


John Cranford,

M. D.





Digitized by the Internet Archive
in 2014

<http://archive.org/details/gateniomniaquae67gale>



GALENI
LIBRORVM
QVINTA CLASSIS
EAM MEDICINÆ PARTEM,
quæ ad Pharmaciam spectat, exponens, simpli-
cium medicamentorum, substitutorum, purgan-
tium, antidotorum, componendorum tam
per locos quàm per genera medicamen-
torum, ponderum deniq; ac mensura-
rum doctrinam comprehendit:

QVARTA HAC NOSTRA EDITIONE,
quàm pluribus sanè castigationibus, ex variorum codicum
Græcorum lectione, illustrata.

*Locis nunc primum in margine signatis, quos Galenus passim
ex Hippocrate citat.*

Librorum numerus proximo folio continetur.

Τὸ Φαρμακευτικόν.



VENETIIS APVD IVNTAS M D LXV.



QVINTÆ CLASSIS LIBRI.

GALENI De Simplicium Medicamentorum Facultatibus libri vndecim, Theodorico Gerardo Gaudano interprete, denuo ab Augustino Gadaldino ad veterum græcorū exemplarium fidem non paucis in locis repurgati. fol. 2	
De Substitutis medicinis liber, Iul. Martiano Rota interprete.	84
De Purgantium Medicamentorum Faculte, eodem interprete.	86
Quos purgare conueniat, quibus Medicamentis, & quo Tempore, eodem in- terprete.	88
De Theriaca ad Pisonem liber, eodem interprete.	89
De Vsu Theriacæ ad Pamphilianum liber, eodem interprete.	98
De Antidotis libri duo, eodem interprete.	99

Omnes hos sex libros, idem Iul. Martianus Rota accuratius
denuo ante obitum recognouit.

De Compositione Medicamentorum secundum Locos libri decem, Iano Cor- nario medico interprete, rursus post Nicolai Machelli medici Mutinensis recognitionem, aliquot in locis emendati.	121
De Compositione Medicamentorum per Genera libri septem, Iohanne Ander- naco interprete, denuo ab Augustino Gadaldino non nullis in locis ad græ- corum veterum exemplarium fidem emendati.	209
De Ponderibus & Mensuris Galeno ascriptus liber, Augustino Gadaldino in- terprete.	235



G A L E N I
D E S I M P L I C I V M
M E D I C A M E N T O R V M F A C U L T A T I B V S
L I B R I V N D E C I M

Theodorico Gerardo Gaudano interprete
Denuo Ab Augustino Gadaldino multis in locis emendati.

A R G V M E N T V M P R I M I L I B R I

Ostendit Quibus rationibus explorandę sint Simplicium Medicamentorum
Facultates, propositis exemplis Aquę & Aceti.

*Quid dicatur Medicamentum, & quid Facultas: Et Quomodo hæc quidem, actu:
illa verò, potentia existat.*

CAP. I.



Quantum conferat simplicium medicamentorum exacte facultates cognoscere, tum ad variorum compositionem, tum ad inuentorum opportunum usum, non habeo nunc ostendere. Nam id partim in opere de Medicamentorum compositione, partim in curandi Methodo monstrabitur. Verum quod deinceps ad temperamentorum sequitur tractationem, id in presentia dicitur: ubi videlicet prius vocabulorum, quibus in hoc utemur libro, significata definierimus. Medicamentum, omne id dicimus, quod naturam nostram alterare potest: sicut, puto, Nutritum, quicquid substantiam augere: refertur enim utrunque ad aliquid. Porro Medicamentum Simplex & ipsum per oppositionem ad compositum nuncupatum est: Est aut id, quod secundum naturam suam syncerum est. At Facultas, causa quaedam est effectrix. Ea quę partim actu siue energia est, partim in futuro tempore: Actu quidem, ut calefaciendi in igne, refrigerandi in glacie: In futuro aut, ut calefaciendi in pyrethro, & castoreo, & similibus: refrigerandi in alterco, mädragora, et id genus alijs. Sanè quandam esse facultatem in purgatorijs quidem medicinis purgatoriam, vomitorijs vomitoriā, sternutatorijs sternutatoriam, bechicis {hoc est quę tussim vel sedat vel ciēt,} bechicā, & in vnoquoque alio opere peragendo, quę denominetur ab eo quod ipsa efficit, ferè nō est qui ambigat. At quę sit huius Facultatis Essentia, quidam certè non posse cognosci existimarunt: quales sunt Sceptici philosophi, & qui inter medicos vocati sunt Empirici. Sed & qui nosci posse arbitratur, inter sese dissidet. Quidam enim ad magnitudines & figuras & posituras corpusculorum ac meatuum {quos ὄγκους & πύλους appellitant} referunt: Alij ad caliditatem, frigiditatem, humiditatem, ac siccitatem: pro sua videlicet utriusque prima elementorum constitutione. Quare & nos, quia in libro de Elementis secundum Hippocratem ex calido, frigido, sicco, & humido, cum aliorum omnium corpora, tum animantium, constare ostendimus, has effectricium facultatum essentias, tum in alijs omnibus, tum in medicamentis, statuemus. Sic autem & in tertio de Temperamentis demonstratum est. Ac qui volet quę nunc dicenda sunt assequi, in eo tractatu se prius exerceat oportet: quippe cum illic quę vniuersim de medicamentis nouisse conueniat, exposita sint. Nec hic toto utique in genere quicquid noui dicemus: verum quę illic generatim sunt scripta, ea hic speciatim elaborabimus.

Quo Pado Quamque iudicare Facultatem oporteat.

CAP. 2.

IN primis quidem ac maxime sumendum est iudicandę facultatis experimentum ab ea re, ad quam dicitur. Siquidem non protinus, si hominem refrigeret cicuta, & sturnum refrigerabit: aut si sturnum nutriat, nutriet & hominem. Eadem ratione neque si hominem purget veratrum, conti-

Quinta Classis.

AAAAA ij

nuo

* ἵμαρ i. no-
stra, est in anti-
quis, licet non
habeatur i im-
pressis.

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

nno purgabit & coturnices: neq; etiam si hos nutrire valeat, consequens statim est, vt & homines. E
Proximum est, vt quod ex accidenti est, distinguatur ab eo quod primario ac per se. Nā aqua frigida calorem quandoq; reuocat, cutem refrigerando, contrahendo q; ac cōdensando: ad id enim, caloris consequit reuocatio, velut in tertio de Temperamentis ostendimus. Rursum "calida quoque ipsa sepe numero refrigerat, excalfacientem nimirum humorē digerendo. Nam si his ad amussim distinctis ad inquirēdā facultatis explorationem accesseris, haud facile, mea quidem sententia, falli queas. Caterum à nullo alio desumi iudicium, q; ab eo ad quod dicitur, id quidē perfacile est: non videlicet an insecta animalia oleum interimat, neque an pingue, aut lentum, aut leue sit considerantes, cum an calfacere, aut frigefacere, aut humectare, aut siccare corpus humanum valeat, inquiritur: Eundem in modum neq; an colore sit rubro rosa, neque an albo cerussa: siquidem necessarium non est, quicquid rubrum sit, esse calidum, neq; quicquid album, esse frigidum: sed an admoda corporibus nostris primario ac per se excalfaciant, ac non interueniente quopiam, neque ex accidente: Ac si ita quidem, facultate esse calida: vt si refrigerēt, frigida. Nam "per deos immortales, vnde nam dicere possumus, an calidum sit facultate album piper, granum cnidiū, cnicus, calx, & veratrum album: aut vnde q; frigidus sit famius aster, terra selinulia, cerussa, nix, & lac: omnia enim ea coloris sunt candidi, viribus verò vel maxime pugnāt. Sunt ergo nix & calx colore f. simillima, viribus autem pugnantiſſima: sed pugnantiā sensus diiudicat. Siquidem niuem applicatam protinus ac primo statim occursu frigidam percipimus: et quoad t̄gatur, magis semper magis q; frigefacere sentimus: videmus porro ipsam neque durare, neq; seruari posse, si vel leuis calor occupet. At calx neque primo occursu refrigerare percipitur: & vsq; dum applicata manet, perspicuo magis ac magis excalfacit. Ex quo constat ex eo q; semper vnum idē q; efficiat, quoad nos contingit medicamen, propriam eius iudicandam esse facultatem.

A.1.1.f.3.d.2.
c.6.fol.61.g.

A.1.1.f.2.d.2.c.
1.fol.30.g

Quo pacto Discernatur Quod ex Accidente quid faciat, ab eo Quod propria Facultate. CAP. 3.

ETenim quod ab initio ad finem vsq; dum applicatum est, magis semper calfacit, id non ex accidente, sed ex sua natura est tale: Sic etiam quod à principio ad finem vsq; refrigerat, ex sua facultate est frigidum, non ex accidente. At sanē si nihil moratus, atque ex posteriore, ac post ablationem facultatem eius expendere voles, sepe numero falleris. Ac forte nō nunq; aquam frigidam, non frigidam modo, sed & calidam, possidere facultatem dices: vbi videlicet frigefacere perpetuo dum nos cōtigerit apparebit, frigidā: vbi vero sepe numero calorē reuocabit, calidam. Quare hæc indiscriminata relinquenda non sunt. Danda q; "in super opera, vt quodcunq; medicamentum in iudicium vocare velis (id quod in libris de temperaturis monuimus) omnis sit expers alienæ tum G frigiditatis, tum caliditatis: ne videlicet naturā eius facultatem adscititia qualitas adulteret. Ad hæc (quæ & ipsa præcepimus) nutrimentum à medicamento distinguo, atq; ea vtraq; ad aliquid dici memento: tum circa eandem sepe substantiam consistere, velut & id quod monstrauimus: Nec secius q; quædam tota substantia in sese mutuo & agant & patiantur: quædam vero vna duntaxat, aut duabus qualitatibus: Super hæc, alia itidem esse tenuia siue tenuium partiū { Græci λεπτομερῆ vocant: } alia crassa siue crassarum partiū { παχυμερῆ Græci nomināt: } tenuia quidem, quæ facile in tenues comminui partes possint: crassa, quæ contra. Atq; vt semel dicam, omnium meminisse distinctionum oportet, quas in tertio de Temperamentis posuimus, vt secundum illas medicamentorum omnium speciei facultas explorari valeat.

A.1.2.t.1.c.2.
fol.92.c

De Aquæ Facultate.

CAP. 4.

ESto sanē prima nobis in cōtemplationem proposita Aqua: q; nimirū ea & cōmunissima hominibus oibus sit, tum sanis, tum ægrotis: & ad vitā maxime necessaria. Primum q; eucrato siue temperato corpori applicator ipsa neq; frigida insigniter neq; calida: Deinde ijs qui natura sunt intēperati: Tertio ijs, q; affectu aliquo tenent. Nam hoc pacto exacte in oibus propriam eius facultatē perpenderis. Igitur tēperato admota plusculo tēpore ipsum oīno refrigerabit: Intēperato vero, citius quidē refrigerabit id quod frigidius natura fuerit, tardius verò quod calidius: Semper aut oīa refrigerabit, etiam si non multis deinceps diebus, sed vel vna quis hora, aut pluribus ea vtatur: nec. n. talis in vllō ipsorum calorē reuocare poterit. Nā quæ summe frigida est, si quadratæ ac iuuenili corporis naturæ pauculo tempore adhibeatur, calorē molietur reuocationē: sin aliter vtaris, semper refrigerabit. Quin et si ijs quoq; qui simplici laborāt morbo, siue calido tēperatura siue frigido, eiusmodi admoueatur aqua, hos etiā manifestò refrigerabit: nam simplex sit affectio oportet (quæadmodum vtiq; in tertio de Temperamentis definitum est) quod videlicet quæ adhibetur, ex sua natura refrigeret, non ex accidente quopiam: quippe cum frequenter, vbi compositus fuerit affectus, aliud primario medicamentum efficiat, aliud ex accidente: velut in phlegmone, est enim ea affectio calidæ copiosæ q; fluxionis soboles. At quæ modicè excalfaciunt pharmaca, cum superfluitatem euacuant, protinus, opinor, & quod affectum est, frigidius efficiunt: Verum cum simplex vna q; fuerit affectio, quod ex accidente sit, in ea prouenire non potest. Ergo si hac ratione expendas, aqua potabilis vnde quaq; videbitur frigida. Non est tamen eadem aliarū aquarum sponte natarū, quæ sulfur, bitumen, aut nitrum, qualitatibus suis referunt, facultas. Siquidē earum omnino nulla, vbi alienæ tum caliditatis tum frigiditatis expers adhibita fuerit, frigefacere conspici-
citur.

A citur. Quinimmo nec marinam ipsam, prius q̄ adscititium frigus summum acceperit, admodū refrigerare apparet. Nam si quis in potabili aqua totum diem innatet, vt ēt non admodum sit frigida, sed velut ex Sole tepens, necessario tñ refrigerabitur: at mare complures iuuenū interdum innoxie pertulere nō per diem modo totam, sed ēt adiūcta nocte. Ex quo liquet aquam potabilem certe & dulcem, secundū naturam suam semper esse frigidam: mare vero non eque. Quod si non semper in sermone adijciam, potabilem, sed dicam simpliciter, quantū ex se est, aquam esse frigidam, haud calumniari oportebit, tanq̄ insufficienter & indistincte locutum. Nā quę exacte ac lyn cere aqua est, omnis alterius substantiæ mistione vacans, ea ex necessitate ex sua facultate est frigida: Si qua verò per bituminosa, sulfurosa, nitrosa, aut aluminosa loca distillans, substantiæ eius aliquid absterferit, secumq̄ traxerit, mista iam ea est, non autem exacte aqua: Velut si ipse quoq̄ volueris aut salem, aut alumen, aut aliud id genus affatim aquæ miscere potabili: sicut sanē sapenūmero facimus in marinæ inopia, quando muriam facere volumus, tūc enī salem aquæ indimus. Ac tantum ipsa facultate iam dissidet, vt si aqua dulcis, videlicet quæ neq̄ insigniter aut calida, aut frigida sit, sed velut ex Sole tepida, & erisipelati perfundatur, noxam oīno nullam hominis corpori sit allatura: at si marinam aquam, aut muriam, aut id genus aquam mistam, bituminosam videlicet aut sulfurosam admoueas, vsq̄ adeo hoīem offenderis, vt partē ipsam sis adusturus. Aqua igitur ipsa ex se frigida est facultate. Porro si extraneum calorem adeptā corpori humano perfundas, putabis forsan simplex quoddam & naturale adhibitum medicamen: at ea quodam vtiq̄ modo composita est, aut igneæ essentiaē partem aliquam nacta, aut certe omnino ipsam qualitātē. Vt enim, si salem illi miscueris, ex confesso fuerit composita: sic multo magis, si igneam aut essentiam aut qualitatem adieceris, compositam quodāmodo et nunc effeceris. Est porro etiam aqua li mosa quadantenus composita, velut est aqua Nili, quę in Ægypto est: sed ea per fictilia vasa percolata planē pura efficitur. Oportet autem non semel, sed bis, & ter percolare, quādo ne sic quidem forsan ad amissim puram queas efficere: verum quando, quī aquæ infertur limus, omnem effugerit sensum, satis tunc est vt queas dicere tales, vt ad vsus, puras & synceras esse aquas.

Quo pacto Iudicemus Aquam Puram.

CAP. 5.

I Vdicantur autē hę tribus sensibus, nempe gustu, visu, & odoratu. Gustu pura est, si nullam offe rat qualitatem, sed ad vnguem qualitatis expers appareat: Visu, cū syncera fuerit, ac planē perlucida. Sic nec odoratu vllam prę se ferre qualitātē debet: vt sunt quædam extreme prauitatis, quę aut aciditatem, aut acrimoniā, aut falsedinē, aut putredinē, aut aliud indicibile aliquod vitium præ ferunt. Igitur aqua quę absq̄ his est omnibus, vt ad naturam certe, ne ipsa quidem ad amissim syn cera fuerit, sicut nec aliud vllum ex quatuor elementis sensibilibus, sed vt ad sensum & vsum syncera est. Talis ergo, vt est dictum, secundū suam naturā frigida ēt est: quippe si valde exalfectam nō modo aquam, sed vel mandragoram, vel altercum, vel cicutam, vel meconium admoueris, non solum exalfecteris, sed etiam vseris corpus humanum. Omnia itaq̄ quę examinanda venient medicamina, omnis extraneæ valentisq̄ tum caliditatis tum frigiditatis aliena sunt, nedum aqua.

Demonstratio, Qua ostenditur Aquam frigefacere Ex cerati, quod ex ea conficitur, effectū. CAP. 6.

Porro q̄ aqua omnis dulcis perspicuo frigefaciat, hinc quoq̄ didiceris. Ceratum humidum si ex aqua frigida subactum accurateq̄ madefactum calido alicui affectui imponas, protinus ipsum frigefacies. Oportet autem quā plurimū admiscere ipsius aquæ, mistioq̄ hoc maxime modo optime perficitur. Ceram quantum fieri maxime potest purissimā oleo liquantes humidum facere ceratum oportet: deinde refrigeratum, ac rasum, in mortario manibus subigere, aquam affundendo frigidam, quantum nimirum ceratum accipere valet, ac non dum aqua circūfluat. Id refrigerat & eos qui in febre vruntur, si hypochondrijs superponatur: & omnem phlegmonem, simili ter herpes quoq̄, & carbunculos, tum erysipelata, & phygethla, ac breuiter omnes morbos calidos. Ergo si non aquam dulcem, sed marinam aut muriam illi admiscens in vno prædictorum quouis vti volueris, non paruam omnino differentiam conspicias: quippe cū id medicamentum adeo nullā propositarum affectionum amplius refrigerabit, vt insuper accedat potius. Adeo multa est diuersitas inter potabiles aquas & muriam marinamq̄ aquam. Æque autē ac muria marinaq̄ aqua, sulfurosa aque, & bituminosa, & nitrosa, & quæ chalcanthum, & mysi, & chalcithim, vel aliquod simpliciter ex natura calidis medicamentis gustu referunt, inimicæ sunt omnes calidis corporum nostrorum affectibus. Ex quo claret has omnes facultatibus esse calidas, solam vero aquam potabilem frigidam.

Quod Aqua Potabilis Humida sit.

CAP. 7.

Æterum q̄ hæc quoq̄ propositarum omnium aquarum sola sit humida, planē ex eadem discies methodo. Nā vlcerata quæ supra modum squallida siccaq̄ sunt, si hac irriges, statim admodum humida flaccidaq̄ reddes, cū aliæ aquæ vniuersæ vlcerata deficcēt. Tum piscatorum vlcerata adeo videntur sicca, ac si forent salita: contra eorum, qui in balneis versantur, humida apparent ac flaccida. Quin si imbutum linamentum vlceribus imponere libeat, humida quidem a potabili, sicca verò a muria marinaq̄, reddi comperies. Aquæ quin etiam aluminosa, quales sunt in Italia vocatæ Albulæ, cū alijs vlceribus idoneæ sunt: tum verò quæcunque fluxionibus tentantur, ea

Quinta Classis.

AAAAA iij

perfacile

† τὸ καλούμενον ἰαληθές.

perfacile desiccant. Sic nec cæterarum aquarum vlla humectare potest, q̄ videlicet non sint exacte E aqua, sed mista & adulterata, accepto nimirum aut alumine, aut chalcite, aut sale, aut id genus aliquo. Quocirca earum non nullæ vlcerâ quoque exasperant, nempe quæ acres admodum sunt & mordaces. Quin etiam sitienti dulcis aqua leniens remedium est: ceteræ vero acerbiores etiam sitim relinquunt. Tum aqua inter cutem laborantibus aduersissimum est & poculum, et lauacrum, aqua dulcis: falsa vero, ac nitrosa, & sulfurosa, bituminosaq; omnes sanè peritiles. Imitari autem potes sicut marinam, sic aliarum quamlibet, substantiâ videlicet admista, quæ in quaq; vincere cõspicitur: nam sulfure in aquam dulcem indito sulfurosam effeceris: alumine aluminosam: ac eodẽ modo aliarum vnamquamque.

Quod Aqua Aduentitium calorem naeta, semper quidem Humectet, Non aut semper Calfaciat: Verum In ipso quidem perfusionis tempore calfacere, Postea vero frigesacere consuevit. CAP. 8.

HÆC ergo propria aquæ natura humida est & frigida. Aduentitium aut calorem adeptâ excalfacit quidem & humectat, quibus est ad mota: verum haud similiter ambo prestare simul potest. Summe namq; humectat seu tepida sit, seu temperata, seu et calidior: summe aut non calfacit, nisi quæ extreme feruat. Quod dico, in temperata primū exploremus naturâ. Igitur si huic aquæ afferas temperate calidâ, eaq; vel laues vel itidem perfundas partem aliquam, in ipso quidem perfusionis tempore calidiorẽ simul & humidiorẽ se ipsa efficit: q̄ si deinde quiesces, nec corpus frigidæ vsu postea contrahes constipabis ac densabis, paulo post se ipso frigidius fieri conspicias, quippe cum corpus rarefactum, transpirante immoderatius calore nativo, frigidius efficiatur. Nõ tamen sicut frigidius postea calidæ vsus corpus destituit, ita & siccus: quanq; profectio videri id possit, tum ob spiramentorum raritatem, tum ob corporis mollietatem, tum ob substantiæ fusionẽ: plusculum siquidem in his affectibus euaporetur necesse est: atqui vapor humor est extenuatus.

Verum non ita habet rei veritas. Nam mollietis, quam calidæ aquæ lotionibus acquirunt corpora, solius humiditatis proprium ac inseparabile signum est, in animantis videlicet corpore: velut in opere de Temperamentis est demonstratum. Sanè vlceratarum partium caro, id ipsum perspicuo ostendit, vt quæ in istis ex aqua calida perfusionibus flaccida atque algè ritu fluida efficitur: quanquam sanè corpus illiusmodi affectionibus inanitur, vt minus tunc in sese habeat humoris, quam antea. Videriq; venia digni possunt, qui per calidas lotiones, atque aquæ moderate calidæ perfusiones siccari corpus existimant: nam similis horum est error, atque illorum qui credunt senes adolecentibus esse humidiores. Pluribus namq; senes excrementis redundant, sed genuinæ (quæ *πεφυκτα μόρια* nuncupant) organicæq; partes adolecentibus magis sunt humide: vt id quoq; in G secundo de Temperamentis monstrauimus. Perinde se res habet in perfusionibus, ac lauacris, omniq; adeo ex aqua calida irrigatione. Siquidem humores qui in valis alijsq; inanibus spatijs sunt, exhauriantur omnes: at ipsa vasorum corpora, & vniuersum genus carnosum se ipso fit humidius. Atq; hanc solam facultatem nunq; aqua dulcis deponit. Neque enim cum feruens corpora exurit, quæ vsta sunt redduntur sicca, vti quæ ab igne sunt assa: rursum nec cum summam adeptâ frigiditatem per diem totum, aut etiam longiori tempore, parti cuiuspiam perfunditur, eam sicciorẽ efficit, tamen si rugosa atq; admodum exilis relinquitur. Verum hæc eueniunt, q̄ qui in valis alijsq; spatijs est humor, exhaustus sit: at partes genuinæ solidæq; nulla sua parte sicciores euadunt. Huiusq; semper meminisse oportet: Tum toto sermone perpetuo obseruandum ex euidenter apparentibus colligendam cuiusque medicamentis facultatem: Ac semper, ad quod quid dicitur calidum, frigidum, humidum, aut siccum, ad id esse æstimandum.

Si à Rebus Externis de Medicinarum Facultate colligi quid oporteat, ex Ignis cum illis commercio Faciendum esse Iudicium. CAP. 9.

Porro si quis velit ex supabundanti à rebus externis pbationes ducere, ne id quidẽ prohibeo: verum, animū diligenter aduertat, consulo. Nam {admodum lubrica res est, ac} multos obtinet paralogismos i. fallendi modos. Sed hos in consequentibus edisserā. Cæterum quod solū quis ab externis rebus sumpserit, vt id quod iudicium subit medicamentū, aut excalfacere, aut refrigerare p̄bet, id in ignis cõmercio cõtactuq; conspicit. Neq; n. vsq; adeo absurdū est, quod facile in ignẽ veris, id calidū facultate putare. Memoria enim, opinor, tenemus oia huius vocis Facultate significata, q̄ in tertio de Temperamētis diffiniuimus. † Vnū igit ex ijs erat & id, quod ex propria eius, quod dicitur, materia, tale est facultate: siq; n. facile in ignem vertitur, id facultate est ignis, non actus scilicet: Nam hoc quod est facultate, ex aduerso ei diuiditur quod est actus: alterū vero quod est per se, ei quod est ex accidente. Hanc ergo iudiciū rationem considerare ac distinguere conuenit.

Quorū & Quæ Prædefiniri oporteat, Vt liceat ex alicuius affectione quæ ad Ignem est, Quo pacto aduersum nos id ipsum afficiatur, colligere. CAP. 10.

At quibus consilium est tuto à rebus extraneis ad corpora transire animalium, videre primū debent, an tenuis sit essentia, an crassa, quod explorandum venit. Secundo an sibi continuum densumque ac solidum, an interuallis interceptum ac rarum. Quocirca his immorandum prolixius est: videtur enim id quoddam esse principium, ac velut elementum multam considerationem postulans.

* in impressis
cod. græ. legi-
tur duntaxat
τὸ ὁδὸν id est
aqua: in pluri-
bus tamẽ mu-
tiscriptis ad-
ditur τὸ γλυ-
κὸν ὁδόνοςτι
i. dulcis scilicet

† Clariora vi-
detur eẽ uerba
tertijs de tẽpe-
ramētis ca. 1.
cl. a. pag. 21. f.
Præterea q̄cũ
que sientiu cõ-
tinuētis mate-
riæ sũt, nec re-
fert an conue-
nientes, an pro-
prias dicās etc.
quo i loco γλυ-
κὸν ὁδόνοςτι
habeatur, quod
hic δεσποῖς
i. eius quod di-
citur. cõsidera.

A

Quòd quæ Subtiliorum sunt partium, Promptius propriam exerant actionem, Quàm quæ Crassiorum, Tamen si Eandem cum illis Facultatem obtineant. CAP. 11.

A.1.2. t.1. c.4.
fol.94.h

Igitur eorum, quæ in confesso est facultate esse calida, nullum omnino apparet nos excalfacere, prius quàm in tenuia sit comminutum. Nam si quis piper solidum cuti inspergat, nullam planè caliditatem percipiat: eadem ratione si quis vel linguæ imponat, aut deglutiat, aut alio pacto vtatur integro, haud quaquàm diligenter trito, & cribrato, ac non adeo còminuto, vt pollinem tenuitate referat. Nā quod pollinis instar tenue cuti inspergitur, excalfacit, ac maxime si affricueris: præterea quod linguæ admotum fuerit, aut in ventrem deuoratum: At quod solidū integrumquè imponitur, nec cutem calfacit, & linguæ ventriquè exiguum dūtaxat caliditatis sensum mouet. Itaque cum tenuium esse partium dicantur quæ facile in tenues partes comminuuntur, crassarum vero partium quæ contra: tum dura viscosaquæ ægre, ac difficulter, aut omnino in tenues comminui non possint: fragilia vero, & quæ citra viscositatem mollia sunt, prompte in tenues soluantur: hinc constare arbitror multa esse facultate calida, ac facile accendi, verū nos haud facile excalfacere. Nam ignis, vt qui omniū esse tenuissimus, simulquè calidissimus, & in profundum facile penetrat, & comminuit, extenuatquè, & vincit, atquè in suam deniq; naturā cōuertit, vnde quaquàm scilicet simile reddens, atque

Bexuperans id quod contingit: At nostra caliditas supra quàm quæ crasse sit essentia, & halituosa, in super infirma est, vt nō facile metuet quod contingit. Ostensum est aut in tertio de Temperaturis (quo sine, quæ hic dicuntur, assequi est impossibile) nullū eorū, quæ nos excalfacere apparent, perinde vt ignē posse calfacere, verum vt materiā accendi facilem: liquidem mutationis principium à nostra caliditate accipientia, vt calamī aridi ab igne, nos cōtra recalfaciunt, & velut partes sunt quæ dā calorī natiui, sicut illi ignis: nam quod prius erat calamus, id nunc fit ignis, vt mutantis ipsū ignis essentiam totā adaugeat. Monstrauimus aut quædam, vbi vel leuem fuerint mutationē extrinsecus adepta, secundum naturā deinde suā ad plurimā mutationē procedere. Quamobrē mirandū non est, si quædam medicamēta primæ quidē mutationis principiu à nostro calore nacta, inde iam pergant eum quoquè, qui mutabat superare. Nam cū corporis cuiusquè proprietas alia habilis sit ad suscipiendum calorem, alia inhabilis, fit vt paria principia non sequatur par incrementum.

{ Quòd Pharmaca, quæ Paruam sortita sunt Molem corpoream, Magis agant, Quàm quæ Magnam }

Quin etiam quod corpus admodum exile facilius alteratur mutaturquè ab eo, cui admotum est: quod autem grandius est, non nisi temporis spatio, ac vix tandem etiam sensibilem alterationem sustinet: id cum non modo à phisicis naturā scrutantibus sit demonstratum, sed cuius etiam hominī rei ipsius experientia notum: satis magnum adfert testimonium ijs, quæ modo dicebamus. Quippe si piperis particulæ à nobis accipere debent mutationem: eoquè accipiant facilius, quod fuerint minutiores: mirandum non est, si eas tanto citius excalfacere experiamur, quanto accuratius in minimas fuerint comminutæ.

Medicamenta Parem etiam sortita sunt Facultatem, tum Consistentiam, Quanto Rarioribus applicentur corporibus, Tanto Ocius actionem suam exercere. CAP. 12.

Quin etiam quod extima cutis superficies callosa sit duraquè & frigida, tum quod sub ea est, quanto profundius subeas, tanto sit calidius, nemo ambigit. Huic sanè rationi si duo etiam principia in alijs à nobis tractationibus demonstrata adiecero, ita deniq; vniuersum possis colligere. Alterum quidem ad demonstrationem principiorum, siue lēmatum, siue axiomatum, siue propositionum, siue vtcunquè nūcupare libebit, in cōmentarijs de Temperamentis demonstratum est, Cutem videlicet oēm in primo statim ortu sibi esse continuam: at temporis spatio perforari, ac plurima nancisci spiramenta ritu cribrorū. Alterū vtilium ad ratiocinationem propositionum est, Corpus vniuersum expirabile esse ac inspirabile, vt inquit Hippocrates. Fusius autem de hac dictum est in libro de Vsu pulsuum, vbi monstrauimus arterias, vbi se dilatantes vndique, & per omnes meatus attrahunt, nō aerem modo halitumquè attrahere: sed, quicquid etiā trahi facile, ac tenue sit, ad spiritalis essentia impetum expedite consequi. Quibus sic se habentibus multæ venæ arteriaquè aperiuntur in cutis meatus & in ipsius superficiem internam: ac in meatuum perforationes haud pauca peruenire venarum arteriarumquè oscula existimandum est, nihiloquè secius ad extimam superficiem, ita vt ipsæ osculis ibi finiāt: Tum quicquid piperis ad exactissimum redactum fuerit pollinem, simul cum ambiente aere ab arterijs attrahi, ipsumquè protinus à calore natiuo transmutari, idquè tum ob paruitatem, tum ob ingenitam vt à calore alteretur aptitudinem: liquidem haud aliud illi erat facultate esse calido, quàm facile posse incalescere. Quod si semel id illi inlit, mirum nō est per omne corpus tempore perlatum, ipsum recalfacere: ac proinde primū maximequè ab id genus medicamentis incalescere partes, quas primū contigerint: deinde quæ his sunt proximæ & continentes: ac sic deinceps tertio, quarto quæ loco, pro situs videlicet vicinitate, cum ijs quæ primo incaluerant, incalescere. Hæc scientifica constant demonstratione, non tamen ijs satis credibili, qui in primis non fuerint exercitati. Oportet enim in ijs quæ de Elementis sunt ratiocinationibus esse versatum, atquè in cōmentarijs de Temperamentis, & Vsu pulsuum, & ante hæc omnia in demonstrandi methodis peritum. Sanè paucis datum est oīa percurrere. Verum his quidem suffecerit (mea sententia) in euidentibus duntaxat versari, paucis attactus cōmentibus

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

rationibus siue epilogismis. Itaq; causam, quamobrem non exalfaciunt corpora humana ea quæ E
crassa adhibentur, etiam si natura sint calida, ijs duntaxat qui rationem assequi valeant, dictam esse
reputent: sibiq; satis esse persuadeant, quod euidenter sensibus apparet. Apparet autem euidenter
crassorum omnium nullum prius, q̃ ad vnguem comminuatur extenueturq; neq; ipsum a corpo
re nostro quicquam perpeti, neq; rursus in nos posse agere. Nec enim solum in pipere, napy, can
chry, cæterisq; omnibus quæ nos exalfaciunt, ita se res habet, sed æquæ item in facultate frigidis.
Nam si quis radicis mandragoræ corticem in magnas partes contractam cuti imponat, aut illinat,
† faut deglutiat, 3 planè nihil efficiet: at si admodū lit cōminuta, refrigerare potest. Sic et papaueris
semen, & cicuta, tametsi hoc sit omnium refrigerantium valentissimum, tñ antequam exacte cō
minuatur, cuti nostræ impositum planè est imbecillum. Ne te ergo magna teneat admiratio, q̃ ca
lami aridi, piliq; tametsi accendi promptissimi sunt, non tamen nos contactu exalfaciāt: quippe
qui planè a nostro calore mutari nequeant, vt sic recalfaciant, q̃ videlicet pollinis ritu cōminui nō
valeant: quandoquidem calamus Indicus, quem & aromaticum idest odoratum appellant, cū m
tundi, cribrari, ac planè magis, quàm qui apud nos nascitur, cōminui valeat, clarè nos exalfacere
conspicitur, sicut vno ore omnes qui ætate nobis maiores sunt medicī, confitentur.

† Est quidē in
antiquis codi.
græcis ἡ κατα
πιος i. aut de
glutiat, i. ipres
sis tamen et
i. tralatione ue
teri uerba hæc
non habentur.

Quod Corpora Rariora Citius ab igne Accenduntur, quàm quæ sunt spissiora.

CAP. 13. F

Porro considerandum est (quemadmodum propolui) non solum crassarum sit partium an te
nuium, exploradorum medicaminum substantia, verum etiā rara ne, an spissa, densa ue. Vo
co sanè rarum, cuius partes spatijs inanibus intercepta sunt, intelligentibus videlicet nobis, ac sem
per recordantibus, quo pacto dicatur spatium inane ab ijs, qui vnitam esse dicunt substantiam,
non quemadmodum Epicuro & Asclepiadi est visum: immo aere plenum est in raris corpori
bus spatium inane. Vbi ergo eiusmodi spatijs multis corpus fuerit distinctum, facilius q̃ spissum
accenditur, etiam si q̃ ad caliditatis frigiditatisq; attinet temperiem, similiter illi sit affectum. Nam
qui in ijs spatijs continetur aer, cū sit ad patiendum promptissimus, primo statim ignis occursu
accenditur atq; inflāmur: vnā vero secum corpus vniuersum accendit, vnamquāq; eius partem
nimirum vndequaq; occupans. Ergo, si parua corpora, cingente ea circunquaq; flāma, promptè
accenduntur (nā id clare conspiciamus) non sine ratione corpus rarum celeriter accenditur, vt pote
cū profundas eius partes omnes flamma contingat. Sic itaq; calamos aridos ignis celeriter exur
rit, tametsi minus sint alia substantia calidi, idq; ob meatuum multitudinem, quos aer quidē prius
occupabat: vbi vero ignis contigit, flamma depascitur: Aer enim accensus, flamma est, terra vero
carbo. Porro q̃ aeris plenos meatus multos aridus calamus obtineat, summum argumentum est
ipsius leuitas: nā siccum natura corpus leue esse alioqui nequeat, nisi inanitate sit præditum. Eun
dem in modum pumex, & spongia sicca, atq; omnia adeo quæcunque fistulosa sunt, multumq; va
cui obtinent, pondere sunt leuia. Sic sanè & calamus non eo duntaxat q̃ siccus est, sed q̃ plurimi
aeris est particeps, promptè accenditur: at a nostro corpore ægrè proinde calferi potest, quod ef
sentia sit crasse. Quando igitur medicamenti cuiuspiam ex ignis commercio temperiem colligen
tes, scrutari statuimus, an aduersum nos eodem modo se gerat, substantia eius respicienda consti
tutio est. Nam si tenuis quidem sit, sed continua, eandem & in nos naturam ostendet, quam prius
in ignem: sin autem rara sit & crassa, fieri potest vt ab igne quidem perfacile alteretur, non tamen
a calore nostro, ac proinde nec nos recalfaciat.

A.1.2.t.1.c.3.
fol.92.g

Aquam Tenuium esse Partium, Nec vnquam nos Ex sua natura Exalfacere.

CAP. 14.

Osteaquam igitur hæc eū in modum definita sunt, rursus ad sermonem de aqua redeamus.
† Nam q̃ tenuis sit essentia, argumento est, q̃ promptissime per pilos & vestimenta perfluat:
nam propter humiditatem mollitiemq; quæ nihil habeat adiunctum viscositatis, diuiles partes
obtinet, & quæ facile in minimas possint distrahi. Talis cū sit, tamen neq; nos ex sua natura cal
facit, neque proprium est ignis nutrimentum, immo omnino contra aduersatur, & dissidēt, atque
extinguit, vt quæ illi sit aduersissima: nec mirum est, si cum igne natura tum calidissimo, tum sic
cissimo, pugnet aqua, quæ frigida est & humida. Coniectura quidem igitur & ex ignis fumenda
commercio, quo pacto quodq; medicamentum in calore frigoreq; se habeat: non tamen protinus
existimandum tale & ad nos videri, nisi tenuium sit partium, & spissum. Sic oleū tametsi facile in
flammas vertitur, non tamen admodum celeriter nos exalfacit, nimirum lenta crassaq; substan
tia sua tenaciter ijs inhærens quæ primum contigit: proindeq; lōgissime omnibus perdurat quib
us fuerit illitum, scilicet nec ab ambiente facile aut extenuari aut digeri potens, nec intro in cor
pus promptè trāsumi: Aqua vero econtrario & celerrime in halitum soluitur, atque expedite di
geritur. Proinde etiam si in idem vas coniectā aquam oleum que decoquas, prior tamē aqua dige
ritur, & absumentur. Sic item si lithargyro, aut cerussa, aut id genus aliquo cum aqua diligēter com
misto, simul ambo decoquere voles, priorem digeri aquam experiere.

Non simpliciter Quod citius ab igne Accenditur, Id ad nos quoq; Apparere Calidius.

CAP. 15.

Non ergo simpliciter quod citius accenditur, protinus ad nos apparet calidius. Siquidem
ante ostensum est, vt calefacientium talium simpliciter erat calidum, vt ignis: aliud exuperā
ua calidum, velut qui in nobis est calor: Sic eorum quæ facultate sunt calida, aliud esse eiusmo
di,

* πολυάμυν.

* εασιάζει.

† ενεργεια i.
actu, additur
in antiquis cod.

A di, vt ad id quod primo & absolute est calidum: aliud vero vt ad id, quod per exuperantiam dicitur. Quam ob rem non absolute ab ea, quæ aduersus ignem est, in iudicium venientium medicaminum dispositione, ad nos transire expedit, sed adiecta limitatione proposita.

Non Quod citius à Frigore Congelascit, Eo quod tardius, Absolute Frigidius existimare licere, sed Inter ea quæ parem sortita sunt consistentiam. CAP. 16.

A. 1.2. r. 1. c. 3.
fol. 92. g.

E Adem hæc limitatio itidem necessaria est, quoniam ex eo quod quid facile congelatur, frigidum esse colligimus. Nam in his quæ eandem habent aut tenuitatem aut crassitudinem consistentiæ, quod ocus à frigore congelatur, temperamenti est frigidioris. Nam si alterum sit tenuius, puta ex olei causa, vinum: alterum crassius, vt oleum: non est necesse aut citius, aut magis, concrelescere quod est frigidius. Verum, si quanto alterum est frigidius, tanto alterum quoque crassius sit, similiter ambo concrelescent. Caterum magis concretum videatur, ipsa videlicet consistentiæ duritia quod fuerit essentia crassioris. Nam rationabile est, reor, similiter congelatorum quod crassioris fuerit essentia, itidem fieri durius. At si vel alterum plus sit frigidius quam reliquum essentia crassioris: aut contra minus frigidius quidem alterum, sed alterum crassioris essentia: haud etiam pari tempore hæc congelascere est possibile: verum quod plus est frigidius quam alterum essentia crassioris, minori temporis B spatio: quod vero minus est frigidius quam reliquum essentia crassioris, maiori. Sic magis minusque vitrumuis ipsorum videri durum, id pro excellus portione euenire est necesse.

Quo Differat Congelatio à Refrigeratione.

CAP. 17.

Hæc ergo memoriæ mandare oportet: tum quod non idem sint congelari & refrigerari,† & quod il-
lud maxime à refrigeratione proueniat. Nam refrigerari est frigidam accipere qualitatem: at congelari est durescere præ frigore. Ergo quæcunque corpora tenuis sunt essentia, cum facile perpetuantur, promptè tum incalescunt, tum refrigerantur: at non æquè promptè congelant, vt aer, & ignis. Nam hic planè non congelatur: ille autem, nempe aer, non perinde vt vitrum, vt pix, vt cera, resina, bitumen: tamen si bitumen sit vel calidissimum, verum essentia eius crassities ac terrenitas, ad congelationis celeritatem adiuuat: ac si tetigeris, calidum etiamnum, planè tamen congelatum reperias: sicut (puto) & plumbum & stannum non aliter concreta sunt etiamnum feruentia. Sic aquam Hippocrates, quæ celeriter & incalesceret & refrigeraretur, semper esse leuissimam retulit: nam quanto tenuior fuerit, tanto pati promptior est: atqui quæ tenuior est, minimum habet limi terrestres. Non ergo absolute, nec temere ex materia passionibus ad ignem, conijcere eius ad nos facultatem oportet, verum adiunctis limitationibus suprappositis. Quare nec equè securum hoc C iudicium, ac id quo ad nos ipsos quid examinamus: at qui hoc etiam ulterius transeunt, planè in multis errorum periculis versantur. Quamquam id faciunt medicorum complures, alij omne quod viscosum est, calidum asserentes:† alij, quicquid adstringit: non nulli, quicquid est dulce: quidam vero, et quod austerum acerbum ue est: sunt autem, qui singulis illorum contraria defendant. Sed qui in istis errores comitantur postea narrabo. Nunc autem præsentem sermonem consilium est absoluerè: nempe vt si quis ex ignis commercio materiam iudicare volet, non absolute neque citra limitationem id faciendum: neque perinde ad ignem & hominem habere, quicquid iudicatur, putandum. Nam aqua igni aduersissima est, vt quæ facultatem sortita est frigidam & humidam: muria vero, marina, bitumosaque & sulfurosa aqua, non equè, quippe cum id genus omnes ab aqua ad calidius recesserint. Verum de sponte natis aquis (Græci αὐτοφῶν vocant) vel hæc sufficiant. Siquidem ubi medicaminum vnus cuiusque, quorum qualitates accipere aquam ostensum est, sermonem singillatim tractabimus, si nunc aut obscurius quippiam aut imperfectius sit dictum, id tunc adijcietur.

{ De Aceto. }

Sed ad reliqua nunc liquidorum medicaminum transibimus: Inter quæ vel maxima est controversia de aceto, alijs frigidum, alijs contra calidum adstruentibus: non nullis calorem quidem D quendam illi concedentibus, sed quendam et auferentibus, velut qui acetum vinum esse mortuum asserunt. Nam hi propriam vini caliditatem perdidisse quidem, verum putredinosam assumpsisse aliam quandam contendunt. Atque ego sanè non multum abest, quin illorum laudem sententiam, in eamque promptè accedam,† proque hac assertione atque opinione pericula omnia subeam, siquam machinam aut artem inuenire queam, sicut in lacte contrariarum partium separationis, ita hic quoque. Nunc autem, quod lac vniuersum non sit homœomeres & simile, neque vnde quaque sibi idem, clare monstrat eius scissio, excogitata videlicet multis hominibus ratione, qua partes calidas à ferolis separari possint. At qui neque tale quid repertum in aceto est: neque manifesto demonstrare possis, quod quantum eius est tenue, atque humidum exacte, refrigeret: quod vero firmius facis substantiam in eo defertur, velut in vinis, calefaciat: nam ea solum ratione aperte quis probauerit ex contrarijs ipsum partibus consistere, sicut lac. Sanè in omnibus liquoribus, quos exprimendis fructibus concidunt, crallum defertur quippiam, quod & temporis spatio subsidit: fax vocatur in vino, in oleo autem amurca. Sed et in omnibus alijs† inest, quod illis proportionem respondet, tamen si proprium nomen sortitum non sit, quod velut fax est in illis. Et fortasse & in aceto est eiusmodi quippiam, & forsan ipsum est quod caloris est particeps: quod vero frigoris, id quod tenue est. Fortassis vero & in ipso tenui exiguum quiddam defertur in multa quantitate dispersum alterius nature, quod ipsum sit totum: nam quod maiori parte

† tamen si.

† Ex antiquis
græcis. Alij
quicquid ad-
stringit, frigi-
dum: non nulli
quicquid e-
st dulce, calidius
vero austerum
uel acerbum e-
st frigidum. Si-
tigua tamen
tralatatio habet
vt noster inter-
pres.

† & συν-
δύναμις
τῆς αὐτοφῶ-
ντος καὶ
ἑαυ.

* ἐμπερι-
στα.

† humiditati-
bus expre-
ssitur in
lactone vel

A. 1.2. r. 1. c. 1.
fol 91. e

parte frigidius sit q̄ calidius, liquido ijs apparere arbitror, qui vere facultatem eius expenderint. E

Perperam multos Cauterij Instar Acetum pronunciaſſe Calidum.

CAP. 18.

AC miror, qua ratione ducti quidam vsq; adeo calidum esse acetum pronunciarint, vt cauterio ipsum assimilarint: Nam hac, inquit, ratione sanguinis eruptiones (αἱμορραγίαις Græci vocant) reprimunt. Primum enim tanta caliditas sensum nostrum nō fugeret. Deinde ad illorum calidorum imaginē omnino utiq; crustam efficeret, calidis medicinis similiter. Nam id plane cōspicimus, vbi per ea sanguinem sistere statutum est, crustam relinqui haud exiguum: siquidem, nisi crustam effeceris, sanguinem haud represseris, nam ea velut operculum fit corporibus sanguinē profundentibus. Proinde sanē etiam cauteria planē candentia illis applicare consueuimus, compertum nimirum habentes, quæ non sunt eiūsmodi, præterquam q̄ nihil proficiant, insuper lædere, ac sanguinis profluuium irritare. Nec sanē ignis ex sua ratione, aut q̄ calfaciat, ipsum sistere potest: verum idcirco, quia cum vrat quæ contigerit, quod ex vstione reliquum est, operculum subiectis partibus relinquat, id quod Græcis appellari consueuit ἐσχάρα, {Latini autē crustā vocant.} At acetum haud perinde vt crustam facientia medicamenta, sed potius vt adstringentia & refrigerantia, citra crustam sanguinis fluores cohibet: itaq; hac quidem ratione non excalfacere {extreme,} sed refrigerare putetur. Præstat tamen, vt & supra monuimus, à talibus coniecturis recedere, vt pote quæ iudiciū ad sensum haud referant, neq; ex propē positis aut vicinis, sed è longinquo & longis lemmatis siue sumptionibus, rationem colligant. Aperiam autem copiosius illarum absurditatem in libris sequentibus.

Qua Methodo Cognoscere liceat, An Calidum sit Acetum.

CAP. 19.

NOs autem secundum methodum siue rationem ab initio positam, vim eius experiemur, primum in ijs quibus inculcata constat sanitas, mox in intemperatis, deinde & in ægrotantibus. Itaq; spongiam aut lanam aceto madentem cuius sanī corporis parti superponemus: deinde, vt ante est positum, protinus rogabimus, idiotas scilicet, atq; ex plebe aliquem (nam illorū in istiusmodi incorruptum est iudicium, quia nulli videlicet dogmati seruiliter sunt addicti) nunquid calorē, an frigus, percipiant. Id verō satis constat, q̄ illud nec summe frigidum, nec calidū admouebimus: nam et de hoc supra verba fecimus. Sanē si tale fuerit, quod applicatur acetum, potissimum si non admodum inueteratum, neq; extreme acre, manifestum principio frigus percipiet: itidem & post vnam, duas, tres ue horas: postea verō, post sublationem scilicet, sensum nascentis in parte caloris phantasiā ac opinionem habebunt. Porro si vehementer acre acetum extiterit, & hoc etiam refrigerari se principio dicent: celeriter tamen recurrentem calorem sentient, non autem longo post tempore, velut in recentiore ac nō valde acri aceto. Ex quibus constat omnino frigidum quidem esse acetum, sed quendam etiam obtinere calorem, qui acrimoniæ ratione per aliquod accides spatium temporis mediocriter corpora excalfaciat, tamen id non vbiq; sed in quibusdam dūtaxat, possit efficere. Nam laxis ac doloris expertibus tumoribus, neq; protinus, neq; postea, caloris sensum aceti vsus commouet: mordicatio tamen in illis quædam percipitur, ob quam sæpenumero ijs qui intemperanter vtuntur, tenuis quidam recurrit rubor. Itaq; neq; primario, neq; proprio temperamento excalfacere videri possit, sed acrimoniæ morſu irritare. Porro quandoquidem à sanis corporibus ad affectus semel delapsi sumus, suggeramus, quæ in calidissimis & frigidissimis affectibus efficere queat. Ergo si quis ab illita thapsia vrat, ardor aceto restingitur: id quod, cui libitū est, experientia discere licet, velut nos profecto fecimus in nobis ipsis, quō accurate medicamenti potentiam experiremur. Illitis enim multis in locis tibijs, vbi post quatuor quinque ue horas accēdi et inflammari cœpissent, huic quidem parti acetum, illi aquam insperimus: alij vero oleum, alij rosaceum inunximus: & alijs atq; alijs alia atq; alia, quæ aut acrimoniā hebetare, aut calorem refrigerare creduntur: sed eorum omnium acetum compertum est efficacissimum. Quocirca manifestum est non eo, q̄ acrimoniā, ac mordacitatem obtundat, sicut oleum & rosaceum, † (nam id H præstare hæc possunt) sed quia refrigeret, tale esse. Quippe, si excitata à thapsia phlegmonas aliter sanare non liceat, nisi aut refrigerando, aut morsum siue acrimoniā obtundendo: nec alterū præstare valeat acetum: consequitur utiq; necessario per reliquam vim sanasse. Alias porro reliquas calidas passiones oēs, phlegmonas puta, herpes, phygethla, erysipelata, carbunculos, aliās plus, aliās minus, refrigerare consueuit. Quapropter nisi vehementia illi atq; asperitas facultatis molesta inesset, haud alio sanē vtendum ad refrigerandum foret.

Quibus Rationibus sint vsi Tum ijs qui Summe Calidum, Tum ijs qui Summe Frigidum esse Acetum pronunciarunt.

CAP. 20.

TAmetſi quidam reperiantur, qui maximum id caliditatis eius argumentum constituunt. Non enim, inquit, neq; acre, neq; mordax, neq; asperum, neq; erodens foret, nisi affatim illi inesset caliditas. Nam sicut frigidi proprium est contrahere ac refrigerare, ita calidi secare atq; diuidere: id quod in primis efficere acetum valet, quippe quod secet atq; erodat non modo animantium corpora, sed & grumos, callos, lapides, fictile, æs, ferrum, plumbum, ac tantum non velut ignis cuncta peruadat ac penetret, nec vlla possit substantia penetrationis eius vehementiam aut sustinere, aut illi reluctari ac resistere: Nā subtile haud secus esse atq; ignē, nō leui testimonio illi tactū esse: quā

* prurigo.

† Al. ex anti quis cod. græc. nam acetū has (hoc est acrimoniā & mordacitatē) efficere solet. Vetus itē interp., quonia de proprietate ipsius aceti est, vt faciat accidere mordicationē etc. & ita omnino legēdum videtur.

A. l. i. f. 4. c. 24. fol. 83 g

Aquin & gustantibus ita videri, & per subtilissima vestimenta promptius aqua perfluere, omniaq; exedere, vti paulo supra diximus. Et quid nam, obsecro, aliud ipsum his verbis q; ignem pronunciant: Non aliter q; qui frigore grumos ipsum soluere contendunt, premendo videlicet, densando, ac vnde quaq; stringendo, ac liquis digitis amplectens compreslerit. Nam hi rursus adeo excedunt, vt & niue frigidius ipsum adstruant. Sed vtrorūq; castigada immoderatio est. Neq; enim vt frigidum sit, iam niue frigidius: neq; vt calidum, omnium calidissimum pronunciandum est: liquidem, nisi iuxta medium foret, ac longe ab extremorū vtroq; dislitum, non tanta incidisset de facultate eius controuersia. Nam de cicute aut mandragore viribus nemo ambigit, neq; de nasturtij & canchryos: verum illa omnibus medicis in consello est facultate esse frigida, hæc vero calida: Eundem in modum altercum & meconium frigida, piper & napy calida. Ad hæc innumera sunt alia, quæ facultate aut esse calida, aut frigida, vno ore medici omnes fatentur.

Quod Acetum Neutrum esse dicimus, Vt ad summe calida, et summe frigida, Quia Vtriusq; extremorum est Particeps.

CAP. 21.

A. l. 2. t. 1. c. 4.
fol. 95. g.

CÆterum acetū, sicut vtiq; & rosaceū, neq; esse summe calidū, neq; rursus summe frigidū, vel ex ipsa dubitatione satis constat: neutrū vero quodam modo, vtrūq; horum sit necesse est. Si quidē cū neutra tripliciter dicatur, vti diuisit Herophilus, partim amborū extremorū participatione, partim neutrius, partim nunc illius nūc huius, oīno & hæc aut aliquo significatorū, aut aliquibus, ex neutrorū natura fuerint. Mihi sanē magis vident vtriusq; extremorum participatione: & q; nunc sensibilibus calfacere videant, nunc rursus refrigerare. Sic ergo neutra dici possint acetum & rosaceū. Quod si quis ea neutra ostendere conetur, quia neutrū extremorū participant, ne illi quidē et forte probabiles quædam rōnes deerunt, sed non erunt demonstratorie ac scientificæ. Id me exacte compertum habere confido, & maxime de aceto. Nam q; suæ vtriusq; sint rōnes probabiles, tum ijs qui frigidissimū demonstrant, tum ijs qui calidissimum, non paruum indicium est ipsum vtriusq; esse particeps: admodum tñ difficile est rationi, contrariorum participationem cōcedere, cum non liceat substantiam eius aut soluere, aut scindere, velut in lacte facimus, & alijs cōpluribus, quæ omnia sermonis progressus aperiet. Proinde euidentius magisq; periculo vocas principium optamus assequi. Porro vt mihi quidē videtur, indagandum illud principium est ex naturæ tū tenuitate, tum crassitie, de qua dictum quidem supra est: verū nunc quoq; copiosius de illa differere expedit, quandoquidem & Plato de principijs longum haberi sermonem oportere prodidit.

Quo pacto Aerem dicamus Tenuum esse Partium, & Nec Omnem Ignem esse Tenuum

Conceditur partium, Nec Quicquid Tenuum est partium, esse Ignem. CAP. 22.

Igitur nemo aerē nō dicit esse leptomere i. tenuiū partiū, q; videlicet in tenues facile partes cōmituat, quodq; p corpora dēssima expedite penetrat: aut si ex alia re quapiā leptomere i. tenuiū tatis partiū, vocabulū illi attribuāt, clarē nos doceāt. Nec. n. ex corpusculis exilibus tenuibusq; vt alterius sectæ principes asserūt, & nos quoq; aerē constitui fatebimur: nā cōtinuus est, totusq; vnus, nihil vsquā in se vacui cōtinens. Porro in eiusmodi corporis natura tenuitas partiū intelligit ex sola in tenuia diuisionis celeritate. Verū si ea rōne aer est tenuiū partiū, haud oīs ignis tenuiū erit partium: quippe cū æs, ferrū, lapis, lignū, atq; adeo quicquid in carbonē verti pōt, sit ignis, non tñ q; antea tenuiorū partiū: flammæ tñ, cum aliud sint ignis genus, re vera tenuiū partiū sunt. Quocirca non oīs ignis est tenuiū partium, neq; quicquid tenuiū partium, protinus & ignis fuerit: liquidē et pruna ignis quidē est, sed nō tenuium partiū: et aer tenuium partiū, verum non ignis. Quid ergo tā in promptu habet hæc propositiones vtrasq; tū medici tum philosophi paulo minus oēs, Omnem ignē esse tenuium partiū, & quicquid tenuium partiū sit, esse igneum: Nā si acrius quis attēderit, animūq; diligenter aduertat, haudquaq; dixerit prunā aere tenuiorū esse partiū. Memoria nāq; repetamus ambientis nos aeris puritatē ac partiū tenuitatem in vehemēti frigore & boreali conditū: ipsamq; cum ferro componamus ignito: manifesto enim ex illius modi exemplis cognoscemus frigidum quid esse, quod sit exacte tenuium partium: & calidum, quod sit crassarum.

Non Omne quod Mordax est, Tenuum partium esse, aut Calidum.

CAP. 23.

Quocirca haud cōcedendū arbitror quibusdā, qui acetū ex eo, qd mordax sit, tenuiū partium et calidū esse colligunt: nec. n. quicquid tenuiū partiū fuerit, id et calidum est: forte verō nec quicquid mordax fuerit, & tenuiū partium. Verū in præsens id illis deī, tametsi adferre liceret niuem, boreā, aquam frigidā, non oculis dūtaxat, sed & vlcibus, & raris corporibus oībus, mordaces, vti Hippocrates inquit, || Vlcibus frigidum mordax. Verum et si quis et illud, vt dixi, concedat, quicquid mordax fuerit, esse tenuiū partium, nō statim & calidum concesserit. Itaq; nec acetum proinde q; mordax sit, calidum fuerit, sed tenuium partiū, vti aer borealis, non tñ calidum.

Quomodo Acetum Obscure Videatur Calfacere.

CAP. 24.

Vnde nam igitur quibusdā obscuræ cuiusdam caliditatis sensus oboritur: Fortassis, vt ante dixi, ex contrarijs facultatibus compositum est, perinde vt lac. Forte verō caloris ipsius reuocatione. Possit etiam, cum asperum molestūq; habeat transitū, dolorem inde ciere, atque cum in locum calidam elicere fluxionem, siquidem id palām est partibus dolentibus quippiam influere. Verum multum influere nequeat, quandoquidem acetum frigidum est, & proinde id quod accurrit,

currit, repellens. At quod planè tenue est, id medicamēti anfas effugiens, præterlabitur, atq; in parte figitur, haud etiam retrorsum, sicut id quod crassum est, repulsum. Sane ad vnguem tenuis quidam efflorescere rubor in partibus ab aceto iritatis conspicitur. Forte verò alia causa est, quæ comprehendī nequeat. Nā ob id ipsum procul ordiendā facultatum explorationē prohibuimus, quia in naturalia incidere problemata necesse est, eaq; non leuibus ambiguitatibus perplexa. Nobis igitur haud statutū est, sicut ijs qui naturam rerum scrutantur, oēs omnium rerum causas exquirere, verū medicaminū facultates cognoscere, quò & illis dextrè vti, & boni compositorum euadere artifices possimus. Nam q̄ sit impossibile aut probe ipsum medicamentum cōponere, aut eo quod ab alio compositum est, idoneè vti, anteq̄ simplicium medicaminum facultates pernoueris, abunde in libris tum de Curandi ratione, tum de Medicaminū compositione conscriptis ostenditur. Cū ergo is nobis in hac tractatione propositus sit scopus, vbi primum quod ab illis utile est inuenerimus, à physis problematis recedendū est, quæ innumeris dubitationibus sunt intricata: quippe, cum in qua in vniuersum temperatura, aciditas, dulcedo, {lentities,} amaritudo, salsedo, austeritas, acrimonia, & aliarum qualitatum singulæ prouenire sunt natæ, phisici viri scrutari nituntur, hesitationes tum plurimæ, tum maximæ, in oratione existere assolent. Has ego non secus vitandas censeo, quā quædam præcipitia, cum præsertim ad manum sit via regia, qua medicamenta iudicare liceat. Primumq; quod paulo ante præcepi, perpendendū, nullam in ambiguo esse facultatē eorū medicamentorum, q̄ vehemēter aut exalfaciūt, aut frigefaciūt: verū de quibus ambigitur, neutra sint, necesse esse: Deinde pleraq; vt ad sensum simplicia, ex pugnantibus constare facultatibus: non. n. solū lac, sed et sulfurosa, bituminosa, nitrosa, & quæcunq; eius sunt generis sponte prouenientū aquarū, ex pugnantū facultatū mistura nascunt: siquidem aqua ex sua natura frigida est & humida: bitumen aut, sulfur, misy, chalcitis, & eius generis alia, calida. Meminisse vero et oportet calidorū haud puca, crassæ esse essentia: nec pauciora frigidorū, tenuis: ac fm hæc principia tuto de medicaminū viribus pronūciare. Sat igitur fuerit, tenuium partiū, refrigeratorium, exiccatoriumq; acetum dixisse, omisis super illis rationibus nimis phisicis, {quæq; magis ad naturam rerū scrutantes attinent:} nam ex illorum scientia, quo pacto alijs medicamentis misceri ipsum liceat, cognoueris.

Veteres medicos Perperam Indefinitam reliquisse Facultatis eiusdem generis

Medicamentorum Qualitatem.

CAP. 25.

QUocirca non possum eos non culpare, qui de viribus eius prolixa quædam nugant & garriunt: magis etiam, paulo minus medicos oēs, quibus curæ non fuit simplicium oium medicamentorū in maioris minorisq; ratione vires discernere: sed satis eis fuit, hæc quidem, G verbi causa, calfacere dixisse, illa vero refrigerare: tum hæc humectare, ista exiccare. Nec enim absolute sic nouisse expedit, sed quatenus psyllium refrigeret, quatenus solanum, aut scāndix, aut cerusfa, aut portulaca, aut lactuca: Tum quatenus exalfaciāt calia, quatenus cinnamomum, aut amomum, aut cardamomum, aut maiorana. Sic & in humectantibus & exiccantibus facultate pharmacis: Non enim vtile est generale solum nouisse, verum quid primum recesserit à symmetro et medio contrariorum facultatibus: Deinde quid illi proximum, tum tertium, quantum, quintumq; si fieri potest, recessum siue ordinem, planis limitibus discernentē definire oportet. Quandoquidem in tali facultatum notitia tum artificialis simplicium vsus constitutus est, tum à ratione proficiscēs ac methodo compositio. Facitq; præter hæc, vt quæ composita iam sunt, rite vsui accommodare possis. Sanè id quidem difficultatis atq; laboris plenissimum est, multamq; poscens tum diligētiam, tum vsū. Ab experiētia verò auspicari in id genus oibus necesse est, velut iam propositum est: tum tuto ac diligenter colligere, ab ambiguis quæstionibus cauendo. Eoq; mirari quispiam possit eos qui talia exquirunt, cum illos implicantes sese quæstionibus scriptisq; animaduertat, quemadmodum consuevit Herodotus.

Perperam Superioris seculi Homines à Compositis medicamentis orfos, Eorum quæ in illa ingrederentur Simplicium pharmacorum Indicasse facultates.

CAP. 26.

SIquidem ab omni vetustissima compositorū medicaminum historia orsi, ad expendenda quæ in illis sunt simplicia transeunt. Ac qm̄ his, exempli causa, calfacientibus medicamentis admistum inuenitur acetum, proinde & ipsum esse calidum cōtendunt. Neq; enim an recte admistum fuerit, constare potest prius, q̄ eius seorsum vim totam perspexeris. Neq; si id detur, etiam nota est componendorum medicaminum ratio, per quam iudicantes inueniemus, qua ratione multis exalfacientibus medicamentis vnum admistum sit frigidum: aut certe refrigerantibus, quod calfaciat. Porro, vbi etiā latentes affectus memorant, ad quos congruere videantur, ac deinde dogmaticis opinionibus paralogismos connectunt, ex quærendis quærenda, ex obscuris obscura, inuicem colligentes, tum profectio vel maxime alijs suas produnt ineptias ac nugas.

Quod & Empiricis Contradicendi præbeant occasionem, Qui Citra iudicium ac discrimen & simpliciter Compositis omnibus facultatibus Fidem habent.

CAP. 27.

NAm omitto, q̄ Empiricis etiam reprehensionis locum ipsi exhibent, ex quo prompte compositis facultatibus omnibus fidem habeant: tanquā fieri non posset, vt pars magna earum errore non vacaret, perperāq; esset composita. Dicent enim arbitror, sicut sanè dicunt, frustra nos

primas

* Cod. græci an
iique habent
sandyx.

A primas effectrices q̄; cuiusq; medicaminis facultates exquirere, cum ab experientia inuenta iam antea sit tum compositorum, tum simplicium medicamentorum, innumera multitudo, quibus & ipsi fidē habent, qui frustra primas facultates exquirunt. Quippe si particulares eorū vsus omnes comperti sint, eos q̄; vnanimiter omnes prædicent: ceterū de causis ob quas agunt, non dū conueniāt: liquet non ex primarum facultatū notitia medicamentorum tum compositionem, tum vsum, esse inuenta: sed ea composuisse experientiā, at rationem ad probabilitatem vsq; duntaxat procedere.

Hæc atq; eiusmodi alia multa, qui experiētiā profitentur medici, ritē in illos dicere videbuntur, qui omnibus quomodocunq; conscriptis pharmacis fidem habere non verētur, causas tñ interim titulis virium ac promissis eorū aptare nituntur. At ego nec illud quoq; { in illos } addere grauabor, Herodotum alias sectas omnes prauas reputare præter eam, quæ spiritibus omnia tribuit, { πνευματικὴν Græci vocant: } Metrodorum omnes præter Asclepiadeam: & Zenonē præterq; quæ ab Herophilo inuenta est: & Hermogenem præter eam quæ Erasistratū autorē habet: & aliū atq; alium oēs damnantem extra suam: De compositis tantū medicamentis citra probatio nē atq; experimentū scriptis omnibus fidem tribuere, siue à sectæ suæ hominibus sint scripta, siue diuersa, siue etiā à quopiam ex plebe. Quin verò etiā causas subinde reddere conātur probabiles

B medicamentorum pessima ratione compositorū, & (quod hoc est mirabilius) etiam si nullum eorum quæ laudant, fecerint periculum, sed alijs duntaxat credant. Quemadmodum cum quidā nuper mirificas multas q̄; podagrici medicamenti laudes iacisset: atq; eo etiamnum loquente forte fortuna aduenisset podagricus quidam, qui tam mediocriter laborabat, vt incedere etiam posset: nos q̄; iussissemus, in illo primū præberet experimentum: ille acquiescens pedi pharmacum appositum fuit. At vir ille noctem totam insomnem egit: ac postero die tantum abest vt cōmodē sicut antea incederet, vt ne gestari quidem posset. Adeo citra vllam explorationem ac temere tum alijs quidem fidem habent, tum alios alijs scientes ac sponte fallere gaudent. Porro etiam si omnes medicamentorum quæ memorant, compositiones probē essent comparatæ, veruntamen speculationis eorū vsum ex ijs quæ faciunt euertunt. Aiunt enim ad præparanda medicamenta cōposita, ea q̄; ritē vtenda, simplicium facultates inspicere ac considerari: in q̄; eorū testimonium tantum nō omnes veterum citant, Erasistratum, Herophilum, Philotimum, Dioclem, Praxagoram, & ipsum et Hippocratem. Porro vbi ad exploranda ea accedunt, ita nobiscum agunt, ac si omnes perspectas iam haberemus facultates compositas. Atqui inquiet, opinor, ad eos quispiam: Quo pacto non frustra simplicium quærat facultates, si omnes compositorum iam noscitis? nam si quorum gratia simplicium facultates inquiritis, eas omnes iam nouistis, superuacaneū est illas exquirere. Ceterū si vel hoc quoq; quis illis cōcedat, saltem id quod & supra positū est nescio quo pacto qs perferat, cum pugnantia cum rebus euidenter apparentibus, prolaxis rationibus adstruere conantur.

* Al. τούτου
id est huius.

Sensus Haud contemnendos esse, Tanquam ad explorandas Simplicium medicaminum Facultates sint Insufficientes.

CAP. 28

Siquidem in quendam etiam iam incidi tantæ stupiditatis hominem, vt contemnendos esse sensus existimaret. Quem cum rogasset quis, num ipsi piper album videretur calidum, ita q̄; vt par erat, annuisset: rursus q̄; alter percontaretur vnde id sciret, ac ille responderet tale apparere: meritò ab ijs qui præsentibus erant derisus est, qui quod diceret nō intelligeret. Ipsum enim hoc apparere, fidē haberi ab illo sensui indicabat, quem paulo antē tanquam fallacem contempserat. Nam per deos, vnde ignem scimus calidum? aut quo syllogismo docti, aut qua demonstratione persuasi? tum vnde glaciē frigidam esse didicimus, nisi ex sensu? Ac postea reperiantur, qui ipso sensu neglecto physicis problematis libros impleant. At non illo ex genere est, quam ob causam acetum terram fermentet: licet enim nobis dicere q̄; nos lateat, sicut talium problematum pleaque. Si verò quis promptē dicat, quia aut calidum sit aut frigidum (vtrunq; enim dicunt) in ambiguis obscuras q̄; rationes se ipsum coniiciet.

Vtrum in Oxycrati potu Acetum admixtum sit duntaxat vt aquam deducat,

An etiam vt ipsum quoque refrigeret.

CAP. 29.

Mecum certe probē actū putem, si quæ sensui apparentibus vicina sunt, atque in propinquo posita, exactē inuenire possim, discernēs in eis ac separās quod ex se est, ab eo, quod ex accideute, puenit: Velut exēpli gratia qm̄ estiuo tpe oxycrati potu qdā planē refrigerant, atq; expertes sitis permanēt: sed nō dū constat, an id acetū gratia eueniat: pauculū siquidē eius copiosē aque mixtum, non calidū, sed q̄ fieri potest maximē frigidū ebibunt. Nā dixerit forte quispiam, quia tardius scule permeet aqua, & plurimū temporis moretur in hypochondrijs nec deorsum concedens, nec in corpus se diffundens, idcirco illi acetum misceri tanq̄ in omnem partem ferendæ futurum vehiculum: Sic etiam si cum vino bibatur aqua, sitim efficacius extinguī, q̄ si sola, vino si ipsam ad distributionem promouente: Itaq; refrigerationem, sitis q̄; sedationem ab aqua prouenire, vt quæ frigidæ naturæ sit & humidæ: ceterū adminiculo esse, ac velut alas illi ad omnes corporis partes permeandas addere tum vinum, tum acetū, quæ ipsa nequaquā frigida sunt & humida: siquidem præstare, sic sola exhiberi potius, q̄ cum aqua, qm̄ ea facile præ tenuitate in corpus distribuatur, & ab hypochondrijs recedant. Porro qm̄ semel in hunc sermonē deuenimus, nihil obstat quò minus

nus

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

nus omnem exacte perficiamus. Nam q̄ fieri possit, vt & aquam acetum deducat, nec tamen ipsum met refrigeret: & non deducat solum, sed etiam refrigeret: certo certius est: Verum vtrum cum veritate coniunctum sit, id considerationem postulat. Distingui autem id possit tantummodo, si cui exhibeas acetum & vinum, vtrumq; seorsum & per se. Apparet enim à vino homini semper sitim incrementum, ab aceto verò epoto interim quidem augeri, interim vero sedari.

Quæ sit Sitis Causa.

CAP. 30.

Quipe cum & Sitis duplici ratione provenire soleat, partim humoris inopia, partim caloris copia. Quamobrem mirū videri non debet, si priorem quidem sanare nequeat, alteram possit: siquidem humectare nequit, at refrigerat non instrenue. Quapropter neq; à sicca dispositione provenientem sitim, neq; à calida & sicca vñq; sanare queat epotum acetum: at si qñ in vnum coeant humiditas atq; caliditas, eiusce quidē sitis optima medela acetū est. Rara sanē eiusmodi affectio est, in aquæ inter cutē affusionibus {ταπεγχύσεις Græci vocant} nōnunquā proveniēs, cōgesta nimirū in ventre falsi humoris copia: tum ēt si quibus pituita falsa ventri illita inheret. At q̄ aliter siti premuntur, puta in febribus ardentibus, & alijs omnibus exurentibus febribus, qui q̄ ætate laborant, ac in gravi æstu, cōposita ijs est affectio, ex caliditate videlicet & siccitate: quare nō iniuria cōposita illis medela est acetū, vt quod strenue refrigeret, & quovis expedite p̄meet: & aqua, q̄ supra q̄ refrigeret, oīum sit vel humidissima, nihil est enim aqua humidius.

Medicamentum Quod in Iudicium venit, Non mistum, sed simplex esse oportere.

CAP. 31.

Quemadmodum ergo haud satis secura est procul à sensu ducta de explorando medicamento ratiocinatio, ita nec ipsius alteri cuipiā permisti usus. Siquidem ipsum per se solū quod iudicandum venit, expendere oportet tum in sanis corporibus, ijs q̄ temperatis & intemperatis, tum in morbo alicui obnoxius: In temperatis quidem, velut supra positum est: In intemperatis, sicut dixit Hippocrates, Naturis picrocholis, hoc est, quæ amaræ bilis succo abundant, utilissimum esse acetum: qui vero temperaturam sortiti fuerint melancholicam, aduersissimū. Porro in morbo aliquo affectis, si simplex fuerit, in simplici exploretur affectu: Sin mistum alicui, necesse est quod commiscetur, temperatura sit medium, sicut in aqua & cerato simplici superius declaratum est. Rationabile quippe arbitror, q̄ nulli diuersi temperamenti sit mistū, sed quā fieri queat medio coniunctum, ipsum eorum, quæ perficiuntur, causam existere. Nam simplici cerato quod neq; calfaciebat, neq; refrigerabat, aqua admista frigida refrigeravit, quippe quæ temperiē habebat frigidam. Quod si excalfacientium quippiam eiusmodi cerato cōmiscuisses, profectò calidum id medicamentum euassit: quemadmodum in affectibus compluribus sæpenumero euphorbium aut castorium temperauimus. Sic si acetum simplici ad amissim cerato cōmisceas, cerato ipso longe frigidius medicamen effeceris: tanq̄ nimirum, quod admistū est, sit frigidū. Erit q̄ tibi id remedium vel optimū ad erysipelata, phlegmonas, herpes, carbunculos. Si autem quod mistum est, tanq̄ simplex expendas (nam id etiam moliūtur) longē maximē hallucinaberis. Nam vlcerū glutinatorium non acetum, sed oxycratum, dicendum est, aliam multo naturam ab aceto obtinens. Siquidem quemadmodū carnem producere in vlceribus nequit ærugo, sed ceratū exiguum quiddā habens æruginis: ad eundem modū neq; acetū conglutinat, sed aqua aceti paucillū accipiens. Ipsum verò p̄ se ac syncerum acetū vlcera quæ glutinationem desiderant, mirū in modum exasperat, vtpote partiū tenuitate erodens, ac dolorē excitans. Quamobrem haud merito, nec conuenienter talia dicuntur, nec melius item faciunt, cum ignotis ignota connectunt.

Quod neq; Adstringentia omnia conglutinent, neq; Conglutinatoria item omnia adstringant.

CAP. 32.

Quipe, cum nihil seorsum de glutinandis, aut carne implendis, aut cicatrice obducendis vlceribus, demonstrarint, ex inductione tñ colligunt, adstringentia omnia dicētes vlcerū esse cōglutinatoria. Oportet autē nō ex inductione, sed p̄ demonstrationē in genere talia accipere, quemadmodum nos facturi sumus in curandī rationis cōmentarijs. Immo absolute quiduis H tale dictum, non modo indemonstratum est, sed etiā falsum. Neq; enim chalcitis, neq; galla, neque malorum puniceorum putamina, neq; omphacium, neq; alumen, multo q̄ minus æs vstū, neque æris squama, neq; misy, vlcera glutinare possunt: alia q̄ innumera sunt inter adstringētia, quæ glutinare nequeant. Porro si quis non hoc, sed glutinatoria omnia adstringentia dixerit, proferētur & hic quoq; non pauca quæ citra adstriccionē conglutinent. Neutra igitur vera oratio est, si simpliciter atq; indiscrete efferatur, neq; cum dicunt adstringentia omnia vlceris glutinatoria: neq; cum aiunt, quæcunq; glutinantur, adstringentium beneficio glutinari. Porro multo sanē ēt magis tum absurda, tum falsa ac præter sensum asserunt, cū mordacia, acria, amara, falsa, ad hæc q̄ molliissimas iucundissimas q̄ sortita sunt qualitates, adstringere dicunt: tanq̄ ad sensoriū gustus non pertineat, quod adstringit, sed ex illorum impositione atq; arbitrio debeat accipi. Malum enim granatum, & malum, verbī causa, & mespilum, & pyrorum quedā genera, & myrta, & sorba, vinum q̄ tum amynæum, tum marsum, euidenter nos adstringunt: At triticum, & zea, & milium, Herodotum forsā adstringebant, aliorum autem omnium neminem. Sexcentos enim qñq; super his sum percōtatus, & in primis super amylo: nam & ipsum adstringere ait Herodotus, sicut & piper: quod nec ipsum vllum omnino aliorum hominū, qui syncere & incorrupte qualitates expendunt,

Aexpendunt, adstringit. At Herodotus cuncta confundere non est veritus, ait que, & quæ acerrima sunt facultate, & quæ summe rodunt, & quæ mollissima sunt ac mitissima, omnia adstringere: tanquam in hoc, vt quosdam sensu defraudet, victoriam statueret. Verum nō ita se res habet, cum ea vel maxima futura sit prauitatis dictorum eius probatio.

Quod non omnia adstringentia refrigerent.

CAP. 33.

* Al. Asclepiades

QVin vero & Asclepiades Metrodorus, tanquam illum etiam superare contenderet asserendis de sensu mendaciis, cum alia quædam, tum resinam & bitumen calfacere nos denegat, atque adstringentia omnia refrigerare dicitur: cum, si nihil aliud, saltem chalcitis, chalcanthos, & misy, quæ valenter adstringunt, tantam affecuta sint caliditatem, vt nos etiam exurāt. Nihil est ergo mirandum, si prolixa quædam nugentur, seipsos que nō nulli fallant, cum de manifesto apparentibus verum fateri non audent.

Perperam Herodotum ac Dioscoridem, quæcumque aut profluuiis, aut dysenteris mederentur, adstringentia censuisse.

CAP. 34.

ITaque ex eis quidam, puta Herodotus & Dioscorides, medicamenta quædā ex eo, quod diar rhœis aut dysenteris medentur, adstringere ea colligunt: quanquam ne minimū quidem habeant adstrictionis, immo prorsum contra rarefacientia nimirum sint & laxantia: cum alioqui quæ adstringunt, corpora contrahant, condensent, constipent, atque cōstringant. Nam semel sensibus pro nihilo habitis atque contemptis, euerterunt confuderunt que omnia, quæ planē sensu dignoscere est, hæc praua ratione asserentes. Nam adeps caprinus omnibus, quæ aut gustu aut facultate sunt adstringentia, aduersissimus est, velut etiam farina triticea, & amyllum, & innumera eorum, quæ vim habent tum emplatricam, hoc est illinendi, tum mitigatoriam, atque acrimonias hebetandi, ea que ratione iis, qui acria mordacia que per aluum excernunt, auxiliantur. Sanē esto & oleum ex adstringentium numero, quoniam sepius iis, qui grauiter mordicabantur, infusum profuit. Esto vero etiam & cera, & adeps suillus, tum gallinaceus, & anserinus, chondri tragi que succus. Nam hæc quoque infundimus, & ceratum quandoque iis, qui vehementer mordicantur, sicuti & adipem caprinum. Verum efficacius auxilium affert caprinus, quia scilicet facilius & cōcrescit, & intestinis inungitur, plurimō que tempore inhæret. Porro siue ob crassitiem, siue aliā ob causam celeriter concreseat, non est opus in præsentia inquirere, re ipsa euidenter apparente. Verum, quemadmodum, quod ocysime concreseat, atque intestinorum morsus obtūdat, ex rei euidentia credibilius est, sic sanē etiam, quod nulla insit aut frigiditas, aut adstrictio. Atque hi qui cōdem ex obscuris ratiocinantur de apparentibus, immo autem, si verum fatendum est, seipsos potius decipiunt. At nos tanto decet magis ad sensum accedere, tanto que diligentius perpetuo illi attendere, quanto plura in eo peccent sophistæ omnes, falsa que de eo asserant. Rursum ergo, vbi prius memorauerimus, quæ idiotas non fugiunt, ipsi que haud ignota erant, cum non dum contendendi libidine in sensus peruenissent contemptum, postea autem per superuacaneam sapientiam amiserunt, ad id, quod continuum orationi est, transibimus.

De propriis sensus cuiusque sensorii.

CAP. 35.

VNaqueque sensilium natura priuatim subiecta est, tactui quidem caliditas ac frigiditas, durities & mollities: albedo vero, nigredo, flauedo, rubor, atque, vt summatim dicam, vniuersum colorum genus, visui: amaritas, dulcedo, austeritas, acerbitas, aciditas, falsedo, acrimonia, gustui: planē que demens videatur, si quis gustu colores iudicare tentet, aut saporis visu: eodem modo de tactu cognoscendum est, reliquis que sensibus, si quidem tactu iudicandæ sunt differentie tangibiles, auditu audibiles, odoratu odorabiles. Quæ cum sic sese habeant, audiamus, quæso, Platonem gustabiles differentias exponentem. Haud tamen animus ipsius physiologiæ attendendus est. Nec enim nunc tempestiue eius meminero, neque in hoc viri testimonium cito, sed tantum vt ostendam, qua de re quodque nomen efferre Grecis mos est. Ausculta ergo differentem Platonem. Tenduntur à lingua venulæ ad cor, saporū nunciæ, in quas si qua ita inciderint, vt humi dam mollem quæ carnis partem penetrantia, terrestri sua natura liquefacta, venulas contrahant atque desiccant, si quidem asperiora sint, acerbiora: si minus aspera, austeriora nuncupantur. Cæterum, quæ eas abstergunt, totam que linguam abluunt, si quidem id supra modum efficiant, simul que aliquid absumant, vt de natura aliquid colliquent (qualis est nitrorum facultas), amara omnia appellantur. At, quæ nitri virtute inferiora sunt, ac moderata vtuntur abstersione, falsa citra asperam amaritudinem, & grata nobis magis apparent. Quæ vero, vbi oris caliditati applicata, ab eo que mollita & feruescunt, ipsum vicissim recalfaciunt, atque accendunt, præ quæ leuitate ad capitis feruntur sensus, ac quæque obuia incidunt, talia omnia has ob vires acria nuncupata sunt. Eadem vero ista interdum à putredine attenuata, & angustas ingredientia venas, partes inibi tam terrenas, quam quodam modo aerias, mutuo incurfu mouent, ac misceri compellunt, commistas vero circumlabi alias, & alias ingredi, ingressu quæ suo penetratas concauas circumtensas que efficere, eas que humore circumfuso concauo, interim terreno, interim puro vascula aeris ex aqua concaua rotunda quæ effici: ac, quæ ex puro constant, perlucida sunt, & vocantur ampullæ: quæ vero ex terrestri agitato elato quæ, ebullitio fermentatio quæ nuncupantur. Harum affectionum causa acidum cognominatur.

Omnibus

DE SIMPLICIVM MEDIC.

Omnibus uero, quæ de istis dicuntur, affectio contraria ab occasione nascitur cōtraria. Porro, ubi E »
ingredientium constitutio in humidis familiaris linguæ habitui existit, quæ exasperata quidem »
fuerint, lenit: quæ uero præter naturam aut coierint, constiterint que, aut fusa laxa que fuerint, »
partim contrahit, partim laxat, omnia que quàm maxime ad naturæ statū reducit: quicquid eius- »
modi est, iucundum, suaue que, & cognatum est omnibus, violentarum que passionum remediū, »
ac medela, nominatur que dulce. His uerbis Plato, quæ nos vocare solemus austera, quæ acerbæ, »
quæ salsa, & nitrosa, quæ amara, quæ acria, quæ acida, quæ dulcia, exposuit. Id uidelicet, quod à no-
bis σύρον siue adstringens dicitur, ipse austerum nuncupans: nam sic à uetustioribus Græcis ap-
pellari solet. Non tamen omnia in vnum confundit, sicut ij faciunt, qui & piper adstringere di-
citant, cum ex acrium sit natura, & acetum, quod ex acidis est, nec sanè etiam ueriti dulcissimo-
rum quædam adstringentium numero adscribere. Ex quo fit, cum omnia confundant, ut pro-
tinus nec facultates inuenire omnino ualeant. Omnis enim inuentionis demonstrationis q; prin-
cipia sunt, quæ sensui, atque intellectui euidencia sunt. At isti hæc ambo perturbant: atque omnes
in unum confundunt cum sensuum actus, & passionem, tum multo etiam magis intellectus, ac ra-
tionis, nimirum haudquaquam in speculatione logica uersati. Itaque operæpretium est nugacem
illorum loquacitatem omnibus modis effugere, ne quid nobis quoq; affricetur uitij ex tam pro- F
lixa illorum, futili que nugacitate. Porro haud leue negocium est dedocere, ac trāsmutare eos, qui
ab illis usque adeo peruerli sunt, ut & sensum contemnant, & nequaquam in speculatione logica
se exercuerint, planè que rudes sint rationum, quas de natura philosophi considerant. Omnino
enim saltem uel id didicissent, quæ in illis sunt ambiguitates, fugiendas esse, caute que obseruan-
das: tum sensibus magis super simplicium medicaminum facultatibus, quàm rationibus haud sa-
tis integris, committendum esse iudicium.

De propriis linguæ sensoriiis.

CAP. 36.

Verum tales dedocere, ac uelut transformare est impossibile. At aliorum tamen gratia, nimi-
rum quos conatus noster iuuare poterit, resumēda est, diligenter que definienda tota de pro-
priis linguæ sensoriiis oratio. Nuncupatur igitur tum à Theophrasto, tum ab Aristotele, tum à
Mnesitheo medico gustandi facultas, græce χυμός (nos saporem dicimus) secunda syllaba ab μ
litera incipiente: at ex humido, sicco que consistentia, eorū uidelicet, quæ à calore concocta sunt,
χυλός (nos succum dicere possumus) à litera λ secūda incipiente syllaba. Tamen si ab ætate illis ma-
ioribus non modo Atheniensibus, sed & Ionibus utrunq; per μ literam scribi consueuerit. Siqui-
dem & apud Platonem, & apud Hippocratē, ueteres que comicos sic scriptū reperitur. Vocetur G
autem in præsentī quidē sermone, clarioris doctrinæ gratia, gustatoria facultas, siue qualitas, siue
ut cunq; cuique appellare libet, per literam μ, χυμός (nos saporem nominabimus.) Humor autem
incrassatus tum in animantibus, tum in plantis, χυλός, secūda syllaba à litera λ incipiente (nos, ut
diximus, succum uertemus. Sciendum ergo sapores, qui tum in unoquoque animali, ac planta,
tum in terra inueniuntur, plurimos esse, nec facile specierum numero comprehensibiles: ceterū
differentias gustabiles aliis octo uisas, aliis numero septem, non nullis autem & his quoq; paucio-
res. At Plato in Timæo in supraposita dictione primum duos sapores memorat eiusdem speciei,
sed in ratione maioris, ac minoris differentes: eorum alterum austerum, alterum acerbum nomi-
nat. Fuerit autem austerus, quem σύροντα (adstringentem uoco) nuncupamus: porro acerbus
huius intentione prouenit, uelut & ipse Plato significauit. Atq; hos sanè pro vna specie nume-
rabimus. Altera est eorum, quæ illis opposita sunt, nitrosorum uidelicet, salis, & amarorum.
Et in his quoque amarus ex nitroso prouenit intentione: salis uero aut nitroso imbecillior, aut
adstrictionis quoque assumens aliquid. Deinde à Platone acris expositus est, mox acidus, postre-
mo dulcis. At à Theophrasto additus est vnctuosus, siue pinguis, à Platone quidem in sermone
de propriis linguæ sensoriiis præteritus, uerum paulo ante plantarum succis adscriptus, ubi vino- H
sum ab oleoso & melleo discernebat. Porro in illo sermone tribus nunc memoratis quartum adie-
cit succi genus, vna appellatione comprehensum, ὀπὸν nominans. Vbi autem ad gustus sensoria
transiit, protinus dulcem memorauit (nihil enim retulerit, dulce, an melleum dicas, uelut nec pin-
gue, an oleosum) omisit autem pinguem, ut qui ad gustum nihil attineret.

Qua differat adstringens ab austero, & acerbis, reliqui que inter se sapores.

CAP. 37.

Qualis autem eorum sit vnusquisque, exponere quidem exacte est impossibile, quandoqui-
dem nec aliam vllam sensoriam passionem: uerum ei, qui eodem sensu communicauerit, li-
cet suggerere. Ergo, si quis aut cydonia, aut mala, aut mespila, aut myrta gustauerit, pro-
culdubio cognoscet alium nobis ab his in lingua moueri sensum, alium ab adstringentibus cor-
poribus. Nam, quæ adstringunt, introrsum pellere contactam nostri partem ex omni parte appa-
rent, id q; æquabiliter, uelut equaliter pellentia, ac stipantia, cōtrahentia que. At austera in profun-
dum etiā subire videntur, atq; asperū quendam, inequabilem que mouere sensum, tanq̃ reliscan-
tia, & humorem omnem corporū sensilium depascentia. Ex quo fit, ut alia sit passionū proprie-
tas, quæ q; haud facile, lucide q; explicari possit, tum ab adstringentibus nos corporibus, tum ab
austeris saporibus. Sed quiuis tñ, qui homo est, facile, quod dico, comprehenderit. Porro, quādo,
quod

A quod linguæ nostræ admotum fuerit corpus, valde desiccatur, contrahitur, & in multam profunditatem usque illam exasperat, sicut pyra sylvestria immatura, & corna, eiusmodi omne acerbum appellatur, ab austeris intentione duntaxat diuersum. At quod nos adstringens vocitamus, haud temere à Theophrasto dictum reperiatur. Videtur autem idem significare quod austerum, aut certe commune esse genus tum huius, tum etiam acerbis. Quæcunque verò linguam dum contingunt, non contrahunt, neque constipant, velut adstringentia, immo contra plane agere apparent, nempe detergentia & abluentia, etiam si adstringentium quippiam adiunctum sit, hæc omnia falsa cognominamus. At quæ his etiam magis detergent, adeo ut etiam moleste exasperent, amara nominantur. Porro quæ mordicant roduntque, idque cum valida quadam caliditate, acria vocantur: si hæc absit, acida: ceterum hæc fermentandi quoque vim obtinent. At quæ velut inungunt atque implent, ac in statum suum restitunt exasperatas ac veluti erosas linguæ particulas, hæc si cum voluptate manifesta contingant, dulcia: si hæc sine, pingua vocitantur. Atque hoc quidem pacto, quantum in me fuit, res explicatu longe difficillimas verbis exponere sum annisus. Miror autem, qui tam prompte omnia adstringentia nominent, siue acria sint, siue amara, siue dulcia, siue pingua, siue acida: cum iam olim rebus ipsis imposita sint nomina, atque affectuum sensibilibus non exigua in nobis differentia sit. Prestitisset fortassis, si quidem naturales scrutari rationes voluerunt, apparentia non euertere, nec appellationes confundere: verum inquirere cuius temperamenti, aut dispositionis, aut corporis constitutionis, aut quomodocunque nominare velint, soboles sit adstrictio, cuius salitudo, amaritas, aciditas, acrimonia, dulcedo, pinguitudo: quæ Plato, Aristoteles, ac Theophrastus conati sunt definire. Clarum quippe est, si ex calido frigido humido siccoque coeuntibus omnia sunt mixta, etiam dictarum quæque qualitatibus ex horum constare mixtura. Itaque si, quæ admodum dictorum saporum quisque proueniat, exponere conarentur, lubens equidem auscultarem, gratiamque haberem non exiguam: At si neque hoc efficiant, immo insuper sensorias omnes differentias in vnum confundant, ut parum absit quin corpora omnia adstringentia nuncupent, sanè nec audire ipse velim: illosque obsecrare, ut inanem contentionem relinquant.

Non ad Totam verum Naturam Iudicandas Medicamentorum Facultates, sicut naturales Philosophi faciunt, sed ad Nostram Naturam.

CAP. 38.

AT nos equidem in consequentibus ostendere conabimur, cuius nam temperamenti saporum quisque sit soboles. In presenti autem discipulos ad experientiam accessuros assuescere velim, ut id solum quod ad artem est utile, prius seligant, ubi iudicare velint, quo pacto vnumquodque nos medicamentorum afficiat. Quippe non quale ex se sit, & ad totam naturam, consideramus. Nam hoc pacto neque acetum, neque marinam aquam, nos exiccare posse, aut sicca esse facultate, dici manifestum est: siquidem vtrunque illorum actu est humidum. Verum si nos exiccare appareant, sicca dicentur, ad nos videlicet, & nostram naturam, quod perinde est atque siccatoria esse. Quin etiam & calida, & frigida, & humida eodem dicentur modo, ubi nos scilicet calfaciant, refrigerent, atque humectent: eaque ad nos, non ad totam substantiam, nec ex se. Atqui si huius duntaxat meminerimus, certissima omnium erit iudicatrix sola experientia: quam qui relinquunt, atque aliunde ratiocinantur, non solum falsa pro veris ducunt, sed etiam tractationis utilitatem subuertunt. Proinde nobis propositum non est, quale ex sua natura quodque sit medicamentum exquirere, verum quid in nobis efficere possit. Atque hic primi libri finis esto. At in secundo deinceps oleo ac rosæ exemplorum vice in sermone positus, prauas et inibi ratiocinandi vias monstrabimus: quibus cum medicorum complures vtantur, in primis quidem se ipsos decipiunt, secumque alios multos in errorem pertrahunt. Porro ubi id erit absolutum, ad tertium commentariorum transiens quaestiones logicas, quæ vniuersam de simplicibus medicamentis enarrationem antecedunt, explicare conabor:

VT videlicet in quarto ipsas iam facultates omnium definire liceat: quas protinus à principio fuisse aggressus, nisi plena paralogismis atque erroribus omnium prope iuniorum medicorum essent volumina: quos prius extergere, atque ex animis discentium delere oportet, ne quid veritati obstat. Nam ut Hippocrates inquit, sic etiam ait Plato: Non solum impura corpora quanto plus nutrias, tanto magis lædas: verum etiam impuris animis si nutrientes sermones offeras, non modo nihil prodis, verum etiam magnopere obfueris. Itaque his de causis, tum etiam quia amicorum plerisque visum est, ut iuniorum medicorum argueremus paralogismos, non tantum in congressibus, quos quotidie cum illis habemus, sed etiam hisce commensariis, necesse mihi fuit diutius prioribus istis duobus immorari: Quo videlicet in tertio purum animi auditorem nactus, qui que veras assequi rationes possit, tum ea exponam, quæ de huius speculationis principijs nouisse oportet: tum deinceps omnes medicamenti cuiusque facultates enarrem.

Id autem fiet in vniuersum, ut reor, libris vndecim, ea ferme magnitudine constantibus, cuius est hic, qui est omnium primus. Qui cum conuenientem nunc nactus sit modum, finem per hanc dictionem accipiat.

2^a. Aph. 10. Ex. ord. 12. c

GALENI DE SIMPLICIVM
MEDICAMENTORVM FACVLTATIBVS
LIBER SECVNDVS

ARGVMENTVM LIBRI

Exponit Vnde Errandi occasionem Veteres medici sumpserint: Prauasq; ipforum Ratiocinationes Confutat: ac Olei & Rosacei exemplo veram docet rationem Facultatis Medicamentorum Iudicandæ.

Quòd Sophistæ, qui Fidem Sensibus abrogant, Demonstrationis Principia Incertiora, quàm quæ demonstrantur, efficiant.

CAP. 1.



Rolixa nobis vt sit de simplicium medicaminum facultatibus oratio, límites suos excedentes sophistæ efficiunt. Nam cum procul principia ducant, sensum que pro nihilo habeant, sese que in illa coniiciant, quæ philosophis etiam inbigua sunt, simul cum ijs quæ ipsi ignorant, & ea quæ aperte cognoscuntur, subuertunt. Eaqu; plerique eorum faciunt non modo naturalis speculationis, sed etiam logicarum methodorum imperitia: quibus utat necesse est, quisquis demonstrare quid aggreditur. Itaque cum nesciant tum ea quæ bene a phylis viris sunt inuenta, tum et ea de quibus non iniuria illi dubitarunt, vtriusque tamen contraria allerere se penumero audet. Sed, Deum immortalē, age obsecro, si nunc ego sic orsus dicere, quod cum quatuor sint elementa, aer, terra, aqua, & ignis, nulli tamen cōgenita sit albedo ac splendor color extra splendorem & ignem: ac deinde citato Empedoclis ac non nullorum phylis aliorum testimonio, splendida corpora omnia plurimum in se ignis habere dicā, haud curas aut niuem, aut cerullam, aut glaciem, aut alia innumera tum splēdidissima, tum frigidissima inspicere: ac mox illa suggerente quopiam, procedentem a sensu confutationem tergiuersatus ad rationem accedi iubeam: ac per eam de rerum natura considerandum, haud quaquam sensibus ratione carentibus vniuersum committendum censeam: nunquid mentem habentibus insanire non videar, haud intelligens vnde rationis desumpsissem initium? Nam mea quidem sententia ex sensu & per sensum omnia id genus cognosci didicimus axiomata, nempe Solem esse splēdidū, flammās subflauas, carbonēs plerosque flauos. Ergo si a sensibus recedendum est, nulla suppetet demonstratio neque nobis eorum quæ modo diximus, neque Empedocli cum ait,

Vndique splēdentem Solem, calidumque videre.

Quæ si vera sunt, perspicuum est multo ante illa fidem habendam sensibus. Immo, inquit, mortales cum simus, a sensibus auspicemur necesse est: verum illis haudquaquam perpetuo immorandum, sed ad partem diuinorem accedendum, nempe rationem: Nam sensum & animantibus rationis expertibus inesse, rationem solam hominibus esse cum deus cōmunem. Atque hic in lōgum orationem extendunt. Quin etiam ex illis quidam & Anaxagoram in testimonium euocant, qui niuem pronūciavit non esse albam. Hic, inquit, vir phylis supra sensum est, atque eius contemnit phātasmatā: ad rationem ire pergit, eaqu; duce rerum naturam scrutatur. At, si me quod in mentem venit fari oportet, qui liber sim scilicet, & in tota adeo vita veritatem coluerim, ad insaniam extremum & vltra, peruenisse illos arbitror, qui talia nugantur. Nam si quæ per sensus euidenter apparent, evertant, vnde sumant demonstrationum principia, non habebunt. Sin autem ab ijs tanquam a fide dignis exordiantur, quo iure iisdem postea diffident? Nam demonstrationum principia certiora sunt quam ea quæ per illa demonstrantur: quippe cum ista aliunde fidem mutuentur: demonstrationum vero principia non solum ipsa per sese, verum etiam ad quærendorum inuentionem quibus credatur, idonea sint.

Quod abunde Sufficiat Iudicandis Medicamentorum Facultatibus, quæ Per sensum accipitur Experientia, iunctis dumtaxat paucis epilogismis, siue rationibus communibus. Et quo pacto

Ratio Rationem Experientie subscribere oporteat.

CAP. 2.

E Quidem optarim nullas non resclare sub sensus nostros cadere, nec quicquam esse quod illos fugeret: hoc enim pacto nihil dubium, nihil ambiguum aut anceps vsquam foret. Verum quoniam illos quædam effugiunt, rationem illis superinducere conandum est, sic tamen, vt non procul, vt illi faciant, nec infinita colligamus. Verum ante omnia nominum significata diligenter definiamus, nequis postea per æquiocationem falli possit: Deinde quod ex se quid agit, ab eo, quod per accidens, separetur. De quibus ambobus supra accuratè disseruimus: significataque eorum, quæ facultate aut calida, aut frigida, aut sicca, aut humida, aut quidvis aliud esse dicunt, discreuimus. Tum quo pacto propriam cuiusque medicamenti facultatem ab ijs, quæ ex accidenti sunt, segregans inuenire quis possit, vniuersim quidem in tertio de temperamentis expositum est, atque in hoc tractatu particulatim

A particulatim enarrabimus, ceu in primo iam libro etiam fecimus in aqua & aceto, & hic rursus in oleo & rosaceo facturi sumus, indicantes prius, quantum delinquant medicorum non nulli, qui longè demonstrationum ducunt principia. Nam quid oportuit olei aut rosæ respexisse colorem, quando rebus ipsiſ variè vti liceat, nec in sanis solum corporibus, sed & ægrotantibus? quippe cum ipsas per se rosas, aut succum earum expressum, corpori tum sano, tum simplici affecto morbo, vt supra diximus, liceat imponere: atq; oleo dulci miscentes, corporibus aut valenter refrigeratis, aut excaſ factis, applicare, siue affricando, siue perfundendo, ac irrigando: tum in corpus quoq; assumere, idq; aut superne per os, aut inferne per sedem: ac sic tãdem, quid ad vnumquemq; vsum proveniat, inspicere. Nam hoc sanè nomine medicamentorum omnium vires contemplamur, vt sit quo vti oporteat, hypochondrijs aut capite ardore afflictis, aut refrigeratis, aut exulceratis, aut phlegmone occupatis, aut id genus aliud perpeſ ſis, tum ipsiſ, tũ alijs omnibus corporis partibus. Ergo cum tam perspicua simul ac compendiosa adsit via ad ea quæ inquirimus, etiam ne colores æſt mabimus, aut odores, aut consistentias, aut formàs medicamenti cuiusq;? perinde facitantes, atq; ij qui ex imagine aut ficta aut picta cognoscere quempiam volunt, cum ipsum aspicere non denegetur, quem agnoscere cupiunt.

B Quod Neq; à Colore, neq; ab Odore, neq; à Consistentia, aut Conglaciatiōe, neq; à Duritate, neq; à Leuitate Ratiocinari de Medicinarum Facultate oporteat. CAP. 3.

ATque hac vtiq; parte non leuiter peccare mihi videntur: multo etiam magis cum inconclusa atq; indemonſ trata nugatur demonstrandi rationis planè imperiti. Nã donemus ignem aut flauum, aut rubrum esse, vtcunq; voluerint: nec enim refert: quid ergo id facit ad hoc, vt oẽ rubrum sit calidũ? Nam oẽm ignem, verbĩ causa, rubere dicẽdũ est: at omne rubrum ignem dicere, ridiculum est: multoq; etiã plus, si omne rubrum calidum quis dixerit. Nã si principio assumptũ esset in oratione omne calidũ esse rubrũ, licuisset fortassis mutua axiomatis conuersione rubrum omne calidum concludere: licet non obscure & illic peccetur. Nã quæ mutuo conuertuntur (hoc est *ἀντισπέδοντες*), non quæ simpliciter cõuertunt (id est *ἀντισπέδοντες*) orationes, verè de se mutuo dicuntur. Veruntamen propinquus is fuerit paralogismus. Atqui qm nec illud orationis initio assumptum erat, nempe oẽ calidum esse rubrum, haud licet mutua conuersione omne rubrum calidũ esse colligere. Tribus ergo modis in sermone peccant, qui aiunt rosas tẽperatura calidas, q; sint rubræ. Primum, q; non demonstrata hac propositione, omnis ignis rubet, conuertere ex hac aliam, videlicet omne rubrum est ignis, tanq; veram, conatur. Secundo, q; nesciunt propositiones quæ mutuo cum veris conuertuntur, non autem quæ simpliciter conuertuntur, esse veras. Tertiò, quod etiam si mutuo conuenterentur, non tamen omne quod colore sit rubro, calidum esse, ex mutua illa conuersione sequatur, sed aliud huiusmodi axioma, rubrum omne esse ignem. Porro q; talia in rem presentem non modo sint inutilia, sed etiam palam falsa, cuius notum est. Debemus enim non an omne rubrum sit ignis, sed q; omne rubrum calidũ sit, ostendere. Nã si quicquid rubet, ignis fuerit, erit nimirum & rosa nobis ignis. Ceterum logicas methodos ignorantes, opinor, medici primum in hoc maxime peccat, q; proprijs finibus excedat, nimirum cũ sufficiens sit experientia, iunctis saltem paucis quibuscũ epilogismis, medicaminum vires exquirere. Deinde tam fœde in rationibus hallucinantur, q; pueri modo speculationem logicam ingressi. Eisdem erroribus tenentur, qui ex odoribus medicaminum facultates coniiciunt. Nec. n. quicquid bene redolet, calidum est (quod quidam dictitant, haud intelligẽtes quo pacto inaudire oporteat quæ ab Aristotele & Theophrasto super hac re sunt prodita, ea quæ nos in quarto harum cõmentationum definiemus) neq; quicquid calidum est, bene olet. Quin et neq; si quid graue olens est, calidum etiam fuerit: neq; si calidum, et graue olens. Sic nec, si quis quicquid grauiter oleat, frigidum dicat: nec, si quicquid frigidum sit, grauiter olere, verum dixerit. Si quidem calidorum innu-
D mera sunt, partim bene olentia, partim grauiter olentia, partim neutra: similiter quoq; frigidorũ. Quanq; quid calida dico ac frigida: cum debeã dicere calſcientia nos, ac refrigerantia, quæ vtiq; et inquirimus. Nec. n. quod absolute calidũ est, aut quod ad hoc expenditur, nunc cõsiderare p-
positum est, sed quod corpus humanum excaſ faciat: nec sanè etiã quod absolute frigidũ, sed quod hominem refrigeret. Denuo ergo hic hallucinantur in homonymia haud distinctis nominũ significatis: tanq; si quis de cane terrestri differens ad marinum se oratione transferat, existimans vt animantis vtriusq; nomen, ita & naturam quoque ipsorum vnã esse. At nobis demonstratũ apertè est in commentarijs de temperaturis (quos & hãce antecedere tractationẽ protinus initio cõmonefecimus) aliud esse facultate calidum, aliud actũ: & huius quod actũ videlicet calidum est, aliud absolute dici calidum, aliud per exuperantiam, aliud ad symmetrum sui generis vel sue speciei, aliud ad quidiũ obuiũ collatum. Quin & hominem non absolute calidum, vt ignem, sed exuperantia calidum diximus, si quidem maiorem in eo calidi portionem inesse, q; frigidi. Ergo & quæcunq; ad hunc dicuntur calida potestate, illum excaſ facere dicuntur: facileq; de illis initur iudiciũ, & per experientiã expenditur, paucis indigens (vt supra cõmonui) epilogismis. Quos cũ sophistæ excedant, & tempus adolescentulorũ frustra terunt, & sophismatis cauillisq; homines seducentes eorũ soluendorũ imperitos, falsis eos dogmatis opinionibusq; implent. Debebant. n.

neq; colores memorare, neq; odores, immo neq; cōsistentiam, neq; leuitatem, aut asperitatem, aut E
eius generis quodcunq;. Nam quid refert, oleū an lentum sit, aut leue, aut splendēs, aut liquidum,
aut pallidum, aut pingue, aut lubricum, ægreq; corporibus illitum exiccari possit: quippe cum ex
nullo omnium eiusmodi colligere possis ipsum esse facultate aut calidum, aut frigidum, aut humi
dum, aut siccum. Siquidem ex genere splendētium leuiumq; & lentorum partim sunt, quæ planē
nos calfaciant, partim quæ refrigerent, tum alia quæ exiccent, alia item quæ humectent: Et eorum
omnium quæ accidunt non oleo solum sed alijs omnibus, nullum est reperire, quod solidum per
petuumq; sit, vt in eo generalem constituere propositionem liceat.

*Quod Sophistæ Rationibus haud vsi sint scientificis Ad ea Lemmata, siue sumptiones, Ex quibus perperam
de medicinarum facultatibus colligunt, Sed aut Inductionibus, aut Exemplis. CAP. 4.*

NAM omitto, q̄ nec scientificis in omnibus id genus sint vsi rationibus sophistæ ad inuenien
da lemmata, sed ex inductione: & quod omnium pessimū est, q̄ nec quæ sit inductionis na
tura, vnquam inspexerint. Quod si quis eos in id prouocet, neque sequi audent: & si de demon
stratione quis quid agat, increpant. Immo, quod etiam deterius est, nō ex inductione solum ratioci
nari assueuerunt, sed non nunq; etiā ab exemplis, tanquā rhetores. Nam qui frigidum esse oleum
asserit, proinde q̄ lentum sit vt pituita, is per exemplum concludit, par robur præbens demonstra
tionis, atq; is qui ipsum calidum contendit, quia lentum sit vt viscum. Nec secus is qui calidum di
cit, qm̄ facile in flammam vertatur vt bitumen, atq; is qui frigidum probat, q̄ facile cogatur ac cō
crescat vt aqua. Nam differt, ex exemplo aut exemplis quid suadeas, an ex inductione. Siquidem
qui ex exemplis fidem facit, vnum aut duo generis eiusdem adfert, aut certē planē pauca, plerisq;
scilicet præteritis: Qui verō ex inductione, omnia comprehendere nititur, quæ per experientiam
sunt cognita: nec quicq; præterire quoad eius fieri potest, quod apertum vulgō ac perspicuum sit,
studet, sed quod occultum est & paucis comprehensum. Quamobrem violenta est, & vehemēter
persuadet, quæ ab omnibus quæ experientia sunt cognita, ducitur inductio: solisq; ijs arrogantia
perspici potest, qui in demonstratorijs methodis sunt exercitati. Quare nos de ea copiosius in De
monstrationis libris differuimus, ac fortē etiam seorsum de ea librum componemus.

De Oleo aduersus Archidamum.

CAP. 5.

PALAM autem fiet nihilo secius & nūc quoq; inductionis natura, multoq; magis & exempli.
Nam omnia in summa percurrere statutum est, quæ de olei facultate à medicis sunt prodita,
eaq; probabiliter quidem q̄ ita viderētur, at non verē: Ac primum illud quod à Diocle in Archi
damo scriptum est, q̄ Archidamus durefcere vriq; cutem ijs qui oleo fricarentur existimari: qua- **G**
propter etiam siccam frictionem prætulit. Oleum enim accendi atq; exurere cum à frictione inca
lesceret, putabat: ac propterea admodum humorem exhaurire atq; liccare, non secus atq; ea asfo
rum quæ vngi solent, nam & ipsa magis durefcere, q̄ si citra oleum assaueris. Præstat autem totam
adscribere dictionem Dioclis. Habet autem ea hunc in modum. At cum oleo fricare non perin **»**
de probabat. Primum enim inæqualem fieri eiusmodi frictionem putabat, q̄ manus laberētur sci **»**
licet, nec æquē carnem apprehendere propter pinguitudinem possent. Præterea durefcere atque **»**
aduri cutem in illis magis qui sic fricarentur existimabat, q̄ qui sicca vterentur frictione: Oleum **»**
quippe accendi & vrere à frictione incallescens, quemadmodum in assis, quæ vncta sunt, magis q̄ **»**
non vncta, vbi oleo accenso incallescunt, et valde exiccantur, indurefcuntq;: Similiter quæ in oleo **»**
coquuntur fragilia friabiliaq; effici eandem ob causam. Ad hæc, quemadmodum ligna, & coria, et **»**
alia complura quæ ex oleo fricantur, oleum intrō imbibunt, ita putabat & corpora. Quod cum fie **»**
ret, multa quæ solita essent cum spiritu effluere, ac foras prorumpere, tunc concludi arbitrabatur, **»**
ceu cum cribris, linteis, lana, omnibusq; adeo per quæ percolari quid assolet, perfunditur, ac inun **»**
gitur, non æquē liquores fluere per ea valent: Porro vbi ea excretio intercepta est, quædam intrō **»**
recurrere, quædam acruata inuicem que implicita meatus opplere, retenta scilicet ab oleo, quod **H**
visco quid simile habeat: sicut in alijs omnibus apparet, quod pingue est, pulueres ac festucas, om
niaq; eiusmodi consecari: Denique vbi obstructi iam meatus fuerint, perpetuō ac sensim omnia **»**
deterius perfici esse necesse, quàm in ijs quæ pro consueto geruntur naturæ modo. Putauit quo
que oleo inesse aliquam mordacitatem, cuius vi oculi illachrymarent, & guttur in tussim ciceretur **»**
(quod *χέρχεν* vocant) tum alius raderetur, excrementaq; redderentur sanguinolenta eo bibito: **»**
Proinde qui citra frictionem vngerentur, nihil affligi: infirmiore enim esse mordicationem, q̄ **»**
quæ sensum aliquem mouere posset: At si per frictionem carnem subintret, mordicationem mo
liri maligniorem, velut multa medicamentorum: vbi enim illinuntur, minus valent: at compres
sa intrō que subeuntia, magis agunt: sicut sanē si vrticis, & alijs multis sensim quempiam contin
gas, nihil læseris: sin ferias aut premas, vtiq; offenderis. Hæc ergo sunt quæ Diocles in Archida
mo prodidit, quorum simul tum probabilitatem, tum prauitatem, conspiciere est. Siquidem, quod
quicquid in oleo coquitur, propriam amittat humidatem, ac friabile fragileq; celeriter reddatur,
cum alioqui nihil in aqua tale perpetiatur, ipsa nos docuit experientia. Quamobrem hac vtiq; par
te nihil Archidamus mentitus est. Debebat tamen, sicut Aristoteles, & Theophrastus, aliq; nō
pauci philosophi, eiusmodi problemata in physicis quæstionibus & proponunt & solunt, ipse
quoq;

A quoq; (si quidem omnium rerum quæ fiunt, causas scrutari voluit) perinde vt illi, vt proponere, sic quoque soluere. At cū id minus facere appareat, in hoc vel maxime mihi delinquere videtur. Nam quod apparet euidenter, id semper primum ponendū est: ac deinde, licet libeat, causam eius inspicere debet, physica problemata hunc in modum componēs: Cur oleum quæ in ipso coquūtur, sicca & friabilia & fragilia efficiat: aqua vero humida & mollia: aut, Quāobrem in oleo cocta siccescāt: at quæ aliter in eo madidata sunt, magis propriam seruēt humiditatem, q̄ si omnino nō essent madidata. Qua ratione scillæ & vrticæ morsus sanet: qua de causa his medeat, cū ipsum oculos mordicet. Quī fiat, vt reliquū corpus vniuersum non mordicet, sed oculos duntaxat. Quare guttur exasperet, vlcera vero leniat. Quo pacto ventrem subducatur. Quo modo lassitudines sanet. Quāobrem inunctos tueatur à frigore. Quare animalia insecta interficiat. Cur lora & coria emolliat: at quæ in ipso coquūtur, duriora omnia efficiat. Atq; hoc vnum est problematū genus ad physicum duntaxat attinēs. Alterum verò, quod commune quoq; eorum est, qui artem quāuis exercent, est tale: Quā ob causam carnes piscesq; assantes coci oleo prius illinant. Quid sit, q̄ athletas oleo fricent gymnastæ. Quid etiam, q̄ pueros pēdotribæ. Nam cuiusq; talium problematum ab experientia profecta causam assignare liceat, Cocis nimirū responsuris, propterea se pisces B ac carnes oblinere, q̄ sicca adustaq; extimæ eorum reddantur partes, si citra pinguedinem assentur: Athletas verò se ex oleo fricare dicturis Gymnastis, tum q̄ quæ ante inerāt lassitudines ipsum exoluat, & quæ futuræ sunt mitiget: tum q̄ frictionem equalem & mitem planè efficiat, corpusq; ad motus futuros præparet. Eas ob res ipsi quoq; Pēdotribæ pueros se & ante & post exercitia inungere dicent. Cur autem oleum lassitudini medeatur, haud etiam nouit nec gymnastes, nec pēdotriba, nec medicus experientia curans: nec tñ quia id nesciant, ab euidenter apparentibus recedent. Siquidem tametsi ignorant, quāobrem veratrum album sursum purget, nigrum deorsum detrahat: neque compertum habent, quare cnicus pituitam ducat, atram vero bilem epithymum: tñ medicamentis ad ea vtuntur, ad quæ vtenda docuit experientia: & eos quibus est opus curant, & euidenter apparentibus fidem habent, eosq; qui contraria rationi adstirunt, derident.

Quod præterquam quod Pugnancia de Olei facultate Archidamus afferat, Insuper

Improprijs vtatur Exemplis.

CAP. 6.

AT Archidamus supra q̄ q̄ in multis, quæ perspicuo apparēt contemnit, in super & hac quoque parte taxandus mihi iure videtur, q̄ dicat meliorem esse frictionem siccam, q̄ quæ cum oleo adhibetur, quia corpus durius & siccus ijs, qui vnguntur, efficiatur: mollius autem ijs, qui fricantur sicci. Dicit porro nihilo secius & in illa ipsa dictione, paulum progressus, ligna, pelles, aliaq; quæ ex oleo fricantur, ipsum in profundū trāsmittere: idq; maximum esse testimonium, q̄ in corporibus nostris intrò subiens meatus oblinat, ac humidorū prohibeat effluxus. Atq; ego q̄dem quomodo hæc consonent, nescio. Si. n. humorum effluxus prohibet oleum, haudquaq; siccum dicendum foret: ac proinde frustra id tanq̄ deliccans in frictionibus repudiat. Falli præterea in hoc mihi videtur, q̄ similiter affici putet tum ea quæ in illo coquuntur, tum eos q̄ fricantur. Nec. n. eadē agere dixerim oleum calidum, frigidum, tēperatum, tepidū, aut seruēs, sicut nec aquam ipsam. Apparet. n. & ipsam, si frigida applicetur, condensare, constipare, contrahere, constringereq; & repercutere: sicut si extremē seruīda, adurere: at, si temperata adhibeatur & moderate calida, laxare, rarefacere, fundere, digerere: porro si nec insigniter calida, nec frigida admoueatur, sed velut quæ fontana dicitur, tunc propositorum nihil efficiet, verū propriam suam facultatem exeret. Sic si quis oleum expendere volet, ab omni prius liberum alieno tum calore tum frigore ipsum efficiat, atq; ita demum ad explorandum accedat: quippe quod summè frigidum fuerit, non ex sua duntaxat facultate, sed ex alienæ qualitatis excessu non nihil in cōtactis operabit: ita quoq; quod magnopere calidum: at si utroq; ipsum liberans sic demum examinare voles, hoc duntaxat pacto propriam Dolei vim inueneris. Quapropter cū quis ex more oleo fricatur, sicut gymnastici omnes, in solo fricatur oleo, quod nimirum absq; omni sit aliena qualitate: at si admodū excalfactio, aut summè vtatur refrigerato, iam compositam ædi actionem necesse est, nempe ex propria olei facultate, & aliena qualitate. Sape verò propriam cuiusq; medicamenti facultatem obscurari necesse est, vbi valēt alunde qualitatem acciuerit. Itaque quī simile fuerit herbas in oleo seruente coquere, ac exercitantium corpora fricare: maximè liquidē, vt supra ostendimus, extrinsecus ductas probationes fugere oportet, cum liceat nimirum propriam cuique adhibere experientiam. Quod si quando tñ id quispiā facere volet, certe similia comparare conabitur, sicut in corijs faciebat & lorīs: nec enim quispiam oleo in igne præcalfactio, neque in niue refrigerato, sed obuio quoq; accepto corium ac lora confricat. Ita puto & pēdotribæ facitiant, obuio oleo pueros fricantes, neutriquam aut in igne excalfactio, aut in niue refrigerato. Alioqui sanè & nos non rarò caput ardore grauātū olei admodum frigidi perfusione refrigerauimus. Porro si salis nihil oleo sit inditum, tanto magis refrigerabit. Sin etiam omotribes, hoc est crudum fuerit, multo profectio etiam amplius.

Quomodo Frigidum Paremus Oleum.

CAP. 7.

Porro præparare illud solemus non aliter atque aquam, nempe prius excalfacientes, ac deinde aqua mergentes summè frigida. At si etiam fons in ipsum cum strepitu decingat, vasculo nimirum

Quinta Classis.

BBBBB iij

rum

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

rum, cui inest oleum, antè diligenter ocluso magis quoq; ac magis ita reddetur frigidum. Multū E
item frigefeceris, si præcalfactum in puteum ita demittas, ut aqua contingat: quanq; quod aquam
non dum tangit, frigidum item euaserit, sed minus. Atq; hoc pacto præparando frigidum reddi-
mus oleum: cōtrario aut modo, calidum. Quo sanè modo et utimur in refrigeratis corporibus, in
alucum olei calidi demittentes, quibus pars quæpiam obstupuit, aut tremuli sunt, aut conuulsione
aut palpitatione tentant, aut motu sensu ve priuant, aut et agere sentire possunt, aut eiusmodi quip-
piam perpeffos. Ergo siq; ex vniuerso vsu de medicaminū facultate pronunciet, putabit, nūq; d
excalfacere & refrigerare, tum exiccare, & humectare nos oleū queat, velut Dioclis Archidamus,
siquidē pugnantis non animaduertat. Nam cū exiccari & fragilia effici quæ in oleo coquuntur
dicit, exiccantem & digerentem eius facultatem ostendit: At vbi intrō in coria subire, porosq; no-
stros oblinire, ac naturales humorum effluxus prohibere, rursus sanè maxime contrariam eius fa-
cultatem demonstrat tum digerentibus, tum exiccantibus: atque in istis vel adhuc quæ apparent
proferens, de illis non rectè ratiocinatur. At vbi de mordicatione agitur, nō ea omnia commemo-
rat. Nam q; oculos mordicet, q; guttur exasperet, siue ad tussim prouocet, q; ventrem radat, atq; se-
cellus sanguinolentos efficiat, abūdè magna testimonia sunt mordacem illi inesse facultatem. At
q; vlcera dolore liberet: & vtrius mordicationes, aut irrigatum, aut infusum, omnino sanet: quicq; F
morsu iritantur, mitiget: cū & ipsa non parua sint contrariæ ipsius facultatis indicia: planè omiſſa
sunt. Ceterum si vtriusq; propositis quis ratiocinari volet, duorum alterū eueniet: Aut. n. id faciet
ut Empiricus, dicetq; se in collatione ad aliquid cuiusq; medicamenti facultatem per experiētiam
cognoscere, ipsius autem per se propriam ignorare naturam: Aut vt Rationalis, cōtrarias inesse
medicamento facultates, & mordicantē & lenientem: ac deinde ingenti tenebī anxietate causam
dicturus, cur interim altera earum agat sensibiliter, interim altera reliqua aut perditā sit, aut non
clarè appareat. Quarum omnium dubitationum solutiones, siquidem vt physica proponantur
problemata, sanè q; difficiles sunt: sin vt ad vsum referantur artis, multam requirunt experiētiam,
epilogismos autem non ita multos, sed exactos ac definitos. Nam primum, an omne oleum ocu-
lis mordax sit, nec ne, experiētia incunctanter definire præstat, haudquaq; ex tempore in vtrāq;
partem rhetorum more disſerere: tum an omne æquè guttur exasperet, aut ventrem subducatur, aut
radat, vt non nunquā cruentas moueat excretiones: an oleorum hoc quidem hæc faciat, illud vero-
ro non: & aliud magis, aliud minus. Olei differentias nunc dico non eas (vt quispiā suspicaretur)
quæ sunt heterogeneis siue alterius generis, sicut cicini, raphanini, caryini, balanini, ac similibus:
nam & horum vires medicus noscat oportet, sed in præsentia eas memorare nō expedit. Satis est G
enim, mea quidem sententia, principio propriissimum, & quod maximè ab omnibus hominibus
vocatur oleum, considerasse: quando & ipse fructus ex quo fit oleum, solus ex omnibus oliua nū-
cupetur, et arbor olea (græce virunque *ἐλαία* vocatur, & ipsum oleum *ἐλαιον*) ipsumq; simpli-
citer ac primario oleum dicitur, at reliqua omnia per translationem & abusum.

De Differentijs Proprie Vocati Olei.

CAP. 8.

Huius sanè quod proprie oleum appellat, de quo omnis in præsentia sermo habetur, plures
dico esse differentias. Secundum ætatem quidem, cū aut recens est, & velut mustum, aut
ætate vigente, aut vetus. Secundum præparandi modum, cū aut simplex solumq; & impermi-
stū fuerit, aut cum sale præparatum. Secundum fructus ipsius diuersitatem, cū is aut immatu-
rus, aut maturus extiterit. Secundum inductam arte alterationē, cū aut quomodo ab initio præ-
paratum fuit, ita seruetur, aut cādū efficitur. Scriptum verò est de albificatione eius & ab alijs
non paucis, & nos quoque in sequentibus trademus. Horum omnium oleorum facultates ipse
equidem experiri studui: quid autem in quoque fieri deprehenderim, postea exponam. At nunc
absoluere statui primum, quod erat in manibus. Perperam enim mihi videntur medicorum pleri-
que tum experiri medicamenta, tum de viribus eorum ratiocinari. H

Quomodo Cuiusq; Medicamenti Facultatem experiri oporteat.

CAP. 9.

Qvippe cum Experiri solum oporteat, quæ impermissa sunt, & ab omni extranea qualitate
aliena: eaq; primum in optima corporis constitutione, deinde in intemperatis, demum in
morbis simplicibus: sicut in libro hunc antecedente, & in tertio de Temperamentis defi-
nitum est: Ratiocinari vero, id quod ex accidente est, semper ab eo quod per se est, distinguētem.

*Quod Non solum in Explorandis Medicamentis medici Hallucinentur, Sed etiam in
Opinionibus, quas habent de Affectibus.*

CAP. 10.

At non nulli medicorum non in istis modo hallucinantur, verum etiam in opinionibus, quas
habent de affectibus. Nam oleum quod lassitudinibus remedio sit, omnes propemodum fa-
tentur: cæterum quis affectus sit lassitudo, non consentiunt. Hic enim articulorum esse ait siccita-
tem, ex motionibus desiccatorum. Alter & musculorum, adiicit. Alius porro contrā quā hī, hu-
miditatem multam, & tensionem, & caliditatem, fluxione nimirum partibus vehementer agita-
tis affusa. Alius non humorum multitudinem, sed qualitatem solam causatur, prouenire inquiens
in motionibus immoderatis pinguedinis carnisq; teneræ colliquationes quasdam, quarum pars
foras transpiret, pars verò retineatur in corpore: & hoc, cum acre mordaxq; sit, affectionem effi-
cere

A cere veluti vlcerofam. Itaq; etiam si in hoc conueniatur, q; lassitudines sanet oleum, attamē ob an-
cipitem atq; ambiguum corporis affectum, nihil queat certi de olei facultate colligi. Atq; id sanē
non tm̄ in lassitudine vsu venit, verum etiam vbi doloris causa, aut mordicationis, aut phlegmo-
nes gratia, bibendum oleum exhibemus, aut per sedem infundimus, aut itidem perfundimus. Si-
quidem vlceribus phlegmone affectis nō solum, sed & cum aqua moderate calida, perfundimus:
vt in lassitudinibus cum lauacro aquæ dulcis. Sed nec quæ sit in phlegmone affectio, cōsentiunt.
Porro vbi per sedem ipsum ingerimus, aut bibendum offerimus, ne tunc quidem cognoscimus
euidenter, cui nam corpori ipsum applicemus, an pituitæ, an bilis, an aliorum aliquorū recremen-
torum pleno. Constat enim non perinde hominem affecturum, vbi pituitæ viscosæ intestinum
omne simul cum ventre plenum offendet, atq; vbi biliolis excrementis refertum, aut alijs quibus-
dam acerbis humoribus, aut stercore multo, aut horum quidem nullo, sed incidat in ventrem inte-
stināq; vndiquaq; pura, aut præterq; q; pura, etiam exasperata reperiatur.

Quod Vt quis probē de Olei facultate Ratiocinetur, Debeat etiam Affectionem hominis

Aestimare, & De ipso oleo Quale sit præfinire.

CAP. 11.

ITaq; negligēter admodum & segniter de his omnibus medicorum pleriq; ratiocinantur, haud
indicantes, nec quo pacto affecto homini oleum exhibeant, nec quale nam ipsum. Ac mox ta-
men dicunt, alij mordicare & radere prorsum partes corporis internas: alij vero etiam si præfuerit
mordicatio, & hanc lenire. Nec enim parum interest, an iniiciatur in ventrem pituita scatentem
oleum expers salis (Græci *ἄνυλον* vocant) & quod re vera oleum est: an quod plurimum accepit
salis, in ventrem purum. Vtrunque enim aluum subducit, diuersis tamen facultatibus. Nempe il-
lud quod sale vacabat, in pituitoso ventre per lubricitatem: simili modo cum maluis, blitis, moris:
Quod verò salem habet, in puro per acrimoniam, perinde vt muria, & marina aqua. Et sanē hoc
quidem radet, alterum non radet. Ergo nec absolutē oleum quoduis interna omnino radere di-
xerimus, aut deiectiones moliri cruētas, neq; mordicationes lenire: verum id cui sal est inditus, in
puro ventre radere: cui autem non, in pituitoso non radere.

Quod Salsuginosa & Acris ex accidente quādoq; Morsui medeantur, nempe Secum quod mordicat educētia.

Dulcia verò & Epicraistica contra, Morsum etiam aliquando ex accidente exasperant, nimis-

rum Cum vnā corrumpantur, & foueant alintq; cacochymiam.

CAP. 12.

NOni nunq; verò mordicationes ex accidente quod salsuginosum est, sanauerit, velut & meli-
cratum, salsugō, serum lactis. Educūt enim secum hæc nō nunq; succum mordicationem fa-
cipientem, ac mordacitatis redduntur medela, perinde vt cætera omnia quæ abluunt & abstergunt.
Sed non statim vbi immissa sunt hoc genus medicamēta, morsum sanant, quin potius tunc etiam
exasperant: siquidem euacuationis, haud epicraiscos i. tēperationis seu mistionis, ratione sanatio-
nem molīuntur. Quippe ceratū ex rosacco & adipe aut pinguedine infusum sæpenumero morfi-
bus cōtinuō succurrit, idq; tēperationis ratione: sed & oleū ipsum solum, sed dulcissimum, id fre-
quenter præstitit: sicut certē etiā adeps hirci, aut succus condri, aut ceratum ex oleo dulci. Nos aut
sæpenumero quibus ex frigore interna dolore torquebantur, ingestio oleo calido dolore liberaui-
mus: ac si maius esse frigus conijciebamus, addidimus & anethum, oleum excalfaciens: si verò
adhuc etiam maius, rutam quoq; & bitumen. Eiusmodi igitur auxilia omnia q; frigori medean-
tur, dolores mitīgant, non propterea quod lædentem humorem attemperent aut educant. At in
idem vniuersa confusa sunt a plerisq; medicorum, qui nec norunt dolorem ab intemperantia na-
tum, ab eo, qui ex cacochymia oritur, distinguere: nec q; medicamentorum, quæ doloris gratia ini-
ciuntur, alia excalfaciendo partem refrigeratam sanant, alia humorem mordicantem euacuando,
alia temperādo. Sed & subinde mistæ existunt affectiones, ex intemperie videlicet, & mordicatio-
ne: In quibus nos cōsueuimus anethinū, aut rutæ oleum, infundere anserino in eo liquato adipe:

Dis si non adlit, saltem gallinaceo: si nec is quoq; vel aliorum aliquo: q; si horum nullus ad manum
fuerit, ceram miscemus mordacitatis expertem, voco aut sic eam quæ lota est: aut certe oleū ipsum
quod effectum est candidum, infundimus, nam id ceræ mordacitatis experti proportionale est.

Temeraria itaq; pronūciatio est atq; indefinita tum eorum, qui oleum omne omni tēpore mor-
dicans adstruunt, tum eorum qui leniens: nam quod salem accepit, mordax est: quod autem eo
caret & dulce est, quod quidem ex se est, lenire potest: nam videri possit & ipsum quandoq; pro
affectibus quibus applicatur, haud etiam esse eiusmodi. Vnumquodq; enim temperantiū medica-
mētorum (Græci *ἐπικεράννυντα*, siue *ἐπικερασικά*, nuncupant) vbi valentius euasit humoribus
mordicantibus, morsum eorum retundit: verum si aut valentioribus facultatibus, aut multis, pau-
cū mistum fuerit, vnā & ipsum corrumpitur, alitq; cacochymia. Quamobrem protinus euacuan-
di sunt, qui ab ijs quæ temperandi naturam habent, iritantur, vtpote qui multa nec facile mobili
corruptione sint repleti.

*De Lacte. { Rebus fere omnibus Multas ac diuersas inesse Facultates, Exuperantem tamen Facultatem co-
gnosci posse ab eo, qui Id quod est per se Ab eo, quod est per accidens, recte distinxerit. }*

CAP. 13.

Sic sanē Lac frequenter simulatq; sumptum fuerit, alijs acescit, alijs in nidorem vertitur prius, q;
probe concoctum corruptionem temperet. In quibus vtique primum maxima cacochymia

Quinta Classis.

BBBBB iij

pars

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

pars euacuari debet, atq; inde sumendus chondrus, & ptisana, & lac, & alia quæ ubi probè fuerint E cocta, conferunt ad euchymian, hoc est succi in corpore bonitatem. Non tamen, quod ad hoc attinet, omnia existimare oportet aut deteriores, aut contrarias, in sese obtinere facultates: neque in sermone scientem, eorum, quæ eueniunt, partem alteram omittere: id quod fecit Archidamus in oleo. Siquidem memorabat oculos ab eo mordicari, guttur ad tussim excitari, & vētrem radi: cæterum q; stomachum sepe cum valenter morderetur, oleum protinus dulcissimum epotū sanauit, & iniectum totius ventris mordicationes leniit: & à thapsia, vrtica, & scilla excitatas inūctum sedauit: eorū mentionē non fecit. Ego verò non ambigo, neq; fidem nō habeo ijs, qui aiunt rebus propemodum omnibus multas ac diuersas inesse facultates: quin ostensurum me id ipsum polliceor in libro sequenti: Attamen non proinde adstruo eam quæ in quoque exuperat, non posse cognosci: verū si, quod ex accidente est, ab eo quod per sese, distinxeris, omnia clarè cognosces. Contemplator enim utrūq; in exemplis, propolis videlicet exempli causa duobus hominibus, quibus similiter os ventris mordicetur, & qui pariter aut succum ptisanæ, aut chondrum, aut panē lotum sumplerint: deinde alteri mordicationē restinctam, alteri verò inauctam ponito: Obscuro, nunqd succus ptisanæ, aut chondrus, aut panis ex se mordax est, per accidens autem in altero hominum morsum non modo nō inauxit, sed mitigauit: an quod ex se qdem erat mitigauit, per accidens verò in altero irritauit? Ego sanè ex sua natura epiceraasticum esse dico succum ptisanæ, & chondrum, & panē, & per louē lac quoq; cæterū in altero homine morsum auxisse, q; properasset à corruptione superari. Atq; ea utiq; est (certo scio) veterum omnium sententiā, sed & recentiorum optimi quicq; ita sapiūt. Verū, si quis fuerit quem ego nesciā (nec enim quicq; est, quod non audeant iuniorū medicorum qdam) qui contendat ex sua natura corruptiones augere chondrum, panē, aut ptisanam, cæterū in quibusdam ex accidente nimirū mitigare, is, inquā, qui talia iactabit, nullā assertionis suę demonstrationem asserre poterit. At nos dicimus, q; si ptisana foret cacochymos malī ve succi, haud vnq; mordicationem mitigaret. Atqui cōspicitur frequēter tum superne sumpta, tum per sedē iniecta, mitigare: Ex quo patet per suam quidem naturā boni esse succi, verum interdū vnā cum ijs succis qui mordicationes excitant, corrūpi, & ipsum augere symptoma.

Quomodo Discernendum sit, à Cacochymis ne Mordicatio sanata sit, An ab

Epiceraasticis, hoc est Temperantibus.

CAP. 14.

Fortè igitur nos roget quispiam, an vllum vnquam cacochymorum mordicationem curauerit? Equidem id non rarò factum cognoui: verū ea dico non temperando, verū id quod mordicabat educendo, mordicationes sanasse. Ac proinde & statim, & vsq; dum euacuentur, hominem mordicare, & insuper euacuata asperum relinquere sensum in partibus aliud medicamentum requirerentem. Quod non faciunt quæ boni sunt succi & dulcis (Græci *ευχυμα* & *γλυκύχυμα* nominant) etenim & protinus mitigant, & præter q; q; euacuationem non faciunt, et sensum asperū nullum inducunt: quin potius ipsa cōtra sensuum medentur asperitati. Itaq; chondrum, lac, ptisana in eiusmodi affectibus & edenda præbemus, & per sedem iniicimus, ubi videlicet melle, aut quopiam eiusmodi, quod infestabat, exterferimus: quo tēpore opportunus est & adeps, & ceratum dulce, & oleum dulce. Porro & in præsentī & in sequēti deinceps sermone omnia me dulciā dicere existimato, tum ea quæ salem non sunt experta, tum ea quæ sunt elota. Quatuor itaq; indicij cum possis quod per se lenit distinguere ab eo quod per accidens, facile cuiusque talium medicamentorum facultatem inuenies. Primum indicium est, an statim mitiget, an non. Secundum, an simul cum lædentibus euacuetur, an non. Tertium, an asperitatem quandam in corporibus relinquat, an nō. Et quartum, an ita affectis vtile & commodū videatur, nec ne. Nam, cum nec protinus mordicationem sanat, verū maiore cū vehementia excernitur: neq; intus manendo medetur, & molestam corporibus asperitatem relinquit, quam, si denuo offeratur, exasperat: argumentum est rodentis ac mordicantis esse naturā, cæterum ex accidente quandoque morsus sanare. At H quod & continuo mitigat, & nullam excretionem prouocat: sed nec exasperat dum intus manet, immo exasperatorum medela existit: ipsum quidem natura bonum est, verū interdum à cacochymia, quæ ipsum alterat corrumpitq; mordax efficitur. Atque hæc ita à me dicta sunt, vt simul vtriusq; medicamentorum generis & tempus, & vtendi modum, simulq; facultatis inueniendæ, rationem docuerit oratio: demonstraueritq; & ptisanæ succum, & chondrum, & tragum, & lac, & panē elotum, ex genere esse euchymorum: quin & pinguedinem, et adipem, & oleum dulce, & ceram dulcem, ex mitigatium esse natura. Fuerit autem cera dulcis, quæ & natura est talis (nam quædam gustantibus amara sunt) & quæ præterquam quod est talis, in aqua bona elota est.

De Ratione Abluendi & Candida faciendi Medicamenta.

CAP. 15.

L Auanda porro est non tantūmodo cera, sed & pix, & resina, & oleum, & quicquid aliud aque non miscetur. Primumq; modicè concalfactum, mox in vas lati oris, ac magnum, cuiq; insit aque copia purissimæ simul & omnis qualitatis maxime expertis, infundito: nā in ea, quicquid sit id quod abluitur, acrimoniā suā exuit. Deinde conterito, tundito, frangito, manibusque impense subigito, vt vnaquæque videlicet abluendi medicaminis particula aquam possit cōtingere. Deniq; effusa priore aqua, rursus quod lauatur excalfaciens, in aliā aquam equè syncerā iniicito:

Rursusq;

A Rursumq; diutissime contundito, donec qualitatem suam in aquam deponat: id aut gustanti dat cognoscere: Mox verò & tertio, & quarto, & sæpius deinceps idem faciendum, donec aqua nullā etiam ex abluto medicamento qualitatem recipiat. Atq; hunc in modum omnia quæ excalheri et fundi sustinent, lauibis. At, si qua sint lapidosa & dura, velut cadmia, & æris squama, & æs vstū, ea exacte in tenuia comminuentem, plurimum in aqua terere fontali purissimaq; oportet, subinde priore effusa, quoad nihil in aqua innatet, maneatq; aqua prorsum a contriti medicaminis qualitate immunis. Nam quādiū aut qualitatis eius quippiam in gustu appareat, aut aliquid innatet, tandiū terendum atque effundendum est: nam, si hoc pacto quiduis eorū q̄ lauari possunt, abluas, mordacitatis expers euadet. Et sanē oleum non tantum mordacitatem exuit, sed etiam candidius interea efficitur. Oportet verò ipsum nō perinde vehementer verberare vt picem, aut ceram, aut resinam, ne videlicet adeo aquæ misceatur, vt ægre postea separari possit, sed ita, vt vbi quiescere paulisper siueris, facile possis innatans detrahare. Sunt & alij modi, quibus oleum efficere possis candidum, quos scriptos inuenies apud eos qui præparationum libros conscribere, & qui de materia prodidere, vt & apud Dioscoridem in primo. Verum pleriq; eorum consumentes quod in oleo aqueum ac rufum est, reliquum candidum efficiunt: At hic ablucendo, veluti ipsum abster-

B gendo ac detergendo, candidum efficit.

Quod Non colligatur Oleum ex eo, quod Tuſſim ciet, proinde esse Mordax: Neq; enim omne

Quod tuſſim ciet, Mordax est: Neq; solum Quod mordax est,

Tuſſim mouet, Sed & quæ Pinguiasunt.

CAP. 16.

DE medicaminum, quæ lauari candidaq; effici solēt, dispositione, rursus ēt dicē. Nūc ad propositum reuertor. Oleum quod nō sit omphacinum vocatū, hoc est crudum (id. n. adstrin- git) neq; cum sale præparatum, neq; recens, ac velut etiamnum feruens, ad hæc omnia accurate lo- tum, id neq; epotum, neq; infusum, mordicationem exercebit. Quod si guttur ad tuſſis impetum prouocat, non idcirco mordax dicendum erit. Nam quicquid mordax est & acre, ad tuſſim impe- tum prouocat: non tñ quicquid impetum ad tuſſim prouocat, mordax est & acre. Hoc enim dun- taxat pacto mordax esse oleum conuiceris, si quicquid ad tuſſim impetum mouet, mordax esse cō- fessum fuerit. Occurrit itaq; denuo hic error non leuis, sed perniciosus in conclusi cōuersione cō- missus. Confessum enim est omne mordax impetum ad tuſſim mouere, & confessum est, oleum omne ad tuſſim mouere impetum: verum his suppositis non conficitur oleum esse mordax, neq; si categoricas, neq; si hypotheticas efficiamus propositiones: q̄ scilicet ex duabus vniuersalibus af- firmatiuis nihil concludi in secunda figura possit, neque conclusio ex necessitate sit vera. Fient au- tem in syllogismo categorico due propositiones istæ: Omne mordax ad tuſſim impetum ciet: sed & Omne oleum ad tuſſim impetum ciet: quibus confessis nihil concludi poterit. Hypotheticam verò propositionem, quam Chrysippus ἀξίωμα συνηµµένον nuncupat, veram accipere non licet, neq; a sensu, neq; ex sensu, neq; ex consequentia rationali. A sensu enim, aut per sensum aut ex sen- su, aut vtcunq; nominare placebit, id genus ἀξιώματα desumpta sunt, nempe, Omne mordax ad tuſſim impetum ciet: & Siquid mordax est, itidem & ad tuſſim impetum ciet: & non, Si oē mor- dax ad tuſſim ciet impetum, protinus quicquid ad tuſſim ciet impetum, mordax erit. Neq; omni- no ad hoc, Si quid mordax est, hoc & ad tuſſim impetum ciet, sequitur in vniuersum istud, Siquid ad tuſſim impetum ciet, ipsum & mordax esse: sed id quidem, Si non ciet ad tuſſim impetū, haud- quaq; mordax esse, id inquam verum est, quippè cum mutuo conuertantur. Non tñ si quid ad tuſ- sim impetum ciet, continuo & mordax est: simpliciter enim hoc conuertitur, & non mutuo. De- monstratum aut in methodis logicis est, quæ ex mutuo veris conuertuntur orationes, ipsas quoq; veras esse: at quæ simpliciter conuertuntur, non perpetuo esse veras: Illas quidem ἀντιστρέφοντας vocant, has verò ἀναστρέφοντας. Igitur si non ex necessitate verum est, Si quid ad tuſſim impetum D mouet, idem statim mordax esse, neq; sanē oleum proinde q̄ ad tuſſim impetum moueat, mordax esse concludi poterit. Hoc enim duntaxat pacto, nempe si in confesso esset, Omne quod ad tuſſim impetum moueat, itidem mordax esse, verè talem confici conclusionem inueniretur, Si ad tuſſim impetum mouet oleum, vtiq; & mordax est: quò videlicet ad hanc sequatur orationem, facta tali assumptione, Atqui ad tuſſim mouet impetum oleū: sequitur ergo iuxta primam orationē inde- monstratam conclusio, Mordax igitur oleum est. Verum enimvero non hoc pacto colligendū il- lis fuerat, q̄ si quid mordax esset, continuo et ad tuſſim moueret: sed q̄ sola mordacia ad tuſſim im- petum prouocat: ita enim concluderetur, quicquid ad tuſſim moueret impetū, esse mordax. At hoc ipsum, Sola videlicet mordacia ad tuſſim impetū ciere videri, & alienè a sensu dicitur, quippe- cum & pinguias mouere ad tuſſim impetum appareant: & quod quaritur, prōptè assumptum est neq; ex sensu neq; ex demonstratione. Præterea hominum id est ignorantium, quæ nam sit ad tuſ- sim impetum mouendi affectio, quam fortassis ipsis exponere præstiterit.

Quomodo & Per quæ ad Tuſſim Impetum cieri contingat.

CAP. 17.

Contingit autem ad tuſſim impetum cieri inæqualitate quadam in gutture præter naturam proueniente: quippe cum spiritus per puram leuēq; semper ferri viā consuetus, si qñ in emi- nentia quædam impingat, quassationem quandam ac velut inæqualem concussionem in guttu- re

re efficit, atq; ita ad tussim animal prouocat. Nam vt alias quoq; multas natura hominibus salutis E gratia ingenitas indidit passionem, ad eundem modum & sternutationem, & tussim: Sternutationem quidem, vt ea quæ in naribus infesta molestaq; sunt, propelleret: Tussim vero, vt quæ in gutture. Porro duplex ea affectio est, aut resiccata exasperataue, quæ in arteria est membrana: aut inequali in ea corpore delato, siue id liquidum sit, siue solidum. Hinc seu panis micula, aut alterius cuiuspiam edulj, nobis inutis in spiritus meatum decidat, tussire adigimur: seu bibentibus affatim, ipsius potus quippiam eò influat, similiter iritatur, atq; ad tussim compellimur. Percolatur enim perpetuo per asperam arteriam in pulmonem ipsius potus tam exile quippiam, vt protinus ab instrumentis raptum per facile quocunq; distribuatur, nec tñ vsq; iam acruatim in spiritus semita consistat, neq; animal ad tussim iritet: At vbi vel id ipsum plusculum, vel aliud quodpiam seu liquidum, seu solidum corpus, in aspera defertur arteria, iam inde tussire necesse est, donec a spiritus vehementia quod molestat propulsatum eiciatur. Proportionale quippiam huic accidit, vbi in membranâ ipsam arteriæ exasperatam spiritus impingit, nisi q; hæc affectio alia à iam dicta est. Nunc enim ab arteriæ membrana aufertur abraditurq; quippiam: intus verò adhæret aliquid, in priore affectu. Porro vtriq; communis est spiritalis viæ inequalitas. De quibus fusius in causis symptomatum disseruimus. Caterum in præsentia cognouisse sufficit, q; mordacia gutturis exasperatione: oleosa F verò & pingua illitu, inaequalitatem & ad tussim impetum efficiant. Quicquid enim extra naturam in arteriæ incidit tunicam, tenaciterq; illi inhæret, tum organis ipsis, & qui per ea defertur spiritui, insolens est, tum animanti quoq; molestum. Nec id nunc dico, quin pleraq; ex oleis qualitate mordicantia sint. Nam & quæ admistum habent salem, & prorsus recentia sunt, ea omnino mordacia quoq; sunt, nō propria sua essentia, sed quoniam omnibus plantarum succis geminum insit excrementum (quod abunde indicauit Theophrastus, & nos postea monstrabimus) alterum crassius ac velut terrestrius, alterum tenuius & velut aquosius. Sanè & oleo ambo hæc insunt, ad concoctionem & discretionem tempus postulantia. Porro tempore quidem, alterum relidet, alterū verò consumitur: Ac primum quidem, quod videlicet & terrestre est & crassum, sublidit, amurca nūcupatum: alterum verò tenuius ac velut aquosius, quodammodo et ipsum compositum est, ex aerea scilicet essentia, & tenui serosa.

Quot Modis Aqueum & tenue Excrementum ab Oleo Separari queat.

CAP. 18.

Cæterum serosum istud ruti coloris est, à crasso illo terrestriq; sublidēte scilicet qualitate absterfa. At oleum ipsum tum minime mordax, tum candidum sua natura existit. Quapropter vbi tenue hoc excrementum separatum fuerit, candidius etiam dulciusq; efficitur. Separatū verò multis modis. Aut enim in Sole feruente lati oris vasculo olei pleno deposito, conchis in altum sublati, subinde id cū strepitu desuper conturbant. Aut calidos vasculis oleum continentibus cineres subiiciunt, solarem q; fieri possit maximè calorem imitati: maiorem enim idcirco vitant, q; ipsum in qualitate transmutet, prompteq; nidorem excitet. Aut nucleos oliuarum, aut frumentū circuncirca apponunt. Aut medicamenta quædam vasis ipsis iniiciunt. In summa, quod aqueum est, exigūt atq; consumunt, reliquum autē seruant. Itaq; si tam dulce candidumq; acceptū oleum, cuiq; nec ab initio sal inditus est, ipsum insuper, vt ante positum est, laues, id tibi medicamentorum omnium minime mordax erit. Ac nos quidem persæpe oleum eiusmodi bibendum non nullis exhibuimus, nosq; ipsi experimenti gratia sumplimus, prorsumq; nullam intestinīs mordacitatem attulit, gutturiq; minime ad tussim impetū commouit: cumq; oculis esset infusum, sensum mouit exiguum, ipsa potius nouitate, atq; insolentia, q; acrimonia molestū. Atq; eiusmodi sanè oleum, ad vnguem oleum existens, cuncta tum humectat, tum emollit, vbi nec summe (vt monuimus) frigidū, nec calidum applicet. Porro cui iniectus sal est, non nulla quoq; inest necessario mordacitas. Verū mirer sanè, si quis tm̄ indat salis, vt oleosam pinguemq; substantiam exuperet: vtq; Archidamū i. referat, qui ait cutem aduri ijs qui in oleo fricant: qñ quidem & id sæpenumero factum vidi, cum aliorum H non nullorū gratia, tum podagræ & arthritidis: Fricant. n. partes affectas trito in pauculo oleo sale multo, idq; per intermissiones, haudquaq; in paroxysmis, tum vt superfluum oē exiccet atq; discutiant, tum vt partibus infirmis bonā comparent habitudinem ac robur. Atq; in hoc quidē sal exuperat, in oleo verò superatur. Potiusq; eorum quæ in oleo rigata sunt, facienda comparatio est, q; quæ in eo decocta, vtpotē qui hominē feruenti nequaq; oleo decocturi sumus, verū temperato vni curi. Præstat. n. (id quod aliquoties supra monuimus) ipsum rei euentum sensu perceptilē et exacte manifestum inspicere: neq; enim sanè extrinsecus quasitis opus exemplis est, in rebus nimirū, quæ tam clare cognosci possunt. Quin si qñ forte obscurum sit quod queritur, adeo vt ex alijs sibi fidē poscat, neq; illic sane remotissima dissimillimaq; propinquis præteritis, accersenda sunt querendæ facultatis testimonia. Sanè euidenter luceq; clari⁹ omnibus hominibus est, q; frictio ex oleo magis q; licca lassitudinem aufert, corporaq; emollit, cohibens occludensque quicquid ē nobis foras effluere est natū, haudquaq; digerens & exiccans. Id ipsum & Diocles confessus est, vt qui oblinere poros oleum dixerit, quæq; effluunt cohibere, tum coria emollire. Quod si rerum euidentia illi nō sufficiebat, ac proinde extrinsecus adducere coniecturas potius illi visum est, ea quæ in oleo frigido rigantur, memorare, non quæ in feruenti decoquuntur, afferre debebat.

Quod

A *Quòd Perperam Archidamus Inæqualem ex Oleo Frictionem asseruit.*

CAP. 19.

Quemadmodum in talibus, rerum transgressus est euidētiam, ita illic quoq; dum ait inæqualem esse ex oleo frictionem, manibus videlicet lubricis labentibus. Nam contrarium oēs manifestò percipimus, nimirum cum quæ ex oleo fit frictio, æqualis existat: inæqualis verò sicca. Cutem enim in frictionibus siccis manus coadducunt, ac velut duplant, violenterq; ac præter naturam complicant: dein ubi non amplius prior velut duplatio labētes sequi manus potest, ipsa quidem recurrit, atq; ad continuum reuelltur: manus verò semel ac vno impetu in alterā cutis partem transeunt, inferiorem transgressæ duplationis partem. Ac proinde inæqualem, duram, laboriosam talem sentimus frictionem: Duram quidem, qm̄ cutis violenter & tenditur, & concutitur: Eisdem de causis & laboriosam: Porro inæqualem, qñquidem non in oēs cutis partes fricantes incidunt manus, verum infernam duplationis partem perpetuo transiliūt: id quod fit tum ob naturales cutis asperitates, idq; potissimum in natu grandioribus: tum q̄ laxa est cum alijs propè omnibus cutis, tum gracilibus maxime & senibus. Quippe si læuis equabiliter tota, & tensa exacte cutis foret, haud facile plicari posset, nec inæquales in se manuū efficere decursus: verū facile, reor, antorsum percurrerēt, à primis ad reliqua prompte delabentes, nimirum cum nullam secum cutis partem ducerent. Atqui cum laxa sit et aspera, externo quopiam medicamento indiget, quod et rugas eius impleat, & fricantibus manibus lubricitatem præbeat: quas ad res oleo nihil aptius inuenias. Mirerisq; profectò Archidamū, qui nec rei sit reueritus euidētiam, nec quæ eius sit causa inuenerit, sed in vtriusq; pronunciarit cōtraria: quippe cū inæqualis sicca appareat frictio, æqualis verò quæ administratur cum oleo: nec minime ea testimonio suo adstruit ratio, quæ causam exponit.

Redarguit Prauam Medicamentorum facultates Inueniendi Rationem.

CAP. 20.

Verum de Archidamo & Diocle satis in præsentia. Volo. n. (qñquidem semel aggressus sum prauam facultatis inueniendæ viam ostendere, oleo pro exēplo vsus) oēm celerrimè orationem absoluerè. Igī cum veteres philosophi calidū esse oleum asseuerant, nō paruo (vt putāt) argumento, q̄ celeriter s. in flammam vertat, contradicentes quidam id illi accidere aiunt, qm̄ tenue est, & aereum: cæterum frigiditatem eius inde adeo monstrari, q̄ hyeme ocyssime concresecat: nec enim vino solū acetoq; sed et aqua ipsa, promptius à frigore deuinci. Ad ea rursus obijciētes alij, q̄ aereum quidē sit non negāt, id quæ ex leuitate perspicuo apparere dicunt: non tñ frigidum esse fatētur: quippe cum aer omnis sit natura calidus, vti generatio quoq; eius indicio est, nimirum cū extenuata solutaq; calore aqua aer efficiatur. Constat quæ iam inde maximā eos ingredi q̄stionem clarissimis philosophis dubitatam. Si quidem Aristoteles, quiq; eum sectātur, calidum esse aera existimant, at Stoici frigidum. Porro ad celerem olei congelationem, quod visum est illis qui frigidū ipsum asserunt, hi qui calidum contra contendunt, non tam valide concresecere vt aquam, cōtra opponunt: neq; enim congelationem in eo esse aiunt, si quis recte expendat, sed velut consistentiam et incrassationē: hocq; fieri aiūt, quia crassum est et viscosum, nō quia frigidū. Itaq; rursum vtrinq; in ambiguum oratio perducitur: illis quidem ex eo, q̄ celerius à frigore vincatur oleum, q̄ aqua: his verò ex eo, q̄ aqua oleo plus congeletur, contraria adstruentibus. Ad hoc itaq; q̄ de his addubitent, neq; q̄ aereū sit, omnibus confessum est. Etenim leuitas quidem, inquiunt, huius indicium foret: at crassities non paruam adfert coniecturam ipsum esse terreum. Porro quidam ambo componentes, aereum simul & terrosus constituit. Sunt qui hos deridentes, id quod cū primis oleo inest, nēpe humiditatē, adimere perfecte ipsos oratione dicāt. Ad hæc nō nulli ex eo, q̄ viscosum sit, frigidū esse contendunt, alij verò calidum, nō nulli siccum, postremo quidam etiam humidum: Etenim nisi contractæ compactaq; partes eius forent, & inuicē exacte adhererent, viscosum haud fore: atqui illos oēs frigiditatis esse effectus: nā fundere, extenuare, soluere, partes à se inuicem separare, eam verò esse calidi naturam. At alij contra viscosum nihil fieri pronunciant citra calidi videtoriam, veluti in succorum omnium patet decoctione, tum eorum qui ex herbis exprimuntur, tū qui ex fructibus: quippe qui cum aquei principio sint, ac consistentia tenui liquida que, ubi decocti fuerint, crassi viscoli que euadant. Quin & ex particularibus vtriusq; exemplis contraria probabiler adstruunt, Alij viscum, mel, picem liquidam, resinam, & alia id genus, quæ in profello & viscosa sunt & calida, proponentes: Alij cicuræ, psyllij, atriplicis, bliti que succum memorātes: et ad hæc veluti colophonem quendam orationi pituitam proferentes, liquido enim ipsis ea & viscosa esse & frigida videtur. Quin & ex eo q̄ quibus venæ sectione sanguis detrahatur, oleū instillatū fluidum reddat sanguinem, utrosq; contraria adstruere videre est. Alij. n. tanq; calore fundens, alij vero tanq; frigore lubricitatem præbens, non secus ac glaciē fluxibilitatē ipsum facere asserunt. Atq; inde aliò versi, de lubricorū oīum natura disceptant, ad extremam vsq; garrulitatem orationē promouentes. Condemnantes aut horum errorem, vt aiunt, alij, pinguitudinem proponunt, q̄ proxime ad olei naturam accedit, & euidenter deprehendi potest cuius sit temperamenti: quippe quæ in nobismet ipsis consistat, nec fallere nos queat. Nam in sanis, inquiunt, & bene curatis corporibus multa provenit pinguitudo, quæ ne infans quidem frigida dixerit: talia. n. fieri robusta natura, quam oēs naturales philosophi calidā esse rem confitent. Sed his ediuerso quidam in frigidis temperaturis pinguitudinem provenire aiunt, velut scemine indicant, qui que ociosam vitam trahunt.

* ομοιοπλας
est tempera.
ουσις ομοιοπλας
in antiquis. et
de etiam hac
eodem pag. 8
dicitur.

figunt. Iam verò & inter gentes ubi frigus quidem superat, pingues: ubi verò calor, graciles, pro-
uenire homines asserunt: proferuntq; exempla, Celtas, Thraces, Bithinos, Ponticos, Galatas, sicut
frigida regionis incolae ita quoq; in vniuersum pingues: Arabes verò, Libyos, Ægyptios, Æthio-
pes, quiq; terram inhabitant calidam, graciles & aridos omnes. Non nulli verò citra particularia
exempla vniuersali inter sese ratione contendunt, partim pinguem in nobis succū provenire non
posse, nisi probe à natura cibi conficiantur, asserentes: partim in cibis quidem contineri contiten-
tes, à nostro tamen calore consumi, velut à flamma oleum: qui ubi infirmior est redditus, in corpo-
re aceruari. Sunt qui animantia quoq; in medium asserant, ut quæ natura frigidiora sunt, pinguiora
omnia reperiantur, ut vrsi, oues, fues: quæ calidiora, itidem & licciora, gracilioraq; & pinguitu-
dine vacatia, ut leones, pardales, canes. Præterea inde adeo, qd madefacta oleo apes, muscæ, vespæ,
formicæq; intereant, alij quidem calidum, alij frigidum comprobare ipsum tentant: ac rursum alij
humidum, atq; alij siccum. Etenim cū iam dictæ animantes exangues sint, ac proinde frigida, qui-
dam eas celeriter refrigerari aiunt, atq; ita mori: quidam contra, dum excalfiunt, haud posse in con-
trarium mutationem perferre: Quin & qd immoderate exiccantur, alij, quippe, cū natura iam an-
tea exiccata sint, immoderationis ratione offendi: alij verò qd humectentur, idq; naturæ contrarie-
tate. Atq; qd in insectis animantibus contraria inuicem colligant, mirū fortassis videri non debet: **F**
sed qd ex ijs quæ nobismet ipsis accidunt, in vtrāq; partem disserunt, id verò admiratione dignum
est. Quippe alij plus, alij minus, sudare nos inquirunt, si quis in balneo vngatur. Nec tñ hi qui plus
asserunt, de facultate eius vniuersali inter sese conueniunt, neq; hi qui minus: Verū ex ijs qui plus
nos sudare asserunt, quidam calori acceptum referunt, quidam verò viscolitatis: priores quidem ca-
lidum sudores prouocare natum dicentes, viscosum vero alteri: quippe venandi & aceruandi co-
rum quæ hæcenus celeriter defluebant, proindeq; sensum fallebant, facultatem obtinens, manife-
stam ita sudorum copiam efficere. Porro qui minus sudare volūt eos, qui aut in balneis, aut exer-
citijs vnguntur, alij quidem illinendi facultatem, alij vero refrigerandi vim, illi attribuunt. Quin
etiam ex apparentibus alij reliccare, alij humectare ipsum dicunt: humectare quidem, quotquot
plus sudare inuencios censent: reliccare vero, alij. Quinimo & qd à frigore tueat inuencios, alij qui-
dem crassitudine viscolitateq; inftar vestimenti aut munimēti, frigus arcere: alij verò per calorem
naturalem contacta concalfacere referunt. Porro etiā ex eo, qd quæ in libris atramento conscripta
sunt, nihil vitiet aut deleat, haud aliter q̃ arena cinisq; cum reliqua liquida oia deleant, quidam sic-
cam & velut exuccam eius naturam adstruunt: quidam verò partium crassiorum, ac minus elabo-
ratarum. Sic et qd alijs nō commisceat, hoc alij quidem leuitati, partiumq; tenuitati: alij verò cras-
situdini viscolitatisq; adscribunt, cū succis sui similibus misceatur, ut maluæ decocto. Eadē asse-
runt & de hoc, qd terra nō probe oleo irrigetur, tametsi alijs liquoribus madefcat, ut vino, aqua, ace-
to. Ac non nulli quidē hic essentia causantur siccitatem: alij tenuitatem: sunt, qui crassitudinem.
Etenim qui tenuitatem pro causa asserunt, intactos transire meatus aiunt: at, qui crassitudinē, om-
nino ne ingredi quidem illos asserunt. Neutros verò arguere queas, cū vtrāq; de causa quædam
ne propinquis commisceantur, prohiberi possint: si quidem phyllicorum non nullis meatuum cō-
moderatio, misionis esse causa videtur. Atq; ego nunc sanē illa, in summa tantum relatis solis ra-
tificationum occasionibus, commemoro. Quod si quis singillatim vnumquodq; extēdere velit,
atq; hinc inde in vtrāq; partem disserere, nō vnum ille volumen, sed et complura, meo iudicio ex-
plebit. Licet enim vel iam nunc prospicere, qd non longum solum orationis hic euasurus sit error,
(nec enim tolerari posset) verum qd summam etiam interim attinget physiologiam, sic ut dijudica-
ri non nunq; nequireret. Porro si cui ēt constaret omnino inutilem esse medicis, longe etiam magis
eam rationum viam, arbitror, effugeret. Nō enim absolute an calidum, frigidū, humidum, siccū ve-
vnumquodq; medicamentorum sit, inquirimus: neq; an formicas, apes, vespas, aut aliud animalū
humectare valeat, aut reliccare, calfacere, aut frigefacere: sed quomodo ad corpus se habeat huma-
num. Cū liceat igitur in hominibus ipsis experimentum capere, non rectē ad alia vertuntur.

Quæ sit Recta Experimenta Olei Facultatis Ratio.

CAP. 21.

† quod non lon-
gus solum sit
talis orationū
error, (hoc n.
tolerari pos-
set) verum et
ad summam
quosq; physio-
logiam ascēdat:
interim vero
etiam diiudi-
catū sit diffici-
lis.

* reuocationē.

AT recta experiūdi ratio, in primis quidem ea est, quæ in corporibus habetur temperatis: de-
inde ea, quæ in intemperatis: mox, ut sæpenumero antea monuimus, quæ in calidis, frigidis,
humidis, ac liccis morbis. Vbi animū advertere iussimus, ut quod per sese quid ageret, ab eo quod
ex accidenti, distingueretur. Id quod futurum est primū quidem, si qd fieri potest simplicibus as-
fectibus admoueas: Deinde si, an protinus ab initio quod sensu possit percipi, suam vim exerat, cō-
sideres, an post temporis aliquantum, aut deniq; ubi ablatum fuerit, velut aqua frigida, quæ caloris
efficit repēcussum: Ad hæc alienæ qualitatis misturæ expers ut sit, dāda quam maxime opera est.
Quomodo ergo oleum quis tale efficiat, supra positum est: verum quomodo simplici morbo ap-
plicari queat, nunc dicemus, id modo prius commemorantes, qd in morborū differentijs ostensum
est, Corpora quædam ad calidius versa videri citra aut cacochymiam aut plenitudinem, visceris, ve:
inflammationem, velut in ingentibus exustionibus euenire assolet: Quædam verò ad frigidius,
ut in vocatis iam passim consueto nomine perfrictionibus (ψυγμοὺς Græci vocant.) In talibus
vtiq; affectionibus si oleum adhibeas, manifesto comperies, refrigerare nos an calfacere sit natum.

Sed

bus considerant: & præterea q̃ mediocritates tum in naturalibus nostris temperaturis (vt in ope de Temperaturis ostendimus) tum in medicamentis expendendis prætereant. Siquidem tanq̃ necessario id cuius perpenditur facultas, medicamentum, aut calidum, aut frigidū, aut humidum, aut siccum esse debeat, ita verba ipsi faciunt: ac si non fieri posset, vt in calfacientium nos ac refrigerantium medio quiddam consistat, atq; aliud rursus inter exiccantia & humectantia. Adeo inuenire est quosdam stupidos, vt ne vbi audierint quidem veritatem, assequi possint. Itaq; quosdam etiā noui, qui contra contendere adstruereq; conarentur nihil temperamento esse medium.

Quod Compluribus nos modis Calfacere Oleum appareat, nempe Vt Alimentum, Vt Medicamentum, ut Tegumentum: Et quod Excalfacientium nos ac Refrigerantium,

Medium quodammodo obtineat.

CAP. 24.

Verūm hos in libris de Temperamentis iustis confutauimus rationibus, nihilo secius idem in sequentibus facturi. Huic autem libro finem iam imponere studens, ad oleum reuertor. Accidit enim illi, vt fortassis tanquam alimentum nos excalfaciat, vbi scilicet intrò in corpus assumitur: probatis enim quibusdam tum medicis, tum philosophis, sicut ex cibis, ita ex oleo corpori fieri appositionem visum est. Accidit verò illi, vt tanquam medicamē medium sit nos calfacientium & refrigerantium: tum etiam velut tegmen nos excalfaciat: naturæq; eius vel maxime propria esse imago videtur eiusmodi. Nam quemadmodum vestimenta à nobis ipsis excalfacta, rursus nos recalfacere consueverunt, ita & oleum. Sed quemadmodum illa excalfaciēte corpore calidiora non euadunt, ita quoq; nec oleum. Recte autem perpendas rem totam, non ad præsens modo, sed & ad futura omnia vtilem, si aeris nos ambientis memineris: Qui interim eo qui in nobis est calore vsque adeo redditur frigidior, vt munimētis quibusdam aduersus eum tegminibusq; sit opus: Interdum verò vsque adeo rursus calidior euadit, vt ferre nequeas, fugiasq; sub tectum aliquod vel umbram: Est autem etiam qm̃ tanta est moderatione præditus, vt neq; tepescientia, neq; refrigerantia exposcas, sed citra omnem molestiam sensumq; in eo verferis. Tertiam hanc temperiem, quam modo dicebam, symmetrā moderatamq; voco, atq; aliarum mediam esse statuo: ac corpus nostrū neq; excalfacere, neq; refrigerare: cum aliarum duarum altera nos excalfaciat, altera verò refrigeret. Similemq; esse dico mediæ aeris nos ambientis temperaturæ, tum qui à vestimentis, tum qui ab oleo prouenit, calorem. Porro si ne sic quidem etiam clarum euasit quod indicare volo, at illo saltem modo apertius opinor intelliges. Duos mihi animo intelligito homines corpore similiter temperatos, mutuo sese contingentes vel pectore & ventre solo, vel manibus & cruribus. Quod si eandem duobus istis hominibus nactus sit temperiem aer illos ambiens, vt in tribus his corporibus par inlit calor, neuter ab altero tunc excalfieri dici queat: nam quæ similia vndiquaq; corpora sunt, à sese mutuo nullam accipiunt mutationem. At si frigidus sit ambiens, mutuo se calfacere hi homines dicentur, tametsi haudquaquam excalfaciant, sed frigus modo arceant. Vulgo itaq; affluti abuti vocibus, id quod frigus arcet, excalfacere aiunt: haud sanè recte. Atqui permittendum ipsis est, vt prout velint appellent: cæterum per calfaciendi verbum in vtraque dictione idem significari, id verò neutiquam concedendum: haud enim idem est, an ex se quid cuiuspiam calorem præbeat, an frigus prohibeat. Quibus sic se habentibus, quæcunq; foris nobis iniecta eandem corpori caliditatem obtinent, siue à sese ipsis, siue ab alijs, siue à nobismet ipsis, eam nacta fuerint, exacta loquendi ratione neq; calfacere neq; refrigerare dicendum: at, sicui abuti libeat, non repugnandū, modo in dictione significationum differentiam commemoret: siquidem alio quodam modo calfacere nos dicitur ac calidus, atq; alio modo qui sit moderatus. Respondet autem proportionē aeri calidiori pyrethrum, napy, piper: moderato autē pinguitudo, & oleum: actū enim aeres sunt calidi, potentia verò medicinæ. Aera enim calidum haud ipsi efficitur, sed qm̃ in eo versando talem ipsum experimur, ita nuncupamus: At medicamenta, sicuti in tertio de Temperamentis demonstratum est, principium excalfactionis à nobis accipientia, partim æquē nos recalfacere sunt nata, partim plus, partim minus. Ex genere autem eorum quæ æquē nos recalfaciunt, oleum est: Cui eidem quoq; à viscositate, ac q̃ difficulter item defluat, tum q̃ meatus infarciat obstruatq; duplici ratione vt augere caliditatem videatur euenit, tum inde adeo q̃ instar vestimenti aut munimēti illinatur: tum q̃ meatus infarciat, prohibeatq; foras effluere magnam vaporosi intus caloris partē. Eadem ratione nec vt resiccentur corpora nostra permittit, nili sanè applicetur calidum, idq; plurculo tempore. Has itaq; vires eius cum homines omnes experientia compertas habeant, quos largius sudare volunt, siue à balneo, siue balnei expertes, ijs non protinus ab initio oleum admouēt: Verum in ijs qui morbo laborarunt, vbi sudare inceperint, tum excalfactum, perfundūt: In ijs verò qui etiamnum laborant, vbi abunde iam satis sudarint: Porro in sanis, siquidem ex longo itinere, aut exercitatione, alio ue quouis pacto, corpus ipsis exhaustum est, eis inungi & ante sudorem permittunt: Verūm qui non concoxerint, aut corpus habent plenum, quod *πληθωρικόν* vocant, his neq; in balneo inungi concedunt.

Quod Medium sit Oleum Inter Humectantia nos & Exiccantia.

CAP. 25.

Atque hinc quoque mihi videtur oleum esse medium inter humectantia nos & resiccantia, velut inter excalfacientia & refrigerantia medium consistere supra demonstraui: humectat

A humectat enim aqua, exiccat verò tum laurinum, tum cedrinum oleum. At quod simpliciter sic admouetur, citra vllam videlicet ex arte conciliatam à nobis aut caliditatem aut frigiditatem (huius enim vsq; meminisse oportet) talem seruat nostram temperiem, qualem scilicet accepit, q; heri possit maxime vaporosas omnes corporis expirationes prohibēs. Porro si plusculum membra frices oleo, calorem ex frictione adscititum comparabis. Atq; hac interim ratione lassos non parum iuuabis, partim q; in minutos corporis meatus pingue ingrediatur, & quę indurata sunt emolliat: partim q; humiditatem acrem ac subtilem, quę in lassitudine ex colliquatione proueniens sub cute latebat, per halitum caliditate digerat. Conspiciuntur enim exercētibus tum foras effluere sudores, tum intus in ventrem non pauca defluere excrementa, quę velut liquamina sunt. Ex hisce autem colligendum est complura toto in corpore eiusmodi relinqui, quę euacuationem deposcant: quippe duplex in lassitudinibus affectio nascitur, sicut alibi ostendimus. Nam similes quidem animantis partes resiccantur, humectantur verò vacua spatiola nō vtili & naturali humore (nam sic foret plethora, siue repletio) sed tenui & acri mordaciq;: proindeq; remedijs indigent duplicibus, tum ijs quę siccitatem corporis irrigent, tum ijs quę humorem acrem euacuent. Itaque ad hec aptissima sunt dulcium aquarum lauacra, nimirum quę humiditate sua instrumentorum corrigāt siccitatem, & caliditate tenuem atque acrem humorem digerant. At si corporibus inharere pollet aqua, nec facile deflueret, ipsa quidem per se sufficeret. At qui cum ea quę foris circumfunditur, facile defluat: & quę in poros ingressa corporis, nullam habens ansam prompte effluat: in hoc sanē ipsum vtiliter miscetur oleum: maximeq; iuuat, si ex vtroq; quis diutius fricetur, id quod veteres Græci *χυτλοῦσαι* nominabant: cui oppositum imposuerunt vocabulum *ξηραλειφειν*, quod est sicca vti frictione. Est sanē & hoc quoq; quodammodo lassitudinem sanare potens, sed multum relinquitur ab eo, quod *χυτλοῦσαι* nuncupant. Nam vt reliqua taceam, vbi cum oleo aqua cōtunditur teriturq;, haud facile solubili mistione coit, vt quibus ita corporibus inūgatur oleum, necesse sit & plusculum inharere aquam. Quare hic item velut materia est quædam oleum humectantium exiccantiumq;, sicut ante ostensum est excalfacientium & refrigerantium. Quippe quod si exiccanti commisceas, totum effeceris exiccans: sin humectanti, & ipsum humectans reddideris: sepē quę quod ex ambobus constat, maiorem adipiscitur humectandi facultatem, q; id quod primario est humectās: quod in aqua accidit. Nam ea primario madefacit: verum cum haud ita diu inhareat, nec actionem obtineat diutinam, leuiter vtiq; prodest. Cum ergo illic velut vinculum fiat oleum, cogatq; plurimum, quibus auxilio eius opus est, inharere, longē omnium optimū redditur remedium exiccatis squallidisq; corporibus. Sed si exiccans oleo medicamen commisceas, puta chalcitē, pyrethrum, gallam, struthion, siccans erit quod ex vtroq; commissum fuerit. Itaq; cum omnibus quę sibi commiscēt, subseruiat oleum, recta rōne velut omnium existit materia: tamen vtiq; necessario propriam eorum actionem retundit quidem ac minuit, non tamen vtilitatem: imo est vbi eam quoq; adaugeat. Haud est. n. idem (quod fortē quis autumet) actionem augere cuiuspiā, & vtilitatem: quippe cum actio secundum propriam cuiusq; facultatē, vtilitas vero non nunq; ex accidenti agat. Differemus autem postea vberius de vtilitate quę per accidens euenit: et nūc quę hacienus de ea dicetur, quatenus in præsentī est commodum. Quippe contusa cū oleo aqua, quod Hydrelæum vocant, magis auxilio est lassitudinibus, q; si esset sola: non quidem q; suę vires intendantur, sed q; quibus opus est, diutius inhareat.

Quod Materię Rationem obtinet, in Mistis Mediam tenere Temperiem debere, Alioquin enim

futurum, vt mistorum sibi Aduersetur actioni.

CAP. 26.

Quod autem, nisi mediam habeat temperiem id, quod ea, quę primario quibus opus est auxiliantur, velut dequinciet, sæpenumero ipsorum repugnabit actionibus, ex ipsa rerum natura generatim addiscere liceat, speciatim autem ex medicamentorum historia. Generatim quidem, quoniam id quod miscetur, si in contrarium retrahat, admisti sibi facultatem medicamenti vincere interim poterit, & in aliam planē speciem, quod ex ambobus miscetur, transferre. Siquidem quod materię rationem in mistura præstabit, nullam insignem neq; speciē, neque facultatem exerat oportet. In particularibus verò experiūdis hoc maxime pacto addisces, nō debere id quod materię rationem obtinebit, aut excalfacere, aut frigefacere, aut humectare, aut reliccare, si primū quidem in memoriam reuoces quę supra de resina, & pice liquida, myrrha, bitumine, tum cedri- no, & laurino, cæterisq; quę excalfaciunt, commemorauimus. Hęc enim omnia in aqua trita admodum olei calfaciunt magis, quàm refrigerant: desiccant plus, quàm humectant: quam ob rem lassitudinis sensus nō admodum soluere valent: Haud enim eandē cum aqua vim obtinent, quò s. auxilio magis sint, q; aduersentur: Neq; mediā inter extrema naturam sortita sunt, vt videlicet tanquam materia quædam inseruiant primario agentī: desiccant enim & excalfaciunt potius, nō humectant ac refrigerant, velut aqua. Si verò excalfacientium admodum reliccantiumq; cuiuspiā aquam commisceas, non modo nihil eorum quę agere nata est, fieri videbis, sed prorsum obscuratam, tanq; omnino admista non esset. Siquidem chalcitis, sandarache, misy, cæteraq;, quę nos vehementer tū excalfaciunt, tum resiccant, validas etiamnum suas vires etiam aquæ permista obtinent. Omnino ergo constat mediam obtinere temperaturam debere, quod vtriusq; extremis tanq; mate-

ria

DE SIMPL. MEDIC. FACVL.T.

ria inferuiet: quē in ordinē oleum si statuas, nihil vtiq; peccaueris, quippe cū oīa singillatim opera E tibi cōsentiant. Et accusabis prolixitatis nō nos vtiq; sed qui recta via preterita prauā prolixamq; sectant: quorū sanē causa hunc nos sermonē extēdere sumus coacti. Ipsa. n. veritas celerrimā inuē tionem obtinet, vt q̄ ab euidenter apparētibus exoriat. Haudquaquā tñ eo vsq; orationē prolon- gaui, quousq; licuerat, oīa, quæ prauē ab īplis prodita erant, scripturum, causasq; errorū edocurū pollicito. Sanē causas dixisse necesse fortassis fuerit, nempe quō, qui ex īplis proueniunt, paralo- gismos in tota particulariū medicamētorum iudicandi rōne cauere possis, veramq; doctrinā cum maiori scientia percipere. Crescit. n. nobis de rebus fides, vbi non solū ipsam veritatē cognorimus, sed etiam paralogismorum omnium causas edidicerimus: quod sanē in sequentibus efficiemus.

De Rosaceo.

CAP. 27.

NVnc aut vbi pauca de rosaceo ad ea, q̄ ab initio sunt dicta adiecerimus, orationem hoc in lo- co sistemus. Igit dictum est, q̄ neq; odoribus, neq; coloribus, neq; alijs oīno accidentiū, ani- mū adhibere in expendendis facultatibus rōnabile sit, sed ijs quæ perspicuo apparent tum in sanis corporibus tum in ægris. Ostensum ēt est, oleum vbi salis expers purumq; ad vnguē fuerit, ex me- dia esse materia. Conficiendum itaq; rosaceum, quod exactum simul ac simplex, req; vera rosa- F ceū erit, ex hoc videlicet oleo: dādaq; opa, ne quid in se medicaminosius cōtineat: vti apparere so- lent vnguētarij, quō videlicet tū magis duret, tū odoratius euadat, oleū videlicet prius, q̄ rosas inij- ciant, odoramētis præcondientes. Ac p̄stiterit fortassis īplis ēt nominibus ea dilinguere, quod ve- teres fecisse constat. Oleū etenim rosaceum nominare adsolent, quod absq; odoramentis p̄para- tum est: cui aut & horū aliquid inditum fuerit non id ēt oleū, sed *μύεον* i. vnguentū, cognomināt. Itaq; cū oleum velut materia quedā sit excalfacientīū refrigerantiūq; medicaminū, ex media vi- delicet tēperatura, constetq; ex oleo & rosarū succo rosaceū, est vtiq; & ipsum talis tēperatura, qua- lis est rosarū succus. Sanē verō facillimū fuerit, non modo rosarū succi per se, sed oleo quoq; rosa- ceo cōfecto, in sanis pariter atq; ægrotis (vt iam frequēter monuimus) virium eius periculū facere. Experieris ergo eos, qui adustione tentant, ab eo refrigerari, protinusq; vtilitatē aliquam percipe- re: qui verō refrigerati sunt, oēs euidenter lædi: vti facile ex vtroq; intelligas, vires eius refrigerare magis q̄ excalfacere. Non tñ valida à rosaceo apparet tibi refrigeratio, sed quæ proxima videat tē- periei mediæ. Voco aut id genus medicamenta, lucidioris doctrinæ gratia, ex prima nātura ordi- neq; refrigerantiū: sicut rursum quæ paululum à media temperie ad calidiorē declinarūt, ex primo recessu & ordine excalfacientium. Atq; hæc quidem in præsentiarū de rosaceo nouisse oportet. G Necesse enim erit & in sequēti libro ipsius medicamēti meminisse, et q̄ reliqua sunt, dictis adijcere.

* *Al. ἀποσά-
σεως i. recessu
seu gradu
ita etiam fre-
quenter inse-
rimus.*

GALENI DE SIMPLICIUM MEDICAMENTORVM FACVL.TATIBVS LIBER TERTIVS

ARGVMENTVM LIBRI

Quæstiones logicas de Actione Medicamentorum Simplicium absoluit, Quæ quali-
Elementa sunt Totius tractationis De ipsorum Facultate.

Quæ Causa Prolixitatis horum librorum, Quid prioribus actum sit,
Quid hoc agendum.

CAP. 1.

H

Α† δια τὸ
τάχος τῆς
πρὸς αὐτοὺς
ἀντιλογίας.
Β† παρακρού-
σονται.
C† clarius fe-
rē ad verbum.
non utique eos
laterēt nec qui
in demonstra-
tionibus ali-
quid paralogi-
zat, nec nos cō-
pendiose veri-
tatem ipsam
edocentes.



QUod equidem nihil, nisi quod vtile curandis morbis foret, hoc tractatu de- scribere decreuerim, primo potissimumq; deos huius rei testes habeo: dein- de & amicos meos, qui me, tum vt hoc opus aggrededer, tum vt quæ ab alijs perperam de medicamentorum facultatibus sunt prodita, quoad liceat com- memorarem, assidue hortari non destiterunt. At si quis erit, qui orationis ni- mia grauet prolixitate, non id mihi iure imputauerit, sed ijs medicis, qui pro- babilia quidem at non vera scripserunt. Nā & ego nunc quidem ēt magno- pere vereor, ne^a quia nimis paucis illos cōfutuimus, } sophismata quedam cōuerfantes cū illis adolescentulos^b fā recta opinione deiiciāt: } qñ quidem si in dialecticis metho- dis exercitati, aut captionum soluendarum periti, ad libros legendos accederent,^c tum sanē & ab ijs qui falsis demonstrationibus vtuntur, magis sibi cauere: & nos qui veritatem compedio tra- dimus, rectius intelligerent. } Qm verō vel ipsorum medicorum pleriq; nequaquam in istis sunt exercitati: tum inter illos quoque nō nulli reperiuntur ingenio natura tardiusculo: hi nisi nostris suppetijs, qui sophismata arguimus, iuuentur, non egre, persuasi in sophistarum sententiā perdu- centur. Itaq; quod ad istos attinet, deesse huic etiam operi quippiam videatur. Verum enimvero quando

A quando ad omnes mihi orationem accommodare non licet, cum tanta sit eorum qui hæc legent, non modo naturarum, sed etiam ætatis & habituum diuersitas, quod utique visum est fore maxime parti vtilissimum orationis genus, id superioribus duobus cōmentarijs secuti sumus. In quorum priore quidem de aquæ acetiꝑ viribus contemplati sumus. In secundo maximam partem de oleo peregrinus, pauculis postea de rosaceo adiectis. At in hoc tertio libro eiusmodi vtemur oratione, qualem ab initio protinus habere institueramus, idꝑ definitis primum vocis cuiusꝑ significatis. Deinde tractatus huius velut elementa tradituri, mox velut ad syllabas accedemus: ex quibus operis finis, ad quem contendimus, promptè sequetur.

Quot Modis dicatur Calidum, Humidum, Frigidum, Siccum.

CAP. 2.

CÆterum vocum definitio nihil accuratius edocebit, q̃ quæ in tertio de Temperamentis, si mulꝑ in primo cōmētarij istorum sunt prodita: repetam tamen eam nihilo secius & in præsentia. Corporum vnumquodꝑ aut calidum, aut frigidum, aut humidum, aut siccum, & dicitur & apparet, interm quidem ex sua natura, interm autē aduentitia qualitate adsumpta. Con sueuimus autem quod ex sua natura est, primario, & secundum se, & per se potentia tale & esse & videri dicere: quod verò adscititiam acquisierit qualitatem, ex accidēti quopiam esse videriꝑ eius. **B** modi. Porro eorum quæ propria sua natura aut calida, aut frigida, aut sicca, aut humida dicuntur, quædam actu seu energia talia existunt, alia potentia: differente quidem hoc potentia modo, quē nunc diximus, ab eo quem paulo antè dicebamus: illic enim ex aduerso diuidebatur ei, quod ex accidenti dicitur: hic verò ei quod actu. Sed & eorum quæ actu dicuntur, aliud quidem absolute est calidum, frigidum, siccum, aut humidum, velut elementa: aliud excessu, vt homo, equus, bos, canis, & vniuersa animalia: aliud ad symmetrū seu generis sui, seu speciei, vt verbī causa, leo cum homine comparatus, homo autem ætate florens cum puero: aliud ad quiduis obuium, vt Dion ad Theonem. Quin & corpora, quæ potentia talia aut talia dicuntur, vnumquodꝑ vt ad id, quod est actu relatum, dici necessario monuimus: Id quidem, quod facile accēditur, ad id quod actu est absolute calidum: hoc verò, quod alia calfacit, ad id quod per exuperantiam: sic quod hominem calfacit, esse vt ad hominem potentia calidum: quod verò bouē, aut equum, vt ad bouem & equum: similiter hoc huic, verbī causa, homini, illud verò illi calidum, frigidum, siccum, aut humidum est, illius vnus naturæ comparatum.

Ad Quid, & Quæ Nominum distinxisse Significata conduxerit.

CAP. 3.

EX hac nominum^a discrētionē & ad assequendam^b iudicij cognitionem {non parum} sumus adiuti. Siquidem si ad hominem quid dicatur calidum, a ceteris omnibus animalibus recedendum, & in ipso duntaxat homine periculum sumendum explorandumꝑ cēsuimus: Si verò quid ad equum bouem, ceruum, aut aliorum animalium quoduis in ipso rursum periculum faciendum erit. Interim verò & illos quoꝑ castigauimus, qui ex consistentia, colore, odore, sapore, grauitate, leuitateꝑ cuiusꝑ medicamenti, existentem in singulis facultatem inuenire tentarunt. Atque hæc utiqꝑ recte nominum^c distinctioni consentanea videntur. At quæ velut elementa huius esse speculationis proposuimus, in primarum consistere qualitatum cognitione ostendimus. Quas quidem in libro de elementis secundum Hippocratem, humiditatem, siccitatem, caliditatem, frigiditatemꝑ esse demonstrauiamus: propeꝑ harū quoꝑ inuentionem assequeremur ex significatis nominum recte distinguendis. Etenim cum medicamentum ab alimento discerneremus, q̃ medicamentum in qualitate alteraret, alimentum verò substantiæ corporis adlīmīlaretur, recte hinc ad alterantium nos qualitatum inuentionem perducti sumus.

Quod, cum Duplicia sint genere Quæ alterant, Alia specifica, Alia minime, In Specificorum genere consistant Medicamentorum Facultates.

CAP. 4.

Porro, cum duplices sint in genere alterationes, alię specificæ, quę propriè sanè & primario dicuntur alterationes: alię verò quę contendunt & contrahunt corporis nostri particulas, quas utiqꝑ potius per abusionem q̃ propriè nominantes alterationes vocant, in primo genere medicamentorum contineri facultates diximus. Nec enim quicꝑ ex specie in speciem mutari queat citra excalfactionem, refrigerationem, humectationem, & resiccationem. Dico autem ex specie in speciem, velut cum ex pane, ptisana, lente, sanguis, pituita, bilis tum flaua tum atra: atqꝑ ex his iterum adeps, os, neruus, caro, arteria, vena, atqꝑ adeo cæterarum animatis partium vnaquæꝑ gignitur. At si secundo nos quippiam, velut vitrū & ensis: aut contundendo, vt lapis & plūbum: aut secrete gata coarctando, vt vinculum, quadatenus partes alteret: ea haud pharmaca fuerint, quippe cum eiusmodi alteratione nullæ rerum oīum ex propria recedant natura. Etenim siue minutum panē frangas concidasꝑ, siue minutim concisum colligas in vnū, non tñ propriā ideo formā exuet: neque caro ex pane fiet per contusionē, neqꝑ os, exempli gratia, per coarctationē: Verūm dū in vētre venisꝑ concoquitur, in sanguinem pituitamꝑ abir: atque inde ex istis in os, carnē, & alias corporis partes, tota sua substantia alteratur, veteremꝑ naturā exuit, in aliam transiens speciem. Nec tamen ab alio quopiam, q̃ calore, frigore, humiditate, siccitateꝑ eas, quæ fiunt in aliā essentia speciei, alterationes mutationesꝑ, singuli affectus corporis accipiunt, vt demonstratum est. Atque hac ratione primas & elementarias específicas qualitates quatuor esse diximus, humiditatem, siccitatem

Quinra Classis.

CCCCC

tatem

^a διακρίσις i. diujsio.

^A Al. εἰς αἰσθητικὰς ἰδιότητες.

^B * καὶ τὰς ἰδιότητας, ἐστὶν ἡ διαφορὰ, ἢ ἡ ἀποστροφὴ τῆς ἰδέας τῆς ἰδέας, ἢ ἡ μεταβολή, ἢ ἡ ἀποστροφὴ τῆς ἰδέας τῆς ἰδέας.

^C * διακρίσις.

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

tatem, caliditatem, & frigiditatem: quærimusq; quā harū medicamentum vnūquodq; in mixtura E
pollentē possideat. Atq; p̄tinus in hoc primū pleriq; eas inquirentiū lapsi videntur, q̄ videlicet
pollentē absolute tanq̄ naturales qdam philosophi considerarent. Præterea cōplures quoq; eorū
decipi videntur, q̄ sine certa methodo Aristotelis Theophrastiq; libros perlegant.

*Quod Solis Philosophis conuenit de Calido, Frigido, Humido, & Sicco, ut ad totam Naturam
distingueret, Medicis verò ut ad Homines.*

CAP. 5.

* *ramet si.*

Siquidem permagni refert, an totius naturæ respectu, an hominum duntaxat, de calido, frigi-
do, humido, siccoq; definiamus. Nam totius naturæ respectu bifariam horum vnumquodq;
dicitur, partim absolute, partim per exuperantiam: absolute quidē vnumquodq; elementorum:
homo verò, equus, & bos per exuperantiam. Iam autem cum ad aliquid respiciendo exploratio
fiat, illud modò cōsiderandum erit, quod nam sit illud ad quod dicitur. Nos verò {medici} non
id quærimus, an in aqua marina humidi simpliciter plus sit q̄ sicci (idenim clarè cōspicimus) sed
si ad hominem conferendo: neq; tū rursus ad hūc simpliciter, ac si leonem illi compares: quippe
cum sic homine humidior marina fuerit. Quoniam igitur pacto scrutabimur, an sicca sit faculta-
te marina: quo nam alio, obsecro, q̄ an corpus humanum in æqualitate quadam reliccare valeat?
Itaq; in hoc vnum modo ceteris relictis intendendum. Atqui contra faciūt medicorum pleriq;: F
nam ad quiduis potius respiciunt q̄ ad hoc. Quomodo ergo ad hominem conuersi reliquis præ-
termiſſis, quā nam in hoc agendi facultate polleat marina, cognoscemus: an videlicet corpori
applicantes, sicq; eius periculū sumentes lauando in marina, rigando, fouendoq;: tum subinde la-
nā, aut spongiā, marina madentem partibus applicando: ad hæc emplastris ceratisq; miscendo:
atque in his omnibus ab eo, quod ex accidenti quandoq; euenit, id quod à propria medicamenti
vi proficitur, distinguendo: Nam in hoc omnis inuentionis summa consistit, quam vix quisq; il-
lorum attingit: sed eos philosophorum verba decipiūt haud potentes homonymiam percipere.

*Quod per Exuperantiam dici, Bifariam apud Philosophos accipitur, Nempe vbi
aut Mole quid exuperat, aut Qualitate.*

CAP. 6.

Nam non solum, ut modo diximus, aliud simpliciter, aliud per exuperantiam, ab ipsis dicitur:
simpliciter. n. ignis calidus est, per exuperantiam homo. Verum quod per exuperantiam di-
citur, bifariam quoq; dici autumant, Partim secundum substantiæ molē, velut & nos quoq; in Tem-
peramentorū cōmentarijs diuisimus: ut si cados duos aquæ summè feruentis vni cado aquæ ma-
ximè algētis pmiscueris: Partim verò secundū qualitātū effectum. Atq; hoc quod ad dogma cō-
sequitur, ita dicunt, non ex ijs quæ euidenter apparēt, {sed per syllogismum} accipientes. Nā sup
ponentes frigidū omne contrahere constipareq;, & substantiā reddere immobilē, aut egrè mobi-
lē: calidum verò rarefacere, fundere, coquere, mouere: rationabiliter in plantis omnibus vincere
calidum pronunciant, siquidem haud aliter neq; nutrimenti ex terra digestionem prolixissimam,
neq; alterationem eiusdem, neq; concoctionem, quin nec incrementū prorsus plantarum, neq;
germinationē, neq; fructuum generationē perfici posse, nisi calidū superaret: atq; ita rursus in-
ter plantas, alias calidiores, alias frigidiores constituunt. Ex eadem ista hypothēsi pendet ea ratio,
qua rosas esse calidas contenderunt: siquidem in illis, si in alijs vllis plantis, plurimum vincit cali-
ditas. Ex altera rursus hypothēsi depēdet quod de oleo & adipe adstruūt. Nam, quod ocylissimè
inflāmentur, idcirco calida esse ea facultate iudicant. Et alio rursus modo quæcunq; dulcia sunt,
calida esse dicunt, siquidem q̄ familiarissima sint, simillimaq; naturis nostris, quæ calida sunt, ideo
& ipsa quoq; calida esse volunt. Atq; philosophis quidem, vtpote qui de tota natura scrutantur,
rectè talia & quærentur & dicuntur: At medicis, quibus aliū est scopus propositus, haud perin-
de rectè, quippe cum in rosarum effectibus calidum non vincat: neq; sanè quoduis aliud plantæ
genus, eo q̄ plantæ est, calidū dici debet, qm̄ nos haud ita calidum quærimus, sed ut ad hominem:
siquidem si, quia in actionibus superat caliditas, propterea calidū quid dices, planta vnaquæq; ca-
H
lida erit, multoq; magis animalia omnia. Dicant igitur, si lubet, papauer, mandragoram, cicutam,
salamandram esse calida: verum nemo id dicit, sed velut vno ore omnes esse frigida pronunciant.
Atqui animal est salamandra, quod & nutritur & crescit, & mouetur, quæ sanè calido in mixtura
vincente prouenire asserunt. Quid ergo in istis quidem ad hominem respiciunt, in alijs verò ad
totam naturam, aut primarum qualitatum actiones? At ego non salamādrā modò aut cicutam
ut ad hominem frigida esse dici oportere cenſeo, sed alia omnia ad eundem modum iudicāda. Si-
quidem cicuta sturnos non modo non refrigerat & enecat, vti nos, sed & alit quoque, & nimirum
etiam calfacit. Quicquid enim substantiam alit calidā, calorē eius quadantenus ēt auget ēt tuetur.
Atqui corporis sturnorum calida est substantia, non modo quā animalia sunt, sed etiam quā san-
guine prædita. Sanè subinde in alijs tractatibus demonstratum à nobis est familiaritates quasdā
pugnātiāsq; qualitatum oibus rebus inesse: ac quod familiare est, expedite assimilari: quod verò
contrarium ad internecionem ducere tum animantia, tum plantas: Præterea familiaritates illas à
totius substantiæ proprietate oriri: id quod sæpenumero à me & dictum est & ostensum. At isti
cum egrè id capere possint, segniter & falsè de complurium medicaminum viribus pronunciant.
Vna. n. duntaxat illorum examinandorum regula est, nempe ea quæ ad hominem fit exploratio,
id

** *Ap. aut.*

Ad id quod secundum accidens, ab eo quod est per se, semper distinguendo. Cui si quis animum intendat, is nec acetum, nec rosaceum, calidum unquam dixerit: quippe cum utrumque nos primario & per se refrigeret: acetum quidem valide, leuiter autem rosaceum. Porro quidnam hoc sit leuiter, ego exponam: una enim cum eo tota medij temperamenti medicamentorum omnium ratio conspicietur, cuius & in praecedente libro mentionem fecimus, ubi de oleo differebatur.

Quomodo Indicanda sint Quae ex Media sunt Temperie, Nempe si mediae temperaturae similem ipsa temperaturam obtineant.

CAP. 7.

Si quippiam est ex applicatis nobis seu corporibus seu medicamentis, quod actu sic calidum sit ut nos, aut ex contactu similiter calidum euadat, id ex media est temperie, cum nobis nimirum collatum: si quidem secundum se queat per exuperantiam dici calidum, velut & nos quoque. At si quid non dum adeo calidum est ut nos, neque admodum tale redditur, id temperie humana frigidius est, quantumcumque in eo caliditas exuperet: etenim ad motum, caloremque in nobis praerat, auferet detrahetque. Quippe si datis duabus aquis calidis, quarum altera plus, altera minus caleat, misceas minus calentem magis calenti, huius certe caliditate exolueris. Sic si in caliditatem rosacei, quae tepida est ut ad temperiem humanam, caliditatem indideris humanam, prorsum ab hac quid detrahes, & refrigerabis.

B *Quod saepenumero pro Corporis nostri dispositione, Quod per se Calidum erat, Refrigerare est visum: Quodque per se erat Frigidum, Excalfacere.*

CAP. 8.

Non ergo mirari oportet, si quicquam eorum quae proprie & per se sunt calida, cum calidior commixtum, frigidius efficere ipsum queat. Ea est enim communis alterabilium corporum omnium natura, ut in se et agant, & patiantur admota: quodque minus est calidum a magis calido calidius euadit: quod vero magis calidum, a minus calido contra afficitur. Nam id vel ex ipso tactu clarissime discas: etenim eadem subinde illi tum calida, tum frigida esse videntur: calidiori quidem facto, frigida: frigidiori vero, calida. Proposuit autem mihi dudum quispiam, quam obrem in balneis frigidum meiamus, foris vero calidum, haud intelligens in balneis urinam quidem perinde ac foris tepidam esse, verum nos non aequae extrinseca corporis superficie, & dum lauamur & ante affectos esse. Nam in balneo ipso calidior ea nobis est quam urina, extra autem frigidior: quare & urina non ab re illi calida extra balneum apparet, in balneo autem frigida: quod enim minus quam ipsa calidum sentitur, velut refrigerans habet: quod autem magis calidum, tamquam excalfaciens. Liceat vero tibi, periculi faciendi causa, postquam abunde lauando incalueris, pelui aquae modice tepidae intro iussu tuo allata, in eam manum aut pedem immittere: apparebit enim aqua non tepida, sed admodum frigida: At si protinus balneum ingressus, aquam peluis tetigeris, minus videbitur frigida: perpetuo enim quanto plus fueris praecalfactus, tanto apparebit frigidior.

† тино.

Nec mirum videri debet, si putealium aquarum pleraque, quae videlicet fontes profundos admodum habeant, contacta hyeme videantur tepida. At si a balneo manibus contingas calidis, multoque magis si etiamnum in lauacro consistens, haud profecto apparebit tepida. Itaque tactum calidi frigidiq; dignoscendi normam ponentes, ac eius dispositioni iudicium omne tribuentes, merito sane crebro fallimur, ut qui quod haud ex se est frigidum, id frigidum esse dicamus: quod vero calidum ex se non est, id esse calidum pronunciemus. Hinc fit, ut dum lauamur, frigidam esse urinam credamus: contraque frigore rigentes aquam e puteis haustam calidam existimemus. At si affectionum in quibus eramus dum utranque contingeremus, obliuiscamur: ac solius eius, qui in nobis factus est sensus, meminerimus: periculum est, ne forte aquam aliquando absolute dicamus calidam, urinam vero absolute frigidam. Atqui neutra absolute aut calida aut frigida est, sed ut ad nos: nec ut ad nos rursus absolute, verum hoc videlicet pacto affectos. Absolute autem utraque, qualis ad nos est, dici possit, ad mediam eandemque optimam nostri temperiem collata: ut si ad hominem absolute expendatur, omnino sane ad temperatum & eucratum expendi oporteat. Sane

* διαπίπτει

D & haec quoque peccata omnia a nominum definitione dependent, quam paulo minus omnes habent contemptui. Etenim cum calidum & frigidum partim absolute dicatur, partim per exuperantiam, partim ut ad symmetrum sui generis comparatum, partim ut ad quiduis obuium collatum, iure optimo in homonymiis identidem fallimur, nescij quidem quoniam horum modorum quid calidum iudicemus, ad alterum tamen transeuntes. Verum sexcenties iam dictum est, dicaturque, quod in quarto & ultimo eorum quae modo recensuimus significatorum, de medicamentorum viribus considerare oporteat.

Quod Experientia Cognoscere iudicareque Medicaminum Facultates oporteat.

CAP. 9.

Non enim an absolute vnumquodque calidum sit, ut ignis, nam id omnino etiam foret impossibile: aut an per exuperantiam, ut sanguis, considerare propositum est: neque an ut ad symmetrum sui generis aut speciei dicatur calidum, ut leo in animantibus, & quod florentis aetatis est in quauis specie ad aetate prouectum: sed an ad hominem sit calidum, frigidum, humidum, aut siccum medicamentorum vnumquodque, id vero inquirere statutum est. Neque rursus ad hunc, tantum id quod ad aliquid aliud comparatur, sed si facultate, hoc est si ad motum ipsi, eam partem quam tetigerit reddat aut calidiorē, aut frigidiorē, aut humidiorē, aut sicciorē. Itaque in experientia, & iudicandi & dignoscendi consistet ratio. Licet reperiantur medicorum plerique, qui

Quinta Classis.

CCCCC ij

experientia

experientia posthabita, an rubra sit rosa, an bene olens, considerant, negligentes ubi caput ipsis exaestuatur, coronis ex rosa contextis, capitique impolitis, aut succo eius, aut oleo rosaceo, sic vel ipsa experientia id quod res est discere. Nam si exalfiant, magis etiam calida fuerit: sin refrigerentur, frigida, quod perinde est atque refrigerandae humanae naturae facultate pollere: Nam id perpetuo memoria tenere oportet, quod tametsi sexcenties dicere non grauatus sum, tamen multi ne sic quidem id capiunt: atque ignoscendum sane illis est, ut quos sophistae prolixis suis nugis peruerterunt. Et profecto experientiae quidem ratio tam facilis est, cum in rosarum, tum in ceterorum medicamentorum omnium facultate. Nam rosis aut coronari liceat, aut eis corritis hominis aestuantis os ventriculi illinere, aut succum earum expressum ebibere, aut oleo aquae uel mistis aliquam corporis partem confricare. Sed quid haec multis commemoro, cum non nulli mistum opobalsamo rosarum succum sub Canis ardoribus refrigerari causa corporibus inungant, usu uidelicet ipso docti, cum hoc fecerint, abunde refrigerare? At Herodotus medicus praeximia uidelicet sapientia, ne mistum quidem aceto rosaceum, quod proprie Oxyrhodinon vocant, refrigerare nos concesserit. Postea memor illo se uti in principijs morborum phreniticorum: nec ignorans quantam sibi contradicentium turbam inde ciceret (quippe omnibus prope medicis confessum est, adeo ut vel Thellali sequaces, hominis impudentissimi, negare non audeant repellendum refrigerandumque in principijs esse potius, quam calfaciendum aut laxandum) non refrigerare ipsum inquit, sed astringere. Atqui difficile sane illi neutiquam fuisset, si quando aestu nimio affligebatur (nam & homo erat, eisdem obnoxius passionibus, quibus & nos) caput oxyrhodino perfundere, sicque experientia medicamenti effectum cognoscere. Immo facilius puto fuerat refrigeratum eo uti, caput perfundendo, auribusque instillando, ac naribus infundendo, totamque adeo frontem perfricando, quemadmodum amaricino, irino, ceterisque eius generis vnguentis calidis uti assueuimus, cum non mediocriter quidem secundum eum calfaciat oxyrhodinon, ex duobus calidissimis scilicet confectum medicamentis.

Ceterum si Herodotus eo uti ausus non est, equum arbitror, ut qui nunc viuunt, eius in sese periculum faciant, ubi aut algent, aut aestu laborant, velut nos sepe in nobismet ipsis experti sumus, aliorumque complurium aestuantium caput perfudimus. Praestat enim ipsos prius in sese quae proferunt expertos, ita denique ea nobis consulere, ac literis posteritati prodere.

De Rosis, & Quod ex eis conficitur, Rosaceo: tum Chamæmelo, & Lini semine. CAP. 10.

Verum enimvero tametsi contradicere nemini statueram, tamen nescio, quo pacto huc illorum me impudentia adegerit. Rursum itaque redeo ad id quod ab initio proposueram, nempe experientia iudicandas medicamentorum potentias: idque tum in ijs, qui inculpatasaniitate fruuntur, tum illis utendo: tum in ijs, qui quoad fieri licet, quam maxime simplicibus tenentur aegritudinibus, aut calidis aut frigidis, aut humidis aut siccis. Ita enim si iudicaueris, oleum neque calidum, neque frigidum, ut ad hominem temperatum, inuenies: rosaceum vero aliquatenus iam eo frigidius, non autem vehementer frigidum: verum ut ego nominare consueui, in primo ordine seu limite refrigerantium. Nam ut aqua, verbi causa, alia ad vnguem temperata est: alia aut calidior aut frigidior, non adeo tamen ut possis extremè frigidam aut calidam dicere: ita in medicamentis quoque oleum quidem ex media existit temperie: at rosarum succus ex frigidior quidem, sed non ita multo, verum caloris est, ut diximus, tepidi. Eiusdem cum illo ordinis est, quod ad calorem tepidum attinet, Linospermon quod vocant: verum essentiae suae crassitudine non paruo discrimine ab illius natura recedit, cum rosarum succus exquisite tenuis sit essentiae: cui rei indicio est, quod celerrimè areseat, nec quicquam obtineat viscositatis, tum ceterorum vnguentorum odores exoluat. Neque enim alia re efficere id videtur, quam quod odoratus meatus opplere praecipuet: nam cum transire ac penetrare illa cunctantur, ante ipse praecipuat, atque illos implet. Est & Chamæmelum tenuitate quidem rosae persimile, calore vero ad olei vires magis accedens homini tum familiares, tum temperatas. Quapropter lassitudini, ut siquid aliud, cum primis confert, doloresque mitigat: praeterea tensa remittit & laxat: quaeque mediocriter dura sunt emollit, quaeque constipata rarefacit. Ad haec febres quae citra visceris alicuius inflammationem infestant, soluit: ac praesertim quae ex humoribus biliolis, aut cutis densitate proueniunt. Qua de re & ab Aegyptiorum sapientissimis Soli consecratum est, februmque omnium putatur remedium. Verum hac quidem in re a veritate aberrant. Solas enim quas dixi febres sanare potest, easque percoctas: licet sane pulchre etiam reliquas omnes adiuvet, quae melancholicae sunt, aut pituitosae, aut ex visceris inflammatione prognatae. Nam & harum remedium chamæmelum est vel strenuissimum, ubi concoctis adhibetur scilicet: quapropter & hypochondrijs, ut siquid aliud, gratum existit. Quin & tale quoque esse lini semen verus sermo praedicat. Nam & ipsum quoque re vera quae circa hypochondria sunt visceribus gratum est, minus tamen chamæmelo: quippe cum & minus calidum sit, ut est dictum, & praeterea esset nae crassae. Verum rosa illis nequaquam his in rebus propinqua est: tametsi quod ad caloris tepiditatem & essentiae tenuitatem attinet, perquam sane & ipsa inflammationibus in hypochondrijs consistentibus utilis esse possit, nisi adstrictio (quae una quoque illi inest) multifariam laederet: quae maxime ijs obest, in quibus chamæmelum praecellit, nempe condensata corpora rarefaciens, indurata molliens, tensa relaxans: nam ijs omnibus inimica adstrictio est. Attamen ad ascensus augmentaque

τὰ ποσά πλείονα
τε καὶ τὰ ὀλίγια.

A.1.2.1.1. c. 1.
fol. 91. h

Augmētāq; inflammationum, ac potissimū earum quę in exterioribus mēbris extant, chamæmelo rosaceum præfertur: quippe cum hæ tepida caliditate cum leui adstrictione indigeant. In principio enim quę refrigerant atq; adstringunt: Per incrementa verò tepida, & mediocriter confirrigentia: At in vigoribus inflammationum quacūq; tum moderate calfacere laxareq; Per declinationes autem, quę tum calfacere, tum valenter discutere valēt, magis competunt. Ac de istis omnibus fufius in libris de medendi Methodo tractabimus. Nunc ad propositum conuertor.

Quod Pro diuersis corporum Affectibus Aliàs aliter agere sunt nata Tum quæ Mediæ temperaturæ Medicamenta sunt, Tum quæ paulum In alterutram partem declinant.

CAP. 11.

ETenim quæ mediæ sunt temperaturæ, & quæ vtramuis in partem leuiter declinant medicamenta, interim calfacere videbuntur, rursūq; refrigerare: interim verò neq; excalfacere, neque refrigerare, sed sicut corpora acceperūt, ita ea seruare. Nec id illis ab re accidit: siquidem aqua tepida & vrina in balneis quidem frigida, argentibus verò calida nobis apparent. Cum ergo ex eo qd affecta corpora varijs subinde modis disponātur, ipsum quod afficit, variē quoq; agere contingat, liquet ex hoc non rosam, non oleum, non chamæmelum, nō lini semen, sed neq; anethum, neq; farinam aut scenigræci, aut triticeam, neq; alia sexcenta, quæ partim ad amissim mediam temperiem fortiuntur, partim paulum ab ea recedunt, eandem vbiq; æditura esse actionem: quando nec sani eandem omnes temperaturam obtinemus, nec eisdem morbis affligimur ægroti. Iam rosaceum mediam inter oleum & rosarum succum temperiem possidens (illo enim minus est calidum, hoc autem magis) refrigerat quidem exustos, id quæ caliditatis suæ tepore: algētes verò paulum etiam calfacit, qd videlicet is quom effectus caloris sit tepidi: quemadmodum balneæ rigentes quidem excalfaciunt, æstuantē vero frigefaciunt.

Quod ex Aequo & Quod curatur, & Quod curat A medio dissidere debeat, idq; Vtroq; in contraria recedente.

CAP. 12.

QVocirca si aut refrigerantibus medicamentis, aut excalfaciētibus, rosaceum indideris, sicut nec magnopere obfueris, ita nec admodum profueris: nam caliditas tepida nec est sufficiens quæ refrigerata sunt lædere, nec eadem curare potens. Etenim quicquid curari debet, tãquam quod ab immoderatione seu ametria ad commodationem seu symmetriam reducitur, nō id quod bene temperatum sit requirit, verū id quod contrariam habeat intemperaturam. Siquidem, si aquam frigidam temperatam efficere studes, temperatam ei misceri non oportet, sic enim tepidum euadet, quod ex vtrisque commistum erit: sed seruens petenda est, ea quæ frigida miscenda: hæcenus quæ moderata calidior esse debet ea quæ frigidam temperare voles, quatenus videlicet & frigida ipsa symmetram frigiditate exuperat. Nam sicut quæ leuiter tantum symmetra frigidior est, ab ea quæ multo est calidior, mediam non recipiet temperiem: sic nec quæ longè frigidior, ab ea quæ paulo calidior. Verū si quod curationem postulat, multo est frigidius, necesse est, quod ipsum curabit, multo quoque calidius existat: sin paulo frigidius, paulo etiam quod curabit, calidius erit. Vt autem vno verbo exprimam, tãto abesse à medio quod medebitur, quanto ipsum cui medela adhibebitur, oportet, nimirum cum in contrariū vtriusq; vergat excessus. Nam quod eandem in partem cum corpore curando, id quæ æquo tēperamento recessit, id quidem idoneum non est quod alterationem vllam inuehat: quare affectum neq; lædet, neq; iuuabit: Quod autem minus aut plus recessit, alterabit quidem omnino affectum: sed quod plus distat, protinus etiam nocebit: at quod minus est, iuuabit qdem, non tñ persanabit. Ergo si affectio qdem frigida sit, at calor medicamenti tepidus, omnino necesse est affectum iuuet quidem, verū haudquāq; ad naturalem symmetriam reducere poterit: quare nec persanabit. Rursū si affectio quidē sit parua, nempe vt à symmetra naturæ caliditate ad tepiditatem declinet, sit quæ medicamen frigidū, omnino refrigerari affectū, lædē quæ à frigore necesse erit. Eodem quoq; modo si calidior sit moderata temperatura affectus, à similibus ipsius medicamenti in eodē statu seruabitur: lædetur autem à calidioribus: porrò iuuabitur qdem ab ijs quæ se sunt minus calida, non tamen penitus persanabit. Sanè & hic quoq; rursū homonymia in totā extensa vitā, crebro quæ nos fallens occurrit. Etenim quod symmetro temperamento est præditū, id subinde calidū appellamus, sicut balneum quod est eiusmodi, ac poculū: tum id quod ab hoc non multū etiam deficit: ad hæc quoq; & quicquid calidius est. At si exquisita nominū vteremur appellatione, quod symmetrū est, non calidum sed eucratum hoc est temperatū, nūcuparemus: Quod aut ab huius excederet modo, si ad calidius quidem immoderatione sua accederet, tum plus, tū minus calidū: sin ad frigidius, plus minus quæ frigidū. Sic opinor in medicamentis, si exq̄site loqueremur, quiddā vocaremus eucratum exquisite, & mediū, velut oleū: Siquid autē eo esset calidius, calidum, vt scenum græcū: sin frigidius, frigidum, vt rosam. Cæterū huiusmodi noīum abusus causa extitit, qd non omnia corpora ab id genus medicamenti refrigerentur, quale est videlicet rosaceū. Nam cū alia peræque illi frigida sint, alia et frigidiora, illa quidē prorsum ne alterat quidē, hæc verò et calfacit: sanè quæ absurdū videri possit, si cū quid excalfacere fateamur, tamen frigidū vocitemus, ac si quis aquā putealem, quæ hyeme manibus refrigeratis tepida videtur, frigidam appelliter. His ergo occalionibus perturbatus nō minū vsus, rerum quoq; vnā perturbat notitiam. Similiter verò & de sicco & humido, confusis

* casuā noui.
medicamento,
est in aliquo.

ipforum noībus rerum quoq; notitia confusa est. Ac tamen si exile videatur nominum significata probe distinguere, attamen maximum habere momentum & facultatem ad rerū cognitionem deprehenditur. Sed de humido & sicco paulo post dicetur, vbi videlicet omnem de calido & frigido sermonem perfecimus. Nam non multū etiam de eius distinctionibus reliquū esse videtur, vbi videlicet iā semel apparuit nihil miri esse, ab eodem medicamento corpora diuersa, alia quidē exaltescere, alia verò refrigerari, alia autē neutrū omnino perpeti. Etenim in eo quod ad aliqd, facillimum est ad particularia accedentē dicere, q̄ eiusmodi corpori admotum rosaceum, in qua ipsum temperie nātum est, in ea seruire potest: alteri verò illiusmodi applicatū, exalfacere: alij autem, refrigerare: At in vniuersum de facultate eius pronunciare, id verò difficile est, nisi nomina distinguas, atq; de ijs conuenias. Fuerit autem tum distinctio, tū conuentio talis. Quandoquidem corpora humana tum ijs quas ab ortu nātā sunt temperaturis, tum ijs quas ex etate postea acquirūt, tum ijs quæ ex vitæ consuetudine adueniunt, plurimū inter se differunt, ab eisdē ea medicamentis variē alterentur necesse est. Quippe si iuuenem natura calidum, ex vitæ instituto artificij exercen-tem, vetulæ mulierculæ eidemq; natura frigida compares, non minus illum excellere comperies, q̄ si valide calfacientium medicamentorum quippiam cum refrigerantibus componas.

Quod Generales Medicamentorum Facultates, Ad mediam referentes temperiem,

Expendere oporteat.

CAP. 13.

F

Medium ergo horum mihi quempiam intelligas, qui & natura sit eucratus hoc est temperatus, & moribus ac consuetudine conuenienti hanc tueatur eucrasia. Dein tres hosce tanq; temperaturæ scopos animo cōmendes, ac circumspectas, quod in genere calidum est, & frigidum, & siccum, & humidum, cuius ex iplis, temperiei respectu, tale appellare sit melius: non ne ad temperatissimam, quæ vnica est, pariterq; reliquarū media, an ad immoderatas & intemperatas, atq; indefinitas, ac propemodum numero infinitas? Sanē mihi ne conferēda quidem distinctio videtur, neq; vlla prope consideratione indigere, sed homini vel paulum etiam ingenij habenti perspicuum esse, corpus omnibus numeris absolutum, & decorum, simplexq; & vnum velut regulam quandam & scopum propendendum, ac ad ipsum alia omnia dirigenda esse. Esto ergo nobis corpus hoc, medicamentorū facultatis regula: quod que similem illius temperiei caliditatē accendit, vocetur temperatum, etiam si vel maximē exalfacere senem refrigeratum videatur: Quod verò calfacit aut refrigerat corpus eiusmodi, illud quidem calidum, hoc verò vocetur frigidū. Esto autem, quò hæc dilucidius tradantur, ipforum excessuum ordo, ad frigidum quidem primus, cuius esse dicas rosaceum†: secundus, cuius sit ipsa rosa: post hunc tertius, & quartus, quoad sermone ad G frigidissima peruenierimus, nempe cicutam, succum papaueris, mandragoram, hyoscyamum.

†AP& ipsa rosa: secundus, rosæ succus.

Rursum ad calidum, anethum quidem, & fœnūgræcum, primus: Secundus verò deinceps, quicumque videatur secundus, tertius que, & quartus, donec ad exurētia peruentum sit. Ad eundem modū in medicamentis humectantibus ac siccantibus rursus à symmetro exorſi, ordines deinceps ad summa vsq; constituamus, nā huius notitiæ ad medēdi methodū nō paruus est vsus: immo nisi quis hoc pacto definiat, officiet magis legētib; q̄ proderit. Siquidem medici, qui nunc quidē simplicium medicamentorū vires exponunt, præter alia multa quæ delinquant, hoc maxime noxium est cernere, nempe q̄ in calidis, verbī gratia, anethum, & fœnūgræcum, & misy, & calcem, indifferenter numerent: in frigidis rosaceum, mandragoram, & cicutam: tanq; scilicet propinquū sit aut calci fœnūgræcum, aut cicutæ rosaceum, ac non multis mediantium medicamentorū ordinibus diluēcia. Verūm nos pro viribus rem tam immensam tam que operosam in ordinē redigere tētemus, exponamus que quæ viribus propinqua sunt, quæ que longē dissita. Atq; id quidem efficiamus, non probabiles sermones, sed certam ac definitā experientiam pro iudice fumentes, velut & id quoq; superius sæpenumero admonuimus. Enimvero eiusmodi iudicium vt tutissimum quidem erit, ita prolixum quoq; ac plenum laboris, dum propositi finem consequamur: Hec tamen qui hæc relegere volent, hoc vnicum ac solum efformare atq; artificiosos reddere poterit, ac velut oculum quo veritatem agnoscat, præbere. Ergo quæ adhuc reliqua sunt ad totā velut elementarem constitutionem, postquam ea hoc libro confecerimus, In quarto de saporū viribus differemus: quandoquidem & hoc quoq; ita visum amicis est: In quinto autē de omnibus in genere simplicium medicaminū secundis quidem ac compositis facultatibus: Atq; ita ad particularia in ijs, qui dehinc sequentur, libris transibimus.

Quod quæ sensu Simplicia videntur Medicamina, per sepe Compositas obtineant vires,

Immo verò etiam non nunquam Contrarias.

CAP. 14.

Reliquum autem est id, cuius subinde iam antè necessario mentionem quidem fecimus, verū absolute non dum exposuimus. Est autem istud, nempe omnia propemodum medicamenta, licet sensu simplicia appareant, natura tamen esse composita: quā & subinde quoq; aduersissimas in sese continere facultates, nempe excernendi & sistendi, incrassandi & extenuandi, rarefaciendi & condensandi, illinendi atq; abstergendi, contrahendi & laxandi, cæterasq; oppositiones vniuersas: vt in sequenti hunc libro patebit. At mirum hoc videri minimē debet in id genus facultatibus, cum vni & eidem medicamento vim calfaciendi & refrigerandi inesse appareat, aut exiccandi

A exiccandi & humectandi, aut tenuium partium & crassarum: quippe nisi primæ efficacissimeq; virtutes hoc pacto complicarentur, haud sanè quæ ex illis sequuntur, similiter complicate forent. Quin si nos ipsi rhu succum, verbî gratia, melli cōmisceamus, quod ex ambobus mistis confectū est, non modo adstringendi, sed etiam abstergerendi, possidere facultatem concedemus: nec cohibēdi solum ventris, sed & euacuandi. At in lacte duas contineri facultates, nempe excernendi, ac vētrem sistendi, haud iridem cōcedimus, tamen si id perfacile in serum ac caseum segregetur, confesum' que sit omnibus, illud quidem ventrem subducere, hunc verò eundem cohibere.

Quòd & Brassica Duas, easq; Contrarias, in sese facultates obtineat.

CAP. 15.

Quòd verò & brassica duas, easq; contrarias, in sese facultates obtineat, neq; id quidē etiā facile concedimus. Nam si succum eius expressum aut solū, aut cū melle, hauserimus, purgare ipsum cernimus: attamen qm̄ quod reliquum est, edere nequeamus, adstrictoriū esse diffidimus: Sed si totā ipsam concoquas, primamq; eius aquam, in quam succum deposuit, effundas, iterumq; eā alteri aquæ puræ inijcias, rursusq; concocta effundas, succum quidem purgare offendes, brassicam verò ipsam vētrem adstringere: multoq; magis si non bis duntaxat, sed ter aut quater aquam effuderis, nam quantò exquisitius in aquā succum suū deposuerit, tanto & illi quidem maiorem purgandi vim adijciet, & reliquam suā substantiam, quæ velut oleris ipsius caro est, restringentē efficiet. Eadem est ratio in beta, atq; adeo in omnibus fermē, quibus sapor aut acris, aut nitrosus, aut salus inest. Quippe & lenticula ipsa, tamen si satis magnā adstringendi potentiam gustu referat, tñ eiusmodi quid sortita est: nā & huius decoctū, ventris soluendi vim obtinet. Verum hic succus etiā, si degustes, perspicuam misturam repræsentat, tãquam si nitroso austerum quid cōmisceas. Sed & conchularū maris, cæterorumq; ferè ostreorum succus planè tum falsus est, tū ventrem soluendi vim obtinet, quāvis eorū caro ventrem reprimat. Verum quod dico deprehendes, si ea quoq; quo modo brassicam censuimus, preparare non graueris. Nā & gallorū veterum ius ventrem ducit, tamen si caro eundem sistere potest. In æris autē squama sicut duplex qualitas, ita gemina quoque facultas inest, nam & adstringit & mordicat: quare adstrictione quidem siccitas vlcera tarū carnū cicatrice obducit, mordicatione verò præhumidas colliquat. Quòd si intrò in corpus sumatur, purgat quidem ventrem, verum non cohibet: vincitur enim ea adstringendi facultas ab acri purgatoria que potentia, Tanq; si rhu succum scammonæ commisceas, nā quod ex ambobus mistum erit, soluet ventrem, haud sistet, licet gustu austeritas exuperet. Sic autem non pauca purgantium medicamentorum cum carne mali cydonij exhibita, gustu quidem fallunt, at effectū solo quid valeant cōmonstrant. Dantur verò quædā cū palmulæ carne, alia aut cū myrtis, alia cū mastiche chia, aut alio quopiā eorū quæ tū grata sunt stomacho, tū adstringunt, quò scilicet gustū fallant, simul que stomachū minus euertant. Verum tamen ea quæ gustu percipitur qualitate, purgantia ab adstringentibus vincantur, alia tamen facultate ipsa vincunt: per se enim lingua à materiæ victa est copia, cæterum actio pro facultatis viribus ac robore perficitur. Itaq; cum substantia exigua quidem, sed validis prædita viribus, mista alteri substantiæ plurimæ, eidem que imbecillæ, in corpus intrò p̄uenit, gustum quidem fallit, attamen effectum q; illa efficaciorē exhibet. Sanè permultos huius rei admiratio detinet, rem que rationis expertē absurdam que existimant, si corpus quodpiā adstringens purgare queat, velut aloë, & æris squama, atq; æs vsum: nam contrariū potius oportebat, nempe ventrem reprimere, haudquaquā ciere. Cæterum q; malū, verbî causa, cui indita est scāmonca, adstringens purget, nemo miratur: tamen hinc orlis facilius erat & in aloë mistā inesse facultatem colligere. Ac si quod ex ea purgat, ab eo quod non purgat, segregari posset, sicuti in lacte facimus & brassica alijs que permultis, non etiā admiratione afficeret: quanquā id sanè quodammodo præstari queat. Nam si aloë accuratè lauetur, aut debiliter aut planè nihil ventrē subducit. Idem vsu venit æris squamæ, erī que vsto: quippe q̄ nos diligenter elota obscurā modò purgandi vim retinuisse sumus experti. Quinimmo ipsius quoq; qualitatis medicaminosus sapor primo statim gustu facultatis mitionē demonstrat. Nam si vnica semper qualitas vnicuiq; gustu adstringentium medicaminū inesset, haud sanè inter ipsa alia cui apta, alia medicaminosa forent, sed tantū in plus ac minus adstringendo differrent. At nō ita se res habet. Nam hæc quidem adstrictio mitis ac suavis apparet, alia ingrata, & medicamentosa: velut pyri quidem, mali, & mali punici, suavis: squamæ verò æris, & aloës, ingrata, atq; medicamentosa, tamen si malo cydoneo eris squama minus adstringat. Quam ob rem nec adstrictionis vehementia eā qualitatis absurditatem inuehit: quando innumera propè alia eorū quæ edendo sunt, aloë, æris squama, & ipso etiā ere vsto, plus adstringant. Atq; in hisce utiq; substantiæ mistura clarè perspicitur. At in alijs etiam si non appareat, tamen eā ratione colligere oportet, ac non putare aliud in aloë adstrictionem moliri, aliud in malo: vnum enim in omnibus efficere pro sua natura non adstrictionem modo, sed & aliarum qualitatum vnamquamq;, rationi consentaneum est. Cæterum quia nullum omnino ab alijs qualitibus syncerū reperitur, idcirco diuersi effectus ab alijs atque alijs adstringentium ædi conspiciuntur. Nam aliud est effectus mespili, aliud æris, aliud aloës, aliud mororum, exēpli gratia, aut gallæ, aut corticis mali granati, aut aluminis, aut rhu: præstitisset que forsitan, qui de adstringentium medicaminum viribus pronunciare sunt ausi, in genere de ipsa

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

potius adstrictione, haudquaquā de adstringentibus dixisse. Nam quod adstringit, non adstringit modo, sed & præter adstrictionem acre est, aut pingue, aut dulce, aut amarum, aut salsum, aut acidum: at adstrictio vnum id solum perpetuo est quod est, vti & salitas, & dulcor, & aliarum qualitatū vna quaelibet. Quod si vt adstrictio vna, ita adstringens vnum esset, sanē vnum quoque perenniter eius esset opus. Verum cum præter adstrictionem insuper alias qualitates recipiat nō paucas, semper quidem omnibus illis aget, sed euidentius aliās per aliam, nempe vincentem: id quod vt ad corporis scilicet, cui admotum est, affectionem: quippe cum & lac, & lens, et brassica, horum interim citare aluum, illorum verò sistere cernantur. Et causam quidem quamobrem non perpetuo euidenter agat in corpore vnoquoque; vnica duntaxat qualitas, visque medicamenti, eam quidem iam mox in sequenti sermone edisseram: In præsentia verò id quod res habet, commemorare solummodo proposui, ne quis plerisque medicamentis contrarias tum qualitates, tum facultates inesse diffidat. Sed & id quoque multam considerationem & distinctiones non paucas requirit, tametsi omnibus perfacile videatur, contrarias inuicem & qualitates & facultates inuenire. Ergo citra controuersiam omnes propemodum adstringens contrarium ei, quod purgat, esse statuunt. Verū neque illud huic contrarium est, quod nos procedente sermone declarabimus. At in præsentia ex superabundanti illud quoque monstrauimus, etiam si ea quis esse contraria ponat, nihil inde sequi absurdum: cum fieri possit, vt in vnam substantiam conueniant vel maxime contrariarum tum qualitates, tum facultates: quippe cum supra ostenderimus, in succis aliud esse quod grauissimum est, aliud quod leuissimum, aliud tertium toti succo permixtum. Nec miri quicquam est, si & in rosæ succo aliud quidem est grauissimum, amurcæ & faci proportionale: aliud leuissimum, & ipsum proportionem respondens floribus in quoque succo supernatantibus: aliud tertium, quale est quod in musto feruet: ad hæc quartum, ipsum videlicet purissimum ac syncerissimum, cuius hæc tria excrementa existunt. Euenit autem alios quidem succos & acescere, & corruptos putrescere: sola verò oleū, mel, & vinum, in longum temporis spatium perdurant. Itaque neque per ebullitionem, neque per secretionem, in alijs succis has excrementorum differentias inuenire perspicuo licet: verum protinus ab initio coctione quadam illis est opus, aut saltem alicuius perdurantis succi mixtura: Nam sic rosæ succum melli miscentes, aut oleo incoquentes, aut totas ei immergentes, reponimus. Caterum quod & in his quoque probabile sit quatuor illa inesse genera, proprium ipsius succi videlicet, & tria excrementa, intellectu clarum est, ac potissimum quia qualitas earum nō simplex est, immo adstrictionem quoque quandam obtinere, si rosam dentibus mandere voles, videtur. Habet autem & dulcedinem, & amaritudinem, qualisque mordicationem quadam leuem. Verum satis erat, etiam si horum nihil gustantibus deprehendi posset, tamen ex eo quod non extreme adstringat, aliorum quoque saporum mixturam intelligere. Etenim si solus sit austerus, summus itidem fuerit: at si non summus, sequitur quod neque etiam solus. Quā enim proposui adstrictionis generationem, eam si solā citra alias inesse cogites, summa hæc sit necesse est: quo modo si sola corpori cuiuspiā caliditas summē inesset, id ignis vtiq; foret: Nam contrariorum mixturæ, summitates ipsas frangunt.

Quam ob rem Lingua, Tangentibus ipsam Dissimilaribus corporibus, ac per diuersas eius partes simul agentibus, Non quam in omnes illa partes inferunt, percipit affectionem, Sed ea, ex parte primo affecta in totam ipsius diffunditur substantiam. CAP. 16.

ATque in similaribus quidem corporibus calor, frigiditas, siccitas, humiditas, particulares differentias efficiunt: in dissimilaribus verò, acrimoniæ, aciditates, austeritates, acerbitates, dulcedines, amaritates, salitates, aquositates, & vinctuolitates. Itaque vnaqueque similarium in ipsis partium nō multas, sed vnam qualitatem obtinet: quod vero totum est dissimulare, complures. Nam si mille, exempli gratia, hoc in cyatho huius succi corpora contineantur similaria, fieri potest, vt centum adstringant, sexaginta mordicent, sexcenta sint dulcia, ducēta amara, quadraginta salsa, sicque mutua mixtione omnia temperata, vt partem nullam accipere sit quantumuis paruum, quæ non sit H omniū particeps, vt in lingue contactu omnes quidem agant, diuersa tamen vnaqueque eius parte, nempe cui ipsam appropinquare contigerit: ipsa verò affectio, ex eo quod primo affectum est, in totā eam diffundatur: veluti si in frigore ingenti digitum in aquam gelidam repente immittas, tota interim manu horrebis, sæpenumero verò & corpore toto. Nam velox est ex eo, quod primo affectum est in corporibus sensilibus, in totū animal diffusio, vt videlicet cum calfacto vnā cōcalescat: refrigerato, simul refrigescat: siccato, pariter siccescat: humectato, cohumescat: atque adeo frequenter etiam contraria vno tempore perpetiatur. Quod autē id facilius quod dicitur intelligas, alteri etiam exēplo adhibere animū præstiterit. Vidisti opinor quāque coniecto in aquam quietam lapide, ex hoc quidem moueri aquam incipientem, in orbem autem motum extendentem, tanquam cētrum sit id quod percussit. Cum ergo vno tempore in diuersas placidæ tranquillæque aquæ partes duo lapides coniecti duos effecerint circulos, qui per sese inuicem ferantur, contrarios conspicias in quauis aquæ particula motus. Quæ res viris etiam naturæ studiosis dubitationem non paruum attulit, num alię partes ab vtroque motuum, an eadem ab vtroque, mouerentur: nam quod circulus circulum non sistat, nec vltra prorsumque ferri prohibeat, id manifestissime cernitur. Id ipsum item fieri mihi intellige, cum eodem tempore pedes quidem in calidam, manus verò in frigidam indideris:

A.L. 2. t. 1. c. 1.
fol. 91. c

† hanc excrementorum ideā.

Aindideris: in totum enim corpus vtriusq; affectionis motus peruatit, subcontrarijꝫ inuicem occurrunt: referatq; forsā nihil, ēt si contraria non incedant semita, sed vnus ab vno, alter ab altero pede, proficiscatur. Tunc enim nec nihil pati corpus, nec ab altero duntaxat dicere queas: nam & manifesto patitur, & ab ambobus patitur, incallescens, ac frigescēs. Quod vtiq; & in febribus lypem riijs & hepialis euenire autumo, extra q̄ q̄ in illis non extrinsecus, sed ex ipso corpore, caliditatis frigiditatisq; affectus exoritur. Quod si quis dicta allequi nequeat, certē ex eo quod iam dicitur, facillime periculum facere possit: etenim non longē ab ijs quæ inquirimus abest, sed ex linguæ affectuum numero existit. Nam si parem ablin: hī portionem mellis exquisitē commistam, linguæ imponas, γλυκύπικρον (quemadmodum poetæ amorē cognominant) hoc est ex amaro dulce, quod ex ambobus mistum fuerit, videbitur: nimirum cū haud alio tempore mellis saporem lingua sentiat, alio verò absynthij, neq; alterum solum, verim perpetuo ex vtriusq; insolentem quandam mixturem permistam. Tale quid euenit cū in vnum succum coierint austera & nitrosa facultas, siue id natura miscuerit, siue à medico fuerit compositum. Nam eodem tempore lingua vtriusq; succi qualitatem percipit: ac si percipit, nimirum & afficitur, idq; pro familiaribus illorum viribus. Necesse quæ est quanq; aliarum corporis partium similiter affici, etiam si qualitates ipsas nō sentiat:

B neq; enim in patiēdo aut non patiēdo, ab alijs linguam differre putandum, verum eo q̄ ipsam nihil familiarium affectuum ob exquisitam sentiēdi facultatem latere possit. Quod si ad id non nihil faciat ipsius raritas: quippē succi facilius in profundum penetrantes, atque in molliculas partes actionem exerentes, tum validam quidem affectionem, tum verò sensum eius imprimunt euidētiore: veruntamen maior vis in sensu accurato potius q̄ in affectionis robore consistit: cū affectionis robur nihilo secius & in exulceratis partibus fiat, sed quia exacta sentiēdi vi carent, idcirco succorum qualitates non percipiunt. Liceat verò cū in illis, tum etiam ante illas, non dum videlicet cute exulcerata, mistam ex contrarijs facultatibus actionem simul in corpore fieri, colligere. Etenim si parti inflammatae solani succū imponas, densari eam constipari que & cohiberi transpiratus conspicies. Itaq; si plusculo id ipsum tempore facias, non rubram seruabis particulam, sed aut liuidam aut atram efficies: id quod assidue in erysipelatis à medicis plerisq; fieri videre est: nā & ea tempore dura atra que, immodice refrigerando efficiunt. Quod si ergo nō solanū, sed anthemida hoc est chamæmelum, parti inflammatae imposueris, eam prorsum cōtra affici videbis: quippe quæ rara, fusca, mollis, laxa que euadet, {cū non dū cutis exulcerata fuerit:} multū que illius superfluitatis, quæ sub ipsa continet, trāspirabit: nec liuida amplius atra ve erit, etiam si vel plurimis

C deinceps diebus chamæmelo vtaris. Fundere enim hoc ac digerere per halitum potest, haud quāq; contrahere, condensare ve, aut transpiratus prohibere. Quod ergo solano, chamæmelū contrariū sit, illinc liquet: quod vero etiam si vtranq; commisceas, euidenter tñ vtriusq; vires perspicias, ego sanē expertus edisseram: quanq; te quoq; malim ipsa re experiunda euentū cognoscere, q̄ narranti mihi fidē habere: id quod, scio, efficiet quisquis veritatis amore tenetur. Oportet verò vt in re iam patenti orationem absoluerē. Si enim simul impositis solano & anthemide, neq; ita densa, dura, tensa, liuida que reddat, atq; si solo vsus solano esses: neq; adeo rara, mollis, laxa, rubens que, ac si chamæmelo solo vsus fores, sed dictorum mediam accipere affectionem particula cōspiciatur: cōsentaneum est vtrunq; medicamentum secundū suam operatum esse facultatem. Nam si neutrum quicquam egisset, sed quieuisset vtrunq; quam ab initio affectionem particula habebat, eam haud dubie seruasset, non secus ac si omnino nihil impositum foret: Sin autē alterum quidem eorū operatum fuisset, alterum verò penitus deuietum, non mediam affectionem, sed extremarum alteram, perpeffa particula esset. At si vtrunq; agit, ea que contraria facultatibus fuere, contraria vtiq; eodē tempore corpus perpeffum est: nec enim partitis inter se agendi viribus operabantur, tanquam si vtriusq; exempli causa totum diem impositis, sex horis prioribus medicamentorum alterum, reli-

D quis verò sex alterum suo vicissim munere fungeretur: nugax enim hæc est hypothesis, nec solum demonstratione, sed probabilitate quoq; omni destituta. Quanq; profectio nec ita quidem fundi contrahi que subiectam contingit substantiam, velut in ijs qui in balneis lauant, postea que ingreditur frigidam: sed potius ita, vt si lauant frigidam aquam adspargas: sic enim nō diuersis temporibus, sed eodem contraria perpetietur. Igitur quemadmodum in medicamentis compositis mirum non est, si contrarij simul affectus corporibus infligantur, ita neq; in simplicibus, cū & ipsa sensu quidem omni atq; cognitione simplicia appareant, verum natura sint composita. Quin etiā quemadmodum in ijs, quæ nos componimus ac cōmiscemus, interim, si ita visum est, plus adstringentis succi indimus: interim plus dulcis, aut amari, aut salsi, aut acris, aut alterius cuiuspiam cōtrariorum: non nunq; verò vtriusq; partibus paribus: Ita quoq; naturam in arboribus, fruticibus, animalibus, & in ipsa quoq; terra, contrarios temperare succos paribus aut portionibus, aut viribus, alienum non est: potest etiam qñq; alterum vincentem efficere. Itaque actiones eorum in misturis paribus similes euadēt, in imparibus autē diuersæ. Ne quis ergo putet (quod & supra monuimus) nihil referre, adstringētē succū dicas, an adstrictiōnē: nā adstrictiō vna res simplex intelligit, adstringens verò duplex: licet & calfaciēs partim simplex & summū, vt ignis: partim per exuperantiam caloris, vt sanguis. Sic adstringens quoque aliud summum est, vt exempli causa, alumen,

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

& melantheria, siue atramentum futorium, & galla, & rhus: Aliud quia adstrictionis cuiusdam est **E** particeps, velut pyrum, vinum, malum, rosa: nam minimum omnino est in rosa quod adstringit, multis numeris eo, quod non est eiusmodi, superante. Quapropter non ab re exigui quoque adstrictionis effectus sunt, tanti scilicet, dum à relaxandi facultate quæ rosæ inest, corporum illi admotum robur non exoluatur. Itaque mirandum non est medelam esse eam inflammationum, ac potissimum dum incrementum adhuc atque augentur, plusque etiam dum incipiunt.

Quod Rosaceum, utpote olei rosæque mediam ad vnguenti naturam obtinens, Inflammationum optimum In augmento Remedium sit.

CAP. 17.

Rosaceum verò (utpote cuius natura olei rosæque in medio est) in inflammationum augmentis optimum est remedium. At oleum commodum est, ubi inflammationes maxime vigent: id quod experientia docet: causam autem nos in tractationibus de medendi ratione exponemus. Porro rosaceum, ut quod in medio eorum ex quibus confectum est consistit, utique et in medio tempore utilitatem ostendit. Nam per initia repellere comprimereque influxus oportet: in vigore autem ita per halitum digerere, ut morsus ablit: at in incrementis repellere simul ac digerere. Id quod si quis nudum, citraque iam dictas ratiocinationes audiat, fortassis fidem non habebit: nunc autem mirer, si quis adeo sit stupidus, ut rationi non dum acquiescat. Etenim indicationes in inflammationum incrementis contrarias esse necesse est: nam semel unoque impetu ab adstringentibus contrahentibusque substantiam ad laxantia fundentiaque transire plane absurdum est: Sicuti sane æquum est in intermedio principij statusque spatio, dum videlicet morbi adhuc incrementum, nec plane repellere sicut in principijs, nec itidem digerere sicut in vigoribus: sed perinde ut morbi conditio media est inter contraria, ita medicinam quoque mediam esse oportet, quæ videlicet non ut in principijs adstringat, nec ut in vigoribus, digerat. Atqui medium omnem ex contrariis mistum est, ijsque totis per tota temperatis, aut per exiguas particulas sensum effugientes eorum, quibus apponunt. Porro, hoc an illo modo rosaceum mistum esse velis, mea quidem certe nihil refert: nam utroque modo propositum demonstrari potest. Satis autem certò scio, si ratiocinationes omnes, tum quas Theophrastus memorie prodidit, tum quas nos toto hoc tractatu complectimur, multum animo versaueris, te secundum missionis modum reperturum. Quin & in profundum penetrare, & corpora arentia magis quam oleum humectare, rosaceum potest: arbitror quæ subinde rosaceo te prædela coriaccas tunicas teri vidisse: quoniam neque oleum, neque hydrelaum, quod ex aqua & oleo mistis constat, eam probe mollire ac madefacere possit, quia videlicet crassiorum sunt partium, quæ ut penitus imbibere ac penetrare queant: rosaceo verò præter cætera quæ potest, paucula quadam inest adstrictio, haud parum huic rei conferens. Nam quæ magnopere austera acerbæque sunt, primo statim contactu superficiem condensantia, humorem ingredi imbibereque prohibent: at quæ paulum quidem adstringunt, cæterum plurimum in se continent essentia tum tenuis, tum tepida, tum abest ut præ adstrictione ingredi altius corpora admotum prohibeantur, ut est ab ea, magis si impellente, iuuentur. Quæ autem penitus tenuia calidæque sunt, magis digerunt discutuntque humores ex corporibus quibus admouentur, quam alios ipsa apponant. Porro quæ frigida sunt & crassioris essentia, omnino nullum introducere humorem queunt. In quibus verò humiditas inest tenuis pariter & tepida, hæc per essentia quidem tenuitatem & tepiditatem promptè mobilia, corporum quæ contingunt, meatum subire nihil prohibet. Quod verò non admodum calfaciunt, ex eo liquet, quod existentem in illis humiditatem non digerant. Si verò præter quæ quæ sint eiusmodi, insuper exigua adstrictionem possideant, quæ tenues particulas meatum iam ingressas in profundum propellere valeat, ipsamque extrinsecus superficiem quadantenus constringere ac condensare, ea inter omnia humectantia efficacissime humectant. Adstrictionis enim {maioris} natura est, ut meatum occludere præoccupans, vicinamque substantiam ad se contrahens, constipansque, ijs quæ humectare valent, impedimento existat. At quæ adeo infirma est, ut in rosaceo, quæ vincatur ipsa potius quam vincat, tenues calidasque rosacei particulas præuerrere quidem nequit, sed ubi illæ altius penetrauerint, hinc in ipsam iam tum superficiem agere incipit, pro viribus constipando, contrahendo, ac condensando. Ex quo necessario sequitur, ut quæ ingredi meatum antea uerterint exigua corpuscula, intro propellantur, ac meatibus præclusis foras regredi inhibeantur.

Quod quæ Frigiditate interimunt, Deleterijs, ex Mutationis celeritate uti corrumpant, euenit: ac proinde Alienam requirant Caliditatem, quæ Velut manu in totum deducat corpus.

CAP. 18.

Sane ad opera eiusmodi non mediocriter confert innata corporibus nostris caliditas, quippe quæ intro ad sese attrahat, & comminuendo extenuet. Hinc est quod & quæ natura frigida sunt medicamenta, nempe quæ deleteria nuncupantur, ut puta cicuta, papauer, hyoscyami semen, mandragora, & quæ eius sunt generis, citius magisque in calidis naturis vim suam exerant: Cuius & tu, tametsi unum ex ambiguum difficultium quæ problematum numero habitum id fuerit, haud difficulter, modo non segniter ijs quæ dicimus aduerteris animum, solutionem inueneris. Etenim cum sit impossibile ut talia interficiant, nisi prius cor refrigerent, sanè intro comminuta extenuataque ingrediantur necesse est: Id quod ex sua natura præstare nequeunt: quippe quæ crassarum sunt partium, nec facile moueri possunt: nec ut minutim concidant, prorsumque ferantur, ex sua natura obtinent: verum adscititiâ caliditate requirunt, quæ in minuta secet, extenuet, atque comminuat, quæque velut manu

A manu ducat, atq; in subtiles partium omnium meatus deducat. Itaq; si qñ ea ablit, cunctantur tardantq; in maioribus meatibus harentia, & venis atq; arterijs velut innatantia: ac temporis spatio interim per longos errores ac multas iactationes ab humoribus quæ in eis sunt, vicissim non nihil perpetuuntur. Oñs enim iam sæpenumero, in sese mutuo qualitates omnes quadantenus agere: nam & lapis ab assiduo aquæ stillicidio excauatur: gladiusq; ceram secando hebetatur. Monstratum etiam est actiones à solidis animantium partibus perfici: quare cum hæc nō dum à refrigerantibus medicamentis refrixerint, animans superlit necesse est. Porro refrigerari nequeunt prius, q̃ illa in proprios istarum meatus subierint: atqui ex sua id natura crassioribus frigidis que medicamentis datum non est, nisi succurrat quod velut deducat. Deducit porro, vt causa primaria, arteriarum attractio, ostendimus enim ipsas inter dilatandum vicinum omne attrahere: vt secundaria verò & materialis, essentia tenuitas: quam cum ex natura sua non obtineant frigida crassiorumq; partium medicamenta, ijs vtiq; opus habent quæ præbeant. Corpora itaq; quæcunque temperaturæ sunt frigidiore, ea arteriarum tractum imbecilliore possident (id quod etiam demonstratum est) atque in minutas particulas medicamentorum substantiam redigere nequeunt.

Proinde medicamentum et ipsum cunctando tardandoq; temporis spatio aliquid perpetiatur par est. Itaq; interim accidit vt concoquatur, velut lactucæ succus: nam & is tempore concoquitur: at si integer ad cor pergere properaret, non secus atq; cicuta hominem interficeret. Euenit autem id ipsum alijs quoq; omnibus admodum refrigerantibus succis: nam nisi celeriter interimere possint, sanè ex hoc omnino nullius effectus redduntur. At quæ aut erosione aut putredine enecant, ijs vt tempore inualescant accidit: liquidem temporis spatio putrescunt omnia, idq; magis in humido calidoq; loco. Merito ergo fit, vt quæ frigore suo noxam inferunt, ijs actionis celeritas ad perniciem proficiat: quippe quæ alioqui spatio excalfacta, vim per quam agebant, deperdant: At quibus actio consistit in putredine, ijs tempus actionem adauget, qm̃ s. & putredinem. Nec enim animal vllum interire potest, quin cor ab agendi munere cesset: fieri porro vt cesset nequit citra maximam intemperiem, liquidem non simpliciter q̃ par est aut calidius, aut frigidius, moueri desinet: eodem modo, si modice siccum aut humidum euadat. Minus enim suo fungetur ob hæc quidem intemperies munere: cæterum motu non vacabit prius q̃ immensam aut caliditatem, aut frigiditatem, aut reliquarum qualitatum aliquam acceperit. Porro medicamentis quæ frigore occidunt, vbi ad cor pergere cunctantur, simile quid accidit, quod lignis humidis viridibus frequenter euenit. Hæc liquidem si multa aceruatim in ignem conijciantur, eū celerrimè extinguunt: sin vndiquaq;

Cin orbe composita prius siccentur, ac incallescant, & deinde sensim inijciantur, tantum abest vt extinguant, vt etiam alimento illi efficiantur. Sic hominem quidem cicuta necat tum ob meatuum amplitudinem, calorisq; multitudinem, tum ob attractionis arteriarum robur validum etiamnum ad cor pertingens: Sturnos verò ob causas contrarias haud enecat, vt puta cū & retineatur & cunctetur, ac sese temporis tractu concoqui præparariq; à corde tanq̃ à foco incallescens sinat, nō secus ac ligna extrinsecus. Quare nec id quidem mirum dubiumq; relinquitur, sed est quale lactucis accidit, quippe quæ moderato esu hominē nutrant: At si quispiam expressum earum succum largiter hauserit, nō secus profectò morietur, q̃ qui aut cicutam, aut papauer sumpsit. Sicuti ergo lactuca si cor refrigerauerit, interimat: sin concoquatur, alimentum animali efficitur: Ad eundē, arbitror, modum cicuta hominem quidem celeritate distributionis interficit, sturnos verò tarditate ipsa nutrit. Si verò exiguum quiddam sumat, mortē homini nequaquā inferet. Id quod anas Atheniensis experimento docuit, cuius apud oēs percelebris memoria est. Etenim ea à minima cicutæ portione auspicata, nullo detrimento ad permagnam progressa est copiam: principio enim paucū exiguitate ipsa deuictum est, at consuetudo naturale reddidit. Nec enim nūc locus est, vt cur plurimum possit cōsuetudo, curq; velut altera ac adscititia natura sit, vti à veteribus proditum est. causam reddam: nam ita maius euaderet operis accessorium, q̃ ipsum opus: vt omittam quod separatim de hoc tractauimus: Verū connectendus est perficiendusq; præsens sermo.

Quod Medicamentorum quæ Frigiditate sua interimunt, Nullum prorsus Genere Lethale sit, ac deleterium, sed sola Quantitate.

CAP. 19.

eorum ergo medicaminum quæ frigore interimunt, nullum genere lethale est, sed sola quantitate: At in erodentibus, putrefaciētib; atq; excalfaciētib; haud ita se res habet: sed de his paulo post dicetur. Quæcunq; autem frigiditate occidunt, ea exigua quantitate sumpta mortem non adferunt, non magis q̃ si copiosæ flammæ paucillum aquæ instillet, aut lignum inijcias humidum ac viride. Quemadmodum itaq; nisi calorem habeant abundantem, qui tum comminuat, tū ad cor vsq; perducatur, interficere non poterunt: sic si quod comminuit ac deducit, multo valentius fuerit, prorsum deuincet, mutabit que, ac alimento vt tibi sit medicamentum, efficiet.

Quod Medicamenta quæ natura sunt Frigida, Iure à Veteribus Potestate frigida appellantur.

CAP. 20.

Quam ob rem eius quoque nunc protinus meminisse oportet, veteres medicamenta natura frigida, potestate dixisse frigida: nam ea quoq; quadantenus refrigerandi potentiam à nobis accipiunt, sicut excalfaciendi calida. Quod si alio modo illa, alio verò ista, nihil vtiq; refert: generale enim idem commune que vtrisque est, nempe alterationis principium ex paulo corpore

corpore in acturum medicamentum procedens. Nam quæ potestate quidem sunt calida, alteran- E
tur eo duntaxat, q̄ incallescāt à nobis: at quæ natura frigida, tum q̄ comminuantur, tum q̄ adscititiū
accipiant motum. Cū itaq; iplis tanquam frigidis agere absque corporis patientis auxilio non
licet, iure potestate frigida dicuntur: nam vt actū nos refrigerent, non prorsū ex sese obtinēt, ve-
rum à nobis prius perpetiantur vt refrigerent oportet: etenim in minuta conteri, & aduentitiū
motum accipere, altēctus sunt medicaminum. Attamē sicui libeat ea actū frigida nominare, haud
equidem repugnem, modo omnis in verbo dissensio sit, res aut vtrisq; confessa: siquidem (quod
paulo supra monuimus) id genus omnia calidum corpus quo agere possint postulāt. Eapropter
meconium hoc est succus papaueris, & cicuta, si vino mista bibantur, ocys necant, licet non quo-
uis temperata modo. Si enim ipsa paucissima plurimo vino misceātur, prorsū deuinci possint:
si verò pauculo multa, deducuntur quidem ad cor, vinci autem nequeunt. Siquis verò papaueris
succum, quantus interficere potest, hauserit, ac etiamnum tñ superlit, recta ratione & hunc quoq;
sanabit largē epotum vinum vetus, magisq; etiam si generosum fuerit, nam id quoq; magis calefa-
cit. Quod verò cor non dum admodum refrixerit, liquet, qñ quidem adhuc homo viuit. Tum autē
digestionis in corpus tarditate quadantenus mutatum iam a corpore esse medicamentum, sicuti li-
gnum viride vbi proximē ignem aliquandiu iacuerit, nec id quidem obscurum est. Calidū itaq; F
id temporis vinum ebibitum præsentiūsimum est remedium: nosq; etiam quendā extremē iam re-
frigeratum vini lesbij potione seruauimus. Potestq; idem salernum, surrentinum, ariusium, tmoli-
tes austerum: ac quotquot calida simul exquilita vinosa fuerint vina, eundem cum lesbio præstare
valent effectum. In summa quod tenui perlucidāq; substantia est, colore vērmiculo aut flauo, odo-
re gratum, quodq; dum temperatur, plurimam aquam exposcit, id tum admodum exalfacere est
natum, tum facile vndiq; per corpus vniuersum deferri. Tale ergo natura vinum, ætate vetus, me-
racius temperatum, eos etiā qui refrigerati iam sunt persanat, nec solum à papaueris succo, aut alio
quopiam refrigeratiū medicaminum, verum etiam qui in morbis aut ex stomachi, aut ex cordis
aliēcti, syncopam patiuntur. At quod cum refrigerantibus medicamentis, quò celeriore mortē
afferant bibitur, id nec multum est, nec generosum, sed quod comminuere ea, ac distributionis sui
impetu in cor perducere modò valeat. Atq; de his quidem hæc sufficiant.

De Actione Medicamentorum, quæ Putrefactione & Erosione nos necant.

CAP. 21.

Quoniam autem de ijs etiam medicamentis, quæ erosione ac putredine interimere sunt nata, dictum me, q̃ tempore perniciosiora reddantur, et ipso genere naturam nostram corrumpere possint, non vt refrigerantia duntaxat multitudine, sum pollicitus, tempus nũc est G promissis satisfacere. Coniuncta est enim quadantenus quæ de his habetur oratio, ijs quæ de medicamentis potestate calidis dicuntur: verisimile siquidem est pleraq; eorum etiam actu esse calida, sed iccirco nos fugere, quoniam aut ipsi plurimum habeamus caloris, aut crassa eorum essentia sit.

Redigamus enim eadem rursum in memoriam, nempe q̄ in balneo frigida videatur vrina: itidemq̄ memoria repetamus, q̄ cum in folium calidum descendere non valeremus, aliud prius minus calidum ingressi, nullo negotio quod antea intolerandum videbatur, postea pertulerimus. Quin & aqua fontium tempore hyberno quibus manus algent, tepida apparet, cū alijs minimē videatur eiusmodi. In summa enim (id quod antea quoq̄ diximus) pro suo vnumquodq̄ affectu corpora admota sentire consuevit. Sic ergo si manum habens frigidam, eam in tritici acervum immiseris, luculenter calorem percipies: si in calidam, nequaquam. At si stercore columbino accumulato, potissimum sylvestrium columbarum, manū inferas, etiam si calidam, manifestam tamen senties caliditatem. Sic misy, sory, chalcitis, ærugo, calx, aliāq̄ id genus innumera, si illis acervatis manum altius injicias, protinus videbuntur esse calida. Caterum si bolum ex eis vnam acceperis, cuius extrinseca superficies ab ambiente extrinsecus aere sit refrigerata, merito nullum percipies calorem, quippe qui refrigeratas tantum eius partes contingas, idq̄ antequam in minutas redactæ sint. Ad eundem modum hyeme sæpenumero tum putealis, tum magis fontalis, calida tangētibz est visa: verū si quis calfactis prius manibus contigerit, frigida videbitur. Memorariq̄ sanē possint alia id genus infinita, quibus facile adduci quiuis possit, vt credat medicamētā potestate vt ad nos calida, alteri animantium generi actū esse calida.

Quòd recte quæ Erodendo Putrefaciendoq; interimunt Medicamenta, Genere, non qualitate Deleteria sunt dicta: Et quòd Quanto in corpore morantur diutius, Tanto & magis agere sunt nata. CAP. 22.

Atque hæc quidem obiter dicta sunt. Cæterum quæ nos contactu, aut per putredinem, aut per erosionem, interficiunt (nam de his habebatur oratio) ea rectè quidem ratione humana naturæ deleteria toto genere existimata sunt, non vt frigefacientia, duntaxat quantitate: Hæc enim interdum vincuntur, & nutrimentum animali redduntur: putrefacientia autem etiam si quantitate minima sumantur, omnino tamen corrumpunt, quia videlicet quæ putredini obnoxia sunt, calore humiditateq; putrescere solent: atqui calidus humidusq; sanguis est. Itaque putrescere nunquam cessare possunt, simulq; vicissim putrefacere, quæ σηπιδωνωδη à putrefactione vocantur medicamina. Proinde longo etiam post tempore à quo sumpta sunt, non nulla interimunt, potissimum quæ crassa terrenaq; essentia sunt. Hæc enim corporibus nostris inhærentia

A insidentiaq; dein temporis spatio putrescentia, erodunt corrumpunt que vicinas corporis partes.

Qua causa Putrefacientia Medicamina, Licet genere Lethalia sint,

Non tamen Perpetuo occidant.

C. A. P. 23.

AT que tenuiora sunt, et excerni interim cum excrementis possint. Fereq; accidit, ut duas ob causas istas quinq; medicamenta putredine erosione ue necantia non intericiant: Vna videlicet, quam modo admodum dicere deui, nempe cum una cum excrementis excernunt prius, quam iniuria corpus afficiant: Alteram, si cui accipienti bona faueat fortuna, videlicet aut cibis, aut quæ alioqui conferunt, utenti: aut medicum qui curando præsit, nasci: nam, ubi grauis ab istis noxa illata est, malum neque victus ratione, neque generosorum medicaminum, medicique auxiliantis ope, sili potest. Quod si prorsum exile sit deleterium, nihil repugnat, quò minus illud quoque nihil perficiat, propterea quod cum excrementis excerni possit, aut idonea victus ratione superari: Vt puta si cantharidis sit centesima drachmæ particula: nam id prius quam noxam animali inferat, una cum urinis excernatur. Sane cantharides urinam clientibus medicinis miscentur, sicut pleraque alia lethalia alexipharmacis, hoc est amuletis. Atque id genus medicamenta composita si aptè mixta fuerint, omnino efficacissima sunt, quoniam admodum quod ex cantharide conficitur, urinae mouendæ accommodum est. Feruntur enim alioqui sponte sua cantharides per urinam ad vesicam, atque sic rodendo eam exulcerant: verum ubi paucum ex illis, multis miscetur bonis atque vtilibus, illa quidem velut manu ducunt, rodere tamen nequeunt. Opus est enim ut quicquid agat, etiam si sit valentissimum, aliquantam tamen et magnitudinem habeat: Quoniam nimirum et ignis ipse si prorsum minimus sit, præterquam quod non uret, ne calfaciat quidem: quippe cum et centesima scintillæ portiuncula sensu nobis sit imperceptibilis. Ex quibus patet, quæcunque frigiditate interimunt, si paucula sumantur, nutrire corpus posse, velut lactucæ succum: at quæ putrefaciendo erodendoque, ea nunquam nutrire, ne si præ paruitate quidem innoxie corpus permeent: genere namque talia humanæ aduersantur naturæ.

Quod in Medicamentis, Dissimilari substantiæ sit mixtura: Ac proinde Vbi sine suo purgantia

frustrantur, Interim quidem extremè Lædimur, Interim vero Nequaquam. C. A. P. 24.

A. l. 2. t. 1. c. 1.
fol. 91. c

QVemadmodum autem in saporibus ante monuimus, nullum prope eorum aliene esse qualitatis expertem, verum siue in arboribus, siue in herbis, siue in fructibus, mistos semper alterius generis esse saporibus: Ita in medicamentis intelligere oportet, multas diuersi generis mistas esse substantias: id quod inuenias, si consideres granum cnidii hoc à cnico differre, quod plurimum habeat caliditatis. Nam similitudinem vtriusque substantiæ tactu visuque cognoscere liceat: Ceterumque ea tertium est, quod ambo pituitam detrahant: ostensum est siquidem nobis in commentarijs de naturalibus facultatibus, quod qualitatibus, quæ in substantiis sunt, proprietatibus attractiones perficiantur. Attamen grano cnidio multum permixtum caloris est, quare à cnico dilatat. Idcirco purgantium medicamentorum, ubi forte purgatione frustrantur, quædam extra quam quod noxam corpori nullam asserunt, etiam alimentum homini præbent: alia verò in corruptionem, ac tanquam in venenum vertuntur. Prorsum enim medicamentum purgans vel cum vno saltem humorum, qui in corpore sunt nostro, similitudinem obtinet, non autem perpetuo permixta est vis aliqua venenosa: quam ob rem nec perpetuo, licet non purget, iniuria afficiet, verum concoctionem accipiet, talemque producet humorem, qualem trahere natum erat.

Quam ob rem, Cum qualitatibus proprietate Attractiones perficiantur, Purgantia medicamenta

perpetuo Humores attrahunt Familiares, Nec tamen Inquam

à Familiaribus attrahantur.

C. A. P. 25.

Non autem me fugit, qui in naturalium facultatum commentarijs exercitatus ante non sit, habere ratiocinationes non satis consequi posse. Demonstratum. n. ibi est pleraque perfici attractiones qualitatibus familiaritate: proinde quancunque singillatim animantis particulam familiare sibi nutrimentum attrahere. Ad quam sententiam seu dogma sequitur medicamenta purgantia esse quidem detrahendis humoribus familiaria, verum quæ attrahunt, quodammodo esse efficaciora valentioraque, sicuti magnes lapis ferro: quippe qui ad ferri naturam accedat, in que ferri metallis reperiat, ei que magnopere specie similis sit: verum fortior est quodam modo, ut attrahere sit aptior, quam attrahi. Quin nec cnicum quoque à pituitæ natura alienum esse diffidendum est, uti colore suo præ se fert: sed tamen calore ipso quam pituita valentior est, ut trahere quam trahi magis par sit. Ad eundem modum granum cnidii siquoniam forte à corpore nostro vincatur (id quod assidue cnico vsuuenit, rarius aut grano cnidio, nimirum ob robur) vice purgationis alimentum efficit: velut veratrum semper coturnicibus. Volo autem (quoniam quidem in hunc sermonem descendimus) logici cuiuspiam meminisse theorematum, quod & in commentarijs de demonstratione monstrauimus, ceterum in re præsentem haud inutiles. Est autem theorema eiusmodi. Demonstrationum aliarum, quæ ex necessitate hoc illi insit, concludunt: aliarum, quæ inesse possibile est. Harum ipsarum quædam in id quod ex necessitate inesse recidunt, quoniam videlicet ex necessarijs consequuntur principijs, velut in hoc ipso quod modo monstrauimus. Si quidem in grano cnidio & cnico pituitosum inesse succum euidenter monstrare non est: tamen posse esse, ac probabile verisimile que esse, ratione colligitur. Sed quia attractiones substantiarum heri similitudine ostendimus (demonstratum. n. subinde est, in purgationibus attractionem esse eorum quæ purgantibus medi-

medi-

A. l. 2. t. 2. c.
150 fol. 117. c

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

medicamentis similia sunt, haud verò omnium simul succorum alterationem) similitudinē inesse E
quandam vtriusq; substantijs, & eius videlicet quod purgat, & eius quod purgatur, necesse est. Por
rò cum quod purgatur, pituita est, quod trahit, pituitosum sit oportet. Pituitosum autē esse oport
tere quod trahit diximus, non autem planē pituitam: etenim similitudinem inesse substantijs dixi
mus, non identitatem: contrarium enim cernimus. Nam neque ferrum attrahit ferrum, neq; caro
carnem, sed lapis sideritis ferrum, caro sanguinem. Differunt enim, mea quidem sententia, idem &
simile: quippe pituita pituita eadem est, & cnicum cnicus, similis autem pituita cnicus, non tamen
idem. Neq; enim quaecunq; edulia aut biliosa aut pituitosa dicimus, perinde tanq; bilem aut pitui
tam continerent sic nuncupamus. Huius enim opinionis absurditatem deteximus cum in natura
lium facultatum commentarijs, tum multis alibi locis.

Quòd in Purgantibus medicinis Duplex insit Similitudo, Nempè quaedam

Actu, & quaedam Potentia.

CAP. 26.

Q Vapropter pretereunda sunt omnia huiusmodi. Illud verò rursus repetendū est, q purgan
tium medicaminum quaedam iam etiā possident idoneam ad attractionem similitudinem:
quaedam non perfectē quidem eam obtinent, verum in animantis corpore accipiunt, nō
secus atq; vrentia medicamenta, quae caustica Græci vocant. Itaq; duplex quoq; in his similitudo F
est, vna actu, altera potentia, velut & in alijs oibus. Quin & permixtae sunt similibus in vnoquoq;
succis alijs dissimiles, q partim quidē medicaminosi sunt, partim non. Quare vbi purgationē haud
assequunt, quaedā purgantū malū corporibus nostris inferūt, quaedam verò alimentum exhibent.

De Superpurgationibus, quas Υπερκαθάρσεις Græci vocant.

CAP. 27.

P Orrò qm̄ semel sermonem de purgantibus medicamentis attigimus, præstiterit fortassis non
nihil quoq; dicere de nimijs purgationibus, quas υπερκαθάρσεις Græci vocant, quasi super
purgationes dicas. Euenire igitur ex solent, cū purgans medicamen vsque adeo inualuit, vt in va
sorū ad ventrem pertinentium osculis mordicationem apertionemq; multā relinquat: assidueq;
irritans conuellensq; corpora, quae in vasis sunt vires dissoluat. Nam, quod in ventre euenire con
spicimus, vbi vires eius in extremam inciderunt infirmitatem, idem in venis accidere putandum.
Quid porrò est quod in ventre euenit? vomitus totius eius quod deglutit, vbi videlicet superio
res eius partes debilitas occupauit: intestinorum verò læuitas, vbi inferiores. Ostensum est autem
& de hisce latius in tractatu de vacuandorum causis. Huiusmodi affectum existere in venis existi
mandum est in superpurgationibus. Cum autem per initia modica etiam nū sit & apertio & imbe
cillitas, tum quod & tenuissimum est minimeq; naturæ familiare, excernitur: sed vbi utraq; adau
cta est, iam tum etiam crassa, & quæ naturæ familiarissima sunt, euacuuntur: Quam ob rē flaua bi
lis primo, pituita secundo loco, tertio loco atra bilis, post hæc postremus omnium in superpurga
tionibus effunditur sanguis, vtpote qui naturæ succus sit familiarissimus. Ante hunc verò primus
quidem qui tenuissimus, postremus qui crassissimus. Disseruit autem & Hippocrates in || libro
qui de Natura humana inscribitur, de ordine qui in istis euacuandis seruari solet. Ac nunc quoq;
ne quid huic sermoni desit, dicendum est. Etenim, si quod pituitam ducat, medicamentum exhi
beas, prima quidem in superpurgationibus flaua, mox atra, tertio loco sanguis eijcitur. At si, quod
flauam bilem detrahat, pituita consequetur, tertia atra, quartus demum reddetur sanguis. Quin &
si atram bilem purgare sit natum, eam quidem primam euacuabit, post quam flauam, deinde pitui
tam, omniumq; postremus sequetur sanguis, tanq; ex inanimis iam vasculis effluens, vt quæ sum
ma iam debilitas occupet, quæq; ad extremā osculorum apertionem peruenerint. Ex quibus ma
nifestum est postremū in superpurgationibus vacuari humorem, qui idem & familiarissimus est:
aliorum autem vnumquemq; prout aut crassus est, aut tenuis.

*Qua causa in Superpurgationibus Humores, minime purganti medicamento
familiares, itidem euacuuntur.*

CAP. 28. H

CÆterum "causæ, quamobrem omnino & qui alieni sunt à purgante medicamento succi vnā
excernantur, in hisce tribus consistunt, vasculorum scilicet imbecillitate, osculorum laxitate,
& purgantis mordicatione. Cum enim vascula non amplius in sese continere succos possunt, &
oscula eorum reclusa fuerint, nec irritare medicamentum desinat, possitq; non amplius familiarem
trahere succū, necesse omnino est reliquos quoq; quo diximus ordine excerni. Satis enim erat vni
ca mordicatio, quæ organa ad excretionem excitare posset: multo ergo magis id fiet, vbi & aper
tio, & imbecillitas vasorum coierit. Fit autem, vt supra diximus, apertio ob medicamenti poten
tiam: ob quam videlicet mordicatio itē provenit: Vasorum autem imbecillitas tum ob ingentē
defatigationem, quam scilicet, dum à purgante medicamento mordicarentur, ac veluti emulgeren
tur, acquisierant: tū ob intemperantiam, quæ in superpurgationibus occupat. Quemcunq; enim
humorum penitus euacuaueris, intemperantiam consequatur necesse est. Itaque q; à purgante &
alieni quoq; vacuētur succi, eas habeto causas: q; vero supradicto ordine, vacuandorum

humorum tum tenuitas, tum crassitudo in causa est: & ad hæc prout
magis & minus animantium constitutioni succus
quilibet familiaris est.

Galen

de Natu. hum.
cō. 2. t. 31. 1.
31. g

A. l. 1. f. 4. c. 6.
fol. 75. c

A. l. 1. f. 4. c. 7.
fol. 75. f

* In antiquis
cod. legit μύ
ξασθαι. i. fuge
rentur.

GALENI DE SIMPLICIVM
MEDICAMENTORVM FACVLTATIBVS
LIBER QVARTVS

ARGVMENTVM LIBRI

De Tenuibus & Crassis Partibus, Saporumq; & Odorum essentia, & facultate,
Quæ in Medicamentis simplicibus cernuntur.

*Quid Tractatum fuerit, Quid reliquum sit Tractandum. Item de Differentia Sensus
Linguae, & Cæterarum partium.*

CAP. 1.



Quo pacto igitur dicatur frigidum, calidum, humidum, siccum, que facultate medicamentum: tum qua ratione id explorare oporteat: supra definitum est. Porro, quoniam non nulla emollientia dicuntur, relaxantia, rarefacientia, condensantia, emplastica, ac digerentia, multa que his similia alia, prestitit et de his differere: vna vero cum istis, aut etiam ante ea, de saporum omnium & essentia, & facultate, de qua & in fine primi horum commentariorum verba fecimus, quoniam si Platonis ex Timæo dictionem adscripsimus. Verum ibi quidem gratia passionum sensibilium, quas lingua in quocumque eorum perpeti est nata: at hic de essentia & facultate sermo habebitur: quoniam quidem & alia animantis partes similiter ut lingua perpetiuntur, sed passionum sensum non exacte percipiunt. At lingua præterquam quod perpetiatur, sensus etiam perfectionem possidens, earum omnium naturas dignoscere potest. Nec enim hoc dicendum est, calidum, frigidum, humidum, siccumque, linguam calfacere, frigefacere, siccare, aut humectare posse, aliarum vero quamuis non posse: immo ut hanc, ita & alias omnes singula afficiunt & alterant, tantum diuersitate in ipsis existente pro minoris maiorisque ratione, haudquaquam in ipso, ut sic dicam, affici aut non affici. Quippe, quod lingua non secus atque alia quauis animantis partium calidum, frigidum, siccum, humidumque dignoscere corpus valeat, cuius clarum est: amaritatem vero, dulcedinem, salinitatem, aciditatem, austeritatem, acerbitatem, acrimoniam, hæc sola discernere creditur: tametsi passionum similitudinem inuenire est cum in alijs partibus omnibus, tum maxime in vlceratis. Nam cutis duritas densitasque excludit, resistit, prohibetque, quod minus foris incidentium facultates intro in carnem ipsam penetrent.

Quo nam modo Frigidum Corporibus nostris Mordax appareat: et Qua differat ab ijs quæ caliditate mordicant, Nempe quod Continuum diuellat, cuius rei causas adducit: At Calidum, quod Substantiæ continuitatem Erodat.

CAP. 2.

Sic enim & illud ab Hippocrate dictum est, ¶ Vlceribus frigidum mordax: tametsi cuti priusquam vlceraretur, mordax nequaquam esset. Est vero & oculis, & naribus, & ori, externis partibus animalis, frigidum mordax: nec minus internis, ventri, & intestinis: ut difficile sit non nunquam discernere, an à frigore quis, an ab humorum mordicetur acrimonia. Eueniunt autem hæc non ab re. Si quidem, cum frigidum quæcunque contingit, eorum & contrahat substantiam & condenses constringatque, primum tenues tum excernantur humiditates necesse est, sicut ex oculis lacryma, ex naribus mucus: postea vero etiam mordax appareat, licet alia ratione quam in calido. Nec enim erodendo, quod continuum est, sed diuellendo, molestum ac mordax est frigidum. Quare nec duris corporibus tale apparet. Nam dum mollia contrahuntur comprimunturque, humidum exprimi contingit, simulque partes diuelli: humidum quidem, sicut in spongia à manibus nostris contracta compressaque: diuelli autem, sicut in ijs quæ distrahuntur, diuellunturque siue à nostris manibus, siue aliunde. Tale quid rara molliaque corpora à frigido perpetiuntur necesse est, raritate frigus promptè intro recipiente, multoque etiam promptius partibus in ea mollibus, quæ in profundo sunt, à frigore concrefcentibus. Frigidum itaque spiramenta cuncta in raris corporibus subiens, qualia sunt vlcerata omnia, oculique, & nares, ac os, venterque, omnes refrigerandorum corporum partes circumquaque amplectitur, & quodammodo multis circumquaque ansis eas contrahens atque condensans à continuis auellit. Quæ dum patiuntur, multa fieri spatia inania necesse est, non tantum quia tenues exprimantur humiditates, verum etiam quia substantia mollis in arctum contrahatur. At qui spatium inane in sibi continuis corporibus, seruata etiamnum continuitate, fieri non potest. Ergo si fieri id constat, clarum est illam deperdi, ac corpus continuum distrahi, ex quo molesta mordaxque sensus exoritur affectio. Tametsi non eadem utrisque qualitas est, tum ijs quæ frigore mordicant, tum ijs quæ calore: sed in illis protinus et contractionis condensationis que sensus percipitur, in his dissolutionis & fusionis. Quin nec par est utriusque affectus celeritas, verum in refrigerantibus quodammodo tardior & cunctantior est mordacitas, at in excalfacientibus celerrime penetrat.

5^a. Aph. 20. Ex.
ord. 39. a

trat. Qñ igitur abunde definitum est tum ipsa rerum natura, tum et qui in nobis fit sensu: clareq; E
expositum est, quo pacto calidum, quoq; frigidum, mordax appareat: colligere quemq; apud se
nunc oportet vel anteq; à nobis id audiat, mordicantium medicaminū alia calida facultate, alia fri-
gida necessario esse. A nobis autē distinctiones eorum exacte addiscere licebit, vbi prius cōmone-
fecerimus poculum & balneum, cum temperata sunt, calida à nobis dici non nunq; appellationis
abusu, qñ quidem eucrata siue temperata dici debebant ac symmetra potius, q; calida. Ergo que sic
calida sunt, grata amica que sunt: funditur enim quod in corporibus nostris cōstiterat, atq; concre-
tū fuerat: quo maxime affectu voluptas animantibus constat: At si moram etiam trahant, sensim
quoq; & ipsa molesta euadunt: ad tantam enim fusionis immoderationem sic recidunt, vt substan-
tiam nostrā etiam digerant, dissoluant, atq; dispergant. Verum nec sic quidem mordicatione infe-
stant, sed animi afferunt deliquium, viresq; deiciunt, vt mors quoq; tandem sequatur. At, que his
magis sunt calida, secant, distrahunt, diuiduntq; substantiam: quare necessario mordacia videtur,
velut aqua feruens, ac ipse ignis. Eundem in modum frigida quæ contrahunt, non dum tñ con-
tacti corporis continuitatem diuellunt, frigida duntaxat sunt, haud et mordacia. At quæ supra q;
q; contrahunt, et conuellant, ea utiq; omnia violenta condensatione vtuntur, quo circa & morda-
cia apparent. Igitur subiectam materiam contrahere & condensare frigidi semper proprium est: F
fundere aut atq; liquare calidi: vtriusq; vero immoderatus affectus, cōmunis est mordicatio. Etenim
quæ summē frigida calidaq; fuerint, præter oēs alias, quas modo memorabam, raras mollesq; par-
tes, cutem etiam nostram inuadunt. Memini me qñq; per niuem iter fecisse tam altā et copiosam,
vt nulla terræ pars nuda conspiceretur: aer exactissime purus erat, spirabat que à niue quidā ven-
tus adeo frigidus, vt non oculos modo, & nares, & totam adeo faciem mordicaret, verum et si quis
forte manum protulisset, similiter illā afficeret. At quæ à summa frigiditate, aut caliditate absunt,
cutem non mordicant: Frigida quidem, quoniam continuitatem eius ob duritiem distrahere ne-
queant, nec in profundum subire præ superficiēi densitate valeant: Calida autem, tum q; non ero-
dant, sed duntaxat fundant, tum q; interdum meatus promptē penetrent. Plurimum autem ad id
genus passiones facit essentia medicamentorum vel tenuitas, vel crassitudo. Siquidē frigida quæ
tenuium partium sunt, cum magis in profundum transeant, vehementius etiam proinde mordi-
cant: Calida vero quæ crassarum sunt partium, quoniam plus vlceraunt, violentius idcirco etiam af-
fligūt. Tenuiorum itaq; partium aer est, crassiorum terra, medium eorum tenet aqua. Sed aer ac-
census, fit flamma: terra autem, pruna: at aqua vehementem sanē caliditatem accipit, sed nec flam-
ma, nec pruna propter innatam humiditatem efficitur. Siquidem flamma & pruna ignis sunt ge- G
nera: ignis autem omnis calidus est et liccus: at aqua sicca vt sit, fieri nequit, proindeq; ipsius ignis
exacte qualitatem sicut aer & terra non accipit. Nullum est itaq; æquē calidū pharmacum, vt aut
flamma, aut pruna, aut feruens aqua: immo vt sit vel calidissimum, omnino tamen plurimum ab
illis vincitur. Procedit autem ad vñtionem vsq; medicamentorum caliditas, vbi videlicet in crassa
consistit essentia: Quæ vero subtilium partiū sunt calida, non nunq; omnino non mordicant, sed
calfaciunt duntaxat. Est autem vbi & mordicent, non tamen vrant.

Quæ Vocemus Tenuium Partium, & Quæ Crassarum.

CAP. 3.

Sed quid tenuium partium, quid ve crassarū esse intelligamus, commemorare oportet. Nem-
pe quæ celeriter in tenuia soluantur, tenuiū appellantur partium: at quæ id perpeti nequeūt,
crassarum. Quod ergo ea soluantur, calor qui est in animantis corpore, cui vnūquodq; applicari
contingit, in causa est: quod autē in tenues crassas ue partes cōminuantur, id à sua ipsorū natura
obtinēt. Quocirca refrigerantium medicaminum ea quæ crassarum sunt partium, mordicare ne-
queunt, vtpote quæ extimam cutis superficiē penetrare non valeant: At quæ tenuiū sunt partiū,
& per facile penetrare possunt, & in profundum subeuntia molles animantis partes mordicant.
Mordicant etiā magis quæ cum tenuiū sint partium, in super inæquabilem obtinent temperiē. H
Sed supra demonstratum est inæquabilia esse propemodum omnia: quippe aut impossibile est,
aut perdifficile vllam inuenire substantiam, quæ ad amissim similitudinē sit partium. Vinum nāq;
diximus vnum quidem habere in se recrementum crassarum partium, vnde, dum temporis spa-
tio fecernitur, fertur que deorsum, fæx consistit: aliud vero secundū, quod florē nuncupant, quod
dum vinum feruet supernatat, sed postea ad fæces subsidit: tertium, aqueū, quod toti vino permi-
stū est, hoc primario potissimū que feruet: quartū præter hæc est ipsum re vera vinū. Ostensum ve-
ro etiā est, q; tū in oleo, tum in lacte, tum in alijs omnibus succis, eadem sit recrementorum natura,
multo que magis in totis plātis, metallicisq; omnibus. Quæ memoria tenentes nunc tēpestiū est
de medicamentis omnibus considerare. Ac primū omnium cauendū est, ne nobis quoque, quod
plerisque omnibus qui talia scrutantur, accadat. Nam quasi omnia similitudinē forent partium, ita
differunt, nec concedunt neque vinū, neque oleum, neque reliquorū vllum, ex diuersis facultate
partibus consistere: immo multo magis mirantur, si de aceto audeamus dicere, ipsum ingenitam
vini caliditatem perdidisse, ceterum ex putredine aliā adeptum: cuius sane sententiæ est tum Ari-
stoteles, tū Theophrastus. Nā vinosæ vini partes, dū ipsum in acetū transit, refrigeratur: at aqueū
recrementū putrescens adscititiā caliditatē obtinet, velut cætera omnia que putrescunt: fitq; acetū
quiddam

A quiddam ex contrariæ facultatis partibus compositum, partim refrigerantibus, partim calidis, sicuti vstorum lignorum omnes cineres. Etenim in illis aliquid velut fomes quidam igneus (*ἔμπυρμα* græci vocant) per exiguas partes dispersum est, quod & valde calidum est: reliquum omnem tum terreum est, tum frigidum. Idcirco cum cinis aqua maceratur, ac per quædam corpora modicè rara colatur, fit vt calidæ acresq; partes vnâ ferantur: reliquum quod est, non amplius calidum est, nempe quod igneas suas particulas in aquam deposuerit. Vocant eam aquam hoies græce *κρίαν*, {latine lixiuium:} idq; proportionem quadam aquæ marinæ & muriæ, dispositionis generationis & facultatis ergò respondet: Illa enim ex aqua salisq; constant: at aqua quæ cinerem abluat, tum ex ipsa, tum ex partibus quas secum rapuit, composita, hoc pacto effecit notatam *κρίαν* id est lixiuium: quod nisi antea scias ex aqua ac fuliginosis cineris partibus effectum, forsitan simplex & incôpositum esse corpus existimes. Eiusmodi quiddam in aceto nobis euenit. Nam cum nequeamus sensu cerne re ipsius generationem, rationi diffidimus. Cæterum si nihil aliud, saltè cõsiderantes omphacis cum eo differentiâ, æquum esse credere sciemus, qd non acidus modo, sed & acris quidam alius ei permixtus sit sapor. Quamobrè perfecte omphacis succus refrigerat: hinc est qd summè ardoribus prosit, siue ori ventris impositum, siue totis hypochondrijs, siue cuilibet alijs quod refrigerare libeat. Secus verò "habet acetum: nec enim ad vnguem vnũ est, neq; tm̃ acidum, sed et acris alius quidam ei sapor permixtus est. Itaq; quod tm̃ est acidum, quicquid id fuerit, planè frigidum est, siue pyrũ, siue malũ, siue acinus vuarũ, siue rubi, siue ipsius mori, siue rheas fructus, {hoc est mala punica,} siue quicquid aliud tum fructus, tum succus, tum planta, vt oxylapathum, & oxalis, quam eandẽ oxyda quoq; nominant. Quippe si gustanti vehemens atq; manifesta illi inesse aciditas appareat, nec quicq; pre se ferat acrimoniæ, omnino hunc succum refrigerantem reperiens: quin confidenter vitor, siue ad ardores vtri consilium est hypochōdrijs imposito, siue ad erysipelas, siue ad alium affectũ calidum. Similiter quoq; frigidos morbos ab eo oēs palam lædi cõperies. Porro vbi mista tibi qualitas appareat cum acrimonia, cõijciendum est caliditatem quoq; inesse: Sin iuncta sit astrictio, aliud est frigiditatis genus: nam acida frigiditas tenuium est partium, at adstringens crassarum.

Quomodo Exerceri oporteat in Agnoscenda cuiusq; Saporis Facultate.

CAP. 4.

Sed horum paulo post probationes afferemus in mediũ. At quod prius consilium dari oportet ijs, qui talia absque sophistica arrogantia, immo vnus veritatis gratia scrutantur, id nunc tempestiuum est expromere, Nempe qd non sola ratione exerceri per eas methodos logicas, ad quas nunquam hortari desino, quasq; in cõmentarijs de Demonstratione tradidi, sed etiam gustandi exercere sensum in saporibus oporteat: principioq; in ijs exquirendis sollicitos esse, quæ vnã quampiam habeant qualitatem manifestissimam: Vt si acrimoniã cogitatione completi clarè velis, id in allio, cepis, & quæ ipsis similia sunt, efficies, assidue gustando, plurimum que dentibus mandendo, tum ita longo vsu passionis existentis sensum memoriæ diligenter mandando atq; in figendo: Sin adstrictionem, in galla, rhu, & similibus: Si vero amaritatem, nitri fellisq; gustu: Si autem dulcedinem, gustu siræi & mellis: Ad hæc siue *ἀποίων*, hoc est quod qualitatis sit expers: siue qualitate, quod ad gustum attineat, medium voles comprehendere: aquam gustare iubeo, & hanc vbi gustaueris diligenter memoriæ commendare, eam que potissimum, quæ nullam dictarum præferat qualitatem, neq; dulcedinem, neq; amaritatem, neq; acrimoniã, neq; aciditatem: præter hæc quæ neq; supra modum sit aut calida, aut frigida. Nam hinc exorsus promptius & ad aliorum obscurorum omnium saporum agnitionem peruenies, & ad eorum quos ego quidem dulces, alijs verò quidam aqueos appellant: qualis utiq; est calamorũ viridiũ, et graminis {agrosten Græci vocant:} ad hæc tritici, hordei, zeæ, aliorum que multorum, quæ Theophrastus recenset: inquirens an plures sint ponendæ dulcium saporũ species, an vero in maioris tantum ac minoris inter se differre ratione existimandi sint. Sed de his alibi definiam.

D Quod Pharmacorum Emplastica vocata, cum Media sint in caliditate ac frigiditate,

Terrestria quoq; esse, ac Sine mordicatione siccare oporteat.

CAP. 5.

Porro si qualem præbet sensum aqua planè omnis qualitatis vacua, talem in re sicca inuenias, ea nimirum extra omnem est insignem tum caliditatem, tum frigiditatem, mediã quoad fieri queat, constitutionem obtinens, aut certè paulum ad frigidius declinans. At si talis cum sit in caloris frigorisque differentia, insuper consistentiam naçta sit siccam, terrestris sit, ac citra morsum desiccet, necesse est. Appellitant eius generis medicamenta omnia medici Emplastica: velut pleraq; quæ exactè lota sunt, amyllum, pompholyx, cerussa, calx, cadmea, terra Cretensis, Cimolia, chondrus, Samius aster, & fullonum terra, ex emplastice sunt pharmacis. Sunt verò ex eis non nulla non terrena solum, sed aquea natura. Quin etiam quædam non parum in se aeris continent, omnia quidem glutinosa, ac proinde emplastica.

Quod Duplex est Emplastice Natura. Nam partim Terrena sunt exactè sicca, partim plane Viscosa & lenta, sed mista aqua terraq; , atque vtpurimum etiam aere.

Communiter vero omnia mordicatione vacant.

CAP. 6.

DVplex siquidem est emplastice medicaminum natura, altera exactè terrea & sicca, altera viscosa quidem omnino, sed ex aqua & terra, & plerumque etiam aere mista, sicut oleũ

Quinta Classis.

DDDDD

dulce.

dulce. Dictum autem retro est, quid dulce vocitem. Ergo hoc ex aërosa, terrea, aqueaq; essentia E temperatum est. At oui albumen ex iisdem quodammodo, sed magis tamen terrenum oleo est. Quin & quod lactis est caseosum, emplasticum quoq; est, & suillus adeps. Nam tauri sanè & hirci pinguedo acrimoniam & multam & igneam possidet: Bouis aut capraq; minus qdem, iam vero quodā modo & horum adeps acris est: nam talium animantiū pinguedo ob crassitiē adeps appellatur: est. n. non calidior tm̄, sed & magis terrena suum pinguedine. Anseris autē & gallinacei calidior est pinguedo, & siccior q̄ suum: quin & subtiliorum partium, & minimū terrestris, sicut & auium oīum: qñquidē & corporis ipsarum substantia non parum habet aeris. Sed de his alibi tractabitur. Quęcunq; ergo pinguedines non dū vllam nactę sunt acrimoniam, emplasticam & illinendi poros facultatem obtinent, eamq; tanto efficaciorē, quanto sicciores, magisq; terrenę fuerint. Huiusmodi est cera elota, deponit siqdem & ipsa quam habebat à melle acrimoniam. Satis verò constat, hęc à me non dicta esse de cera quę natura sua amara est, qualis est pontica: ex absynthio nanq; ea amaritudinem obtinet: ac si vel sexcenties eam laueris, prorsum tamen omnē amaritatem haud elueris. Fugienda verò etiam illa cera est, quę ex acri & thymoso melle cōficitur, cum planè ab omni mordacitate alienū pręparare voles medicamentum. Quocirca ad lauandum idonea est, quę ex melle facta est tum aquosiorē, tum minimè mordaci.

F

Quod Adstringentia Medicamenta Acidaq; Licet vtraq; qualitate sint frigida, Inde tamen diuersa sunt, quod Astringentia terrena sint crassęq; essentia, Acida vero tenuis. CAP. 7.

ATque emplastica quidē medicamenta eiusmodi sunt: sed ad acida adstringentiaq; reuertor. Adstringentia certè terrena sunt & crassa corporis consistentia, qualitate verò frigida: Acida autem tenuitate pollent corporis, sed perinde vt adstringentia refrigerant. Vtriq; gemina probatio est, nempe ex sensu quę ab inductione est: & ex ratione, quę ex substantia eorum colligitur. Prior autem probatio ea dicitur quę vulgo quidē est appertior, ceterum ad scientificam demonstrationē minus habet virium. Arborum fructus quotquot nobis vbi maturuerint, dulces apparent, nuper enati, acerbi sicciq; sunt consistentia, † pro sui nimirū parentis quicq; natura (ccu quodam ait loco Theophrastus) oliuę, vuę, mala, mala punica, mora, palmula, pyra: at progressu temporis humidiores redduntur, acquirunt que ad acerbitem aciditatem: quam sensim exuentes, postea dum maturescunt ac perficiuntur, dulces euadunt. Sunt qui non in arboribus, sed postea cum decerpti conditiq; aliquandiu fuerint, dulcedinem accipiunt. Alij sunt, qui non interueniente aciditate, sed palām ab acerbitate in dulcedinem transeunt, sicut oliuę. Quin q̄ calido maturescūt coquunturq; omnes, clarum est. Tum q̄ id ipsum duplex sit, alterū proprium, & G cuiq; ingenitum: alterum externū, à Sole videlicet, sed tamen naturę ipsorum conueniens ac familiare: si quidē meminimus quę nobis perpetuo proposita sunt elementa: & ipsum vtiq; clarè cognorimus. Porro si, cum initio acerbi essent, tempore maturescētes dulcescunt, sequitur ex calore ipsis provenire dulcedinem, acerbitem vero aciditatemq; constituisse ex frigore. Quoniam autem principio lignosi cū sint (vt & Theophrastus dixit) sicci quoq; sunt, simulq; acerbi, verum affluētis postea humoris copia acidus efficiat, palām est saporem acerbum magis esse terrenum, acidum autem magis humidum. Itaq; & Plato rectè definiit dicens, Quęcunq; partes eiusmodi in succis deferuntur terrestres, eę liquefactę contrahunt atque exiccant humiditas linguę sensibiles partes: ac si exasperant, acerbę, sin minus id faciant, austere apparent. Rectè autem & nos preter hęc dicemus frigidum esse temperie saporem eiusmodi. Nam si terrenus fuisset duntaxat, emplasticus, non acerbus foret. Iamq; oratio quodammodo ad essentiam ipsam transgressa saporum, demonstrationem attingit scientificā. Quippe si ab acerbo sapore manifestè linguā contrahi, sicari, asperariq; contingit: ostensumq; superioribus libris est, ab vnico frigido contrahi, cōstringi, densariq; corpora: liquet planè frigidum esse saporē acerbum. Quoniam porro inęquabiliter desiccatur (id est enim, quod exasperatur) fuerit sanè oīno ēt terrenus. Siquidem aqueum corpus omnia H æquabiliter penetrat atq; peruadit, eiq; inseparabile est, etiam si diuulsum sit, vt rursus vniatur: at terreno corpori quod in saporibus defertur, iam antea inest diuulsiō, simulq; vt nunquam deinceps facile coeat. Quin si eius recorderis, quod vtriuscq; singulatim passionis est propriū, iisdē ipsum subscribet ac testificabitur. Velox siquidē acidorū saporum trāsitus in sentientibus partibus fieri conspicitur, acerbiorū aut tardus: tum acida quidē in alto magis agere apparēt, in superficie aut acerbiora. Hęc itaq; oīa crassarum esse partiū acerbiora indicāt, acida verò tenuium. Multum ergo inter se hęc conueniunt, tum ea quę à rerum dicta sunt essentia, tum ea quę per inductionē eorū quę sensu sunt inuenta. Porro nihilo deterius fuerit, mentionē rursus de nominū vsu facientes, hęc quoq; adijcere, nēpe q̄ vtraq; adstringere dicatur, tum quę acerbiora sunt, tum quę austera: sed in maioris minorisq; ratione inter se difficrāt: Tum q̄ multę insint medicamentis qualitates, non diuersę tm̄, sed & pugnantes, atq; interim etiam omnino subcontrarię: Id quod retro satis ostensum est, ceterum ab eo nunc rursus ordiri necesse est. Nam si gustāti tibi idem adstringens & mordax appareat, id missum facias medicamentū, iubeo, atq; illud quęras, quod absq; mordacitate adstringat. Ac si neq; acidū appareat, neque dulce, neque amarū, sed q̄ fieri maxime possit vnā possideat qualitatē à mistione alienā, nēpe adstrictionem, ita denique experiētia examinabis, quomodo sapenumero

† pro generans arboris.

A. l. 2. t. 1. c. 3. fol. 93. g

A. l. 2. t. 1. c. 3. fol. 93. a

»
»
»

A saepenumero faciendū ante proposui. Sin adstringit simul ac mordicat, aut aliam quāuis qualita-
rem seu facultatē adstrictioni iunctā habeat, frustra est ac supuacaneum, vbi adstrictionis actionē
explorare consilium est, ad experimentum tale ducere pharmacum: incertū est enim, num ob ad-
strictionem, an ob aliā quāpiam admistarum illi qualitatum, an ob vtrasq; sic in corpore sibi appli-
cato egerit. Etenim chalcitis, misy, chalcanthos, fori, æris squama, cum simul adstringāt & mordi-
cent, secundum vtrasq; qualitates in quouis admotorum corporum actionem exerunt: nec tñ do-
cere nos aperte queunt, an ab adstrictione vrendi vim habeant, an ab acrimonia. Mittere itaq; il-
la præstiterit, & multa deinceps alia gustare, synceram seorsum adstrictionem intuētem, ac quo ad
fieri possit per sese existētem: ac vbi tandem talem quāpiam reppereris, ita deniq; medicamentum
iudicare ijs methodis, quas supra à me frequenter audiuiſti: Vipote, si gustātū tibi balaustium, aut
galla, aut cytinus, aut hypocystis, aut solanū, aut glaucium, aut acacia, aut succus rhu, aut id genus
aliud, exactē quidem esse appareat adstringens, nec vllā manifestā habens aliā qualitatem, in hoc
iam expendere ac diligenter explorare adstrictionis actionē oportet. Porro exploratio ipsa fieri
(vt saepe diximus) debet tum in optima corporum cōstitutione ad vnguem sanorum, tum in sim-
plicibus affectibus, seu calidis, seu frigidis, seu humidis, seu siccis. Nā si corpus sanum manifestò re-
B frigerare cernatur, & calidis proſit affectibus, & euidentem quoque laboranti ipsi frigidam afferat
qualitatem, audendum erit de adstrictione, q̄ refrigeret, pronunciare: Sin contrā appareat, sanāq;
ab eo corpora incallescant, & calidi affectus exasperentur, frigidiq; iuuentur, non refrigerare, sed
excalfacere medicamentum eiusmodi putandum est. Eodem modo de acris, sumendū experi-
mentum in caps, allio, pipere, pyrethro, zinzibere, struthio, elenio, calce. Etenim quemadmo-
dum qui solani succū piperi miscuit, neutrum satis explorare potest: sic nec quæ à natura sunt mi-
sta. Eundem in modum contemplādum de acida qualitate, de amara, de dulci cenſeo, vchementes
nimirum, & quæ quantum licet solæ sint, in explorationem ducendo, & experientia vires eorum
scrutando. Quippe quiduis te, quod modo sit aut acerbum, aut austerum, aut amarum, in experi-
mentum ducere, tanquam in eo acerbatis, austeritatis, vel amaritatis faciurum periculum, planè
absurdum arbitror. Nam si vnā duntaxat qualitatem possideat, idem erit medicamenti ipsius &
qualitatis experimentum: sin multas, ex omnibus nimirum mistā medicaminum actionem edet:
quare vnus adhuc eius, quæ in iudicium veniebat, actio obscura & incerta permanet. Itaq; si, vt
prius dictum est, iudicare oporteat, non rectē senserunt qui nihil prorsum pronunciari posse de sa-
porum facultatibus, existimarunt, quicq; aliter iudicium ineundum cēſent: siquidem & de ipsis ali
C quid asseri potest, nec iudicium aliter quā nunc est dictum iniri conuenit. Sanè si id modo dixiſ-
sent, planè opus non esse saporum consideratione, cum vires medicamentorum expendimus (nā
absque his medicaminum vires experientia inuenire licet) laude illos potius, q̄ vituperatione, di-
gnos putarem: Verum vbi tanq; de re, necessaria quidem illa sed incomprehensibili, differunt, bis
reprehendēdos iudico, tum q̄ rem non necessariā habeant, pro necessaria, tum q̄ consequi eam se
posse desperant. Nam facultatis medicamenti cuiusuis iudicium abunde citra saporum dignotio-
nem sola reperitur experientia, eum in modum habita, quem sexcenties iā antea posui. Atq; ego
sanè nunc, non quasi aliter inueniri quod inuestigatur non posset, ad sermonem de saporibus de-
scendi, sed partim propter eam, quæ ad principia est, sequelam, vt videlicet ostenderem omnia ad
elementorum rationes consequi, nec quicq; vsquam inueniri pugnans: partim verò etiā vt illos
coarguerem, qui adstringentia omnia excalfacere contendunt. Quinimmo fuerit etiā non nullus
eius ad præſens negotium vsus. Sed hæc postea monstrare conabor. At nunc ad rem propositā
reuertor: & hortor qui veritatis sunt amatores, vt ipsimet adstringentia omnia degustent, vt nos
fecimus: ac vbi inuenerint aliquo in corpore perfectā adstrictionem, quoad liceat, ab aliarum
qualitatum mitione alienā, tum deniq; experientia expendere tentent, frigidum sit, an calidum,
D humidum, an siccum, corpus eiusmodi. Sed hoc quisquis sapiet, seorsum ipse faciet. Ego verò vt
aliquid de mea afferā pronunciemq; experientia, fortassis necessarium fuerit, atq; in hoc quidem
libro in genere, membratim aut in cōmentarijs sequentibus. Fuerit aut generalis de omnibus ser-
mo eiusmodi. Corpus omne adstringēs, ab alijs, quod sensu animaduerti posset, qualitibus syn-
cerum, perpetuò comperi experiendo, refrigerare. Quin etiā non nulla ex ijs quæ qualitibus mi-
sta erant, nempe quæ modice dulcia, aut amara, aut acia, aperte quoq; refrigerantia repperi, scilicet
cum in eis adstringendi refrigerandiq; facultas ita vincerent, vt alias obscurarēt. Eadē ratione aci-
da vniuersa, tū ea quæ simpliciter acida essent, sicut oxalida, & oxylapathū: tum mistis quoq; alijs
qualitatibus quædā siue dulcibus, siue acris, siue amaris: nihilo secius refrigerantia expertus sum,
qualia sunt mala punica, mala, pruna, vuæ, mora, ficus, cerasia, ipsumq; adeo acetū: Sed huic, vt su-
prā dictum est, permista est quædā acrimonia: fructibus autem ijs quos ὀνόμας Græci vocāt, dul-
cedines quædā & acerbitates: quibusdā verò etiā amaritates quædā obscuræ ac leues. Tum item
quæ adstringunt pariter, atq; acida sunt, ea omnia quoq; manifestò refrigerare experientia cogno-
ui. Sola verò dulcia omnia pro dulcedinis modo protinus ēt calorem continēt: quocirca eorum
quæ admodū dulcia sunt, nullū omnino est frigidū. Fuerint tñ quædā modice dulcia, itidem frigi-
da, scilicet qñ plurimā corporis ipsius substantia aquea extiterit, sed non adeo tñ frigida, vt id quod

valde acerbum est, aut acidum, sed sicut alicubi retro diximus de illis, quæ tepidum calorem possident. Porro amara omnia calida sunt, ut bilis, nitrum, vina valde vetusta, ac numerosa seminum copia. Nam & semen rutæ, potissimum sylvestris, & tordili, & spondyli, melanthiiq; & lupini, magisq; agrestes: orobi, & inter hos potius agrestes, quicq; a secure pelecinus nuncupatus est, reperitur autem in tritico: amygdalæ quædam, quæ ob id ipsum amaræ vocitantur: cucumerum quædam semina, & semen mali medici, & ad hæc infinita alia, amara apparent gustantibus.

Quod Per Acerbi saporis exolutionem Nascentur Austerus sapor, Acidus, Dulcis, ac Pinguis. Soluitur autem Acerbus sapor, cum frigidus sit & terrenus, aut excalescentia, aut humectatione, aut simul utraq;. CAP. 9.

Sed infra copiosius de amaris agemus. Nunc rursus resumpto de astringentibus atque acidis sermone, convenientem ei finem imponamus. Ergo austerum quod sit acerbum exolutum, sensum ad memoriam reuocare oportet. At quæ sit eius generatio, nunc dicam. Quandoquidem corpus acerbum terreum est ac frigidum, tripliciter necessario exoluitur, aut incalescens, aut humescens, aut utrumq; simul perpetuens. Itaque si caleseat duntaxat, id nec humidius est nec mollius: sed durum manens solâ acquirere dulcedinem, velut robustæ glandes, ac potissimum quæ vocantur castanæ. Sin tamen humescat, liquidem ea crassarum sit partium & aquea humiditas, austerum euadet: cuiusq; n. F saporis vires aquea retundit ac hebetat humiditas. Si vero tenuium partium & aerea sit, accescet: ostensum namq; est, frigidum subtile acidâ efficere qualitatem. At si pariter & humescat & calefiat, humiditate quidem aquea in dulcedinem, aerea vero transibit in pinguedinem. Perspicuum ergo hinc iam euolat, quo pacto fructus principio acerbi cum sint, processu temporis quidam plane dulcescant, quidam accescant, non nulli fiant austeri, aliqui et acerbi permaneant, tum quidam etiam pingues reddantur. Et sane secundum propositarum qualitatum mixturas variam fortuntur mutationem. Acerbus ad extremum perseverat fructus ilicis, arbuti, fagi, corni: liquidem frigidus siccusq; qualis erat ab initio, permanet, tantummodo mole increscens, nulla præterea magna accedente alteratione: nam & arbores ipsæ tum densissimæ sunt, tum siccissimæ, ac frigidissimæ. Acerbus simul & dulcis, myrti fructus est, & pyri agrestis, ac roboris. Magis tamen dulcis quæ acerbus, fructus castanæ quem nominant. Tamen austerus, vitis amineæ tum fructus, tum vinum, ac quotquot his similia sunt. Austerus unaq; dulcis, fructus palmæ: Et inter vina surrentinum, sabinum, albates, ut vocant, & quæ eius sunt generis: Solummodo dulce, theracum, & scybeliticum, & syracum, & alia quæcunque cum istis conveniunt. Pinguis exacte, tum fructus, tum succus oleæ, tum etiam alij omnes ex quibus oleum conficitur, sicut ricini, raphanidis, & ipsa sesama, nucesq; & amygdala. Nam id genus omnia G vetustate prorsus efficiuntur pingua, quippe in quibus aquea quidam excrementitiaq; humiditas digeritur, propria vero à calore nativo elaboratur atq; exacte concoquitur.

Quod Amara ab Immodico nascentur Calore, & immodice sint calida: Dulcia vero omnia calida sint Miti Caliditate, quæq; non supra modum nostram exuperet caliditatem. CAP. 9.

* ἐν τῇ μετα-
κολῇ.

Quicunque ergo fructus oleosi sunt solummodo, edendo non sunt & dulces: quibus vero alterascentibus amaror quidam advenit, non edendi non possunt. Quippe amarum omne esui ineptum est: taleq; efficitur a caloris excessu, sicuti postea docebimus. Verum dulce omne calidum est, nec immodice calorem nostrum exuperat: immo sicut aqua calida, cuius contactus voluptati est, maxime ubi frixerimus, hætenus videlicet nos exalfaciens, dum concretas frigore in nobis particulas fundat, non tamen soluat, aut secet, distrahatve continuum: ea, inquam, ut summa afficit voluptate, ac utilissima est: sic omne edulium dulce, calidum sane omnino est, sed non tamen calore excedit, ut is lædat, ac molestus sit: sed inter limites se continet fundentis, leuigantis, ac mollientis. Rursus mihi hic memoria repete quæ sæpe antè dixi, quædam esse quæ vel una vel duabus in sese qualitatibus & agunt & patiuntur: quædam vero quæ totis substantiis suis, quorum in numero & medicamentorum non pauca dixi, & nutrimenta universa. Horum duplex esse genus apparet, prout significavit H & Theophrastus. Nam quædam sunt pingua, velut pinguedo: quædam dulcia magis minusve, velut fructus omnes quibus vescimur, & animalium carnes, tum herbarum item multæ, ac radices, floresq; & germina. Nam tamen sunt inter ea quædam acerbæ, sicut pyra sylvestria, & corna, omnino tamen dulcedine participant, nisi summe sint acerbæ, velut galla, rhus: verum ob hæc iam pro medicamentis istis magis quam pro cibis utimur. Apparent enim, quæ citra laborant mulieres, quicq; impleti sunt, & quibus exolutus est stomachus, ea appetere degustare: Alioquin si esuriat, contra respuunt potius tum acerbæ, tum acidæ: expetunt autem ac sumunt quæ dulcia sunt & pingua, hisq; expleri desiderant.

Quod Pingua, atq; adeo Quæcunque nutriunt, ex Dulcium sunt genere. CAP. 10.

Sane vero fortassis & pingue ipsum dulce est, & quicquid nutrit, ex genere est dulcium. Euenit autem id illis non ab re, sed secundum ipsam quantum fieri potest nutrimenti substantiam: quippe nutritio est euacuati repletio. Atqui quod euacuatum est familiare erat: quamobrem & quod nutrit, familiare sit necesse est. Porro si familiare, necessario iucundum amicicq; fuerit, protinus etiam ut ad id quod nutritur, moderate calidum. Sed in hoc non parua est maioris minorisq; ratio, quam nimirum nec ad cibos accedimus plane secundum naturam affecti. Solum enim corpus eorum qui cibum desiderant, inanitum sit oportet, si exacti futuri sint familiaris ipsorum qualitatis cognitores.

Nam

A. l. 2. t. 1. c. 3.
fol. 93. a

A. ibidem g

A. l. 2. t. 1. c. 3.
fol. 93. a

A. ibidem. fol.
94. a

A Nam si præter id calidiores quæ conueniat, aut frigidiores euaserint, seu toto corpore, seu pertinentibus ad linguam ac ventrem locis, non solum quæ nutriant, verum etiam quæ refrigerent aut excalfaciant, postulabunt. Proinde sanè cibi quoque illis aliàs alij videntur iucundiores. Nam cum duplex sit genere iucundum, alterum quod impleat id quod euacuatum est, cuiusmodi est nutrimentum: alterum quod medeatur ei quod alteratum est, id quod iam medicamentum est: euenit utique cibis, ubi non modo vacuatis exhibentur corporibus, sed etiam qualitate aliqua mutatis, ut duobus nominibus delectent, ut cibi scilicet, & ut medicinæ. Sed ut medicamenta quidem, refrigerando quædam, & excalfaciendo, & exiccando, & humectando, ex ratione iuuabunt & proderunt: Ut nutrimenta verò sola ea, quæ cognata sunt, & familiaria totis nutriendorum substantijs. Proptinus verò istis adest, ut moderate scilicet sint ad ea, quæ nutriuntur, calida. Quamobrem nec eduliorum, nec medicamentorum, vna est animantibus omnibus species: siquidem pro sua vnaquæque familiari substantia simul & affectione tum delectantur, tum iuuantur ab vtriusque. Sed si hæc sic habent, id quod in cibis minus erit dulce, minus quoque erit calidum: quod dulcius tanto nimium erit calidius, quāto videlicet dulcius. Sin ad immodicum recidat calorem, nec eiusmodi dulce erit, sed iam amarum apparebit, velut mel vetustum atque decoctum, itidemque aliorum dulcium

B vnumquodque.

Quod Amara Dulciaque partim Adscititio Calore fiant, partim Proprio & ingenito. CAP. 11.

E Tenim ut à moderato calore bifariā cuique corpori dulcedo prouenit: partim enim sunt proprio & innato calore dulcia, partim verò adscititio: ad eundem modum amara. Alia enim sunt quæ suapte natura immoderate excalfaciunt per eas, quæ temporis spatio eueniunt, mutationes: alijs autem id accidit ab acquisititio calore accensis. At de amaris post dicitur. Caterum dulcia calore proxime accedunt ad ea quibus apparent dulcia. Fiunt autem talia (ut dictum est) bifariā: quædam proprio calore, ut mel: quædam adscititio, ut sunt omnia quæ ab igne præparantur, ac proinde dum calida sunt, suauiora ijs, quibus renutritio est opus, apparent. Porro mustum non suo modo, sed & acquisititio calore dulce esse videtur. Multum enim ceu ardoris {Græci *εὐπρόσμου* vocant,} ut Aristoteles & Theophrastus censuere, ex solari calore tum acinis, tum alijs inest fructibus: à quo id quod illis aqueum, ac velut etiamnum semicoctum reliquum est, ad concoctionem ducitur, conficiturque, ac transmutanti simile redditur. Nam ex quibuscunque pomis si succum exprimas, eum protinus non secus atque mustum feruere deprehendes: tanto tamen feruoris discrimine, quanta erit vnius fructus ab alio in calore diuersitas. Sed ubi iam quod aquosum ac semicoctum erat, transmutatum fuerit atque confectum, et is qui feruorem concitabat calor euauerit, iam tum denique quæ propriæ sunt succorum proprietates, synceræ conspiciuntur. Itaque tunc quæ propria vinorum natura sit agnoscimus. Quia in re animum diligenter aduerte, ut austera sensim austeritatem deponant. Semper enim, quæ inueterantur vina, dulcedinem quandam & acredinem adsciscunt: quæ verò prius inerat illis adstrictio, eam tempore abijciunt. Est autem in quibusdam vinis, postquam effierbuerint, dulcedo quædam syncera, suavis, & propria ipsius succi naturæ, non qualis ante erat, mista scilicet ex proprio, atque eo, qui circa semicoctum aquosumque excrementum erat, feruore. Igitur si confessum est vina omnia vetustate fieri calidiora: austera verò primum quidem tempore dulcedinem quandam atque acrimoniam deposita adstrictione acquirere: ac deinde crescente acrimonia sensim dulcedinem deponere: ac subinde rursus maiori tempore acria admodum euadere, assidueque amarescere: ac denique, ubi crassescunt, penitus fieri amara: sanè constat dulce acerbo esse calidius, ac dulci amarum. Atqui si verum est dulcedinem à moderatione prouenire caloris, patet acerbitem à frigido vincente perfici.

Quod & Acidi Succus ex Frigore proueniant.

CAP. 12.

Porro quod & aciditas à frigore procreetur, & antea ostendimus. Veruntamen, quandoquidē in præsentī disputatione de naturali vinorum, quæ temporis spatio fiat, alteratione docuimus, non nihil quoque & de non naturali dicamus. Itaque ut vinum acerbum, tempore dulcius primum, mox acius amariusque efficitur, denique planè etiam amarum redditur: ad eundem modum quod velut rigorem perpassum est, acidius protinus redditur, ac si prorsum refrigeretur, penitus acescit. Itemque quod in fructuum collectione vindemiæque per assiduam pluuiam aliena humiditate impletum fuerit, quodque alio quouis modo humiditate acceperit, leui occasione ea omnia promptè acescunt. Contrà euenit ijs quæ igni admouentur. Nam & protinus statim, & temporis progressu postea semper dulciora euadunt. Quod si multo etiam tempore durauerint, & ipsa nihilo minus quæ cætera amarescunt: videturque id libi quodammodo secundum naturalem consentaneum esse rationem. Nam si omphax acida est, vua verò dulcis: ac fructibus omnibus maturatio à solari prouenit calore: planè est imperfectius & frigidius esse, quod acidum: perfectius verò & calidius, quod dulce fuerit. Cum ergo vinum perfrictione rursus acescat, manifestum est, in eum illud humorē conuerti, ex quo prouenerat. Diuersis tamen hæcenus viribus omphacis succus acetumque constant, Quod aceto accedat ex putrido calore acrimonia quædam: proinde Aristoteles rectè dixit acetum proprio quidem vini calore esse frigidum, adscititio calidum: At omphacis succus calorem adscititium non habet, ac proinde neque acrimoniam. Accedit verò & in substantiæ tenuitate diuersitas.

Quinta Classis.

DDDDD iij

Siquidē

Siquidem omphacis succo acetum tenuius est: cui rei & sensus adstipulatur: excellit enim quæ ab E aceto infligitur frigiditas, eam quæ ab omphacis succo, vehementia & mistione. Imbecillior enim est quæ ab omphace fit refrigeratio, cum etiam alienæ in se caliditatis ne minimum quidem contineat: At quæ ab aceto proficiscitur, tanto est validior, quanto & tenuior: inest verò illi & acrimonia quædam exalfaciens, quæ tamen satis non sit ad superandam ab aciditate prouenientem frigiditatem, verum quæ ad transitus celeritatem subseruiat. Nam quanto calidum frigidum facilius penetrat, tanto acris succus aptior est, qui sensibilibus corporum meatus transeat, quam acidus. Itaque ille velut præcedens viam sternit: hic verò haud longè insequitur: quo tempore sensus perficitur mistus, & qui ægrè exponi queat, utpote qui nec planè frigidum esse acetum denunciet, quippe cum in eo ignea quædam percipiatur acrimonia: nec planè calidum, nam perpetuò, quæ ex præcedente fit acrimonia calfactionem frigus ab insequente aciditate occupans obscurat, protinusque extinguit: quo fit ut maior multo ex frigore percipiatur sensus, quæ ex calore. Porro si plurimo melli aceti paulum admisceas, statim & calorem & frigus manifestè percipies. Nam si paulum mellis aceto permisceas, magis frigidum quod fuerit mistum, quæ calidum videbitur: sin multo melli paulillum misceas aceti, plus calfacere quæ refrigerare conspicietur: & si pari mole utraq; miscueris, acetum tamen etiam viribus superare comperies. Quod si, ut est dictum, plus sit multo mellis quæ aceti, equalia rursus frigus ac calorem in ea mistura conspicias: multis enim numeris acetum plus ab ijs, quæ moderate sunt calida, ad frigiditatem recessit, quæ mel ad caliditatem. Proinde & supra demonstrauimus fieri non posse, ut vehemens coeat cum dulcedine caliditas: vetusque illud verbum pulchre dictum est, Vera inter sese omnia consentanea esse, ac conuenire. Etenim ad hypochondria ardentia præstator est succus omphacis quam ipsum acetum, quod nec violentam ac ferientem habeat frigiditatem, nec eam mordaci admistâ caliditati. Debent enim, qui sic laborant, sine violentia mitigari, ut est dictum, nec foris ullam adsciscere mordacem caliditatem aut acrimoniam. Atque hæc quidem iam curandi attingunt methodum, quæ multis in locis huic tractationi communis est: quare ijs denuo relictis ad propositum reuertamur. Itaque omphacis succus non acidus modò est, sed & acerbus. Nam, ut supra propositum est, omnes prope arborum fructus ortus sui principio, testimonio etiam Theophrasti, gustantibus acerbi sunt: dein ubi humore implentur, accedit quidem aciditas, decedit verò acerbitas. Haud tamè & quod accedit, & quod amittitur, par est in fructibus omnibus, neque si speciem, neque si genus respicias. Etenim inter omphacas aliæ plus acerbis, aliæ aciditatis obtinent: sunt & quæ pari portione ambas sortitæ sint: omnes tamen ad refrigerandos ardores non ab re conueniunt, quippe cum non solum quod acidum est, frigidum sit, sed & quod G acerbum, velut & antè à nobis dictum est. Recedit sane & hic rursus oratio ad curandi methodum: quare & rursus ad propositum illam reuocemus. Porro propositum, ut reor, ab initio in hoc libro fuerat de saporibus omnibus differere: ac nunc quidem ferè de omnibus verba fecimus, interim tamen orationis affinitate & alia attingere coacti. Nec enim de acerbis modò & austero, & acido iam diximus, sed & persepe de dulci, & amaro, & acris: reliqua tamen, quò tota oratio perfecta euadat, adijcienda etiam sunt. Atque in adstringentibus haud ita multum etiam reliquum est, quod non ex iam dictis clarum euadat.

Vnde Arbitrati sunt quidam à Calore Acidum prouenire saporem: Nempe ex eo quòd Vina nequaquam fortia, Vere Aestateque mutentur.

CAP. 13.

AT in acidis deesse fortassis etiamnum videatur, quod eximios quosdam medicos fecellit. Nā eo quod vina inualida vere atque estate alterentur atque acefiant, hyeme verò suas seruent qualitates, hinc adeo quibusdam à calore aciditatem nasci visum est. Quorum auget opinionem & quod vehemētius motum est vinum, & quod longius in nauigijs aduectum: talia enim omnia cum infirma fuerint, celerrimè acefiant. Quin etiam quidam qui de re rustica scribere, dolia in ædibus ad Aquilonem expositis defodienda censent: tãquam frigus scilicet qualitatem eorum seruet, mu- H tet autem caliditas. Sanè verum & id sepe numero ipsa experientia comprobatū constat: acefiant enim vina quædam promptè, ubi in meridianis & Soli expositis locis reposita fuerint. Videorque dictorum hinc iam orsus solutionem. Etenim quod non omnia caliditate acefiant, sed quæ initio tantum frigidiora sunt, nec id veteri alicui accidat, id nobis ad veritatem viam inueniet.

Qua de causa ab Externo calore Vinum natura Frigidum infirmumque Arguatur. Quia si.

Res quælibet in propria natura proprio seruat calore, ab extremis seca verò immoderatione corrumpitur.

CAP. 14.

QVippe causam sermo scrutabitur, propter quam vinum natura frigidum atque inualidum ab extrinseco arguatur calore. Quanquam per verbum, arguatur, iam dictum omnes prius dictæ ambiguitates dissoluantur. Per simile enim quid vinis accidit, quæ natura frigidiora aquosioraque sunt, quale flammis exiguis & imbecillis: quippe si eas ad Solem feruidum exponas, aut prorsus obscurari, aut denique etiam extinguì, conspicias. Sic quoque si ardentem lucernam aut iuxta flammam vehementem magnamque deponas, aut ad Solem feruidum exponas, marcescere utique ac dissipari protinus videbis: quin etiam si validum ventum facias infirmæ paruaque flammæ, citius eam extinxis, quam inauxeris: Natura enim infirma validum neque motum, neque calorem sustinet,

A sustinet, verum ab ijs dissipatur potius quam augetur. Quanquam ex industria multis in locis vina & commouent & transportat, sicuti sane & in Solem efferunt, atque excalescunt, ut etiam quaedam insuauia fiant, fumi contrahentia qualitem. Apud nos sane in Asia in tecta aedium aetate omne prope in lagenas transfusum imponunt, postea in aedita cubicula, sub quibus inferne multa flamma luceat, transportant. In summa autem ad meridiem Solemque cellas obuertunt, in quibus & citius ea maturescant, & potui idonea euadant: nam quod multo tempore alijs, hoc ijs quae sic excalescunt, breuissimo aduenit. Porro nihil mirum est, qui de colendis agris memoriae prodiderunt, ob eam quam de sua regione habebant, experientiam, audacius atque inconsideratius de vinis omnibus definiuisse. At Theophrastus atque Aristoteles experientiam etiam vltiorem naeti, & in perscrutandis naturae rationibus exercitiores, ac diligentius omnia distinguentes, cum multa huiusmodi, tum vero de vinis nos docuerunt, quod simile illis atque corporibus nostris accidat. An non enim et ipsa quoque prout aut robusta sunt, aut infirma, ab iisdem tum iuari, tum ledi conspiciunt? Etenim ut exercitia valida, & Sol, calida atque robusta corpora etiam validiora efficiunt: prosterunt autem & digerunt refrigerantque quae non sunt eiusmodi: sic vina naturam calida motus velut ventilans, Sol excalescens, flammamque iuxta ardentem, celerius concoquunt. Quae vero frigidi-

Bra sunt & dilutiora, eorum arguunt omnia id genus imbecillitatem, celeriusque perpeti cogunt, quae alioqui post passura essent: Quippe cum ita comparatum sit, ut res quaelibet in propria seruetur natura calore proprio: corrumpatur autem ab immoderatione extrinseca, nepe caloris alieni aut frigoris abundantia. Atque quod ab utroque efficitur, vnum est, non tamen vnus generationis modus: quare non aequae idiotis omnibus facilis cognitu est haec corruptionis ratio. Etenim ubi quid rerum calidarum a frigore deuictum est, ne vulgo quidem ignotum est: At ubi a circumstante foris calore validiore digestum ac dissipatum est, eos sane qui circa naturam exercitati non sunt, latet, ignorantes caliditatem mediocrem omnibus esse vtilem, immoderatam vero non minus frigiditate noxiam.

Quod in Saporibus Aciditas proueniat, Calore ipsos quidem incipiente concoquere, non autem perfectam mutationem atque alterationem asferre potente.

CAP. 15.

CAeterum in genere hoc nosse pulchrum est, quod aciditas in saporibus nasci potissimum videtur, dum a calido quidem mutatur, ut tamen non superet: id quod ex acidis ructibus vel maxime conijcias. Nam haudquaquam, ubi nulla prorsum facta in ventre est ciborum alteratio, prouenire solent: quemadmodum nec ubi optime concocti: sed tantum ubi semicocti, ut ita dixerim, fuerint. Voco autem semicoctos, qui a ventriculi calore alterationem perpeffi, non etiam perfecte ab eo superati fuerint. Sic lac, prisanæ succus, & quaecunque eius sunt generis, tempore aestiuo citius accescunt quam hyeme: postulantque aedes frigidas, ut in ijs repolita plusculo tempore perdurent. Ex quibus omnibus patet, quod a calore mutatae quidem, non tamen prorsum vincente, aciditatis generetur qualitas: atque ob id plerisque inest fructibus priusquam maturuerint: idque etiam ijs, quae ab initio de saporibus acidis diximus, consentaneum videtur. Etenim si simile quid illis vsuuenit, quod borealibus constitutionibus accidit, ut tenuis scilicet essentiae sint, simulque frigidi, nasci eos haud sine calore satis constat, sicut nec illum ipsum aerem. Proinde quoque quae summè nos refrigerant ac interrimunt, veluti cicuta, papaueris succus, hyoscyamus, mædragora, minime omnium acida sunt: quippe licet frigidi sint saporis acidi omnes, haud tamen eosque refrigerant, ut interficiant: non enim subtilis forent essentiae, si extremè essent frigidi. Itaque non modo iam quod frigidus sit sapor acidus, sed & quatenus, iam apparuit. Exploranda porro eius natura est in oxylapatho & oxalide, quam etiam oxyda nuncupant: est autem haec olus syluestre: in istis enim maxime mihi syncerus est visus ac simplex, nullius particeps acerbitalis, ut solent arborum fructus: perspicuum enim hi cum acerbitate quadam admistam habent aciditatem, sicut cum acrimonia acetum. Itaque quod proprie in saporibus appellatur acidum, a sola lingua percipi potest, sicut & acre: ceterum quod utriusque commune est, nempe mordacitas, etiam a tactu sentitur: Vtraque vero lingua agnoscere nata est: nam quae communia sunt, sicut & reliqua corpora sensilia: quae vero propria, tanquam gustus organum, percipit: Id quod mihi videtur illi eximium ac peculiare esse iuxta totarum substantiarum tum proprietatem, tum (ut ita dicam) alienitatem. Dictum autem demonstratum quod sepe numero est, nec secius alias quoque repetam, quid sit secundum totas substantias agere, aut pati: immo vero & haecenus eius nunc meminero, quod in rem praesentem satis sit, hinc sumpto initio. Ex quatuor elementis, particulatim corporibus omnibus constant generationes impares mixtura ac diuersae. Si quidem quaedam ignis quam aliorum elementorum in se plus continent, quaedam aquae: sicut alia, si fors ita tulit, terrae, non nulla aeris. Ex eiusmodi itaque imparitate proprietates corporum particularium sunt perfectae: ex elementis quidem, plantarum: ex his autem, animalium, sicut in libris de Elementis demonstratum est. Porro transeunt quaedam quidem protinus in sese mutuo, non nulla vero mediatis alijs: velut terra in triticum, hordeum, & alia id genus: rursum horum vnumquodque in carnem humanam: cum tamen ipsa terra caro ut fiat, sit impossibile, eam videlicet, quae in medio est, mutationem transiliendo. At tamen eorum quae in sese mutuo transeunt, quaedam prompta celerem quae, quaedam diuturnam alterationem obtinent: At quae similitudinibus propinqua sunt, celerem: quae vero remotiora, tardiora. Oportebat itaque, meo quidem iudicio,

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

innasci animantibus organum, quod naturæ similitudines ac dissimilitudines discernendi potest. E-
 state polleret: quod agnoscens rerum naturas, familiaria quidem eligeret, aliena verò refugeret.
 Eiusmodi ergo lingua est, quæ exuberanti sensu non calida modo, frigidaq; humida, atq; sicca, sed
 etiam quæ familiaria, quæq; non familiaria sunt, agnoscit: In hac enim duntaxat particulam com-
 plures inferuntur nerui, cum aliæ omnes aut vnius tantum, aut duorum sint participes, nec ita ma-
 gnorum tñ. Porro cum quædam naturæ nostræ magis sint familiaria, quædam minus: ac partim in
 hac temperamenti coniugatione, partim in illa: necessario plures gustus qualitates extiterunt. Ce-
 terū oīum, quæ nutriūt, cōmunis dulcedo est: nā quicqd nutrit, aut plus, aut minus est dulce. His
 verò quæ non nutriunt, cōmune est id quod per negationem dulcis aut priuationem sic dicitur,
 velut non dulce, & indulce. Particulares aut differentia cōplures meritò euaserunt: quia id quod
 cuiq; rerum familiare est, vnum est, nēpe quia & natura eius familiaris vna: aliena verò plurima,
 partim plus, partim minus, à substantia eius dissidentia. Quæ itaq; summè acida sunt, acerba, aut
 amara, aut simpliciter aliam quāuis qualitatem præter dulcem sortita sunt, ea oīa nutrire nequeūt:
 sicut quæ solum dulcia sunt, omnia nutriūt. Inter ea autem quæ mista sunt, quotquot dulcia simul
 & acerba sunt, & crassioris sunt essentia, & temperaturæ frigida, velut paulo antè ostendimus.
 Quotquot verò acida simul ac dulcia, tenuiora quidem sunt, q̃ acerba, sed & ipsa tñ refrigerant. F
 Quin etiam amara quidem calida sunt, sed acria his etiam calidiora. Nutriunt ergo hæc omnia, si
 iunctam habeant dulcedinem: ceterum per se dictorum nullum, vt nutriat, satis est. Porro dupli-
 ci ratione mista esse assolent, nempe vt dissimilaria sint, & diuersas habeant qualitates in diuersis
 partibus: aut simplicia & similia, sed quæ in mutua eorum quæ multum dissident, altératione
 consistant. Neq; enim mel extemplo fit amarum, sed aut multa coctione aut vetustate amaritudi-
 nem induit: nec id tamē illi nisi pedetentim accidit. Neq; quotquot ex fructibus dulces ex amaris
 euadunt, sicut quidā cucumeres & melopepones, & ipsi repente semelq; ab initio qualitatem abij-
 ciunt: nam ijs omnibus quæ à natura mutantur, sensim fiunt mutationes, potissimum vbi in mul-
 tum, dissidentes aut planè contrarias qualitates alteratio trāsitusq; perficitur. Sicut ergo quod est
 summè dulce, aptum esui est: quod verò lincerè amarum, esui ineptum: sic quæ in medio sunt eo-
 rum, nutriunt quidem etiam, verum minus q̃ dulce. Eadem ratio est in alijs qualitibus: nam nu-
 trire, præter dulcem, nullæ omnino possunt. At elementa multo sanè etiam minus nutriunt, nul-
 lamq; gustui qualitatem offerunt: proinde & terra, et aqua (sunt enim ambo gustui insipida) mi-
 nimè nutrire idonea sunt, sicut nec aer, nec ignis. Itaq; pro horum interim admistione, dulcium sæ-
 pe qualitas exoluitur, aquea ferè essentia in pumilium { *ἐπιγεια* Græci vocāt } fructibus superan-
 te (nam triticum, hordeum, fabæ, cicer, & quæ eius sunt generis, cum propter humiditatem prin-
 cipio qualitatum propè expertia sint, temporis successu maturata ac siccata dulciora euadunt) ter-
 restri verò & sicca in paleis, fœno, gramine, & arundinibus siccis, & lignis. Quorum tamen quæ-
 dam priusquam aruerint, dulcia nobis sunt, nutrimentumq; interdum corpori exhibent, velut pal-
 mæ cerebrum, sic enim nominant summam eius particulam: & gramen: & molles maluarum ra-
 dices, maximè quæ in Ægypto proueniunt: ad hæc plerunq; arborum germina. Siquidē quod
 nutrit, à similitudine, quæ illi est ad id, quod nutritur, dulce apparet: dissimilitudine verò non dul-
 ce. Porro multæ cum sint dissimilitudines, multas proinde necesse est qualitates esse non dulces,
 quas verbis quidem efferri est impossibile: attamen memoriam earū mouere suggerere que quo-
 dam modo licet, cum omnes homines certissime norint alium fieri in lingua sensum atq; affectū
 ab acerbis, alium ab acidis, & alium à salis, alium que ab amaris.

*Aliter, sex.

A. l. 2. t. 1. c. 3.
fol. 93 h

*Qua de Causa quæ Igni admouentur, Alia suauiora, Alia insuauiora efficiantur. Et qua de Cau-
 sa Edulia quædam Cum per sese edi non possint, Suauitatem tamen ijs præ-
 beant, quæ per ipsa præparantur.*

CAP. 16.

ITaq; "quemadmodum edulia, quæcunq; nutriendorum naturæ simillima sunt, ea & dulcedinē H
 summam præ se ferunt, nec vllam præparationem postulant: sic quæ temperaturam nata sunt
 remotiorem, alia condimentis, alia coctione, alia vtroq; indigent. Nec verò mirum est, cum condi-
 mentorum nullū edendo sit, ad suauitatem tñ ijs conferre, quæ per ipsa præparantur: quippe cum
 fieri possit, vt immoderatis duobus coeuntibus, id quod ex ambobus mistum sit, commoderatum
 euadat, ac proinde quoq; dulce appareat, cū immoderata minimè sint talia. Postea verò q̃ & per
 elixationem, & per assationem, & omnino per calidū quiddam, præparatio fit ciborum, nihil etiā
 absurdum est aut ambiguum, quæ prius non erant suauia, tunc fieri suauissima: apparet enim ca-
 lidi natura, qbus admota fuerit, ea celeriter alterare, atq; in aliam speciem mutare. Quocirca nec id
 quoq; dubium est quædam suauiora, quædam vero insuauiora, effici igni applicata: tum quædam
 rēpore minimo, quædam plurimo coqui debere. Etenim quæ nutriendorum corporū tempera-
 turis simillima sunt, ea vel citra coctionem aut præparationem iā dulcia apparent: quæ verò dissi-
 milia sunt, omnia insuauia sunt antequam præparentur. Porro quæ nimis quàm calida sunt, frigi-
 do corrigi debent: quæ verò multū frigida, calidorum mistura ciborum, & igni: ad eundem mo-
 dum humiditate, quæ terrea sunt & sicca: siccitate, quæ plus q̃ conueniat aquea sunt & humida.
 Siccitates ergo, humidorum admistio: humiditates verò, siccorum mistura ignis que emendant.
 Maximam

A. l. 2. t. 1. c. 1.
fol. 91. e

A Maximā rei dictę fidē affert, quę in ore fit mutatio. Nā qui pluscūlum sustinuerunt ieiunium, ijs salua salsa redditur: qui verō plurimum, non salsa modō, sed & amara: sic ē corpus vniuersum, biliosum habitum contrahit: Ac si perinde vt lingua sensu polleret, salēdinē quoq; quę in ipso est, atq; amaritudinem perfacile, reor, perciperet: ad hęc ē ipsam dulcedinem quę naturali inest sanguini. At nunc vbi vase quopiā aut rupto, aut aperto affatim calidus sanguis in linguam effunditur, dulcissimus apparet, vtiq; si fm naturam, vt dictum est, habuerit: nā morbidus, amarus aut salus est, aliam ue eius generis qualitatem prę se fert: At qui in toto est corpore, nos fugit, non aliter q̃ aut bilis, aut pituita. Quāq; et bilis quidem flaua vel minima quapiam parte linguā contingens, perpetuō amara appareat: atra verō, acida. Porro vbi pituita linguam attingit, partim quidem dulcis, partim acida, partim salsa, sæpe est manifestō visa: cum & ipsa in toto animali incognita sit.

Qua de Causa Mel a caliditate validiorem amaritudinem contrahat, Lac vero frequenter etiam

Dulcius efficiatur, Cum tamen vtraque gustui sint dulcia.

CAP. 17.

Nihil mirum igitur neq; cur rerum omnium dulcissimum Mel succum generet amarissimū: neq; cur id maximē ætate florentibus, & calidis natura, et febrientibus accidat. Nam vt foris, cum pluscūlum igni admouetur, amarum efficitur, ad eundem modum & in animantium corporibus, vbi syncerum validum q; nactum calorem fuerit, biliosum succum procreat. At in temperaturis frigidioribus, siue propter ætatem, siue propter naturam corporis, siue etiam ob morbum, facile in bonum & moderatum sanguinem conuertitur. Quippe, cum neq; nimīū in ijs corporibus aut excalfiat, aut alteretur: verū ei quod modicē coctum fuerit, simile quiddam perpetiatur: plane illis adsimilatur, prorsum q; seruat dulcedinem. Et quid obsecro miri, si a valentiore animāus calore, aut longiore coctione veterem mel dulcedinem exuat, cum etiā citra hęc per suum ipsius calorem spatio temporis amarum euadat? Nam in mutationis duntaxat celeritate, haudquaquā q̃ aliā perpetiatur passionem ab alia causa, differentia consistit: quippe & passio est eadem, & causa quę mutat: passio quidem amaritudo, causa verō caliditas immodica. Porro immodicum, quod ad alterationem ducit, duplex est: aut enim in admoti consistit robore, aut in temporis diuturnitate: alterum ex nobis & igni, alterum ex se ipso mel accipit. Et merito sanē tempore maiore id fit ex ipso, si quidem quod mutat, imbecillius est. Ergo quod a minore causa longiori fit tempore, quid mirū est a maiore in breuiori perfici? Cæterum Lac etsi gustu sit dulce, tñ ex sese nunq; amarum efficitur: vincitur enim in eo a frigore magis caliditas, q̃ ipsa vincat: proinde etiam repoliticum acescit. Ex tribus enim substantijs qualitate dissidentibus (velut suprā quoq; dictum est) constat: prima quidē crassa, ex qua caseus conficitur: altera pinguis, ex qua butyrum: et tertia aquea, quod serum nuncupamus. Verum ex hisce pinguis quidem vel maximē temperata est: crassa verō paulum ab ea declinat: at excrementum illud serosum, & frigidum & humidum est. Quare lac vniuersum a modicę caliditatis corpore longo interuallo relinquitur: quapropter ex se acescit potius q̃ amarefcit. Ac si gustari pollet, vbi in ventre & per venas concoctum est, ipso etiam melle dulcius inueniretur: nam, quod foris & ex sese mel obtinet, id dum coquitur, lac accipit: & cum admodum ingēs in animante calor extiterit, tantam acquirit lac dulcedinem, quantam mel deperdit. Recta q; id ratione euenit. Etenim quod summē dulce est, ac proinde etiam nihil apponi ad eius dulcedinē potest, id vt in consequentem verti pergat qualitatem necesse est: at cui quid deest, id per concoctionem acquirit. Proinde sanē lac vbi cruditatem in ventre perpetitur, duplicem suscipit alterationē: In frigidiore nanque ventre acescit: in calidiore nidorosum amarum q; efficitur. Non tamen mel coquendo vnquam aciditatem admittit, quippe cum calidius sit, quā vt vbi non superetur acescat. Itaque vtraque linguam mordicant, tum quod acidum est, tum quod amarum: non tamen id tāquam proprium linguę sensus possidet: quippe si in aliam quamuis carnem cute spoliata ipsa inieceris, & illam sane etiā mordebit. Ex quo constat, mordacitatem a tactu proprie, nō a gutturali sentiri. Quin & quę acria appellantur, velut pyrethrum, allium, cæpa, non linguam modō mordicant, sed & omnem reliquam nostram carnem. Communis quę est mordicatio tribus iis saporibus, acido, amaro, acri: Verum acido quidem, vt frigido simul & subtili, nam & id sæpe monstratum est: amaro verō & acri, vt calidis.

Quod Sapores Acres omnium sint Calidissimi.

CAP. 18.

Quod itaq; sapor amarus calidus sit, modō ostendimus. At de acri vocato, principio ne demonstratione quidem est opus: præuenit enim sensus euentia, rationis fidem. Quare nec quisquā de ipso addubitauit: immo & Plato de eo tāq; omnium calidissimo pronunciat, tum Aristoteles quoq; & Theophrastus. Atq; adeo nec veterum, nec recentiorū medicorū quisq; est qui secus sentiat, quippe cum excalfactio ex essentia eius sit ratione. Itaq; si vel ex plebe quempiam roges, quid vocet edulium acre, dixerit sanē, puto, quod fortiter, dum gustatur, excalfacit, velut piper, pyrethrū, nasturcium, allium, cæpa, & id genus omnia: videtur q; id adeo saporū genus, cū appellatione careret propria, communi per excellentiā vsum. Nā cum & sapor amarus, et sapor acidus, ambo etiā acres sint, in quocunq; tamen corpore vehementem comperimus acrimoniā, tamen neq; amarum sit neq; acidum, acre appellare consueuimus: Quāq; multa in specie sint corpora

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

pora cuiusmodi, alia enim edi possunt, alia esui sunt inepta. Ea igitur quæ idonea sunt esui, dulcem E
quandam, saltem obscuram admistam habeant qualitatem necesse est: proinde multis ipsorum pro
opsonio utimur, multus verò ut condimentis tantum: at ut cibo, ipsorum omnino nullo, id quæ ob
virium vehementiam. Porro eorum, quæ non eduntur, alia mortifera sunt, alia simpliciter medica-
menta: omnia saltem cuti nostræ impolita vlcus celeriter moliuntur. Quin & horum quoque non
nulla qualitatem quãdam amarã præferunt, quemadmodum esculentorum quædã dulcem: non ta-
men vocatur amara, quoniam quidem hæc in eis levis est & infirma, valida aut vis acrimoniæ. Sūt et quæ
ne gustare quidem audeas, cuiusmodi est vel thapsia, vel cātharides, vel aliquod aliud eorum quæ
erolione aut putrefactione interimunt: sed & horum gustum esse acrem ex ijs conijcere licet, quæ
in toto agunt corpore. Multa verò etiã ipso statim odore aliena sunt, plane quæ pugnātiā cum
homine indicant, velut & hæc ipsa quæ nunc dicta sunt, & cicuta, papaueris, mandragoræ, & hyo-
scyami succus. Quin et nuper quoque herbã quãdam conspeximus, quã Centurio quidam ex bar-
barica circa Ægyptum regione comportauerat, odore adeo graui, adeoque inamœno, ut ne gustare
quidem auderem, sed lethalem esse conijcerem: Vrebatur aut ad vrgentes articulorū dolores: atque
ipsis et laborantibus refrigerandi pollere facultate est visa. Est aut colore subflauo, odore tam graui,
et cicuta, nisi quod leuem quandã instar aromatum odoris adferat gratiam. Nomen herbæ ex qua suc- F
cus hic exprimitur, Lycopersium esse dicebat. Verum de facultatibus deleterijs rursus tractabitur.
Scire autem oportet acres sapores omnes (nam de istis agebatur) summè esse calidos, ac deinceps
post illos esse amaros, deinde verò dulces. Cum verò in omnibus ampla sit latitudo, is qui magis
aut acris, aut amarus, aut dulcis est, magis quoque est calidus: qui verò minus, tantum amittit caloris,
quātum abest ab exacta gustus qualitate. Terminus autem seu finis saporis amari est abstergere:
acris verò vrere: at dulcis nutrire: vbi videlicet in sua quisque natura absolutus fuerit, hoc est, vbi
quoad fieri possit, minimè alienis permisti sint qualitibus: Velut amarus prorsum quidẽ est cali-
dus, verum qui modò admodum ex dulci mutatione natus est, & minus amarus est, & minus cali-
dus: at qui iam diu mutatus est, summè amarus est, & proximè ad acrem pertingit, ut nō abstergat
solum, sed etiã exedat & mordicet: velut aristolochia quidem, iris, & panax, id modò possunt, nem-
pe vlcera abstergere, atque expurgare. At vitis agrestis, quæ Græcè staphis agria dicitur, nihilo ab
istis amaritudine vincitur, nili vel ipsa quoque vincat, est enim iam etiam acris, id quæ valde: tū mul-
tum quoque calida, ut non sordem vlceribus auferat modò, sed & ipsam quoque carnem colliquare
possit. Porro quod in vlceribus nati sunt præstare amari sapores, id ipsum in corpus assumpti ef-
ficere valent. Abstergunt enim, expurgantque, et quæ in venis est, crassitiem incidunt. Quam ob rem G
mensiles mouent, educendo quæ ex pectore pulmoneque puri auxiliatur: & in summa, siue crassa in
eis pituita, siue pus, siue aliud quippiam contineatur eiusmodi, expurgant: ea quæ ratione & comi-
tiali morbo competunt, quicunque certè naturam non habent deleteriam: illi enim toto genere
præter naturam sunt. Sed & ijs qui sanguinem spuunt, noxi sunt: quippe cum isti adstringentia
& viscosa, non incidentia diuidentiaque, exposcant. Atque hæc quidem iam quadantenus curan-
di attingunt methodum.

*Qua Differant Amarus Acrisque sapor. Quod si Amarus præterquam quod calidus sit, etiam est siccus:
at Acris, utique qui non exactus est, vberem quandam humiditatem obtinet.* CAP. 19.

Postea verò et de saporibus amaris definiuimus: diximus quæ quod incidendi vim habeant & exte-
nuandi, tum abstergendi, ac nimirum et calfaciendi, hæc tamen, ut non vrant: rursus ad acres
orationem vertamus. Ac primum exactè ipsos calidos dicimus, deinde exedentes, vrentes, cru-
stā molientes, ac denique etiã colliquantes, eosque omnes vel cuti impositos esse huiusmodi: Sin intro in
corpus sumatur, siquidem tota substantia animati cuiuspiam summè aduersentur, putrefacientes omnes
deleteriosque, eius generis animantium: Sin caloris duntaxat immoderatione, si crassæ sint essentia
terreaque, interiora exulcerandi pollere facultate: sin tenuis, urinam mouendi, sudores quæ ciendi vim H
habere: in summa aut, incidendi, & digerendi per halitum: ex quo genere quidam tum expuitio-
nibus ex thorace, tum mensium motibus auxiliantur. Cæterum quoniam sit, quo modo, & qua metho-
do utendum, non est præsentis tractationis exponere: de omnibus siquidem eiusmodi in curandi
methodo differetur. Quare de acrum saporum natura plura scribere super sededo: sat. n. fuerit di-
stinctiones adijcere exactiores, quibus ab amaris differunt. Nec enim sola caliditate vehemēti ab
illis diuersi esse consueuerunt, sed quæ amari omnes non modò calidam habeant facultatem, sed et siccā,
cineri (ut eos quis optime comparet) adsimiles. Acres aut, quicunque utique amari non sunt, multā
interim humiditatem admistā habent, proindeque corporum eiusmodi non pauca à nobis elidantur.
Porro quod nō calidus modò, sed & siccus est omnis sapor amarus, in primis nos maxime quæ discre-
ta docet experientia, de qua sæpenumero verba supra fecimus: lis verò qui præter experientiam per
rationem etiã scrutatur, similiter accidit. Admodum itaque excelsis dulcibus, siue id ab igne, siue
à calore ingenito, amarorum corporum constare generationem indicauimus: quæ protinus consi-
stentia quoque sicciore apparent: Tum verò quoniam absumat semper ac defluat ab eis humor in vapo-
rē à calore solutus, necesse est reliquū terrenius sicciusque effici: quippe cum dulce præterquam quod
calidum

A calidum sit, siue plus, siue minus, necessario sanè & humidum plus minus'ue existat. Si autem corporis nostri naturæ maxime est simile, ipsa vero sit temperatè tum calida, tum humida, id quod ex dulci superaffato prouenit, perinde vt calx cinisq; calidum siccumq; necessario efficitur: proinde abstergere quoq; comminuere, secare crassos viscosos que humores, sicut cinis & nitrum, est natum. Nec enim aerea est, neq; tenuis, neq; aquea eorum consistentia, sed, vt paulo ante dictum est, terrena, exacte à calore elaborata ac velut superaffata ipsorum essentia. In comparatione ergo adstringentium quidem, non parum ijs tenuiora sunt medicamenta amara, vt ad acria vero, crassiora: quam ob rem neq; facile crassos viscososq; humores pertranseunt, velut ea quæ sunt tenuiore essentia: nec incidere, perinde vt crassiora, nequeunt. In medio aut vtriusq; excessus sint oportet, q̄ incisura sunt, nempe vt neq; prompte penetrent perinde vt flamma: neq; dum cunctantur tardatq; disseccare non possint. Verum de istis in sequenti libro, qui ex ordine est quintus, tractabit. Nunc autem tatum nouisse suffecerit, q̄ qualitas omnis amara calidis simul siccisq; substantijs accedit, & præter hæc tenuibus & terrenis. Inaudiendum est autem totum quod dicitur coniunctim, haudquaq; vtrunq; separatim legendum: nam sic, pugnare cū terreno videatur tenue. Verum non simpliciter tenue, sed vt in terrena consistentia tale esse amarum assero, velut calx, & cinis, & quicquid

B exacte peraffatum fuerit, cinisq; redditum: forte autem verius adsimiles fuligini, ac ipsius flammæ fauillæ, quippe quæ gustantibus apparet amara. Ergo crassum & terrenum est corpus, ferrum, ac lapis: fauilla autem & cinis tenue. Ignita itaq; ferrum, lapisq; calce cinere que sunt crassiora, multo que magis q̄ fauilla: ad hæc quoq; & calidiora. Sed ferro lapidi que ignito, ea quæ per erosionem interimunt medicamenta, similia sunt: quæ à corporis nimirum calore huc perducuntur: velut chalcitis, myli, fori: ad hæc arsenicum, hydrargyros, lithargyros, et alia innumera. Crassarum enim sunt partium id genus omnia, ac potestate calida: ac proinde temporis spatio accensa per eam, quæ est in animatè mutationem, non aliter q̄ lapis ferrum que ignitū ventrem tum exulcerant, tū exurunt, cum scilicet in corpus distribui præ gravitate haud possint. Istis autem subtiliora sunt, tamen si & ipsa terrenæ sunt consistentiæ, calx, cantharis, lepus marinus: quorum quædam vsq; ad iecoris pertingunt regionem: quædam verò vsq; ad velicā & pectus, in tato interim itineris spatio igneā acquirunt naturam. Porro aristolochia & iris his etiam subtiliores sunt: quippe quæ tum humidæ essentiæ, tum aeris, plus q̄ illa obtinent: quod hinc constat, q̄ neq; adeo sint sicca dura que, neque adeo grauiā, quapropter & deleterium effugere genus. Sanè vero & cantharis, parce interim sumpta, quibus que oporteat admista, præterq; q̄ velicā nihil offendant, etiā renes expurgat: immo

C & quæ efficaciora conficiuntur ad vrinas mouendas medicamenta, non nihil habent cantharidis. Sed de hisce alijs habebitur sermo.

Quod Sapor Amarus insit Corporibus temperie Siccis: Et, Si planè amarus sit, esculentus non sit.

CAP. 20.

A. L. 2. 21. c. 3.
fol. 93. g

AT^{us} amarus sapor q̄ siccis temperie corporibus insit, hinc colligere licet, q̄ & minime omnium amara putrescant: minime que vermes alia que non nulla animalcula, qualia in radicibus herbis que ac fructibus putrescentibus prouenire solent, procreent, maxime namq; videmus in humidis nasci corporibus vermes, ac putrilaginem. At quæ exacte amara sunt (voco autem ita, quæ nulla sensu notabili alia participat qualitate) omnibus propè animantibus, nedum hominibus, esui inepta sunt: quippe cum animal omne plus minus que sit humidum: amara autem, sicca, haud aliter q̄ cinis & puluis. Itaq; neq; cinerem, neq; puluerem, neq; fauillā, neque calcem aial, vllū etiat, neque eorum quæ planè amara sunt quicquā. Absynthium enim non solum amarum est, sed & adstringit: marina verò aqua salis potius est, quā amara, plurimum in se habens aquæ potabilis: id quod & ab Aristotele olim satis est demonstratum. At aqua quæ est in lacu Palæstinæ in caua Syria, quem alij quidem mare vocat mortuum, alij stagnum bituminosum, gustantibus non salis modo, sed & amara est. Salem verò etiam habet ex sese natum, perinde amarum. Primo que statim aspectu vnā cum vniuerso mari tum candidior, tū crassior apparet, meræ salugini seu muris, similis: in quā si salem iniicias, ne liquari quidem etiā possit, plurimum enim eius in se habet: ac si quis in eā se mergat, continuo sale tenuissimo velut conspersus vndique emergere cōspicitur. Quapropter etiā aqua illa q̄ cetera marina grauior est, id que tato pondere, quāto fluuiāli marina. Itaque ne si te ipsum quidem dimittere velis in profundum, deferri deorsum possis: ita attollit eleuat que aqua: non sanè quia natura levis sit, quod quidā veterum sophistarum prodidit, sed vt censuit Aristoteles, propter gravitatem instar luti que leuiora sunt gestas. Proinde si hominem ligatis manibus pedibus que in stagni illius aquā conieceris, deorsum haud feres. Quin verò, sicut naues in mari onera plura q̄ in fluuijs citra submerisionē portare valent, eundē in modum in stagno mortuo multo plura q̄ in mari: tato enim est quæ in illo est aqua, marina grauior, quāto marina lacustri aut fluuiāli: inest enim ei salis substantia, quæ terrea grauis que est. Ipsi que tibi marinā, si lubet, efficere licet, sale in aqua fluuiāli colliquato, cognoscere que quāto grauior reddatur aqua eiusmodi, quā sit dulcis. Quin & modum iā inuenerunt, moderatam ad salendum conficiendi saluginem, si ouum in ea videatur natare: nam vbi etiamnum sidit, ac non dum super saluginis superficiem innatat, aquosa magis est & dulcis: grauior verò salis est, vbi tanta est salis copia indita, vt amplius liquari

ri qui postea adijcitur nequeat. Quam aquam si pendere non grauaberis, omnium aquarum com E peries grauissimam. Itaque ego quoniam inanem esse diuitis cuiusdam ambitionem ostendi, qui tantam in Italiam maris mortui aquam deuexit, quae cisternam implere posset: nam id ipsum ego expedire praestiti, sale plurimo in aquam potabilem coniecto. Longe etiam grauiorem eiusmodi effeceris aquam, si quam plurimum salis liquatum sub Canis exortum, ubi potissimum effusum iam fuerit valentissimus, torreris siueris, haud aliter quam in stagno bituminoso: sic enim haec aqua perinde ut illa grauis efficietur: ac si ligatum hominem, aut aliud animal, in ipsam conieceris, instar nauis super aquam feretur. Quin vero et amarior protinus quoque eiusmodi erit aqua, si decoquere ipsam in igne lubeat: nam quicquid salum plusculum excalesceris, amarum tibi euadet. Sic & ipsius bituminosi lacus aqua in caua calidaque regione contenta, dum Sole torretur, amara efficitur: proindeque aestate quam hyeme amarior est. Ac si liquidum eius haustum in vase cauo regioneque aprica (quemadmodum nos effecimus) aestiuo tempore deponas, continuo amarior sese reddita videbitur. Verum haec omnia istis quae paulo superius de amari generatione diximus, abunde subscribunt. Caterum cuius gratia oratio ad bituminosum digressa est stagnum, id non dum omne expositum est. Nullum enim in eo neque animal, neque planta inesse conspicitur: immo cum duo in eum fluij confluant longe maximi, pisciumque copia leatentes, maxime qui prope Ierichontem fluit, quem Iordanem nominant, nullus omnino piscium fluuiorum ostia excedit: ac si captos quis in lacum iniiciat, celeriter mori conspiciat: adeo est omnibus tum hominibus, tum plantis, inimicum quod exacte amarum est, & quod squallidum pariter & siccum est, atque natura velut fuliginem ab exaltatione referens. Quanquam ne illius quidem stagni aqua exacte amara sit: quippe cum nec ipse sal: vocant autem cum Sodomenum, a circumiacentibus stagnum montibus, quos Sodoma appellant: multi quae ipsum accolae ad omnia, ad quae nos alio utimur sale, accommodant. Vis eius non modo plus quam cuiusvis alterius salis exicatoria est, sed & extenuare nata, quia si plus quam alius exaltatus est. ¶ Omnis enim salis obscura quaedam adstringendi vis inest, quae eas quae condiuntur carnes constringit, densatque, potissimum ubi durus & minime fragilis extiterit. Talis est exactissimus quidem fossilis fere omnis: Minus autem illo marinus: Tum, qui multis in locis aquis leuiter salis arefcetibus prouenit, tertium locum obtinet, abtergere magis quam adstringere contrahereque potens: Proximas his vires habet Sodomiticus, aequae atque marinus durus: ceterum ob admixtam amaritudinem, facultatem valentius abstergentem ac digerentem quam marinus possidet. Sic & nitrum ipsum, & ipsius spuma, & quod composita appellatione vocatur aphronitrum, ceteris magis extergere possunt, nempe quia minime adstringunt, & exacte sunt amara.

Quod Sapor Salis calidus sit & terrestris, Eaque ratione quadantenus saporis Amaro similis. CAP. 21.

Etenim propinquus est sapor salis amaro: quippe terreni ambo sunt, & calidi: non obscura tamen diuersitate dissident, quod videlicet amarus a calore arido plus sit extenuatus & elaboratus. Sic in genere salis, qui durior est & delior terrestriorque, qualis fere est vniuersus fossilis, minus calidus est, subtiliumque minus partium: qui vero rumpi facili laxusque, tenuior simul & calidior est: in quo genere est & qui subamarus est, mediam quodammodo naturam inter salem durum & aphronitrum obtinens. Sane & inter aphronitra quaedam sunt durae crassaeque essentiae, quaeque nec facile liquari in aqua queant. Verum de prauis non est in hoc loco nobis sermo, sed de istis quae iuxta nominis rationem essentiam habent spumofam, qualis utique est & ipsa nitri spuma. Est enim ea omnium modo dictorum tenuissima, velut & aliae petrae flos: multum enim & hic quoque tenuis est, sed aphronitro minus calidus. Quare utique carniū excrecentiam minore cruciatu colliquat: mordicat autem eas nitri^a spuma: mordicat vero et aphronitrum: nec secius quoque et ipsum nitrum, tametsi illis sit minus calidum. Verum supra monuimus, essentiam crassam plus erodere, ubi nimirum calorem quendam nacta fuerit. Nulla enim eius pars sine cruciatu celeriterque transit, sicut eius quae subtilis est: verum retenta & immorans ac tardans, plusculoque tempore vni corporis nostri particulae inhaerens, haud immerito molesta redditur, instar pali carni infixi.

Quod Odorata omnia Calida.

CAP. 22.

Ceterum, ubi de saporibus omnibus, b) quae conuenire visa sunt, exposuimus, reliquum fuerit de vaporibus differere: quippe cum huius sensibiliū generis gratia, odoris sensum natura crearet. Sane plerique similiter saporibus nos afficiunt. Si quidem acida omnia, & ante ista ipsum adeo acetum similiter odoratum gustumque mouet: tum acrida quoque, velut allia, caepe, & ipsa non minus quam gustum, odoratum quoque offendunt, mordicantque. Sic in alijs singulatim similis propemodum est odoris sensus sensui gustus. Itaque quorundam corporum, etiam non gustantes, qualitatem cognoscimus, veluti fimi: proinde omnino ne gustare quidem aggredimur, quia si admodum fides habeatur odoratiui. Quin etiam si qua boni odoris edulia, putrilagine corrupta, odore nos suo offendunt, protinus ea abijcimus haud gustare dignati. Fereque in omnibus mutuo consentiunt odoratus & gustus: attamen in odore suauissimis, velut rosa, plurimum differunt dissidentque: tamen enim abest ut gustantibus suauia sint, ut amaritudinem non paucam praeseferant, c) tametsi amarum nunquam odoratum est, neque ut medicamen nobis suaue, neque ut cibus. Quae nam igitur huius sit dissonantiae causa, licet Theophrastus quaesierit, tamen praestiterit & quae nos de ea cognoscimus exponere.

Amari

† Cogit mul-
ti ab hac trala-
tione variant,
hic autem inter-
pretatur veterem tra-
lationem imi-
tatus est.

A* Allios.

B + εἰς τὰ
ταῖς ἰστίαις.

C + In cod. gre-
cis impressis le-
gitur καὶ τῶν
τῶν τε πιπρῶν
οὐδὲ πῶτον
ἰστίαις, οὐ-
δὲ ὡς ὁ ἀμα-
ρος ἰστίαις ἢ οὐ
ἰστίαις ἀμα-
ρος nunquam odo-
ratum est, neque
ut medicamen
nobis suaue.
Cod. autem anti-
quissimus hic,
καὶ τῶν τῶν τε
πιπρῶν οὐδὲ
πῶτον οὐδὲ ὡς
ὁ ἀμαρος ἰσ-
τίαις ἢ οὐ
ἰστίαις ἀμα-
ρος. I. ta-
met si apertum
nunc sane nec
ut medicamen-
tum est nobis
suaue. Verum
italatio ita ha-
bet. verum res
amari saporis
non cadit ex ca-
su delectabili
aliqui hora nec
in viam medi-
cine, nec secun-
dum viam cibi.

A. l. 2. r. 1. c. 3.
fol. 93. a

A Amari saporis generationem ex dulcibus à calore extenuatis prouenire iam clare docuimus: ap-
paruitq; calidiora simul & tenuiora temperie esse amara, q̃q; dulcia. Sed & odoris sensus in ipsis ce-
rebri est ventriculis, velut & id quoq; alibi à nobis demonstratum est: et odorabilem vaporosa est
substantia. Ea enim quæ à corporibus defluunt, ambientem permista, ac deinde per narium inspira-
tionem in cerebrum delata, sensum mouent. Recta ergo ratione, quæcunq; odorata, eadem & calida sunt, quippe cum vaporum copia à calore proueniat: non tamen protinus, quicquid odoratum
est, suaue esse colligitur: siquidem non omne id spiritui in cerebri ventriculis contento familiare est.
Etenim quemadmodum qui linguæ obueniunt sapor, ij qui familiarissimi, iidem & dulces erant:
qui verò non familiares, complures habebant differentias: ita odores qui familiares sunt cerebri spi-
ritui, iidem & grati sunt & suaues: qui verò non familiares, multis differentiis à se mutuo dissi-
dent: ceterum non omnibus imposita sunt nomina, perinde ut saporibus. Dicimus enim quippiam
acidum acremq; habere odorem, sed austerum, acerbum, salsum, aut amarum haud etiam dicimus.
Verum in hæc duas appellationes odorabilem pleraq; reducimus, beneolentia & graueolentia
appellantes: beneolentia quidem proportionem quadam ad ea quæ linguæ sunt dulcia: graueolen-
tia verò ad ea quæ non dulcia: vno enim nomine totum hoc in saporibus genus appellari nequit.

† Af. vaporosa,
omnino.

B Videtur autem à corporibus non odoratis aut omnino paucum defluere, aut quod pro mole sua
sit immoderatum, sicut in ijs quæ exacte tum falsa tum acerba sunt. Exacte autem cum tale aut tale
quid dicimus, syncerum, & quantum fieri possit, alterius qualitatis expers dicimus. Siquidem crassa
vtriusq; essentia est, & ad hoc acerbiorum etiā frigida: quare verisimile est, quod ab ijs defluit, paucū
esse & crassum, & mole sua terreum, ac proinde per inspirationem in cerebrum non incidere.

Quod Neq; ex Odore, neq; ex Colore certo quid Definiri de Medicaminum temperie possit. CAP. 23.

I Taq; haud tutum est ex odore de sensibiliū temperatura conijcere perinde ut ex gustu. Nam
quæ odore carent, crassam quidem essentiam obtinent: ceterum quæ sit eorum in calore frigo-
reque natura, id verò non dum constat. At quæ odorata sunt, tenuia vtiq; sunt quadantenus & cali-
da: verum eius tenuitatis caliditatisq; quantitas haud etiā indicatur. Porro maxima potissimaq;
causa, quamobrem in odoratis nihil euidens de temperatura indicari queat, inæqualitas est substā-
tiæ: de qua sæpenumero verba mihi iam habita sunt, ubi demonstrabam corpora pleraq; dissimila-
ri esse substantia. Ac nunc quoq; etiam claritatis gratia vnum exemplum proponā, nempe Ro-
sam, quæ non ea modo ratione dissimilis est, quæ pars quidem eius continet, pars verò continetur
(continens quidem durum & terreum, quod continetur succus est humidus) immo & succi ipsius
tria sunt excrementa, quemadmodum supra necessarium esse demonstratum est, vnum terreum,
quale est in vinis fax: alterum aereum, quod ipsum quoq; vini florū proportionem respondet: ter-
tium aqueum, quod in omnibus bullitionem efficere corruptionemq; diximus, ubi nimirum ne-
que deuictum, neq; planè alteratum ebullitionis tēpore fuerit. Sanè huius excrementi gratia qui-
dam succos non nili coctos reponunt, alij in Sole feruenti præscicatos: nam terrei aeris que gratia
non admodum corrumpendos metuunt, cum ea & separari videant, ægreq; corruptibilem sortita
substantiam, quandoquidem temperamentum nata sunt siccum. Sed de istis supra abunde disserui-
mus. Ceterū in Rosæ natura aliud gustantibus acerbum est, quod terreum ut sit & crassum frigi-
dumq;, necesse est: aliud verò amarum, quod tenue est & calidum: & tertium in ijs aqueum, neces-
sario quidem frigidum, sed in tenuitatis crassitudinis que oppositione quadantenus summorum
medium: cuius mistura neq; ipsum illud acerbum, neq; ipsum amarū, summè est tale, quale dicitur,
qualitates enim omnes exoluit aquei admistio. Ipsum itaq; hoc aqueum elaboratum, extenuatūq;
atq; exalfactum quodammodo videtur, ac proinde facile in vaporem solui, & hac ratione rosa
tum odorata esse, tum celerrimè reficari. Atq; hæc omnia de eo ex gustu conijcias: at per odorem
haud æquè: quippe cum non æquè omnes eius partes euaporent, nec perinde sensum moueāt. In

A. I. 2. 1. 1. c. 3.
fol. 93. e

D gustu autem omnes similiter gustabiliū corporum particulæ in linguam incidunt, sensum que
mouent pro sua natura singulæ. Quare certum tutumq;, ut diximus, non est, de tota medicamen-
torum facultate ex odore conijcere: nā ea sola agnosci possunt quæ modo posuimus. Multo mi-
nus ex coloribus de medicinarum virtutibus colligere quid valeas: quippe cum in singulis colo-
ribus calida, frigida, humida, siccaq; reperias, quemadmodum in primis huius operis commenta-
rijs ostendimus. In quoq; tamen singulatim genere aut seminis, aut radicis, aut succi, ex colore indi-
cationem quandam liceat sumere: utpote capæ, scilla, vinum, quanto fuerint albidiora, tanto & mi-
nus sunt calida: quæ vero subflaua fuluaque, calidiora. Idem vsuuenit tritico, milio, ochris, phase-
lis, ciceri, ireos radici asphodeli que, alijs que compluribus: in quoq; enim genere in vniuersum
fulua, flaua, rubra que omnia albis sunt calidiora. Itaq; etsi hinc quoq; de medicamentorū viribus
coniectura fieri queat, tamen sermoni adijciatur, optimum sanè esse (ut & dictum & ostensum sæ-
penumero est) per experientiam discretam facultates inuenire, in hac enim falli non
possis: quanquam prius quàm experientia virtutem agnoscas,
gustus pleraque indicet, pauculum etiam (ut di-
ctum est) approbante ip-
so odore,

GALENI DE SIMPLICIVM MEDICAMENTORVM FACVLTATIBVS LIBER QVINTVS

ARGVMENTVM LIBRI

De Reliquis agit Principijs earum Facultatum, Quæ post primas calfaciendi,
refrigerandi, humectandi, & siccandi, Medicamentis insunt, &
ex operibus quæ adunt in corpus, denominantur.

Recapitulatio Prædictorum, Quæ veluti Suppositiones ad dicenda erunt.

CAP. I.



Vintum librum de simplicium medicamentorum facultatibus orsurus, ea pri-
mum repetam, quæ supra demonstrata in rem præsentem censent accommo-
da, sumpto ab elementis principio, aqua videlicet, igne, aere, ac terra: quæ nō
nulli à qualitatibus denominantes, humidum, calidum, siccum, et frigidū esse
aiunt. Sunt ergo qualitates hæ, humiditas, siccitas, caliditas, frigiditas. Quæ
verò ab illis denominant corpora, ea sunt tum cōia oīum elementa, tū ea quæ
per harum excellentiā aut humida, aut sicca, aut calida, aut frigida nūcupant:
tum ea quæ ad conueniens siue symmetrum generis eiusdem aut speciei cō-

A. I. 2. t. 1. c. 4.
fol. 94 f

ferunt: quæq; ad quidvis obuium. Sanè de horum differentiā frequēter tractauimus. Nec minus
diximus, quatenus differat nutrimentum à medicamento: & q nutrimentum vincitur ac superatur
ab eo quod nutritur: medicamentum autem contra, ipsum enim vincit atq; superat corpus, cuius
fuerit medicamentum, quippe cum vtriusq; referat ad aliquid notio. Ostensum præterea est medi-
camentum alterare natum esse aut vna quapiam qualitate, nempe aut calfaciendo, aut refrigerādo,
aut humectando, aut siccando, aut dictorum coniugatione quapiam: aut tota sua substantia, sicuti
cōplura deleteriorum seu lethalium medicamentorum, nec pauca alexiteriorū seu amuletorum, tū
purgantia omnia, ac pleraq; eorum quæ epispastica hoc est attrahentia nuncupant. Sed de istis q
reliqua sunt, infra adijciam. Quæ verò vna duabus ue qualitatibus in vniuersum corpus nostrum
agunt, ea hoc in libro exponam, rursus hic sumpta hypothesi superius demonstrata, q simplicium
medicaminum pleraq; dissimilariū sint partium, req; vera composita, ceterum appellant simpli-
cia, q cuiusmodi sunt, talia natura sint, nec quicq; ex nostra industria assumpserint: quin etiam q q-
dam crassarum sint partium, & terrena suis substantijs, quædam tenuia & aerea, alia verò aquea, et
dictorum media. Hæc cū sint superioribus libris demonstrata, hypotheses mihi sunt ad ea, quæ
nunc dicenda veniunt. His ergo pōpositis ordiēda iam oratio est.

A. I. 2. t. 1. c. 1.
fol. 91. c

ὑποκειμένων

De Vsu Medicamentorum.

CAP. 2.

Vsus est frequenter hominibus medicamentorum ob id ipsum tantummodo, vt aut refrige-
rent, aut humectent, aut calfaciant, aut siccant, aut per coniugationem horum quid agāt. In-
terim verò, vt quod supra modum laxatum est contendat atq; contrahāt, aut quod intensum est
laxent: aut quod condensatum est rarefaciant, aut rarum condensent: aut durum emolliant, aut im-
modicam molliciē ad duritatem reuocēt: aut plenum euacuent, aut vacuum impleāt: aut gene-
ris eius aliud quid agant. Nam quisquis perfrixerit, non medicus tm̄, sed cuius etiā ex plebe ab ip-
sa rei natura ductus calfaciens medicamen inuenire desiderat: aut ardenti febre æstuās, quod refrige-
reret. Sic priuatus quispiā si vlcus habeat nimis molle ac humidum, id medicum desiccare iubet:
aut si siccum & exuccum, humectare. Quin etiam cū siccitatem pariter atq; caliditatem toto cor-
pore percipiunt, ceu & qui æstuāt, siue vsti sunt, & qui defatigati sunt, lauari expetunt, frigidamq;
bibunt, tum quicquid refrigerare simul & humectare potest, studiose exquirunt: voti q; sepe com-
potes fiunt. Atq; ipsa natura duce eorum remedia plerique idiotarum inueniūt: at phlegmones,
scirrhi, œdematis, erysipelatis, putredinis, herpetis, gangrænæ, nullus ex illis sibi remedium perue-
stigandum sumit, tanquā vnumquodq; eorum maius iā sit quā pro captu hominis plebei, ac scien-
tiam requirat venerabiliorem. Eam scientiam nuncupant Medicinam, & qui eam exercet, Medi-
cum. Atque hucusque & ipsi procedunt, vt sciant vlcus cauum carne impleri, sordidum purgari
debere, æquabile cicatrice induci: non tamen norunt quid carne impleat, quid purget, quid cicatri-
ce inducat. Sic sanè etiā si musculum habeāt durum aut tensum laxum ue, q duro quidem mollien-
tibus sit opus, tenso autem laxatibus, laxo verò contenditibus, id satis perspiciunt: non tm̄ com-
pertum habent medicamentum, quod aut emolliat, aut laxet, aut contendat, sed ea inuenire opus
est medici. Siquidem inuenias ex plebe quosdam, qui non secus atq; medici medicamentorū pol-
lent inuentione, sed hætenus, dum calida modo ac frigida humida ac sicca perquiruntur: verum
in ijs quæ modo dicebamus, prorsum rudes reperias. Tametsi, ceu ante monuimus, haud omniū
tum calfacientium, tum refrigerantium, tum humectantium, atque exiccantium, æque facilis est
atq;

A. I. 2. t. 2. c. 4.
fol. 94 f

A atq; expedita inuentio. Quippe q̄ napy pyrethrumq; exalfaciunt, & portulaca solanumq; refrigerant, tum aqua & oleum humectant, & acetum & marina aqua deliccant, penè omnibus nō medicis duntaxat, sed & idiotis confellum est: At rosaceum an' ne calfacere, an refrigerare dicendum, similiter acetum, oleum, & eius generis non pauca, ingenti controuersia iactata sunt. Verum de talium facultate in quatuor ante hunc libris disputauimus. In primo ac secūdo sophistarum redarguentes epicheremata, { seu in vtrancq; partem ratiocinationes: } monstrantesq; veram methodū, cuius quis ductū medicamentorum facultates inueniat. In tertio missis sophistis oēs ab initio logicas exposuimus quæstiones, quibus maxime insistas, quibusq; vt sic dicam, artificiose efformatus idoneus sis ac sufficiens, qui medicamentorum omnium facultates inuestiges. In quarto de proprijs linguæ sensorijs disserui, quos sapores appellant, id indicans, quo pascio hinc orsus primas inuenias tum qualitates, tum facultates. Atigi porro ē in extremo libro qualitates odoratus, docens quantum itidem & hinc iuuari queas ad primarum inuentionem facultatum. At in hoc quinto libro aliud mihi propositum est facultatum genus expromere, quas vocare potes secundas ac tertias post primas & omnium communes. Si quidem cum particulatim vnumquodq; non pari modo ex illis temperatum sit, aliud, puto, ex ijs laxatorium euasit, aliud intensorium: aliud emol-

B liens, aut indurans: aut rarefaciens, aut condensans. Tum ex operibus quæ adere nata sunt, facultates in se habere dicta sunt rarefaciendi, condensandi: emolliendi, indurandi: illinendi, extergendi: attrahendi, repellendi: ad hæc laxandi, contendendi: ora referandi, ac contrahendi: incrassandi, extenuandi: dolores sedandi, ac ciendi, illas ἀνωδύνοιας, has ὀδυνησας nominant: concoquendi, puris mouendi: digerendi per halitum, sudoris prouocandi: soporis conciliandi, stuporis accerfendi: animū alienandi, { ecstasias nuncupant: } putrefaciendi, vrēdi, erodēdi, crustam facienti: fundendi, densandi: succum prauum procreandi, attemperandi: purgandi, sistendi: exasperandi, leniēdi: infarciendi, fæctu liberandi. Accūm vltius ēt procedunt, ac propē particulatim opera appellāt, vrinas ciendi, vomitus proritandi, subducēdi ventris ac lubricandi, per nares & os purgādi { quas ἐμπίνοιας & apophlegmaticas vocant, } menses mouendi, aut comprimendi: similiter lacus ac seminis tum generandi & extinguendi, tum prouocandi & reprimendi: Magisq; etiam cum a iecore hepaticas, a liene splenicās, ab auribus oticas, ab oculis ophthalmicas, a dentibus odonticas, a coxa ischyadicās, a renibus nephriticas, a pedibus podagricās, ab articulis arthriticas, a coitis pleuriticas, a tussi bechicas, & a calculis comminuendis λίθων θρυπτικὰς facultates vocitant, ad particulares perueniunt. Pari modo quædam dicta est a procreāda in vlceribus carne facultas sarcotica, ab

C inducenda cicatrice epulorica, a glutinando colletica, a purgatione cathartica, ab excrescentia carnis detrahenda catharetica: fereq; numerari nequeant oēs particulatim facultates, si ab vnoquoq; singulatim eorum quæ perficiuntur, deflexa illis imponere nomina aggrediamur. Sed præclarior sane ac methodo dignius est, si missam facientes orationem tum prolixam, tum confusam, commo dis speciebus compolitās medicamentorum facultates compendio definiamus, non puris mouendi, aut mitigandi, aut doloris sedandi, aut per halitum digerendi, aut laxandi, in triticeæ farinæ cataplasmate facultatem inesse dicētes, sed modicè tum humidam, tum calidam: superius nanq; dictum est, in quo significato eiusmodi dictionem efferamus: Similiter non vrinas, aut menses prouocans, aut bechicum esse medicamen: aut pleuritici, aut peripneumonici, aut purulenti { quos ἐμπύους vocant } congruere: aut morbis comitialibus, & spasmis, & palpitationibus, & tremoribus, & ruptionibus, & spasmatibus prodesse: neq; carne implere, aut purgare sinuosa vlcera: aut lateris, iecoris, lienis ve dolores sedare: neq; chæceradas discutere, aut ex ossibus carnes educere: ad eūdem modum neq; genituræ profluuiū congruere, aut in vteri fomenta vtiliter misceri emollientē & referantem: quin nec q̄ neuos & ephelides detergeat, & inueteratum capitis dolorem sanet, aut foetum corrumpat detrahatq;: Sed sufficit hæcenus dixisse calidam, hæcenus liccam, & eatenus tenuium partium illis obuēnisse temperiem: sic quæ tum omnia quæ nunc memorata sunt, tum longe item plura indicasse: quin alio quoq; modo de ea dixisse sat est amaram esse, sed non extremè, immo ita vt dulcedo quædam admista appareat. At primus doctrinæ modus empiricorum proprius est: secundus virum potissimum rationalē decet: atq; hunc mihi nūc exponere statutum est.

De Pus mouentibus, atq; Emollientibus Medicamentis.

CAP. 3.

Cæterū vniuersa ea quæ quatuor superioribus libris sunt dicta, propria sunt ipsius de medicamentis speculationis, nisi si qñ per affinitatem curandi methodum sermo attingit: At in quo nunc versamur, ad illam magis pertinet: quapropter sæpe consilium mihi fuit, omnino intactum præterire. Verū, qñquidem visum est præexercendos esse eos qui assequi deberent curandi rationis intentiones: & pleriq; ex amicis, potissimum quæ nō, quorum in gratiam hunc tractatum cōscribere sum aggressus, ita me facere censuerunt: idcirco sermonem hunc hoc in libro absoluam, sumpto exordio ab emollientibus, & pus mouentibus, Cum vtracq; sint calida humida quæ, diuerso tamen vtracq; modo: hæc enim ceu simillimum corpori in pus mouendo calorem producentia, absq; vlla existentis in eo humiditatis aut consumptione, aut adiectione: illa verò ceu maiorem q̄ pro natura accendentia, ac nō nihil quoq; humiditatis cōtrahentia. Porro perspicua est notā quæ omnibus pus mouentium notio: siquidem Suppuratio in pus est mutatio.

Tribus

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

Tribus modis dicitur Molle & Durum, partim ut Extreme tale, partim ut Per excellentiam, partim ut Ad symmetrum generis eiusdem, aut speciei, aut quiduis obuuium. CAP. 4.

E

Sed de emollientibus medicamentis, ipsaq; adeo emollitione, non perinde simpliciter loqui licet, quia videlicet nec de duro molliq; corpore. Siquidem partim absolute durum dicitur, ut terra: parum per excessum, ut vnguis, calcar, cornu: partim ad symmetrum sui generis aut speciei, ut hoc animal, puta elephas, aut hic homo, puta Hercules: partim ad quiduis obuui collatum, ut Diogenes ad Aristotelem. Pari modo dicitur molle, aut ut summe eiusmodi, aut per excessum, aut ad symmetron sui generis aut speciei, aut ad quiduis obuuium. Quod vero tripliciter quoq; id genus omnia dicere liceat, partim ut a mistura aliena, summasq; habentia qualitates a quibus nuncupata sunt, partim ut ad symmetron sui generis aut speciei, partim ad quiduis obuuium collata: & qd nihil retulerit, illo an hoc modo dixeris: frequenter mihi ostensum est. Omisiss itaq; ceteris significatis, de mollibus durisq; ut ad optime comparatum hominem, contemplemur: quem sane regulam ac mensuram statuimus omnium quae eum in modum dicuntur: nec tamen ad illius partem quamcunq; puta os, adipem, ues, sed quae temperie media est, nempe cutem, maximeq; ea quae in manibus est, ubi perfecta est tangendi potentia. In vnum autem redit, si quod per excessum ad totam substantiam dicitur, sic molle durumq; appellites, quoniam quidem medium quoddam est tactus noster: uti & Aristoteles visum est, et Plato quoq; sensisse videtur, cum ait, Dura quidem, quibus caro nostra cedit: mollia vero, quae cedunt carni. Nam cutem hominis eo ipso in libro, Timaeo scilicet genere esse carnem ostendit. Quin & Aristoteles cum ait molle esse quod in se cedit, durum quod non cedit, idem quod Plato, sensisse videtur, & maxime quod ad tactum ea iudicanda censeret, tanquam ad medium. Quod vero in comparatione ad quiduis obuuium durum est ac molle, id in eo quod magis minusq; cedat, aut non cedat, iudicari videtur. Quin & ipsam cutem nostram aut musculum aut partem aliam quamlibet cum induratum dicimus, cum naturali eius statu aduentitium affectum conferentes ita nominamus. Sane corporum hoc pacto affectorum ad statum naturalem reditus emollitio est.

Quot Modus sunt Dura? Nempe aut Resiccatione, aut Concretionem, aut nimiam Impletionem, aut harum Coniugationem quapiam. CAP. 5.

Porro cum varie quidq; durius efficiatur, nempe aut siccescens, aut concrescens, aut nimia repletionem adeo ut vehementer distendatur, aut coniugationem quapiam, sequitur ut & propria suaq; cuiq; emolliendi sit ratio. Itaq; de omnibus deinceps distinguamus, interim illud prius commonefacientes, nominum verborumq; copiam plerumq; non esse indecoram, sed potius eius contrarium esse illiberale, quando scilicet non est necesse de illis distinguere. Nam ita & Plato prodigit. Et nobis in praesens necessitas incubit de duri significatis definire, principio rursus ab ijs desumpto, quae modo dicere desuimus. Nam quod in se cedit, molle est, siquidem corpus simplex fuerit: siquidem quod ex pluribus constat aut sese contingentibus, sicut tritici acervus: aut inuicem implicatis, ut lana et pili: simul et cedere potest, nec tamen esse molle. Contra in ijs quae summe plena sunt, velut vires vesicaeque, neutrum latus in se cedit, nec tamen quod continetur durum est: sicut nec quod continet ubi impletum est, durius se ipso euasit, aut aduentitium alium affectum est adeptum, nisi quod nunc tensum est, quod hactenus fuerat laxum. Quam ob rem ego id renitens, {Graece ἀντίτυπον} non durum appello, quoniam nimirum accuratius loqui propono: permitto tamen qui velit durum appellare: quin & ipse persaepe sic nuncupo. Sed illud tamen moneo, non vnam esse induratorum naturam, neque vnam medelam: nam quod a siccitate induratum est, humectari postulat: quod vero a congelatione, excalescere: quod autem a repletionem, inaniri: quod denique a siccitate simul concretionemque, humectari simul ac concalescere: quod vero a congelatione pariter & impletionem, pariter quoque & calferi & euacuari. Siccantur itaq; corpora citra congelationem, tum in validis exercitijs, tum in Sole feruenti, tum in inedia ingenti, tum in febre ardenti, & medicamentis quae ita siccant ut non refrigerent quoque: Congelantur a vehementi duntaxat frigore: Sicut sane & implentur a largi tantum humoris affluxu: At siccantur simul & congelantur, coeuntibus quae simul conuenire possunt causis, ut si quis supra modum labore in frigore: Sic quoque replentur simul & congelantur ab influxu frigido, aut partis refrigeratione. Frigoris rursus ipsius causa triplex est: Vna a foris incidentibus, puta aere, aqua, medicamento, quod saepe facit in erysipelatis: Altera est propria patientis particulae temperies: Tertia ab influente in ipsam humore provenit: nam is saepenumero se ipso calidior effectus est, aut putrescens, aut contactu calidarum naturarum partium alterascens: cum interim quod partibus natura frigidioribus affricuit frigus, plurimo perduret tempore. Atque tot quidem modis corpora tum indurantur, tum molliuntur. At medicamentum emolliens {Graeci vocant μαλακτικόν} non de omnibus his modis efferre videntur, sed peculiariter de ijs, quae congelatione induruerunt, magis quae etiam si in eis contentus sit humor praeter naturam, velut in scirrhis. Quippe si a siccitate induruerit, humectare potius, non mollire id praecipiunt, sicut impleta euacuare, non emollire. Sed de nominibus neque contendere honestum est, neque curiosum esse est necesse: verum rerum insistere diuersitatibus praestat: in quibus liquidum peccatur, ingens aegrotis damnum malumque provenit. Itaq; quod resiccatum est, humectantia postulat remedia, de quibus supra abunde disserui. At quod a frigore congelatum est, excalescentia postulat: quae nec ipsa obscura

A.1.2. t.1. c.3.
fol.92.b

Ascura sunt. At quod impletum est, aut refrigerantia requirit, aut excalfacientia, aut quæ propriè vocantur siccantia: vniuersa liquidem hæc humorē superfluum euacuāt, sed sua ac peculiari quodq; ratione: Frigida quidem duobus modis, nempe repellentia, simulq; cum calore multam educentia humiditatem, licut Aristoteles docuit: Quæ verò excalfaciunt, dum contentum in calefcentibus corporibus humorem in vapores dissoluunt: Quæ autem deliccant, velut quæ vocantur diaphoretica, hoc est per halitum digerentia, & ipsa duplici ratione, aut humores ebibentia, cum poris quibusdam insunt, aut totam alterantia partem. Verum quando tempestiuus cuiusq; sit vsus, nō est præsentis negocij definire, sed ad curandi attinet methodum. Quæ verò à frigore pariter & siccitate induruere, ea excalfacere pariter & madefacere expedit, non licut pus mouentia calore & humiditate secundum naturam attemperatis, sed tanto esse medicamen expedit calidius, quanto exuperauit frigiditas: tantoq; humidius, quanto & vicit siccitas: In quibus mēsuram finire ad curandi itidē methodum pertinet. Sufficiat autem hic medicamentorum speciei formulam quandā exponere, idq; pauculis exemplis. Igitur oleum & aqua calida humectant simul & excalfaciunt. Quod si ambo in vnum misceantur, multo magis tum excalfaciet tum humectabit quod ex ambobus erit mistum, licut aquæ potabilis bālnea cum oleo copioso exhibita. Idē efficit eduliorum

B qualitas, si similiter habeat. Itaq; ingentis famis, quam βοῦλιμον nominant, illiusmodi sunt remedia: Est enim ea affectio frigiditas iuncta siccitati, & sanatio eius per cōtraria perficitur. Enimvero cataplasma quod ex farina triticea conficitur, in temperatis naturis pus mouens, nec quicq; naturalis partium humiditatis aufert, quod quidem relatu sit dignum, multoq; magis nec apponit: licut nec calorem intendere potest, nec hebetare, sed tantum in substantia ipsa augere. Ceterum non idē est, qualitatem intēdere, & augere substantiam. Sed hæc paulo post accuratius ostendam. Attamen id genus medicamenta humida calidāq; dicimus, non ceu calidiora humidioraq; q; nostra sit substantia, sed ceu similem habentia nobis temperiem, quæ calida & humida est iuxta veterum sermonem, velut in libris de Temperamentis ostendimus. Nec tamen sic aquam humidam aut galbanum calidum dicimus: sed illam tanq; quæ carnē nostram riget, hoc tanq; quod cal faciat. Nam, tametsi aqua calida euacuare partes quæ per humorum influxum contumuerunt valeat, similes tamen saltem omnino humectat, licut in primo libro à me monstratum est.

De Medicamentis Pus mouentibus.

CAP. 6.

Medicamenta itaq; quæ pus mouent, eo q; perinde vt aqua calida excalfaciant, superfluum in spatij vacuis contētum humorem per halitum digerunt: licut in libello de Inequali in temperie monstrauimus. Iplis tamen similaribus corporibus secundum naturam affectis, humiditatis nihil neque adijciunt, neque adimunt, quod quidem manifestum sit, & sentiri queat: quippe, cum temperaturam possideant æqualem, earum substantiam tueri potius quàm alterare possunt. Nam in suppurationibus humiditas quidem alteratur, item que siqua sit caro confusa: cetera verò quæ secundum naturam habent, substantiam suam seruant. Etenim cum tres in animalium corpore hant alterationes: Vna planè secundum naturam est, cum videlicet in ventre cibus coquitur, aut in visceribus & valis qui inibi generatur succus, vnde rursus pars vnaquæque nutriatur: Altera contrā planè præter naturam, nempe in putrescentibus omnibus: atque hæc quodammodo inuicem sibi contrariæ sunt: Tertia ex vtraque mista & media est, partim quidquam obtinens primæ ac secundum naturam, partim huius contrariæ quæ est præter naturam. Siquidem alterationi secundum naturam duo hæc insunt, vt & ex familiari animantis materia fiat alteratio, & ab ingenito calore planè superetur: Ei verò quæ præter naturam est, & ab aliena caliditate mutatio provenit, & ad nihil vtile: At media earum, quæ scilicet suppurationes comitatur, ab ingenito quidem fit calore, sed non planè vincente: neq; enim ex materia peragitur quæ prorsum benigna sit, neque tamen ex omnino aliena. Itaque quemadmodum alterationes secundum naturam, quæ ab innato proueniunt calore, à simili extrinsecus iuuantur, pari modo & quæ in mouendo pure conspiciuntur. Nam nihil æquè concoctioni ventris conferre nouimus, atque corpus humanum illud contingens. Proinde quidam pueros noctu ad mouentes per quietem, longè euidētissimum adiuuentum sentiunt: confert liquidem amplius, magisq; multo familiaris est eo calore qui a fermentis paratur. Eiusdē gratia vtilitatis quidam paruos catellos per quietem ventri imponunt, copiam coquentis cibos caliditatis adaugentes, non qualitatem. Tale esse debet quod ad mouendum pus adhibebitur medicamentum, qualis est in naturis temperatis calor natiuus. At si iusto calidior natura fuerit, in eo corpore, quod pus mouebit medicamen, calidius sit oportet: tanto nimium temperato calidius, quāto & natura eius temperatam in caliditate exuperat. Itaq; clarum iam illud est ex curandi methodo, cuiusq; singulatim hominis suum ac proprium esse puris mouendi medicamentum. Nec minus illud constat, quod sepe numero iam demonstratum horum comprobatur testimonio, Omnes medicamentorum facultates vt ad optime temperatum hominem explorandas. Siquidem nulla constitui ars possit, nisi prius velut regula ac scopo generi materiæ, in qua id veisatur constituto, ad illum iam particularia omnia dirigātur. Rursus ergo proposito tanq; scopo quodam in hoc sermone, optime temperato homine, eius respectu aliud esse dicimus medicamentum pus mouens, quàm quod indurata emollit: esseq; eorum temperaturas, quas superius

Quinta Classis.

EEEE

esse

* *lanagra.*

* *Non est in græco. et intellegendum est de lanagra non de polu. Ut apparet etiam ex interpret antiquo.*

* *Vetus interpres legit ignis.*

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

esse posuimus. Eius quidem, quod naturæ in mouendo pure auxilio est, commodatam & simi- E
lem ei corpori cui admouet: ac proinde quod natura nostra humida sit & calida, humida calidaq;
medicamenta eiusmodi frequenter appellari: Eius verò quod indurata emollit, temperata natura
multo calidiorem, non tamen iam valde calidam.

De Ortu Scirrhi.

CAP. 7.

O Ritur autem induratorum affectio ex fluxione viscosa & crassa, paruis particulæ poris si-
ue meatibus impacta: digesta verò per halitum quæ in ea parte est tenui humiditate, ac de-
inde quod reliquum est refrigerato ac velut congelato, vocata sequitur scirrhosis. Ac proinde fri-
gidum pathos aiunt, & per calfacientia curari: Porro, quoniam cum frigiditate humiditas redun-
dat superflua, idcirco etiam compositam eius esse medelam, ob refrigerationem scilicet exalfacien-
tia poscente affectu, ob alienam verò & superuacaneam humiditatem, euacuantia. Vnde fit vt eo-
rum quæ scirrhi in morem indurata sunt, nullum curari valeat neq; à validè exiccantibus, neq; à
fortiter exalfacientibus, neq; ab ijs quæ vtraq; hæc præstare possunt. Nā quæ validè exalfaciunt,
harens ac contentum in particula humidum violenter digerentia atq; elicentia, reliquum omne
desiccant, & incurabile constituunt: Quæ verò fortiter deliccant, etiam si non exalfaciant, tamen
ipsa non per medium, euacuando scilicet quod subtile est, sed ex professo ac ex natura sua ad sum- F
mam duritiem infixam particulæ fluxionem adigunt. Sola igitur ea quæ calfaciunt, sed non ad-
modum, vnaq; exiccant non magnopere, eiusmodi sanare affectus possunt: vocanturq; ea medi-
camenta græcè Μαλακτικά {latine emollientia nomino,} eodem tempore vtrūq; agentia, nem-
pe quod congelatum est fundentia, & sensim per halitum digerentia.

*Emollientia Medicamenta in hoc à Pus mouentibus differunt, quod Emollientia calidiora sunt, & modera-
tè desiccant humiditatem in partibus: Pus autem mouentia humano similem calorem
obtinēt, & quæ in eis est humiditatem seruant.*

CAP. 8.

Q Vapropter calida sunt id genus medicamenta, nec admodum sicca: atq; à pus mouentibus
eo dissidentia, q; calidiora sint & sicciora. Illa enim cognatam ac simillimā corporibus no-
stris caliditatem possident: emollientia verò licet validiorem habeant, non tantā tamen,
vt attractionis violentia reliquum desiccant. Præterea ea quæ pus mouent, humorem qui præfuit
in partibus induratis, seruant: emolliētia verò paulum quiddam eius absument. Proinde quam-
uis innumera sint calfacientia simul atque exiccantia medicamenta, sola tamen ea quæ conuenien-
tem ac symmetrū calorem possident, vnaq; illi respondentem sortita sunt siccitatem, mollire quæ
scirrhi instar indurata sunt possunt: quale est bdellium, styrax, galbanum, ammoniacū thymiana, G
medulla tum ceruina tum vitulina, adeps caprinus & taurinus, & quæ eius sunt generis. Nam nūc
consilium non est omnem expromere materiam, sed solum de id genus facultatibus omnibus ge-
neralem constituere doctrinam. Præstat nanq; in genere de pus mouentibus atque emollientibus
cognoscere, q; illa æqualem accendunt calorem ei, qui est in homine secundum naturam: quæ ve-
rò emolliunt, multo maiorem. Quocirca illa quidem quantitate potius q; qualitate caloris agere
sunt nata: at quæ indurata emolliunt, qualitate potius. Itaq; si in parte, quæ suppuratione indiget,
assiduè impolitas seruare manus, aut aliam quamuis partem possibile foret, celerrimè sic suppu-
ratio procederet. Pari quoq; modo si medicamentum hominis temperaturæ sit quàm simillimum,
ocysimè concoquet quod in pus verti debet: vt est non nunquam caro, nimirum vbi cōtusa fue-
rit, interdum verò humor qui phlegmonem produxit.

Quod Pus mouentia etiam, Emplastica esse conueniat.

CAP. 9.

Q Vin etiam q; emplasticum esse debeat eius generis medicamentum, vt exactè suppurato-
rium sit, & ipsum liquidò mihi apparere videtur. Nam si substantiam innati caloris auge-
re, non intendere qualitatem ipsam, conueniat, poros corporis obstrictos esse necessum
est, quò videlicet halituosos transpiratus includant. Siquidem ea cataplasmata quæ aut detergen- H
tia, aut validius exalfacientia, halitus diffilari permittunt, exiccant quidem, sed pus non mouent.
Talis est hordeacea, cicerum, sœnigræci, fabacea; farina, amplius etiam ærina, eruina, panici, lupi
norum, milij, omnium que adeo exiccantium: quippe cum tum per ea quæ detergunt, etiā si non
admodum exalfaciāt, sed quia obstructione liberant, referāt que meatus, vnà quoq; calor particu-
læ euolet, vt naturalis haudqua; seruetur cōmoderatio: tum ab admodum exalfacientibus hu-
ius etiā non parum vacuetur, & qui reliquus est incalescat: ex quo fit vt natiui caloris substantia di-
minuatur, sed qualitas intēdatur: Quorum neutrum fieri expedit: verum halituosum et calidum
spiritum contineri quāplurimum, & ad vnguem caliditate symmetrum: quippe cum hic in pue-
ris copiosissimus, omnes actiones naturales adaugeat. Sed sunt quos id fugit: & cum hoc q; igno-
rent, Hippocratem in super accusare non verentur, q; dixerit, || Crescentia plurimum habere calo-
ris innati. Sed nos dicta eius haud perperā capere oportet: ac cognoscere innatum dixisse calorē,
quem in quoq; animantium & natium spiritum nominamus, de quo & Aristoteles scriptum re-
liquit. Verum nihil prohibet, sanguineā substantiā simul que aerēam vnā cū spiritu calidū inaudi-
re innatum. Ac Stoici quidem hunc ipsum spiritum animæ esse substantiam autumāt. Nos sanè de
animæ substantia non admodum pronunciare quippiam audemus, & ad præsens superuacaneum
arbitramur:

*A. calor.

*εργα i. opera.

1^a. Aph. 14. Ex.
ord. 7. a. Et de
Nat. hum. cō.
2. t. 13. 7^a. 180. a

*A. feminalē.

A. 1. 2. t. 1. c. 3.
fol. 92. h

Arbitramur: quanquā nos iam antè spiritum innatum, etiam si non sit animæ essentia, saltem primū eius esse instrumentum in cōmentarijs de Hippocratis Platonis quod placitis demonstrauimus. Et certè dicimus eum spiritum in omnibus animantis contineri partibus, sed non vndiquaque esse sui similem, veluti nec sanguinē, esse necesse: Tum in spatijs inanibus nō paruam eius inesse substantiam, immo potius velut materiam quandam, leuiculam etiamnum mutationē exposcentē ad innati spiritus qualitatibus suis absoluti generationem, nihilo secius tñ iam tum etiam admodū ad naturalia opera conducentem. Porro autem vnum ex naturalibus operibus est ea, quæ in pus fit conuersio: nam & illic quædam perficitur coctio: cum autem quidquam coquere consilium est, quā plurimum, meo iudicio, spiritum seruari intus oportet. Atqui digeritur tum ab^a cuāporantibus ac detergentibus, qualis est hordeacea fabacea quod farina: tum à reliccantibus, qualis est panici, lupinorū, milij: tum ab excalfacientibus, qualis est fœnigræci: quin multo etiam magis ab ijs quæ simul & excalfacere & relicare possunt, puta lolio, eruo, cicere, ochris. Igitur omnium ad puris generationem aptissimum est, Ex ijs utique quæ perfunduntur, aqua tēperata: aut cui additum oleum est, quod hydreleum Græci vocant: Ex ijs verò quæ irrigantur, oleum tēperatum:^b † At ex ijs quæ ex hydrelæo illinuntur, farina triticea, & panis ipse: sed is modicè coctus sit oportet. Nam qui plu-

Brimum coctus est, quodāmodo siccior est, aptus quod phlegmonis quæ ægrius concoctionem admittunt: qui verò minus, ijs quæ admodū calidæ sunt, atque, vt sic dixerim, feruent, congruit. Tum cui plus additū olei fuerit, pertinacius coctioni aduersantibus conuenit: cui minus, feruentibus magis cōperit. Et sanè quod ex pane cōficitur cataplasma, difficulter coctioni cedentibus phlegmonis idoneum est, siquidem panis tū sal tum fermentum admixtum est: quod verò ex triticea farina preparatū est, calidioribus vtilius est. Et ipsius etiam triticeæ farinae quod pura est, tum panis quoque qui purus est, puri mouendo competentior est, nimirū cum furfur minus sit calidū, & magis deficiet: farina autem pura, quæ quod alere est nata, humida est & calida: qualia certè ad pus producendū conferre ostendimus. Itaque medicamenta quod phlegmone tētatis imponuntur^c partibus, si calida sint & humida, ad pus mouendū conducunt, vt iadeus suillus, & vitulinus. Nam tauri & capræ aciores esse ostēdimus: quāobrem phlegmonis tū frigidioribus, tum durioribus magis cōgruūt. At suillus & vitulinus, ijs quod propriè phlegmonē appellatur, familiarissimus est. Est & adeps gallinaceorū familiarissimus, magis quod etiam anserū, quodāmodo tñ ad digerendū potentior: est enim substantia sua tenuior, sicut & bubulus & caprarum crassior, & terrenus magis. Quin & agrestium animalium omnium acrior est adeps simul quod siccior multo quod domesticorum, maxime quod pardalis

C & leonis: quare horum nullus omnino puri mouēdo idoneus est, sed, vt dixi, suillus & vitulinus.

Porro pus mouent & pix, & resina, nēpe oleo quopiam aut rosaceo subactæ. Sed & hīc ad feruētes phlegmonas ex rosaceo eas liquare oportet: ad frigidiores verò ex calfacientium quopiam, puta cicino, raphanino, veteri, & licyonio. Quod si quando sola vtaris cera, alijs ad manum nullis ad pus mouendum, & ipsam in excalfacientium quopiam dissoluere oportebit: quippe cū ipsa per se minus sit calida quod vt pus mouere possit: siquidem illinendi certè vim obtinet. Solis itaque feruentibus phlegmonis apta est, ex calidorum oleorum quopiam liquata. Verum quemadmodum hæc symmetria ac mediocritate inferior est, vt ad medias temperie phlegmonas, hominum quod & partium naturas, sic paulum quiddā excedunt resina & pix. Quapropter hæc omnia simul mista moderatè pus mouent. Sed hæc iam ad tractatum de medicamentorum compositione attinent: quem vt aliquatenus attingeremus, speculationis ipsius nos sequela adegit. Rursum ergo ad propositū reuertor: est autem propositū definire, quæ sit in genere pus mouentium natura. Dictum verò est, quod modicè humectantem & excalfacientem esse eam oporteat: quod alijs verbis est, vt neque excellat, neque inferior sit temperatura corporis ipsam immutantis, sed quoad fieri possit simillima.

Caterum, quod medicamentum puri mouendo idoneum tale sit facultate: & actu, siue energia fiat Deiusmodi, dum corpori nostro admotum est: sæpenumero iam antè dictum est: sed nunc nihilo secius id repetimus, quandoquidem vtrobique eius meminisse oportet. Atque eiusmodi est pus mouentis medicamenti temperies. Porro corporis ipsius constitutio emplastica est: qua maxime pollet quæ lenta & viscosa sunt, velut adeps porcine, butyrum, thus, & quod ex farina triticea conficitur cataplasma: quippe quæ moderatè tum calida tum humida lenta que sunt, ac proinde puri mouendo idonea. Chondrus tñ farina triticea siccior est, quanquod nihilo minus lentus sit, nisi forte etiā amplius: vnde fit vt in medijs tēperatura phlegmonis puri mouendo ineptior, in humidioribus etiam triticea farina præstantior sit. Verū & hæc iam præsentis commentationis limites excedunt. Itaque denuo ad medicamentā duritates emollientia reuertor, hæcenus & hīc curadi methodum attingens, quantum dicendorū claritati conducatur. Scirrhus vocant tumore præter naturam, doloris vacuū, sed durum. Sunt autem inter eos quiddā, qui vbi plurimū increuerint, simulatque indurati fuerint, non modo dolore carent, verū etiam sensum exiguum, aut etiam nullum habent reliquum. Porro nascuntur ex humore crasso & frigido, quales sunt in animalium corporibus dūtaxat duo, bilis videlicet atra, & superexiccata pituita. Proinde tumores scirrhosi omnino aut pituitosæ sunt substantiæ, aut atrabiliaræ, aut ex vtraque misti. Sed de agnitione eorum non est nunc tēpestiuum differere, verum de medicamentis emollientibus illud vt nunc dicam opportunum est,

^A In græc. cod. habetur tantum *πυπτόντων* i. detergentibus, & ita in antiqua translatione.

^B † At ex cataplasmatibus⁹ tū farina triticea ex hydrelæo, tum panis ipse. sed id modo dice coctū sit, oportet. Nam quod etc. intellegendū semper de cataplasmate, ut et in necesse interpreti.

^C Alii vlcetibus⁹

Nempe quæ proprie vocantur emollientia, quæ medentur scirrhis tumoribus ex pituita resiccata E crassa quæ prognatis consueuerunt autem in potissimum in musculorum capitibus, & qui ex eis prodeunt tendonibus, consistere. At quæ ab atrabilario succo indurantur, cancrofa sunt omnia, & ab emollientibus medicinis asperantur: sed his quo pacto prospicere oporteat, in Commentarijs methodi curandi docebimus. Quæ verò à lento crasso quæ humore congelato indurata sunt, calida poscunt sicca quæ medicamenta, sed non tamè quæ valida sunt ac violenta: sed sufficit interim vt secundi aut tertij sint ordinis excalfacientium, primi exiccantium. Porro cū non exigua sit in corporibus sic induratis maioris minoris quæ latitudo, necesse utique est & medicamentorum illis medentium non paruam esse latitudinem. Siquidem adeps caprinus, & gallinarum, quæ sic indurata fuere, iuuarunt. Verum illi quidem imbecilliores sunt, & moderatas duritates emolliunt. Valentior gallinarum gallorum quæ adipe anserinus est, caprarum verò hircinus, validior quoque & taurinus, sed minus tamen quæ hircinus. Quin etiam medulla ceruina modicè emollit, & post eā vitulina: quippe cū id genus omnia medicamenta calida sint, & mediocriter sicca, multo quæ magis excalfacere quæ exiccare nata. Vnde liquis forte ea quandoque calida dicat & humida, non repugnandū: nam paulum absunt ab ijs quæ neque humectant neque desiccant. Eodem ex genere sunt, quanquā validiora, ammoniacum thymiana, & styrax, & galbanum, & bdellium scythicum. Sed ad emolliendū præstantiora ex ijs sunt quæ recentia sunt, siquidem inueterata validius quæ oportet desiccant. Id ipsum vsuuenit in medulla & adipe, quippe quæ & ipsa vetustate se ipsis tum acriora, tum sicciora euadunt. Quin & oleū quoque sicyonium ex hoc est genere: nec in postremis id, quod inueteratū est: et ea quæ preparantur, vt fusinum. Sed de compositis hic dicere statutum non est. Porro radix althææ, & cucumeris agrestis, non nullæ quæ aliæ plantæ, partim in oleo, partim in aqua decoctæ, emollientium medicamentorum facultatem induunt: sicut maluæ agrestis folia, tum cruda tum cocta: Atque hoc simplex medicamentum est, sicut porcinus adeps vetustatem passus: sed salis nihil oportet adijcere, sicut nec alijs quæ emolliunt, valde enim desiccant sal. Porro quæcūque alia emollire possunt, seu simplicia seu composita sint medicamenta (alibi enim ea recensuimus) calida sunt ex secundo & interdum ex tertio ordine, leuiter verò sicca: sed & his sanè illinendi vis & emplasticam vocantur insit necesse est, non aliter quæ ijs, quæ pus mouent. Sed quāto maiore euacuandi facultate pollere debent, tanto utique minus etiam meatus illitu obstruere.

Quod Medicamenta Indurantia Humido Frigido quæ sint Temperamento.

CAP. 10.

SANÈ emollientium facultas medicamentorum abunde iam exposita est: proinde deinceps de indurantibus verba faciam. Frigida itaque hæc sint oportet & humida, velut semperuiū, portulaca, psyllium, lenticula palustris, solanum: aut hoc quidem certè non est temperamento humido, sed medium obsoletè humectantis & exiccantis, ex pugnantibus facultatibus compositū, exiccante videlicet & humectante, nimirum cum & duplicem in se habeat substantiam, terrenam & aqueam. Sed iam non est mihi cōsiliū ad particularem materiam sermonē deducere, verum generales dūtaxat breuiter facultates definire. Sanè siquid simul & refrigeret & desiccet, & ipsum profectō omnino indurabit: sed non est ex ijs quæ proprie indurant, siquidem congelatione potius quæ euacuatione durum efficitur corpus, prout supra posuimus. At siquid sit quod proinde quia natium humorem non retinet, induratum est, id siccū potius quæ durum appellabimus: constat quæ eius sanatio rigatione et humectatione, non emolliatione: sicut certè & tenlio curatur laxatione, et laxatio tensione.

De Tendentibus Laxantibus quæ Medicamentis.

CAP. 11.

SED hæc vt se habeant liquido conspiciuntur, cū in cute, quemadmodum & ab Hippocrate dictum est, || Cutis duræ mollificatio, tenfæ laxatio: tum etiam frequenter in articulis. Igitur laxatio provenit humectatis immodicè quæ circa eos sunt ligamentis pariter & tendonibus: tenlio vero non etiam simpliciter, sed aut plusculum exiccatis, aut refrigeratis, aut phlegmone affectis, H aut scirrho. Atque ita quidem in articulis: In cute vero non tētum ita, sed musculis quoque qui ei subiecti sunt quoquo modo in tumorem sublati, nam & præ carnis sæpe copia quibusdam tenditur: quod vero & in phlegmonis id ipsum illi accidat, supra positum est. Quamobrem non simpliciter vna est species laxantium remedium, utpote cū alia humectando, alia calfaciendo, alia vero emolliendo, quædam euacuando, non nulla tumores præter naturam purgando, alia etiam per coniugationem horum quampiam agentia, laxare assolent. At Thessalus, fere quæ sequaces eius vniuersi, sicut in alijs multis, ita & in his appellationes simul cum rebus confundunt, quicquid obuium est, citra ullam examinationem conscribentes. Quamobrem, vbi quæ in manibus sunt absoluerimus, necesse nobis forsitan fuerit aliquando in eos stylum conuertere: In præsentī autem quod dicta continuo sequitur, persequamur, rursum sumpto principio ab ijs medicamentis quæ vocantur emplastica, quia sæpe iam ante & de ijs diximus. Breuiter ergo Emplasticum medicamentum est, quod tenaciter corporis poris siue meatibus illitum inhæret. Porro abundè dictum est nobis de pororū, quos nos statuimus, natura, in libris de Temperamentis. Demonstratum autem est & in libro hunc præcedente, mordacitate vacare omnino debere medicamentum emplasticum: nam siqua illi inerit mordacitas, herere in poris non poterit, sed omnino facile excernetur,

|| lib. de Liquidorū vsu à principio.

*Interpres forte legit καθαίροντα, cum tamen oēs greci cod. quos viderim, habeant καθαροῦντα i. detrahendo, uti se alibi verit: vel destruedo, vt antiquo.

A cerneretur, aut partium aliquam liquando, aut certè humorem aliquem ex alto attrahendo. Sed & illud satis constet, terrenæ consistentiæ et viscosum esse oportere emplasticum.

Quod Poros purgantium Medicaminum Vnumquodq; calidum sit, & tenuium partium:

Nam amara omnia & nitrosa sunt.

CAP. 12.

Sed de istis supra abunde dictum est. Quod verò illi contrarium est, dici queat poros repurgans, & infarctu liberans: sicut & ipsum emplasticum non modo emplasticum dicitur, sed & ἐμφρακτικόν, quasi dicas infarciens. Fuerit autem id sicut effectu contrarium, ita & corporis natura neq; viscosum, neq; mordacitatis expers, sed nitrosum & subtile. Nā in ratione maioris ac minoris inter se differunt, substantiæ genere minimè diuersa, tum emplastica ab ijs quæ sordem nutriūt, tū poros repurgātia ab extergentibus. Nam quæ in superficie sordem auferūt, siue in cute, siue in vlceribus, ea extergentia siue rhyptica nominantur. Quæ vero poros etiam expurgant, ea subtiliorum his partium sunt, et emplasticis cōtraria: proinde pororū ecphrastica & eccathartica, quasi expurgantia & farctu liberantia dicas, appellantur: sunt autem hæc tum nitrosa, tū amara. Atq; cuti extimæ imposita solam nitrosam qualitatem possideant exactam est opus ad ea peragenda, quæ dicta sunt: At intrò in corpus assumpta, etiam si adiuncta sit quædam adstrictio, possint tamē sic quoq; magnos purgare abstergere q; meatus, cuiusmodi sunt in valis. Nam foris meatuū exiguitas prius ab adstrictione occlusa, q̄ probè queat expurgari, non etiam inde in altum abstergentem substantiam recipit, nec expurgatur: At quæ circa ventrem sunt partes omnes, quæ q; in iocinore, liene, alijs q; omnibus visceribus, cum maximos in se meatus habeant, maius accipiunt commodum ex vasorum corroboracione, q̄ propter osculorum exiguitatem ledātur. Proin intus absynthium repurgare potest, foris non potest: quippe quod compositum est, vt supra dixi, ex amara acerbā q; facultate. Quamobrem eius generis medicamenta particulatim vt persequar, nō est necesse. Quæcūq; enim reppereris nitrosa & amara, ea ad purgandos meatus omnes valere noueris. At cutis vniuersæ ac vlcerum sordes non hæc tātum, sed viribus minora auferre possunt, qualia sunt dulcia quæ tenuium sunt partium, puta mel: & ex cerealibus seminibus quædam, vt eruū, fabæ, hordeum, lupini: Quanquam in iplis fabacea hordeacea q; farina tātum extergit, non etiam meatus farctu liberat: erui autem & lupinorum potissimum si amara fuerint, supra q̄ q̄ extergūt, non nihil quoq; meatus purgare valent. Simile quiddam amygdalis accidit: nā & horum ipsorū ea quæ amara sunt, & detergunt, & meatus expurgant: quæ verò edendo sunt, detergunt quidem, non tamen infarctu liberant. Quin & vrticæ semē, non secus atq; eruū amigdala q; amara, meatus purgat. Ex eodem genere scilicet sunt scilla, & iris, et quæcūq; alia vincētem in se qualitatem amaram possident. Siquidem nitrum ipsum per se, & aphronitrum, { & spuma nitri, } & seriphō, & abrotonum, & id genus reliqua, cum cibo potu q; assumpta eandem vim obtinent. Protinus enim his inest vt crassos lentos q; humores extenuādi vim obtineāt, sicut emplasticis oibus crassos leptos q; corporis succos reddendi. Quamobrem lentis ac pituitosis thoracis pulmonis q; humoribus aut puris, & incidendis, & extenuandis, & educendis, aptiora inuenire alia præ istis medicamenta nequeas. Iisdem istis & iocinoris obstructions expurges, & modicas etiam lienis: nam quæ maiores sunt, vehementiora desiderant, nempe capparidis corticem, radices tamaricis, scolopendrium, & scillam, & eam quæ id ipsum nomine repræsentat, asplenos appellata. Sed tamen istis vtendum in quoque viscerum est, ad iecur, iplis per sese duntaxat: ad lienem verò, mistis aceto, aut ei incoctis: ad thoracem pulmonem q; melicrato, ptisanæ, oxymeliti, aut dulcium vinorum cuiuspiam. Sed hæc ad curandi pertinent methodum: proinde in præfens rationibus ea confirmare omitto. Nam & in illo opere, & in alio quod de Componendis medicamentis inscribetur, eas explicabo.

Quod Vrinam Cientia ex Acrum genere sint, ac proinde calida & sicca: Tum quod

Sanguinem serosum seegregent, crassum vero cogant.

CAP. 13.

D Porro quæ necesse est vt dictis adiciam, ea duntaxat expromam, Nempe cum plurimam mouere vrinam annitimur, non admodum dictis vtendum pharmacis, sed quæ acriora sunt, & magis excalfaciunt: dictum siquidem supra est, acre omne esse calidum. Eius generis sunt semen apij, petroselinum, foeniculi, dauci, agrioselinum, smyrnium, & sanè ipsum quoq; feseli, & ammi, & phu, & meon, & asaron, & acoron: a quibus sanguis non extenuatur duntaxat, sed & funditur ac secernitur, nō secus atque lac quod coagulatur seroso videlicet & tenui seorsum segregato, crasso verò in sese coeunte. Siquidem quò facillimè ad se attrahant renes, quod in sanguine aqueum tenue q; ac serosum est, utraq; hæc conferunt, nempe totius sanguinis primum fusio, deinde segregatio: quorum neutrum absq; valido calore peragi queat. Quamobrem puris ex thorace expuitioni ea omnia aduersa sunt: quippe cum natura eorum sit tum excalfactoria exiccatoria q; tum etiam coactoria, & secretoria. Cogitur quidē in sese quod crassum est: excernitur verò ac secernitur in ipso coactu, quod in sanguine serosum ac tenue dēfertur: atque hoc ad sese trahere renes anteuertunt: quod verò coactum est atque exiccatum, haud etiam facile expuitur. Proinde vt modo dixi, incidendi vim habeat eiusmodi medicamentum oportet, sed non tamē insigniter calidā, ne videlicet valide desiccet: ac eiusdē profecto commoditatis gratia cū sorbitionibus potionibus q; humectantibus

ἐμψέεται.

Quinta Classis.

EEEEEE iij

exhiberi

exhiberi pollulat: At quæ renes expurgant, & ipsa quidem incidentia sunt, verum larga humiditate non indigent. Porro quæ callosas siue tophaceas consistentias incidere sunt idonea, & ipsa utiq; admodum incidunt, sed minimum caloris possident: Quandoquidem caliditas porum exiccando contrahit, non incidit neque diuidit: at quæ minus sunt calida, cum hoc quod incidere valeant, meliora quoq; sunt, velut radices regionum asparagorum, & rubi, & betonica, & polium, tū ochra, & vitrum vstum, & ex scilla confectum acetum, & quæ sunt eius generis. At Thessalus infussissimus atq; imperitissimus, sicut pleraque alia artis cōtumelijs ac probris immerito afficit: ita & hæc quoque discerpere contendit, nullum esse medicamentum censens, quod propriè sit aut hepaticum, aut nephriticum, aut pleuriticum.

Quod Rarefacientium Temperies moderata sit caliditatis & siccitatis, consistentiæ verò tenuium partium:

Anastomoticonum aut calidior, mordax, atq; acris, ac crassarum partium: Porro Condensantium

adstringēs & aquea potius: Stipatium verò, crassarum partium, & frigida. CAP. 14.

Sed illius peccata alijs libris detexi. In præsentī autem libro reliquas simplicium medicamentorum facultates edisseram, exordio rursus ab aperientibus ac rarefacientibus {illa anastomotica, hæc aræotica nominant} desumpto. Videntur enim & hæc quodam sanè modo iam dictis esse vicina, nempe quæ extergere, incidere, obstructions tollere, diuidere q; diximus: quanquam F non vndiquaque esse similia. Sanè & horum ante omnia distinguenda notio est, ac sic inquirenda substantia. Quæ cutis meatus referant, Rarefaciētia dicimus: quæ verò vasorum oscula, Aperientia. Quin & illis contrariorum, siquod poros contrahit, Cōdensans appellitant: siquod autē osculum occludit, haud etiā proprio designant nomine, sed generalioribus quibusdā, et Contrahens occludens, constringens, atq; obstruens nominant. Porro vtriusq; natura sic habet: rarefaciētium quidem tum modicè calida est, tum minimè desiccans, tum tenuium partium: aperientium verò, tum crassarum partium, tum acris ac mordax. His porro contrariorum, condensantium quidem frigida sanè, sed non terrena, neq; aerea, sed potius aquea: eorum autem quæ apertiones siue anastomoses occludūt, crassarum partium, & frigida. Exemplā horum sunt, Rarefacientis quidē naturæ chamæmelum, & althæa, & quod ex ipsis præparatur oleum, nec minus quod ex agrestibus conficitur cucumeribus: quin & vetus, & cicinum, & raphaninum oleū ex eadem sunt nota: Aperientis verò facultatis, quæcunque omnia acris sunt simul q; terrena, cyclaminus, allia, cæpe, fel taurinum, vnguentorum q; omnium subsidentiæ quæ simul crassarum sunt partium & calida, cuiusmodi est irinum, & amaracinum, quæ vtrique & occæcatas aperiunt hæmorrhoidas. Porro, quæ vteri os à phlegmone, aut scirrho, aut ariditate occlusum, aperire dicuntur, ex accidenti, non autem G primariò & per se eiusmodi habere facultatem censentur, velut nec ea quæ labiorum à phlegmone occlusorum, aut genarum, aut nariū, aut gutturis, aut præputij, aut sedis, aut alterius eiusmodi oculi instrumenti, phlegmonem sanant, atq; occlusionem corrigunt: ea nanque phlegmonē solvere dicit possint, haudquaquam aperiētia siue anastomotica. Peccat sanè in istis Dioscorides, nō nunq̃ aperientis inquiring facultatis medicamentū quod laxat, aut emollit, aut humectat, aut phlegmonem soluit. Atque rarefacientium & aperientium eiusmodi sunt essentiæ: At eorum q̃ ipsis contraria sunt, Cōdensantium quidem, aque est frigide, semperuiui, portulacæ, tribuli viridis, psyllij, herbæ quam muris aurem vocitant, lenticulæ palustris, & vt semel dicam, quæcunque refrigerant, sed non adstringunt. Proinde & mandragora, cicuta, altercum, papauer, ipsas nunc dico herbas, siquis modice vtatur, condensandi vim obtinent: sin liberalius, nō modo condensandi, sed & obstupefaciendi: si vero etiā plurimum, nō tantum obstupefaciendi, sed & enecandi. At eorum, quæ aperientibus aduersantur, substantia cum sit crassarum partium & frigida, adstringentiū est omnium, quæ quidē admistā non habent acrimoniā. Quorum sanè materiæ abunde multa posuimus in quarto huius exēpla, in quo & essentiā eiusmodi medicaminum terrenam frigidam q; exposuimus. Mirum ergo videri non debet, si sola contrahere occludere q; possit aperta præter naturam vasorum oscula: soli enim huic, quæcunq; requirunt ea quæ cōtrahi debent, oīa adsunt: Nimirum quæ consistentiæ crassitudine foris incumbat, nec paruos meatus penetrare possit: tum frigiditate sua intro premat, atque vndiquaque in sese cōtacta vicina q; corpora cogat ac contrahat: ac proinde quod desiccet (eiusmodi enim esse ostensum est, quicquid adstringit,) humorem depascatur, & partem roboret. Itaque si hæc omnia conueniant, osculum claudetur, ceu à manibus foris, ipsis nimirum adstringentis substantiæ partibus contractū. Ea verò medicamēta quæ frigida quidem sunt aut æquæ, aut amplius, sed substantiā sortita sunt aqueam, ea inquam, debilitèr & contrahunt, & constringunt, nimirum propter molliem: quippe quicquid valenter tum cōstipare, tum constringere debet, robur quoddā renitens & durum habeat oportet: quo cū careant medicamenta naturæ magis aqueæ, tenues quidem poros in vnoquoq; corpore contrahunt atq; condensant, cæterum instrumentum vndiquaq; totum constringere nequeunt. Quamobrè merito talia cōdensantia quidē sunt {græcè πυκνωτικά} nō tñ obstruentia {græcè στεγνωτικά dicta.} Intelligas nūc velim obstruentia siue stegnotica me dicere corpora, quæ sensibiles excretiones cohibēt: corpus enim stegnoticū, quod στεγνέει siue claudit ac cōtinet in se, nec quicq̃ quod sensu queat percipī, ex sese emittit, græcè στεγνόν nuncupatur. Atq; hæc eiusmodi sunt tū tēperature, tū facultatis.

At

A At rarefacientia prorsum quidem calfaciunt: nec enim aliter diffundere & laxare possent substantiam: ad quod consequitur, ut & pori dilatentur. Debent autem non admodum esse calida temperie, siquidem ea iam acria sunt, & inhorre faciant: neque item exiccatoria, nam & hæc sensilia corpora colliquant, dolorem quoque in ipsis excitant.

Quod Escharotica crassa sint consistentia, ac vehementer caustica adeo, ut corpus sensibilibus colliquent.

Ac Septica, quæ non dicuntur proprie caustica, & ipsa colliquant, non tamen ita valenter. Ad

hæc consistentia sunt tenui, ac proinde latentem moluntur colliquatione.

CAP. 15.

I Taque quæ citra molestiam excalfaciunt, ea sola omnium sunt rarefacientia. Si verò non modo calida fuerint, sed etiam consistentia crassa: siquidem vehementia sint, & caustica hoc est vrentia: & ignis instar corpus colliquant, & sæpe escharas hoc est crustas, ritu cauterij efficiunt. Porro si debilius quæ ut vrere possint calfaciant, anastomoticam siue aperiendi vim obtinent. Itaque medicamen omne anastomoticum essentia quidem terreæ simul quoque ignea est, hæc tamen excalfaciens, ut non dum vrat. Si porro causticum sit, non tamen vehementer præterea essentia tenuioris, id planè ab omni aberit mordacitate: aut cum exiguo tum dolore tum morsu carnosas partes eliquabit. Nam quod non confertim alterat, uti quæ vehementer sunt calida: quod quoque non ægrè penetrat, sicut quæ crassæ sunt essentia: latentem ea actionem obtinent. Siquidem alterationes quæ subitè confertæ quoque sunt, mutationes maxime sensibiles sunt: tum penetrationes, quæ violentæ sunt. Quippe quod in crassa essentia causticum est, id cuicumque inhererit parti, stipitis ritu infixum excruciat: verum hoc quidem escharoticum est, perinde ut caustica. Cæterum de quibus nunc agitur, crustam non faciunt, & vocantur septica hoc est putrefacientia, haud quidem appellatione propria, nam quæ verè sunt Septica, humectant simul & calfaciunt: veruntamen symptomatis similitudo, ut sic appellemus, efficit, ut potè cum ab utrisque nullo doloris sensu fiat corruptio. Multis enim modis corrumpi quid potest. Siquidem quæ nimio plus refrigerata sunt, aut excalfacta, tum exiccata, aut humectata, ea omnia corrumpuntur: cæterum non quicquid corrumpitur, σήπεται hoc est putrescere dicimus, sed quibus id cum foetore accidit. Sed de nominibus non admodum esse sollicitum oportet: verum nouisse expedit ea medicamina, quæ Septa & Septica nuncupantur, ut sunt auripigmentum & ἀρσενικόν Græci vocant } sandaraca, chrysocola, dryopteris, pityocampe, aconitum, omnia tum eliquare, tum colliquare, ac potissimum carnem tenellam, id quoque absque dolore. Sed sunt inter ea quædam quæ proprie vocant Cathartica hoc est detractoria, eis quoque vtuntur ad inducendam vlcibus excrescentibus cicatricem. Sunt tamen et ipsa eiusdem genere facultatis, septices scilicet: verum tantulo imbecillioris, quæ extimam modo superficiem, quam contigerint, detrahant, non tamen in altum subire valeant: velut Asiæ petra flos. Quanquam nec talia ipsius re vera facultatis cicatricem inducentis, quam vocant ἐπουλωτικήν, sunt. Siquidem quæ huius sunt facultatis, non detrahere, neque liquare carnem sunt nata, verum indurare & desiccare: cuiusmodi sunt alumen, galla omphacitis vocata, æs combustum, præsertim lotum: nam quod lotum non est, quiddam obtinet catharticum, velut et eris squama: quod autem lotum est, omnium medicaminum cicatricem inducentium longè præstantissimum est, quippe, quod probè cicatricem inducit, modice adstringat oportet, atque desiccet. Quapropter spinæ Egyptiæ fructus, & mali grati putamina sicca, & eius generis vniuersa cicatrici inducendæ sunt medicamina.

Quod Cicatricem inducentia Medicamenta adstrictoria esse & desiccatoria conueniat: Quæ verò

Vlcerum caua implent, mediocriter extergentia, & morsu uacantia.

CAP. 16.

Cæterum confusa est apud plerosque medicorum non solum appellatio, verum etiam omnium id genus medicaminum facultatis cognitio. Siquidem quæ carnem detrahant ac colliquare sunt nata, ea non nunquam nominant epulotica, hoc est cicatricem inducentia, scilicet quod hominum sæpe vsu vlcera ad cicatricem perueniant: sed id neque primario, neque peculiari ipsorum facultate, neque in omni vsu sequitur. Siquidem ad exactum pulueris leuorem redacta id genus medicamenta per specilli cuspidem carnem leuiter contingentia ad cicatricem vlcera perducunt: At si paulo largius vtare, mordicant colliquant quæ carnem, & vlcus cauum efficiunt, contra quam in ijs quæ re vera sunt epulotica: siquidem nili satis magnam eorum quantitatem imponas, nihil proficies. Id enim est in planis vlcibus ad cicatricem ducendis consilium, ut caro alteretur, hæc quoque cutis: id quod perficitur per ea, quæ illam contrahere, constringere, consuppare, densare, præterea siccare, & calli instar indurare valeant: quippe cum cutis velut in callum durata caro sit. Quæ igitur medicamenta sic agere possunt, primario proprie quæ dicuntur epulotica, siue ad cicatricem perducunt: cætera verò, nempe cathartica hoc est detractoria, secundo, & per accidens: sicut & ea quæ absque adstrictione desiccandi vim habent mordacitatis expertem. Nam & hæc quoque ex accidente cicatricem inducunt: cuiusmodi vtiq; medicamentum est myrrha, & lithargyrus, & combusta ostreum & diaphryges: quandoquidem & ipsa sæpenumero cicatricem inducunt sicca illita. Ceterum scire oportet, ubi tum in his libris tum alijs omnibus hanc vocem, sæpenumero, adijcio, id me velle significare, quod aliquando promissa frustrentur, propterea quod nec primario nec sua facultate efficiant. Porro epulotica medicamenta vlcus omne planum claudere cicatrice valent: sicut

Quinta Classis.

EEEEEE iij

mediocriter

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

mediocriter citra q̄z morsum abstergentia cauitates implere. Ceterum de hoc genus medicamen-
torum facultate fulius dicitur in cōmentarijs de Ratione curādī, cum quo multis locis magna est
huius libri affinitas, ceu etiā ab initio p̄fatus sum. Proinde suspēso de istis sermone, ad alterum
genus facultatum, nempe attrahentium & reperiētium, siue repellentiū, transeundū cenſeo.

Quod Attrahentium Essentia & calida sit, & tenuium partium: Reperiētium

Verò & frigida, & crassarum.

CAP. 17.

Igitur Attrahentes sunt, quæ ex alto vehementius extrahunt: Reperiētes verò, quæ in al-
tum occurrentes sibi succos repellunt. At essentia illis quidem calida est, & tenuium partium:
his verò frigida, et crassarum. Attrahit enim perpetuò calidum, repellit verò frigidū: verum quod
cum caliditate coniunctam habet partium tenuitatem, trahit vehementius: quod verò cum frigi-
ditate partium crassitudinē, veluti adstringens, id violentius propellit. Itaqz ex actionis vehemen-
tia nomen vtriqz impositum est. Atqz adstringētium quidem nota est essentia. Attrahētium au-
tem alia sponte nata est: alia verò ex putrefactione acelcente generationem sortita: Sponte nata,
vt dicāmi essentia, & propoleos, & thapsiæ, & sagapeni, & succorū cyrenaici & medici, & si qua
his similis extiterit: Ex putrefactione, qualis est fermenti, & p̄forici quod vocant. Quod si finis
quoqz ex putrefactione generatio constat, vtiqz omnes attrahendi facultate pollebunt. Sed non
parua illis inest diuersitas. Nam columbinus admodum attrahit: ex æquo autem vtrinque ab hoc
recesserunt, ad calidius quidem anserinus, ad frigidius verò gallinaceus: hoc etiam magis vincun-
tur humanus & suillus. At canum stercus simile est medicamentis extergentibus, maximè si ve-
scantur ossibus. Crocodilorum autem terrestrium stercus magis etiam id perficit atque absoluit.

Sed & aliud est attrahentium genus medicamentorum, quod qualitatis familiaritate attrahit: id
quod aliud est nihil, quā totius essentia similitudine: ceu, quæ nutriuntur, familiaria nutrimen-
ta attrahunt. Talium medicamentorum sunt purgantia omnia, & non nulla alexiteriorum siue
amuletorum. Ceterum calida vt sint id genus omnia necesse est. Nam inter ea, quæ essentij simi-
lia sunt, quod calidius est, id potentius attrahit, vtpotè quod similitudini auxiliariū adiunxe-
rit calorem: siquidem cum ipsum duabus caulis attrahat, superabit id quod vna duntaxat trahit.
Porro nihil refert ἐπισπαστικήν, aut ἐλκτικήν, aut ἐλκυστικήν δύναμιν dicas, {latine attrahētem siue
attrahētoriam facultatem.}

Alexiteriorum & Alexipharmacarum Facultatum, Quædam alterando quod mortiferum est, iuuant,

Quædam euacuando. Et alterantium, Aliæ una aut duabus qualitatibus agunt, Aliæ tota

*essentia. Similiter euacuantium, Quædam substantia similitudine euacu-
ant, Quædam caliditate subtenuium partium.*

CAP. 18.

Verum quandoquidem de istis abundè dictum est, transeamus ad facultates quas vocant ale-
xiterias, & alexipharmacas. Est autem harum natura duplex. Siquidem quædam alterant:
quædam verò euacuant ex corpore patiente seu venenum corrumpens, seu deleterium medica-
men. Alterant igitur aut vna qualitate, aut duarum coniugatione, aut deniqz tota substantia: Eu-
cuant totius substantia similitudine, & caliditate subtilium partium. Quatuor itaqz sunt vniuer-
sæ differentie proficiscētis ab illis vtilitatis, duæ alterātes, & duæ vacuātes. Atqz ea sanè quæ qua-
litatis contrarietate auxilio est, manifesta est. Nam si frigidum sit medicamen deleterium, aut ve-
nenum animantis, ab excalfaciētibz petendum remedium: sin calidū, a refrigerātibz: Si verò
humidum, ab exiccantibus: sin siccum, ab humectantibus: Sic etiam si humidum sit & frigidum,
ab exiccantibus & excalfaciētibz: sin calidum & siccum, ab humectantibus & refrigerantibus:
& in reliquis duabus coniugationibus ex proportione. Sed nec obscura est alteratio quæ fit per
totius substantia facultatem, vtiqz ijs qui memoria tenent quæ demonstrata sunt in cōmentarijs
de Naturalibus facultatibus, & in illis quæ inscribuntur de Temperamentis. Siquidem facultates
quæ deleteria medicamina alterant, naturam habent mediam inter corpora perpetientia, & medi-
camenta ipsa lædentia: vt videlicet eadem sit proportio corporis ad facultatem alexiteriam, quæ il-
lius ad deleteriam: & rursus deleteriū ad alexiteriū, quæ alexiterij ad corpus. Ea propter prope-
modum omnia quæ deleterijs aduersantur, si largius sumpta fuerint, grauiter animantis corpus
oblædunt. Quamobrem ea moderatione quātītatis omnes id genus facultates exhibere oportet,
vt neque copia nimia corpus offendant, neque exiguitate sua a deleterijs vincantur. Sed hoc iam
attinet ad curandi methodum. Nunc autem quæ reliqua sunt persequamur. Omne deleterium
venenum a foris impositis medicamentis euacuatur, nēpe aut caliditate attractionē molientibus,
aut totius substantia similitudine. Sed & hic quoad fieri poterit, maximè medium natura alexite-
riū sit oportet, corporis videlicet quod curatur, & veneni lædentis: nam si aduersissimum foret
corpori, in ipsum ageret potius, ceu deleterium, haud euacuaret venenū. Etenim, vt claritatis gra-
tia summam repetamus, scire oportet deleterias facultates vniuersas temperatura esse aduersissi-
mas corporibus, quæ ab ipsis læduntur. Itaqz si à similibus tēperie medicamentis euacuentur, erūt
& hæc corporū naturis contraria. Sanè & sunt quadantenus contraria, non tñ adeo vt interimāt,
sed ambigant potius, in medio sita eorum quæ aperte corpus animantis lædunt, & quæ iuuant.
Porro nihil intererit deleterias facultates, an phtharticas, an phthoropœas, an alio quouis modo
appellare

A. l. 2. t. 1. c. 4.
fol. 95. c

G

A appellare voles: similiter nec an'alexiterias, an alexipharmacas. Attamen si qui ea, quæ venenatarū bestiarum ictus aut venena sanant, alexiteria nominare velint: quæ verò medentur deletæris, alexipharmaca, ceu quidam censuere: disceptandum cum istis ac pugnandum de nominibus non est: Nec enim ex istis comparatur curandi morbos peritia, sed ex rerum ipsarum cognitione.

Quod Anodynorum, hoc est dolorem sedantium, et Paregoricorum, hoc est lenientium, Quædam re vera sunt eiusmodi, velut Calida cum partium tenuitate: Alia vero nomine duntaxat, veluti Narcotica, hoc est stupefacientia, qualia sunt refrigerantia omnia. CAP. 19.

Porro quandoquidem & de his, quod ad præsens conueniat, satis iam expositum est, transeundum deinceps est ad sermonem de facultatibus anodynis hoc est dolorem sedantibus, & paregoricis aut praynticis id est lenientibus aut mitigantibus, aut utcumq; nuncupare libebit. Facultas igitur Anodyna, alia re vera est: alia tantum dicitur, tãquam si quisquam hominem mortuum dicat anodynion, quia dolore vacet. Cæterum facultas re vera Anodyna, est eorum quæ primo ordine excalfaciunt, si utiq; in essentia tenui contineatur: At facultas eorum, quæ dicuntur, frigidior est, quæ absoluto vtentia frigore partem obstupefaciunt: est autem Stupor paulo minus q̃ insensibilitas, sensus ue priuatio. Porro quæ affectum sanando, dolorem sedant, nec ea merito anodyna dici possunt: nam id commune est omnium quæ curât. Itaq; quæ re vera sunt anodyna, partium sint tenuium, & calidiora q̃ quæ symmetra sunt, necesse est, ut scilicet euacuent, ac digerant, tum ra refaciant, extenuent, concoquant, & equabile reddant, quicquid in partibus dolore vexatis, aut humorum acrium, aut lentorum, aut crassorum, aut multorum, tenuibus spiramentis in farctorum: aut etiam vaporosi, aut crassi, aut admodum frigidi spiritus, exitum commodum non inueniētis: inhæsit atq; inclusum est. Itaq; nihil prorsum adstrictionis habeant oportet, ne si pars quidem aut etiam affectus exposcant. Ex quibus liquet, q̃ interdum affectionem non iuuabunt, sed dolorem tantummodo mitigabunt, quando videlicet re vera dicuntur anodyna: Interdum vero etiam affectum ipsum adiuuabunt, & facultatem habebunt duplicem, nempe anodynā, & sanantem. Sed de talibus copiosius agetur in curandi voluminibus. At in præsentī hoc dixisse sufficiat, nempe q̃ horum Anodynorum propriè nūcupatorum medicamentorum quædam, ut est ante dictum, primi sunt ordinis excalfacientium, quæ sanè propriè sunt anodyna, ceu oleum anethinum: quædam verò similiter ut corpus nostrum, velut pus mouentia nuncupata, de quorum materia supra distertum est. Sed de ipsorum usu in libris de curandi ratione definitur. At ea quæ καταφορὰν id est soporem, epota moliuntur, ac proinde anodyna, & ὑπνωτικά hoc est somnum conciliantia, à ple-

Crisq; appellantur, temperiem sortiuntur vel summè aduersam ijs quæ re vera sunt anodyna. Refrigerant liquidem omnia corpus, & sensum eousq; obstupefaciunt, ut si paulo liberalius ebibantur, mortem afferant. Cæterum ad usum propositum optima sunt quæ deliccant: nā quæ frigida cum sint, humiditatis item copiam obtinent, ceu cicuta, ea potui non sunt utilia: Talis est mandragora, excepto cortice eius sicco: & altercum, præter semen: sed tamen & in his candidū semen atro præstat. At sunt quæ tota essentia nobis cōtraria sunt: proinde si vel minimum eorum assumptū fuerit, omnino lædat necesse est, Ceu dryopteris, & pityocampe, & thapsia, & solanum manicum, & hydragyros, & fungorum non nulli, præterea salua & fel venenatorum animalium: Nam talia omnia genere sunt deleteria, non quantitate: ac proinde nihil eorum in alexiterias antidotos inditur, veluti papaueris succus, & myrrha, & styrax, & crocus. Siquidem hæc si largius bibantur, quædam dementant, quædam mortem inferunt: verum conuenienti quadam mensura alijs admitta, adiuuant. Porro quæcumq; inter ea mentem lædunt, continuo etiam pleraq; caput degrauant, vaporum prauorum congerie ipsum implentia. Sed & quædam os ventriculi tentant atq; affligunt, ut et inde caput per consensum lædatur. Communiter verò vniuersa duobus modis cerebrum affligunt lædunt q̃, aut cum tota substantia sunt contraria, aut cum vna duabus ue qualitatibus tem-

Dperaturam immutant.

Duobus Modis dicitur Cathartica hoc est purgans, Facultas, Aut enim quocumq; modo expurgans corporis recrementa: Aut quia vim attractoriam familiarium succorum obtinet. CAP. 20.

Cæterum quoniam de his sufficienter dictum iam est, quod quidem ad præsentia faciat, tempestiuum nunc est, resumptis dictorum capitibus, ea adijcere quæ sermoni reliqua esse videantur. Nam in veritate quidem nihil est reliquum, nimirum cum secundæ iam facultates omnes sint expositæ, quales sint genere scilicet: nec pauca speciatim superius explanata, ceu exempla, unde quis orsus, quorum que auxilio reliquas ipse queas assequi. Verum nihilo sese res deterius habebit, si claritatis gratia breuibus iterum capiubus ea fuero complexus. Primum enim facultatem omnes purgatoriam in ore habent: Non tamen omnes perinde intelligunt, quod vocabulum duo significat, alterum commune omnium quæ quouis modo animalis excrementa expurgant: alterum verò quod per excellentiam de ijs tantummodo dicitur, quæ aut per vomitum, aut per vētris deiectionem, purgant: Neq; q̃ eiusdem est generis tum ea quæ fit per nares, tum ea quæ per os fit purgatio. Vocant autem ea medicamenta, quæ naribus {quas Græci ῥίνας nominant} capitis purgandi gratia infunduntur. Erithina: At quæ in ore colluuntur, aut dentibus mandantur, omnia vna nomenclatura comprehendentes Apophlegmatizōnta nuncupant: ac eorū facultates,

Apo-

A. l. i. f. 4. c. 30. B
fol. 83. h

A. ibid. & l. 2.
c. 4. fo. 95. g

apophlegmaticas appellant. Eiusdem cum istis sunt generis, quæ vuluæ admota expurgāt. Quæ- E
cunq; liquidem purgare memorauī, ea trahendi vim possident, alia vnum quempiam succum, alia
duos, aut etiam plures: & id illis inter sese commune est. Nam quæ crassiss lentis q; humoribus ex-
tenuandis aut vrinam ciere possunt, aut ex pectore pulmone q; eiiciendis excreationibus auxilia-
ri, purgāt sanē & ea quidem quodammodo, verū antedictis non similiter nuncupantur: sed alia
vocantur vretica, alia bechica, alia menses mouentia, hac re à superioribus diuersa, q; non habeant
vim familiarium succorum attractricem, vt illa. Quam ob rem et in hisce sermo aliam distinctionē
postulat, nempe huiusmodi. Quæ in pessis, aut fomentis, aut quouis modo simili, vuluæ admouē-
tur, ea duplici ratione agere consueuerunt. Nam alia calfaciendo duntaxat prouocant: alia faculta-
tibus attractorijs & purgatorijs, quas vocāt, quas demonstrauius trahendorum familiaritate va-
cuationes peragere. At quæ hoc nomine bibuntur, vt sanguinē extenuent, & meatus obstructio-
ne liberent aperiant q; ea trahendi facultate vacuationem non perficiunt. Atq; priora quidem cū
pu-
gantibus eiusdem sunt generis: Secunda verò cum ijs quæ lac & sanguinem generant: de quib-
us paulo infra verba faciemus, vbi prius de bechicis dissertum à nobis fuit: quandoquidem &
hæc bifariam nominata sunt, partim quia tussim prouocent, partim quia sedent. Atqui contrariæ
horum facultates sunt: alia enim extenuandi naturam habent, alia incrassandi. Atq; extenuandi F
quidem facultas, in calidis & tenuium partium substantijs sita est: incrassandi verò, in frigidis &
crassarum partium essentijs inest. Atq; hic sermo hoc in loco finem habeat. Conuenit aut tran-
si-
re ad id quod paulo ante distulimus. Est enim societas & similitudo quædam tum operum tum fa-
cultatum in ijs quæ prouocant sedant q; menses, lac, et semen. Sed & affinia illis quodammodo vi-
cina q; sunt, quæ vrinas mouent, & bechica. Proinde de quolibet seorsum differendum est.

* Ap. semen.

Quod Lac generantium, aut Semen prouocantium Facultas moderatè sit calida & humida:

Alimentorum verò in totius essentia consistat similitudine.

CAP. 21.

LACTIS & seminis effectrices facultates sunt partim in medicamentis tantum, partim in alimen-
tis: In medicamentis, cum succos pituitosos exalfacientes in sanguinem vertimus: In alimen-
tis autem secundum substantiæ totius similitudinem: vbi videlicet boni sunt succi, & moderate hu-
mida, ac tepidè calida, ceu ipsum lac. Siquidē sanguis caloris est particeps animali mediocris: plus
quàm verò mediocris, flaua bilis: sicut pituita, frigiditatis. In medio autem pituita & sanguinis est
lac, utiq; quod ad calorem attinet: non tamen eque ab utroq; abest, sed longius abest à pituita, pro-
pius accedit ad sanguinem. Cum ergo minus quàm expediat ad vbera lac venit, velis autem co-
piose prouenire, ipsum contemplator sanguinem. Aut enim paucior est quàm conueniat, aut de- G
terior. Itaq; qui paucior est, vniuersam victus rationem exposcit humectantem et exalfacientem:
qui autem deterior est, liquidem biliosus fuerit, primum purgationem deliderat, mox victum quē
modo dicebamus: sin pituitosus, medicamenta requirit exalfacientia aut primo aut secundo ordi-
ne, non tamen desiccantia. Verum inter ea potiora sunt, quæ non tantum sunt medicamenta, sed
& nutrimenta, velut eruca, fœniculum, anethum. Dico autem ipsas herbas etiamnum virentes &
humidas: nam siccæ, plus quàm oporteat & exalfaciunt & desiccant. Huius generis est & smyr-
nium, apium, sion, polium, ea q; virentia, prius quàm liccentur: quippe cum ea quæ desiccant, hu-
morem sanguinis depascentia, ipsum crassiores simul pauciores q; efficiāt: tum, si natura quoq;
sint calida, iusto etiam calidiorem: sin frigida, frigidiores: debet enim esse modice calidus, ac neu-
ti quam crassus, vt lac generet. Quocirca quæ sunt illiusmodi, extinguunt magis lac, quàm procreāt:
At quæ sic vt dictum est calfaciunt, nullam q; insignem adiunctam habent siccitatē, lactis procrea-
tricem habere facultatem merito dicta sunt. Verum eo numero sunt perquam exigua. Nec enim
profecto facile inuētu est, quod propositam in temperie sortitum sit mediocritatem: ceterum in-
finita sunt vt ita quispiam dicat, & multitudine incomprehensa, quæ lac lædant. Etenim quæcūq;
plus q; expediat calefaciunt, quæ q; desiccant aut refrigerāt, partim qualitatem ipsius sanguinis vi- H
tiantia, partim ipsum minorem redditia, lac prouenire prohibent.

Quod Menses mouentium Medicaminum Facultas calidior est, & modice desiccant: Alimentorum

uerò est secundum totius substantiæ similitudinem.

CAP. 22.

PORRò dictis adsimilem vim obtinent, quæcunque prouocare aut sedare menses possunt:
vtrorunque enim communis materia est, nempe sanguis in venis contentus. Itaque vbi hic
fluxilis fuerit, & quantitate temperatus, utique abundantem suppeditat copiam. Communes
quin etiam vberibus vtero quæ venæ sunt non exiles: at, quæ nam eæ sint, alibi dictum est. Itaque
vbi ad alterutram partium sanguis defertur, altera siccescit. † Proinde quibus menses mediocri-
ter ferūt, ijs lac in mammillis non colligitur: quibus verò hoc large suppetit, ijs planè menses
supprimuntur. Itaq; mirandum non est, si tum victus, tum medicamenta similia sint, nempe & ea
quæ generant, sedant q; in menses singulos ex vtero purgationem: & ea quæ lactis in vberibus ge-
nerationem procurant, ac supprimunt. Quamq; hæcenus differant, quod & calidioribus & magis
incidentibus purgatio menstrua non nunquam indigeat: quippe cum ea in parte sita venæ ma-
gis aperiri debeant, q; quæ tendunt in mammas: & sanguinem fluxilem magis requirāt, nimirum
cum vterus ad delationem eius nihil conferat. Mittuntur enim in venas quæ illi committuntur,
haud

† Ap. Proinde q-
bus menses ferū-
tur, ijs lac ī mā-
millis medio-
criter colligitur.

A haud attrahuntur menses. At sanguis in vbera non tantum mittitur, sed & trahitur: ac proinde leuiore subsidio medicaminum opus habet, cum non abunde in mammas confluit. Et medicinae quae iuuant ut sanguis in mamillas eat, deficientes atque imperfectas purgationes etiam adiuvant. Sin autem multum oblaesa sint, aut plane retentae, nulla ex eiusmodi eas sanare potest: verum sabina, & merum, & iris, & calamintha, & pulegium, tum dictamnium, asaron, costus, cassia, cinnamomum, amomum, aristolochia, buniū, & eius generis reliqua, absolutas vteri purgationum retentiones sanant: nam talia quoque vrinam promouent. Sed ab ipsis vreticis vocatis medicamentis hoc solo differunt, quod non vehementer deliccant. Siquidem excalfactio tribus generibus medicaminum communis est, puta quae lacti procreando succurrunt, quaeque mensibus ciendis, & vrinae conueniunt. Differunt tamen caloris mensura: tum etiam quod quaedam deliccant, quaedam non. Siquidem quae non deliccant, & modice excalfaciunt, lacti generando vtilia sunt: Quae vero plus excalfaciunt, non tamen valenter deliccant, mensibus eliciendis sunt congrua. Verum & vtraque haec vrinas prouocant: & ad haec cum primis ea, quae calefaciunt & deliccant. Et propter hoc ea peculiariter dicuntur vretica siue vrinam mouentia, non quia sola moueant vrinas, sed quia solas, & non etiam menses aut lac. Nam praeter alia & reddendis ex pectore pulmoneque excreationibus incommoda sunt deliccantia: poscunt enim & ipsa incidi quidem, at non sicari, ceu & renum velicæ quæ calculi. Verum de talibus medicamentis superius disserui.

Quod quæ Semen Prouocant, Quorundam ut medicamentorum quidem, Facultas est flatuosa & calida: Aliorum vero ut ciborum, flatuosa quidem etiam, sed tota substantia familiaris.

CAP. 23.

VT lac, ita & semen quaedam generare dicuntur, & quae his sunt contraria, extinguere: tum quaedam prouocare, & ipsis contraria suppressere: Ac generare quidem, quae procreant quod antea non erat: extinguere vero, quae corrumpunt: Prouocare autem, quae quod in alto delitescbat, in apertum proferunt: & his contraria, quae suppressunt. Igitur semen generant cibi quidem qui bene nutriunt, et flatuosi sunt, totisque substantiis familiares: medicamenta vero flatuosa & calida: Extinguunt autem deliccantia & refrigerantia omnia, & quae totis substantiis sunt contraria. Porro prouocant quaecunque calida sunt & flatuosa absque deliccatione: suppressunt vero contraria. Etenim cum seminis substantia ex bona superfluitate generationem sortiatur, sitque etiam efflatuosa, bene nutriant & flatuosa sint necesse est, quaecunque semen aut procreare, aut prouocare possunt. Itaque bulbi, cicer, faba, polypodes, conus, edulia dicuntur multi seminis, & sunt: at scincus & satyrion medicamenta sunt: porro simul cibiac medicamina multi seminis sunt lini semen & eruca. Ceterum quae refrigerare sunt nata tum edulia, tum medicamina, semen cogentia, incrassantia, & stabile reddentia, vim habent ipsum suppressentem, non autem corrumpentem, nempe lactuca, blitum, atriplex, cucurbita, mora, melopepones, cucumeres seu pepones, seu non pepones, hoc est maturi, seu non. Porro quae resiccant, prorsum ne esse quidem semen permittunt, etiam si calida sint natura, velut ruta. Si autem non calfaciunt, multo minus, ut nymphaea: atque haec sane rationabile est substantiae proprietate: contrarie affecta esse semini. Eandem proportionem tum esculentorum, tum medicamentorum est, inuenire in lacte & mensibus. Porro alio modo sub idem genus cadunt, quae respirantium instrumentorum reiciendis excreationibus auxiliantur, quaeque vrinam ciere possunt: haec enim omnia extenuandi facultatem obtinent, uti contraria incrassandi. Sed de victu extenuante priuatim conscriptum est, nihilo secius in eodem volumine indicatis quae incrassant. Verum extenuantia & incrassantia medicamenta ex libris, qui deinceps sequuntur, seligito: in extenuantibus quidem scopum habens caliditatem iunctam partium tenuitati, in incrassantibus vero contraria. Ostensum enim est in superioribus libris, D quod propria quaedam sit medicamentorum essentiae tenuis natura, non solis excalfacientibus coniuncta. Eadem ratione & incrassantium natura non solis inest refrigerantibus. Ceterum ut in talibus facultatibus proportio quaedam inest, eundem in modum quaerendum est in omnibus, etiam si nomen non sit impositum. Vocantur enim quaedam Oxydercica facultates, quae oculos, ubi nullum illis insit sensibile pathema, male tamen munere suo fungentes, corrigunt & in integrum restituunt. Ac nimirum & in auribus, & in naribus, & per quemque aliorum sensuum singulatum proportionem talis quaedam sit facultas, necesse est: nec tamen facultas nominata est ab acumine auditus oxycoos, sicut nec in olfactu, nec in gustu, nec in tactu, cum tamen in rebus ipsis sensibus ex proportionem insit. Porro si quis similitudinem plus etiam extendat, per quamque nostri particulam, talem existere medicamentorum facultatem necesse est, a qua videlicet melior reddatur partis ipsius actio: ut verbi causa, ventris actio. Siquidem talem eius imbecillitatem inuenire est saepenumero, qualis est in oculis Amblyopia hoc est hebetudo visus, cum is nec phlegmone teneantur, nec influxu torqueantur, nec vlcerati sint, nec aliud quidvis mali perpesi. Et sane in medicamentis, quae affectum ventris eiusmodi emendant, Peptica siue concoquentia nuncupantur, appellationis quidem figura nihil proportionale habentia oxydercicis, ceterum opere ipso & facultate similia.

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

De Facultatibus à Partibus Corporis cognominatis.

CAP. 24. E

Porrò, quoniam & quasdam appellatas à corporis partibus facultates esse diximus, nihilo fuerit deterius & de his differere. Nec enim (quod quispiam forsan existimet) omnibus partis affectibus congruunt: nec ita vni, ut alij nihil prosint: sed quoniam frequentissime aut maxime agant ea in parte, à qua nomen sunt mutuatae: Ophthalmicæ quidem, quandoquidem maxime ac plurimum ad oculos ipsas usurpamus, velut colliriū *διαρόδων*, & aliud *διαπομφόλυγος*, & cygnū apellatum, & lybianum, & alia omnia: quibus uti quidē liceat & ad aures affectas, aut os, aut nares, præterea pudendum, & anum: verum non ita frequenter, nec tanto cum fructu. Rursum autem alias nuncupamus hepaticas, alias splenicæ, pleuriticæ q̄, & stomachicæ: nimirum cum & ipsas ea in parte quam nomine designant, sapissime simul ac potissime prodelle conspiciamus. Porro quæ sit profectus & adiumenti causa, in opere de curandis ratione explicabimus, in quo cætera quoque omnia de medicamentorum usu exponentur. Itaq; nihil etiam hic hærendum atq; immorandum est, nisi q̄ vocabulorum non nihil declarandus est usus: quem cum alij non nulli recentiorum medicorum, tum præsertim qui vocantur Methodici, inaniter innouarunt atq; induxerunt.

De Inani Nominum usurpatione, quam medici recentiores & inter eos maxime Methodici induxerunt.

CAP. 25. F

Nam q̄ Stalticas quasdam facultates, hoc est sistentes seu suppressantes, & constringentes, & contrahentes, & repellentes, aut alias id genus proferant, id nequaquam absurdū est, nec obicurum. At cum metasyncriticas tum materias tum facultates nominant, nec apertum est quod dicunt, nec verum: nec etiam sectæ congruens eorum, qui se fugitare profitentur, quæ à dogmaticis opinionibus {hypoplepsis vocant} proficiscitur, indicationem. Sufficere namq; aiunt sibi apparentes communitates. Atqui excedentibus corporis meatibus ex statu naturali in statum præternaturam, in proprietate excedendi existere quædam pathe, ea dogmatica hypoplepsis est. Sequitur verò ad hanc, quasdam esse facultates, eiusmodi *παθων* metasyncriticas, videlicet {quæ commutent meatuum alienam à natura confusionem:} nam sic usurpant nomina Thessali sequaces: atque ad ea quæ diutina fluxione vexantur, facultates eiusmodi adhibent, cum nec monstrarint meatuum alterationes in talibus provenire affectibus: neq; q̄ hæc medicamenta transmutare {nam ita verto *τὸ μετασχηκρῖν*} vitiatum meatuum statum pollunt, demonstrare valeant. Nam, per Deos immortales, cur obsecro napy, thapsia, pyrethrum, capparis radix, & absolute quæcunque vrere possunt, si diutius corpori inhæreant, meatuum statum commutant? Nam q̄ partes quæ tentantur assidua fluxione, ab hoc genus medicamentis iuventur, perspicuū videtur: at quam ob rem iuuetur, G naturalis speculationis problema est. Ac nos quidem dicimus earum frigidam simul atq; humidam esse temperiem, ac proinde poscere medicamenta, quæ simul & exalfaciāt & desiccant. Atq; alij aliam causam proferent, pro opinione nimirum, quā conceperunt de corporis elementis. Nec tamen usurpari convenit metasyncrises vocabulum à quoquam alterius sectæ, præterquam eorum qui animantium corpora & existimant & appellitant syncrimata seu confusiones ex corpusculis insecabilibus, minimis q̄, & partitionis expertibus, ac similaribus: quanquam nec istis omnibus, sed ijs duntaxat, qui, uti Thessalus in Canone, meatuum alterationi id genus morbos ascribunt. Non enim quā methodicus est Thessalus id dicit (siquidem ubi tanquam methodicus differit, illic ab obscurorum recedit indicatione) sed qua dogmaticus, scilicet ab iisdem quæ Asclepiades ponit, elementis exorsus, cæterum haud ubique sequens. Sed nunc tempus non est super talibus prolixius differere: nam quædam curandi Methodo magis sunt propria, quædam verò in opere de Themisonis & Thessali secta exactius expromentur. Tempestivum itaque nunc est, contractis huius libri velis quiescere, si modo duo illi præterea capita adiecero, Alterum superius dilatum, nempe de facultatibus contrarijs: Alterum ad insequentem sermonem necessarium, definiturus scilicet cuiusque tum exalfacientium, tum refrigerantium, tum exiccantium, atq; humectantium H medicamentorum ordinem.

Quo pacto Contrarias Indicare Facultates oporteat.

CAP. 26.

Igitur contrarias iudicare facultates ex operibus oportet, sicut toto hoc libro sæpenumero ostendimus, dicentes quasdam facultates emplasticas & his contrarias extergentes, tum farctu liberantes & infarcientes, præterea emollientes & indurantes, ac laxantes & contendentes: nam adstringentes, aut acres, aut amaras, aut acidas, aut dulces, non facultates medicamentorum, sed gustus esse qualitates monstrauimus. Itaque in his aut prorsum quærenda non est contrarietas, aut non ut in facultatibus quærenda. Scopus autem in istis duplex est, nempe earum actiones, & temperatura. Actiones quidem, in densando, & rarefaciendo: aut quippiam ex alto extrahendo, aut repellendo: increassando materias, aut extenuando: aut infarciendo meatus, aut farctu liberando. Temperatura verò in calido, frigido, humido, & sicco. De quibus omnibus abunde in quarto libro determinatum est, monstrantibus nobis, q̄ adstringens, terreste sit & frigidū: acidū verò, subtile frigidum: amarum autem, terreste subtile: quod vero est absq; vlla insigni qualitate, frigidum aqueum. Sic acre, igneum ostendimus: salsum verò, terreste calidum, nō dum tamen igneum: similiter dulce, calidum, sed non dum vrens: Quæ verò oleosa sunt, omnia aquea sunt & aeria.

Secuta

ἡ ἀλλοιούσας
δηλονότι τὴν
παρὰ φύσιν
τῆς συγκρίσε
ως ἡμῶν πορο
ποιῶν.

A Secuta sanè sunt temperaturas eorum et opera. Nam adstringens contrahere, constringere, densare, repellere, & incrassare, & ante hæc omnia refrigerare, exicare q̄ natum est: Acidum verò incidere, extenuare, diuidere, fæctū q̄ liberare, perpurgare {διαναθαίρειν Græci vocant} citra excalfactionem: Acre verò similiter vt acidum agere, q̄ ad extenuationem perpurgationem q̄ attinet: cæterum hoc differt, q̄ acidum refrigeret, acre verò excalfaciat: ad hæc q̄ illud repercutiat, hoc attrahat & digerat. Sic amarū quoq̄ meatus perpurgat, abstergit, extenuat, incidit humorum crassitiem absq̄ manifesta excalfactione: Frigidum verò aqueum incrassat, cogit, contrahit, constringit, obstupefacit, atq̄ extinguit. Porro acre extenuat, perpurgat, digerit, perrūpit, attrahit, & escharā siue crustam efficit. At salsum contrahit, constringit, condiendo seruat, desiccatur citra apertam aut caliditatem aut frigiditatem. Dulce verò concoquit, laxat, rarefacit. Oleosum deniq̄ humectat, emollit, laxat. Facilius itaq̄ iam erit ex modò dictis ponderantem sapores, inuenire qui temperamento, qui q̄ operibus sint contrarij.

De Limitatione ac finitione Ordinis cuiusq̄ Excalfacientium, Frigefacientium, Humectantium, & Desiccantium.

CAP. 27.

B Porro congruens iam tempus est, definitis temperamentorum & facultatum, quæ in medicamentis sunt, ordinibus hunc librum absoluere. Igitur symmetrum medicamentum, et quod sit similis temperamenti cum eo cui admoventur, cum neq̄ calefaciat, neq̄ frigefaciat, neq̄ desiccet, neq̄ humectet, id nec calidum, nec frigidum, nec siccum, nec humidum appellare cōuenit: Quod verò aut calidiū, aut humidū, aut frigidū, aut siccū est, à vincente seu excedente cognominatur facultate. Porro per vnumquemq̄ excessum quatuor posuisse ordines, quod ad vsum spectat, sufficit, Calidum quidem nominantes primi ordinis, quod nos excalfacit, non tamen euidenter, verum vt opus sit insuper aliqua demonstratione rationali: sic frigidum, humidum, & siccū, quod demonstrationem † requirat etiam, non dum actionem valentem neq̄ euidentem adeptum. Quæ verò manifestè aut calefacere, aut frigefacere, aut humectare, aut desiccare possunt, ea secundi esse ordinis dicuntur. At quæ iam vehementer quidem, non tamen summè, tertij. Quæ autem adeo excalfacere possunt, vt escharam moliantur & vrant, quarti: sic quoq̄ quæ vehementius refrigerant, adeo vt extinguant, & ipsa quarti sunt ordinis. Cæterum nullum inuenire est, quod quarto ordine desiccet, quod non etiam vrat: nam quod summè desiccatur, omnino id etiam deurit. Attamen tertij ordinis exiccantium esse quippiam queat, quod non vratur, ceu omnia quæ vehementer adstringunt, ex quibus est omphacion, rhus, alumen, balaustrum, galla omphacitis. In his autè ipsis quædam vicina iam sunt adurentibus, vt squama aris, & æs vstum, quasi inter tertium quartum q̄ ordinem dubiè hareant. In medio tertij est æs vstum, si lotum sit. In principio tertij hypocystis. Sic autem & in secundo & quarto differentias constituere licet triplices: nec enim perinde vrit cauterium, & napy, licet ambo quarti sint ordinis. De his sanè omnibus in sequentibus libris per singula seorsum medicamenta determinabitur.

† Ad litteram antiquam, legimus.

* in cod. græcis tam manuscriptorum quam impressus est ἔν-παις i. siccatur & ita in translatione veteri.

GALENI DE SIMPLICIUM MEDICAMENTORVM FACVLTATIBVS LIBER SEXTVS

ARGVMENTVM LIBRI

D Agitur de Effectricibus Qualitatibus singulorum Medicamentorum, quæ plantæ, aut ipsarum partes existunt: Quorum historia ad nonum vsque librum continetur.

Quid Agendum Reliquis Libris simplicium medicamentorum: et Qui Authores rectè, qui perperam, de ipsis tractarint.



De simplicium medicaminū forma pariter & facultate scribere nobis aggressis, primis duobus libris ante omnia prauos modos ratiocinationū, quibus recentiorū medicorum pleriq̄ vsū grauissimè hallucinantes, indicare est visum. In tertio velut elementa quædā totius doctrinæ tradidimus. Deinde verò in quarto de saporū natura disquisiuius, studio inueniendorū oīum, q̄ ex illis ad facultatū cōducere cognitionē possent: disseruimus autè in extremo ipsius libri de qualitatibus medicamentorū quæ ad odoratū attinent. Porro in quinto ad reliquū facultatum genus transgressi, quod quidem ab ipsis operibus, q̄ peragere natæ sunt, denominat, & illic quoq̄ cuiusq̄ substantiā ostendimus. Et sanè vniuersalis sermo de simplicium medicamentorum facultate vniuersus iam finem sortitus videtur. Tempus verò

verò est ad sermones particulares, seu speciales, seu vtcunq; nominare cuiq; visum erit, transire. Et fanè hi priuatim in vnoquoq; medicamine peragentur, ceu protinus in initio fecimus, in primo quidem horum commentariorum de aqua et aceto contèplati: in secundo verò de oleo et rosaceo: Nisi q; illic velut in exemplis sermonem transegimus aduersus eos, qui non rectè de illorū facultate quid protulissent: hic aut breuib; de vnoquoque disseram, non amplius curans, si quis malè de quouis eorum quippiā pronunciarit, id tñ scripturus, quod mihi videbitur verissimum, omiſsa aduersus illos qui quid peccarunt, concertatione. Porro q; non modo obscura futura est oratio ijs, qui superiora ignorant, verum demonstrationis destituta quoq; fide, vel me tacente clarū arbitror. Sed in & in memoriā reduxisse forsan præstiterit, primum quidem q; in natura temperatissima faciendum est medicaminum facultatis periculum, deinde in intemperata, postea deinceps in morbis simplicibus. At si quis ex gustus qualitatibus indicatorie coniectari velit de eorum facultate, in quarto monſtrauimus quæ nam sit in his methodus. Si quis ergo aut negligenter lectis superioribus, aut planè non lectis, statim ad hunc librum pergat, festinans quā primum medicaminum facultatis peritus effici, haud certā eorum habebit notitiā. Cæterum qm̄ medicamenta omnia partim sunt partes aialium, aut plantarum, aut fructuum, aut horū liquores & quos ὁπρὸς Græci vocant, aut succi: partim verò ex metallis sumuntur: melius mihi visum est de plāis ante omnia disferere, tum q; numerosissimum illarum est genus, tum q; virium robore præcellentissimum: inde de metallicis tractare, atq; hinc ad animalium partes transire. Quin etiam eo illas ordine perscribere decreui, qui in elementis visitur, eas plantarum primo loco collocans, quarum appellationes initium sui sortita sunt elementum α, secundo verò loco quæ à β incipiunt, & sic tertio, quarto, quinto q; loco, atq; ita deinceps, pro literarum videlicet ordine. Nam & Pamphilus eum in modū tractatum de herbis composuit. Verum is ad fabulas versus aniles est, simul q; præstigiaturas quasdā deliras egyptias, iunctis non nullis incantationibus, quas cum herbas colligunt admurmurant. Et fanè vtitur ad periapta id est quæ suspenduntur, & manganæas non solum curiosas & à medicina alienas, sed etiam falsas vniuersas. At non neq; horum quippiā, neque nugaces istorum narrabimus trāsformationes: nec enim vel paruis admodum pueris vtilēs tales esse fabulas existimamus, nedum ijs qui medicinæ operam obire properant. Et profectio protinus in Aphorismorum initio ab Hippocrate dictum mihi videtur, || Vita brevis, ars verò longa. vt tempus non in inutilia impēderemus, verum quā maximo studio festinarem; viam incedere compendiosissimā, nempe per ea quæ sunt in arte vtilissima. Pleraq; verò ista herbarum nomina aut Ægyptiaca, aut Babylonica, quæ q; non nulli {aut} priuatim, {aut} notæ gratia illis imposuerunt, hic adscribere mihi visum est superuacuum. Nam præstat, si quis hæc volet curiosius persequi, seorsum & per se apud illos legere qui transulere: nam ita & libros illos inscribunt, vt qui eos non composuerint, velut Xenocrates Aphrodisiensis fecit, vir cum in alijs supra modum curiosus, tum à præstigiatura non alienus. At Pamphilus, is scilicet qui libros de herbis composuit, planè ex ijs quæ vel ipse scribit, præ se fert grāmaticum, indicat q; se nec conspexisse herbas de quibus conscribit, nec vires earum expertum, sed ijs qui ante ipsum scribere, fidem habuisse citra vllam explorationem. Sic fanè libros expleuit, annexo ad quāque herbam nominum aceruo: deinde etiam exponens, si qua ex homine ferebatur transformatio: tum epodas, seu incantationes, & libationes, atque thymiamata, quæ in colligendis illis adhibebantur, adscribens, nec non & alias eiusmodi præstigiaturas nugaces. At Anazarbenſis Dioscorides quinque libris materiā omnem vtilem absoluit, non herbarum tantum, sed & arborum, & fructuum, & succorum, & liquorum: memorans insuper & metallica omnia, & partes animalium. Et mihi vtiq; videtur omnium perfectissimè tractatum de materia medicamentorum confecisse. Nam licet à maioribus eo, plurima de illis benè scripta extent, tamen à nemine omnium æque de omnibus, † nisi si quis Tanitrum prædicet Asclepiadis: } nam & huic cætera bene dicta esse probantur extra ratiocinationes quas super causis affert. Atque hæc nimirum perlegere debet quisquis peritus medicamentorum materiæ euadere studet: ad hæc quoque quæ scripta reliquit Heraclides Tarentinus, & Crateuas, & Manteas. Verum illi non similiter scripserunt, nec in vnum collegerunt omnia, ceu Dioscorides, qui de Materia quinque libris fecit titulum: verum seorsum, verbī causa, de Præparatione aut probatione medicamentorum scripserunt, vt Heraclides Tarentinus: seorsum vero de Purgatibus, aut propotismis, aut clysmis, vt fecit Manteas: separatim de Facile parabilibus remedijs, vt Apollonius: aut de lis quæ secundum locos, vt Manteas. Porro plerunque medicamentorum vsum veteres in curandi tractatibus prodiderunt, vt & iuniorum medicorum propè omnes. Nam & ab Hippocrate dicta sunt multa, & ab Euriphonte, & Dieuche, & Diodice, & Plistonico, & Praxagora, & Herophilo. Nec est veterum medicorum quisquam, qui non aliquid plus minus' ue arti contulerit ad medicamentorum scientiā, id' que citra præstigiaturā aut mendaciū, quæ postea inuexit Andreas. Itaque cui ocium suppetit legendis vtiliter de medicamentis scriptis libris, multos quidem habet, vt est dictum, antiquorum, sed nec paucos iuniorum, adusque Pamphilum & Archigenem. Quin & Rufus Ephesius cum multa medicamenta in curandi libris conscripserit, tū de herbis versibus hexametris

1^a. Apho. 1. Ex.
ord. 2. b

† Legit in anti
quis græcis co.
πλιν εἰ τὰ νί
γρου τίς ἐπαι
νοῖν τοῦ ἀσ
κληπιαδίου
i. nisi quis Ni
gri asclepiadei
opa prædicet.

A metris quatuor libros composuit. Nec metus est defecturos libros viles, etiam si in tota vita quis aliud nihil quam de medicamentis legere velit. Verum abstinendum ab Andrea est, alijsque similiter mendacibus: multo quam etiam magis fugiendus Pamphilus, qui ne per somnium quidem herbas vidit, quarum aggreditur figuras perscribere. Nam id genus hominum (quo modo assimilauit eos Heraclides Tarentinus) simillimum est praconibus, qui formam ac notas fugitiui mancipij, licet ipsi non viderint vnquam, praconio tantum publicant: notas enim ab alijs qui norunt accipiunt, & ceu cantilenam eas proferunt: ut si forte is, quem praconio indicat, propere adlisteret, agnoscere tamen non possent. Equidem non possem non accusare et illos quoque, qui primi herbarum formas scriptis docere sunt conati, cum melius existimem ab ipso preceptore oculis discere, ac non adlulari res, qui ex libris prodeunt gubernatores: nam sic & verior & manifestior esset doctrina, non herbarum modo & fruticum arborumque, sed & aliorum omnium medicaminum. Verum enimvero si omnino libris est opus, quis adeo miser est, ut praeteritis scriptis Dioscoridis, Nigri, Heraclidis, Crateuae, & aliorum innumerorum, qui in arte ipsa consenuerunt, libros grammaticos, scribentis incantationes, transformationes, & decanorum demoniorumque herbas sacras perferat? Nam quod hominibus istis praestigiatoribus vnicum fuerit studium, ut vulgus imperitum talia scribentes in sui admirationem verterent, vel ex ipsis Paphili libris discere liceat, qui primam inter herbas conscripsit Abrotonon omnibus nobis cognita: ac deinde Agnon siue Viticem, et ipsam admodum nota: inde Agrosin herbam, nec vulgo ignota: mox Anchusam, quam nec ipsam quispiam ignorat: sicut nec Adiaton, quae illi deinceps scripta legitur: atque in his utique nihil, quod quidem sciam, superuacuum scribit. Verum postea herbae meminit nomine, ut ait, Aeti, hoc est Aquilae, de qua fatetur Graecorum nulli quicquam esse proditum, verum scriptam se repperisse in libello quopiam ex his qui inscribuntur Mercurio Aegyptio, continente triginta sex sacras horoscoporum herbas. Quas clarum est esse omnes nugas meras, atque autoris ipsius figmenta, similia Ophionicis Conchylacis: Nec enim prorsum quispiam extitit Conchylax: ad risum enim fictum nomen est, sicut pleraque alia in libro eius conscripta: nec triginta sex herbae illae ultra nomen ipsum quicquam sunt, nec vlla ipsis res subiaceret. Verum Paphilo, sicut & plerisque alijs, otium fortassis supererat inutiles fabulas libris intexere: At nos nunc quoque tempus nos perdidisse arbitramur, qui prolixius eorum meminimus. Itaque quae vtilia sunt iam nunc ordiamur.

ABROTONON.

A Brotoni^h herbae nec speciem formamve scribere post tot tantosque viros oportet, nec particulares actiones, ceu illi facitauerunt: quas si non definitis distincteque, saltem clare significauerunt: verum & nos quoque eas copiosius exponemus in opere de componendis pharmacis, simulque de paratu facilibus: interim vero etiam in curandi methodi libris, nimirum ubi exposcet usus. Verum quod ab initio propositum fuit, nempe vniuersales duntaxat medicamentorum omnium facultates inspicere, id quidem & in alijs consentaneum est, & nunc sane et faciendum: Dicendumque Abrotonon esse calidum & siccum facultate, in tertio ordine siue recessu post symmetra situm. Porro quod eiusmodi ordo ut ad temperatam naturam expenditur, saepe ante diximus. Sed & inueniemus temperie eius non minime quidem & ex gustu ducta coniectura, utpote cum sit admodum amarum. Porro sapor eiusmodi, cum terrenae sit essentiae, a largo calore extenuatum ostendimus: ita ut non instrenue exalfaciat pariter & delibet. Quin immo & cum distincta illa experientia, de qua supra frequenter dictum est, diligenter explorassemus, ex eadem temperie medicamen hoc comperimus. Nam siue comam cum floribus (nam reliqua eius palea inutilis est) contusam vlceri puro illinas, mordax & irritans videbitur: siue eo in oleo macerato caput voles aut ventrem perfundere, admodum calfacere reperies. Quin & si qui per circuitum rigoribus corripiuntur, eos ante inualionem hoc voles confricare, minus utique rigore concutientur: immo & sensus quidem protinus ubi admotum fuerit, ipsum calfacere percipit. Porro quod lumbricos interimat, par est, nimirum cum sit amarum, ac proinde vel antequam experiaris manifestum, si quidem memoria teneas quae in horum commentariorum quarto de amari saporis natura prodidimus. Scies quae protinus, quod & digerendi & incidendi quaedam vim habeat. Sed & quod magis quam Absynthio id ipsi necessario insit, in promptu erit colligere, primum quidem ex gustu (paucissima siquidem acerbis partis abrotonon est, non paucum vero absynthium) deinde ex eo quod inimicum quidem sit stomacho abrotonon, velut et Seriphon: gratum vero et amicum absynthium. Si quidem de istis supra ostensum est, quod amarum ipsum per se omnifariam insensum sit stomacho: aulterum vero, aut acerbum, aut in summa adstringens, stomacho amicum. Porro ubi qualitates haec inuicem permixtae fuerint, quae vehementior fuerit, ea utique vicerit. Atque haec satis est in hoc tractatu nouisse. Monstrabitur autem in libris de ratione curandi, quo pacto quis optime medicamento eiusmodi uti possit. Ac proinde querendum haud etiam est, quam ob rem cum malo cydonio coctum illitum, aut pane, oculorum sanctorum phlegmonas: neque quid cum farina hordeacea tritum ac coctum digerat phymata: neutrum siquidem horum, nec aliorum quiduis, huic propolito nobis tractatui proprium est: Sed qui empiricam profitentur doctrinam, in paratu facilibus medicamentis ea conscribunt: At qui ex ratione artem tractare volunt, res opus est methodo curandi: nam alioqui damnum magis quam vtilitatem ex tali consequantur narratione. Sane Hippocrati, qui in Aphorismis scripsit, Dolores oculorum

• h. Aetia.
62. Aph. 31. Ex
ord. 49 c

lorum soluit meri potio, aut lauacrum, aut fomentatio, aut sanguinis missio, aut purgatio: nec adiecit, quos nam dolores vini potio, quos lauacrum, quos fomentum, quos sanguinis missio, & quos purgatio: ignoscendum forsitan quis arbitretur, tribus, ut arbitror, de causis. Siquidem aphoristicā faciebat doctrinam, in qua propter breuitatem & compēdium pleraque ita dici cōcessum est. Et oīa quæ dolores soluunt enumerauit, tametsi non definiit, ad quem dolorem quod nā ex illis congrueret. Tum multis in locis aliorum librorum occasiones nobis præstitit, distinctiones in ijs quæ hoc pacto dicuntur inueniendi. At qui neque in alijs libris de talibus scribere distinctionibus, aut in

* *diexodico.*

enarratorio, et prolixo tractatu aphoristice tñ ac breuiter scribunt, aut insuper etiam ex multis vnū tm indicant, ij plus nos lædunt q̃ iuuant. Nam cum sint multæ in ophthalmijs differentię, atque vna duntaxat ex eis prædictum poscat cataplasmata, aliæ verò omnes ab eo lædantur: si quis id ad oēs sine discrimine adhibeat: multo plus lædet, q̃ iuuabit. Ad hunc itaq; modum non tantum de Abrotono, sed de alijs quoque omnibus scribendum nobis est, eas quidē facultates quæ sunt in calefaciendo, frigefaciendo, humectando, siccandoque, ijs quas sæpenumero memorauimus methodis, reperiuntur: quæ verò secundum totius substantię proprietatem perficiuntur, sola experientia. Et de his ostensum est q̃ deleteriæ sint, & deleteriæ alexiteriæ & purgatoriæ. Nam has ex ratione inuenire est impossibile, præterq; q̃ in quibusdam suspicionem duntaxat probabilem inuenire li-

ceat, neque, n. in omnibus, licet hoc in superioribus monstratum fuit. At de facultatibus quæ hoc pacto inueniuntur, separatim postea differemus, vbi videlicet prius singulatim per quodque medicamentum de ijs quæ calefaciendo, frigefaciendo, humectando, siccandoque agunt: tum de ijs quæ ad has consequuntur: narrationē absoluerō. Porro vbi vnum modo adiecerō, finem faciā de Abrotono dicendi, nempe q̃ summē suspiciendus ille Pamphilus, etiam si hanc primam herbarum recensuit, ac forsitan nullam deinceps aliam, tñ hanc saltem oculis suis conspiciari voluerit: attamen vel maxime hallucinatur, existimans hanc herbam à Romanis appellari Sātonicum. Differt enim ab abrotono fantonicum, velut etiam Dioscorides exactissime scripsit in tertio de materia, & omnes id norunt tum medici tum rhodopolæ. Nam abrotoni due sunt species, altera quam marem, altera quam sceminam nuncupant: quod ipsum definitum est tum apud Dioscoridem, tum apud ipsum Pamphilum, aliosque innumeros. At aliud est ab eo Absynthium: cuius rursus tres statuendæ sunt species: quarum vnā eodem cum genere ipso nomine appellitant, cuiusmodi potissimū est Ponticum: alterum, Sātonicum: tertium, Seriphum. Si verò aliud placet appellare absynthium, aliud verò seriphum, aliud autem fantonicum, nihil interest, quod ad presens certe attinet: nec enim nomen diuisuri venimus, sed studium nobis est iplis de rebus. Porro quoniā hæc tum specie seu for-

* *diexodico est in antiquis.*

ma, tum gustu, tum facultatibus inter sese diuersa sunt, non obscure vno, si ita lubet, omnia nomine nuncupes, verum exacte vires eorum edoceas. Ac nos sanè sufficienter ipsas formas à Dioscoride explicatas esse, alijsque non paucis, iam diximus: itaque denuo eadem scribenda non sunt, quæ maioribus recte sunt prodita. At siquid illi in facultatibus omisere indistinctum, cuius profectio gratia ad hanc narrationem venimus, ea nos adiungere tētabimur. Absynthium quidem dictis minus est calidum, nempe plurimam obtinens adstrictionem. Quod cum sit, & minus quoque tenuium q̃ illa partium, & utique minori etiam quā illa ad eundem modum extenuandi facultate, attamen non minus deficcatorium est. At cæterorum Sātonicum quidem à Sātonia regione in qua nascitur, nomen sortitum proximam habet facultatem, seripho paulo imbecillius in excalfaciendo & extenuando deficcandoque. Porro ipsum Seriphon abrotono minus est calidum, verum calidius absynthio: stomacho impendio inimicum, nempe cum amaritate falsedinem quandam præ se ferens: sed & quandam, licet minimam, adstrictionem obtinet. Sic & abrotonon & fantonicum admodum infesta sunt stomacho. Solum autem inter ea Absynthium, & maxime Ponticum, gratum est stomacho, quia plurimam adstrictionem continet. Abrotonum vero vstum, calidum liccūque facultate est, magis etiā quā cucurbita sicca vsta, & anethi radix. Illa enim vlceribus humidis simul & citra phlegmonem callo induratis conueniunt: ac proinde maxime vlceribus, quæ in pudendorum præputijs fiunt competere videtur. At cinis abrotoni vlceribus omnibus mordax est: ac idcirco cū oleo tenui, cicino scilicet, aut raphanino, aut sicyonio, aut veteri, & maxime sabino, ad Alopecias accommodatur. Tum Barbam segnius tardiusque enascētem cum aliquo dictorum oleorum elicit, sed nec minus illis lentiscino maceratum. Quippe pro eo q̃ tenuium est partium, rarefaciēdi vim obtinet, & mordax est, & calidum: quas utique maxime eius facultates nouisse oportet, nec quicque etiam particulare in hoc tractatu requirere.

Agnos, Vitex.

† In codi. quodam græco antiquissimo, & in translatione veteri, verba hæc non habent, iudico autē esse glossēma, epitomē verborū Galeni p̃tinēs.

Agnos, aut Lygos, hoc est Vitex, plāta illa fruticosa, † calidus quidem est & siccus tertio ordine, verū multum tenuis substantiæ, tum gustu acris simul & adstringens, † ipsas quidem vitices ad medicinā habet inutiles: ceterum folia semenque calida sicca quæ facultate sunt, substantia verò tenui. Nā & vtentibus ita apparet, & gustatibus acre simul & subadstringēs percipitur tum folium, tum flos, tum fructus. Edendo tñ etiā fructus est: veruntamen perspicuo calfacit, & simul capiti dolorem parit. At si frigatur (nā & sic editur cum tragematis) minus caput tentat. Porro flatus ventris discutit & cū non frictus, & multo magis cū frictus fuerit. Cohibet porro impetus in venerē,

tum

A. ibidē.

A tum frictionis expertus, tum etiam ipsam expertus. Folia item flores que ipsius fruticis id ipsum præstare possunt: itaque non tñ esa pota qz ad calitatem conferre creduntur, verum etiam subtilata. Hinc est q Athenis in Thesmophorijs, hoc est sacris Cereris, mulieres totū sibi fruticem substernunt. Hinc illi quoque nomē inditum agni, hoc est casti. Ex quibus omnibus manifestum est, siquidem memoria teneamus quæ superioribus commentarijs sunt dicta, agnum calfacere, simul qz exiccare, tum omnium maximè flatus discutere. Porro q tenuium sit partium, facultas eius indicio est. Nam q caput tentat, non magis à multitudine vaporum ab eo prognatorum, qz à caliditate eius ac subtilitate partium, fieri rationabile est. Nam si flatuosum spiritum procreare posset, sanè & ventrem inflaret, & venerem stimularet, perinde vt eruca: verum cum non tantum non excitare, immo etiam reprimere queat, fuerit profectio secundum rutæ maxime facultatem tum in excalfaciendo, tum in resiccando. Non tamen illi par est, nam vtroq paulo est inferior: siquidē ruta tum magis est excalfactoria, tū magis desiccatoria. Differt etiā qualitatis simul ac facultatis missione. Nam agni semen ac germina modicam ferunt adstrictionē: at ruta vbi aruerit, exacte amara est & acris: vbi verò humida, subamara. Non tñ austeritas aut acerbitas illi inest: aut sicui videatur inesse, ea utiqz omnino obscura, scio, videbitur, nec par ei que est in agno. Quocirca et ad iecur, **B** & lienem indurata, & obstrueta, agni semen potius qz ruta cōpetit. Sed hæc ad curādi iam methodum pertinent: quam qdē vt oīno nō attingam de medicamentorum pronuncians facultatibus, fieri nō potest: verum celeriter his omissis ad rē propolitā reflectere, viri est utiqz temperati. Magis qz etiam id in sequentibus medicamentis efficere conabor: hoc est, vbi ex quibusdā paucis cui dentibus vniuersalem facultatem collegero, particulares postea actiones omittam. Nā in præsens id nouisse sufficit, q Agnus calidus est & siccus facultate, idqz, non mediocriter, sed tertio excessu: tum admodum tenuium partium. Hæc qui norit, ac postea methodum curandi didicerit, ipsemet inueniet, quo pacto mentes hinc cieat: quo pacto partes induratas digerat: quo pacto lassitudinē soluens, seu acopum, & excalfactorium ex eo vnguentum præparetur.

Agrostis Gramen.

{ Graminis Radix modicè frigida est, & sicca, mordacitatem quandam exiguā, & partium tenuitatem obtinens. At Herba ipsa primo quidem excessu refrigerat, in humiditate verò & siccitate moderata. Porro Semen alibi quidem imbecillum est, in Parnaso verò desiccatorium, & tenuium partium, & subacerbum. } Gramen esculentam habet radicem, vbi mollis fuerit, dulcem quidē instar aquæ, sed acre quiddam exiguum & subacerbum obtinentem. Hæc herba planè aquea gustantibus est. Ex quibus apertum est radicem modicè esse tum frigidam, tum siccam, ac proinde cruenta vlcera glutinare. At ipsa herba illita non vehementer refrigerat, in medio constituta humiditatis & siccitatis. Porro mordacitas & tenuitas quæ radici inest, exigua est quidem, sed interdum tamen lapide frangeres asfolet, si quis eam decoctam ebibat. At semen alterius quidem imbecillum est: eius verò quæ in Parnaso nascitur, vrinam ciet, & fluxus vētris & stomachi resiccat: vis enim eius est exiccatoria, tenuium partium, & subacerba.

Anchusa.

{ Anchusæ quadruplex species est. Quarū Onoclea quidem radicē habet admodum refrigerantem & desiccantē, tum adstringentem & subamaram, tum quæ sufficiat extenuādis & extergendis humoribus biliosis, corporibus qz condensandis. Caterum folia habet imbecilliora quidē radice, adstringūt tñ & ipsa, & desiccāt. Porro Lycopos cognominata refrigerat & deliccat, magis qz eius radix, qz onoclea adstringit. At Onochelos calidior est, & magis medicata, nā plusculum habet & gustu ipso protinus acrimoniæ. Hæc verò etiam calidior est reliqua & parua, quæ & amarior, & magis etiam medicata est. } Anchusæ nō omnes easdem vires obtinent. Nam Onoclea quam vocant, radicem habet simul adstringentem & subamarā, corporibus condensandis & modicè extenuādis idoneā, tum abstergendis quoqz & abluendis biliosis & salis succis. Dictum enim supra est, q qualitas acerbata mista amaritudini ea præstare queat. Sic sanè aurigini & lienosis & renum affectibus est utilis. Sed & refrigerare idonea est: & sanè cum polēta illita iuuat erysipelata. Et abstergit nō modo epota, sed & foris impolita: proinde vitiligines & lepras sanat cū aceto. Ac Radicis qdē hæc opera sunt, & operū facultates quas diximus. At Folia ipsius herbe radice quidē sunt imbecilliora, non tñ aliena sunt à resiccatione, & adstrictione. Itaqz et profluuium sanant pota cum vino. Et quæ Lycopos nominatur, eodē modo erysipelatis congruit: & radicem habet, q onoclea, magis adstringentem. At Onocheli & Alcibiadiæ cognominatæ vis magis est medicata. Nam & gustu protinus maiorem habet acrimoniā: & eos, qui à viperis morli sunt, admodum iuuat tum illita, tum supensa, tum esa. Reliqua verò, nempe quarta, quæ parua est, & ferè nomine caret ex illis sola, alcibiadiæ quidem per similes est, verum & amarior, & magis medicaminosa: ac proinde ad latos lumbricos idonea, oxybaphi mensura cum hyssopo & nasturtio epota.

Agarici Radix.

† Agarici Radix, hoc est q trunco innascitur, primo quidē gustu dulcis quodā modo, sed paulo post subamara apparet, & acrimoniæ quādā specīe tēporis spatio inducit, euiculæ qz adstrictionis. Est & consistētia laxa. Ex quibus oibus manifestū est, siquidem q in superioribus cōmentarijs di-

* τεχνίσιον.

* Hic colligi potest errorē esse quod in primo de facult. Alimē ca. de Agno. et lib. 2. de cōpon. med. secundum locos pag. 36. f. dicitur refrigerare.

Nō sunt in antiquissimo codice græco, nec in tralatōe veteri, sed videntur esse summa quidam verborū Galeni sequēdum.

Non sunt in antiquissimo codice græco, nec in tralat. veteri.

† Et hoc in loco i Ald no codice græco hñt hæc verba. Agarici cōpositū ē ex substantia aerea & terrea, a caliditate tenuata: facultatē ēt hñt digerendi, calfaciendi, crassitudinē incidendi, & obstruētōes iecoris liberandi. Quāquā nec i cod. antiqz nec in tralatōe veteri legantur.

A. ibidē c. 306. & 707.

A. l. 1. c. 19. fol. 100. g

A. ibidē c. 77. fol. 107.

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

Et sunt, meminerimus, q̄ medicamentum hoc compositum est ex substantia aeria & terrea à caliditate extenuata: porro minimum habet essentia aquea. Hac ratione & digerendi vim, habet & crassitudinem incidendi, tum infarctus viscerum expurgandi. Proinde regio morbo laborantes sanat, eos utiq; qui sic ab infarctu iecoris laborant. Iuuat & morbo comitiali obnoxios eadē facultate: tum rigores per circuitum recurrentes ex crassis aut viscolis humoribus natos sanat. Iuuat & morfos à bestiis frigore lædētibus, aut compunctos, tum foris in affecta parte impositum, tum intro in corpus sumptum pondere drachmæ vnius cum vino diluto. Est & purgatorium.

Ageratum.

Ageratum facultatem digerendi habet, & leuiter quadantenus phlegmone liberandi.

Adiantum.

Adiantum^{*} in caliditate quidē & frigiditate symmetrū est, verūm desiccatur, & extenuatur, & digerit. Etenim caput ex alopecia glabrum capillis cōuestit, & strumas & abscessus digerit, lapides q̄ frangit epotū, & viscosorum crassorum q̄ pectore pulmone q̄ excreationibus non mediocriter confert, & vētris profluuium sistit: non tñ vllam manifestam caliditatē affert, sicut nec frigiditatē. Verūm posuerit ipsum quispiam secūdm hanc oppositionem & temperiem in ordine medio.

A. ibid. c. 100.
fol. 110. c. d

Aerzoon Semperviuum.

Aerzoon^{*} vtrunq; tum maius, tum minus, desiccatur quidem leuiter, quādoquidem & mediocriter adstringit, omnis alterius vehementis qualitatis expers. Quare in eo plus cæteris abundat essentia aquea: ceterū nō mediocriter refrigerat. Est enim ex tertio ordine, & recessu refrigeratum. Hinc etiam ad erysipelata, & herpes, & phlegmonas à fluxione natas accommodatur.

F
A. ibid. c. 607.

Ægilops Avena.

Ægilops digerendi vim pollidet, id quod ex gustu patet: leuiter enim est acris. Verum & ex eo liquet, q̄ phlegmonas induratas & ægilopas sanat.

Aera Lolium.

Lolium desiccatur & calfacit efficaciter, vt propinqua sit acribus, magis q̄ iris: sed nō est perinde vt illa tenuium partium, verum multum in hoc deficit. Secundum hoc ponat ipsam quispiam in principio tertij ordinis excalfacientium, extremo verò secundi exiccantium.

Ægyrus Populus Nigra.

* in impressis
legitur τριτὸς
i. tertio. in man
nscriptis quos
viderim, τρι
τὸς i. primo.

Ægyri Flores calidi quidē sunt in primò recessu à tēperatis: at in differētia, q̄ habet in siccādo & humectādo, paulū qddā ad siccius deflexerūt: sed & subtiliorū potius q̄ crassiorū sunt partiū. Et Folia quoq; ipsius quodāmodo floribus similia sunt, nisi q̄ ad oīa imbecilliora, minus q̄ effica

† A. folia ipsa
acerba sunt.

G
cia. Sed et Resina eius, floribus similem facultatem obtinet, atq; etiam calidiorem. Porro Semē tū resina, tum floribus, & subtiliorum est partium, & exiccantiū, non tamen admodum calidius. Acacia.

A. l. 1. c. 2. c. 3.
fol. 99. b

Acacia[†] & plāta ipsa acerba est, et fructus, & succus: Qui lotus qdē & imbecillior, et minus mor

dax redditur, vt potē acrimoniā quādam in lauatione deponēs. Porro si parti alicui sanē illinat, protinus eā & sicciorē & cōtractā efficiet, nullū qdē caloris sensum inuehēs, sed nec frigoris admodū valentē. Vnde cōstat medicamē id esse frigidū & terrosum, immista quādā ēt essentia aquea. Et sane cōiectura est nō esse simile, verū quādā in sese dispas habere partes tenues & calidas, q̄ in ipsa ablutione segregent. Esto q̄ & hoc tertij ordinis exiccantiū, & secūdi refrigerantiū, vbi qdē elo tum fuerit, illorū verò primū.

Acalephe Vrtica.

Vrtica. Et^{*} huius herbae tum fructus, tum folia (nā hec potissimū sunt vsui) admodū digerētis sunt facultatis, adeo vt & phymata et parotidas sanent. Sed & quiddā flatuosum obtinent, quo & venerē extimulat, & maximē vbi cū musto semen bibitur. Porro q̄ nō vehementer calfaciat, sed multū tenuiū sit partium, testimonio est crassorū viscosorum q̄ humorum ex pectore pulmone q̄ educit, tū q̄ partes quas contigerit pruriant. Porro flatuosum eius, cuius esse particeps dicta est, dum concoquitur, nascitur: nō enim actu flatuosa est, sed facultate. Vētre autem modicē subducit ipsa duntaxat absterfione, ac veluti titillatione, non purgatione. Et gangranosa, & cācrofa, & in totū quæ exiccari citra mordicationem postulant, ea conuenienter sanat, nimirum cū subtilium partium sit, & temperaturæ siccæ: non tamen tantum habens caliditatis, vt iam mordicet.

A. ibid. c. 714.

Acanthos Spina Vulgaris.

Acanthos. Alij quidem Melamphillum nominant, alij verò Pederota. Folia quidē mediocriter digerentem facultatem obtinēt: Ac Radix exiccatoria est, & leuiter incisoria, & tenuiū partiū.

Acanthion.

Acanthiū. Radix huius & folia facultatis sunt tenuiū partiū, & excalfactoria, vt & ijs q̄ cōuelluntur auxiliētur.

Acantha Leuce Spina Alba.

* stomachicos.

Acātha^{*} Leuce. Hāc qdā Leucacanthon noiant. Radix eius desiccatoria est, & modicē adstringens. Quamobrē & coeliacos & dysentēricos iuuat, & sanguinis reiectiones cohibet, œdemata q̄ illitu contrahit: ac dentes dolentes iuuat, si decocto eius colluant. Semen tenuiū partiū et calidē facultatis est. Itaq; potui dari ijs, qui cōuellunt conuenit.

A. l. 1. c. 2. c. 30.
fol. 108. d



Acantha Aegyptia.

Spina Aegyptia. Quidā Arabicam vocāt. Similis autem est spinæ albæ nostrati, verum facultate

A. ibid. c. 615.

A. 1.2.1.2.C.45.
fol. 102.d

A. ibidē.c. 360:
& 676.

† Cod. impre-
sibabit. τὴν
τῶν ἐν τῷ σώ-
ματος ἢ κα-
θ' ἑδραν. Με-
μνηστέ. 
Agnus τὴν
τῶν ἐν τῷ σώ-
ματος ἢ κα-
θ' ἑδραν, quā-
di exterminar
poris partibus
 circa se-
dē. Paulus. Ex
trinsecus qui-
dē in carnibus
quē putrefere-
debet ipso nūc-
dum est.

A. ibidē. c. 611.

A. ibidē.c.64.

A.1.2.2.2.6.
fol. 101.6

A.l.2.t.2. c. 18.
fol. 100.f

A. bidē. c. 466.

A. ibidē. c. 60.

FFFFF ñ

educit.

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

educit. Sed & grumos sanguinis liquare creditur, non solum in ventre, sed & in vesica: sed tūc potius cum mulso bibenda. Et omnes simpliciter fluxiones pota desiccant, stomacho infesta.

Amorce Amurca.

Amurca "terrestris est substantiæ, calidæ, non tamen tñ possidet caliditatis vt palam mordicet. Quod si coquatur quoq, multo etiam magis crassarum partiū & sicca redditur. Et fuerit sanè ex secundo ordine excalfacientium, & siccitium intenso quodā modo magis. Sic et vlcera corporum temperatura liccorum curat: quæ verò in alijs omnibus sunt, exasperat. Siquidem contendit perinde vt resina, & pix sicca, & bitumen: Quæ & ipsa in corporibus admodum duris, quæ vulnus habent aut sinum, glutinatoria sunt: alia verò omnia contendunt atq; irritant.

A. libi. c. 277.

Ampeloprason.

"Ampeloprason. Si inter aliū & prason hoc est porrū, mediū quiddam concipias, facultatem ampeloprafi inueneris. Est enim agreste, vt sic dicā, porrū: quāobrem & acrius eo & siccus est, si cut agrestia omnia reliqua hortēlibus, ac proinde stomacho q̄ illud nocētius. Sed & crassos & lentos humores potētius incidit: valētius q̄ infarcta organa obstruētione liberat. Hac quoq; rōne vrinæ, & mēstrua sēpe puocauit, vbi à crassis et lētis retinebantur humoribus. Adeo vero est calidū, vt illitū cataplasmatīs mō, exulceret. Diditū ē autē retro, q̄ q̄ eū i modū sūt calida, extremi sūt ordinis. F

A. libi. c. 540.

Ampelos Agria Vitis Agrestis.

Vitis Agrestis Racemi extergēdi vim hñt, vt ephelis, & neuos, & id genus omnia in extima cute existentia curare possint. Sed & adstrictionem quandā extrema germina { ἀμπέλουρας Græci vocant } obtinent, quæ & sale condiri assolent.

Ampelos Hemeros Vitis Satiua & culta.

Vitis "Cultæ adsimilis facultas est agresti, sed ad omnia imbecillior.

A. libi. c. 723.

Ampelos Leuce Vitis Alba.

Ampeli "Leuces, quam & Bryoniam & Psilothrum vocāt, prima quidem Germina ab oībus pro more edī vere solent, vtpote edulium stomacho propter adstrictionem acceptum. Sed & subamarā & modicè acrē adstrictionē possident: quare & vrinā modicè ciēt. At Radix & abstergētē, & desiccantē, et tenuiū partium vim habet, et moderatē calidam. Quamobrē & lienes induratos liquat tū epota, tum foris cū ficibus imposita: & pforam & lepram sanat. Porro Fructus eius, racemi speciem præferens, ijs qui coriā depfant, est vtilis.

A. libi. c. 262.

Ampelos Melena Vitis Nigra.

Vitis "nigra. Vocatur autem hæc propriè Bryonia: supradictæ tamen ad omnia similis, nisi G quod imbecillior.

A. libi. c. 263.

Amygdala.

Amygdala, "quæ quidē palam Amara sunt, omnino extenuandi vim possidēt, quod & qualitas ipsa indicat, & experientia cōprobat. Ac de amara quidem qualitate in quarto horū cōmentariorū proditum est. Caterū duo experiētiae exēpla proponi satis est, vnde vim eorū possis discere. Siquidem ephelin expurgāt, et excreationibus ex pectore pulmone q̄ crassorum lentorum q̄ humorum impendio conferunt. Porro hæc ostensa sunt genere quidē attenuantis, specie verò extergentis esse facultatis. Quin & q̄ per accidens facultatē item habeant ab obstructione liberandi, & ipsū supra demonstratum est. Sed & experientia monstrat. Nā in iecore crassorū viscosorum q̄ humorū in extremis valis impactorū obstructiones, abūdē expurgant expediunt q̄. Quin & laterū dolores ab huiusmodi causa natos, & lienis, & coli, & renum sanant. Porro & ipsa Arbor tota similē sortita vim est. Nā huius Radices coctæ atq; illitæ ephelis purgant. Quotquot verò sunt amygdala Dulcia, & ipsa leuiculā amaritudinē possidēt, quæ tñ dulcedie superatē occultat: ceterū id tēporis spatium clarum fit. Demonstratū autem retro est qualitatē dulcem moderatē esse calidā.

A. l. 2. t. 2. c. 57. fol. 104 g

Ammoniacum.

Ammoniacum, "opos siue liquor est ferulæ cuiusdā. Hoc habet emolliendi facultatē intensam, adeo vt & articularū tophos dissoluat, & lienes induratos sanet, & chœradas per halitū digerat.

H

A. l. 2. t. 2. c. 8. fol. 99. f. g

Amomum.

Amomum "Acoro similem facultatem obtinet, nisi quod acorū siccus sit, maiore autem quantatenus concoquendi facultate amomum.

A. libi. c. 51. fol. 103. c

Anagallis.

Anagallis "vtraq; tum ea quæ cœruleum habet florem, tum ea quæ purpureum, admodum extergentis sunt facultatis. Habent verò non nihil etiam caloris, & quandam trahendi facultatem, adeo vt & infixa corpori extrahant. Succus earū ex naribus purgat eadē de causa. In summa autē desiccandi vim habent citra mordicationē. Quamobrē & vulnera glutinant, & putrida adiuuant.

A. libi. c. 32.

Anagyris.

Anagyris frutex est grauiter olens, acris, & digerentis, excalfaciētis q̄ facultatis. Sed Folia etiā num virentia, cūm propter humiditatis admistionem minus sint acria, idcirco tumētia reprimūt: at resiccata incidentis sunt exiccantis q̄ valenter facultatis. Similem ferē facultatem habet Radicis eius cortex. Semen autem magis subtilium est partium. Sed & vomitum puocant.

Androsænum.

Androsenum.

Androsace.

Andrachne Portulaca.

Anemone.

Anethum.

ere in symposijs. *Anthillis.*

Anthemus, aut Chamæmelum.

Amisut.

Antirrhinum.

Aparine.

Aplos Pyrus.

Achrades Pyra Sylvestria.

Арсениум, или Синограме.

Quinta Classis.

FFFFF in

rum

† Grace ὁ κα-
 θέκατος τὸ
 μέτρον ὡ-
 ρον, τοῦ εὐ-
 ρωτον. & ἡ
 cūdam verāq;
 altera qđ frī-
 gida, altera ve-
 ro temperata.
 Antiqua trala.
 Sed si tu vis di-
 cere per aliū
 modū, dices qđ
 illa sunt
 frigida, & que
 dā sūt cōmix-
 tī cōplexionis. Vi-
 deur. n. l. c. 11. c.
 τὸ ἄνθος
 τῶν ἄνθων

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

tum grauit̃er olens. Proinde omnino calida est non instrenuè, non tamen proportionē desiccāt. Et itaq; illita admodum digerentis est facultatis.

Argemone.

Argemone. Et huius herbae facultas absterforia est, & digerens.

Arisarum.

Arisarum multo minus est Aro. Radicem habet oliuæ magnitudine, sed multo est ipsa acrius.

Aristolochia.

Aristolochiæ "Radix multo est ad medicationes vtilissima, amara & subacris. Sed ex illis oïum subtilissima est Rotūda, & ad oïa efficacior. Aliarū verò duarū quæ Clematidis appellat̃, fragrantior est: itaq; ea ad vnguēta vtunt̃ vnguētarij: sed ad sanationes infirmior. At Lōga minus quidē tenuitatis partiū obtinet q̃ rotunda, sed nec ipsa inefficax est, verū abstergerendi atq; excalfaciēdi potentiā possidet, minus quidem q̃ rotunda abstergens ac digerens, sed non minus calfaciens, immo forsan plus quoq;. Itaq; in quibus vsus est modicę absterlionis, commodior est longa, puta in vlceribus carne explēdis, & fomentationibus vteri: At in quibus crassum humorem validius extenuare oportet, illic vsus est rotundæ. Proinde dolores ab infarctū aut crassitie crudorum spirituum natos magis curat rotūda, & spicula extrahit, et putredines sanat, & sordida vlcera repurgat, Fidentes & gingiuas candidas efficit. Auxilio est & asthmaticis, singultientibus, comitialibus, podagricis, si cum aqua bibatur. Tum ruptis & cōuullis, vt si quod aliud medicamētum, idoneū est.

A. l. 2. t. 2. c. 49.
fol. 102. b. c.

Arceuthus luniperus.

Iuniperus "calida & sicca vtrinq; tertij ordinis. At Fructus similiter quidem calidus est, sed nō similiter siccāt, verū in hoc primi fuerit ordinis.

A. ibi. c. 759.

Arctium Lappa Minor.

Arctium illud, quod thapso verbasco est simile, radice tenera, candida, dulci, caule oblongo & molli, semine cymino simili, facultatis est admodum tenuium partium, & ob id exiccantis extergētis quæ, tamen modicę. Quamobrem Radix ac Semen eius cocta cum vino quadatenus dolores dentium mitigant. Porro ambusta, & chymethla idest perñiones, non horum modò decoctū perfusum, sed & caules teneriores sanare possunt. Arctium aliud, Lappa maior, Bardana. Alterum verò Arctium, quod Profopitida, & Profopion i. perfonatium, vocant, cuius q; folia cucurbitę simillima sunt, nisi quatenus tum maiora tum duriora, digerit simul & desiccāt, sed & adstringit non nihil. Quamobrem folia eius veteribus vlceribus mederi possunt.

Arnoglossum Plantago.

Arnoglossum. "Mistæ & hoc est temperaturæ: habet enim quiddam aqueum frigidum: habet verò & austerum quiddā, id quod terreum est, siccum frigidum. Itaq; refrigerat simul & desiccāt, & in vtroq; secundi excessus a medijs est. Porro medicamenta, quæ cum hoc q; refrigerant, vnā etiam adstringunt, ea & ad vlcera rebellia omnia, & ad fluxiones, & putredines cōueniunt, ac proinde & ad dysenterias. Nam & sanguinis profluuiā sistunt, & liquid aduratur refrigerāt. Tum sinus quoq; glutināt, & alia vlcera recētia simul & vetera. In oïbus ferē id genus medicamentis primas tenet, aut certē nulli secundum est, Arnoglossum, id q; temperaturæ symmetria & conuenientia. Nam siccitatem obtinet morsus expertem, & frigiditatem, quæ nō dum obstupefaciat. Et Fructus & Radix similis sunt facultatis, nisi q; tum siccioris, tum minus frigida. Sed fructus quidem subtiliorum est partium, radices autem crassiorum partium. Et ipsa herbe Folia exiccata subtiliorum sunt partium & minus frigida facultatis, nempe distillato ex eis ac digesto excremento aqueo.

G
A. ibi. c. 429.

Hac ratione & radicibus vtuntur ad dentium dolores tum mandentes, tum collutionibus incoquentes. Præterea ad iocinoris & renum obstructions non has tantum adhibent, sed folia quoq;, & multo magis fructus. Hac enim omnia quandam in se abstergerendi facultatem obtinēt: quam & in herba viridi inesse satis conijci potest, verū ab humiditatis copia deuinci.

H

Arum.

Aron. Terrena " & ipsum essentia constat, calida. Proinde extergendi vim possidet, verū nō valentem, sicut Dracontium. Est itaq; in exiccando & excalfaciendo primi ordinis. Radices eius maximē sunt vtilis: liquidem comesa crassitiem humorum mediocriter incidunt, adeo vt & excreationibus ex pecciore idoneæ sint: sed magis tamen aptum est Dracontium.

A. ibi. c. 432.

Artemisia.

Artemisia. "Duplex quidē est herba Artemisia, sed vtraq; excalfacit, & modicę desiccāt: & sint; quod ad calfactionem attinet, excessus secundi: quod verò ad resiccationem, aut primi intensi, aut secundi incipientis. Sunt autem & modicę tenuium partium. Itaq; ad renum calculos mediocriter commodæ sunt, & ad fomentationes vteri.

A. ibi. c. 83.

Asarum.

Asaron. Huius "herbae Radices vtilis sunt, facultate similes radicibus acori, intensiores tamē. Itaq; ex ijs quæ de illis prodita sunt, hic facienda coniectura.

A. l. 2. t. 2. c. 4.
fol. 99. c.

Asclepias.

Asclepias. In tertio Dioscorides de hac herba cōscripsit: At nos eius non dū periculū fecimus.

Aspalathos.

A *Aspalathos.*

A. ibi. c. 206. Aspalathus "gustu quidem acris simul & adstringens est: facultate verò ex dissimilaribus constat, nempe partibus suis acris exalfaciens, partibus verò alijs, austeris scilicet, refrigerās. Itaq; vtriusq; ratione deficcet & refrigerat: Et proinde ad putredines & fluxiones est utilis.

Asparagus.

A. ibi. c. 603. Asparagus "Petreus, aut Myacanthinus abstergendi vim habet, id q; citra manifestam aut caliditatem aut frigiditatem. Hinc renes ac iecur infarctu liberat, & maxime herbae ipsius radices & semen. Quin & dentium dolores sanat siccitatis nomine citra calefactionem, quam vel maxime dentes requirunt. Porro Athenienses per ph dicunt Aspharagus.

Asplenium.

A. ibi. c. 630. Asplenium "tenuium quidem partium, non tamen calida est herba. Hac utique ratione & lapides frangit, & lienes liquat.

Astragalos.

Astragalos fruticellus est exiguus, Radices habēs adstrictorias. Quamobrem ēt ex numero est non instrenuē exiccantium. Nā vlcera vetera ad cicatricē ducit, & aluum fluxu tentatam sistit, si quis in vino decoctam radicem bibat. Plurimus huius fruticis proventus est in Pheneo Arcadiae.

Aster Atticus.

A. ibi. c. 337. Aster "Atticus. Alij Bubonium vocant, non ob id tantum, q; illitū, sed etiam q; suspensum, bubones sanare creditur: habet quiddam etiam digerēs: habet verò nō minimē & refrigerans quiddam ac reprimens, vt mista sit potentia, vti rosa: verum id non adstringit.

Astaphis Vna.

A. ibi. c. 716. Astaphis, "Culta quidem, concoquendi, adstringendi, & leuiter digerendi facultatem possidet. At Agrestis vehemēter acrē obtinet, adeo vt ex capite purget {quod ἀποφλεγματίζειν Græci dicunt} abstergat q; valenter. Itaq; ad pforam accomoda est. Sed & vrendi vim habet.

Asphodelus.

A. ibi. c. 73.d Asphodelus ". Et huius Radix utilis est, sicut Ari, Afari, & Dracōtij, nempe extergētis & digerentis facultatis. Vltæ autem Cinis calidior, & exiccantior, subtilior q; ac digerere potentior efficitur: Ac proinde & alopecias sanat.

Atractylis.

A. ibi. c. 159. Atractylis, aut Cnicus agrestis. Hac planta ex spinarum est genere. Facultatem habet deficcandi, & modicē digerendi.

* calidam.

Atraphaxis Atriplex.

A. ibi. c. 149. Atriplex "humida & frigida tēperie est, humida quidem secundi ordinis à medijs, frigida verò primi: quam utiq; tepidam esse caliditatem posuimus, cuiusmodi ros is inest: nō tamen adstrictio- nis est particeps, sed aquea est, & minimū terrena, quēadmodū malua. Quin & ventrē celeriter p- meat, vt illa, ob lubricitatem. Porro paululum omnino eius est, quod digerendi obtinet potentia.

Hortenses aut atriplex & malua, q; agrestes, tū humidiores sunt, tū frigidiore. Proinde phlegmonis & phygethis incipientibus, gliscentibus q; & emollibus etiam nū, ac velut feruētibus hortenses: vigentibus aut, & declinantibus, ac indurescentibus commodiores sunt agrestes. Semen eius abstergendi vim habet. Itaq; ad auriginem ex pituita infarctu progeneratam utilis est.

* A. Iecoris.

Aphace.

Aphace vim habet adstringēdi, sicut & ipsa lenticula {φάκων Græci vocāt.} Sed & similr vt lē ticulari edi solet, cæterum ægrius q; illa concoquitur. Valētius aut deficcet, & moderati caloris est.

Ablynthium.

A. l. 2. t. 2. c. 2. fol. 98. g Absynthium "adstrictorium, & amaram, & acrem simul qualitates possidet: exalfaciēs pariter D & extergens, & roborans, & deficcans. Proinde biliosos vētris humores per egestionem infernā propellit, ac per vrinas euacuat. Magis autē quod in venis est biliosum, per vrinas expurgat. Ob hac contentam in ventre pituitam nihil adiuuat sumptum: sic sanē si in thorace aut pulmone cō- tineatur: nam adstringens in eo facultas, q; amara, valentior est. Porro q; insit quoq; acrimonia, idcirco maiori portione calidum est q; frigidum. At si opus est vniuersaliter comprehēsam eius temperiem secundum primas circumscribere facultates (etli anomœomeres & dissimilare sit) calidum ipsum dixerim primi excessus, siccū tertij. Succus autē eius longē q; herba ipsa calidior est.

BALANOS MYREPSICA GLANS VNGVENTARIA

A. ibidē. c. 79. fol. 108. c **B** Alanus "myreplica, hoc est Glans vnguentaria, adferē ex Barbarica regione. Vtunt vnguen- tarij carnis eius succo, qui facultate calidus est. Reliquia aut, vnde expressus est succus, terre- tiores scilicet & duræ, vincētem habent qualitatem amaram. Sed & admista est quædam adstrictio. Proinde extergentem simul & incidentem, contrahentem que, & stipantem effectum possident.

Itaq; ad ionthos, lētes, ephelin, & pruritū, deinde & ad pforam, & leprā conueniunt. Verū enim uero & lienes liquāt iecurq; indurescentia. Quod si quis carnem eius drachmę pondere cum meli- crato bibat, medicamen experietur vomitorium. Sape etiam per infernam aluū largiter subducit. Itaq; cum hoc medicamento vtimur ad viscerum expurgationem, & maxime iocinoris lienisq;

ex oxycrato ipsum exhibere consueuimus. Gaudet vero vel maxime alioqui aceto ad actiones extrinsecas. Adeo enim efficax efficitur, ut & psoras, & lepras extergeat: & multo etiam magis quæ his sunt minora, lentes, vitiliginem, ionthos, ephelin, exanthemata, achoras: tum vlcerosa, & quæ crassi sunt succi omnia. Sed & cicatricibus decorem affert. Porro, quod cum illinenda est leni, præflect adinistram esse farinarum quampiam exiccantium, cuiusmodi est erui ac lolij farina, id iam potius ad componendorum medicaminum tractationem, haudquaquam ad præsens institutum pertinet: sed & in paratu facilibus ipsum dicitur. Verum in præsens sufficit abstergentem & incidentem cum adstrictione quampiam propositi medicaminis dixisse facultatem, ac sic ad aliud transgredi. Cortex tamen eius admodum adstringit. Itaque & hunc quoque possis, ubi valida usus est adstrictionis, accommodare.

Balsamum.

Balsamum "desiccatur & excoarctatur secundo excessu. Est autem & tenuium partium, adeo ut odoratum sit. Sed Liquor eius subtiliorum etiam partium est quam ipsa planta, non tamen adeo calidus, ut quidam existimant, tenuitate partium falsi. Porro Fructus eius persimilis genere facultatis est, cæterum longè in subtilitate partium inferior.

A. J. 2. l. 2. c. 21. fol. 108. c

Balaustium.

Balaustium "flos est agrestis punice, sicut domesticarum Cytinus. Valenter gustum adstringit. Et sane desiccantis & refrigerantis facultatis est, & nimirum etiam crasse essentie, si quidem memores sumus eorum quæ in quarto horum commentariorum sunt prodita: ubi ostendimus omnem adstringens, terrestre esse frigidum. Aliarum autem qualitatuum nullius præ se fert indicium. Proinde ipsum quis censcat strenue & exicare & refrigerare. Siquidem non perperam in quarto horum voluminum terreis frigidis corporibus adstringentem inesse qualitatem demonstratum est. Sane vero & euentus ipse comprobatur. Nam si intertriginibus et alijs vlceribus ipsum illinas, celerrimè illa videbis cicatricem contrahere. Hoc sane nomine & ad sanguinem reijcientes, & ad dysenteriam, tum ad ventris vteri quæ profluvia, non est quispian medicorum, qui curandi tractatus conscribere, qui hoc non utatur medicamento.

F. A. ibid. c. 109. fol. 110. h

Batus Rubus.

Rubi "Folia, germina, flos, fructus, & radix qualitate adstringente participant, ea quæ non obscura. Sed hoc inter se differunt, quod folia ac præcipue mollia & recens nata plurimum in se habeant substantiæ aqueæ, paucum vero adstrictionis: eadem ratione & germina. Itaque si mandatur, aphthas & alia oris vlcerata sanant. Quin & alia vulnera glutinare valent: est enim eorum temperies & ex terrea frigida essentia, & aquea tepida. At Fructus, si quidem maturus fuerit, non parum habet succi calidi temperati, qui dulcis est, uti monstrauimus: Itaque ob hoc & ob modicam adstrictionem esui non insuauis est. At immaturus à frigida substantia terrea vincitur, ac proinde acerbior est & valde exiccatorius. Et sane uterque siccatus recoditur validius quam recens desiccans. Sed & Flos eandem vim fructui immaturo possidet. Vtraque ad dysenterias, & ventris profluvium, & atonias imbecillitates, & sanguinis exuptionem idonea remedia. Porro Radix præter adstrictionem, non paucam habet substantiam in sese tenuem, per quam & lapides renum comminuit.

A. ibi. c. 572.

Batrachium.

Batrachium quatuor habet speciatim differentias. Omnia verò vehementer acrem qualitatem possident, adeo ut cum dolore exulcerent. Hac ratione, si moderatè utare, psoras & lepras excoarctant, & vngues diuellunt: tum leprosis stigmata digerunt, & acrochordonas & myrmecias detrahunt. Quin & alopecias iuuant paucò tempore admota: nam si diutius inhæreant, non excoarctantur solum ipsa cutis, sed & in crustam vritur. Atque hæc omnia caulis & foliorum sunt opera, si imponas virentia. Porro Radix arefacta sternutationem prouocat, similiter alijs omnibus, quæ valenter desiccant. Sed & dentes dolentes iuuat, ut & frangat eos, valenti scilicet exiccatione. Et ut semel dicam, calida & sicca valde est tum radix, tum vniuersa adeo herba.

H

Bdellium.

Bdellium, "quod Scythicum nominant, quod sane & atrius est, & resinofum magis, emollientis admodum & efficacis virtutis est. At alterum, nempe Arabicum, quod dilucidius est, magis desiccatur quam emollientia. Igitur recens & humidum est, & contusum facile mollescit, ad omnia ad quæ scythicum, idoneum: At quod antiquius est, & admodum gustu amarum, & acre, & liccum, ab eorum, quæ indurata molliunt, mediocritate excidit. Utuntur autem quidam illis, & potissimum arabico, & ad bronchocelas, & hydrocelas, saliuam matutinam ieiuna que subigentes, ut emplastri consistentiam accipiat. Porro arabicum & calculos renum in potu sumptum frangere apparet: tum vrinas ciere, & crudorum flatuum discursus: præterea laterum dolores & rupturas persanare.

A. ibi. c. 112.

Bechium Tussilago.

Bechium inde adeo sic nuncupatum est, quod bechas hoc est tusses, & orthopnoeas, iuuare sit creditum, si quis folia arida aut radicem in prunis vrens ascendente inde fuliginem inspiratu attrahat. Est autem modicè acris, ut sine molestia noxaue omnes thoracis abscessus credita sit rumpere. Sane Folia virentia partes cruda phlegmone obsessas illitu extrinsecus adiuuant, nempe ob aqueæ humiditatis

A humiditatis admiffionem, qua omnia viridia tenera q̄; participant, alia plus, alia minus: nam sicca bechij folia acriora sunt, quàm vt phlegmonis conueniant.

Blitum.

A. ibi. c. 636. Blitū^o olus est esculentū, humidē frigide q̄; temperature, in secūdo maximē excessu à tēperatis.

Bulbus Satiuus.

A. ibi. c. 85. Bulbus^o Esculentus quidem frigidiorē & crassiorē lentū q̄; succū procreat. Nā & coctū difficilis est, & flatuosus, & venerem prouocans. Attamen illitus ob amaritatem simul & adstrictionē abstergit simul & glutinat, & nimirum etiam exiccat. Est enim ostensum amaritudinem in extergentibus esse substantijs, adstrictionem verò in glutinantibus. At siccitas vtranq; consequitur.

Bulbus Vomitorius.

Bulbus Vomitorius multo est calidioris temperatura, quàm superior.

Bubonium.

Buboniū, aut Aster Atticus, nuncupatum est ita, quia creditū est bubonas sanare tū illitū, tum inguinī adalligatum. Est aut mediocriter digerentis facultatis, quia videlicet & modicē calidum est: nec vehementer, nec ita deliccat, vt contendat, maximē cum etiamnū molle ac recens fuerit.

B

Buglossum.

A. ibi. c. 428. Buglossum^o humidæ calidæ q̄; temperiei est. Itaq; vinis iniectū lætitiæ ac hilaritatis causa esse creditū est. Sed & ijs qui ob supremi gutturi {pharynga Græci vocāt} asperitatem tussunt, coctū in melicrato cōuenit. *Bunium.*

Bunium, alij Arcticiū, adeo excalfacit, vt & vrinā moueat, & menses prouocet. Sed & Pleurodonium adsimilis illi caliditatis est. *Al. Arction.

Bupthalmum.

A. ibi. c. 97. Bupthalmum^o sic appellatum est à floribus, qui figura quidem boum oculis videantur adsimiles, colore autem anthemidis floribus simillimi sunt, sed multo tum maiores, tū aciores. Proinde & vehementius digerunt, adeo vt & duritias sanent cerato misti.

Brathy Sabina.

A. l. 2. t. 2. c. 5. fol. 99. d Sabina^o ex numero est fortiter exiccantium, id q̄; secundum tres qualitates quas in gustu præ se fert, similiter ut cupressus, nisi q̄; ea & acrior ē, & vt sic dixerim, magis aromatica, {seu odorator.}

Igitur huius quā modo dixi qualitatis est particeps, nempe acrimoniæ cōsistentis in tēperamento calido, præterea amaritudinis & adstrictionis obscurioris q̄; in cupresso: quantum. n. ipsa cupressum superat in acrimonia, tū ab ipso superatur in adstrictione. Quo manifestū est q̄; omnino calidior est cupresso, & ob id ēt potentius digerit. Itaq; glutinare nequit vulnera ob liccitatē & caliditatis robur: nam illi tū vtriusq; inest, vt ēt contendat, & inflammationē afferat: At putredinibus similiter ut cupressus accommodari potest, maximē vbi rebelliores fuerint & diuturniores: nā hæc citra noxam vim medicamenti perferunt. Quin & quæ atra sunt reddita, & admodum sordida, ea cū mellē expurgat. Carbunculos item soluit. Porro partiū tenuitate menses quoq; prouocat, vt siquid aliud: & sanguinē per vrinas mouet. Fœtum ēt viuētem interficit, & mortuū educit. Esto aut hoc medicamen tertij ordinis tum excalfaciētū, tum deliccantiū, ex numero eorū quæ vel maximē tenuium sunt partium. Et hoc vtique nomine vnguentis inditur, & maximē gleucino, & in multas antidotos inijcitur. Quidam verò etiam cinnamomi vice duplū eius subijciunt. Est enim extenuandi & digerendi facultatis, si epotum fuerit.

Bretanica.

Bretanica herbe Folia adstringentia sunt, & vulnerum glutinatoria, similia agrestiū lapathorū folijs, nisi quatenus acriora sunt, magis q̄; hirta. Sed & expressus ex illis Succus perinde natus est adstringere: itaque coctum quidam reponūt tanquam inter stomatica medicamēta efficacissimū.

D Videretur enim sanare iam etiam putrescentia.

Bromus.

Bromus vnum est ex leguminibus: verū vt medicamentum, similem hordeo vim obtinet. Nam illitum deliccat & digerit mediocriter, & sine morfu. Temperiem autem habet paulo frigidiorē. Non nihil etiam adstrictionis obtinet, vt ventris profluuiā iuuet.

Bryon Thalattion Alga.

Bryon Thalattio compositum est ex terrena & aquea essentia, vtraq; frigida. Siquidem & gustum adstringit: & calidis quibuscumq; illitum, ea euidenter refrigerat & adiuuat.

Bryon aut Splanchnon Muscus.

A. ibi. c. 711. Bryon^o, quidā verò Splanchnon. Inuenitur aut in quercubus, & piceis, & populis albis. Vim habet adstringentem inualidā. Nec. n. multū est frigidū, sed proximē fermē medij, quia videlicet & digerendi & molliendi facultatis est particeps, maximē quod in cedrinis lignis reperitur.

GALLIVM

A. ibi. c. 115. fol. 327. Gallium^o inde adeo nomen sortitum est suum, q̄; lac coagulet. Adsimile autem est Aparinæ, facultatem obtinēs exiccatoriam & subacrem. Flos eius sanguinis profluuijs competere videtur, & combustis mederi. Est autem boni odoris, & coloris lutei.

Gentiana.

Gentiana.

Gētiana. "Huius herbe Radix multum est efficax, cum opus est extenuatione, purgatione, absterfione, obstructionis liberatione. Nec mirum si hæc possit, cum impense sit amara.

E

A. ibi. c. 281.

Gigarta Acinorum Vuae Nuclei.

Acinorū Vuae Nuclei ex secundo ordine sunt exiccātium, refrigerantium verò primo. Substantia eorū crassarum partiū est et terrena: cui gustus indicio est, nimirū cū acerbi appareant. Quin & experiētia comprobatur. Nā omnibus ventris cū profluuiio iunctis affectibus impendiō conferunt.

Gingidium.

Gingidium, sicut gustu amaritatem & adstrictionem præfert, sic temperie quoq; ipsa caliditate & frigiditatem. Secundum vtranq; verò qualitatem desiccatorium est. Sed enim stomacho amicum est, utpote non paruam obtinens adstrictionem. Quamobrem non admodū conspicuam caliditatem possidet: secundo autem recessu desiccatur.

Glaucium.

Glaucium "adstringit cum quadam insuauitate. Tum adeo manifeste refrigerat, ut solum sepe erysipelata, utiq; si valentia non fuerint, curare possit. Mistura eius cōposita est ex aquea terrea q; substantia, vtraq; sanè frigida, verū non summè, sed ceu aqua fontana.

A. ibi. c. 470.

F

Glaux.

Glaux Herba. Et ipsa lactis generandi vim obtinere videtur. Quod si sit, calida quodammodo humida q; temperamento fuerit.

Gluchon Pulegium.

Pulegium". Et hæc herba, quandoquidem acris & subamara est, valde tum exalfacit, tum extenuat. Porro quod exalfaciat, abundè magnum est testimoniū, quod illita rubrificat: & si quis diutius toleret, exulcerat quoq;. Quod verò extenuet, satis indicat, cum humida crassa & lenta ex thorace & pulmone excreatu facilia faciat, menses q; moueat.

A. ibi. c. 461.

Glæos Strigmenta Balneorum.

Glæos modice emolliendi vim obtinet.

Glycyrrhiza Dulcis Radix.

Glycyrrhiza". Huius fruticis radicum Succus in primis utilis est, similiter ut eius radices, dulcis simul q; leuiter adstringēs. Proinde asperitates lenire potest, nec modo in arteria, verū etiam vasa scabra, id q; temperaturæ mediocritate. Quocirca fuerit sanè natura eius familiaris nostræ temperaturæ: nam tale monstratum est esse dulce: sed cum adstrictio quædam adiuncta sit, vniuersum eius temperamentum quantum ex caliditate & adstrictione est, tepidè potissimum caliditatis fuerit, quàm proximè accedēs ad symmetrum siue temperatum. Porro qm temperie quoq; est humidum id quod modice est dulce, iure sanè etiam siti congruens medicamentum est, nimirum modicè humidum, simul & humana natura frigidius. Refert Dioscorides Radicem siccam ad læuorē redactam, pterygiorum seu vnguium oculorum idoneum esse illitu remedium.

A. ibi. c. 437.

Glycyfida Pæonia.

Glycyfida, "quam Pentorobon & Pæoniam nuncupant, Radicem habet læuiter adstringentem cum quadam dulcedine: ac si plusculum dentibus mandas, acrimoniam item quampiam subamarā subesse percipies. Proinde menses ciet ex melicato amygdali pota quantitate: sanè tundere eam necesse est, ac ita cribratam inspergere. Expurgat porro etiam iecur obstructum, & renes: sed hæc efficere nata est, quæ acris & subamara est: Quæ verò quiddam etiam adstrictorium obtinet, in ventre prouenientes fluxiones sistere potest: ceterum eam tunc in austerorum vinorum quopiā decoctam potare conuenit. Est porro omnino resiccatoria. Eapropter haud desperauerim eam (quod merito creditum est) ex collo pueris suspensam comitalem morbum sanare. Equidem vidi puellum quandoq; octo totis mēsis morbo comitali liberū, ex quo hanc radicē gestauit: ac postea forte fortuna cū, quod à collo suspensum erat, decidisset, protinus denuo cōuulsione correptū: rursus q; suspensum in locum illius alio, inculpatè postea egisse. Porro visum est mihi satius esse rursus id collo detrudere, certioris experiētiæ gratia. Id cū fecissem, ac puer iterū esset cōuulsus, magnā recētis radiceis partem ex collo eius suspendimus: ac deinceps prorsus sanus effectus est puer, nec postea conuulsus est. Rationabile itaq; erat aut partes quaspiam à radice defluētes, ac deinde per inspirationem attractas, affectos ita locos curare: aut aerem a radice assidue mutari & alterari. Nā hoc pacto Succus Cyrenaicus columellam phlegmone affectā iuuat: & Melanthium frictū palam catarrhos & coryzas desiccatur, si quis id in calidum linteum rarum liget, assidue q; calorē ex eo per inspirationē in nares attrahat. Quin etiā si cōpluribus linis, & maxime marinæ purpuræ, collo viperæ iniectis, illis viperam præfoces, ea q; postea cuiuspiam collo obuincias, mirifice profuerit tū paristhmijs, tum omnibus ijs quæ in collo expullulant. Sanè de talibus priuatim aliquā forte conscribam. Ac nunc pæoniæ cognoscendum temperamētum est tum exiccatorium, tum subtilium esse partium, haud tamen insigniter calidum, sed aut symmetrum, aut pauxillo calidius.

A. ibi. c. 561.

Gnaphalium.

Gnaphalium inde adeo nominatum est, quod folijs eius mollibus pro tomento vtantur. Sunt autem

*τεχμήριον.

Autem candida, & modice adstringunt. Ac proinde quidam id exhibent ex austerorum vinorum quopiam dysentericis.

Gongilis Rapum.

Gongilidis Semen venerem excitat, vtpotè spiritū flatuosum procreans. Sic & Radix coctū difficilis est, inflat q̄, & semen generat.

DAMASONIVM SEVALISMA

A.l.2.c.2.144
fol.117.a

DAmasoniū, aut Alisma. De hac herba in tertio libro tradit Dioscorides, q̄ Radix eius epota dysenterias sanet, & aluum sistat, atq; œdemata mitiget. Sed nos ea quidem experti non sumus: Quod autem constitutos in renibus calculos aqua in qua decocta fuerit, pota comminuat, id certe experti sumus. Ex quo liquet q̄ absterforiam quandam facultatem obtinet.

Daucus Staphylinus.

A. lib. c. 287.

{ Daucus, "quem quidam etiam Staphylinum nuncupant, agrestis quidem domestico minus est esui idoneus, ceterum in omnibus vehementior: at domesticus esui aptior, sed imbecillior. Acrē, & calefaciendi facultatem obtinet, ac proinde etiā extenuandi. Certe Radix præter iam comprehensa flatuosum quiddam obtinet ac venerem. Semen autem domestici quidem & ipsum quandam ad venerem ciendi potentiam possidet. Agrestis verò planè flatu caret, quod ἀφυσον vocant: ac proinde vrinam menses q̄ ciet. }

Dauci Semen.

A. libidem.

Dauci herbe Semen excalfaciendi vehementer facultatem habet, adeo vt inter prima efficax sit tum vrinæ mouendæ medicamen, tum mensibus prouocandis. Multū etiam digerere per halitum foris impositum valet. Ipsa verò Herba similem quidem vim obtinet, tamē semine infirmiorē, nimirum ob aqueæ humiditatis misturam, quanquam vtiq; & ipsa calida sit temperie.

Daphne Arbor Laurus.

A. c. 213. & 444

Lauri arboris & Folia & Fructus desiccant & calfaciunt vehemēter, plus q̄ etiam fructus quā folia. At Radicis cortex minus quidem acris est & calidus, plus tamen amarus, habet q̄ etiam adstrictionis non nihil. Quamobrem & calculos confringit, & iecori prodest. Bibitur ex vino fragrante trium obolorum pondere.

Daphne Herba, & Chamedaphne.

Daphnes herbe, quam & Daphnen Alexandrinam appellitant, temperatura euidenter est calida: & gustantibus, acris simul est & subamara: Potaq; tum vrinas, tum menses prolicit. Porro Camædaphnes Germina tenera edi quoq; assolent. Est autem perlimilis viribus Daphnæ Alexandrinæ, sicut sanè & quod Daphnoides nuncupant.

Dictamnium.

A. lib. c. 461.

Dictamnium "tenuiore essentia constat q̄ Pulegium, cætera illi simile. At quod vocant Pseudodictamnium, ad omnia imbecillius dictamno est.

Dipsacos.

Dipsaci spinæ Radix ex secundo ordine exiccatoria est, habet q̄ non nihil & absterforium.

Dorycnium.

Dorycnium temperamento papaueri simile est, & mandragoræ, ac cæteris, quæ parē habent refrigerandi potētiam: excellit & frigiditate aquea admodū efficaci. Quamobrem pauculum quidem, soporem conciliat, plusculum verò sumptum interimit.

Dracontium Dracunculus.

A. lib. c. 432.

Dracontium "quiddam Aro perlimile obtinet tum folijs, tū radice, cæterum illo tum acrius est, tum amarius: ac proinde calfactorium magis, & tenuioribus partibus. Habet etiā leuiculā quandam adstrictionem, quæ quandoquidem cum comprehensis duabus qualitatibus acris s. & amara coniuncta est, medicamentum factum est, vt quæ maximè, efficax. Nam Radix viscera omnia expurgat, crassos potissimum & lentos succos extenuans: optimumq; remedium est contumacium vlcerū, { quæ κακονδῆ nūcupāt. } Expurgat quoq; exterget q̄ protectio strenue tū alia, quæ extensionem desiderant, tum vitiliginem cum aceto. Tum Folia item, vtpote similem facultatē habentia, vlcibus vulneribus q̄ recens inflictis accōmoda sunt: & quanto minus fuerint sicca, tātō magis conglutinant. Nam quæ sicciora sunt, viribus sunt acrioribus, q̄ vt vulneribus cōueniāt. Creditum quoq; est caseum humidum, si illis foris tectus reponatur, ob temperaturæ illorū siccitatem à putredine conseruari. Fructus valentior est non folijs tantum, sed & radice. Itaq; & caneros & polypodas eliquare creditus est. Succus quoq; eius † vitia oculorum } expurgat.

Dryopteris Filicula.

A. c. 419

Dryopteris "gustu mistam qualitatem præfert, dulcem, acrem, subamaram: in radice verò item acerbam. Facultatem habet septicam: Proinde etiam pilis glabram cutem efficit.

Drys Quercus, siue Robur.

A. lib. c. 179.
fol. 130 g

Quercus "Partes omnes adstringentis qualitatis participes sunt: Sed plus tamen habet quæ in trūci cortice Membrana subest: tum quæ sub glandis ipsius caliculo, ea videlicet quæ fructus carnem

* Dioscorides
dicit succū ra-
dicis.
† τὰ ἐν ὀφθαλ-
μοῖς, i. quæ
sunt in oculis.
Dios. nubes-
las albugines
& caligines.

nem cōueſtit. Quam ob rem ad profluuium muliebre, et ſanguinis expulſiones, tum dyſenterias, E & diuturnos ventris fluxus, commodam eſſe credunt. Maximè verò ea vtunt̃ decocta. Valētius tñ aſtringūt Fagus & Ilex, ſeu quis eas ſpecies eſſe Roboris velit, ſeu toto genere diuerſas. Quin & Folia harum plantarum tenella illita non inſtrenuè deſiccare valent: minus autem quæ ſunt alterius roboris, nimirum quanto minus ſortita ſunt adſtriſtionis. Siquidem ego quandoq; glutinaſſe me vulnus memini ſecuri inſlictum, cū nullum ad eſſet ad manū medicamen præter ipſius quercus folia. Triui ea in læui petra, & vulnus omnem q̃ vicinum locum contexit. Eandem folijs vim habet & Fructus roboris: eo q̃ medici non nulli ad incipiētes & crescentes vtūtur phlegmonas, nam quæ iam vehementes ſunt, adſtringentia reſpuunt. Sed talia ad curādī potius rationem q̃ præſentem tractatum attinent. Cæterum in præſentia nouiſſe, q̃ catenus adſtringentem, quatenus dictum eſt, facultatem quercus obtineat, ſufficit: ac proinde deſiccandi, atq; adſtringendi: excaſfaciendi autem paulo infra media, in genere ſeorum, quæ (vt ſic dicam) tepida ſunt.

EBISCVS ALTHAEA.

* Al. phyma-
14.

EBiſcus, ſiue Althæa. "Eſt autem Malua agreſtis, facultate digerendi, laxandi, ἀφλέγμαντος hoc eſt phlegmone leuandi, mitigandi, concoquendi difficiles coctū phlegmōnas. Radix porrò eius & ſemē cætera quidē pari folijs viridibus modo agūt, verū tenuiorū partium, magis q̃ exic F catoriā, ad hæc magis exteſoriā, facultatem oſtendunt, vt & vitiligines detergant, et ſemen renum calculos confringat. At radicis Decoctum ad dyſenteriam, diarrhœam hoc eſt alui profluuium, & ſanguinis reiectionem, aptum eſt, nempe cū adſtringentem quandam facultatem poſſideat.

Ebenus.

Ebenus "ex ijs lignis eſt, q̃ trita cū aqua in ſuccū ſoluunt̃, ſicuti nō nulli lapides. Vis ei ineſt excaſfaciēdi, extergēdi, & tenuium partiū. Quā ob rē quæ pupillas offuſcāt, extergere credit̃. Miſcet̃ alijs remedijs ocularibus, quæ ad vlcera antiqua, fluxiones, & bullas ſiue puſtulas, accomoda ſunt.

Elex Olea.

* θάλλοι.

Oliuæ "Rāmi quātū habēt adſtriſtionis, tātæ & frigiditatis participes ſunt. Fructus verò, ſi qdē ad vnguē maturuit, moderatè calidus eſt: ſi immaturus eſt, magis tum adſtringit, tum refrigerat.

Elexon Oleum.

Oleum "quod ex oliuis cōficietur, quod ſanè propriiſſimo nomine oleum appellamus, cuiuſmo di ſit temperaturæ, ſuperioribus libris definitum eſt. Quippe humectatoriū eſſe & moderatè calidum oſtēdimus. Eiuſmodi eſt, quod eſt dulciſſimum: ſitq; potiſſimum ex oliuis quas Græci δρυπεῖς vocant, {nos druppas}. Cæterum quod Omotribes & omphacinū nuncupant, id quan G tum in ſe habet adſtriſtionis, tñ etiam illi ineſt frigiditatis. Porrò oleum vetus, quod quidē ex dulci inueterato efficitur, & calidius eſt, & ad diſcutiendum potentius: Quod verò ex crudo, id dū reliquum quippiam ſeruauerit adſtriſtionis, miſtæ permanet facultatis: vbi verò illam prorsum abiecerit, reliquo ſit ſimile. Quin etiam quicunq; in præparando rāmos inſciunt, ij & ipſi omphacino ſimile oleum efficiunt. Cæterum rogandum non eſt, quo pacto ſit præparatum, ſed guſtandum eſt potius: ac, ſi præferat adſtriſtionis quippiam, eatenus ēt frigidum eſſe exiſtimandū, ceu illud quod ab Iberia portatur, quod Spanum id eſt Hiſpanicum nominant. Quò ſi nequaquā guſtantibus adſtringere appareat, ſed ad amuſſim videatur dulce, id modice eſſe calidum putandum. Porrò ſi tenue quoq; cernatur (tale eſt quod purum eſt, quod q̃ intuenti translucidum videtur) ac modicum eius latiſſime per cutem extenſum ſibi maneat continuum, celeriter q̃ a cure combibatur, id vtiq; pro optimo ducēdum, ac olei virtute q̃ maximè pollere, quale eſt Sabinum. Porrò q̃ oleum Lotū minimè omnium mordacitatem continet, ſupra etiam dictū eſt. Cæterum quo potiſſimum modo id probiſſimè laues, in ſequenti tradam opere, quod inſcribetur de Medicaminum cōpoſitione: vbi & de ſicyonio, & ſiquid eius generis præterea oleum eſt, agetur: Nunc ſermo mihi eſt de ſimplicibus, adiſciam q̃ & de alijs olei ſpeciebus. Vocatur enim quoddam Cicinum oleum, H in Ægypto maxime proueniens ex fructu ricini: Tum Raphaninum, ſeſaminum, amygdalinum, caryinum: ad hæc ſinapinum, lentiſcinum, laurinum, melāthinum, terebinthinum, maſtichinum, myrtinum, balaninum, hyoſcyaminum: nec pauca præter hæc ex fructibus expreſſa omnia, cæterum tñ inter ſeſe diſcrepantia, quantum et fructus ipſi à ſe inuicem diſſident. Eſt enim Cicinum tum tenuiorum partium, tum ad diſcutiendum potentius, q̃ ſimillimū oleo ex oliua vetuſto. Quā ob rem ſiquando in medicamenti cōpoſitione cicinum oleum adſcriptum fuerit, ſi ipſum non adſit, communi vtendum oleo, maxime ſi fuerit ſabinum. Raphaninum autem cætera huic ſimile eſt, ſed calidius tñ, at hoc etiam calidius Sinapinum. Huic ſimile eſt quod ex Melanthio, hoc eſt gith, conficitur. Pugnant cum iſtis Myrtinum & Seſaminum, tum q̃ adſtringant, tum q̃ craſſarū ſint partium. Miſtæ facultatis eſt Lentiſcinum, & Terebinthinum, & Maſtichinū: non enim tñ emolliunt, ſed & adſtringunt. Amygdalinum porrò amaritatem exuperantē poſſidet, cæterū cuiuſdam etiam adſtriſtionis eſt particeps: non tñ Caryinum, ſed id vel maxime ſimplicis eſt digerēdi facultatis. Calidius eo eſt ac magis digerens Laurinum, & hoc ēt magis Cedrinum. Proximū ei eſt, quod ex nigra pice conficit̃ Dadinū, minus quidē laurino calidum, verū valētius deſiccans. Hyoſcyaminum verò miſtæ facultatis eſt, emolliendi videlicet, & refrigerandi. Oleū porrò Cicinum

A. l. 2. c. 72.
fol. 107. b. Etc.
194. fol. 121. f

A. ibi. c. 226. fo.
124. g

A. ibi. c. 524.

A. c. 523.

* Forte loco amygdalini olei caryinum, rursusq; pro caryino amygdalinū legēdū eſt. Nullā. n. aſtriſtionē amygdalis attribuit Gal. cap. de amygdalis. Nuncib' autē qdā iſſe ait adſtriſtionē cap. d. caryis ſeu nuncib'.

A cieinũ ventrem subducit. Hoc verò magis, quod fit ex Gnidio grano, tanto nimirum, quanto granum potentiorẽ purgandi vim obtinet, q̃ cieis id est ricinus. Iã quod ex Agrestu oliua oleũ exprimitur, non simplicem temperaturam obtinet, sed extergit, simul q̃ astringit. Squallidissimum id est ex omni olei genere: & post, Istricũ quoq̃; deinceps post illa est Hispanum. Pinguis-
 mum est Lybicũ, & Cilicium: simul autem pingue & tenue Sabinũ. In medio comprehensorum omnium sunt, tum id quod per Cyclades insulas nascitur: tum quod per Græciam, Asiam q̃. Por-
 rò oleum pingue estimat iudicatur q̃ viscositate: tenue verò, si perluceat, si purum sit, si plurimum à minima eius portione inungatur, si facile à cute combibatur. Ex dictis cognoscere tam liceat &
 de alijs olei generibus, quæ equiuocè ipsis dicunt vnguētis, puta rosaceo, melino, liliaceo: et quæ-
 cunq̃ id genus floribus, fructibus, germinibus, folijs in oleo maceratis, cõficiuntur. Horũ quodq̃,
 vbi vnà cum aromatibus præparantur, vnguētum efficitur. De his copiosius dicitur in opere de
 Componendis medicamentis. Porro vbi quod in præsentia vtile est exposuero, desinam. Pro cu-
 iusq̃ iniectionũ natura oleum variari contingit. Ex ijs ergo, quæ in toto hoc opere de quocq̃ inieci-
 dorum vniuersaliter discas, singillatim quoq̃ confectum ex iisdem oleum cognoscere dabitur.

Elatine.

B Elatine modice tum refrigerat, tum adstringit.

Elaphoboscus.

A. ibi. c. 55.

Elaphoboscus facultatis est excafactoriæ, & tenuium partium, ac proinde exiccatoriæ secun-
 do maximè excessuum ordine.

Elenium Enula Campana.

A. ibi. c. 235.

Elenij herba Radix maximè est utilis, nō primo statim occurſu excafaciens: ac proinde dicen-
 da est non calida & sicca exactè ceu piper tum atrum, tum candidum, sed cum recrementitio humo-
 re. Quapropter eligmatis, quæ faciunt ad educendos ex pectore pulmone q̃ crassos lentos q̃ hu-
 mores, idoneè commiscetur. Rubrificant illa quoq̃ partes frigidis ac diuturnis vexatas affectibus,
 cuiusmodi sunt non nullæ coxarum passiones, ischiadas vocant, & exigue assiduæ q̃ articulorum
 quorundam præ humiditate procidentia ac luxationes.

Eleliphacos Salvia.

Eleliphacos euidenter excafacit, ac leuiter subadstringit.

Elleborus Veratrum.

A. ibi. c. 237.
fol. 125. d

Elleborus vterq̃ tũ albus, tũ niger, extergētis est & excafaciētis facultatis. Quā ob rem ad al-
 C phos, lichenas, pforas, lepras q̃, accomodi sunt. Quin et niger si in fistulā callo induratā immisſus
 fuerit duobus tribus ve diebus, callũ detrahit. Dētibus prodest cū aceto colluētibus. Sũto autē
 in tertio ordine excafacientium & desiccantiũ. Porro niger gustu calidior est, cādidus subamarus.

Elxine.

A. l. 2. c. 2. 18.
fol. 100. f

Elxine. Alij Perdicium nominant, alij parthenium, alij sideritin, sunt qui heracleam appelli-
 tent. Cæterum vis ei inest abstergendi & leuiter constringendi cū humiditate subfrigida. Quam
 ob rē phlegmonas oēs in initio & augmēto sanat vsq̃ ad itatũ *ἰσχυρὸν* Græci vocant, } & maximè
 si calidæ fuerint. Quin etiam incipientibus phygethiscataplasmatis ritu illinitur. Tum et ad au-
 rium dolores phlegmonosos Succus eius cū rosaceo mediocriter profuerit. Gargarizandũ item
 non nulli exhibent ad paristhmia. Sunt verò etiam ex medicis quidam, qui ijs qui diutina tussi ve-
 xantur, illam exhibuerint. Certè euidenter extergendi experimentum præbet & in vas vitreis.

Elxine.

Elxine, quæ & Cissampelos nuncupatur, digerendi facultatem obtinet.

Elymus, Meline, Panicum.

A. ibi. c. 288.

Elymus. Vocatur autem & Meline. Panicum ex leguminum genere est, milio specie simile,
 D facultate certè pauci nutrimenti, & exiccatoriæ. Sisti quoque non nihil ventris fluxus, ceu ipsum
 etiam milium. Si verò foris illinatur, exicat atq̃ refrigerat.

Empetron.

Empetron ad solas purgationes esse videtur commodum, bilem ac pituitam educens. Gustu
 falsum est: proinde ad alia quoq̃ vtaris licet, ad quæ pollere ostendimus substantiam falsam. Nomi-
 natur item Prafoeides.

Epithymum.

A. ibi. c. 225. a

Epithymum thymī facultatē habet, ad omnia efficacius. Exicat & excafacit in tertio gradu.

Epimedium.

Epimedij vis est moderate refrigeratoriæ cū aquea humiditate: quare nullā habet insignē quali-
 tatem. Vberibus illitum ea recta feruare potest. Aiunt verò, si potu hauriatur, sterilitatem parere.

Epimelis.

Epimelis. Acerba hæc planta est, vt q̃ dixerit quispiam, pomus syluestris. Vocatur autem ab
 Italia rusticis Vnedon. Ingens eius in Calabria prouentus. Fructus eius acerbus quidem est, ni-
 hilo minus tamen stomacho ingratus, & capitis mouens dolores. Admista siquidem ei est aliena
 quæpiam qualitas.

Erebintus

* A. Cnicinũ.

* A. Cnicus.

* A. hemicra-
nia.

* A. ἰσχυρὸν ad
stringit.

DE SIMPL. MEDIC. FACVL.T.

Erebinthus Cicer.

Cicer "legumen est flatuosum, copiosi nutrimenti, aluo mouendę habile, ciendę vrinę idoneū, lactū & semini generando aptū: prolicit verō et menses. Porro quod vocat Criū, hoc est arietinū, cæteris efficacius vrinam prouocat. Decoctū eius calculos renū confringit. Reliquū autē cicerū genus (vocat aut Orobiaū) eadē vi pollet, puta attrahendi, digerendi, incidendi, extergendi. Sunt enim calidi, & modicē siccī: participes itē sunt amaritatis: Cuius vi lienē, & iecur, & renes expurgant, pforas q̄; {& lepras,} & lichenes extergunt, tū abscessus post aures proueniētes {παρωτίδας Græci vocāt,} & testes induratos discutunt. Tum ēt vlcera, quę cacoethe vocant, cū melle sanant.

Erebinthus Agrestis.

Erebinthus agrestis ad omnia efficacior domestico est, hoc est tum calidior, tum siccior, quanto & acrior & amarior.

Erice.

Erice digerendi per halitum facultatem obtinet. Flore eius potissimum ac Folijs vtendum.

Serpyllus Serpyllum.

Serpyllum "vsque adeo excalfacit, vt & menses, & vrinas moueat. Gustu multum est acre.

Erysimum.

Erysimi Semē sicut gustu nasturtio apparet simile, ita facultate igneū est, & excalfactoriū. Porro vbi in eligmate vt ex vsu est, præstat aqua maceratū refrigerare, aut linteolo inuolutū & crusta pistoria circūlitū torrere. Vtile est cū eligmatis ad promouēdas crassorū lētorū q̄; pectoris pulmonis q̄; humorū exuptiones. Quin & parotides induratas, & duritias antiquas vberū & testiculorū iuuat. Refert Dioscorides, q̄ cū aqua & melle cataplasti in morem illitum oculis proliit cancris.

Erythrodanum Rubia Passua.

Erythrodanum. "Est autem tinctorum Rubia radix acerba gustu, & subamara. Itaq; quacūq; agere dicta sunt superiore libro, vbi in vnum eiusmodi coierint facultates, ea omnia in hac radice luculenter conspicias. Quippe cum & lienem et iecur expurget: & vrinas crassas multas q̄; ac non nunquam etiam sanguinolentas vacuet. Quin & menses ciet: & mediocriter quę exterrionē postulant extergit, proinde vitiliginē albas cum aceto illita iuuat. Sūt qui eam ischiadicis, hoc est coxendicum doloribus afflictis, & resolutis, in potu cum melicrato exhibeant.

Eupatorium.

Eupatorium "herba ipsa tenuium partium, incidendi extergēdi q̄; facultatem citra manifestam caliditatem obtinet. Quocirca obstructions iecoris expurgat. Inelt itidem ei & adstrictio quædam, per quam robur visceri addit.

Euphorbium.

Euphorbium "caustica siue vrentis facultatis est, & tenuium partium alijs succis similiter.

Ephemerum.

Ephemerū, nō illud lethale ac deleteriū, quod & Colchicū nomināt, sed alterū, quod et Irin agrestē cognomināt, folia & caulē lilio similē obtinet: radicē oblongā, nō rotundā ceu colchicū, digiti potissimū crassitudine, adstringētē, & boni suauis q̄; odoris. Ex quibus palām fit facultatis tēperaturæ q̄; esse mistā, nempe repellentis, & halitu euaporātis. Testificantur opera, quę particulatim ædit. Siquidē non inefficaciter radix eius in dentiū doloribus colluitur. Tū phymatum augmento & statui Folia congruunt: oportet autem ea in vino decocta prius, q̄ pus moueas, illinere.

Echinus Herba.

Echini herbæ Fructus acerbus est, ac proinde repellentis & exiccatoriæ facultatis. Vtuntur eo ad oculorum fluxiones & ad aures.

Z E I A

ZEia "vniuersa sua facultate quodammodo in medio est tritici et hordei. Itaq; ex illis cognoscatur.

Zingiber.

Zingiberis "Radix utilis est, vtiq; quā ex Barbaria ad nos cōuehant. Excalfacit valēter, sed nō primo statim occurso velut piper: vnde sanē & minus esse subtiliū partium q̄; piper existimandū, siquidem in tenues solueretur partes, & celerrimē actū vt illud fieret calidū. Apparet. n. illaborata & crassior adhuc quædā ei inesse substantia, nec ea sicca & terrestris, sed humida potius atq; aquea. Quo fit vt facile perforetur, cum s. recremētitiā insit humiditas: neq; n. quicq; eorum, quę aut planē sicca sunt aut humida, sed elaboratam & familiarem continent humiditatem, tale aliquid patitur. Idem vsu venit piperi longo. Atq; hinc est q̄ diutius perseuerat, quę proficiscitur à zingibere aut pipere longo caliditas, quā quæ ab albo aut nigro. Nam sicut ab aridis calamis flamma simul celerrimē accenditur, & vnde quaq; dispergitur, eundem in modum quæ à siccis potestate medicamentis æditur caliditas: at quæ prodiit ab humidioribus, ceu ligna sunt viridia, & tardius accendit, & durat diutius. Ex quo fit vt vtriusq; medicamēti diuersus sit vsus. Siquidem vbi totum corpus celeriter excalfacere consilium est, ea tunc exhibenda sunt, quę & celerrimē à calorē nostrī contactu incalescant, et promptissimē vnde quaque ferantur. Verum vbi partem quamuis refrigeratam recalfacere studemus, contrā agendum, nimirum, quę tarde calefcentia plurimo tempore perdurent, ea præbendo. Cæterum licet zingiber & piper longum hac ratione à nigro pipere differāt, non

* Quāq; Aldi nus co. græcus, ac manu scriptū etiā, quotquot vidimus, & tractatio vetus, & Oribasius legūt, humidi.

* φῶξαι.
* ὀπτῖσαι.

E

A. ibi. c. 128. fo. 114. c

A. ibi. c. 507.

A. ibi. c. 573.

A. ibi. c. 239. fo. 126. b. c

G

A. ibi. c. 232.

H

A. ibi. c. 735.

A non magna tñ est differētia: at nasturtiū, napy, thapsia, & agrestiu colūbarū stercus maiori tpe pfecte accēdunt, & plurimo tpe pdurāt. *Zythus.*

A. c. 171.

Zythus acrior est nō paulo hordeo, & succi prauī, vtpotē qui ex putredine proueniat: est & flatusosus: tum partim acris est & calidus: partim verò plurimum frigidus, aqueus, acidus.

Zyme Fermentum.

A. ibid. c. 178.
fol. 130. g

Fermentum tenuium est partium, & mediocriter calidum. Proinde sanē sine molestia ac mordacitate quæ in profundo sunt tum extrahit, tum digerit. Cæterum ex contrarijs & ipsum facultatibus temperatum est, sicut alia multa. Particeps namq̃ est aciditatis cuiusdam frigida, & caliditatis putredinosæ, cui accedit & ea, quæ ex salis est & farinæ natura.

HEDIOSMOS MENTA

A. ibi c. 487.

Hediosmos. Alij verò Minthen odoratam nuncupant. Est enim & alia quedam Minthe nō odorata, quam Calaminthen vocant. Vtraq; gustu acri, & facultate calida est, ex tertio ordine excafcientiū. Infirmior tñ est menta odorata q̃ calamintha: & minus excafcit. Vt. n. in vniuersum dicam, hæc ceu sylvestris quedam est, illa ceu domestica. Quam ob rem sanē ob eam, quæ ex cultu accedit humiditatem, mediocriter item ad venerem excitat: Id quod omnibus commune est quæ humiditatem semicoctam & flatusosam continent. Ob talem ipsius herbæ temperaturam in abscessibus ea quidem cum polenta mista vtuntur: Id quod in calamintha facere nequeas, propterea q̃ valentius tum excafciat, tum deliccet, q̃ id genus poscant. Habet vero etiam quiddam amarum in se & acerbum: illo quidem lumbricos interficit: acerbitate vero si cum oxycrato bibatur, recentes sanguinis reiectiones reprimat. Substantiæ est, vt si qua alia herba, tenuium partium.

Hedysarum.

Hedysarum, aut *Pellocinus*. Huius fruticis Semen colore rufum est, vtrinq; anceps, vtī secures. Amarum & subacrbum apparet. Quam ob rem potum gratum est stomacho, & viscerum obstructions expurgat. Idem præstant totius fruticis germina.

Hemerocalles.

Hemerocalles radicē habet lilij radici similē, nō figura tñ, sed & viribus. Prodest nō secus atq; illa, igni ambustis: Quippe q̃ leuiter digerentem facultatē habeat, & cū hoc non nihil repellens.

Hemionitis.

Hemionitis simul & adstrictionem & amaritudinem possidet. Quam ob rem cum aceto pota lienolis auxilio est.

Herigeron.

C Herigeron facultatem mistam obtinet, simul refrigeratorem, & modice digerentem.

Heryngium.

Heryngium caliditate aut parum, aut nihil, quod temperatum est, superat. Cæterum non parua habet siccitatem leptomere, idest in tenui essentia consistentem.

THALIE TRVM

Thalietrum folia habet coriandro similia, caulem crassitudine rutę. Vis ei inest exiccatoria citra morsum. Itaq; vlcera inueterata ad cicatricem perducit.

Thapsia.

A. ibi. c. 304. &
300.

Thapsia acrem habet ac valenter excafcientē facultatē cū humiditate coniunctā. Quā ob rē ex alto violenter extrahit, & quod extraxit digerit. Verū plusculum ad ea efficienda tēpus postulat, vt quæ larga humiditate excrementitia impleta est: cuius vitio ē fit, vt celeriter corrumpatur.

Thermus Lupinus.

A. ibi. c. 440.

Lupinus edī potest coctus, multis ante diebus p macerationem amaritudine in aqua deposita. Fitq; tunc nutrimentū succi crassi. Cæterum hic, vt medicamentum quidem, ex genere est emplasticorum. At vbi natua etiamdum manet amaritas, extergendi digerendi q̃ vim obtinet. Interfici lumbricos tum illitus, tum addito melle linctus, tum ex posca epotus. Quin & Decoctum eius lumbricos ejicere potest: tum etiā foris itidem perfusum viuligines, achoras, pustulas & exāthematia Græci vocant, & pforas, gangrænas, vlcera maligna quæ cacoethe vocant, iuuat, partim extergendo, partim citra mordacitatem digerendo siccando q̃. Expurgat iecur et lienem cum ruta & pipere suauitatis gratia assumptum. Elicit menses ac foetum cum myrrha & melle impositum. Porro lupinorū Farina sine mordicatione digerit. Nec enim liuida tñ, sed & choeradas et phymata durat: sed tunc in aceto, aut oxymelite, aut posca coquatur oportet, id q̃ pro laborantium temperamento, & affectus diuerlitate, quod ex vsu est, eligendo. Sed non est præsentis instituti talia distinguere. Digerit item quæ liuida sunt. Et quæcunque modo diximus præstare posse decoctum, eadem omnia efficit & farina. Sunt verò etiam qui eam ischiadicis cataplasmatibus modo illinunt.

Thermos Agrios Lupinus Agrestis.

Lupinus Agrestis amarior est, & ad omnia valētiōr domestico, eiusdē genere cū ipso facultatis.

Thlaspi.

A. ibi. c. 501.

Thlaspī Semē. Habet & ipsum facultatē acrē, adeo vt internos abscessus potū dirumpat. Menses ciet, & foetum necat. Per sedē infusum sanguinolenta euacuās ischiadibus prodest. Est. n. alioqui tum supernē tum infernē biliosorum humorum euacuatorium, oxybaphi mensura epotum.

Thridax

† A. Ex græcis
codic. & mss.
suo Clarus, cui
accedit & ea, q̃
ex sale & farina
prouenit, q̃
sua natura est.

Tridax Lactuca.

Lactuca "humidum est frigidum q̄z olus, non tamen extremē (liquidem edendo non foret) verū maxime secūdm aquā, vt sic dicam, fontanę frigiditatem. Proinde ad calidas phlegmonas accō modum est, & ad parua & leuia erysipelata: non tamen maioribus satisfacere idonea est. Est etiam edulium siti aduersum. At Semē potu, geniturę profluuiū cohibet: quam ob rem etiam ijs qui libidinosis somnijs vexantur, datur: Sic & Agrestis lactuce semen, cuius colligitur succus, argemas & caligines expurgans, tum ad adustiones cum lacte mulierum inungi solitus.

Thymum.

Thymū "incidit & calfacit vehementer. Ob id & urinā, & mēses prouocat, fœtum euellit, viscera potū expurgat, educēdis ex thorace & pulmone cōfert. Itaq; in excalfaciendo exiccādo q̄z in ter tio ordine statuendum est.

IDAEA RADIX

I Dæa Radix gustu admodū acerba est: ac si opere periculū facias, eandē vim p̄fert: Nimirū sanguinis profluuiā, alui fluxus, dysenterias, profluuiū mulierū, & q̄cunq; eius sunt generis tū po ta, tum foris imposita curans.

Ixos Viscum.

Viscū "ex plurima aerea & aquea calida, paucissima terrena substātia cōstat. Nam acrimonia in eo amaritudinē excellit. Itaq; ēt effectus substātię respōdent. Siquidē valēter ex alto humores ex- F trahit, nec eos tm̄ tenues, sed & crassiores, eos q̄z diffundit ac digerit. Est aut ex eorum genere q̄ nō protinus admota excalfaciunt, sed quæ tempus requirunt, velut thapsia: sed & suprā hoc commo nuimus inesse calidis facultate medicamentis, vbi largum continent humorem recrementitium.

Ios Viola.

Violæ "Folia aqueam & subfrigidam substantiam superātem possident. Proinde tum per se, tū cum polenta illita calidas phlegmonas mitigant. Imponuntur & ori ventriculi estuanti, et oculis.

Hippuris Cauda Equina.

Hippuris "adstringentē cū amaritudine qualitātē possidet: ac pinde valēter, simul q̄z citra mor- A dacitatē, exiccantē. Itaq; vulnera vel maxima illita cōglutinat, etiāli præfectos esse neruos cōtigit: p̄terea vocatas enterocelas glutinat. Ad hæc ad sanguinis reiectionē, ad profluuiū muliebri potissimū rubrū, ad dysenterias, & reliquos vētris fluxus, strenuū ac generosum est remediū herba ipsa aut ex aqua, aut ex vino epota. Sūt qui de ea scriptū reliquerunt, q̄ non nunq; ēt vesicæ ac re- nuuium intestinorū vulnera sanauit. Eius vero Succus prodest ēt profluuiio sanguinis prorūpēti ex naribus, tum fluxibilibus in ventre passionibus ex austerorum vinorum quopiam potus, ac si febre teneantur, ex aqua.

Hippomarathrum.

Hippomarathrum. Vnā cum foeniculo & de ipso differemus.

Isatis.

Isatis "Domestica quidē, qua vtunt̄ tinctorēs, facultatis est valenter exiccātis, non dum tm̄ mor- A dentis: est. n. simul amara atq; adstringens. Proinde magna vulnera corporum durorū glutinat, etiam si in capitibus musculorum fuerint: & sanguinis profluuiio laborantibus partibus vtiliter il linit. Tumores œdematodeis mirifice digerit simul ac reprimi: et aduersus omnia vlcera maligna & cacoethe mirabiliter resistit, etiā si putrescāt, etiā si exedant̄ ac erodant̄. Quod si qn̄ q̄ pro laborā tis natura valentior appareat, folijs eius tritis miscere oportebit aut panē, aut hordeaceā farinā, aut triticeam, aut polentam, pro vincente nimirū in vnoquoq; affectu. At Isatis Syluestris manifestē iam acre quiddā tum gustu, tū actione præfert. Proinde q̄ domestica valentius desiccans, valētius humidis ēt putredinibus oblitit: Ad cetera vero iā cōprehensa deterior: immoderatus enim iam mordaciter q̄z desiccet: talia autē iritantur hoc pacto, & phlegmone grauari incipiunt. Cæterum ob facultatis robur lienosis quoq; vtilis fuerit, cum altera non dum prodesse possit.

Isopyron, aut Phasiolon.

Isopyrum aut Phasiolum semen habet amarum & subacerbum. Extergit itaq; & incidit humo H res crassos cum hoc vt corpora contrahat & constringat. Quam ob rem excreationibus pectoris conducit, & iecur expurgat: & sanguinem spuentibus non est aduersum, immo etiam iuuare cre ditur: Nam propter temperaturæ mistionem contrarijs etiam congruere videtur.

Itea Salix.

Salicis "Folij ad cruētī vulneris glutinationē vti possis. Verū floribus eius maximē propē oēs vtunt̄ medici ad exiccantis emplastri præparationē: est. n. vis eorū ita desiccatoria, vt morsu absti- neant: habet verò etiā quandā adstrictionem. Sunt verò ēt, qui succū ex eā expressum, medicamen feruent mordacitatis expers, & exiccatorium, ad multas res vtile. Haud. n. inuenias quid ad plures res vtilius medicamēto citra mordacitatē exiccātē, quod paulū ēt adstringat: sicut in opere de me dicamentorū cōpositione exactius docebimus. Porro arboris Cortex similē facultatē obtinet tū floribus, tū folijs, nisi q̄ tēperaturę sit sicciōris, velut oēs cortices. Sed hūc quiddā cōburūt, eius q̄z Ci nere vtuntur ad ea omnia quæ valēter desiccare oportet. Nam clauos quos vocant, callos {Græci τάλους vocāt,} myrmecias tollūt, aceto acri ipsum macerātes. Non nulli aut dū floret salix, corticē eius incidūt, & succū quendā colligunt, vtuntur q̄z ad ea q̄ pupillas offuscant, extergente videlicet simul q̄z tenuium partium medicamine. Vti verò illo ad multa quis possit, siquidem talis fuerit.

Galenī

E

A. ibi. c. 441

A. ibi. c. 328. & 704.

A. ibi. c. 217.

A. ibi. c. 715.

A. l. 2. t. 2. c. 202. fo. 122 c

G

A. ibi. c. 509.

A. ibi. c. 319.

* Aliter eis.

GALENI DE SIMPLICIUM
MEDICAMENTORVM FACVLTATIBVS
LIBER SEPTIMVS

*Quod Hi Libri haud negligenter legendi: Ac de Quatuor Gradibus
Simplicium medicamentorum.*



S Eptimum de simplicium medicaminum facultatibus commentarium scripturus necessariū duxi praefari, solis ijs apertum ac clarū fore, qui in superioribus libris non velut aliud agentes, aut obiter, fuerint versati: alios vero potius perperam inaudituros, q̃; eorum quæ in eo dicenda sunt, aliquid percepturos existimo: tum sese falluros: & nos forsan, tanq̃; nō recte quædam scripserimus, calumniaturos, atque cōuicijs laceraturos. Itaq; qui sanioris mentis sunt, monitis, scio, auscultabunt: ac si qua illis cura est praesentis huius speculationis, ab initio totum opus perlegent: at qui praecuriositate potius q̃; discendi studio huc accesserunt, monita nostra contemnent. Enimuero mirum fortasse videri nō debet, si inuenti sunt, qui mysteriorum libros à mysterijs alieni legere non sunt reueriti: verum illos sui Authores non scripserant prophanis: Nec ego, mehercules, ijs qui in principijs non sunt exercitati. Exponetur hoc in libro, & eo qui hunc subsequitur, reliquarum plantarum primæ facultates eo doctrinae ordine, qui in literis à quibus incipiunt visitur. Antecedente itaq; libro vsq; ad progressi sumus. Hic autem principium sumemus à 2, id modo premonentes etiā, p̃ ad ante demonstrata principia totum referemus. Siquidem hinc omnis membratim medicamentorum in agēdo provenit diuersitas, q̃; haecenus eorum vnumquodq; aut calidum est aut frigidum, aut siccum aut humidum, aut tenuium partium aut crassarum. Cæterum quatenus in comprehensōrū vnoquoque processum sit, iuxta exactissimā veritatem, explicatu certē est impossibile. Sed nos id tamen claris limitibus circumscribere sumus conati, qui quidem ad artis vsum sufficerent, Vnum esse medicamentorum genus monstrantes, quod ad similem corporibus nostris temperaturā pertingeret, cum à calore qui in ipsis est, mutationis alterationis q̃; acciperet principiu: Alterū, quod calidiū q̃; nos efficeretur: Cuius quatuor constituendos esse ordines visum est, Primum, qui sensu obscurus sit, adeo vt ratione sit opus, quæ verum deprehendat: Alterum ab eo secundum, quodammodo iam sensu clarum: Tertium deinde alium, qui valenter quidem excalfaciat, sed nō dum vrat: Quem sequitur quartus, & postremus iam adurēs. Sic quoq; refrigerantium, Primum quidem eorum, quæ rationis subsidio indigent, vt refrigerare demonstrantur: Secundum eorum, quæ sensibilibiter refrigerant: Tertium eorum, quæ valenter: Quartum eorum, quæ extinguunt, ac mortem inducunt. Proportionem istorum & de humectantibus, ac siccantibus.

CALAMINTHA NEPITA

C Alamintha essentia est tenuiū partiū, & calida sicca q̃; tēperie, ex tertio quodāmodo ordine vtraque qualitate. Horum manifesta sunt indicia, partim gustu apparentia, partim experientia cognita. Gustu siquidem acris & calida palam est, ac paulum omnino subamari obtinet. Periclitantibus autē & corpori admoventibus extrinsecus imposita, primum quidem valde excalfacit & mordicat, cutem q̃; exugit, postremo etiā vlcus efficit. In corpus autē intrō assumpta tum ipsa per sese sicca, tum ēt ex melicrato, perspicuo calfacit, & sudores ciet, omne q̃; copus tum digerit, tum exiccat. Ea ratione ducti quidam ipsam contra corporis cōcussiones rigores q̃; per circuitū repetentes adhibuerunt, foris quidem oleo incoctam toti corpori inungentes cum fricōne non desgni: intrō vero assumentes sicuti est dictum. Quin etiā & coxendicibus eam quidam in agitudinibus ischiadicis tanq̃; strenuum remedium illinunt: Trahit enim, quæ in profundo hærent, ad extimam superficiem, totum q̃; adeo articulū excalfacit, cutem q̃; non obscure adurit. Mēses q̃; tum epota, tum apposita, admodum efficaciter prouocat. Bonum ēt elephanticorum remedium, non eo tantum q̃; strenuē tenues humores digerat, verum etiam quia extenuet & incidat valenter crassos, qui talem morbum procreant. Sic & cicatricibus atris candorē reddit, & sugillata digerit: sed ad talia in vino concoquentes, emplastri modo ipsam imponere, & virentem magis q̃; arētem, praestiat, quippe arefacta vehementior redditur, & ad vrendum promptior. Porro talis cum sit, ad venenatarum bestiarum morsus assumitur, velut etiā cauteria, & quæcunq; medicamēta calida sunt & acria, tenuium q̃; partium, quæ q̃; facile ex alto ad sese circumiacentem omnē humiditatem possunt attrahere. Cæterum quæ illi inest amaritas, planē exigua est, verum ad quædā ita efficaciter agit, vt quæ valentissima est, nimirum cum coniuncta sit vehementi calori cū essentia tenuium partiū. Quare et ascaridas & lūbricos succus eius aut infusus, aut epotus enecat: Eadē ratiōe aurīū vermes: ⁊ aut si alicubi in corporis parte linuosa aut implicata, quæ putredine tentē, talis prouenit affectus. Sic & cōcepus seu pota, seu admota, interimit & enicit. Igitur incidēdi quidem ei vis adest propter calorē eius, tenuitatem partium, & amaritudinem: abstergendi vero propter vnicā

Quinta Classis.

GGGGG

amaritudinem

† Alex antiqui
cod. græc. & tra-
lat. veteri. aut
sicubi i vlcere
periclitantibus i
aia corpus par-
te talis proue-
nit affectus. nā
ex hoc nō vni-
us habent.

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

amaritudinem. Itaq; asthmaticis ob omnia antedicta prodest: Ictericis verò, siue regio morbo laborantibus, potissimum ob amaritudinem, sicut alia ferè omnia amara, vtpote abstergētia & expurgantia in iccinore prouenientes obstructions. Ad omnia iam dicta efficacior est Montana.

Calamus Aromaticus, seu Odoratus.

Calamus "Odoratus leuiculam quandam adstrictionem, ac minimam acrimoniā possidet. Maxima ex parte essentia eius terrena est & aerea, in caliditatis frigiditatis q; coniugatione temperata. Quamobrem moderatè vrinam mouet: & facultatibus quæ iecori stomacho q; imponuntur, misceri potest: tum in fomenta quoq; vteri, quæ phlegmones gratia, aut iritandis mensibus, assumuntur, vtiliter admiscetur. Ponatur itaq; habeatur q; secundi ordinis eorum quæ excalfaciūt & deliccant, valentius tamen desiccant q; excalfaciunt. Inest quoq; ei quædam partium tenuitas, velut alijs omnibus odoratis, siue aromatibus: ceterum illorum compluribus tenuium partium plurimum, calamo verò non multum adest.

A. ibi. c. 157. e.

Calamus Phragmitis Canna.

Calami Phragmitis Radicem cum bulbis aculeos & stipites ex alto extrahere quidam scripserunt, ceu trahendū quædā vis ei inesset. Nos tamen eius rei periculum non fecimus. Verū quantū gustu liceat coniungere, abstergētem facultatem possidet non paucam, minime q; acrem. Quin etiā Folia ipsa abstergentis sunt facultatis. Cortex verò eius combustus admodum tenuium partium, & digerentis facultatis efficitur, adiūctum habens absterforium quiddam, vt exiccet & excalfaciat tertio quodammodo ordine, plus tamen desiccet q; excalfaciat. Vitandus est eius Flos, quem Anthelen vocant. Nam si in aures incidat, adeo tenaciter adhærens affigitur, vt auelli non possit, auditum q; vitiat: quamobrem sapissimè exurdat.

Cācanus Cacalia.

Cācani "Radix facultatē hēt mordacitatis expertē, & modice exiccantē: essentiā crassarū partiū, & emplasticam. Quapropter macerata vino, sicut Tragacātha, & linctā arteriæ asperitates sanat. Nec minus si quis eā cōmandat, Succus eius defluēs prodest arteriæ similī vt Glycyrrhizæ succus.

A. ibidē. c. 382.

Canabis.

Canabis "Semen flatus extinguit: adeo q; desiccet, vt si plusculū edatur genituram exiccet. Sūt qui viridem succum exprimentes ad aurium dolores ab obstructione, opinor, natos eo vtantur.

A. ibidē. c. 170. fol. 110. b.

Capnios Fumus.

Capnios, "alijs Capnos, acris simul & amarę qualitatis est particeps: nec tñ planè expers est acerbæ. Quamobrem vrinam biliosam multā q; prouocat: sanat q; iocinoris obstructions & debilitates. Succus eius oculorum aciem acuit, non paulum trahens lachrymarum, velut ipse fumus: nā hinc ei appellatio indita. Plebeius quidam ea vti solebat ad stomachū roborādū, vna q; ventrem lubricandum. Siquidem herbam primum desiccata cōdebat: porrò cū vti volebat subductionis quidem gratia, melicrato inspergebat: roborandi verò stomachi causa, vino nimirum diluto.

A. ibidē. c. 275.

Capparis.

Capparis "Radicis cortex vincētem habet qualitatem amarā, proximam acrem, deinde acerbā. Ex quo liquet q; diuersis pugnantibus q; cōstet facultatibus: quippe abstergere, perpurpare, incidere potest amaritudine: excalfacere, incidere, digerere acrimonia: porrò contrahere, densare, constringere acerbitate. Itaq; lienes induratos, siquid aliud, hoc medicamentum iuuare valet, tum foris idoneis illinendis remedijs admistum, tum intro in corpus assumptum, siue decoctum in aceto aut oxymelite & id genus, siue aridum cōtusum illis q; permistum: quippe cū apertè crassos lentos q; humores hoc pacto sumptum euacuet, nec eos tantum per vrinas, sed & per ventrem: sæpe etiā sanguinolentos defert, vnde & lienes adiuti sunt, & coxarum dolores. Quin etiā menses promouet: et ex capite purgat detrahīt q; {quod ἀποφλεγματίζειν vocāt}: auxiliat q; ruptis atq; conuulsis. Cæterum cui nam ipsum potioni in quoq; affectuū misceri conueniat, non est præsens Hitis instituti persequi, sed aut eius, vbi de componendis agitur medicamentis, aut vbi curandi traditur methodus. Porrò Radicis eius cortex vlceribus malignis cataplasmatīs modo impositus non malum est remedium, vt qui illa extergere valeat, nec segniter desiccare. Præterea dētium labores prædictarum qualitatum ratione adiuvat, interim cum aceto coctus, interim cum vino, sæpe etiā solus dentibus manus ac morsus. Sed non pertinet ad præsens negociū, quādo quodq; horum tempestiuum sit, definire: nec. n. id nūc propositum est, sed ex quoq; particularium eius operum, virium eius quandam sumere indicationem, sermonem ad principia ab initio proposita reducendo. Ex dictis ergo clarum est incidendū quandam ei facultatem inesse, item q; extergendū, digerendū, contrahendū. Vitilignes siquidem cum aceto detrahīt, & choeradas, & duros tumores digerit idoneis ad ea medicamētis mistis. Radicis cortici, Fructus proportionē viriū respōdet, nisi q; ad omnia sit imbecillior. Immo & Folia & Caules eius similem vim obtinent. Memini q; me folijs quandoq; paucis diebus duritiem, choeradis naturā referentem discussisse. Sed admiscemus scilicet illis quippiam, quod eorū viriū obtundat vehemētiā. Nec mirum est q; Succus auriiū vermes amaritate occidat sua. Porrò capparis q; in admodū feruētibus regionibus prouenit, vt quā fert Arabia, multo est nostrate acrior, adeo vt plurimum etiam habeat facultatis adurentis.

A. l. 2. c. 2. c. 138. fol. 115. d.

Cardamum.



A

Cardamum Nasturtium.

A. ibid. c. 502.

Nasturtij⁹ Semen adurentis seu causticæ facultatis particeps est, velut Napy. Proinde coxendis & capitis dolores, atq; adeo quodcunq; aliud rubrificationem postulat, eo excalfaciūt, sicut napy. Miscetur quoq; remedijs quæ exhibentur asthmaticis, tanq; valenter crallos succos incidere valeat, velut & napy: nam omnia ei simile est. Porro & Herba arefacta similem semini vim possidet: Humida verò adhuc ac viridis propter aqueæ humiditatis admisionem multo, semine inferior est, adeo q; tunc mordacitas eius moderata est, vt cum pane ea vti liceat ceu opsonio.

Cardamomum.

A. ibid. c. 156.

Cardamomum⁹ est & ipsum sanè facultatis admodum calidæ, non tamen vsq; adeo vt Nasturtium: sed quanto suauius magis q; fragrans est nasturtio, tanto et imbecillior ei calida facultas inest: nec enim vlcere idoneum est vel ipsum per se illitum. Porro adiunctum habet quiddam etiam amaritudinis, qua lumbricos interficit, & cum aceto valenter pforas detergit.

*Caron.*A. l. 2. t. 2. c. 137.
fol. 115. d

Cari⁹ Semen calfacit, & exiccat tertio quodammodo ordine, moderate acrem qualitatem possidens. Itaq; & flatus extinguit, & vrinas ciet non semen tantum, sed & planta.

B

*Casia.*A. ibid. c. 151.
fol. 117. f

Casia exiccat⁹ & excalfacit tertio quodammodo ordine: sed & tenuium admodum partiū est: gustu verò plurimum habet acrimoniæ, leuiter quoque non nihil adstringens. Quamobrem ob hæc omnia incidit, simul q; digerit quæ in corpore sunt recrementa, & ad hæc robur etiam instrumentis addit. Idoneum verò etiam suppressis mensibus, cum videlicet ob copiam simul & crassitudinem excrementorum, quod sufficiat, euacuari nequit.

Carya Nuces.

A. ibid. c. 494.

Carya.⁹ Arbor tum in folijs, tū in germīnibus, adstrictionem quandā possidet, cæterum euidētem plurimam q; in nucis putamine recēti pariter et sicco: proinde eo tinctores quoq; vti solent. At nos eius expressi succo, similiter vt mororum & ruborum, in melle decocto, vice stomatici medicaminis vtimur: & ad omnia reliqua adhibemus, ad quæ modò dicti succi conuenire censentur.

Porro ipsius nucis Id quod edendo est, oleosum est, & tenue: itaq; ē facile exprimī: & quo diutius recōditum fuerit, magis tale efficiē. Quamobrem oleū ex eo inueterato exprimere liceat: tūc aut admodum ē fit per halitum euaporatorium. Itaq; quidam eo gāgrenas, & carbūculos, & egilopas sanant. Ac non nulli ad neurotota, hoc est neruorum vulnera, vtunt. Cæterum si recēs sit,

Cadstringentis non nihil qualitatis etiam obtinet. At quod imperfectum est etiam dū, ac non dum siccum, veluti reliqui fructus omnes qui virides sunt, plenū est semicoctæ humiditatis. Nucleus tamen eius vbi inaruit, ac vltus sit, tenuiū partium & exiccatoriū est medicamentum, morsus expers. Est & aliud genus nucum minorū, quæ nimirum Ponticæ nuncupātur, plus habens essentia terrestri ac frigida: itaq; etiā gustanti austerior tum cortex, tum planta, tum fructus apparet: cætera magnæ nuci similes sunt, quæ à quibusdā vocatur græcè καρύν βασιλικόν, Latine iuglās. Appellatur autem parua hæc nux à multis λεπτοκάρυν Græcè, Latine Auellana.

λέπος i. πυ-
tamen.*Caucalis.*

Caucalis. Quidam Daucum Syluestrem nuncupant: est enim ei adsimilis gustu simul ac viribus. Excalfacit enim vt ille, & desiccet. Tum vrinam ciet, & sale ad repositionem conditur.

*Carpesium.*A. l. 2. t. 2. c. 134.
fol. 115. a

Carpesiū⁹ simile est vocato Phu, hoc est valeriang, nō gustu tantum, sed & facultate, sed plus habet tenuitatis: Proinde magis eo ē viscerum obstruções extergit, & vrinā mouet, renes q; calculis degrauiatos expurgat. Non tñ eatenus tenuium est partiū, vt liceat loco cinnamomi, si nō ad manum sit, vsurpare, sicuti faciebat Quintus. Præstantius est Ponticum carpesium Laertio, non

D tñ vel ipsum cinnamomi viribus vicinū est, immo non paruo deterius optima calia. Nūcupatur vtrunq; à mōtib; quibusdā Pāphylia in quibus nascit. Ingens q; eius prouentus est in Syria.

† Al. Sida, q̄ est
vrbs Pāphlā.*Cenchrum Milium.*

A. ibid. c. 182.

Milium⁹ primo ordine refrigerat, exiccat verò tertio exoluto, aut certè secundo intenso: paululum ēt habet tenuitatis partiū. Ex hac tū consistentia, tū tēperatura, esu quidē planē inter oīa frumentaria edulia minimum confert nutrimentū. Sed & ventrem desiccet. Porro foris impositū in facculis idoneū est fomentū ijs, quæ citra morsum exiccari postulant. Et cataplasmatismodo illitū exiccare potest: attamen admodum friabile est, proinde difficilis est eius in cataplasmatismodo vsus.

*Cedrus.*A. ibid. c. 160.
fol. 119. b

Cedrus⁹ specie Duplex est, altera fruticosa iuniperis adsimilis, altera arbor nō exigua. Vtraq; est calide sicca q; temperaturæ tertij quodāmodo ordinis secundum vtrāq;. Ceterum Cedrea (vocatū ita cedri oleum) quartum ēt ordinem videtur attingere, admodū calida, simul & tenuium partium. Mollem itaq; carnem promptē citra q; dolorē putrefacit, sicut alia omnia, quæ cum eiusdē sint in calfaciendo ordinis, adiunctam ēt habent substantiæ tenuitatem: at in duris, plusculo tempore, & vix, effectū potest consequi. Porro talia oīa medicamenta Septica vocantur, & Septica sed inter sese maioris minoris q; ratione dissident. Est aut in hoc genere medicamentorū ex primo &

Quinta Classis.

G G G G G ij

internallimo

infirmissimo ordine cedrea: pleraque enim eorum admodum sunt efficacia. Talia itaque & mortuo-
rum corporum carnes corrumpunt: At cedrea exiccat, simulque à corruptione tuetur corpora de-
mortua, utpote humiditates eorum superfluas depascens, ceterum solida corpora haud attingens. At in
viventibus calor ipse qui in corporibus est, cedree vires adaugens, causa efficit, ut tenera ab ea car-
nes deurantur. Nec mirum videri debet, si, cum tanta polleat potentia, ledes, pediculos, & tineas,
et in corporibus natos vermes, interficere valeat: tum foetum viventem quidem apposita interimat,
mortuum autem efficiat: sicut sane etiam in coitu semen, pudendo circumlita. Proinde partui aduer-
sum est medicamentum, si sic utaris, nulli secundum. Alia quoque multa eiusmodi particulatim efficit.
Itaque argumentum est ipsum valenter excalfacere, sicut ubi dentium foraminibus instillatur: si qui-
dem dolores eorum mitigat, sed & ipsos confringit. Extenuat quoque oculorum cicatrices, & visus hebe-
tudini ab humorum crassitudine ortae medetur. Porro quod eius est pinguisimum, & ad unguem
oleosum, quod suspensum supra eam, dum coquitur, lanis excipitur ac colligitur, tota cedrea tenuius
quidem est, sed minus acre, quam non minus excalfaciens. Eadem quippe rationem habet ad id,
quod reliquum est cedreae, crassius illud videlicet, quam oleum ad amurcam: proinde illud, utpote
crassius, mordax est, & {maiores} aperiendi facultate praeditum. Itaque ulcera iritat, phlegmonem quoque il-
lis excitat. Porro oleosa illa cedrea adeo clementibus est viribus, ut etiam plebei experientia docti, F
vulnera omnibus occasione tendendi à forfice facta, illa illita sanent, sicut etiam pice humida. Vun-
tur autem ea & ad ouium scabiem, & ricinos {Graeci πρότυνας vocant.} Porro Cedrides (nam ita
fructum cedri nuncupant) moderatiores vires obtinent, adeo ut comedi quoque possint. Attamen
si liberalius ijs utare, capiti dolorem inferent, ardorem quoque ac morsum in ventre percipies.

Centaurium Maius.

Centaurij Magni Radix sicut gustu contrarias qualitates, ita in usu contrarios effectus praestat.
Gustu itaque acris simul adstringens quoque apparet cum leuicula dulcedine. At in actionibus acrimo-
nia quidem caliditatis opera ostentat, menses prouocans, & foetum mortuum euellens, viuum quoque
corrumpens atque eiiciens: Adstrictio vero opera crassa terrene quoque frigiditatis, cum ulcera glutinet,
& sanguinem reicientibus proflit: exhibentur autem eius drachmae duae, febrientibus quidem
cum aqua, febrim vero liberis cum vino. Porro secundum omnium simul qualitatum actionem, ru-
ptis conuulsis, dispersione siue spirandi difficultati, tum inueteratae tussi, couenit. Nec enim talibus
euacuare solum, quod praeter naturam est, oportet, sed partem quoque euacuatae roborare ac con-
firmare. Vacuationi itaque accommoda est acrimonia, utique cum non sola sit ac pura, sed aut dulcedi-
ni iuncta, aut certe non prorsum amaritudini: siquidem vehementiam tunc atque violentiam mi-
sta illi temperata quadam substantia, cuiusmodi est dulcis, non obtinebit. Porro ad ea, quae euacua-
ta sunt, roboranda contrahenda quoque adstrictione est opus. Eadem, quae radix, & Succus ipsius effi-
cit. Vtuntur quoque eo quidam vice Lycij.

Centaurium Minus.

Centaurij Minoris Radix plane inefficax est, sed caules eius extremi, & potius Folia quam illis in-
herent, & Flores, vtilissima sunt. Vincit in eis qualitas amara, paululum habens & adstrictionis, atque
ob eiusmodi temperamentum admodum exiccatorium est medicamen, expers mordacitatis. Por-
ro quod omnia talia vtilissima sint, supra commonui, & nunc nihilo secius tamen nos repetere tempe-
stuum est, omnes eius particulatim actiones memorantes. Ulcera itaque magna Herbae ipsius re-
centis illitu glutinantur: & vetusta, quae quoque aegre ad cicatricem perducere queunt, cicatrice eodem mo-
do ventibus includuntur: Arefacta vero glutinatorijs & deficcatorijs miscetur facultatibus, ijs vi-
delicet quae sinus & fistulas sanare sunt natæ, veteresque duritias emollire, tum ulcerum maligna
& cacoethe sanare. Miscetur etiam ijs quae rheumaticis affectibus medentur: in quibus ea medica-
mina praestantissima sunt, quae vehementer deficcantia cum quadam adstrictione nullam habent mor-
dacitatem. Decoctum herbae quidam ischiadicis infundunt, seu biliosa & crassa ducens: nam & ta-
lia purgat: quamquam cum adeo vehementer operabitur, ut cruenta euacuet, tunc plus proderit. Suc-
cus porro eius, cum adsimilis sit facultatis, hoc est exiccatoriae & absterforiae, & cetera iam compre-
hensa pulchre praestare potest: & cum melle oculis illinitur: menses quoque, & foetus, appositus euo-
cat. Sunt qui ipsum bibendum praebeant & ijs, quibus nervi affecti sunt, ut qui euacuet, et deficet
innoxie quae impleta sunt: Quippe cum iocinoris quoque obstructions optime expediat: bo-
numque sit leni indurato remedium foris impositum, nec secius si quis bibere velit.

Cerasus.

Cerasus arbor fructum fert non parum adstrictionis in omnibus particulatim plantis participem.
Nam & in harum, sicut est in malorum granatorum, & malorum, quibusdam austera qualitas, qui-
busdam vero dulcis, non nullis autem acida exuperat. Quin et ipsorum dulcium ea, quae non dum
cocta sunt ac matura, quaedam admodum sunt acerba, quaedam similiter moris acida. Sed in moris
immaturo acida qualitas acerbam exuperat, in cerasis non semper. Ergo quae dulciora sunt, magis que
in intestinis sunt, subducunt, sed minus grata stomacho sunt: contra austera. Acida pituitolis excre-
mentis quoque stomachis sunt apta: siquidem austeris magis deficcant, et non nihil est incidunt. Porro ipsius
arboris Gummi cōem quidem omnibus viscosis, & mordacitatis expertibus medicaminibus, facultatem
obtinet,

*ascarides.

*A.auribus.

†ἀτόκισιν.

Non est in an-
tiquis.A. ibi. c. 158. fo.
118. f

A. ibi. c. 158.

*vulnera.

A obtinet, quæ & ad arterias exasperatas accommodata est: Propria aut, siquidē quod quidā scribunt verum est, quod cum vino bibitum calculis vexatos adiuuat. Nam sic illi tenuium partium inest factas cultas quædam.

Ceratonia.

Ceratonia exiccatis est & adstringentis facultatis, sicut & fructus eius, quæ Ceratia vocant, nō nihil etiam dulcedinis continens. Accidit autem istis quiddam simile cerasiis. Nam si humida sumas, magis ventrem subducunt: sicca verò magis sistunt: utpote cum humiditatem expirent, & quod essentia est crassioris, tantum reliquum habeant.

Cestrum Betonica Psychrotrophum.

Cestrum, aut Psychrotrophū, Romanè verò Betonica, vim habet incidendi, ut gustus indicat. Amariuscula enim est & subacris ipsa herba: id quod ostendit & particulatim ædita actio. Nam consistētes in renibus calculos rumpit: & pulmonem, peccius, & iecur expurgat abstergit quæ: mens quoque ciet, & comitialibus prodest: tum rupta conuulsa que curat: & omnibus bestiarum moribus, vlceri illita, auxiliatur. Postremo acidū ructantibus {ὀξύπερμιώντας Græci vocāt} & ischia dicis bibita auxilio est.

*Ap. Psychotrophon.

Cecis Galla.

A. lib. c. 308.

B Galla "quæ Omphacitis nuncupatur, admodum acerbum est medicamē, pleraque sui parte essentia terrena & frigida, per quam desiccatur & repercutit fluxiones: ad hæc constringit contrahit quæ partes laxas ac languidas: omnibus quæ fluxionū affectibus strenue resistit. Esto verò tertij in desiccando, secundi autem in refrigerando, ordinis. Altera autem galla, flaua illa & magna laxa que, & ipsa desiccatur quidē, sed tanto minus, quanto minus acerbæ qualitatis est particeps. Cocia itaque per se, ac deinde trita, cataplasma est non infrenuum sedis phlegmonarum, ac procidentiarū. Porro coquenda est, si modica opus sit adstrictione, in aqua: si vehemētiore, in vino: ac si augere insuper adstrictionē sit opus, vino utare et austeriore. Hanc rustici nostrates Οἰονηξίδα, quasi vinigallam dicas, nominant. Denique gallæ Combustæ sanguinis reprimendi facultatem acquirunt, ac nimirum etiam calorem & acrimoniam ex vitione assument: sunt que ijs quæ ignem experte non fuerint, tum subtiliorum partium, tum maiore desiccandi potestate. Cæterum, cum ad sanguinis suppressionē præparare eas voles, carbonibus impositas, dum vnde quaque candent, aceto aut vino extinguerē oportebit.

Cera.

A. lib. c. 194. & 462.

Cera "quodammodo medium tenet calfacientium, refrigerantium, humectantium, & desiccantium. Habet verò quiddam etiam crassarum partium, atque emplasticum: quāobrem non modo exicare, sed & per accidens humectare videri fortassis poterit, perspirationes videlicet prohibens. Quamobrem aliorum medicamentorum tum exalfaciētiū, tum refrigerantiū, materia est: Ipsa aut per se ex genere fuerit debiliter cōcoquentiū: nec tñ intro in corpus assumptorum, sed foris impositorum. Habet enim paulum quiddam digerentis calidæ quæ potentia, quæ plurima melli inerat.

Cici Ricinus.

Ricini Fructus quemadmodum purgat detergit ac digerit, sic quoque Folium, sed vnde quaque debilius. Oleum quod ex semine conficitur, tum calidius est, tum tenuiorum partium, quæ est oleū commune, ac proinde {potentius} quoque digerit.

Cinnamomum.

A. lib. c. 114.

Cinnamomū "summè tenuiū est partiū, nō summè tñ calidū, sed ex tertio quodāmodo ordine. Nihil aut æquē desiccatur eorū quæ pari sunt exalfaciendi facultate, propter tenuitatem scilicet essentie. At Cinnamomis est velut imbecillū cinnamomū: nō nulli ipsam Pseudocinnamomū nūcupant.

Circea.

Circeæ herbæ Radicem scribit Dioscorides ex vino dulci potā secundas purgare: est enim bo Dni odoris, & calfactoria. Semen aut eius in sorbitione exhibitum ad lactis generationē conducit.

Cisthus.

A. lib. c. 111. & 111. a. b.

Cisthus, "aut Cistharus, frutex est gustu adstringens, oibus que particulatim operibus. Porro Folia, et parua Germina trita adeo deliccant adstringunt quæ, ut vulnera glutinare valeant. At Flores magis sunt efficaces, adeo ut cum vino poti dysenterias, vētris imbecillitates, fluxus que ac humiditates sanēt. Cataplasmatibus ritu illita vlcerum putredinosa iuuant: Est enim facultas eorum non infrenue deliccans, ferē que secundi excessus à temperatis absoluti. Adeo verò frutex hic frigidus est, ut tepidi caloris sit particeps. Porro Hypocisthis, quam vocant, multo est magis adstrictoria quæ folia, admodum efficax remedium ad omnes fluxionum affectus, puta sanguinis reiectio nes, profluvia muliebria, coeliacos, dysentericos quæ affectus. Quin si quam partem roborare consilium sit, quæ videlicet plusculo humore exoluta fuerit, robur ac firmitatem illi non segniter addit. Sic sanē stomachicis epithematis, hepaticis que, commiscetur: & ex viperis cōfectis antidotis inditur, nimirum quo corpora confirmet ac roboret.

Cisthus.

A. lib. c. 411.

Cisthus "aut Ladanū. In calidioribus regionibus hic Cisthus pueniēs, tamet si haud alius sit genere quæ qui apud nos nascitur, eximiū tñ à regione ac peculiare digerentē que caliditate natus est:

Quinta Classis.

GGGGG

iii

atque

atq; vtroq; à noſtrate differt, tum quia frigiditatem depoſuit, tum quia calorem aſſumpſit. Itaq; cetera quidē huius ciſthi, illis quæ in noſtrate viſuntur, ſimilia ſunt. Verū Ladanum quod vocāt, ex eo prouenit, medicamentum primo exceſſu iam quodammodo completè calidum, vt videlicet & ſecundum attingat, habens etiam adſtriſtionis paululum: Ad hæc ſubſtātia tenuium partium, ac proinde emolliēs ſiue malacticum, pariter q; moderate digerēs, ac videlicet ἐτ συμπεπλὺν hoc eſt concoquens. Itaq; mirandum non eſt, ſi peculiariter ad vteri vitia conueniat, qñquidem ad dicta paulum quiddam adſtriſtionis obtinet. Quocirca diſſuantes capillos retinet: nam quicquid ad radices eorum prauī humoris federit, id omne abſumit: tum meatus quibus infixi ſunt, cōſtringit contrahit q; adſtriſtione. Cæterum alopecias, & ophthālmias ſiue lippitudines, ſanare non poteſt, vtpote grauiores vires, q̄ quæ ladano inſunt, poſcētes: quippe proueniunt iſta ex prauis ſuccis lentis craſſis q; quos ſecantia ac digerentia medicamēta potiſſimum euocant atq; euacuant. Ceterum tenuium partium ſint facultatis oportet, & minime adſtringentis, non tamen vſque adeo tenuium partium, & deſiccatoriæ, vt nimio plus deſiccēt, vna q; cum collectis inibi ſuccis præter naturam, naturalem quoq; humiditatem incrementa pilis ſuppeditantē abſumant. Nam ſic non tantum alopecia liberabunt, ſed & caluitiem afferent. Sed hæc ad curandi rationem pertinent.

Ciſſos Hedera.

Hedera⁹ ex contrarijs compoſita eſt facultatibus. Habet enim quiddā adſtringentis ſubſtantię, quam terrenam & frigidam eſſe oſtendimus: habet q; etiam nō nihil acris, quam calidam eſſe vel guſtus comprobāt: nec deeſt tertia, aqueam nanq; ſubſtantiā quandam tepidam obtinet certè, ſi viridis ſit. Siquidē dum areſcit, hæc prima exhalet neceſſe eſt: manet q; quæ terrea & frigida adſtringēs q;, & ea quæ calida & acris. Viridis autem, Folijs eius in vino decoctis, vlcera grādia conglutināt: quæ que maligna ſunt, ad ſanitatem reducit: tum igne factas exulcerationes cicatrice includit. Porro cum aceto decocta folia lienoliſ profunt. Flores autem quodammodo validiores ſunt, vt ad leuorem redacti cum cerato ambuſtis conueniāt. Præterea Succus medicamentum eſt errhinon, { hoc eſt, in nares fuſum, capiti purgando idoneum: } tum vetuſtas aurium fluxiones ſanat: ad hæc vlcera vetera tum in auribus, tū in naribus. Porro ſi acrior appareat, aut roſaceo aut dulci oleo miſcetur. Lachryma eius pediculos interimit, pilis nudat, vſque adeo calidæ poteſtatis, vt obſcure adurat: eſt enim velut aqueus quidam liquor, ſicut aliæ omnes lachrymæ.

Clinopodium.

Clinopodium excalfaciendi vim obtinet, ſed non dum adurendi: eſt verò etiam eſſentia ſubtilium partium. Ponat q; ipſum quiſpiam in tertio ordine tum excalfacientium, tum reſiccantium. G

Clematis.

Clematidis Folia acrem & adurentem ſiue cauſticā facultatē obtinent, adeo vt & lepras excoerent. Fuerit itaq; in quarti ordinis excalfacientium initio. Vocatur autem Clematis & Daphnoides, quod quidam Myrſinoides, alij Polygonoides appellitant. Cæterum id nequaquam exulceratorium eſt aut acre, ſicut quod ante dictum eſt: immo profluuijs ac dyſenterijs cum vino potum prodeſt, dentium q; dolores manuſum mitigat, tum vteri quoq; doloribus in peſſo admotum vſui eſt: tñ abeſt vt perinde vrāt aut vlceret, ceu illud ſuperius. Sed ſummè nobis ſuſpiciendus Pamphilus ille ſicuti in reliquis nugatur de ijs, quæ nuncq; vidit, literiſ ea mandās, ſic hæc ambo in vnū confudit. At Dioſcorides vtriuſq; in quarto meminit, & eius quæ ſimpliciter vocatur Clematoides, id que in fine libri: & alterius, ſed in principio. Quamobrem non eſt neceſſe, vt ego ruſum notis ſuis vtrunq; depingam, ſicut nec in alijs feci.

Cnicus.

Cnici⁹ Semine dūtaxat ad purgationes vtimur. Tertij eſt ordinis excalfaciētium, ſiquis foris eo vti volet. A. ibi. c. 159.

Coccus Cnidius Granum Gnidium.

Granum Gnidium & ipſum quoq; purgat: ſed acris eſt adurentis que facultatis. H

Coccus Baphicos Granum Tinctorium.

Granum⁹ Tinctorium adſtringentem ſimul q; amaram qualitatem poſſidet. Vtraq; ſine morſu deſiccāt. Proinde ad ingentia vulnera congruit, & ad neruorum vulnerationes. Sed tūc ipſum quidam cum aceto terunt, alij cum oxymelite. A. ibi. c. 718.

Coccymelea Prunus.

Pruni⁹ Fructus ventrem ſubducit, recens quidem plus, aridus minus. Cæterum haud ſcio, cur Dioſcorides pruna damascena ſiccata ventrem ſiſtere dicat, cum & ipſa palām etiam ſubducant, minus tamen q̄ quæ importantur ex Iberia: ſiquidem damascena magis adſtringunt: at quæ Iberia fert, dulciora ſunt. Quin & ipſæ Arbores fructibus proportionē reſpondent. Minus enim adſtringunt quæ in Iberia naſcūtur, magis verò quæ Damasci. Cæterum vt in ſumma dicam, quorum in folijs aut germinibus adſtriſtione quædam ineſſe apparet manifeſta, ijs decoctis phlegmone in columella aut tonſillis exiſtentes idoneè colluuntur. Porro Agreſtium Fructus euidenter adſtriſtorius eſt, ventrem que ſiſtit. Nominatur autem hæc planta in Aſia Prumnum. Gummi autem arboris, ſunt, qui dicant cum vino potum lapides confringere: cum aceto, puerorum ſanare lichenas. Ac ſi id præſtat, clarum eſt incidentem tenuium que partium illi facultatem ineſſe.

Colla

*Arbitrōr legē dū eſſe ophiſes, qñquidem de pilorū affectib⁹ ſermo ipſi eſt. Qui & Auiſcen. cap. de Ladanō videt hanc leſionem. Adde qđ ophthālmia eā nō expoſcit curationem.

*A vulnere.

*Al. Coccomelea.

F
A. L. 2. c. 2. c. 169.
fol. 119. g. h.

A. ibi. c. 159.

H

A. ibi. c. 718.

A. ibi. c. 532.

A

Colla Gluten.

A. ibi. c. 101.

Gluten,* quod ad libros præparant ex similagine & gâro, emplasticæ concoctiori^e que facultatis est, quibuscunq; ipsum partibus illinas.

*Colocynthe Cucurbita.*A. ibid. c. 175.
fol. 120. c

Cucurbita "humidæ frigidæ q; temperaturæ est, vtraq; qualitate secundî ordinis. Quocirca ramentorum eius Succus ad aurîu dolores cum phlegmone iunctos cum rosaceo utilis est. Sic tota quoq; illita calidas phlegmonas mediocriter refrigerat. In esu aut humidâ est, & sitim propellens.

Colocynthis.

A. ibi. c. 127.

Colocynthis "gustu amara est. Sed quæ illi amaritudinis dum potatur adsunt opera, ea euidenter efficere nequit ob purgatoriam facultatē, quā validā in sese cōtinet: nimirum cū ijs, q; purgat, antè & ipsa per aluum excerni præuertens. Viridis ipsius Succus intritus ischiadibus prodest.

Comarus Arbutus.

Arbutus arbor ipsa qualitate acerba vna cum fructu est. Eum Memecylum nuncupât. Est autem hic & insensus stomacho, & capiti dolorem commouens.

Commi Gummi.

A. ibi. c. 310.

B Gummi "lachryma est cōgelata concreta q; in truncis arborum ipsam producentium: velut resina quoq; in multis visitur, quæ resinam proferre possunt. Est autem exiccatoriæ emplasticæ que potentia, Propterea que asperitatibus medetur.

*Conia Lixiuum.*A. ibid. c. 188.
fol. 121. c

Lixiuum, "quod velut ablutio est cineris, sic nominatur. Porro omnium maximè tum absterforium tum exiccatorium illud est, quod ex cinere ficus & tithymallorum efficitur: ferè que septi cæ seu putrefacientis est facultatis: quæ cuiusmodi sit, in quinto volumine exposui.

Conyza.

Coniza & Maior, & Minor, ad similes sunt tū tēperaturæ tū facultatis, gustu amare & acres appa-
rētes. Excalfaciunt q; admodum luculēter, siue quis folia cū teneris ramulis (est enim fruticosa plā-
ta) parti cuiuspiam illinat: siue vbi in oleo coxerit, eo vtatur, siquidē cōcussiones siue rigores per cir-
cuitum redeuntis tale sanare vlcum videtur. Flores quoq; eorum ad similes sunt facultatis. Itaque
quidam & ipsos cū folijs tritos in vino bibēdos exhibēt ad mēses fortiter ducendos, eiiciendū que
foetum. Est & Tertiū conyza genus in locis humidioribus proueniens, vtriusq; illis tum graueo-
lentius, tum imbecillius. Sed primæ memoratæ tertij sunt ordinis in excalfaciēdo exiccandō que.

C

*Coriannon seu Corion Coriandrum.*A. l. 2. t. 2. c. 119.
fol. 115. b

Coriannon, "siue Corion, aut vtcunq; vocare lubet. Vetusiores Græci Coriannon noīabant: at recentiores medici omnes Corion appellat, sicut & Dioscorides, refrigeratorem esse herbam ipsam dicunt, sed perperam. Siquidem ex contrarijs facultatibus cōstat & composita est, plurimum habens essentia amaræ, quam ostendimus esse tenuium partium, & terrenam calidā: nec pa-
rum etiam humiditatis obtinet, quæ tepentis est facultatis: his adiūctum est quoq; adstrictionis
pauillum. Ex quibus omnibus varie quidem agit ea, quæ scribit Dioscorides, sed non tantum ex
refrigeratione. Ceterum ego cuiusq; particulatim actionis causam enarrabo, tamen si propositum
fuerat mihi meā vnius duntaxat hoc in libro sententiam expromere. Sed forte nihil obstabit, im-
mo, si verum fatendum est, † proderit non nihil superiores methodos, quæ in paucis medicamen-
tis sunt dictæ, hic repetere. Primum ergo non Dioscorides tantum, sed & alij complures medico-
rum, indeterminatè de morbis pronuntiat: sicut sanè hac quoq; tempestate non paucos inuenias
medicos vel insignes, præter alia, hac in re turpissime hallucinantes. Interdum "enim atra, liuida, fri-
gida q; reddita parte, quæ erysipelas habuit, nec amplius refrigerantia poscente pharmaca, ceu an-
tea, sed ea quæ infixum parti præter naturam humorem eliciant, hi refrigerare perseverant: inter-

A. l. 2. t. 1. c. 1.
fol. 92. a

Dum autem ad digerentia transeunt, ea que erysipelas sanare dicunt. Et sanè etiam scribunt incipien-
tibus quidem etiamnum, atque gliscentibus, crescentibus ue erysipelatis alia medicamenta, decli-
nantibus vero ac flaccescentibus alia. Sed ita res non habet. Neque enim erysipelas etiam voca-
ri debet, postea quam inflammatio eius, & feruor, ac biliosum illud abierint: † neque quæ faculta-
te sunt frigida, neque quæ illa sanant, remedio esse putandum. Sed velut si vel in initio protinus
aut percussis, aut alia de causa quavis, tumor in parte quapiam aut liuidus, aut nigrexerit, cum
esse frigidum affectum existimabis, & quæ digerant excalfaciant que, poscere: Ad eundem, opi-
nor, modum, si calida affectio in frigidam reciderit, negligenda quidem prior est, sed secunda alio
appellanda nomine: aut si displicet nominis mutatio, saltem, sicut quidam alia scribunt principij,
alia declinationis remedia, haud sanè cēsendū frigida esse declinationis remedia. Concedendum
sanè est, si cui ita placet, vt talis affectio etiam erysipelas vocetur: sed eam etiam calidam dicere vbi
iam refrigerata est, id verò nequiquam concedendum. Itaque ne, quod tunc ei auxilio est, refrige-
ratorium esse credamus, sicut Dioscorides Coriandrum, quod cum pane aut polenta, vt ipse in-
quit, erysipelas curet illitum. Nam quod ad vnguem est erysipelas, quod vti que inflammatum est
& flauum, haud vnquam sanare queat cum pane Coriandrum, sed illud quod iam refrigeratum
est. Proinde nos superioribus voluminibus, cūm determinata ac definita experientia, cuiusque

Quinta Classis.

GGGGG iij

medicaminus

* Ant. codices
legūt γόπρος
i pollinē. & ita
ver^o interpres,
Oribasius, Aet-
sius, & Paulus.

† Al. ex antiq;
Græ. ea quæ in
hunc modū in
paucis medica-
mentis dicuntur,
mutabūt angd,
ac rememora-
būt superiōres
methodos.

† Al. neq; quæ
has affectiōes
sanāt, faculta-
te frigida esse
putandum est.

medicaminis facultatem explorandum censuimus, q̄ maximè fieri posset simplicissimum eligi affe-
ctum consuluimus. At pleriq; medici, neq; q̄ vel plurimi morborum protinus ab initio cōpositi
inuadant, norunt: neq; q̄ alius affectus sit erylipelas exactum: alius verò is qui vocatur ab omni-
bus nobis v̄sitate, vt à veteribus quoq; phlegmone: alij autem inter hos mediij plurimi, partim vt
sic dicam, erylipelata phlegmonode, partim phlegmonæ erylipelatodeis: ac inuenias non nunq̄
vbi neutrum vincat, sed ad vnguem paria sint: quin etiā non nunquam cedematodes esse erysi-
pas conspicitur, sicut aliud scirrholes: vt compositorum morborum non paruus acruetur nume-
rus. De quibus copiosius cum alibi differuimus, tum in curadi rationis voluminibus. Dicitur au-
tem & nunc, quoad saltem eorum meminisse necesse est, q̄ exactum erylipelas haud vnquam ab
antedicto cataplasmate curari possit. Voco autem exactum, cum à biliosa fluxione pars impleta
fuerit. Porro q̄ longè à refrigeratione absit Coriandrum, vel ex ijs quę ipse scripsit Dioscorides,
discere liceat. Nam choeradas siue strumas cum eregmo siue lomēto, inquit, discutit. Porro q̄ nul-
lum refrigerantium medicamentorum idoneum sit discutiendis choeradibus, vel ipsum Dioscori-
dem non dubitaturum arbitror, quippe qui sexcenta scripserit medicamenta choeradas sanare po-
tentia, quæ omnia tum temperie calida tum actionibus digerentia esse confessus est.

Coronopus.

Coronopodis "Radix coeliacis prodesse creditur manducata.

Costus.

Costus "leuiculam planè amaram, plurimam autem acrem et calidam, in se qualitatem simul &
facultatem continet, adeo vt etiam exulceret. Vnde ex oleo corpus eorum quibus per circuitum
rigor inuadit, ante accessionem illo confricant: sic verò etiā in resolutis, & ischiadicis: atq; in sum-
ma in quibus excalfacere partem quāuis, aut ex alto in superficiem extrahere quippiam est opus,
ad costum confugitur. Eadem de causa vrinas menses q̄ prouocat: & ad rupta, conuulsa, ac laterū
dolores congruit. Porro ob amaritatem quæ illi inest, lumbricos latos necat. Ob eādem & ad con-
tractas velut ex Sole maculas { ἐφίλεις Græci vocant } cum aqua aut melle vsurpāt. Inest item fla-
tuosa quædam illi temperiei humiditas, per quam & venerem excitat cum vino mulso.

Cotyledon Umbilicus Veneris.

Cotyledon facultatis mistæ est, nēpe humidæ subfrigidæ, & cuiusdam obscure subadstringētis,
& cum ea leuiter amare. Vnde refrigerat, repercutit, abstergit, & discutit. Itaq; phlegmonas erysi-
pelatodeis, & erylipelata phlegmonode, curat: & maximè stomachi ardore astuantis admodū vti-
le est epiplasma. Putantur Folia cum radice manducata calculos confringere, & vrinam mouere. G

Crania Cornus.

Corni "arboris Fructus admodū acerbus est, esui aptus. Itaq; mirū videri nō debet ipsum valē-
ter ventrē restringere, sicut & mespila. Folia quoq; & Germīna gustu acerba sunt, valēter q̄ deli-
cāt. Itaq; maxima vulnera glutinare possunt, potissimum durorū corporū: At paruis vulneribus
& mollioribus corporibus potius contraria sunt: nam nimīū ea contēdunt, ac plus satis deliccāt.

Crambe Brassica.

Brassica "Esculenta deliccādi vim habet tum esa, tū foris imposita, nō tñ etiam admodū acrem.
Alioqui & vlcera glutinat, & maligna vlcera sanat, præterea phlegmonas iā induratas ac ægrè so-
lubiles, & id genus quoq; erylipelata. Eadē facultate epinyctidas & herpes sanat. Habet quid-
dam etiam in se absterforium, quo lepras curat. Porro Semē eius potū lumbricos interficit, maxi-
mè brassicæ Aegyptiæ, quanto scilicet temperatura siccior est. Sanè amaræ qualitatis particeps se-
men est, sicut videlicet omnia alia medicamenta quæ ad lumbricos idonea sunt. Secundum eandē
facultatem ephelidas, & lentas, & quæcunq; modicam absterfionem postulāt, adiuuat. Porro cau-
les brassicæ cōbusti Cineres efficiunt admodum deliccātes, vt videlicet iam & causticam siue adu-
rentem vim participant. Hac ratione ei veterem adipem comiscentes, ad inueteratos laterum do-
lores, & si quid eius fuerit generis, adhibent: nam valenter digerens pharmacum efficitur.

Crambe Aoria Brassica Agrestis.

Brassica "Agrestis quodāmodo calidior siccior q̄ domestica est, ceu alia ppemodum oia agre-
stia sui generis domesticis secundū vtrāq; hanc facultatem valentiora sunt. Quamobrē neq; intra
corpus citra noxā sumitur, vt quæ longius ab humana recesserit tēperatura. Eadem de causa & gu-
stantibus amarior est q̄ domestica: quanq̄ domestica quoq; acrimonię non nihil & subamaritudi-
nis contineat: sed vtrāq; habet agrestis validam: quare ēt extergit & digerit q̄ domestica valētius.

Crambe Thalattia Brassica Marina.

Brassica "Marina supra q̄ q̄ ventrem deiciat, vtpotē subsalsa & subamara gustu, fuerit sanè ēt
ad externos corporis vsus, & ad omnia ea, ad quæ tales qualitates accommodantur, idonea.

Cratægonos.

Cratægoni herbæ Fructus & acris gustanti est, & † v̄tenti frigidus, } similis milio.

Crethmon.

Crethmon gustantibus salsum quodāmodo est cum paucula amaritate: quamobrem vis eius
est exiccatoria & absterforia. Vtrāq; tamen imbecillior ei est quā in amaris.

Crithe

† σφοδρὸς
χαρμῶν, est
v̄tenti v̄he-
mētior. Vt uer-
tit uetus iter-
pres. Scio equi-
dē apud pau-
lū i aliquibus
codi. legi σφ-
χρὸς i. frigi-
dus. Vt nos-
ter interps. tr̄stū
lit: antiquissi-
mi tamē libri
habent σφο-
δρὸς: intelli-
gendum q̄ est,
quod v̄hemē-
ter sit acris,
quæadmodum
et Dioscorides
dixit. In Ori-
basio legitur
καρπὸς δρι-
μύς ἐστι χυρὸ
δρὸς, i. fructus
acris est & ue-
hemens.

F

A. ibi. c. 560.

A. ibi. c. 161. fol.
119. b. c

A. ibi. c. 315.

A. l. 2. t. 2. c. 139.
fol. 115. f

A. ibidem.

A. ibidem.

A

Crithe Hordeum.

A. libi. c. 530.

Hordeum "primi est ordinis in exiccando & refrigerando: habet etiam paucillū absterfionis. Paulo etiam plus desiccatur quā farina fabacea, cui nō insint cortices: Cetera verō similia sunt foris utentibus: in cibo autem hoc fabis prestat, q̄ flatuosam naturam exuat: fabis, quantūcūq; coxeris, flatuosa natura remanet, sunt enim crassioris essentia q̄ hordeum: quamobrem eo plus etiā alunt. Porro qm̄ vtrunq; paulum modō à medio recessit, multo sunt vsui: nam talia medicamenta multis alijs miscentur ceu materiae quaedam. Itaq; etiam cera & olcum non paucis medicamentis coniunguntur. Alphon verō, hoc est Polenta, multo plus hordeo desiccatur.

Crimnon.

Crimnon. Quod crassarum partium est tum in tritici, tum in zea farina, ita appellari consuevit. Plus nutrit q̄ polenta, sed ægrius concoquitur. Porro Sorbitio quam ex eo conficiunt, Poltos nuncupatur, ea q̄ si ex zea conficiatur, leniter ventrem sistit, ac magis si frigatur.

Crinos Lilium.

A. libi. c. 436.

Lilij Flos temperaturam mistā obtinet, partim ex essentia tenuiū partium ac terrena, ex qua utiq; habet ut gustu sit amara: partim ex aquea, ea q̄ temperata. Itaq; et quod ex eo conficitur Oleū ac vnguentum, citra morsum digerendi simul q̄ emolliēdi facultatem obtinet: vnde fit ut vteri duritiebus sit aptissimū. Porro Radix Folia q̄ per se trita desiccant & abstergunt, & digerunt moderate: proinde quoq; ambustis cōpetunt: liquidē hęc quoq; moderate deliccantē extergentē q̄ facultatē postulat. Radicē ergo tostā, ac deinde cū rosaceo contritā ambustis, quoad obducatur cicatrix, imponunt: quippe cum alioqui & aliorum vlcere omnium bonū sit inducendā cicatrici remediū. Quin etiā vteros emollit, menses q̄ prouocat. Folia verō præcoquentes, & ipsa ad obducendā vsq; cicatricem imponunt, non in ambustionibus dūtaxat, sed alijs quoq; vlcerebus. Sed & sunt qui aceto ea condientes ad vulnera suo tpe vtantur. Plus tñ inest abstergentis facultatis in radice q̄ in folijs, quanq̄ tñ nec in ea ipsa multū insit, sicut prædiximus: nā primi ordinis abstergentiū est medicaminum. Itaq; cū aut vitilignes, aut psoram, aut leprā, aut achoras, aut aliquid id genus, extergere volumus, commiscemus illi aliquid aliorum medicaminum validius extergentiū, cuiusmodi est & mel. Caterū si id moderate illi ac conuenienter admisceatur, & ad neruorū diuisiones competit, & ad alia vniuersa quę valēter exiccari postulant absq; morfu. Reposuius verō et q̄q; & foliorū Succū cū aceto & melle coctū: succus quinq; partibus plus vtroq; erat. Eratq; insigne medicamen ad omnia ea, quę valēter exiccari postulat absq; morfu, ceu vulnera oīa ingētia, & maxime q̄ in capitibus musculorū eueniunt: tū ad ea vlcera quę nimis mollia sunt, & diuturna, atq; egre ad cicatricē perducuntur. Sed hæc iam ad medicamentorū cōponendorū institutū attinent, à quo q̄tum licet, abstinere in præsentia adnitor: caterū rerum ipsarum natura sæpe numero ut attingam adigit: celeriter verō relinquenda sunt, atq; ad propositum reuertendum.

Crocodilum.

Crocodilij Semen acre est, atque odoratū, vrinam menses q̄ ciens. Itaq; facultatem habuerit calidam, digerentem, & exiccantem. Succus tū caulis, tum seminis, ut quę similis sint facultatis, ne phríticos adiuuat. Radix pectoris excreationibus valenter conducit, minus quidē q̄ semen acris, non tamen minus amara. Trahit verō etiam per nares sanguinem.

Crocus.

A. l. 2. c. 2. ca. 126. fo. 113. f. g.

Crocus paulum et adstringens quid obtinet, quod terreum frigidum ostendimus: sed superat in eo calfaciens & qualitas, & facultas: ut tota eius essentia secundi sit ordinis excalfacientium, & primi exiccantium. Proinde concoquendi quoque vim quandā obtinet, adiuuante s. in hoc & paucula illa adstrictione. Quippe quibus medicamentis, cum non admodum excalfaciant, paucula adest adstrictio, ea parem facultatem habent essentijs emplasticis vocatis: quas cum iunctas esse caliditati non vehementi contigerit, pepticas hoc est concoquentes, esse ostendimus.

Crommyon Cæpa.

A. libi. c. 119.

Cæpa ex quarto est ordine excalfacientium: essentia eius potius crassarū est partium: Vnde et hemorrhoidas aperit tum apposita, tū cum aceto inuncta. In Sole alphas abstergit: tum alopecijs attrita pilos alcyonio citius restituit. Porro si Succū eius exprimas, quod reliquū est, admodū terreæ substantię est, eius q̄ calidē: at succus aqueę aereę q̄ caliditatis. Hic igitur ijs qui suffusi sunt, aut aciem oculorū obtusam præ crassitudine humorū obtinent, inunctus prodest. Ex huius temperatura tota cæpa flatuosa est manducata. Itaq; quę temperatura sunt sicciore, minus flatuum generant.

Cyamos Faba.

A. libi. c. 140. ol. 126. d.

Faba in vtroq; medijs temperamenti proximē est in exiccando & refrigerando. Caro eius paulum quoque abstergentis facultatis continet, sicut Putamen nō nihil adstringētis. Idcirco medicorum nō nulli totā fabam cū oxycrato decoctam dysentericis, coeliacis, vomētibus, quos *emeticos* nominant, exhibuerunt. Porro ut eduliū, flatulēta est, ac coctu difficilis, liquid aliud: excreationibus ex thorace & pulmone idonea: Ut medicamentum verō foris impolita, desiccatur innoxie. In podagricis ea sæpe numero vsi sumus ex aqua decocta, & ita adipi suillo admista. Ad neruorū tū contusiones, tum vlcerationes, farinā eius ex oxymelite imposuimus. Ad eos quos ex ictu iam phlegmone

phlegmone occupauerat, cum polenta. Sed & testium & vberum aptum est cataplasma: nam he partes cum phlegmone tenentur, moderatè refrigerari amant, maximè cum vbera ex lacte in ipsis concreto phlegmonen patiantur. Quin lac quoq; ab eo cataplasmate extinguatur: Sicut puerorū pubes farina fabacea illita plurimo tempore glabra seu impubis permanet.

Cyclaminos Rapum siue Tuber terræ.

Cyclaminus^o varias vires possidet. Nam & abstergit, & incidit, & ora venarum aperit, & attrahit, & digerit. Clarum id est ex particularibus operibus: Nam Succus eius hæmorrhoidas refert, violenter q; ad secessum puocat in crocyde siue floccis appositus. Sic et facultatibus, phymata, strumas, alias q; oēs durities digerentibus, commiscetur: ac suffulis cum melle illitus competit, ad hæc quoq; per nares expurgat. Adeo vehemens eius facultas est, vt abdomine illito ventrem subducatur, & foetus interimat: nam & alioqui validum interimendo conceptui medicamen est, in pello appositus. Tota autem Radix succo imbecillior est, quanq; & ipsa vehemens sit. Nam & menses siue epota, siue apposita euocat: & aurigini prodest, non modò ipsum viscus expurgas, sed et q; in toto corpore bilis fuerit, eam per sudorem ejiciens. Proinde sanè post potionem, sudoris adiuuanda omnino prouocatio est. Modus eius bibendi est drachmarum trium, siue cum melicrato, siue cum passo. Cutem detergit cum in alijs, tum q; alopecias, ephelidas, omnia q; exanthemata siue efflorescentias, curet. Lienem quoq; induratum iuuat emplatri modo illita tum recens, tum arida. Sunt qui radicem siccam asthmaticis seu anhelantibus exhibeant. Porro Altera cyclaminus, quam quidam Cyssanthemon nominant, propterea q; cyssus hoc est hedera, flore sit assimilis, Radicem quidem inutilem habet, sed Fructum admodum efficacem. Nā hic cū vino albo pluribus diebus duobus cyathis potus lienes sanat, vrinas mouens, ac ventrem subducens: secundas quoq; ejcit, & asthmaticis prodest. Qualitas eius gustanti acris est, & sublentia.

Cyminum Cuminum.

Cymini^o Semine maximè vrimur, quemadmodum anisi, ligustici, cari, petroselini. Est verò & facultatis excafacientis, sicut illorum vnumquodq; tum vrinam mouens & flatum extinguens, ex tertio ordine excafacientium.

Cynosbatus Sentis Canis.

Cynosbatus. Huius fruticis Fructus nō segniter adstrictorius est, Folia verò mediocriter. Itaq; particularis eius vsus haud ignotus est. Cauendū ab eo quod in fructu eius, lanæ speciem habet, ceu arteriam vitians.

Cyparissus Cupressus.

Cupressi^o Folia, Germina, Pilulæ recntes & molles magna vulnera cōglutināt in duris corporibus. Ex quo clarum est q; resiccandi vim habeat absq; insigni acrimonia, aut caliditate, sicut certè G & gustus testificatur: apparet enim in ea leuis quidē acrimonia, sed plurima amaritudo, multo q; etiam plus acerbitalis in tota planta. Tanta ei inest acrimonia caliditas q;, quanta satis sit deducenda in altum acerbitali, ac nullam tamen mordicationem aut caliditatem in corporibus efficiat. Proinde in alto latentes in flaccidis putrescentibus q; affectibus humiditates, innoxie tuto q; depascitur atq; absūmit: cū quæ excafaciunt simul desiccant q;, eas quidē quæ contentæ sunt, absumat, caterū acrimonia & caliditate alias attrahant. Sic & enterocelicos iuuat: siquidē exiccat, robur q; addit corporis partibus præ humiditate laxis: vt potè cū adstrictio in altum subeat deducente ipsa caliditate, quæ admista est, eum seruante modum, vt deducere quidem valeat, non tamen mordicare queat. Quidam ea vtuntur ad carbunculos, & herpes, polentæ miscentes, tanquā absumat citra excafaciōnem, eos morbos facientem humiditatem. Sunt qui & ad erysipelata vtantur, admista nimirum polenta cum aqua aut oxycrato aquoso.

Cyperus Iuncus Quadratus.

Cyper^o Radices maximè vsui sunt, excafacientes pariter & exiccantes absq; mordacitate. Itaq; vlceribus, quæ præ nimia humiditate cicatricem difficulter admittunt, mirifice prosunt: habent. n. quiddam et adstringens. Quapropter vlceri item oris conueniunt. Quin & incidendi vim quāpiā illis inesse testificandum, qua & calculo vexatis congruunt, & vrinam menses q; prouocant.

Cypros.

Cyprus. Huius arboris Folia sūma q; germina i vsum veniūt, & facultatis, & qualitatis miste: Habent. n. qddā digerēs cū aquea substantia modicè calida: habent q; et adstrictoriū qddā ex terrena substantia frigida. Itaq; eorū Decoctio qddā ambusta fouet. Vtunt verò et aduersus igneas phlegmonas & carbunculos: nā absq; molestia & morfu desiccant. Quin etiā sponte proueniētibus in ore vlceribus, ac maxime q; aphthode sunt, & ipsis et puerorū aphthis, cōmansa accommoda sunt.

Cytisus.

Cytisi Folia digerendi facultatem obtinent aqueæ temperatæ mistam, sicut & Maluæ.

Coneson Cicuta.

Cicuta^o q; extremè refrigerantis sit facultatis, omnes norunt.

Conos.

Coni^o Fructus, quem quidam Cocalon nuncupant, & Strobilon, vridis totus, habet cum humiditate

A. l. 2. c. 2. c. 272.
fol. 129 d

A. l. 2. c. 2. c.
136. b

A. ibi. fo. 117. a

A. ibi. c. 591.

A. ibi. c. 14.

A. ibid. c. 662.

A. ibid. c. 180.
fol. 131. a

Amiditate amaritudinem quampiam & acrimoniam. Proinde purulentis, & quibuscūq; adeo, quæ in thorace & pulmone sunt, facile extussire & expuere expedit, accomodus est. Porro Fructus ex eo esculentus, nutrimentum est coctu difficile, & validum. At vt medicamen asperitati leniendæ cōgruit, cum videlicet in aqua maceratus omnem in ea acrimoniam reliquerit: nam reliquum omne minime mordax, maxime q̄; emplasticū redditur, in medio calidæ & frigide qualitatis confusus, ex aquea & terrea mistura, minimum participans aerea.

L A G O P V S

L Agopus facultatis est desiccantis, adeo vt fluxus alui probè exiccet.

Lathyrus.

Aibic. 473.

Lathyrus. Sunt qui dicant & hanc esse Tithymalli speciem, tum q̄ similiter illis succū habeat, tum q̄ eodem modo purget, tota q̄; illis facultate assimilis sit, nisi q̄ semen gustantibus videatur dulce: Quod sanè etiam purgatoriam vim maxime possidet.

Lampfane.

Lampfane esa quidem succos prauos procreat: cæterum illita abstergendi non nullam digerendi q̄; facultatem possidet.

B

Lapathum.

A. ibid. c. 53.

Lapathum moderatè digerentem sortitum facultatem est, at Oxylapathum mistam: nā cū eo quod digerit, nō nihil quoq; repercutit. Semen eorum manifestam quoq; quandā adstrictionem obtinet, vt & dysenterias, & diarrhoeas siue profluuiā, sanet, & maxime oxylapathi. Porro Hipolapathū, quod in totū in paludibus prouenit, easdē dictis facultates obtinet, sed imbecilliores.

Lemonium.

Lemonij Fructum, utpotè austerū, exhibēt cum vino cœliacis, & dysentericis, hæmoptoicis q̄; siue sanguinem spuentibus. luvat & profluuium muliebri. Satis est oxybaphi mensura.

Leichen.

Leichen, qui in petris nascitur, est velut muscus quidā, sed rectè ex plantarū censi genere pōt. Porro ita nominatus videtur, q̄ leichenas curet. Extergentem habet ac modicè refrigerantē facultatem, utranq; verò resiccantem. Atq; abstergentem quidem atq; exiccantē à petra obtinet: refrigerantē verò ab humore aqueo, nascitur enim in humidis & roridis faxis. Porro quod ex talibus componitur, aduersum esse phlegmonæ {quod aphlegmanton vocant} nihil mirum est. Ceterū an hæmorrhagias sistat, vt refert Dioscorides, id verò neutiquam dicere queam.

C

Leontopetalon.

Leontopetali Radice maxime utimur: q̄ digerēdi facultatē, & exiccādī, excalfaciendī q̄; in tertio ordine possidet.

Lepidium.

Aibic. 657.

Lepidium ex quarto est ordine excalfacientium, simile Nasturtio tum odore, tum gustu, tū viribus: sed minus eo desiccet.

Leucas.

Leucas acrē possidet qualitātē exuperantē, tēperaturam vero calidā siccā q̄; in tertio quodāmodo ordine.

Leucacanthos.

Leucacanthos, quidam autem Polygonaton, alij Ischiada nūcupāt. Huius amara Radix est: ac proinde incidit, & exiccat in tertio ordine: in calfaciendo autem ex primo est ordine.

Leucoion.

Leucoij Frutex vniuersus extergentē facultatem possidet, ac tenuiū partium: plus tñ flores, & inter hos, qui sunt sicciores, magis ēt q̄ virides: adeo vt & oculorū cicatrices crassas extenuēt. Tū menses quoq; decoctum eorū mouet: & secūdas, fatus q̄; emortuos elicit: ac si bibatur, abortū facit. Est ergo id medicamentū, vt si quod aliud, amarū. Ac si quis viriū eius vehemētiā multa aqua admista retundat ac mitiget, aut certe id genus aliquo, habebit & ad phlegmonem nō malū medicamen. Sic & Decoctum eius, si non merū fuerit, vteri phlegmonas itidē perfusum sanat, potissimū q̄ diutino tpe ad scirrhi modū induruerit. Sic & cum cerato vlcera ægrè ad cicatricē perueniētiā curat. Sunt verò ēt qui cū melle & ad aphthas adhibeant. Semen, cū eiusdē facultatis sit, aptissimum est duarū drachmarum mensura potum: tū mensibus ciendis appolitū cum melle conuenire creditur, fœtus q̄; viuentes interficere, ac mortuos eiicere. Radices similis quoq; facultatis, nisi quatenus crassiorum sunt partium, & magis terrenæ, cū aceto lienes induratos sanant. Non nulli verò & phlegmonas {in articulis} induratas ijs curant.

Leuce Populus Alba.

Leuce arbor mistæ quodāmodo temperaturę est ex aquea tepida, & terrena extenuata essentia: Quamobrem & abstergentis facultatis est particeps.

Libanotus Thus.

Aibic. 525.

Thus excalfacit ordine secundo, desiccet primo, habet quoq; subadstringens pusillum: sed minimum manifesta adstrictio est candido. Cortex eius euidenter adstringit: proinde sanè strenuè quoque desiccet, adeo vt ex secundo sit ordine completo desiccantium. Est autē crassiorum partium quàm ipsum thus, & minime particeps acrimonie. Ob has ergo tū facultates, tū qualitates, multus

multus est eius vsus apud medicos in hæmoptoicis, stomachicis, cœliacis, ac dysentericis, non tantum ipsæ, quæ extrinsecus applicantur, ipsum admiscentes, sed & ipsæ quæ intrò in corpus sumuntur.

ἡ ἀλλὰ δὲ πρῶτα
uate legi i co-
dici. in presis.
legendū est. n.
ἀλλὰ δὲ, ut an-
tiq. cod. & Ori-
bani habet, i.
fuligo vel fauila.
Antiquus i
terpres habet,
fumus.

Ramus eius tum siccioris, tum calidioris est facultatis q̄ ipsum thus, adeo ut ad tertium vsq; excessum perueniat. Habet verò etiam absterforium quiddam. Itaq; eo nomine & expurgare & implere quæ in oculis consistunt vlcera videtur, velut & qui ex myrrha, & qui è styrace.

Libanotides.

Libanotides Tres sunt, vna sterilis, duæ fructum ferētes: omnes verò eiusdem facultatis, emollientis, & digerentis. Succus tum radicis, tum herbæ, mistus melli obtusam oculorum aciem ab humorum crassitudine emendat. Porro eius libanotidis, quæ ad coronas est utilis, quam Romani Rosmarinum nuncupant, decoctum regio morbo laborantes potum adiuuat. Omnes enim libanotides abstergentis & incidentis facultatis participes sunt.

Lignys Fuligo.

Fuligo^o omnis exiccatoria est, ac proinde terrestris est essentia, habens quasdā et ignis qui materiam combussit, reliquias: sed id pusillum est. Porro tota natura terrena est, tenuium partium. Sed quæ speciatim in ea differentia sunt, eæ pro vsta materia eueniunt, ex acriore & calidior, tali est proueniente fuligine, ex dulciore simili quoq; & hinc fuligine proueniēte. Primum. n. thuris fuligine vtuntur in ocularias medicinas mista, eas videlicet quæ ad oculos etiam nū phlegmone tentatos accommodantur, atq; etiā nū fluxione vexatos, & vlcera habētes: nā & illa expurgat, & carne implet. Ad hæc vsurpant quoque eā ad facultates quas vocant calliblepharas. Præterea terebinthinæ myrrhæ q̄ fuligo molestia caret, non aliter q̄ thuris: sed styracis quodammodo valētior est: magis est picis liquidæ: qua est magis cedri. Porro acrioribus vtuntur ad vitia palpebrarū vocata ptila, & erosos oculorum angulos humidos q̄ citra phlegmonem: At mollioribus miuoribus q̄ tum ad hæc, tum ad ea, ad quæ competere paulò superius diximus thuris fuliginem.

A. l. 2. t. 2. c. 242.
fol. 126. g

Libysticum.

Libystici Radix & Semen ex genere excalfacientium sunt, adeo ut & menses cieant, & vrinas prouocent, flatus q̄ extinguant.

Linospermon Lini Semen.

Lini^o Semē esum flatuosum ē, et si frigat: adeo sanè recremētitia humiditate plenū ē. Est verò et in primo ordine quodāmodo calidū, ac humiditatis & siccitatis quodāmodo in medio est situm.

A. ibi. c. 598.

Linozostis Mercurialis.

Linozostide vtuntur oēs ad vētris purgationes dūtaxat. Verum enim uero, si quis eius facere G periculum volet in cataplasmate, sanè admodum eam esse digerentis experietur facultatis.

Lonchitis.

Lonchitidis^o eius videlicet quæ semen habet triāgulare, cuspidis figura, Radix potissimū quodāmodo similis est radici Dauri: Proinde vrinam ciēt. Porro eius, q̄ Scolopēdriæ similia habet folia, ea ad glutināda vulnera idonea sunt viridia, sed sicca cū aceto bibita lienes induratos sanant.

A. ibi. c. 336.

Lycion.

Lycion^o siue Pyxacāthon, arbor spinosa, ex qua Lycium, quod vocāt, cōficitur, id videlicet medicamentum liquidum, quo ad sugillata vtuntur, & sedis oris q̄ phlegmonas, vlcerationes q̄, tum herpetas, putredines, & vlcera cōtumacia, & aures pure fluentes, & intertrigines, ac paronychias.

A. ibi. c. 390. a

Est aut facultatis exiccatoriæ, compositum ex diuersi generis substantijs, {quas ἐρεπον ἐνὲς Greci vocāt, } altera quidem tenuium partium, digerente atq; calida: altera terrestris frigida, ex qua ad strictionem obtinet. Porro hæc qualitas pusilla medicamento inest: digerit verò & desiccet nō parum, nempe in secundo ordine: in calore autē medijs & symmetris proximū est. Proinde ad varia hoc vtuntur medicamine, ut abstergente quidem † ad putredines, & cacoethe vlcera: } ut contrahente verò, cœliacis, dysentericis, ac muliebri profluuiō adhibentes. Lycium hoc, in Lycia & Cappadocia plurimum prouenit, Sed Indicū ad omnia valentius est.

† Atq; id assū-
mūt tāquā ex
purgās, q̄ pupil-
lā obtenebrāt.

Lyfimachios.

Lyfimachios supantē habet qualitātē adstrictoriā, p̄ quā & vulnera glutinat, erūpētē q̄ ex naribus sanguinē emplastri mō illita reprimīt. Quin & reliquas sanguinis eruptiōes listere pōt tū ipsa, tū succus eius multo magis. Pota dysenterias, sanguinis reiectiōes, ac muliebri profluuiū sanat.

Lychmis.

Lychnidos Coronariæ Semē calidum est secūdo quodammodo ordine, aut iam etiā tertio: sic- cum sanè eodem modo.

Lotos Herba.

Lotus Domestica, quā quidā Triphyllon, hoc est trifoliū, nominant, ut mediocriter abstergēdi vim possidet, sic et exiccādi. In caliditatis frigiditatis q̄ coniugatione mediā quodāmodo est, & tēperata. Lotus aut Agrestis plurima in Libya prouenit. Semē eius secundi est ordinis excalfaciētium, habet q̄ non nihil absterforium. Porro Ægyptiæ loti Semen etiam in panes fingitur.

Lotus Arbor.

Lotus arbor non ita multē adstrictoriæ qualitatis est particeps, sed & tenuium partium est, &

A. ibi. c. 513.

A & exiccatoria. Itaq; lignorū eius assule derafa muliebri accōmodatur profluuiio, & dysenterijs, & coeliacis affectibus. Decoquuntur verò interim in aqua, interim in vino, nimirū prout vsus poposcerit: nec infunduntur tm̄, sed & bibuntur. Quin etiā q̄ pilos defluentes cohibeat, nō mediocre lignum est ipsum adstringētis esse cuiusdā, similiter mediocriter deliccantis, facultatis. Dictū qppe est & in sermone de Ladano eiusmodi esse facultatis oportere, qđ fluētes capillos esset cohibiturū.

M A C E R

A. ibi. c. 448.

M Acer^r Cortex est, qui ex India conuehitur, gustu multum acerbo, cū leuicula quadā acrimonia odorata, iucundum sanē redolens, vt pleraq; aromata siue odorata, quæ ex India cōuehuntur. Videtur itaq; & ipse ex mista constare essentia, pleraq; terrena frigida, paucula verò calida, & tenuium partium. Quamobrem valenter deliccet, adstringit q̄. Proinde coeliacis & dysentericis miscetur facultatibus, in tertio exiccātium consistens ordine: in caloris frigoris q̄ differentia neutrum insigniter efficiens.

Malabathrum.

A. ibi. c. 253.

Malabathri^r Folium Spicē nardi similem facultatem obtinet.

Malache Malua.

A. ibi. c. 194.

B Malua^r, Agrestis quidem, digerentis paululū & emollientis leuiter est facultatis: Hortensis vero quāto plus habet aqueæ humiditatis, tāto facultate imbecillior est. Fructus eius tanto validior est, quanto & siccior. Porro huius generis est & ea, quæ Dendromalache nuncupatur, sed efficacissima comprehensarum in digerendo. Appellatur etiā Althea.

Mandragora.

A. ibi. c. 357. h

Mandragora^r vincentem habet facultatem refrigeratoriā, adeo vt tertij sit ordinis refrigerātium. Veruntamen non nihil etiā caloris inest, & in pomis humiditatis. Proinde soporē ea cōciliandi vim habent. Radicis cortex cū sit valentissimus, non tātum refrigerat, sed & deliccet: reliquum quod intus est, imbecillum est.

Marathrum Fœniculum.

A. ibi. c. 274.

Fœniculū^r tā valēter excalfacit, vt ex tertio ordine excalfaciētū cenferi promereatur: deliccet verò nō eque, sed ipsum quispiā in hoc primi esse ordinis posuerit. Proinde lac pcreat: quod, si admodū deliccaret, nō sanē efficeret: suffusus eadē rōne auxiliatur: vrinas mēses q̄ ciet. Porro est & alterū Fœniculū Agreste, quod præ magnitudine Hippomarathrū nuncupāt: cuius Radix ac Semē amplius q̄ domestici, deliccandi vim obtinet: quocirca vētrem quoq; eo nomine sistere vī: **C** nec sanē manifesta illis inesse videtur adstrictio. Huius nō radix modo, sed & multo magis semen Cachryi affimile est: potest q̄ & calculos frangere, & auriginosos sanare, mēses q̄ & vrinas mouere: non tñ lac congerere, sicut illud superius. Aliud est Hippomarathrum, cuius semē rotūdū est & acre, simile semini coriandri, facultate quidem hippomarathro simile, sed debilius.

Mastiche.

A. ibi. c. 453.

Mastiche^r Candida quidem, & Chia consueto more cognominata, quodammodo ex cōtrarijs cōposita facultatibus est, adstringēte videlicet & emolliēte. Proinde stomachi, ventris, intestinorum, iecoris q̄ inflammationibus competit, vtputa secundo ordine excalfaciens & deliccans. Nigra verò, q̄ Ægyptia cognominatur, tum magis deliccet, tū minus adstringit: quamobrē aptior quodā modo est ad ea, q̄ validiorē digestionē per halitum exposcunt. Hac ratione & furunculis bonum est remedium. Porro Oleum vnguentum q̄ mastichinum ex Chia cōficitur, nō admodum sanē ex Ægyptia. Caterum similis est & ipsum Mastichæ facultatis.

Melanthium Nigella.

A. ibi. c. 516.

Melanthium^r excalfacit atq; deliccet tertio ordine. Videtur etiā tenuium esse partiū: Hoc enim nomine catarrhos sanat calidū in lintheo admotū, atq; assiduū olfactū. Quin etiā si intro in **D** corpus sumatur, vel maxime flatus extinguit. Vñ constat essentia ipsum esse subtiliū, partium, & ad vnguē à caliditate elaboratæ: propterea sanē ēt amarum est. Ostensum verò in quarto horum voluminum est, q̄ cū ad extremam tenuitatem atq; elaborationē terrena ptingit substantia, amara proueniat qualitas. Itaq; mirum non est, si lumbricos interimat nō esum modò, sed etiam foris ventri impositum: siquidem & id præstare posse saporem amarum monstratum est. Nec sanē ēt mirandū, si lepras, clauos, myrmecias eiiciat, ei præsertim qui in superioribus libris comprehensorum haud est immemor. Sic verò etiam orthopnoxā iuuat: & menses prouocat, qui vtiq; ob crassitiem aut viscositatem humorū retenti fuerint. In summa vero, vbi sectione, extersione, desiccatione, excalfactione est opus, præstantissimum id remedium est.

Melilotum.

A. ibi. c. 445.

Melilotum^r miste facultatis est: habet enim quiddam adstringens: sed & digerit & cōcoquit: copiosior enim in eo est substantia calida, quā frigida.

Mel.

A. ibi. c. 489.

Mel^r deliccet & excalfacit ordine secundo. Est autem simplicis, quoad fieri potest, tum facultatis tum temperamenti, extergentis, vt nobis appellare mos est, medicamentorum speciei existens. Porro coctum minus acre absterforium q̄ redditur. Itaque ad sinuosorū vlcerum glutinationes

† περιπρήν-
ται μὲν, ὡς-
φασί, καλὰ-
μοις, idest con-
crefcit quidē,
ut aiunt, circa
calamos.

tiones eo vtuntur. Ceterum si quod mel Amarum est, ceu Sardoum, clarū est & ipsum misce esse E facultatis: tanquam si nostrum quispiam ei absynthium admiscuisset. Sed & Sacchar, vt vocant, quod ex India atq; foelici Arabia cōuehitur, † in calamis, vt aiūt, cōcrefcit, & ipsum mellis est species, minus certē nostrate dulcius, sed adsimiles ei vires obtinens, quod ad abstergendum, deliccā- dum, & digerendum attinet. Porro quatenus nec inimicū stomacho est, ceu nostras, nec sitim affe- rens, eatenus ab illo substantia differt.

Melissophyllum Citrago.

Melissophyllum Marrubio simile est facultate, sed plurimū ab eo vincitur. Quamobrē nec vti- tur eo quispiam: superuacaneum siquidem foret praesente marrubio, cuius tantus est vbique ter- rarum prouentus, velle vti melissophyllo. Ceterum, si cui fortē ad manum quādoq; marrubium non fuerit, illo vti liceat, modō non exciderit, quanto ab hoc exuperetur.

Mespilum.

Mespilum, alij Tricoccum nominant, quod tria intus in vniuersum gerat grana, quorū vnū quodq; arboris est semen, ceu ea quae in malis inueniuntur, ipsius mali: & vinacei, ipsius vitis: & fi- cus, minuta illa grana, quas Cenchramidas Graeci vocāt. Arboris huius Fructus admodū acer- bus est, vix q; edi potest, ventrem strenuē coercens. Quin & in Germinibus & Folijs acerbata hac F qualitas non pauca reperitur.

A. l. i. c. 2. 742.

Medion Trifolium Odoratū.

Medij Radicem contrā atq; fructum ipsum temperatam esse cōtigit: Nā illa quidē austera est, & fluxiones cohibet cū alias, tum verō etiam profluuium muliebre quod vocāt. At Semen tantū abest vt tale quid efficiat, vt etiam menses cieat, nimirum tenuiū partium, & incidendi facultatis.

Mecon Papauer.

Papauer alterum Rhœas nūcupatū est, q; f. celeriter flos eius defluat: alterum Domesticū, qñ- quidem colitur. Quin & Aliæ duæ præter has sunt species syluestris papaueris, alterū velut insi- dentē calicē sustinēs: alterum longiorem q̄ illud calicem obtinens, totum autē procerius ac squal- lidius. Ab hoc succus defluit: atq; hinc est quod hanc speciem quidā Rhœada nominent. Porro omniū facultas refrigeratoria est. Ceterū fatiui Semē, quod & Thylacite cognomināt, mediocri- ter somnum cōciliat, visu candidum: proinde panī ipsum inspergunt, ac melle maceratum edūt.

A. l. i. c. 563.

At eius quod primo loco recensuimus, cuius florē celeriter decidere posuimus, validius Semen refrigerat: itaq; nequāq; eo quis innoxie solo vti possit, sicut fatiui siue domestico, melli admi- scēs. Admodū verō si ita sumptū sit, somnū conciliat. Ceterum pusillum eius inspergunt ijs, quae G ex melle conficiuntur, bellarijs, atq; itrijs, panibus q; . Porro tertio loco dicti Semen atrū, ē medi- camentosum est, admodum refrigerans. At, quod quarto loco positum est, omniū est medicatissimum tum in semine, tum in caliculis, tum in folijs, tum in succo. Validē enim refrigerat, ad stu- poreū vsq; & mortem perducens. Sed medici, quō probē eo vtantur, medicamentis miscentes, fri- giditatis vehementiā retundunt. Est enim ex quarto & vltimo refrigerantiū ordine. Porro quo pacto maximē ex methodo missionem facere oporteat, non est praesentis tractationis proprium, sed eius quae de Componendis medicamentis agit, quae post hoc opus à nobis exponetur.

Mecon Ceratitis Papauer Cornutum.

Papauer Cornutū, nominatū qdē sic est à fructu leuē inuersionē habēte, velut & scēnū grēcū, vt bouis cornu esse videat simile. Vocatur porro à qbusdā Paralīū, qñquidē vt plurimū iuxta mare nascit. Vim habet incidēdi, & abstergēdi. Itaq; Radix herbe in aqua decocta ad dimidiū, hepaticos affectus adiuuat. Porro Folia & flores sordida admodum & cōtumacia vlcera iuuant: sed ea reijcere oportet vlceribus iam expurgatis: adeo enim abstergere valent, vt & purae quoq; carnis non nihil eliquent. Hoc viriū robore non sordem duntaxat, sed & crustam vlceribus detrahīt.

Mecon Heracleia Papauer Herculeum.

H

Papauer Herculeum. Vocatur verō & Aphrodes, hoc est spumofum, eo quod totum candidū est & spumofum, exile. Semen habet pituitam expurgans.

Melea Malus.

Malus nō omnis eiusdem naturae est, velut nec eiusdem fructus. Quippe quaedā mala dulcia sunt, quaedā austera, nō nulla acerbata, non nulla acida, alia extremē exoluta & aquea. Et sanē in istis aqueū exuperat, vt tēperies eorū sit tū humidior, tū frigidior: in acerbis autē terrenū frigidū: in au- steris vero tū istud, tum aqueum frigidum: sicut in dulcibus aqueū temperatū. Sic quoq; succi, cortices, folia q; arborum inter sese dissidēt. Itaq; si austeriora sint atq; acidiora, vulnera illis glutina- re possis, tum in phlegmonarum principio influxionē reperiūt, ac stomachum ventrem q; exolutum ac languidum roborare: at aquosioribus mediocres phlegmonas incipiētes & gliscen- tes remittere. Sed haec iam ad curandī rationem attinent: proinde ea citius ēt relinquenda. Porro q; plurima pomis omnibus recrementitia frigida q; insit humiditas, vel hinc liqueat, q; eorum om- nium nullus omnino succus durare, ac vetustatem ferre possit, verū acescant corrumpanturq; vni- uersi. Solus, n. cydoniorum & struthiorū (vt pote quae propter vincentē adstrictionē minus cate- ris sunt humida) succus coctus cum melle durare potest: tamen si ipse per se non ita durare queat.

A. l. i. c. 564.

Melea.

† orib. cod. ad
dit, dulce: i a-
cidis. Vide su-
pra li. 4. ca. 8.

A

Melea Persice Malus Persica.

A. ibi. c. 564.

Melea Persice. Hęc vulgo nūc ab omnibus vocatur Persice tantum, illo videlicet omisso *Melea*. Ipsa igitur arbor in germinibus & folijs vincētem habet amaram qualitatem. Proinde Folia eius trita & super umbilicum imposita lumbricos necant. Alioqui sanē etiam digerens medicamen est. Fructus eius, nempe esculentum hoc persicum, humidior est & frigidior temperie.

Melea Armenice Malus Armenica.

A. ibi. c. 143.

Melea Armenice. Huius vetus nomen deficit: vocant enim oēs tū fructum tū arborem *Præcocion*. Fructus humidior frigidiorq; est, vtrunq; secundo quodammodo excessu perpeffus.

Melea Medice Malus Medica.

A. l. 2. c. 116.

fol. 111. g.

Melea Medice. Huius Fructus non amplius malum medicum, sed ab omnibus Citriū nūcupari adsolet. In Semine quidem vincentem habens qualitatem acidam & siccā, vt ipsum tertij sit ordinis reliccantium refrigerantium q; : In Cortice verò itidem desiccātem temperiē est sortitus, non parum tamen habentem acrimoniā: proinde desiccet hic secundo excessu, non tamen frigidus est, sed aut temperatus, aut paulo infrā. Porro Caro eius pariter crassi succi est, & pituitosa frigida q; : nam & ipsa editur sicut & cortex. Semen omne edi ineptum est, tum humidum illud & acidum, de quo primūm disserui. Et Nucleus qui in illo inuenitur, id quod re vera semen est, hic amarus est, & digerendi videlicet siccandi q; facultatem obtinens, secundo quodammodo ordine à temperatis recedens. Folia verò deniq; exiccandi ac digerendi vim obtinent.

Meum.

A. ibi. c. 454.

Meum. Huius Radices perutiles sunt, calidæ tertio ordine, siccæ secundo. Proinde vrinā menses q; ciere volentes hoc vtuntur pharmaco. Sed si plusculum sumatur, capiti dolorem mouet, vt-pote cum plusculum sit calidum q; siccum: quippe cum humiditatē crudiūsculam etiamnum & flatuosam caliditas, quæ in ipso est, ad caput deferat, atq; ita ipsum afficiat ledat q;.

Milax Trachea, hoc est aspera.

Milax Trachea clauiculis plena est: variē nāq; arboribus circūuoluitur sursum deorsum. Folia leuiter acia gustantibus sunt, & alioqui vtentibus calida.

Milax Leia, hoc est leuis.

Milax Leia quodammodo iam dictæ similes vires obtinet.

Morea Morus.

A. ibi. c. 491.

Mori Fructus maturus quidem ventrem subducit: immaturus verò vbi aruerit, admodū restringit. Itaq; ad dysenterias accommodus est, & affectiones coeliacas, & quascunq; alias fluētes. Contūdatur autē, ac obsonijs commiscetur, velut *Rhoi* fructus: aut si cui ita videatur, ex aqua aut vino bibat. Porro q; maturorum Succus ad stomatica medicamenta sit utilis, propter eam videlicet, quæ inest illi adstrictionem, neminem latet. Præterea ad alia complura particularia, quæ mediocrem poscunt adstrictionem, cōpetit. At immatura mora præter acerbiteriam, & aciditatē sortita sunt. Et tota adeo arbor in omnibus suis partibus mistam aliquā vim obtinere videtur ex restringente & purgante compositam: Attamē in Radicis cortice purgatoria cum quadam amaritudine exuperat, adeo vt & latum lumbricum interficiat: † In alijs autem partibus restringēs vincit: In Folijs tamen & Germinibus quodammodo mediā vtriusq; temperies est.

Myagros.

Myagri Semē pingue est: nam si tundat, oleosum quid effundit, quod emplasticā vim obtinet.

Mycetes Fungus.

A. ibi. c. 168.

Fungus frigida humida q; admodū planta est: quāobrem ēt, pximē ad deleteriā & enecantē facultatē accedit. Et sanē inter eos sunt qui interficiant, potissimū qui ex natura mistā habent qualitatem putredinosam. *Myle.*

D Myles Radix paruo bulbo similis est facultatis, cōtrahentis. Nam cum farina ærina, hoc est loliij, apposita apertam vuluam sanare scribit Dioscorides.

Myos Otis Auricula Muris.

Myos Otis, qdā verò *Myos ōta*, desiccet secūdo ordine: ceterū nullā euidentē caliditatē possidet.

Myrice Tamarix.

A. ibi. c. 684.

Myrice abstergentis est ac incidentis facultatis absq; perspicua desiccatione: habet verò etiam adstrictionem non nullam. Has ob qualitates facultates q; admodū prodest lienī indurato decocta cū aceto, aut vino: siue radice, siue folijs, siue extremis ramulis decoctis. Sanat porro dentium dolores. Ceterū Fructus & Cortex nō paucā sortita sunt adstrictionē, adeo vt gallæ omphacitidi proxima sint: nisi q; acerbitas euidentis est in galla: sed myricæ fructui temperatura inest inqualis: immista est enim naturæ eius multa vis abstergendi, atq; partium tenuitas, quod sanē gallæ non accidit. Attamen vbi galla forte ad manū non erit, eo vti liceat ad omnia, ad quæ illa vtimur: ad eadem & cortice. Porro myricæ combustæ Cinis admodū desiccatoriæ facultatis est, plurimā habens abstergendi & incidendi facultatem, pauxillam adstringendi.

Myriophyllon.

Myriophyllon vsq; eò desiccatoriæ facultatis est, vt vulnera glutinet.

Myrrhis.

† ἐν δὲ τοῖς
ἀσπασίμοις
ἐστὶν ἡ ἰμμά-
τουρ αὐτῆς μο-
ρῆς. ἔχει ἐν
ὀρίβῃ.

Myrrhis.

E

Myrrhis, quidam Myrrhan nominant, Radicem habet odoris iucundi, & dulcem, quæ q̄ mēses moueat, tum ea quæ thoracem ac pulmonem degraunt, expurgantem. Itaq̄ ex secundo ordine fuerit exalfacientium, adiuncta quadam partium tenuitate.

Myrrhine Myrtus.

Myrtus. " Ex contrarijs substantijs hæc planta constat: vincit tamen in ea frigidum terrenum. Habet verò etiam quiddam tenuium partium calidum. Itaque valenter desiccatur. Porro tum Folia, tum germina, tum fructus, tum succus, non parum inter se in adstrictione dissident. Porro quod ramis & trunco adnascitur tuberosum, quam quidam Myrtada nūcupant, quanto dictis siccius est, tanto & desiccatur & adstringit vehementius. Quidam id reponunt tundētes, postea vino subigētes, ac in pastillos formantes. Folia item arida viridibus plus desiccant: miscetur enim virentibus humiditas quædam. Porro Succus non tantum ex virentibus folijs exprimitur, sed & fructu. Constipandi vim hæc omnia habent tum foris imposita, tum intrò sumpta in corpus, quod scilicet non dum vllam deleteriam aut purgatoriam substantiam habeant admistam.

Moly.

Moly. " Hoc quidam vocant Peganon Agrion, hoc est, rutam syluestrem. Non nulli Harmolā, F A. ibi. c. 330. Syri Befasan: sicut Cappadoces Moly, quia radicem habeat nigram, & florem lacteū. Vis eius tenuium partium est, & calida tertio ordine. Vnde & crassos & viscosos humores dissecat, ac digerit, & vrinam mouet.

GALENI DE SIMPLICIVM MEDICAMENTORVM FACVL TATIBVS LIBER OCTAVVS

Qualitates tantum Effetrices Simplicium medicamentorum hisce libris tractari: Ac quid ex ijs, quæ antè tractata sunt, in memoriam reducendum.

†κατὰ φύσιν.
ed forte κα-
τὰ φύσιν, id-
est, in plantis.



Vantum itaq̄ reliquum est facultatis † secundū naturā, † id hoc libro dicet: nec id quidem omne, sed tm̄ effectriciū qualitū actiones. Nā totius substantiæ plātarū opera postea per se exponā. Cōmonefaciis itaq̄ lectoribus de ijs G quæ suprà tractauimus, nepe quod cuiusq̄ simplicis facultatis in maioris minorisq̄ ratione discriminationē quatuor ordinibus notauimus: quod q̄ per sp̄i cuius limitibus cuiusq̄ ordinis latitudinē circūscripsimus: tū quod inueniendarū facultatū rōnē quandā ac viā docuimus, horumq̄ omniū demōstrationes cōfecimus, ac scopos posuimus, & cuiusq̄ facultatis iudicādi normas tū peculiāres, tū cōes: sic iā reliqua adijciemus, hortantes, si quis sit qui in superioribus versatus non sit, vt aut hæc omnino relinquat, aut si amās laboris est, ab initio prius totum opus perlegat. Siquidem prius q̄ in illis exercitatus fuerit, obscura omnia & demōstrationis expertia videbuntur dicenda.

NARDV STACHIS SPICA NARDI

Nardi " Spica exalfacit excessu primo, desiccatur secundo iam cōpleto. Cōposita est ex adstrigente sufficienter substantia, & acris calida non multa, & quadam leuiter subamara. Ex his cōmans facultatibus Radix & ad iecur, & ad stomachum, rationabiliter conuenit, tum pota, tum extrinsecus imposita. Vrinam ciet, morsus stomachi sanat, in ventre ac intestinis cōlissentes fluxiones desiccatur, ad hæc & eas quæ in capite & thorace. Valentior est vocata Indica, quæ nigrior est quàm Syriaca uocata.

A. ibi. c. 640.

Nardus Celtica, hoc est Gallica.

Nardus " Gallica iam dictis similis quadatenus in genere facultatis est, ceterum ad omnia imbecillior, praterq̄ ad prouocandam vrinam. Siquidem calidior illis est, sed minus adstringit.

A. ibidem.

Nardus Orea, hoc est Montana.

Nardus Montana, quæ & Thylacitis, & Pyritis nūcupatur, plurimā in Cilicia nascitur, sed prædictis debilior.

Narthex Ferula.

Ferulæ Semē exalfacit & attenuat. Ceterum id quod intus inest, dum adhuc viridis est, quod medullā vocat, adstringentē qualitātē participat: Cuius nomine sanguinem spuētibus & cœliacis conuenit.

Napy.

Napy calfacit & desiccatur ordine quarto.

Narcissus.

Narcissi " Radix vsq̄ adeo exiccādi facultate pollet, vt & maxima vulnera cōglutinet vel ad incisiones vsq̄, quæ circa tendones accidunt. Habet verò quiddam absterforium & attractorium.

A. ibi. c. 503.

Neuras Poterium.

Neuras, quidam Poterium vocant. Desiccandi absq̄ morfu facultatē possidet, adeo vt & neruos

A uos incisos glutinare credatur. Radices eius potissimum eiusmodi vim obtinent. Quin & Deco-
ctum earum quidam exhibent ijs, quibus affecti sunt nerui.

Nerium, aut Rhododaphne.

Nerium, aut Rhododaphne, notus oibus frutex, Foris quidē illitus digerēdi vim obtinet. Por-
rō si intro in corpus assumatur, perniciosus ac venenosus nō tantum hominibus, sed plerisq; etiā
pecudibus est.

Nymphaea.

Nymphaea tum Radix, tum Semen, desiccandi vim habet citra morsum. Itaq; ventris proflu-
uia cohibet: semen q; siue per insomnia, siue alio pacto immodice profluens, retinet. Iuuat porro
etiam dysentericos. Ceterum Nymphaea, quę candidam habet radicem, potentioris est facultatis,
vt & muliebri medeatur profluvio. Verum & hæc, & ea quoque, quę atram habet radicem, ex vi
no nigro austero bibitur. Porro non nullam habent quoq; & abstergendi potentiam. Itaq; & al-
phos sanant & alopecias: ceterum ad alphos, macerantur aqua: ad alopecias, pice liquida. Sed ad
hæc aptior est ea, cuius radix nigra est: sicut ad alia, cuius alba.

XANTHIUM

X Anthium, vocatur etiam Phasganium. Fructus digerendi vim obtinet.

Xyris.

Xyris, quidā Xyrida, tenuiū partiū, attractoria, digerēdi, ac nimirū ēt desiccandi est facultatis cū
radix, tum multo ēt amplius fructus: Qui quidem & urinā ciet, & lienes induratos sanare potest.

Xiphion Gladiolus.

Xiphij Radix, & maxime altera illa, quę superior est, attrahentē, digerentē, & desiccantē scilicet
ēt facultatem possidet.

OESOREVS

S Orbus arbor, cuius Fructus græce Oz vocantur, & à plerisq; Ouz cum u, hoc est sorba, nomi-
nantur, adstringentem obtinet qualitatem, sed multo imbecilliorē q̄ mespilus. Proinde sanē
etiam esui iucunda est, minus q; q̄ Mespilus ventrem constringens.

Oenos Vinum.

Vinum ex secundo est ordine excalfacientium: sed quod admodum Vetus est, ex tertio: sicut
Mustum quod vocant, ex primo. Caliditati eius proportionē respondet siccitas.

Olynti Grossi.

Grossi acrem & digerentem vim possident propter succum totius arboris communem, qui il-
lis inest. Cocū itaq; duros tumores discutiunt, crudi verō myrmecias & thymos ericiunt.

C *Olostium.*

Olostium desiccandi vim habet cum adstrictione: Quamobrē ipsum ad rupta potui exhibēt.

Olyra.

Olyra mediam tritici & hordei naturam possidet tam vt nutrimentum, quā vt medicamen-
tum. Ex illis igitur de istis colligito.

Onagron.

Onagron aut Onothera, aut Onothyris. Huius Radix arefacta vinosum qddā redolet. Sed &
facultatis vini est maxime.

Onosma.

Onosma, vel Osma, vel Phlonitis, vel Ononis, ex acri & amara cōstat substantia. Proinde quo-
que creditur fœtus necare & eiicere, folijs eius in vino potis.

Onobrychis.

Onobrychis rarefaciendi digerēdi q; vim obtinet. Proinde Folia eius virentis etiamnum, illita
ad morem cataplasmaus, phymata digerunt: arefactæ verō, si cum vino bibantur, strangurias sa-
nant. Quin etiam sudores elicit cum oleo inuncta.

Ononis.

D Ononis Radicem habet tertio quadatenus ordine excalfacientem. Cortex eius maxime est vti-
lis, habens quippiam & absterforium & incisoriū. Itaq; non tantum urinas prouocat, sed & la-
pides confringit. Eadem facultate & crustas cito detrahit. Vtuntur porro ea quoque & ad den-
tium dolores, collui videlicet eam in oxycrato cocūam præcipientes.

Oxos Acerum.

Acerū in primo horū cōmentariorum mistæ esse substantiæ, nempe frigida pariter & calida,
eius q; vtriusq; tenuiū partiū, demonstratū est: Ceterū calidā frigida exuperat. Porro magnam de-
siccandi facultatē obtinet, adeo vt sit tertij ordinis desiccantium iā cōpleū, vtiq; cū validum exuterit

Oxyacanthos.

Oxyacanthus. Hæc arbor vt Pyro syluestri similem habet speciem, ita & vires nō dissimiles.
Quin & ipsi Fructus, pyri quidem syluestris, absolute acerbus est: ceterum qui oxyacanthos, &
tenuum est partium, & paulum quiddā incisium obtinet. Porro arboris huius fructus, pyri syl-
uestris fructui similis nō est, verum myrtis, scilicet rubēs & rarus. Habet vero & nucleos. Porro
non esus tantum, sed & bibitus, affectus oēs fluxionum {quos *ρῶδεις* Græci vocant} cohibet.

Opus, siue Succus.

Opus, siue Succus, Cyrenaicus quidē oēs & caliditate & tenuitate exuperat, ac proinde etiam

Quinta Classis.

HHHHH

oium

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

omnium maximè per halitū digerit: quanq̃ sanè & reliqui admodum calidi sunt & spirituoſi: ſi- E
quidem plurima eorum pars eſſentia aeria eſt & ignea. Porro complures habentur ſucci. Qua-
uis nanq̃ radice incifa aut caule, quod ex vulnere craſſum ac lētum effluit, ſuccus eſt: cæterum ſpe-
cialius, & velut per excellentiā quandam, Cyrenaicum ita nuncupant, & Medicum, & Syriacum.

Origanus.

Origanus, "Heracleotica quidem efficacior eſt Onitide: ſed agreſtis, quam quidā Panaces he-
racium, aliq̃ Conylen cognominant, valentior vtrūq̃ eſt. Omnes verò incidendi, extenuandi,
exiccandi, calfaciendi q̃ facultatem poſſident: hæc q̃ tertio exceſſu obtinent. Porro ea, quā Tra-
goriganum appellant, aſſumpſit etiam adſtriſtionis quippiam.

A. l. 2. t. 2. c. 526.

Orobos Eruum.

Orobos "deſiccatur quidem exceſſu ſecundo intenſo, calfacit verò primo. Porro quatenus amari-
tatis eſt particeps, eatenus incidit, extergit, atq̃ obſtruſtiones expedit. Cæterum ſi ſumatur copio-
ſe, ſanguinem per vrinas euocat.

A. ibi. c. 342.

Orobanche Eruangina.

Orobanche ſiccæ frigida q̃ temperatura eſt in primo ordine.

Oryza.

Oryza "habet adſtriſterium quippiam: Quare mediocriter ventrem ſiſtit.

F

A. ibi. c. 67.

Orchis Testiculus Canis.

Orchis. "Nūcupat & herba hæc Cynos orchis. Radici eius bulbosa ac geminæ viſ in eſt humi-
da & calida: ac guſtātibus dulciuſcula eſt. Cæterum Maior radix multā vī habere humiditatē ex-
cremētitiā, & flatuoſam: quapropter epota venerē excitat. Altera verò, Minor videlicet, contra,
nimirū admodū elaborata: vt ſit eius tēperamentū ad calidius & ſiccius vergēs. Itaq̃ hæc radix tm̄
ab eſt vt ad coitū ſtimulet, vt ēt planè contrā cohibeat ac reprimat. Eduntur bulborū more, toſta.

A. ibid. c. 707.

Orchis, ſeu Serapias.

†quā prior, ſ.
orchis.

Orchis, quē & Serapiada nūcupāt, ſicciorē facultatē obtinet, †q̃ vt primi ordinis haberi merea-
tur: †quocirca nec perinde ad venerē accōmodus eſt. Oedemata illitus diſcutit, vlcera ſordida ex-
purgat, herpes ſanat. Siccatus multo amplius deſiccatur. Nā & putreſcentia contumacia q̃ vlcera
ſanitati reſtituit: quippe cū & ſubadſtringens ſit: ac proinde etiam vētrem ex vino potus ſiſtit.

Oſiris.

*Al. coremata.

Oſiridi herbæ, ex qua fiunt & cacōremata, amara in eſt qualitas, & obſtruſtiones expediendi fa-
cultas. Quare & in iocinore conſiſtentes adiuvat obſtruſtiones.

G

PANCRATION

PAncratiū. Radix huius, ſcillæ ſimilem guſtū & facultatē refert. Quare ea quidā pro ſcilla,
ſi ea non adſit, vtuntur: efficit enim omnia in genere quidem ſimiliter, ſed longè imbecillius.

Paliurus.

Paliuri Folia & Radix adeo non obſcurā habēt adſtringēdi facultatē, vt & ventrē fluentē cohi-
beant: adeo q̃ digerunt, vt et Phymata curent, q̃ quidē non admodū phlegmonode ſunt et calida.

Fruſtus porro tāta obtinet incidēdi vim, vt & calculos veſicę cōminuat, & thoracis pulmonis q̃
excretionibus auxilietur. *Papyrus.*

Papyrus "ipſa quidem per ſe in vſum medicinale ſe haud ingreditur. At macerata aut vſta vti-
lis efficitur. Igit oxycrato vino ue Macerata recentia vlcera glutinat, maximè in circulū circūpo-
ſita: verū hic quidē eſt ceu materia, quę medicamina ſanantia accipiat. At Vbi vſta fuerit, medi-
camen eſt exiccatorium, velut & chartæ combuſtæ cinis, niſi quatenus infirmior eſt papyri cinis.

A. l. 2. t. 2. fol.
120. c. 173. c

Panax Heracleum.

Panaces "Heracleum. Ex hoc ſit vocatus Opopanax, radicibus eius & caulibus ſcilicet exciſis.
Porro Opopanax ipſe longè eſt ad plurimos vſus aptiſſimus, vtpote exalfaciēs, emolliēs, & dige H
rens: ponat q̃ ipſum quiſpiā in calfaciendo tertij ordinis, in deſiccādo vero ſecundi. Cortex radi-
cis exiccatorium ſimul & exalfactorium eſt medicamentū, ſed minus q̃ ſuccus: quā & non nullā
habet abſtergendi facultatem. Quare eo quoq̃ vtimur & ad nuda oſſium, & ad vlcera maligna &
contumacia. Sufficiēter, n. talia carnem procreant, ſcilicet abſtergēdo ſimul ac deſiccando, nec ita
magnopere calfaciendo: quæ omnia ad carnem generandam neceſſaria ſunt, velut in libris de cu-
randi ratione oſtendimus. Fruſtus calidus & ipſe eſt, ac menſibus mouendis medicamen accom-
modū. Ceterū, neſcio quo pacto nunc oēs ex more non Panaces, ſed Panaca herbā hanc vocitēt.

A. ibid. c. 521

Panaces Aſclepeum.

Panaces Aſclepeum minus eſt calidum ſuprà dicto panace: Quamobrem floribus eius & fru-
ctu melli miſtis, ad vlcera, phymata, & phagedænas vtuntur.

Panax Cheironeum.

Panaces Cheironeum & ipſum ſimilem prædicto facultatem poſſidet.

Paronychia.

Paronychia ab affectu nominata eſt: ſanat enim paronychias: vt & refert Dioſcorides, fauos
quodq̃. Viſ eius eſt tenuium partium, & exiccatoria, morſu vacans. Talia enim ſint oportet, quæ
paronychias

A paronychias sanant. Porro satis constat tale esse idoneum ad digerendos affectus omnes, qui digerere possunt. Talia enim sunt, quæ cum ex tertio sint ordine excofacientium & delicatium, velut & hoc, essentia insuper subtilis sunt.

Pentaphyllum.

A. ibid. c. 545.

Pentaphylli Radix desiccatur vehementer, minimum verò acris est. Quare multo est vsui: velut alia quoque omnia, quæ cum sint tenuium partium, citra morsum deliccant. Est enim hæc radix desiccatoria ex tertio ordine, minimum habens euidentis caliditatis.

Peplos.

A. ibid. c. 103.

Peplos: quidam verò Mecona Aphrode. Et hic fruticulus Succum habet similem tithymallis, cum in alijs, tum quia purgat ceu illi.

Peplium.

A. ibid. c. 104.

Peplium. Et hic quoque fruticulus succum obtinet sicut tithymalli: nascitur quoque plerumque ad mare, Radicem habens inutilem, ut & peplos: Succum verò validum, nec ipsum admodum utilem: sed Semen utile est & flatuosum, similiter ut semen pepli purgans.

Pepere Piper.

A. ibid. c. 549. B

Piperis Radix vires costis similes potissimum obtinet. Porro Fructus nuper quidem admodum germinantis, longum piper est: quare etiam maturo humidius est. Humiditatis eius indicium est, quod facile repositum perforetur, ac non protinus mordicet, sed post paulo incipiat, verum plusculum duret. Porro Fructus qui velut omphax est, piper album est: nigro quidem acrius. Nam illud iam quasi superassatum est, & superexiccatum. Verum utrumque valenter tum excofacit, tum deliccatur.

Persea.

A. ibid. c. 112.

Persea Folia adstringentem vim modicè participant, adeo ut queant etiam non nunquam utiliter sanguinis eruptione affectis paribus imponi.

Periclymenos Volucrum Maius.

Periclymeni utilis est tum Fructus, tum Folia, adeo vehementer incidētis pariter & excofacientis facultatis, ut si plusculum bibantur, urinam sanguinolentam efficiant, principio quidem urinam duntaxat mouentia. Porro foris cum oleo illita excofaciunt. Iuuant & lienosos & difficulter spirantes. Competens potionis mensura est drachmæ unius cum vino. Porro deliccatur quoque Semen: & quidam aiunt, si copiosius bibatur, sterilitatem omnimodam bibētibus asserre. Sed & sunt qui certum dierum numerum ad talem potionem præfiniunt, ut & Dioscorides, qui septem & triginta tradit eos refert. Hic etiam urinam cruentam reddi à sexto die memorat.

Peristereon.

Peristereon. Appellata est inde adeo, quod in ea peristerea hoc est columba, versentur. Vim habet hactenus desiccantem, ut vulnera conglutinet.

Petasites.

Petasites ex tertio est ordine delicatium. Quamobrem ad cacoethe & phagedænica vlcera ea vtuntur.

Petroselinum.

A. ibid. c. 551.

Petroselini Semen maximè vsui est, cum tota etiam herba una cum radice similem sed imbecilliorē facultatem sortiatur. Est autem ut gustu acre cum amaritudine, sic & in operibus calidum, una cum incidendi effectus. Hinc menses & urinas assatim prouocat. Est & apysson, hoc est, flatus extinguit. Fuerit itaque & ipsum tertij ordinis tum excofacientium, tum desiccantium. Porro Cilices, id modò Petroselinon appellant, quod natum est in Amano: sed id Smyrnum potius fuerit, quam petroselinum: non tamen ita inultum à petroselini viribus abest.

Peucedanum.

A. l. 2. c. 86. D.
ol. 109. d

Peucedani Radice quidem maximè, sed tamen etiam Succo & Liquore vtimur. Sunt autem omnia hæc eiusdem specie facultatis: sed valentior succus, admodum excofaciens & digerens. Quare affectibus omnibus circa neruos consistētibus cōuenire creditur: tum morbis in pulmone thorace quoque ex crassitudine & viscolitate humorum prouenientibus. Atque intro quidē in corpus sumptus, sed tamen etiam olfactu prodest. Porro quod incidat & extenuet, sæpe etiam dentium perforatorum dolores cavitati impositus protinus sedauit: quia videlicet tenuium est partium, & excofaciorius. Quin etiam lienes induratos iuuat nempe incidendo, digerendo, atque extenuando crassos humores. Sed & Radice ad hæc uti liceat: quæ et squamas celerrimè ab ossibus separat, quia videlicet validdè desiccatur, minus tamen quæ succus excofaciens. Et vlceribus contumacibus remedium est optimum arida illita: ipsa enim expurgat, carnem inducit, & ad cicatricem perducit, Excofaciens quidem ordine secundo iam completo, desiccans verò tertio iam incipiente.

Pezanon Ruta.

A. ibid. c. 330.

Ruta Agrestis ex quarto est ordine excofacientium & siccantium: Domestica verò ex tertio. Est autem non solum gustu acris, sed & amaro. Ex quo sanè est digerere atque incidere crassos lentos quoque humores potest. Ob eam vim & urinas mouet. Quin & tenuium est partium, flatus quoque extinguit. Quare ad inflationes competit, ac veneris appetitum cohibet: digerit quoque, atque exccat sanè strenuè: est enim

*Al. rupōdes
i. igneus. & ita
Diosco. & Paulus.
Quin et Aetius ex Hippo.
dicit eē discul-
forum flatus.

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

eorum ex numero medicamentorum quæ valenter desiccant. Porro quod superius Moly & Be E
sasan nominari diximus, & ipsum utiq; fuerit Ruta sylvestris.

Pissa Pix.

Pix, Sicca quidem desiccet et exalfacit secundo à mediocribus siue symmetris excessu: ac plus
desiccare potest q̃ exalfacere. Humida verò ecōtra, plus videlicet calfacit q̃ desiccet: habet q̃ nō
nullam partium tenuitatē, qua & asthmaticos & purulentos adiuuat. Satis est autē cyathi linxisse
mensurā melli mistē. Sed & abstergendi quandā vim habēt, atq; cōcoquendi digerendi q̃: veluti
& in gustu subamarum quiddam & acre. Sic leprosos vngues eximūt mistē cum cera, lichenas q̃
detergunt. Concoquunt item duos & inconcoctos tumores oēs cataplasmatibus inditæ. Ad ea oīa
humida valētiōr est. Arida verò pix tametsi ad hæc quidem deterior est, glutinādis tñ vulneribus
magis cōgruit. Ex his itaq; clarum est humidæ pici calidam humiditatem affatim esse admistam.

A.I. 2. c. 2. c.
539.

Pisselæum.

Pisselæum ex humida pice efficitur, genere quidem illi simile, sed essentiæ tenuiorū partium.

Pistacium.

Pistacium, In Syria vbertim hæc planta nascitur. Fructus eius quodammodo tenuioris essen
tiæ est, subamarum quiddam & odoratum habēs. Obstructiones itaq; liberat, sed maxime iecoris, F
veruntamen etiam thoracis, pulmonis q̃.

A.I. c. 169.

Pityides.

Pityides. Nominatur ita fructus *πιτύων* idest picearū. At quidam per abusum similiter quoq;
pini fructum nūcupāt. Mistam vim obtinent, vtpote adstringentes, & acrimoniā quandam
cum amaritate possidentes: Quamobrem thoracis pulmonis q̃ expuitionibus conferunt.

* πεύκης.

Pitys Picea.

Picea, Cortex vincentem habet facultatem adstrictoriā vsque adeo, vt & intertrigines bellif
simè illitus sanet, & ventrem potus listat. Sed & ambusta cicatrice includit. Porro Teda Cortex
illi adsimilis est, sed viribus tamē moderatioribus. In Folijs arboris vtriusq; vt quæ multo sunt cor
tice humidiora, vis inest vlcera glutinatoria. In Cono, quanq̃ his similis sit, validior tamē facul
tas est tum in cortice, tum in folijs, adeo vt dictorum nihil probe efficere queat, verum molestat
quampiam habeat mordacitatē. Porro Fuligo quæ ex dictis colligitur, ad pilos superciliorum
accommoda est: itemq; ad angulos oculorum erosos, lippientes, ac lachrymantes.

A.I. bid. c. 280.

* πεύκης.

† πρὸς πύλα
βλέφαρα, i. ad
depilatas pal
pebras.

Pityusa.

Pityusa. Et hanc quidam speciem putant esse Tithymalli, q̃ succum habeat vt illæ, quod q̃ si G
militer illis purget, cætera q̃ omnia viribus illis sit adsimilis.

Platanus.

Platanus, humidioris frigidioris q̃ essentiæ est non ita multo q̃ symmetra. Proinde Folia viri
dia trita & il lita, non obscure phlegmonas nascentes adiuuant. Cortex autē & Pilulæ magis desic
cantem vim obtinent, vt ille quidem in aceto coctus ad dentium adhibeatur dolores: pilulæ vero
cum adipe ad vlcera ambusta. Sunt autem qui Cortice combusto medicamē desiccatorium & ab
sterforium efficiunt, vt cum aqua lepras sanet: per sese autem illitum, ob humorem nimium vlce
ra vetera & sordida. Vitandus est Pulvis folijs arboris insidens: alioqui si spiritu attrahatur, arte
riam offendit, valēter desiccans & exasperans: vocem q̃ lædit, sicut sanè etiam visum & auditum,
si in oculos aut aures inciderit.

A.I. 2. c. 2. c. 209.
fol. 123. a

Polygonon Seminalis.

Polygonon, vti adstrictionem quandam obtinet, ita sanè vincit in eo aqueum frigidum: vt vi
delicet secundi sit ordinis medicaminum refrigerantium, aut etiam quodammodo in initio tertij.

A.I. c. 725.

Proinde sanè, quibus stomachus æstu feruet, foris frigidum illitum potest, velut etiam erysipe
lata & calidas phlegmonas iuuat. Porro tale cum sit, & fluxiones repercutit, & hac ratione vide
tur esse exiccatorium. Quare cum herpetum, tum vlcera, tum aliorum, bonum est remediū,
tum etiam efficacissimum in inflammatis & fluxione tentatis partibus. Est & cruentorum vulne
rum glutinatorium. Sed & aurium vlcerebus prodest: ac, si vel plurimum insit puris, hoc tñ etiam
desiccet. Easde ob facultates sistit profluuium muliebre, ac dysenteriam, & sanguinis eiectiones,
& vndecunq; aliunde immoderatus quippiam feratur. Refert Dioscorides, q̃ & vrinam prouo
cet exhibitum stillicidio & stranguria affectis: non tamen exactè dispositionē discriminat, in qua
ipsum dari expediat. Porro mas ad omnia dicta q̃ femina validioris est effectus.

Polygon.

Polygonum modicè austera Folia obtinet. Videntur autem, si bibantur, lac generare. Itaq; supe
rauerit in eo calidum ac humidum.

Polygonatum.

Polygonatum mistam habet tum facultatem, tum qualitatem: habet enim adstrictionis pari
ter & acrimoniæ quippiam, nec non fastidiosam quandam amaritatē explicatu difficilem. Quo
circa nec admodum est vsui, sed tātum q̃ Radicem eius quidam vulneribus illinunt. Sunt etiam,
qui neuos in facie illo detergant.

Polemonium

A

Polemonium.

Polemonium, quidam, Philatærium: quidam, veluti Cappadoces, Chilic dynamon: tenuium partium est, & deliccandi vim obunet. Quamobrem quidam Radicem eius cum vino ad ischia-dicos, dysenteriam, lienem q̄ induratum, potui exhibent.

Polium.

A. ibi. c. 537.

Polium^r amarū est gustantibus, & modicè acre. Obstructione itaq̄ liberat viscera omnia: vrinam q̄ & menses ciet. Ac viride etiam nū magna vulnera glutinat, & maximè species eius fruticosa: aridum cum fuerit, rebellia vlcera sanat illitum: & magis hoc præstat, quod minus est.

Polium Minus.

Polium Minus. Quo etiam vrimur ad antidotos, nā & acius et amarius est hoc q̄ maius, adeo ut ex tertio sit ordine desiccantium, ex secundo autem completo excalfacientium.

Polynemon.

Polynemon desiccat & excalfacit secundo excessu. Itaq̄ & ipsum vulnera glutinat.

Potamogeton.

A. ibi. c. 531.

Potamogeton^r adstringit & refrigerat sicut Polygonum, sed essentia eius crassior q̄ polygoni est.

B

Polypodium.

A. ibi. c. 535.

Polypodium^r dulcem simul & austeram habet vincentem qualitatem: ut facultatis sit admodū quidem desiccantis, citra morsum tamen.

Praesium Marrubium.

A. ibi. c. 533.

Praesium^r sicut gustu amarum est, ita si quis vtatur, conuenientem huic saporis actionem possidet, iecur ac lienem obstructione liberans, & thoracem pulmonem que expurgans, ac menses promouens. Sed & illitum detergit ac digerit. Ponat q̄ ipsum quispiam in caliditate quidem secundi ordinis iam completi, in siccitate tertij medijs aut completi. Succo eius ad aciei oculorum claritatem vtuntur cum melle. Quin etiam & per nares auriginem purgāt: & ad aurium dolores inueteratos adhibent, vtiq̄ in quibus obstructionem discicere, meatum q̄ ipsum & ramos meningum seu membranarum expurgare, est vsus.

Propolis.

A. ibi. c. 462.

Propolis^r extergentis non ita valentis est facultatis, cæterum admodum valenter attrahentis: est. n. essentia tenuium partium. Porro excalfacit ordine secundo cōpleto, aut certè tertio incipiente.

Parmice.

C

Parmices Flores quidem ciende sternutationis vim obtinent: vnde & herbe nomen obuenerit. Totus autem Frutex si contundatur viridis, sugillata, & reliquas ecchymoseis digerit: est enim temperies eius calida & sicca, viridis etiamnum ordine secundo, siccata tertio.

Prelea Vlnus.

A. ibi. c. 71.

Vlmi^r Folijs quandoq̄ recens vulnus glutinauimus, confidentes adstringentem pariter & abstergentem inesse illis facultatem. Cortex amplius etiam subamarus est & adstrictorius. Itaq̄ cum aceto & lepram sanat. Porro viridis etiamnum ac recens, si vulneribus vinculi vice circūligetur, ea glutinare potest. Radices eandem vim obtinent: nam & decocto earum quidam perfundunt fracturas, quæ topho siue callo inducto opus habent.

Pteris Filix. Thelypteris Fœmina Filix.

A. ibi. c. 620.

Filix^r Radicem habet maximè vtilē: latum. n. lumbricū interficit, si quis eam quatuor drachmis in melicrato ebibat. Ad eundem modum partum viuū quidem necare, mortuum autē erigere, mirum nō est. Est enim amara, paulum habens adstrictionis. Quāobrem vlcibus imposita vim habet valenter desiccandi: non tñ mordax est. Similem ei vim habet Thelypteris nominata.

Pycnocomum.

D

Pycnocomi Radix, fructus, folia, omnia digerendi attrahendi q̄ habent facultatem, utpote quæ & gustu sunt acria. Folia itaq̄ phymata, & furunculos discutiunt. Fructus valentior est: & hæc quidē efficere potest mistus alicui digerentium cataplasmatum, cuiusmodi est quod ex hordeacea farina cōficitur. Palos, et alia id genus infixæ ad extimam cutem elicit. Porro Radix ad supradicta quidem deterior est & infirmior, cæterum bilem flauam purgat.

Pyrethron.

A. ibi. c. 47.

Pyrethri^r Radice potissimè vrimur, causticam vrentem ue facultatem obtinēte, qua vtiq̄ etiam dentium refrigerantium dolores mitigat. Et ad rigores ante periodum cum oleo cōfricatur. Ad hæc stupidos quoq̄, {quos *vapxwδ eis* vocant}, & resolutos adiuuat.

Pyros Triticum.

A. ibi. c. 245.

Triticum^r, ut alimentum quidem, quam habeat naturam, non est huius instituti exponere: Ut medicamentum verò foris impositum primi est ordinis excalfaciētium: non tñ nec reliscare, nec humectare manifestò potest: habet verò etiā quiddā lentoris, obstruentis q̄ nature. Porro quod ex eo conficit Amylum, eo tum frigidius est, tum siccius. Quod verò ex pane fit cataplasma, vim habet magis digerentem, q̄ quod ex tritico: nimirum cum & salem & fermentum panis adiuncta habeat: quippe cum fermentum vim habeat attrahendi digerendi q̄ ea, quæ in alto resident.

Quinta Classis.

HHHHH iij

Rhamnus.

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

RHAMNVS

E

Rhamnus desiccatur & digeritur excessu secundo: refrigeratur in primo completo, aut secundo incipiente. Proinde herpes sanat, & erysipelata non magnopere calida. Ceterum ad hanc tenentis utendum est folijs.

Raphanis Radicula.

Raphanis excalfacit quidem excessu tertio, desiccatur vero secundo. Agrestis autem in utroque efficacior est. Quin & Semen ipsum planta efficacius est. Facultas ei inest digerendi. Itaque ad sugillata, & alia id genus liuida ob talem facultatem accommodata existunt.

Rheum Rha.

Rheum, "quidam id Rha nuncupant, mistam habet tum temperaturam, tum facultatem: habet enim quiddam terrestre frigidum, cuius indicio est adstrictio: & adiuncta est quaedam caliditas, si quidem si plusculum mandatur, subacre conspicitur. Quin etiam aeræ cuiusdam substantiæ subtilis est particeps: quod indicat tum laxitas, tum leuitas: non minime vero & opera. Ob id enim licet adstringens, non tantum conuulsis, sed & ruptis, & orthopnoæ prodest. Sic quoque liuentia & lithenae sanat illitum cum aceto. Porro quod adstrictionis opera haud instrenua sunt, hinc discere liceat, quod sanguinem expuentibus, coeliacis, & dysentericis conferat. Nec enim reluctatur terrestri frigidum tenue aereum: immo eo quod deducat, & in altum perducatur, valentioris effectus causa existit.

A. l. 1. 2. 2. c. 578

Rhetina Resina.

Resinae "omnes desiccant & excalfaciunt. Ceterum inter se discrepant, quod plus ac minus habeant in gustu quidem acrimoniae, in facultate vero caliditatis: Tum quod alia plus, alia minus, fortiter sunt partium tenuitatis: Praeterea quod non nullae adstrictionis sunt participes, aliae nequaquam. Primas meruit omnium non iniuria Lentiscina: eam vocant Mastichen. Nam praeterquam quod paucula ei adest adstrictio, adeo ut stomachi ventrisque & iecoris imbecillitatibus & phlegmonis conueniat, insuper illi inest mordacitate vacans desiccatio. Minimum. n. acris est, & maxime tenuium partium. Inter alias praefertur Terebinthina, manifestam quidem non similiter atque mastiche adstrictionem possidens, ceterum adiunctam habens amaritudinem quandam, per quam magis etiam quam mastiche digerit. Ob eandem qualitatem inest & absterlio, tanta quidem, ut & psoras sanat. Quin etiam quae in profundo resident, ceteris resinis magis attrahit, nimirum cum illis maiorem habeat partium tenuitatem. Attamen Pineae, & hac etiam magis Strobilinae, aciores quidem ea sunt, sed non magis tamen digerunt neque attrahunt. Mediae inter has sunt Picea & Abietina aciores quidem quam terebinthina, minus tamen quam aut pinea, aut strobilina. Habet porro etiam emolliens quiddam Terebinthina. Secundum locum habet in emolliendo Lentiscina: sicut & Cyparissina acris.

A. ibi. c. 242.

Rhodos Rosa.

Rosarum "facultas superioribus libris pluribus verbis exposita est, nempe quod ex aqua substantia calida mista duabus alijs qualitibus, adstringenti videlicet et amara, composita sit. Quin etiam, cuius sit naturae utraque, amara scilicet & adstringens, in horum commentariorum quarto declarauimus. Flos earum magis etiam ipsis rosas adstringit: ac proinde sane etiam exiccatorius est.

A. ibi. c. 568.

Rhodia Rhiza Rhadix Rhodia.

Rhodia Radix, ea videlicet quae in Macedonia nascitur, tenuium partium, & digerentis est facultatis. In calefaciendo vero secundi ordinis censenda est, aut certe tertij incipientis.

Rhododaphne.

Rhododaphne "rota sua essentia venenum est, nec tantum homini, sed plerisque pecoribus. At temperie sane tertij est ordinis excalfacientium, incipientis utique, primi autem desiccantium.

A. ibi. c. 522.

Rhoea Malum Granatum siue Punicum.

Malum Granatum omne adstringentem qualitatem obtinet, non tamen in omnibus ea exuperat. Sunt enim inter ea quaedam acida, quaedam plus dulcia quam austera. Et sane quae ab unoquoque eorum proderit utilitas, secundum vincendum eueniat qualitatem necesse est. Dictum autem in quarto horum commentariorum est super dulci sapore, austero, et acido. Itaque ex illis de malorum puniceorum differentia liceat colligere. Porro Acini succo ipsorum tum adstringentiores, tum exiccantiores sunt: his est magis Putamina, vocantur autem Sidia, Adsimile illis vim habent Cytini, sic enim eorum appellantur flores.

Rhus.

Rhus "fruticosa planta adstringit, & desiccatur. Nam & coriarij ad desiccandum & adstringendum coria planta utuntur: ac proinde Buprostaphis { Graece, Latine excoriaria } appellata est. Porro medicis in usu sunt in primis Fructus eius & Succus multum austere qualitatis. Consentaneus est usus particularis ipsi gustus sensui. Fuerit itaque & hoc medicamen ex tertio ordine exiccantium, ex secundo vero refrigerantium.

A. ibi. c. 671.

Rhypos Sordes.

Sordes à gymnasiarum statuis, in quibus largum oleum inhæret, digerendi emolliendi que vim obtinet: In palæstris autem, quantum accepit pulueris, tamen etiam diuersa est: hanc sordem Πάρον Graeci vocant. Prior cruda phymata digerit. Secunda optimum est phlegmones mamillarum remedium. Si quidem feruorem earum veluti ignem extinguit: & quod affluit, repellit: denique & quod continetur

A cōtinetur, halitū digerit: constat enim ex puluere, oleo, sorde humana, & sudore. Ac pulvis qdem emplasticā vim habet, & refrigeratoriā, percussoriā q; oleū verò emollit: porro sudor & sordes digerētia sunt. Ceterū quæ à stautis corraditur cum puluerē non habeat, & ab ære æruginē quandam sumpserit, non iniuria acrior est. Porro huius mentionem modo fecimus, quod plurimū in se ipso sit oleosæ substantiæ, quæ ex planta originem fortitur. Sed & vbi de ijs, quæ ab animalibus proueniunt, verba faciemus, eius tum quoq; meminisse erit propter sudorem.

SAGAPENVM

A. lib. c. 619.

Sagapenum "liquor est calidus & tenuiū partiū, sicut & alij liquores Sed. & absterfionē quādam possidet, qua oculorū cicatrices expurgat atq; extenuat. Quin & suffusionibus & hebetudinibus oculorū, quæ ob humorū proueniūt crassitiē, non malū est medicamentū. At ipsa Plāta ex qua prouenit, ferulæ affimilis, imbecilla & inutilis est. Sanè ipsa primū sagapenū appellat: at liquor eius abusiue hoc nomen obtinet: ceu alia quoque multa ex nominis defectu per abusum nuncupamus. Perfectius nanq; foret ipsum cognominare non sagapenum, sed sagapeni succum.

Sampsycon Maurana.

A. lib. c. 466.

Sampsycon "tenuiū partiū, & digerentis est facultatis: desiccatur enim & excalfacit ordine tertio.

B

Sapores Xylon Caries Lignorum.

A. lib. c. 617.

Caries "Lignorum, & maxime quæ participat adstrictiōis simul & absterfionis, velut vlmus, expurgat implet que vlcera humida.

Sarcocolla.

A. lib. c. 592.

Sarcocolla "lachryma est arboris persicæ. Mistam vim habet ex emplastica quadam substantia, & paucula amara. Itaq; citra morsum desiccatur, ac proinde glutinare vulnera valet.

Satyrium.

A. lib. c. 706.

Satyrium, "aut Triphyllum, humidum & calidum temperatura est: quamobrem gustu quoq; apparet dulce. Attamen recrementitiā & flatuosam humiditatem possidet. Quocirca ad venerem incitat. Hæc verò & herbæ ipsius Radix præstare potest. Porro vt quidam aiunt, ex vino nigro austero potum sanat opisthotonon.

Selinon Apium.

A. lib. c. 55.

Selinum "vsque adeo calidum est, vt & vrinas & menses cieat. Flatus quoq; discutit, & magis semen q̄ herba ipsa. Sed & Oreoselini & Hipposelini similis vis est: verum hipposelinon imbecillius est, oreoselinon valentius.

C

Seris Cichorium.

A. lib. c. 119.

Seris "olus est subamarum, & magis quod agreste est, quod ob id ipsum Picrida hoc est amarā, quidam nuncupant: quidam verò Cichorium appellant. Est autem ea sicca frigida q; temperatura, vtrunq; primo excessu. Porro domestica magis etiam q; agrestis refrigerat: sed & humiditatis multræ admistio siccitatem extinguit. Verum vtraq; adstringētis qualitatis est particeps, velut & Chondrila: nam & ipsa est sereos species.

Seriphum.

Seriphū. Dictū sanè de hoc est & in sexto libro in sermōe de absynthio: est enim absynthio tū specie, tum gustu simile. Attamen discrepat, Gustu quidem, quādoquidem non æquē vt illud adstringat, plus q; excalfaciat, amaritatem q; quandā cū falsedine resipiat: Facultate verò tum q̄ stomacho infestū sit, magis q; absynthio lumbricos necet, siue foris impositum, siue intro in corpus assumptum. Et sanè calfacere ipsum in secundo ordine intenso censendum est, exiccare in tertio.

Sefeli.

A. lib. c. 616.

Sefeli. "Et Radix quidem, sed & Fructus vsque adeo excalfacit, vt admodum vrinam mouere queat. Sed & tenuium est partium, vt & comitali morbo & orthopnœis competat.

D

Sesamon.

A. lib. c. 641.

Sesamon "nō parum in se cōtinet viscosum & pingue: quare emplasticū est & emolliēs, ac mo dice calidum. Eiusdē facultatis est, qd ex eo conficitur Oleū. Et herbæ quoq; Decoctū similem vim obtinet.

Sesamoides Magnum.

Sesamoides Magnum, quod & Anticyricos Helleboros appellatū est, ppter ea videlicet quia Semen eius vt helleborus purgat, hoc & reliqua facultate helleboro simile est. Nam et in abstergendo, excalfaciendo, desiccando que, similem illi vim obtinet.

Sesamoides Album.

Sesamoidis Albi Semen non nullam item acrem qualitatem cōtinet: sed multum amarum est. Excalfacit itaq; rumpit, & extergit.

Sideritis.

Sideritis habet quidem etiam abstergendi quandam facultatem, sed plurima eius pars humida est, & mediocriter frigida: paucula verò inest adstrictio. Quare phlegmonen sedat, & glutinat. Quidam etiam vocant Achilleam Sideritim, quæ propositæ quidem, q̄ ad iam dicta attinet, viri bs est non dissimilibus, cate rum adstrictiōe exuperat. Quare ad sanguinis eruptiones, dysentias, & muliebre profluuium congruit.

Quinta Classis.

HHHHH iij

Sicyos

* ὁ πὸς modo liquor, modo succus, ab hoc interprete vertitur, sicut & χυλός: cū tñ clarū sit ὁ πὸν & χυλὸν inter se differre, tū ex pleriq; Galeni locis, tū præsertim ex capite de Peucedano, & ex capite de Ricu.

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

Sicyos Edodimos Cucumis Esculentus.

Cucumis "Esculentus, pepō quidem hoc est maturus, tenuioris essentię est: qui immaturus est, crassioris. Sed & abstergerendi & incidendi facultas eis inest: Quare & vrinam mouent: & corpus splendidum reddunt, ac magis quoq; si quis semine arefacto contuso q; atq; cribrato vice pulueris absterforij siue *ρύμματος* vtatur. Superat in eis humida frigida q; temperies, non tñ magnopere, sed quasi in secūdo cēsetur ordine. Attamen si quis aut Semen, aut radicē arefaciat, haud etiam humide fuerit naturæ, sed iam desiccātis, id q; in primo quodammodo ordine, aut etiam secundo, sed incipiente. Est & in istis maior abstergerendi facultas, q; in fructus ipsius carne.

E

A.l.2.t.2.c.29.
fol.109.f

Sicyos Agrios Cucumis Agrestis.

Cucumeris "Agrestis tum fructus ipsius Succus, quem vocant Elaterium, tum non minimè radicis & foliorum ad medicationes perutilis est. Elaterium itaq; menses ciet: & fœtum interimit appositum, ceu alia omnia amara & subtilium partium, maximè si quam habeant caliditatem, velut nimirum elaterium: summè siquidē amarum est, leuiter calidum: vt ex secūdo sit ordine excalfacientium: Porro tale protinus quoq; digerendi vim possidet. Sic igitur eo angina laborantes inūgunt quidā cum melle aut oleo vetere. Bonum item est regio morbo affectis fusum cum lacie in nares. Sed & dolores capitis sanat hoc vsu. Atq; elaterium quidē eiusmodi est: At Radicis Succus, vt & foliorum, licet elaterio similem vim habeat, imbecilliores tñ. Sed & ipsa Radix ad similem facultatem possidet: abstergit namq; digerit, atq; emollit. Porro Cortex ea potētius desiccatur.

A.ibi.c.176.
fol.120.c

Silphium Laserpicium.

Silphij "liquor calidissimus est: verum enī uero & Folia, & caulis, & radix sat strenuè excalfaciunt. Sed oīa flatulentæ magis essentiæ sunt, ac proinde coctui difficilia: foris tñ imposita corpori, efficaciora: & oīum potissimum liquor, admodum trahentem facultatem possidens. Attamen & excrescentias amoliendi, & liquandi vim quandam, propter propositam temperiem obtinet.

A.l.2.t.2.c.51.
fol.103.g

* AP. Sinon.

Sison.

Sison calidus & subamarus gustu est: Quare & vrinam mouet, & concoquit, menses q; prouocat, omnes q; viscerum obstructions diluic.

Sion.

Sion, "quantum gustu quoquomodo odoratum est, tantum etiā excalfacientis facultatis est particeps. Sed & digerit, & vrinam mouet, & calculos renum frangit, & menses euocat.

A. ibid. c. 556.

Sisaron.

Sisari "Radix cocta stomacho grata est, & vrinam mouet, secundo ordine excalfaciēs, adiectam G habens amaritatem quandam cum leuicula adstrictione.

A. ibid. c. 632.

Sisymbrium.

Sisymbrium "tenuium partium, digerentis, excalfacientis, & resiccantis facultatis est, & temperaturę in tertio ordine. Sed & Semē eius tenuium partium est, & calidum: Quocirca ipsum quidam cum vino exhibent singultientibus, & tormina patientibus.

A. ibid. c. 507.

Sisymbrium dictum Cardamine.

Sisymbrium, quod quidam Cardaminen vocant, qñ quidem Cardamomo simile quiddā gustu præfert: cū Siccū est, tertij est ordinis excalfacientiu & desiccantiu: cū Humidū & viride, secundū.

Scandix.

Scandix ex agrestium olerum genere est, subacre & amarum, adeo vt in siccando et excalfacendo sit secundi ordinis intensi {aut tertij incipientis.} Vrinam valenter ciet, & viscera obliuione liberat, ex dictis qualitatibus constans.

Scilla.

Scilla "admodum incidentem facultatem obtinet, nō tamen admodum calidam. Sed secūdum hoc eam quispiam secundi ordinis censeat excalfacientium. Præstat autem aut assam, aut elixam H sumere: sic enim virium eius vehementia exoluitur.

A. ibid. c. 597.

Scolymos.

Scolymi Radix copiosam vrinā graueolētem elicit, si quis eā in vino coctam bibat: Ac proinde graueolentiam sanat tum alarum, tum totius corporis. Atq; hoc sanè, medicamento ex tota inest essentia, nimirum cū succus sit purgatorius. At quæ secūdū qualitates editur actio, calidum in secundo ordine completo, aut tertio incipiente, medicamen indicat, siccum verò in secundo.

Scordium.

Scordium. " Ex varijs id tum saporibus tum facultatibus constat: nā & amarum quid obtinet, & acerbum, & acre: & maximè scorodo hoc est allio, ad similes eius est acrimonia: vnde sanè, mea sententia, nomenclaturam sortitum est. Expurgat igitur simul q; excalfacit viscera: tum menses vrinam q; prouocat. Præterea conuulsa rupta q;, & laterum dolores ab obstructione & frigore natos sanat epotum. Deniq; viride quidem illitum magna vulnera conglutinat: sed sordida perpurgat, & contumacia ad cicatricem perducit, illitum aridum.

A. ibid. c. 622.

Scorodon Allium.

Allium "desiccatur & excalfacit quarto excessu. Porro Ophioscorodon agreste allium est, domesticum

A.l.2.t.2.c.71.
fo.106.h

A stico valentius, ceu reliqua agrestia omnia.

Scorodoprasson.

Scorodoprasson sicut gustu & odore mediam scorodi hoc est allij, & prassi id est porri, qualita-
tem possidet, ita & viribus.

Scorpioides.

Scorpioides excalfacit ordine tertio, desiccatur secundo.

Smilax.

A. ibid. c. 143. Smilax aut Cactus arbor est venenosa facultatis.

Smyrna Myrrha.

A. ibid. c. 468.

Myrrha secundi ordinis est tum excalfacientium, tum desiccantium. Itaque capitum vulneribus
illita glutinare ea potest. Inest & amaritas non pauca, per quam foetum & lumbricos tum enecat,
tum ejicit. Adest hinc ei & abstergendi potentia. Sic igitur ocularibus miscetur facultatibus, utique
quae ad vlcerum & crassas cicatrices praeparantur. Eadem de causa inditur & medicamentis, quae ad
tussim veterem & asthma siue anhelationem, exhibentur. Non tamen arteriam exasperat sicut ab-
stergentium non nulla: verum adeo moderatam obtinet absterfionem, ut non nulli eam arteria-
B cis, quae vocantur, medicamentis commisceant, tanquam sufficienter excalfaciens & desiccans medi-
camentum: scilicet absterfionem proficiscentem ab amaritudine nihil verentes.

Smyrna Boice Myrrha Boeotia.

*ALSCIENTIA

Smyrna Boice vim habet excalfaciendi, fundendi, emolliendi.

Smyrnium.

A. ibid. c. 55.

Smyrniū quidē Hippofelinū agreste cognomināt. Ex eodē genere & ipsum cū apio est, & pe-
trofelino. Fuerit quae apio quidē validius, imbecillius petroselino. Menses itaque & vrinas mouet. ca-
lidū siccū quae tertio ordine. Cilices Petroselinū nomināt, quod in Amano nascitur. Est sane & ipsum
smyrniū, verū minus acre petroselino, smyrnio quae. Proinde sanē vlceribus imponi potest, quia videli-
cet sine molestia desiccet. Sed & digerere quae indurata sunt potest. Reliqua vis eius apio & petroseli-
no similis est. Quocirca & Semine eius vtimur ad menses, vrinas, & asthma siue anhelationes.

Sonchus.

Sonchus ubi adoleuerit, ex spinosis plantis est. Ceterum viridis etiam nū & tener estur perinde
ut cetera agrestia olera. Temperamentum eius quodammodo mistū est: constat enim ex aquea terrea quae
essentia, utraque leuiter frigida. Nam & adstrictionis cuiusdam est particeps: & siue cataplasmatibus
C in morem illinatur, siue edatur, manifesto refrigerat. Postea vero quae planē resiccatus fuerit, terrestre
eius temperamentum redditur, modicam habens caliditatem.

Sparganium.

Sparganium & ipsum desiccantis est facultatis.

Spartum Genista.

Sparti, quo & vites alligant, tum Fructus, tum virgarum Succus, non instrenue trahentis est facultatis.

Staphilinus Pastinaca.

A. ibid. c. 187.

Staphilinus satius imbecillior, agrestis ad omnia potentior est. Vrinas menses quae prouocat
cū Herba quidem tota, tum maxime semen ac radix. Habet porro et absterforium in se quippiā.
Quāobrem vlcerum phagedaenica quidā Folij eius viridibus cum melle, quo pura reddant, illinunt.

Stachys.

Stachys, frutex ille Marrubio similis, gustu acri & amaro, tertij est ordinis excalfacientium. Quā-
obrem rationabiliter non menses solum prouocat: sed & abortum affert, & secundas ejcit.

Stoebe.

Stoebes Fructus & Folia maximo sunt vsui, adstringendi vim habentia mordacitatis expertē.
D Sed & desiccant euidenter in tertio ferē ordine incipiente: Quāobrem Decoctum eorum dysentericis
injicitur, & auribus pure fluentibus: tum vulnera magna cōglutinat. Euidētius haec praestat cū vino
atro austero: valenter. n. desiccatur oēs praeter naturā humiditates. Preterea Folia viridia si illinant,
vim habent erumpentis sanguinis supprimēdi. Denique & oculorum ex icu suffusiones illita iuuat.

Stoechas.

A. ibid. c. 94.

Stoechadis gustu quidē qualitas amara est, & mediocriter subadstringēs: ceterum temperies cō-
posita, nempe ex terrena essentia frigida exigua, unde sane adstringit: & extenuata altera terrena
copiosiore, a qua utique amara est. Ob utrorumque vero conuenientiam & coitum, obstructione libera-
re, extenuare, extergere, roborare quae tum viscera omnia, tum totum corpus, est nata. Supra nanque
ostensum est, quod quae ex eiusmodi essentis constant medicamina, dictos effectus reddere possint.

Stratiotes.

Stratiotes Aquaticus quidem, humida & frigida facultate est: Terrestris verò non nihil habet
adstrictionis: Proinde sanē & vulnera glutinare potest, & vlceribus esse vtilis. Sunt qui eo & ad
sanguinis eruptiones vtantur, & ad fistulas.

Struthion.

A. ibid. c. 133.
fol. 114h

Struthij Radice potissimum vtimur, utpote gustu acri, & calida sicca quae temperamento, ex quatuor

to

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

to quodammodo ordine. Sed & abstergit & iritat: Proinde quoque sternutationē prouocat, ceu Ecetera omnia quę calida sunt temperie, & gustu acria.

Stryax.

Stryax^o exalfacit, emollit, concoquit. Quamobrem tussibus, catarrhis, pituita destillationibus raucedinibus quibusque quas κορίζας & βράγχους vocant, prodest. Tum menles seu potum seu admotum prolicit. Combusti eius Fuligo, thuris fuligini quodammodo est similis.

A. ibi. c. 423.

Syca Ficus.

Ficus^o Arida vim habent exalfaciendi ordine primo est completo, aut secundo incipiente. Habent verò & partium tenuitatem quandam. Ex istis duobus idoneę sunt, quę tubercula dura concoquant: statim verò est ea digerunt. Atque ipsa per se illita eiusmodi vim obtinet. Sed & Decoctum earum eiusdem vtiq; naturę est. Verum ubi magis concoquere consilium est, miscenda est farina triticea: ubi verò plus digerere, hordeacea: panis horum in medio. Sed hæc magis sunt propria tractatus de medicamentorum compositione, & rationis curandi: verum in presentia hæc de ischadibus i. caricis, nouisse sufficiat. Porro scire oportet, quod quę pinguiore sunt, magis possunt concoquere: quę verò gustu acriore, magis tum extergere, tum digerere. Ceterum Quod ex ijs plurimum in aqua coctis efficitur, simile est melli non solum consistencia, sed & facultate. Porro Ficus Virides F comesa propter admistam humiditatem, facultatis sunt imbecillioris: subducunt tamen aliu vtraque tum humida, tum sicca. Porro Ficus Caprifici acris & digerentis facultatis sunt. Sic est domesticarum Grossi, quę gręci vocant ολύντους: inest enim illis non nihil etiam succi ex ficu arbore.

A. l. l. c. 276
fol. 129. h

Syce Ficus Arbor.

Ficus^o Arbor calida tenuium quibusque partium temperaturę est, ceu indicant tum liquor eius, tum foliorum succus. Valenter enim eorum vterque calidus est. Itaque non mordicat tantum, aut vehementer abstergit, sed & vlcerat: & ora vasorum referat: & verrucas, quas myrmecias vocant, eiicit: sed & purgare potest. Porro Ficus Agrestis, quam Erineum quę gręce, latine caprificum, nominant, tum Opos, tum succus, ad omnia quę fatiua valentior est. Sed & Crada i. rami earum adeo sunt calidi, tenuium quibusque partium, ut carnes bubulas duras, si coquendis adiiciantur, friabiles ac teneras efficiant.

A. ibidem.

Symphytum Petreum.

Symphyton Petreum ex contrariis constat viribus. Habet enim secandi vim quampiam, qua collectum in thorace pulmone quibusque pus expurgare potest: habet quibusque etiam quandam contrahendi vim, qua eiectionibus sanguinis auxiliatur: & tertia ad eas inest humiditas quaedam non immodice calida, per quam gustantibus dulce apparet, & odoratu iucundum. Mansum sitim extinguit, & arterię asperitates sanat. Porro secundum omnium dictarum virium missionem simul digerere abunde potest, simul quibusque corpora contrahere constringereque: proinde enterocœlii imponitur: & ad conuulsa & rupta cum oxymelite bibitur. Porro qui ipsum in vino Decoctum ad dysenteriam exhibent & muliebri profluuium rubrum, vtuntur tanquam desiccante & contrahente: Qui verò ad nephritim, tanquam expurgante & incidente.

A. ibi. c. 534.

Symphytum Magnum.

Symphyton Alterum, puta magnum, similem dicto vim habet: non tamen gustantibus dulce est, aut odorantibus odoratum, sed his sanè à modo scripto diuersum est. Ceterum, quatenus viscositatem quandam & mordacitatem obtinet, Scilla simile est. Vtitor quibusque ad omnia, ad quę iam dicto.

Sphondylion.

Sphondyli^o Fructus acris & secatis est facultatis. Itaque ad asthma, & comitalem morbum, aptum est medicamen. Prodest & aurigini. Et Radix, nimirum ad similes facultatis, ad eadem accommodat. Sed & insuper fistularum callos tollit: ceterum imponere eam oportet circumrasam. Porro floribus etiam Succus ad diuturniora aurium vlcera conueniens reponitur.

A. ibi. c. 643.

Schinos Lentiscus.

Schinos^o Frutex hic ex aquea essentia leuiter calida viribus, & terrena frigida non multa, compositus est, ob quam moderate adstringit. Desiccatur igitur secundo ordine completo, aut tertio incipiente: Hinc in caliditatis & frigiditatis differētia quodammodo est medijs & symmetrus. Simile omnibus suis partibus adstrictionem obtinet in radicibus, ramis, extremis turionibus, germinibus, ac folijs: præterea fructu, & cortice: ac si Succum ex folijs eius viridibus exprimas, similis hic ordinis est, moderate adstringens. Itaque bibitur & per se, & cum alijs medicamentis, quę dysenterias & alij affectus sanant. Quin & ad sanguinis expuitiones, sanguinis quibusque ex vtero eruptiones, tum sedis vulua quibusque procidentias, idoneus est, ut potest ad hypocystida non nihil propè accedens.

A. ibi. c. 443. 8

Schinu Anthos Schini Flos.

Schinu Anthos modice calfacit, modice quibusque etiam adstringit, nec planè à tenuitatis natura alienus est. Quocirca his de causis vrinam mouet, menles quibusque ciet adhibitum siue in fomentationem, siue in potionem. Prodest & iecoris, & stomachi, ac ventris phlegmonis. Magis eo adstringit Radix. Quod verò Florem vocant, calidius est. Porro in omnibus suis partibus, in alijs magis, in alijs minus, gustantibus apparet adstrictio: Proinde medicinis quę hæmoptoicis siue sanguinem reicientibus, exhibentur, commiscetur.

Schoenos.

*Al. Cœliacos

A *Schoenos Leia luncus Leuis, Oxyſchoenos, Hoſoſchoenos.*

Schoenos Leia, quędam Oxyſchoenos, alia Oligoſchoenos nuncupať. Gracilior durior q̄ oxyſchoenos, craſſior laxior q̄ oligoſchoenos. Fructus oligoſchoeni ſomnum affert. At oxyſchoeni duę ſunt ſpecies: Altera ſterilis, cuius quidem in medicina nullus uſus eſt: Altera verò fructum fert: conciliat verò & huius fructus ſomnum, ſed minus q̄ oligoſchoeni, q̄q̄ tamen hoc caput tenet. Vterq̄, ſi fructus cum vino bibatur, ventris fluxus delictat, & muliebre profluuium rubrum ſiſtit. Ex quibus clarum eſt, q̄ compoſita eorum temperies eſt, ex terrena videlicet eſſentia leuiter frigida, & aquea leuiter calida: vt & inferna deliccare poſſint, & ſenſim frigidos ad caput vapores ſubmittere, quibus ſomnolentos efficiant.

*Al. hoſoſchoenos.

TERMINTHOS TEREBINTHVS

A. lib. c. 303.

Terebinthi^m tum Cortex, tum folia, tum fructus, adſtriſtorium quiddam obtinēt. Sed & ſecundo ordine excaſciunt. Itaq̄ q̄ etiam deſiccant manifeſtum eſt, recentes quidem etiamnum humidi q̄ modicè: ſicci verò ordine ſecundo. Ceterum Fructus aridus propinquus eſt etiā tertio ordini deſiccantium: eſt enim adeo calidus, vt mandentibus protinus eius caliditas percipiatur. Itaq̄ etiam vrinam prouocat, & lienibus prodeſt.

Teutlon Beta.

A. lib. c. 636.

Beta^m nitroſa cuiuſdam facultatis particeps eſt, qua tum digerit, tum extergit, & per nares purgat. Ceterum cocta nitroſitatem oēm ac acrimoniam exuit, ſit q̄ facultatis aphlegmantę hoc eſt phlegmonis aduerſa, leuiter digerentiſ. Porro ad detergendum digerendum q̄ validior eſt beta Alba: nam Nigra adiunctum habet adſtriſtionis quippiam, & magis in radice q̄ alijs partibus.

Teucrium.

Teucrium incidendi & tenuium partiũ facultatis eſt: Quare lienes ſanat. Ponat q̄ ipſum quiſpiam in tertio exiccantium, ſecundo verò caſſacientium ordine.

Tephra Cinis.

A. l. 1. c. 188
fol. 121. c

Cinīs.^m Combustorum plignorũ reliquię ſic nuncupantur, cõpoſitę ex contrarijs tũ quali-
tatibus, tum ſubſtantijs. Habet enim in ſe partim terrenum, partim velut æthalodes iſeſt fauilloſum, ſiue lygniodes iſeſt fuliginofum, ſiue quomodocunque quis appellare volet. Atq̄ hæ ſanè partes ſunt tenuiũ partiũ, & quę maceratis aqua cineribus & percolata vnà aſportatur atq̄ abeũt: quod verò reliquum eſt, terreum eſt & infirmum & morſu vacās in lixiuiũ calida facultate depoſita. Sed nō omnis Cinis eadem temperatura præditus eſt, ſed pro combuſtę materię diuerſitate variatur. At neſcio, quo pacto Dioſcorides oēs cineres adſtringendũ habere vim prodiderit, cũ Ficulneus eiufmodi omnis qualitatis ſit expers, vtpotè cũ et ipſa arbor nulla ſua parte acerbã qualitatem præferat, ceu quercus, ilex, arbutus, fagus, lentifcus, hederæ, & hoc genus alia, verũ plena ſucco valido tota ſit, ea q̄ acri & calido. Ergo ex Acerbis vtiq̄ lignis factus Cinis non parum adſtringit: memini q̄ me q̄q̄, cũ aliud ad manum non eſſet medicamen, p hunc ſanguinis ſuppreſſiſſe eruptionem. Verũ nullus vnquam ad tale vti ficulneo audeat: ſiquidẽ hic acrimonię multũ adurentis q̄ facultatis obtinet, miſtę abſterſioni: Et vtroq̄ differt ab eo, qui ex Quercinis lignis cõficitur, tum q̄ in eo fuligineũ multo eſt acrius, tum q̄ in illis terrenũ quodãmodo ſubadſtringens eſt, in hac abſtergens, veluti in cinere tithymallorũ. Eſt & Calx cineris quędam ſpecies, ceterum eſſentię, tenuiorũ partiũ, q̄ qui ex lignis ſit: nimirũ quanto lapides exactius torrerĩ, vt cinis fiant, poſtulant. Sed tñ multum & ipſa reliquũ in ſe habet velut nature igneę, quod vocat̃ ἐμπύρευμα. Proinde Elota medicamen eſt citra morſum deſiccans, magis q̄ ſi bis ter ve lauetur. Ceterum ſi marina aqua abluta ſit, admodum digerit. Diceretur porro de ea, vbi de metallicis ſermo habebit.

†In qu. ſ. r̄
riquo cod. .
vox nō repe-
tur.

Telephium.

Telephium exiccandi & detergendi facultate eſt, non tñ inſigniter calida: verũ in hoc forſan D quĩpiam ipſum primi eſſe ordinis cenſeat. Deſiccet tñ ſecundo ordine int̃ſo, aut certè principio tertij. Proinde ad putrida vlcera conuenit, & vitiliginem vtranq̄ ſanat cum aceto.

Telis Fœnumgræcum.

A. lib. c. 146.

Fœnumgræcum^m calidum eſt ſecundi ordinis, ſiccum primi. Proinde ſeruantes phlegmonas iritat acerbat q̄: quę verò minus ſunt calidę, & magis durę, eas digerendo curat.

Tithymalli.

A. lib. c. 411.

Tithymalli oēs vincentem habent acrem calidã q̄ facultatem: ineſt verò ipſis & amaritas. Validiſſimus itaq̄ eorũ eſt Liquor: ſecundum locũ tenent Fructus & Folia. Sed & Radix dictarũ facultatũ particeps eſt, ſed non ex æquo. Sanè ipſa cũ aceto decocta dolores ſanat dētium, maxime q̄ illis erofis, pueniunt: At liquores, vt qui valentiorẽ vim habeāt, in foramina quidẽ ipſa dentiũ induntur: ceterũ ſi aliam corpõris partem contigerint, cõtinuò adurunt, vlcerāt q̄: proinde foris illis cera circũlinitur: quippe cũ ex quarto ſint excaſſacientium ordine, quẽ eſſe adurētium poſuimus. Sic pilos quoq̄ Succus inunctus tollit: porro cũ vehemētior ſit, oleo miſceť: & ſi id idētĩdẽ ac ſæpe fiat, tandem prorſum pilorum radices aduſtę corrupent, corpus q̄ depile reddeť. Eadẽ facultate verrucas, quas acrochordonas nominant, & myrmecias, & pterygia ſiue oculorum vngues, & thymos auferũt: detergēt q̄ lichenas & pſoras, quia ſ. & abſtergēdi facultas ineſt propter amaritudinem.

*Al. ſoris.

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

amaritudinem. Præterea vlcera phagedænica, anthracode, & gangrænode, quia valenter tum E
excalfaciunt, tum detergunt, si in tpe & moderatè vtare, iuuare aliqui poterunt. Verum enimvero
& fistularum callos eadè facultate eximunt. Ceterum hæc omnia genere quidè similiter, imbecillius
tñ & folia & fructus præstare possunt. Quibus sanè & ad pisces in aqua stagnali capiendos vti asso
lent. Celerrimè nanq; ab illis in vertiginem acti, ac semimortui redditi, ad aquæ superficiem ferun
tur. Porro cū Septem sint eorū genera, valentissimus est què Characian nominant, què vtiq; et
quidā marem cognominant: & Fœmina nuncupata Myrsinities: & Qui in petris nascitur ad mo
dū arboris: deinceps Qui phlomo adsimilis est: & Cyparissias: deinde Paralys siue marinus: de
niq; Helioscopius. Proportione verò cōprehēse illorū facultatis & Cinis & Lixiuū ex ipsis erit.

Tragacantha.

Tragacantha similè Gūmi vim obtinet emplasticā qdā, & quæ acrimoniam hebetat. Et sanè si
militer vt illud desiccatur. *Tragion.*

A. ibi. c. 120.

Tragii Folia, fructus, lachryma q; trahētis digerētis q; sunt facultatis. Est verò & tenuiū partiū,
& facultate in principio tertij iā quoquo mō ordinis calida. Stipites & herētia corporibus extra
hit, lapides frangit, mēses mouet drachmę pōdere potū. Porro in Creta sola nascitur, Lētisco ad
simile. Ceterum Alterū tragiū hoc minus, cuius folia Scolopendrio similia sunt, visitur quidè mul
tis in locis: sed non parum habet facultatis adstringentis, vt & ad fluxionum affectus conueniat.

Tragoriganum.

De Tragorigano in sermone de Origano suprà est dictum.

Tribolos.

Tribolosⁿ ex humida essentia modicè frigida, & sicca nō mediocriter, & ipsa frigida, componi
tur. In terrestri tñ superat terreum frigidū, quod adstringens ostēdimus: in aquatico verò aqueū.

A. ibi. c. 329.

Proinde ambo, & cōtra phlegmonarū generationes, & omnino contra oēs influxus, congruūt.
Porro terrestris ipsius Fructus, cum tenuium sit partium, potus lapides in renibus comminuit.

Tripolum.

Tripolij Radix gustanti acris est, & facultate calida in tertio excessu.

Triphyllum.

Triphyllum, quidam Asphaltion, quidā Oxyphyllon, nō nulli Minyanthes, sunt & q Cniciū
vocitent. Prima quidem tria, ab accidētibus frutici: reliqua duo nomina, haud scio vnde. Vis plā
tæ est calida & sicca vt bituminis, cui odore est similis, vtrinq; tertio ordine. Proinde pota laterū
dolores ab obstructione natos iuuat, & vrinam menses q; prouocat.

G

Trichomanes.

Trichomanes eadem præstat, quæ Adiantum.

Trychnon Solanum.

Trychnonⁿ quidā præpolito s, Strychnum vocant. Esculentū quidem, quod in hortis nasci,
notum est omnibus: vtuntur q; ad omnia ea, q refrigerari adstringi q; postulant. Pōt. n. hæc duo
ordine secūdo. Ceterorū non esculentorū vnum quidem nuncupat Halicacabum, fructum ha
bens rufum, acino vuae tum figura tum magnitudine adsimilè, quo & ad coronas vtunt: alterum
verò fruticosum, à conciliando somno Hypnoticum: & tertium, quod insaniā afferat, Manicum
appellitant. Halicacabū igitur in foliorū facultate hortensi solano simile est, fructū habens ciēdæ
vrinæ idoneum: proinde cōpluribus facultatibus cōpositis, quæ ad iecur, ad velicā, & renes accō
modant, adiungit. Solani verò Hypnotici, cortex radice, si cum vino bibatur, somnum accersit
drachmæ pōdere sumptus. Sed & cetera quoq; papaueris succo persimilis est, nisi q hætenus im
becillior est, q ipse tertij habeatur ordinis refrigerantium, cū hic positus sit in quarto. Huius sola
ni Semen vrinā ciendi potestatem habet. Ceterum si plus duodecim corymbis hauseris, dementiā
quoq; adsciscet. Porro quod reliquū est ex propositis solanis, ad medicationes, quæ intrō in cor
pus adhibentur, inutile est. Nā si quatuor eius drachmæ offerantur, mortē inferent: si pauciores,
insaniā: vna certè innoxie sumitur, ceterum nec ipsa vtile quid obtinet. Verū si foris corpori empla
stri modo illinat, vlcera cacoethe, & nomode siue pascētia, curat. Sed ad talia radice cortex præfer
tur, desiccans secundo ordine iā completo, & tertio incipiente: refrigerans secundo incipiente.

A. ibi. c. 369.
& 646.

HYACINTHVS

HYacintiⁿ Radix bulbosa est, ordinis primi in desiccādo: secūdi verò cōpleti, aut certè tertij
incipientis, in refrigerādo. Itaq; pueros diutissimè seruare ipuberes vino illita credi. Fru
ctus leuiter extergit & adstringit. Quamobrè & ipse regio morbo laborātibus exhibetur in vino,
Ordine quidè tertio quadātenus desiccans, ceterum in medio consistens caliditatis ac frigiditatis.

A. l. 2. c. 1. ca. 3
fol. 101. g

Hydnon Tuber Terra.

Hydna oibus nota sunt. Substantiā habēt vincentē terrestre qdē cōsistentia, sed tñ cū paucula
qdā partiū tenuitate mistā. *Hydropeperi.*

A. ibi. c. 688.

Hydropeperiⁿ à locis in quibus nascitur, & à similitudine quæ illi cū pipere in gustu est, nomen
sortitum est: ceterum non vsque adeo calidum est q piper. Et sanè Herba ipsa etiamnum viridis
vnā cū fructu cataplasmatibus in modum imposita, sugillata & tumores induratos digerit.

A. ibi. c. 551.

Hyoscyamus.

A

Hyoscyamus Altercum.

Aibic. 348.

Hyoscyamus. cui semen atrum est, insaniam ac soporem affert: Sed is, cui semen mediocriter flauum est, propinquam ei facultatem possidet. Verū vtriq; fugiendi sunt vt inutiles & venenosi, seu deleteri. Cæterum cuius semen ac flos candidus est, ad sanationes vel maximè idoneus est, ex tertio quodammodo ordine refrigerantium. Porro Flos eius quidem, cui semen est nigrum, mediocriter purpureus est: eius verò, cui est subflauum, leuiter mali colorem refert.

Hypericum.

Aibic. 354.

Hypericum calfacit & desiccatur, essentia tenuiū partium, adeo vt & menses & vrinas prouocet: sed ad hæc totus sumendus est Fructus, non tantum semen. Porro cū Folijs illitus viridis ad cicatricē ducit cū alia, tum etiā ambusta. Cæterum si sicca contusa inspergas, sanabis & mollia nimis, humida q; & putredinosa vlcerum. Sunt & qui ischiadicis bibendum exhibeant.

Hypecoon.

Hypecoon refrigerandi vim habet, ex tertio ordine refrigerantium, vt parū absit à papauere.

Hypoglosson.

Hypoglosson inde adeo nuncupata est, q; summis corymbis velut ligulæ quædam exeūt. Ceterum Radix & Succus fruticis emolliendi vim possident.

Hystopum.

Aibic. 356.

Hystopum desiccatur & exaltatur ordine tertio: sed & tenuium est partium.

PHACI LENTES

Aibic. 438.

LEntes valenter adstringunt: medium tenent caliditatis & frigiditatis: desiccant sanè in secundo ordine. Ipsum itaq; earum corpus desiccatur, & sistit ventrem: cæterum Decoctū prouocat. Proinde etiā prior aqua abiicitur, vbi retentionis causa adhibentur.

Phacos Lenticula Palustris.

Aibic. 450.

Lenticula Palustris humidæ frigidæ q; tēperaturæ est, vtrinq; ex secundo quodammodo ordine.

Phaleris.

Phaleridis herbæ tum Succus, tum semē, tum folia potari vtiliter creduntur ad vesicæ dolores, ceu in sese habeant quiddam tenuium partium, & calidum.

Phalangites.

Phalangites, sic appellata est, q; morsus à phalangijs auxiliatur. Est autem facultatis tenuium partium, desiccantis: Quamobrem & tormina patientibus succurrit.

Phlomis Verbasum.

Aibic. 98.

CPhlomos. Quidā per literā & scribunt, & proferunt. Quædam folijs alba est, quædam verò nigra. Et albæ quidem mas est, cuius folia angustiora: foemina, cuius maiora. Et præter has est alia Phlomos, Agria cognominata: flores habet aureos & luteos, siue melizontas. Sed & alia præter has est, quam propriè Phlomida nominant, & Thryallida. Priorum itaq; duarum Radix acerbæ gustu est, & fluxionis affectibus prodest: sed & ad dentium dolorem eam quidam colluunt. Sanè folia digerendi vim habent: sic & aliarum folia, & maximè eius, quæ aurei coloris flores obtinet, qua èt capillos flauos reddunt. Oium enim folia desiccandi & mediocriter detergendi vim possidēt.

Phoenix Palma.

bid. c. 87. &

DPhoenix arbor adstrictoriæ facultatis omnibus sui partibus est particeps. Igitur ramorū Succus austerus est ex aquea substantia tepida, & terrea frigida, cōstans. Similis naturæ est Encephalos, quē vocant, hoc est cerebrū siue medulla, esui aptus. At Fructus eius, & maximè dulcis, nō paucā obtinet caliditatem. Ceterum, cū edendo sit, multo est vsui, non tantum foris impositus, vbi quid roborare & desiccare, contrahere, stipare, densare q; consilium est: sed & tanq; cibus sumptus & simul cū alijs, & per se. Porro quod Elaten vocant, nempe tenerum illud palme germen, eandem cum cerebro eius facultatem possidet. Quod verò velut Tegumentum eius est, adstringentē & ipsum qualitatem habet, verū plus q; dicta omnia exiccat: vtpote quod & essentiæ consistentia illis liccius est, & minimū habet humiditatis. Itaq; iure vtūtur illo ad vlcerū putrescentia: miscēt q; medicamentis articulos plus iusto laxatos contrahentibus: ad hæc facultatibus hepaticis & stomachicis, seu intrò sumantur, seu foris admoveantur. Sed & Radix plantæ desiccatoriæ citra morsum facultatis est, adiunctum habens & ipsa adstrictionis quippiam.

Phorbion.

Phorbij Semine ad leucomata hoc est albugines, cum melle applicāt. Sed & spicula extrahere creditur. Porro & ipsa Herba idem prestare videtur. Ex quibus constat q; tenuium partium, & attrahendi detergendi q; potentiam obtinet.

Phu.

Aibic. 255.

Phu. Odorata quodam modo est huius herbæ Radix, nardo viribus similis: sed tamen ad pleraq; infirmior. Vrinas mouet plus q; aut Indica, aut Syriaca nardus, perinde vt Gallica.

Phycos Alga.

Phycos humens etiamnum & virens ex mari exemptus desiccatur & refrigeratur ordine secundo: habet enim quiddam modicè acerbum.

Phyllis.

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

Phyllitis.

Phyllitis, cū qualitatis sit acerbæ, non ab re diarrhœas siue profluuiâ, & dysenterias, pota iuuat.

Phyllon Malabathri Foliū Malabathri.

Foliū^m Malabathri Nardo similem vim possidet.

CALBANE GALBANVM

G Albanū succus est plantæ ferulaceæ, molliēdi & digerēdi vi. Fuerit q̄q; sanē ex tertio ordine excalfacientiū incipiente, aut secundo completo: in deliccando verò, ex secundo incipiente.

Chamædrys.

Chamædrys^m vincētē habet qualitatem amarā: est & quodāmodo acris. Quocirca merito līnes colliquat, & vrinas ac mēses prouocat, crassitudinē humorum incidit, & vlcerum obstructiōnes expurgat. Ponat q̄q; eā quispiam in tertio ordine excalfacientium & deliccantium: plus tamē deficcat, quā calefacit.

Camæcissos.

Chamæcissos^m Flos, cum sit admodum amarus, iecur obstructiōne liberat. Datur q̄q; ex coxendice laborantibus.

Chamælea.

Chamælea^m vincentem habet qualitatem amaram. Quamobrem admodum sordida vlcera, & quæ maximas habent crustas, cum melle perpurgare potest.

Chamæleuce.

Chamæleuce calidæ facultatis est tertio quodāmodo ordine, siccæ primo.

Chamæleon.

Chamæleontis^m Radix, Nigri quidem, lethale quiddā obtinet. Quamobrē foris vtiq; vsus eius ad p̄foras adhibetur, & lichenas, & vitilignes, & in summa quæ deterfionem postulant: præterea digerentibus & emollientibus pharmacis commiscetur: & phagedenica vlcera sanat illita. Est. n. sicca tertio ordine, calfacit verò secundo ordine absoluto. Porro Albi chamæleōtis radix ad latus lumbricos potui datur cū vino austero mensura oxybaphi. Exhibent sanē etiā aqua inter cutem laborantibus ad similem habentem temperiem ipsius nigri radici, nisi quatenus amarior q̄ illa est.

Chamæpitys.

Chamæpitys^m gustu quidē amarum saporem validiorē acri obtinet, effectū verò expurgat abstergit q̄q; viscera plus, q̄ calfacit. Proinde auriginolis, & omnino quibus faciliē iecur obstruit, bonū est remediū. Quin & menses ducit tū pota, tum apposita cū melle. Sed & vrinæ mouendę medicamen est. Sunt autē ēt, qui eā exhibent decoctā in melicrato ijs, qui coxēdicis doloribus torquentur. Herba porro ipsa viridis vulnera magna conglutinat, & vlcera putrescentia sanat: præterea G vberum durities discutit. Est enim in siccando ordinis tertij, in calfaciendo verò secundū.

Chamæsyce.

Chamæsyce abstergendi simul & acrē vim possidet. Itaq; acrochordonas, & myrmecias, Caudales eius teneriores in modum cataplasmatism admoti, qui q̄q; ex eis profluit liquor, auferunt. Cum melle verò crassas oculorum cicatrices detergunt. Sed & hebetudines visus à crassitie natas adiuvant, sicut sanē & suffusionum principia.

Chelidonium.

Chelidoniū^m extergentis admodum & calidæ facultatis est. Sed & Succus eius ad acuendū visum cōmodus est, vtiq; in quibus crassum quiddā in pupilla colligitur, digestionē atq; discussione indigēs. Vñ sunt Radice eius quiddā ad auriginem ab obstructiōne iecoris proficiscentē, in vino eam albo potui exhibentes cū aniso. Similiter māsā confert dentium doloribus. Porro Chelidoniū Minus cū acrius sit maiore, celeriter illitū cutē exulcerat, vngues q̄q; scabros eicit. Succus eius per nares purgat, vt pote admodū acer. Itaq; hæc herba quartū quodā modo ordinis fuerit calfacientium incipientis: Maius autē chelidoniū tertij est ordinis absoluti iam, id q̄q; tum in calfaciēdo, tum in siccando.

Chondrila.

Chondrila. Et hanc quidam Serin nomināt. Est enim eiusdem ferē cum illa facultatis: nisi q̄ gustu amariuscule est, ac proinde facultate siccantiore.

Chondrus.

Chondrus est sanē nutrimentū optimum, sicuti & triticū. Sed huius instituti non est de nutrimento distinguere. Verū vt medicamē emplastice facultatis est, tēperie tritico similis, plus tñ illo viscosus: quare sanē ēt illo plus nutrit. Est q̄q; ceu materia quædā idonea excipiendis aceto, marina aqua, muria, & id genus alijs valenter desiccantibus: proinde quiddā ex genere admodū exiccantium esse & hoc semen autumarunt. Cæterū Chondrus ex numero est potius concoquentiū, vt & triticum, quę minimē profectō desiccant. At ob exiccantium medicaminum admistionem, cū quod ex illis compositum est, exiccatorium sit, medicorum complures in errorem inducī sunt, vt falsò putarent deliccationem chondro acceptam ferendam, ijs, quę admista erant, præteritis.

Chrysocome.

Chrysocome, vocat & Chrysites. Radix vincētes habet acrē simul & adstringentē qualitates: quare non admodū multi vsus est. Vñ tñ est decocta in melicrato in peripneumonijs, & morbis hepaticis siue iecorarijs. Sed & menstruæ purgationis prouocandæ vim quandam obtinet.

Pseudodictamnium.

E

A. ibi. c. 253.

A. l. 2. t. 2. ca. 130, fol. 114. c

A. ibi. c. 456.

F

A. ibid. c. 197. & 455.

A. l. 2. t. 2. c. 131 fol. 114. f

A. ibi. c. 195.

H

A **P**SEVDODICTAMNVM
Pseudodictamnvm imbecillis dictamni vim habet.

Psyllium.

Aibi. c. 533.

Psyllium Semen habet admodum vtile, ex secundo refrigerantium ordine: in desiccando vero & humectando medium quodammodo est & symmetrum.

OCIMON

Aibi. c. 10.

O Cimum ex secundo est ordine calfacientium: habet autem recrementitiam humiditatem. Proinde nec commodum est quod in corpus sumatur: Ceterum foris illitum, ad digerendum & concoquendum idoneum est.

Ocimoides.

Ocimoides. Quidam Philitarium cognominant. Radix inutilis est. At Semē tenuium partium, & desiccantis citra mordicationem facultatis est.

GALENI DE SIMPLICIVM

MEDICAMENTORVM FACVLTATIBVS

LIBER NONVS

ARGVNTVM LIBRI

Agit de Terrarum ac Metallicorum Facultate.

*Replicantur quæ de Adstringentibus, & Combustis Medicamentis
Quarto libro demonstrata sunt.*



QUOTQUOT plantarū partes sunt, & fructus, & succi, atq; liquores, suprà dicta sunt omnia. Nunc autem de reliquis medicamentis, quæ metallorū genere censent, quæ q; ipsius terræ species sunt, differere propositum est: post quæ deinceps nō nihil tractabitur de partibus animalium, utiq; quibus ceu medicamētis ad curationes vtimur. Ceterū præstare mihi videtur, cōiter de illis omnibus præfari, quò videlicet tū clarius intelligi possint, tū quæ dicenda sunt, distinctè ceu in articulos inaudiantur. Nā si quis in omnibus sequatur scriptores siue medicamentorū, siue materiārum, siue illorū præparandorū, in multis profectò turpissimè hallucinabitur, & ea quæ præfinitè ac determinatè à me posita sunt, perperā accipiet. Cæterum cum duo sint capita cōis orationis iam proponendæ: Alterū est, an spontè nascentium medicaminū quæ combusta sunt, calidiora arbitrari oporteat, an frigidiora: Alterū de medicamētis adstringentibus, quorum in genere esse suprà ostensum est tum austera, tū acerbā. Itaq; sup̄ his quidē in quarto horum commentariorum verba fecimus: sed & modò cōmemorare satius fuerit Medicamentis adstringentibus & facultatem & qualitatem inesse cū acribus pugnantissimā. Adstringunt enim acacia, balaustiū, hypocystis, cytini, galla, rheon, rhus, omphacium, mespila, corna, malicorium, myrta. Acria verò sunt euphorbium, allium, cæpa, porrum, napy, piper, gingiberi, smyrnium, origanum, pulegium, calamenthe, & thymus. Reuocandum itaq; in memoriā dūtaxat, qualem cuiusq; dictorum percipimus sensum, & protinus sequetur qualitatē eorum diuersitas, quam in quarto libro exposui vnā cum alijs omnibus gustus differētijs. Sanè contrahunt constipant q; atq; condensant substantiam nostrā adstringentia: ac proinde in quamuis corporis nostri partem extrinsecus imposita, continuo illam rugosam & contractam efficiunt, contrā quā acria, quæ imposita cuti perspicuè eam excalfaciunt, atq; in molem attollunt, rubente colore: ac si diutius immorentur, etiam vlcerant. Hęc itaq; euidenter apparent tum incidere, tum excalfacere, tum etiam à vicinis partibus ad sese sanguinē attrahere: at adstringentia refrigerando, contrahendo, constringendo q;, in illis etiam contentum repellere. Facultas itaq; aduersissima est adstringentibus cū acribus: nec quæ in gustu apparet qualitas, simile quippiam obtinet. Quid ergo non nullis in mentem venerit, ut piper, allium, atq; adeo acria omnia, adstringere dicerent, sanè cogitatione assequi nequeo. Nam si ut hæc adstringere dicunt, ita rhus, balaustium, omphacium, mespilum, & quotquot eius sunt generis, acria cognominarent, diuersa ac commutata in nominibus consuetudine, ignaros profectò illos vocatione, & earum significatum, non tamen gustandi aut olfaciendi carere iudicio, dicerem. Nunc verò cum res duas & olfactu, & gustu, & effectibus suis, contrariam inter sese naturam ostentantes, vna appellatione nūcupent, admiranda profectò hominum aut stupiditas est, aut dementia, aut simul vtraque: perinde enim faciunt atque illi, qui & ignis & niuis eundem esse sensum aiunt. Atque adeo in quendam quondam incidit, qui præ tam aliena atque absurda vsurpandorum vocabulorum consuetudine, diceret nihil prohibere, quò minus diceretur nix eandem igni habere tum qualitatem, tum

tum facultatem: quia videlicet & hæc quævis visa sit pedes diutius per eam ambulantium adussisse. E
Sanè non paruo tpe opus est, vt illis hominibus sordem animi expurges. At quibus non in tam
profunda ignorantia caligine degere contigit, ac quantum horum commentariorum perlegerint,
ijs quæ iam dicta sunt, memoriæ causa repetita sufficiunt, quò distincte nomina de quæ propriarum
rerum ita inaudiant, quemadmodum Latinis efferre Græcis quæ mos est. Tranlibo verò ad se-
cundum scemna siue speculationem, haud etiã de nomine & significato eius habendum, verum
de rei natura. Nam plerique existimant combusta omnia se ipsis effici frigidiora: alij contra, com-
bustorum omnium augeri caliditatem existimant: vtrique sanè errantes. Conspiciuntur enim liqui-
do quædam calidiora reddita & ad gustum, & ad tactum, & ad eam quæ in vsu cernitur facultatem:
velut supra dicebam de acribus & adstringentibus. Quædam contra ab vstione minus apparent
calida: id quæ clarè discernimus tum tactu, tum vsu. Dico autem vsu, ceu antè dixi, cum cuti impolita
alia calidiorem rubentiorē quæ partem efficiunt, alia exanguem & frigidam: & alia molem attol-
lunt, alia contrahunt. Igitur Acria multum caloris amittunt vsta: at quæ eiusmodi non sunt, assur-
munt. Sanè combustorum omnium nullum planè est frigidum: relinquitur enim in illis velut
εμπύρευμα hoc est ignitio quædam, nam ita vocabat Aristoteles. Atque id est quod per ablutiones
detergitur, ex combustorum substantia subtilissimum: quod vbi cum aqua abierit, quod vsti reliquum
est, substantia terrena est: siquidem humidum omne combustio absorbit, reliquum autem terrenum est
vna cum empyreumate ab Aristotele vocato. Hoc ergo vbi per lotionem ablatum ac semotum fue-
rit, aqua, in qua medicamentum ablutum est, calidam adsciuit facultatem, eam quæ tenuium partium: quod
reliquum verò est, terreum simul & frigidum est, desiccare citra mordacitatem potens. De his quidē
& supra diximus: ceterum nihilo deterius est in memoriam nunc ea reuocasse, vt repetita illorum
memoria, simul quæ dicenda sunt, exactius quis assequatur.

DE TERRÆ DIFFERENTIIS

Cum duæ sint res, quæ terræ vocabulo significatur, necessarium duxi prius eas distinguere,
vt clariora sint quæ dicenda veniunt. Altera sanè omnibus Græcis {pariter Latinis} maximè
coniuncta est. Siquidem vbi triticum, hordeum, aut aliud quodpiam seminum, quæ cerealia nuncupantur, se-
minant, mediocriter humidam esse terram oportere aiunt: At vbi vites, ficus, oleas, aut alia quæ arborē
plantant, fugiendam præcipiunt tum eam, quæ vliginis planè expers sit & arida, tum quæ humida sit &
lutosa: nam Lutum vocant terram humido maceratam. Tum qui de colendis agris seu georgica conscri-
bunt, in regionum differentiis atram terram, argillosam, arenosam quæ, discriminantes efferunt: sed &
pinguem terram vocant, ex qua lutum fit viscosum ac lentum: alteram verò contra quæ hanc dispositam,
quæ lutum efficiat pinguitudinis expers & friabile, vt sic dicam. Atque hoc est vnum terræ voca-
buli significatum, omnibus vlitatum. Alterum est solis philosophis usurpatum, cum aiunt elementa
corporum esse terram, aquam, aerem, & ignem. Corpus namque extremè siccum ac frigidum terram
nuncupant. Secundum hos ergo nullum compositorum corporum terra censetur elementaris:
aiunt in ea plurimum habere terram, puta adamantem, & saxa: & quanto, corpore fuerint durior, tam-
to magis ea dicunt esse terrea, contra quæ agricolæ. Haud enim quo durior sit corporum consistencia,
eo plus terreum esse dicunt, verum lapides & petras planè ad agriculturam esse ineptissima contem-
dunt. Ceterum eam esse terram dicunt exactissimam, quæ quæ longissimè recessit à saxi consistencia: quip-
pe cum & argillosam & arenosam ad plerumque damnent inutilem. Secundum itaque significatum quod
à philosophis celebratur, tribus finientur generibus terræ differentiæ. Siquidem Vnum eius ge-
nus lapis est, Alterum corpus metallicum, Tertium verò terra quæ colitur: facta apud eos differen-
tia de metallicis corporibus, quæ fundi possunt, velut ære, stanno, plumbo, hæc. n. quidam autem non
terræ, sed aquæ, plus continere. Attamen ceteri homines omnes eam duntaxat terram nominant, quæ
humido macerata lutum efficitur: De qua utique & ego nunc statui differentias exponere, id mo-
dò præfatus, quod proposita sectio corporum terrenorum in lapides, metallica, & terram quæ colitur, H
absque corporibus quæ propriè physica seu naturalia nominantur, dicta est. Nam si ea accedant,
tum ligna omnia, & fructuum partes complures, velut et animalium, essentia esse terrena dicent:
fructuum quidem partes, vt nuclei oliuarum, & vinacei vuarum, putamina nucum, & conorum, &
eius generis multa alia: animalium verò ossa, cornua, dentes. Verum de plantarum partibus, quæ
terrenæ utique sunt & dure, partim iam supra dictum est, partim et nunc dicitur: At de ijs quæ ani-
mantium sunt, infra tractabitur, vbi prius terræ species absoluerō: licet. n. ea tibi aut differentias,
aut species, aut et appellare genera. Dico autem hæc, lapides, metallica corpora, terram in lutum solu-
bilem. Ac primum omnium dicam ab Latinis nuncupatæ terræ differentias, quæ commune hoc
habet, vt addita aqua continuo solvatur, & fiat lutum. Nam quod à philosophis sic appellatur, non
habet omnibus commune, sed illis tantum consuetum ac celebratum significatum.

DE DIFFERENTIIS NOMINATAE PASSIM TERRÆ

Terram vlitatè Latinis vocari dixi, quæ iniecta aqua statim soluitur, & fit lutum. Huiusmodi
ergo est, quam homines ad culturam elaborant, differentias habens quasdam sanè secundum
propriam rationem, dum pinguis est & viscosa, quæ utique omnino & atra colore est: alia verò friabi-
lior, & pinguitudinis expers, quam vocant argillam, quæ sanè quodammodo candidior est. Atque
hæ

A hæ contrarijssimæ sunt differentiæ. Aliæ harum in medio sunt, alteri atq; alteri magis accendentes: atq; adeo quedam etiam quæ ex æquo ad vnguem in medio, pari intervallo ab vtrâq; distant.

At aliæ sunt terræ differentiæ ex diuerli generis corporū natæ cōmistiōe: qua ratione lapidosæ & arenosæ habentur. Atq; admistam talium substantiā segregant large aque effusione ac maceratione, dum tōtum humidū efficiatur: cū.n.id effectum est, id quod deferitur atq; inest lapidosum atq; arenosum, id omne subsidit, & terra exacta supernatat. Tale quiddā & in Lemnia terra visit, quā cognomināt quidā Milton lemnīā, id est rubricā lemnīam: & alij quidam Sphragida lemnīā, hoc est sigillum lemnium, ob impressum videlicet illi sigillum Dianę sacrū. Siquidem hanc terram sacerdos cum patrio quodā honore sumens, haud mactatis animalibus, sed tritico atq; hordeo piamenti gratia terræ redditis, in urbem cōportat. Quā deinde aqua maceratā, atq; in lutum redactam, ubi valenter conturbauit, paulum q; inde quiescere sinit, aquā quę supnatat, primū aufert: & mox quod sub ea est pingue terræ tollit, at reliquum duntaxat quod ad imū subsedit, lapidosum scilicet & arenosum relinquit vt inutile ac superuacaneum. Porro lutum illud pingue vsq; eō deliccat, dū mollis cere consistentiam accipiat: huius q; exiguis acceptis particulis, sacrū Dianę signum imprimi: ac postea rursus in vmbra siccandū reponit, donec omnē planē humiditatē mittat, fiat q; il-

* Alutium.

B lud medicis omnibus cognitū medicamē Lēniā sphragidis siue sigillū: sic enim quiddā illā cognomināt ob impressam illi sphragida hoc est sigillum: ceu etiā non nulli ob colorem, lemnīā milton siue rubricam appellāt. Eundem ergo quem rubrica colorem obtinet, verū ab ea differt, q; contactu non contaminet atq; illa: & secūdem collem in Lemno, qui totus colore fuluo est, & in quo neq; arbor, neq; saxū, neq; plāta nascitur, tū huiusmodi terra visitur. Porro Tres eius signant differentiæ, Vna quā posuimus terræ sacra, quā alij nemini præter vnā sacerdotē contingere fas est: Altera verò eius quæ re vera milto est, siue rubrica: vtuntur autē ea potissimū fabri: Demū tertia eius quæ extergit, qua vtuntur qui lintea & vestes lauant, quibus vtique collibitum est. Caterū cū & apud Dioscoridem & alios quosdam scriptū legissem, Lemniæ terræ hircinum misceri sanguinem, atq; ex luto quod ea mistione conficiebatur, sacerdotē lemnias quas vocant sphragidas tum conformare, tum consignare, cupiebam profectō & ipse mistionis modum inspicere atq; symmetriam. Itaq; quemadmodum in Cyprum nauigauerā vidēdorum, quæ in ea sunt, metallorum gratia, & in Coelen id est cauā, Syriā Palestinæ partē profectus fueram, bituminis & aliorū quorūdam inspiciendorum causa, ita nec in Lemnū enauigare piguit, vt quantū sanguinis terrę admiscerē, conspicerē. Nā cum iterum ex Alia Romā pedestri peterem itinere per Thraciā & Macedoniā,

C prius à Troade Alexādria in Lemnū ad nauigauī, nactus illic nauē quæ ad Thessalonicā cursum destinabat. Conueniebam autē cum nauclero, vt in cursu Lemno appelleret. Et sanē ille præstitit, sed nō ad eam ciuitatem ad quam oportebat. Antea.n.nesciueram duas esse in insula ciuitates, sed credebam, vt Samus, Chius, Cos, Andrus, Tenus, & oēs adeo quæ in Ægeo sunt mari, vnā duntaxat ciuitatē habent toti insule cognominē, ita & Lemnum nominis sui vnā habere ciuitatem. Porro vt ex naui descēderam, intellexi ciuitati nomen esse Myrinę: nec in regione ciuitatis illius aut Philoctetis templum esse, aut sacrum Neptuni collem, sed in altera quę vocaretur Hephestias: nec ciuitatem eam Myrinæ esse propinquam. Cum q; me Nauclerus expectare nō posset, distulī, vt cū Roma in Asiā redirem, tum Hephestiada viserem: id quod feci prout speraueram & proposueram. Nam ubi ex Italia in Macedoniā traiecissem, eam q; penē totam pedestri itinere pertransissem: peruenissem q; Philippo, quæ ciuitas est finitima Thraciæ: inde ad mare descendi quod proximū aberat centū viginti stadijs: primumq; Thason transmisi, distantem plus minus ducenis stadijs, atq; illinc in Lemnū septingentis, ac rursus fermē septingentis in Alexandriam Troada traieci. Ac proinde sanē ex industria tum de nauigatione, tum de stadijs adscripsi, vt si quē eadem, quæ me, caperet Hephestiada visendi cupiditas, cognito eius situ sic nauigationem institue-

D ret. In tota nanq; insula Lemno orientem spectat Hephestias, occidentem verò Myrina. Et quod à poeta dictum de Vulcano est, qui græce dicitur Hephestus, Decidit in Lemnum. propter collis naturam occasionem sumplisse fabulę crediderim: apparet.n.combusto simillimus tū colore ipso, tum ēt quia nihil in eo nascitur. In hūc itaq; collē sacerdos, quo tempore ego ad insulā accesserā, egressa, certo quodā tritici hordei q; numero in terrā cōiecto, alijs q; quibusdā pro religione patriæ perpetratis, plaustrū totū terra impleuit. Atq; ubi in urbē cōtexisset, quo dixi modo, illas fama hominū adeo celebratas Lēnias sphragidas preparabat. Visum ergo mihi erat percōtari, nūqd vnq; antea hircinū aut caprinū sanguinem huic misceri solitū memoriæ proditū accepisset. Quo audito oēs in risum soluti sunt, nec ij sanē quiuis ex vulgo, sed viri oppido q; eruditi cū in alijs, tū præcipuē in vniuersa patrię historia. Quin & à quodā librum accepi quondam ab incolarum quopiā cōscriptum, qui oēm Lemniæ terrę vsum edocebat. Quamobrem nec me quoq; piguit huius medicamenti periculū facere, acceptis fragidum viginti millibus. Sed & is, à quo librū dono accepi, inter principes habitus ad multa hoc vrebatur medicamine. Siquidē ad vulnera tū vetera, tum cicatrici inducendę cōtumacia: ad hæc ad morsus viperæ, atque adeo oēs ferarū morsus: nec nō aduersus medicamenta lethalia: nō antē modò exhibere, sed & post sphragide vtī cōsueuerat. Addebat porro sese periculū fecisse medicamenti, quod quia fructū iuniperi accipit *Δία τῶν ἀπνευσθίων*

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

nuncupatur, cui utiq; indebatur & terra Lemnia: vomitum q; ciere aiebat, siquis cum etiamnum E in ventre lethale venenum haberet, alexiterium siue amuletum ebibisset. Et sanè nos quoq; huius fecimus periculum in lepore marino, & cantharidibus, cum sese tale quippiam accepisse homines suspicarentur: verum hauſto, quod lemnia sphragida habebat, medicamento, protinus omne euo muerunt, nec postea vllum illis accidit symptoma eorum, quæ ad leporem & cantharides comitari cõsueuerunt, tametli coniuncta esset perniciosorum medicaminũ exhibitio. Caterum an ad alia mortifera medicamenta, hæc inquã quæ vocant deleteria, eandẽ vim habeat medicamẽtum quod ex fructu iuniperi & terra Lemnia conficitur, mihi utiq; ignotũ est. At ille ab Hephæstiade profecto assererat adeo, vt & rabietis canis morsum eã sanare diceret in vino diluto epotam: vlceri autẽ ex aceto impense acri impositam. Sed & aliarum ferarum ictus ex aceto sanare referebat, extrinsecus folijs insuper impositis, quæ putredini resistere didicimus. In primis verò p̃dicabat Scordiũ, deinde Centaurium exile, inde Marrubiũ. Porro si qñ nos sanè ad vlcera cacoethe & putrida terram lemniam adhibuimus, magnificè profuit. Vſus autẽ est pro prauitatis vlceris magnitudine. Quippe id quod grauiter olet, impendio q; laxum molle q; est, ac sordidum, sustinet vt vel per acerrimum acetum lenia terra in lutosam soluaturs consistentiam, aliorum more pastillorum, quorum

** Passiois.* alius alio vitur: dico autem Polyidæ, & Prælionis, & Andronis, & qui nunc dictus est, quem Be- F tinum vocant. Siquidem hi omnes valenter desiccantes profunt vlceribus contumacibus, soluti interim quidem in vino dulci, interim sapa, interim œnomelite, non nunq; etiam alborum vinorum quopiam aut fuluorum aut flauorum, prout nimirũ vſus postulat: nã de talibus alibi definitur. Similiter verò qñq; soluuntur aut ex aceto, aut vino, aut aqua, aut oxymelite, aut oxycrato, aut melicrato. Porro Lemnia terra ex aliquo comprehensorum soluta medicamẽ fit idoneum tum recentibus glutinandis vulneribus: tum medendis inueteratis, egre ad cicatricem venientibus, et contumacibus. Similiter autem & alia quæuis terra pharmacodes siue medicamẽtosa. Necesse enim erit distinguere, sicuti supra, ab elementari terra, in qua & lapides comprehendebantur, eam quæ in lutum soluitur: sic nunc ab ea, quæ colitur, medicamentosam. Nihilominus deterius erit ita eam cognominasse, qua ad curationes vitur: tametli eius quoq; quæ colitur, si qua pinguis est, comoda est ad curationem earum omnium partium, quæ desiccari possunt. Vnde sanè ea & Alexandria & per Ægyptum vitur multi sua utiq; spõte ac iudicio, multi verò etiam moniti somnijs.

Vidi enim Alexandriæ quosdã aqua inter cutem laborantes ac lienosos Ægyptiæ terræ luto vten- A. l. 2. t. 2. ca. tes, multos qui sibi furas, femora, cubitos, brachia, tergũ, latera, pectus q; inungerent, ac perspicuo 412. fol. 140. b iuuarentur. Eundem in modum & veteres phlegmonas, & laxa œdemata adiuuat lutum hoc. No- G ui siquidem quosdam, qui ex immodica per hæmorrhoidas euacuatione turgentibus effecti ac tumidi, nõ obscure fuere adiuti. Sed & quidam diutinos fixos q; parte quapiam dolores perpeſsi, luto hoc planè perſanati sunt: desiccãdi nanq; vim terra quæuis possidet. Quoniam verò corpus eius natura ficcum est, & quando prorsum igne substantiæ mistionis est expers, ita desiccatur, vt minimè sit mordax, ad quod tamen etiam proficit si lauetur.

{ DE TERRÆ LOTIONE }

Cæterum lauatur terra ois ad eundem modũ, quo propositũ est de Lemnia. Primum quidem maceratur aqua, quæ nullã habet medicamẽtosæ qualitatis suspiciõnẽ. At vbi lutũ cõfederit, effundit quæ innatat aqua: deinde quod post ipsam erat, segregat à lapidosis atq; arenosis quæ ad imum refederunt. Ac si exercitatum habeas gustandi sensum, ipse iudex eris accuratus, quã oporteat terrã lauare, quam non. Nam quædã lauari non desiderant, quædam etiam bis ter q; elui exposcunt. Ac lemniam quidem paratam accipis semel à sacerdote lotam, quæ iterum ablui nõ exigit.

{ DE TERRA SAMIA }

A T^{ra} Samiam ne lauari quidem opus est. Vitur autem altera eius specie magis, quã Samium A. ibid. c. 41. Aſtera cognominant, ad sanguinis exuptiones vndecunq; natas, velut etiã Lemniũ sigillo. H Eadem vi iuuant sanguinis ex vtero profluuiã, & vocatum fluxum muliebrem. Quin & profunt exulcerationibus dysentericis, anteq̃ putrescentia euadant vlcera: Nomas id genus affectus appellare medicis mos est, ab eo quod putredo depascat, et ad vicinas partes serpat, { quod græce dicitur νέμεσις. } vnã cum primum vituata & ipsas corrupēs. Tametli etiã in istis qñq; sum vſus Lemnia, & palam profuit tũ per sedẽ infusa, tũ epota: utiq; antea, quod facere solemus, vlceribus melicratomeracioribus prius ablutis, posterius verò muria. Inijciatur ergo per succũ arnoglossæ: bibebat verò ex oxycrato aquoso. Sed nec paulo quopiam efficacioribus videt esse viribus Lemnia terra q̃ Samia: quare nec ea, quæ iã phlegmone tentari cõeperint, vim eius perferunt, sed clarè iritantur, atq; exasperantur, potissimum si vir sit habitus molliori { quem malacosarcõ Græci vocat. } At à Samia adeo non exasperatur vlla sic affectarum partium, vt etiam mitigentur, maximè quæ humidiore sunt & laxiores, velut vbera, testes, adenes. Idoneè autem vtaris terra eiusmodi, si vbi ad læuorem redegeris per aquam, tantum admisceas olei rosati boni, quod mistione sua medicamentum à relificatione prohibeat. Sed et cõmodum vtile q; est, vbi sic preparatum fuerit, ad alias quoque phlegmonas calidas, & bubonas incipientes, & fluxiones podagricas, & summatim vbi refrigerare statutum est mediocriter cum mitigatione ac lenitione: vt euidenter appareat vim Samiæ

A Samiæ mediocriter esse refrigeratoriā. Quin & magis quodammodo aerea est eius essentia collata ad Lemniam: cuius argumentum est & leuitas. His itaq; notis et omnem aliam terram medicaminosam aestimato. Dico autem notas consistentiæ tum leuitatem tum grauitatem, præterea q; in gustu asperitatem ac leuitatem, ad hæc tenacitatem, & abstergerendi potentiam. Tenax enim & viscosus est Samius alter, cum & Lemnia sphragis eiusmodi paululum quiddam habeat. Absterforiam quoq; facultatem moderatam obtinet et Selinusia terra, & Chia: quamobrè mulieres quedam ad faciem ijs vtuntur. Ostensum autē est in tertio libro de ratione curandi, quicquid leuiter absterget, producendæ vlcera carni esse idoneum. Id autē si etiam desiccet, cicatrici inducendæ habile est. Porro omnium ex his aptissima sunt & ad vlcera quæ in summa cute consistunt, & ad ambusta, illa quæ cum citra morsum exiccant, tum neque manifestò exalfaciunt, neq; refrigerant. Quocirca terra Selinusia, & terra Chia pulcherrima sunt ad ambusta vlcera remedia. Expolcunt enim ea moderatissime extergentia medicamina absq; insigni aut calfactione, aut refrigeratione: quod utiq; inest tū Selinusie, tū Chia, tum Samiæ terræ. Dictum est autem q; & huius species est Aster quæ vocant, reliqua terra hoc præstas, q; viscosum quiddam ac tenax obtineat. Quocirca q; cum ad alia vlcera, tum ad ambusta pertinet, alijs terris quæ tenacitatem non habent, conferendus

B non est. Siquidem substantiam tenacitas magis reddit emplasticam, q; vt sinat abstergere: scilicet vbi nulla vtiq; alia adsit acrimonia viscoso tenaci q; corpori: vt in visco cernere est. Attram Chia & Selinusia terra inferiores sunt Samiæ ad phlegmonas, in māmellis, testibus, atq; inguinibus incipientes: tamen vbi inopia est aliorum quæ summè profunt, nec ipsa planè ineptæ sunt & incommodæ. Porro Cimolia cum mista sit facultatis, partim refrigerat, partim etiam digerit, sed leuiter. Proinde dum lauatur, hanc facultatem deponit atq; exuit: absq; ablutione verò secundū vtrāque agit facultates, ceu alia quoque cōpositorum medicamentorū plurima, digerentia pariter & repercutientia. Porro vtrāque facultatem facile indicat, dum illi miscentur humores naturæ contraria. Nam si mista sit repercutientibus, refrigerantibus q; lutum quod ex ipsa & illis conficitur, refrigerans repercutiens q; efficit: sin digerentibus, & ipsum digerens. Sic ambustis cōuenit. Atq; idiotæ quidam protinus aceto maceratā illinunt. Sed in tali vsu non impēse acre sit acetum oportet: ac si tale sit, aquam miscere præstat. Et illud mihi semper memoria teneto, ceu cōmune omnis terræ leuis. Omnes enim ambusta iuuant, continuo illitæ ex aceto, aut oxycrato, nimirum bullas: existere prohibentes. Ceterum contemplandum insuper est, corporis curandi quæ sit natura siue habitudo, dura ne an mollis: Id in vniuersum præ oculis habendo corpora mollia valentium medicaminum vim haud posse perferre, dura verò posse. Sed hæc huius instituti non sunt, verum copiosius exponuntur tum in tractatu de Cōponendis pharmacis, tū in libris de Facile parabilibus.

C Præfens autem narratio à principio id studuit, vt generales inueniret facultates. Quibus animum intendens quispiam cōplura habiturus est ad particularis vsus copiam, vtiq; si vtēdi eorum viā ac rationem insuper adiūxerit atque edidicerit. Quare immorandum nō est. Verum quod antea dictum est, nunc in memoriam reuocare oportet, nempe terrā ipsam expertem missionis substantiæ generis alterius, vim habere citra morsum desiccandi. Atqui cum nullū reperire corpus queas missionis ad vnguem expers, inspicienda item est eorum quæ illi accidunt commissio, id q; secundum leuitatis & grauitatis differentias, eas q; quæ in gustu visunt. Nam si qua eluceat adstrictio, tantum assumpsit frigiditatis, quantum habet & adstrictionis. Sin etiam acrimonia quædā appareat, tantum inesse scito caliditatis, quātum & acrimoniæ. Similiter in leui & graui videndū: cum leuitas illi inde proueniat, q; larga & copiosa in tota eius temperie aerea insit substantia: grauitas verò quanto maior sit, tanto itidē syncerior terra existat. Terræ proprium est, q; igni admota nō fundatur aut liquecat: id quod accidit plumbo, stanno, argento, & auro. Itaque cum terram audis {ab argento} noīari Argyriten, vel {ab auro} Chrysitē, vel {à ferro} Sideriten (nā ita nuncu-

D pant quidā illas quæ ex metallis sumuntur) haud putes per totū terræ immistum esse argētum, aurum, aut ferrum: sed contingere, coniunctas q; esse paruis terræ particulis immistas particulas paruas: in Chrysite quidem quæ ab auro dicitur, auri: in Argirite, quæ ab argēto, argēti: in Siderite, quæ à ferro, ferri: eas q; ab igne in fornacibus fusas coireadinuicem. Eundē in modū quæ vitrum continet terra, arenosa est: in arena enim potissimū eiusmodi substantiæ frustula reperiuntur sæpe numero parua. Et qui earū rerū periti sunt, cōspectis arenis talibus haud difficulter cognoscunt, quantum ex eis colligi queat vitri. Sed & auri quoque frustula exigua frequenter non paruo numero in quibusdā inueniuntur arenis. Verum nō ex quauis arena, qui negotio huic sunt dediti, aurum vitrum q; extrahunt: sed eas eligunt arenas, quæ quā minimò impēdio plurimū cōgerūt. Siquidem post multos sumptus, quos in fornacibus instruendis facere necesse est, si paulū modò colligeretur substantiæ, damnosum id ipsis esset. Itaque cum in plurimis arenis auri vitri q; frustula parua contineantur, qui talia callent, nō ad quasuis accedunt. Ad eundem modum neque æs, aut argentum, aut ferrū, aut stānū, plumbū ve ex quauis terra colligunt. Nec tñ vbi dictorū quodque ab admista terra separauerint, quæ reliqua est, alijs terris est similis, quas passim sic ab omnibus nūcupari proposui, quæ cōmunem habent notam, q; irrigatæ facile soluantur in lutum: nā terræ quæ in metallis est, reliquiæ lapideæ fiunt, nec macerari rigari ue possunt. Dico autem rigari, per totā

† ΑΡ. ἀτηκτον
id est nec liqua
ri possunt.

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

substantiam humectari: madescere verò, extrema tantum superficie madesceri, haud etiam in altum E penetrare humore {illud $\tau\epsilon\gamma\gamma\epsilon\delta\varsigma$, hoc $\beta\rho\epsilon\chi\epsilon\delta\varsigma$, Græci appellant.} Sic fit Cadmia, quã vocat, lapidea, nec ipsa rigari potis. Sed de talibus corporibus infra differetur. Nunc rursus ad medicaminosam terram reuertor, quæ proinde quod aqua irrigata facile in lutum soluitur, terra appellatur: quia verò ea utimur velut alijs medicamentis, idcirco non iniuria græcè Pharmacis idest medicaminosa, sola vocatur: nepe quia aut sola est eiusmodi, aut euidentiorē quàm alia, vim medicaminosam possidet: Id quod sanè verum est. Nominatur autem Ampelites, non quod vitem in ea serere præstet, sed quod viti circumlita interimat nascentes in ea vermes, quos scnipas apud nos vinitores cognominant. Nascuntur porro hi ineunte vere, cum germinare vites, turgere quæ earum pars vnde germē exit (quem oculum nominant) incipiunt. Hos igitur oculos scnipes depascentes, non leuem viti noxā afferunt: ac proinde oculorum istorum radices, qui hæc sapiunt, inungunt ac illinunt. Hæc itaque ratione Ampelites & Pharmacites id genus terra appellata est, vel ex eo quod scnipas perdat, quantum habeat facultatis medicaminosæ indicans. Sed & à reliqua terra, qua ad curationes utimur, multum diuersa est, quippe quæ proximè ad lapideam perueniat: quamobrem misceri eam in medicaminum scriptionibus comperies, vbi exiccare atque digerere quid opus est. Nec enim mordacitatis expers est, nec moderata, nec mitigandi vim obtinet, velut Chia, Samia, & Selinulia. F

Atque de Cimolia quidem dictum est, quod illis paulo sit valentior, veruntamen etiā morsus expers, maximè si elota sit. Cretica verò terra istis quodammodo assimilis est: verum admodum imbecilla est, multum habens substantiæ aeræ. Inest tamen ei vis extergēdi: quamobrem ea homines valis argenteis sordidis splendorem recuperant. Itaque & hæc tibi visui fuerit ad ea omnia, ad quæ alias sine morsu extergentes idoneas esse posuimus. Harum omnium Lemnia valentissimas vires obtinet: siquidem & adstrictio ei quædam inest. Porro Eretrienlis hæc etiam valentiorē possidet, hæc tamen in, vt non dum mordicet. Quod si lauetur, valde moderata efficitur, non secus atque supradictæ. Expediit verò hanc terram non semel, sed bis ter quæ lauare, vt & Cimoliam. Quin & vrunt eam quidam, quod videlicet essentiæ reddant subtilioris & acrioris, vt & ad digerendi potentiam transeat. Cæterum si vsta lauetur, tunc deposita in aquam acrimonia subtilitatem quidem, quam ex tostione acquisiuerat, retinens, desiccantior constituitur. Quocirca cum vstionem non experta, communi ratione terræ cuiuslibet, vlceribus sit accommoda, magis certè iam cōgruit & ad ea, quæ carnem sibi restitui agrè patiuntur: & ad ea, quæ ad cicatricem difficulter perueniunt, si postquam combusta fuerit, abluatur. Porro cum Duæ eius species sint, ea quæ colore est cinericio, illi quæ admodum albida est, præfertur. Est & alia terra dicta Pnigites, tota quidem facultate G Cimoliam assimilis, cæterum colore diuersa. Est enim atra, perinde vt Ampelites. Porro viscolitatem & tenacitatem non minorem quàm Samia terra obtinet, immo non nunquā etiam maiore. Cæterum durat hæc immani & graui peste, allata "ad me & alia quædā terra est ex Armenia ea, quæ Cappadociæ finitima est, siccantior, colore pallido. Lapidem, qui donarat, non terrā, appellabat: promptissime quæ in leuorem soluitur, ceu etiam calx: sic enim videlicet nuncupo petram combustam. Verum vti nec in illa arenosum quippiā apparet, ita nec in Armenia. Nam posteaquam in mortario pistillo comminuta est, adeo est leuis, nec plus est lapidea, quàm aut calx aut Samius alter: tamen si non æquè vt alter leuis est. Itaque illo etiam magis conspissata est minus quàm aeria: quamobrem opinionem ac phantasiā præbet ijs, qui negligentius intuentur, quasi lapis ellet. Cæterum, quod ad præsentia attinet, nihil interest, lapidem an terram vocites, si id modo teneamus, quod summè desiccet. Siquidem ad dysenterias, & ventris profluuiā, tum sanguinis expuitiones, & catarrhos, ad hæc ad putrescentia oris vlcera, in primis competit. Quin & eos magnificè iuuat, quibus ex capite in thoracem fluxio decubitat: quamobrem illis, quibus ex tali occasione assiduò difficilis est anhelitus, valde prodest. Sed & eos qui phthoe laborant, adiuvat: vlcus enim eorum desiccet, vt haud etiam tussiant, nisi in victu peccetur non leuiter, aut ambiens derepente ad intemperiem recidat. H Ac mihi videtur, quod, sicut in fistulis sæpe conspeximus, non in alijs partibus duntaxat, sed in ipso etiam ano, vt citra collyrij immiſsionem, quod sordem & callum auferret, ipso duntaxat desiccante medicamine contraherentur ac clauderentur, ita quoque in pulmonis eueniat vlcere. Siquidem & ipsum ab exiccantibus, iuari medicamentis perinde conspicitur, utique cum mediocre est, non admodum magnum. Itaque vili sunt quidam eorum qui talia habebant, prorsum esse liberati. Ac quidā, qui Roma in Libyam talem ob causam profecti sunt, planè se sanos esse credidere: & sanè usque ad annos aliquot inculpate transigebant: postea verò cum non pari degerent cura et cautione, reditus morbi apparuit. Hos ergo, vt dixi, Bolus armenia euidenter adiuit: Quin & eos qui Romæ agunt, qui assiduò difficultate spirandi discruciantur, magis etiam. Porro in magna hæc peste, cuius eadem facies fuit, atque eius quæ Thucydidis memoria grassabatur, quotquot hoc medicamen bibere, celeriter curati sunt. At quibus non profuit, omnes interiere, scilicet cum nec alio quouis iuuarentur. Vnde colligitur quod ijs duntaxat non fuerit auxilio, qui planè erant incurabiles. Cæterum bibitur ex vino albo, consistentia tenui modicè diluto, si aut planè febri careat, aut leuiter ea teneatur: sin grauius febriat, admodum aqueo. Non tamen calore vehementes sunt febres pestilentiales. Porro de vlceribus reliscari postulantibus quid attinet dicere, quantam vim habeat

A. ibi. c. 417.

A. l. 1. c. 413
fol. 140. b

A habeat bolus hæc armenica: Liberum est autem vtcunq; appellare velis, siue lapidem, vt is qui mihi donauit: siue terram, vt ego, quandoquidem humidis rigari patitur.

EX LAPIDIBVS

EX sponte natis corporibus sunt & lapides, hoc diuersi à nuncupata vulgo terra, q̄ rigari non sustinent. Vires habent partim fm̄ totius substantiæ proprietatem, partim secundum qualitates effectrices. Porro vt hæc inter se differant, superius docui. Nunc autem sermo nobis est de illis quæ secundum effectrices agunt qualitates: in quibus sanè est & vtendi ratio ac methodus. Si quidem, vt ostendimus, facultates quæ proprietatis totius substantiæ ratione insunt, à methodo ac ratione alienæ sunt & per solam noscuntur experientiam. Nam cur hic lapis tacto vulnere, vnde sanguis prorumpit, cursum eius reprimat ac sistat, haud nouimus: At cur lapis quem vocant Hæmatiten, in oculares facultates indatur, haud latet: nam id rationis inuentum est. Si enim in core oculari eum teras cum aqua, donec mellis crassitiæ accipiat, adstringentem facultatem si gustare volueris, percipies. Atqui didicisti q̄ phlegmonas etiānum gliscientes, potissimū quæ contingunt in partibus neruosis, restringentibus medicamentis repercutere oporteat: at vbi haud etiam sanguis in partem affluit, adstringentibus medicinis, quæ digerant adiungere, & sensim ad ipsa sola transire. Atq; de huiusmodi quidem facultatibus in lapidibus differemus, vbi ea prius in memoriam reuocauimus, de quibus fusc locuti sumus in libro contra eos conscripto, qui insultant ijs, qui voce solocissimum committunt. Nam horum quidam λίθον {quæ vox lapidem Grecis significat} masculino genere efferri non sinunt: verū si dicas, ἔμβαλλον τὸν λίθον ἐπὶ τὸν κύνα, non aliter vociferant, q̄ si ipsis in caput lapidis esset coniectus: velut etiam si quis dixerit τὸν δρῦν {quercū sonat} exclamant tanq̄ fuste percussī. Itaq; si quis eorum suauis consueta medicis nomina mutare in animum inducat, dicens τὴν λίθον, τὴν αἱματίτην, & τὴν πυρίτην, & τὴν γαλακτίτην, & τὴν χρίσην, vt curiosus sanè & stolidus damnabitur: nimirum cum veteres ex more oēs masculinè efferant eorum differentias, αἱματίτην, πυρίτην, γαλακτίτην, μελιτίτην, γαγάτην, χρίσην, φρύγιον, ἀράβιον, μευφίτην. Ecōtrario verò τὴν πέτραν foemininè pronunciant, non τὸν πέτρον masculinè. Nā ἀσίαν πέτραν, nō ἄσιον πέτρον noiant λίθον ἄσιον hoc est lapidem asium, ceu est asiæ petrae florem. Porro ex petra cōbusta calcē fieri dicunt. Attamen Heraclides Tarentinus, & alij non nulli non ex quouis lapide calcē fieri volunt, sed ex sola petra, nuncupantes ita per excellentiam solum, qui sit lapidū durissimus. Equidem ego vel ex industria & studio consueui mutatis inuicem nominibus vtroq; modo talia efferre, de quibus inutiliter non nulli rixantur, id re ipsa monstrans, nihil offendi enarrationis claritatem, vtrouis modo quis dixerit. Caterū mirādum non est, qui ignorant enarrationis secundum naturam, aut vnam solam habendam virtutem, ipsam scilicet perspicuitatem ac claritatē, aut certè omnium aliarum primam atq; optimam, si ad tantas vertantur nugas. Itaq; de ijs lapidibus primum differam, qui mortarij aut cotis attritu in liquorem succum ue soluuntur.

Cyperis Pumex.

Caterū si Pumex inter lapides recēseri potest, & ipse eiusdem est facultatis, quod certè ad abstersionē attinet, velut est figulina testa, ac multo magis ea quæ fornacium est. Sed Smiris acrimoniæ quiddā obtinet: Proinde causticis et desiccantibus facultatibus a quibsdā miscet, eis q; quæ curant gingiuas laxas, ac mollitiæ fluidas. Pumex autē si cōburatur, hauderit inferior eosdem ad v̄sus Smire.

De Lapidibus, Qui in Spongijs reperiuntur.

Lapides qui reperiunt in Spongijs, frāgendi vim obtinent, nō tñ ita validam vt lapides in vesica comminuant: & qui id scriptum reliquerūt, mentiti sunt. Verū qui in renibus cōsistunt, rūpunt, velut qui ex Cappadocia conuehantur, quos in Argæo nasci aiunt. Soluunt autē hi in succo colore lacteum: ex quo liquet, q̄ extenuandi vim obtinent absq; vt insigniter excalfaciant.

Ostracites, & Geodes, & Cotis Naxiæ ramentum.

D Porro Ostraciten vocatum lapidem prædicare quosdam audio quasi desiccandi valenter facultatem obtineat, temperatam ex adstrictione & acrimonia: Velut Geodē nomine, pupillas expurgare, et vberum testium q; phlegmonas sanare, ex aqua videlicet inunctum. Attamen Cotis Naxiæ ramentum mammas virginibus suo tempore prohibet tumescere, & puerorum testes, tanquā videlicet particeps facultatis refrigeratoriæ.

Ophites, & Vitrum.

Sed Ophites quem vocāt, lapis, v̄stus extergēdi confringendi q; vim possidet, Ceu etiam Vitrum. Admodum enim ipsum ex vino albo ac tenui epotū lapides vesicæ conterit atq; cōfringit. Verum ipsum in lapidibus quispiam fortè non numeret.

Iaspis Viridis, & Lapis Omphacites, & Hieracites, & Indicus.

Proprietatem non nulli lapidibus quibusdam testimonio suo adscribūt, qualem re uera habet Iaspis virens, nēpe stomachū adhæsi, ventris q; os adiuuans. Ac nō nulli quoq; ipsum anulis inserunt, scalpunt q; in eo draconē radios habēt: velut Rex Nechepfos memoriæ prodidit in quarto & decimo libro. Sanè huius ego quoq; lapidis abūdē feci periculum. Torquē enim ex huiusmodi lapillis confectū à collo suspendi, ita vt lapides os ventris cōtingerent. Apparebant autē nihilo secius prodesse, etiāsi sculpturā nō haberēt, quā scripsit Nechepfos. Porro lapidem Omphaciten

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

vir fide dignus re vera iuuare morfos à vipera suspensum retulit. Sed eiusmodi facultates extra E
vsum sunt methodo constantem: Velut etiam cum Hieracites & Indicus profluentem ex hemor
rhoidibus sistunt sanguinem.

Sapphyrus.

Sed & Sapphyrus ietos à scorpio epotus iuuare creditur.

Aphroselinus.

Et Aphroselinus quem vocant, comitali morbo vexatos: non tamē nos experti sumus. Sunt
verò & alij lapides nō nulli, qui aduersus quēdam suspēduntur. Cēterū quidā, characteres quos
dam & literas inscriptas habent: sicut qui hæmorrhoidibus cōgruit Hieracites, cuius nos fecimus
periculum. Sed non est nunc tempus de illis differere, qui sola experientia fidem habent, ac nō ra
tionali quadam methodo in vsum veniunt: aliud de his tempus erit & locus. Nunc autem ad id
quod ab initio nobis toto opere propositum fuit, reuertor.

Thyites Dioscoridis.

Omniū dictōrum lapidū valentissimam vim habet Is qui ex Æthiopia affertur, quadantenus
subuiridis, vt Iaspis quem vocant. Soluitur hic lapis in succum colore lacieum, gustu verò morda
cem: Ac proinde illum nemo ocularibus miscet facultatibus, nec fluxiones repercutientibus, neq;
vlcera sanantibus: sed tantū ad purgandū, & abstergendum quē pupillā ofuscant absq; phleg
mone, ex quibus sunt cicatrices recentes, quas attenuare potest. Sed & oculorum vngues { Græci
pterygia vocant, } utiq; si non admodum duri fuerint, exterget.

Iudaicus.

Est & Alius lapis viribus valentioribus in Palæstina Syria proueniens, colore candido, specie
concinna, lineas habēs ceu torno ductas: appellitāt eum à loco in quo nasci consuevit, Iudaicum:
Utuntur q; ad velicę lapides, in cote soluentes, & ex aquæ calidæ tribus cyathis potui præbentes.
Sanē in quibus nos experti sumus, proficit nihil, quod ad lapides velicę pertinet: verū ad eos
qui in renibus hærent, efficax est.

A. l. 2. t. 2. ca
394. fo. 139. c. d

Pyrites.

Vnus eorum qui validā facultatē possident, est & Pyrites quē vocant, quo vtimur digerēti em
plastro admisto: adiicitur ei & schistos. Ab hoc medicamine & pus sepe numero, & cōsistētia gru
mosa in spatijs intermedijs musculorū nata, per halitum digesta sunt. Cēterum lapides oēs vbi in
vsum vocantur, admodū vehementer confusi, atq; ad leuorē redacti sint oportet, similiter atq; ea
quæ in ophthalmicas facultates admiscuntur. Etenim nisi pollinis instar cōminuantur, adeo vt in G
profundum corporum, quibus applicant, subeāt, assimiles manēt istis marinis & fluuatilibus are
nis, quæ & ipsę cōmunem oīum lapidū vim possident. Siquidē exiccant tumentē ab aqua inter
cutem carnē, videlicet laborante in eis excafacis decumbente. Non tñ ad aliud quippiam eis vtī
mur tanq; prædictis, puta ad ophthalmicas, & sistentes tum sanguinē tum muliebri profluuiū
facultates: præterea ad glutināda vlcera, cicatrice claudēda, carne implēda. Nam qui ex eis acres nō
sunt, ad hæc oīa sunt viles: velut & acres, quorū posterius mentionē faciā, ad detergendū abster
gendū q; tum detrahendum, extenuandū, digerendū, valenter q; siccandum, & colliquandum.

Phrygius.

Huius facultatis habetur & Phrygius quem vocāt. Sed eo semper vtor, combusto quidem ad
vlcera putrida, id q; aut ipso per se, aut ex aceto, aut cœnomelite, aut oxycrato: ad oculos verò medi
camentum siccum efficiens: quod multi nunc acceptum à me obtinent. Miscuntur ei & alia quę
piam. Dicitur autem de ipso in opere de Componēdis pharmacis. Nunc satis est de generali eius
facultate explicuisse: Validē enim desiccet, habēs quiddam adstrictionis simul & mordicationis.
Dictū verò superius est ea esse omnia optima medicamina, plurimī que vsus, quę mistas in sese
hæc duas facultates habent, nempe repercutientem, & digerentem.

A. ibidē. c. 405.

Ageratus.

Est autē lapis Ageratus quē vocant, quo vtuntur coriarij, facultatis mistæ, adstringētis scilicet,
& digerentis. Sed de sola adstringente considerandum. Iuuat quidem euidenter columellas phleg
mone grauatas: non tamen apertam gustu adstrictionem præferre aut acrimoniam conspiciunt.

A. ibi. c. 409.

Asius.

Est & Alius lapis in Asso proueniēs, quē ob id ipsum Asion cognominant, nō durus vt petrę.
Siquidē color illi est pariter q; consistentia ceu tophi, friabilis & laxus. Innascit ei quiddā farinę te
nuissimę simillimū, qualis in molarū parietibus adherere visit. Appellitāt hoc medicamentū Pe
trę Asię Florē. Est verò & subtiliū partiū, vt sine morfu nimis molles carnes ac fluidas eliquet. Pe
tra verò in qua nascit, tamē vim habeat illi similē, actionis tñ vehementia inferior est. Hoc enim
ea potior est flos, non tantū q; magis colliquet ac digerat, & velut sale condita seruet, sed & quia
hæc præstet absq; vehemēti mordicatione. Habet & salfedinē quandā in gustu hic asię petrę flos:
vt coniectura sit illū nasci ex eo, q; ros quidā ex mari in petram residens, postea à Sole desiccet.

Gagates, & Thracius.

Est & Alius lapis colore atro, qui vbi igni admotus fuerit, persimilē bitumini odorē exhibet:
quem

A quem Dioscorides, nō nulli q̄; alij in Lycia inueniri prodiderunt ad fluuium noīe Gagaten: vnde & ipsi lapidi nomenclaturam inditam dicunt. Ego tñ eum fluuium non vidi, tamen parua nauicula totius Lyciæ littora legerim, quò videlicet quæ in ea sunt inspicerem. Crustaceos verò lapides nigros, & qui in ignē additi exilem flāmam aderent, cōplures ex Cœle Syria asportauī, natos in colle, Mortuum mare quod vocāt, circumdante, quā orientē spectat, vbi & Bitumē est: erat quæ lapidum odor similis bituminī. Vtebar q̄; eis ad inflationes in genu diurnas, & ægrè curabiles, mistis videlicet facultatibus quæ ad hoc symptoma probatæ fuerant: plane q̄; visus sum mihi euidentiore earum facultatē reddidisse. Miscui verò ipsum & Barbaro quā vocant: & palām medicamentum effectū est exiccātius, adeo vt & sinus contraheret, nedum cruenta vulnera glutinaret, ad quæ cōpetere maximè creditur. Est & Alius lapis, cuius meminit Nicander hunc in modum,
 Si lapis vratur candenti Thracius igne, &
 Post madefiat aqua, flagrabit totus: at idem
 Mox oleo affuso penitus restinguitur. Adfert
 Thracius hunc ad nos pastor de flumine, nomen
 Cui Pontus.

B Verū nullus eius in medicina vsus est: neq̄; Nicāder præter graueolentiam, quæ suffitu feras fugat, quicquam ei adscripsit.

Magnites, quæ & Heracleia Magnes.

Aibi.c.463.

Ex "lapidibus vnus est & Magnites, & Heracleia quā vocant, adsimilē Hæmatiti vim obtinēs.

Arabius.

Attamen Arabius quē nominant, lapis elephātī similis, desiccātis abstergentis q̄; facultatis est.

Alabastrites.

Et Alabastrites, vocatus Vnguis, in medicinæ vsū ingreditur combustus. Quidam eum bibendum dant stomachicis.

Smiris.

Sed & vocata Smiris q̄; multam abstergentem habeat facultatem, clarum est vel ex eo, q̄; dactyloglyphi hoc est qui anulos exculpunt, eum in vsū illo vtatur. Quin etiā q̄; dentes puros efficiat, experti sumus.

Hæmatites, Galactites, & Melitites.

A.L.2.c.236,
fol.125.c

Porro "taliū quoq̄; vnus est Hæmatites quem vocant, à coloris similitudine id appellationis sortitus: Sicut & Galactites, quando & ipse in succum solutus, lacti similis conspicitur. Huic aut coloris adsimilem succum efficiens, Melitites à mellis similitudine, quod gustu repræsentat, nūcupatus est. Porro ostensum in quarto horum commentariorum est, q̄; succus omnis dulcis à temperato calore talis eueniat, adstringens verò à frigore. Habebit ergo lapis Hæmatites tantum frigiditatis, quantū habet adstrictionis: Melitites verò calorem temperatum: mediā autem vtriusq̄; temperiem Galactites. Merito itaq̄; ausi sunt medici ocularibus facultatibus lapidem miscere Hæmatiten. Ac solo eo vti possis palpebris exasperatis: si quidē cum phlegmone asperæ sint redditæ, ex ouo ipsum diluens: ac si magis, etiam per decoctum fœnigraci: Sin vero citra phlegmonem, ex aqua. Incipito vero semper à modicè humido, per specillum infundens: vbi autem q̄; vires eius ferat conspexeris, magis ac magis crassum efficies: ac tandem adeo crassum facies, vt specilli cuspidē inungas secundum subiectionem aut euerisionem palpebræ. Hic idem lapis similiter in cote contritus sanguinis expuitioni competit, omnibus q̄; vlcerebus. Porro liccus si ad tantū redactus fuerit lauiorem, vt pollinem tenuitate æquet, reprimat excrecentia. Atque eo nullus solo atq̄; per sese vitur. Ego vero ad ea, quæ dixi, vsus sum, facultate eius ex gustus qualitate cōperta, cum mox experientia periclitari vellem, nūquid rectē coniecissem. Et ipsa quidem oculorum vlcera solus per Dīe cicatrice includit, vt paulo antè comprehensum est attritus, caterū aut affusus, aut inunctus: nam & id experientia exploratum habeo.

Schistos, Ac Multi alij Lapides.

Huic lapidi persimilem vim obtinet, verū infirmiozem, is qui vocatur Schistus: ac post eum Galactites. At Melitites caliditatis etiā non nihil, vt dixi, adiūxit. Vt itaq̄; vnusq̄; leuiter ac sensim ab Hæmatitis facultate recedit, ita ad oculos in vsū ducit: est tñ mitior. Porro mitiora remedia partibus etiā phlegmone afflictis semper gratiora sunt atq̄; iucundiora: caterum liberis iam phlegmone partibus, infirmiora q̄; quæ per sanare valeant. Porro cum lapidibus oibus commune sit vt desiccant: quotquot ex ijs in succū soluti, aut alioqui ad lauiorē triti, nullam euidentē qualitatem in gustu obtinent, hos putandū est esse tū infirmissimos, tū mitissimos, tū minimè mordaces. At qui manifestā gustui qualitatem offerūt, hi pro qualitatis proportionē potentiā possidēt: ac si quidē adstringant, ad cōprimendum, consiringendum, spissandum, & contrahendum: si verò mordicent, ad exalfaciendum, digerendum, & liquandum: medij eorum sunt, qui abstergent citra adstrictionem aut mordicationē. Igitur Hæmatites, Schistos, Galactites, ac Melitites, in succū soluunt, quo posui modo, ad cotē aut mortariū attriti, cum sint & alij lapides in succū solubiles, vt qui in Ægypto nascitur, quo vtuntur ad splendorem linteis conciliandum. Est autem omnium

Quinta Classis.

IIII iij

dictorum

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

dictorum minimè qualitatis particeps, nec adstrictionem, nec morsum, nec absterfionem præ se ferens. Quocirca hoc ipsum duntaxat lapidi huic inest, quod desiccet videlicet. Proinde cerato eum miscentes, ad cicatricem vlcibus inducendam in mollibus corporibus vsurpant. Sed & ocularibus miscetur facultatibus perinde ut modo dictum: at quanto est maiore emolliendi vi quam prædictum, quod nullam videlicet effectricem qualitatem habeat, tanto etiam moderatior est, magis quàm dolorem leuat. Hunc lapidem quidam Moroxum, non nulli Leucographida nuncupant.

METALLICA MEDICAMENTA

Metallica medicamenta appellare medicis mos est, quorum generatio in metallis est, siue sponanea, siue per fornacem facta. Et ad hæc tertio loco sunt quæ rursus homines ex his ipsis præparant quouis modo, velut cerussam, psorycum, sandyca, phycum. Deinceps itaque de singulis dicitur ea serie literarum, quæ quodque nomen incipit. Verum illud primum de omnibus illis dicemus cõmuni præfatione, qualẽ de lapidibus paulo ante habuimus, & his et superius de terra medicaminosa. Nam uti illis id inter sese omnibus cõmune est, ut desiccet, ita metallicis quoque medicamentis omnibus: est enim essentia eorum terrea, secundum elementaris videlicet terræ significatum nunc loquendo. Sed quæadmodum à nobis ex terra figulina, dolia, & fictilia, ollæ quæ, & alia eiusmodi, parantur, per ignem qui torrendo humiditatem absument, durata: eundem in modum in terra, caliditate diutina mista ex terra & aqua, non nunquam etiam aere, substantiam veniente temperate quæ, ac postea deliccante, metallicorum medicamentorum proueniunt consistentiæ. Porro locorum in quibus hæc proueniunt, natura, prout plus minus quæ est frigida, alia plus alia minus congelat ac cogit. Quæadmodum itaque in terræ differentiis plurima inest essentia terræ elementaris, paulum verò aeris: ita in metallicis multum immixtum est ignea substantiæ. In medio eorum sunt lapides. Proinde pleraque metallicorum medicamentorum alia semel aut bis, alia verò frequenter lota, idonea sunt ad desiccantes sine morfu facultates. Atque hæc sunt cõmunes rationes quas de his omnibus præscire oporteat. Deinceps vero dicent quæ cuique singulatim sunt propriæ, id quæ iuxta literarum, à quibus appellationes incipiunt, ordinem,

Halæ Sales.

Sal "Partim ex mari prouenit, in salinis videlicet, quas Græci vocant halas, cuius & inter marina medicamenta mentionem facuri sumus: Partim ex terra effoditur {Græci ὀρυκτὴς ἅλας nominant} cõmuni metallicorum genere comprehensus. Vtriusque vis adsimilis est, siue fossilis sit, siue ex mari oriundus. De quibus & supra verba fecimus libro quarto, eo loco, ubi salsum ac saluginosum saporem ab amaro distinximus. Ac nunc quoque dicitur, quod Aphronitri quidem amarus est & abstergens: Salis vero tanto in abstergendo inferior est, quantum accessit adstrictionis: est enim ex duabus qualitatibus mistus, abstergente videlicet, & adstringente. Porro quod magnopere uterque desiccet, supra monstratum est. Cæterum vtriusque in medio est Nitri sapor.

A.l. 2. t. 2. c. 616.

Armeniacum.

Armeniacum "vim habet extergentem cum leuicula acrimonia, & leuissima adstrictione. Itaque tale cum sit, ocularibus miscetur facultatibus. Et ipso per sese quoque ad pollinis lauorem redactio, ut tunc sicco ad pilorum in palpebris incrementum: nepe ubi præ humorum acrimonia partim excidunt, partim verò nec crescunt, nec alunt. Siquidem depalatis his acrimoniis, in bonum naturæ habitum pars reducit: cuius cum alia sunt munera, tum et producendi, incrementum præbendi, ac roborandi, quod in palpebris sunt piluli: Quippe cum prima & ex profecto, quædam sint medicamentorum opera: quædam vero mediante natura, quæ animantium corpus dispensat, aduntur, velut quæ in ipsis calliblephara nuncupant. Ipsa enim partes oblectas mediocriter desiccant, pilos corruptentem humiditatem absorbendo: quæ ubi abolita est, tum natura ad proprias redit actiones, nimirum sublati, quæ hactenus impedimento fuerant.

A. ibi. c. 618.

Arrhenicum Auripigmentum.

* AP. Arsenice seu Arsenicon.

Arrhenice, "siue Arrhenicum (utroque n. modo appellatur) facultatis est causticæ siue vrentis, id quæ tam cõbuitum, quam vstionis expers. Cæterum id constat vstione reddi tenuiorum partium. Utuntur porro eo ceu adurente ad denudandam pilis partem quauis: verum si diutius inhæreat, nec cuti et ipsi parcat.

A. ibid. c. 49.

Aphrolitrum.

† Aphronitrum à spuma nitri differt. Nitri enim spuma &c.

* Aphronitrum.

† Nitri. † Nitro.

† Aphrolitrum "ab Aphronitro differt. Litri enim aphros hoc est spuma, medicamentum est excitatorium, aspectu triticæ farinæ similis: etenim alba est, non ut aliæ petrae flos, cinericea: Aphronitrum vero farinæ speciem non habet: neque solutum est, sed congelatum et coactum: quo qui in balneis fordes exterunt, quotidie utuntur: ea detergendi facultate, ut non modo sordes extergeat, sed et pruritus sanet, nempe digerendis quæ ipsum excitant saniebus. Non abs re itaque medici ex eo multa digerentium medicaminum præparant. At spuma litri eiusdem quidem cum litro tum naturæ, tum facultatis est, cæterum essentiæ tenuioris. Dictum tamen paulo antè est, Nitrum in medio consistentem habere facultatem aphronitri & salis. Aphronitro enim sola inest vis extergendi, sali vero etiam adstringendi multo magis, ac extergendi.

A. ibid. c. 84.

Gypsum Gypsum.

Gypsum " & ipsum ad cõmunem omnium terrenorum lapidosorum quæ corporum facultatem, qua desiccare dicta sunt, insuper hoc adiunctum habet, quod est facultatis emplastice. Vnitur enim ipsa ad sese, & cogitur, lapidescit quæ macerata. Quamobrem siccis medicamentis, quæ ad sanguinis accommodantur

A. l. 2. t. 2. c. 284. fol. 131. d

A accommodantur eruptionem, vtiliter commiscetur: nam ipsa per sese lapidosa fit coacta ac cōgelata. Proinde rigare diluere q̄ illā excogitauī tenui albo q̄ ouī liquore, quod ad ophthalmias vtile est, admisto quod in farina triticea est pollinis tenuissimi, qui in parietibus molarū residet. Excipere verò, quod sic maceratū est, tenellis leporis pilis, aut qui perinde sunt molles, expedit.

Gypsum κεκαυμένον hoc est Deustum.

Gypsum Combustū non æquē emplasticā vim habet, cæterum tenuiorum est partium, & valētius deliccat. Quin & reperiensorium est, maxime si maceretur oxycrato.

Diphriges.

Diphriges mistā habet tum qualitatem, tum facultatem: habet. n. in sese quiddā & mediocriter adstringens, & mediocriter acre. Quamobrē vlcera rebellium optimū medicamen est. Cōuexi aut & huius medicamēti vim ingētē ex ijs, q̄ i Cypro sunt Soli, vbi metallū ab vrbe abest quasi trīginta stadijs. Proiectū. n. erat in medio spatio adium, quæ antē metallum extructæ erant, & vici q̄ ei subiacet. Cæterū Præfectus ac Procurator metalli, id quod post cadmiā reperiretur, esse dicebat inutile: itaq; abijci non secus atq; vstorum in foco lignorum cinerem. Verum hoc mihi multo vtilissimū factum est medicamentū, tum ad putrescentia oris vlcera, siue per se, siue cum melle cui detracta sit spuma: tum ad anginam, videlicet vbi iam per adstringentium medicaminum auxilium constitit quod influebat. Præterea columellam vbi præsecuissem, ipso solo & statim, & vsque ad cicatricem, sum vsus: ac frequenter exactē occlusam effecit cicatricem tū huius particulæ, tum omnium adeo exulceratarum: sic in vlcerebus omnibus pudendorum, atq; ani. Vtus autē similis est vt in oris vlcerebus: siquidem eæ partes eisdem ferē medicamentis gaudent, nimirum calidæ similiter ac humidæ. Verū hæc oratio iam tractatum de componendis medicamentis attingit. Ea itaq; omiſsa, ad id quod propositum est pergamus, vniuersalem medicamēti cuiusq; facultatē exponētes, sicut sanē diphrigis diximus. Adijciā verò huic, qui de illo habetur, sermoni rem nō modò de Diphrige scitu vtilem, sed & de Lemnia sphragide, & pōpholyge, & opobalsamo, & lycio Indico. Nā etiā nū adolescens didici hæc ita p̄parare, vt à veris natiuis q̄ nihil differre videretur: nā q̄ me docebat ingētī mercede, homo curiosissimus erat, nō in his tm̄, sed & alijs similibus. Itaq; in Lemnū, in Cyprū, in Palæstinā Syriā, eo studio nauigauī, vt medicamētorū istorū cuiusq; vim magnam, quæ in oēm vitam meam satis foret, reponerem. Sed & lyciū Indicū nuper asportatum in Phœnicen cum aloe Indica id temporis commodum accipere contigit, cum à Palæstina iter reflexerem: cum persuasum haberē, eo ipso, q̄ à camelis cum tota sarcina aduectum esset, proculdubio esse Indicū: quod q̄ adulteratum haud nosci ab ijs qui portassent posset, propterea q̄ materia, ex qua id præparatur atq; adulteratur, illis in locis haud nasceretur. Porro satius visum ē mihi, quibus rationibus ea adulterantur, haudquāq; adscribere, vtpote cum homines scelerati i lucro ponant talia posse discere. Nec enim necessarium est cum verorum ac germanorum notis ac indicijs adulterandorum nosse compositiones, cū nihil ad ea discernenda conferat: immo optē, si fieri posset, quæ à maioribus me perperam conficiendorum medicaminum proditæ sunt compositiones, omnes prorsum delere atq; extirpare.

Theion Sulfur.

A. ibid. c. 611.

Sulfur^o omne trahendi vim possidet, est q̄ temperamentum calidū, atq; essentiæ tenuis, adeo vt ad multa venenatorum animalium resistat. Siquidem ego aduersus Turturē marinū, & Draconē, sæpenumero eo sum vsus: & cum id piscatores quosdam docuissem, reuerso post aliquantum temporis magnificē medicamentum hoc commendarūt. Vtus eius est, vt & siccū icui inspergatur, & cum salua mistum: nam cum & hoc excogitasset, ab experiētia cōprobari repperi. Sed & vrina maceratum idem effecturum excogitauī. Docebā enim piscatores medicamenta maxime parabilia: dixi q̄ pulchrē illos & cum oleo veteri, & melle, & resina terebinthina vsuros. Et sanē hoc **D**rum omnium experientia iudiciū præstitit. Quin & psoras, & lichenas, & lepras, non rarò hoc medicamento cum resina terebinthina sanauī. Extergit enim omnes id genus affectus, atque in profundū nō repellit: cum alia multa medicamenta, quæ illos curant, mistam habeant potentiam, nempe vt digerant pariter & reperiunt.

Ios Aerugo.

A. ibi. c. 739.

Aerugo^o gustantibus acrem qualitatem offert, digerens, detrahens, & liquans non tenerā modò sed & duram carnem. Porro suprà dictum est non nullos eius generis medicamenta, Epulotica hoc est quæ cicatricem inducāt, appellare, cum ijs in tenuissimū pollinem tritis per specilli cuspidem cōtigerint vlcera excrementia, ac postridie contracta reperiant: tametsi illos haud lateat, si paulò plus impositum foret, sese vlcus non contractum sed erosum inuenturos: Siquidem colliquat & digerit carnem: cū medicamenta epulotica contrahant, constipent, constringant, & calli in morem illā indurent. Quin & gustum mordicat aerugo, nō tm̄ ipsa vlcera. Quòd si pauculum eius, cerato nō pauco admisceas, id quod ex ambobus mistum est, citra morsum exterget. Dictū verò suprà est de talium medicamentorum natura: tum vt sese quidam fallant, ex talibus compositionibus aut sarcoticam aut epuloticam facultatem medicamentis adscribentes, quibus minime oportet, vtpote cum ipsa id præstare nequeant, verum ea, quæ ex ipsis composita sunt.

Cadmia.

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

Cadmia.

Cadmia fit, ubi in fornacibus æs paratur, nempe tota terra ex qua æs generatur, in fornacibus in altum egerente velut fuliginem quampiam, aut fauillam, utcumq; appellare libuerit. At si non terram, sed lapidem, nuncupare velis, ex quo in fornacibus secernendo partim fit æs, partim cadmia, partim diphryges, nihil sanè retulerit. Sed & in argenteis metallis efficitur simili secretionem siue generatione, aut quomodocunque vocare voles. Quin & ex Pyrite lapide in fornacibus vsto fit cadmia. Ceterum absq; fornace in Cypro cadmia inuenitur: ac iure quispiam illam lapidem nuncupet. Itaq; in Solis paucissimum est reliquum erat cadmiæ, quæ in fornacibus prouenit, quo tpe ego in insula peregrinabar. Verum lapides, qui in montibus & riuis reperiébantur, à metallis Præfecto acceptos, in Asiam Italiam q; portauit ad amicos: à quibus summam inibam gratiam, q se vel maximū munus accepisse dicerent, & quæ alia omni cadmia multo esset præstatiō. Et talem certè meritò quis lapidosam vocet cadmiā. At eius quæ cōbusta est, aliam Botryitin, aliam Placitin medici nuncupant: Botryitin quidē, quæ in æditiōribus domorū, in quibus fornaces extructæ sunt, partibus colligitur: Placitin verò, quæ in inferioribus. Ac liquet sanè botryitin partium esse tenuiorū, crassiorum verò placitin, vtranq; aut vi deliccandi, ceu alia metallica omnia, & lapidosa terrena q; Porro præter deliccandi facultatem mediocriter item extergit. Attamē quæ in fornacibus colligitur, igneæ facultatis aliquid habeat necesse est. Meritò itaq; lauantes eā, medicamentū efficiunt mediocriter tum deliccans, tum extergens absq; mordicatione, vtile ad vlcera carnis impletionē poscentia, & in oculis, & in toto corpore. Porro vlcera magnopere humida aut putrescētia in corporibus impendio mollibus, qualia sunt eunuchorum, puerorum, ac mulierum, eiusmodi cadmia adiuuat: at in durioribus & contentioribus, quæ valentiū deliccant requiruntur. Itaque illud semper memoria tenendū sermonē ad temperatam & mediam excessuum naturā in ijs, quæ ita simpliciter effertur, referendū: puta cū dicimus medicamentū aut vlcera carne implere, aut cicatrice claudere, aut aliud quiduis eius generis præstare: ad quam utiq; & nos respiciētes, delicatoriam leuiter q; absterforiam cadmiæ inesse facultatem dicimus. In caliditatis aut & frigiditatis differentia, temperata quodammodo existit cadmia, nempe neutrum insigniter efficiens.

Cinnabari.

Cinnabari^m modicè acrem facultatem obtinet. Habet verò & adstrictionis quippiam.

Ciseris Pumex.

Pumicē si inter metallica recenseas, calūniabuntur, quibus animus prurit accusandi libidine: & si inter lapides ponas, lapidem esse negabūt: ac multo minus terrā esse concedent: nec marinorū G haberi quodpiā volent. At qui alicubi tñ de illo dicendum est: quippe qui in sarcotica indatur medicamenta, & ea quæ dentes extergunt, partim vstionem non expertus, partim est vstus, qñ videlicet, alijs omnibus cōbustis similiter, substantiæ efficitur tenuioris. Ceterum vstione quiddā acquirat acrimoniæ, quam rursus lotionē exuit. Videri aut poterit splendorem dētibz conciliare nō tñ facultate, sed et asperitate: velut et si smirin, aut testam, aut hoc genus quippiā tritū admoueas, quæ certe & ipsa splendorem afferunt: forte utroq; tum quia detergendi habeāt facultatem, tum quia asperitatem. Eundem in modum Cornua deusta dentes splendidos efficiunt.

Conia Lixiuum ex Cinere.

Lixiuū. Abluto cinere fit lixiuū. Cinerē aut, vstorum corporū reliquias Latini nuncupant, siue natura sint lapidea, siue arborū animalium ve particulæ. Fit ergo lixiuū pro cius, quod cluitur, natura: eius, quidē quod empyreuma siue igneam naturā, habet acerrimā, ipsum quoq; acerrimum est: eius, quod tale non est, et moderatius. Quare & septicis vocatis facultatibus cōmiscetur, utpote causticā caliditatem possidens, sed propter substantiæ tenuitatem citra dolorem adurens.

Cyanos Cæruleus.

Cyanos, siue masculino, siue fœminino genere, pronūciare velis. Hoc medicamē acri facultate H est tū detrahendi {quā καθαρῆτιν vocat} tū digerēdi, potētiorē q Cinnabari. Inest quoq; ei non nulla adstrictio.

Lepis idest Squama, Aeris, & Ferri, & Stomomatis.

Squama^m alia est Aeris, medicamē multo vtilissimū: alia Ferri & Stomomatis. Quidā verò nō minant & Helitin lepida siue squamā. Oēs sanè vehementer deliccant. At inter sese diuersę sunt, tum q alia magis, alia minus, exiccat: tum q alia crassioris, alia tenuioris, sit essentia: quod q; plus minus ve adstrictionis sint participes. Helitis certè principem in deliccando locū obtinet: nā & subtilissimæ omnium substantiæ est: nimirū quæ & æruginis nō nihil assumpserit. Maiorē obtinet adstrictionē Squama Ferri, & hac et maiorem Stomomatis: quamobrem ad cōtumacia vlcera meliores sunt, q squama aeris. Detrahīt & liquat carnem potentius Squama aeris, & hac et valērius helitis. Oēs aut squamæ non instrenuē mordaces sunt. Ex quo clarum est, q essentię ipsarū consistentia nō admodum tenuis est, sed potius crassa. Siquidem inter quæ eandem vim obtinēt, minus est mordax quod est tenuius: ceu superioribus libris ostendimus.

Lithargyros.

Lithargyros^m desiccat quidem, velut alia omnia metallica, lapidea, terrena q; medicamenta, verum omnium id efficit moderatissimē. Et secūdam alias tum qualitates, tum facultates, quodammodo

E

A. l. 2. t. 2. c. 165.
fol. 119. c

A. ibi. c. 627.

A. ibi. c. 231.

A. ibi. c. 49.

A modo in medio est, neq; manifesto exalfaciens, neq; refrigerans. Modica tñ adstringēdi abstergēdi q; facultas ei inest: quamobrē inferior est & sarcoticis medicamētis, quę mediocriter extergentia ostēdimus, & cōtrahentibus atq; adstringentibus. Ceterum ad intertrigines femorum vtilis medela est: qñquidē vtriusq; iam dictę facultatis leuiter est particeps. Iurē itaq; medij ordinis in metallicis habebitur. Proinde ea frequenter vtimur ceu materia, ijs miscētes, quę valentē facultatē obtinent siue mordicantē, siue adstringentē, vel aliud quid faciētem: sicut in liquefcentibus ad pleraq; medicamenta ceram adhibemus tanquam materiam, quia s. & ipsa quodammodo mediū tenet eorum quę valentem facultatem possident.

Nitrum.

A. l. i. c. 34.
fol. 108. h

Nitrum* dictū est suprà in medio esse aphronitri & salis virium. Ceterū vstū ppius ad aphronitriū accedit, vtpotē ex vstione tenuius redditum. Desiccatur itaq; ac digerit: & si intrō in corpus sumatur, secat & extenuat crassos lentos q; succos potentius multo, q̄ sal. Aphronitriū verō, nisi grauis vrgeat necessitas, deuorandū non est, nimirum inimicū stomacho: qñquidem plus ēt litro incidit. Sanē ad fungos suffocantes rusticus quidā vti eo assolet: & semp profuisse probatum est. Ceterū nitro vsto simul & non vsto, & multo etiam magis eius spuma, in talibus vti consueuimus.

B

Melanteria.

A. ibi. c. 47.

Melanteria* ex medicamentis est multum adstringentibus, cum hoc q̄ omnia propemodū adstringentia tenuitate partium exuperet.

Melan Graphicon Atramentum Scriptorium.

A. ibi. c. 689.

Atramentum* quo scribimus, admodum & ipsum desiccatur aqua solutum. Vlcera autem igni ambusta protinus illitum iuuat: at si acetum quoq; habeat, multo magis.

Misy.

A. ibi. c. 47.

Misy.* In metallo Cypri, cuius modò mentionem feci, in montibus Solorū, domus erat ingens, cuius ad parietem dextrum, sed ad nos vtiq; qui ingrediebamur, sinistrū, descensus erat in ipsum metallum: in quo quasdam conspexi in longissimum porrectas veluti zonas alias super alias, numero tres: infima erat ipsius foreos, super quam erat altera chalciteos, suprema misyos. Ceterū id temporis Prefectus metalli his commonstratis, sicut, inquit, nunc aduenis in cadmię fornacię inopia, ita horum trium admirandas has vides diuitias. Itaque ego ingenti eius accepto pondere, primum quidem in Asiam, deinde Romā attuli, & vsque modò habui, elapsis iam annis plus minus triginta. Et forte quadam absolutum fuit hoc opus adusque octauū librū antē annos viginti, nec adiectus fuit nonus, partim q̄ lapides quosdam non dum conspexissem: partim ob alia negocia, quę mihi interea temporis obuenerunt. Nunc autem cum nonum hūc librum ceteris addere pararem, interea forte fortuna mihi accidit res spectatu longē pulcherrima, ac si quīpiam eo studio ac industria magno cū artificio effecisset. Nam cū misy opus haberē ad medicamen quodpiam preparandum, bolum eius accepi, quātū ferē plena manu teneas, qualem sanē consistentiā misy non admodum solet habere: cū in parua frustula diuidatur. Miratus itaq; insolitam eius cōdensationē, bolo fracto extimum quidem misy circumquaq; repperi, eius quod intus erat, velut efflorescentiam. Porro sub eo, inter chalcitin videlicet & misy, quiddam erat medium vergens ex chalcite ad misy, ex dimidio iam commutatum: principio enim bolus fuerat chalciteos, ceterum quod in alto erat, perfectia erat chalcitis, nullam dum alterationem experta. Hoc igitur vbi vidissem, cogitatione repetens & in metallo ita super chalcitin nasci ipsum misy, vt ærugo super æs, in mentem subijt inspicere, quod seruabatur adhuc apud me reliquum ipsius foreos, nunquid & ipsum vllam acceperat mutationem in chalcitin: & quēdam certe apparuit suspicio, vt videretur & ipsum fortē longo tempore mutationē in chalcitin posse accipere. Itaq; mirū non est, tria hec medicamina eiusdem genere facultatis esse, Sori dico, & Chalcitin, & Misy, tenuitate partium & D crassitudine inter se diuersa. Crassissimū enim est inter ipsa sori, tenuissimum misy, mediā vtriusque facultatem habet chalcitis. Adurūt vniuersa hec tria, & escharas quas vocāt efficiunt: attamen etiāli vrant, nō nihil quoq; adstringunt. Ceterū misy admotum corporibus duris minus chalcite mordicat, tamen ea non minus sit calidum: verum id habet beneficio tenuitatis parū. Porro cū vtraq; hec in decoctionibus fundantur, & magis chalcitis q̄ misy, sori tñ non liquefcit, nimirum q̄ lapidosius sit ac vehemētius compactū: sicut rursum misy, quia a cōgenito calore elaboratus est, ac proinde siccus chalcite, idcirco merito quoque agrius liquefcit.

Molibdena Plumbago.

A. ibi. c. 460.

Molibdena* similē Lithargyro vim possidet, tñ a mediā temperie ad frigidius paulū quid recedens: sed nec abstergētis facultatis est particeps. Vtraque autē hec medicamina liquari possūt, ac non vt lapides, & cadmiā, & arena, liquationem respuunt: sed celerrimē liquātur, vbi oleo additum non nihil aceti est: liquātur tñ ēt admista aqua, sed diutissima coctione. Porro ceu in Cypro Cadmiā, quę in montibus & riuis nascitur, accipiebam, quę & ipsa lapidis, vt dixi, species est: ad eundem modum Molibdenam multam cū alijs proieciā lapidibus conspexi in via, quę ad Ergasteria ducit a Pergamo. Vocatur autē Ergasteria pagus quidam, in quo & metalla sunt, inter Cyzicum & Pergamum, quadringentis & quadraginta stadiis distans a Pergamo.

Molibdos.

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

Molubdos Plumbum.

E

A. l. 2. t. 2. c. 12.
fol. 100. b

Plumbum^u facultatis est refrigeratoriæ. Siquidem non modo multam habet substantiam humidam à frigore congelatam coactam q̄, sed & aeream, paucam autem terream. Igitur quod plurimum habet essentia humidæ à frigore coactæ, indicium tibi esto, quod ubi admotum est igni, celeriter fundatur fluat q̄. Quod vero & aere sit particeps, hoc habeto signum. Omnium quæ no uimus, vnicum plumbum tum mole ipsa, tum pondere augetur, si condatur in ædibus subterra- neis aerem habentibus turbidum, ita ut quæcunque illic ponantur, celeriter situm colligat. Tum etiam plumbea statuarum vincula, quibus earum pedes annectuntur, se penumero creuisse visum est, & quædam adeo intumuisse, ut ex lapidibus dependerent crystalli modo verrucæ. Atque hæ probabiles quidem sunt humiditatis eius frigiditatis q̄ notæ, prius quam experiaris. Cæterum sciē- tificæ & certæ per experientiam cognoscuntur. Preparato igitur mortario, simul q̄ pistillo, vtriusq̄ ex plumbo, infunde quemlibet liquorem, ita q̄ terito, ut & pistillus, & plumbeum mortarium succum quendam reddat: id quod ex vitroque constabit, multo erit frigidius, quam liquor ipse fue- rat. Licet autem & aquam, & vinum tenue aqueum, & oleum iniicere, aut quiduis eiusmodi. At si etiam plus efficere succum voles refrigeratorium, oleum omphacinum sit, aut rosaceum, aut me- linum, aut myrtinum. Porro si succo qui proveniet uti voles, optimum habebis remedium & ad F phlegmonas in sede cum ulcere aut rugis, & ad eas quæ in pudendis, testibus quæ, & vberibus cō- sistunt: similiter aduersus cæteras omnes fluxiones incipientes, quæ aut in inguina, aut in pedes, aut in alium quemuis articulum, decumbūt. Sed & ulceribus rebellibus utile est: nam ad cancro- sa, eo vtens virtutem medicamenti mirabere. Quod si celeriter multum succi plumbei voles col- ligere, conare in Sole terere, aut quocunq̄ certè modo aere excafacto. Multo autem utilissimū habebis medicamentum, si adfuso refrigerantium succorum quopiam teras, ceu semperuiui, coty- ledonis, intybi, lactuca, chondriles, psyllij, omphacis, portulacæ. Porro si qua horum non facili in succū soluuntur, velut portulaca, misceto illis aliorum succorum quempiam, velut omphacis: qui & ipse per sese prædicto mortario inditus, medicamentum efficit refrigeratorium longè pulcher- rimum. Quin & in laminam ductum plumbum ipsum per sese, athletarum sese exercitantium lumbis insertitur, vb. Veneris somnijs vexatur scilicet: nimirum haud obscure eos refrigerans.

de Fracturis
com. 3. c. 63. 7.
150. f

Sed & bractea tenuis ex plumbo facta probè ganglio illigata planè ipsum dissipat. Illigabit autē probè quisquis ab Hippocrate didicerit || in ipsam noxam potius firmandū, quam hinc vel inde. Mirum ergo non est, si Plumbum Crematum, ac rursus ablutum, refrigeratis efficiatur faculta- tis, cum ante lotionē mistæ fuerit. Et hoc ipsum medicamē, nempe plumbum combustum, bonū G est ad ulcera rebellia. Vbi verò lotum fuerit multo optimum medicamen est & ad ulcerum imple- tionem, & ad eadem cicatrice obducenda. Cōuenit & Chironæis quæ vocant ulceribus, & cancro- sis, & putredinosis omnibus, tum ipsum per sese, tum medicaminum ad cicatricem perducentium quibusdam commistum, quale est quod ex Cadmia conficitur. Cæterum soluendum est principio, si copiosa sit sanies, quotidie: si minus, tertio aut quarto quoq̄ die. Verum foris spongiam impo- nito aque frigide: quæ si delicet, rursum mergatur. Sed hæc fulius q̄ pro instituto diximus, plu- sculum sermonis affinitate prouectū. At tempus iam est sequentia deinceps persequi.

Ostracon Testa.

Testa^u desiccandi vim possidet, atq̄ abstergendi, maxime quæ ex fornacibus est, q̄ videlicet to- sta sit. Quocirca emplastrus, quam vocat Hephestiada, ex hac præparata videlicet, optimū est me- dicamen inducendæ cicatrici.

A. ibi. c. 709.

Pompholyx, & Spodium.

Pompholyx^u fit & in eris fornace, velut & Cadmia: fit q̄, & dum in fornacibus cadmia vritur, ut in Cypro. Cum enim Præfectus ad æris fornacem instructas res non haberet, præcepit ex ipsa Cadmia præparari, presentibus atque inspectantibus nobis, Pompholyga, videlicet minutis cad- H miæ fragmentis in ignem cōiectis, qui ante grarium iacebat follē. Camera q̄dā erat incurua, nus- quam pertusa, sed integra, quæ egestam ab vsta cadmia fauillam excipiebat: quam ubi collegis- sent, habebant pompholyga. At quod reflectens in pauimentum recidebat, Spodos est quā vo- cant: quæ plurima ubi es in fornacibus vritur, colligi assolet. Quidam eam Spodium neutro ge- nere pronunciant: Cui videtur similem habere facultatem, quod vocant Antispodium. At ego illo vsus sum nunquam, cum largè mihi semper pompholyx suppeteret. Nec enim quisq̄ ubi hæc adlit, spodio uti velit, nedum antispodio. Est autem Pompholyx medicamentum propè omniū quæ citra morsum deliccant, si elota fuerit, præstantissimū: Quamobrem ad ulcera cancrōsa ido- nea est, & ad alia omnia maligna. Itaq̄ inditur collyrijs quæ ad oculorum imponuntur fluxiones, quæ q̄ bullas siue pustulas in eis natas aut ulcera curant. Præterea ad pudendorum ac sedis ulcera optimum est medicamen, nimirum sine morsu, ut dixi, desiccans. Sed nō est huius negocij, in istis diutius immorari.

* A. l. scirrhosa.

Sandarace.

Sandarace^u vrentis est facultatis, ceu Arsenicum quod vocant. Merito itaq̄ eam digerētibus fa- cultatibus commiscet, atq̄ extergentibus.

A. ibi. c. 48.

Sandix.

A

Sandix.

Sandix qua sit facultate prædita, in sermone de Psimythio explicabitur.

Scoria.

A. ibid. c. 231.

Scoria omnis resiccatoriū medicamen est, potissimum aut Ferri. Siquidem ad leuorē redigēs ipsam in aceto quā acerrimo, postea q̄ decoquēs, ad aures, quæ longo iā tpe pure fluxerūt, ea vtor pro medicamento maximè exiccatorio, adeo vt mirentur qui præparantem me vident, & ante rei periculum fidem non habeant aures tale posse ferre medicamē. Porro Argenti scoriam propriè helcysma appellāt. Verū emplastris quibusdam, quippe quæ resiccatoriæ facultatis sit cōmiscetur.

Stimmi.

Stimmi. Ad facultatem desiccantē adiunctā habet hoc medicamen adstrictionē. Quāobrem & ocularibus medicinis commiscetur, & illis scilicet, quæ conformantur in collyria quæ vocant: & siccis, quæ utiq̄ sicca collyria cognominant.

Stryteria Schiste, & Strongyle, & Hygva. Alumen Fissile, Rotundum, & Humidum.

A. ibi. c. 68.

Stryteria. Huius medicamenti nomen ab adstrictione deductū est: nā adest illi vehemētissima. Ceterū cū sit crassarū partiū, tenuiorū quodāmodo partiū est, q̄ vocatur Schiste, hoc est fissilis. Proxima est Strongyle, & Astragalote. Admodū aut crassarum partiū est tū Liquida, tū Placites, & Plinthites appellata. *Titanos Calx.*

A. ibi. fol. 117. a

Calx. Viua quidem {quæ Ἀσβεστος Græcè dicitur} vehemēter vrit, adeo vt crustas efficiat: Ex tincta verò protinus ēt crustam molitur & ipsa: at post diem vnū aut alterū minus vrit, minus q̄ inducere crustā potest: at verò temporis progressu prorsum nec crustam quidem gignere queat, tamen etianū calfaciat, carnem q̄ liquet. Porro si Lauetur in aqua, suā mordacitatem exuit, efficit q̄ nūcupatā Græcè Κορίαν idest lixiuiū. At ipsa absq̄ morfu resiccat: ac si bis ter q̄, aut amplius, abluta fuerit, planè mordacitatis expers constituitur, ac strenuè absq̄ mordacitate exiccat.

Hydrargyros.

A. l. 2. c. 46. fol. 102. c

Hydrargyros nō est ex spōte nascētibz medicamentis, sed ex ijs q̄ preparantur, velut psimythium, erugo, psoricū, lithargyros. Nullū aut eius feci piculū, neq̄ q̄ interimat si deuoretur, neq̄ vbi foris admota sit.

Phycos.

Phycos cuius nam sit facultatis, vbi de Psimythio agetur, exponam.

Chalcanthos Atramentum Sutorum.

A. ibi. c. 47. f. g. Et c. 167. folio. 191. f

Chalcāthos. Fortè fortuna & chalcāthū in chalcitin trāsire conspexi. Asportauī. n. ex Cypro & huius medicamenti ingentem copiā. Extimum eius omne post annos plus minus viginti chalcitis effectū est, intima eius parte chalcāthi speciem seruāte. Quamobrē & vsq̄ in hūc diem quod sic mutatur asseruo, obseruās dum ad imum vsq̄ volūtētibz annis pcedat mutatio, ceu chalcitidis quoq̄ in misy: vt est antè positum. Ceterū mirari subit de hoc medicamēto, quo pacto vehemētissimæ adstrictioni admista est caliditas non instrenua. Cōstat ergo q̄ omnium maximè condire seruare q̄ carnes humidas potest, nimirū caliditate humiditatē absumens, atq̄ adstrictione substantiam contrahens atq̄ constipans: hoc. n. opere nō nihil ēt humiditatis ipsius exprimit. Constringit verò, desiccāt, atq̄ contrahit in sese totius substantiam carnis. Porro quo tpe in Cypro diuersabar, hunc in modum medicamentum hoc colligi conspexi. Domus erat magna quidem, sed humilis, ingressui in metallum obiecta. Ad parietem autē domus sinistrum, qui erat ingredientibus dexter, effossus erat specus in continentem collem, ea latitudine, vt tres sese viri in eo contingerent: tāta verò altitudine, vt viro summè p̄cero recto liceret incedere. Specus hic decliuus quidē erat, non tamen præceps ac præruptus. Porro ad finem eius quasi in stadium porrecti, lacus erat aquæ viridis & crassæ tepidæ plenus. At in toto descensu calor similis qualis in primis balneorū adibus percipitur: quas, q̄ in eis corpora præmolliri soleāt, Promalacteria appellare consueuerūt. Aqua verò quotidie guttatim ex pertuso colle destillans, quatuor & viginti horis totius diei ac noctis colligi assolet ad amphoras Romanas quasi octo. Eam vincti quidam in piscinas quasdā quadratas ficiles, in domo ad ingressum posita sitas efferebāt, in q̄bus paucis diebus concrebescere fiebat q̄ chalcāthus. Mihi verò vbi ad terminū effossi specus descēdissem, vbi videlicet tepida hæc viridis q̄ aqua colligitur, aeris odor visus est suffocās, & toleratu difficilis, chalcitin aruginē q̄ redolēs. Et aqua quoq̄ gustu præferebat qualitātē eiusmodi. Eapropter & nudi, & cū summa festinatione amphoras vincti exportabāt, nec longiorem illic morā perferre poterant, sed celeriter recurrebant. Accensi autē erant mediocribz in specu interuallis lychni, qui nec ipsi lōgo tēpore durabant, sed celerrimè exstinguebantur. Hunc ergo specum pederentim excauatum multis annis ab ijs tunc didici. Hæc enim, inquebant, aqua viridis, quam vides ex colle in lacū manantem, sensim se ipsa minor effici assolet. At vbi, propè adest vt desinat, rursus vincti, quod cōtinens est ipsius collis, perfodere pergunt. Euenit q̄ aliquādo olim, vt subito, quicquid perfossum esset, cōcideret, oēs q̄ ad vnum occideret, ac totā viam corrumpere. Id vbi fit, alio foramini fodiendo eousque insistūt, quoad rursus aqua illis adsit. Hæc habui quæ tibi de Chalcātho exponenda censerem, & sanè fortasse non necessaria, ceterū quæ scire præstaret, quàm ignorare. Memineris autem, q̄ ad sinistram manū ingrediētibus cōspectum nobis dixerim metallū Soreos, chalciteos, & misyos:

vt

DE SIMPL. MEDIC. FACVLTV.

vt ex ijs cōiungere liceat aquā pluuiā totius collis terrā illā colluere atq; abluere: ex qua sponte qui-
dē fiebat Sori, misy, & chalcitis: & per fornaces Æs, cadmia, pompholyx, spodium, & diphryges.

Chalcitis.

Chalcitis. Dicitum de ea est in sermone de Misy: Nunc autem tantū dixisse sufficiat, q̄ mistas habeat adstringentem acrem q̄ facultates. Caterum vincit acris, vt quā adeo est vehemens, vt car- nem vr̄at, vocatā q̄ escharam efficiat. Vstū hoc medicamen minus quidem mordicat, caterū non minus deliccāt: sed & adstrictionis non parum amittit. Itaq; vnde quaq; melior est chalcitis vsta q̄ quā non vsta est, nempe partibus tunc quidem tenuioribus, ceu alia omnia combusta, ve- rūm haud assumpta acrimonia, velut in alijs multis accidit. Didicisti porro, q̄ Vsta omnia si la- uentur, moderatiora reddantur, minus q̄ mordacia.

Chalcos Cecaumenos Æs Vstū.

Æs vstū habet & acrimoniā quandā: sed & adstrictionis est particeps. Proinde si Lauetur pul- cherimū est medicamē inducendæ vlcibus cicatrici: Quanquā id ipsum prestare & antequā la- uetur possit, potissimum in carne duriore: alioqui in molliore commodius est quod ablutum est.

Chalcu Anthos Flos Aeris.

Flos Æris facultatis est tenuiorū partiū q̄ aut Æs vstū, aut Squama. Merito itaque ex eo factis F-
collyrijs extergunt auferunt q̄ palpebrarum magnas asperitates, quas vocant sycosis.

Chryfocolla.

Chryfocolla. Et hoc medicamentum ex ijs est, quā carnem liquant: non tamē valenter mor- dicat, quanquā sit facultate admodū digerente desiccante q̄. Igitur quidam id modō quod in me- tallis inuenitur ita nominant: Alij verō id quod in æreo mortario pistillo q̄ æreo ex pueri vr̄ina præparatur: id quod quidam inter æruginum differentias numerant. Satiū verō est ipsum præ- parare tēpore æstiuo, aut certē aere prorsūm calido vr̄inā in mortario terentes. Præstat autē æs, ex quo mortarium pistillum q̄ conficias, rubrum sit: nam quo æs mollius fuerit, eo plus circūagēdo pistillo deteritur. Hoc medicamentum aptissimum est vlcibus contumacibus, tum per se, tum alijs mistum, vt in opere de componendis medicamentis referetur. Nūc autem id nouisse sat est, q̄ quanto plus q̄ Chryfocolla metallica desiccāt, minus q̄ mordicat, tanto etiam ipsam excellit te- nuitate partium. Ipsam tamen chryfocollam illam si vras, multo tenuiorem efficies.

Psmythium Cerussa.

Psmythiū. Et hoc medicamē testimoniū p̄bet modō dictæ facultati. Nā si ex acri aceto solua- tur, gustu tñ neq; acre erit, neq; mordax, neq; digerens, sed emplasticum & refrigeratorium: facul-
tatis ærugini dissimillimā, tametsi & illa conficiatur aceto æs dissoluēte. Porro cerussa Adusta in Sandyca quam vocant, transit, medicamentum se ipso tenuius, nō dum tñ exalfaciens. Phycos, autem seruata cerussæ frigiditate tenuitatem partium assumpsit, vt per eam in profundum altū q̄ corporum, quibus admouetur, vis eius penetrare valeat.

Pforicum.

Pforicū. Cōficiū hoc medicamē dupla chalcite admista lithargyro: añ tñ vtrifq; aceto acerrimo solutis, sic q̄ in ollā nouā cōiectis, quā fimo æstate media diebus quadraginta obrutā sepelies. Hoc medicamē desiccatoriū ē magis, simul q̄ minus mordax chalcite, ac nimirū p̄tibus ē tenuioribus.

GALENI DE SIMPLICIVM

MEDICAMENTORVM FACVLTATIBVS

LIBER DECIMVS

ARGVMENTVM LIBRI

Agit de Facultate Simplicium Medicamentorum, quæ
Ex Animalibus sumuntur.

Aduersus Xenocratem, & ceteros, qui, Quæ mortalibus damno, & dedecori sunt, Scriptis prodidere.



Nihil eorū, quæ nūc dicenda veniūt, magnopere iuuare poterit eos, qui ea quæ principio huius tractatiōis, primis videlicet qnq; libris, tradita sūt, ignorāt: imo quædā fortassis noxæ occasio erūt illi, qui, cum scriptis hic medicamen- tis vti volet, rationē tamē ac methodū non habeat. Tanquā itaq; illa didice- ris, ita tecū verba faciā repetita totius tractatus summa. Ostēsum est medica- menta, q̄ effectricibus nominatis qualitatibus agūt, nēpe caliditate, frigidita- te, humiditate, & siccitate, harū mistiōe effici acerbā, austera, salsa, saluogino- sa, amara, acria, dulcia: Præterea extergentiā, reperiētentiā, attrahentiā, emolliē- tiā, vr̄etiā, septica, crustica: Ad hæc secundū alias actiones magis speciales sarcotica, synulotica, glu- tinatoria tū fistularū tū vlcis, aut carnis excrescentiā detrahentiā. Ostēsum quoq; est, quo pa-
cio

Actio vniuersalis facultas experientia vnica demonstratoriè inueniatur, nec ea vulgari & quauis, sed quæ cum dictis adhibeatur limitationibus: Caterū inuenta semel facultate vniuersali, nulla insuper experientia opus esse ad particulares actiones, nisi ad confirmationem eorum quæ ratio repperit. Sic ergo nūc quoque iudicium faciamus propositæ materiæ, quæ est ea, quæ ab animantibus accipitur. In tribus enim libris, qui insequuntur quintū, nempe sexto, septimo, & octauo, materiam ad plantas attinentem exposuimus, non sanè omnem quæ vniuerso terrarum orbe reperiatur, sed quantum nobis experiri eius datum est. In superiore verò, qui est totius operis nonus, eam quæ versatur in terrosi ac lapidosi corporibus, enarrauimus. Reliquum porro nunc est, ut eā quæ ab animalibus sumitur materiā, persequamur. Deinde restant quæ in mari, paludibus, aut omnino in aqua nascuntur, quæ quidem neque plantæ, neque terra, neque lapis, neque animal, sunt. Ea planè paucissima sunt, & vltimo loco scribenda, postquam videlicet quæ ad animantium corpora pertinent, absoluerō. In quibus is doctrinæ ordo seruabitur, qui in nomenclaturarum primis visitur literis. Porro sicut in plantarum materia etiam de succis, qui ex ipsis fiunt, disserui, ita nunc quoque non solum edocebo solidarum in animalibus partium facultatem, sed eorū quoque quæ in ipsis continentur, puta pituite, bilis, sanguinis, vrinæ, stercoreis, & similibus. Igitur in

B his quæ superius sunt dicta, haud ita multa particularia eorum, quæ in materijs conscripta sunt à medicis, ignota mihi fuisse: verum operam dedi, ut ipse per experientiam facultates eorum cognoscerem. Quod siquid ignorabam, planè nec de illo quicquam conscripsi, haud credendū alijs censens ne de vno quidem eiusmodi, quod certum habeam non nullos multa mentiri. At in præsentī materia non ita se res habet. Ingenue siquidem fateor complura esse tum partium, tum liquorum, in animantium corporibus comprehensorum, quorum nullius eiusmodi feci periculum, cuiusmodi quidam scriptum reliquerunt. Siquidem quædam eorum abominanda detestanda quæ sunt, quædam etiam legibus vetita: de quibus haud scio, quo pacto scribere licuit Xenocrati, hominī non olim nato, sed proauorum nostrorum seculo, cum Imperium Romanum hominibus vesce vetuisset. Atque ille sanè, tanquam ipsemet fuerit expertus, magna profectò fiducia scribit, quos nam affectus curare valeat comesum cerebrum, aut carnes, aut iecur humanum: quos autem capitis, suræ, & digitorum ossa, partim vsa, partim vsionem non experta: quæ denique & sanguis. Sed hæc sanè tametsi contra leges sunt, non tamen sunt fœda atque abominanda: At potio sudoris, aut vrinæ, aut mensium mulieris, abominanda detestanda quæ est: atque horum in primis sterco: quod tamen scribit Xenocrates, si oris ac gutturis partibus inungatur, & in ventrem deuoretur, quid præstare valeat. Scripsit etiam de aurium sordibus deuorandis. At ego ne has quidem vnquam deuorare sustineam, ne si in totum quidem morbo deinceps liber degerem. Atque his etiam magis abominandum puto sterco. Est quæ probrum grauius hominī modesto audire *πορφαγόν* hoc est stercoreuorum, quàm fellatorem aut cinædum. Et inter fellatores magis execramur qui phœnicisunt, quàm qui lesbiantur: Cui non dissimile mihi videtur perpeti, qui menses bibere sustinet. Itaque horum nemo periculum facere non auersabitur hominū certè secundū naturam habentium: neque insuper eorum, quæ tametsi modestiora videantur, tamen etiam fœda sunt, nempe partem aliquam corporis stercore inungi perpeti, ob affectum scilicet si quem patiatur: Aut humano semine, id quod *γενόν* hoc est genituram, appellare solet Xenocrates: summaque diligentia distinguit, quæ nam ipsa genitura sola illita iuuare queat, quæ verò vbi ex sinu mulieris post coitum viri effluerit. Nam ingēs sit medicamentorum penuria oportet, vbi quis quod chimethla siue perniones curet, viri semen conquirere cogitur, quod in mulieris congressu intus non remansit, verum effluxit, atque effusum est. Atque pleraque sanè eiusmodi materiæ species est in his, quæ de utilitate ab animalibus percipienda ab illo sunt conscripta. Siquidem non quā vim habeat epota vrina, aut deuoratum illitum ve oris partibus sterco duntaxat hominis, enarrat, verum etiam aliorum cuiusque animalium, atque alia etiam non pauca rarorum & paratu difficile, puta cum Elephantū aut equi Niloi meminit. Nam bestiam seu feram regiam, quam vocant Basiliscum, ne videre quidem vnquā contigit: & si vera sunt quæ de illa referuntur, periculosum etiam est vel propè accedere ad hoc animal. Non dissimilia his quæ à Xenocrate scripta sunt, & ab alijs prodita sunt de animalibus: ex quibus & ipse Xenocrates pleraque excripsit. Nam vnde illi tantarum talium quæ rerum experiundarum fuisset copia? Sanè Rex quondam noster Attalus cum ambitiosissime talia ad experientiam conquireret, tamen pauciora scribere conspicitur. Porro quidam Ateurisi eandem tractationem commendans, enarrandam mihi tradidit: ceterum iudicio meo nec illa quidem etiam ita ab illo conscripta est, ut omnia ipse fuerit intuitus, oculis quæ suis præsens conspexerit. Proinde nec ego basiliscorum, aut elephantorum, aut equorum Niloorum, neque alterius cuiusquam, cuius ipse periculum non fecerim, meminero. Porro *φίλων, αγωγίμων, θεραπευτικῶν, & μισθίων* vocatorum (ex industria enim ipsa illorum nomina recensui) planè nec si abundè illa scirem expertus, mentionem facere in animum inducerem, sicuti nec lethalum medicamentorum, aut ut ipsi vocant, *παθοποιῶν*. Nam illa sanè ridicula sunt, constringere ac vincire aduersarios, ut in iudicio nihil possint eloqui, aut grauidè abortum afferre, aut ut ne vnquam deinceps concipiat efficere, & quæcunque eius sunt generis. Sanè horum

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

rum pleracq; vel antequam facias periculum, scire licet esse impossibilia: quædam verò possibilia, E
cæterum vitæ mortalium noxia. Itaq; ego, per deos, admiror, qua cogitatione, quò ve consilio, ad
ea scribenda quidam accesserint. Nam quæ viuētib; dedecori atq; ignominia sunt prodita, quo
pacto sibi post mortem gloriæ fore sperarunt? Itaq; si regia potestate præditi in hominibus mortu
condemnatis illa experirentur, nihil graue committerent. At ubi totam vitam degūt priuati, atq;
eiusmodi potestatis expertes ad ea scribenda accedūt, duorum alterū necesse est: Aut enim si ex
perti non sunt, ea conscribūt quæ ipsi ignorant: Aut si experti sunt, hominum omnium sunt vel
impijssimi, qui experiendi gratia hominibus innoxijs perniciofa medicamenta exhibent, ac non
nunquam etiam honestis ac probis viris. Nam quidam medicis duobus ad vnguentariorū offi
cinam conspectis, attulit ad eos mel, venditurus scilicet. Illi ubi gustassent, de pretio disceptāt. At
hic tanquā illi parū offerrent, properè subducit sese: verū medicorum neuter seruatus est. Itaq;
non minus qui scribunt, q̃ qui talia perpetrant, imino magis etiam, odio digni sunt: quanto s. mi
nor iniuria ac scelus est, quod solus facias, q̃ quod cū multis. Deinde cum eo, qui perpetravit, mo
ritur & malorum theorematū experientia: at eorū, qui scriptis prodidere, immortalis est malitia
arma prauis hominibus suppeditans. Iam igitur nos dicamus de ijs rebus, quæ humano generi
sunt vtilis, vtiq; quarum fecimus periculum. F

DE HUMIDIS QUAE SVNT IN ANIMALIBVS HAEMA SANGVIS

Sanguis. Intelligēdū videlicet est animalis secūdū naturā habētis: nā is re vera sanguis est. At
Smelancholicus, aut picrocholicus, aut pituitosus, aut serofus, aut putridus, sanguis est mistus, ex
languine s. vero, & ichore, sanie ve illi permista. Tum ipsius quoq; sanguinis naturalis in quoq;
aiali alius liquidior, alius liccior: hic magis, ille minus calidus: nam frigidus sanguis nullus est.

Sanguis Suillus.

Sanguis Suillus humidus est, & minus calidus, humano maxime temperie similis: siquidē &
carnes suum humanis sunt similes. Comperti enim sunt hospites & coqui complures, qui huma
nas carnes pro suillis venderent: tametsi, qui eas edissent, nullum omnino discrimē percipere po
tuerint. Quin & ipse narrantes audiui viros fide dignos sese in diuersorio publico ius eliasse de
licatum cum carnibus suauissimis: cæterum, cū iam penē saturi essent, inuenisse digiti partē an
teriolem, quæ videlicet ad vnguem est: quo perculli, ac metuentes eos, qui agebant in diuersorio,
ne s. se quoque vorarent, ceu ei rei assueti, protinus quidem illinc exiere, ac vomitu redditis quæ
ederant, ita iter denuo ingressi sunt. Sed & in ipso facinore homines macantes deprehensos nō G
ita multo post referebant. Itaq; iure quispiā existimet suillum sanguinē humano esse simillimū:
ex tali enim sanguine tum prima constat generatio, tum postea nutritio carnibus. Itaq; quisquis
sanguinem humanum morbo alicui vtilem esse ait, in suillo primum id comprobet: ac si non eā
dem, saltem similem, actionem ostendat. Nam etsi aliquatenus inferior sit humano sanguine, sal
tem assimile quippiam efficit: quo cognito, ab humano pleniorē fore vtilitatem sperabimus.
Nam si ne paulum quidem promissis respondeat, nō erit cur in humano experiri oporteat: quip
pe similia efficere posse similia experti sumus. Nam columbæ sanguinem Pergameni nostri, atq;
adeo per totam ferè Asiam qui capitis ossa fracta perforant, in crassum cerebri inuolucrum ef
fundere assolent. Postea quidā cū haberet palūbum, nec esset ad manum columba, vsus est palum
bi sanguine, & tñ seruatus est homo ille. Et alius turturē eūdē ad vsum applicās nihil hominē læ
sit. Siquidem similibus ad eosdem vti affectus, ubi quæ antea exptus sis non adsunt, vnum est ex
confessis, & experientia comprobatis. Et humanæ vitæ pleracq; hunc in modum peraguntur.

Hæma Peristeras Sanguis Columbae.

Porro qm̃ exempli vice mentionē feci sanguinis columbini, nihilo deterius fuerit iam ipsum
sermoni proponere. Siquidem eo ad hyposphagmata in oculis consistētia quidam vtuntur, proti H
nus videlicet fumentes qui ex animante macata esiliūt. Nam calidū in hyposphagmata affundūt
venis ad alarum exortus incis, quò videlicet ad multos vsus idem animal sufficiat. Alter, pullorū
tenerorum extractis pennis (sunt autem hæ molles, & fistulas humore plenas obtinent) eum ip
sum humorem exprimebat, oculis instillās. At alijs medicis cōtrouersia fuit, pulli ne sanguinem
an columbæ adultæ, meningi affundere oporteret: & an maris, an foeminæ. Ego verò sexcentos
nouī eorum, quibus Romę perforata fuere capitis ossa, nec quicq; ab vsu rosacei citra columbæ
sanguinem, offensos. Verū id calidum sit æquē atq; columbæ sanguis, necesse est: ac fortassis ipsa
tñ caliditatis in contactu moderatione est utilis, haudquaq; eximia & incognita facultate. Adest
illi quoq; bona facultatis temperatura. Sed quid hoc? Nam & hæ rosaceo inest, præterq; q̃ leui
ter adstringat. Itaq; melius inuenire nihil possis in capite perforato, q̃ vt rosaceo probo vtare. In
dicaui autem suprā, quo pacto oporteat rosaceū, de quo queri nō liceat, præparare. Sed & colly
ria sunt plurima, quæ medeantur hyposphagmatis, & maxime quod plurimam recipit myrrham,
quale est quod à Damocrate compositum est, quod vocant Diasmyrnon. Secundo sunt quæ ha
bent multum thuris. Post quæ sunt quæ ex croco constant. Quin & foenigraci succus sanguine
columbino in hoc vtiq; præstat. Quid ergo moramur aut columbos, aut palumbos, aut turtures,
cum

A. l. 2. r. 2. c. 601
fol. 163. f

A. lib. 1. r. 1. c.
292. a

A. lib. c. 602.
fol. 163. g

A cum omnium medicamentorum paratu facillimū habeamus fœnumgracum, tum memorata collyria in promptu seruemus: Ad eūdem modum nec noctuæ sanguine ad difficulter spirātes egebimus: quanquam sunt qui non sanguinem bibendum exhibeant, sed ipsam iubeant coctam, edere ex simplici iure. Ac sanguinem quidē alij aque, alij vino, instillantes exhibēt. Et fuit etiā quidam qui immodicē hunc sanguinem apud mulierem assiduē difficulter spirantem extolleret, & cum rogarem, qualem ab eo sciret curatam spirandi difficultatem, ne id quidem nouerat q̄ plures essent. Et sanē in muliere quidem est vsus, verūm profuit nihil.

Hæma Nycteridos Sanguis Vespertilionis.

A. ibidem. f. Sicut nec Sanguis Vespertilionis: quem scribunt quidam, si virginum vberibus illinatur, plurimo ea tpe ab extuberatione tueri. Est autē & ipsum falsum, veluti & q̄ enasci sub alis pilos prohibeat: Id quod rectē Xenocrates tanq̄ mendacium calūniatus est. Verūm ipse censet post illius vsus aut chalcanthon inspergendum, aut semen cicutæ. Ait q̄ vbi hoc factum erit, aut prorsum pilos non prodituros, aut certē lanuginosos: ceu leue atq̄ exile medicamentum adderet cicutæ semen, ac nō per sese sufficiat strenuē refrigerare partes quibus fuerit impositum. Alij verō & puerorum pudendis sanguinē vespertilionis illinunt, credentes ita diutissimē eas partes a pube seruari posse immunes. Atqui non oportebat putare diutissimē, verūm perpetuō fore tales: velut existimant & alas. Ergo ex refrigeratione partis vehemēti eiusmodi quippiam posse contingere nō est à ratione alienum. Non tñ adeo frigide facultatis est vespertilionis sanguis: nam in totum nullus sanguis frigidus est. Sunt enim non pauci qui pro alimēto habent sanguinem leporis, gallinarum, & caprarū: verūm leporis & gallinarum complures etiā eorū qui vrbes incolunt: at agrestes ventres suos caprarum sanguine vnā cum adipe implent, vti Homerus ait solitos sponso Penelopes. Sed nunc nō est nobis sermo de ijs, quæ ciborū loco sumuntur, sed quæ adhibētur vt medicamenta. Sed quædā sunt, vti suprā posui, alimenta simul & medicamenta: quorum hic faciendā mētio est quatenus medicamenta, non quatenus alimenta. Etenim qui aqua inter cutem laborantibus Sanguinem Caprarum cū melle exhibuerunt, eū vt medicamen, non vt alimentū, obtulerunt: tum qui ad dysenteriam tosto eo, & ad ventris fluxum, sunt vli. Videtur q̄ mihi quispiam crassam eius essentiā & terreā cū caliditate exiccatoriam esse suspicatus, ad hūc vsus perductus. Porro Galli Gallinæ q̄ sanguinem cum ab ipsis ad meningum hemorrhagiam scriptum inuenissem, nec magnum quippiam effecturum speraui, nec ausus sum experiri. Simul enim metuebā, ne curiosus & stolidus viderer, si tantis tam q̄ probatis remedijs semel præteritis, confiderē sanguinem C gallinaceum illis plus posse præstare: Simul verō cū eiusmodi sanguinis eruptio admodum sit periculosa, non est mihi visum fore honestum, si ad ea quæ inexplorata essent, trāsissem: siquidem periculosa est eiusmodi experientia, & quæ solis Regibus in homines noxios meritō vsurpatur.

Desperabam verō et de sanguine Agnorū, quæ quidā comitali morbo mederi potū scripserunt. Itaq̄ nec hunc quidem etiā experimēto iudicare sum ausus. Quod si quis experiri volet, certō scio dānabit qui talia scripserunt. Si quidem quæcunq̄ potu iuuant epilecticos, ea facultatis sunt incidētis: at sanguis agninus omnium minimē talis est. Porro quod de Hædorū sanguine prodidit Xenocrates, cū existimassem non esse impossibile, ratus ob acetī mistionem posse aliquid efficere, persuasi cuidam in agro degenti, ac rei rusticæ quidem studioso, cæterum primis disciplinis erudito: retulit q̄ se eo in duobus sanguinem expuentibus vsus, non nullā vtilitatem expertum. Cæterum illorum neuter, ex ijs, quæ mihi narrabat, neq̄ ex arteria, neque ex larynge aut pulmone, expuisse visus est. Xenocrates igitur in primo libro de percipiēda ab animantibus vtilitate, vbi de hædis differit, scribit in hæc verba. Ad hæmoptoicos hoc est sanguinem spuētes, admodum utile. Oportet autem {hædorum sanguinē} non dum concreto mensura semicotyly tantundem admiscere acetī acris, id q̄ feruēfactum trifariā partiri, & in singulos dies singulas partes exorbe-
D das præbere. Itaq̄ liceat tibi fortē fortuna in agro deprehenso, vbi reliquorum fuerit inopia, hoc vti, cū citra periculum id experiri possis. Vrsorum verō Sanguis si abscessibus calidus imponatur, fieri potest vt concoquat. Adiciam verō etiā Caprinum, Hircinū, Taurinum. Licet q̄ tibi, si voles, præteritis decem millibus medicaminum paratu promptorum, quibus concoquūtur abscessus, vrsos, tauros, ac hircos mactare, quolibet scilicet vsu: nec enim quispiam semel imposito in partem affectā medicamento promissum ei exiget, nec etiam si refrixerit vt iam cogatur.

Sanguis Viridium Ranarum.

A. ibidem. f. Porro cū assereret quidā sanguinē Viridiū Ranarū, paruarum scilicet, quas quidā Brexātes nuncupāt, si euulsis ex palpebris pilis inungeretur, vt in posterum ne recrescerēt, prohibiturū, falsum id cōperi factō periculo. Postea verō scriptum à quibusdā repperi illud ipsum, sicut et Crotonum, quos potius veteres appellant Cynoraistas. Verūm nec hic factō periculo promissa p̄stitit.

Sanguis Crocodili, & Reliquorum.

A. ibidem. h. Cæterum an Crocodili Terrestris Sanguis visum acuat, ne id quidē experiri volui, cū habere probata aciei exacuēdæ medicamina, {quæ Græci vocāt ὀξύδερκον.} Neq̄ an Admissariorū Equorum sanguis crustam moliatur, & septicus sit: neq̄ an Murium Domesticorum sanguis verrucas, {quas vocāt ἀποχρόδονας,} decidere faciat. Nam aliorū fuit mihi magna semper copia & ad hoc

pathema, & quod ægrius illo medicabile est, nempe ad vocatam myrmeciam. Et cauebam ne præ E
stigiaturæ opinionem merito referrem, cum iam etiam improbi quidam medici ex diuinâ qua-
piam arte, non ex speculatione medica, me in morbis solere prædicere calumniarentur.

Gala Lac.

Lac. Bifariam hoc utimur, partim vt cibo, partim vt medicamento. Sed quid valeat vt **cibus**,
in curâdi Methodo alibi q̃ expositum est: At facultatem eius ceu medicamētū, eam nunc explica-
bimus. Ac primum illud cōmonebo, quod paulo antè de sanguine, q̃ non de morbo lacte, sed
de naturali cuiusq̃ animātis, ea quæ dicēda sunt intelligere oporteat. Igitur lac sanissimum, velut
etiam sanguis, purum syncerū q̃ est, nec amaritudinis, nec acrimoniæ, aut aciditatis, aut falsedinis,
aut foetoris particeps: sed vt dixerit quispiam, bono odore præditum, aut odoris expers, aut cerre
exiguū odorem bonum referēs. Clarum etiam est id esse debere gustu suaue, pauculam habens
dulcedinem, sicut & sanguis integræ sanitatis, ex quo & lacti constat generatio. Tale lac ad acres
& mordaces fluxiones est vtilissimum, non abluens tātummodo eas à partibus afflictis (est enim
id illi cum aqua commune) sed & corpora illinens, vt non in nuda cadat quod defluit. Nec in hoc
duntaxat aquæ præstat, verum etiam quia colluit, vtpote extergentem in sese humiditatem conti-
nens, quā vocant Serum, id quod colluit, diluit q̃ corpora: reliquo autem quod crassum pingueq̃: F
est circūlinitur, non aliter q̃ pinguedo, adeps, atq̃ ouī albumē, & ceratū ex eloto oleo cera q̃ con-
fictum: Nā & hæc ab acris ichoribus seu saniebus natas mordicationes mitigāt, eo q̃ corporibus
circūlinantur, ipsa nature minimè mordacis. Porro cum lac oīum facillimè alteretur, præsertim si
ambiens fuerit calidū, multū à dicta facultate amittit, nisi protinus quis ab vberibus effusū calido
etiānum utat. Maximè igitur Mulieris bene habite, & bonam vicius rationē seruātis lacte vtendū,
nam id humano corpori est familiarissimū: deinde aliorum animalium, quæ quidem ab huma-
na natura non longissimè absunt: id quod scies ex carniū odore, nam fætidiosus est & iniucun-
dus eorum quæ multū diuersam habent temperiem, ceu canis, lupi, leonis, pardalis, vulpis, hye-
næ, vrsi, & similibus: non iniucundus autem est eorum quæ nō porro absunt, vt suis, capræ, eque,
bouis, ouis, asini. Quocirca et cuncti homines docti experientia Caprino, Ouillo, Bubulo, Alimi-
no q̃ vtuntur lacte, et caseos ex eis conficiunt, excepto alinino. Nam id planè tenue est, & plenum
humoris serosi, velut bubulum crassum: cæterum consistentia medium caprinum est: at suis crudū
aqueū q̃ lac obtinet. Porro Lac omne ex tribus constat essentijs, caseosa, serosa, pingui: Hanc plu-
rimam habere conspicitur bubulum, ex quo conficitur et id, quod Butyrū nominant, cōcoquen-
tis & laxantis facultatis: Quamobrem maximè illo vtuntur ad parotidas & bubones.

A. l. 2. t. 2. c. 434
fol. 142. d. c

Serum Lactis.

At Serum, vt dictum est, extergendi potentiam possidet: adhibetur q̃ subducendū vētris gra-
tia, ac per clysteres iniicitur, extergēs & abluens sine mordacitate intestinorū acrimoniā. Præterea
si quis vlcera, quæ sanie infestantur acri, vice aquæ sero colluat, optimè sanè fecerit. Præterea que-
cūq̃ medicamēta digerere solent ecchymomata & atra, ea præstat sero q̃ aqua diluere. Sic et eo uti-
mur ad sugillata & hyposphagmata, peculiaribus ad hæc medicamentis cōmiscētes. At Caseo-
sum illud & crassum i plus lactis magis illitū adheret, & eo nomine acrimoniā retundit {magis}.
Porro vbi aliā quāpiam delictantem facultatem habuerit adiunctam, optimū est remediū dytente-
riæ, & oīum ventris acriū fluxionum. Eam accipit à lapidibus, qui prædecocto ipsi iniiciuntur
igniti. Porro eos esse oportet quos vocant *πάχληκας*. Et lac eousq̃ decoqui debet, dum pleraq̃ se-
rosi in eo humoris absumpta pars fuerit. At nos iniectis ferreis in ipsum cylindris candentibus,
eādem, aut etiam meliorem facultatem effecimus: nam ferrum adstringētis quoq̃ (vt est dictum)
facultatis est particeps. Ac proinde cylindros ego cōplures effeci huius gratia, ad fines verū pro-
pendentes, quo videlicet quis manubrio ignitum ferrum facile igni eximat: & sicut cauteriorum,
ita horum manubria pannis inuoluo. Porro Lac totum ad acres oculorū fluxiones tū per se, tum H
cum mollium collyriorū quopiā, est vtile: præterea ad hypopīa, & hyposphagmata. Quin etiam
palpebris extrinsecus, vbi qui ophthalmia laborant, somno sese dabunt, impositum simul cum ro-
faceo & ouo, phlegmonas eorū concoquet: Sed hoc esto lac mulieris recens ex māmillis expres-
sum. Infundimus ipsum & vtero vlcerato tum per sese, tum ijs medicamētis commiscētes, quibus
misceri potest, utiq̃ citra morsum curantibus: & vbi in sede vlcera mitigamus præ saniei acrimo-
niæ dolentia, aut phlegmonas, aut stolidas perpetientia. Sic & ad vlcera pudendorum utimur, &
ad oīa, quæ leniri postulant siue ob phlegmonem, siue ob morsum, siue ob malignitatem. Ea pro-
pter & cancrōsis applicatur vlceribus, medicamentis anodynīs commistum, qualia sunt quæ con-
stant ex pompholyge. Et quid attinet cōmemorare, q̃ ore contētum & collutū gargarizatum q̃
vel maximè phlegmonas eius mitigat: Sed & tonsillas, & columellam, & antiadas phlegmone
affectas, admodum mitigat, & proinde et synanchen siue anginam. Atq̃, vt semel dicam, medica-
mentum est leniēs {Græci vocāt *παρηγορικόν*}, totā quidem substantiam habens mordacitatis ex-
pertem, sed multo magis vbi concoctione moderata potissima pars serosi humoris absumpta est.
Sic mihi videtur etiā medici ad venena quæ erosione interimunt, lac dari suadere, velut sunt lepus
marinus, & cantharis. Sed & sunt qui exhibent ijs, qui aconitum & thapsiam sumperit. Sed hæc
ex rōne

A. ibidem.

Al. 1. 2. 2. c. 144 A ex ratione fecerūt. Alia verò palàm mētiti sunt, vt de Lacte "canino, q̄ in palpebris pilos renasci prohibeat, si prioribus euullis ei loco foret illitum, vnde pilorum radices extractæ essent. Ad eundem modum qui scripserunt, q̄ celerem pilorum in pudendis exortum reprimat, si quidem foret ante pubertatem illitum: qui q̄z q̄ fœtus emortuos ençeret potum, verum non protulere. Sed & alia quædam præstigiaturis contaminata, tum de horum, tum de aliorum quorundam animalium lacte conscribunt, quæ me ab initio dicturum negavi, etiam si experientia didicissem vera dixisse.

Caseus.

Al. 2. 2. 2. ca.
123. fol. 113. 2

Caseus. Sermoni "qui habet de Lacte, annectendū est de Caseo, propterea q̄ sit lac coagulatum. Nō tamē vniuersa lactis essentia in caseos cogitur, sed quod crassum est duntaxat, scilicet tenui seroso secreto ac separato. Porro dictū est habere lac in se naturam quandā pinguem & veluti oleo sam, eam q̄z plurimam esse posui in bubulo: ac vbi à reliquo lacte seiunctum fuerit, solum que per se constitit id pingue, Butyrum appellari: at, vbi cum toto lacte coagulātū fuerit, seroso duntaxat humore per coagulationem separato, pinguem caseum effici. Fiunt q̄te hoc pacto casei bubuli quidam adeo pingues, vt ex ijs effluat quiddam ad speciem olei. Porro tum hi tum reliqui oēs, temporis spatio aciores tibi apparebunt, siue gustes, siue olfacias. Itaqz cum mihi olim caseus allatus esset bubulus, quem ex odore acrem esse conijciebam, abieci: & iam à famulis absumptum putabam: cæterum illi talia seruare soliti, longo post tempore ex promptuario proferētes, quid nam de illo fieri iuberem, rogant. Cum igitur edendo non esset propter acrimoniam, ludicrum nobis problema extitit, proponentibus, cui rei quis illum vtiliter posset accommodare. Interea cum ad me Arthriticus quispiam in curru cōuectus esset, tophos {quos Græci πώρες nuncupāt,} in articulis habēs, subiit mihi crure suillo falso quod erat intus, decocto, caseū eo decocto macerare, ac probè in mortario subigēdo vnitū tophis imponere. Et sanè arthriticus ab hoc medicamine magnificè adiutus est: nā rupta sponte sua cute, absqz incisione videlicet, effluxere quotidie citra dolorē tophorum particule. Vbi aut totus, qui apud me erat, caseus fuisset absumptus, talē sibi alium comparans arthriticus in posterum seruauit: & postea rursus vsus est inueterato, atqz vbi tunc quoqz idē percepit cōmodū, sepius deinceps vti perseverabat: & quosdam amicorū similiter affectorū docuit. Atqz id quidē nos excogitauimus: cæterū comprobauit atqz confirmauit experientia. Porro recentem, qui inueterato contrarij est temperamentū, quādoqz homini in agro degenti, moderatæ magnitudinis vulnus habēti imposui, antea videlicet ad leuorē tritū. Extrinsecus autem illi imponebā folia lapathi. Possint verò etiā, si hæc nō adsint, folia superponi vitis, aut platani, aut betæ, aut Claciucæ. At ipse quidē caseus vulnus glutinauit, ferat q̄z etiānum mollis. Alius verò, qui vocatur & in patria mea Pergamo, & per superiacentē, Asiā Oxygalactinus, magnū rustici vulnus conglutinauit impositus. Nam recens coagulatus ac mollis percutiendi vim obtinet, nimirum leuiter refrigerans. At oxygalactinus præter hæc digerendi insuper leuem quandam vim possidet.

Butyrum.

Al. 2. 2. 2. c. 110
ol. 110. h. Et
11. d

Butyrum, "aut Butyrum, vtcūqz nominare voles, siue masculino, siue neutro genere, sit quidē, vt supra dictum est, ex eo quod in lacte pinguisimum est. Miror autem, quo pacto Dioscorides ex ouillo & caprino confici referat: Ego nanqz ex bubulo hoc medicamentum fieri noui, ac proinde nuncupatum esse butyrum existimo. Facultatis est concoquētis, paulum habens etiam digerēdi potentiæ, in medijs nimirum corporibus secundum duritiem ac mollitiem. Nam id semper memoria tenere oportet, quicquid simpliciter ac sine addito aut limitatione aliqua profertur, de medijs tēperatura corporibus intelligi. Nā corporum planè durorum tumores præter naturam hoc nequit medicamē digerere: at quæ in mollibus sunt phlegmonge, eas & cōcoquit & digerit perfacile: Nā parotidas, & bubonas, & oris phlegmonas, alias q̄z partes cōplures, prorsum illo solo curauimus, nimirum puerilibus corporibus ac muliebribus perpetientibus. Sed et gingiuus puerorum dentientium assidue illitum, nihilo imbecillius melle gingiuas extenuat, per quas exitus est dētibus. Et alios omnes in ore affectus phlegmonosos, postea q̄ fluxio restiterit, digerit pariter & concoquit. Proinde cataplasmatibus inditur quæ extrinsecus imponuntur parotidibus, hypochondrijs, & bubonibus. Sed & in ventrē deuoratum, & ex eo distributum, magnificè confert expuitionibus ex pulmone, id q̄z in pleuritidis & peripneumoniacis affectibus, cum hoc q̄ eos etiam concoquat. Atqz si solū lingatur, magis quidem cōcoquit, verum minus educit: sin cū melle & amygdalis amaris, plus educit, sed minus concoquit.

Pyria Coagulum.

ibid. c. 115. f

Coagulum "omne acris ac digerentis potentiæ est, ac nimirū etiam exiccatoriæ: nam necessariò id superiora comitatur. Ac Leporis quidem Coagulum comitiale morbum, si cū aceto ebibatur, præterea profluuium muliebre, sanare proditum est: Sed & lac in ventre coagulatum dissoluere: quod certè & nos experti sumus, nō solum in leporino, sed etiam in aliorum animalium omnium coagulo: attamen leporinum omnium est præstantissimum. Sed & sanguinem in ventre concretum simili modo epotum dissoluit, ac efficacius quidem cæteris, verum non solum, quod quibusdam scriptum legitur, sed & hoc commune est omni coagulo. Quidam autem sanguinis ex thorace reiectiones leporinum coagulū epotū suppressere prodiderunt: cæterum nec aliū quencūqz eo

Quinta Classis.

KKKKK ij

vsus

† Cod. græ. hēt
ἐπλῆς τις ὠν
i. simplex s. exi
stens. & ita ve
tus trala. Inter
pres vñ legitte
ἀπαλός, id est
tener.

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

vsus noui, nec ipse sum ausus acri vti remedio ad affectum adstrictionem poscētem. Porro Coa E
gulum Equinum ad dysentericos & cœliacos peculiariter accommodari scripserunt non nulli.

Coagulum Phocæ.

At Phocæ Coagulum eximie aptum esse quidam prædicant, tanquam vires obtineat castorij.
Verum quacunque proditum est quodq; coagulum secundum essentia suæ præstare propria-
tem, non est nunc tempus exponere.

Chole Fel.

Hic succus omnium, quæ in quoq; sunt animalium, calidissimus esse demonstratus est. Itaque
sicuti sanguinem & carnes dissimiliter temperata obtinet animalia, eadem ratione & fel. Quocir-
ca calidissimorum fel, aliorum quoque animalium fel excellere necesse est: & quæ illis minus sunt
calida, proportionem & hunc humorem illis inesse calidum, quanto scilicet & in alijs sunt inferio-
ra. Didicisti enim quatuor esse vniuersos in vnoquoq; animali sanguineo humores, sanguinem
pituitam, & bilem tum flauam, tum atram. Didicisti porro ex more non tantum medicis, sed & Lã-
tinis omnibus bilem flauam absolute efferi bilem, tanquam subaudituris, qui audiunt, coloris co-
gnominationem: Atram verò nō simpliciter nuncupari bilem, sed cum addito, nempe hoc toto,
atram bilem. Sed & q; flauam bilem non nunq; pallidā cognominant, nosti: & q; in vesica iecoris
interdum pallidam, interdum flauam, in confectionibus animalium, ipsam conspiciamus. Audisti
porro flauam tanto esse pallida calidiorē, quanto & crassiorē: nam seroso recremento flauæ
bili commisto pallidam constitui contingit: sicut & flauam plusculum excalfactam consistentia
reddi crassam, colore autem flauam. Quin & in animalibus apparet flaua quidem ijs quæ magis
sunt calida: quæ vero minus, pallida. Et vbi calida animalia aut fame aut siti torquentur, ad atrum
colorem vergit, interim illum habens æruginosum, interim cœruleum, interim isatidis qui quidē
magis est colore brassicæ fuscus. Itaq; & tu bilis colorī diligenter intendito, cum medicamentum
præparabis cui admiscenda est bilis. Miscent autem cycliscis vocatis & trochiscis, qualis est An-
dronis, & Polydæ, & Pationis, et Bitinis, qui tauri recipiunt bilem: nam vbi ea medicamenta præ-
parant quæ sunt vtilia ad oculos, hyænæ, galli, perdicis, & aliorum quorundam animalium, bilem
adhibet. Porro Taurorum Bilis calidior est & siccior q; Boum castratorum: nam castratum ani-
mal semper simile redditur fœminæ, & ijs quæ sunt ætatis minoris. Itaque sicut hæc humore supe-
rant adulta & perfecta, vincuntur q; ab iisdem caliditate: ad eundem modum bos castratus à tau-
ris. Et quorundam ego taurorum bilem vidi cœruleam, flaua nimirum superaffata: quam sanè in
præparandum injici medicamentum vetui, sumpto illius loco alterius tauri bile mediocriter fla-
ua. Nam ille vinculis violenter tractus, supra modum fuerat defatigatus: itaque eo labore cum ex-
canduisset, clarum est temperaturam eius fuisse calidiorē: probabile quæ est sic violenter pertra-
ctum tum sitisse, tum etiam esuriuisse. Atque, vt summarim dicam, velut vrina à modica potione
modice pallere, & sitim famem quæ & multum laborem perpeffis flaua esse conspicitur: impletis
verò atque inebriatis albida: ita & bilis colores variat, ad flauius quidem per exercitia, inedia, &
sitim: ad candidius verò in contrarijs. Scito ergo si præparando medicamini bilem impense fla-
uam injicias, calidius te id effecturum: si pallidam, mediocriter calidum: si exolutam & aqueam,
tanto imbecillius temperie conuenienti, quanto & bilis ad candidius fuerit versa. Sic qui oculu-
sas hæmorrhoidas taurino felle aperiunt, ijs interdum imbecillū, interdum verò supra quàm con-
ueniebat, acre apparuit. Quanquam non nulla quoq; diuersitas existit pro corpore cui adhibetur,
prout s. promptiore sensu aut hebetiore fuerit: tum per facile patiens, aut difficulter. Verum in ip-
sa bile non parua visitur, vt dixi, varietas: nam idem homo à pallida minus, à flaua bile plus, mor-
dicatur. Liqueat itaque vel ex eo q; hæmorrhoidas aperit, q; sit hic humor acris: sed & illis ipsis qui
vtuntur, mordicare percipitur. Ac proinde cauemus, ne ad alium morbum aut symptoma bilem
flauam vsurpemus solam ac per se: nam propositi cyclisci pauculum bilis accipiunt. Ac quæ ad
oculorum acutiem componuntur medicamenta, partim hyænæ, partim perdicis, partim galli, par-
tim alterius cuiuspiam bilem accipientia, admistum habent tum mel, tum fœniculi succum, tum
opobalsamum. Porro animalium quorundam singulariter bilis à medicis extollitur, tanq; aciem
exacuat oculorum, & suffusionum initia digerat, velut piscis quem vocant Callyonymon, hyænæ,
& scorpij marini, tum galli, & perdicis. At Suilla adeo omnium imbecillima est, vt ne vlceribus
quidem toleratu sit grauis: & apparet omnium bilium maximè aquea, exceptis syluestribus sui-
bus, & ijs qui degunt in montibus: nam vt horum caro & calidior & siccior est, ita & bilis. Por-
ro domesticorum suum bile vtuntur quidam ad vlcera aurium, medicamento vtique non repro-
bo: & tu quoq; vbi cōpositorum nihil adfuerit, vitior: sunt enim innumera. Sed & pro affectus
magnitudine alia etiam atq; alia alterius animalis bilis potest congruere. Nam vbi vlcus diutur-
num fuerit, multam q; saniem pus q; contineat, etiam sicciorē bilem perferet, puta ouium, quæ
paulo est acrior suilla: hac etiam magis caprarum: cui adsimilis quodammodo est vsorum, &
boum. At taurorum his valentior est, inferior tamen bile hyenarum: & hæc quoque inferior bile
callionymi, & scorpij marini, & marinæ testudinis. Porro Hirçī agrestis bilem scripsere quidam
prodesse lusciosis. siue nyctalope vexatis. Cæterum Volatilium animalium biles omnes tum
acriores

Alib. 2. t. 2. ca.
25 c. 10. 127. g

*Capræ.

Aacriores sunt, tum sicciore q̃ quadrupedum: & inter ipsas quoq̃ volucres Gallinarum & Perdium biles ad medicinę vsum probatores habentur. Miluorū vero & Aquilarū impēdio acres sunt, sed & erodunt: quamobrem colore vifuntur ærugineo, ac non nunq̃ atro. His itaq̃ carum cognitis differentiis: atq̃ affectibus, qui plus, qui q̃ minus, delictari postulant, cognitis: si vnam modo quampiam opere fueris expertus, inde ad alias transire poteris per methodum, vt semper, quę affectui comoda sit, adhibeatur. Nam cū velut in coniectura sita sit cuiusque facultatis vehemētia, a definito quopiam principio ad materiam inexploratam transire oportet, ac a prius explorato excessus qui in illis consistunt discere. Sed & notas quasdam luculentas ego exposui tum a bilis colore, tum ab animalium temperie.

Hidros Sudor.

Alibi. c. 648.

Sudor. Vnus & hic est humorum in animantis corpore provenientium, & eādem habens materiam quam vrina, & eundem generationis modum. Siquidem vtriq̃ ex bibito humore constat generatio, ex calfacto simul in corpore, & biliosa non nihil substantiæ adepto: verum sudor plus est elaboratus, vt pote qui ad cutem vique permeatis omnibus, quę intersunt, partibus peruenit. Attamen sudores inter sese & vrinas differre necesse est, tum pro animalium temperaturis, quę & natura & per atates non parum a sese inuicem sunt diuersę, & pro precedente victus ratione. Clarum autem est, etiam si aliquando in sermone omissum fuerit, pro tempore anni, & presentis constitutione, preterea pro regionibus, diuersitatem effici in animantium corporibus non parua. Nam compendij gratia vno capite complecti eiusmodi omnia soleo, nempe pro cingentis nos aeris temperie ea mutari dicens: etenim diuersitatem regionum, quę est in caliditate & frigiditate, hic comprehendit, vt tempus anni, & presentem preteritam q̃ constitutionem. Cū ergo sermo fuerit de vrinis, aut sudoribus, aut bilibus, aut sanguine, aut pinguedine, aut adipe, aut quopiam in corpore nato, diuidentibus videlicet nobis eas, quę in animalibus vifuntur, differentias, de sanis corporibus sermo intelligendus est, mediam proprię ipsorum temperaturę constitutionē habentibus. Sic ergo q̃ & sudor salis & saluginosę vocatę qualitatē est particeps, gustus testimonio probatur: nam sæpenumero nolentibus in os defluens dictam qualitatem indicat. Sæpe verō etiam non obscuram præfert amaritudinem. Attamē & color eius naturam designat: nam sicut vrina naturalis modicę est pallida, sic & sudor. Verū id facile cognosces in ijs q̃ lauantur, cū absq̃ oleo strigili radunt: nam sudor in cauo strigilis colligitur, colorē quem dixi simul & gustum præferens, ac euidenter salfedinem habens, sed obscurę amaritudinem. Verum de vrina plus etiam q̃ conueniat medici scripserunt, propterea nimirum q̃ largē ea in oībus hominibus tum priuatim, tum publice, quotidie colligatur. At de sudoribus aut nihil, aut quę curiosa sint potius, & præstigiaturę obnoxia: & insuper scripserunt alij superuacanea, quę per aliam fieri possent materiā medicam. Porro sudor etiam in palæstris exercentium miscetur sordibus, hoc est pato, quem quidam curiose Atticam sectantes linguam, Conisalon vocant: confert q̃ non nihil tenuibus sordibus vt tumores præter naturam p̃ halitum digerāt. Nam illę plus reperiunt, minus autem digerunt: at post adiunctum exercentium sudorem acquirunt multum facultatis digerentis. Ergo in phlegmonas vberum solæ hæ sordes impositæ efficaciori sunt remedio. Sin sicciore videbuntur, cyprinum superungito: & si valde etiam sicca, cyprino item subigito. Præstat autem nō siccas, sed molles accipere. Porro si non adsit cyprinum, rosaceum bonum miscuisse sufficit. Hoc medicamentū admodum est vtile ijs quibus a partu resingueret lac consilium est, eo nomine q̃ in māmīs coaguletur in morem casei. Hinc orso, ad alios affectus similes vti licebit. Atq̃ ego sanē ad bubonem eo vsus, celeriter disparuisse tumorem conspexi.

Vrina.

Dictum quidē est de tota eius natura in sermone de sudore: Dicetur q̃ & nunc, q̃ quanta est in animalibus bilis diuersitas, tanta item sit in vrinis. Atq̃ omnes quidem facultate sunt calidę, sed plus tamen animalium calidiorum: minus autem frigidiorum.

Vrina Humana.

Alibi. c. 716.

At Vrina Hominis omnium propē aliarum vrinarum est imbecillima, exceptis porcis domesticis, quibus exēti sunt testes. Nam illorum similis est totius corporis temperatura, temperiei hominum, & vrina similiter debilis. Verū montanorum Aprorum valida est, vt etiam ex odore apparet, qui vtiq̃ acerrimus est. Sed & in alijs animalibus ex odore vim eius coniectare liceat: nā vrinas illas deglutare planē est abominandum, cum ne pueri quidem vrinā vir quidam honestus vitā pariter ac moribus ebibere sustinuerit, cum pestiferē agrotaret in Syria: vbi, cum multi vrinam puerorum simul & virorum hausissent, sese hinc seruatos credebāt. Ceterū vrina Hominum, vt si quid aliud, extergēdi vim obtinet: quod cū alij multi satis indicant, tum maxime fullones, q̃ sordida vestium ea expurgāt atq̃ extergunt. Hanc eius vim cum & medici conspexissent, psoras & lepras ea detergunt: perfundūt q̃ viscera tum multa humiditate, tum sordibus & impuritate scatentia, ac multo magis vbi putridum quiddam obtinent. Sed & pudendis, vbi sic afficiuntur, vrinam infundunt, & auribus pure fluentibus. Quin & achoras, & furfures ea curant, capiti identidem perfundentes. At nos hæc facere edimus potius, cum ad manum sint quę illis conducant

Quinta Classis.

KKKKK 111

alia

alia medicamina: At vlcera digitorum, pedis maximè, quæ ex illusione atq; offensione essent infl- E
cta, sæpenumero, vbi nimirum phlegmone carerent, & ipse curavi, ea q; in seruis & hominibus ru-
sticis, quos iter ingredi absq; medicis erat necesse: Siquidem linamento {υῶτον Græci vocat,} vl-
ceri imposito, ac insuper linteo circūuoluto ac ligato, quoties meiendi incesset cupiditas, in digi-
tum ferri vrinā præcepi, nec antè soluere q̃ bene esset curatus. Nam & si quæ alium ruri sine medi-
co agentem, vrinam vlceribus perfundentem audissem, non vetui, vbi scilicet in partibus thora-
ce interioribus vsque ad imos pedes vlcus constitisset: siquidem vlcera aut capitis, aut faciei, vrina
perfundi sinere auerfabar. Attamen Medicamentum quod ex Vrina pueri cōficitur, quod quidā
vocant Chryfocollan, quia eo ad auri glutinationem vtuntur, ad vlcera difficilia sanatu optimum
esse assero. Fit autem id fura gphiali, confecto mortario ex ere rubro, habente pistillū eiusdem ma-
teriæ, in quod meiente puero pistillum circūages identidem, vt non tantum a mortario quid de-
radat, sed etiam a sese non nihil deterat: id quod pluribus deinceps diebus peragitur, donec vrina
crassitudinem assequatur mellis. Faciendum verò id in Sole: nam facilius in aere eiusmodi ab are
quid deteritur: aut si Sol absit, calidas esse ædes saltem conuenit. Hoc medicamento misto ijs, quæ
curandis vlceribus rebellibus sunt idonea, vtimur, vt dixi, ceu optimo: nihil enim habet abomi-
nandum, perinde vt vrina capiti alteri ve parti infusa. Nam quid commemorem Vrine potum? F
Scripsere tamen medicorum quidam de subidente in vrina crasso illo videlicet & albo, dicentes
id mederi erysipelatis. Sanè ea erysipelata, quæ ignea etiānum sunt, & re vera erysipelata, calidorū
& acrium medicamentorum omnino nullum iuuare potest: quæ verò per refrigerantia refrigere,
tum hoc, tum alia multa medicamina digerētia, adiuuare valent. Atq; hoc quidem vti licebit, vbi
non in facie, aut propè, erysipelas constitierit, verū in artuū quopiā, aut dorso, aut vētre. At Vrinā
pueri orthopnææ gratia ebibere necessariū nō est, cū sint & alia medicamina quæ huic medeantur
affectui. Quin cū bibisset quidā, affectu liberatus nō est: vt non eximiū quid præter alia possideat.

Sielon Salina.

Sielon, siue Sialon, siue Ptyclon appellare libet, nihil interest. Verum id sciendum est, vim eius
esse differentem tum in animalium speciebus, tum in eorum vnoquoq; sano & ægroto, ieiuno &
sitibundo, aut cibo potu q; sumpto. Etenim vt vrina & bilis, sic etiam saliuā sumpto quidem cibo
imbecilla est: valida & acris eorum qui ingenti aut inedia: aut siti premuntur: in medio vtriusque
est eorum qui probè concoxere quidem, non dum tamen cibū potum ve hausere. Hac ergo sali-
ua nutrices pueris lichenas curant, paruum videlicet digītum rigātes, ac deinde cutem affectā con-
fricātes: id q; faciunt subinde, tanto scilicet interuallo, dum saliuæ vires in lichene perdurēt, ac non G
dum sint extinctæ. Sed & triticum mandentes rustici non pauci furunculis imponunt, nam cele-
riter eos & digerit, & concoquit: cū si macerarent aqua, nō æquè prodesset. Ex quo liquet sali-
uam iuuādī robur adferre. Atq; corporibus mollibus, aut puerorum, panem non triticum impo-
nunt ore commāsum. Porro omnia sic commansa digerunt & sugillata, cetera q; ecchymomata,
maximè vbi panis simul cum pauco radicula fuerit commansus. Porro tota substantia vel maxi-
mè aduersa est Saliua bestiis hominem interficientibus, ceu alicubi etiam Nicander poeta refert.
Pollicitus autem mihi quidam incantationem sese ostensurum, quæ scorprios interficeret, vbi illā
semel dixisset, in scorpionem expuit: inde rursus eam obmurmurans, iterum scorpionem conspuat: ac
vbi tertio dixisset, atq; expuisset, mortuus est scorpion. At postea ego absq; incantatione a sola sa-
liua occisum vidi scorpionem, id q; celeriter a saliuā esurientium, aut sitientium: tardè autem ab illis
qui cibo potu q; fuerant impleti: in alijs autem, proportionē.

De his Quæ in Corpore proueniunt.

Nascuntur in corpore cū alia præter naturam, quorum non est satis honestum meminisse: tū
etiam Lapis in vesica: de quo scripsere quidā q; lapides vesicæ cōminuat. Atque hoc quidem sal-
sum est experientia iudicatum: cæterum an renū lapides frangat, omnino experti non sumus, H
cū suppetere alia ad hoc symptoma probata medicamina. De Pure autem & id genus dicere
superfedeo, id illis concedens qui his in rebus mirifici sunt, scilicet quibusdam cum prestigijs. Cæ-
terum Stercus, vnum est inter ea, quæ in corpore proueniunt secundum naturam affectio animalī,
veluti & aurium sordes. De vtroq; itaq; deinceps differam.

Copros Stercus.

Copros, siue Copron, siue Apopatema appellari velis, perinde est. Scito autē hanc substantiā
vim habere vel maximè digerentem. Verum stercus Humanum ob foetorem abominandum est:
At Bubulum, caprinum, crocodilorum terrestriū, & canum vbi ossibus duntaxat vescuntur, neq;
grauiter olet, & multa experiētia non tantum nobis, sed & alijs medicis me natu maioribus, com-
probatum est. Siquidem Asclepiades, cui cognomen erat Pharmaceon, & alia omnia medica-
menta collegit, vt multos impleteret libros: & stercore ad multos saepe affectus vtitur, nō modò me-
dicamentis quæ foris imponuntur commiscens, sed ijs quoq; quæ intrō in os sumuntur.

Stercus Caninum.

Sanè ego memini me admirandam tum Humani tum Canini stercoris expertum facultatem.
Sed prius differam de Canino, quo vti assidue consuevit præceptorum nostrorū quidā, sola ossa
cani

A. ibid. 599. Et
613.

A. l. 2. t. 2. c. 395
fol. 139. d

A. ibi. c. 606.

A. ibidem.

A cani edēda exhibens duobus continuo diebus, ex quibus durū, candidum, ac minimē foetens stercus proueniebat. Hoc igitur acceptū delicebat, ut cū postea vsus esset, facile ad læuorem posset redigi. Vtebatur eo ad anginam, & dysenteriam, & summē inueterata vlcera: Ad anginam quidē, ijs admiscens quē alioqui huic affectui congruebāt: Ad dysenteriam, lacū illi immiscens, cui decocto calculos vocatos *καλκας*, ignitos iniici antē posuimus: aut, ut ego postea ob parabilitatē ad ferrum confugī, id candens iactū probē decocto iniiciens. Vocant autē medici non nulli lac eiusmodi, nescio quo pacto, Schistum: verum oportebat non hoc sic appellare, sed in quo segregamus ac scindimus {quod *σχίζω* græce dicitur} serum a caseo. Cæterum medicus ille stercus Caninū aridum tritū lacū, in quo extincti erant calculi mārini, clam iniiciebat, & id solū generosissimos quosq; discipulos docebat. In his ergo duobus multum expertus sum stercus Caninum ceu medicamentum mirabile, sicut & in vlceribus extreme malignis. Miscui ergo & ad illa paulum quiddam stercoris canini medicamentis probatis, & manifesto se ipso valentius redditum est medicamen. Et si quando digerere aut desiccare quid opus esset, illis etiam medicamentis admiscui.

Stercus Humanum.

Cæterum Humani Stercoris hoc habeo experimētum. Assidue quidā a phlegmonis ad guttur existentibus vexabat, adeo vehementer, ut suffocationis subiret periculū: & sanē ob hoc periculum sanguinem mittere cogebatur. In hunc cū forte quis incidisset, pollicitus est se prebiturum medicamentū experimentū: & se vocari, si quando rursus aliqua in parte gutturis emicuiisset phlegmone, ante sanguinis missionē præcepit. Itaq; vocatus, medicamentū illito statim hominē curauit. Ut autē iterum profecit, non in ipso tñ, sed & in alijs qui similiter erant affecti, rogabat is, qui assidue suffocari periclitabatur, data mercede, ut sese medicamentum illud doceret: erat enim ille & locuples, & in pecunię sumptu liberalis. Porro ubi conuentū esset de pretio is, qui vendebat, Hoc medicamentū, inquit, per antipathean quandā vilitatē obtinet: esse autē eam antipathean, ut qui curatur, nesciat, vnde cōficiatur. Iussit itaq; alium daret, qui pro ipso disceret, qui tibi fidelissimus esse videretur, qui q; iureiurando reciperet sese nulli eius facturū copiam, priusquā ipse qui dedisset, foret defunctus. Itaq; a morte eius qui indicarat, non tñ ille suum hominem, sed & alios sanabat: et mihi ne petenti quidē medicamenti exēplum volens ac lubens obtulit. Erat autē Stercus Pueri siccum cū melle attico ad læuorē tritū. Vicibat autē puer, cuius stercus accepturus erat, uti ipse qui medicamentum dederat, ostendit, lupinis, illis videlicet qui ex more edi solent, cum pane bene cocto in clibano, modicum salem & fermentum habente. Præbebat autem bibendum vinum vetus: atq; hæc omnia mediocri in quantitate, ut perfectē ea puer posset concoquere. Itaq; cum primo die eo victu esset vsus, postero tamen die nō dum stercus capiebat, sed in eo quoq; die rursus eodem alebat victu, ac tertio demum sumebat: ac postea arefactio utebatur similiter, ut stercore canino, ut ante dictum est. Dicebat autem illum, qui docuerat, fugitantem alios cibos ob foetorem, prætulisse lupinos: sese verō, experimenti gratia, carnes gallinaceas aut perdiciū ex aqua aut tenui iure bene coctas persæpe exhibuisse, & medicamentum nihilo minus operatum. Atq; ego sanē hæc tibi de canino humano quæ stercore narrare possum.

Stercus Lupinum.

At Lupinum Stercus quidam colicis potandum dabat, non tantū in ipsis paroxysmis, sed etiā in intervallis, si quidem phlegmone vacarent. Quorum ego quosdam vidī nō amplius inuadi: & qui erant inuasi, nō amplius id grauiter passos, sed nec post paucum temporis. Accipiebat autem ille albidius potius stercus, quale ubi ossa ederint solent excernere. Verum illud etiam in eo mirabar, qd vel suspensum euidenter aliquoties iuuisset. Itaque hic stercus capiebat, quod non decidisset in terram: Id quod non erat inuentu difficile: ea enim est luporum natura, quæ canū, ut suspensio altero posteriorum crurum & meiant & cacent in eminenti quopiam ex terra. Itaq; in spinis sæpe Destate stercus lupinum reperitur, & fruticibus, vepribus, herbis q; procerioribus. Inuenitur porro in stercore illorum & non nihil ossium deuorati animalis: quod ut effugit commansionem, ita & concoctionē: quod & ipsum contūdens ac conterens, bibendum præbuit colicis: ac si homo esset puritatis amans, miscebat & salis quippiam, aut piperis, aut quippiam eiusmodi. Ut plurimum autem ex vino albo consistentiæ tenuis bibendum præbebat: interim vero etiam ex aqua. Hoc ergo stercoris quod patientis ilibus { *λαγωνας* Græci vocant } applicandum esset, præcepit suspendi ex vinculo confectio ex lana, sed non qualibet: verum multo præstabat eam esse ouis a lupo laniatæ, vnde, quod ad hūc vsū accommodaretur, esset cōficiendum. Quod si talis nō adesset lana, ex pelle ceruina & lorum quod cingeret ilia, & in quo stercus contineretur, parari præcipiebat. At nos ollulam ad magnitudinem maximæ fabæ confecimus, quam experiundi gratia indito stercore quibusdam suspendimus, nec potuimus nō mirari, cum plurimos ipsorum videremus adiutos. Cæterum ad ollulam duas ceu aures affiximus, per quas lorum transmitti posset. Sed hoc quidem obiter dictum esto, si quis inuenietur qui sic suspēsis fidem habere dignabitur. Dico autem sic, nā substantia est quæ suspenditur, non voces barbare, ut quidam facere præstigiatorū assolent: quando & alias expertus sum substantias, quæ in alijs affectibus similiter operarentur. Sed de his non est nunc dicendi tempus. Ad propositum itaq; reuertamur.

*Stercus Caprinum.*E
A. ibidem. c

Nam humanum, caninum, lupinum quod stercus recēsuī, alia verò non dum: quorum etiā maior est quod dictorum numerus: & quādā assiduo habetur in vsu, quādā rariore. Omnium creberrimè utimur Caprino stercore {Græci Σαυράθους propriè nomināt,} digerētis et acris facultatis: adeo ut & induratis scirrhorum in modum tumoribus congruat, nec tātum lienis, ad quos creberrimè medici non pauci huiusmodi stercora applicant, sed etiam aliarum partium. Siquidē ego eo vsus sum ad genu, tumorem habens inueteratum & agrè solubilem, iussu fieri cataplasmate ex farina hordeacea per oxycratum, indito videlicet hoc stercore: & mirum est, quod homo ille fuerit adiutus. Erat autē rusticus in quo id factum est. Et iam etiam alius rusticus, cum sic vsus esset non tantum in genu, sed etiam alijs in partibus ad tumores similes, perinde adiutus est. Nam acrius est medicamentum quod ut mulieres urbanas, aut pueros, aut omnino qui tenera sunt carne, sanare possit. Sed de particulari oīum medicamentorum vsu in opere de componendis illis tractabitur. Quin & ad aquā inter cutē, & ad splenicos variè caprino stercore utimur. Sed & vsu tenuioris quidem essentiae, verum haud manifestò reddi acrius. Quamobrem sanè ad alopecias congruit, & oīa adeo, quæ extergentia medicamenta desiderāt, ut lepras, pforas, lichenas, & hoc genus alia. Miscetur digerentibus cataplasmatibus, qualia sunt quæ accommodantur ad parotidas & bubonas diuturniores: est enim vis eius tum vlti, tum non vlti, absterforia, & digerens, nec etiam paruam habet digerendi potentiam. Nam medicus quispiam ex ijs, qui in agris & vicis medicinam exercent, utebatur eo ex aceto ad viperarum morsus, & multo sanè etiam magis aliarum bestiarum: ac profectò ex ijs cōplures seruauit. Et hic ipse quoque medicus ad auriginem potādas ipsas spyrathos ex vino præbuit, & ad profluuium muliebri cū thure apposuit. Quæ oīa sanè optimus medicus ignorare non debet: ceterum potiora eligere potissimum ad urbanos et honoratos, alicuius quod existimationis viros: in quibus equidem ego tali nunquā sum vsus medicamine, cum multo meliorum suppeteret copia. Attamen existit nō nunquā talium vsus, aut in itinere, aut in venatione, aut rusticatione, cum scilicet meliorū nihil adfuerit, aut homo rusticus perinde fuerit carnis duræ ac asino similis. Nam eiusmodi multos in agris reperias dignos, qui bibāt spyrathos. Porro quod & supra monui de vrinis, & bile, & salua, id nunc memoria repete, nepe vniuersalem & communem facultatem eandem oībus inesse, verum pro animalium temperaturis variam. Nam eorum, quæ sicciore sunt temperatura, & stercus exiccantius est: sicut & calidiorum magis etiam excalfactoriū. Verum nullum omnino stercus refrigerat, sicut nec vllum humectat. Sed & pro natura eorū quæ edunt, multa item fuerit diuersitas. Proinde in hominibus potius quod alijs animalibus maior est: quandoquidem hoc animal diuersissimis maxime quod varijs cibis utitur. Nam quid simile habent, qui alliū ac capras comedunt, & qui cucurbitam, verbi causa: at caprarum spyrathi pro pastu vario non nihil item habuerint differentiae, non tamen tantum, quantum stercus humanum.

Stercus Bubulum.

A. ibidem. a

Similiter Stercus Bubulum exiguā habet differentiam: Est quod & ipsum facultatis exiccatorie: verum attractoriam etiam obtinet, ut monstrat, dum apum vesparum quod morsus iuuat. Atque hæc ut à proprietate substantiæ totius iuuentur, fieri potest. Caterum medicus quidam medicamentorum peritus, in Mysia quæ in Hellespontho est, aqua inter cutē laborantes bubulo stercore oblinens, in Solem exponebat. Atque hic ipse imposuit et partibus rusticorum phlegmone obsessis humidum illud vere collectum, cum herbam boues pascuntur. Manifestum autem est hoc esse alio moderatioribus multo viribus: dico autem aliud, cum paleis vescuntur: nam hoc medium est inter id quod modò diximus, & quod prouenit ab erui pastu. Liqueat ergo, quæadmodum id quod ex pascuo herbae prouenit, ad phlegmonas accommodatur, sic istud aqua infestatis esse idoneū.

Scire tamen oportet, omnia id genus medicamenta duris agrestium hominum corporibus aptari, nempe fessoribus & messoribus, & qui opus obeunt tam validum: In quibus utique Mysius ille Hæc medicus & ad chæradas adhibebat, & ad tumores omnes scirrhosos, ex aceto in cataplasmatibus formam compositum illinens.

Stercus Ouillum.

A. ibidem. c

Sed & hic ipse medicus Ouium utebatur Stercore ad acrochordonas, & myrmecias, & thymos, & furunculos duos quos clauos nominant, aceto videlicet diluens. Quin & vlcera ambusta ad cicatricem illo ducebat, nempe stercus hoc cerato rosaceo cōmiscens. Sed & per stercus Caprinum combustum similiter curabat: ceterum pauculum eius multis numeris maiori cerati molli admiscebat. Et in totum, studium id illi erat vnicum, omnia curare per ea, quæ ex agris facillimè parantur: inter quæ sunt & herbae, & frutices, & arborum flagra, & germina, & folia mollia, & fructus, & cortices: Super quibus copiosius dicetur in facile parabilibus.

Stercus Columbinum.

A. ibidem. c

Porro Stercore Colūbarum Nomadū (nam sic eas quidam cognominant, à domesticis videlicet distinguentes) tanquā medicamento excalfaciente & ipse ad multa frequenter admodum vtor, Nempe cum semine nasturtij contusum cribratum, quæ siccum vice napyos ad ea, quæ rubrificari debent, adhibens. Manifestum autem est, quod inueterata omnia dico in talibus affectibus, quales

Ales sunt coxendix, hemicrania, scoromata, vertigines, & cephalæa: & in lateribus, scapulis, ceruice, lumbis, dolores inueterati: & ad hæc nephritides, & affectus coeliaci, & podagricæ arthritides quæ videlicet in articulis eorum non dū conſtiterint tophi ſiue pori. Atq; hoc ſtercus planè ſcetidū nō eſt, maxime arefactum. Quocirca & in vrbibus eo varie vtimur, aliàs alijs miſcētes medicamentis.

Stercus Gallinaceum.

A. ibidem. g

Porro cum conſpexiſſem illum in Myſia medicū Gallinacco vtentē Stercore in eis, qui ab eſu fungorū ſuffocabātur: Et ipſe quoq; ſum vſus in quibuſdā vrbē inhabitātibus, qui & iſti fungos elitarant, ipſum videlicet ad læuorem cōtritum tribus quatuorve oxycrati aut oxymelitis inſpergens cyathis: & palām adiuti ſunt, id q; celeriter. Nā qui præfocabantur, paulo poſt vomebant pituitoſum humorem omnino craſſiſſimum, & exinde planè liberati ſunt ſymptomate. Eſt autē hoc ſtercus columbino minus calidum. Cæterū Myſius ille medicus dabat ēt bibendum ſtercus gallinaceum ijs, qui diutino coli dolore fuiſſent vexati, ex œnomelite: quod ſi hoc non aderat, ex aceto, aut vino aqua diluto. Porro memoria tenere oportet communē de omnibus animantibus rationem, nempe tum in ijs quæ in corporibus ipſorum continētur tam humida q̄ ſolida, tū in ipſis partibus, plurimam eſſe diuerſitatem montanorū quæ vocant, & eorum quæ in pratis, paludibus, Blacubus, & adibus verſantur. Semper. n. quæ exercentur, ijs quæ non exercentur, ſunt ſicciora: & quæ cibis vtuntur calidioribus ſiccioribus q̄, ijs quæ humidis frigidis q̄. Nā in colūbis (quandoquidem creber nobis earum ſtercoris eſt vſus) multo ſemper inferius ac imbecillius expertus ſum earum ſtercus quæ in domibus degebant, q̄ earum quæ in montibus, quas Nomadas nuncupant. Tum gallinarum quoq; inueni multo ēt imbecillius earum quæ conſuſe ſeruātur, & furfuribus aluntur: non paulo autem valentius earum quæ in agris, atrijs, aut foris paſcuntur.

Stercus Anſerum, & Ciconiarum.

A. ibidem. d

Cæterum Stercus Anſerinum præ nimia acrimonia inutile eſt. Colligo etiam ita eſſe & Accipitrum, & Aquilarū. Verū fugienda eſt materia omnis eiufmodi, quæ diſſiculter comparari poſteſt. Qua occasione complures validiſſimas vires talibus materijs teſtimonio adſcribunt ſuo, ceu non facile redarguendi: Velut qui Ciconiarum ſtercus comitiali morbo mederi ſcriptitant. Verū quanquā hoc multis alijs quæ ſcribunt, longè ſit parabilius, curioſum tamen eſt (vt taceam falſum eſſe) quod de illo eſt prodiitū: Nam quidam ijs, qui talia memorant, credulus, epoto hoc ſtercore nihil adiutus eſt. Nam & antequam experiare, promiſſorum prauitatem ac falſitatē ipſi qui talia ſcribunt, detegunt: nam cum multis modis diſſiculter homines ſpirent, neq; q̄ omnibus cōferant adſcribunt, neq; q̄ his aut huic. Tameſi ſunt inter eos, qui talia ſcriptitant, qui nō ſimpliciter dyſpnœæ hoc eſt diſſicilis ſpirationis, ſed ortopnœæ, talia eſſe remedia dicunt, nempe ciconiæ ſtercus, noſtuæ ſanguinem, vrinam humanam, & alia his abſurdiora: haud ſcientes q̄ pituitoſus viſcoſus q̄ ſuccus bronchia obſtruēs pulmonis, huius affectus, ſit cauſa, & q̄ in eo euacuando conſiſtat medela, & q̄ euacuatur dum per tuſſim excreatur, & q̄ id fieri nequeat abſque crebro epoto medicamento acriore. At hi adeo ſunt nugaces, aut præſtigiatōres, aut quo illos digno appellem nomine neſcio, vt dicāt abſurdorum iſtorum poculorum vnumquodq; epotum à dyſpnœa liberare: quod fieri nō poſſet, ne ſi vel ſpecillum fas eſſet alicui in pulmonem demittere, quo infixum humore tolleretur ſemel duntaxat demiſſo. Præſtabat itaq; illis dixiſſe, nō ſi epotus ſit hic ſanguis, aut vrina, ſanare dyſpnœam, ſed ſi poterit: Rectius q̄ etiam q̄ non ſemper & omnino ſanabit, ne ſi vel aſſiduo poterit: ſed q̄ multos ſanauit, multos verò adiuuit quidē, ſed morbo prorſum non liberauit. Sed hos iam mittamus, & quod deinceps eſt, ad id pergamus. Cuiusq; enim ſtercoris acrimoniā & digerendū vim poſſidentis, prout aliud alio plus minusve eius ſortitum eſt facultatis, ita particulares in ipſis proueniunt differentię: ac proinde aliud hoc pathema potius, aliud illud magis curare valet.

D

Stercus Murium.

A. ibidem. e

Sic enim Murium Stercus alopecias curare prodiitum eſt: Et inuentus eſt quidā medicus, qui ad hoc pathema vtebatur compoſito medicamento ex murium ſtercore conſecto. Et alius quidā glandem puero familiaribus rogantibus vt apponeret, præcepit vt ex ſtercore conficeretur murium. Quo dicto oēs, qui audierāt, in riſum ſoluti ſunt, q̄ cum tot eſſent, quæ appoſita ſedi ad excretionem excitarent inteſtinum, ille omnibus præteritis ad murium conſugiſſet ſtercus. Nam re vera pudendum eſt alia etiā experiri velle, cum oēs ceu curioſum & præſtigiatōrem condemnent eum qui talia aut faciat, aut dicat. Itaq; de murium ſtercore hæc quoq; ſufficiunt.

Stercus Crocodilorum Terreſtrium, & Sturnorum.

l. 1. c. 12. c. 112
p. 123. g

Cæterum Terreſtrium Crocodilorū, horum inquam exiguorum, & humi ſerpētium, Stercus pretioſum effecere mulieres delicioſæ: quibus non eſt ſatis, quod alia ſint medicamenta tā multa, quibus faciei cutis & tenſa & ſplendens efficitur, quin etiam adiungant ſtercus crocodilorū. Simile illi ſit & Sturnorum Stercus, cum ſolam oryzam ederint. Clarum itaq; eſt quod abſtergēdi deſiccandi q̄ facultatem, vtranq; moderatam, habent ſtercora eiufmodi, & multo moderatiorem & hebetiorem ſtercus ſturnorum. At ſtercus crocodilorum, ſicut à facie ephelen tollit, ita & vitiliginem, & lichenas.

Rhypos,

DE SIMPL. MEDIC. FACVLTV.

Rhypos hoc est Sordes, Hominum, & Ouium.

E

Sordes nascitur non tñ per totam corporis cutem, sed & in auribus: sed ob paucitatem paratu difficilis est. Proinde de illa nihil scribunt, nisi q̄ paronychys congruat sordes auriũ: quam sanè et solam per se licet accipere. Nā quæ in tota cute prouenit, & in balneis & in palæstris deraditur, conferens non nihil & ipsa pato quem vocant: de quo suprà disserui. Sed & generatio, eius naturam indicat. Nam si sordes est crassum illud ac terrestre, quod reliquum est eorũ, quæ per latentē transpirationem euacuantur, sequitur vt desiccandi vim habeat cū non nulla caliditate iunctam.

Ea tñ sordes quæ lanis Ouium inhæret & adnascitur, ex qua Oesypon quod vocant, conficitur, concoquendi vim habet similem butyro: paulum verò et digerentis facultatis obtinens.

G A L E N I D E S I M P L I C I V M MEDICAMENTORVM FACVLTATIBVS LIBER VNDECIMVS

ARGVMENTVM LIBRI

Adduntur, Quæ superiori libro de Medicamentis ex Animalibus deerant,
Ac quæ ex Mari, & Salsis Aquis proueniunt.

Quæ Animalia Carne aut Sanguine careant, vel prædita sint.



Leræq̄ animantiũ partes communes inter se omniũ sunt: nulla tñ est æquè communis vt caro. Hanc enim habet omne animal sanguine quidem præditum, vt homo, & oēs quadrupedes, tum aues, serpentes, lacerti quos sauros vocant, testudines, & quæ sunt eius generis. Sanguine carentia, tum ostrea omnia, tum nō pauca genera eorũ quæ in aquis degūt, sicut & nō nulla quæ in terris. Et quod ex animantibus maximè editur, caro est: nam & viscerum plurima moles ex carnibus ipsis inhærentibus constat. Verum nō nulli medicorum carnem viscerum Parenchyma vocandam censent, propterea q̄ ex

A. l. 2. c. 2. ca.
145. fol. 116. b.

venis effusus sanguis circum vasa omnia concresecat, vt ipsi arbitrantur: sed eam quæ visitur in G musculis, solam carnis appellatione dignantur. Verum de nominibus, vt semper monemus, cōtendendum non est: sed exercenda potius rerum scientia: Cuius nos quoq̄ studio vsq̄ dediti, quæcunq̄ tum de proprijs cuiusq̄ animantis partibus, tum de cōibus cognouimus, ea q̄ partim experientia, partim ratione docti, omnia deinceps exponemus, orsi à Carne propriè dicta.

Caro { Viperæ. }

Non oēs animalium carnes hominem nutriunt, sed quorundam et lethales sunt, nō secus atq̄ venena quæ vocant deleteria. Tum inter eas carnes quæ hominem nutriunt, quædam hoc ipsum tñ sunt, nempe nutrimentũ: quædam verò suprà q̄ q̄ nutriunt, habent & facultatem ceu medicamentũ, qñquidem desiccando, humectando, exsiccando, ac refrigerando, corpus alterant. Nam Viperarũ carnes palā videre est exsiccantes & desiccantes, vbi condiuntur ceu anguillæ, nempe oleo, sale, anetho, porro, & aqua, seruato nimirum mō. Quod aut totum corpus per cutim euacuent, discere tibi liceat vel ex ijs, quæ ego iuuenis etiānum in Asia nostra sum expertus: q̄ singulatim deinceps narrabo. Homo quidam morbo, quem Elephanta cognominant, laborans aliquousq̄ cū sodalibus conuersabatur, donec ex ipsius consuetudine conuersatione q̄ quidam nostrum morbi inficerentur contagione: & ille iam odoratu grauis, ac fœdus redderetur aspectu. H Constructo igitur illi tugurio proximè vicum in iugo collis pp fontem, illic hominem collocat, tñ illi quotidie ciborum ferentes, quod vitæ sustinendæ satis foret. Cæterũ ad canis exortũ, cū fortè messoribus haud procul inde metentibus vinum esset allatũ in fictili sanè q̄ fragrans, is qdẽ qui attulerat, deposito illo, ppe mellores, abiit. Verũ vbi eius bibendi aduenisset tps, sublato fictili adolescens, vt pro more impleto cratere, competente aqua vinum temperaret, in cratera vinum effundit, & vnà excidit vipera mortua. Qua re attoniti mellores, veriti ne quod, si ebibissent, inde sibi malum eueniret, suam quidem sitim aquæ potione sedare maluerunt. Cæterũ cū illinc discederent, præ humanitate videlicet ac misericordia homini illi elephanti obnoxio vinum largiuntur, rati expedire illi potius mori, q̄ viuere in ea miseria. At ille vbi bibisset, admirandum in modũ sanitati restitutus est. Nam tuberosum illud oẽ cutis totius non aliter q̄ animalium, à testis mollitiæ nuncupatorũ malacostracon, tegmẽ decidit: quod aut reliquum erat, molle admodũ apparuit, instar cutis cancrorum & locustarum { carabos Greci vocant, } vbi extima testa fuerit detracta.

A. ibid. c. 142.
f. & c. 608.

Alterũ quoq̄ eiusmodi nō dissimili casu in Mysia Asia, nō pcul ab vrbe nostra accidit. Vir qdam Elephanto laborans profectus est ad aquarũ calidarum sponte nascetium vsum, speras inde non nihil se commodi adepturum. Erat illi scortum mancipium, iuuẽcula sanè formosa, compluribus

Aribus amatoribus ambita. Ille istius fidei tū nō nulla alia ad rē domesticā spectātia, tū penū ipsū, crediderat. Profectis igitur illis, in ædibus, quibus vicinus erat locus squalidus, & viperarum ple-
nus, forte fortuna ex illis vna in vrceū vini incidit negligētius positum, extincta q̄ est. Ac scortū
quidē in lucro id reputās quod forte euenisset, hero id vini ppinat, atq; ille ebibit. Ceterū exinde
ad eū modū, quo ille qui degebat in tugurio, perfanatus est. Porro tertiu quoq; annectā, quod ex
nostra profectū est imitatione. Cū qdā hoc morbo ægrotaret, animo magis, q̄ vulgus, philosophi-
co, & contēptore mortis, oppidō q̄ grauius ferebat: satius q̄ dicebat mortē semel perpetu, q̄ vitā
viuere tā miserabilē. Itaq; illi quē superioribus duobus accidissent indico. Erat autē ipse auguriorū
peritus, & amico vtebatur mirifice hāc disciplinā tractāte. Itaq; vbi ad auguriū cū illo confedisset,
persuāsus est, vt quā per experiētiā essent cognita, ipse imitaretur: atq; epoto vino, quod sic erat
veneno infectū, leprosus factus est: ac postea leprā eius nos cōsuetis remedijs sanauimus. Quar-
tus præterea viuas capere vīperas arte instituit. Sed illius morbi tantū erāt in illo principia. Itaque
cura studiū q̄ nobis fuit, vt illū q̄ celerrimē sanitati redderemus. Quocirca misso sanguine, atra q̄
bile medicamēto detracta, vīperis quas capiebat vti iussimus, præparatis in olla anguillarū in mo-
dum. Atq; hic ita sanatus est, euaporato per cutē affectu. Postremo & alius vir quidā opulentus,
Bnō nostras ille quidem, sed ex media Thraciā, Pergamū aduenit, admonitus somnio. Vbi iubente
Deo per insomniū, vt quotidie medicamentum biberet, quod confectū est ex vīperis, foris q̄ cor-
pus inungeret, nō multos post dies morbus in leprā abiit: rursū q̄ & hoc pathos, quibus Deus
præcipiebat, medicamētis curatum est. Sanē Viperarū Caro adeo ingentem obtinet desiccā-
di facultatē, vt quidam, qui eam edere, vehemētissima cruciati sint siti: ac pinde illas, Dipsadas co-
gnominant. Sunt autē qui dicant demorsos à vīperis satiari non posse potādo, sed dirumpi citius,
q̄ siti liberari. Quocirca eos qui Romē vīperas venantur, quos Marfos nuncupant, percontatus
sum, ecquid haberent signi quo genus vtrunque viperarū discernere. At illi prorsū negabāt
vllum esse genus viperarum dipsadum, verum eas quæ iuxta mare atq; in locis degunt falsedinē
multam habentibus, carnem obtinere falsam: ac proinde in Libya talium ingentem esse prouen-
tum, in Italia verò propter regionis humiditatem non inueniri. Atq; hæc quidem narrantes audi-
ui Marfos: non tamen certo dicere queam, an in totum verum dixerint, an partim etiā falsum.
Nam quasdam esse vīperas in ijs, quas memorabāt, regionibus, quibus falsa sit caro, vel maximē
mihi videtur esse probabile: scio enim cū cibis animalium mutari carnes: non tñ nullum esse ge-
nus viperarum dipsadum pronunciare valeam. Caterum tutissimum est cauere, ne in eiusmodi
Cregionibus vīperas venemur seu ad esum, seu ad medicamenti præparationem, quale est & hoc
præclarum quod medici propē oēs Theriacam appellant. Porro qm̄ ex more, cū Artiscos
Theriacos, quos vocant, præparamus, non tñ caput sed & caudam earum abijcimus, subijci mihi
frequenter rationabile fortassis esse, caput quidem totū abijci ob venenū, quod ore continent, ve-
rū à ratione alienum esse, adimere & caudam. Nec enim dicere liceat q̄ id faciendum sit ob recremē-
ta nutrimenti tum liquida, tum sicca. Nam interfectis atq; excoriatis apertis q̄ exempta interanea
omnia abijcimus, vt sola sit carniū substantia reliqua vnā cum arterijs venis q̄ per ipsas innatis,
quarum minima moles est vt ad totam carnem, ac ne apparens quidem, nisi quis multum diligen-
ter intentis oculis cōsideret. Atq; Artiscos, quos & Theriacos vocant, hunc in modum præpara-
mus. Purgatas illas in aqua lixamus, quoad exactē nobis videantur coctæ. Indimus autem ab ini-
tio statim aquæ anethum, & post coctionem spinas à carne separamus: mox panī ad læuorem tri-
to carnem commiscemus. Verum non quemlibet panem citra delectum accipimus, sed q̄ fieri pos-
sit purissimum simul & probē in clibano coctum, & salis simul q̄ fermenti quod satis sit habētē.
Eum autē antea desiccamus in ædibus siccis, minime q̄ humectis, donec adeo siccus efficiatur, vt
in mortario contundi possit. Non tñ tundentes miscemus, verum aqua in qua decoctæ fuerant vi-
Dperæ, maceramus: & carnem ipsam prius q̄ commisceatur panī, in mortario coquorum eatenus
conterimus, donec exactē reddatur leuis. Postea paruos artiscos fingentes, atq; in ædibus calidis
siccis q̄ desiccantes, deinde quoq; in talibus repolitos seruamus. Hos ergo ineunte æstate confici-
mus: quo potissimū tempore optima est viperarū caro. Porro vtimur eis postea contulis denuo
& cribratis, & rursus ad læuorem redactis, salis non nihil adijcientes ad suauitatē præparati: cuius
etiā aliquid ipsi theriacæ inijcimus. Ceterū eodē quoq; tpe ex Viperis assatis Salem conficimus,
viuis illis in ollam nouam iniectis vnā cum ijs medicamentis, quē illis & substerni & apponi alio
lento: quē omnia nunc commemorare non est præsentis negotij. Nam inuenientur fortassis etiam
qui me non iniuriā reprehendent ob monstratam hoc in loco Artischorum præparationem, tanq̄
alieno tpe expositam. Verum hæc posteaq̄ dicta nunc sunt, seruentur tñ ac maneant, et si non ad-
modum videantur huic instituto propria. At quæ sequuntur, conuenienti dicantur modo: Cō-
ueniens autē est, generalis facultatis meminisse, Carnem Viperinam dicendo exiccatoriam, & valē-
ter digerentem, mediocriter verò excalfacientem. Properat autē, vt videtur, vis eius ad cutem, per
eam videlicet quæ in corpore sunt recremēta exigēs. Quibus ergo assatim est malus succus in cor-
pore, ijs ingens prouenit pediculorum numerus: & à cute ceu squama abscedit ac decidit extima
cutis, & quam Græci vocant *ἐπίδερμίδα*, ad quā sistuntur ac retinentur crassi terrosi q̄ humores
ad

ad cutem protrusi, à quibus quidem psora, lepra & elephantes nascuntur. Et hæc quidem habui E
quæ de viperarum carne dicenda putarem. Rursum ergo sermonem repetâ. Calidiorum natu-
ra animalium carnes non solum nos alunt, sed etiam calfaciunt, frigidiorum autem refrigerant:
sic etiam licciorum carnes desiccant, humidiorum humectant. Memoria itaq; repete, quemad-
modum didicisti in libris de Temperamentis, q; ubi conieceris animal quoduis temperatura esse
siccius, velut exēpli gratia suæ syluestre domestico, huius & carnē cognoscas eē magis exiccatoriā,
& secundū alias temperaturarum differentias similiter: puta sue sicciorem ouem, & hac capram,
qua bouem, quo deniq; leonem: Sic in caliditate leo calidior est cane, canis tauro, taurus boue exe-
cto. Itaq; proportionem, qua cetera animalia in temperatura excedunt, & carnes quoque corū dif-
ferunt atque exuperant. Proinde ubi consilium fuerit corpus exiccare, licciorum temperie anima-
lium carnem exhibeto: calfacere autem volens, calidiorum: & frigidiorum, si coneris refrigerare:
deniq; si humidius reddere, humidiorum. Nec parua existit carniū differentia, cum quasdam
sale condimus. Nam prorsum diuersæ atq; alię euadunt, adeo ut sæpenumero animalis tempera-
tura humidissimi caro salita longē euaserit exiccātor, quā ea, quæ natura fuerat sicca. Porro in-
ter eas, quæ salitæ nō sunt, liccior est, q̄ assa est, q̄ in aqua elixa. Scripserunt aut & aliorū animalium
carnes quidam prodesse tum comestas, tū in partes affectas impositas, Vt Erinacei[†] terrestres desic-
catam, si bibenda prebeatur elephantō obnoxiijs, cachectis hoc est qui mali sunt habitus, tum con-
uulsionem sæpenumero patientibus, nephriticis q; & ijs qui laborant aqua inter cutem quā ana-
sarca vocant. Ac si ea efficere potest, facultatem habuerit valenter simul digerētem desiccantē q;.

F A. ibi. c. 145. fo.
116. f.

† AP. mucosos
tumores.

Sicut & caro Mustelæ { Græci Galen vocant, } arefacta, quæ utiq; comitali morbo afflictiōs iu-
uat epota. Sed & salitorum Hælorum carnem ad lauiorem contritam palos & spicula educere
aiunt, impositam videlicet, tanquam trahendi vim habeat. Porro Mutolorum { quos Myacas
Græci vocant } carnem vlcibus à mordente cane inflictis competere. Ego verò nullam insignē
inuenio facultatem, quam requirant id genus vlcera, tanquam ea, quæ à rabido cane mordente
sunt illata. At Cochlearū caro prius in mortario contusa, ac postea ad lauiorem redacta, omnium
valentissimē desiccet partes superfluo humore grauatas, adeo ut & hydericis contineat. Ipse au-
tem Humor solus per se citra carnem (vocatur autem is à vulgo cochliu myxa hoc est mucus li-
macis,) thuri mistus, aut aloæ, aut myrrhæ, aut horum quibusdam, aut omnibus, quoad accipiat cæ-
rati crassitiem, medicamentum fit tenax, desiccet q; purulentos mucos } aurium. Sed & fronti im-
positum inhaeret, oculorum fluxiones resiccans. Quidam etiam ad palos eximendos vtuntur to-
tis vnā cum testis ad leuiorem tritis: sed & quidam ad sistendos menses. Equidem ego aliquan-
do in agro carnes ipsas solas in vulnus cum nerui vulneratione & contusione factum tritas im-
posui, ipsum q; vulnus pulchrē glutinatum est, & neruus phlegmonen haud perpeffus: erat au-
tem homo durus & agrestis: miscui tamen illis contritis pollinem farinæ acceptum à pariete mo-
læ proximo. Scripsere autem maiores me non nulli medici ad eiusmodi vsum miscendum thus,
aut myrrham, vel vtraque. Verum horum habebam tum neutrum, ut qui tunc ab vrbe abessem
in agro. Possis autem & resinæ frictæ contritæ admiscere, si adlit, quippiam. Porro ubi multum
muci cochlearum accipere voles seorsum, stylo carnem earum pungito. Sed nō ante multos dies
venatas esse expedit, alioqui enim tempore desiccantur: nam recentes plurimum habent viscosæ
illius humiditatis, quam stylo punctæ effundunt. Humiditas hæc pilorum in palpebris præ-
ter naturam gluten est.

Pimele, & Stear Pinguedo, & Adeps.

Pinguedo, & Adeps.[†] Et hæc quoq; communissimæ sunt inter animalium partes. Nam quæ-
cunque bene nutriuntur, ea omnia aut pinguedinem, aut adipem obtinent: quæ verò macilentia
sunt, male q; nutriuntur, sæpe omnino ne habere quidem, sæpe verò pauculum id q; siccum, ut
ægrè uti possis, apparent. Porro Differt à pinguedine adeps, q; crassior sit: ac propterea animan-
tibus totam naturam terrosiorem habentibus adeps prouenit, velut humidioribus pinguedo.
Proinde Pinguedo celeriter in ignem posita liquefcit: nec facile, ubi liquata fuerit, rursum cōcre-
fcit ac cogitur: At Adeps nec facile funditur liquefcit: ve: & fusus celerrimē coit ac congelatur,
multo q; apparet pinguedine durior. Sus enim bene habitus pastus q; multam habet pinguedi-
nem, ob naturalem temperamenti humiditatē. At Boues & Capræ, & quæcunq; { id genus } cor-
nigera ob siccitatem adipem plurimum generant. At tu si voles, oleosam & pinguem in anima-
libus substantiam omnem, adipem appellato, ut pleriq; medici: sed & pinguedinem appellare to-
tum hoc genus licet: Non tamen licet citra mendacium adipem caprinum humidiores esse di-
cere, quā suum: nam hic omnium fermē aliorum est humidissimus, ac proinde actione sua vi-
cinam oleo vim possidens, quanquam oleo magis tum emolliat, tum concoquat: ac proinde cata-
plasmatis quæ ad phlegmonas accommodantur, commisceri solet. Qui verò mordicationes per-
petiuntur aut in recto intestino, aut in colo, ijs potius caprinū adipem quā suillum inijcimus:
non q; acrimonias plus obtundat (nam ex natura sua suillus obtundit magis, ac proinde miscetur
medicamentis vlcera curantibus, cuiusmodi est quod vocant Parygrum) sed quod caprinus ob
crassitiem citius concrefcet, suillus autem instar olei defluat: proinde ipsum potius dysentericis
&

A. l. 2. c. 70.
fol. 106. g.

A & tinesmosis iniicimus, quando morsum eorum mitigare consilium est. Porro ob tenuitatem essentiae non nulla acrimonias magis retundunt, ubi nimirum in alto mordicatorum corporum quod molestum est haerit. Nam quod crassiorum est partium minus, magis autem quod subtilium, tota corpora penetrat, & omnibus ipsum saniebus mordicantibus permiscetur. Hac ratione Adeps Anserinus, quae in alto corpore mordicat, magis obtundit: sed & suillo calidior est. Horum tamen in medio est Gallinaeorum adeps ac Gallinarum. Porro calidior semper ac siccior est Matulo animalium: & horum ipsorum execiorum minus tum calidus, tum siccus: quippe Mas caliratus eiusdem semper generis foeminae assimilatur. Hoc autem sermonis caput commune est, cuius meminisse oportet, Pro animalium temperatura semper existere differentias eius, quae in illis est, pinguedinis, aut adipis, aut quocunque modo appellare libebit totum hoc genus corporis in animalibus oleoli & pinguis. Igitur cum Sus omnibus prope quadrupedibus animalibus in caliditate ac siccitate inferior sit, proinde pinguedinem quoque minus habet calidam, magis quae humidam.

Omnis igitur pinguedinis facultas est humectatoria & excalfactoria humanorum corporum, huius enim meminisse perpetuo oportet in principiis huius operis dicti: at Differentiae quae sunt cuiusque singulatim, in maioris minoris quae ratione sunt. Nam pinguedo Suis, ut ad nos quidem, largius humectare potest, sed non aequae excalfacere, sicuti neque oleum: verum pinguedinis suavis talis est caliditas, qualis spectatur in nobis. Porro Taurorum Adeps suillo multo calidior est & siccior, rursus id memoria repetentibus nobis marem foemina esse tum calidior, tum siccior: marem autem castratum adsimilari foeminae, velut quicquid iuuenilis est etatis. Et inter iuuenilia foemina mare humidior est, & minus calida. Sic & Adeps Vitulinus taurino minus tum calidus est, tum siccus: & Haedorum quam caprarum: sed & Caprarum minus quam hircorum: & rursus Taurorum minus quam leonum: Nam horum adeps omnium prope quadrupedum adipe potentius digerit, nam & caliditate exuperat, & partium tenuitate. Itaque si ipsum medicamentis ad ulcera & phlegmonas conuenientibus commisceas, non modo nihil adiuueris, verum etiam laesis, nimirum addita maiori, quam conueniat, acrimonia: Inueteratis tamen tumoribus atque scirrhi in morem induratis, tum neruorum curuaturis, *ζαγκύλας* Graeci vocant: & in summa quaecunque scirrholosa sunt, iis aptissimus est: in quibus sane minime appareat efficax suillus. Taurinus autem ab utroque ex aequo distat: ut quanto calidior siccior quae suillo est, tanto superetur a leonino. Itaque tanquam in medio consistens, merito utriusque medicamentorum miscetur generi, & ei scilicet quod scirrholis medetur, & ei quod phlegmonas concoquit, cuiusmodi est

* Al. suppurat.

Cetrapharmacum quod vocant, ex cera, resina, pice, & adipe constans. Nam siue in hoc taurinum, siue vitulinum, siue hircinum, siue caprinum, siue suillum indideris, semper puri mouendo aptum & concoctorium medicamen effeceris. Sed suillus si addatur, in pueris, & foeminis, & ut breuiter dicam, omnibus, quibus caro est mollior, competit. Sin taurinum adieceris, fossoribus & mellioribus, & omnibus carnem duram habentibus, siue ob naturalem temperiem, siue ex ratione ac forma vitae, conueniens effeceris. Caterum Adeps omnis dum inueterascit, se ipso & calidior, & tenuiorum partium efficitur, ac proinde quoque valentius digerens. Verum id omnibus inueterascentibus accidit, quae quidem non putrescere anticipant. Nam vinum, mel, acetum, frumentum, butyrum, oesypus: oleum omne siue lentiscinum, siue cicinum, siue raphaninum, siue ipsum quod ex oliuis conficitur: vetustate & calidiora & tenuioris essentiae efficiuntur: ac proinde gustantibus apparent acriora, & ad induratos aegre quae solubiles affectus adhibentibus potentius digerentia. Atque ego sane gustantibus acriora videri dixi: at quidam, quibus studium est nominum significarus corrumpere, non acria sed adstringentia vocant id genus omnia, adusque piper: tanquam inter sit nihil, adstringens an acre dixeris. Et si denovo illos roges de galla, myrto, mespilis, mali punici putaminibus quae sidia vocant, rhoon, & omphacio, & haec dicunt adstringere: tamen si aduersum

* πικρὸς est in impressis. si uero mētumised in manu scriptis πικρὸς licetibus & in uetus et interpretis.

Dissimum ex illis sensum percipiamus ei, qui a pipere, pyrethro, napy, euphorbio, cæpa, allio, adarce percipitur. Igitur si quemadmodum adstrictionis vocabulum de utroque affectu, quem gustu percipimus, communiter efflerunt, sic ipsos quoque affectus unam habere naturam existimant, quiduis aliud potius habendi, quam homines, ut qui soli proprios sensus obtineant. At si omphaca, rhoon, gallam, balaustrum, hypocystida, contrahere constringere quae nostram fateantur substantiam: fecerere uero, mordicare, ac penetrare, piper, napy, pyrethrum: improprie adstringentia nuncupant quae mordicant & excalfaciunt, ceterum in cognoscendis ipsis medicamentis non peccant. Verum si oportet coniectantem dicere, in uocabulis an in rebus hallucinantur, equidem in uocabulis potius falsos viros illos dixerim, & maxime quibus Graeca lingua insueta est: Qualis est Dioscorides Anazarbensis, qui profectio multa bene dixit eorum, quae de materia medica memoriae prodidit, ceterum significata graecanicarum uocum non satis pernouit. Hic ergo cum ait magis esse adstrictorium adipem caprinum suillo, si quidem acriorem significare velit per magis adstrictorium, accipimus sermonem ceu uerum: at si illud, talem habentem qualitatem & facultatem, qualem rhus, rheon, hypocystis, balaustrum, haud uerum esse sermonem dicemus. Porro, quoniam Viperarum Adipem, ubi radicitus pilos sub alis euulseris, prohibere illos recrefcere illitum referunt, visum est mihi eius facere periculum esse satius: at ubi prout iubent fecissem, mentitos com-

pcri,

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

peri, sicut etiam quod initia suffusionum sanet. Verum Vrsorum adipem alopecias curare verè E est proditum: cum tamen probatiora habeamus ad eum affectum remedia. Porro cum dicat tamen Vulpinum adipem dolores aurium sanare, neque dicant quos aurium dolores, ceu non noscentibus ipsos distinguere attendendum non est. Alij Piscium adipem laudant, tanquam ad suffusiones, aut quemcunq; alium affectum nominare velint, congruat. Alij non simpliciter Piscium dicunt, sed addunt fluuiatilium: alij vero potius marinorum: quo videlicet aliquid plus scire videantur quam vulgus.

Myelos Medulla.

Medulla^a vim habet indurata & scirrhusa corpora emolliendi, siue musculis, siue tendonibus, siue ligamentis id accadat, siue etiam visceribus. Optimam semper expertus sum Ceruinam, deinde luniorum Boum, quos vitulos etiam nominant, ac proinde medullam eorū Vitulinam appellant. At Hircorum & Taurorum tum acrior est, tum siccior. Itaque durities scirrhosas dissolvere nequit, si qua etiam memoria manet eorum, quæ in quinto libro de his sunt prodia. Ex vitulina igitur & ceruina medulla pessi componuntur vteros emollientes. Et extrinsecus vteris medicamenta imponuntur, quæ ex medulla preparantur, vim habentia emolliendi. Accipitur autem non solum medulla ex Ossibus, quæ sanè re vera est medulla, sed & ex Spina, quæ & ipsam medullam nominant, spinalem videlicet, quæ tum durior tum siccior est, quàm alia: illa enim mollior est & pinguior: ac proinde ego spinalem seorsum per sese absq; illa repono. Sed ea mihi vtriusq; cura est, ne aut putrescant, aut situm colligant. Itaq; in hyeme primum eas capio, velut & adipem: deinde in ædibus siccis atq; editis, planè humoris expertibus, cū folijs lauri siccis repono: nam quæ recentia sunt & humida, multum etiā qualitatis suæ illis impartiunt, vt acriores fiant medullæ. At si quando ambiente calido & austrino medullas aut adipem voles reponere, paratū sit in hoc cubiculum neq; calidum, qualia ferè sunt quæ meridiem spectant, putrescunt enim in talibus: nec humo proximum, atque humidum, nam in talibus situm contrahunt: sed supernū atq; excelsum, & ad Aquilonem obuersum, paruas habens apertas fenestras, vt tam noctu quàm interdiu ab Arcto spirantes ventos accipiat.

A. ibi. c. 485.

Caput Mænidum.

Capitibus Mænidū sale inueteratarū Vitis, ad sedis fissuras utebatur quidam: & is ipse ad columellam diu indurata. Videtur ergo vis illarum esse desiccatoria, non admodū acris: nā id adustorum quæpiam obtinent, sicut omnia communiter desiccationem.

Caput Leporum

Alius Caput totum Leporis Comburens utebatur ad alopecias cum adipe vrsino.

Caput Saurarum id est Lacertarum.

Porro Sauræ caput contritum quidam palos & spicula extrahere memoriæ reliquerunt, tum myrmecias, acrochordonas, & clauos.

Cerebrum Leporis.

Cerebrum^a Leporis attritum & esum vtile esse didicimus pueris dentientibus, capite videlicet toto elixo, vt fieri solet. Non tamen eximia vis eius est, sed similis melli & butyro, & alijs, quæ ad dentientes pucros conueniunt. Quidam etiam aduersus metum vtiliter edi cerebrum hoc prodidere.

*Al. tremore.

A. ibi. c. 387.

Cornua Cerui & Capræ.

Cornibus^a Cerui & Capræ Vitis maxime vtuntur: vt & nos sæpe vti sumus, tum ad candorē dentium, tum ad contrahendas mollitie fluidas gingiuas. Ceterum Ceruinum maxime commendatur ab ijs, qui talia scribunt. Quod si ab vitione Lauetur, dysenteriam & sanguinis excreationē, præterea coeliacos affectus, sanat: & aurigini vtile esse dicunt. Porro duo exhiberi cochlearia ad omnia ista præcipiunt. Miscuerunt autem ipsum non nulli, vt dictum est vstum & elotum, collyrijs etiam desiccantibus oculorum fluxiones. Est enim scilicet omnium talium vis exiccatoria, velut & antè dictum est.

A. l. 2. c. 2. c. 178. fol. 120.

Pulmo Agninus, & Porcinus, & Vulpinus.

Pulmo Agninus, pariter & Porcinus, intertrigines à calciamenti curare creditur. At Vulpinus si bibatur resiccatus, asthmaticos iuuat.

Iecur Canis Rabidi.

Iecur Canis rabietis, si Assum edatur, remedium existere ijs, qui ab ipso fuerint morfi, quibusdam est proditum: Ac scio certè quosdā qui sumpsere, mansisse superstites, verum nō illo duntaxat vfos: siquidem alia præterea remedia, quorum fecimus periculum, in rabietibus tunc adhibuimus. Audiui verò quosdam, cū illi soli fidem habuissent, postea mortuos.

Iecur Caprinum, & Hircinum.

Porro Caprinum Iecur quidam Assantes, saniem q; effluentē excipientes, inungunt nyctalopa affectos. Vaporem etiam eius dum lixatur, oculis apertis excipiendum præcipiunt. Quin & Assum si edatur, & ad eosdem affectus accommodari aiunt: & eos, qui comitali morbo sunt obnoxij, arguere, conuulsionem q; illis accersere. Idem potest Hircinum.

A. ibid. c. 2. fol. 124. c.

Iecur

A

Iecur Lacertæ.

A. ibid. c. 639.

Iecur^s autem Lacertæ erosis impositū dentibus, eos dolore liberare non nulli scriptū reliquere.

Venter Mergi.

Ventrem Mergi quidam commendāt tanquam medicamen cōcoquens, & pepticum: id q̄ siue protinus lixum, siue arefactum comedas. At nos id experti vanam esse promissionem comperimus: sicut sanē etiam quod de interna Tunica Gallinarum memoriā est proditum. Aiūt enim quidam, si ea arefacta bibatur, iuuare stomachicos.

Iecur Lupinum.

Iecur Lupinum sapenumero in medicamentum indidi hepaticum, quod ex eupatorio conficitur: nec tamē, quod mentione dignum sit, amplius præstare comperi, ad illud videlicet cōparans quod sine ipso componitur.

Castorium.

A. li. 1. c. 2. cap. 122. g.

Testiculos Castoris^s nūcupant Castorium, medicamentū & celebre, & multi vsus. adeo vt Archigenes de castorij vsu totum conscripserit librum. Atq; ille sanē particulares eius facultates exposuit: nos verō velut in alijs medicamentis fecimus, ita & in hoc quoq; generalem modō facultatem dicemus. Quam si præ oculis habeas, ipse per te particulares inuenire possis. Itaq; q̄ exalfaciat, manifestum est. Nam si voles ipsum ad vnguem læuigatum oleo maceratum parti cuiquam infricare, euidenter illam incallescere percipies. Porro calefacientia omnia vbi contacta substantiæ quippiam digerunt, continuo etiam illam desiccant, nisi si quid natura fuerit humidum, ceu oleū & aqua, atq; aduentitiā qualitatem calidam, non facultatē assumpserit: sicut certē hæc ipsa igni Soli ve æstiuo admota. Itaq; cum castorij consistētia quoq; sit sicca, & calfaciendi potentiā habeat adiunctam, meritō desiccet: atq; hoc illi cum multis alijs medicamentis commune exitit. Porro quoniam impensē subtilium est partium, ob id plus valet q̄ alia, quæ similiter vt ipsum & calfaciūt & desiccant. Nam quæ tenuium sunt partium medicamenta, ijs quæ sunt crassarum, plus sunt efficacia etiam si parem sortita fuerint facultatem, nimirum quia penetrent & in altum subeant ad motorum corporū, potissimum si ea densa fuerint, velut neruacea. Palam igitur talia ob causam positam magnificē iuuantur à castorio. Cæterum falluntur medicorū pleriq; in vsu castorij, cum id modō considerant partem quampiā aut tremere, aut conuelli, aut sensu motū ve priuatam esse, aut ægre sentire, mouere^s ve, haud scientes id genus symptomata ad dissimiles sequi corporis affectus. At tu ab Hippocrate doctus ex plenitudine pariter & inanitione conuulsionem cōsequi: C vbi quidem quæ in neruis continentur præter naturam, euacuare consilium est, ibi & bibendum exhibe, & foris cui castorium impone: vbi verō ex siccitate nimia obuenerit conuulsio, scito hoc medicamen illic esse aduersissimum. Ad eundem modum ijs qui præ plenitudine tremunt, vtilissimum: aduersissimum vero ijs, quibus id accidit ab inanitione. Ad portionem modo dictorum affectuum, vbi singultus euenerit stomachi, perscrutato prius inuento q̄ illius affectu ac discreto, siquidem à plenitudine ipsum ægroui perpetiantur, ad castorei vsum accedito: sin autem à siccitate & euacuatione, aut acrium humorum morsu prouenerit, medicamē hoc fugito. Sanē si odori gustui q̄ aduertat animum, suspicaberis humano corpori aduersissimam habere substantiam: tamēli in natura nihil efficere comperiat eorum, quæ talia facere assolent. Siquidem alia stomachum vitiant, alia ventrem, alia caput, alia aliam quamuis partem lædunt: At hoc medicamen siue corpori humido applices resiccationem poscenti, siue frigido exalfactionem, siue humido simul frigido q̄ exalfactionem pariter & resiccationem requirenti, magnam vtiq; experiere commoditatem: nec vllam parti cuiquam noxam afferet, potissimum si feбри vacet, aut non admodū calidam perpetiatur homo febrim, sed vt sic dicam tepidam, qualis accidit in cataphoris maximē & lethargis. Ac multis sanē castoriū exhibuimus vnā cum pipere albo, vtrunq; mēsurā cochlearij ex melicrato bibendum præbentes: nec quisq; vllam sensit noxam. Sed & mensibus retentis, vbi per venam quæ in talo est, modice euacuassem, oblato castorio vnā cum pulegio aut calamintho, semper medicamen hoc expertus sum purgationem ciere absque foeminæ læsione. Præterea secūdas morātes erigit. Ea q̄ omnia ex melicrato potum efficit. At quibus ita venter flatu distenditur, vt ægre curationē admittat, ita q̄ torminibus vexat atq; singultu, id q̄ ob frigidos crassos q̄ humores, aut crassos flatulentos q̄ spiritus, eos ex oxycrato potum adiuuat. Quæ porro iuuat in corpus intro sumptum, ijs prodest quoque cuti impositum cum licyonio aut veteri oleo: quæ verō ampliori caliditate indigent, ijs etiam per sese infricari debet. Iuuat etiam, si quis suffitum eius in prunis impositi inspiratione hauriat, maximē affectus humidos & frigidos in pulmone aut capite consistentes. Attamen lethargicos & cataphoricos affectus omnes, qui quidem adiunctam habent febrē, præstat non dictorum oleorum quopiam macerātes curare, sed potius ex rosaceo capiti collo q̄ imponere.

Renes Scincorum.

ibid. ca. 696. 637.

Renes^s Scincorum bibunt quidam tanquam pudēda intendentes: Quorum contrariū accidere videtur maxime semini lactuicæ potō ex aqua. Sed & quidam lenticularum decoctum cū melle bibitum intentiones sedare referunt.

6^a. Aphor. 39. Ext. ord. 50 f

*A. P. v. l.

V. n. g. e. s.

DE SIMPL. MEDIC. FACULT.

Vngues Caprarum, & Asinorum.

Quidam^{*} Vngues Caprarum deustos mox q̄ acetō perfusos alopecijis illinūt. Itaq; fuerit & talis Cinis facultatis extenuatoriæ. Sunt autem qui combustos Asinorum Vngues comitialē morbum curare dicant, si scilicet assiduo bibantur: si verò oleo macerentur, chœradas digerere: Sed & ipsum Cinerem, si succus inspersus fuerit, sanare p̄rniones siue chimethla.

* AP phychla.

Ossa.

Ossa^{*} Cōbusta admodum digerentē exiccātem q̄ vim obtinent, & id maximè, vt quidā asserūt, Humana. Certè Talū Suillū combustum, ac deinde bibitum, inflationes & tormina sanare dixerunt. Noui aut nostratium quosdā Ossa cōbusta potui exhibuisse, haud sciētibus qui biberēt, quid nā ebibissent, ne scilicet auerfarentur: ac multorum tum epilepsiam, tum arthritin, curasse.

Senecta Serpentis.

Senectam Serpentis scripsere quidam in aceto Bullitam dentium mederi doloribus.

Pellis Ouina.

Pellis Ouina recens detracta, circumposita ijs, qui quocunque modo fuerint verberati, omniū luculentissimè adiuuat, adeo vt die ac nocte vna illos curet: concoquit enim & digerit quæ sub cute sanguinem habent.

Equorum Lichenes.

Equorum^{*} Lichenas cum aceto tritas comitiales curare scriptum quibusdā est. Alij verò & ad cuiusvis feræ morsum adhiberi consulunt.

Tela Aranei.

Aranei Telam scribunt quidam à phlegmone tueri summæ cutis vlcera.

Coria Vetera.

Coria^{*} Vetera, quæ videlicet veteramentorum sunt, Vsta, ad attritiones commodari calceamentorum scriptum à quibusdā est, tanquam scilicet hoc faciant ex antipathia quadam. Certe quæ phlegmone obsidentur, haudquaquam iuuantur: verum vbi sedata fuerit phlegmone, non iniuria iuuantur, nempe quia resiccantur: est enim talis cinis resiccatorius. Ac nos sanè quandoq; in agro ad vlcus eiusmodi ex attritione sumus vsi. Curat autem talis cinis nō ab re vlcera ambusta, & quæ vocantur intertrigines in feminibus existentes.

Ostreia.

Ostreia^{*} quidam nuncupant omnia ostracoderma hoc est testacea ab Aristotele appellata. At quod à plerisq; vocatur Ostrecon, secunda syllaba absq; scripta, vnam esse ostræorum speciem cōstituiunt, in toto genere comprehendentes & buccina, & purpuras, & chamas, & pinas, & similia omnia, de quibus deinceps dicam.

Buccina, & Purpura.

Buccinorum^{*} Purpurarum q̄ Testa quādoquidem durissima est, nunquā absq; vstione vtor: Atq; vsta quidem deliccandi vim admodū possidet. Cæterum ad vnguē eā læuigare plane q̄ polinis in modū necesse est, tundendo scilicet & cribrando prius. Quod tibi cōmune sit in omnibus lapideis testaceis q̄ subitantijs præceptum: nam nisi exactè leuia sint reddita, arenis similia sunt.

Per se autem illarum tritarum farina vlcerebus malignis competit. Id quod ipsum quoq; cōmune est omnium, quæ citra insignem morsum desiccant vehementer: quippe cum alioqui fluxionū causa existāt. Sed & aliud est omnium id genus commune, nempe vt cum aceto, aut oxycrato, aut ænomelite, aut oxymelite, idonea sint vlcerebus putrescentibus. Idcirco lapides omnes vbi ad eū vsum applicantur, alij magis, alij minus, certè omnes conferunt.

Ostreia.

Ostreorum^{*} Testa Vsta similis est facultatis Buccinorum testis, tametsi etiam subtilioris, immo vt certius verius q̄ dicam, minus crassæ. Nam terrosam duram q̄ corporis sortita consistentiam concretionem q̄, impediō omnia crassarum sunt partium. Itaque accuratè ea læuigare necesse est. Quamobrem cum dicimus horum aliud aliō esse tenuius, ita inaudienda dictio est, tanquam si Vlysses Therlite dicamus maiorem, cum vterque tamen fuerit paruus: aut Aiace Achille minorem, cum ambo itidem fuerint magni. Cæterum omnia id genus (vt & antea est dictum) cogendi quandam in se facultatem obtinent, per quam condensata eorum essentia, dura terrosa q̄ sunt reddita: quam vbi per vstionem deposuerint, contrariam adsciscunt facultatem, quam vocāt digerentem. Porro si vsseris ea Laueris q̄, ignea tota natura in aquam deposita, ipsam efficiunt cum tenuitate excalfacientem, adeo vt & interdum putrefaciat: reliquum vero terrosum, morsus fit expers: id quod maximè implendis cicatrice q̄ claudendis vlcerebus humidis est vtile. Igitur Testa eorum, quæ peculiariter vocantur Ostrea, combusta vtor ad diuturnas ex fluxione ægre q̄ carne implebiles cauitates, nempe quæ fistulosæ sunt atque profundæ, eam foris cum suillo adipe veterato circumponens: id vulgò axungiam nuncupant. At in sinum ipsum aliquid eorum quæ talia carne implent, immitto, quale est † vstum Diaphanes, quod Specarium nominant.

† AP. æs vstum diphryges.

Parem in genere facultatem habent & cæterorū Ostracodermorum Testæ deustæ, maximè vero, vt dixi, ostreorum, deinde buccinorum, & purpurarum. Itaque Cinis eius generis emplasticis

E

A. ibid. c. 55. & 732.

A. ibi. c. 28.

F

A. ibi. c. 233.

A. ibi. c. 62.

A. ibi. c. 538.

A. ibi. c. 529.

A. ibi. c. 529.

A. ibidem.

A cis miscetur facultatibus digerētibus, & cum quouis adipe digerit. Verum quoniam inueteratus efficacius digerit, illi magis misceri solet. Porro potentius hoc medicamen digeret, si acrem illi adipem quempiam miscueris: de quibus superius determinatum est. Quin & dentes splendiores talium omnium cinis efficit, non tantum extergendi potentia, sed & asperitate substantiæ, velut & pumex, & testa clibanī. Verum in vsu eiusmodi non est necesse quæ sic vitæ sunt, admodum læuigare: at in vlceribus rebellibus præ omnibus diligenter sunt læuiganda ac inspergenda. Porro excrescentiam carnis mediocriter exterūt comprimunt q̄. Ad hæc cum sale omnia id genus vltadentium sinegma reddunt efficacius, adeo vt non modo laxitatem mollitiem q̄ gingiuarum desiccet, verum etiam vlcera putrescentia adiuuet.

Sepia.

Sepiarum Testa admodum laxa est, non vt ostreorum lapidosa. Itaq; absterfio quidem illi cum alijs ostracordemorum testis communis est, velut etiam desiccatio: cæterum partium tenuitas eximia illi præ ceteris inest. Quocirca Vsta ea vtimur ad vitiligines, ephelin, lentes, psoras. Quin & fossili sali mista, in oculis existentes vngues eliquat. Et antequam vratur contrita & læuigata dentibus splendorem adfert: vlcera q̄ desiccant. Porro hoc nomine, quod mediocre obtinet asperitatem, adhibemus eam & ad ingentes oculorum asperitates, quas sycofers appellare consueuimus. Nam exculpentes ex ea quiddam ipsa figura simile collyrio, eo illas confricamus, donec sanguinem reddere incipiant: quo facto collyria cathæretica siue detrahentia præstātius effectum suum in illas exerunt.

Opercula Purpurarum.

Opercula Purpurarū quidam memoriæ prodiderunt ex aceto bibita lienes turgidos sanare: & suffitu eas quæ vteri suffocatione periclitantur, iuuare: præterea retentas ejicere secundas.

Lana Oesypæ hoc est Succida.

A. ibi. c. 439.

A. l. 2. t. 1. ca. 5. fol. 96. g

Lana "Sordida, ac proinde à quibusdā appellata succida, idoneè excipit irrigationes, quæ adhibentur contusis, aut quomodocunq; percussis particulis, vt quæ vilitatem ex illis proficiscentem promoueat, id q̄ propter œsypon. Lota verò, nec amplius œsypon habēs, apta quædam materia fit humoribus qui irrigant, excipiendis. Porro Vsta "vim habet acrem pariter & calidā vnā cum partium tenuitate. Itaq; molles nimium q̄ humiditas vlcera carnes celerrime eliquat. Inditur & in medicamina desiccatoria. Vrito eam tanquam alia plurima, ollam implens nouam, quam tegat operculum multis foraminibus pertusum.

C

Pili Vsti.

Pili Vsti similiter vt vsta lana excalfaciendi desiccandi q̄ admodum sunt facultatis.

Ouorum Facultas.

A. l. 2. t. 2. c. 520

Consequens "fuerit ad partium doctrinam de Ouis differere: nam alibi eorum meminisse non licet. Sanè Oua partes non sunt animalium, ceu nec arborum fructus, nec grauidarum foetus: verum proportionem respondet ijs quæ agnascuntur. Itaque eorum quæ agnascuntur, quædam planè familiaria propria que conspiciuntur tum plantarum tum animalium naturis: quædam non omnino talia, vt viscum quod agnascitur quercubus: & vt semel dicam, si qua arboribus alterius generis arbor, frutex, fructus, herba, aut omnino germen quodpiam vt fungi, agnascantur. Ex familiaribus autem est & ouium Lana, & aliorum animalium Pili: & Cornua, quæ decidentia denuo recrescunt, vt in masculis ceruis, ex hoc sunt genere. Conceptus autem siue foetus fructibus proportionem respondent, nimirum ad generis propagationem à natura creati. Ex his vnum est & Ouum factum ad generis successionem perpetuitatem que. Cæterum vtile est & tanquam nutrimentum: verum de nutrimento non est nunc institutum differere. Proinde quæ tanquam medicamentum efficere potest, ea hoc loco recensere, ex pauculis vsibus particularibus vim eius exquirens tum in partibus, tum in tota substantia. Siquidem quo pacto inuenta rerum cuiusque generali facultate, ad multos eam vsus particulares ducere possimus, didicimus. Insuper doctrinam sumus, quomodo ex vno altero ue experimento de generali facultate liceat colligere. Igitur ouorum Albū & tenue illud, quo item ad ophthalmias vtimur, ex numero est medicamentorum minime mordantium: nec vnquam effectum frustratus sum ex vlla tali intemperie, qualem habet sæpe lac, vt ante ostendimus, in animalibus cruditate perpetientibus, aut nimiam famem sitim ue, aut quæ cibis pasta sunt prauis: quæ sanè frequentius euenire solent mulieribus, ob victus videlicet vitæ que errorem. At oua vnā modò prauitatem patiuntur, quam scilicet adfert vetustas: eam que facillime effugias, si vtaris recentibus. Porro vilitatissimum nobis est maxime que parabile gallinarum ouum: ea propter illo vtimur, aliorum oua nihil curantes, tamen eandem illi habeant naturam. Temperatura porro symmetro frigidius est. Itaque vtendum est oui albumine non tantum ad oculos, verum etiam ad alia omnia quæ medicamenta requirunt suauissima minime que mordacia, vt sunt vniuersa sedis, ac pudendorum vlcera contumacia. Miscetur quoq; idoneè medicamentis profluium sanguinis ex cerebri inuolucris suppressimentibus, quæ nimirum citra morsum illinuntur, atque adstringunt. Sed & ad vlcera rebellia miscetur ijs, quæ absque morfu ea possunt desiccare, cuiusmodi est medicamen pompholyx elota,

& metallicorum quædā elota: de quibus priuatim supra differuimus. Porro & ipse Vitellus ad-
E similis est nature: ac proinde miscetur ceratis morsus expertibus, ouis videlicet aut lixis, aut assis.
Verum id tamen manifestum est hîc leuiculam existere differentiam, q̃ paulo plus delicent quæ
sunt assa: ac quantum huius accipiunt facultatis, tantum deperdant de mitigandi potentia. Misce-
tur & cataplasmatibus phlegmonen extinguētibz, vt ijs quæ ex meliloto constant, sed applicandis.

Crudo vero Ouo toto vtimur admisto rosaceo ad palpebrarum, aurium, mamarum q̃ phlegmo-
nas, quæ s. aut ic̃tis illis, aut alio quouis modo euenerint: aut extiterint in neruosis corporibus, pu-
ta cubito, & digitorum tēdonibus, aut articulis, id q̃ in pedibus pariter & manibus. Porro in ace-
to Coctum Ouum si edatur, fluxiones ventris deliccat. At si etiā quippiam eorū, quæ ad dysente-
riam aut coeliacum affectum conueniunt, adiunxeris, atq̃ in igne modico fumi q̃ experte (qualis
est qui ex prunis constat) fruxeris, edendum q̃ ita præbeas, non minime sanè laborātes adiuueris.
Aptissima talem ad vsum sunt omphaciū, rhus tum ipse q̃ cibis adspargitur erythros nūcupatus,
tū succus ipsius: galla, sicut hoc est mali granati putamina, cinis cochlearū integrarū vstarū. Apta
quoq̃ & vuarum acini, & myrta, & melpila, & corna. Magis istis medicaminosa sunt balaustium,
hypocystis, cytini siue mali punici flores. Sed & ad ambultiones protinus impositū est vtile, siue
quis seorsum albumen duntaxat ipsum molli lana excipiat, siue etiam cū vitello cōmiscens cōfun-
dens q̃ applicet: etenim mediocriter refrigerat, & citra morsum deliccat. Tale cum sit, & ad ana-
collemata vocata, quæ fronti videlicet imponuntur, vtimur: & pilos palpebrarū adglutinamus, ni-
mirum admisto idoneorum quopiā, cuius generis est thus, potissimū pingue si fuerit, ac non inue-
teratum & siccum. Verum in illiusmodi, ipsius albuminis commoda est viscositas, nō autem tem-
peries: nisi quis, quatenus nequaquā aduersatur illi quod adhibetur medicamento, eo nomine vtile
commodum q̃ dixerit. Nam viscosorum quædā sunt quæ aduersantur, velut viscū, nimirum acre
& calidum, ad ea quæ exalfieri non debent: dictum q̃ frequenter superius est ea, quæ validā vim
nullam obtineant medicamēta, ceu materiam ijs, quæ tales vires obtinent, misceri: proinde quoq̃
creberrimi sunt vsus, vt pote ijs quæ valenter agunt, inseruientia. Eiusmodi cum sit ouum, simul q̃
non paruam adipiscat in lixationis assationis q̃ quātitate differentiā, fit sanè multo vtilissimū. Nā
medicamentis, quæ humiditates deliccāt, aut lixum, aut assum, aut frictum, miscetur: ijs verò, quæ
incidunt ea, quæ in thorace pulmonē que sunt, forbile quod vocant: id quod in aqua eousq̃ lixari
debet, dū incaluerit. Eiusdem huius naturæ nomine & ad eos, quibus gutturis supremum aut ex
vociferatione, aut ex humorū acrimonia, exasperatum est, assumitur, tū scilicet q̃ affectis partibus
illinitur, atq̃ cataplasmatibus modo inhæret: tum q̃ substantia sua mordacitatis experte eas mitigat, G
sanat q̃. Eadem ratione stomachi, ventris, intestinorum, ac vesicæ medetur asperitatibus.

Echinus hoc est Erinaceus, Combustus.

Erinacei vtriusq̃ tū Marini, tū Terrestris, corpus totū vstū Cinerē efficit facultatis tū extergē-
tis, tū digerentis, tum detrahētis. Itaque eo quidam & ad excrescētia, & ad sordida vsi sunt vlcera.

A. l. 2. c. 23.

Cochlea, siue Limaces.

Cochlea si tota cū testis Vratur admista galla omphacitide, simul q̃ pipere albo, mirifice pro-
sunt dysenterijs, in quibus vlcera non dum cōputrescere cœperunt. Conuenit autem vt piperis sit
pars vna, galle vero duæ, quatuor cineris cochlearum. Hæc vbi ad vnguē leuigaris, cibis inspergi-
to: bibendum q̃ aut ex aqua, aut ex vino albo & austero, præbeto. Caterum absq̃ gallæ mitione ci-
nis cochlearum admodum resiccantis est facultatis, obtinens item non nihil ex vitione calidum.

A. ibi. c. 393. Et
529.

Porro Cochleæ quæ vstionē nō sunt experte, si trite vnā cū testis imponant, & toti vētri aqua in-
ter cutem laborantium, & in arthriticis articulorum tumoribus, ægre quidem diuelli poterunt, cœ-
terum impensè deliccant. Et sanè inherere sinere oportet, quoad sponte decidant. Idem q̃ facien-
dum in tumoribus ex ic̃tu natis difficile solubilibus, & ex contusione facta in auribus: deliccant
enim illos magnopere vniuersos, etiam si viscosus crassus q̃ in alto humor contineatur. H

Carcini hoc est Cancræ, Vsti.

At Fluuiatiliū Cancrorū Cinis quanq̃ similiter prædictis exiccatorius est, substantiæ tñ proprie-
tate mirabilis est eius in ijs qui à rabiente cane sunt morfi, effectus, is q̃ tū solus, tū cum gētiana &
thure multo præstātor. Thuris sanè partem esse vnā oportet, quinq̃ aut gētianæ, porro cācro-
rum decem. Et raro equidem aliter, illis vstis nos sumus vsi, cæterum ad eum modū plerunq̃, quo
Æschrion empiricus ille medicamentorū peritissimus senex, conciuis ac præceptor meus. Patella
erat aeris rubri, in quam impositos cancras viuentes, hætenus vssit, dum facile ad lauorem redigi
possent. Hic Æschrion paratum semper in ædibus hoc habebat medicamē tēpore æstiuo, vrēs eos
post ortum Canis, qñ Sol in Leonem transisset, non nisi Luna decima octaua. Porro bibendum
hoc medicamē ijs, qui à cane rabido fuissent morfi, præbebat quotidie diebus quadraginta, men-
sura cochlearij magni aquæ inspersum. At si nō protinus ab initio, verū aliquot post dies curam
cepisset demorfi, tūc quotidie duo cochlearia aquæ inspergebat. Ad ipsum vero vulnus emplasti-
cū applicabat medicamētū, quod ex pice brutia & opopanace aceto q̃ cōficitur, habens picis librā
vnā, vnū aceti acerrimi sextariū Italicū, opopanacis vero vncias tres. Hæc tametsi à p̃senti institu-
to essent aliena, scribenda tñ censui, quia magnopere medicamento huic ipse considerē: nimirum
cum

A. ibi. c. 147.

A cū nullus vnq; eorū qui illo fuerint vli, sit mortuus. Cæterum seorsum etiam librum cōscribam aliqñ de ijs, quæ proprietate substantiæ totius quid agūt, è quorum numero sunt id genus omnia. Ignoscendū itaq; tum hoc in loco scribendi importunitati, tum sicubi præterea id mihi hoc in opere contigit: nempe quia ex ijs summa proueniret vtilitas, quam sanè posteris impertire volebam, si forsā me, prius, q̃ q̃ post hæc deinceps sunt, opera perfecissem, mors occupasset propositum impediēs. Cæterū Pelops doctor meus & ipse oīum eiusmodi causas reddere volens, Non ab re, inquit, Cancer, cum animal sit aquaticū, prodest à cane rabido morsis, quibus videlicet metus est ne corripiantur affectu siccissimo, nēpe rabie: quamobrem sanè et aquam metuūt. Ac fluuiatiles, nō marinos, cōuenire cancos dicitabat, s. q̃ animalia marina ob admistionem salis natura siccissimi haud æquè exactam tuerētur eā, q̃ est aduersus rabie contrarietate. Ac cū quidā subiecisset, Cur nō omnia quæ in potabili aqua degunt animalia, perinde vt cancri, iuuari assolent: quia, inquit, similem cancris preparationē non admittunt, Nam horum vstorum cinerē, exiccatorius cū sit, canū rabientiū venenū absumere, simul q̃ digerere. Hec igit sanè Pelops dicebat, profitens ambitione q̃ magna iactans oīum se taliū nouisse causas. At ego, nisi planè me scire quippiā p̃suasum habeā, alijs p̃suadere nō tēto. Itaq; nec Pelopis rōnē vt verā accepi, vt quæ crebras habeat cōtradictiones: B verū cancos opinor ex pprietate totius substantiæ prodesse. Qm̃ aut nullū eorū, qui fuerāt illis vli, mortuū sciuerā, hæc aperiēda recēsenda q̃ à me existimaui: tamen nō esset huius instituti propriū.

Chelidones siue Hirundines, V Stæ.

Aibi. c. 347.

Sanè "corporibus totis (nam id erat propositum) non eorum tantum aīaliū quæ dixi, sed & Hirundinū vli sunt multi, Cōburētes videlicet, & cinerē mellis miscētes, ac deinde synanchicos inungentes, & in totū quicūq; in guttere ac columella cōsistunt cū tumoribus affectus. Vtuntur & ad acuendū visum hoc cinere non nulli. At alijs eas arefactas drachmæ pondere bibendas exhibent.

Tettiges id est Cicadæ.

Sed et Cicadis Siccis quidam vtuntur ad colicos affectus cum paribus numero piperis granis: dant q̃ aut treis, aut quinque, aut septem, per intermissionem videlicet, & per ipsos etiam paroxysmos. Porro alijs Asas edendas offerunt, quibus affecta vesica est.

Corydalis id est Galerita Alauda.

Galerita tamen auis illa pusilla obiter nobis plerunq; obuia, in iure elixa colicos adiuuat. Verum assidue eam edere simul cum iure necesse est. Habet verò hoc animal in capite velut galerum ex pilis sponte enatū, cuius occasione efficta est, quæ apud Aristophanē comicū legitur fabula. Is "Cenim inquit hūc in modum: Imperitus es, nec curiosus, & nec Æsopum quidē didicisti, qui ait galēritam primam volucrum fuisse, etiam ante terrā: inde patrē morbo defunctum, cū humus nō dum esset enata, dies quidem quinque iacuisse: at hanc præ inopia melioris consilij in capite tandem patrem suum defodisse. Hoc quoq; aiunt, obscure licet, designasse tamen Theocritum,

Οὐδ' ἐπιτυμβιδίαι κορυδαλλίδος, ἢ λεῖνον τί.

nempe indicare illum eas, quæ in capite tymbon hoc est sepulchrum gerāt. Annexui aut huic ista sermoni, quò planè & clarè hoc animal, nempe galeritā, significarē, quos ferat in capite pilos erectos: qñ quidē expertus sum eius aduersus colicos vtilitatem, velim q̃ qui ipsum non norunt, ijs bene aperte q̃ mōstratum. Etenim auiculis pyrgitis ac troglytis appellatis adsimilis est. Discernitur autem tum quia galeram habet, tum quia paulo maior existit. Nam & ipsa Corydalis appellata herba colicis conuenit. Et hoc quoq; tibi obiter sit notatum.

Alectorides id est Gallinæ.

A. ibid. c. 289.

At "Gallarum ius simplex retinendi vim possidet, vti Gallorum subducendi. Coquendi autem sunt cum sale prolixissime. Sed horum ipsi fecimus periculum.

Gale id est Mustela.

D Mustelam nunquam combussimus. De qua scriptum legitur, Cinerem quidē eius cum aceto illitum podagricos arthriticos q̃ iuuare, tanq̃ vehementer valeat digerere: Ipsam verò arefactam ac potam prodesse comitialibus, eadem nimirum illa facultate. Porro quidam etiam planè omnis feræ alexipharmacum eam esse referunt, & maximè eius ventrem.

Rana V Stæ.

Aibi. c. 589.

At "Ranarum vstarum Cinerem sanguinis eruptioni mederi referunt inspersum: Cæterum cum liquida pice sanare alopecias.

Hippocampus.

Et Hippocāpum, animal illud marinum si totum Vsseris, alopecijs prodesse proditum quibusdam est: ipsum q̃ videlicet deficcantis esse facultatis, extenuatis q̃, aut certè eius cinerem: Quem quidam vnguento amaracino cominiscunt, quidam pici liquida, alijs veteri adipi suillo.

Tellinæ Salsæ.

Aibi. c. 529.

Et "Salsas Tellinas vstas adeo vrentem efficere Cinerem aiunt, vt is cum cedria euulsos radicitus ex palpebris pilos, instillatus in locum, renasci prohibeat.

† Intestina Terræ, siue Lumbrici.

A. ibid. c. 198.
L. 718.

Porro "citra vstionem aut lixationem, totorum animalium in partes affectas impostorum, aut

Quinta Classis.

LLLLL ij

intro

* ἐπιπραττει
κῆς. sunt qui
legendū putāt
ἐπικρατῆς
i. contēperādi.

† In multis codicibus continetur hic sensus cū superiori vsque ad dictionem, scribunt: ibiq; incipit hoc caput, Intestina terræ &c.

*Al. profunt.
*Al. sunt.

intro in corpus sumptorum, quidam medicorum fecere periculum: aut ceu fecerint periculū, ita E scribunt: } Terræ quidem intestina cōtrita, neruis q̄ diuisis imposita protinus mirum in modum prodēsse: atq; hæc ipsa quoq; cum mulso pota medicamen esse mouendæ vrinæ idoneum.

Cimices.

Sed & de Cimicibus quibusdam traditum est, q̄ si cum aceto bibantur, hīrudines absorptas eij ciant: At nobis, cum eas perpetuo aliorum esu eiecerimus, haud opus fuit cimicibus.

Cantharides.

Veruntamen "sufficientem habemus de Cantharidibus experientiam, q̄ in vngues p̄forodes cum idoneis ceratis aut emplastris impositæ sic illos educunt, vt toti cadant. Miscuimus eas etiam facultatibus p̄foris & lepris congruentibus, nec non quibusdam septicis: atq; interim etiam ijs quæ clauos, quos vocant, eijciunt. Porro p̄ceptorum meorum quidam earum paulum quiddam in medicamenta vrinam mouentia solebat inijcere. At quidā solas alas & pedes inijciunt, quæ aiunt esse alexiteria ijs, qui corpora ip̄orum bibissent: alij contra: at nos totas indimus. Ceterum aptiores sunt ad ea, quæ expertum me dixi, eæ cantharidum quæ inuentæ in frumento lutea transuer- sim in alis cingula obtinent, potissimum si inijciantur in vas fictile, cuius ori linteum obductū sit rarum: itaq; illud inuertas, vt linteum halitum ab aceto subtus posito excipiat, donec emoriantur F ipsæ cantharides.

Buprestis.

Sic Buprestes quoq; reponere expedit. Sunt autem & ipsæ animalis quoddam genus cantha- ridibus tum specie tum viribus adsimile.

Pityocampe.

Quin & Eruca, quæ in piceis nascunt, meritò sanè nuncupatę Pityocapæ, huius sunt facultatis.

Salamandra.

Et Salamandræ combustæ Cinerem quidam septicis, & lepricis, p̄foricis q̄ miscent facultatibus.

Narce Torpedo.

Sed & Torpedinem totam (dico autem animal marinum) capitis dolores sanare capitū admo- tam, sedem q̄ euerfam coecere, à quibusdā est proditum. Verum ego cum vtrunq; essent exper- tus, neutrum verum comperi. Eam igitur cum cogitallem viam esse applicandam, cui caput do- leret (posse enim fieri vt hoc medicamen anodynū esset, ac dolore liberaret similiter, vt alia quæ sensum obstupesciunt) ita habere comperi. Puto q̄ eum qui primus est vsus, tali quapiam motū ratione experiri aggressum.

Draco Marinus, & Trigle, & Alia id genus.

Viuas etiam nū hæc animæ apertas, & protinus partibus affectis appositæ, prodesse scripse runt, nempe Draconem marinū in suum ipsius ic̄um impositum: similiter & Triglam, in draco- nis: Mures domesticos, in ic̄um scorpij, velut & Saurā: Mygalen in suum ipsius, & Saurā chalcī- dicam, quā & ex vino bibendam præbent, tanq̄ suum ipsius morsum sanat. Porro Scorpionum suū ipsius ic̄um curare, si tritus imponatur, similiter si assus edatur. Congruere autem aiunt & ijs, qui à vipera sunt morli, Ascalabota vero ijs, qui à scorpio. Referunt aut & in Ægypti regionibus are factum Aliracum quem vocant, exhiberi ijs, qui à scorpio percussi sunt: & vocatū Cybiū vtiliter vulneri à cane inflictō imponi: multa q̄ eiusmodi, de q̄bus copiosius differemus, vbi tractabitur de ijs, quæ proprietate substantiæ quid agunt. Cæterum in Oleo lixis totis animalibus ip̄so oleo vtebantur nostratium medicorum quidam, sed & superiorum non nulli, ad depilationem seu pi- lorum nudationem, nempe Pityocap̄is, & Vrticis marinis, Lepore marino, Scolopendro marino. Ad aurium vero dolorē Silphis in oleo coctis, & ijs quos vocāt Oniscos { Græci, Latini multi- pedas. } Ea enim animalia in globū sese contrahunt, vocant q̄ ea apud nos quidā cyamos hoc est fa- bas, quandoquidem esculentis fabis sunt perlimilia, vbi sese videlicet in globum cōuoluerint, co- H lore fusco. Porro in agro complures videre est natos sub situlis, quibus à fontibus rustici aquam comportant, deponūt q̄ eas iuxta focum. Vidi q̄ quosdam ex ijs, qui medicinam in agro exerce- bant, assidue oleo ex illis composito ad vniuersos aurium dolores vtī, non discernentes affectum vnde oriretur. Itaq; non ab reuēnit, vt interim effectum consequerentur, interim laderent. Et quid mirum, quando & insignes quidam medici de ijs citra distinctionem scripsere? Tales sunt Apollonij libri de facile parabilibus. Atq; hic sanè etiā scripsit vermes terræ in olēo coctos aurīū dolores mitigare: sed alij censent admisto adipe anserino sic demum vtendum.

Vulpes, & Hyæna.

Cæterum de "Vulpibus quæ totæ oleo coquantur (nam sic quidā curant arthriticos, partim vi- uas vulpes in lebetem ingentē inijciantes, partim etiam mortuas) fusius dicere mihi necesse est, quandoquidē plerofq; visæ sunt principiò planè morbo hoc liberaffe, verum post multum tem- poris non ita profuisse: siquidē illos malū repetijt, quanq̄ non ita vehemens q̄ antea. Sanè Oleū in quo cocta vulpes est, non est potentioris in digerendo facultatis, q̄ in quo hyæna: quæ si simili- ter in oleo lixetur, redditur oleum longe potentissimæ in digerendo facultatis. Porro frequenter dictum est talibus medicamētis inesse potentiā eorum, quæ in alto continentur corpore, in extimā cutem

A. ibi. c. 70.

A. l. 2. t. 2. c. 201
fol. 122. c. d

A. ibid. c. 584.

G

A. ibi. c. 221. fo.
123. 3

A. ibi. c. 729.

Acutem extrahendi, ac eo nomine quandoq; sedandi dolores: non enim perpetuo hoc ad ea sequitur, cum ij duntaxat dolores ab eiusmodi medicamentis sedentur, quorum causa est humor in alto contentus, dolorem ciens aut substantiæ crassitie, aut refrigeratione, aut vehementi acrimonia: aut etiam spiritus flatuosus exitum non habens. Itaque qui vtuntur vulpibus, & ipsi oleum digestiuium efficiunt: atq; inde impletis eo alueolis totos arthriticos in eos imponunt, multo ibi tempore immorari præcipientes. Verum ex hoc fit vt non tantū, qui citra articulos sunt, tumores euacuentur, sed etiam vniuersum corpus. Itaq; vbi corpus illis antea plenitudine affectum fuerit, mirum non est per euacuationem consecutum commodum, nempe cum nihil etiam in affectas partes influat, quia corpus vniuersum iam euacuatum est: & qui continebantur, humores exhalarūt. Cæterum quemadmodum antea, cum corpus noxa vacaret, praua victus ratio morbum inuexit, eundem in modum, aut etiam amplius, à simili diæta par est rursus illos similiter afficiendos in articulis, quibus iam laborauerunt.

DE IIS QVÆ IN MARI ET AQVIS SALSIS PROVENIUNT

Sola hæc in toto opere reliqua hoc habēt nūc tempus opportunum. Nam quæ in mari et aqua nascuntur animalia, superiori sermone exposita sunt, vbi videlicet agebatur de animalibus: **B** At quæ in aquis quidem aut ex aquis nascuntur, nec sunt animalia, ea nunc exponuntur.

Adarcion.

Adarcion, "quidam verò masculinè efferunt Adarcon, alij foemininè Adarcen appellat, essentia quidem sua velut spuma est aquæ salis concreta, circum arundines & farragines concrevens. Acerrimum hoc est medicamentum, simul q; calidissimum: proinde & per se inutile est, verum commisceri solet ijs, quæ vim eius retundunt, sicq; fit multo vtilissimum in ijs affectibus qui excalfieri postulant: Id q; foris impositum, nam intro in corpus ipsum sumere est impossibile, nimirum ob virium vehementiam.

Alcyonia.

Alcyonia "omnia detergent, ac digerunt, qualitatem habentia acrem, & calidā facultatē: verum aliud alio non parū plus minus q; & in his iplis quæ diximus, secundū partiū essentia totius tenuitatem. Est autem eorum Vnum dēsum & graue, odoris prauū, olet enim pisces putridos: spōgiæ figura simile. Alterum verò figura longiuscula, leue & rarum, odorem habens similem phycijs.

Aliud tertium vermi simile est figura, colore purpureo, consistētia molli: vocant id Mileliū. Post quæ quartum secundo quidem iam posito similiter & leue & rarum, verum lanis succidis simile.

C Deniq; & quintum extrema superficie læui circūscribitur, cæterum interna substantia asperū, nullius odoris, gustu tamen apparens acre: & sanè omnium alcyoniorum est calidissimum, adeo vt et pilos vrere possit. Itaq; cum duo prima lichenas, alphos, psoras, lepras q; adiuvant, præterea cutē splendidiorē competentia virium efficiant, idem præstare non potest hoc vltimo loco positum. Nec enim perinde vt illa cutem duntaxat summam extergit, sed etiam excoriat, vsq; in profundum cutis penetrans, vt etiam vlcera moliatur. Porro quod tertio ordine recensuimus, omnium est tenuissimum. Itaq; vsum alopecias curat illitum cum vino, colore quidem fuluo, tenui tñ essentia. Quartum autem eiusdem cum hoc speciei vires obtinet, verum haud parum imbecilliores.

Sal.

Sal^{us} eiusdem genere facultatis est, siue Fossilis sit, siue Marinus: verum hoc differunt, quod salis ex terra effossi substantia magis sit compacta, ac proinde in hoc maior est & partium crassities, & adstringendi potentia. Itaq; marinus affusa aqua protinus liquecit: at fossili hoc nō euenit. Porro eiusdem speciei cum marino est, qui in stagnis quibusdam falsedinem habentibus nascitur, esta te videlicet aquis æstu ex ijs absumptis, cuiusmodi est Tragafius, nō procul à Smīnthio. Confluit enim illuc ante aquas spontaneas, quæ admodum sunt calidæ, copiosa aqua stagnans non amplo

Din loco: & ea æstate omnis absumitur, à Sole videlicet arefacta. Porro quoniam locus ipse falsedinem connatam continet, quod reliquum est omne, sal est, cognominationē à loco pariter & aquis fortitus. Nam spontaneæ & ipsæ illis in locis aquæ Tragafiæ nuncupantur, potentia summè excicatoria: & sanè qui in ea regione sunt medici, ad hoc illas accommodant. Porro dictum est & de Sodominiis in mari mortuo prouenientibus, in quarto libro: quem si quis librum diligenter perlegerit, illi tantum refricare memoriam nunc opus est, vt expolita gustus qualitate, ipse medicamenti facultatem cognoscat. Igitur cum qualitas salis digerat simul & contrahat contactam ab ipsa substantiam, Aphrolitron in hoc differt, quod in ipso vnum modo saporem exuperantem euidenter sit videre, quem vocant amarum, vim habentem digerendi, haud etiam contrahendi, vt sal. Nam hic quicquid in corporibus humidum inest, id quodammodo absumit: & quod reliquum est substantiæ solidæ, adstrictione contrahit: ac proinde etiam conditura sua carnes feruat, & à putredine tuetur: Quippe, quæ putrescunt excrementitium continent humorem, substantiamque tum dissolubilem, tum minime compactam. Quibus ergo corporibus nulla prorsum est humiditas superflua, ceu melli optimo: & corpus solidum & compactum est, ceu lapidibus: ea vt putrescant est impossibile. Ac proinde in his salis non probatur vsus, verum in ijs, in quibus sua specia putredo.

^a Ap totum.

Sal Vstus.

Sal Vstus digerit quidem potentius quàm vstionis experts, quanto scilicet subtilius ipsius corpus accepta ab igne facultate redditur: velut & in alijs, quæ cōbusta sunt, euenire diximus: Verum non sicut ille, qui non est vstionem expertus, solidam ipsam substantiam cōtrahere constringere q̃ potest.

Litrum Nitrum.

Litrum.ⁿ Ostensum est & hoc medicamen in medio salis & aphrolitri vires habere.

A. ibid. c. 84.

Halos Anthos hoc est Salis Flos.

Halos Anthos. Quidam vt vnum nomen Halosanthos, quidam diuidētes Halos anthos nominant. Est autem hoc medicamen liquidum, tenuiorum etiam partium quā sal vstus: tum acris qualitatis, & admodum digerentis facultatis.

Halos Achne Spuma Salis.

Halos Achne spumosa est salis efflorescentia, multo tenuioris naturæ quàm sal ipse: Quare & extenuare, & digerere multo plus ipso potest: verum quod substantiæ est reliquum, contrahere vt sal nequit.

Asphalton Bitumen.

Bitumen,ⁿ vnum & ipsum est ex ijs, quæ in aqua marina proueniūt, & in alia quapiam quæ nō est marinæ dissimilis, vt in Apollonio Epiri. Et per alia id genus loca multa, aquis sponte nascentibus ceu spuma quædam innatans hoc medicamen reperitur. Et molle quidem est dum innatat, postea verò resiccaturum pice sicca durius efficitur.

F. A. ibi. c. 114.

Bitumen Proueniens in Mari Mortuo.

Optimū verò bitumen in mari quod Mortuum vocant, prouenit. Est autem id stagnum salsum in Caua Syria. Caterum medicaminis ipsius vis est tum resicatoria, tum exsicatoria in secundo ordine. Merito itaq; eo vtuntur & ad glutinationes vulnerum cruentorum, & ad alia omnia, quæ exicari debent cum modica exsiccatione.

Spongos Spongia.

Spongiaⁿ Vsta acris est & digerentis potentia. Vtebatur ea præceptorum meorum quidam ad sanguinis eruptiones, quæ manuali opera indigent: in quem usum semper eam paratam habebat siccam, & exsiccata: cum verò res posceret, bitumine in primis imbuebat: sin eo careret, pice. Porro admovebat eam partibus sanguine profluentibus etiamnum ardentem, vt & crusta par ti induceretur, & ipsum spongiæ vstæ corpus ceu operculum acciperet. Caterum spongia Noua, non sicut lana aut linamentum (quod *μότον μιλτόν* idest carpinatum vocant) materia dūtaxat est quæ humores irrigando excipiat, sed etiam manifestè desiccet. Id quod scies, si ea sola vtaris in vulnere cum aqua, aut oxycrato, aut vino, pro diuersitate videlicet corporum, vt est antè dictum. Glutinabit siquidem ea similiter atq; medicamenta quæ vocant enæma. At si Non noua sit, sed vsui accommodata, palàm cognosces quantum à noua superetur, si vulneribus eam imponas siue cum aqua, siue cum oxycrato, siue cum vino. Nec mirum est, cum in spongia noua seruet etiamnum ea, quam à mari accepit, facultas modicè corpora exiccandi. Atq; hæc quidem præstare potest, cum etiamnum seruat maris odorem. Nam temporis spatio, etiam si nūquam vsui accommodata sit, tamen & odorem maris amittit, nec æque desiccare potest.

A. ibi. c. 97.

Garus vel Garum.

Garusⁿ facultatem habet multam & calidam & siccam: Ac proinde ex eo medici quidā ad vlcera vli sunt putrescentia: tum dysentericis ischiadicis q̃ inijciunt.

A. ibi. c. 486.

Halme Salsugo seu Muria.

Salsugo piscium salforum similiter garo & ad putredines accommodatur: & ad ischiadas dysenterias q̃ infunditur. Et acrimonia quidem humores coxam infestantes attrahit, ac proinde per intestina euacuat. Putrescentia verò vlcera in dysenteria colluit atq; desiccet.

H

Maximè verò salsugine salforum Silurorum & Manidum ad talia vt medici quidam assolent. Et nos sanè ad vlcera in corpore putrida accommodauimus.

*A. E. c.



GALENI LIBER DE SVBSTITVTIS MEDICINIS

Iulio Martiano Rota interprete.



E substitutis medicinis cum & Dioscoridem, & Philistionem, & Euriphontem quaedam scripsisse constet, age nos quoque pauca de his tradere non recusemus. Substitutitas medicinas appello, quae in alterius locum subrogari queunt. Has medico notas esse multum opis adest, si in operando velit artem exercere, nec recidivas aut contemnendas curationes efficere. Euenit enim plerumque ut ea medici desiderent, quae ad salutem alicuius plurimum conferre iudicarunt, et his utantur quae proposito minus conueniunt, nec easdem quibus illa vires obtineant. Atqui par fuit ipsos, ne in tales angustias deuenirent, simplicium medicinarum notitiam didicisse. Quod si nec ea adepti fuerint, nec quae mox

subiungemus animaduenterint, merito in curandis agris aberrabunt. Tibi vero Diogeniane veritatis amator, ac simplicium medicinarum virtutes ediscere cupienti, quibusdam explicatis propositam materiam aggrediar. Erit autem verus, quem tecum in eo sermonem, modo reuoces in memoriam id, quod mihi contigit in Alexandria. Ibi enim cum essemus, ecce mulier tam graui morbo periclitabatur, ut moritura videretur: morbi conditionem explicare, cum nihil intersit, nunc opus non est. Huic opem allaturus lysimachiam herbam cum quaesiuisset, nec repperissem: nisi statim Aegyptiae spinae semine, lysimachiae loco usus essem, perisset mulier: quae illo prope dato, suppresso sanguine, mox conualuit. Hoc factum postridie medici plerique accedentes cum mirarentur, interrogarunt me, quid moriturae foeminae pro lysimachia exhibuissem. Quibus ego, Aegyptiae spinae semen cum respondi, id quod in compluribus fieri posse dixissem, non destiterunt mecum precibus agere, quoad medicinas, quae in aliarum locum substitui possunt, vnum in opus conferre promitterem. Sicitaque libellum hunc de substitutis medicinis composui, in quibus recensendis quod magis expeditum usum haberent, seriem literarum seruaui, principium quoque ab earum prima sumpsi.

A

Pro

Abrotono
Abinthio
Acacia
Aconito
Acoro
Amianto
Agallocho
Agarico
Alga
Aloe indica
cium, Glaucium, Centaurium
Aloe
Alumine
Animi
Ammoniaco suffitu
Amomo
Amylo
Amygdalis amaris
Anchusa

Origanum.

Abrotonum.
Succus lentisci.
Iridis agrestis radix.
Radix asari.
Aphroselinum lapis.
Calamus odoratus.
Euphorbium, aut Epith.
Anchusa.
Aloes viridis folia, Ly
Fimus ibis.
Sal fossilis.
Anisus.
Propolis.
Acorus.
Gyris sicca.
Absinthium.
Hyacinthus.

Pro

Aniso
Arace
Aristolochia ro.
Argemone
Armenio lapide
Asbesto i. calce viua
Asphalatho
Asphodelo
Asaro
Alio lapide
Auripigmento

Daucus.

Sesamum.
Aristolochia longa.
Sisymbrium, Seriphium
Atrametum indicum.
Adarce. (ticiis semine.
Ericas fructus, aut Vi-
Succus betae.
Zingiber.
Sal ammoniacus tostus,
Sandaracha.

B

Balsamo
Balsami succo
Balauatio
Bdellio.
Bitumine
Brutia pice

Radix albae violae.
Myrti succus.
Malicorium.
Sphagnus odoratus.
Pix brutia vel liquida.
Pix i aceto feruifacita.

Quinta Classis.

LLLLL iiii Pro Buc-

G A L E N I

<i>Pro</i> Buccina	Ostreum.	cus, aut Porri Ficus' ve succus,	
Buprestis	Vermes panarij.	<i>Pro</i> Elleboro nigro	Papyri radix, aut Stru-
Butyro	Lac bubulū concretū.	Enneaphyllo	Potamogiton. (thij.
		Epithymo	Colocynthis semen.
C		Equiseto	Chamæpitys.
Cadmia	Leucophragis egyp.	Ericis fructu	Galla immatura.
Calamo odorato	Sphagnus.	Erini folijs i. caprifici	Stercus ibis, vel Mori
Canchri	Lauri bacce, Pyrethru.		folium.
Cantharidibus	Phalangia. (cē.	Erucae semine	Erysimi semen.
Capparis radice	Erices radix aut Myri-	Erucis pini	Vespa cum cedria.
Cardamomo	Fructus myrti, vel Xy-	Erugine	Atramentū metallicū.
localpafum, vel Cyperis ammoniaca.		Erylumo	Struthij succus.
Casia	Cinnamomi quifglia.	Euphorbio	Stercus palumborum.
Castorio	Vermis panarij visce-	Eupatorio	Chamæpitys.
Cedria	Ladanum. (ra.		
Ceraunio	Leucographis.	F	
Ceruina adipe	Anseris adeps.	Faba fresca	Struthium.
Cera	Faba fresca cum propo-	Felle cameli	Fel ascalaboti.
	li cocta & trita.	Felle mustelæ	Fel cameli.
Cerui cornu	Caprinum. (bū vstū	Felle hyenæ	Fel perdicis.
Cerussa	Scoria plumbi, plum-	Felle simiæ	Fel cameli.
Chalbane	Sagapenum.	Felle viperæ	Fel ichneumonis.
Chamedry	Lapati sylvestris rad.	Filice	Cneori semen.
Chamemelo	Anthemis.	Fœnugræco	Maluæ semen.
Cicuta	Semen coriandri.	Flore æris	Squama æris.
Cinerula cypria	Cinis foliorum oliuæ.	Folio	Nardi spica, vel Iris il-
Cinabari	Rosei pastilli.		lyrica.
Cinnamomo	Casiæ duplum, aut Sa-	G	
binæ, vel Rutæ sylvestris duplū triplūve,		Galla	Fructus myricæ.
et melius facit cinnamomo: vel Thuris cor-		Gentianæ radice	Radix apij odorati, id
ticis tantundem, aut Cyperos attici.		autem est petroselinum, aut Rhedon i. He-	
Clinopodio	Heliotropium.	lenium.	
Cnico	Viticis semen.	Glycyrrhizæ succo	Mori succus.
Colocynthide	Ricini semen.		
Colophoniam pice	Pix nauibus abrafa.	H	
Corallio	Moly, aut Symphitū.	Hederæ succo	Perseæ succus.
Costo	Cedri fructus, Heleniū.	Hedychroo	Amaracinum.
Cotyledone	Anagallis.	Heliotropiæ sem.	Semen rapæ.
Crinanthemo	Aphrodisias	Hyacintho	Flos isatidis.
Croco	Crocomagma.	Hyenæ adipe	Vulpis adeps, aut An-
Crocomāgmate	Agallochus indica.		seris.
Crocodili adipe	Canis marini adeps.	Hyoscyamo	Solani vesicariæ semē.
Cumino	Brassicæ semen.	Hippuri	Aiuga.
Cynosbato	Solani vesicariæ semē.	Hyperico	Anethi semen.
Cyperis	Iuniperus magna.	Hypocystide	Acacia.
Cyphi	Carica combusta.	Hylfopo	Thymum.
D		I	
Damafonio	Carpesiū, aut Nepita.	Iri illyrica	Helenium odoratum.
Dauci semine	Sij semen.	Iuniperi baccis	Cyperus.
Dictamo	Salvia, vel Pulegium.	Iunco odorato	Cardamomum.
Diphryge	Phrygius lapis, Misy	Iunco palustri	Polygoni radix.
vstum, vel Æs vstum, aut lapis Pyrites.			
Dorycnio	Alterci semen.	L	
Draconti	Aron	Ladano	Sampsuchus.
		Lapathi radice	Radix cynaræ.
E		Lapide phrygio	Lapis argyrites.
Ebeno	Loti arboris lignum.	Lapide asio	Gagates lapis.
Ebisci radice	Folia mori, vel radix	Lapide pyrite	Lapis igniuomus.
	Papyri.	Lauri baccis	Serpillum aridum.
Elaterij succo	Eiusdem herbæ, suc-	Lathyridis sem.	Granum cnidium.
			<i>Pro</i> Lemnio

Pro Lemnio sigillo	* Sandaracha.	Pro Opobalsamo	Gutta myrrhæ.
Lentisco	Terebinthus.	Opopanace	Lac sycamini.
Lepidio	Rubia.	Oryza	Farina hordei.
Lepidij radice	Folia capparis.	Ormino	Lini semen.
Lepore marino	Lepus fluuiialis, aut concha.	Ornithogalo	Anthyllis.
	Struthium.	Ostreo	Buccina.
Leucini flore	Fabæ medulla.		
Lini semine	Betæ semen.	P	
Loti semine	Vrsi adeps.	Peucedano	Succus glycythizæ.
Lupi adipe	Pastinacæ semen.	Panacis radicis vncia	Succi pars octaua.
Lygustico	Spinæ egyptiæ semen.	Papyri radice	Elleborus albus.
Lylimachio		Perlicæ folijs	Rosæ folia.
		Pice liquida	Succus panacis.
M		Phu	Sphagnos.
Magnete	Hæmathites lapis.	Pipere	Zingiber.
Malabathro	Nardus indica.	Pipere albo	Nigri duplum.
Malo cydonio	Melilotum.	Potamogitone	Serpillus.
Malua	Fœnumgræcum.	Polygoni succo	Eruce semen.
Mandragora	Dorycnium.	Polij semine	Eruce semen.
Manna	Thuris cortex.	Polypodio	Chamaeleonis radix.
Mastiche	Lentisci caulis.	Polytrico	Abfinthium.
Medulla cerui	Vituli medulla.	Pompholyge	Cadmia vsta.
Meliloto	Syluestris lotus herba.	Populi genumis	Sampfucus.
Melle	Sapa.	Propoli	Ladanum.
Melle attico crudo	Mel despumatum.	Psyllio	Lens palustris.
Menta	Calamenthum.	Pulegio	Hyssopum.
Meo	Myrobalanus.	Pumice	Terra cretica.
Myrsinite	Succus mori.	Pyrethro	Zingiber.
Molybdena	Lithargyrium.		
Mori succo	Rubi folia.	R	
Myrobalano	Glauciū, aut Peucinū.	Radice cynaræ	Bulbus asphodeli.
Myrrha troglodytica	Calamus odoratus	Rheo	Centaurium.
Myrti oleo	Lentisci oleū, aut Meli nū, aut Mori succus.	Rapa	Heliotropium.
		Raphanino oleo	Ricini oleum.
Misy cyprio	Ochra cypria.	Resina pini	Terebinthi.
Misy tolto	Diphryges.	Ricino	Palestræ sordes.
		Roseis pastillis	Sinopis.
N		Rosis siccis	Persee folia sicca.
Nardo indica	Nardus celtica.	Rhu syriaco	Oxyacanthæ fructus.
Nardo syriaca	Iuncus odoratus.	Rubo canino	Semen vesicarię.
Napyos semine	Rapæ semen.	Ruta siluestri	Domesticæ duplum.
Nepita	Agrestis menta.	Rhu coquinario	Sampfuchus.
Nucleis pineis	Cucumeris semen.	Rubigine	Squama ferri.
Nuce pinea	Galla.		
		S	
O		Sagapeno	Resina pinus sicca, vel Chalbane.
Ochra	Misy cyprium.	Saluia	Calamenthum.
Ocymo	Sisymbrium.	Salamandra	Lacerta viridis.
Ocymoide	Menta agrestis.	Salis flore	Sandaracha.
Oenanthe	Omphacium siccum.	Sale ammoniaco	Sal cappadocius.
Oelypo	Vituli medulla.	Sambuco	Spine viridis folia.
Oleo cicino	Laurinum, aut Verus oleum.	Sampfucho	Rhus coquinarium.
Oleo vetere	Feruefactum duplum.	Santonico	Abrotonum.
Oleo fusino	Fœnumgræcum.	Satyrio	Eruce semen.
Oleo picino	Pix liquida.	Scammonio	Ricini semen, vel La-
Oliuæ lachryma	Hypocystidis succus.	thyridis aut Colocynthidis.	Satyrium.
Oliuę ethyop. lachria	Acaciæ duplum.	Scinco	Bulbus, qui edēdo est.
Omphacio	Galla immatura.	Scylla	Plumbum productū.
Omphacio	Succus rhu opsoniorū.	Scoria plumbi	Melanteria egyptia.
Onocardio	Psyche herba.	Scoria cypria	Pro Sem-

DE SVBSTIT. MEDICINIS

<i>Pro</i> Semperuiuo	Lactuca.	<i>Pro</i> Succo polygoni	Succus plantaginis.
Sepiæ crusta	Pumex.	Sulphure viuo	Sandaracha.
Serapide	Radix pæoniæ.	Symphito	Centaurium.
Serpillo	Fontinalis herba.	Sori	Diphryges, aut Melan-
Sesamo	Lini semen.		teria.
Sesamoide	Amaranthi expressio	T	
Sinapi	Nasturtium. (gustici.	Tragacantha	Gummi.
Sio	Radix asparagi, vel Ly.	Terra cretica	Terra eretria.
Sisone	Anisus.	Terra megarica	Salis spuma
Sinnone syriaco	Petroselinum macedo-	Terra samia	Leucographis egyptia
	nicum.	Terra eretria	Calx thebaica.
Sisymbrio	Ocymum.	Terra alana	Plumbago.
Solano vesicaria	Semen hortensis solani.	Terra asteri	Cimolia.
Spodio	Pompholix.	Terebinthina	Mastiche.
Sphagno	Iuncus odoratus.	Teucrio	Chamedrys.
Spinæ albæ semine	Acanthi semen.	Thapsiæ succo	Chameleonis nigri suc-
Spondyllo	Cinis foliorum oliuæ.		cus.
Stœchade	Chamedrys.	Thapsia	Nasturtium, vel Eruce
Stercore vulturis	Columbi sterces.		semen.
Stercore turturis	Stercus columbi.	Thymo	Satureia.
Stercore felis	Ichneumonis sterces.	Tithymallo	Chameleon.
Stercore lupi	Canum fimus.	Thure	Ampelitis terra.
Stibio	Aeris squama.	Thuris cortice	Manna thuris.
Styrace	Castorium.		
Struthij radice	Ellebori nigri radix.	V	
Succo chamæleonis	Salicis succus.	Verbenaca	Chamæleuce.
Succo ficus	Succus mori.	Viola	Flos radicular.
Succo mori	Succus hederæ.	Vino rhodio	Vinum austerum.
Succo peucino	Dulcis radix.	Vino falerno	Vinum mendesium.
Succo thebaico	Succus papaueris.	Visco quercus	Chameleonis viscum
Succo balsami	Succus carpobalsami.	Vituli adipe	Porcinus vetus.
Succo calpasi	Succus myrti.	Vitici semine	Vitici semen.
Succo cyrenaico	Syriacus succus.	Vulpis adipe	Vrsinus adeps.
Succo peucedani	Glycyrrhizæ succus.	Vua domestica	Pulpa dactylorum.
Succo rododaphnes	Viscum quercus.		
Succo papaueris	Mandragoræ succus.	X	
Succo salicis	Hederæ nigre succus.	Xylocalpaso	Cinnamomum.
Succo gallæ	Succus mori.	Xylobalsamo	Radix violarum alba-
Succo panacis	Lac sycamini.		rum, aut Lygustici.
Succo persico	Hedera.	Z	
Succo syriaco	Mori succus.	Zingibere	Pyrethrum.



GALENI DE PURGANTIVM MEDICAMENTORVM FACVLTA TE

Iulio Martiano Rota interprete

Quæstionis Introductio, & Aduersariorum ad inconueniens deductio, Quòd in euacuando non quid educendum, sed tantum quid ager mallet, spectare oporteret.

CAP. I.



A mihi de causa prauas opiniones vetustissimi medici irreprehensas omisisse videntur, qua & legum latores antiquissimi maxima scelera inulta reliquerunt. Nam cum per id tempus hominū malitia intra me diocritatis terminos stetisset: nec quisquam aliū supremis iniurijs afficere, aut manifestissima quæq; impudenter abnegare auderet: quo pacto quis vel non dum perpetrata castigare, vel non adhuc dicta reprehendere, debuit? Postea verò vnà cum tempore adaucta hominū malitia, cum neq; inausum amplius quicquam, neq; nō dictum, inueniretur, coacti sunt & legum cōditores noua supplicia aduersus maleficos excogitare, & veritatis obseruatores varijs reprehensionum formulis

C sciolos coarguere. Id quod in præsentia facere nos quoque decreuimus, eos medicos confutādo, qui purgantibus medicamentis vim adimunt, qua humores quos euacuant, è corpore trahunt: qui q; vim aliam iplis attribuunt, qua æquabiliter humorem, quemcunque attigerint, immutare dicūt. Quare de Hippocrates ne verbum quidem idcirco fecit, quòd ea tempeitate neque Asclepiades vixit, qui tam impudenter loquens veluti in certamen contra veritatem descendit: neque Erasistratus, qui tametli non sine modestia, vniuersum tamen de purgantibus medicamentis caput euerit, cum actiuam maxime ac naturæ consuetam attrahendi vim nusquam suis in scriptis agnoscat, sed eius loco illa, quæ vacuum cōsequitur, inanitione vti maluerit. Pars est autem facultatis propria attrahentis vis ea, quæ in medicamentis purgantibus sita est, quemadmodū & illa p quā bilis & vrina in sua receptacula deriuantur, complura q; alia non modo dum sana sunt aialia à natura, sed etiam per morbos, & dum ad sanitatem reuocantur cum à medicis, tūm præcipue ab ipsa natura absoluuntur. Hippocrates itaq; cum nihil aduersus eos dixerit qui attractionē è medio tollere gestiunt, quia auctores tam peruicaces, quā postea plures, istæ opinio non habebat, æquum esse videtur me de rei veritate || pro Hippocrate contendere debere, ac primum quid nā ipli dicant commemorare, deinde peruersè eos sensisse commonstrare. Est autem ipsorum ora-

“D tio huiusmodi. Medicamētum omne cui purgandi vis inest, quemcunque attigerit humorem in
“ suam naturam conuertit, ita q; transmutat. Nam flauam nigram’ ve bilem facit id quod bilis est hu
“ ius vel huius, vt ipsi appellant, educituum: Similiter pituitam aquosam q; substantiam, quod vel
“ pituita, vel aquæ educituum istorum vocabulo nuncupatur. Postremo, vt summatim dicam, cō-
mutatio est omnium qui in venis sunt humorum, non vnius alicuius euacuatio, illa, quæ purga-
tio appellatur, vt istorum oratio introducit. Verum si ita vultis, illud modo obijciemus, siue quis
flauam, siue quis atram bilem, siue pituitam, siue aquam educens medicamentum sumat, om-
nes in venis humores euacuare. Atqui hac vna in re solum distat purgare aliquem tali medica-
mento & eidem sanguinem mittere, quòd aperta vena, quale prius inerat, euocatur: purgante au-
tem medicamēto non solum colore, sed etiam natura immutatum educitur. Etenim & quæ aquā
purgant, humida omnia & tenuia reddunt, quæ in venis attigerint, etiam si crassissima prius fuis-
sent: & quæ nigram bilem euacuant, crassa ac solida, quamuis antea tenuissima, versa vice faciunt.
Quam ob rem quoties hunc purgare, illi sanguinem mittere, volemus, aliò quā ad ipsam eua-
cuandorum naturam respiciemus. Quid nam igitur aliud spectabimus, nisi complures ad vena-
rum sectionem propensos, quosdam purgantibus medicinis aptos magis esse: quemadmodum
alij quiduis potius, quā venas incidi, sustinerent: alij abscindi membrum aliquod sibi potius, q
medicamentum

de Natura hu.
com. 1. 1. 1.
31. g

DE PURGANTIVM

medicamentum exorbere tolerarent: aliquibus enim sumpto purgante medicamento ventriculus subuertitur, non paucis id ipsum sine molestia facientibus. Hæc ergo respicientes his sanguinem detrahemus, illis medicamentum exhibebimus, non quæ Asclepiadis sequaces putant, contentos quidem in venis humores æqualiter omnes euacuari sanguinis missione credentes, purgando autem non omnes sed vnum aliquem, ac solum illum, quem ducere existimatur: vnde & purgari sanguinem ab huiusmodi medicaminibus aiunt, non euacuari, quemadmodum fit ad aperta vena. Hæc, vestra decreta, nolitis velitis, absurda sequuntur.

*Quod Vnumquodq; Medicamentum vim habeat Proprium Humorem
attrahendi, experientia probat.*

CAP. 2

Subiungam autem ipsorum capita. Asclepiadis sectatores aperta vena contentos in venis humores indifferenter omnes exire, data potione non omnes sed quosdam eximi, sanguinem quoque purum reddi hoc pacto, autumant. Qui verò Erasistratum sequuntur, vniuersos aiunt tam medicamenti potione, quam sanguinis egressu, pariter euacuari: vnde nec purgare re vera quicquā, sed cum immutatione quadam, & euacuandorum corruptela, inanire dicunt. Atque cauillatores hi omnes mihi, siue mediocriter siue magnopere impudentes, in certamen procedant: ac mecum veluti in stadio contendant, non verbis, neque prolixis nugis, sed operibus, ad quæ ipsos hac in populosissima vrbe prouoco, in qua quotidie penè innumeri morbo regio & aqua inter cutem laborantes inueniri possunt: siquidem mihi de his primum sermonem facere satis erit. Ducat aliquis ad me quempiam sine febre, cui in vniuersum corpus amara bilis redundarit, spectet quoque post aliquot dies, cum hominem præparauero, mihi quoque iam tempus instare visum fuerit exhibendi medicamenti alicuius, quod bilem expurget, quo pacto naturalem corporis habitum eiusmodi potione ipsi restituam, etiam si non dum extrinsecus quicquā admouero. Hec ipse non semel, bis ve, sed sæpe admodum, ostendens, semideprauatos ipsorum ac multos ad meliora reuocaui. Neque tamen in eam sententiam hæc dico, vt te pessime cauillator testibus fidem adhibere velim: spectes ipse, cum volueris, vnica ex purgatione morbo regio laborantem pristinum colorem accipere: cum quoque hoc factum videris, audebis lepidum caput in coronis hominum præconis instar, vocem attollere, ac discipulis tuis prolixas nugas, quales sæpe deblatterasti, intonare, Non detrahi quippiam certi ab vilo purgante medicamento: verum quicquid in venis repertum fuerit, qualecunque sit, in id mutari, in quod virtus medicamenti ipsum conuertere suapte natura valet. Atque hic qui nunc est arquato morbo liberatus, non bile educita, sed euacuatione tantum facta conualuit. Videte itaque, quo pacto alium ego ita affectum vel secta vena, vel data potione, iuuabo. Hæc cum affeueres ipse, deinceps mihi è duobus arquatis vni sanguinem mitte: alteri potionem aliquā porrige ex istis, quæ cæteri omnes nigram bilem euacuare, tu verò non euacuare sed gignere iudicas. Atque si agrotum subleuabis, aut pallorem de cute ejicies, me tibi omni supplicio deuinctum trado. Sin autem non modo quicquam non profeceris, sed hominem in extremam perniciem egeris, ad meliores sententias redi, & Hippocratis artem sequare. Ac de morbo regio laborantibus hæc tamen nus. Nunc ad aquam inter cutem habentes transitu facto, considera rursus hunc quoque non eodem modo sanguine misso, & medicamento quod aquam detrahit exhibito, affici. Nam si non monstrauero aquam aqualiculo comprehensam medicamento euacuari, tum antiquam opinionem condemnare licet, quæ non gigni, vt tu putas, medicamento, sed è corpore trahi, eiusmodi humoris affirmat, ac de nobis tuo modo decerne. Sed profecto si, quod nigram aut flauam bilem educit, dederis, ventris tumorem nequaquam minues. Atque ita vt singulum quodque medicamentum proprium quendam humorem è corpore trahat apparet. Tu verò si omnes eodem modo immutari persuasum habes, & medicamenti opus euacuare solum, non purgare credis, venam adaperias licet. Hec si quis apud Indos scribendo alium increparet, difficile esset ipsum redarguere: nunc autem cum singulo quoque die à vobis is conspiciatur, atque ad ipsum factorum argumentum prouocet, nescio hanc cur blatterare non erubescatis. Nolo autem nunc commemorare, vt ipse quam plurimos regio morbo laborantes vnica potione flaua bile detracta liberarim: multorum enim hac de re testimoniū extat. Quod si impudentissimi isti cauillatores vniuerso populo non credere se fingunt, rem ipsi quoties voluerint, intueantur.

*Responsionis cuiusdam Confutatio, Quæ primò tenuia, deinde crassiora
trahi concedebat.*

CAP. 3

Sed quid ego dico, intueantur? ostendi enim iam sæpenumero hoc ipsis: Ac nescio quem, me mihi tales nugæ respondisse, non vnum aliquod humoris genus sed pariter omnes medicamento trahi, ac veluti ab emulgente elici: Ex humoribus autem tenuissimos primum, deinde corpulentos magis, vltimò crassissimos etiam extrahi: Medicamentum itaque cuius vis celeriter euanescit, aquosa deijcere: cui amplius durat, flauam bilem educere: & nigram, quæcunque ambobus robustiora fuerint. Hunc sodales cum sapienter respondisse iudicassent, acclamarunt. At ille concitato gressu me relicto discessit, probè noscens, opinor, si mansisset, se à nobis confutatum iri. Postero autem die libellum, in quo tam temeraria responsio refellebatur, eius affectis porrexī: neque postea ipsis etiam tanta in existimatione amplius fuit, cum nostras obiectiones diluere nesciret.

Erant

A Erant autem hæc eo in libro scripta. Heri tu quidem disceptationē subterfugisti similis pugili, qui antea quā lucietur, coronam rapit & aufugit: hodie verō quin redarguaris subterfugere nō poteris. Consequetur enim te libellus iste qui in manus tuorum totalium incidit: neq; enim minus cum illis quā tecum sermonem insituit: qui nunquam antea te vlla in re prorsus attrahentem facultatem concedere audierant, & heri quæcunq; in venis continentur, indifferenter medicamento trahi consentientem audiuerunt. Par quippe fuit ut non modo dictum hoc tuum non admirarentur vel prorsus laudarent, sed prodidisse etiam causam tuam te existimarent. Nam quo pacto vrina & vtraque bilis in sua loca descendant, alia q; permulta in corpore fiant, longo sermone frequenter exponitis, quid vis potius concedentes quā vnumquodq; corporis membrum facultatem quandam à natura insitam habere, qua sibi convenientia adducit atque rapit: nunc autem non modo quorundam, sed indiscrète omnium attractionem esse dicitis: quod profectio longe maius est, quā certa quædam attrahi concedere. Siquidem, ut facultas quædam animatibus inest, qua aliena à se repellunt, sic aliam qua sibi convenientia trahunt, vnicuiq; corpori inesse probabile omnibus videtur, non dum hanc vestram sapientiam edocētis: at omnia, siue cognata, siue contraria, quippiam ex æquo ad se trahere, rationem nullam prorsus habet. Atq; ita non solū attractionem confessus es, verum etiam, quod multo deterius est, non aliqua solum sed omnia indiscrète trahi fateris: idcirco q; mihi non tam à tuis discipulis extollendus quā explodendus videris. Cæterum purgantibus medicamentis manum te nunquam admouisse, ac vulgarem quendam medicinā q; imperitum esse, paucis monstraturum me confido. Quæcunque nigram bilē purgant, statim à principio eam educunt: differunt tamen inter se purgationes eo, quod liquidiora primum, deinde corpulenta magis, semper euoluunt. Idem in euacuationibus pituitam, & flauam bilem cuenit. Trahunt namque medicamenta omnia in primis quidem sibi obnoxia liquidiora, deinde crassiora etiam: non tamen, ut tu putas, primam matellam quispiam aquosis replet excrementis, secundam flaua bile, tertiam pituita, atq; ita tandem nigra bilis egeritur. Quade re patet medicamentum ante omnia suum quodq; humorem elicere, quem comitantur aquosa excrementa in matellis supernatantia. Hoc autem tibi nunc spectare, si nunquam antea, licet, aquosa & biliosa plurima, medicaminibus ad id facientibus, purgatos homines emittere: at nigram bilem deicientibus, simul omnia pauca esse. Oportebat autem, si tibi constare vis, ab hisce medicamentis q; atram bilem expurgant, plura semper educi, pauciora verō ab euacuantibus aquam & bilem detrahi, cum ad fortitudinem & imbecillitatem euacuandi, medicamenta distinxeris. Sic itaq; atram bilem euacuantia, quoniam ipsa reliquis fortiora constituisti, quā plurimum euacuabūt: & primum aquosa omnia, deinde bilem, postea pituitam, demum atram bilem: debilia vero medicamenta aquosa tantummodo subtrahere poterunt: Quorum tamen cum nihil fieri appareat, sensus ipse tuum sermonem confutat. Libet tamen interea ex te scire, si inter exeundum corpulenta semper ad tenuia consequuntur, cur nigra bilis ante sanguinem exeat, præsertim cum sit eius veluti sedimentum, qualis in vino sæx est.

Quod extet Medicina, quæ Sanguinem primò è Venis Trahat.

CAP. 4


Sed quæres forsitan & tu, num aliquod medicamentum statim à principio sanguinem educēs inueniatur. Inuenitur sanè, nec eo quisquam inuēto vteretur. Quam obrem? inquires fortasse: quia hoc iugulare non purgare homines foret. Nam quæ purgant, purgantia passim idcirco nuncupantur, quod sanguinem ab antedictis humoribus purum constituant: atqui nemo est adeo prudēs medicus, ut vniuersum sanguinem euacuare, reliquos autem humores intus omittere velit. Quare medicamenta omnia quæ per venas intestinorum & ventris, sanguinem deiciunt, venenis adnumerant. Consentaneum autem erat, si modo quæ doces vera sunt, neq; hæc primò sanguinem euocare. Quibus autem nominibus eiusmodi medicamenta nuncupentur, etiam si conditanter scirem, literis cōmendare nolim. Illud tamen quod in Thracibus Bithyniam incolētib; me adhuc puero contigit, sine periculo cuiusquam dici potest. Inuenit homo quidam herbam, quam si quis assumpsisset, sanguinem primo, tum vitam emittebat. Multis itaq; hoc pacto morientibus, cum facinus hoc diligenti inquisitione dignum arbitrarentur, herbarium comprehendūt, & ad gentis magistratum ducunt. Is cum non solum hominem necare studeret, sed si quis alius herbam aut didicisset aut docuisset, à nullo se quidem ipsam didicisse veneticus asseruit: Verum in suburbanum cum aliquando suillum iecur deferret, urgente ventre, super herba quadam iecur deposuisse, quod aliquanto post cum sustulisset, vidisse ex vniuerso iecinore sanguineos riuulos ad herbam confluere: Ex hoc cōiectura facta corpori sanguinem ea detrahi posse, periculo mox in obuio quodam facto, ut verum comperit, quod fore sperarat, ad malos vltus herbam deinceps transulisse: se tamen alicui alij eam monstrasse negauit. Hæc herbarius ille diu inter quæstiones habitus retulit. Populi verò magistratus, cum plurimam illis in locis nasci hanc herbam ex rei dictis accepisset, vincētis oculis ad supplicium ipsum duci iussit, ne cui inter eundem herbam indicaret. Ex his ergo lepidum caput multa medicamenta eam vim habentia, ut sanguinem à principio statim eliciant, inueniri constat. Reticere autem ipsa melius est, quemadmodum & alia venena tacent, quicunque ratione aliqua præditi sunt. Quanquam & hæc olim non nulli abunde

dè docuerint, miram quandam rerum diuersarum misturam ostendētes, ac qua via quodq; venenum conficiatur, scribentes: qui mihi cerebrum non habuisse videntur, quemadmodum & vos, si me interrogetis, quæ nam sint sanguinem educētia. Sed vt vnde digressa est, eò rursus nostra redeat oratio, Qui humores omnes ex æquo trahi, & primò liquidiora, tum alia, excerni asseuerat, propriam causam prodit, cum attrahentem facultatē rebus inesse fateatur, quam eius socij impudenter abnegant. Et siquādo dicere cogantur quo pacto bilis & vrina in sua receptacula veniāt, quoq; modo cōcoctum alimentum corpus subeat, & huiusmodi alia, monstra loquuntur: & hisce quæ sensus dicat, contraria statuunt, veluti paulo antè mōstrauimus. Nam si verum est quod discendum proponunt, quæ educentur medicamento nigram bilem euacuante, plurima erunt: q̄ ab aquosum excrementum purgante, pauca. At millicies, si modò artis opera inspicere velis, ostendam tibi perditē veterator, aquosa purgantibus, plurima: nigram bilem euacuātibz, pauca semper excrementa deiici, ac nigram bilem statim inter initia exire.

Quod Purgans Medicina non immutet humores in suam naturam:

Ac totius Quæstionis conclusio.


Qui ergo omnes humores è venis æquabiliter duci asserit, stolidus tantum & imperitus est: qui verò immutari dicit, consideret vt nullum discrimen faciat inter sanguinem mittere, F & bilis medicamentum regio morbo laboranti exhibere: & num aquam inter cutē habenti venam aperiat, an medicamentum aliquod aquam educens porrigat, quantum in ipso est nihil interesse: tum quomodo hæc indecora non sint explicet. Irridet ista vulgus minus rectè, quoties medicos inter se altercantes animaduertit, eosq; loquacitate condemnat: ac si quos mutire quippiam omnino viderit, verbis tantum medicos ipsos appellat. Subiungam nunc id, quod semper asserere consueui, imperitum quenq; hisce cauillatoribus meliorem esse. Nam si nulla alia in re præstet, communes saltem animi notiones admittit, quas isti longa consuetudine deprauati negant. Nuper itaq; homo quidam minimè stultus, cum pustulæ ipsi toto è corpore subito erupissent vlcerosæ & malè coloratæ, medicum adiuit existimans se quam primum purgatum iri: at eo sanguinis missionem potius iubente, ne delipias, inquit, verisimile siquidem est vnà cum prauis bona quoque est fluxura. Caterum qui omnia potius, quam verba Hippocratis, vera esse volunt, communes animi notitias vincendi studio tollunt: tum nobis, ac si dilaniare vellēt, insiliūt: atq; ipso rerum euentu postea redarguti condolescunt. Æquum autem fuerat, vt quemadmodū nos sustinemus, & docere conamur eos, qui Hippocratem in ijs, quæ nō intelligunt, calumniantur, sic & ipsi rationes contra se factas tolerarent: docentesq; plurimum, si fieri potest, diligerent: G aut si id fieri nequit, odio penitus non haberent: Veluti nuper medicus quidam eiusmodi demētia præditus. Is simul atq; nouit me sola purgatione complures à defluuio capillorum liberaſſe, illico prosequi me odio cœpit. Item alius, cum incipiens carcinoma, quosq; elephantes appellant, & depascentia, multa q; alia vlcera curatu difficilia, sanassem: Et alius, quia solis purgationibus oculorum obtenebrationem patientes cōualeſcere feceram: Et adhuc alius, propterea quod infanientes, comitiales, melancholicos, & in super nō paucos diutino capitis dolore vexatos, purgando tantum liberaſſem, vt & coxendices, & longis doloribus alijs in partibus infestatos, Atq; hunc nuper, quem, tanquam colo vexaretur, tribus iam mensibus medici tractauerant in peius quotidie abeuntem. Hunc ego omnia, quæ illi imposuerant abicere iussi, ac solis purgationibus sanitati reſtitui. Muliebrem fluxum præterea nobilis cuiusdam Romanæ matronæ ita hac arte suppressi: vt & multas alias ignobilioreſ fœminas non solum ab hoc morbo, sed etiā ab alijs veteri aegritudinibus, exemi. Quid verò me cōmemorare opus est, vt nullum remedium sacro igni, *Ξέρυσίππας* Græci dicūt, efficacius adhibeatur, quam bilem expurgans: nullum magis aduersum, quam pituitam educens: Diem hunc totum contererem, si quam admiranda opera purgantibus medicamentis absoluantur, referre vellem: quæ tamen istos ignorare verisimile est, artē tractandi medicinas expurgantes nunquam edoctos. Nam cum nec quicquam extare penitus arbitrentur, quod purget, quo pacto vel quibus in morbis purgationibus vtendū, vel quo modo, intelligent: Hac de causa quam plures sola experientia ducti ægrotantes medicantur. Nostri autem isti sapientes qui rerum rationes tractant, non quod aliquid experientia inuentis addant, sed vt eam subuertant, longè perniciosius ijs, qui solo vsu nulla q; ratione ducuntur, medicam rem exercent. Ceterum horum omnium principium atque fons vnus est, conceptum aduersus Hippocratem odium, ex quo ceu fonte cū alia multa absurda manant, tum præſens hoc consilium, vim attrahentem abnegandū: cuius pars, siue species, aut quo quis alio nomine appellare velit, purgantis medicamentī facultas est.



GALENI QVOS PURGARE CONVENIAT, QVIBVS MEDICAMENTIS, ET QVO TEMPORE, LIBER.

Iulio Martiano Rota Interprete

*Oribasii est hic Libellus, ex Galeni libris Excerptus: & est Caput vigesimum tertium
& vigesimum quartum Libri septimi Collectionum Medicinalium
ad Iulianum Imperatorem.*



Al. 1. f. 2. d. 2.
fol. 6. fo. 32. g

Vi sano corpore sunt, si purgentur, molestias, sentiunt: nam & vertigines & tormina patiuntur, egre q̄ purgatio succedit, & cum hoc etiā celeriter exoluuntur. Causa autem horum omnium medicamentum est, quod cum sibi obnoxium humorem educere cupiat, nec ipsum reperiatur, sanguinem & carnes colliquat, ut ex eis quod suum est eliciat. At sani quidē adhuc, sed nisi euacuati fuerint, ægrotaturi, præueniendi sunt, & ineunte vere inaniendi vel missō sanguine, si ex multitudine: vel data potione, si ex humorum corruptela, morbis capi soleant. Nos etenim Podagram & articularum dolores inter initia tamen, qui nō adhuc circum articulos nodum fecerant, eiusmodi euacuatione complures annos inhibuimus. Non paucos insuper, sanguinem expuentes, comitiales, attonitos, melancholicos, & huius generis alios diutinos affectus, quo diximus modo, euacuando sedauimus.

C Multis itaq; pituitam, alijs amaram bilem, quibusdam nigram, non paucis serosa excrementa, ad impendentis morbi qualitatem, expurgare conducit: Velut ecce Melancholia quidam, nisi purgatus fuerit, singulo quoque anno capitur: hunc purgo non solum vere, sed autumnō etiā. Itē scēminam quandam Cancrum in mammilla quondam habentem quotannis aduentante vere similiter euacuo: quam ad sanitatem reuocaui, vsus medicamento nigram bilem validius subtrahente. Hæc si quando assumpta purgatio non fuerit, dolore mammillam sentit altius infestari. Quin & incipientem Elephantiam multo primū sanguine, & potione data in alio, sanauit: deinde huic quoque vnica purgatio in singulos annos sufficit, quæ intermissa morbum statim reuocat. Atque hoc genus agnitudinum nigros humores subduci postulat: comitiales autem, attoniti, qui q̄ ægre spiritum ducunt, pituitosos: velut articularum dolores si multo cum calore infessent, amaram bilem: sin tumeant frigeant q̄, pituitam, extrahi volunt. Alius quidam estiuo tempore febre Tertiana semper corripiebatur: qui multos iam annos febrem non sensit, nostro consilio decedente vere flauam bilem antea subtrahendo. Hoc enim tempore id genus homines inanire melius est: Quemadmodum comitiales, & attonitos, articularum q̄ morbo laborantes, & melancholicos, ac quicunq; humorum crassitie in morbos incidunt, inchoante vere. Oportet autem, prius quā purgans exhibeamus medicamentum, crassos humores attenuare, tenaces q̄ dissecare, & meatus recludere, per quos trahi atq; deduci queant, si purgatio succedere optima debeat, cum in reliquis omnibus, tum præcipue in elleborum assumentibus. Vis enim medicamenti, quæ diuellit, cum humores affectis membris altius inhaerentes excutiat, & ob hoc longis morbis proliit, facilius opus suum absoluit, prius attenuatis humoribus. Quod qui negligent, molestias obibunt purgationes, hoc est non sine torminibus, interdum & vertigine quadam, multa q̄ nausea, malo pullu, exolutione, & difficultate. Elleborum itaque sumpturi naturam prius experiri debemus, quo modo illa se habeat ad supernas expurgationes, eas dico quæ vomendo nunt. Experiemur autem, si quæ vomitum mediocriter prouocant, exhibuerimus: qui enim facile hoc pacto non purgabitur, hic nisi preparatus ad elleborum agendus non est. Preparatur autem cum vomitu ipso læpius facio, ita eo qui elleborum accepturus est, vomere promptius assuescente: tum melius etiam, si corpus humidum antea faciemus. Humescit autem corpus partim multo cibo, partim quiete. Ac quietem quidem istud facere nemini dubium esse potest: quando ut exercitatio membra exiccat, ita quies, cum vacatio quadam & exercitio contraria sit, humiditates conseruat: At cibus quamuis largē ingestus non omnis humectat, sed is qui vehementes qualitates non habet, hoc est nec saliedinem, nec acrimoniam: nec amarus, aut acerbus sit. Nos itaque

acetum

Al. 1. f. 2. d. 2.
fol. 2. cap. 3. fol.
40. d

acetum mulsum, aliquādo bibendum exhibuimus, in quo ellebori albi ramusculos per integrum E diem ac noctem raphanis infixos dimiseramus: esset q̄ hęc ellebori leuis expurgatio. Ceterum qui angustum Pectus habent, & idcirco pulmonem compressum, ad euomēdum ineptissimi sunt cum alijs vomere facientibus, tum præcipue veratro: conceptaculum enim aliquod ex ijs quæ respirando vsui sunt, dirumpent. Conuenit insuper Amaram Bilem per superiora, Pituitam per inferiora magis educere: quamuis interdum contrarium facere oporteat, si in ventriculo pituita, in intestinis aggesta bilis conlitterit: nam atra bilis per inferiora semper est eijcienda. Quod ad Anni autem tempora attinet, in aphorismis Hippocratis scriptum est, || Ætate superiores, hyeme inferiores, ventris partes medicamēto purgandas esse: & regiones, calore frigore q̄ distinctas ad anni tempora æstimari debere. Idem est & in ætatibus sentiendum. Cōsuetudo quoq̄ haud parum euacuationis modum ostendit. Nam qui assueti sunt vomere, per superiora purgari facilius tolerant: non assueti periculum subeunt, præsertim si elleboro purgentur. Morbi præterea Genus spectandum erit: Hydrops enim quem *Φλεγματίαν* appellant, eget medicamento pituitam educente, ac primò quidem per inferiora, deinde per vomitum, postremò per nares & palatum. Cum enim noxius humor in vniuersum corpus redundarit, omnes euacuationum species admovebimus. At hydropi Ascite, quippiam aquam detrahens offeremus: Velut Regio morbo laboranti, aliquid quod bilem educat: nam & his bilem euocare multifariam opus est, sursum, deorsum, per vrinæ meatus, per palatum, & nares. Eodem modo si Bilis Atra supra modum excreuerit, vt in melancholia, cancro, elephantiasi, aliquid quod nigram bilē detrahat exhibebimus: Nam Comitiales pituitam inanientibus expurgamus. Ex his itaq̄ planum est morbi conditionem ostendere & humorem euacuandum, & locum per quem educere ipsum conueniat. Nempe inflammationem habentibus in iecinore, simulatq̄ maturuerit, aluum subducemus, cum in simis iecinoris partibus ea incubuerit: at si in gibbis exiterit, vrinam ciebus: Itidē & in reliquis spectabimus, humorem exuberantem, & locum humore infestatum, ex quo tanquam causa quadam, vis morbi confurgit: hęc enim & quid euacuandum, & quomodo, & qua parte euacuandū, indicabunt, & ad hęc omnia tempus etiā monstrabunt. Siquidem inter initia morbi, tenues & aquosos humores euacuabis: vbi crassi & tenaces fuerint, quales suapte natura sunt pituita & nigra bilis, concoctionem expectabis. Accessiones quoque quo modo euacuandum sit docent. Nam dum accessio infestabit, à superioribus educes: vbi destiterit, quod intermissionem dicimus, ab inferioribus trahes. Ad hoc etiam facient quæ Sponte in morbis eueniunt. Multis enim per accessiones vomitus excitatur, & sanguis è naribus erumpit, non paucis intermissione facta lotium & alius fluit. Præcipue verò quo tempore accessiones, & iudiciales dies adueniant, obseruandi erunt, siquid per inferna purgare molieris. Nam si ad superiora humores inclinauerint, purgantis medicamenti efficacia impiedietur. In his autem qui iam ægrotant, si Diuturnus futurus est morbus, expectanda semper erit concoctio: Sin Acutus sit, inter initia, si modò à concitatis pendeat humoribus, purgare licet: quanquam & istud ipsum magna cum animaduersione, diligentiq̄ consideratione faciendum est. Neque enim exiguum impendet periculum, ne sinistre purgatio succedat, eò quod quæcunq̄ purgant, latentem caloris excitandi potestatem habēt: & febris, vt febris est, & secundum suam rationem, non sicca neq̄ calida, sed hisce summè contraria, humida frigida q̄, requirit. Non igitur febrilis caloris gratia purgans exhibemus medicamētum, quod nos quoque quantum in ipso est, nocere scimus: verum vt humores febrem concitantes extirpemus. Vtilitas itaq̄ maior provenire debet molestanti humore detractio, quàm ab expurganti remedio nocumentum, quod necessariò corpori infligitur: utilitas autem maior obueniet, si & quicquid ladebat, & sine molestia, detractum fuerit. Vt autem hoc fiat, ante omnia considerare oportet, idoneus ne sit ad eiusmodi purgationem qui morbo laborat. Etenim qui sæpe cruditate laborarint, & qui tenacibus & crassis visci consueuerint, qui q̄ sub costis tensum & inflatum ventrem habent, vel eximiè calidum atque feruentem, aut in his locis inflammationes sentiunt, omnes ad purgationes sunt inepti. Hos itaque dimittere oportet: nam quoad fieri potest, ægroti humores ad fluendum paratos esse conuenit, hoc est tenues minus q̄ tenaces: ac meatus, per quos transierint, apertos esse, ne qua illos moretur obstructio. Hęc nos quoque antea facere moliemur, cum aliquem purgare volumus. In acutis verò morbis, si statim inter initia primo die vel non vltius secundo, purgatione vti velimus turgente materia, huiusmodi præparationi locus non est, nisi quis fortè nactus fuerit occasionem, aquam mulsum exhibendi, in qua hyssopum, origanum, ve, aut tragoriganum, vel thymum, vel pulegium, vel quippiam aliud humores attenuans, incoxerit. Quocirca rarò in acutis morbis, modò rationem adhibeamus, ab initio nobis medicamenta vsui erunt, cum neque assilientes humores plerunq̄ concitati sint à principio: neq̄, si hoc ad sit, ægrotus aptus sit purgationi, vel se preparandi tempus idoneum nobis nō præstet. Concitari verò & turgere humores dicuntur, cum motu vehemēti agitantur: ac ab vno loco ad aliud confluentes inter principia morbi hominem vexant, dolores q̄ ac titillationes afferendo ægrum quiescere non permittunt. Hos ergo humores euacuare conuenit, in motu, agitatione, & fluxu positos: Qui verò iam aliqua in parte corporis confederūt, neq̄ vllò alio auxilio

4^a. Aph. 4. Ext.
od. 27. h

A. l. i. f. 4. ca. 3.
fol. 72. h

A. l. i. f. 4. c.
fol. 71. h

* ἀσθενες
legitur in
aliquo codice,
quod est fasti-
dia cientes.

Axilio neque purganti medicamento prius mouendi sunt, quàm concocti fuerint: tunc enim & naturam euacuationi adiutricem habebimus. Hæc enim simul atque concoxit, humores excernere atque superflua refecare conspicitur, quò tempore iudicatio morbi quoq; quam crìsim appellant, celebratur. Verum quoties natura euacuationem absoluit, nulla insuper opus est medicina: cum autem ipsam mediocriter ac segnius peragit, quod deest medicos supplere conuenit. Illud vero non ignorare par est, rarò euenire vt ab vno mēbro ad aliud humores confluant: sæpius accidere, vt aliqua in parte corporis quiescant, ibi q; tandiū maneant donec concoquantur toto morbi tempore, quoadusq; soluantur. Cum ergo non solum morbus acutus fuerit, veluti pleuresis, sed etiam maxima cum febre, multo magis cauenda est purgationis exhibitio, præcipue cum egrotantis natura nobis incognita fuerit. Alij nanque difficulter purgari solent: alij modica portione ebibita, copiose vacuantur. Cum itaque febris vehemens non fuerit, ægri q; naturam noueris, inaniciens medicamentum dabis, elleborum nigrum, aut aliud simile quippiam, quorum est etiam diacolocynthis, quam nūc vsitato nomine hieram hoc est sacram appellant. Hæc cum variè conficiatur, quæ veratrum assumpsit, nec scammonium habet, medicamentum est eximie purgās, in ijs tamen, in quibus educitio conuenit. || Post assumptam vero purgationem statim hordei pultriculam forbere

de Rat. vict.
in mor. acu. cō.
2. l. 12. 7^o. 118. d

Bvtilē est, vt Hippocrates inquit. Nam purgans medicamentum vt exiguum etiam fuerit, in fundū ventriculi descendat, oportet: In descensu cum gula & quicquid ventriculi gulam excipit, non solum medicamenti qualitate, sed etiam substantia inter deglutiendum appulsa, inficiatur, magnopere læditur: Quare vtilē est hordei cremorem deinceps forbere, propterea quòd abstergere & inferius trahere potest, id quod transeūdo se meatibus implicuit, & temperare atque immutare medicamenti qualitatem, quæ membris insedit. Ob hæc igitur Hippocrates iubet ab assumpta purgatione ægrotos hordei pultriculam statim bibere: non tamen eam dare consulit, cum purgatio procedere incipit, timens ne purgationis opus dissoluatur. Quamuis interdum data purgatione alius non egerit, vel ob ægri naturam eiusmodi: vel quia quod purgare debet, exiguum fuit. Perunque etiam stercus densatum atque in aliquo intestino exiccatum, quod clystere subduci opus fuit, antea quàm medicamentum exhiberetur, euacuationem prohibet. Potest insuper natura ad vrinam vergente, potio, quæ subducere aluum debuerat, nihil efficere. Interdum quoq; cum euacuatio frustratur, præter hoc quòd nocumentum aliquod corpori non affert, in nutrimentum etiam transit. Interim tamen in pernitiem & venenum mutatur. Cum vero medicamenta omnia quæcunq; purgant, ventriculum lædant, & maxime eius ostium, quod maxime neruosum est, & acutissime sentit, excogitatum est bene olentia purgantibus admiscere, ne sola atq; sincera eorum vis ostium ventriculi attingat. Oportet autem admista semina talia esse, quæ & medicamenti malitiam retundere, & eius opus impedire nequeant: quæ q; attenuare & incidere valeant:

& vt crassos humores secare, & vias per quas educi debent, aperire & patefacere possint.

Oportet præterea vt commista sibi inuicem medicamenta consentiant, neque vlla in re discrepent. Discrepant autem non cum hoc bilem, illud pituitam trahit, vtraque enim parī modo euacuationem procurant: verū si hoc celeriter, illud tardius, ab assumptione purgare incipit. Ita nanque inæqualiter euacuatio celebratur, quamuis simul accepta sint. Inæqualem autem euacuationem dico, si cum hæc desinisse videtur euacuatio, alia rursus incipiat.

FINIS

Quinta Classis.

MMMM

Galenī

l. 1. f. 4. c. 5.
ol. 75. d

l. 1. f. 4. c. 4.
ol. 74. c



GALENI DE THERIACA AD PISONEM

Iulio Martiano Rota Interprete

Sunt qui negent hunc librum esse Galeni, nec sine causa. Aëtius tamen in capite de Sale Theriaco, citat Galeni verba, ex hoc libro desumpta.

*Libri Dedicatio, Andromachi Commendatio, & Quid Galenum impulerit
Ad hoc opus scribendum.*

CAP. I.



E T hunc tibi de Theriaca librū, maxime Pīso, diligenter omnia perscrutans, cū ipse vltro de industria dedicaui, tū quia aium tuum ab huiusce medicamenti cognitione nō abhorrentē animaduerti, quo tpe, sicuti consueueram, ædes tuas ingressus, & alijs quā plurimis, tibi q̄q̄ cōsuetis voluminibus circūseptū te offendi: & scriptū quendam de Theriaca libellum, auide percurrentē inueni. Soles. n. à publicis occupationibus ocium nactus, tēpus omne in euoluendis antiquorū philosophorum libris, consumere. Vt igitur me tibi accedentē, blando primum vultu, deinde verbis etiam, excepisti, intermissam postmodū lectionē auscultantibus nobis prosecutus es. Nā & ego libenter aures adhibebam, cū G

† Græcè impressū legitur
ὑπό τινος ἀνδρουμάχου καλουμένου, i. a quodā Andromacho vocato.
In antiquissimo aut cod. legitur
ὑπό τινος ἀνδρος μάχου καλουμένου, i. a quodā viro, cui nomen Magnus.

opus illud nō incōcinne scriptū esse cōstaret † à viro quodam, cui nomē Andromachus fuit, artē medicam ad summū vsq̄ edocto, nec faciendo solū, sed dicēdo ē, vehementer exercitato. Hic itaq̄ quod vtroq̄ præstaret, reliquos medicos ab suā tēpestatis Imperatoribus anteire, vt mihi quidem vī, creditus est: cui forsitan & patria aliquid, ad medicinā optime cōsequendā, attulit. Nā ex insula Creta genus ducebat, quam credibile fuit, vt complures herbas, sic talē virum producere potuisse, qui humano generi salutarē antidotum cōponeret. Cū itaq̄ tu huiusce viri libellum legeres, plurimum quidem ego gaudebam: admirabar q̄q̄ magnopere, q̄ rebus quæ ab eo scriptore tradebantur, mentem tantopere adhiberes: nec poteram non habere magnas gratias nostrī tēporis fortunæ, q̄ te vsq̄ adeo studiosum medicinæ cōspiciebā. Maior siquidem pars hominū aures tantū tibi demulceri volunt medicorum orationibus: tu vero nō solū, quæ ab eis dicuntur cū voluptate audis, verū etiam multa quæ non exprimuntur, insita tibi prudentia & aptē & faciliē conijcis: immo & peragenda quædam sic accurate cognoscis ac inspicias, veluti nos qui magnis laboribus ista didicimus. Id quod ego quā verissimē sum in te ipso contemplatus, atq̄ magnopere demiratus, quādo charissimus omnium tibi filius, vrgente quadam equitandi necessitate summis femoribus ægrotauit. Sacris enim certaminibus tunc ipse præeras, quæ in honorem deorum Romanorum H celebrabantur. Oportebat autem eo tēpore, nobiles etiam pueros equis insidentes, atq̄ pro conditione certaminum ad numerū discurrentes, ludum quendam obire. Tunc igitur filio quoq̄ tuo valde tenero coxarum summitas à subiectis stragulis contusa, inflammationem contraxit, & inde saniem collegit, quā per incisionē educere opus fuit. Ac puer quidē, perinde atq̄ iā vir aliquis esset, patienter oīa sustinens apte curabatur: putasses illum ad instantia mala fortiter tolerāda philosophorum sermonibus optime instructum. Tu vero diligenter adeo, præsens cum fores, inspiciebas, & omnia quæ à nobis fiebant, annotabas, vt si quando minus apte quippiam fieret, instares illico, moneres q̄q̄ || Nihil temere secundum Hippocratem agēdum. Quamobrem ego singula diligentius obseruans, etiam plusq̄ conueniat operosius quippiā quod abs te fieret, animaduerti. Nā si quod eorum quæ à medere imponebant, apte minus insisteret, illud tu statim tuis digitis ita transferebas, atq̄ sic decenter vulneri coaptabas, vt mirabile foret spectare, tantā te manibus prōptitudinem ostendere, ob amorem quo filium prosequeraris, ingenium q̄q̄ tuum ad oīa versatile, quantā qui sunt artē exacte consecuti. Quāobrem illud in te merito conspici posse videbā, quod etiā sapiētissimus philosophus Plato, sicut par fuit, i quā plurimis saepe speculatus, veritatis q̄q̄ necessitate delectatus, asseruit, Quæ in nostrā cognitionē veniūt, nō discere nos, sed reminisci, ingenitā q̄q̄

6. Epid. cō. 2. t.
25. 3. 164. h

« **A**nitam q̄q̄ humane menti rerum oīum esse notitiam: quæ tum deniq̄ sese pandit, q̄n vsus exposuit.
 « **I**at. Vt igitur artis medicæ peritiā in te filij sollicitudo, nihil nobis tale expectātibz, aperuit, ita vir elegans & ingeniosus cum sis, legendis de theriaca v̄sibus intentus eras, procurabas q̄q̄ cum illius vires & temperaturā cognoscere, tum quātitatē modū, & vsus opportunitatem intelligere.

Theriaca Commendatio, & Dignotio, Principum q̄; Romanorum hac in re Studium. CAP. 2.

A.L. 3. f. 1. r. 1.
fol. 522. g

NAm re vera celebratissima est apud omnes hoīes partim ob promissionum certitudinem, partim ob actionum efficaciam. Nullus. n. vnq̄ traditur occubuisse, qui cōmorsus ab hisce feris quæ consueuerūt necare, theriacā subito sumpsisset. Ac si quis prius ipsam bibat, inde q̄ paulo post ab aliquo serpente feriat, irritum esse venenū illud compertū est: Quod sæpenumero cōplures magistratus, qui mortis & vitæ potestatem habet: & utrū quæ promittit antidotus præstare queat, dignoscere volunt: in hoībz ob aliquod perpetratum facinus carnificinæ adiudicatis experiuntur. Nos aut̄ qui in hoībz periculum facere non possumus, in alijs quibusdam aīalibus verum de ipsa iudicium sumere tentamus. Accipimus. n. gallos non domi enutritos & contubernales nostros, verum syluestres, sicciōri cum sint tēperatura: deinde iniectis serpētibus, illos qui theriacam non biberint, illico mori videmus: alios aut̄ qui biberunt, consistere, & vitam et post icū
Bretinere. Nonnunq̄ vero & hoc pacto, num adulterata sit experiri conuenit. Data prius theriaca, postmodum exhibemus medicinam aluum subducentem: ac, si qui assumpsit non purgatur, optimam iudicamus antidotum fuisse, q̄n purgari prohibuit eum, qui purgantem medicinā assumpserat. Atq̄ hæc probatio nunq̄ nos fefellit, quin verā theriacā agnosceremus. Multæ quippe fiunt ab impostoribus hac etiam in re fraudes: vulgus q̄q̄ sola theriacæ fama deceptū, ab istis quibus ars est mercenaria, non recte cōpositam antidotum multa pecuniā redimit. Etenim aliqui reperiuntur qui quanq̄ valeant, toto tñ vitæ suæ spatio theriacam sine intermissione suscipiunt, p̄sertim qui propter sinistros & illiberales mores securi nō viuunt, sed mortē sibi p̄ insidias ab inimicis impendere semper existimāt. Aliqui vero singulis diebus incolumitate corporis ducti theriacam assumūt, quemadmodum nos Marcum Antoninum, qui paulo ante Romanum imperiū summa integritate administravit, & corporis sui temperamentum exacta prudentia cognouit, abunde quali delicato quodam cibo, vsus nouimus. Ab illo. n. auctoritas medicamento amplior creuit, cum eius efficacia latius inter hoīes diuulgaretur: siquidem cum Imperator vitam sanā traduceret vtilitatis fidem antidotus maiorem obtinebat. Verum Antonini quidē temporibus opus solummodo theriacæ cōis fuit sanitatem Principis intuētibus: his aut̄ Imperatoribus, vsus etiam
Cpublicus euasit. Licet. n. oībz nobis ab ipsis petere, & tradita per manus antidoto liberaliter curari, quoniam non solum cunctos excellunt, q̄ a dīs imperium sint adepti, sed etiam quia libet̄ in vniuersos oīa bona deos imitati conferunt: tantum q̄q̄ gaudium concipiunt, quanto fuerint incolumitatem ab ipsis consecuti. Maximam imperandi partem arbitantes, cōis salutis procurationem: quæ res me magis in admirationem ipsorum traxit. Neq̄ enim de theriaca solummodo curam habent, verū ita sunt hoībz in rebus benigni, vt si q̄n quispiam amicorū antidoto egeat, mirandum sit quanta promptitudine, quanta q̄q̄ animi propensione, ipsam cōicent. Non. n. theriacæ compositionem in necessitatem vsus differunt, sed repentinis occasionibus, improuulis q̄q̄ euentibus, promptam, paratam q̄q̄ decenter habent. Quo tempore igitur Antipatrus, cui græcas epistolas scribere cōmittebant, & ob morum grauitatem exactam q̄q̄ rhetoricæ artis peritiā honoris plurimum deferebant, in renalem morbum incidens, grauiā & irremediabilia pateretur, laude dignum eorum studium pro salute amicorum susceptum vidī, mirabilem q̄q̄ in adiuuendis remedijs concertationē. Sic. n. varijs differentibus q̄q̄ symptomatis occurrentes, morbo repugnabant, vt optimi medici & omne vitæ tempus in re medica exercitati consueuerunt. Amicā vero mihi præ cæteris Arriam, eximie commendatam & ipsam ab Imperatoribus, q̄ philosophiæ diligēter
Doperam daret, & præcipue Platonis lectione delectaretur, non leuiter olim ægrotantem sanarūt. Laborabat. n. v̄triculi languore, atq̄ iō ita supinē decūbebat, vt ne cibum qdē accipere valeret: vnde periculum ipsi imminēbat, ne defectu nutrimenti periret. Tunc itaq̄, sicut expertissimi solent medici, mulierem curarunt, vinum absynthio medicatum, me commōstrante, propinantes. Mox enim vt tale vinum bibit, & stomachum roborauit, & celeriter cibi appetētiā recepit. Illud vero, quod in filio tuo contigit, vt recorderis adhuc, credibile est. Collectio siquidem abscellu, tu quidem, vt bonus pater, incisionem tardabas: tempus autem festinā puris emissionem suadebat: illi dato medicamento nos ea in re magna sollicitudine liberarunt. Nam superimpositum emplastrum subiectum locum incisione citius aperuit, & omnem inclusam saniem sic eduxit, vt dolorem ea de causa puer deinceps sentiret nullum.

Cur è Multis Antidotus componatur, Insitam q̄; Rebus omnibus esse Virtutem, quon vatione sensibus q̄; inuestigamus.

CAP. 3.

TAlem igitur diligentiam circa hæc medicamenta, sicuti vides, cum nostri Imperatores habeant, merito theriacam quoq̄ summa cura conficiunt. Cū. n. singula quæ imponūt, ipsi diligenter adeo examinēt, vt ne minimam quidem rem contēnant, propterea mirandos effectus pducit. Nā sicut nosti, Theriaca, quemadmodum multis è rebus cōponitur, ita quā plurimos

Quinta Classis.

MMMMM ij . vsus

usus habet. Quāobrem ego demiratus sum illū qui primus ipsius cōpōnem est aggressus: vide-
tur q̄ mihi nō temere, sed exacta quadam rōne, & exquisito supra modū cōsilio, tot res miscuisse.
Non. n. sic & nos medicinarum notitiā assequimur, quēadmodū qui se empiricos ab sola experiē-
tia cognominant. Illi. n. omīssa disciplina quæ rerum naturā inuestigat, quoties oblatos ægros nul-
la rōne curant, turpiter profitemē se remedia partim ab insomnijs, partim à fortuna, suscipere. Nos
autē "auxilia quæ rō & prima & sola excogitare pōt, summa cōsideratione diligētia q̄ scrutantes,
magno studio reperimus: quæ aut rō nō valet inuenire, ea sensuum iudicio perpēdimus: plerūq̄
tñ vni non fidentes, pluriū cēsūrā adhibemus. Neq̄. n. vt calcem frigidam credamus, quāuis sit vt
nix, alba, oculorū dūtaxat iudicio stādū esse arbitramur: aut rosam p̄pterea q̄ rubra sit, calidā idcir-
co statim cōcedimus: Sed oculista cū adiuncto, calcē tā calidā deprehendimus, vt fortiter vrat: ro-
sam tā frigidā agnoscimus, vt leuiter refrigeret. Sic & in reliquis medicinis accurata sensuum opa
cuiusq̄ facultatē inuenimus. Nā gustus nobis discernit illud acutū vel salsum esse, q̄ tale sit: hoc
amarū vel dulce, q̄ eiusmodi. Tactus aut quæ calida & frigida, quæ sicca & humida, contrectando
nobis manifestat. Multa quoq̄ nariū iudicio exploramus, in primis q̄ medicinarū vires, quarum
integritatem odoris vehemētia, imbecillitatē eiused remissione, colligimus. Nos itaq̄ sensuū iudi-
cio, quæ simplices medicinae bonæ secus ue sint, cognoscentes, ipsas primum experimur, inde sen-
su q̄ cōprobatis postmodū experiētiæ rōnē cōiungimus: quā ducē rebus in oībus sequentes, F
& simplicibus remedijs sicut par est vtimur: & cōmonstrante artis viā rōne, cōposita quā opti-
ma conficimus. Nam simul atq̄ didicimus morbi cuiusq̄ naturam, & variā differentem q̄ tempe-
raturam simplicis vniuscuiusq̄ nouimus, tum remedia miscemus, quæ suæ cōpositionis diuersita-
te singulis ægitudinibus occurrant, oībus q̄ hoībus artificiose conueniant, variato tñ in singulis
corporibus medicamēti modo. Magnā. n. vt non ignoras remediorū copīā promptam habemus,
& adeo multiplicē, vt non solum in cōpositis spectari multitudo virtutis ipsius queat, sed in sim-
plicibus ēt. Quorū alia oībus suis partibus vnā & eandē vim ostendunt: velut Scāmōnia, quæ fla-
uā bilem violētē educit: velut atticū Epithymū, quod nigrā bilem per aluum purgat: velut Gra-
nū gnidiū, quod pituitā & oēm aquosum humorē aperte subducit. Hæ siquidem medicinae oībus
suis partibus, tota q̄ sua substantia, p̄dictos humores extrahere cōspiciunt. Neq̄. n. fidē Bithyno
Asclepiadi præstamus, dicenti, tūc occasione data humores subita quadā mutatione fieri, qñ pur-
gant hoīes. Nā cū ē molibus & meatibus humana corpora constare semel supposuisset, atq̄ id ne-
gare cogatur opationes naturæ, cōsentaneū ipsi fuit, hūc ēt de humoribus afferre sermonē: nimi-
rū quia rōne caruit, prorsus q̄ fieri nō potuit id quod supposuerat. Quis. n. mētē p̄ditus credat, ita G
tim vt medicina corpus attingit, humoris educēdi substantiam, p̄creari? Quis cōtra non facile sibi
p̄suadeat, humores istos suapte natura prius in corpore substitisse? Cū videat ictericū quo tēpore
purgantē bilis medicinā accipit, & subito tā multā bilē excernere, & à pallore tā prompte liberari?
Aquā vero inter cutē hñti, medicinā nō reperiri, quæ cōfestim vt accepta fuerit, cōtentā in ventre
aquam totā educat, quin vel nullus vel minimus humor in corpore superlit. Sed dogma puerili-
ter seruās Asclepiades, ista se videre dissimulat, inuectā, sicut dixi, sentētiæ fauēs, mauult q̄, p̄babi-
liter fingēdo cūcta expiri, q̄ verē p̄priā cuiusq̄ medicinae facultatem cōcedere. Nos aut cū antedi-
cta fieri videamus, & rōnem secuti cognoscamus posse nos verē naturalis cuiusq̄ medicamēti vi-
res fateri, p̄dictas quoq̄ medicinas ingenita quadam facultate proprios humores extrahere pla-
nē scimus: quemadmodum & in magnete lapide virtutem quandam insitam, qua ferrū ad se ra-
pīt, bona ratione credimus. Deus enim est illa, sicut in hominibus, Natura, put sentit Homerus,
quæ similibus similia adducendo diuinas eo pacto suas virtutes ostendit.

*Simplicia Medicamenta plerūq̄; Compositas vires obtinere, Diuersas corporis partes & ledere
& iuuare, Diuersis q̄; diuersa conuenire.*

C. A. P. 4.

O Mniū "aut naturā ideo diligēter ingrimus, vt facultatē accurate discamus, p̄ quā agūt. Dum H A. I. 2. l. i. ca.
itaq̄ scrutamur ista, deprehēdimus alia, sicut dicebam, oībus suis partibus idē & posse & age 1. fol. 91. h
re semp: alia vero, q̄ sicut partes diuersas habēt, ita vires dissimiles ostendunt, & actiones plerūq̄
tā diuersas efficiunt, vt cōtrarios effectus in humanis corporibus ab eis fieri videamus, q̄ res inspi-
ciētibus admirationē excitat. Siq̄. n. lapathi folia comedat, aluū deiiciet: sin aut māducet eius se-
mina, retinebit. Parī mō quoq̄ galli veteris ius, brassicæ decoctū, & cochlearū marinarū iusculū, vē-
trē puocat: at ipsius brassicæ olus, & illorū carnes comestæ, astringūt. Aloes puluis, & æris squa-
ma, carniū excrecētias in vlceribus cōprimunt, & illuc cōfluētes humores siccāt: ore aut sumpta
corpus totū & molliūt & expurgāt. Lac ipsum si q̄s diuidat, cōtrarias facultates & usus habet: se-
rū. n. ebibitū, vētrē laxat, caseus emāsus eundē cohibet. Iam vero quædam ex cōmistis virtutibus
quas in se cōtinēt, admirabiles adeo, pducūt effectus, vt ne fieri quidē posse audiētibus videāt, nisi
ex euentu fidē oculis ipsi cōsequant. Trifoliū qd' verno tpe cū floret, hyacintho similis est, & semē
agrestis gnico parē gignit, si q̄s valde decoquat, & inde cōmorsum à phalāgio vel ēt vipera locum
decocto abluat, ipsum sanat, & illico dolores amouet: At si q̄s alius non pcussus eidē aq̄, partē sanā
immittat, similē cōmorfolionē, totidē q̄ dolores sentiet: vt re vera summa admiratione dignū
sit, eandē herbā & pcussis mēbris sanitatem inducere, & sanis pcussionis lēSIONEM inferre. Rursus
medicinae

A. l. 2. t. 2. c. 150
fol. 117. c

A medicinae quaedam extant nullo pacto nutriendis hoibus idoneae, veluti cicuta: quae sturnos alit, nec in eis mortiferam vim exercet, in nobis autem vitae calorem extinguit: Et veratrum, quod tamen coturnices "pascit, hoïem tñ strangulat. Non nulla vero deprehendimus, quibus propriū est partem aliquam corporis solū offendere: quemadmodū lepus marinus, pulmonē: cātharides, vesicam exulcerant. Et rursus quibus insitum est, vt aliquod mēbrum ex oībus iuuent, vnde male affectū iecur, eupatorium herba plerunq; valde confirmauit, & vnguentaria glans lieni pluries cōtulit, & saxifragia atq; betonica renibus multoties profuit. Sunt & aliae quae membris alijs conueniant medicinae experientia comprobatae: quas nos, sicut dicebam, accurate p̄scrutati, propriū cuiq; valetudini remedium adhibemus, optimum vt in alijs, sic in hoc quoq; magistrū secuti Hippocratem, quem exactissimum medicinarum artificē fuisse, cū alia multa probant ab eo tradita, tum illud quod ipse scribit in secundo epidemiorū libro his verbis: Medicamentorū modos nouimus, quibus singula quaeq; fiunt: non. n. eodem modo cūcta, sed aliter alia rite cōponunt. Nam quaedā celerius, quaedā tardius colligunt: parant etiā aliter alia, velut siccant, tundunt, coquuntur, & id genus alia, donec plurima plus minuant, & quaeq; singulis accōmodent. Præterea quibus in morbis, morbi aetate, valetudinis specie, victus qualitate, anni tempore, cōuenienter exhibeantur, B & id genus reliqua. Per hæc itaq; vt vides, summatim nos instruit, monet q; vt medicinarū naturam intelligamus, vt tēpus quo sumi debeāt exploremus, vt tpaturas accipiētū inspiciamus. Reperiunt. n. re uera nō nulli, qui tā facile medicinas sumūt, vt vel ipsas sæpe cōficiant, vel nulla in re saltē ab eis male afficiantur, interdum etiam in nutrimentum commutent. Aliqui vero medicinis accipiendis inepti sunt eo vsq; vt statim ab initio ipsas auersentur, & inde stomachus eorum subuertatur, demum ante q; illa procedere incipiat, ipsi facile dissoluantur.

Quid Medicos induxerit, vt Plura Simplicia cōmiserēt. Quis q; Primus vīperas theriacæ imposuit. CAP. 5.

Hæc igitur, vt ego quidem arbitror, veteres medici quotquot optimi fuerunt, cū ab Hippocrate didicissent, tam optimas medicamentorū cōpositiones inuexerūt, cōpōnis artē ex ingreditus cuiusq; tēperatura mutuati. Nā, si quæ nimīū intensas qualitates habebant, aliorū admīstione retuderūt: si quæ nimīum acres, hebetarūt: ac postremo in singulis morbis varietate perspecta & in singulis hoibus tēperatura perpenſa, magno artificio medicinas administrarunt. Quamobrem, opinor, & hanc ipsam theriacam, de qua nobis totus hic liber accurate disceptat, ē plurimis & optimis rebus appararunt. Nam cū ex vna parte animaduertissent, nec serpētū icūs euadere, nec venenorum insidias euitare nos posse, sed vtrāq; de causa mortē incurrere: ex altera vero considerassent tantopere naturam hoīum inter se differre, vt quod vni prodest, alteri non cōferat: merito sunt multiplicem & exquisitam ipsius cōpositionē moliti, vt hoc noīe foret in oībus hisce necessitatibus remediū præsentaneū, & vsu tam opportuno apud oēs gentes summopere celebrata. Siquidem mihi nihil tam difficile vī in vita quā serpentes & venena vitare non posse. Nam cætera quæ nobis excidium inferre queunt, euadere fugiēdo possumus: at ista, quia caueri nequeūt, facile decipiunt. Etenim sæpe vnus & alter venenū libi per imprudentiā assumit, nepe quia non intelligit, quid vitet. Item alius ab insecto, vel serpente nō animaduerso percussus, quā primū intērit. Memini ēt me in historijs legisse q; dux quidā cū Romanis bello nauali dimicaturus, aiaduertens se militari manu imparē (Carthaginēsis hic fuisse tradit) ollas multas impleuit serpentibus, q; cōfestim interimere solēt. Cū itaq; testas opertas oēs repēte in hostes iaculatus fuisset, nec illi quid inclusum foret, suspicarent, atq; ideo sibi non cauerēt, nō. n. cōsuetū fuerat eiūsmodi tela mitti, breui tempore quā plurimi serpētibus icū cecidere. His artibus vir iste, tanq; alter serpēs & ipse foret, in bello vsus, multoties hostiū manus effugit. Quāobrem & vobis Principibus ad euitandum insidias, & exercitū Duc̄toribus in varios bellorum euentus, necessariā hanc antidotū existimo: quæ sanē quondā licet sine vīperis cōficere, plurimū tñ aduersus hæc oīa valebat. Inde medici cū D huic vni inuigilarent: & quod maxime præsentanea fieret, quid adderent, inter se consultarent: medicus quidam excogitauit, vīperas admiscere. Ferunt hūc virum Andromachū fuisse, medicū cōmemoratione dignum, qui non multis ante nos annis fuit. Conuixit enim Neroni, cui libellum versibus scriptū dicauit, in quo Theriacæ cōpositionē & promissiones tradit. Subscribā aut illius carmen, ne vir elegās adeo cum sis, ipso careas. Illud tantum prius dicam, Theriacā duabus de causis meritō, & ab eo qui sic ipsam admiscuit, & à nobis deinceps appellatā, simul quia moribus serpentum maxime succurrat, simul quia viperinas carnes admixtas habeat. Sūt aut carmina hæc.

Prima pars Poematis Andromachi continet Operis dedicationem, Theriacæ nomina, Pro-missiones: & postremo Dosim, Modum assumptionis, & Tempus.

CAP. 6.

Antidotum multis insignem viribus audi
Cæsar, qui nobis ocia tuta facis.
Tranquilla hæc, Hilaris q; suo, pariter q; Serena,
Nomine, cyaneos non timet vna sinus.
Non, si quis cupidis expressa papauera labris
Hauerit, exitum pocula sumpta ferent.
Non, si quis gelida compleuerit ora cicuta,

Quinta Classis.

MMMMM iij

Si quis

DE THERIACA

Siquis hyoscyamum, siue aconita bibat.
 Non si cantharides, aut præsens morte venenum
 Colchi tuum sumat, feruida Thapsæ tuum.
 Arida non dipsas, non clarus fraude ceras,tes,
 Non feret impresso vipera dente necem.
 Incaustum cauda consurget scorpius vnca:
 Nec subitos luctus alpis iniqua dabit.
 Non pyras audebit calido progressa cubili,
 Vt prius aduersa comminus ire via.
 Nullus ob hæmorrhæi stillabit vulnera sanguis:
 Nec tumidos faciet pressa dryina pedes.
 Claudere non cogent odiosa phalangia summum,
 Concussu tremulo frigorebus q̃q̃ diem:
 Non hydrus. Nec ubi torret Sol æquora cancro,
 Cum petit arua minax, concitus atq̃ furit,
 Ora trahens multa chersydrus cæde cruenta,
 Supremum vitæ ducet in exitium.
 Hac fidens æstu per rura vagabere Cæsar,
 In Lybico quamuis progrediare solo.
 Nil oberit sicci tibi ruris alumna rubeta,
 Nil geminum tollens amphilibæna caput.
 Hac rursus stomacho præsens medicina tumentis est:
 Hac ab anhelanti pectore tollit onus:
 Aut intus toto cum spiritus vndiq̃ ventre
 Fluctuat, & surdis viscera pulsat aquis:
 Dira q̃q̃ cum miserum dirumpunt tormina ventrem,
 Et saluunt longi membra dolore colli.
 Sanat item croceo suffusos ora colore,
 Regius is solito nomine morbus erit.
 Hi politas nolunt miseri contingere mensas,
 Nec, si quis vitæ tempora longa daret.
 Sed sibi dissimiles oculis animi q̃q̃ dolore,
 Contemnunt medicæ, quis putet? artis opem.
 Inuadet quoties hydrops mala, corpora liuor
 Inficit, hac fies liber ab antidoto.
 Hinc hebetes oculi sibi pristina lumina sument.
 Hac phthisis incipiens victa recedit ope.
 Sola potest in se collectos soluere nervos,
 Pendula tunc aliquis tenta 'ue colla gerit.
 Nec finit vt membrana, leues quæ pectore ab imo
 Sepsit pulmones, victa tumore premat.
 Hac etiam magno vesica dolore leuari,
 Horrifici stimulis vlcis iccta solet.
 Sola potest clausos penis referare meatus,
 Irrita quos vrit, sollicitat q̃q̃ Venus.
 Cinxerunt lumbos renum quandoq̃ dolores,
 Hauriat hæc aliquis pocula, sanus erit.
 Sola potest eadem multis accepta diebus,
 Tollere de læso pectore puris onus.
 Ne te dira lues, neu lædat noxius aer,
 Hanc cape, cum primo est Sole reuecta dies.
 Hac q̃q̃ canum rabiem fato impendente fugabis,
 Cum trepidat moriens, & sitit æger aquas.
 Insomnes demum quibus est mos ducere noctes,
 Conciliat somnum, peruigiles q̃q̃ leuat.
 Pondus erit quantum creuit faba, quam pater atro
 Atq̃ restagnanti flumine, Nilus alit.
 Ipse tribus cyathis præscriptum dilue pondus
 Antidoti, cyathis igne calentis aquæ.
 Sic commissa, tibi vel claro mane bibatur,
 Vel cum nox primam protulit orta facem.

E

F

G

H

Morbi

A Morbi certa dabit crudi solatia, mane
 Sumpta, quibus tristis lux solet esse magis.
 Vespere, cui magnos nox aduehit atra labores,
 Languenti cultos atque leuamen erit.
 At qui calcati morfu serpentis anhelat,
 Ignarus 'ue doli toxica nigra bibit,
 Et cum mane nouum, & cum se Sol abdidit vndis,
 Sumat, ab æquali pondere tutus erit.
 Hac tenus & pondus, viresque, & tempora Cæsar.
 Quod superest, dicam quo facienda modo.

*Secunda pars Poematis Andromachi continet Compositionem Pastillorum ex Viperis
 & Scilla, Pondus eorum quæ ingrediuntur Theriacam, Modum commi-
 stionis, & postremo Aesculapij Inuocationem.*

CAP. 7.

V Ipera principio, cura obseruata procaci,
 Protinus est celeri corripienda manu.
 B Namque ubi tristem hyemem pepulit clementior aura,
 Arcta solet cæcæ linquere lustra domus.
 Et passim violis carpit vernantia prata,
 Dum viridis quærit semina fœniculi.
 Nam facit hæc cernant serpentes acrius herba,
 Quos alit in cladem tarde bubulce tuam.
 Deprensus igitur summum caput, imaque cauda,
 Demenda, hinc quicquid venter inanis habet.
 Infert nam sauos hinc atque hinc vipera luctus.
 Et squammis caudæ dira venena tegit.
 Ceruicisque ideo tantum caudæque secabis,
 In pugnum quantum est alta reducta manus.
 Sanguine sed mistum caueas stillante venenum,
 Verè hilarem nam sic experire diem.
 Hæc ubi rite tibi fuerint perfecta, subinde
 C Vipereas carnes fœtilis olla coquat.
 Ante tamen misces frondem graue olentis anethi,
 Et quantum satis est prouidus indis aquæ.
 At cum panda fluunt resoluti corporis ossa,
 Cumque tument flauæ noxia terga feræ,
 Exime vipereas, confusa cadauera, carnes.
 Exemptas, longa ventilet aura mora.
 Hinc spinas tacita prudens subducito mente,
 Quas bene si tractes sentiet apta manus.
 Adde laboratum panem, ne vipera formam
 Tutâ neget rotulis, ne pereat 'ue liquor.
 Inque cauo dudum postquam hæc versaueris orbe,
 Finge rotas, aptum det quibus umbra locum.
 Inde capillato scillam cum cortice sumptam,
 Pulle linas, medio constituasque foco.
 D Ac cineris rutili cumulos superingere, donec
 Reddatur scillæ mollius igne caput.
 Signa dabit, seruens positos cum discutit ignes:
 Excute, & ut leues dempseris exuias,
 Tres scillæ partes, erui compone duabus,
 Pistilloque crepet concaua pila diu.
 Ac minimos tandem contusa premantur in orbes,
 Quos procul à radijs mitior umbra tegat.
 His igitur lancem primum cumulabis, & octo
 Bisque decem drachmas accipe, bisque decem.
 Dimidium superadde rotæ, quam vipera fecit,
 Et piperis longi sit quoque pondus idem.
 Sitque opij tantum, tantum medicaminis eius
 Quod grati nomen magma coloris habet.
 Inde quater ternas mutato pondere drachmas
 Iridis, & siccæ protinus adde rosæ.

Quinta Classis.

MMMM iiii Addaturque

DE THERIACA

Addaturq; tui radix dulcissima succi,
 Et dulcis tantum seminis inde napi.
 Scordion iungas, & odoribus inclyta semper
 Balsama, qui syrio mittitur orbe liquor.
 Tum quæ suspendas æquata cinnama lance
 Conijce, & agarici par quoq; pondus eat.
 Hinc superest myrrham, costum q;, specu q; reuulsum
 Corycio, fragrans imposuisse crocum.
 Et calia calamos, & quam tulit India nardum,
 Te q; Arabi schœnum gloria prima soli.
 Inde nigrum coniunge piper, thuris q; nitorem,
 Diuite quod foelix rure Sabæus alit.
 Nec tu dictamnum, nec tu quoq; pontica rheon
 Defueris, stœchas, marthubium q; virens,
 Atq; apium petris quod nasceris, & calaminthe,
 Afra q; cum lachrimis ò terebinthe tuis.
 Et folijs gramen quinis, & zingiber ardens:
 Singula sed drachmas sex tibi quæq; trahant.
 His etiam polium drachmis se quatuor addet,
 Addet se polio proxima pinus humi.
 Cum q; racemifero Celtarum nardus amomo,
 Et styracis lentor, feruida q; herba meon.
 Atq; humilis quercus semen, Ponto q; petita
 Phu, quibus accedet Lemnia terra comes.
 Nec non malabathri folium, miscebis & assam
 Chalcitim, fibras gentiadas q; simul.
 Inde tenax gummi, pressa q; hypocistide succus
 Adsit, & hinc fructus balsame parua tui.
 His etiam anisum, seselim q; his iungere mollem,
 His cardamomum, fœniculum q; velis.
 Atq; atram lachrimam, Nili quam spina remittit,
 Quæq; suo thlaspis semine nomen habet.
 Hypericon rursum, pallens miscebis & ammin,
 Nec drachmis totidem plus sagapenus eat.
 Pondere dimidio tum quos sibi Castor ad Istrum
 Ore secat testes, im posuisse decet.
 Quis nec Aristolochi radix, siccum q; bitumen,
 Candida nec desint semina dauce tua.
 Deniq; cum panacis succum, centaurion atq;
 Addideris, finem chalbanus ipsa dabit.
 Antiquo primum solves tamen omnia vino,
 Humida quæ fuerint, vt liquor & lachrimæ.
 Tum quæ sicca vides postquam contusa minutim,
 Cecropio pariter iungere melle velis.
 Hæc qui nos primus docuisti maxime Pæan
 Adsis, seu Tricæ te iuga summa iuuant,
 Seu Burrina magis, Rhodos, aut Epidauria tellus,
 Adsis, & Regi fer tua dona meo.
 Stirpe tua natam Panaceam, namq; salutem
 Ille datam puro semper honore colet.

*Cur Andromachus Viperam potius quàm serpentem alium Theriacæ admiscuerit, deq;
 Cleopatæ Morte diligens Historia.*

CAP. 8.

IN his itaq; carminibus ab Andromacho non inscite compositis, illud mihi consideratione dignum esse visum est, cur è tam multis serpentibus nō alicuius alterius, sed viperæ solius, carnes idoneas iudicarit, quæ reliquis in Antidoto positis misceantur: nam, vt vides, nihil ipse de hac rescripsit. Mihi verò præ cæteris viperæ non tam noxiâ in se vim habere videntur. Basiliscus enim serpens parumper flauus, & tres in capite eminentias habens, tantūmodo conspectus, & si quando sibilat auditus, videntes se & audientes necat: atq; si quod aliud animal, illud etiam mortuum attingit, statim moritur: hinc aiunt omne aliud reptiliū genus cauere ne basilisco vicinū habitet. Dryinus & eiusdem generis, sed diuersi sexus Dryina, in radicibus quercuum vitam agit, & adeo pestifera qualitate præditus est, vt supra se transeuntium pedes quidem excoriet, crura vero tota valde

Avalde tumefaciat: ac quod admirabile magis adhuc est, si quis ægrum curare velit, medicantis manus pelle mulcentur. At si quis forte Dryinum occidere contendat, tradunt eum, qui id facere aggreffus fuerit, putare oīa bene olentia male olere, nec quicquam aliud olfacere insuper posse. Hæmorrhoides & alterius sexus Hæmorrhoids, similem suorum nominum significationi læsionem inducunt. Nam qui demorli ab his fuerint, sanguine per os nares & vniuersum corpus erumpente, moriuntur. Sicut à Dipsade percussus sitis incendio misere pereunt: nam supra modum sitiētes, & vehementer æstuant, atq; non nunquā fatiscētes intereunt. Acontias vero se ipsam valde protēdit, & sicut iaculum hominem inuadēs, eum interficit. Aspīdē quædam reperit nomine Ptyas, quæ perinde ac si tunc ratione prædita foret, æstimata interualli distantia, collum eiusq; extendit, vnde possit iter facientibus commode venenum inspuere. Horum itaq; serpentium vno (siquidē tria sunt aspīdum genera, Ptyas, Chersea, et Chelidonia) Reginam ferunt Cleopatram cum vellet custodes fallere, citra suspicionem repente sibi mortem conscīuisse. Nam Augustus qui Antonium vicerat, & Cleopatram viuam capere, & viuere volebat, magna vt par fuit diligentia ipsam seruabat, quo tam insignem fœminam Romæ in triumphum duceret. Id Cleopatra cum persensisset, & elegisset etiam tum Regina potius ē vita decedere, q̃ priuata de se Romanis spectaculum præ-

Bbere, hoc serpentis genere sibi mortem inferre decreuit. Conuocatis itaq; duabus fidissimis ancillis, Naera & Carmione, quarum ministerio ad cultum corporis utebatur: nam altera capillos decēter complicabat, altera scitē vnguū putamina rescindebat: iubet cōtectam ficibus & vīs ptyadem inferri, vt, sicuti diximus, custodes lateret. Inde periculo in ancillis prius factō, num celeriter serpens illa necaret, vt vidit eas celeriter interiisse, deinceps illam sibi admouit. Quo factō tradunt Augustum vehementer admiratum cum ancillarum beneuolentiam, quæ dominam etiā in morte sequi voluerunt, tum Reginæ magnanimitatem, quæ generosam mortem seruii vitæ prætulerit. Siquidem ferunt Cleopatram inuentam fuisse dextra manu regium gestamē in capite detinentem, vt mortua quoq; spectantibus Regina appareret: Id quod de Polyxena tragicus poeta scribit. Nam etiam si à Pyrrho iugularetur, tamen mentem adhibuit, vt cum decore caderet. Qui verò nobis & mulieris ad fallendum sagacitatem, & aspīdis ad occidendum celeritatem, verbis extollere volunt, Cleopatram inquit magnum primò ac profundum vulnus brachio suo dentibus intulisse, deinde venenum quod prius ex aspīde parauerat in pixide quadam ad se allatum vulnere infudisse, atq; ita veneno corpus subeunte nō multo post in scīs custodibus vitam leuiter finiuisse.

Verum hæc nō sine animi voluptate narrauimus, vt tuo disciplinarum omnium desiderio satisfaceremus, & per ista intelligeremus q̃ celeriter hi serpentes mortem afferant. Nam re vera serpentes isti velociter interficiunt, sicut ego sæpe in magna Alexandria spectauī. Cum n. aliquem hoc supplicij genere condemnatum sine longo cruciatu dilatione q̃ necare volūt, aspīdes illorum pectoribus admouent, ambulare q̃ parumper faciunt, atq; sic ipsos breui perimunt. Vides ne igitur quomodo nos merito nullum id genus serpentum antidoto commiscemus, ob tam magnam quam in corporibus suis vim mortiferam continent?

Cur Vipera Theriacæ Integra non imponatur, Multaq; ex Animalibus remedia haberi. CAP. 9.

ATqui ne viperas quidem totas in Theriacā mittimus, sed capite amputato & cauda id quod superest accipimus. Et hoc neq; forte fortuna, neq; sine ratione facimus: verum quia viperarum capita humorem pessimum, hoc est ipsum venenum, continent: propterea igitur capita recidimus, vt minus viperinæ qualitatis antidotus habeat. Nam viperarum capita facultatem obtinēt veneni conficiendi: sicuti conuoluta vasa, seminis: et muliebria vbera, lactis. E reliquis autem omnibus vipera caput habet ad lædendum aptius. Ferunt enim ipsam ore adaperto maris semen excipere: quod cum fecerit, insertum illius caput præcidere: hunc q̃ viperis esse congressus morem: ex eo semine postea natos fœtus natura tacitē vltionem procurante, genitricis ventrem rodendo diuidere, atq; ita foras exilientes in patris vindictam matrem occidere. Hæc nobis Nicander suis in carminibus eleganter describit. Sunt autem hæc:

O triuium moneo fugias & aperta viator,
Distinctis maculis quoties mas vipera nigris
Congressum vitat, dentes q̃ subire maritæ.
Diffugit, exardens tunc illa cupidinis ira
Insequitur, saltu q̃ viri conatibus obstat.
Donec ab occurfu & veneris dulcedine captus,
Vxori demens caput inserit: illa mariti
Ora fouet, lambit q̃ diu, compressa q̃ tandem
Colla secat. Tali prægnans de semine gestat
Progeniem, matris fraudes, cædem q̃ parentis
Vlturam, fracto cum mox prorumpit ab aluo.

Caudas vero & extrema corporis amputamus, tanq̃ caudæ partes, puto quia magis sordidum humore ad se trahūt: nā frequenter cū moueant plurimū attrahunt, veluti & piscium caudas ob assiduū motum magis nutriri dicunt. Ne vero vlla te capiat admiratio, si hisce partibus adēptis reliqua

qua viperarum membra potentiorē antidotū efficiant, ex ingenita admista q̄; carnibus ipsarum E
iuvandi facultate, q̄n & aliorum aialium multas partes strenuum nō paucis morbis auxiliū praeſta
re ſciamus, vt Capita Muriū, q̄ combuſta & ex melle inuncta alopecias ſanant. Itē Milui Caput la
borantibus podagra ſuccurrit, ſi quis ipſum ſine pennis exiccet, & ex eius puluere quantū tribus
digitis continere pōt, cum aqua bibere velit. Sunt et̄ quēdam mēbrorum partes, q̄ ſepenumero
ſolae certos affectus ſanare queunt, vt ſiccātū Cameli Cerebrū, quod ex aceto bibitū epilepticos li
berat. Idē & Muſtela Cerebrum poteſt, vt Hirūdinis ſuſſuſiones tollere cū melle ſumptū, & Otiū
itidem melli cōmiſtum pueris in amiſſione dentiū pruriētibus ſummē cōferre. Siquis aut̄ Tauri
ni Cornu ramenta cū aqua deglutiat, ſanguinis eruptionem detinebit. Cremata vero Femorū Of
ſa ſanguinem ſupprimunt, & ſaepe hoc idem remediū ſolutā aluum quoq; continuit. Ceruini Cor
nu ſcobes exuſtae, vino q̄; admista poſtea ſuperimpoſita commotos dentes firmāt: Id quod & Bo
vis Talū facere dicunt: ſed hic cū melle ſumptus rotūdos lumbricos educit, & cū aceto mulſo ſple
nem liquefacit, ac vitilignes albas delet, & venerē nō nihil excitat. Caſtoris inſuper Teſticulū poti
conuulſiones ſanant. Amplius multa reperiunt̄ aialia, quorum, fel, pinguedo, medulla, pellis, lac,
ſanguis, & exuuiā vt ſerpentū, hoībus auxilio eſſe poſſunt: & quod plus eſt, quorundam timum
etiam cōtulīſſe nouimus. Nam Bubulus ſiccatus & cōbuſtus menſura trium cochlearium hydro- F
pici auxiliū praeſtat. Muriū aut̄, aceto cōmiſtum alopecijs medetur, ebibitū vero calculos veſice
cōminuit. Iam vero Anſerū Adeps oleo roſaceo coniunctū, inflammationes curat. Hygnae Fel ex
melle inunctū viſum acuit, & ſuſſuſiones diſcutit. Equi fluuiatilis Coriū vſtum, & ex aqua impo
ſitum, adenū abſceſſus diſpergit. Vipere Pellis attrita & alopecijs impoſita capillos mira quadam
celeritate reſtituit. Aſpidis Seneſcē ſi quis terat, & ex melle inūgat, maximē oīum videbit. Demū
magnus eſt harū rerum numerus, q̄ nunc recēſere in teſtū arbitror, ne ſermo longius q̄; par
ſit, prouehat, cum ea quae haecenus attulimus ad comprobandum quod propoſueramus ſufficiāt.

Illud certē cognitione tua dignū exiſtimo, tota multorum aialium corpora nobis prodeſſe, velut
Cancer "in fluminibus viuens, qui contuſus & impoſitus iacula et inſixos ſtipites extrahit. Cātha
ris quoq; ſimiliter attrita, ac cum radice vitis albae bibita, lumbricos eiſcit. Scorpius ſi aſſatus cū pa
ne comedat, calculos in veſica rumpit: Idem faciunt & Lūbrici terrae cū vino hauſti. Quod ſi quis
eos attritos ex vino mulſo capiat affectus regio morbo, q̄; primū purgatus liberabitur. Sēpenume
ro & cū ceroto roſaceo podagricis impoſiti eorum inflammationes leuarunt. Accipiter in vnguē
to ſulino decoctus, obtuſam oculorū aciem reuocat. Scarabeus aurium doloribus ſuccurrit, ſi oleū
in quo ſerbuerit, auribus inſtilletur. Galerita poſtq; toſta fuerit, comeſta coli dolores aufert cū om
G
nium admiratione. Atq; vt plus ē virtutem in corporibus aialium poſita mireris, illud inſuper
tibi commemorabo. Multa ſunt quae ſolū inſpecta vim ſuam oſtendunt, vt Stellio, quē ſi ſcorpio
nes intueantur immobiles & demum mortui redduntur. Amphilibaena ſerpens eſt ſimilis nauī
gio proras duas habenti, ipſi. n. natura propter abundantiam materiāe duo capita eſt elargita: hāc
amphilibaenā ſi pragnās mulier tranſcendat, foetū corrumpit & abortū facit. Quam obrē minimē
mirū eſſe debet, viperas quoq; partibus illis amputatis vim quandā auxiliatricē obtinere. Opinor
enim diligenter oſtendimus, interdū totum aial, interdū animalis partem etiam minimam, iuvare.

*Quomodo Quae noxia ſunt, interdum Prodeſſe queant: V namq; in compoſitis
medicinis Qualitatem ex omnibus reſultare.*

CAP. 10.

ILLud vero ſcrutandū potius eſſe duxi, quod pleriq; admirabile vī, quo pacto eadē animalia, q̄
nobis inimica ſunt & hoīem cito perimunt, ſi ipſorū morſibus imponantur, auxilio eſſe poſſint,
& ſola hoīem ab ea noxa ſeruare. Huic quēſtioni vetus q̄dam oratio reſpondet, virulētas beſtias,
ſi quidē attigerint humanū ſanguinem, qui dū mordent egrediū, necare. Sin non attigerint, ſed ſo
lum deuorentur, cōmorſos ſanare poſſe: id quod de Helenio a Gracis, Nico ab incolis appellato,
memoriāe proditum tradunt. Dacas. n. & Dalmatas inquiunt telorū cuſpides Helenio confricare, H
id q̄; hoc pacto vulneratorum ſanguini congregiens occidere poſſe: at ab eis manducatū innoxiiū
eſſe, nullum q̄; ex eo cibo nocumentū prouenire, quin & ceruos ab eis ſagittis confoſſos nullā co
medentibus læſionem inferre. Verū hāc reſpōſio ſatis mihi non eſſe videt̄ ad inuentionem illius
quod quærimus, cū experientia ſola nitaī, & tm̄ id, quod euenit, exponat. Nā medicos qui ſolū ex
perientiā ſequunt̄ non admittimus, qm̄ & ipſi, ſicut vulgares faciūt, quae vident inſpiciētes, rerum
euentum quidē mirant̄, ſed euentus cām ignorāt. Quorū alij quia ne rerū quidē originē diſcere
quærunt, ſed ipſam rōnem inuenire negligunt, tantū q̄; facta annotant, & ſibi ſatis eſſe ad medicadū
multoties viſa dicunt, eodē vt vides mō, quo vulgares admirant̄. Alij p̄dictis diligentiores, fatent̄
quidē oportere medicos hiſce de rebus recōditā magis q̄; vulgares habere cognitionē, ſed cum ip
ſam inuenire nequeant, inquirere ſuperuacaneum exiſtimant. Nos aut̄ qui maiorē illis curam arti
medicæ impendimus, & euenta ſolum vulgariū more inſpicere nolumus, experientiam nō reiſci
mus, ſed experiētiā rōnem quoties licet, coniungimus, atq; ita neceſſario rationalem perfectam q̄;
medicā artē habemus: nec vt ſolū inueniamus, quo pacto aliquid fiat inuētiōni operā damus, ſed
vt aliquid ad medēdū vtile ex inuēto diſcamus. Atq; ideo rōne hic quoq; certabimus aliquid inue
ſtigare, quod euetus cā eſſe poſſit: eſt. n. admirabile q̄; prompte celeriter q̄; hoc etiam, tanq̄; reſpō
dens

1. ad 6. t. 4. c.
1. ad 6. t. 4. c.

Adens & consonum quippiā, inquirēdi studio reperiat. Atq; quò magis fide dignus sermo noster habeat, à quibusdā alijs, q̄ quotidie fieri videmus, ostētionē moliemur, siue foris tm̄ imponant, siue p̄ os ē intus accipiant. Demorsis à crocodilo crocodilinū adipem summe contulisse nouimus obtrit̄is mēbris impositū. Muris aranei morsus, qui ēt ipsi interficiunt, ab eodē mure araneo confuso & imposito, sine dolore sanāt. Eodē mō & à vipera pcussi liberant, si quis illam atterat, & vulneri coniungat. Atq; hęc, nostra quidem sententiā, sicut dicebā, non absq; rōne contingunt. Nam cum tātam vim nō habeant vt illico necare possint, paulatim q̄ in profundum corporis virus serpat (id quod & in cataplasmatis euenire conspiciamus, cū moderatum vigorem in se habeant) sanare imposita non occidere queunt. Id vero quod in theriaca contingit, apertā magis rationem continet. Aflero. n. bestiolas istas lethiferas propterea cōmorsis à se hominibus auxilium pręstare, q̄a maiorem partē venenosę facultatis cum capitibus ipsarum amputamus, minorem aut reliquo corpori confusam conuenienti pręparatione obtundimus. Nā & earū truncum cadauer elixamus, & nō parū salis & anethi quātitatē aque cōmiscemus, non solum vt huiusmodi misturam suauiorē reddamus, sed vt viperarū carnes eliquemus, atq; ita vel parū vel nihil potius venenosum in ipsis relinquamus. Magnum vero momentum ad iuuandū viperis cōfert admistio. Nā tot talibus q̄ rebus adiunctis, quo nā pacto officere amplius valēt, soluta iā ipsorum noxia facultate? Ac vt oratio mea vera adhuc magis esse dignoscāt, cōsimilium rerum exēpla subiiciā. Cātharis si sola exhibeatur, velicam exulcerat: & cum inimicam nobis facultatem obtineat, hominem plerūq; necat: at si quibusdā alijs misceatur, auxilium eidē velicę prębet, & vrinā maximope prouocat. Papaueris succum p̄ se bibitum qui lethālē nesciat, est nemo: hic quibusdā alijs admistus, sic interdū laborantibus subuenit, vt nulla magis salubris extet medicina. Neq; n. raro phreneticorum amentia strenue curauit: aut vires impotentia dormiendū labefactatas, cū omnium admiratione somno reuocato solidauit. Phalangia redacta in puluerem & ē vino pota, illos quos momorderint, ab instātī morte liberāt: vt ex hoc maxime nostris verbis fidem adhibere queas. Nā si vinū solum phalangijs adiunctum ab imminente periculo securū facit, proculdubio theriaca ex tot tātis q̄ rebus cōposita, salutaris potius q̄ lethalis euadit. Illud. n. in plurium medicinarum iunctura tenere nos oportet, admistę cuius q̄ vim medicinę eandem immutatā q̄ non seruari, verū ex omnibus vnā quandā resultare. Nā cum quodq; simplex alteri virtutem suā cōicent, vna quędam alia temperatura virtus q̄ ex ipsis confurgit: id quod & in mulso fieri videmus, portione ē melle vino q̄ cōposita. Nā duo hęc postq̄ in vnum exactē coiuverint, neq; mel, admistum cū sit, mellis gustū retinet: Neq; vinū amplius vinum existens, vinū esse apparet, sed p̄ter virūq; aliud quiddā ex vtriusq; temperatum, ipsum inq̄ mulsum. Idem mihi cogita fieri cū in oībus alijs compositis medicamētis, tum pręcipue in ipsa theriaca, vt nō amplius vna cuiusq; simplicis medicinę facultas, qualitas ve permaneat, verū singulis quibus q̄ congregientibus & naturalem quandam vnionem subeuntibus, quędam alia diuersa q̄ ex omnium confusione natura procreetur.

Digressio aduersus Asclepiadem & Epicurum, qui Negabant Alterationem:

Opera Naturę in Atomos & moles referebant.

CAP. II.

Senim ex atomis & vacuo, sicut Epicurus & Democritus asserunt, omnia constitissent: vel vt Asclepiades medicus inquit, molibus & meatibus, nā homo iste eādē quā illi de rerum natura sententiā cūm retineat, noībus tm̄ mutatis atomos moles, vacuum meatus appellat: incommutabiles iure medicinę forent, eo quod neq; à suis qualitatibus dimoueri neq; spoliari possent. Cū aut vera non sit hęc sententiā, sicut ostendemus: sed (vt diximus) oīa mutantur, alterētur, & temperaturā à se inuicem accipiant: necesse est, vt temperamēto per omnia cōmissa diffuso, id quod est validius vincat q̄ imbecilliora sunt. Et idcirco nos cum vsus postulat artificiosis mistiōibus medicaminum qualitates immutamus: quod fieri non posset, si parua quędā impassibilia incommutabilia q̄ rerum corpuscula forent. Quāobrē ego sæpe miratus sum, quo pacto vidētes tam celeres in vniuerso mutationes fieri, tot q̄ in temperaturis variationes euenire, sustineant tali rerum principia defendere, & in primis is de quo paulo ante mētionem feci, medicus Asclepiades, cū quo sermonē potius instituo, qm̄ manifestas ēt corporis mutationes variationes q̄ non admittit. Quid. n. ad hęc respōdere poterūt, qm̄ si solum digitum in aquā frigidā ponimus, illico totius corporis immutatio fit: & qm̄ si vētus variat, corpora nostra mutant? Noui ego ex sodalibus meis quendam, qui ēt dum in lecto cubaret, ex alteratione circa caput facta, quis ventus spiraret agnoscebat: nā quoties grauari sibi caput sentiebat, statim dignoscebat flantem ventum austrum esse. Mulier pregnās si tonitruū audisset, vel formidolosum quidpiā vidisset, foetum eiiciebat. Interdū ēt cū velociter succurrere volumus, & celerem auxiliij sensum ægris inferre, subitā corporum mutationē fieri videmus. Vnde in quibusdā valde deficientibus vir admirabilis Hippocrates || aliquā animi iritationem ad moueri consulit, vt conatus fortitudine, defectus imbecillitatem sanemus: sepe numero quoq; vel modicus cibus exhibitus confestim ipsos recreauit, & eorum virtutem roborauit: arbitror corpore velociter in melius cōmutato, non aut quia moles nihil patiantur, atq; ideo talium alterationem sensum nobis exhibere queāt. Quis. n. tam repente moles cōponere valeat, aut quis ex inalterabilibus cōpositus molibus occurrentia tam celeriter sentire? Nā transpo-

1. Epid. sec. 2.
circa finem. Et
6. Epid. sec. 7.
t. 9. 3. 190. e

siturum

sitarum molium noua cōpositio figuram tm̄ variare, sed alterare & qualitatem aliā ex alia produ- E
cere, nō pōt. Propterea q̄ mihi v̄r Asclepiades nō solū id quod in medicinis ēuenit, negare, quō
suum dogma sequat̄, verum ēt naturam quā in nobis cuncta dispensat, nihil esse putare, cum velit
singula q̄ sūt ē molium cōplicatione iunctura q̄ nasci. Quocirca magna me subit admiratio, cū
ipsum video non videntem opera naturæ tam admiranda, & in primis artem quā adhibet in pri-
ma hominis origine, vt fētū in vteri cōcauitate formet: vt formatum ingeniose nutriet: quātis, &
quā mollibus vīculis eundem intus detineat, donec opportunum exeundi tēpus adueniat: q̄ di-
uino artificio, quam q̄ euidentī similitudine, parētum imaginē in genitis effingat. Qua in re vel
maximo cū dedecore Asclepiadis de molibus positio redarguitur, cū infantes nō parentibus mo-
do sed progenitoribus ēt, similes nascan̄. Mihi vero quedam vetus historia exposuit, hoīem opu-
lentum quidem, sed deformem extitisse, qui cū affectaret pulchrū sibi filium procreare, formosum
in ampla tabula puerum depinxit. Inde vxori cōgrediens præcepit, vt ē regione positā imaginē
diligenter consideraret: illa vero attente respiciens, & vt sic dicā, totū animū illuc conijciens (erat
enim valde pulchra ea figura) puerum peperit non patri, sed picturæ similē, oculis puto, non moli-
bus, picturæ exemplum naturæ tradentibus. Ac qm̄ ob moles vir iste talibus naturæ mysterijs nō
inītiatus esse sustinet, & ob videndi incertitudinē debilitatem q̄, non sinīt discipulos suos tā mira F
bilibus operibus naturę fidē pręstare, ab opertis & abditis ad aperta & manifesta ipsum traduce-
re volo. Quis. n. aranei structas ad capturā insidias cernens, & telam ab eo fallentibus adeo tenui-
bus q̄ filis confectam, vt aliqui dixerint hoīes ab araneis artē texendi primum accepisse, de natu-
ra dubitet? Quē vero non suadeat confiteri naturā esse rem admirabilem, cū videat illud quod vr-
sa facit? Parit quidem vrsa, sicut cetera aīalia faciunt, sed carnem parit informem indistinctā q̄,
& nullam prorsus figuram hñtem, quam tm̄ naturali quodam artificio breui distinguit: nā mater
linguam tanq̄ manum, tam diu admouet quoad in fœtu animalis figuram absoluat. Sed finem
faciam dicendi aduersus istos homines: In disceptationibus enim consueui, vt contumacem equū
freno, sic altercantem orationem moderatione acriter coercere.

Quod diligenter Exploranda sint Singula quęq; Theriacam ingredientia: & quod

Andromachi Descriptio cæteris Anteferenda sit.

CAP. 12.

Monstrauimus, opinor, hæcenus adeo manifeste, vt amplius tibi mirandum esse non possit,
quō serpentes iīdem alio & alio modo præparati, diuerlis q̄ medicinis admixti, prodesse &
obesse valeant. Incipiemus deinceps ab his antidotum conficere, qm̄ & quam parandæ theriacæ
adhibemus artem, exigua non sit. Nā & fraus qua sæpe venatores in viperis vtuntur, & imperitia G
medicinarum qua plerunq; cōpositores laborāt, antidotum multoties inutīlē reddiderunt. Multi
siquidem artem capiendi viperas ostentare volunt, n̄ p̄sertim qui se remedia quedam ad hæc faciē-
tia habere iactitant: quod tm̄ mentiuntur, nā qui haberet nunq̄ inueni. Sed vbi viperas malitiose
concinnarint, spectantibus imponunt. Non. n. viperas cōuenienti tpe capiunt, verum multo post
q̄ ē latebris exierint, qm̄ non amplius vigent: deinde cū eas ceperint, ipsas ante sibi cōsuetas effi-
ciunt: demum nō v̄satis alimentis eas pascunt, sed carnibus, quas cum assidue mordere cogant,
venenum quod ore cōtinent, eiīciant necesse est. Quidā vero & ossas quasdam illis exhibent, qui-
bus dentium foramina obstruāt, vt etiā hoc pacto viperarum morsus imbecilles euadāt: Id quod
spectatores in admirationem magnā adducit, ignaros artis quibus ad fraudem ornandā vtuntur.

Rursus quoq; (sicuti dicebam) & medicinarū quę theriacę imponunt non parua est inscitia. De
ijs dico quę præciosissima immittunt: vt puta & casia, cinnamomi q̄, non modica est differentia,
q̄ plurimos fallere cōsueuit. Nā & adulteratum cinnamomum licet vero sit simile, gustu tm̄ & ol-
factu multo deterius eē deprehendit: atq; à xylocinnamomo differt, q̄ ligneū hoc plus sit, durio-
res q̄ ramusculos habeat, nec tam bene redoleat. Nā verū cinnamomū illud quod in mōtibus na-
scit̄, nec subtile nec longū cum sit, colorem habet ad modicā rubedinē magis tendentē: reliquum H
aut aliquātulū nigricat, & velut quasdam fibras habet. Aliud reperitur cinnamomū planē albicās,
fragile, non durum, nec magnam radicem habens. Est & aliud russæ casia simile, redolēs, & leue.
Oībus tm̄ pręstat id, quod ab incolis Mosyllum appellatur: colorem habet cinereū, virgas paruas
& subtiles, ramos densos, odorem vehementer redolentem. Hoc nos præcipue seligere consueui-
mus, cum & odoratum suauissimum, & gustatū acre & mordax valde appareat, māsū q̄ rutam
imitari videat̄: lene est ēt, & frangi facīlē potest. Casia quoq; & ipsa nisi quis in iudicādo peritus
existat, fallere se penumero consueuit. Nam extat quedā falsa casia, quę quidem similis verę plu-
rimum est, sed tā bene non olet, & medullæ corticē adhærentem habet. In summa vero quę cēlēt
optima, modice rubet, rosam spirat, gustata suauis euadit, concaua est, vinum refert, & valde redo-
let. Ziger ab incolis hæc nominatur. Verum par est te nō ignorare fraudes quas in longo pipere
struunt. Quidam. n. ipsum confingunt vero piperi longitudine æquale, & imposito pyretri vel
napyos aliquantulo, quia sensum hoc pacto mordet, gustantē fallunt. Verū qui circa hæc peritus
fuerit, & suaue acutū q̄ gustu dijudicare nouerit, præsertim si pediculū ipsi adhærentem accuratius
inspiciat, verū piper inuenit, & ab istis decipi non potest. Cū vero magna sit adhibēda in ceteris
etiā oībus diligentia, sicut in antedictis narraui, quę hucusq; diximus satis esse tibi ad commen-
tationem

Atationem quauis existimē, ne liber nimis in longum protrahat. Consulo tñ vt cū singulas medicinas diligenter exploraueris, tum deniq; componas antidotum: nā vnus alicuius improbitas sepe reliqua omnia corrumpit. Est et ipsius antidoti descriptio, ne hoc quoq; nescias, a medicis varie tradita. Andromachus enim, de quo paulo ante mentionem feci, diligēs in cōmīscēdis medicinis cū foret, hac descriptione theriacā cōponebat. Pastillorum scillinorū 3 xlvij, pastillorū viperinorū 3 xxiiij, piperis longi 3 xxiiij, succi papaueris 3 xxiiij, magmatis hedychroi 3 xxiij: rotularum mīccarum, iridis illyricæ, radices dulcis, seminis napi syluestris, scordij, liquoris balsami, cinnamomi, agarici, singulorum 3 xij: myrrhæ, costi, croci, calicæ, nardi, florum iunci rotūdi odorati, thuris, piperis nigri, dictami, marubij, rhei, stœcadis, petroselinī macedonici, calaminthæ, terebinthinæ, zingiberis, radicū quinq;folij, singulorum 3 vi: polij, chamæpityos, styracis, racemorum amomi, mci, nardi gallicæ, ligilli lemnij, phu pontici, chamædryos creticæ, foliorum malabathri, chalcitis assæ, gentianæ, anili, succi hypocistidis, fructus balsami, gummi, seminū sceniculi, cardamomi, tefeleos, acaciæ, thlaspeos, hyperici, sagapeni, ameos, singulorum 3 iij: castorij, aristolochiæ tenuis, seminū dauci, bituminis iudaici, succi panacis, centaury tenuis, chalbanī, singulorum 3 ij: mellis libræ decem, vini falerni quantum sufficere videatur. Xenocrates autem & ipse, qui nō exiguum studiū hisce rebus adhibuit, cætera quidem sicut Andromachus admiscet in compositione theriacæ, tantum quatuor sagapeni drachmas nō duas imponit. Damocrates quoq; medicus optimus & ipse cum esset, integrum librum versibus accurate conscripsit de compositione antidotorum: in quo theriacam describens, res quidem easdem imponit, sed in pondere discrepat. Nam quedam quorum illi quatuor drachmas accipiunt, hic duas sumit: & rursus quedam ex quibus illi duas imponunt, ipse quatuor immitit. Magnus etiam, qui nra tēpestate præses medicorū fuit, reliqua quidem omnia, sicut illi consueuerant, seruat: in cinnamomo solum discordat: duplum. n. cinnamomi theriacæ cōmiscet. Ita & de chalcitide, & de sagapeno ab Andromacho dissentit: nā, vt Xenocrates, duas drachmas iniicit, cum tñ Andromachus quatuor imponat. In sagapeno autē & a Damocrate euariat: Damocrates. n. quatuor drachmas adhibet, Magnus duas. Vīno præterea Magnus mensuram ascribit: vult. n. sextarios duos ipsam implere, cum alij sicuti par est quauis mensura, quantum satis videatur, vtantur. Demetrius etiam ætatenra medicus, & ipse medicis præsidens, omnibus in rebus Andromachum secutus antidotum componebat, tñ in pondere pastillorum scillinorum euariabat & ab illo & a cæteris. Nam illi xlvij drachmas cum immitterent, ipse xlvj tñ admiscebat. Tanta cū extet discordia inter theriacæ descriptiones, nos Andromachi traditionem, vt optimam probamus: atq; ita theriacā in vsum Imperatorum componimus. Eius aut compositio hoc absoluitur modo, nam verbis compositionis modum cōplecti, valde vtile tibi fore iudico, vt si quando theriacam facere volueris & medicis careas, ingeniosus cū sis, per te ipsum conficere quā optimam valeas, magistrum hunc librum habens.

Quo Pacto Componendi sint Pastilli Hedychroi, Scillini, & Viperini.

CAP. 13.

Cæterum ante cōmīstionē oportet vt Hedychroi Magmatis, quod imponitur antidoto, descriptionem agnoscas: cuius optima compositio est, quā Magnus tradit: ea est huiusmodi. Radicū corticis alphasathi, calami aromatici, florū iunci rotūdi odorati, phu, costi, asari, ligni balsami, succi balsami, casie, singulorum 3 vi, cinnamomi 3 xxiiij, amomi tantundem, amaraci 3 xx, mari 3 xx, nardi indicæ 3 xvi, folij 3 vi myrrhæ 3 xxiiij, mastiches 3 vi, croci 3 xix: vīno falerno simul hæc admiscere conuenit, & in rotulas redigere, q̄ dū facimus manus & ferramēta inungemus liquore balsami: postremo digestum in rotulas medicamentum in vmbra siccandū est. Non aliter & Scilliticos Pastillos conficiemus hoc modo. Recentem scillam non admodū magnā accipere oportet, & eam non luto sicut quidam faciunt inuoluere (sordidū. n. id mihi esse vī) sed pulte teneriori: in qua & assatur facile, & ab ea quiddam dum assatur, accipit. Vbi ipsam probe coxeris, vel in furno quod vocant: vel sub cacabis in quibus panes assantur, quo equaliter assetur: sume interiores partes scille, quæ tenerrimæ fuerint: & eis accurate dissolutis admisce farine erui optime recentissimæ q; tantundem, sicut Damocrates censet. Nam & Magnus qui dimidium iubet, parū mihi conijcere videt: et Andromachus, qui duas partes præcipit, non dum satis imponere, cum æqualē erui portionē scilla regrat. Sic itaq; scilla & farina cōmīstis, modicas inde faciemus rotulas, quas in vmbra siccatas vsui referuabimus. His ita peractis, oportet tot accipere Viperas, quot totius antidoti mō sufficiant, non quouis tpe captas, sed potissimū circa veris initia, qñ non amplius in subterraneis cauernis degunt, sed inde progressæ sub diuo diuersantur, nec vltius tam noxiū venenum habent: nam donec in subterraneis locis habitant cū nullatenus distilentur, pestilentem noxiā q; magis intra se qualitatem colligunt. Quo tpe serpentes et, senectam quam vocant, sibi obducere consueuerunt, quæ crassissimus quidam lentor est ex diuturna latitādī mora cōtractus: quæ res potius tps longitudine, quā senescentis ætatis vitio, prouenit. Quam ob rem non oportet statim egresas viperas surripere, verum eas aliquod tps dimittere, vt & libero fruantur aere, & cibis nutriantur consuets. Comedunt aut huiusmodi bestiolæ, & certas herbas, & quedam animalia, & alia non nulla sibi consueta, sicut buprestem, cantharidem, & appellatam pinus erucam. Hæc. n. viperis conuenientia sunt alimēta. Sit autem Vipera fulua parumper, & ad motū valde

prona,

prona, quæ collum præcipue attollat, & oculos aliquantulum rubros habeat, atq; audacter & tor- E
uè, conspiciat. Sit præterea capite lato, ventre propenso, ac toto corpore sinuosa: meatus excremen-
tis destinatus magis ad extremam caudam vergat, quam non conuolutam sed modice flexam po-
tius esse conuenit: gressu deniq; incedat quieto: Nam hac in re solum à fœmina mas discrepat, &
dentibus caninis, quorum plures fœminis, duos maribus, Nicander his versibus ascribit.

Sunt gemini dentes maribus, sua signa, canini

Fundentes virus: habet hos sed fœmina plures.

Viperis igitur hoc tpe captis, pro quatuor digitorum mensura caput primum caudam q; detrunc-
cabis. Quod dum facis, vt diligenter inspicias moneo, nunquid post abscissionem detruncatæ vipe-
ræ sine sanguine, sine motu, ac prorsus sine vita, statim consistant: nam tales si inueneris antidoto
componendæ inutiles arbitrator. Quod si amputatis extremis, videas in viperis motum aliquem
supereffe, & vitam per aliquod spatium prorogari posse, ipsas vt optimas cõficiendæ theriacæ du-
cito: quippe cum ex eo non imbecillem, sed validā, habere vim dignoscantur. Inde postq; bestias
obtruncaueris, pellē è toto corpore diligenter auferes, pinguedinem q; vt inutilem eximes, & in-
terna omnia, vt quæ excrementorum receptacula sint. His peractis, cõijce viperas in aliquod vas
testaceum quàm pulcherrime confectum, vel lebetem bene abstersum, atq; accensis carbonibus F
impositum vt sine fumo coquantur. Coquantur autem in aqua fontana, cui recentem salem inji-
cies, & anethi nō sicci ramusculos quot sint satis. Deinde cum bene fuerint carnes elixæ, quod erit
quando spinas à carne separari videbis, tūc lebetem ab igne remoue, & accurate spinas à carnibus
seiunge: quas in mortarium coniectas contundes, adhibito panis quàm purissimi & sincerissimi
filigine compositi, quantum ad compinsendum satis esse iudicabis, sicut etiā Andromachus vult.
Nam Magnus & Damocrates, qui determinant panis portionem, admiscunt æqualem carnibus
panem, & sic vtraq; commiscunt. Postremo iuris quantum sufficiat infunde, & inde conueniētes
pastillos cõfice: quod dum facis, manus pauco intinges opobalsamo. Hos pastillos in vmbra sic-
catis ad totius antidoti structuram seruabis.

Theriace Compositio, Repositio, Aetas, Probatio, Dosis.

CAP. 14.

Pastillis absolutis, deinceps è reliquis quæcunq; & contundenda & cribranda sunt per incer-
niculum mittes, angustis quantum fieri potest foraminibus. Nam quod valde minutum est,
mihi plurimum conducere videtur, vt auxilium præstet idcirco, quia corpori plus adhæreat: quæ
cunq; vero macerare & dissoluere conuenit, ea tu vino molliēs & læuigabis. Vinum autē illud sit
optimum, quale falernum dulce est, quod faustinianum appellant, non autē acre & actum nomi- G
natum ab oibus. Postea cum liquidis sicca admiscueris, mellis quātū satis esse videatur, infundes.
Satis autē videntur libræ decem mellis conuenienter decocti, sicuti authorū literæ præcipiunt, quò
si quid inest flatuosum aut cereum, feruendo seponatur. Oportet autē mel esse Hymetium, nā apes
in eo colle Atticæ quia thymum pascuntur, mel optimum conficiunt. Separatim etiam relinā &
chalbanum prius liquefacies, & inde reliquis in mortarium cõiectis superinfundes. Atq; vbi de-
inde coniunxeris omnia, diligenter q; commiscueris, denuo manibus & ferramentis inunctis li-
quore balsami, antidotum è mortario in vas aliquod vitreum aut argenteum transferes: quod tñ
non replebis ad summum vsq; sed spatium aliquod relinques, quo respirare queat. Immo frequē
ter operculum dimouere conuenit, vt antidotus magis diffilari possit, & celerius utilis euadat: nā
tpe non modico eget, si tñ concoqui debeat, quantū vsus requirit. Concoquit autē vt plurimum
intra annos duodecim: Sed qui valentiori potētiori q; vti voluerunt, ipsam post quintū & septi-
mum exhibuerunt, præsertim aduersus venenatorum ictus, canum rabientium morsus, & noxia
herbarum venena: validis siquidē noxis succurrere cum vellent, potentioribus theriacæ viribus
eguerunt. Potens est autē in his ad annos vsq; triginta: Alijs autē morbis in quibus tanta non inest
efficacia lædendi, sexagesimo etiā subuenit: nam vltra hoc spatium debilis admodū & imbecillis H
euadit. Multi itaq; vires antidoti dignoscere cū volunt, primū alicui purgantem aliquā medici-
nā porrigunt, deinde theriaca paulo post exhibita, iudiciū de ipsa sumunt. Nā si valida vigēs q;
adhuc fuerit, nullatenus ventrē purgari sinit, nempe deuicta soluentis medicinæ facultate ab an-
tidoti potentia: sin autem alius ita deijcitur, vt si theriacam non sumpsisset, planum est antido-
tū adeo viribus defecisse, & vt ita dixerim, consenuisse, vt ne purgātis quidem medicinæ vim sup-
primere queat. Non damus autem oibus eādem quantitatem antidoti, sicut nec liquoris quo ip-
sam dissoluimus. Nam in antedictis ad magnitudinem nucis auellanae, theriacā ex tribus vini cya-
this propinare solemus: In alijs autē morbis & antidoto & liquore differēter vtimur. Ad affectuū
enim diuersitatem respiciētes, & theriacæ pondus metimur, & liquoris conuenientiā iudicamus,
quando non solum reptilium moribus, & venenorum noxis, auxilietur hæc antidotus, sed in ma-
ximis etiam alijs ægritudinibus à nobis experta salutaris medicina reperta sit.

Quot & Quantis Morbis auxilietur Theriaca.

CAP. 15.

Itaq; ipsam Andromachus in suprapositis carminibus opinor idcirco tranqllā appellauit, quia
corporibus tanq; aliqua morborū tempestate vexatis, vt tranquillitatē, sanitatem inducit. Diu
turnos. n. capitis dolores & vertigines sanat. Auriū tarditatē, & oculorū hebetudinem curat. In-
terdum

A. libidem g

A. l. de med
i. t. 2. cap. 4. f
585. f

Aterdum genitale membrum flaccescens, atq; vietum attollit. Sæpe furētium deliria generose sedauit adductio somno, p quē ēt animi turbulentia, pplexasq; cogitationes sedauit. Comitialibus inuasionibus acriter resistit: nā & nimia capitis humiditatem absorbet, & aduenienti vento vias obstruit. Subuenit quoq; cū difficultate spirantibus, qñ pituita quēdā crassa meatibus pulmonis insidens, hoīem inspirare prohibet: facile. n. ipsam & desiccet, & ad expulsionē preparat, cum & compacta attenuet, & tenacia diuidat. Illis ēt qui sanguinem expuunt, valde prodest, si quis solidaginē herbam elixet, & in eius decocto theriacā soluat & bibat. Malos ēt ventriculi affectus plerunq; curare consuevit, quem & appetitus deiectionē patientem, nec quicq; assumere valentem, ad cibi solitam appetentiā reduxit. Crescit interdum cibi desiderium supra modum ex quodam acriori mordaci q; humore ventriculo insistenti, hoc quoq; valenter dissipat: Item eam famē, quā in intestinis lumbrici morantes excitant: eos. n. theriaca potenter strangulat, atq; ita ventriculum ab insatiabili comestione desiderio liberat. Mirabiliter ēt ex intestinis eijcit maximū & latum illum vermē, qui susceptum oē nutrimētum deuorat, atq; ideo reliquum corpus extenuat. Hepatis insuper & lienis morbos frequēter curat, illarū partium obstructionibus adaperitis. Morbum quoq; regium ex aliquo iecinoris vitio collectum, facile sanat, bilē deponēs ac veluti manu detergens, cū efficiat vt hepar ipsam à sanguine prorsus distinguat. Lienē indurātū qñq; liquefacit, paulatim consumēs sordes & superuacua materiam, quæ in eo continet. Renū calculos frangit, & oē quod in renibus est terreum ac sordidū, facile expurgat. Vrinā ē vesica vix egredientem producit, atq; eius vlcera sæpe curauit. Tardam ventris concoctionem & imbecillitatem sanat, ipsum calefaciēdo & vim eius corroborando. Quin & intestinorum exulcerationes, difficultates, & lubricitates, iuuare consuevit: ac insuper ijs prodest qui vel in voluuli dolores inciderint, vel diuturna coli vexatione laborarint, præcipue qñ inflammatione caruerint intestina: nam acres in eis humores theriaca absumit, & eorum flatus in vaporem resoluit. Succurrit etiam plerunq; cholerae fluxu laborantibus, partim humores densando, partim sistendo. Illud vero quod in cardiacis sæpenumero conspicitur, maximum est opus theriacæ. Nam cū multis & cōtinuis sudoribus corpus diffluat, atq; ita vires dilabatur, vt nec exhibitum vinū sæpenumero succurrere morbo valeat, antidotus ebibita & sudorē cōprimit, & concidentē ægri virtutē veluti suscitāt, atq; ex infirma valentem reddit. Educit eadem in mulieribus menstruum sanguinē, & suppressas vteri sedis ue sanguinis excretiones frequenter aperit: ac quod admirabilius est, immoderatas eiusdem sanguinis eiectiones detinet. Recorderis. n. dixisse nos in præcedentibus antidoti huius virtutem multiplicem ac variā esse: atq; ideo quædam egredi facit cum ea attenuet atq; diffundat, quædam ob imbecillitatem virtutis immodice prodeūna suppressit, corporum vires instaurās. Pedum insuper & aliorum oīum articulorum doloribus ab influxione excitatis tunc præcipue cōfert, qñ tēpus incrementi discesserit, & status vigor adueniat. Oportet aut prius dolores mitigare, foris imponendo quippiā, quod ipsos lenire queat, inde theriacā bibere, quo fluxionem cohibeat: nā & quæ iā illata fuerint absumit, & q̄ mox inferrentur auertit. Maxime vero prodest qñ quis ipsam sanus adhuc frequenter accipit, idcirco quia superfluitates humorum consumit, & totius corporis temperamentum immutat. Nam alia medicamenta quæcunq; podagrici bibunt in remedium dolorum, fluxionem quidē ad pedes ferri prohibent, sed cum superfluum humorem non consumant, aliq̄ aliam maiore ægritudinem excitant. Vagat enim toto corpore fluxio illa, & pulmo qui ppter respirationis offm cōtinue mouet, rarus cū sit, facile huc & illuc vagum humore ad se trahit, atq; sic hoīem suffocat, quæadmodū ego in multis vera experientia cognoui. Quo circa ne prorsus tales medicinas ebibāt ægri, dehortor: suadeo q; summo opere, vt theriaca velint in talibus morbis vti, qm̄ & superfluum humore exiccat, et alium colligi nō permittit: vnde plurimi in principio ex hac bibētes, prorsus à podagra liberati sunt. Nec, ar bitror, alia rōne hydropicis theriaca tantopere contulit, q̄ q̄ humorem in ipsis consumit, & refrigere

Dratum in eis naturalem calorē accendit: maxime vero anafarcas, & leucophlegmatias quos appellant, potēter adiuuat: in vniuersum. n. corpus se inserit, & malā inde humiditatem exprimit. Quā ob rē mali habitus bona est medicina, vt q̄ corporis habitū in melius cōmutet, & quæ superuacua sunt in vapores eijciat, ac naturā prōpte suas actiones exercere faciat, quo mō sæpe ēt laborantibus elephantiali, remedium præstitit. Nā cum multus humor corruptus toto corpore dispersus suis viribus illius tēperaturā perdat, superueniens antidotus morbum profligat, partim humoris fluxionē sistendo, partim ab eo sanguinē corrumpi prohibendo. Neruorum aut vel cōtractiones, vel distensionēs, non aliter multoties curauit, neruos calefaciens & eorum tensiones remittens, q̄ membrorum resolutiones sæpenumero sanauit: qm̄ naturali excitato calore, & spiritus in pristinum statum reduxit, & mēbris solitas motiones restituit. Verū vt libuerit hæc quisq; estimet: Illud certe summa est admiratione psequendū, q̄ theriacā non mō corporis affectus sanare videmus, sed etiā animi passionibus ipsum qñq; grauiter infestantibus opitulari cōspicimus: Veluti cū excitatas melancholia graues curas multoties sumpta ex animo pellit, perinde ac si ē splene ac reliquis membris atrā bilem exurgeret: Id quod ēt in serpentum venenis euenit. Qua de causa quartanis ēt febribus optime conuenit: cū. n. ea febris ab atrā bili cōsurgat, facile sumpta theriaca discedit, mō quis ipsa seruatis medicæ artis pceptis vtatur. Ego nanq; multos quartanalaborantes, hac vsus artis semina,

DE THERIACA

ta, facile à morbo vindicauit. Primum. n. cum cœnassent, vt euomerēt, effeci: deinde secuta die suc E cum absynthij bibendum tradidi, quo bilem contemperarem ac veluti edulcorarē: postremo duabus horis ante inuasionem antidotum exhibui: atq; ita cum omnium admiratione voti compos euasi, cum celeriter is qui theriacam sumpserat liber ab inuasionem maneret.

Methodicorum Reprehensio, Qui morborum causas noscere superuacuum arbitrantur:

Et inde reliqua Theriacæ Remedia.

CAP. 16.

A Quæ formidinē quoq; morborum oīum pessimum hæc antidotus plerunq; tollere consueuit: strenue q; aduersus tot malorum concursum dimicare, quibus non solū corpus exiccat, & interdū cōtrahitur, febre q; intus aspera comburit, sed ēt animus delirat, et difficillimo symptomate molestat. Aquam. n. expauescunt, & q̄uis ob nimiam siccitatem ipsam vehemēter affectent, tñ eam bibere reformidant, quia corrupto mētis iudicio quid ipsis prodesse possit, non intelligūt. Sic q; remediū vitando, & aquā metuendo, miserabili morte pereūt. Quā in re methodicos admiror magnopere, qui causarum notitiā curandis morbis inutilem arbitrant: nescio. n. quo pacto tales egrotos sanare possint, cum vniformis & similis sit morsus à cane rabido & non rabido illatus. Quem. n. curationis modum ipsis ostendit cōmorsus locus, nullam ex vulnere distinctionem habens, si internā mordētis causam scrutari nolunt? Nēpe methodicorū oculis aspici non valet, F ab rationali aut medico nō nili sola cogitatione diligēti q; discursu inueniri. Quocirca, si quis miser, in methodici tanq̄ in alterius beluæ manus incidat, proculdubio moriet, ex consecutione dogmatis ab eo interfectus, qm̄ vt ē secta non recedant, inuestigare causas nolunt. At bene fortunatus ille, qui rationalē medicum accesserit, neq; tam malis symptomatis facile capiet, neq; ob artem rationalis medici mortē incurret. Statim. n. rationalis medicus, susceptum egrum diligēter interrogabit, qualis nam foret is canis à quo cōmorsus est. Ac si audiet q; macilentus & gracili corpore fuit, & oculos rubricatos, caudā demissam, spumā ex ore fluētem habuit: disceat q; vt linguā exertā gestaret quæ tanq; bile infecta crocea videret, vt obuios quosq; incurreret, vt interdum sine causa procurreret & deinceps subito conlisteret, vt q; furiosa quadā indignatione improuissos aggredere: si inq; talia comperiet, statim intelliget canem illum rabidum fuisse. Curabit q; vulnus illud non simpliciter, sicut methodici solent, sed ipsum maius illico faciet, carnem circūquaq; auferens, & ad rotunditatem redigens, ne facile cicatricem obducatur, sed apertū longo tpe perscueret, saltem quadraginta diebus, quo rabidi canis venenum egredi queat. Ferramentis itaq; valde ignitis soliti sumus locū inurere, & inde alia medicamenta adinouere, quæ attrahentem vim habeant, nec intra carnem venenū manere sinant. Equidem olim mecū ipse aliquod remediū excogitans, hæc G ipsam theriacam oleo rosaceo mollitā, linamentis imposui, ac veluti medicamen aliquod vulnerarium foret vlceri superimposui, vt tanq; cucurbitula venenum ē profundo traheret & exurgeret. Deniq; theriaca perinde atq; pœonia aliqua medicīna & foris imposita, & intus assumpta, præsentaneum auxilium cōmorsis à cane rabido præstat. Deprehēsa q; est mihi vel sola in pestilentī cōstitutione languentibus posse succurrere, cū nullum aliud præsidium tā magno malo tunc ita resistere valeat: nec immerito, cū pestis ipsa, ceu fera quædā venenata, nō paucos aliquot miserē perdat, verū totas ciuitates depascat. Immutat enim aerē malo quodā modo, vt hoīes interficiat, qui cum non respirare nō possint, cōtagium miseri euadere nequeūt. Attrahunt. n. in se ipsos aerem illum infectum, tanq̄ præsentaneū aliquod venenū. Quo circa summis laudibus prosequor admiradum Hippocratem, || qui pestem illā ex Æthiopia ad Græcos veniētem, non alio præsidio reppulit quā aerem purum faciēdo, ne ab hominibus (qualis tunc erat) infectus hauriret. Precepit itaq; vt per totā ciuitatem ignis accenderet, qui non solum ē simplici materia constaret, sed bene olentes coronas & flores haberet: talia siquidem ignibus alimenta subministrari consuluit, & vt vnguenta q; pinguiissima infunderent, & id genus alia bonum odorem fundētia, vt hoc pacto ciues aerem purum inspirantes, ab imminente lue tuti forent. Ad istū modū arbitror & theriacā, tanq; ignis qui- H dam purificans & ipsa esset, illos quidem, qui sani adhuc ipsam biberint, non permittere, vt pestilentia prorsus capiant: illos aut qui iam egrotēt, sanare posse, cum aeris inspirati malignitatē commutando, tum corporis temperaturā corrumpi non sinendo. Quā ob rem cōsulo tibi Piso, vt partim ob has tā repentinas aeris cōmutationes, partim ob alias nocentium rerum causas, frequenter etiā sanus, theriacam sumas, vt exterius occurrentibus noxis corpus tuum resistat: & siq̄n passum aliquid fuerit, ad sanitatem facile reducat. Nā theriaca, optimam quandā temperaturā corporibus procurat, & in eis bonam valetudinem conseruat. Absumit. n. humores superfluos, calefacit membra refrigerata, corroborat naturalē virtutē vt debitas actiones exercere queat. Nam qñ fortis natura fuerit, tunc & venter expedite cibos cōcoquit, & venæ sanguinem facile produciunt, & iecur prompte bilem secernit: atq; ita defecatum sanguinem cor suscipiēs, ipsum deinceps vniuerso corpori iam nutriendo idoneū submittit. Excrementa quoq; moderate foras eadem expellit, & q̄ corpori superflua sunt, mēbrorum oīum respiratione salubriter excernit. Maxime verò cōsulerem, vt antidotē assumeres, cū frigente p hyemē aere, iter aliquod suscipis. Erit. n. tanq; optimum visceribus indumentū, multū eis calorē præbere cū possit. Cōpertū adhuc nobis est theriacā & ad animi prudentiā, & ad ingenij acumen, haud parū cōducere, qñquidē & sensus actiones suas fortiter obire

In vita Hippo. ex Sorano. Et in decreto Atheniensi, quod post ei⁹ epistolas habetur.

A obire faciat, & mentem à vaporibus corporis liberando solertem magis reddat. Verum ut summam laudes huius antidoti complectar, totum corpus ita disponit, ut ab ulla re noxia non corrumpatur. Hanc autem resistentiam procreat tam varia & efficax tot medicinarum compositio, & præsertim quæ in ipsam ingrediuntur viperæ. Nam & Mithridatem illum bellatorem magnū ferunt non assumpta theriaca, quæ non dum erat, sed alia quapiam multiformi antidoto mithridatica de illius nomine dicta, non potuisse sumpto veneno mori, quoniam sic illius membra temperauerat, ut ab re noxia pati non posset. Hoc autem contigit quo tempore bellum cum Romanis gerens à Pompeio profligatus, atque in extrema fortuna constitutus, illesus è vita decedere festinaret. Haulit itaque venenum, & plus etiam quàm satis esset ebibit, nec tamen ipse mori potuit: filias vero ipsius quæ cum patre vitam finire prorsus decreuerant, atque ideo ex eodem quoque veneno hauserant, celeriter occubuisse tradunt. Mithridates igitur cum mori tardaret, eo quod antidotus quam præsumperat, venenum redderet irritum, unum ex amicis suis nomine Bistocum vocauit, cui mandauit, ut se iugularet. Is autem opus veneni, ferro absolvens, Mithridatem violenta morte confecit.

Quantum, & Quando, & à Quibus Theriaca sit accipienda.

CAP. 17.

Vides igitur quo pacto è pluribus composita medicamenta magnam vim habeant ad efficiendum corpora nullis obnoxia læsionibus, præsertim theriaca propter eximiam, sicut dixi, viperarum potestatem: Quam tamen assumas velim, postquam cibos probe cōcoxeris, nec amplius repletum te senseris. Recte autem facies si varia ipsam mensura sumas, interdum ad ægyptiæ fabæ magnitudinem ex duobus aquæ cyathis, quoniam modicum interuallum tibi supererit ad antidoti concoctionem: interdum ad nucis auellanae quantitatem ex tribus aquæ cyathis, quoniam plus temporis habiturus es, quo possit in corpus theriaca digeri. Considerabis præterea & anni tempus, & loci conditionem, quoties ipsam accipere volueris. Æstate enim, ut theriacam sumas, nullo pacto consulo: nam temporis constitutio calida tunc cum sit, calefactum adhuc magis ab ea corpus læditur. Id quod videns admirabilis Hippocrates afferit, Medicinas, & antequam canicula oriatur, & postquam orta fuerit, molestas esse: ut plurimum enim ea pars anni febrem hominibus affert. Quamobrem & eos qui media sunt ætate, & eos qui naturalem temperaturam calidam admodum habent, monito, ut neque multoties neque multum theriacæ suscipiant. Ex aduerso quibus ætas iam in senium vergit, & plurimum, & plerumque, & non ex aqua sed ex vino, theriacam bibere suadeo, ut ab ipsa & corpus iam flaccescere incipiens, reparetur, & natiuus calor iam languescens excitetur. At pueris maxime omnium theriacam interdico, quoniam ipsius magnitudinem illorum vires plurimum cecedit: nam & puerile corpus facile dissoluit, & complantatum spiritum celeriter extinguit, non aliter atque lucernæ flammam plusquam conueniat infusum oleum. Vidi ego alias puerum, ab interpestiuo theriacæ vsu solutum: febrerat enim longo tempore, fuerat quæ corpore valde macilentus, & viribus adeo debilis ut viuere magna cura vix posset: Quæ cōspicatus medica prudentia, vertabam antidotum puero dari. Cum autem quidam ipsius curam haberet, qui patrem se pueri esse dicebat, & potius imperiosa quadam iubendi licentia vteretur, quàm profectum à ratione consilium audiret, temerario quodam impetu & violento coegit me theriacam puero exhibere: quam ille acceptam concoquere non valuit, eo quod potentior esset viribus ipsius. Soluit itaque vniuersum pueri habitum, aluum quæ fluere cum fecisset, ob datam præter rationem antidotum subsecuta nocte periit. Quod si quando & tu Piso in æstuosa regione fueris, noli theriaca uti, satis cum esse possit eius loci caliditas. Quocirca gentibus quoque primum orientem habitantibus, calidissimi cum sint, atque ideo multum sicci, non conuenire theriacam existimo.

4^a. Aph. 5. Ext. ord. 18. a. Et de Medic. purg. iuxta finem. Et de Aere aquis & locis iuxta medium.

De Salis Theriaci virtutibus.

CAP. 18.

Preparatur vero & Sal quidam hisce serpentibus, de quo mentionē facere necessarium duxi, ut absolutissimus hisce de rebus penes te sermo foret. Facit autem & hic sal ad omnia quæ ante diximus, sed modice facit, nec nisi longo post tempore remedium apparet: si quis tamē frequenter eo utatur, sensim auxilium affert. Vnde plerique hoc sale medicati cum inter initia celerem remedij sensum non habuissent, ne prorsus quidem ipsum cōferre arbitrabantur, præsertim cum redactum in cinerem, vim medicam incendio amisisse censeant. Equidem, ut antidoto parem facultatem non habere salē affirmo, sic omnem ipsius vim aboleri penitus nego. Nam ignis multa efficit meliora, & interdum latentem rerum naturam detegit: quædam etiam quos volumus in vsu apta reddit. Aurum quippe à nobis igne exploratur, impurum quæ à puro hoc pacto secernitur: nam aurum quod igne repurgatum exacte fuerit, Obrium esse cæsetur. Ferrum quoque flammis emollitum, quouis modo producit, & flexum sicuti volumus, varijs hominum vlibus inferuit. Sed quid remota cōsector? nonne multa quæ nutriti causa sumimus, igne nobis idonea redduntur? Panis & pecudum piscium quæ carnes quandiu crudæ sunt, ne appetuntur quidem: at ubi cocta fuerint, etiam in nutrimentum cedunt. Ipsum insuper vinum si quis statim, ut natū est, è racemis premat, crudum & immaturum est, at Solis igne maturatum, & suauissimum, & potui conuenientissimum euadit. Amplius, multa reperiuntur ad structuram medicamentorum attinentia, quæ donec præscam naturæ suæ rigiditatem seruauerint, & acerrima, & nostris corporibus inimica esse, docet experientia. Hæc ignium virtute temperata, curandis morbis idonea, redduntur.

Quinta Classis.

NNNNN

tur

DE THERIACA

tur, vtrputa Chalcitis, quæ si cruda fuerit, corpus vrit, & in eo crustam celeriter excitat, sin tosta ad- E moueatur vlceri cicatricē inducit. Item Lapis qui è phrigia aduehitur, is crudus acerrimus est, as- fatus & alijs quibusdam commistus præstans oculis remedium euadit. Cinis etiã quem ex incen- sis spongijs conficiunt, sanguinis fluxum valēter astringit. Idem mihi & de theriaco Sale iudican- dum videtur. Nam omnia simul accensa, hoc est, integri cum sale serpentes exusti sicut ignis ope- ra noxiam excedentem q̃ corporis nostri virtutem deponunt, ita conuenientem medicaminibus opem assumunt. Præcipuum vero Sal iste habet, q̃ morbos cutim infestates curat, albam dico vi- tiliginem, lepram, impetiginem quam seram vocant: & demum omnia sub cute posita excremen- ta resoluit. Quamobrem magna pars eorum, qui salē hunc comedunt plusq̃ consueuerant, sudan- tes putridam materiã eijciunt, & cum ea pediculos etiã appellatos quosdam emittunt, qui è pu- tri materiã ortum ducentes nomen sibi *φθειρε* apud græcos acquisiuerunt. Dentes præterea sal hic optime purgat & ipsos à putredine seruat, nec eos erodi permittit: membra laxa dēfat, illuc q̃ de- scendentem fluorem supprimit.

De Salis Theriaci Compositione.

CAP. 19.

Conficitur autem hoc modo: enitar enim rursus tibi hunc quoq̃ Salē nudis verbis describe- re. Oportet víperas quatuor antedictis similes & eodem tempore captas, nec plus duobus F diebus asseruatas, accipere, immo si fieri potest eodem quo captæ sunt die: postea salis ammoniaci quem vocant, sin minus communis albi & parumper aerī expositi modicum vnum italicum: dein de salī adiunge cretensis gentianæ in partes aliquot concisæ, libram vnam & dimidiam: aristolo- chiae rotundæ, iudem libram vnam & mediam: summitatum cētaurij minoris, libras duas: carda- momī armeniāci, marrubij, libram mediam: scordij montani, chamædryos creticæ, libram vnam: feminum rutę domesticę tantundem: hæc omnia melle attico cōmiscabis. Harum rerum mediam portionem in ollam nouam ex argilla confectam conijce: postea víperas quatuor viuas superim- mitte, & cum eis scillas quinq̃ recentes, & nuper euulas, atq̃ in frustra concisas: inde reliquū alia- rum rerum dimidium: postremo lutum olle diligēter inducito, vbi prius operculum imposueris: quod foraminibus quatuor aperies, vt per eam vapor egrediens assationis mensuram significet. Nam fumus qui primum exibat obscurus admodum & valde turbidus denotabit ignem ad vipe- ras iam peruenisse: quo tempore diligenter aduertas moneo, vt respirando, nō aerem attrahas in- sectum hoc fumo, qui à víperis exhalat. His peraētis cum fumus delisset, & tenuem quandā flam- mam è foraminibus ascendere videbis, tunc optime tosta cuncta iudicato: itaq̃ transfer ollam ab igne in locum, vbi per integrum diem & noctem frigescat. Inde vase adaperto combustas res exi- G me, quibus contulis atq̃ cribratis hæc alia adiunge. Seminum rutę syluestris vncias nouem, hyso- pi creticæ tantundem, feminum sceniculi syluestris vncias sex: nardi gallicæ, stachyos scythicę, lin- gularum tantundē: petroselinī macedonici vncias quatuor, racemorum amomī vncias tres, ori- gani heracleotici capitulorum vncias nouem, feminum horminī torrefacti vncias tres, summitatū thymī attici vncias nouem, foliorum malabathri indici vncias quatuor, carnium baccarū iuniperi laconici libras duas, feminum coriandri domesticī selibram, piperis albi libras duas, piperis nigri tantundem, radicū silphij vncias decem, zingiberis nō perforati libras duas, radicū satyrj se- libram, pulegij montani tantundem, seminis seseleos massiliensis fului vncias sex, feminum tordi- li montani tantundem, mentæ tantundem, calix optimæ vncias duas, cinnamomī vnciam vnam. Hæc vbi semel contudi & excussi, denuo & contundere & excutere molior, quò sæpenumero cri- brata in tenuissimum pulcrem redigantur: quem in vitreis vasibus positū, non statim, sed à qua dragesimo die vtendum trado. Cæterum ipse hunc salem etiã non inuistis víperis conficio, ve- rum pastillos ex eis quorum compositionem in theriaca docui, reliquis quę cum víperis vruntur, admisceo, ipsos q̃ comburo, vt quam in se habent amaritudinem incendio deponant. Tantam ve- ro pastillorum mensuram impono, quantā habere quatuor víperas conijcio: ac reuera sal q̃ opti- H mus euadit, vt qui propter vstionem, neq̃ cinerulentum quippiam gustatus præ se ferat, neq̃ con- specius nigredinem, verum & iucundissimus accipientibus euadat, et virtutem ad quę dixi ipsum proprie valere, præstantiorē ostēdat. Hæc sunt quę de Theriaca, & Theriaco Sale, dicenda habui, diligenter sicut arbitror à nobis elaborata, præsertim cum & tu Piso in omni sermone valde sis ac- curatus. Memini enim te cū eloquentiæ magna cum gloriã operam nauares, siue concionem in senatu vel ad populum haberes, siue causam aliquam in foro ageres, obijcerent q̃ qui tecum con- tendebant ea de re multas dicendi occasiones abs te inueniri, respondisse, dicentes aliqñ cessare. Nam & deos affirmabas quoties non respondent, tacere, & illos qui respondent, interdum silere: Mare præterea hyberno tempore nauigationem non concedere: & fluminum aquas desinere fluere, rursus q̃ interpolito spatio cursum repetere: Terram demum non semper fruges producere. Quamobrem te Piso imitatus nihil omisi quod de theriaca quæri possit: & simul hortatus sum, vt ea libenter vtaris, quoniam comper- tum est Theriacæ vsum, Tempus vitæ prorogare: quam tibi à dijs longissimam exoptare me- rito debeo.



GALENI DE VSV THERIACAE AD PAMPHILIANVM

Iulio Martiano Rota interprete.

Sunt etiam qui opinentur, & hunc non esse Galeni librum.



Vælisti sæpenumero Pamphiliæ artē cōponēdæ Theriacæ & vsum ex me cognoscere: sed quæ olim à nobis præfens ipse audiuiſti, cū neq; te amplius meminisse existi- mem, neq; tum satis à me dictū fuisse, nunc ocium nactus omnia quæ, dum essem Romæ, mihi narrabantur ab hac antidoto effecta, quæ q; nos experiendo cognouimus, in memoriā reuocaui, redacta q; in exiguum hunc libellum ad te misi: & vnā docui, quo modo, quo tēpore, quibus in morbis, theriaca vti conueniat: quæ si quis ad vnguem seruauerit, nunquam à concepta spe decider. Nam rem occultare quæ ad salutem hominum cōducatur, & qua se merito iactant qui in vrbe oīum principē degunt, vt & priuatē beneficio, & publicē ornamento, affecti ab ea antidoto, quæ communis salutis gratia pro totius ciuitatis conseruatione parata seruatur, rustici admodum mihi esse videtur, præsertim tibi, quem nouimus, cū alias vrbes, tum præcipue Creticas, animi tui moderationem & oībus in rebus mansuetudinē, non solum cōmendare, sed etiam amore summo prosequi. Nam in Ægypto, Ægypti q; regia vrbe Alexandria, plures vnī tibi Cretensiuū amici sunt quàm cæteris oībus. Quam ob rem iure quispiā fortunam quoq; miraret, quæ tuis moribus tam conueniens nomen imposuit, perinde atq; præfageret te cunctis amabilem fore. Sed ad Theriacam redeo, quā tu tibi liberaliter & à multis facile cōparabis: vsus vero peritiā nostrī in te studiū pignus & beneuolentiæ monumentū erit. Vt enim si lyram aut tibiā aliquis possideat, nec vsum noscat, tantūdem est, ac si eā non haberet: sic quī antidotum aliam uel medicinā domi continet, nec vti sciat, nullam ex ea vtilitatem capiet. Quod si theriaca, sicut apud oēs iam inualuit, ad morsus serpētium & ad venena tantūmodo faceret, oportebat eam domi repositam tanquā picturā aliquam aspernari, nullo vsu, sed sola vetustate, consumendam: Cū vero præter supradicta, bonum corporis habitum, vitam longam, sensus vegetes, sanitatem stabilem promittat: nec solum ab instantibus morbis liberet, sed etiam ab imminētibus præseruet: non ab re facturum existimo quisquis theriaca sanus etiam vti velit, malit q; potius impendentem morbū præuenire, q̃ iam vexantem arcere. Hac de causa Romæ principes viri cōplures, alij primo die Lunæ theriacam accipiunt, alij quartum eligunt: & tribus interiectis diebus concoctioni dant operam, curato q; leniter ventre circiter horam tertiam, ex vno cyatho mellis duobus aquæ calidæ admisto tantum theriacæ sumunt, quantum est græcæ fabæ magnitudo, non vt aliquo morbo liberent, sed ne prorsus in aliquem incidant. Nec sua eos fallit opinio: nam sanguinem theriaca bonum reddit, non quia malā sanguinis qualitatem excernat, sed quia eius contumaciā vincat, & ex inimica amicā efficiat. Foris quoq; si quam urbem aut regionem morboſam esse conſpiciant, vel aquas malignas esse intellexerint, eodem pacto theriacam assument, & ea tanquam lorica quapiā corporis sui statum tuentur. Referam quæ vetustissimū omnium eorum qui me docuerunt dicere audiui, virum & medicæ facultatis experientia præstantissimum & singulari quadam humanitate insignem Ælium Meccium: Italiam olim pestem inuasisse, qua celeriter & multi intercipiebantur: Timentibus igitur oībus, vt fit, & medicis & principibus, auctorem se fuisse, vt sola theriaca vterentur, nam cætera nihil cōtulerant: Tūc itaq; ex ijs qui ægrotabant quā plures assumpta theriaca cōualuisse: paucos in quibus vis morbi nimium inualuerat, occidisse: reliquos oēs, quos non dum pestis occupauerat, nō modo periculum euasisse, sed ne in morbum quidem incidisse. Atque mirum hoc alicui videri non debet, quando, si haustū venenum superat, pestilentiam quoq; vincere possit: aer enim est, qui corruptus cum sit, homines

Quinta Classis.

NNNNN ij perimit:

perimit: Quod & complures medicos & imperitos omnes nescire ne mireris, cum illud etiā eos E
 lateat inutilem etate theriacam reddi. Radices enim, succi, cortices, lachrymae, semina, flores, &
 carnes, sunt ea ex quibus componitur: atque ut haec singula tempus exinanire possit, ita & quod
 ex eis confectum est medicamentum antiquare valet. Hinc fit ut qui medicinas venales habent,
 hoc sensu praediti, inueteratam nimium theriacam alijs vendant, aut etiā amicis donent: ipsi vero
 cum res postular, viribus & etate praestantem promunt: fieri q̄ non potest quin ipsis opem offe-
 rentibus res ex voto succedat. Subiungam deinceps alias temporis praescriptiones, alia morbo-
 rum genera, in quibus si quis uti theriaca voluerit, nunquam frustrabitur. Nam percussis à vipe-
 ra, vulneratis à serpente, ictis ab aspidē, commorlis à rabido cane, demum lassis ab aliquo animali
 quod dentibus aculeo vel contactu venenum relinquat, recens "theriaca satis super q̄ efficacax re-
 medium est. Recens autem est quā sextum & trigelimum annum nō dum attigerit, quo tempo-
 re venenis etiam alijs confert: nam ab eo tempore morbis solum auxiliatur, de quibus mox refe-
 ram, modo ad trigelimum sextum annum multorum adhuc annorū accessio facta non sit: Inef-
 ficax enim tum deniq̄ theriaca redditur & inutilis penitus: quod hoc pacto deprehendes. Medi-
 cinam quā vel alium subducatur, vel vomere faciat, scammonium aut elleborum vel quidvis aliud
 hisce etiam valentius exhibe, perinde atq̄ si aliquem purgare velles: huic postea bibendum trade F
 tantum theriacā, quantum grācam fabam aequet: si bona erit, non solum non purgabitur qui as-
 sumpsit, sed ne commotionem quidem ullam sentiet: sin cōtrarium eueniet, vetulitate deprendes
 antidoto vires concidisse. Sed tempus est theriacae vsum doceamus. Dat̄ ex tribus cyathis vini,
 nucis auellanae magnitudine, tam post venenum venenosorum q̄ animalium ictus, q̄ ante, si quis
 veneni suspicionem habeat. Eodem modo illis etiam subuenit, qui ex interna causa & incerta cō-
 sumuntur, tanquam si veneno aliquo petiti forent. Tussi tam nouae q̄ antiquae, & quibus colicas
 aut pectus dolor infestat, auxiliatur ex mulso, si non febriant: si febriant, ex aqua dulci, noctu da-
 ta fabae Aegyptiae magnitudine: Quā quantitas inflationes etiam ventriculi, tormina ventris, do-
 lores intestinorum & coli, sedat: ex aqua tamen & primo mane sumenda est. Magnum insuper
 comedendi desiderium remittere, prostratum q̄ eundem excitare potest, singulis quibus p̄ natu-
 ra functionibus intra consuetum operandi modum reuocatis. Bibere vero oportet horum gratia
 supradictam antidoti quantitatem ex aquae vel diluti vini cyathis neque pluribus tribus, neque
 paucioribus duobus. Bona est etiam hoc modo ad tollendum tremores, & frigora febrium qua-
 uis interualli ratione seruata inuadentium: item ad bilis vomitum qui febris accessionem praere-
 nire solet, quanquam exacerbationem etiam interdum comitetur. Si quis vero ter vel quater ad G
 summum ante febris annotationem aduentum q̄ theriaca vtatur, febrem omnino tollet, modo
 victus ratio non repugnet: Nullum enim tam efficacax remedium medicina habet, quod solitum
 auxilium afferre queat. si ei victus vel resistat, vel non adiuuet. Creditur etiam retentos mulierum
 menses ducere: mortuos foetus eijcere, quos natura etiam si multoties tentet. expellere tamen non
 potest: his datur ad fabae Aegyptiae magnitudinem (incolae cithe ciborium q̄ nominant) ex passo
 vel aqua mulsa in qua dictamnum vel ruta prius ferbuerit. Vtilis insuper est aquam inter cutem
 habentibus, & regio morbo laborantibus, ex asari decocto. Quidam tamen aquam inter cutē ha-
 bentibus ante cibum solam theriacam deglutire praecipiunt: alij eam vni cyatho postq̄ cōmiserūt:
 ita nanq̄ magnopere illorum situm leuat, vniuersum corporis habitum firmiorem facit, & cum
 hoc, q̄ aquam inter cutem minuit, ipsam etiam exiccationi paratiorem reddit. Facit praeterea ad
 vocem retusam sola, & hausta, & ore detenta. Qui tamen eam bibere volet, tragacanthi duplum
 admisceat & ex mulso vel passo hauriat. Qui vero sub lingua cōtinere, colliquefaciat medicamē-
 tum paulatim oportet, quomodo in alijs quoq̄ praecipere solemus, quā arteriaca à meatu in pe-
 ctus descendente nominantur. His etiam qui sanguinem ē pectore vel pulmone reijciunt, theria-
 ca conuenit: atq̄ si recēs hoc malum sit, ē postea bibēda est: sin antiquum, ex aquae tribus cyathis: H
 longe tamen praestantius remedium fiet, si herbae symphyti modicum, aquae incoxeris. Sumi vero
 debet ad fabae Aegyptiae magnitudinem incipiente nocte & illucescente die. Romae quosdam ē
 praeceptoribus meis obseruauimus in ita affectis hominibus eo etiam remedio consueuisse uti,
 quod ē subere constat, cuius compositionem opportuno magis loco, cum opus fuerit, describam.
 Abunde ergo pectus circūquaq̄ ante & retro, hac medicina fouebant, atq̄ ita ferē semper morbū
 hac arte superabant. Prodest insuper renum vitij, vesicae calculis, intestinorum excoriationibus,
 agrē spirantibus. Demum in iccinore aut liene duritiem habentibus, aliud ue aliquod inueteratū
 malum, his ex aceto mulso dandum est: acetum mulsum sumemus quod ē fauis cōfectum sit, id. n.
 Hippocrates recte cōpositum arbitratur in eo libro quem de ¶ Acutis morbis adidit: Difficulter
 autem spirantibus ex aceti scyllitici cyathō vno & dimidio: Lapidem in vesica habentibus ex apij
 petroselinij ue decocto: Renum vitio laborantibus ex mulso: Excoriationem intestinorum patiē-
 tibus ex decocto arbusculae syriacae quam rhun Graeci appellant. ¶ Comitiales quoq̄ si macilen-
 ti fuerint, & parum sanguinis habeant, ex aqua mulsa: sin corpulenti & multi sanguinis, ex aceto
 mulso, dari solet. Quidam vero approbati medici comitiales iubent prius sinapin commanduca-
 re & expuere, tum nocte superueniente theriacam quā fabam Grācam aequet, ex aqua sumere.
 Demum,

A l. 5. ff. 1. t. 1.
fol. 522. b

Lib. 3. de Mor-
 bis circa finē.
 Et de frac. cō.
 2 t 29. 7. 235.
 h. Et cō. 3. t 49
 248. c. Et. 4. de
 Artic. 292. f

A. ibidem. fo
 523. b

A Demum, vt paucis multa colligam, in quibus alia remedia vi morbi superata nihil contulerint, in his theriaca exhibita præter omnem expectationem egregie operatur: quamobrem & cholericis quibus iam vox intercepta erat, & cardiacis præ dolore ventriculi deficientibus exhibita, tanquam ad vitam eos reuocauit. Cæterum omnia verbis consequi non possum, nec si possem, deceret, cum ex hisce quæ hæcenus recensuimus deducta vsus ratione, feliciter vti theriaca possit in alijs etiam morbis qui supersunt. Nam qui ipsam adhuc magis extollere voluerunt reprehendendi sunt, quod ei non medicas sed circularias promissiones attribuere, dum aurium theriacam dolores tollere, grauem auditum meliorem facere, hebetes oculos acuere, demissam vnam suspendere, & oris vlcera obducere, narrant. Calumnias siquidem ista laus antidoto potius quam commedationem affert: nam si minutos hosce morbos vili remedio sanare melius possumus, ignauum est id ipsum pretiosa antidoto minus consequi velle. Sed missa hæc faciamus, cum adhuc de compositione theriacæ dicendum superest. Indiget enim & hæc bræui quadam enarratione, siquidem Menecrates confuse ipsam protulit, quam nos in præsentia distinguemus. Ac cum hedychroum medicamentum, pastillos ex scilla, itemque alios ex vipera capiat, nos prius hæc explicabimus quæ composita sunt & ipsa, tum alias simplices medicinas ex quibus theriaca miscetur, subiungemus. Hedychroum

B medicamentum ita conficies. Corticis radicem aspalathi, calami aromatici, costi, assari, ligni balsami, phu herbae, amaraci, mastiches, singulorum pondo vi, florum iunci rotundi odorati pondo xij, cinnamomi pondo xij: amomi, casia, rha pontici, singulorum pondo xv: nardi indicæ, folij, singulo. pondo xvi: myrrhae, croci, lingu. pondo xij: vino falerno excipe, & dum concorporas opobalsamo iunge, tum vt in vmbra siccescant finito. Pastillos Scilliticos ita conficiemus. Scillam luto circumquaque tege, rectam in ignem quo thermæ calefiunt iniice, sequenti die eius quod intus est drach. cxx cape, & farinae erui drach. lxxx: vbi commiscueris in pastillos redige. Pastillos autem Theriacales ita compones. Viperas quatuor vel quinque flauas accipe: melius est autem paulo ante captas sumere quam diu retentas, nam quæ multo tempore detenta fuerint, magis venenosæ sunt: coniungere hoc ex ieiunis hominibus licet. Deinde ad quatuor digitorum mensuram vtrinque, i. caput & caudam amputa, corium detrahe, viscera & intestina abijce, quod superest in ollam nouam conijcito, anethum adde: ferueat: cum cocta fuerit, spinas diligenter exime, latent enim plerumque. Carnes vbi exquisitè collegeris, panis sicci quidem sed puri dimidium adijcies, commiscebis, opobalsamo que assumpto massam totam in pastillos diuides, quos in vmbra siccabis. Ipsa verò Antidotus cui ab Andromacho qui primus ipsam composuit, nomen Galene hoc est Tranquilla, inditum est, quamuis alij qui ipsam ab eo susceperunt, vt Crito & Critonem secuti, quod viperae carnes acciperet, theriacam appellarint, hoc modo conficitur. Pastillorum scillinorum, pondo xlviij, pastillorum theriacalium pondo xxiiij, pastillorum hedychroi pondo xxiiij, piperis nigri pondo xxiiij, lachrymarum papaueris pondo xxiiij: cinnamomi, iridis illyricæ, radicis dulcis, opobalsami, rosarum rubearum, scordij cretici, seminis napi i. rapae agrestis, agarici, singulorum pondo xij: croci, myrrhae, zingiberis, rha pontici, radicis quinquefolij, calamenthi, marrubij, petroselinij, stœchadis, costi, piperis longi, dictamni cretici, florum iunci rotundi odorati, thuris masculi, terebinthinæ chiæ, casia fistulae nigrae, nardi indicæ, singulorum pondo vi: summitatum polij cretici, styracis, seminum seseleos, thlaspeos, ammeos, trixaginis, chamæpityos, succi hypocystidis, malabathri, nardi gallicæ, radicis gentianæ, anisi, mei, seminum fœniculi, sigilli lemnij, chalcitidis vsta, amomi, carpobalsami, phu pontici, hyperici, acaciæ, cardamomi, gummi, singulorum pondo iiij: seminis dauci, chalbanij, sagapeni, bituminis, succi panacis, castorij, centaureæ tenuis, aristolochiæ, singulorum pondo ii: mellis attici libras x, vini falerni sextaria duo. His ita paratis in mortarium conijce succum hypocystidis & glycyrrhizæ, myrrham, opium, sagapenum, styracem, acaciam, opopanacem, mel que paulatim instillando simul omnia contunde & dissolue, tantumque

C vini demum infunde vt superferatur. Hæc tribus diebus ita macerato: postea cinnamomum, crocum, casiam, nardum, thlaspim, malabathrum, sigillum Lemnium, chalcitim vsta (hæc enim nigro colore theriacam commendat si scitè combusta fuerit) amomum, bitumen, castorium, sigillatim quodque contusum & cribratum in pilam mitte: & affundens vinum, ac si collyrium faceres, diligenter commisce. Postea quæ in mortario sunt in pilam transfunde, diligenterque commiscendo vinumque infundendo sicca omnia superadde, atque in vnum corpus redige. Deinde mel, terebinthinam, chalbanum, opobalsamum, in cacabo tepescit superinfunde ijs quæ in pila sunt, omnia que in vnum corpus redige, & in vase stanneo argenteo ue repone & vtere. Crito hoc plus de theriaca scriptum reliquit, Viperas vere finiente vel autumno comprehendendas esse, eligendasque illas quæ magne & corpulentæ sint, anetho que imposito elixandas. Carnibus autem

decem viperis collectis vnam panis siliginis vnciam admiscendam censet, atque ita pastillos theriacales appellatos conficere. Rursus scillas messis tempore colligendas iubet, quod eo tempore præcipue vigeant.



GALENI DE ANTIDOTIS LIBER PRIMVS

Iulio Martiano Rota Interprete

Quid Antidotus sit, & Vnde Theriaca originem habuerit.

CAP. I.



Edicamenta quæ non extrinsecus imposita, sed intus assumpta, malas corporis affectiones sanant, Antidotos medici vocant: quarum tres sunt omnes differentia. Nam aduersus exitiales potiones quædam faciunt: quædam ad feras valent, quæ venenum icu morsuue relinquunt: quædam excitis mala victus ratione morbis auxiliantur. Non nullæ verò tria hæc simul pollicentur, Cuiusmodi est quam Theriacam vocant, quæ ab Andromacho medico composita Mithridaticam penè antiquauit, ita & ipsam ab auctore suo dictam. Mithridates, n. iste, quemadmodum & apud nos Attalus, omnium ferme simplicium medicamentorum quæ venenis aduersantur, sedulo vim expertus est in illis hominibus, qui

A. l. 5. fol. 1. 2. 1.
fol. 524. a b

mortui condemnati fuerant. Repperit itaque priuatim quædam phalangibus, quædam scorpionibus, quædam viperis, aduersari: Item eorum quæ ad exitiales potiones faciunt, illa aconito, hæc lepori marino, alia alij atque alij veneno, remedium esse. Quæ omnia comiscens Mithridates, medicamentum vnum effecit, ex eo se sperans auxilium venenis omnibus præsens habiturum. Subsecutus autem multis post annis Andromachus inter Neronis medicos primus, non nullis additis, quibusdam adeptis, theriacem quam appellant, composuit, haud exiguum partem carniū viperæ quibus Mithridatica antidotus carebat, cæteris admiscens. Sane quod idcirco theriaca ad morsus viperæ plus Mithridatica valet: ad reliqua verò omnia non modo quicquid illa plus non potest, sed est in quibusdam inferior etiam. Neutra tamen eam vim habet post venenum accepta, quam antequam habuisset. Nam portio antidoti quæ prius, & semel hausta, tutum à morte quempiam præstitisset, ea venenum subsecuta, nisi ad quadruplum quincuplumue aucta, non iuuabit: nequid semel tantum, sed bis singulis quibus quod diebus hausta, faciet. Quod si quis singulis diebus quemadmodum tempestate nostra Aurelius Antoninus Imperator, vel sicuti olim Mithridates solebat, antidotum capiat, nullis serpentum moribus, nullis quod noxijs potionibus, lædetur: Id quod ipsi Mithridati contigisse ferunt: qui cum potius veneno mori, quam in potestatem Romanorum venire decreuisset, nihil inuenit quod se necare posset. Atque Mithridati hoc quidem euenisse accepimus: Nos autem Antoninum scimus, quo se in primis tutum à veneno præstaret, singulis diebus tantum theriacæ quantum est Ægyptiæ fabæ magnitudo, sumpsisse, interdum quod sine aqua aut vino eam deglutisse, interdum verò liquidum quippiam admiscendo ebibisse. Sed cum ipsum quotidie, inter vitæ functiones quoque, profundo somno corripitur accidisset, papaueris succum eximi iussisse. Quare rursus euenit ut, quia mos eius ita antea fuerat, quod naturalem temperaturam corporis licet ciores haberet, & quia multis iam mensibus exiccantem antidotum acceperat, plurimam partem noctis in somnum duceret. Quamobrem coactus est denuo theriacam assumere quæ papaueris succum haberet, iam aliquo modo inueteratam. Dictum est autem à nobis aliàs sæpe huiusmodi medicamenta inueterata, mitiorem eum succum habere. Fuit autem hoc, quo tempore suscepto aduersum Germanos bello, & ille in provinciis quæ secus Istrum sunt degeret, & ego me illum eod subsequi posse excusaueram. Verum quia Imperator antidotum laudabat à Demetrio medicorum primario confectam, eo vitæ functio, Euphrati medicæ materiæ venditori, à quo simplices omnes medicinas ad theriacam conficiendam emebat, per literas significauit ut sibi renunciaret quis nam medicus imperatoriam antidotum conficiendi Demetrio affuisset: Ab eo itaque cum intellexisset me semper Demetrio quoties theriacam componeret, astitisse, tum quidem eam me per literas componere Antoninus iussit: Romam quod postmodum reuersus, quod ea precipue delectatus fuisset, percontatus

Acontatus est, quæ nam simplicium cōuenientia ipsam miscuisset. Cui ego rem ita vt se habuerat, aperiens, retulit primum me quicquam eorum quæ ab antiquis Imperatorum medicis imponi consuetum fuerat, neq; omisisse, neq; addidisse: Deinde causam exposui, cur ipsi nostra cōpositio maximè placuisset: de qua nunc quoq; dicere cū nobis decretum sit, eorum quæ tunc facta fuerunt, mentionem feci. Nam Antoninus cū singulis quibusq; diebus magno cum studio theriacam sumeret, eius vitia virtutesq; exactissimè dignoscebat.

Quomodo Theriaca Optima componatur.

CAP. 2.

Conficitur autem pulcherrimè & hæc, & alia fermè quæcunq; medicamenta, si eorum quæ imponuntur virtus cognita, & virtutum inter se proportio seruata fuerit. Pleriq; vero, quod primum esse deberet, ne sigillatim quidem vnūquodq; eorum q̄ bonum malum ue sit diiudicare sciunt: quare nec virium inter sese, p̄portionem scire possunt: & idcirco vbi plurima vel tempore vel genere debilia interdum immiserint, validum ac potens aliquod postea commiscunt. Velut olim quidam, qui cū ab Ægyptijs petiit Thebis opium (id aut̄ est potētissimum) imposuisset, & gustu & viribus similem Philonio theriacam fecit. Idem rursus, cū myrrhā q̄ optimam pluribus inualidis admiscuisset, vt cæteris ipsa dominaretur effecit. Alius quoq; similiter in croco

Bpeccauit, & alius in sagapeno, vt & alius rursus in asphalto & galbano. Non pauci vero & duo & tria sic, vt diximus, valida debilibus admiscuentes, in causa sunt, vt inualidis fortia præualeant. Atq; artem quidem antidotos conficiendi, si quis acuto vir ingenio vel semel tantum inspexerit, facile discet: vt vero eorum quæ imponuntur notitiam consequamur, non semel, bis ue, aut ter, sed sæpius admodum sigillatim quæq; obseruasse necessum est, etiam si quis attentius ab aliquo cōmonstrante ac verbis docente cuiusmodi sint, quæ sunt optima, discat. Quod si nullo monstrante, ex libri alicuius lectione, quod genus est opus Heraclidis Tarentini, item Crateæ, Dioscoridis, Nigri, Iolla, Rufi Ephelii, aliorum q̄ quorundam, in eorum cognitionem peruenire aliquis velit, longè maiori ipsi opus est inspectione, prius q̄ exactè singularum medicinarum virtutes ac vitia diiudicare sciat. Nam qui simplices medicinas diuendunt vsq; adeo callidè illarum quasdam concinnant, vt exercitatissimos etiam quosq; ea in re viros decipiant. Quapropter optimum est multo antè eas sibi per amicum spectatæ fidei ibi cōparare, vbi electissimæ prouenire solent: vel illuc semel accedendo secum inde tantum earum asportare, quātum per totum vitæ spatium sufficere possit: cuiusmodi sunt fermè omnia quæ metalla nūcupantur. Cyprum itaq; & nos hac de causa visere voluimus, vbi amicum magnæ auctoritatis hominem cū haberemus, sodalem procuratoris, qui Cæsaris nomine metallorum fodinis præerat, & cadmiā, & diphrygem, & spodiū, & pompholygem, & chalcitū, & misy, & fori, & es vstum, inde multum asportauit. Quemadmodum rursus è Palestina Syriæ balsami liquorem purissimum, nam bitumen Iudaicum ne fraudes quidem vllas admittit, sicut neq; balsami fructus, neq; lignum. Nauigauit quoq; in Lemnum insulam, dii norunt, non alia de causa q̄ vt Lemniā siue terram quis velit ipsam nominare, siue sigillum, agnoscerem: dictum est aut̄ à nobis satis super q̄ de hac in nono de simplicibus medicinis libro. Hanc inquam siue terram, siue sigillum quis appellet, adeo quidam interpollant, vt veram à ficta dignoscere queat nemo, velut & quod lycium Indum appellatur, alia q̄ complura quæ non nisi magna cum difficultate secerni possunt ab adulterinis. Atq; hæc per eos qui talibus in locis diuersantur conquirere opus est, vel per Præfectos & Senatores, qui illis regionibus præsunt, vel saltem per amicos ibi habitantes, quomodo me facere vidistis. Apportantur namq; mihi quædam ex magna Syria, quædam è Palæstina, quædam ex Ægypto, nō nulla è Cappadocia, ex Pōto alia, pleraq; è Macedonia, & ex prouincijs ad occidentem positis quas Galli habitant & Hispani, & oppositas oras incolentes Mauri. Quæ nam igitur quocunq; in loco medicamenta optima proueniant, cū alijs, tum Dioscorides verissimè scripsit. Nos vero, vt dicebā, ipsa comparare opus est, Deo quo diximus modo, præsertim si Romæ habitemus, quod ex vniuersis gentibus quàm plurima quotannis aduehuntur. Multa quoq; per ipsam Italiam partim sponte nascuntur: partim arte fiūt, veluti Dicearchiæ Puteoli nunc dictæ, ærugo, cerussa, æs, aris squama, ac quædam alia: & Romæ, lithargyrium hoc est argenti spuma. Non pauca verò penè singulis quibusq; diebus Romam importantur, quæ è Sicilia & magna Libya quotannis æstiuo tempore aduehuntur, præsertim q̄ è Creta. Multa namq; herbarij qui illic à Cæsare aluntur, non solum ipsi Cæsari, sed & toti Romanæ ciuitati, vasa hisce rebus plena mittunt, quæ q̄ viminibus contexta sint, textilia vocant. Tam multa itaq; vasa Romam & in nationes alias è Creta afferuntur, vt nullius rei prorsus quæ ibi nascatur egeamus, non herbarum, non fructuum, non seminum, non radicum, non succorum. Ac reliqua licet omnia sincera quidem inde afferantur, succos tamen aliquot adulterari, quanquam raro, contingit. Nam cū herbarum copiam insula gignat, fraudulenter concinnare quicquam nō admodum curant herbarij qui in ea degunt: nec si curarent, magni, quemadmodū in alijs, ea fraus esset. Nam in succum absynthij quem solum conficere debuissent, marrubium quoq; exprimunt, aut exiguum quippiam hoc genus interpollant. Quamobrem Romæ si quis vinguetarios adeat, qui singulis quibusq; annis vasa illa textilia herbarum plena emunt, ab eis primo omnia hæc cognoscere poterit, etiam si nunquam antea ipsa vidisset. Deinde ex frequenti inspectione, quale sit

Quinta Classis.

NNNNN iij optimum

optimum quodq; per se ipsum intelliget: qui. n. memores sunt eius quod superiori anno emerunt, cū aliud melius illo vident, facile hoc illi præstare iudicant. Ex herbis liquidem quæcūq; vnā cū semine summis ramusculis adhærente apportantur, pro cuiusq; tñ conditione, plurimū seminis habentes, non habentibus: vegetas, exilibus: ponderosas, debilibus: cōpactas, flaccidas: tpe non consumptas, citō absumptis, potiores arbitrantur. Alius planē is esset, qui ista cogitare nesciret. Atq; vt hæc percipere difficile non est, ita nec gustu & olfactu, quid optimū sit, iudicare laboriosum erit, hisce tñ qui eadē sæpe inspexerint: nam qua in re medicamentū gustu olfactu q; tentatum excellit, id ea in re validius sui generis alijs est. Mel itaq; quod optimū esse perhibetur, dulcissimū est & acerrimū, eo q; mellis natura acrimoniā dulcedinī iunctā habet. Quoties igitur mustū ē dulcibus vuis expressum ad dimidias tertias uē coquendo deferbuerit, quāuis dulcedine melli non cedat, vt aqua tñ obtusum est, nec sensum vellicat: atqui mel eiusmodi non est, sed acrimoniā ita dulcedinī iunctā habet, vt præstantissimū id sit quod hisce duobus excellit. Ac primæ quidē optimi mellis notæ ex hisce sumuntur: secundæ verō ex accidentibus colliguntur naturam eius consequentibus, colore, odore & corpore. Colore nāq; luteum mel sit oportet: corpore verō neq; crassum, neq; concretū, neq; valde dilutū, sed vni forme totū: atque ita tenax, vt si digito particulam ex ipso sultuleris, defluere q; permiseris, perinde atq; viscū descendat, non cæsim, non frustatim. Quāq; ob ista mel optimū quidē non est, sed cū suapte natura optimū est, tū hæc se consequentia signa semper habet, ipsum q; idcirco optimū esse ista significant. Quamobrem simplex quodq; medicamentū sapius quisq; contēpletur admoneo, quod memoria teneat quantū quodq; dulcedinis, aut acrimoniæ, aut alicuius senilis qualitatis, habere possit: neq. n. qualitatum gradus verbis vllis explicari queunt. Accedit præterea & aliud quoddā iudicij genus, quo vis vniuscuiusq; medicamenti perpenditur, longa experientia comparatū, quod oratione declarari non pōt. Mel quippe ē Cnido aduectū, si quis signa quæ modō retulimus attendat, optimū adeo censebit, vt ipsum thasio & hymetio proximū esse iudicet: quod tñ vbi consenuit, vinū haud parū ostendit, vini nanq; conditiones assumit. Idem quoq; rhodio accidit. Vnde quidā theriacā rhodio melle cū admiscuisset: deindeq; tertio pōst anno ipsam mihi nō modō gustu, sed et odore, vinū redolere inuentā ostendisset, & eā ego conspexissem: id quod euenerat, ex melle quod imposuerat accidisse dixi. Mirabatur autē ille. Tum ego rursus eū interrogauī, nunquid & mel plurimū coxisset, ipsum q; diutius despumasset. Quæ se fecisse cū fateretur, ob hoc etiā mirabatur, ac si recōditi quippiā ex me audiuisset. Hic ego eius temeritatē dānare cœpi, q; ex sola librorū lectiōne theriacā cōficere ausus foret. Alius quoque theriacā mihi videndam obtulit quā composuerat, acidam factā, causam q; sciscitabatur. Cū ergo ex me cognouisset se plus vini quā par fuerat imposuisse, nec defæcati, nec antiqui: forsā q; & plus panis quā decebat non ritē confecti viperinis carnibus admiscuisse, sic q; rem se habere fateretur: vt temerarius à nobis obiurgatus discessit.

Quod Vinum in Antidotis poni debeat.

CAP. 3.

IN primis itaq; prouidendū est, vt id vini genus imponamus, quod firmissimū esse nobis experientia cōpertū sit: tū vt validū quoq; quod non amplius mutātū iri per multos iā annos exploratū nobis sit. Nā & debilissima vina, & veluti quispiā diceret, aquolissima, vel magnopere austera, quæ q; præ cæteris acescere solent, nili à primis annis acida fiant, integra postmodū perseuerāt. Est autē huiusmodi cōmutationis tēpus aliq; aliud. Aquolis quidem non multorū annorū: ita. n. vina appellant colore alba, corpore tenuia, atq; vt diluantur non multæ aque indiga. Demū talia cū sint, vt nec caput omnino petunt, ita nec corpus planē calefaciunt, nec ventris venarum q; concoctionē euidenter adiuuant, nec deniq; bene alendo corpori conducunt. Celerrimē omnium vina hæc inueterantur: appellant autē citō inueterari, periti harū rerū, ante tēpus antiqui vini conditiones assumere. Sunt autē, acrimoniā primum, qua planē calefacit, tū amaritudo quoq; † ad quā subinde transit. Interdū tñ & aquosa quādā vina ad vetustatē peruenisse vidimus, si primis tribus annis vel quatuor acida non euaserint. Potentia autē vnā & austera & alba vina cū crassitie, qñq; post decennium etiā, non ritē seruata, acescere contingit: contingit & quā plurimo tpe vetustescere. Talia sunt in Italia Tiburtinū, Signinū, Marsum, & Surrentinū. Tiburtinū nanq; & Marsum, austerū est, & si improvidē reponat, acescit facile: Signinū verō validius, & minus acescit, inueteratum q; optimū euadit. De Surrentino autē quid me dicere opus est? quod oēs iam sciunt ante annū ferme vigesimū crudū adhuc esse: vigesimo. n. tādē anno viget, potui q; aptū diu pseuerat, nec facile amarescit, p̄stātia q; cū Falerno contendit. Contrarias his dispōnes aquosum vinum subit, Albanū, Sabīnū, & quod in Gauro mōte nascit, qua parte Puteolos urbē spectat: quod q; in collibus Neapoli vicinis orit, Aminæū quidē nuncupatū, sed tenue, nec tale quale in Sicilia & Bithynia nascit Aminæum. Nā licet apud has gentes nō nihil tenuis & aquosi vini gignat, nō tñ multū abest à Sabīno quod in Italia nascitur, neq; ab Arlinio & Titacazeno quod in Asia prouenit, aut ab eo quod à nostris Tibenū vocat, ita à regione Tiba in qua cōficitur, denominatum. Atq; hæc omnia vina facile in contrarias qualitates mutant, acidā dico, & amarā: acidam quidē à principio, amaram verō si postea perdurauerint. Locus tñ in quo vinum reponitur multū facit, vt ad alterutram qualitātē mutetur. Optimus itaq; inter initia locus frigidus est, postea calidus, vel ē cōtrario multum

† Cod. impres-
si habet eis ἢν
μετέστη. ἐνίο-
τε δὲ καὶ τοὺς
ὑδατῶδεις
οἶνους ἀφικ-
νουμένους
ἔστιν, ἐν δὲ αὖν, ὁ-
ταν γε. c. An
si quispiam in
cod. habet eis
ἢν ἐν ἐτεσιν
ἐνίοτε δὲ κα-
τοῖς καὶ τοὺς
ὑδατῶδεις
et c. i. ad quā
in annis quan-
doque decem
et aquosa vi-
na peruenire
videre est, ubi
primis et c.

A multum calidus primo: quoniam tepidus locus vina facile acida reddit. Si vero duobus aut tribus annis frigido loco reposita, bona manserint, in cellam calidam satis transferri postea deliderant, nec unquam tepida temperata quibus indigent. Reperiuntur tamen quaedam vina usque adeo aquosa & debilia, ut frigus ne a principio quidem ferant: Quae pater meus experiendi gratia cum in calidissimam cellam detulisset, stoebe cum multa tum calida plenas lagenas contexit: voti quibus compositus effectus, nunquam deinceps acidum vinum habuit, sed quibus celerrime vetus effectum. Quo modo autem unusquisque cellam vinariam calidam sibi comparare possit, ut & pater meus, iam exponam. Apud nos omnibus in agris atria magna extruuntur, quae focus in quo ignis accenditur, in medio habent: nec procul inde iumentorum praesepta sunt vel utraque ex parte dextra & sinistra, vel ex altera saltem. Furni autem foco iuncti sunt ab anteriori parte, quae ad fores totius domus spectat. Tales itaque sunt domus omnes in agris etiam si frugalius aedificatae sint. Nam quae maiori cura fabricatae sunt, exedram habent e regione ianuae sitam ad parietem qui intus est, & utrinque cubacula: quibus aliae cellae, quemadmodum & in multis cauponis in circuitu trium & saepe quatuor atrij parietum dispositae superincumbunt. Ex his autem omnibus cellis ea plurimum ab utroque latere contegit, quae exedrae insit, quam quae pater meus vino reponendo eligebat, quod in dolis deferbuisset. Nam ut firmiora vina prius quibus ferueant in fidelias transferre, sic infirma calido in loco seruare, nostrates solent. Melior autem ad id ea cella est quae ad meridiem spectat, & a septentrione auersa est. Herba vero quaedam apud nos inuenitur fruticosa, calida, & acris valde, parumper redolens, quam incolae colymbadem, alij stoebe appellant, ad praeseruandum vina aptissima. In hac itaque fidelias rustici collocant, atque parietem unum superioris cellae qui in atrium respicit, in quo furnum & focus esse diximus, amplis fenestris aperiant, agnoscetes calorem per fenestras ingressurum cellam, in qua fideliae repositae sunt. Cella igitur vinaria partim calore ex atrio ascendente calefacta, partim herba stoebe fota, vinum quodcumque repositum acescere non sinit. Quod si quis magis adhuc hoc consequi, nec unquam aberrare, deliderat, vinum fidelis infundat non nouis, sed aliis, e quibus antiquum vinum iam exhaustum sit. Si milem quoque morem seruandi vinum & in Italia obseruauimus, in agro Neapolitano, & Neapoli vicino colle, quem Trifolium appellant: multis quibus aliis in locis Italos accepi, ita vinum calefaciendo praeseruare. Verum eiusmodi vinum ut firmiter euadit, sic & capitis dolorem facilius parit, eam quibus ex fumo qualitate acquirat. Fugienda sunt autem omnia eiusmodi vina nec medicamentis admiscenda, quae corpus intrant: nam in emplastris & id genus aliis medicaminibus quae foris admouentur, si optima desint, talibus quoque uti nihil prohibet. Eligenda sunt itaque in conficiendis antidotis vina suapte natura firma, inter quae Falernum non hac re solum excellit, verum & omnibus aliis dotibus antistat: eligendum quibus ex falernis id quod non dum est vetustate amarum, ut aliqui faciunt, hac in re ab iis qui theriacam rite conficiunt, aberrantes. Cum enim audierint id quod semper ab omnibus dici solet, senescere caetera temporis diuturnitate praeter vina, summe vetustum vinum admiscant. Neque vero hac in re vna delinquant, sed in alia etiam peccant, dum ex eo quantum admiscere debeant, coniectare nesciunt, quod in libris medicinarum compositionem continentibus quantum vini infundere conueniat, expellum non sit. Cum autem Falerni genera duo reperiantur quae sese virtute nihilo superant, dulcius, quod Faustianum proprie appellant, gratiorem antidotum facit. Quemadmodum ergo qui fugiens vinum & acescere solitum antidotis adhibent, magnopere peccant, nam tamen nullum de se vitium habeat, commistum tamen rebus alijs plerumque acescit: licet et qui Falernum eximiae vetustatis immittunt, errant: ipsum namque antidotos amaras reddit.

De Melle Componendis Antidotis idoneo.

CAP. 4.

Mel quoque vetus admodum alius quidam medicus, ut & de falerno vino diximus, imponebat, tali ratione motus. Si mel quod optimum antea videbatur admixtum antidotis vinosum effectum est, tutius est multo illud mel admiscere, quod sicut & vinum, temporis longitudine constet incorruptum esse. Atque hoc sane mel vetustate subamarum tum fuit: postea quae plus etiam quam par fuerat coctum, magis adhuc amarum euasit, id quod omni vetusto melli, simulatque decoctum fuerit, euenire solet. Atque hoc admirabile non est, cum etiam si coctum non sit, dulcedinem tamen cum amaritudine vetustate commutet. Pater meus mel quoddam habuit ita amarum ac si in Ponto natum foret, eo in tractu, ubi ex ablinthio apes mel colligunt. Id ipsum tamen & Atheniense et optimum fuisse dicebat, verum temporis diuturnitate amarum euasisse. Hoc quoniam inutile mihi videbatur etiam post patris obitum, nunc usque seruamus, amarumque adhuc plus quam tunc fuerat effectum est, & nigrius: non tamen crassius multo euasit, id quod mellis optimi praecipuum indicium est. Siquidem mel quod in Eleunte Chersonesi nascitur illo in loco, ubi Protetilai sanum extat, quamuis diu easdem condiciones habeat quas & hymeti, crassius tamen & conglobatius processu temporis efficitur. Conscienda sunt igitur in antidotos mella quantum fieri potest, optima, hymetia, thassia, aut certe attica: quibus si careamus e Cycladibus aduectum mel imponemus quodcumque similis attico fuerit. Quanquam in Isthmo quoque bonum mel provenit, ita Isthmiacum, a loco ubi nascitur, cognominatum: Sicut & Tabreum, quod & ipsum, nomen adeptum est. Celebrata autem mella haec sunt. Nam mel in alijs etiam regionibus opimum conficit, sed cum ob exiguitatem ab incolis totum absumatur, in alias provincias non exit, nomen quibus idcirco nullum non habet. Nostra liquidum in

Asia

DE ANTIDOTIS

Asia collis quidam inter Pergamum & Eleam urbem maritimam porrigit, thymo scatens, in quo E apes optimum mel reponunt, quod ibidem totum absumentur: occurrit autem collis iste à læua Perga mo Eleam abeunti, viæ tamen vicinus non est. In Mylia quoque qua parte nostræ provinciae finitima est, tractus occurrit, quem Britum nominant, in quo mel attico simile penitus magna cum admiratione conspexi, quãque deteriora planè mella ibi quoque proueniant. Extabat autem ibi quoque monticulus quidam non magnus, saxosus totus, thymo & origano plenus, ad cuius radices agri cytiso quæ plurimo abundabant. Ex eo collis dominus mel usque adeo dulce colligebat, ut hac in parte atticum et superaret: acre tamen, ut atticum non erat: statim quæ idcirco se gustantes subuertebat, et nauseam cito commouebat, si paulo liberalius comestum fuisset. Hoc siquidè de cytiso scriptores vno ore tradunt, apes ex cytisi floribus plurimum mellis excerpere. Fruticosa verò planta Cytisus est eã altitudinem attingens, ad quam myrtus crescit. Dicta autem à nobis hæc sunt, non solum ad utilitatem medicorum qui Romæ diuersantur, quò singulis annis optima quæque ex omnibus provinciis comportantur, sed etiam ad commoditatem eorum qui in cæteris orbis terrarum partibus degunt. Nam si rerum optimarum notas agnoscent, eximia quæque eligere scient, quæ apud ipsos in suburbanis & vicinis agris populis uel nascuntur. Philonium igitur si quis conficere velit, aut aliam quam aliam minorem antidotum, medicinis non eget ad summum optimis. At si vel mithridaticam, vel theriacam, vel aliquam aliam maiorem antidotum, componere molietur, quæ & multa comprehendat, & cinnamomum accipiat, optimis quibusque indiget medicinis. Quæ quoniam alio in tractu quæ Romæ haberi non possunt, propterea tales antidotos Romæ conficiunt non solum optimi quique medici, sed etiam vnguentarii. Qui tamen omnes in earum compositione nunc plus nunc minus impingant, eas tamen usui non inutiles conficiunt. Quo tempore igitur Antoninus imperabat, theriaca à multis diuitibus parabatur: deerant quæ idcirco non nunquam eorum quæ difficulter haberi possunt, simplicia quædam. Est enim admiratione dignum quantopere diuites principum mores vel imitentur: vel, si non imitentur, videri saltem velint. Nam postquam ex humanis Antoninus excessit, pauci amplius aut theriacam aut mithridatum conficiunt. Cæterum ut Romæ potius quæ alibi medicinæ simplices optimæ, omnes haberi possunt, sic quoque ab eo qui Romæ Caesarum antidotos conficit, singula multo magis perfecta habent, Vinum falernum, mel hymetium, opobalsamum Syriacum, quod à loco in quo plurimum & optimum prouenit alterum quoque nomen accepit, Sagadinum quæ dicitur, cunctis alijs melius quæ in Palestinæ prædijs colliguntur. Quantum verò falernum vinum eo quod caupones vendunt, præstantius est, tamen Ægyptio opobalsamo sagadinum vocatum antistat. Is igitur cui theriacam Cesari conficere obtigerit, ut & mihi contigit, modò singulas medicinæ cuiusque dotes exactè noscat, optimum proculdubio antidotum conficiet. Nam cum optima quæque Imperatoribus vndeunque afferantur, ex optimis quoque denuò præstantissima seliguntur. Equidem ipse vini falerni ætate perfecta quæ singulis in fidelibus descripta fuerat, id tantum gustabam quod vigesimum annum excessisset: inde quæ initio facto ad id usque perueniebam quod subamarum non dum foret. Id enim vinum optimum quo ad ætatem censeo, quod vetustissimum quidem est, non dum tamen amaritudinem aliquam assumpsit. Ex mellis quoque hymetij copia quæ in Imperatorum apothecis plurima erant, bimum gustabam, id quæ rursus eligebam quod dulcissimum & acre plus esset: hoc enim & recenti & magis inueterato præstat. Cæterum quia non modò regias opes tractantibus, sed omnibus quoque alijs medicis, hæc componendi artem utilem esse volumus, idcirco quædam adhuc subiungemus, in primis quæ illud, Mella Athenis multa diuendi, quæ thymum multum in imo vase occultatum, atque ideo aspectui non obuium habet: acrimoniam autem id melli parit, & processu temporis in superficiem enatat, quemadmodum, & quicquid aliud melli incidit. Tale autem mel est penè omne quod Romæ venale proponitur, nisi ipsum qui afferunt prius commisceant, thymum quæ quod supernatat omne auferant, ut vulgo ex gustato melle, thymi saporem quæ plurimum percipienti, facilius imponant. Verum hic sapor non nisi in vitiatò melle contingit. Quam ob rem si quis thymi saporem habere mel senserit, modò expositas fraudes subesse intelligat. Mel siquidem optimum quæuis thymi acrimoniam præ se ferat, non tamen eius odorem reddit, aut gustum tantopere vellicat. Ac de mellis quidem optimi conditionibus hæcenus, nã quoad usque coquere ipsum conueniat, mox docebimus, cum de theriacæ compositione loquemur. Interea verò ea de vino subiungemus quæ paulo antè dicere omiseramus.

Conquirenda esse Quamvis in regione, Mella, Vina, Simples medicinas.

CAP. 5.

IN Asia namque si antidotos conficere volueris aut aliqua alia in gente, vino quæ ad medicamentum requisito carueris, vinum conquires fuluum quidem colore: nam neque nigrum, neque album, neque rubicundum, eiusmodi antidotis conuenit. Corpore autem ita tenue esse debet, ut oculis peruium sit et transpareat. Gustum verò talem præ se ferat, qualem modò falernum habere dicebamus, non dum quidem amarum, non tamen adhuc ob iuuentam crudum. Subijciam autem in exemplum quæ nam vina talia sint, nominatim quæ ipsa quæ in nostra Asia proueniunt, commemorabo. Antiqui namque medici, etiã ante quam Romanorum Imperium creuisset, & falernum vinum famam adeptum esset, eorum nomina suis libris commiserunt, sunt quæ tria hæc in Asia à medicis celebrata vina, Chium quod in Chio insula nascitur: Arium ab eo tractu, in quo prouenit, cognominatum: Lesbium ita de nomine totius insule, in qua oritur,

Aoritur, appellatum: & Tmolite à monte Cilicię vnde aduehitur, cui Tmolus nomen est, vocabulum adeptum. Perspicuum autem est ex his optimum eligendum esse per ea signa quę superius exposui. Nam, vt de melle quoq; dicebam, quemadmodum id quod in Attica nascitur, omne ferè bonum est, & inter attica mella hymetium principatum obtinet, postea ab illo thalium: sic cum multa vina in Lesbo gignantur, id quod fuluum nec corpulentum est, & bene olet, minimum quę constipat, & dulcedinem modicam quidem non tamen obscuram habet, Lesbium propriè nuncupatur. Optimum q; in Eresso vrbe huiusmodi vinũ prouenit: deinde ab hoc scdm in Methymna, & tertium Mitylene gignitur: quorum omnium præcipuum is eliget qui notis antedictis vinum dijudicat. Vinum enim id ex omnibus aptius erit ad componendũ antidotos, quod & odoratius, & dulcius, & tenuius fuerit: quod genus est lesbium & ariusium, quę duo parum inter se differũt. At tmolite & falernum eiusmodi non sunt, sed duo vini genera, alterum dulce: alterum nec dulce, nec austerum, sed inter dulcia & austera medium. Inijciemus ergo in theriacũ vinum quod est dulce, non quia præceteris vim aliquam antidotis afferat, sed quia illarum gustum gratiorem reddit: cui operam dare conuenit, in hisce medicinis quę intrò assumimus, præsertim cum amara inter se q; plura cõtinuerint, quod genus est theriaca & mithridatum. Nam & omnes alias simplices medicinas, quas longa experientia serpentibus aduersari compertũ est, amaras esse constat: velut cum eas tractabimus apparebit. Homerus autem, vt ex verbis eius colligitur, quęcunq; dolores etiam amouent, amara putat. Inquit enim, Radicem q; addit amaram Compressam manibus, cunctos quę sola dolores, Abstulit. Medicus autem omnium stirpium, si fieri potest, peritiã habeat consulo: sin minus, plurium saltem, quibus frequenter vtimur. Sunt autem ipsarum genera, vel si sic ea denominare velis, differentię hæc, arbores, frutices, herbę, sping, virgulta. Hęc enim quisquis toto ætatis illarum decursu nouerit, multis in partibus orbis terrarũ reperiet: Vt & ego in Italia multis in locis inueni, quę nec quando pullulant, nec quando crescunt, nouerunt isti qui siccas stirpes tantummodo cognoscunt. Nullus itaq; Romę vnguentarius extat qui Creta allatas herbās, & ipsarum semina, non agnoscat: at in suburbanis vrbis non paucas ex ipsis nascentes prorsus ignorant: idcirco q; nec quo tẽpore semen ferant, obseruāt. Ipse verò, & chamępityn, & chamędryn, & thlaspm, & centaureã, & hypericum, & poliũ, & id genus herbās alias Romę vidi, quas obseruato tempore quo vigent, neq; æstiuo Sole arefactas, neque citius quàm par fuit euulsas collegi, non dum concocis seminibus aut maturis. Compositarum nanque medicinarum virtus ex simplicium vigore confurgit, parua quadam interueniente differentia ex componendi arte: ad quam explicandam mox deueniemus, si prius quo pacto simplicia medicamenta inter se aptè componi possint, expreßero. Quoniam verò quędam formulę compositionis artem continentes, mendosè conscriptę sunt, dum alij illarum descriptiones petentibus exhibendo dedita opera mentiuntur: alij exemplaria quę à maioribus integra acceperunt, peruersa minoribus tradunt (nam libri qui in bibliothecis repositi sunt, cum numeros notis designatos contineant, facillè deprauantur, siquidem modo in *h*, modo in *o*, transit, & quoq; & reciprocant: vna enim linea addita, in *v* mutatur, & ex duabus altera detracta, remanet) idcirco, sicut Menecrates librum conscripsit quem integris literis Imperator inscribit, in quo septem duarum syllabarum voce, non his notis solum vij, significantur: & viginti, trisyllabica dictione designantur, non autem his literis xx: & quadraginta, quatuor syllabis, & non his solummodo figuris xl: item q; alijs in numeris, eodem modo fecit: ita & ego faciam. Andromachum quoq; summopere commendo, qui theriacam ipsam, vt & alii quidam carminibus celebravit. Nam Damocrates nō theriacam solum, sed quascunq; etiam alias medicinas versibus conscripsit, rectè sanè: ita nanq; ab improbis peruerſa medicamenta minime possunt. Verum Andromachi primum nos in præsentia carmen subiungemus.

D ANDROMACHI SENIORIS THERIACA QUÆ VIPERAS
HABET, ET TRANQVILLA COGNOMINATA
TVR, AD D. NERONEM CAP. 6.



Antidotum multis insignem viribus audi
Cæsar, qui nobis oĩa tuta facis.

Theriace Dedicatio.

Tranquilla hæc, Hilaris q; suo, pariter q; Serena,
Nomine, cyaneos non timet vna sinus.

Theriace Nomina.

Non si quis cupidis expressa papauera labris
Hauserit, exitium pocula sumpta ferent.

Ad Venena.

Non si quis gelida compleuerit ora cicuta,
Siquis hyoscyamum, siue aconita bibat.

Non si cantharides, aut præfens morte venenum
Colchi tuum sumat, feruida Thapsæ tuum.

Ad Serpentes.

Arida non dipsas, non clarus fraude cerasites,
Non feret impresso vipera dente necem.

In cassum

Incassum cauda confurget scorpius vnca:
 Nec subitos luctus alpis iniqua dabit.
 Non prius audebit calido progressa cubili,
 Vt prius aduersa comminus ire via.
 Nullus ob hæmorrhii stillabit vulnera sanguis:
 Nec tumidos faciet pressa dryina pedes.
 Claudere non cogent odiosa phalangia summum,
 Concussu tremulo frigoribus q̄q̄ diem:
 Non hydrus. Nec vbi torret Sol æquora cancro,
 Cum petit arua minax, concitus atq̄ furit,
 Ora trahens multa cherfydrus cæde cruenta,
 Supremum vitæ ducet in exitium.
 Hac fidens æstu per rura vagabere Cæsar,
 In Lybico quamuis progrediare solo.
 Nil oberit sicci tibi ruris alumna rubeta,
 Nil geminum tollens amphilibæna caput.
 Hæc rursus stomacho præsens medicina tumentis est:
 Hæc ab anhelanti pectore tollit onus:
 Aut intus toto cum spiritus vndiq̄ ventre
 Fluctuat, & surdis viscera pulsat aquis:
 Dira q̄q̄ cum miserum dirumpunt tormina ventrem,
 Et saluunt longi membra dolore coli.
 Sanat item croceo suffusos ora colore,
 Regius is solito nomine morbus erit.
 Hi politas nolunt miseri contingere mensas,
 Nec, si quis vitæ tempora longa daret.
 Sed sibi dissimiles oculis animi q̄q̄ dolore,
 Contemnunt medicæ, quis putet? artis opem.
 Inuadet quoties hydrops mala, corpora liuor
 Inficit, hæc fies liber ab antidoto.
 Hinc hebetes oculi sibi pristina lumina sument.
 Hac phthisis incipiens victa recedit ope.
 Sola potest in se collectos soluere nervos,
 Pendula tunc aliquis tenta 'ue colla gerit.
 Nec finit vt membrana, leues quæ pectore ab imo
 Sepsit pulmones, victa tumore premat.
 Hac etiam magno vesica dolore leuari,
 Horrifici stimulis vlceris icta solet.
 Sola potest clausos penis referare meatus,
 Irrita quos vrit, sollicitat q̄q̄ Venus.
 Cinxerunt lumbos renum quandoq̄ dolores,
 Hauriat hæc aliquis pocula, sanus erit.
 Sola potest eadem multis accepta diebus,
 Tollere de læso pectore puris onus.
 Neu te dira lues, neu lædat noxius aer,
 Hanc cape, cum primo est Sole reuecta dies.
 Hac q̄q̄ canum rabiem fato impendente fugabis,
 Cum trepidat moriens, & sitit æger aquas.
 Insomnes demum quibus est mos ducere noctes,
 Conciliat somnum, peruigiles q̄q̄ leuat.
 Pondus erit quantum creuit faba, quam pater atro
 Atq̄ restagnanti flumine, Nilus alit.
 Ipse tribus cyathis præscriptum dilue pondus
 Antidoti, cyathis igne calentis aquæ.
 Sic commissa, tibi vel claro mane bibatur,
 Vel cum nox primam protulit orta facem.
 Morbi certa dabit crudi solatia, mane
 Sumpta, quibus tristis lux solet esse magis.
 Vespere, cui magnos nox aduehit atra labores,
 Languenti cultos atq̄ leuamen erit.
 At qui calcati morsu serpentis anhelat,

Ad Graviore Morbos.

F

G

H

Dosis Theriacæ.

Assumptionis Modus.

Assumptionis Tempus.

Ignarus

- A** Ignarus 'ue doli toxica nigra bibit,
 Et cum mane nouum, & cum se Sol abdedit vndis,
 Sumat, ab æquali pondere tutus erit.
 Hæcienus & pondus, vires q̄, & tempora Cæsar.
 Quod superest, dicam quo facienda modo.
 Vipera principio, cura obseruata procaci,
 Protinus est celeri corripienda manu.
 Namq; vbi tristem hyemem pepulit clementior aura,
 Arcia solet cæcæ linquere lustra domus.
 Et passim violis carpit vernantia prata,
 Dum viridis quærit femina fœniculi.
 Nam facit hæc cernant serpentes acrius herba,
 Quos alit in cladem tarde bubulce tuam.
 Deprensis igitur summum caput, ima q̄ cauda,
 Demenda, hinc quicquid venter inanis habet.
- B** Infert nam sæuos hinc atq; hinc vipera luctus,
 Et squammis caudæ dira venena tegit.
 Ceruicis q̄; ideo tantum caudæ q̄; secabis,
 In pugnum quantum est alta reducta manus.
 Sanguine sed mitum caueas stillante venenum,
 Vere hilarem nam sic experire diem.
 Hæc vbi rite tibi fuerint perfecta, subinde
 Vipereas carnes scissilis olla coquat.
 Ante tamen misces frondem graue olentis anethi,
 Et quantum satis est prouidus indis aquæ.
 At cum panda fluunt resoluti corporis ossa,
 Cum q̄; tument flauæ noxia terga feræ,
 Exime vipereas, confusa cadauera, carnes:
 Exemptas, longa ventilet aura mora.
 Hinc spinas tacita prudens subducito mente,
- C** Quas bene si trahes sentiet apta manus.
 Adde laboratum panem, ne vipera formam
 Tusa neget rotulis, ne pereat 'ue liquor.
 In q̄; cauo dudum postquam hæc versaueris orbe,
 Finge rotas, aptum det quibus vmbra locum.
 Inde capillato Scillam cum cortice sumptam,
 Pulte linas, medio constituas q̄; foco.
 Ac cineris rutili cumulos superingere, donec
 Reddatur scillæ mollius igne caput.
 Signa dabit, feruens potitos cum discutit ignes:
 Excute, & ut leues dempseris exuvias,
 Tres scillæ partes, crui compone duabus,
 Pistillo q̄; crepet concaua pila diu.
 Ac minimos tandem contusa premantur in orbes,
 Quos procul à radijs mitior vmbra tegat.
- D** His igitur lancem primum cumulabis, & octo
 Bis q̄; decem drachmas accipe, bis q̄; decem.
 Dimidium superadde rotæ, quam vipera fecit,
 Et piperis longi sit quoq; pondus idem.
 Sit q̄; oprij tantum, tantum medicaminis eius
 Quod grati nomen magma coloris habet.
 Inde quater ternas mutato pondere drachmas
 Iridis, & siccæ protinus adde rosæ.
 Addaturq; tui radix dulcissima succi,
 Et dulcis tantum seminis inde napi.
 Scordion iungas, & odoribus inclyta semper
 Balsama, qui syrio mittitur orbe liquor.
 Tum quæ suspendas æquata cinnama lance
 Conijce, & agarici par quoq; pondus ear.
 Hinc supereli myrrham, costum q̄; specu q̄; reuulsum
 Corycio fragrans imposuisse crocum.

*Pastilli ex Vipera.**Pastille Scilla.**Primus ingredientium ordo xlviij.**Secundus xxviij.**Tertius xij.**Quotus ordo vi.*

Et

Et calix calamos, & quam tulit India nardum,
 Te q̄ Arabi schœnum gloria prima solū.
 Inde nigrum coniunge piper, thuris q̄ nitorem,
 Diuite quod fœlix rure Sabæus alit.
 Nec tu dictamnum, nec tu quoq̄ pontica rheon
 Defueris, stœchas, marrubium q̄ virens,
 Atq̄ apium petris quod nasceris, & calaminthe,
 Afra q̄ cum lachrimis ò terebinthe tuis,
 Et folijs gramen quinis, & zingiber ardens:
 Singula sed drachmas sex tibi quæq̄ trahant.
 His etiam polium drachmis se quatuor addet,
 Addet se polio proxima pinus humi.
 Cum q̄ racemifero Celtarum nardus amomo,
 Et styracis lentor, feruida q̄ herba meon.
 Atq̄ humilis quercus semen, Ponto q̄ petita
 Phu, quibus accedet Lemnia terra comes.
 Nec non malabathri folium, miscebis & assam
 Chalcitim, fibras gentiadas q̄ simul.
 Inde tenax gummi, pressa q̄ hypocistide succus
 Adsit, & hinc fructus balsame parua tui.
 His etiam anisum, fœselim q̄ his iungere mollem,
 His cardamomum, fœniculum q̄ velis.
 Atq̄ atram lachrimam, Nili quam spina remittit,
 Quæq̄ suo thlaspi semine nomen habet.
 Hypericon rursum, pallens miscebis & ammin,
 Nec drachmis totidem plus sagapenus eat.
 Pondere dimidio tum quos sibi Castor ad Istrum
 Ore secat testes, imposuisse decet.
 Quis nec Aristolochi radix, siccum q̄ bitumen,
 Candida nec desint semina dauce tua.
 Deniq̄ cum panacis succum, centaurion atq̄
 Addideris, finem chalbanus ipsa dabit.
 Antiquo primum solves tamen omnia vino,
 Humida quæ fuerint, vt liquor & lachrimæ.
 Tum quæ sicca vides, postquam contusa minutim,
 Cecropio pariter iungere melle velis.
 Hæc qui nos primus docuisti maxime Pæan
 Adsis, seu Tricæ te iuga summa iuuant,
 Seu Burrina magis, Rhodos, aut Epidauria tellus,
 Adsis, & Regi fer tua dona meo,
 Stirpe tua natam Panaceam, namq̄ salutem
 Ille datam puro semper honore colet.

Quintus ordo iij.

F

Sextus ordo ij.

G

Commissionis Modus.

Aesculapij Innocatio.

Andromachi Iunioris Theriacæ descriptio.

CAP. 7.

HÆc quæ senior Andromachus de theriaca cōscripsit, Andromachus filius in eo libro cui ti-
 tulus est de Medicinis intro assumendis, his verbis explicat: non tamē equestri, vt pater, sed
 pedestri vtitur oratione. Antidotus Galene i. Trāquilla cognominata ad oēm malam internā q̄
 corporis affectionē, præcipue q̄ ad vētriculi vitia & venena, febres q̄ per circuitū inuadētes. Ha-
 bet autem pastillorum scillicorum 3 xlvij: pastillorum theriacalium, ipissamenti hedychoi, pipe-
 ris nigri, opij, singulorum 3 xxiiij: rosarum siccarum, scordij cretici, seminis napi, iridis illyricæ,
 agarici pontici, cinnamomi, succi radiceis dulcis, opobalsami, singulorum 3 xij: myrrhæ, croci,
 zingiberis, rhei pontici, radicum quinquefolij, nepitæ, marrubij, petroselinij, stœchadis, costi,
 piperis longi, dictamni, florum iunci rotundi odorati, thuris, terebinthinæ, calix fistulæ, nardi in-
 dicæ, singulorum 3 vi: polij cretici, seseleos, styracis, thlaspeos, ameos, chamædryos, chamæpi-
 tyos, succi hypocythidis, malabathri, nardi celticæ, radicum gentianæ, anisi, mei athamantici, se-
 minis fœniculi, rubricæ lemnia, chalcitidis vsta, amomi †, phu pontici, fructus balsami, hyperici,
 acaciæ, gummi, cardamomi, singulorum 3 iij: seminis dauci, chalbani, sagapeni, opopanacis,
 asphalti, castorij, centaureæ tenuis, aristolochiæ tenuis, singulorum 3 ij: mellis atticij drachmas
 noningentas sexaginta, vini 3 tercetum viginti. Hæc Andromachus iunior soluta oratione cum
 scribat, potest qui non intelligit, omnia quæ senex Andromachus elegiaco versu tradidit, hinc
 ea conquirere. Quam ob rem & nos eorum quæ obscurius ibi dicuntur, expositionem omisimus
 operis prolixitatem veriti. Vnum tantum demirati sumus, iuniorem Andromachum, dum
 connumeraret

A.l. 5. fu. 1. b.
fol. 523. c

† acori, addi-
tur in impres-
sis.

Aconnumeraret simplices medicinas quæ antidotum hanc faciunt, in locum calamenthi, nepitam retulisse, sic enim Romani calamentum vocant. Non decuit autem ipsum qui cætera Græce scribat, hanc solam Romanam vocem Græcis vocabulis interponere. Vna autem in re tantum hæc ab ea differt quæ carminibus descripta est, quæ illa piperis longi 3 xxiii, nigri sex habet: hæc autem prosa oratione descripta nigri xxiij, longi vi continet. Quoniam vero, ut dixi, multa exemplaria medicinarum pondus mendosum habent, idcirco ipsum non notis, sed integris vocabulis, primum apposui, Menecratis iudiciū hac in parte secutus. Deinde quia Andromachi versus obscuriores videbantur, Damocratis iambos eam de re aperte admodum conscriptos, subiungere decreui. Verum hoc paulo post fiet: in præsentia namque, quoniam ex simplicibus medicamentis quæ huic antidoto imponuntur, à nobis aliquot iam expolita sunt, reliqua deinceps subnectere melius esse visum est.

De Compositione Pastillorum ex Viperis.

CAP. 8.

Viperas non, ut aliqui faciunt, æstate media, neque statim ubi cavernas egresse fuerint, venari conuenit: æstate liquidem earum carnes litim excitant, statim quæ ab egressu frigida sicca & extenuata sunt. Opportunum itaque tempus est quod ipsi medium intercedit, quod quæ Andromachus ipse significauit: quo tempore & qui libero patri sacra faciunt, viperas lacerant, vere quidem hinc te, non dum tamen æstate incipiente: vel si ver quoad magnam suam partem hyemale fuerit, circa principium æstatis, non multo post pleiadum ortum. Viperas autem quæ prægnantes sunt, reuocare oportet: aliarum vero caput ac caudam abscidere, quæ partes venenatae etiam plus esse videntur, & duras paucas quæ carnes continere. Sufficiet autem in magnis viperis si id, quod utrinque amputabimus, quatuor digitorum mensuram non excedat. His peractis reliquum corpus intestinis exemptis pelle que detracta aquis primo abluendum, atque in vas fictile coniciendum est: deinde aqua pura superinfusa, & anetho quod tunc viget, ollæ prunas ut coquatur subijciemus: vel arida ligna quæ quod fumum non emittant, *ἀνάρτα* vocant: vel quod melius adhuc est, vitium sarmenta. Salis autem si suo tempore viperas ceperis, tantillum immittere oportet: si in æstate iam incipiente, nihil. Omittere insuper eas conuenit quæ maritima loca, quæ uel in aliqua salsa aquarum lacuna, degunt. Antidotus enim quæ eiusmodi viperas acceperit, litim excitabit. Viperas igitur cum ita coctæ fuerint ac si quis ipsas comedere vellet, ab iure primum eximemus: deinde illarum carnes ita à spinis auellemus, ut spinam aliquam non accipiamus: auulsas carnes exquillite conteremus: panis ex purissima farina confecti optime quæ siccati, qui præcipue & bene fermentatus sit, et in furno non sub clibano coctus, modicum quiddam admiscebimus. Non nulli tamen in commiscendo panem viperarum hanc mensuram seruandam præcipiunt, ut panis pondus viperinarum carnum dimidio minus sit: alij tertiam partem excedat malunt. Ego vero quandoque quartam, quandoque & quintam, panis inposui. Caterum nili bene coctus fuerit, periculum aliquod acoris imminet medicamento. Melius est igitur panem hunc ita coctum per aliquot dies loco aliquo sicciori prius exicasse. Verum cum viperas & panem coniunxeris, diligenter quæ adeo subegeris, ut nulla viperinæ carnis particula non contusa remanserit, pastillos ex ea massa conheito, qui tenues sint: nam crassi cum difficulter siccescere soleant, & carnem putrescere, & panem aclescere linunt. Quam ob rem panem quoque ante siccatum terere satius est, & non quemadmodum ante nos qui Celsi theriacam faciebant, viperarum iure maceratum. Quam rem ipse quoque diu feci, sed mihi postea melius esse visum est, panem antea contritum, viperarum carnibus exacte iam subactis admiscere: citius namque pastilli siccescunt qui siccum panem non madidum acceperint. Sit autem cella in qua pastillos arefacies, in superiori domus parte ad meridiem conuersa: vel saltem ad septentrionem non respiciat, ut Solis radios tota penè die accipiat. Tali enim in loco commode siccescet, statim à compositione ibi collocati, quod solares radij peruenire non possunt. Fræquenter autem ipsos conuertere opus erit, ut æqualiter utraq; ex parte siccescant, quod facere si quis omiserit, superior quidem pars celeriter arefcet, inferior autem humida diutius permanebit, periculum quæ erit ne marcescant. Postea vero quæ exiccati fuerint, maneant adhuc aliquot diebus eadem in cella longius quam prius à Solis radijs, sæpe quæ denuo conuertantur. Sufficiet autem ad hæc omnia quindecim dies ad summum: post quod tempus, donec theriacam conficere volueris, recondi debent in vase stæneo, aut vitreo, aut etiam aureo. Vitro liquidem & auro nihil fraudulenter admisceri potest: Stannum autem plumbo adulteratur, quod vitare conueniet, non solum in hac antidoto, sed & in quibuscunque alijs medicinis: Quæadmodum & argentum, si purum non fuerit, vasa namque ex eo fabricata celerrime rubiginem contrahunt: purum autem argentum Romanicandidum vocant. Caterum longe melius est haud multo postquam pastillos confeceris ipsis uti: quam non multum detrimentum capiant, etiam si peracto anno, atque etiam multo post, eis utaris. Recte namque à principio siccati, ad tertium quartum quæ annum integri perseverant, dummodo tamen aptè reponantur: & subinde pulvisculus quidam qui ipsis obnasci consuevit, mundis mantilibus interdum abstergetur: is namque si diutius inhæreat, pastillos perforabit. Perspicuum est autem inutiles eos tum denique reddi, cum perforati fuerint, quemadmodum antea quæ hoc accidat, etiam si multum tempus intrecerint, non inutiles esse.

De Pastillorum Scilliticorum Compositione.

CAP. 9.

Sive scilliticos, siue scillinos, quis appellare velit confectos scilla pastillos, rotulas uel, aut orbes, nihil

DE ANTIDOTIS

nihil refert: neq; enim medicamento quicq; officit, quomodolibet inditum nomen, modo errorē E aliquem in eorum compositione non admittant: Quod ne contingat, ego tibi eam dilucide nunc explicabo. Principio scillam succulentam de terra euellens, cuius folia penitus iam & scapus aruerint. Huic deinde cortice detracto duriores puliculas induces ex tritico nouo quantum q; fieri potest exquisito cōfectam: ipsam postea multo calido q; cineri subiectā non prius extrahes, quoadusq; circumposita pulicula crusta planē fiat. Quod si vbi hac agis furnus aliquis adsit, vna cum pane scillam illuc inferre potes: inde cum obducta puls iam exaruit, ipsam extrahes, & conteres. Satis assam vero scillam intelliges, si festucam immixtam admiserit: scilla nāq; cum bene tosta est, furculos facile excipit. Vbi vero scillam diligēter attriueris, candidam erui farinam admisce: nam quę candida non est, amara supra modum esse consuevit. Cognitum autē vniciq; existimo prius oportere tenui cribro farinam excutere, ac præterea diligēter eam leuigare. Scilla vero sesquipondere farinam superet opus est: dico autem sesquipondere, vt si duas farinā sumas, scillæ tres accipias. Quam rem cum & Andromachus iunior asserat, nescio qua ratione ductus velit erui farinā drachmas octoginta esse, scillam vero centumviginti: cum satis sit dicere, scilla eruum sesquipondere superet. Postremo vero simulatq; rotulas tenues ex hac mīstura conformaueris, in cella, sicuti paulo ante dicebamus, ad meridiē vergente, repones: quas tamen non in Solis radijs collocabis. F Verum sicut de pastillis viperæ dictum est, ita in his quoq; cætera perage.

De Magmatis Hedychroi Compositione.

CAP. 10.

CUm superius theriacam Andromachus conficere nos doceret, quomodo viperini scillini q; pastilli cōficerentur, ipse quidē satis super q; exposui: Quo pacto autem Hedychroum magma componeremus, neq; Andromachus docuit, neq; complures alij: qui tametsi de medicinarū compositione tractarent, in cum theriacam describerent, Hedychroi compositionem omiserunt: adeo vt medicus quidam Romæ qui theriacam conficere nunq; viderat, ipsam q; se ex sola librorū lectione compositorium fidebat, ab vnguentarijs Hedychroum peteret, existimans illud herbam esse quampiam, vel simplex aliquod aliud medicamentum. Sed ego spissamentum hoc etiam indicabo, ab Andromacho in eos qui nunc quoq; Cæsari ipsum componūt, perpetua serie deriuatum. Quod vt ipsum quoq; perueri non possit, hexametro carmine subscribetur.

Magma, quod Hedychroum læto dixere colore,
Aphalathi drachmis, asari que, mari que, duabus
Constat: nec plures attollit amaracus illis.
Tres calamus, late suaues qui spargit odores.
Tres que Arabum passim qui creuit iuncus in aruis.
Tres costum redolens. Tres toto cognita Ponto
Phu: quibus æquale fragrantia cinnama pondus,
Et lachrymæ, & sarmenta dabunt, quæ balsamus ædit.
Rursus sex foliorum drachmas, sex indica nardus,
Sex calisæ calami, sex myrrhæ gutta leuabit,
Sex que croci flores: bis sex attollet amomum.
Mastiche solidam tantum trahet vltima drachmam.
Omnia tu vino simul hæc coniunge falerno.

Hæc vbi inter se miscueris, rotulas viperinis & scilliticis similes figurabis, ipsas que eodem modo siccabis. Hæc autem Hedychroi magmatis conficiēdi ratio, veluti diximus, ab Andromacho per manus multorum ad nos vsq; peruenit: nam quas alij conscribere, aliqua in re ab hac nostra disserunt. Quæ siquidem Hedychroi descriptiones ab ijs traditæ sunt, qui medicamentorum experientia dant operam, rerum iniectionum pondere ab hac euariant: aliæ vero neq; marum neq; amaracum prorsus habent. Quædam alterutrum tantum continent: neque enim duo hæc vnguentarij omnes noscunt, eo q; herbas solum Creta aduectas emant, et earum semina atq; succos. Ego vero & has duas herbas scio in Asia nasci, ac in alijs quidē regionibus raras esse, sed in Cyzico frequentes. In Italia quoq; vt & alias quasdam herbas, ita & amaracum vidi quæ odore multum à maro superatur: marum enim valde redolet. Putaret que forsan aliquis sola nominis appellatione ductus vnguētum amaracinum quod in Cyzico faciunt, amaraci plurimum capere: sic q; forsitan ab antiquis id vnguentum conficiebatur, sed nunc solum marum imponunt. Hanc herbam aliquādo cum ipse degustassem, ac eam amarā quidem plurimum, sed acrem parum, deprehendissem, hortatus sum quenpam eorum qui amaracinum cōficere solent, vt amaraci tantum immitteret, quantum & mari. Visum q; est mihi id vnguentum, minus quidem redolere, sed peius nihil operari. Hæc itaq; à nobis obiter dicta sint.

De Exploranda Quarundam Medicinarum integritate.

CAP. 11.

Nunc, quo pacto antidotus hæc confici debeat, explicabimus: eo ordine singula quæq; imponenda cōmemorans, quo suis in elegis Andromachus recensuit. Is. n. rotularum scilliticarū drachmas octo & bis decē, rursus q; bis decē, imponi iubet: quod pīnde est, ac si quadraginta octo diceret. Harū dimidiū, hoc est viginti quatuor drachmas, theriacaliū pastillorū, opij, piperis, longi,

Alongi, & magmatis Hedychroi præcipit. Ac de tribus quidem, iam dictum est. Piper autem longum fraudulenter concinnatum deprendes, si illud aqua maceraueris: soluitur enim hoc pascio, quod subornatum est: quod autem fraude caret, indissolutum manet. Est autem id quo piper longum adulteratur herba quædam fulua ab externis regionibus aduecta, quæ piperi longo, aspectu quidem proxima, non tamẽ gustu similis est, quo etiam ab eo distingui facillime potest. Sagapenum quoq; quod vocant & ipsum in aqua seu vino dimissum cognoscitur: verum nanq; statim dissoluitur: quod autem tale non fuerit, indissolutum manet. Siue autem quispiam ut neutrum nomen sagapenum, siue ut masculinum proferat, & totum hoc sagapenum succum intelligat (est enim re vera succus ferulæ cuiusdam panaci similis) nihil refert. Cæterum Panacis succus simile quicquam non habet chalbanæ particulæ cuidam albiori: nam chalbanæ pars quædam re vera in sagapenum transit, quæ spumosa & leuis est: quædam vero chalbanum optimum est sagapeno æmulum: densum autem hoc est, & reliquo chalbano longe magis compactum, quo uti debemus, ceu optima chalbanæ particula. Quoniam vero ad sagapenum ex chalbano transire diximus quodcumq; spumeum, constans, & album est, humori q; immixtum facile diluitur, superioribus quædam adhuc subiungere opus est, præsertim cum ob similitudinem optima calia cinnamomũ

Beuadat. Vidimus enim aliàs frequenter calia elatæ & auctæ tantum, ut fruticis magnitudinem æquaret, ramos quosdam cinnamomo penitus similes aspectu, corticis tenuitate, & præterea hisce signis quæ cinnamomum certissime ostendunt, ac gustu olfactu q; percipiuntur. Ad hunc modum & in optima myrrha opocalpasum reperitur, quod tamen à myrrha differt. Atq; secundum hæc tria, sagapenum dico, opocalpasum, & cinnamomum, quædam proueniunt, quæ neq; chalbanum, neq; calia, neq; myrrha quidem amplius sunt, non dum tamen sagapeni, cinnamomi ue, aut opocalpasi, naturam exacte consecuta. Quam ob rem sapenumero perspexerit oportet, qui similia internoscere ac fecernere cupit. Nam quemadmodum gemellos atq; cõsimiles inter se fratres qui consuetudinem cum ipsis non habent, distinguere nesciunt, quod tamen contubernaliibus facillimum est: Sic in omnibus medicinis qui inter ipsas enutritus fuerit, & eas frequenter aspexerit, facile illarum diueritates vel minimas etiam, inueniet atque comprehendet: At qui semel tantum aut bis inspexerit, eas tanquam indistinctas intuetur, neq; vnam ab alia internoscere valet, cum tamen signa quibus distinguantur manifestissima non nunquam habeant, illi vsque adeo exposita qui sapenumero conspexerit, ut per vnum eorũ facile quancq; medicinã agnoscat.

Csagapenum itaq; e chalbane confectum eundem odorem nõ habet, quem verum sagapenum possidet: nam id odoris genus quod harum rerum periti hircinũ appellant, sumptum e chalbane sagapenum non deponit. Quanquã inter verum sagapenum, & eiusmodi chalbanum, non multum interfit, etiam si quis antidotos componat: ambo nanq; ad id apta sunt, & serpentibus ac venenis ambo aduersantur, & si chalbanũ sagapeno minus. At opocalpasum exitiale est, multos q; nos sorte quadam vidimus nostræ in ætatis decursu mori, q; myrrham cui opocalpasum admixtũ esse nesciebant, assumpserunt. De industria nanque qui antidotos conficiunt, tanquam optimam talem myrrham imponebant, eo q; viderant ipsam in collyrijs optimam fuisse medicinam: nempe saniam absque mordicatione extenuat, & interdum incipientes oculorũ suffusiones, & adhuc renes aufert. Atque siue in emplastrum, siue in ceratum, siue in extenuans aliquod medicamentum foris imponendum, talem myrrham coniicies, remedij vim augebis: at intra corpus assumpta exitium affert. Hæc vberius ideo narrauimus, non solum, quia orationis series ita expositularet, sed etiam quia hæc nosse plurimum conducit.

De Medicinis in Tertio Ordine positis.

CAP. 12.

Verum iam tempus est, redeamus ad ea considerata quæ sunt in tertium ordinem simpliciũ medicinarum ab Andromacho relata. Inquit enim, Inde quater ternas mutato pondere drachmas. Hæc igitur quo tempore vigent, proculdubio colliges. Rosas primum, ut de pastillis dictum est, exiccabis, illas decerpens quæ plus alijs bene olebunt, & rubicundiores fuerint. Vitabis autem cellas subterraneas, nec vllum medicamentum in ipsis repones: præsertim vero in humidis, in quibus recõdita celeriter cariõsa fiunt. Rosas Andromachus Iridem illyricã adiungit: quæ verba non tanq; inaniter prolata negligenter excipienda sunt: veluti nec cum alijs medicinis patriæ nomen apponit, de quibus paulo post edisserens quid quoq; in genere optimũ sit demonstrabimus. Poliũ ergo & Chamedrys, duo hæc Romam afferuntur, natis in Italia parũ meliora: in aliquot siquidẽ Italiæ locis, haud multũ deteriora proueniunt, illis annis quorũ vniuersum ver humidũ nõ fuerit, sed sicuti sæpe contingit æstiuo tpi simile. Quod si veris cõstitutio licior obuenerit, multa quæ in Italia nascuntur pluribus Crera allatis paria erunt, veluti chamædryes, chamæpitys, hypericon, gentiana, thlaspi, elleborus niger, & id genus alia. At vero quod ad Iridẽ pertinet, secus se res habet. Si enim iris Lybica quæ plurima ex Africa Romam affertur, Illyricã comparetur, tantum ipsi cedit, quantũ cadauer viuo corpori: non tñ alijs in gentibus orta, tã multũ ab illyrica degenerare iris videtur. Iridem igit, velut & reliquas medicinas, odoratiorem semper eligito: Vnũquodq; n. optimũ est quod sui generis odorem vehementiorem habet: is autem ex multorum inspectione manifestus vnicuiq; fit. Ac de gustu quidem perceptis quali-

Quinta Classis.

OOOOO

taibus

tatibus eodem modo censendum est. Id enim optimū medicamentū esse constat, in quo id quod E suo generi proprium est, exuperat: pessimum vero quod sui generis alijs & tenuius & exilius est. Meliora nāq; sunt omni in specie, quæcunq; nec rugosa, nec exilia fuerint: vt quæ conuenientem sibi magnitudinē excellere, peiora sunt ijs quæ bene quidē enutrita, sed tñ astrictiora sunt. Quam ob rem vt dixi, medicinas simplices multas & sapius inspexisse operæpretiū est, & maxime optimas, quæ longo iam tpe sui experientiam ipsi nascendi in ijs præbuere, quæ q; vno ore à peritis medicæ materiæ auctoribus cōmendant. Oēs igit herbarij vnanimes scripserunt, iridē in Illyrio natā, optimam esse: Petroselinū vero, quod in Macedonia prouenit: Asphaltū ē Iudæa aduectū, item & Opobalsamū. Eodem modo & in reliquis. Quorum dotes à regionibus acceptas cū priuatim de vnoquoq; loquimur, nō omitemus. Subiūgit deinde Radicis dulcis succū, & Agrestis napi semē, quæ duo nobis ē Creta q; optima afferunt: p̄cipue q; radix dulcis & ipsa & eius succus.

Scordiū quoq; pulcherrimū Creta mittit: quāq; in alijs regionibus ēt minime contēnendū scordiū reperias. Literarū quippe monumētis traditū est à quibusdā celebribus viris, cū in prælio interēptorū cadauera multos dies insepulta iacuisent, quæcunq; supra scordion forte fortuna ceciderant, multo minus alijs computruisse, ea p̄sertim ex parte qua herbā attigerant. Ob quā rē sanē persuasum est oībus, tam reptiliū venenis q̄ noxijs medicaminibus, quæ corpus putrescere faciūt, F scordiū aduersari. Ac de omni quidē medica materia satis super q; est à Dioscoride quinq; libris disputatum: à quo discere licet vnicuique cū alias oēs notas, tum gustu olfactu q; p̄ceptas, quibus p̄batae medicinæ certissime cognosci, & ab improbatis secerni queūt. In quibusdam vero, oculis quoq; perceptæ qualitates haud parū vtilitatis afferūt. Sed consiliū meū non est quæ ab alijs recte concripta sunt, hoc in opus transferre: verum quæ illi planē omiserunt in medium adducere.

De Opobalsamo & Cinnamomo.

CAP. 13.

Meminīt postmodū Andromachus Cinnamomi & Opobalsami: in quibus post notas à Dioscoride traditas præcipuum illud est, videre prius ipsa, quibus in locis optima nascuntur: Quemadmodum ego feci, qui sciens balsamū vsque adeo pluribus artibus adulterari, vt internosci vix queat, ipsum ex arbore sua resudantem aspicere volui, & ex eo particulā tanq; regulam ceteris agnoscendis apud me semp habere. Didici quoq; quo pacto multis modis adulteratū peritissimos ēt quosq; falleret. Quam rem qui sciunt, diuulgare non consulo, ne obiter improbi fraudes discant, & in malos vsus cōuertant. Nā neque illos approbo qui noxias medicinas describunt, & publicant. Si quis igitur probationes à Dioscoride scriptas, & ab alijs quicūq; de oī medicamentorum materia docuerūt, agnoscēdis simplicibus medicinis admoueat, ipse q; suū ex multa inspe- G citione collectum iudiciū adhibeat, exacte quæcūque secerni possunt distinguet. Quædā enim, vt dixi, vel nullatenus, vel nō exacte, ab adulterinis secerni queūt: vsque adeo falsis vera sunt vtroq; cōfusa indicia: veluti de quo nunc loquimur opobalsami: Nam de Cinnamomo cōtraria ijs quæ de opobalsamo narrauimus, cōperta habeo. Persuasum nanque mihi est ipsum cognitu facilissimū ex oībus esse, illis qui sæpe optimum cinnamomum viderint. Optimum vero consequi nemo potest, nisi repositum ab Imperatoribus intueatur, sex generibus quodāmodo distributū. Siquidem & in hoc ipso velut & in calia optimi ad deterrimum tam magna differentia est, vt suprema calia ab infimo cinnamomo parum distet. Neque vero cinnamomi virtus ad vsū apta lōgo tempore durat: ad triginta siquidē annos quā à principio vim habuit, integram nō cōseruat: nugantur enim qui cinnamomū ex hisce medicinis esse dicunt, quæ senectutē nō sentiant. Atqui ego non centum neque ducentū annorū interuentu, sed pauciorum, si quis ad tantum numerū cōferat, vetustius factum obseruaui. Quo tēpore siquidem Antonino Imperatori theriacam parauī, vasa lignea in quibus eiusdē generis cinnamomū inerat, multa conspexi, alia Traiani, quædā Adriani, non nulla Antonini, qui post Adrianum Imperator fuit, ætate reposita: oīa q; hæc sese & saporis & odoris imbecillitate vehementia que tantū planē superabant, quantū & tpe differe- H bant. Olim ē barbarorum terris arca cubitos quatuor & medium longa Romam perlata cū fuisset, in qua cinnamomi primi generis integra arbor erat, ex eo que M. Antonino Imperatori antidotum quandam composuissē, ipsam ceteris multum præstare deprehendi, adeo vt Imperator quoque ea degustata, medicinæ cōcoctionē, velut in alijs fieri solet, expectare noluerit. Sed statim ea vsus sit non dū integre duobus mensibus elapsis. Antonino subsecutus est Cōmodus, qui nec theriacæ, nec cinnamomi, curā vllā habuit: sub quo non solum arboris illius qd' superfuerat omne dissipatum est, verum etiam quodcūque post Adriani tempora cōportatum fuerat. Quo factum est, vt nunc Imperator noster Seuerus cum me sibi theriacam eo modo conficere iussisset, quo M. Antonino cōfeceram, ex cinnamomo Traiani & Adriani tempore reposito sumere coactus sim: imbecilliorī que planē mihi visa est, & tñ non dū anni triginta intercesserant. Hinc nos optimi cinnamomi notas quasdā necessarias subiicere volumus, Summopere ipsum bene olere, inexplicabilē que præ ceteris bonum quendam odorem spirare, ac calidum gustantibus se multum exhibere, non ita tamen vt mordicando tristitiam palato inferat: colorē denique talē habere, qualem si quis lactū nigrum colorem admisceat, atque cœrulei quem vocant aliquantulum addat. Ex hoc igitur quantum volebam, vt mos mihi fuit, cum accepissem, ramusculos aliquot apud me de- posui,

Aposui, in ea apotheca in qua res meas omnes pretiosas scruebam. Verum ipsa combusta, qua tempestate & templum Pacis incensum est, & hæc & aliæ quinque cinnamomi species quas mihi conquisiueram periere. Nunc itaque cum Imperatori nostro Seuero theriacam componere ex cinnamomo Adriani tempore reposito, quod optimum visum est elegi: de quo etiam utile quiddam lecturis subdere cum possim, id facere non grauabor. Super sunt adhuc ibi multa vasa lignea, quæ varias cinnamomi species continent, quarum nulla tamen veluti truncus in ramos plures diuisus multum attollitur, sed ellebori figuram præ se fert, immo vero damafonij quod est Creta ad nos afferit. Quævis autem cinnamomi species ab una radice seu frutex quidam paruus confurgit, emittitque hæc sex, illa septem virgulta, vel paulo plura pauciora: ue: non æquali tamen omnia longitudine sunt, verum quod maximum est, pedis Romani dimidium non excedit. Vniuersa autem cinnamomi natura similis est quodammodo optimæ casia: quam qui afferunt barbari bisyllabo nomine vocant, cuius prima g & i constant, secunda z & i continet. Ac de cinnamomo quidem hæc enus.

De Reliquarum Medicinarum Probatione & Electione.

CAP. 14.

Agaricum sequitur, quod fraudem nullam admittit. De quo illud modo dicere sufficiet, quod est ab auctoribus ante nos proditum, optimum id agaricum esse quod leuissimum esset: densum vero, graue, & lignosum abiectum: quod autem inter hæc medium est quantum signis tantum & virtute ab utriusque distabit. Subscripta sunt deinde Myrrha & Costus, nequaquam cognitu difficilia hisce qui prius utraq; viderint: nouisse tamen opus est myrrham quam Trogloditicam appellant, antidotis idoneam esse. Hanc quidam Minæam vocant, a loco in quo optimam nasci ferunt. Maxime vero hæc bene olet, & ut modo dicebamus, opocalpsi quicquam admixtum non habet.

Crocum vero Corycium cum omnis antiquitas, tum poetæ quoque laudant. Ego vero Sciantrum corycium in quo gignitur & crocum ipsum accuratius inspexi, vegetum quidem, non tamen odoris magnitudine vel diuturnitate cunctos alios excedentem. Quibus signis & vos optimum ab ignauo iudicare consulo, non autem quia supra modum vegetum sit. Perspicuum est autem optimum crocum summe flauum, & plurimum redolens esse, ac longo tempore vigorem conseruare. Quoniam vero crocum quoque adulterari a quibusdam solet, neque facile id deprehenditur, nisi ab his qui sæpe optimum inspexerunt, satius esse ducio crocum multum ante emptum aliqua in domus cella ad id apta repositum habeamus: quemadmodum paulo ante faciendum docuimus: Magnum siquidem probitatis indicium est, si tale permaneat quale repositum fuit: adulterati namque croci tam color quam odor citissime aboletur. Quod ad Casiam vero attinet, ea me commemorare nunc

Copus est, quæ in multis de medicina libris scripta sunt, Duplum casia si quis cinnamomo egeat iniiciendum. Hoc dictum irridens Satyrus magister meus, unam ex Quinti facetijs ipsum esse dicebat, asseuerantis eos qui duplum casia imponere iubent, si cinnamomo careamus, similia illis facere, qui nos censent si quando falerno caruerimus, illius quod in cauponis venditur duplicata mensura bibere: si quæ panis siliginæus desit, fursuracei duplum comedere. Mihi vero hæc Quinti facetia si de re una quapiam qua per se sola uti velimus afferatur, vera irreprehensibilisque videtur: si de re quæ in societatem multorum veniat, non est eodem pacto vera. Nam cuiuscunque quod solum corpori ad moueri debet, rhus puta, absinthium, iris, gentiana, vel id genus alia aliqua medicina, si quis minus boni duplum loco præstantissimi accipiat, & corpori vel extra vel intra ad moueat, duplicato etiam nocebit. At si multis unum aliquod optimum commiscendum fuerit, quod se aucturum aliorum vires spondeat, si præstantissimum desit, peius nihil erit uti duplo illius qui proprietates eiusdem generis habeat, etiam si deterius hoc illo videatur. Casia siquidem cinnamomo genere proxima usque adeo est, ut ex ipsa quandoque cinnamomum oriatur, spectenturque non nunquam casia arbores integræ, in quibus aliqua cinnamomi virgulta est casia ramis prodeant. Simile quoque istud est, non vino aut pani, sicuti Quintus dicebat, sed vitæ functionibus in

Dextruenda domo, in fabricanda nauis, in tollendis & transponendis oneribus, in omnibus denique vitæ actionibus, in quibus quod peragendum erat ab uno homine robusto, si ablit, a duobus imbecillioribus perficitur. Hæc aduersus Quinti dictum obiecta sint, eo quod mihi reiiciendum omnino non videtur eorum præceptum, qui pro cinnamomo duplum casia imponendum censent, quæquam ego semper cinnamomum imposuerim. Nam quibus ego Romæ antidotos composui, cum vel Imperatorum amici vel diuites essent, facile fuit illis quidem a Regibus petere, ipsi vero cinnamomum emere. Quibus illud etiam addidisse, quando Imperatoribus antidotos composui, me cinnamomo nunquam eguisse, superuacaneum planè fuerit. At Quinti sententiam quam de Carpesio habuit, commemorare tempestiuum: ipsam namque non solum a Satyro, sed ab alijs etiam Quinti discipulis accepi. Imponebat igitur Quintus, ut aiunt, quoties cinnamomum decrat, carpesium, perinde atque viribus optimæ casia non inferius. Ego quoque carpesium idcirco multum mecum attuli ex ea peregrinatione, qua orientis prouincias ad, diligenterque repositum nunc usque plurimum seruo, quod odorem etiamnum et saporem si non qualè prius habebat, certe non dum extenuatum retinet. Est autem Carpesium herba phu appellato genere similis, validior tamen atque aromaticum quiddam plus spirans. Plurimum hæc in Sida vrbe Pamphiliæ nascitur: emiturque propterea illic vilissimo pretio. Quocirca si quis vestrum illuc accesserit carpesium multum emat,

Quinta Clasis.

OOOOO ij cum

DE ANTIDOTIS

cumeum sibi longo tempore duraturum nouerit. Tenuia autem quædam carpesij sarmenta cin- **E**
namomi virgultis similia sunt. Eius duo genera reperiuntur, vnum quod Laertium, alterum quod
Ponticum nominatur, à monte in quo nascuntur vtraque nomen adepta: sed ponticum melius est.
Quod cum plurimum haberem permultis medicamentis admiscui, in quibus phu vocata impo-
ni debuerat: est enim carpesium, vt dixi, phu simile, validius tamen, & qualitatem quandam aro-
maticam, gustum, odoratumque remittens. Inter tam multa autem quæ de calia retulimus, neces-
sum est illud etiam in primis explicemus, quæ casia theriacæ iniicienda sit. Nam Gizi nuncupa-
tam præcipue laudant, secundo autem loco Moto dictâ. Sunt & qui Arebo Daphitenque probent.
Cæterum Gizi quam vocant, in omnibus cinnamomo similem esse superius quoque diximus. Hæc
est quæ ab aromatum peritis perinde atque cinnamomum assidue venditur. Quamquam Androma-
chus iunior caliam à quibusdam fistulam appellatam imponendam arbitratur. Hæc omnibus co-
gnita est, nam & vilius cæteris venditur. Cuius exterior cortex fistula appellatus, quia obuolutus
ipsam repræsentet, saporem & odorem validum habet: interior autem pars debilis adeo est, vt nul-
lum usum præstet. In carminibus itaque patris paulo ante à me transcriptis casia nomen absolute
pronunciatum est: in soluta vero filij oratione fistula nomen casia adiectum est. Atque ab eo series
per eos qui ante nos theriacæ Imperatoribus cõposuerunt, in nos usque deriuata fistulae nomẽ nunc **F**
usque appositum seruat. Iubet deinde Andromachus Indicam Nardum imponere, quã ex eo quia
spica figuram imitetur, nardi spica noiant, quauis radix sit. In qua cauisse oportet, nequis Elutam
vocatam nobis vendat: est autem hæc nardus quæ prius ab vnguentorum structoribus elixata,
vt ipsorum mos est integra venditur. Quam ob rem Ompham barbara voce dictam emere con-
uenit, cuius radici terra adhuc adnexa si contrectetur, nardi odorem habet. Schoenum id est iun-
cum, ex Arabia petatum, ad hæc idem auctor imponere præcipit, nescio qua de causa schoenan-
thum id est iunci florem, à vulgaribus appellatum: nobis liquidem cum florum copia non adlit,
iunco utimur ex Arabia comportato: Cuius summitatem cameli sæpenumero abroserunt, iuncum
dissime namque hunc iuncum cameli pascuntur, secus vias ibi plurimum nascentem. Est autem iun-
cus iste exigui pretij medicina, solaque odoris integritate dijudicanda: quoniã celeriter ipsius odor
expirat. Subscribit posimodum Andromachus, Inde nigrum coniunge Piper, thurisque nito-
rem. Quo in loco non opus est, inquiramus, quid nitor sit, perinde atque cuiuspiam alterius medici-
nae nomen, cum & ex theriacæ descriptione profa oratione ab Andromacho iuniore prodita, &
ex compositionis instituto quod ab eo in nos usque peruenit, medicamenti nomen nitor non sit.
Nam præter duodecim drachmarum piperis longi in sex nigri cõmutationem, tam pater quam filius **G**
eadem de theriaca scripserunt. Quare thure & pipere excepto cum nihil superlit, de quo quis ni-
toris appellationem dictam putet, censendum est Andromachum versus conscribentem id ni-
toris vocabulum thuri epithetum fecisse. Meminit deinde Piperis nigri, dictamni, marrubij, rheij,
rerum omnibus cognitarum. Theriacæ tamen descriptio quæ nobis per manus tradita est, graue
piperi adiectum habet. Magnitudine vero piper hoc aliud superat, corticemque subtiliorem, & mi-
nus rugosum habet. In Rheo quoque fraus committitur. Nam quibus in locis nascitur, simulatque euul-
sum est, ipsum elixant, quo succum remittat, ac tam succum vt sincerum & aquæ impermixtum,
quam rheum exiccatum vt non elixum, ad nos postea mittunt. Quam ob rem scientia opus est ve-
rum ab adulterino secernendi: quam facillime consequuntur, qui suæ spontis rheum aliquando
viderint. Nam elixi pars quæ sub aspectum venit, densa per totum & compacta non est, sed ra-
rior: & gustu tentatum saporem adstringentem, vel nullum vel obscurum remittit, cum tamen si
adulteratum non sit, vehementer astringat. Cito tamen & ipsum foraminosum efficitur. Stœ-
chas autem multa pluribus in locis prouenit: plurima vero in Creta & insulis Stœchadibus quæ
in Ibero mari sitæ sunt, vnde & Stœchadi nomen deductum est. Quæ autem in prædictis insulis
oritur, vegetior Cretica & melior est. Quod ad Petroselinum attinet, laudatissimum Macedo- **H**
nicum est omnibus cognitum. Hoc Estreaticum etiam quidam appellant, à loco in quo nascitur
nomen imponentes: verum exiguum est prorsus quod ibi prouenit, cum & præruptus & angu-
stus is locus sit. Estreaticum itaque, seu Macedonicum hoc quod in omnes gentes affertur, pau-
cum & ipsum in Macedonia gignitur. Sed idem in petroselino macedonico accidit, quod in at-
tico melle & vino falerno contingit. Mercatores siquidem in vniuersa ferme orbis terrarum op-
pida, vt mel atticum, vinum falernum, sic petroselinum macedonicum aduehant: cum tamen in
Macedonia petroselini tantum non oriatur, quantum populis omnibus satis esse queat: verum
in Epiro petroselini multum gignitur, in Cycladibus mellis plurimum. Atque vt mel ex insulis Athe-
nas affertur, sic petroselinum ex Epiro in Macedoniam comportatur, plurimumque immo penè
totum Thessalonicam: vnde tanquam macedonicum quocunque asportatur. Idem in vino faler-
no contingit. Nam cum in exiguo quodam Italiae agro falernum proueniat, complura alia vina
in falerni speciem à vini magistris concinnantur: quæ perinde atque falernina in omnes prouin-
cias imperio Romano subiectas exportantur. Tibi vero si Petroselinum Estreaticum quandoque
deerit, ne peiorem existimes theriacam futuram si aliud imposueris. Non enim si mortiferis ve-
nenis, si venenatorum moribus, aliud ab estreatico petroselinum minus congruit, propterea reli-
quis

A quis etiam morbis, vt torminibus, ventriculo debili, aquæ inter cutem, & id genus alijs, segnius opitulantur, quos in primis sanare theriaca non promittit. Ad hæc est reaticum petroselinū amarum etiam plus theriacam facit, præsertim cum recens adhuc imponitur: nā vt acrimonia, sic amaritudine, hoc alia superat. Resinam postea Terebinthinam addit, quā nescio cur Andromachus omiſſa Chia Libycam eſſe voluerit, Chiam nanque penē omnes meliorem iudicarunt. Quāq; laudo & Libycam si bona sit: sed proculdubio bona semper non est, quemadmodum quæ ē Chio venit. Nascitur quoq; & in Ponto, & in alijs aliquot locis optima terebinthina: verum chia reliquas & odore & sapore vincit. Retulit subinde inter componentia theriacam Andromachus Zingiberem, & Pentaphylum hoc est quinquifolium herbā, quæ duo fraudem non admittūt, & ab omnibus cognoscuntur. Meminit ab his Polij quod omnibus cognitum, nec simile sibi quo adulterari possit quicq; habens. Deinde Chamæpityos, de qua illud tantum referam, multis in locis & odore & sapore præstantiorē chamæpityn gigni, q̄ in Creta: nobis enim inde affertur, ea q; omnes qui Casari antidotos conficiunt, vtuntur. Romæ liquidē in suburbanis prædijs, & chamæpityn & chamædryn repperi multo plus redolentes q̄ Creta aduectas, si tamen continuis imbribus obrutæ nō fuerint. Illud hoc loco non ignorare nos conuenit, cum Creta nobis herbæ affe-
B runtur chartis obuolutæ, in quibus earū nomen scriptū est, quādā inuolucra solummodo incluse herbæ nomen inscriptum habere: quādā vero præter herbæ nomen cāpestres quoq; vocabulum additum continere: ac campeſtres quidem generosiores inuenies, etiam si in planis locis herbæ fermē omnes imbecilliores proueniant. Manifestum insuper est Styracem qui in calamis ē Pāphilia apportatur Andromachum præcipere. Pauciſſimus autem illic styrax nascitur: tantū q; ab hoc vulgari distat, quantum à vino quod in tabernis venditur falernum. Accipere vero styracem oportet maxime pallidum, quem & odorem & saporem quoque vehementissimum habere perspicuum est. Nardum ab hoc Andromachus commemorat, quemadmodum ipse scribit ex Gallia petitam, quam regionem orbis terrarum periti Celticam frequenter appellant. Tria nanq; nullo discrimine vnus gentis vocabula sunt, & eos populos aliqui Gallatas, aliqui Gallos, quidam Celtas nominant, sed vsitatus apud eruditos Celtarum nomen legimus. De reliquis autem deinceps ab Andromacho conscriptis, partim alibi est à nobis in superioribus libris disputatum, veluti de Lemnio sigillo, & rubrica: nam terram potius ipsum quā rubricam appellare cōuenit. Est enim Lemnia rubrica res alia quædam in Lemno nascens, ad alios vsus apta non ad quos Lemnium sigillum quod vocant. Sed de hoc quoq; sicut etiam de reliquis, à nobis est in libris de simplicia medicina disceptatum: partim vero sunt medicis omnibus cognita, nec fraudes vllas admittunt: eorum q; non nulla sunt in theriaca pedestri oratione conscripta, dilucidius explicata, veluti illud, Atq; atram lachrymam Nili quam spina remittit. Acaciā nanq; ex Ægyptia spina collectā Andromachus significat. Hoc loco vnum hoc præterire non possum. Vtūtur omnes ferē Thlaspi, quod ē Creta affertur: at vbiq; nascitur, colore inter luteum & flauum medium, figura rotundum, exiguum adeo vt multoties grano milij cedat. Melius est autem, ē Cappadocia comportatū thlaspi imponamus. Hoc ad nigredinem quā plurimum inclināt, figuram q; non exacte rotundam habet, & antē dictū magnitudinē permultum superat: atq; ab vno latere paruam quandā veluti compressionem præ se fert, vnde & nomen obtinuit. Prouenit autem vt hoc sic & illud in Cappadocia quā plurimum. Ideo q; non absolute quod inde asportatur optimum censendū est. Sed quod peculiariter in Sauro nascitur, nec Cretico, nec passim nascenti, simile. Si quid adhuc aliud superest, quod minus dilucide sit ab Andromacho patre elegiaco versu dictum, planum fiet theriacam legentibus ab eius filio soluta oratione descriptā. Quod enim ille Cecropium mel obscurius appellat, hic Atticum aperte nominat. Centaurion ille nulla adhibita distinctione in carmine pronunciat, hic in prosa tenue apponit, eo q; aliud quoq; centaurium extet crassum appellatum. Idem & in aristolochia fecit, cum præter tenuem aristolochiā, alia quoq; reperiatur quæ crassam radicem habeat: & rursus tertia, quæ rotundam.

De Compositione Theriacæ.

CAP. 15.

Dictum est à nobis & supra eum qui theriacam cōmiscentibus animum semel intenderit, nō iterum neq; tertio id facientem videat opus esse: At optimas quocunq; in genere medicinas vt idem agnoscat non semel, bis, aut ter, sed multoties, & sæpe, quæ singulis in locis optime prouenire feruntur, inspexerit, oportere. Nec satis hæc sunt. Præcepta quoq; ad vsum earum pertinentia habere conuenit: de quibus & si in superioribus iā egimus, denuo tñ per capita de oibus dicere tempestiuū erit. Radices igitur medicinarum quæ in vsum veniunt extento cortice sint oportet, non rugoso: hoc. n. earū maciem significat. Fructus autē vnā cū virgultis & germinibus & calicibus vegeti plures q; eſſe debent: item & quicquid semen includit, tegmina, cortices, inuolucra. Semina vero sicut & radices vegeta sint conuenit: qđ ex eo quia tentū corticē habeant conſiciemus. Liquores & succi neq; diuturnitate arefacti sint, neq; suas qualitates obscuras habeāt: has dico quæ gustu olfactu q; percipimus. Fructus autē qui vnā cū virgultis, folijs, calicibus, ac floribus, in theriacā mittuntur, ij sunt scordij, nepitæ, marrubij, stœchadis, dictamni, polij, chamædryos, chamæpityos, hyperici, centaureæ. Radices autem hæ, zingiberis, iridis, rhei, quinquifolij, costi,

Quinta Classis.

OOOOO iij nardi

DE ANTIDOTIS

nardi Indicæ, nardi Gallicæ, gentianæ, mei Athamantici, phu, aristolochiæ tenuis. Semina vero E hæc, napi, petroselini, thlaspi, ammeos, anethi, fœniculi, dauci, cardamomi. Hæc itaq; tria rerum genera mortarijs Ægyptijs imponi debent, durissimi enim sunt: itaq; minus periculi est, ne pars aliqua inde inter contundendū abrupta medicinis admisceatur. Antedictis autem hæc quoq; ad denda erunt, pastilli scillitici, pastilli viperini, magma hedychroum, piper nigrum & longum, rosa sicca, agaricum, crocus modò siccus sit, terra lemnia, chalcitis vsta, amomum, cinnamomum, calia fistula, balsami fructus, acacia modò tenera aut humida non sit, castorium deniq; & asphaltus, siue fœminino siue masculino genere quis ipsam efferre velit: diximus nanq; sæpius aliàs non animaduertendas esse huiusmodi verborum minutias. Vno autem macerata dissoluenda hæc erunt, myrrha, & crocus, si tamen ita facere tutius tibi visum fuerit, nec ipsum, quia humidus sit, contundere. Succum autem omnes ideo vino macerantur, ut & dissolui queant & laeuigari facilius possint, sagapeni dico, panaceæ, papaueris, cuius liquorem & Meconium & Opium vocant: acacia quoq; cum humida tibi visa fuerit, nec ad contundendum facilis: hypocistidis item & radicis dulcis succus. Thlaspi autem & napi semina primo quidem, sicut & ante me alios fecisse viderā, in mortarium vnā cum alijs contundendis ipse quoq; conijciebam: inde vero cum ipsa pilæ concavitati adherere ob tenacitatem animaduertissem, melius esse duxi sola in alio mortario prius attrita, vino superinfuso macerare quoad exacte dissolueretur, dissoluta q; postmodum cæteris quæ peculiariter vino macerantur ac diluuntur, admiscere. Thus quoq; per se solum in mortario seorsum laeuiter comminueres satius est, ne in placentam coeat: tum vbi cōminueris & excusseris pròptum habere, quò reliquis vino maceratis cum placuerit ipsum inspergas: Nam gummi & vino macerare & ipsum per se vel cū thure laeuigare necesse est. Hæc igitur quo diximus pacto omnia præparentur, atq; humida quidem ex vino dissoluantur: sicca vero in puluerem redigantur. Quo tempore autem cuncta simul admiscenda erunt, resinam terebinthinam in vase duplici primum colliquabis, tum styracem & chalbanum antea pistillis ferreis rutabulis'ue confracta, mellis q; crudi parumper instillabis. Hæc simul atq; effuderis, & manibus complanaueris, mellis aliquantulum, resinæ quoq; liquefactæ affundes. Atq; ita vase cooperto ea rursus liquari permittes. Melius est enim his rebus impositis, non dum mel admiscere, sed ad operto vase quod aquæ innatat, ut elixentur permittere. Interea dum ista liquefunt, maceratis ex vino rebus siccas medicinas eatenus adijcies & cōmisceris, quousq; spissa satis esse videantur. Atq; ita paulo post in mortariū magno cochleari liquefacta, tepida tñ trāspones, robustus q; aliquis homo tunc ipsa commisceat. Ac postea q; bene inter se commista, atq; in vnum corpus redacta fuerint, densa q; iam quodammodo videri cœperint, mellis & moderate decocti & proculdubio despumati partem quandam superimittes: postea contusarum medicinarum portionem quandam: deinde rursus mel inferes: postea liquefacta, sed tepida infundes: postremo quicquid pulueris & mellis supererit, admiscebis, vehementer omnia magno in mortario magna q; tudecula commiscendo. Cum vero tudeculæ ductu in mortario omnia coierint, tum in pilam transferenda sunt: atq; ferreis rutabulis diligenter extersis ne quid rubiginis insistat sine intermissione contundēda. Rutabulum autem opobalsamo subinde perunges, ne subigendarum rerum tenacitate obtineatur, ne'ue difficulter se inde attollentibus resistat. Ut igitur opus expedite procedat, imas rutabuli partes opobalsamo frequenter inūgere conueniet, atq; opobalsamum hac vna in re totum absumere. Melius est autem in Sole theriacam commiscere: sic enim citius in vnū corpus simplicia coeūt: dum q; hoc faciemus pilam in qua antidotus admiscetur, operiemus. Ac post quatuor aut quinque dies rursus in Sole ipsam eodem modo cōmiscerimus: idem q; sex, septem'ue dierum spatio interiectio iterum atque deinceps repetemus, donec menses duo vel quadraginta dies saltem compleantur.

Hactenus quæcunq; cōscripsimus ad Theriacæ vim augēdam pertinent: quæ vero mox subiungam, ad colorē. Danda nanq; est opera, ut nigram theriacam efficiamus: nam hoc etsi quo paucio in consuetudinem venerit, nesciam, quisquis tamen hunc colorem non cōsequitur, irridetur, quanq̃ nulla coloris qualitate medicamentū vis immutetur. Nigra vero theriaca non erit, si chalcitis flaua lutea'ue dum vritur, euaserit: chalcitidis enim particula quantūvis minima colore suo, theriacam inficit. Ne quis igitur hac quoque in re frustretur, ijs quæ dicam, mentem adhibeat. Quatuor chalcitis drachmas cum theriaca solummodo capiat, multo plures assare conueniet hoc modo. Conijce in exiguum ollam chalcitis crudæ drachmas non pauciores quadraginta: postea succensis carbonibus ollam absq; operculo, in medio prunarum statue: cum q; liquefactam chalcitin videris, ac quæ leuissima & spumosa pars eius est innatare, statim ollam ab igne amoue, humi q; colloca, nec ut aliquando solebamus, sicuti qui ignem accendunt, ipsi insufflabis: mirandum est enim quantum ita faciendo luteus flauus q; color emergat. Non tamen in Sole collocanda erit: sed in umbra, donec frigeat, omittenda. Hinc postea id solummodo capies quod superne spumeum fuerit, quod q; neq; luteum, neq; flauum, neq; pallidum est. Deinde experiundi gratia aliquantulum eius quod probaueris, accipe, atq; comminue: & num quis ex supradictis coloribus appareat, inspicere. Nam si qualis accepta est, viridis aut cinerea manserit, drachmas quatuor ipsius impones: talem nāq; chalcitin exiguum inuenies, etiam si multam exusseris. Quæ ad componendam

A nendam conficiendam q̄ theriacam requirebantur, omnia iam absoluimus.

De Theriaca ex Descriptione Damocratis.

CAP. 16.

Cvm vero Damocrates atq; Crito in quibusdam ab hisce discrepēt, opportunum mihi quæ ab hisce quoq; auctoribus conscripta sunt, subiicere visum est, Ac prius quidem Damocratis Theriacam qui omnem eius vsum dilucide explicuit. Ea autem est iambicis versibus, vt mos hominis fuit, descripta: commoditatem q̄ hanc habet, vt non solum memoria facile contineri, sed nec à suo ordine perueri possit. In eo itaq; libro in quo antidotos describit, ab vsu ipsarum comuni, & à proprio theriaces ipsius, initium sumens, ita exorditur,

ANTIDOTOS paratas habere decet.

Aduersus omnes virulentas feras,
Quarum reperta & videntur gratia.

His & venenis obuies lethalibus,

Illi propinans ante, cui metus subest

Ne quid veneni capiat mistum cibis.

Post vero illis, qui putauerint simul

B Ferale quicquam se indidisse cum cibo.

Ingestam vbi reiecerint escam tamen,

Bis illam ter q̄ præcipe passis dari,

Donec veneni signa permanent mali.

Hanc, læsit serpens quos obuies, dabis.

Lethalis dentes vel quibus impressit fera,

Aspis, Ceraſta, Dipsas, atq; Hydri graues,

Echidna tristis, spumei Canis furor:

Hæc quippe morſu cuncta lethali nocent.

Obstat marinis omnibus belluis quoq;

Et quas minutas bestias vocant, Apes,

Crabrones, Vespas, & rigentes Scorpíos,

Mures araneos, rapax Phalangium.

Huius antidoti, plus vna drachma dato,

Quantum nux magna, sed parumper amplius,

C Admistis vini puri cyathis decem.

Male commorſis, non sufficiet semel

Haurire, metu si quis absolui velit,

Necesse antidotum ingerat frequentius.

Hæc vsum ad omnes commodum morbos habet,

Qui corpus longa male afficiunt mora:

Ad febris orbe tranſeuntis impetus,

Rigorem quoq; qui longum tempus manet,

Membris pernitiem afferens præcipuis:

Inclufum q̄ vtero flatum, & flatum coli,

Et quos vesica torſit, vel renes diu,

Siue adſit vlcus, siue torqueat lapis.

Miscebis & quos hepar infestat male,

Et qui è pectoris sanguinem recessibus

Aut fœculenti virus excreant sputi,

D Feratur vndecunq; sit pulmo licet.

Infunde ruptis, atq; conuulsis, quibus

Intus diruptum est atq; conuulsum aliquid.

Sic cura tristis, sic q̄ pelletur dolor.

Hanc, egre sumptum cum coquit calor cibum,

Quamuis des modicum, coquet calor cibum.

Quos q̄ ira motu semper asperat graui.

Iter profectis longius, quibus diu

Vt necesse tabidis lymphis erit.

His vero, pendent quantum oboli tres, dato,

Caldæ q̄ cyathos quatuor, aut tres aque

Miscebis, ante cibum tres horas vel amplius.

Læsa est quibus vesica è passo dabis,

Et sputo sanguinis, & stomachum vlceraſis.

Quibus at totum stillat in pectus fluor,

Ex aquæ, in qua coxerit pugillulus

Quinta Classis.

OOOOO iij

Polij

- Polij Teuthrij, præstat hoc Cretico,
 Præstat q̄ Scythico, Pontico est præsentius: E
 Nam continebis fluxionem citius:
 Tribus cyathis præbe, vt est dictum modo.
 Quidam si magnus vrget aurium dolor,
 Passo dissoluunt antidorum Cretico,
 Et sic meatus illita lana obstruunt.
 Optimam quisquis theriacen cupit,
 Selecta cuncta cum reliqua habeat:
 Tum vero pastillos viperæ quos vocant,
 Sicut docemus, ita instructus paret,
 Nam hi inter commiscenda præstant admodum.
- A**ESTATE grandes vyperas bis decem
 Venator, captas quas recenter attulit,
 Sumat, vel plures etiam, nam parum est
 Quod inde tollens ponat in antidotum. F
 Nempe qua caput instat, abscindat primum,
 Quod æquet digitorum mensuram trium;
 Qua cauda vibrat, amputet plus parum.
 Id dum recentes, dum q̄ vigentes adhuc,
 Agat oportet. Post vt anguillas, exuat
 Pelle, tum pingue & intestina abiiciat.
 Quod restat, lauet, in ollam mittat, atq̄
 Anethi sicci congerat manipulum,
 Aquæ quod satis. Hinc ferueant tam diu,
 Facile donec recedat à spinis caro.
 Ollam tepenti tunc ab igne transferens,
 Solam reuulsis ossibus carnem legat.
 Æquali carnem panis æquet pondere,
 Polline panis confectus triticeo.
 Hac soluens ambo, dum læuigas, modicum G
 Iuris affunde: mox inde placentulas
 Paruas confinge, quibus siccis vtitor.
 Pastillos hæcenus diximus è viperis:
- D**ICEMVS Scillæ. Cum messis falce cadit,
 Et magnam bene & albam scillam cape.
 Vndiq̄ siccum detrahito corticem.
 Radices, q̄ lignosæ, cunctas amputa.
 Nudatæ pultis vbi loricam feceris,
 In furnum mittes. Cum assam satis duxeris,
 Sumes exemptæ quod libræ pondus leuet.
 Contundes. Læuigatæ diligentius,
 Adde farinam, libræ pondus mediæ,
 Erui farinam parumper vstulati.
 Statim vt eruo scillam obligaueris,
 Paruas, sicut dixi, conficies rotas. H
 Et mox siccatas conde quo vase libet.
- M**ISTVRAM istam sumere, vt nuper inuentam,
 De Theriaca loquor, si ambigis, audi.
 Ferunt hac vsum Mithridatem quoq̄.
 Deuicius ergo venenum cum liberis,
 (Coegit fatum peruicax) hausit miser,
 Nullam q̄ solus vim veneni pertulit,
 Sed ense vitæ terminauit circulum.
 Natas iam ferox abstulerat potio.
- N**E tardes igitur. Scillinos orbes quater
 Denis assume, bis q̄ drachmis quatuor.
 Pastillus viperæ pendat senas quater.
 Opium quoq̄, nigrum piper, & magma
 Quod olim veteres dixerunt hedychroon.
 Radicis succum dulcis exiccatum

- A His addē, drachmas impleat duodecim.
 Tantundem pendat siccae pondus rosae,
 Et cinnamomum, & balsami praestans liquor,
 Et iris quam superbum fert Illyrium,
 Napi q̄ semen, & albens agaricum,
 Cretense scordium. Rursus dimidium
 Pontica radix pendat, petroselinum,
 Et myrrha, & stœchas, & Corycium crocum,
 Radix pentaphylli, & quam nepitam vocant,
 Marrubij semen quod globuli continent,
 Album piper, longum piper, nardi Indicæ
 Spica, & terebinthina, thus q̄ masculum,
 Atq; album costum, dictamni q̄ herba etiam,
 Et iunci non festucae flores Arabi,
 Et siccum nec madescens vnquam zingiber.
- B Cortices demum nigrae iunge casiae,
 Senas impono drachmas istorum quoq;
 Inde quæ drachmas singula pendant duas,
 Contusa thlaspi, polium, phu pontica,
 Gummi, chamaedrys, atq; lentescens styrax,
 Et gentiana, & acorus, meon etiam,
 Et cardamomum, & semen foeniculi,
 Hypocystidis succus, assa chalcitis,
 Semen hyperici Creticum sit tamen,
 Acaciae succus cum humens tum bonus,
 Celtica nardus, & sigillum Lemnium,
 Et ammi, & chamaepitys, atq; seselis,
 Anisi dudum siccati semen quoq;
 Racemum amomi, malabathri folium,
 Cuiusq; drachmas nos imponimus duas:
- C Quaternas quidam, sed non recte faciunt.
 His rursus panax, lachrima q̄ chalbanī,
 Addatur semen dauici Creta genitum,
 Nuper q̄ lectum sagapenum, & castorium,
 Centaurium q̄ non recens sed Creticum,
 Aristolochia tenuis & sicca probe,
 Impone drachmas singulorum bis duas.
 Aequum q̄ statue pondus asphalthis bonae:
 Duas huc quidam conferunt, quod improbo.
 Confeci saepe quo diximus pondere.
 His tu Falernum quod satis, funde optimum,
 Mellis recentis attici libras decem.
- Horum cum succi quædam sint, illa semina,
 Folia hæc, radices ista, illa lachrima,
 Gignantur q̄ in metallis haud compluscula,
- D Mero dissolue lachrimas, succos, atq;
 Metalla, donec mellis acquirant modum.
 Immitte quæ supersunt, sicca omnia,
 Contusa, denso q̄ transmissa cribro.
 Mel rigans adde, bis ter quod deferbuit.
 Repone, & serua vasculis non ligneis,
 Sed vitreis, argenteis q̄, & corneis,
 Et stanneis, & testaceis, densis tamen.
- Trades bibendum antidotum nec protinus,
 Nec moræ quam siccauerit prolixitas.
 Id si contingat, isio corriges modo.
 Infunde mellis quod sat, quod que ferbuit,
 Nam ipsum postquam commiscueris diu,
 Vtile habebis, quod corruerat dies,
 Peiore at multum sorte q̄ mistum semel.
- * Ipse igitur se Damocrates ab Andromacho dissentire significat, cum inquit, Quaternas quidam,

DE ANTIDOTIS

dam, sed non recte faciunt: & rursus, Duas huc quidam conferunt, quod improbo. Illud quoque E
perspicuum est, apertam magis esse theriacę descriptionem ex iis quę à Damocrate scripta sunt.

Alia Theriacę Descriptio Hexametro carmine.

CAP. 17.

CVM vero aliam etiam theriacę descriptionem apud me haberem, carmine & ipsam comprę-
sam, mihi eam quoque non omittere satius esse visum est, sed quo modo ipsam à superioribus
medicis accepi, subscribere, seruata singularum medicinarum ratione. Est enim cęteris omnibus
& planior & concisa magis hæc descriptio.

PONDERA quę rerum, rerum quis possit acervus

Condere Theriacen, paucis aduerte docebo.

Semina principio dauci, panacis q̄ liquorem,

Et tenuem (inuentum Chironis) centauream,

Orta q̄ Syriacis grauē olentia chalbana terris,

Serpentes q̄ fugans olido nidore bitumen,

Nec non immeritis exempta virilia fibris,

Et longam (Lucinæ munus) aristolochian

Difficiles tenui partus radice leuantem,

Accipies: geminas suspendant singula drachmas.

Inde meon, seselim q̄ breuem, polium q̄ senescens,

Fœniculum, gummi, chalcitim, thlaspin, amomum,

Balsameos fructus, duplicato pondere sumas,

Atq̄ humilem quercum Graii dixere chamædryn,

Et pinu similem foliis & odoribus herbam:

Quam q̄ bonus primus q̄ manu Rex Gentius olim

Montibus in patriis radicem vullit amaram,

Conspectam q̄ suo donauit nomine: quam q̄

Lemnus habet terram, pharetrata signa Dianæ:

Atq̄ Paretonium fudit quem spina liquorem,

Compressum q̄ rubra flauum ex hypocystide succum.

His folium stagnis fœcunda quod India nutrit,

His styracem iungas, inimica q̄ flatibus ammi,

His & ab Assyria sagapenum gente petitem,

Et cardamomi præcluso cortice semen,

Hyperici q̄ comas, nardum quam Gallia mittit,

Phu quam Pontus alit, Cretei ruris alumnum

Anisum multis Celebratum laudibus adde.

Rursus quę drachmas attollant pondere senas

Marrubium capies, dictamnium, zingiber inde,

Et piper oblongum, caliam q̄, crocum q̄, rheum q̄,

Et nepitam, & myrrham, & costum, iunci q̄ rotundi

Diues odoratos quos dat Panchaia flores,

Atq̄ apium petras quod amat, numerum q̄ suorum

Quinq̄ tibi referens foliorum nomine gramen,

Emissum q̄ tuo frondens terebinthe liquorem

Stripite, & hinc alio stillantia caudice thura,

Hesperio q̄ mari nascentem stœchada, quam q̄

Proxima iam nostris nardum tulit India terris.

Hinc noua congeries sequitur, syluestria primum

Semina buniadis, cinnamomum, scordion herba

Allia quę redolet, tantum q̄ imitatur odore.

Adde nigrum dulci pressum radice liquorem.

Adde etiam Illyricis crescentem in collibus irim,

Quę q̄ Palæstino de palmite balsama sudant,

Siccata q̄ rosam, lectum leuitate loco q̄

Agaricum: senas bis tollant singula drachmas.

Inde piper capies geminato pondere nigrum,

Atq̄ suo fundunt quem secta papauera succum

Vulnere, tum læti nomen sortita coloris

Magmata, rem nostro memoratam carmine, nec non

Vipereos orbes, scillæ quos pondere duplo

Pastilli superent, spumati deniq̄ mellis

Et vini quantum satis est infunde falerni.

Reliquum

F

G

H

A Reliquum adhuc mihi videtur ad explendam vniuersam theriacæ doctrinam, si quid Crito vel aliter q̄ supra diximus senserit, vel omissum aliquid addidit, subiungere.

Quæ Crito de Theriaca scripsit in Tertio de medicamentis libro.

CAP. 18.

Quod ad pondus itaq; medicamentorum attinet, conijcit quidem & ipse piperis nigri drach. xxiiij, quemadmodum Andromachus filius, & longi sex: imponit q̄ chalcitidis vsta 3 iiij, & mellis atticī libras decem. Viperas autem vere iam delinente ætate que incipiēte, aut vindemiæ tempore comprehendere iubet, vitans nimirum æstatem omnem, excepto principio, vsq; ad canis ortum, & inde sequens tempus quod aliqui Oporam id est fructuum prouentum, peculiariter vocant. Tunc in hominibus quoq; bilis plurimum excrescit. Vindemiæ autem tempore, quod autumnī medium est, colligendas primo apprehendendas q̄ vīperas censet quæ magnæ corpulentæ q̄ sint, anetho q̄ imposito elixandas, deinde carnem ex decem viperis collectam vnīs filiginei panis vncijs commiscendam, atq; ita pastillos conficere suadet. Ad hunc modum & Scillas messis tempore, quo præcipuē vigent, euellere iubet. Planum est autem messem ipsam appellare illud æstatis spatium, quo triticum rustici metunt. Euulsas deinde in furno quoad satis sit, assare præcipit: gypso luto ue circumtectas, calido cineri subiicere, donec planē tostæ sint: tum extra-
Bctis medullam excipere (ita enim Crito scillæ medutullium nominat) eam que atterere: vnam q̄ erui partem duabus scillæ admiscere: rotulas q̄ sic demum conficere, & eas in vmbra siccare mandat. Quod ad contundenda verò medicamenta pertinet, accuratē singula docuit. Nam mortario pellem obsiticiē circumligandam præcipit, atque ita in medio perforatam, vt per id foramen non modo rutabulum imponere possis, sed etiam eo sublato manum quoque & cochlear immittere, quò per eum contusa & quæ cribranda sunt eximi queant. Rursus quoque alia pelle opus fore dicit quæ angustius foramen adhuc habeat, vt per ipsum tudecula solummodo demitti possit ad cōtundendum ea quæ in mortario fuerint: hanc q̄ priori superimponendam dicit, nec prius adimendam, quàm excitatus inter contundendum puluisculus subsidat. Eodem modo quoque cum per cribrum contusa transmittemus, desuper contegere quæ excutimus nos admonet, nec ea prius aperienda, quàm cribrum mouere pridem desuerimus, de quæ sublato cribro quicquid inhæsit, pen-
na deducere.

GALENI DE ANTIDOTIS LIBER SECVNDVS

Iulio Martiano Rota Interprete

De Mithridaticis & Alijs quibusdam Andromachi Antidotis.

CAP. I.



Xposita à nobis integro volumine Theriaca, vt reliquas antidotos breuibus explicemus, efficiet, quas mihi hoc in libro recensere propositum est, ab ea quam Mithridaticam vocant initio sumpto. Hæc enim aduersus q̄ multa venena plus etiam q̄ theriaca valet, quamuis ic̄tus viperæ sanare minus possit. Qm̄ vero Andromachus & hanc, & deinceps optimas quasq; ferme antidotos, literarum monumentis commisit, cum de medicamentis ageret quæ intra corpus assumuntur, idcirco & ipse eas omnes, quo ordine ille cōscripsit, subiungam. **E** Antidotus Mithridatica, priuatim ad Omnia Venena faciens, et ad Malas

D Internasq; corporis Affectiones efficax. Radicis dulcis 3 vii, oboli iiij: opii 3 iiij, ob. ii: castorii 3 vi, oboli ii: polii 3 v, ob. ii: costi 3 vi, ob. ii: spicæ nardi 3 vii, ob. iii: casia 3 v, oboli ii: thuris 3 vi: seseleos 3 v, ob. ii: succi hypocythidis 3 vi: acori 3 ii: scordii 3 vi, ob. ii: folii 3 iiij: * salis 3 v, ob. iii, alii 3 vi immittunt: cypheos 3 vi, ob. ii: myrrhæ 3 vi: croci 3 vii, ob. ii: cinnamomi 3 vii, ob. ii: styracis 3 v, oboli iii: semini dauci 3 vi, ob. iii: zingiberis 3 vii, ob. ii: phu Pontici 3 ii: petroselinii 3 iiij, ob. iii: nardi gallicæ 3 iiij: seminis fœniculi 3 iiij: nardi Indicæ 3 iiij: hyperici 3 ii: acaciæ 3 ii: gentianæ 3 iiij, alii vero duas imponunt: anisi 3 iii: thlaspeos 3 vi, ob. iii: meu Athamantici 3 iiij, alii 3 ii: rosarum siccarum 3 iiij: gummi 3 ii: cardamomi 3 iiij, alii 3 ii: iunci odorati 3 vi, ob. ii: opoponacis 3 vi, oboli ii: opoballami 3 vi: galbani drach. vii: scinci 3 ii, oboli ii: terebinthinæ drach. vi, obo. ii: vini Chii quod satis est: mellis Attici despumati quod sufficit. **E** Aliter Mithridatica hæc Antidotos componitur ex Antipatri & Cleophrantis traditione. Myrrhæ drach. vii, ob. iii: spicæ nardi tantundem: croci 3 vii, obo. iii: opii drach. iiij, oboli ii s: styracis 3 v: castorii 3 vi, ob. i: cinnamomi 3 vii, ob. iii: polii 3 vi, oboli iii: scordii drach. vii, ob. iii: zingiberis tantundem: costi drach. vi, oboli iii: piperis longi 3 vi, ob. iii: piperis albi 3 v, ob. ii: seselis drach. v, ob. ii: abrotoni drach. v, obo. ii: petroselinii drach. xiiij: seminis dauci drach. vi, obo. iii: casia drach. v, obo. iii: thuris drach. v, obo. ii: succi hypocythidis drach. vi, obo. i s: nardi Gallicæ 3 iiij: seminis fœniculi drach. iiij: foliorū malabathri drach. iiij: acori, phu pōtici, sagapeni, fructus

* galii aliq le-
gūt. g. γελίου

DE ANTIDOTIS

fructus balsami, hyperici, iridis Illyricæ, singulorum drach. ii: rubricæ Lemnig, cypheos, lumbo-
rum scinci, singulorum drach. vi: acaciæ, gummi, cardamomi, securidacæ, singulorum drach. ij: se-
minis thlaspeos drach. vi, ob. iij: gentianæ drach. iij, alij ij: anisi drach. iij: rosarum exiccatarum
drach. iij: mei Athamantici tantundem: florum iunci rotundi odo. drach. vi, ob. ij: opopanacis
drach. vi: chalbanī drach. vi, ob. ij: opobalsami tantundem: aristolochiæ. drach. i: hyssopi 3 ij: mar-
rubij drach. i: chamæpityos drach. ij: roris marini drach. v: terebinthinæ drach. vi, ob. ij: mellis at-
tici quod sufficit: vinum ne iniicito. *☞ Antidotus in Orbanum Indum velata ad Fœtus ejciendos.* Myr-
rhæ drach. xv: croci drach. xvi: nardi Indicæ 3 xvi: cinnamomi, calicæ, panacis, singulorum drach.
xiii: amomi drach. viij: scordii drach. v: florum iunci odo. 3 viii: mei Athamantici drach. iij: succi
rosarum drach. xii, obo. ij: phu drach. v, ob. ij: hyperici drach. v: zingiberis drach. vi: piperis ni-
gri drach. vi: piperis albi drach. viii: styracis drach. v, ob. ij: seminis fœniculi sylvestris 3 ij, ob. iij:
piperis longi drach. v, alij drach. vi: costi 3 vii, ob. iij: seminis trifolii 3 v: gentianæ, drach. iiii: aristo-
lochiæ rotundæ drach. iiii: polii drach. v: radicis trifolii drach. v, ob. iij: cardamomi drach. v: radi-
cis echii drach. iiii: thuris drach. vi: petroselini drach. vi: verbasci 3 vi: seseleos drach. v: cumini
Æthiopici drach. iij: fructus balsami drach. iiii: nardi Celticæ drach. vii: terræ sigillatæ drach. iiii:
opii drach. iiii, ob. iij: cachryos drach. iij: cypheos drach. iiii: iridis Illyricæ tantundem: succi man-
dragoræ drach. vi, ob. iij: sagapeni drach. iiii: opopanacis drach. iij: anisi drach. iiii: succi hypocy-
stidis drach. vi: terebinthinæ 3 v, ob. iij: castorii drach. v: opobalsami drach. xvi: seminis rutæ syl-
vestris drach. iij: chalbanī 3 iiii: seminis napi tantundem: medullæ ceruinæ 3 vi, ob. iij: vnguenti
nardinī drach. xx: sanguinis hædini exiccati drach. v, obo. iij: sanguinis anserini tantundem: san-
guinis anatis drach. iij, oboli. iij: succi buphthalmi Ægyptii 3 viii: vini Chii, mellis attici, quod suf-
ficat. *☞ Antidotus Panacea quæ utor multa promittens ab Aphrodis accepta.* Cinnamomi 3 viii: amomi
drach. iiii: calicæ fist. nigræ drach. xvi: croci drach. xvi: iunci rotundi odo. drach. v: thuris drach. v:
piperis albi drach. iiii, ob. iij: piperis longi 3 i, oboli. iij: myrrhæ drach. xi, ob. ii: nardi Indicæ drach.
xi, ob. iiii: nardi Gallicæ drach. xvi, ob. ii: rosarum exiccatarū drach. vi: costi drach. ii, ob. iij s: opo-
balsami drach. iiii, ob. ii: succi Cyrenaici 3 iij, alij drach. iiii s: stœchadis drach. v, ob. ii: radicis trifo-
lii drach. iiii, vel eius seminis drach. iij: florum scordii drach. xi, ob. ii: polii Cretici drach. vi, ob. ii:
asarī drach. ii: acori 3 iij, ob. iij s: seminis dauci tantundem: seminis anisi 3 ii: cumini Æthiopici tā-
tundem: rhei Pontici 3 v, ob. iij s: seminis napi sylue. drach. iij, vel seminis napi sativi tantundem:
phu pontici 3 ii: mellis despumati quod satis est. *☞ Antidotus Incomparabilis quæ ipse composui faciens
ad omnes Malas internasque corporis affectiones ex Nicostriati traditione.* Radicis dulcis, folii malabathri, G
opobalsami, agarici, cinnamomi, singulorum drach. xiii: zingiberis, semi. trifolii, amomi, semi. ru-
tæ sylvestris, baccarum iuniperi immaturarum & exiccatarum, singulorum drach. xv: petroselini
* singulorum, drach. viii: succi papaueris tantundem: castorii, piperis longi, succi hypocy-
stidis, cypheos, singulorum drach. xii, ob. ii: polii, piperis albi, seseleos, bdellii, singulorum drach. xv, ob.
iij: florum iunci odorati, costi, singulorum drach. xii s: seminis dauci, thlaspeos, singulorum 3 xiii:
spicæ nardi 3 xxiii: radicis calicæ nigræ 3 xvi: thuris, panacis, opopanacis, singulorū drach. xii: aco-
ri drach. v: scordii 3 xvii: fœniculi, nardi Gallicæ, gentianæ, florum rosarum, gummi, succi Cyrenai-
ci, cardamomi, thymiamatis ammoniaci, radicis echii, succi aparines, singulorum drach. viii: saga-
peni, hyperici, succi acaciæ, iridis Illyricæ, singulorum drach. xiiii: myrrhæ quæ stacte dicitur, 3 xx:
croci drach. xxx: styracis drach. xi, oboli. ii: phu, mei, dictamni, semi. napi, calami odorati, singulo-
rum 3 viii, aut x: anisi, asari, agârici, scinci, singulorū drach. vi: terebinthinæ * singulorum drach.
xiiii, ob. iij: galbani drach. v: sanguinis anatis fœminæ, sanguinis hædi, singulorum drach. vii: pi-
peris nigri, piperis longi, singulorum drach. xxiiii: crocomagmatis tantundem: radicis quinque-
folii, origani sylvestris, marrubii, stœchadis, ammeos, chamædryos, chamæpityos, centaureæ mino-
ris, aristolochiæ minoris, singulorum drach. vi: sigilli Lemnii 3 xxx: sanguinis anserini, testudinis H
marinæ, rhei pōtici, singulorum drach. vii: mellis Attici quod sufficit. Datur ad magnitudinem
fabæ ex aqua. Facit etiam ad quartanam, cæterum ad venena plus aliis antidotis valet. *☞ Antido-
tus Aely Galli, quæ Casarem liberauit, hac & Charmes utebatur, ad ebibita morsuque illata Venena faciens: quaq;
si Luca in quibus reptilia diuersantur, asperseris, ea fugabis. Valet etiam ad Fluxiones Oculos aliud ne quodvis cor-
poris membrum infestantes: eas enim exiccat. Tristem animi Habitum & longas intermittentes quæ Febres soluit.
Mulieribus præterea, quæ Difficulter purgantur, auxiliatur. Fœtus sine dolore ejcit. Tabidis demum ex quatuor
aque cyathis ad nucis auellanæ magnitudinem sumpta prodest: Vt à Vipera percussis ex vino. Myrrhæ drach.
duodecim, croci drach. xiiii, nardi drach. xiiii, iunci rotūdi odorati drach. xii, cinnamomi drach. ii,
amomi drach. iiii, chalbanī drach. xi, terebinthinæ drach. v, piperis albi drach. x, piperis longi
drach. xxxii, costi drach. viii, thuris drach. xii, succi papaueris tantundem, scordii drach. viii, polii
drach. iiii, succi hypocy-
stidis drach. duodecim, seseleos drach. xiiii, opobalsami drach. xii, castorii
drach. viii, petroselini drach. xviii, seminis dauci drach. xvi, opopanacis tantundem, mellis Attici
sestaria duo. *☞ Antidotus Zopyria.* Cinnamomi drach. iij: myrrhæ, quæ stactē dicit, drach. v: nar-
di drach. v. Exhibetur ad nucis auellanæ magnitudinem ex tribus aque cyathis, postquam annus
transactus fuerit.*

A

De Mithridatica Antidoto ex Damocratis traditione.

CAP. 2.

QUAS hac tenus antidotos descripsimus, omnes sunt ab Andromacho conscriptæ. Cum vero quæ carminibus explicatæ sunt, ad ponderis sinceritatem medicamentorum quæ memoriam maxime conducant, idcirco conscriptas quoque à Damocrate antidotos memoratu dignas subiunximus, principio rursus à Mithridatica sumpto.

Antidotus quam viri quidam insignes admodum, Mithridatium vocant, medicamen ad omnes malas corporis affectiones efficax, quam quæ omnis antidoti vicem præstare dixerunt.

MIRRHAE Arabicæ Troglodyticæ drachmas decem,

Croci decem, agarici decem, zingiberis decem,

Cinnamomi decem, spicæ nardi decem,

Thuris decem, et item thlaspis decem.

At felis, & succi balsami, & iunci odorati,

Stœchadis, costi, chalbanî, terebinthinæ,

Piperis longi, ac castorij Pontici,

Succi hypocythidis, styracis bonæ,

B Opopanacis, & folij malabathri recentis,
Pares singulorum bis quatuor drachmas capit.

Cassia vero nigræ septem, & polij septem,

Piperis albi septem, scordij tantundem

Cretici tamen, & seminum dauci tantum.

His pender fructus balsami drachmas pares.

Æquale pondus cyphi prædictis dabit.

Sunt qui par velint bdellium adijcere.

Hinc nardi Celticæ repurgatæ, & gummi,

Et petroselinî, & opij meconium quod vocant,

Et cardamomi, & seminum fœniculi,

Et gentianæ, & foliorum rosæ,

Drachmas imponunt singulorum quinas,

Parumper tamen descendat lanx propensius:

Pendat dictamnium Creticum tantundem.

C * Rursus anisi & tres asari & *

Acori quæ, phu quæ, sagapeni quæ tres.

Mei quæ Athamantici, & acaciæ,

Et ventris scinci, & seminum hyperici,

Singula drachmas hæc pendant duas semis.

Vini & mellis adde quantum est satis.

Satis est quantum hæc apte iungas simul.

QUONIAM vero Damocrates Cypheos mentionem facit, id quæ etiam ipse componit, recte ideo illius quoque compositionem adscripsit, quam deinceps subiiciam.

Cyphi vero nec mistum quicquam est, nec simplex

Ipsam fert tellus vlla, non pressus herbæ succus.

Ægyptus quosdam hoccum placat Deos,

Incendit, & quo dicam parat modo.

A. ibidem. **C** Passam et albam sumunt, & pinguis simam,

D Corticem demunt, eximunt vinacea.

Pulpe contusæ & subactæ diu,

Drachmas accipiunt quatuor bis decem.

Exustæ terebinthinæ pondus idem

Addunt, & myrrhæ, & cinnamomi, & iunci

Rotundi tantum, sed vnam ponunt croci.

Tres vnguium bdellii, aspalathi duas semis,

Tres spicæ nardi, tres cassiæ bonæ,

Tres lecti cyperi, baccas iuniperi quibus

Adiungunt aquas, pingues & magnas legunt.

Accedit drachmis calamus flagrans nouem,

Mellis quod sufficit, & vini prorsus parum.

Bdellium, vinum, myrrham, in mortarium

Mittunt: & terunt, quoad mellis crassitiem

Liquentis iuncta reddant. Tum mel postea

Affundunt, vvas miscent: demum cætera

Imponunt,

Imponunt, sed contusa. Paruos inde
 Confiunt orbes, quibus deos fumigant.
 Rufus nos Cyphi sic parare docet,
 Vir probus valde & peritus medicus.
 Quidam, si delit cinnamomum sibi,
 Tantundem miscent cardamomi seminum,
 Et hac vuntur æquæ ac priore.
 Quidam, si pulmo vel iecur vel ex extis
 Aliud vllum, vlcus habet malum,
 Huius propinant pharmaci denarium.

De Tribus Antidotis, Duabus ad Phthisim, Vna ad Venena.

CAP. 3.

CUm vero Damocrates alias quoque antidotos memoratu dignas, & ob expositas commoditates, carminibus ab eo proditas conscripserit, illas quoque subiungere mihi satius visum est, quam inactas omittere. Nam theriacam quam vocant, quo ritu ipse conficiat, in præcedente libro docuimus: Nunc quæ deinceps expositæ sunt antidoti subiiciemus.

ANTIQUAE phthisi alia valde bona,
 Et sputo sanguinis, & clàm febrienti,
 Nec non & pectus imbecille habentibus.
 Stomacho, renibus, & iecori prodest.
 Omnibus quæ dixi valet, delicatis tamen
 Quod possit minus, conueniet magis.
 Libenter sumpta hac Augustum ferunt
 E longo morbo, conualuisse breui,
 Pectore multum costis quæ affectum male.
Accipit & psylli & subrubentis casia,
 Inde quæ nardi, & Gallicanæ puræ,
 Et cinnamomi, atque recentis croci,
 Drachmas duodecim: opobalsami decem:
 Myrrhæ quam staeten dicunt, crassæ, sedecim,
 Hinc iunci tenuis, & sigilli lemnij,
 Radicis Ponticæ, & seminum rutæ:
 Sylvestris melior multo est ruta tamen:
 Amomi quoque, & siccæ rosæ tantum.
 His album piper adde, semen napi:
 Incultis locis hoc, non subactis lege.
 Quater hæc duo drachmam, ter vero thus trahet.
 Aequabit thus dictamnum creticum, satis
 Siccatum quidem, sed tamen adhuc recens.
 Thuri cuminum exæques Thebaicum.
 Alia cribro tusa excerne tenui,
 Immitte solum in mortarium psyllium,
 Multo plus tamen, ut inde quantum velis
 Sumas, nam totum comminui nequit.
Confice hoc pacto: Myrrham mitte bonam
 In pilam latam, vini quantum est satis
 Falerni pinguis affunde, atque dilue
 Myrrham parumper: opobalsamum dein
 Admisce translucidum, nam id est bonum.
 Hinc, ubi tusa consperferis alia,
 Combibant lines humorem tantisper,
 Donec feruorem bis terue mel efferat.
 Affuso melle vnies antidotum.
 Repones vase qualem descripsi modo.
 Sic quibus dixi hinc remedium dabis.
ALIA, valde bona ad quæ dixi omnia,
 Prorsus quæ hanc dicunt ad flatum meliorem,
 Stomachum longo qui infestarunt tempore.
 Tollit rugitus, qui ventrem & colon
 Perturbant intestina discurrentes.
 Acutos quoque reddit oculos senum.
 A feris morsos summa leuat ope.

Ita

A Ita hanc conficies, sed miscenda hæc habe.

Succi Cyrenai boni drachinam cape.

Acori, phu, castorij q̄3, & asari,

Seminis cardamomi, gummi arabici,

Liquoris acaciæ, iridis optimæ,

Sagapeni puri, Cretensis hyperici,

Propensa lance drachmas inijce duas.

Tres opobalsami pellucidi, parem

Mensuram psyllij opobalsamo subdes.

C Tum albi piperis, & spicæ, et nardi Celticæ

Petroselinij, ac recentis folij,

Cumini quoq; seminum Æthiopis,

Mei q̄3 Athamantici, & amomi boni,

Meconis opij, gentianæ, & balsami,

Appendo singulorum drachmas quatuor:

B Styracis quinque liquidæ & triobolum:

At albi costij, thlaspeos, & seselis,

Nigræ q̄3 casia, vno obolo minus:

Schoeni, & polij, drachmas quinque, tres obolos:

Item dictamni Cretæ quam tellus alit.

Pondere eodem coniicito scordium,

Masculum thus, Lemni terram, longum piper,

Myrrham, glycyrrhizam, chalbanum, terebinthinam,

Anatis recentem sed siccatum sanguinem,

Succum panacis, ac semen fœniculi,

Folium rosæ siccum, hypocystidis

Expressum pulchrè succum, dein agaricum,

Dauci que semen Cretici electum adde,

Anisi quoque semen, & scincum quoque,

Bis tres cuiusque pondera denarios:

C Demum zingiberis cum sicci tum boni,

Et cinnamomi, atque croci, bis quatuor.

Omnium pondus mel geminet. Chium

Infunde vinum quod esse putas satis,

Stue Falernum vetus quantum Chij.

Miscebis hanc antidotum, vt te parum

Ante miscere theriacam docui.

Vt q̄3 illam dixi, sic hanc omnibus dabis.

A LIA ex Sanguinibus, quam quidam aiunt

Cæteris amplius ad venena conferre,

Continet anserini sanguinis sicci duas

Drachmas, tres marinæ testudinis,

Hoedini tres, tres anserini sanguinis:

Anatis fœminæ sanguis præstat tamen.

Drachmas perpinguis myrrhæ iunges decem.

D Liquenti myrrhæ spicam nardi æquabis.

Nam cinnamomi bis tres erunt satis:

Bis quatuor foliorum sicca rosæ:

Iunci rotundi, costij que, & thuris vna:

Amomi tres, piperis albi totidem:

At longi piperis vnam & dimidiam,

Croci duodecim, casia bis quatuor:

Quinq; radicum trifolij, & polij:

Opobalsami tres, petroselinij quatuor:

Baccarum iuniperi pinguium, & acori, duas:

Rha pontici, mei que, & dictamni, duas

Cuiusque, drachmas dico, & phu itidem, duas,

Ammoniacy que thymiamatis similiter,

Et fœniculi: agarici duas semis,

Tres rutæ syluestris, dauci duas quoque:

Anisi, & asari, vnam cum dimidia.

Æquabis

Æquabis antedictis ammi, & semina
 Cumini, Thebe quod exusta procreat.
 Tres seminum sylvestris drachmas napi,
 Prædictis addes: quinque vero scordii,
 Quod Creta gignit, diximus id melius.
 Omnium pondus mel atticum duplicet.
 Partim contusa, partim soluta omnia
 Excipe melle cocto. Serua pyxide.

De Charme Antidoto.

CAP. 4.

Post antidotos hucusque descriptas Mithridaticam Damocrates subiungit, quam nos paulo ante recensuimus. Ea igitur omissa quas deinceps conscripsit ille, nunc ipse subiiciam.

ANTIDOTVS, quam recentes Charmen vocant,

Affectus sanat, qui molestarunt diu,
 Et quibus nullum medicamen profuit.

Myrrhæ hæc optimæ habet, & opobalsami,

Succi hypocystidis, & thuris boni,
 Opopanacis sinceri, & croci noui,
 Drachmas duodecim, in singulis pares.
 Albentis costi, Pontici castorii,
 Terebinthinæ puræ, florum schœni, iniice
 Drachmas bis quatuor singulorum: atque
 Amomi racemorum, & polii quatuor,
 Et cinnamomi quoque totidem boni:

Cretensis dauci seminum bis tres,
 Dauco par pondus seminum seseleos:

Rusæ quæ casia corticum bis nouem,

Æquabis casia petroselinæ semen:

Piperis longi & noui bis duodecim,

Abrosii carie nam vetus reperies.

Piperis albi decem, chalbanæ decem,

At spicæ nardi electæ drachmas sedecim.

Drachmas recentis bis viginti & quinque

Adiunge scordi, quod tellus Creta parit.

Res siccas pondus mellis ter adæquet.

Commisce, sicut antidotos alias

Te pridem monui, & similiter dabis.

Hanc Charmes auctor bis quingentis atticis

Vendebat drachmis, nec totam libram dabat.

Dare quæ gratis videbatur insuper.

QV I D A M fide dignus Charmis discipulus,

Scripturam hanc dicebat probatissimam,

Quæ nardi Indicæ drachmas sedecim capit:

Et myrrhæ pinguis, & succi papauerum,

Hypocystidis succi, succi balsami,

Succi panacis recentis & liquidi,

Et thuris, & castorii, singulorum

Drachmas bis senas: at chalbanæ quatuor,

Terebinthinæ quinque, polii quatuor,

Bonæ sed nigræ casia bis quatuor,

Albi piperis duas, oblongi vnam

Et duos obolos, croci Corycii decem.

Vnam prædictis addes & bis quatuor

Schœni attriti, sed amomi quatuor,

Duas cinnamomi, item & seselis duas,

Sex dauci drachmas seminum Cretensis,

Petroselinæ seminum bis nouem.

Hinc scordii drachmas bis quatuor comæ,

Bdellii vnguium vnam sed pellucidi.

Mellis infunde libras quinque plus parum.

Confice hoc pacto. Succos dissolue prius

In melle calido, atque resinam optime

Cribrata

- A Cribrata post hæc admiscebis reliqua.
Corpus in vnum rediges. Ex hoc dabis,
Quantum auellana, sumere quibus expedit.

De Quibusdam alijs Antidotis à Damocrate descriptis.

CAP. 5.

HÆc, si componere vis, impetum cohibet
Infra supra ue prorumpentis sanguinis.
Hanc si accuratè facis, habebis optimam.

Capit Cilicij croci recentis & boni
Drachmas bis octo, & tantundem opij:
Sinceræ myrrhæ, & thuris infracti,
Cuiusq; drachmas accipiet sedecim:
Corticum octo radicum mandragoræ,
Hyoscyami seminum ter quatuor.
Bis ternas adde seminum papaueris.
Tres cinnamomi drachmas appendo boni.

B Succi Pataricæ aut Syriacæ rhois
Ter viginti quinque, alterius bis duodecim.
Miscebis ita. Primò selectum crocum
Cretico & albo & dulci vino madeat,
Ad summum dies duos. Cùm fracidum videris
Et mollem valde, conijce in mortarium,
Et cochleari subige, dum læuigatum facis.
Adiunge myrrhæ thus simul & opium.
Seorsum rhois succus madescat quoq;
Quem maceratum prædictis adijcies.
Subinde læuigata, & comminuta
Cætera cuncta pariter confundes:
Ac mellis cocti & Attici quod satis,
Paulatim fundens in vnum aceruabis.
Aceruum è mortario in vas vitreum,

C Vel stanno factum, transferes, & oblines.
Ex hoc ijs dabis, qui sanguinem reijciunt
E ventre, gutture, pectore, pulmone,
Quantum tres oboli pendunt, aut plus parum,
E tribus vini cyathis diluti.
In vino myrtis facto, & saxis aqua
Astricta, renes, aut velica, sanguinem
Remittit, quibus hanc medicinam dabis.
Quod si ieiunum, siue intestinum aliud
Subtile, siue colon, siue vterus fluet,
Huius antidoti, quantum est drachma, dato.
Febriat si quis pluuia ex aqua:
Non febrienti, ex vino dabis quoq;
Diluto, vel myrtaceo, vel dulci Cretico.

Si quis non multis mistam habere velit,
D Sed paucis conditam antidotum rebus,
Ita componat sedulus aptissimam
Infirmo stomacho, nec appetenti cibum,
Squallidis, macris, tardè concoquentibus,
Dolores omnes inueteratos pectoris,
Et ventris tollit infixos iam diu.
Ferunt Augustum hac vsum Tiberium,
Vllam nec vnquam perbibisse aliam.

Continet nigri piperis quinque vncias,
Crocomagmatis quindecim, rosæ decem,
Excussa cribro excipe melle omnia.

A LIA faciens ad eadem, quæ & prior
Rosarum constat vncijs bis quatuor.
Cætera verò quæ & superior capit.
Contusa ea omnia, & per cribrum adacta,
Melle despumato excipe valde bono.

Quinta Classis.

PPPPP

Ad

Ad magnitudinem auellanae ex hac dabis
 Emulso vel recenti melicato
 Bene decocto, & commisto bene.
 Percussis a serpentibus, seu veneno
 Petitis, quantum nux iuglans, exhibe
 In septem vini cyathis diluti.

Pastillorum e Rosis Apparatio.

Hos te oportet pulchre struxisse prius
 Quo dicam modo. Recentes carpe rosas.
 Carptas siccato in umbra dies duos,
 Vel tres ad summum. Tres inde libras cape,
 Et tunde missas in pilam, quantum est satis.
 Schœni viginti, bis q̄ sex myrrhæ diu
 Contusæ, drachmas, bis quatuor adde croci.
 Inspersgens simul commiscebis omnia.
 Rotulas finge magnas siccatas bene.
 Desumes quantum satis in antidotum.

Crocomagmatis Compositio.

Croco magma si habere bonum cupis,
 Misceto diligenter hæc cuncta simul.
 Primum Cilicii drachmas centum croci,
 Myrrhæ dimidium pinguis, inde rosæ
 Tantundem siccæ, post amyli candidi,
 Et gummi drachmas bis quinque & viginti.
 Cuncta hæc tusa atq; excussa bene,
 Vino odorato Coo insperge parum.
 Vbi satis maduerint, finge rotas.
 Sicca, vtere vt bono, cum opus fuerit.

Antidotus Prognostica.

Prognosticam Antidotum ita conficies.
 Quam si quis prius cepit, si venenum sumat,
 Euomet ipsum statim & cibum simul.
 Qui verò, ne sumpserit venenum, timet,
 Si hanc susceperit, reiiciet escam
 Vnà cum nuper hausto medicamine.
 Quod si nil prauum, nil noxium, inter
 Dapes propositas sumpserit, nauseam
 Ne sentit quidem, atq; epulum retinet.
 Hæc quoq; medicina ad dolores facit
 Lateris, dorsi, renum, & vesicæ. Impetum
 Sanguinis cohibet absq; molestia,
 Vndecunque feratur, etiam è pulmone.

Ita conficias. Lemniam terram cape
 Inscriptam signo, inde sigillum dictam,
 Pendat hæc drachmam vnā, duos obolos.
 Aequent iuniperi baccæ drachmas duas.
 Dissolue diu fundens olei parum,
 Quod dulce & bonum, quod q̄ sit recens satis.
 Emulsa, quantum nux auellana magna est,
 Offeres, quibus offerre hanc erit opus.
 Si profluentem sistere voles sanguinem,
 Emulso aceto quod diu ferbuit, dabis.

*De Antidotis ab Asclepiade conscriptis in Quinto Internarum affectionum libro,
 qui Mnasonis inscriptus est.*

CAP. 6.

Mos itaq; iunioribus medicis est antidotos appellare, non modò quæ aduersus mortifera me-
 dicamenta, quæ q̄ ad morsus ictus q̄ venenosos exhibet, sed etiam quæ cōtra malas corpo-
 ris affectiones, præsertim q̄ diutinas valent, ex aliquo viscere aut abscessu consurgētes. Has autē
 cū Asclepiades describeret, in tria genera distribuit. Quorū primū ea continet, quæ febribus per
 circuitū inuadētibus cōuenire dicit: quibus & inunctiones quasdam, ita.n.eas ipse συγχρίσματα
 vocat, subiūgit. Atq; hæc omnia ληξιφάρμακα & ληξιτύρετα hoc est soluimorbia & febrifugia,
 cognominat. Secundum verò medicamenta complectitur, quas Theriacas appellat, ad morbum
 canis

A canis rabidi, scorpj, phalangij, & vipere, facientia. Tertium autem genus in duas partes & ipsum ab eo diuisum est. Quarum altera medicamenta à venenis liberantia nominat, alteram à venenis præseruantia inscribit, Andromachi ordinem hac in parte minimè seruans. Is enim, vt est à nobis inter initia huiusce libri dictum, in libro què de medicamentis intra corpus allumendis inscribit, prius antidotos oēs ad venena, venenatasq; feras facientes, disponit: Deinde medicinas subscribit ad quamcunq; affectionem, non solum contra abscessus, sed etiam ad fœtus eijciendos, si opus fuerit, propinanda: nam & hoc medicamenti genus antidotum etiā vocat: Ad conuulsa quoq; & rupta, atq; (vt summatim dicam) ad oēs malas internas q; corporis affectiones, quacūq; in parte corporis incubuerint. Atque hæc medicamenta in huiusmodi affectionibus bibenda potiones etiam idem auctor appellauit, cum circa finem libri quarti Mnaſonis ea describeret. Postremas itaque, hoc est i fine librorū quos Mnaſonis inscripsit, antidotos Asclepiades collocauit, que vel eos qui venena iam ebiberunt liberant: vel ne ab ebibendis ledant, tutos præstāt. Ego verò tales antidotos primas hîc describere statui, simul quia paulo antè traditis affinia sunt, simul quia ipsis plurimum vrimur. Nam & ad abscessus quocunq; in viscere interna ue corporis parte insederint, oēs faciunt: Quarum aliqua corporis imbecillitatem subleuant, indolentiā procurant: humores vitiosos quidem emendant, incoctos verò concoquunt, atque eos vel per cutem insensibiliter, vel per aluum vrinam q; sensibiliter, item & per sputum trāmittunt, vt quæcunq; pulmonem & pectus, per tussim expurgant. Plurimè verò humores crassos attenuare, tenaces q; dissecare & abstergere, possunt: quibus sequitur, vt & obstructions adaperiant: quæ quidem in iecinore sæpe, in alijs autem visceribus & corporis particulis aliquando, fieri solent. Finis enim ipsarum est humores attenuare, & abstergere, clausa que meatuum ora patefacere.

Asclepiadis Remedia ijs qui Venena ebiberunt, ipsiusmet auctoris verbis descripta. CAP. 7.

Is igitur qui Papaueris succum hauserint, confert hydrelæon hoc est aquam oleo conditam, calidam subinde bibendam exhibere, atque vt vomant cogere: vel aquam calidam & acetum mulsum dare, & euomere facere: cōpetet etiam aluum clysteri inanire. Qui autem Opium id est papaueris lachrymam, biberint, ijs statim merum plurimū exhibendū est, aut piper, aut nasturtiū, aut cardamomum ex vino. Proderit quoque lac alininum, bubulum ue haurire, & farina triticea vel hordeacea vino commista decocta q; ventrem emplastrare, ac mitioribus vti clysterijs. Aconitum verò si quis assumpserit, rutæ manipulum subactum tamē è vino puro bibat. Ius quoq; gallicaceum pingue auxiliatur. At qui Apollinarem herbam biberint, ijs lac bibere confert, asininum præcipue. Quod si non aderit, aliquod aliud lactis genus, vel solum, vel cum mulsâ calida.

Coriandrum autem viride qui gustarint, ij vino puro iuuatur, & iure gallinaceo pingui. Quod si Leporem marinum ederint, lac potent asininum in primis: vel si desit, bubulum, aut caprinum. Maluæ quoque caules diutius elixatos comedant, aut etiam pulegij manipulum è passo: vel mali terræ radicem vino cōmistam hauriant: vel deniq; cedriam pondere vnus aut dimidij oboli passo maceratam deglutiant. Sin autem Toxicum biberint, auxilium afferet vinum dulce, oleum rosatum, sanguis caprinus, semen napi contusum ex vino: Velut Ephemerum assumentibus, polygonij succus, plantaginis ue, aut origani, vel thymi etiam aliquantulum vino admistum. Dorycnion autem si quis edat, lac bubulum bibat, & passum, & conchyliorum ius. At si malos Fungos assumat, raphani crudī dandi erunt, vt q; ex eis plurimum comedat iubendum: vinū purum insuper, & è farmentorum cinere factum lixiuium: nitrum q; in aceto dissolutum, aut vini fœx vsta & contrita ex aqua: absinthiū præterea, aut ruta aceto cōmistâ, quauis & ipsa per sese ruta comesta proſit. Ixiam verò assumentibus opem affert absinthium ex vino sumptum, castorium q; & ruta. Confert etiam acetum mulsum bibendum exhibere, postea vomitum irritare. Confert denuo organum ex vino haustum. Vtemur quoq; hac compositione, quæ habet Rutæ drach. vi. resinæ drach. iij, castorij drach. ij, chamapityos cochlearia tria. Omnia hæc contere, & aceto calido misce, & vtere. Buprestin autem quisquis ebiberit, passum multum primò hauriat, deinde vomat, ius demum carnis suillæ, & lac calidum sorbeat. Prodest etiam ad saturitatem non edere. Dandum est quoq; ficuum decoctum: vel nitri rubri drach. iij contusas, ex aqua bibendas trade. Cantharides autem si quis assumpserit, passum oleo mistum, & seutum in aqua decoctum atq; colatum, bibere proderit, tum vomere eniti. Proderit quoque lac plurimum bibere, nucleos que pini multos comedere, aut eorū plurimos atterere & ex mulsâ propinare, vel rutam tritam atq; irino vnguento mistam dare, vel deniq; cantharidum alas & pedes ex melle tritos lingere. Quod si Psilothrum quis fortè biberit, oleum calidum sumendum est, deinde vomendum. Vtile etiam erit lac caprinum, & maluæ elixæ succus expressus cum mulsâ calida vel oleo, aut ficuum decoctum cum oleo, vel sesamum tritum ex vino, quinque ue nuces iuglandes ex oleo, lixiuium ue farmentorum cinere factum. At si Spumam argenti quispiam hauserit, piper, apium, myrrha in vino dissoluta & bibita, proderunt: Vt Gypsum deuorantibus lixiuium è farmentorum cinere confectum, dādum est, thymum ue ex aqua contritum. Ad Lac autem concretum in grumos acetum valet, opus q; erit coagulo etiam ex aqua fontis vti, vel aserpitij & thymi æquas partes ex aceto mulso bibendas tradere. Taurino autem Sanguini remediū est acetum bibere & vomere, vel aserpitij obolum

Quinta Classis.

PPPPP ij

lum

Ium semiobolum'ue sumere, aut nitri obolos duos in vino dissolutos, vel caprifici grossos aceto dilu-
lutos. Proderit quoque ventrem subducere, eundem'que lupinorum farina & nitro in oximelite
decoctis contegere. Hirudines verò si quis deglutierit, alij muriam, quidam niuem, superbibere
suadent. Asclepiades autem primò os colluere monet, mollem q̄ spongiam frigida madefactam
faucibus immittere, vt hirudo spongiæ insiliat & extrahatur: postea lentis succum exhibet, & cer-
uicem extrinsecus emplastris refrigerantibus operire docet. Apollonius aut cognomento Mus,
acetum acerrimum propinabat cum muria. Qui verò niuem dabant, eam calefaciebant, & disso-
luta utebantur, cibum'que & potum ad subducendam aluum opportunè adhibebant, vt hirudi-
nem ejicerent: sæpenumero n. nq̄ aiunt vnà cum excrementis ipsas quoq̄ deferri. Cerussam ve-
rò si quispiam assumpserit, oleum calidum bibat & vomat, vel passum & aquam calidam. Prode-
rit etiam asininum lac bibere, & expressum malua decoctæ succum, atq̄ aquam mulsam calidam
oleo mistam, vel caricarum decoctum cum alijs dare, nuces'que iuglandes quinque oleo commi-
stas exhibere, aut è sarmentorum cinere lixiuium. Atque de simplicibus quidem venenis hæc
nus à nobis dictum sit. De compositis autem postea dicitur. Eorum aut compositionē docere im-
probi mihi hominis videt. Quāvis hæc multi cōscribere sint aggressi: inter quos est Orpheus theo-
logus cognominatus: & Horus Mendefius, iuniorem dico: & Heliodorus Atheniensis, qui tra-
gœdias quoq̄ conscripsit: Aratus'que & alij quidam huiusce notę scriptores, quos sanè quispiam
commendatione dignos iudicauerit, quòd talia carminibus illustrare adorti sint: reprehendet au-
tem, ac meritò quidem, ob genus materiæ susceptum. Nam cum sigillatim quodq̄ venenum pa-
rare doceant, improbos magis instruunt, & pronos ad malum ducunt. Quam ob rem qui pulchra
hec poemata conscripsere, veriti ne publicè plesterentur, lectoribus inter initia suadere conantur,
se neque perditis moribus esse, neq̄ eiusmodi lethalia conficere, sed vitare docuisse: veluti Helio-
dorus qui cum se ad Nicomachum purgat, ita exordiens fatur:

Mitia per Tricen habitantia numina testor:

Qui' que deos latè conspergit lumine Phœbum,

Sceptrygerum'que Iouem, Saturno rege creatum,

Nec me muneribus quisquam, nec viribus ullis

Flexit, amicitia vinculum'ue abduxit, vt ista

Conscius esserem: at tollens ad sidera palmas,

Immunem sceleris mentem pro pectore seruo.

Ex his itaq̄ libros eiusmodi legentibus, quod dicebamus, persuadere moluntur, metuentes ne à G
multitudine laderentur. Atqui nec dici potest, oportere propterea talium venenorum instructio-
nem sciri, quò quis aptius indigentibus succurrat. Falsum est enim hoc. Nam qui simplici vene-
no petitis auxiliari nouit, is etiam priuatim vnumquodq̄ superueniens symptoma distinguens,
compositis affectos optimè tractabit, ingeniosè obseruando id quod inter reliqua symptomata ex-
cellit. Sed ad id quod restat, redeamus. Si incognitum nobis fuerit venenum, quod quis biberit
ederit'ue, hydrelæon calidum dabimus, vt q̄ ex eo multum bibat iubebimus, tum vomere ipsum
faciemus. Vtile insuper erit somnos quoq̄ circumscribere. Verūtamen vt et ab his & ab alijs qui-
buscunq̄ venenis caueamus, subscriptis antidotis vtendum erit.

Apollonij Muris Medicamenta à Venenis præseruantia.

CAP. 8.

R Vtq̄ folia viginti, nuces iuglandes duas, salis grumum vnum, caricas duas. Hæc si ieiunus ali-
quis comederit, à venenis lædi non poterit. *Antidotus quæ exhibita accipientem tutum à Ve-
nenis reddit.* Baccarum iuniperi drachmas ij, terræ lemnia drachmas ij. Hæc vbi in puluerem rede-
geris, oleo aut melle commiscebis, & repones: atque cum opus fuerit ex aqua mulsæ cyathis duo-
bus, quantum est auellana, dabis. Hæc antidoto Nicomedes Rex utebatur, si quando suspectos ha-
buisset qui se vocarant: nam si venenum non sublit, quieta manet: sin adlit, nauseam concitat, & H
euomere cogit, ita vt venenum quoq̄ cum antidoto rejiciatur. *Antidotus Cody Tusci, quæ & Cra-
terus utebatur.* Marrubij, herbæ sacrae, seminis rutæ agrestis, scordij, corticum radicum rhamni, sin-
gulorum pondus æquale. Hæc melli commisce, inde'que drachmas duas exhibe, ad serpentium
quidem morsus ex vino, ad venena autē ex mulso & oleo. *Ad idem alia, vt Apelles tradit.* Diſiam-
ni drachmas duas, polij drachmas tres, piperis longi drachmas quatuor, rutæ syluestris drachmas
sex, scordij drachmas tres. Hæc melli commisce, atque, vt modò dictum est, vtire. Bona est etiam
laterum morbo, trium obolorum pondere exhibita: menstrua'que mulieribus detrahit, drachi-
mas vnius pōdere. *Antidotus Anthridatis Athanasia cognominata faciens ad Venena, & omnium vene-
natorum morsus, quibus q̄; Cibus in ventriculo acescit, Sanguinem q̄; rejicientibus. Antiquas insuper Tussis, He-
patis, Lienis, Vesicæ, & Vteri morbos sanat.* Continet autem piperis albi grana quadraginta: costi,
mei, afari, acori, seminis dauci Cretici, petroselinij, nardi Indici, nestēritę lapidis, singulorum drach-
mas quatuor: croci, myrrhæ, singulorum drachmas octo: cinnamomi, casia, singulorum drach-
mas xij: mellis attici despumati quod sufficiat. Datur ex hac ad auellanae quāritatem cum mulso.

In alio exemplari sic se huius antidoti compositio habet. Spicæ nardi, piperis albi, costi, mei, afari, acori,
opobalsami, seminis dauci Cretici, seminis petroselinij, singulorum drachmas xij: mellis quod
satis

* Fortasse ἀλόν
i. sale.

A satis est. Item in aliorum *hor modo se habet*. Piperis albi grana quadraginta: costi, mei, asari, agarici, scordij, dauci cretici, petroselini, singulorum drachmas quatuor: croci, myrrhæ, singulorum drachmas octo: cinnamomi, casia, florum iunci odorati, singulorum drachmas xij: mellis quod satis.

C Ambrosia quæ dicitur Philippi Macedonis antidotus ad Venena, omnium quæ Venenosorum ictus, & Internos corporis morbos. Accipit autem Styracis, galbani, piperis albi, piperis longi, cinnamomi, singulorum drachmas duas: seminis apiij, anisi, iunci rotundi odorati, costi, cumini æthiopici, seseleos, cypheos, rhei pontici, cardamomi, amomi, nardi, myrrhæ, casia, singulorum drachmas quatuor: palmularū eiectis nucleis, carniū iuglandium, singulorum drachmas sex: croci drachmas octo: vuæ passæ demptis vinaceis drachmas duodecim: mellis attici quod satis sit: confice vt mos est.

C Antidotus Zopyria quæ facit ad Venena & Reptilium morsus. De hac talia feruntur, Zopyrum per epistolam Mithridatem monuisse, ut antidotum hanc ita experiretur. Accerseret vnum ē condemnatus, iuberet quæ primo Venenum haurire, deinde hortaretur antidotum bibere: vel prius antidotum assumere, postea Venenum bibere. Idem quoque vt percussus a serpentibus, & in vulneratis a sagittis toxico illitis, faceret, hortatus est. Verum omnibus ita peractis hominem contigit illesum permanisse. Iuuat autem Vitio Ventriculi acidum ructantes, Sanguinem reijcentes, Celiacos, Intestinorum torminibus laborantes, Comitiales, Iecoris, lienis, renum quæ morbo vexatos. Vteri demum, & Vesicæ affectionibus medetur. Emortuos fœtus & secundas trahit. Conficitur autem hoc modo. Opobalsami drachmas tres: nardi indicæ, myrrhæ troglodyticæ, florum iunci odorati, cinnamomi, characiæ, costi recentis, piperis longi, hypocystidis, polii, piperis pereatici, scordij, mei cretici, cardamomi, singulorum drachmas quatuor: thuris masculi, carpobalsami, dictamni, singulorum drachmas sex: petroselini, casia fuluæ, singulorum drachmas septem: croci corycii, drachmas octo: mellis attici quod sufficit. Datur hæc antidotus ad magnitudinem nucis auellanae, non febrientibus ex vino, febrientibus ex mulsa. **C** Antidotus Diæmaton id est ex sanguine, appellata, ad Venena venenatorum quæ omnium morsus. Habet autem. Piperis longi, piperis albi, costi, acori, croci, phu, mei, dictamni cretici, ammoniaci, agarici, singulorum drachmas duas: amomi, opobalsami, seminis rutæ syluestris, cymini æthiopici, anisi, sanguinis anatis maris & fœminæ sicci, sanguinis hoedini, sanguinis anserini, seminis napi syluestris, singulorū drachmas tres: gentiane, trifolii, florum iunci rotundi odorati, thuris, rosarum siccarum, singulorum drachmas quatuor: petroselini drachmas v, phu cretici tantundem, cinnamomi drachmas sex, florum scordij drachmas viii: myrrhæ, nardi, singulorum drachmas xii: casia drachmas viii. Omnia hæc diligenter contusa, ac per excussorium cribrum traiecta, melli attico despumato commiscebis, commista quæ in argentea pixide repones: atque hac vt magno aliquo medicamento vteris.

De Diascincino nobili antidoto, Theriaca, & Centena.

CAP. 9.

Antidotus Mithridatis Eupatoris, Diascincini cognominata, faciens ad Venena omnium quæ Venenatorum materiam mortem inferentem, Omnium quæ Venenosorum animalium ictus, & Malis internas quæ corporis affectiones. Mulieribus concipere nequeuntibus opitulatur. Menses ducit, emortuos fœtus, atque recentas secundas trahit. Febres per intervalla inuadentes, earum quæ tremores soluit. Coxendices, in scapulas rigentes, podagricos, & id genus reliquos nervorum morbos iuuat. Conficitur autem hoc pacto. Scinci, sagapeni, acori, phu, costi, hyperici, acaciæ, iridis, mei, gummi, singulorum drachmas duas: rosarum siccarum, gentiane, cardamomi, singulorum drachmas quatuor: seminis papaueris drachmas v, obo. ii: styracis drachmas octo: polii, casia nigra, seseleos, bdellii, balsami, piperis albi, singulorum drachmas v, obolos ii: succi hypocystidis, opopanacis, myrrhæ, thuris masculi, castorii, piperis longi, cypheos, foliorum malabathri, singulorum drachmas sex: scordij, florum iunci odorati, chalbani, terebinthinæ, singulorum drachmas sex, obol. ii: nardi syriacæ, opobalsami, thlaspis, dauci cretici, singulorū drachmas sex, obol. ii: croci, cinnamomi, zingiberis, singulorum drachmas vii, obol. ii: succi glycyrrhizæ, agarici, singulorum drachmas octo, obol. iii: mellis quod sufficit: vini optimi quod satis est. Dad succos dissoluendos. Construitur autem hoc modo: Cyphi, hypocystis, sagapenum, gummi, opium, styrax, opopanax, vino chio macerantur die noctu quæ quoad penitus dissoluta sint: reliqua verò interim contusa, tenui cribro excutiuntur, illis quæ iam maceratis ac dissolutis commiscuntur: commista quæ attico melle ad crassitiem vsque despumato excipiuntur: opobalsamo quæ superimmissio demum in vas argenteum transferuntur, atque ad multos vsus reponuntur. Datur autem ex hac antidoto quantum æger tolerat. Nos autem vt validius medicamentum hoc faceremus ad Menstrua prouocanda, vt quæ sine periculo Fœtus educi possent, imposuimus dictamni drachmas quatuor, ammoniaci drachmas tres, seminis rutæ syluestris drachmas tres, cumini æthiopici drachmas sex, seminis trifolii drachmas iii, napi syluestris drachmas iii, chamedryos drachmas iii, rhei pontici drachmas iii, succi cirenaici drachmas ii. His additis medicamenti vsus ad multa utilis redditur: Quadrimestres enim fœtus corrumpit, & trimestres educit. **C** Mithridatis Theriaca. Hac Mithridates Rex semper vsus est, vt se à Venenis tutum præstaret. Itaque à Romanis obfessus bis epoto Veneno cum mori non posset, se ipsum ense traiecit. Facit autem ad perniciosam Venena, omnium quæ Venenatorum morsus, & Internas corporis affectiones. Hac & Andromachus postea vsus est. Componitur quæ hoc modo. † Pastillorum scilliticorum drachmæ quadraginta octo: pastillorum viperinorum, piperis nigri, spissamenti hedychroi, succi papaueris nigri, singulorum drachmæ viginti quatuor: rosarum siccarum, scordij, se-

† Hæc cōpositio corrupta ē et mutilata. Li- cet vero eā in- staurare ex de- scriptione the- riacas Demo- crati p. 108.

Quinta Classis.

PPPPP iij

minis

DE ANTIDOTIS

minis napi, iridis illyricæ, agarici, cinnamomi, succi glycyrrhizæ, opobalsami, singulorum drach-
mas xii: roris marini drachmas octo: myrrhæ, croci, zingiberis, rhei pontici, radicum quinquefo-
lij, nepitæ montanæ, marrubij, petroselini * oboli duo: stœchadis, costi, piperis albi, piperis ni-
gri, thuris * calix nigræ drach. iiii: costi 3 i, croci 3 iiii, piperis albi drach. i, piperis longi drach.
i: iridis illyricæ, iunci rotundi odorati polij, scordij, rosarum siccarum, sanguinis anatis, lingulo-
rum drach. ij: mellis attici despumati quantum sufficit. *Antidotus Centena qua vtor, quam que
Cæsari composui ad Omnia, præsertim que ad Venena.* Abrotoni drach. ii & semis, aristolochiæ drach.
xx, acaciæ drachmas iiii, baccarum iuniperi tantundem, croci drachmas ii, asari drachmas iiii, anisi
drach. iiii, amomi drach. vi, agarici drachmas iiii, carpobalsami drach. ii, bdellij drach. iiii, balauustij 3 ij,
gentianæ 3 iiii, succi glycyrrhizæ tantundem, seminis rapi drach. viii, terræ samix drach. viii, semi-
nis dauci drach. iiii, radicis dracontij drach. iiii obol. tres, seminis irionis drach. xx, iridis illyricæ 3 ij,
myrrhæ drach. vii, zingiberis tantundem, radicis eryngij drach. iiii obol. ii, thlaspeos drach. xx, co-
nizæ tenuis drach. vi obo. iij, cyperi drach. vi, acori drach. vi, seminis cicutæ decoricati drachmam
i obo. iij, ammeos drach. iiii, seminis cnici drach. vii obo. ii, cinnamomi drach. vii, costi drach. vii
obo ii, calix 3 vi obo. ii, succi centaureæ 3 iiii obo. v, castorij drach. vi, calami aromatici 3 iiii, gum-
mi drach. ij, cardamomi drach. iiii, cachryos drach. iiii obo. iiii, cypheos drach. vi, chalbanij 3 vi obo. F
ii, foliorum libanotidis drach. iiii, salix tantundem, seminis lonchitidis drach. ij obo. iiii, seminis li-
thospermi drach. iiii, thuris 3 vi obo. iiii, seminis fœniculi drach. vi, succi papaueris drach. vi, rubri-
cæ lemnix 3 iiii, malabathri drach. x, mei drach. vi, sanguinis anatis tantundem, nardi syriacæ drach-
mas vi obo. iiii, nardi celticæ drachmas viii, xylobalsami drach. iiii, succi panacis tantundem, seminis
hormini 3 viii, erui albi tantundem, radicum panacæ drach. i i, opobalsami drach. iiii, securidacæ
drach. vi, polij drach. v obo. ii, foliorum polygoni drach. ix, radicis elenij drach. v obo. iiii, petroseli-
ni drach. vi obo. ij, quinquefolij drach. viii, succi peucedani tantundem, piperis nigri drach. v obo.
iij, piperis albi drach. iiii obo. iiii, piperis longi drach. iiii, scinci drach. iiii, terebinthinæ drach. ii, ro-
sarum exiccatarum drach. vi, sagapeni drach. viii, stœchadis drachmas iiii, pinæ nucis torrefactæ
drachmas vi, iunci odorati drachmas iiii obo. ii, vix passæ sine vinaceis drach. iiii, seseleos drach. v
obo. ii, seminis pastinacæ drach. iiii, fellis taurini 3 v, fellis vrsini tantundem, chamæpityos drach.
iij, seminis psyllij drachmas iiii, chamædryos tantundem, seminis lisami adusti drach. vi, radicis cō-
solidæ drach. ii, summitatum scordij drach. iiii obo. iiii, herbæ pedicularis drach. v, styracis drach. v
obo. ii, fructus trifolij drach. x, seminis tordilli drach. ii, foliorum teucrij drachmas iiii, succi hypo-
cystidis drach. ii & semis, fructus hyperici drach. ii, seminis alterci drach. ii, rhei pontici drach. ii, G
phu drachmas viii, rhus obsoniorum drachmas v obo. iiii, radicis vmbilici veneris drach. i obol.
iij, vini & mellis quod satis est. Ego vinum non adhibeo.

Variæ Diverforum Antidoti, Diversis Affectionibus succurrentes.

CAP. 10.

Antidotus Aelij Gallicum ad alia, tum ad Canis rabidi morsus. Nardi syriacæ drachmas quatuor, myr-
rhæ drach. ix, cinnamomi drach. xii, calix nigræ tantundem, croci drachmas octo, costi drach-
mas quatuor, seminis dauci tantundem: mei tantundem, at alij 3 i: petroselini 3 iiii, piperis albi gra-
na xxx, carpobalsami 3 iiii, acori, asari, tantundem: iunci rotundi odorati drach. viii, alij ipsum nō
immutant: mellis despumati quantitas, quæ sufficiat. Hæc per se sola deglutienda est. *Eiusdem
alia ad Internas affectiones multum efficax.* Cinnamomi drachmas sex, croci drach. ii obo. iiii, piperis al-
bi drach. iiii obo. ii, piperis longi drach. iiii obo. iiii, opij drach. iiii, nardi indicæ drachmas quatuor,
myrrhæ drach. iiii obo. ii, acori drach. iiii, nardi gallicæ drach. iiii, styracis drach. i obo. ii, chalbanij
drachmas quatuor, castorij drach. iiii obo. ii, costi drach. ii obo. ii. Omnia hæc melli commisceto, in-
de q̄ pilulas conficito, potione uel aliqua diluito: concoctionem enim & indolentiam procurat.

Antidotus Aromatica optima Galli ad Omnia faciens. Cinnamomi drach. i, calix drach. i, croci drachmæ 3,
amomi drachmas v, malabathri drach. ii: myrrhæ drach. s, alij drach. i: iunci rotundi odorati drach. i, H
costi drach. s, piperis drach. iiii, mellis attici quod sufficit. Ego verò, inquit, cinnamomi duplum
immitto, melior q̄ efficitur. *Antidotus Archiuij, quæ Ambrosia & Sacra cognominatur, ad omnes
Internas affectiones qua vtor.* Continet autem Anisi drachmas quatuor, seminis apij tantundem, myr-
rhæ drach. i, panacis tantundem, cinnamomi drach. ii, seminis loti amari drach. ii, calix drach. ii,
croci drach. ii obo. iiii, piperis obo. iiii, succi papaueris drach. iiii, mellis quod satis est. Potio hinc
conficitur, ad intestinorum Tormina quidem, ex vini myrtini hemina vna, & aque quarta parte:
Ad Hepar autem ex aquæ mulsæ hemina dimidia: Item ad Vigiliæ, Ophthalmiæ, & Lateris mor-
bum ex aqua mulsæ: Ad Stomachi demum vitia, ex vini granatorum cyathis duobus, & aquæ to-
tidem. *Antidotus Antipatri, quæ & Theriaca nuncupatur, & ad Morsus aspidis valet, ante & post ictus
exhibita, qua vtor.* Habet autem Gentianæ drach. iiii, radicis trifolij 3 iiii, seminis eiusdem 3 ii, polij
drachmas iiii, aristolochiæ tenuis drach. ii, radicum peucedani tantundem, chalbanij drachmas duas,
petroselini drachmas quatuor, rutæ sylvestris drachmas tres, pyrethri drachmā vnā, herbæ pedicu-
laris tantundem, radicum vitis albæ drachmas duas, piperis albi tantundem, acori drachmas tres,
thymiamatis ammoniaci drachmam i obo. iiii: verbasci, idem chamæpityos, chameleg, marrubij te-
nuis, conyzæ tenuis, cymini æthiopici, succi papaueris, castorij, seminis fœniculi, agarici, calix
ruse,

A rufæ, florum iunci odorati, rheî, singulorum drach. ij. dauci cretici drach. j obo. iij, opopanacis tantundem, sagapeni 3 ij obo. iij, abrotoni 3 j obo. iij, dictamni tantundem, styracis tantundem, cinnamomi drach. iij, nardi tantundem, myrrhæ drach. iij, thuris 3 j, croci drach. viij, anisi 3 j, succi cyrenaici tantundem, coaguli hinnuli 3 iij, mellis attici quod satis est. Ex hac sumitur quantum est nucis auellanæ magnitudo, vt se quis à veneno tutum reddat. *¶ Aely Galii Theriaca qua tor, optima ad Scorpionum ictus, & Alia quæ Venenum morfu relinquunt, ad Rupta, Conuulsa, Coli inflationes, & huiusmodi cætera. Hanc Gallus ex Arabia rediens Cæsari obtulit, qua multos ex commilitonibus suis seruauerat. Habet autem, Radicis vitis albæ drach. xvj: seminis trifolij, opopanacis, singulorum drach. viij: aristolochiæ tenuis drach. xij: radicis libanotidis, iridis illiricæ, zingiberis, opij, singulorum drach. viij: seminis rutæ syluestris drach. xij: cumini æthiopici drach. sedecim: myrrhæ, calia, castorij, seseleos, radicis eryngij, serpilli, succi cyrenaici, singulorum drach. vj: medicæ drach. xij, sagapeni drach. vj, croci 3 v, farinæ erui 3 xxiiij. Cum aqua hæc in pastillos trium obolorum rediges, & ex vino dabis.*

*Eiusdem alia Theriaca valde efficax: Quæ ex his constat, Seminis trifolij 3 xij, aristolochiæ drach. vj, magmatis hedycroi 3 viij, quinquefolij drach. iij, echij herbæ drach. vj, philocrati drach. v, sagapeni drach. iij, polij drach. vj, castorij 3 iij, croci drach. viij: seminis apij, anisi, fœniculi, petroselinij, singulorum drach. vj: opopanacis drach. iij, opobalsami drach. vj, seseleos drach. quatuor, cumini æthiopici drach. v: myrrhæ, scordij, phu, mei, singulorum drach. sex: seminis alyssi cretici drach. sex, farinæ erui drach. octo. Vinum ariusium lene quod satis est infunde: orbes q3 confice ponderis quatuor obolorum, quorum vnum dabis ex vini chij vel falsi puri cotyla dimidia. *¶ Theriaca ad Dolores internos Euclidis Palatiani, quam, vt ipse dicebat, ad morsus Aspidum composuit: facit tamen & ad Pleuriticos & Quartanarios magnitudine nucis auellanæ exhibita, si prius euomuerint. Tussientibus insuper & ægrè screantibus ex aqua: percussis à Serpentibus ex vino: Pleuriticis & sanguinem reijcientibus ex aquæ cyathis duobus & aceti vno datur. Habet autē, Castorij drach. sex: opopanacis, sagapeni, seseleos, cachryos, chamædryos, chamæpityos, marrubij, singulorum drach. sedecim: styracis, bituminis iudaici, myrrhæ, drach. viij: succi papaueris drach. octo: mellis libram vnam. Percussis à serpentibus, si fieri potest, fac vt prius euomāt, deinde ex hac cum plurimo succo fraxinij, vel si desit, cum vino, drach. j exhibe, vel plus etiā: Quartanarijs autem ad nucis iuglandis magnitudinem dato. *¶ Zenonis Lao dicei Theriaca, quemadmodum tradit Menutianus, qui eam ab ipso accepit. Habet autem, Cardamomi demptis inuolucris, serpilli, seminis apij, radicis vitis albæ, seminis trifolij, anisi, petroselinij, radicis & seminis fœniculi, ammeos, aristolochiæ tenuis, farinæ erui, opopanacis, singulorum pondus equa***

C le. Separatim primo queque contunde, tum commisce: & vbi ea vinum austerum affundens subegeris, orbes conficito, qui simulatq3 in vmbra exiccati fuerint, trium obolorum pondus impleāt. Horum vnum ex duobus aquæ cyathis dato ter interdiu, semel noctu, interdum verò & sæpius, præsertim ijs qui frequenter euomunt: quandoque per nares etiā infundendi sunt, si eos ægrotus deglutire nequeat noxio somno grauatus, aut aliquo alio prauo symptomate correptus. Loca verò demorsa, si quodam cum tumore nigricauerint, ac carnem alioqui diffluentem habuerint, veluti vlcera maligna procurato. *¶ Antidotus quæ ad Conuulsiones & Rupta facit. Sanguinem reijcientibus, Lienosis, Iecimorosis, & exulceratæ Vesicæ auxiliatur. Ventriculi vitio laborantes & Cæliacos sanat. Inflationes discutit, & Arquatos liberat. Datur ad hæc omnia ex mulso oliuæ magnitudine. Cinnamomi, costi, singulorum drach. sex: nardi syriacæ drach. xx: croci, myrrhæ, malabathri, singulorum drach. octo: calia drach. xij, piperis albi drach. x, thuris drach. quatuor, iunci odorati drach. sedecim, iridis illyricæ drach. xij, terræ lemnia drach. xx: mei, seseleos, singulorum drach. octo: seminis apij drach. quatuor, pinearum drach. xij, irionis drach. sex, seminis cucumeris torrefacti drach. sex, terebinthinæ drach. tres, petroselinij drach. quatuor, amomi drach. tres: scordij, polij, opobalsami, gentianæ, cumini æthiopici, singulorum drach. v: seminis rutæ syluestris, drach. tres: anisi, tragachan*

D ti, singulorum drach. octo: phu, stœchadis, cneori, singulorum drach. ij. Irionem linteolo conuolutum in aqua primum coquito, vt ipsum deinde reliquis omnibus comminutis admiscere possis: tragacantham postmodum aqua maceratam superimmitte. Dabis ex hac antidoto quantum est ægyptiæ fabæ magnitudo, Febrientibus quidem ex aquæ, non febriētibus autem ex mulsi, cyathis duobus. *¶ Antidotus Mithridatica, vt Xenocrates ait apud Nicostrium, ad Venena omnia, Venenatos ictus, Difficiles concoctiones, Inflationes, Stomachicos, & Cæliacos faciens, Iecore quæ & liene & coxendicibus, ac renum lateris & pulmonis vitio, laborantibus subuenit. Continet autem, Succum hypocyttidis drach. sex, scordij drach. v, castorij drach. quatuor, petroselinij drach. quinque, seseleos drach. j, thuris drach. vj, polij drach. ij, dauci cretici drach. x, piperis albi drach. j obo. iij, piperis longi drach. j, costi drach. quatuor obo. iij, cinnamomi drach. ij, croci drach. quinque obo. iij, calia nigre drach. quatuor, nardi drach. octo, myrrhæ drach. octo, iūci rotundi odorati drach. quatuor, amomi drach. ij, chalbani drachmas ij, terebinthinæ drach. j obo. iij, succi papaueris drach. xx, mellis attici quod sufficit. Ex hac dabis quantum & reliquis. *¶ Antidotus Tyrannis appellata, & vt inquit Nilus, ab Antipatro composita, ad Calculosos, & Eos qui inter spirandum suffocari videntur, facit. Secundas & fœtus reitentos eijcit. Comitialibus, Podagricis, Articulorum quæ & coxendicum morbo laborantibus prodest, Urinam crassam plurimam educens. Hanc dabis ad fabæ magnitudinem ex mulso etiā contra Venena: aduersus autem Ser-**

pentium ictus ex vino: Comitibus vero, si febriant, ex mulla. Habet autem, Sinci drach. viij, myrrhæ E drach. xxviij, rubricæ leniæ drach. iij, nardi drach. viij, iunci odorati drach. iij, cinnamomi drach. xxiiij, radices dulcis drach. xxviij, * myrrhæ drach. xx, eryngij drach. xxiiij, amomi drach. xij, cardamomi drach. octo, croci 3 viij, baccarum cedri nigrarum 3 xij, meliloti 3 xij, seminis hyacinthi 3 iij, piperis longi 3 iij, piperis albi grana lxxxv, spondilij 3 xij, stœchadis drach. v, pyrethri 3 vj, seminis maluæ sylvestris 3 xij, seminis leuconij 3 iij, opobalsami 3 vj, costi 3 viij obo. j, ammeos drach. xij, radicum umbilici veneris drach. xiiij, seminis dauci 3 xij, carpobalsami 3 iij, xylobalsami 3 iij, calicæ drach. viij, cumini aethiopici drach. iij, seminis ocymi drach. octo, acori drach. octo, florum lambrusæ drach. octo, seminis apij drach. xij, sagapeni drach. octo, radicum capparis drach. quatuor, gentianæ drach. xiiij, radices periclimeni drach. octo, thuris drach. viij, styracis drach. j. * milij agrestis drach. xxiiij, radicum smyrnij drach. iij, thymiamatis ammoniaci drach. xvj, feseleos drach. iij, cachrysos drach. iij, iridis illyricæ drach. iij, anisi drach. iij, chamædryos drach. xv, chamæpityos tantundem, seminis smyrnij drach. viij, zingiberis drach. xiiij, centaureæ tenuis drach. octo: seminis pastinacæ, mei, singulorum drac. octo: radices calami drach. quatuor, * vnguenti boni cotylā vnā. *Antidotus Arpuli ad Quartanarios.* Myrrhæ drachmas quatuor, piperis longi drach. ij, lachrimæ papaueris drach. ij, castorij obolos iij & semis, cardamomi drach. iij, sagapeni F drach. ij. Communitis his omnibus & aquæ commistis rotulas ponderis duorum obolorum cōfin ges: Quas per intervalla Febrietibus dabis ex adriani vel aminæ vini cyathis duobus, et aquæ fontanæ quæ deferbuerit, cyathis quatuor: Febrientibus autem sine intermissione ex hydromelice totidem cyathis. Facit quoque ad reliquos Febrium circuitus. Quoniam verò ad morsus ictus q3 venenosorum animalium, superscriptis antidotis tam Asclepiades q3 Damocrates quædam insuper alia addiderunt, idcirco mihi quoq3 ea hoc in libro subijcere potius quàm omittere visum est, ac primo quidem ab Asclepiade prodita.

Remedia ab Asclepiade conscripta in Quinto Mnesonis ad Serpantium noxas.

CAP. II.

Potio demorsis à Rabido cane hominibus amuleum valde generosum, præservat enim ne in rabiem incidant.

Licij indicij quàm optimi obolos tres ex aqua dabis, verbenæ que parumper immittes.

Diebus autem tot id facies, quoad securum esse ægrum arbitraberis. Datur & sine aqua lycium solum in ovo forbili. *Alia.* Castorij drachmā j ex vini rosacei albi cyatho, bis singulis quibusq3 diebus bibendum dabis. Quod cum facere delieris, absinthij decocto ægrum euacua, salis q3 tantum immittes, ut clystere vehementius reddatur.

Antony Col. Alyssum herbam contusam & cribratam repone. Huius cum opus fuerit, à rabido cane morsus cochlear exhibebis ex aquæ & mul- G sæ cyathis tribus, statim à primo die vsque ad quadraginta: sin minus saltem primis septē diebus.

Alyssus autem herba est marrubio similis, asperiores tamē & magis spinosos in furculorum summitatibus orbes habet, florem ad cœruleum vergentem profert. Hanc inter caniculæ æstus colligere oportet: exiccata q3 & cribrata seruanda est, ut expirare non possit.

Alia celebris admodum:

Quæ recipit, Cineris cancrorum fluuiialium vitis albæ sarmentis exustorum attritorum q3 mystra x, radicum gentianæ mystra tria, terebinthinæ mystra duo. Ex hac antidoto singulis quibusq3 diebus quoad sextus adueniat, cochlear vnum ex vini puri antiqui cyathis tribus plus minus ue dabis: ætatem nanq3 & vires infirmi spectasse conuenit. Iis inquam cochlear vnum dato, quibus simulatque rabido cane morli fuerint, medici copia affuit. Quod si quis primo vel altero die remedio caruerit, si secundus dies is sit, antidoti duplum capiat: si tertius triplum: nam vinum, satis idem semper erit. Tribus postea subsequētibz diebus tantum assumat, quātum prima die sumplisset. Hoc medicamentum bibentem satis super que tutum reddit, ne in aquarum formidinem incidat.

Antidotus Cratippi viri & celebris & alendis canibus dedit. Cancrorum drach. xx, myrrhæ drachmas ij, croci drach. j & semis, gentianæ drach. j, piperis albi grana x, vini quātum satis est ad commiscendum. Dabis ex hac drachmam vnā ex vini aqua diluti cyathis tribus.

Alia qua vsus H est Heras Cappadox. Scordij drach. ij, piperis albi drac. ij s, opij drachmas tres, succi cyrenaici drach. iij s, cachrysos drach. iij: gentianæ, seminis rutæ sylvestris, rubricæ lemnis, singulorum drachmas quinque: myrrhæ drach. viij, opobalsami drach. viij. Hęc primum vino infunde, tum melli desputato commisce, postremò opobalsamum iniice. Robustioribus quod bis Aegyptiæ fabæ magnitudinem æquet, dato ex aquæ calidæ cyathis tribus.

Alia Aelij Galli quæ, ut Belchionius inquit, à Cæsare sumpta est. Polij, succi cyrenaici, singulorū drach. iij s: cachrysos, seminis rutæ sylvestris, singulorum drachmas quatuor: gentianæ, rubricæ lemnis, singulorum drachmas quinque: myrrhæ drach. vj: opobalsami drach. octo: scordij, piperis, singulorum drach. xij: melli omnia hęc admisceto.

Antidotus Zenonis Laodicensis ad morsum Canis rabidi, quæ etiam est bonæ theriacæ. Seminis petroselinij, ameos, anisi, serpilli, radicum vitis albæ, seminis fœniculi, farinæ erui, aristolochiæ longe, seminis trifolij, opopanax, medullæ cardamomi detrahitis folliculis, singulorum drachmas quatuor. Ita verò conficitur. Opopanax vino dissolutum in promptu habe: reliqua verò vbi contuderis, ac per minutum cribrum traieceris, inspergendo subige, subacta que opopanax commisce. Rotulas inde confice, quas postquàm in umbra siccaueris, drachmæ vnus pondus ex vini meri cyathis tribus totidem diebus exhibebis nuper à rabido cane morsus. Quod si diu iam com-

morsus

A morfus quis fuerit, ex aqua frigida pondus idem dabis. Antidotus hæc in Dionysium Miletium refertur. *¶ Claudij Apollonij medicamentum aduersus Canis rabidi morsum, quod & Theriaca est.* Seminis trifolij, radicum fœniculi, singulorum drach. vi: foliorum scillæ aridorum, aristolochiæ longæ, singulorum drach. quinque: scinci, surculorum serpilli, singulorum drach. quatuor: cardamomi à cortice depurati, radicis dulcis, singulorum drach. iij: ammeos, radicis rutæ, singulorum drach. ij: opopanacis, succi cyrenaici, singulorum drach. j: vini falerni seltaria tria, & cæcorum marinorum exustorum libras tres. Cancros in vinum coniectos macerari sinas: quod vbi combiberint, ipsos accuratè dissolutos promptos habe. Res autem siccas cõtusas & per minutum cribrum transmissas cancris admisceto: rotulas q̃ inde confingito, quarum tres obolos propinabis ex vini puri cyatho vno & dimidio tribus diebus. Ac de his quidem hæcenus: nam quæ fori, quoq; admoeri debent subiungenda videntur. *¶ Menippi Enplastrum ad morsum Canis rabidi, quo Pelops vrebatur.*

Picis brutiæ libram vnā, opopanacis vnc. iij, aceti seltarium vnum. Opopanacem in cyathis quatuor aceti diluito: aceti quod superest vnā cum pice decoquito: vbi cõsumptum tum id videris, opopanacem addito, sed caueto ne efferueat. Cum satis inter se commista videbuntur, plagellas permagnas inde conficito, loco que demorso superindito. Necesse est autem vlcus per quadra

B ginta dies apertum seruare. *¶ Menelai quod valet ad morsum Canis rabidi, Aegolopas que, & omnium Reptilium ictus.* Habet autem, Nitri rubri drach. ij, fæcis vini combustæ drach. octo, thymiamatis ammoniaci drach. vij, seui caprini lib. j, olei lib. j & semis. ceræ libras duas, aquæ seltarium vnum. Ammoniacum in aqua dissolue sic vt amurcæ crassitiem habeat, reliquum verò aquæ ferueat nitro & fæce immissa. Quod cum densatum fuerit, ea quæ colliquantur iniicies. Vbi dissoluta fuerint, ab igne vas amoue bis, ammoniacum q̃ impones, inde q̃ vtraq; in mortarium transferes, diligenter que subiges. Ex hoc cum opus erit vttere. *¶ Album Heræ medicamentum ad morsum Canis rabidi, quod & extrinsecus vlceri imponitur: & per os intro assumitur, maxime ab ijs quibus iam rabies dominatur, pilula ad magnitudinem auellaneæ nucis confecta, ac quotidie quadraginta diebus deglutita: statim enim à periculo liberat.* Imponitur autem loco demorso, nec nisi secundo quoque die soluitur: & idcirco opus est alternis diebus vubius soluere, & vlcis nigredinem spongiis abslergere, id que tandiu facere quoad vsque medicamentum album permaneat. Ita autem conficitur. Ceræ ponticæ lib. ij: spumæ argenti aureæ, cerullæ, singulorum lib. j: myrrhæ, medullæ ceruinæ, singulorum vnc. ij: thuris masculi vnc. j, olei veteris seltarium vnum. Argenti spumam oleo decoque: Quam cum ad sordium crassitiem peruenisse videris, ceram iniice, & cerullam insperge. Cum que ad id venerint vt manus non inquinent, igne

C subducto medullam impone, myrrham q̃ & thus iniice: atque vbi cuncta bene subegeris vttere. *¶ Basilica aduersus Canis rabidi morsum composita, quæ in aquarum formidinem egros incidere non permittit.* Hanc Augusta apud se compositam semper habuit. Cõtinet autem, Salis ammoniaci, succi cyrenaici, singulorum drachmas duas, quod si cyrenaicus desit, syriaci duplū accipito: coaguli leporini drachmas quatuor: iridis illyricæ, castorij pontici, singulorum drachmas quinque: lactis caprificus aridi tantundem, aut si liccus desit, liquidi duplum impone: adipis hyænae drachmas octo: resine terebinthinæ drachmas nouem: adipis canis nigræ, sanguinis eiusdem, singulorum drachmas vndecim: ceræ ponticæ drachmas xxxvj, olei antiqui cyathos duos, aceti scillitici cyathos tres. Arida contrita aceto commisce: liquanda verò liquefiant prius, deinde attritis addantur atque in opportunos vsus omnia reponantur.

Remedia ad Scorpiones tam intus assumenda quàm foris admoenda.

CAP. 12.

AD Scorpionum ictus subscriptis antidotis vtẽdum erit. *¶ Hac Diophantus vrebatur in Scorpionum ictibus & in commorsis a Phalangys.* Habet autem, Aristolochiæ drachmas quatuor, piperis drachmas duas, opij drach. j, pirethri drach. iij. Contusa hæc & melle excepta in rotulas ad fæbæ ægyptiæ magnitudinem rediges, quarum duas deglutiendas trades ex vini puri cyathis duobus. *¶ Alia ad Scorpionum ictus, noxios que aliorum animalium morsus.* Accipit autem Aristolochiæ, zingiberis, singulorum drach. viij: nepitæ, seminis rutæ syluestris, singulorum ob. iij: piperis ob. ij. Hæc primum testudinis sanguine subigito, tum rotulas inde trium obolorum pondere confingito, atque ex vino puro dato. *¶ Alia,* Quæ constat ex Cymini æthiopici, sulfuris viui, piperis albi, singulorum drach. ij: castorij, silphij, trifolij, singulorum drach. j. Hæc inter se vino commisce & ex vino puro sorbenda prebe. *¶ Antidotus ad eos, qui in periculum deuenere ob ictum Scorpionis Phalangij, aut alterius cuiusq; reptilis.* Assumit autem, Seminis rutæ syluestris, seminis cruce, pyrethri, styracis, sulfuris viui, singulorum drach. vi: castorij drach. ij. Omnia hæc testudineo sanguine subacta, ex meri vel aceti dimidia cotyla propinabis quatuor obolorum pondere. *¶ Antidotus quæ Dolorem sedat ijs qui à Scorpionibus Phalangys ceteris que reptilibus percussifuerint: Quæ que cum difficultate patientibus auxiliatur.* Huius nomen est Callista hoc est optima. Cõtinet autem, myrrhæ, castorij, styracis, singulorum drach. j: opij drach. ij, chalbani drach. iij, seminis apij acetabulum vnum, anili tantundem, piperis grana xxx. Hæc inter se vino coniuncta ex vna vini cotyla dabis pondere vnus drachmæ. Antidotus autem hæc eximie bona est. *¶ Antidotus Abascanti medicamentum Luodum exercentis.* Accipit autem, Piperis albi grana xx: castorij, opij, croci, myrrhæ, iridis illyricæ, herbe pedicularis, chamedryos, radicum vitis albæ, pyrethri, singulorum partes equales. Omnia hæc vi-

no commisce, & drachmam vnam ex vini puri cyathis tribus exhibe. **¶ Antidotus quæ à scorpione** E
mbus Scoriaca dicitur, quæ que medicamentum minime fallit, magna cum difficultate nobis à quodam accepta: qui
in Africa degens hac utebatur, & percussos à scorpionibus tutos ab omni periculo reddebat. Optime quoque præser-
uat bibita à non dum percussis in securitatem euentus. Habet autem, Sulfuris viui, sulfuris fossilis, singul.
 lib. ij: piperis albi, drach. quatuor: opopanacis, fabinæ herbæ, thuris masculi, singulorum drach.
 tres: aristolochiæ rotundæ, peucedani, myrrhæ, centaurij, serpilli, chamædryos, chamæpityos, her-
 bæ scoriacæ, anagallidis, bituminis, singulorum drachmas duas: betonicæ, medullæ ceruinæ, scin-
 ci, singulorum drach. i. Singula quæ enumerauimus contusa, ac per minutissimum cribrum pri-
 mo traiecta, deinde simul omnia commista ita seruanda sunt, vt respirare non possint. Cum verò
 percussis opitulari volueris, cochlear vnum huiusce pulueris ex vini puri cyathis duobus exhibe-
 bis. Præseruationis autem annuæ gratia semel ex hac antidoto bibant, qui se tutos à periculo ser-
 uare volent. Oportet tamen eos qui primo hoc medicamentum præseruationis gratia bibent, die
 illo nec lauare, nec venere vti. **¶ Antidotus à Zoilo sumpta, qua Epaphroditus Carthagenensis utebatur.**
Statim autem hæc & ægros à dolore liberat, & per annum quàm pulcherrime quoque præseruat semel ebibita. Con-
 tinet autem, Sulfuris viui libras quatuor, thuris lib. i: fabinæ, stœchadis, aristolochiæ, singulorum
 drach. vi: myrrhæ drach. v: medullæ ceruinæ, opopanacis, singulorum drach. iiii: dictamni cretici **B**
 drach. iiii: bituminis, serpilli, scordij, rhei, trifolij, centaurij, chamædryos, piperis albi, abrotoni, be-
 tonicæ, polij, coaguli hædini, anagallidis, singulorum drach. ij: crocodili terrestres, drach. x. Con-
 fice vt dictum est. Et percussis cochlear vnum bibendum præbe ex vini puri cyatho. Præseruat ea-
 dem singulo quoque anno semel exhibita.

¶ Quæ Extrinsecus imponenda sint percussis à Scorpionibus. Lauri folia in vino cocta & contusa im-
 pone: vel liliorum radices attritas ex aceto. *Aliud.* Aristolochiæ in vino decocta, rutæ summita-
 tum, & nitri, partes æquales atteres, & ex vino impones. *Aliud.* Cærorum fluuialium, cachryos,
 herbæ pedicularis, rutæ, partes æquales ex vino superimittes. *Aliud.* Chamæmeli, nigellæ, nitri
 rubri, partes equas contunde, & ex aceto admoue. **¶ Arabæ Thebani medicamen ad ictus Scorpionum**
excogitatum. Habet autem, Chalbani, terebinthinæ, singulorū 3 ii: herbæ pedicularis, pyrethri, sul-
 furis viui, singulorum 3 i: myrrhæ, piperis, singulorum drach. i & semis, picis liquide quod satis est.

Diuerſa ad Phalangiorum Morſus remedia.

CAP. 13.

CHARITONIS circulatoris Antidotus ad Phalangiorum morſus: Quæ habet, Seminis spondilij, calamin-
 thi, partes æquales. Hæc simul attrita ex vini cyathis duobus bibenda dabis pondere drach.
 i sapius quocunque die. Hac medicina utebatur Charito, frequenter que in conuentus hominū **G**
 veniebat, vt à phalangio demorſis opem ferret. *Eiusdem alia,* Quæ continet, Succu cyrenaici, se-
 minis dauci cretici, mentæ liccæ, nardi indicæ, singulorum pondus æquale. Hæc aceto commista,
 ex aceti puri cyathis quatuor dato drach. i pondere, bibentes que in aquam calidam descendant.

¶ Antidotus Andreæ ad Phalangiorum morſus. Habet autem, Herbe pedicularis, pyrethri, myrrhæ,
 opij, vitis albe, chalbani, singulorum equas portiones. Vino odorato hæc simul admisce, inde que
 ex passi cotyla vna, drachmam vnam dato. *Alia nobilis admodum,* Quæ continet, Cachryos, semi-
 nis rutæ syluestris, piperis albi, herbæ pedicularis, myrrhæ, singulorum drach. i: radicū cyperij,
 drachmas duas. Omnia hæc vino odorato commisce, inde que drachmam vnam, ex passi cyathis
 quatuor mellis que vno sorbendum dato.

¶ Antidotus ad Phalangiorum, Scorpionum, Aliorum que
reptilium ictus, qua Theophanes utebatur. Accipit autem, Castorij, piperis albi, myrrhæ, succi papau-
 eris, singulorum pondus idem. Hæc in vino dissoluta, atque in orbes redacta, trium dabis pon-
 dere obolorum ex vini puri cyathis tribus, vt & Deophanes faciebat. *Alia.* Corticum radicis mā
 dragoræ, piperis albi, castorij, succi papaueris, singulorum partes æquales. Confice & exhibe si-
 cuti supra diximus. **¶ Alia ab Apollodoro sumpta, quam & Heraclides Tarentinus describit in eo libro quem**
ad Aspidamantem mittit, ad omnes Venenatæ feræ morſus, Dolores que vehementissimos, & Vteri Strangula- **H**
tiones. Accipit autem, Succu cicutæ, alterci, singulorum drachmas quatuor: castorij, piperis albi,
 costi, myrrhæ, opij, singulorum drachmam vnam. Hæc comminuta passi cyathis duobus addi-
 tis in Sole tam diu commiscebis quoad densescant: inde rotulas confinges, quæ magnitudinem
 fabæ græcæ non excedant. Harum singulas ex vini cyathis duobus tradito.

¶ Alia Heraclidis
Tarentini ad Phalangia omnium que Reptilium morſus, quæ tam imposita quàm ebibita prodest. Accipit autem,
 Cachryos, seminis rutæ syluestris, piperis albi, myrrhæ, cocci cnidii, costi, pyrethri, herbe pedi-
 cularis, singulorum pondus idem: cyperij duplum. Hæc aceto dissoluta melle que excepta su-
 perimpones. **¶ Alia ad Phalangia omnium que Venenatorum ictus:** Quæ continet, Herbe pedicu-
 laris, pyrethri, myrrhæ, succi cyrenaici, singulorum drachmas quatuor: radicū vitis albe, chal-
 bani, singulorum tantundem. Aceto hæc dissoluta melli commiscebis & impones. Eadem quo-
 que pota summopere iuuat.

¶ Alia quæ ictibus Phalangiorum aliorum que Reptilium & imposita, &
ebibita prodest. Hac Simmas circulator utebatur. Habet autem, Sulfuris viui, chalbani, singulorum
 drachmas quatuor: succi cyrenaici, amygdalarum amararum à corticibus repurgata um, singulo-
 rum drachmas duas. Hæc in vino diluta melle que excepta superimittenda sunt. *Alia,* Quæ re-
 cipit, Seminis rutæ syluestris, herbe pedicularis, seminis erucae, cachryos, seminis viticis, pilula-
 rum

A rum cupressi, singulorum partes equales. Hęc aceto dissolue, melli commisce, & impone: pota quoq; auxilium prestat.

*Remedia ad Viperas, in quibus Antiochi Theriaca continetur, quam Plinius in foribus
edis Aesculapij descriptam fuisse tradit.*

CAP. 14.

VErum de his hacienus, Quibus autem à viperis morderi contigerit, infraposita remedia ad-
mouebimus. *¶ Dorothei Hely remedia aduersus Viperarum morsus.* Ita enim ipse inquit: Potio-
nibus ego planè simplicium vsus sum iis quę ex aceto dantur: Acetum nanq; calefactum & per
se potum quantum hemine dimidium continet, iuuat: Item corticum Aristolochiæ drachmæ ii,
ex vini, aut aceti, hemina dimidia: Et seminis trifolii oboli tres, ex dimidio vini cyatho. Profunt
etiam panacis chironiæ drachmæ duę, ex aceto: Item hinnulorum coaguli drachma vna ex vi-
no: Et sanguinis marine testudinis exiccati drachmæ duę ex aceto.

*¶ Ex Compositis verò Antidotus, quę ab Apollodoro consecuta est, & à Sosstrate, atq; alijs qui ipsam ab eo ex-
ceperunt commendata, hæc est, quę à testudinis sanguine nomen accipit:* Et continet, Seminis cumini sylue-
stris acetabulum, sanguinis marinæ testudinis exiccati drachmas quatuor: coaguli hinnulorum,
B aut si desit, leporis, drachmas tres: sanguinis hœdini drachmas quatuor. Hęc simul admista affu-
so quę optimo vino coniuncta repones. Cum opus fuerit hinc quantum est oliuę magnitudo fu-
mes, dilutum q; ex vini quàm optimi cyatho medio bibendum trades. Quod si paulo post egrotus
antidotum euomat, denuò quantum est oliuę dimidium ita, vt diximus modò, prebebis. Et rur-
sus si reiciat, quantum est egyptię fabę magnitudo tertio propinabis, quo prediximus modo.

¶ Rustici medici. Antidotus ad Viperæ morsus. Accipit autem Trifolii, stachyos, erui moliti, seminis
rutę syluestris, aristolochię rotundę, singulorum drachmas octo. Hęc vino cõmista in rotulas re-
digito: quarum drachmam vnā ex vini cyathis tribus dabis bis ter'ue singulis quibusq; diebus.

¶ Alia versibus ab Eudemo conscripta, quę Antiochi Philomitoris theriaca inscribitur. Cuius principium
hoc quidem est.

Disce medelam istam serpentum, matris amicus,
Expertam victor quam docet Antiochus.

Conficiendi autem Modus is qui sequitur.

Radices conuelle mei, quę pondera drachmæ
Duplent, serpilli sit quoq; pondus idem.

C Sit panacis succi tantum, nam drachma triphylli
Imposita fructus sat erit vna tibi.

Hinc apium, anisum q; hinc ammi, fœniculum q;
Semine quod q; suum compleat oxybaphum.

Post orobi tenuis duplum superadde farinæ.

Et coeant Chio nectare cuncta simul.

Tum paruos facias æquati ponderis orbes,

Quisq; trahat drachmæ pondera dimidiæ.

Hos quicumq; Chio miscebit, & hauriet orbes,

Temnet echidneæ dira venena feræ.

Officient vnquam nec sæua phalangia, nec qui

Scorpius oblique spicula tenta gerit.

Singula verò quę hisce carminibus continentur hæc sunt. Radicum mei, serpilli, opopanax,
singulorum drachmas ii: seminis trifolii drach. i: anisi, fœniculi, ammeos, seminis apii, singulo-
rum acetabulum vnum: farinæ erui tenuissimæ acetabula duo: vini antiqui quantum satis est ad
D commiscendum, vt rotulas hinc cõficere possis: quas in vmbra siccitas ex tribus vini cyathis triū

obolorum pōdere dabis. *¶ Antidotus Enneapharmacos id est ex nouem rebus, Heraclides Tarentini, quam
ipse in suo de Serpentibus libro tradidit.* Habet autem, Myrrhæ troglodyticę, opopanax, succi papaue-
ris, singulorum drach. ii: radicum vitis albæ drach. iiii, corticum aristolochiæ longæ tantundem, ra-
dicum pyrethri tantundem: seminis rutę syluestris, cumini æthiopici, seminis trifolii, singulorum
acetabulum vnum. Omnia hæc postquam attriueris, ac per cribrum traieceris, aceto commisce-
bis, in quo gummi maduerit, vt agglutinandi vim quandam habeat: tū rotulas inde cõficies, quas
in vmbra siccabis. Cum ipsis vti volueris, dimidiam dabis ex vino vel aceto in quo rutę folia de-
ferbuerint. Hoc licet sæpius diebus singulis peragas, integrum tamen antidoti pondus drachmas
duas impleat: nam supra hanc mensuram exhibita, vomitum excitare solet: quare plus duabus
drachmis, dare non consulo. Quod si vomitus insurgat, nihilo minus pluries adhuc singulis qui-
bus'que diebus antidotum exhibebis. Opus est insuper agrotum alere: & vino diluto recreare,
hoc'que sæpius die vno facere. Locus quoq; demorsus calida diu fouendus erit, & in his submer-
gendus, quę ipsum iuuare possunt: quod dum fit, ita collocandus erit, vt deorsum inclinet.

¶ Antidotus Dorothei ad omnium Repulium iclus excogitata. Quę cõtinet, Corticum radiceis verbasci
fœminæ, seminis trifolii, singulorum drach. i: opopanax, serpilli, mei, coaguli hinnuli, singulo-
rum

rum drachmas duas: seminis apij,ameos,seminis fœniculi,seminis anisi, singulorum acetabulum E
vnum: erui in farinā redacti drachmas duas. Res siccas contusas & cribratas vino ariulio coniun
ges, in quo prius & coagulum & opopanacem dissolueris: orbes q̄ inde conficies, quos pro viri
bus agrotantium dabis. Nam vehementer à veneno detentis drachmam vnam: alijs obolos tres,
ex vini cotyla tribues. Vtebatur quoq; Dorotheus hac medicina ceu nobili admodum ad Intesti
norum affectiones, & eos quibus noxiam materiam ad vetricam fluere volebat: ad tusses etiam &
morbos alios. Cæterum percussis quidem à venenolis animalibus ex vino, ceteris autem ex aqua
tribuenda antidotus est. **C** *Alia Hybristi Acuti rostri cognomento, ad omnium Serpentium ictus reperta,*
atq; ab Apollonio Memphite descripta: Quæ continet Aristolochiæ, panacis, seminis viticis, singulorū
drachmas quatuor: cachryos, myrrhæ, piperis, feseleos massaleotici, nardi indicæ, castorij, cinna
momi nigri, piperis longi, succi cyrenaici, iridis, seminis rutæ sylvestris, singulorū drachmas duas:
hyperici drachmam vnam. Omnia hæc contrita & per tenuissimum cribrum demissa vino salso
affuso subiges: rotulas que inde conficies: quas in vmbra siccitas ex vini puri cotyla vna, & aquæ
cotylis quatuor, drachmæ vnus pondere sorbendas trades. Vnam præterea ex hisce rotulis con
tusam ac vino dissolutam commorsæ particulæ superimpones, adiectis aristolochiæ in tenuissi
mum puluerem redactæ drachmis duabus, item que erui farinæ quatuor. His nanque diligentius F
attenuatis comminutis que vlcus operies, ac folio ficulneo desuper immisso vittam demum cir
cumligabis. **C** *Antidotus, quæ aduersum Viperæ morsus theriaca est.* Facit tamen et ad aliorum Serpentium
ictus. Hanc Gallus ex Arabia reuersus Cæsari obtulit, qua multos ex commilitonibus suis à Rabido cane demor
sis, & à Scorpionibus, Phalangys, ceteris que Serpentibus percussis, seruauerat. Accipit autem Erui in fari
nam redacti drachmas xxv, radicū vitis albæ drachmas xvi, seminis rutæ sylvestris drachmas xij:
iridis opopanacis, aristolochiæ longæ, succi papaueris, zingiberis, singulorum drachmas octo:
cuminī æthiopici, myrrhæ, eryngij, succi cyrenaici, croci, serpilli, costi, sagapeni, singulorū drach
mas sex. Vinum aminæum insperge, subige, rotulas confice: confectas pro conditione viriū
agrotantis da. Sunt autem tres oboli, pondus antidoti integrum, ad percussos quidem ex vini di
luti, ad reliquas verò affectiones ex mulli hemina vna. **C** *Medicamentum Viperarum ictibus impo
nendum:* Quod habet Sagapeni, piperis, succi cyrenaici, opopanacis, singulorum partem vnam:
chalbanī, sulfuris viui, singulorum partes duas. Res quidem siccas contunde, ac per tenuissimum
cribrum excute: succos autem vbi in aceto dissolueris, siccis superinfundes: atque omnia ad em
plastrī crassitiem rediges: læso membro superimmittes, & ficus vriticæ ue folio extrinsecus impo
sito conteges. *Aliud.* Cardamomi, radicū eryngij, sulfuris viui, piperis, singulorum pars vna: G
myrrhæ, chalbanī, singulorum partes duæ: confice vt suprà diximus. *Aliud.* Centauræ, herbæ
pedicularis, radicū peucedani, singulorum partes æquales. Hæc contusa, cribrata, & ex aceto
subacta chalbano commisce, & quo diximus modo vtere. *Aliud.* Cachryos, herbæ pedicularis,
radicū vitis albæ, aristolochiæ, singulorum partem vnam: myrrhæ, opopanacis, singulorum par
tes duas. Hæc quoque cum aceto veluti docuimus subige.

Damocratus ad Reptilium & Canis rabidi Morsum Antidoti.

CAP. 15.

Q Voniā verò quæ carminibus conscriptæ sunt medicinæ facilius memoria contingentur, &
earum pondera linceriū incorrupta seruāt, ideo mihi satius esse visum est Damocratis ver
sus hoc in loco subiungere, qui ita se habent.

N VNC autem tradere medicinas volo,

Quæ morsus tantum venenatos sanent
Cornutæ, viperarum, aspidis, chersydri:
Ictus ferarum, & puncturas quoq;
Apum, vesparum, scorpij, phalangij.

Hac arte struas. Iridis bis quatuor

Assume drachmas primū: tū zingiberis,
Succi panacis, & succi papaueris,
Radicū libanotidis, semen trifolij
Cuiusq; creticum tamen, bis quatuor.
Aristolochiæ, longam dico, & rutæ
Agrestis seminum drachmas duodecim.
Radicū vitis albæ sex & decem:
Serpilli verò pariter & smyrnij,
Ponto que missi nobilis castorij,
Tantundem: sed eryngij, & seminum apij
Æthiopici præsertim & adhuc noui,
Cuiusq; drachmas appendo ter duas:
Erui q̄ candidi & mundi bisduodecim.

Hæc cuncta sicca & transmissa cribro,

Excipe vino. Paruos inde fac orbes

H

Rotas ue

A Rotas'ue paruas. Vnicam drachmam dabis
 Huius medicamenti, ex hemina meri
 Boni, non commisti, pinguis, & non noui.
 Facit dimidium resolutum aqua
 Tumori ventris, atq; turgido colo,
 Et quibus incerta causa quicquam dolet.

Alia

Valde bonum remedium, quo vfos etiam
 Ipsos bibendo noui commorfos male
 A viperis nuper captis, quos vocant
 Pſyllos (gens hæc natura non ferme solet
 Pati serpentes, neq; assueta timet)
 Dedisse q; alijs valde commorfis male.

Mollem siccabis vmbra mellissophyllon:
 Siccatum tunde, mox q; drachmas accipe

B Inde bis octo. Tum longæ vel rotundæ
 Aristolochiæ, drachmas adde decem,
 Sicca tamen: chamædryos decem quoq;
 Myrrhæ & bonæ & troglodyticæ item decem.

Istæc contusa subtili cribro excute:

Mellis quod satis dulcis adde, & vnias.

Dato quod pendet drachmam vel plus parum,

E vini purioris cyathis decem.

QUIDAM è longo atq; recenti folio
 Exprimunt succum, sic q; mensura pari
 Vinum coniungunt, vt q; bibatur iubent.
 Mensura vtriusq; sint cyathi decem,
 Parum vel minus, aut parumper amplius.
 Impositum quoq; folium attritum prodest.

Alia

C Cum hæc ad alias serpentes feras quidem,
 Tum verò est viperis efficax remedium.
 Semper repositum habeas coagulum
 Ceruini pulli, recens sit præcipimus.
 Antiquo recens stomacho plus conuenit.
 Drachmam repositi cyathis duobus
 Vini falerni, & aquæ sat quæ videatur,
 Admisce. Præbe quibus dentes intulit
 Serpens, mox vigilent ambulent q; impera.
 Ac, si demorsa non hoc prohibeant loca,
 Balneas petant, vbi per tempus aliquod
 Maneant: egressi q; haud multum postea
 Rursus, vt dixi, capiant coagulum.

Alia

E Genere eorum quæ aduersantur venenis

D Antidotus ea est, quæ ad rabidi morsum canis
 Facit, latrandi morsum inferentem amentiam,
 Et aquæ & potus omnis inanem metum
 Vsque adeo, vt si aquæ tantillum videat,
 Et conuellatur æger, & statim tremat.
 Hic & vigilias inter & amentias
 Iuges degendo, commorietur breui.
 Ac quamuis primo effugiat metum aquæ,
 Tamen mox ipsum tales heu casus manent
 Repente, quales solent commorfos diu.
 Ergo ne tales in pauores incidas,
 Velim tam sacram medicinam pares.
 Nam si quis ipsam quo dicam bibet modo,
 Nullam commorfus sentiet insaniam.
 Confice hoc pacto. Cancros fluuiatiles
 Sarmentis vitis albæ sed viniferæ

Combure,

Combure, & tere, tritos serua pyxide.
 Rursus cribratam bene gentianam,
 Alio conde vase. Cum vti opus erit,
 Insperge cyathis vini suavis tribus,
 Mystra duo parua cancrorum cineris, &
 Gentianæ vnum, sicut dixi, contritæ.
 Ieiunus hoc commistum sorbeat tribus
 Æger diebus nullo intermisso, iube.
 Lux prima si quo casu præterierit,
 Duobus alijs simplicem mensuram
 Trades: secundo duplum die porriges
 E vini cyathis, vt dixi modo, tribus.
 Quibusdam rursus & transacto tertio
 Videtur, tantum morfu vastatos graui
 Tres semper gentianæ dandos obolos,
 Secundus adlit donec & vigesimus,
 Tribus è vini cyathis vel plus parum.

Alia

Hanc quoq; ad eos qui timent aquam sibi
 Dicebat Niceratus constare, & simul
 Amicis, qui mirandas iudicare
 Medicinarum proprietates queunt.
 Lycij Patarici optimi tres obolos,
 Præstaret Indicum, si id adesset tibi.
 Dies iubebat viginti duos dare
 Ieiuno, vt dixi, nuper morso, & ex aqua.
 Facere succus britannicæ fertur idem
 Datus, quo lycium præcepimus modo.
 Hoc quidam etiam multum admirantur, Duo
 Vrsinæ fellis mystra, duobus aquæ
 Admista cyathis, diebus tribus datum,
 Manè cum primum illucescit, ante cibum.

AD MORSVS rabidi Canis, præsertim vbi
 In rabiem complures incidunt canes,
 Emplastrum, quo aduersus saniem vtor, habe,
 Quæ è morfu exit: iuuabit, & si quid nigrum
 Vulneribus inest aut liuens. Vulnus vbi
 Circum scalpseris, emplastrum pone super
 Per longum tempus, atq; vulnus dilata
 Medicamento quod crustam & vlcus ducat.
 Facit ad aliarum ferarum nihil minus,
 Quæ virus linquunt, ictus, atq; morsus:
 Et tela prauo madefacta toxico:
 Et vlcus omne, sic vocant, moris mali.

Terræ ampelitudis nigræ drachmas cape
 Bis quinque, bis viginti. His adde argenti bonæ
 Tantundem spumæ, & tantundem bituminis.
 Tribus prædictis par sit pondus olei.
 Attica pendat propolis decem quater.
 Aristolochia, & symphitum, & marrubium,
 Elenium'que, & chamelæon bis hæc duas.
 Tres iris alba sicca, tres & smyrnium,
 Tres galla non matura: sex alumen, &
 Polium, quæ chalbanum vno vincat obolo.
 Decem & duas thus pendat & dimidiam.
 Chalcitis vsta drachmas tantum quatuor
 Pendat, centaurion tenue ter duas.
 Bis quinque & decem affunde mellis attici.
 Confice diligenter, & præsens asta:
 Nam valde, si contempnas, vritur citò.
 Ergo ampelitim terram, & argenti spumam

Concrede

- A Concrede vasi fictili magno & nouo,
 Oliuo affuso. Mox igne leni coque.
 Denfari cum videbis, alumen, atq;
 Chalcitim sparge: vas' que seorsum aliud
 Colliquet mella, chalbanum, & propolin:
 Ac si quid aliud liquandum adsit, liquet.
 Hæc vbi satis ferbuerint, transferas.
 Oliuo iuncta cum ferbuerint parum,
 Nec plus inquinant, insperge puluerem
 Quem tusa radix, quem caulis herbę dedit.
 His actis, statim vas ab igne transferas.
 Et commiscendo vbi refrixerit parum,
 Effusum valida emplastrum subiges manu.
 Subactum serua, sed contectum corio.
- B Vulneri cuspis quod intulit hoc prodest,
 Veneno cuspis illita. Prodest quibus
 Serpens venenum intulit, atq; fera.
 Vnus' que idcirco est omnium curæ modus.
 Omnibus carnem vulneratam protinus
 Scalpello circuncide, vel igne amputa.
 Ventosam post hæc, ni locus vetet, infer,
 Acutis' que & vrentibus medicinis
 Vulnus seruabis latum multo tempore.
 Hoc nos in libro docuimus alio,
 Illis scribes qui medicinas volunt
 Conficere, quæ vrentibus & scalpro fiunt.
- V T A T V R idem antidotis, quas docui
 Bibendas illis quos commorsit vipera.
 Bibendum trade, & hinnuli coagulum.
 Bibendam trade gentianam rabido
- C Cane commorsis, ac quæ dixi reliqua
 Istis prodesse, nam hæc conueniunt quoque.
 Cyrenes succus, is si non adsit, dabis
 Quem Medi mittunt, quantū pendet obolus
 Duobus è calentis cyathis aquæ.
 At gentianæ quod tres obolos trahit,
 Multum radice succus est præstantior.

*Antidoti ab Hera conscriptæ, quæ & Theriaca sunt: Quasq; & nos
 experti sumus.*

CAP. 17.

Theriaca qua Marcus Imperator utebatur hæc recipit, Seminis trifolij quod bitumen pluri-
 mum oleat, aristolochiæ rotundæ, rutæ syluestris, erui permoliti, pondus æquale. Omnia hæc
 inter se vino cōmisce, rotulas confice drachmarum quatuor, quarum vnam dabis ex vino et oleo.

- Alia.* Fraxini folia contūde, exprime, expressum succum bibendum da: quod ab expressione su-
 perest, vulnere impone. *Alia ad Phalangiorum ictus.* Vni rotulæ trigonis pastilli, piperis grana tre-
 * Decem admisce, & folij herbæ grana quadraginta, commista ex vino diluto calefactio bibenda tra-
 des quotidie vsque ad tres dies. *Alia quæ ad Idem facit:* Et continet, Aristolochiæ longæ 3 i, cumini
 æthiopici obolos tres, seminis rutæ syluestris 3 vi, succi cyrenaici 3 iij & semis, rubricæ lemnia 3 x,
 myrrhæ 3 vij, opobalsami 3 viij, piperis albi 3 ij & semis, cachryos 3 iij. Hæc tusa & cribrata mellis
 concorporato: & ex aqua calida dato magnitudine fabæ ægyptiæ: q̄ si impensius obniti volueris,
 duplum porriges. *Alia post theriacales antidotos conscripta.* Nescio tamen quo pacto Asclepiades or-
 dine non seruato, postea quàm potiones duas ad coxēdices scripsit, rursus ad antidotos reuertatur,
 describat q̄ eam quam Zopyriam appellant: Et aliam quandam ex multis rebus compositam ve-
 nenis omnibus, vt inquit, aduersantem tam antè q̄ post assumpta: vtilem insuper demorsis à cane
 rabido, laborantibus q̄ morbo laterali, et internis doloribus omnibus, ita vt muliebres affectiones
 quoq; leuet. Post hanc rursus aliam plurimi vsus subiungit ex centum rebus conflata, excellen-
 ter, vt ait, ad venena & eos qui sumpta cerussa suffocantur faciētem. Deinde ab his aliam adhuc ex
 rubrica lemnia confectam, de qua dudum antea mentionem feci, cum Damocratis versus transcri-
 berem. Illa igitur quæ ex centū rebus est, omissa, satis mihi fecisse videbor si Zopyriam vocatam,
 huic q̄ aliam subsequētē, & vltimò illam quæ à rubrica lemnia cognominatur exponam, præter-
 missa, vt dixi, centum rerum antidoto, quæ eadem est cum illa quam Andromachus conscripfit.

C Antidotos

¶ *Antidotus Zopyria faciens ad Omnia, sed præcipuè ad Venena, Iecoris morbos, Ventris inflationes, & Incipientes aquas inter cutem effundi, maxime verò quando plus status quàm aquæ affuerit. Accipit autem Myrrhæ 3 v, spicæ nardi 3 v & semis, croci 3 iij & semis, florum iunci odorati 3 ij & mediam, calix 3 iij, cinnamomi 3 tres, piperis albi drachmam vnam & mediam, thuris drachmam vnam & obolum vnum, costi drachmam vnam. Ex his melle attico exceptis rotulas confice, nucis auellanae magnitudinem non excedentes, quas ex vino aut aqua dabis.* ¶ *Alia Antidotus quæ ad omnia Venena tam ante quam post assumpta confert. Demorfos quoq; à Cane rabido, Lateris morbo laborantes, Internis doloribus vexatos, sanat: ac Mulierum dolores morbos q; subleuat. Habet autem Radicis dulcis drach. vi obo. i semis, feminis dauci cretici drach. vi ob. i semis, opii drach. iiii ob. ii, castorii drach. ii ob. i, piperis longi drach. vi ob. iiii, costi 3 vi. obo. ii, spicæ nardi drach. vi obo. i semis, calix nigrae drach. v obo. ii, thuris masculi drach. i & semis, seseleos drach. v obo. ii, scordii drach. vi obo. ii semis, succi hypocyttidis drach. vi, acori drach. ii, foliorum malabathri drach. vi obo. i, ligapeni drach. ii, fructus balsami drach. v obo. ii, myrrhæ drach. vi croci drach. vi obo. ii, styracis drach. vi, cinnamomi 3 vii obo. ii, zingiberis drach. vii obo. ii, piperis albi drach. v obo. ii, phu drach. v, petroselini drach. iiii, nardi gallicanae drach. iiii obo. ii semis, hyperici drach. ii, succi acaciae drach. ii, gentianæ drach. iiii, iridis illyricæ drach. ii, anisi drach. iiii, thlaspeos drach. vi obo. ii semis, rosarum siccarum drach. iiii, mei F drach. ij, gummi drach. ii, cardamomi drach. iiii, florum iunci odorati drach. vi obo. ii, opoponacis drach. vii, opobalsami drach. vi & semis, chalbani drach. iij obo. ij, terebinthinæ drach. iij obo. ii, agarici drach. vii & mediam, cypheos drach. vi, bdellii drach. vi, scinci drach. ii, amomi drach. iiii, polii drach. v obo. ii, dictamni drach. vi, feminis rute sylvestris drach. iiii, sigilli lemnici drach. ii semis, irionis drach. iiii. Hæc omnia ex vino falerno et attico melle commisce.* ¶ *Alia Antidotus quæ tam ante Venenum quàm post assumpta hominem à morte liberat: quæ quæ si cum alijs medicinis exhibeatur, impedimentum nullum affert. Quoties autem exhibitæ fuerit consq; nauseam concitat, quoad mortiferum omne excutiat. Habet autem Rubricæ lemnia sigillo obli gnatae drachmas duas & obolos totidem, baccarum iuniperi drachmas duas. Hæc minutè contrita oleo q; quàm bono commista, ex mulso dabis nucis auellanae magnitudine.* ¶ *Ad eos qui à Rabidis canibus morfi in aquarum formidinem deuenerunt, Antidorum ab Aphrodisumptum. Lathyridis vnciâ vnam, castorii drachmas tres. Cōminuta hæc ad drachmæ pōdus ex hemina vini rosacei bibenda trade.* ¶ *Auctoris eiusdem ad Aquarum formidinem Pilula. Castorii drachmam vnam & mediam, & lathyridis grana nouem. Commisce & exhibe.*

¶ *Ad Idem Antidotus alia à Nicostrato accepta: Quæ continet Castorii drachmas octo, lycii indicidrachmas quatuor, gentianæ drachmas duas, cancrorum exustorum drachmam vnam & mediam. Cuncta hæc melli commista dato.* ¶ *Ad Aquarum formidinem admirabile. Si quis aquam in qua fabri ferrum intingunt artifice incio bibendam præbuerit, valde mirabitur. Vt autem qui iam in aquarum formidinem deuenerunt bibant, pannum superimmites poculo, qua parte egreditur aqua & bibit. Gentiana quoque per se ipsam ex aqua data confert trium cochlearium mēsurā.* ¶ *Amaranthi grammatici † ad Dolorem pedum Antidotus, quæ & ipse vsus sum. Habet autē Rheipontici drach. x, piperis albi drach. viii: petroselini, agarici, hyperici, acori, eryngii, singulorum drach. vi: cardamomi, thlaspeos, acaciae, succi glycyrrhizæ, rosarum siccarum, singulorum drachmas quatuor: feminis foeniculi, aristolochiæ longæ & rotundæ, singulorum drach. ii: baccarum rusci drach. iiii, feminis apii drach. iiii, feminis napi sylvestris drach. iiii, zingiberis drach. iiii, gentianæ 3 vi, scinci drach. ii, thuris drach. v, phu pontici drach. iiii, irionis drach. vi, iridis illyricæ drach. iiii: calix, ligustici, florum iunci odorati, spicæ nardi, iiii, scorpiuri, singulorum 3 vi: mellis quod sufficit. Ex hac singulis annis dato quantum est nucis auellanae magnitudo.* ¶ *Alia quæ vtror. Chamedryos drachmas quatuor, scordii drach. iiii, petroselini drach. iiii, cardamomi drach. iiii: marrubii, gentianæ, singulorum drach. quatuor: centaurii drach. iiii & semis, aristolochiæ rotundæ tantundem, mellis quantum satis est. Dabis ex hac singulis annis nucis auellanae magnitudine.*

FINIS

Galenus

† Fortasse ad viperarū morsus



GALENI DE COMPOSITIONE MEDICAMENTORVM LOCALIVM SIVE SECVNDVM LOCOS LIBRI DECEM

*A Iano Cornario Medico iam in latinum sermonem conuersi, ac denuo post Nicolai
Macchelli Medici Mutinensis emendationem. plurimis in locis ad veterum
græcorum codicum amussim castigati.*

ARGVMENTVM PRIMI LIBRI

Continet Medicamenta ad Pilorum & summæ Cutis capitis Affectiones.

Quid Agendum Hoc libro, ac de Differentijs, & Affectionibus, Pilorum.



C

Vod non solum is affectus qui curatur, curationem ipsam indicet, sed
q̄ tum ipsius agri temperamentū, tum affectæ particulæ natura, nō pa-
rum simul indicent, antea in cōmentarijs de medendi methodo est mō-
stratū. Quemadmodū ēt quo modo quis ex simplicibus medicamentis
per se cōpositū aliquod faciat, compendio quidē in illa ipsa methodo,
fusus verō in septem libris ante hunc item æditis, oēm cōponendorū
medicamentorū vniuersalē viam ac rōnē ostendimus. Nunc verō quo
modo quis per se vniuersali viā ac rōnē medicamētorū facultates præ-
paret ad singulas partes congruentes, atq; ijs quæ à prioribus medicis
inuentæ sunt rectē vti, percurrere propositū est, à capite initio factō,
sicuti oibus qui nos præcellerunt est visum. Accidunt aut capiti plurimæ affectiones cū reliquis
oibus partibus cōmunes: verūm capillorū affectionem cum paucis cōmunem habet, propterea
q̄ ēt pilosum esse, ex primaria rōne haud multis inest. Generatio. n. pilorum eadem est quæ terre
nascentiū, quemadmodū in libris de temperamētis est demonstratū. Quēadmodū aut in ijs quæ-
dam arte & arbitrio agricolæ, quædā verō iuxta naturales causas proueniunt, eodem modo & in
aialium corporibus. Aruo. n. cuiuspiam triticū aut hordeū aut quidpiam cæterorum cerealium semī-
num in se natorū habēt, ea pilorū parte, quæ in regione superiori producit, caput similatur. Pili
verō qui in vniuerso corpore, cæteris herbis similē habent generationem: non enim secundū pri-
mam rōnem, sed per accidens quoddā, natura eos generare solet. At pili cū palpebrarū, tum su-
perciliorū, non paruā vtilitatem animalibus exhibere ostendebant: menti verō & pudendorū pili
minoris vtilitatis gratia produci vidētur. Quapropter ēt affectiones pilorum in oculis & super-
cilijs in primis nos ad sui curationē adhortantur: secundum verō locum capitis capillorum affe-
ctiones habent: deinde menti & pudendorum. Sunt aut pilorum affectiones, perfectā perditio,
& coloris ipsorum alteratio, velut in vitiligine alba, {Leuce Græcis appellata,} heri consuevit.
Ad hæc etiam in alopecijs & ophialsi non modicū atq; indecorum detrimentum simul capillis ac-
cedit. Quidā igit promiserunt veluti has, sic ēt incipientem caluiciem se, ne aulescant, prohibitu-
ros: sunt autem qui hoc impossibile esse dicunt. Ad alopeciarum aut & ophialis curationē ac-
cedentes, pharmaca scripserunt per quæ perfectā ipsarū sanationem pollicentur. At verō pleriq;
medici ex ipsorum vsu aliquñ non solum successu longē frustrantur, sed ēt vehementer nocent, vt
affectio ipsa incurabilis reddatur: quod sanē ipsis ēt circa alia pharmaca contingit, quibus citra
methodi rationem vtuntur. Ego verō id quod Hippocrates precepit, in artis operibus facere sem-
per annitor: nimirum || Vt quod auxiliij loco adhibetur, velut ille scripsit, iuuat, vel certē non no-
ceat. Quod verō pharmacorum citra methodum vsus non solum non profit, sed frequenter etiā
oblit, hinc sanē discere licet. Iam verō ordiendi quod proposuimus tempus adest.

1. Epid. c. 5. l. 1.
50. 3. 112. f

Quinta Classis.

QQQQQ

De

Quemadmodum plantæ aliquæ ob humoris inopiam reficcate corrumpuntur, aliquæ verò ob humoris alieni ab ipsarum natura cōmercium, eodem modo & capilli aut propter humorum ex quibus nutriri consueuerunt inopiam, aut propter eorundem vitiationem, accidunt ut corrumpantur. Et propter inopiam sanè humorū Caluicies cōtingit: ppter vitiatos verò humores Alopecia, & Ophialis: vnū quidem ambæ secundum morbosam affectionē malum, nomina aut iuxta figurā habētes diuersa: serpenti. n. similis læsa capitis pars in ophiali apparet: alopecias aut ob id appellatas ferunt, q̃ vulpibus frequēter accidunt. Nos aut propter quid sic appellari cōtingit non quærimus: vnde verò oriantur causam quærentes, eā ipsam humorū vitiatorū redundantiam comperimus. Quales autē tandem sint corrupti humores, ex colore cutis capitis cognosces: aliquibus. n. mutata albidior apparet, aliq̃bus nigrior, aut pallidior. Quare in istis primum totius corporis purgationē adhibebis, aut pharmaco pituitam ducente exhibito, aut quod bilē pallidā, aut nigrā trahit, coniectura redundantis humoris ex colore cutis facta. Ego verò semp per hierā purgaui: aliq̃n veratro nigro adiecto, vbi atrē bilis expurgare volui humorem: aliq̃n scāmonia, si amara bilis purganda esset: si verò pituitosum exuperare coniecissē humore, nihil admiscui. Tales enim præsertim ex capite, hiera ex colocynthide purgare cōsuevit, simul q̃ cum his et alios quosdam humores, etiam si scāmonia, aut veratrū nigrū, aut epithymum non assumpserit. Quin & ex aloe catapocia quæ tum scammoniam tum colocynthidem admistam habēt, vtiliter ita affectos purgare solent. Cæterum post totius corporis purgationem, pituitam per os ducere præstat, {Græci αποφλεγματίζειν dicūt:} deinde vsque adeo affecto loco remedia admouenda, de quorū cōpositione dicere aggredior. Oportet enim, velut in alijs, sic & in his affectioni mederi, cuius accessio siue symptoma est vitium capillorū. Si quidē igitur vitiatum humor circa vnū locū fuerit collectus, scopus medendi erit, ut is quā celerrimē euacuetur, prius q̃ ab ipso cutis in quendā malum habitū deducatur tm̃, ut etiam, si quis vitiatū ipsius humorē euacuet, & boni sanguinis influxum præparet, is adeo et à malo in ipsa habitu prius inducto corrumpatur. Si itaq̃ vitiatū humorem in cute euacuare volueris, discussorijs pharmacis opus habebis. Atqui cōtradictet forsā aliquis, cōmunem scopum in omnibus affectionibus quæ ex influxu humorum fiunt, contemni ac subuerti ratus, repelli ipsos debere asserens, partem refrigerando ac adstringendo, non attrahi cal faciēdo: esse aut discussoria medicamēta oīa facultate calida. Et certē affirmamus nos quoq̃ verē hæc dicta esse. Incipientes. n. ophiales & alopecias per hmōi pharmaca prohibere oportet ne au-gescant: non tm̃ iam principium ipsorū alopeciam aut ophialin appellari, sicut neq̃ scabiē, neq̃ lepram iam appellamus quæ ex impetigine orditur. Ego itaq̃ quēadmodum nostis, etiam iam factas alopecias aliq̃n sola purgatione sanauī, nullo amplius medicamento post ipsam ad locū affectum admoto. Ut aut ampliōrē eius rei experiētiā facerem, ex eiusmodi quopiam successu sum impulsus. Adolescens quispiā bonæ habitudinis, & exercitijs adfuetus, hanc affectionē in capite habebat: erat aut satis familiaris mihi, ut victus rationē etiam ipsius qua iam per tres aut quatuor menses vsus erat, probē nossem: explebat. n. se quotidie fermē fungis. Hunc itaq̃ sola hiera ex colocynthide purgaui bis in quinq̃ diebus: in prima sanè purgatione quatuor ex ea drachmis, in secunda quinq̃, exhibitis. Prius q̃ verò ad has purgationes peruenirē, catapotia ex aloe vndecim ei præbui, ciceribus ferē magnitudinem parem habentia. Habent aut catapocia hæc, Colocynthidis partē i: aloes & scāmonia, vtriusq̃ partes ij: his ego vnam partem succi absinthij misceo. Antea verò, et mastichen chīam & bdelliū adieci, hoc enim modo Quintus utebā. Verū ppter quid ea reiecerim postea, alio sermone explicabitur, quē in cōpositionis purgantium pharmacorum libros referuo. Cū igitur post has tres purgatiōes homini pituitā e capite deducere p apophlegmatismos vellē, atq̃ deinde pharmacū quoddā ad affectā partē adhibere, contigit ipsum de repente in pfecionē quandā ablegari: in qua cū boni succi cibis, de quibus à me audierat, vteret, post dies fortē viginti redijt ab affectiōe circa capillos penitus curatus. Ex hoc sanè successu incitatus ego, cū in alijs eandem curationē fecissē, expectaui ut viderē quid citra pharmacorū ad caput adhibitiōem esset secuturū. Curati sunt itaq̃ oēs hoc modo: non tm̃ in iam inueteratis hmōi experiētiā periculū feci. Difficiliter. n. eluuntur in his cuti admodū insidētes serosi humores: multo verò magis in ijs q̃bus iā ipsa cutis ad malū habitum peruēnit, desparāda est p solas purgationes curatio. Atq̃ hæc quidē necessariō pfatus sum. Cæterum de pharmacis affectioni huic cōmodis iā dicere incipiā. Euacuatiua igitur omnino esse oportet ipsa affligētis humoris, verū euacuare nihil potest quod non discutiendi vi sit præditū, eā verò vim citra calefactionē habere nō potest. Sed si quidē ex vehemēter calfacientiū numero fuerit, cutē exuret: q̃ si verò nō vrat, in principio quidē præclare iuuabit, progressu verò t̃pis cuticula capitis super reliccata talis euadet, qualem in caluis videmus. Non tm̃ simpliciter moderatē calidū esse pharmacū oportet, sed intra videlicet fines scopi, ppositi accedēs. Nam & tenuium partiū ipsum esse cōuenit, quod sanè in altū sit pgressurū, vnde radices capillorū generationis suæ principiū habēt, & vi qualem diximus p̃ditum: p̃ id quod crassior sit & durior capitis cutis, & ob id medicamento opus habeat efficaciore. Itaq̃ si supra hoc q̃ vitiatos humores discutiat, et idoneum sit ad bonū sanguinē attrahendum, velut est thapsia,

A.li.4. f.7. t.1
c.2. fol.505. bA.li.4. f.7. t.1
c.6. fo.507. d

A thapsia, optimum sanè pharmacum est censendum. At verò cum thapsia longè calidior sit q̃ affic-
tioni sit ex usu, meritò eius adhibitionem per se vitamus: exulcerationes enim in cute excitare
confuevit, & omnino phlegmonosa oedemata: quapropter necessariò quædã quæ eius vehemen-
tiam mitigent admiscemus. Id ipsum verò ceratum ex oleo apparatus præstare potest: sit autem
tenuium partium oleum quale est Sabinum, præstat item moderatè esse vetustum. Ad hanc rem
confert item oleum Cicinum, quod mox ab initio eiusmodi naturam habet, quale prædictum est
Sabinum inueteratum. Quòd si neutrum horum ad manum sit, ex reliquis græcis oleis citra olea-
rum germina apparatus quodcunq; tandem admiscemus, præsertim si sit vetustum. Perspicuum
itaq; esse opinor oleum ex Iberia, aut Hispania, aut quomodocunq; quis eam appellare velit, fu-
giendum esse, item q̃ quod ex oliuis non dum plenè maturis apparatus, Omotribes & Omphaci-
num Græcis appellatum. Vfus sum autem & sola thapsia, vehementi eius facultate larga aqua ad-
mitione exoluta. Verùm de thapsia, qui ipsa vtitur, sciat opus est, maximam differentiam esse re-
cētis ad vetustiorē: vis enim huius pharmaci post annum multum exoluitur, atq; amplius ad-
huc post duos annos: auderet autem quispiam dicere inutilem penitus eius vsum ad triennium pro-
gressu. Hæc igitur haud ignorans, imparē aquæ modum admiscebis. Ad recentem enim pluri-
B mum aquæ addes, eam q̃ sæpe singulis diebus illines: ad eam verò quæ per tempus imbecillior
reddita est, minus adfundes, quò & ob crassitudinem diutius adhærere, & propter liquiditatem
non statim defluere contingat. Quin & cum compositum pharmacum paras quod thapsiæ admi-
sionem requirit, quale est quo ego assidue vtor, non æquale semper pondus thapsiæ admiscebis,
sed quantum pro tempore ætatis eius conuenit, tantum ipsum pondus augebis. Cæterum de hac
tota re paulo post diligentius cum ad composita peruenero differetur, vbi prius omnia simplicia
pharmaca affectioni huic familiaria recēsuero. "Etenim ex his quæ fortiter calfaciūt, est Euphor-
bium: quæ autem sufficienter, Laurinum, siue oleum siue vnguentum, aut quocunq; tandem no-
mine id appellare velis: nam & his vnà cum calfaciendi ac discutiendi facultate inest vis adtrahen-
di sanguinem in locum ab ipsis calefactum. Licet igitur ipsis & per se vti, euphorbium quidem
in oleo læuigando soluendo ue, laurino verò solo citra alterius admitionem illiniendo: si tamen
nimis fluidum appareat, parum ceræ addatur. Cum verò multo calidius sit recens euphorbium, si
quidem eo quod duorum aut trium annorum est, vteris, ad libram vnā romanā olei, euphor-
bii vnciam vnā iniicies, quæ sanè duodecima olei pars existit. Recenti verò euphorbio parçē
vtaris, quā minima eius parte primum admista, aut etiam ceræ vncia vnā insuper addita, quò vi-
C deas quantum hominem excalfaciat: licebit enim tibi vbi rursus vti voles, denuò addere siue oleū
siue ceram malis. Eodem modo etiam thapsia vtendum est, omnibus q̃ fortibus medicamentis.
Peccatum enim infra modum nullum detrimentum affert, suprā verò aliquādo exasperat & exul-
cerat cutem, inflammationem q̃ suscitāt. Et sanè vbi in sequentibus cōpositis pharmacis q̃q; eu-
phorbium aut thapsia scribatur, pondus ipsorum in vigore existentium non veterum intelligere
oportet. Valde enim vetusta omnino fugere oportet, non solum in his pharmacis, sed omnibus
etiam alijs, quæ videlicet succi, & liquores, & flores, & folia, & fructus, & radices, & semina exi-
stunt, quando sanè etiam Metallica, per longioris temporis situm & ipsa viribus infirmantur.
Vtimur tamen quibusdam pharmacis viginti aut etiam triginta annorum, propterea quòd non
dum vergentem omnino habeant ætatem: alia enim aliam tum vigentem, tum vergentem seu in-
clinatam ætatem habent, atque etiam, si ita dicere libeat, senectam. Vnumquodq; autem propriū
vigorem ijs qui ea sæpe viderunt indicat, tum ex odore, tum ex gustu, aliquando etiam ex colore,
& secūdum crassitiem compage. Quemadmodum in alijs omnibus pharmacis non solum quòd
calefaciant operæpretium est cognoscere, sed & quanta distantia, quantoque ordine id faciant.
Sic item in ijs quæ alopecijs conferunt pharmacis nosse oportet, q̃ calidissimum quidem ex eis
D est euphorbium. Eo autem minus calidum est thapsia, post thapsiam autem sinapi & nasturtium.
Iuxta alium autem modum limnitis nulli horum secundum est: habet autem præter hanc duas
alias appellationes, nam & Adarcium & Adarce vocatur. Post hæc succedunt sulphur, & nitri
spuma, ipsum q̃ nitrum molle vsum, & quod Berenicariū appellatur: quemadmodū & Aphro-
nitrum album, leue, ac laxum, quod nullam in se terreā asperitatem habet. Deinde veratrum
vtrunque, & erucæ semen, & laurinum siue oleum siue vnguentum velis appellare: ad hæc alcyo-
nium vtrunq; vsum & non vsum, præstat tamen vsum: & arundinis radices, item q̃ cortex, am-
bo vsta. Quin & pix liquida, & cedrinum quod aliqui cedriam appellant, & murium stercus, vr-
sa q̃z adeps: præstat autem si vetustior extet. Quanquam etiam hyanæ, leonis q̃z, ac pardalis, ac an-
feris, adipēs conueniunt, & quicunq; tenuium partium substantiam habent, quò promptè in cu-
tis profundum penetrare queant, atq; ad radices vsq; capillorū pertingant. Sed & amygdalæ ama-
ræ integræ vstæ commodæ sunt, & thus aceto acerrimo confectum. Confectum autem intellige
cum pluribus diebus, & maximè ad Solem diutius cum acri aceto sit contritum. His itaque omni-
bus pharmacis licet vtaris, ad fortia quidem cerato liquido addito, debilibus verò oleo laurino im-
butis. Et inueteratas quidem ac difficulter curabiles cum fortibus perfanare conaberis, incipien-
tes autem & paruas, cum debilibus.

Cæterum pharmaca composita, quæ partim à prioribus medicis, qui alicuius æstimationis fuerunt, magnopere sunt laudata, partim verò à nobis ipsis per longam experientiam sunt examinata ac probata, eiusmodi existunt. ¶ Euphorbii, thapsiæ, laurini, lingulorū 3 ij; sulphuris viui, veratri vtriusq; 3 i: neq; refert albo an nigro veratro, quod ad manū sit, vtaris. His admisce cerę 3 vi, laurino, aut cicino, aut veteri oleo præliquans: vt ere q; hoc vt fortissimo pharmaco ad inueteratas & ægrè curabiles alopecias. His etiam aliquñ nasturtij 3 i, aut alcyonij vsti 3 i, admiscui. Præstat autem in hunc vsum alcyonium quod durius est & magis asperum. Quod si thapsia nō adlit, pro ipsa tñ pondus seminis nasturtij aut erucæ addes, aut ipsum adeo nasturtium. Si verò laurinum non habeas bonum, picem liquidam adde: laurinum nanq; picem liquidam non multum excelsit, thapsia verò reliquorum respectu maximum excessum habet. Hoc sanè pharmacum omnium quæ ad hanc affectionem efficaciter faciunt, fortissimum & valentissimū est, qñ videlicet affectio, vt dicebam, ægrè recipit curationem. Quæ enim parua est & incipiens etiamnum, sola purgatione sanatur, & p singula quæ recensui simplicia vsta † laurino, aut cedrino, aut liquida pice, aut cicino vel veteri oleo excepta. Admiscui etiā aliquñ mel pro cerato, minori tñ copia & pondere, neq; vlla ex parte peius euallit pharmacum. Quæ verò ē ex adipibus componuntur thapsiæ paucissimum F assummentia profunt, præsertim si euphorbiū & adarcium addatur. Sit aut adipis cuiusq; pars vna: sunt enim tres, leonis, pardalij, & hyænæ. Si verò hyænæ adeps non adlit, sufficit præsentibus reliquis duobus vti, anserino admisto. Si verò oēs quatuor habeas, simul oēs miscebis, addito insuper si adlit vrsino. Ad totam verò eorum molem duodecimam thapsiæ aut euphorbii partem addere satis est: aut si omnino fortius facere velis, amborum simul addes: nā & per experientiam hæc ipsa pharmaca efficacia sunt iudicata. Plurimum. n. experientiæ habendę gratia. perentibus subinde medicis à me amicis, singulis aliud atq; aliud eorum quæ experientia cognita habui, ex tpe digestum exhibui, & reperta sunt sanè plurima ex eis optimè cōducentia. Verū ante omnia vos methodi meminisse oportet circa eorum vsum, quæ cōis in oibus præsertim fortibus pharmacis existit: quare ēt sæpe eius mentionem facio, vt potē in qua magna oīno vis lita est. Qui. n. singulis fortibus pharmacis vtitur, in principio quidem ipsa molliora adhibebit, admistione videlicet eorum quæ vires ipsorum exoluunt: qualia sunt oleū & cera, & ex simplicibus quæ diximus debilia, velut est thus, & arundinis cortex ac radices exustæ, & amygdalæ amaræ, & quæcunq; eius generis existunt. At verò post primū vsum cū iam secundo adhibere voles, intueri oportet qualem alterationem in affecta particula prius admotum pharmacum fecit, atq; illius respectu aut vehementiam facultatis eius lenire, aut augere. Velut in hac quā iam tractamus affectione, primū quidem capillos nouacula tollere oportet, deinde affectā cutē per lintecolum neq; asperū neq; molle nimis confricare, ac "videre ad quantū ruborē per hmōi motionem ac confrictionem pēuenit. Hoc. n. tibi ex vstu ad spem curationis est futurum. Nanq; si per exiguas defrictiones rubefiat, moderatā affectionē opinaris: si verò per multas, grauiorē, præsertim cū quædam cuticulæ etiam si multū cōfrices, non rubefiant. Manifestū igitur est has oīum difficillimè curari, sicut cōtra facillimè, quæ facile rubescunt: quæ verò inter has medio modo habent, tñ inter se differunt, quantū vel ad peilimas vel moderatissimas accedunt. Atq; hæc quidē accessionis loco sint dicta, quantū neq; neglectui habenda. Rursus itaq; ad id quod propositū erat reuersus, methodi te cōmonestaciā quam vsum pharmacorum requirit. Post primā igitur pharmaci cuius vsum elegeris adh. bitionē, intueri conuenit primū quidē, an ēt ante confrictionem cutis coloratior appareat: deinde aut an cū pauciore q; prius frictione: aut an cū æquali quidem, magis tñ q; prius rubicunda fiat. Præ oibus verò animaduertere oportet ne in fortium pharmacorum admotione cutis vltra q; conuenit concallescet, id quod tum ex colore ipsius, tum digitorum tactu deprehendes: colore nanq; flauior apparebit, & digitorum contactu abūdē calidam cognosces. Horū itaq; animaduersionē habere oportet: periculum enim est iterū atq; iterum repetito eorum vstu cutem exurī. Quare ad molliora transendum est: aut eodem vtendum quidem, sed cerati, aut adipis, aut liquoris cuiusdam oleoli admistione vi ipsius exoluta. Vtendum est & olei calidi dulcis irrigatione, & cataplasmate ex pane, fermentis q;, & scarificationibus, ac cucurbitis, & cerati illitione, {virium item refectrice diætā.} Cæterum perseverante affectione vtendum est assidua rasura, & rubificationis ex sinapi velut est prædictum, item q; frictionibus præscriptis: & sequentibus diebus illita pice, aut oleo cedrino, & post confrictionē scarificationibus. Quidā verò aciculas colligantes hoc modo, vt aciem ad cutē vergentem habeant, per ipsas cutē compungunt. Verū post rubificationem per defrictionem inductā & post scarificationem, pharmacis quæ ex alto euocare, ac meatus transmutare possunt {Metasyn critica Græci appellant,} vtēmur. In omnibus autem cōis scopus hic sit, vt in aere calido pharmacum ipsum adhibeamus, & maximè si fieri possit in loco insolato, qui non habeat aurā ipsum perflantem: hyemis autem tempore præstiterit in balneo his pharmacis vti.

De Pharmacis Compositis ad Alopecie affectionem à Senioribus me Medicis conscriptis.

Heras quidem igitur in ferula iuxta dictionis seriē sic scripsit ad alopecias. ¶ Alcyoniū quod asperius est, vstum ac cum oleo tritum ac laeuigatum loco illinito. Sit autem oleum maximè ex lucernis

† vstai. κεκαυ
μενον. αλ. κατ
αυτο μόνον
i. per se sola.

A. l. 4. f. 7. r. 1.
c. 5. fol. 507. c

A lucernis acceptum. Hæc quidem sunt Heræ herba: Verum nosse oportet mediū esse viribus hoc pharmacum, & propterea ad medias magnitudine alopecias curandas sufficiens. Inhermuu equidem pharmacum est, si calami radicem aut corticem, aut amygdalas amaras, aut eius generis quipiam vstum, cum oleo committas. Fortia verò sunt quæ ex euphorbio, & thapsia, & adarca apparentur. In medio verò istorum est alcyonium vstum, sed & ipsum moderatius redditur oleo admisto, fortius verò liquida pice aut laurino affuso. Miscetur item prædictis adipibus. Et sanè ego cui dam qui ad hanc affectionem vrsino adipe vsus erat, nec quicquam profecerat, alcyonium admiscere consului, à quo postea breui sanus euasit. Ceterum oleum lucernarum non ob aliam rationē aptum est, q̄ q̄ magis tenuium partiū existit, id quod ipsi ex lucerna in qua veluti coquitur accedit, sit q̄ tum veteri, tum cicino adsimile, veluti si etiam aliàs ad ignem oleū velis calefacere. Itaq; & sordes quæ in lucernis liquido luto similes, gignuntur, ijs qui apud nos ruri degunt cognitæ sunt, ad vlcera in medio digitorum pedum curanda efficaces: quæ vlcera frequenter illis oboriuntur, propter illuuiem & negligētiā perluendi eos singulis diebus. His itaq; sordibus lutosis cōsului cuidam rurali alopeciam, vbi prius rasilset, quam mihi ostenderat, illinire, simul q̄ frequenti abrasione vti: qui sanè ab ipsis perlanatus, etiam alios tentauit hoc modo curare, vtpotè qui puta

B ret omnem alopeciam ab hoc pharmaco posse curari. Verum ego cum moderatam eius affectionem essem intuitus, speraui ipsum quidem per illas sordes sanitatem consecuturum.

Aliud Compositum Pharmacum Heræ Pueris aptum.

Aliud etiam deinceps pharmacum Heras post præscriptum, iuxta seriem dictionis hoc modo scripsit. **C** Deminis erucæ partem i, nasturtij partem i, nitri partē i. In aliquibus autem exemplaribus simpliciter scriptum est: Erucæ partem i, nasturtij partem i, nitri partem i: contritis picem li quidam affunde, & loco prius confricato impone: atq; vbi abstuleris pharmacum, locum spōgia calida imbuta extere. Auferes autem bis per diem, & in pueris maximè efficax conspicitur hoc pharmacum. Fortius enim est priore verum inueteratam & ægrè cedentem alopeciam non curauerit: quod ipsum etiā Heras indicat, qui in pueris ipsum maximè efficax adscripsit, hoc est in corporibus molli cute præditis. Ex huiusmodi enim vitiatū humores faciliè discutiuntur. Habent autem consimilem pueris cuticulam eunuchi & mulieres.

De iis quæ Crito ad Alopecias conscripsit.

Crito verò in tertio libro eorū quæ ad corporis ornatum pertinent, sic scripsit. **C** Ad affectionem Alopeciam appellatam, quæ capillos denasat, & cuius deformitatem inducit, subscriptis compositionibus vtendum est, vt Heracides Tarentinus tradit. Amygdalas amaras cum corticibus vstas ac tritas aceto excipe, modico item affuso melle. Vsu verò expetente, loco per mundum linteolum præfricato, affidue illine. Prodest autem maximè etiam assidua rasura, antequā pharmacum imponatur. *Aliud quo Moschus vsus est.* Erinaceorum marinorum testas exustas & aqua subactas locis præfrictis impone. In quibusdam exemplaribus non aqua, sed adipe vrsino excipi debere Erinaceorum cinerem repperi, quod mihi magis placuit: hoc enim modo efficacius redditur. *Aliud.* Arundinis radices vstas adipe vrsino excipe, atq; impone. *Aliud.* Thapsiæ corticem tritum cum aceto imposito. *Aliud.* Chamæleonis radicem cum aceto diligenter trita imposito. Hæc præfatus Criton deinceps ita scribit: Quod si verò perseveret affectio, subscriptis compositionibus vtendum est. Quibus verbis planè indicat per præscripta medicamenta moderatas affectiones sanari. Itaq; deinceps quæ ad fortiores affectiones conducūt scribit, quæ iuxta seriem dictionis ipsius hoc modo habent. **C** Ad Alopecias velut Heracides Tarentinus tradit. Orestini ad alopecias inueteratas. Muscerdæ 3 ij, thuris 3 ij: aceto acerrimo dissoluta præfatis locis illine. *Aliud.* Erinaceorum marinorū vnā cum testis exustorum 3 ij, gallarum acerbarum tantundem, amygdalarum amararum vstarum tantundem, muscerdæ 3 i: aceto dissoluta & probè trita imposito. *Aliud Orestini.* Pilorum vrsi vsto Drum, adianthi vsti, radicum arundinis vstarum, foliorum fici vstorum, panniculi Cilicij vsti, singulorum æquales partes adipe vrsino & cedria excipe. Vsu verò tempore, loco foto, & per fici folia confricato, ac per nitrum exterfo, pharmacum quotidie illine. Cutis verò superficie exulcerata, ceratum ex oui luteo impone, & farinarum tritici ac hordei succum recentem superline. *Aliud Orthonis Siculi accommodatum.* Cineris ranarum minimarum in ollula vstarum partem vnā: muscerdæ, veratri albi, radice arundinis vstæ, piperis albi, singulorum æquales portiones aceto excipe, & ad præfrictum ac prærasum locum vtere. *Aliud.* Cineris vngularum caprinarum vstarum, succi thapsiæ, alcyonij, muscerdæ, spumæ nitri, myrrhæ, piperis albi, zingiberis, singulorum æquas partes probè tritas felle caprino excipe.

Quæ Cleopatra in Libro eorum quæ ad Corporis ornatum pertinent, scripsit.

In libro Cleopatæ de ornatu corporis, ad alopecias descripta sunt pharmaca, quæ iuxta illius dictionis seriem hoc modo habent. **C** Ad Alopecias. Sandaracham tritam, largo q̄ visco quercino exceptam, & in linteolum inditam, loco per nitrum prius preparato imposito. Ego verò et nitri spumam ad prædicta admiscui, & egregiè efficax pharmacum fuit. *Aliud.* Scillæ 3 i, veratri albi 3 i: ex aceto trita præfatis & nitro confricatis illinito. *Aliud.* Sinapis 3 i, nasturtij 3 i, trita ex aceto: præfatis & nitro exterfis locis imposito. Præstat autē locum vulnusculis impactis scarificare.

Quinta Classis.

QQQQQ ij *Aliud.*

† Additur in antiquis πρὸς ἀλωπεκίας τὰς μετρίας. i. ad alopecias moderatas.

† AP. Et liliorū & tritici & hordei succo recentē.

Aliud. Corticis arundinis 3 iij, spume nitri 3 iij: pice liquida exceptis vtere. Cæterum locum affi E
duè radere oportet, & cum linteolo confricare, sic enim q̄ celerrimè pilos producet. *Aliud.* Mu-
scarum capita contrita africa. *Aliud.* Muscerdas tritas illine, loco prius per linteoli affricum sub
cruento reddito. *Aliud.* Amygdalas amaras vnā cum corticibus exustas cū aceto & melle conte-
re, & loco per defricionem subcruento reddito illine, id q̄ ipsum assidue facere perge: & locū no
macula rade, sic enim capilli citò prodibunt. *Aliud.* Cæterum ea quæ sequitur compositio oēs vi
sua præcellit, faciens item ad profluuium capillorū, cum oleo aut vnguento dissoluta: facit & ad
deciduos in principio palpebrarū pilos, & in caluiciē prolabentes: est q̄ oīno admirabilis. Mu-
riū domesticorum vstorū partem vnā, panniculi ampelini vsti partem vnā, dentium equinorum
vstorum partē vnā, adipis vrsini partem vnā, medullæ ceruinæ partē vnā, corticis arundinis partē
vnā. Hęc oīa arida læuigentur, & sufficienti melle admisto ad crassitudinem mellis redigantur, in-
de q̄ adeps & medulla liquefacta addantur: & pharmacum ipsum in æream pyxidem reponatur,
ex eo q̄ alopecia donec capillos producat defricetur. Similiter autē & proflui capilli quotidie ex
eo illinantur. Porro inter hęc ipsa pharmaca, item q̄ ea quæ deinceps describentur, non diffici-
le est diiudicare quæ acriora ac fortiora, rursus q̄ quæ molliora & imbecilliora, existāt, modò quis
ea quæ in principio dixi in memoriā reuocet. Ita enim & rectus eorum vsus continget, nimirū F
ad mediocres alopecias mediocribus adhibitis, ad fortiores fortioribus: velut etiam ad eas quæ for-
tissimæ sunt, fortissima remedia adiuuentur.

Quæ Archigenes ad Alopecias commoda Medicamenta conscripsit.

Archigenes item hæc pharmaca ad alopecias hac verborū serie descripsit. **C** Alopecias leues
& in superficie hærentes, nitro cōfricatas, ac linteolo exteras, verbenaca in Sole trita aceto q̄ dilu-
ta largiter illine. Aut eodem modo extersis betæ folia impone, in super q̄ linteolo humecto con-
tege, aufer autem ea per loci humectationem. Ceterum in altum progressas cum aceto, * nitri gle-
ba, aut sepia {eius quæ piscis est} testa, aut fici folijs, vsq̄ ad dilanationem defrica: deinde deterfo
sanguine, betam ex vino coctam impone, aut caricas vstas cum vino: aut lentis farinam cum vino
pro cataplasmate adhibe. Aut buprestis cum aceto, aut ranunculo, aut ari radice, aut tali quopiam,
in cerati formam radactis, & per noctem impositis, bullas ex alopecia excita: manè verò bullas cō
puncias, allio, aut buselino, aut anemones phernij {ue folijs}, intege. Probè faciunt etiam post exci-
tatas bullas hippocāpi marini vsti, & cum modico atramento sutorio crudo trito inspersi: item q̄
oīa maxillarum suillarum vsta. Aut vbi deraferis & cum nitri spuma deterferis, alcyonio, ex acri
aceto confrica, donec sanguis emanet: dehinc vbi nucum auellandarum putamina vsta ex melle læ G
uigaueris, inunge: atq̄ id bis in die facito. Sedat ac sistit eas vt plurimum in diebus decem. Aut
mures domesticos in olla exustos tritos q̄, axungia excipe, & præfrictis cū allio alopecijs in sple-
nio impone, id q̄ donec capilli enascantur quotidie repete. Aut ranunculos paruos similiter exu-
re, eorum q̄ cinerem cum pice sæpe feruefacta vsquequo crassa facta sit, illine, loco neq̄ raso, neq̄
prius confrictio. Aut muscerdas & thus æquali portione cum aceto ad mellis crassitudinem reda-
cta loco prius rubificato illine. Aut ficus aridas vstas cum oleo similiter illine, vbi prius læuigau-
ris. Aut veratrum album, {aut} piper, {aut} muscerdas, prædeterfis, ac prærafis ex aceto illine.

Aut raphano & cepis oblique concisis probè confricans illine. Aut alcyonium torrefactum cū
digito oleo madefacto diligenter affrica, donec morsum percipiat: & correctam alopeciam emen-
dabis. Aut alcyonium ad lucernam torrefactum, adipem q̄ vrsinum similiter liquefactum, misce,
& præfrictis ad Solem, illine. Aut præpunctis pro more, cepas tritas cum melle cataplasmatīs mo-
do impone. Aut raphani corticem eodem modo. Aut facta scarificatione, arundinis corticem su-
perioiorem quem Ægyptij Siphtherium appellant, vstum cum pice liquida committe, splenium q̄
imponere, & quater aut quinquies solue: deinde exterge, ac aliud splenium impone. Quidā nitrū
ad decimā cineris ipsius partē admiscēt, valde q̄ ei succedit. Aut squamam stomomatis ferri cum H
aceto & oleo illine eodē modo. Aut felis siue crocodili stercoris 3 vi, sinapis 3 iij, cum acri aceto il-
line. Aut cantharidas vstas pice liquida exceptas ad cerati liquidi formam redige: præfrictis q̄ ex
nitro albo locis & extersis, in splenio impone, & per noctem sine: manè verò tolle, locum q̄ exci-
cari permitte vsquequo circumcirca rumpatur: vbi verò eruperint capilli, eos assidue rade. Aut
nasturtium, vel vt alij piper: muscerdas, veratrum album, æqualibus portionibus ex aceto illine.

Aut cū piscis corio, quale est squatina, aut folio ficulneo, aut pumice læui, supernè alopecias crue-
tas facito, deinde q̄ amygdalas amaras vstas cū aceto mulso illinito: id q̄ assidue facito, ac radito,
augefcēt. n. statim capilli. Aut testudinis marinæ sanguinē illine, ex laudatissimis. n. hic est. Aut
hippopotami corium vstum illine. Aut nuces ponticas vstas, & staphidas syluestres cum vnguen-
to laurino. Hoc enim ab Archigene laudatur. Aut muscerdas & veratrum album illinito. Aut
corticis arundinis vsta, & nitri æquas partes, cum pice liquida ad malagmatīs formam redige:

Aut nuces amaras vnā cum corticibus vstas ex aceto aut melle frequenter illine, id q̄ loco prius
per linteolum exterso: post verò assidue radito. Aut ammoniacū thymiamā cū succo thymali
affricato, aut felis stercus aridum ex aceto. Aut rhois 3 iij vel ij, sinapis 3 ij, cum acri aceto illine.

Aut amygdalas amaras & pumicem illine. Dionysodorus autem medicus, Coriū, inquit, nouū
vstum

* Alinei.

*

*hippopotami

A vſtum cum acrí aceto illine *. Egregiè autem facit ad inueteratas alopecias, ſi thapſiæ ſuccum aut radicè cerato exceptū loco impolueris, etiam ſi nihil præterea aliud facias: decedit. n. ſuperna cutis & ſanie ſeroſa mader, capilli q̄ ſua ſponte ſubnaſcunt. Vides itaq; quō Archigenes ex Thapſia pharmacum collaudet, neq; n. aliud eo præſtantius reperias. Auger aut fidem commoditatis eius cōſona hiſtoria: quapropter & ego oīa quæ apud medicos expertos ſunt medicamēta ſcribo.

* Additur ex
atiquis, cabal
liq; dices uſus
ſimiliter.

Quæ Aſclepiades in libro de Alopecia ſcripſit.

Non recentioris nūc mentionē facio Aſclepiadæ, qui memorabiles ſanè pharmacorū compoſitiones in multis libris cōſcripſit, ſed vetuſtioris, Bithyni videlicet. Hic itaq; Aſclepiades curādī viā ſe reperiſſe gloriatur, per quam multos curatu difficiles alopecias habentes ſanatos dicit. Verū plus ad curationem totam viuendi rationem valere q̄ pharmaca ipſa tradit. De viuendi ratione itaq; hæc ſcribit: Abſtinendum itaq; ab oī vino in totum, propter has ipſas cauſas. Maniſtum verò eſt inde. ipſum antea retuliſſe cauſas, quas ſi quis diſcere velit, ex libri ipſius lectione requirat. Deinde ſubiungit: Abſtinendū ē à nimia repletionē. Prohibet aut & carniū eſum, & caſei, & lacūs, & leguminū, oīum q̄ ſimpliciter quæ ē exigua copia accepta vim habēt, qua multum & nutriant, & inflent. Quin & exercitia plurima fugere iubet, velut ēt aſſidua balnea, & multas exudationes. Cæterum de Pharmacis iuxta ſeriem dictionis ſic ſcribit. ¶ Eſt aut primū vnguētū tale. Spumæ nītri partes duas, ſalis ammoniaci partem vnā, vſta trita acerrimo q̄ aceto diluta, donec ſtrigmentorum craſſitudinē accipiant, præſcalpræ leuiter alopeciæ, quò denſetur & cruētus reddatur locus moderatè illinimus: deſricamus q̄ donec caput ea concipiat, & pharmacum in altum probè deferatur, atq; ita quieſcere vſq; ad crepuſculū linimus: poſtea ad velperam idem repetētes, ſimiliter q̄ ſequenti ac tertia die, magnam permutationē reperimus. Siſtitur enim depaſſio, & capilli dum raduntur neq; vi trahuntur, reſiſtunt & non euelluntur. Deinde ſequenti die ex aceto præſcrictus cataplaſma apponimus, quoad bullæ aſſurgant, & cutis in ſuperficie exulceretur. Bullas autem ubi diuiſerimus, atq; ad duos dies aquoſitatem exceperimus quæ ab ipſis vlceribus prodiit, inde rurius eodem vnguento vtimur, vlceratis tm̄ locis parcentes, eos q̄ trāſgrediētes: ſanos verò apprehendentes, eos q̄ deradentes, { vſq; ad crepuſculum quieſcere linimus, quò idem repetentes } multum que conſcricātes, vſq; ad ſeptimum aut octauū id facere pergitur diē: quò ſanè tempore videmus iam ab extremis alopeciæ non ampliùs tenues vt antè, & lanuginofos p̄dire pilos, ſed robuſtiores, poſtea paulatim etiam in partibus denudatis excreſcentes, viciliſſim q̄ tenues & imbecilles deficientes. Contingit q̄ ſimile quiddam quale in vlceratis videmus. In vlceribus. n. cicatrix ab extremo initium faciens, poſtremum in medio vlcere deſinit ac coit. Ita in alopecia partes pilofis vicinæ primū conualeſcunt, & denſæ pilis redduntur: quæ verò in medio litæ ſunt, omnium poſtremo pilos producant. Si itaq; curatio hoc modo proceſſerit, reliquis medicamentis nihil opus habebimus, ſed vno hoc per multū tempus ſemper vtimur: cedit q̄ benigniter affectio, niſi oīno magna nuditas exiſtat. Medio autem tempore, ſcalpturam per acutum cælum aſſiduè facimus. Aliqn̄ etiam cuspide acuti ſpiculi cute pertuſa, per hiſſuras ipſas ſanguinem moderatè elicimus. Hæc his verbis præſatus Aſclepiades, deinceps de raſura contra q̄ alij tradit: neq; enim aſſiduè, ſed per intervalla, affectam partem radere iubet, ubi ſā mediocriter denſi capilli in ea fuerint exorti: prodeuntes aut iam, & adhuc tenues, raſura non dignatur. Cæterū poſt raſuræ faciā mentionem, deinceps hæc verba ſcribit: Quod ſi verò remoretur capillorum exortus, ad ſubſcriptas compoſitiones cōfugimus. Sunt aut tales: ¶ Erinacj terreſtris caput aut corium vſtum, tritum, ac melle ſubaſtum, illinito. *Aliud.* Hippocampum marinum & nītri parū coexure, adipe q̄ anſerino admīſto, loco nītro præparato illine. *Aliud.* Thapſiam aqua maceratam illine. *Aliud.* Muſcerdas aceto tritas illine. *Aliud.* Calami Cyprij folia in olla exurito, deinde reſina pinus cineris plurimum excipito, & præſcricata alopeciæ imponito ac obligato. Aut corticem ſiue eodiam arundinum eodem modo præparato, ampliùs q̄ nītri parem cineris modum admīſceto, & pice exceptis vtitor. Eſt autem non inualidum, ſed plurimum efficax. Poſt hæc verò ēt muſcarū Aſclepiades meminit, iubens q̄ plurima ipſarū capita, mox ubi captæ ſunt, nudis alopeciæ partibus affricari, atq; id maximè, ubi alopecia fuerit exulcerata. Etenim fert, inquit, muſcarum ſanguinem iritata tunc per medicamenta quæ ex nītro atq; alijſ componuntur, nimirum, inquit, cum nō mordeant hæc ipſas tantum, ſed bullas etiam in eis excitent.

Quæ Soranus ad Alopecias conſcripſit.

Soranus aut cum prædixiſſet quædam quæ iuxta propriæ ſectę ductū digeſſit, meminīſſet que eorum quæ Aſclepiades ſcripſit, deinde ſic hac verborū ſerie ſubtextit: ¶ Quapropter ubi recens malū eſt, primū abſtinentia proderit, deinde ſimplex exiguus cibus boni ſucci, & irrigatio ex oleo dulci calido, & panis in cataplaſmate, fomenta que, & ſcalpturæ, & cucurbitæ, ac cerata. Vires itē reparētur. Inueterata aut iam affectione aſſidua raſura, & rubificatio ex linapi, & fricutiones præſcriptæ, ita vt in ſequentibus diebus picē ſuperlinas, aut oleum cedrinū. Proderit item rubificatio ex affricu ſoliorum ſici, aut caparum, aut linteoli indicī aut pollicis obuoluti, & poſt fricutionē ſcariſicationes. Quidam verò acus colligantes ita, vt cuspides ipſarū in eundem locum porrigantur, per ipſas & cutē cōpungunt. Cæterum poſt rubificauonē per deſcricutionē inductam, poſt q̄ ſcari-

Quinta Claſſis.

QQQQQ iij ficationem

* Al. d. d. d.
i. ſale.

ficationem pharmaca conueniunt ex alto euocantia ac transferentia, metasyncritica Græcis ap. E pellata, tum illita, tum emplastri modo imposita. Eiusmodi aut multa particulatim existunt. Nam & cape tritum, & raphani cortex, vtrunq; cum melle emplastri more appositū valet. Aut spumæ nitri pars vna, rhois partes duæ, salis ammoniaci pars vna: vsta, & cum acri aceto trita ad strigmentorum crassitudinē redigatur. Scripta sunt & alia multa, inquit, apud Asclepiadem & Heraclidē Tarentinum Elephātidem q; ac Moschionē in libro de ornatu. Ex quibus sane & ipse ea quæ ex Asclepiade præscripta vidisti, excripsi, & alia item quædam quorum deinceps mentionem faciā.

† Af. ptes duas

¶ Adipis vrlini † partem vnam, † cineris foliorum arundinis vstorum partem vnam, squamæ stomomatis ferri partem vnam: aceto & oleo veteri subacta illine. *Aliud.* Stercoris felis aut crocodili 3 viij, sinapis 3 iij, ex acri aceto. *Aliud.* Hordei vsti & muscerdæ par pondus ex acri aceto. *Aliud.* Nasturtium & muscerdas, veratrum album, piper, æquali mensura ex acerrimo aceto.

Aliud. Sinapi & nasturtium, aut spondyliū, vsta, trita ex aceto illine. *Aliud.* Ranarum vstarum 3 xvij: pumicis vsti 3 xij, alij xv: habent sinapis 3 viij, nitri 3 iij, nucum vstarū 3 xxiiij. *Aliud.* Præstat & ceratum ex pipere, pîrethro, calce viua, & oleo myrteo. Oportet autem & partem affectam præfricare vel per alcyonium vstum, donec morsum persentiscat: vel per Erinacij marini vsti cinerem linteolo inuolutum, donec locus rubefiat. Alia pharmaca quæ partim mihi, partim præce F

ptoribus meis, partim amicis medicis, in vſu fuerunt. Pumice rubificatorio præfricato, præfomentato q;: & thapsiæ succū, donec cutis eleuetur, illinito: deinde q; fomento adhibito, cerato rosaceo vtitur. *Aliud.* Foliorum ac radicis arundinis vstorum, pilorum vrlī, adianti, adipis vrlini, picis liquida, pilorum caprarum vstorum, cedriæ, omnium octo par pondus accipe, liquida q; cum aridis cōmitte, & præfrictis adhibe. *Aliud.* Fici folia cū aceto donec lanugo prodierit affrica, deinde verò herbæ quæ Stœbe appellatur succum illine. *Aliud.* Ranas p̄ruas vsta, picis liquida tepidæ insperge: deinde neq; præralis, neq; præfrictis illine. *Aliud.* Spumæ nitri 3 iij, stercoris muris 3 ij, corticis arundinis vliæ 3 ij: pice liquida excipito, & splenium formato, id quæ præraso, ac cum nitro præparato loco imposito, & ante biduum vel triduum non auferto. *Aliud.* Sinapis & stercoris felis æquas vtriusque partes, loco præfricto illinito. *Aliud.* Scarificato, ac sepia atramentū illinito: aut marrubium viride tritum illinito. *Aliud.* Sphæritidis folia terrefacta & cum aceto læuigata imposito. Appellatur autem sphæritis, cupressus, quæ sphæria id est pilulas, producit.

* αλευχονς.
i. albas.

* πράσιον.
al. πράτον
i. porrum.

Aliud. Nuces amaras vnā cum putamine vsta, præralis ex aceto & melle illine. *Aliud.* Erinaceorum marinorum testas vsta ex melle & aceto præralis illine. *Aliud.* Alecyonium vstum & murium stercora cum porri succo illine. *Aliud.* Radicis thapsiæ drachmas quatuor, radicis chamæleonis 3 ij, visco probè subacto excipe: & cataplasmatīs modo impone, cum quæ exarebatus ager fuerit, adime. *Aliud.* Foliorum arundinis græcæ vstorum 3 iij, muscerdæ 3 ij, erinaceorum vstorum drachmam vnam, cum aceto trita illine. *Aliud.* Salis ammoniaci 3 i, nitri drach. vnam: vtrunque torrefacito, aceto q; rigata ter in die illinito, loco prius cum nitro præparato. *Aliud.* Amygdalarum amararum tostarum obolos tres, pumicis obolos ij, salis ammoniaci obolos iij, similiter illine ex aceto. *Aliud.* Piper, muscerdas, veratrum album, æquali pondere, cum aceto & exiguo oleo illine. *Aliud.* Squamam stomomatis cum aceto & modico oleo illine. *Aliud.* Locum per pumicem proritato: & sulfuris, spumæ nitri, ammoniaci, singulorum æquas partes misce cum aceto illinito. *Aliud.* Alecyonij drach. i, sulfuris viui drach. † vi, muscarum ad ariditatem torrefactarum cyathum vnum: muscas per se terito, item q; sulfur: alcyonium verò aqua coctum vnā cum siccis læuigato, felle suillo ac aceto vicissim affusis vsquequo strigmentofum reddatur. Deinde axungiam a rotis deraſam, & manu emollitam vt emplastri forma confiat, misceto: & prærasa alopecia ac rubificata, pharmacum vt optimum confidenter illinito. *Aliud.* Locum vbi denterferis, alicam quæ aceto irrigatam læuigaueris, addideris quæ exiguum cyrenaicum liquorem, inunge. *Aliud.* Loco præfricto ac scarificato caricas affatas cum passo cataplasmatīs modo imposito. *Aliud.* Passum illinito, ac deinde ferulam vstam inspergito. Quæ deinceps sequuntur duo pharmaca, admiranda sunt: & verbis eius qui ea prodidit inscripta ad alopecias, caluiciem, raritatē capillorum agrè curabilem in capite, in mento, ac supercilijs. Pilorum ouis vnciam vnam, radicis arundinis vnc. vi, filicis cum radice quadrantem ac vnciæ dimidium, castanearum hispidi corticis quadrantem, lanarum succidarum q; pinguiſſimarum sexuncem, capita muscarum numero xxxvi, muscas v capitibus reiectis. Omnia in nouam ollam indita in furnum mittito, deinde cinerem ipsorum terito. Sunt autem tibi in vino amineo prius trita ladani 3 vna, myrrhæ 3 vna: adijciatur quæ olei veteris sextans, & cedrini 3 vna, malabathrini sextans: deinde insperſis aridis tritis medicamentum fume: atq; vbi linteolo alopeciam præfricaueris, deinde quæ aut cæpa aut scilla vellicaueris, aut fici folijs lentè exalperſis, pharmacum ipsum illitu affrica. Loto q; hominī, in sequētib; diebus locū † intento linteolo valde cōfricato, contentus illitione vsq; ad mēses duos. Quod si amplius in hac curatione perseueraueris, et caluiciē ea persanabis. ¶ Ad Caluescentes præter ætatem remedium. Adipis taurini insolati lib. vnam, adarces vnc. vnam: succi thapsiæ sesquiunciam, alij vnciæ dimidium habent: myrrhæ bonæ vnc. vnam, polytrichi lib. dimidium, callitrichi lib. dimidium, membri asinini libram vnam, splenis asinini lib. vnam, ladani tantundem. Ego ladanum in

† Af. ij.

† Al. ualido
linteolo.

vino

A vino pauxillo maceratū contriui: adipē verò aque vapore liquefeci, deinde afini membrū allatum donec infumat radito: splenem verò cum callitricho & polytricho in noua olla torrefacito: contusis q̄ quæ contundi possunt ac cribratis, oīa gleucino aut sabino excipito, & ante balneū vitōr capite prius pectinato. Manifestū verò est quod eadē pharmaca ēt ad menti pilos non enascentes cōducunt. *Aliud.* Fœnigræci sextarios iij, seminis lini sextarios ii, ladani bellem, succi acaciæ sexuncem, foliū malabathri sexuncem, gallas numero xx, onychis aromatici sextātem: calami Syriaci sextantem & vnc. dimidiū, alii vnc. vnam habent: bdellii sextantem, myrti vstæ sextarium vnū: musci, quem alij splanchnon, alii bryon aromaticum vocant, quadrantem: iridis astragalitidis, alij Illyricæ, sextantem. Singula per se contundito, ac per cribrum arctius excutito, & deinceps vt præscriptum est misceto. Vtū verò expetente, pharmaci tertiam partem, aut quantum sufficit, in æreū aut testaceum vas conijcito, deinde vini Italici odorati tantum vt liquidum reddat admisceto: atq̄ ita prunis impositum donec semel ebulliat cum lignea virga agitato, animaduersione habita ne comburatur. Post verò illines, egro cū medicamento in aquam delidere iussu, sensim q̄ in folio sedenti affricabis, ac pro more capite ex aqua perfuso pharmacum ablues. Deinde autem staphidem syluestrem per se tufam ac cribratā, quatuor diebus illitionis pharmaco admiscebis, similiter q̄ coques:

B eodem q̄ modo illines, parçē tñ ac cautē, ne in oculos destillet. Vnguento autē à balneo vteris, olei myrti libra vna, cum ladani triente contrita. Constans et cetera est pharmaci huius facultas, neq̄ citra effectum dilabitur. *Aliud ad Eadem.* Pericalamitidis vnc. i: myropissoceri, sordis eius videlicet quæ à pilis, vtriusq̄ uncie dimidiū: adipis infantis informis libram vnam: succi foliorū dionysiaci tenerorum, succi foliorum ladonidis tenerorum, succi callicereos, succi herbe verbenacæ, succi foliorum arūdinis, singulorum cyathos iij: cynomori, erinaciorum marinorum vstorum, vtriusq̄ sextantem, aut amplius si melius reddere pharmacum velis: acanthionis terrestres corium vstum. Hæc oīa ad plures dies in pila plumbea terere oportet, donec omnia probè lauigata vniant, atq̄ ēt donec à pila quippiam detritum eis accedat. Vtere loco acriter ex crudo linteolo ex lino præfrecto, ac deinde cum althææ siue hibisci radice deterfo, illinito. Hoc pharmacū eo modo scriptū reperit. Claudianus amicus noster in libello ex membranis cōtexto, eo qui pharmaco vsus fuerat vita defuncto. Multi autē faciebat eius possessionem, propterea quod duos quosdam caluiscere iam incipientes ex eo curatos conspexisset ita, vt neq̄ vltius caluicies progrediretur: et quod denudatus locus pilis densus euaserat: ad hæc quod symbolicè scriptus erat. Nos hoc nacti, singulatim considerabamus quid tandem singulis significaretur, cum q̄ iam hoci am aliud mente conciperemus, C per magnā experientiam tandem nos veritatem reperturos sperabamus. Verū in præsens quidem sit posteris scriptum, scripturi etiam in posterum si quid experientia cognitum repererimus. In præsens autem pericalamitidem, arundinis corticem dici putamus. Nam & aliàs ipsum eiusmodi affectionibus conuenire scimus maximè vstum, nouimus item alios scriptores ex eiusmodi pharmaca composuisse: quapropter credibile est, qm̄ cortex arundini circum adheret, pericalamitē tñ ipsum appellari. Potest autē etiam id quod ab aliquibus limnestrum, ab aliis adarce & adarcium dicitur, pericalamitis appellari, propterea quod arundinibus adnascatur. At verò myropissocorum, picem & ceram dici æstimamus, vnguento quopiam ad huiusmodi affectiones congruēti eliquata, veluti est gleucinum, & laurinum, nardinum, lentiscinum, sesaminum, et cedrinum. Ceterū † barba hircinæ fordes † statim nobis visæ sunt de ladano dictæ esse: nam ad has affectiones conuenire in confesso est. Et sanè generatio eius circa mentum hircorum in quibusdā locis contingit, quod ipsum & Rufus Ephesius per hos versus indicat.

† Ladanium Ereborum reperitur & alterum in aruis,

Caprarum circum bārbas. Nam pabula capris
Florentis cisti summæ gratissima frondes.

D Istius verò lanuginis vnguen inhaeret
Caprarum hirsutis q̄ genis, atq̄ vndiq̄ costis.
Non adeo id morbis prodest, sed spirat odorem
Eximium: quare præstantia pharmaca miscent
Plurima, Ereborum & tellus fert qualia campis.

An quidē igitur hoc solū ladanium is qui pharmacū composuit, inijcere iubet, non satis manifestū est: possibile est autē per vnam speciem totum genus ab eo designari. Porro infantem informē videtur mihi vrsæ dixisse. Vrsam enim parere aiunt informem quādam velut carnis molem, verū post per linctum matris animal formari ac effigiari. Dionysiacum autē vitem mihi dicere videtur, quāquam & de hedera dici posse aliquis opinari queat. At verò quod ladonidē laurum appellet, nemini puto dubium esse. Calliceros autem fœnumgracum appellare videtur: nominatur autē hæc plāta apud nos in Asia Ægoceros. Cynomorū deinde rubum canis verisimile est dici. Acanthiona autem postremum terrestrem, erinacium terrestrem appellatum ab eo existimo.

De Desuino Capillorum.

CAP. 2.

E St & alia pilorum affectio quæ ad raritatem cutis, inopiamque substantiæ pilos generantis, consequitur. Quapropter etiam curatio hoc modo læsorum, non eundem scopum quem alopecie

† Additur in
textu ἀποπρα-
γοπρωγός.
* Al. libra.

† ἀποπραγο-
πρωγός.

† Al. ex anti
qua tralatio-
ne. Aliud au
tē sanè per ter-
ram errans la-
danum inue-
nies.
* mentum.

peciae habet. In alopecijis enim, ut vitiatum humor consumatur, intentionem summam ac primum E
scopum habemus: in his vero, ut capitis habitum robaremus, & boni succi allationem procure-
mus, cutem quae ad densitatem ac raritatem moderatam reuocemus. Quam ob rem sane ad pharmaca hu-
medinata aliquid moderatè adstringens admiscere oportet, quale est ladanum, quod utraque in se mo-
deratè complectitur quae ad hoc symptoma conueniunt, caliditatem videlicet mediocrem, & adstrin-
gendi vim iuxta eandem proportionem: pro hoc itaque oleo mistum, quod illiniri possit, symptoma si-
ue accessione defluuii capillorum sistit. At verò manifestum est capitis frictionem necessariò huius
pharmaci vsui praemitti, & multorum pilorum ablationem, aut si anni tempus id fieri permittit, perfe-
cta ablationem. Ita. n. in affricu & illitu robusta & calida reddetur cutis, & moderatè densitatem ac-
quiret, eam videlicet quae secundum naturam est. Consuevit autem haec circa pilos oblatio saepe ijs qui
aegrotarunt accidere: raro autem citra morbum. Et magis sanè victu vires reficere atque salubri, opus
habet: multi quae citra medicamentum perfecte sanati sunt, atque id breui. Composuerunt tamen medici
eius gratia pharmaca moderatam densitatem cuti inducentia, ita tamen ut ne simul eam refrigerent:
quae enim vehementer adstringunt, omnia est refrigerant, & alimenti influxum reprimunt, propter
cuius inopia capilli defluunt. Intentio itaque medicamentorum est sanguinem affluentem non solum
non praepedire, sed etiam prolecare, cogere autem sensim & adstringere rarefactam cutem. Tale
autem sponte naturae est ipsum ladanum, quod quia cera similem compagem habet, largo aliquo co-
nuenienti liquore indiget, quo capiti illini possit. Praestat igitur huiusmodi liquorem similem lada-
no esse hoc est ex contrariis facultatibus mistum, attractoria nimirum & coactoria. Nequaquam er-
go oleum Sabinum, aut vetus, aut Cicinum ad hanc rem aptum fuerit, sed in Iberia aut Hispania,
aut quomodocumque tandem appellare velis, natum: habet. n. & adstrictorium quippiam, atque am-
plius adhuc eo lentiscinum, sponte naturae tale existens, quale est ipsum ladanum. Quare neque ex-
pertus sum, neque mente concipere possum, vllum praestantius pharmacum fore ad defluos capillos,
quod est quod ex ladano & lentiscino oleo permistum constat. Manifestum autem est quod raso quidem
cuiuspiam, crassius ad mouere medicamentum oportet: ad ipsam verò cutem praefectos & attonfos
habentibus pilos, liquidius: quoniam enim comam alere non oporteat priusquam quis curetur, euidens
puto. Quod si verò largè defluant capilli, & coniectare possis multam raritatem cutis capitis factam,
non ineptum fuerit in praesens myrteum oleum pro lentiscino ad ladanum admiscere. Licebit etiam
aliquando vnguentum nardinum adhibere in aetate frigida, & tempore hyemali. Bonum autem
pharmacum ad haec est diuinitum foeminarum vnguentum, quod Romae vocant Foliatum. Non mi-
nus autem eo commodum est, immo magis, quod appellant Spicatum. Quare cum his vel solis diui-
tes vngui iubeto, & cum optimo nardino. Ladanum verò in duplo vase liquefacito, & liquefacto
vna cum nardino ex praedictis pretiosis vnguentis quodcumque ad manum fuerit admisceto. Atque
haec quidem medicamenta mihi suffecerunt vna cum rectoria ac salubri diata, quae in plerisque
est sola sufficit. Composuerunt autem, ut dixi, quidam ex prioribus medicis pharmaca ad defluos
capillos, in quorum relatione, ubi inuicem dissentiant exponam. Primum autem referam compo-
sitiones ab Hera scriptas, quarum priorem quidem laudo, posteriorem verò curiosam, & praeter
rem auctam existimo. De priore verò ita scribit.

Compositiones Pharmacorum ad Defluos Capillos ab Hera scriptae.

Heras in ferula duo subscripta pharmaca habet, iuxta hanc ipsam dictionis ipsius seriem, ad hoc
ut capilli in capite ne defluant: Ladanum in vino austero rigatum terito, & oleo myrteo ac vino vicis-
sim affuso ad mellis crassitudinem redigito, ex eo quae ante & post balneum caput illinito. Praestat au-
tem & polytrichon quod quidam adiutum vocant, dimidia ladani portione adiacere, & cum myrteo
aut nardino vii. Haec de priore compositione locutus Heras, deinceps haec scribit. ¶ *Compositio*
Olei ad Defluos Capillos, quae & Nigros eos facit. Intra calendas & Idus Iulias, nuges virides centum tundi-
to, eis quae olei primarij sextarium iussu affundito, & aluminis liquidi lib. iij. Haec simul in vas nouum
testaceum praemadefactum indito, id ipsum quae diligenter oblitum in loco neque humecto ni-
mium neque calido reponito, & per menses tres sub terra situm sinito: deinde auferto, oleo quae vtor.
Haec ipsa secundi pharmaci est descriptio, quae plus quam conuenit ipsum pharmacum adstringens red-
dit. Quapropter ut vehementem adstringendi vim ipsius corrigeret is, qui primus hoc pharmacum co-
posuit, defodere ac velut putrefacere ipsum iussit, inde nimirum magis tenuium partium reddere in
eo commissa conatus. At verò tale pharmacum in tempore, regione quae, ac natura corporis, calidis
commodum fuerit, adeo ut in contrariis non tutum sit tali vti. Etenim perfrigeratas eius vsu mu-
lieres vidi, ut inde in grauedinem ac rauedinem defluxum quae a capite ad pulmonem delaberent.

Quae Archigenes ad Defluos Capillos conscripsit.

Archigenes in primo libro pharmacorum secundum genus, ad defluos capillos in haec verba
scripsit: ¶ Ladani & ablinthij aequales partes, & iuniperi baccas x, tritas in linteolum illigato, &
in oleo per dies v macerato, ex eo quae caput illinito: & neque capilli defluent, neque furfures habe-
bunt. Aut dum capillos pectus, adiantum cum myrteo aut rosaceo oleo adhibeto. Aut adianti,
myrti nigrae, aequales partes, gallae duplum, cum oleo veteri, aut lentiscino, aut myrteo, ad mel-
lis crassitudinem redige, ac vtere. Aut thus, & mysi, & gallam, & adiantum, aequis partibus cum
vino

† AP. bonili-
bram j s.

A vino maris experte ad mellis spissitudinem in Sole terendo redige. Aut molliter cocta donec nigrescat, deinde q̄ cum oleo veteri, aut lētiscino, aut myrteo mista, in vsum adhibe. Aut brassicam aridam tusam cum aqua impone. Aut loti radicem eodem modo.

Quæ Cleopatra in Libro de Ornatu scripsit.

Quæ à Cleopatra in libro de ornatu scripta sunt, illius ipsius verbis sic habent. **C** *Ad Capillum in capite generationem.* Arundinum tenellarum radices vbi contuderis succum exprimito, mufcas q̄ vbi siccaueris, in pulcra misceto: simul q̄ vrlinum adipem, atq̄ oleū cedrinū, vbi in vnū triueris, atq̄ vnā miscueris, ad illinēdum exhibeto. Quò verò odorem obtundas, vinū aut passum affundito. *Aliud non longè præcedens, his verbis conscriptum.* Quo capilli enascantur, lini semen siccū vnā cum lini stipula exurito, tritum q̄ cum oleo sesamino illinito. *Aliud paulo inferius scriptum hoc modo.* Ad defluos capillos, terram cimoliam solidissimam vino austero & mororum succo tanto, quantum combibere potest, rigato, ei q̄ hyoscyami tenuissimè triti acetabulum adijcito, inde que pastillos formato: quos in vmbra siccatos in vas figulinum nouum reponito. Vsu verò postulantē, aqua dissolutos illinere iubeto. Deinde cum locus exaruerit, ablua. Quinto die id ipsum facito. Facit item ad faciei & colli impetigines. **C** *Aliud Capillos augēs citò, densans q̄ ac demorans.* Ladanū cum oleo & vino dulci lauigatum ac ad mellis crassitiem redactum præfrictis illinito. Nō longè quoq̄ postea aliud pharmacum scriptum est his verbis. **C** *Ad Defluuium Capillorum citra morbum accidens.* Brassicam aridam tritam ex aqua impone, aut loti radicem eodem modo.

Quomodo Comptoria ab Exornatoria medicina parte differat.

Comptoria quidem scopus est, vt pulchritudinē acquisitiuā inducat. Exornatoria verò medicina partis, vt quicquid fm naturā est, id oē in corpore custodiat, ad quod consequitur ē naturalis pulchritudo. Indecoro. n. aspectu est caput alopecia vitiatum, velut ē oculi pilis palpebrarū denu dati, similiter q̄ superciliorum pilorum defluuium. Non solum verò ad pulchritudinē, sed multo prius ad ipsam partium sanitatem huiusmodi pili conducūt, quemadmodum in libris de vfu partiū est demonstratū. Quid attinet aut dicere de lichenis, aut pfora, aut lepra, cum præter naturā talia existāt? At verò faciei colorē per pharmaca nitidiorē aut rubicundiorē facere, aut pilos capitis crispas, aut fuluos, aut nigros, aut quēadmodum mulieres solent in longitudinem auctos, hæc ipsa, & quæ huiusmodi sunt, cōptorij maleficij existunt, non medicæ artis opera. Verum pp societatem quandam quā cum illis habent, q̄q̄ ad regiarum fœminarum, atq̄ adeo ipsorum Regum imperium, et comptoria adiungimus, vt pote cum his negare non liceat, docendo tamen comptoria ab exornatoria medicina parte differre. Quapropter visum est mihi ea quæ Crito scripsit pharmaca capillos conseruantia, eisdem q̄ augmentia, ex primo illius de ornatu libro subscribere.

Quæ Crito ad Conseruandos ac Augendos Capillos scripsit: Item q̄

quæ à Defluuiis ipsos præseruent.

In primo libro Exornatoriorū statim in principio post præfationem Crito hæc verba scripsit: Ad conseruandos itaq̄ capillos subscriptis cōpositionibus vtendum est. **C** *Heracleida Tarentini cōseruatiua Capillorum.* Phernij florē anemones ue cū oleo tritū illine, idē ē eos denigrat. *Aliud.* Ladanum vino austero maceratum ac tritum oleo myrteo excipe, eo q̄ pilos ante balneum subline. *Aliud.* Verbenacā rectam appellatā vnā cum radicibus arefactam contundito, & per angustissimum cribrū cōcernito: deinde oleo admisto, vt strigmenti crassitudinē accipiat, in vas æreum reponito: atq̄ vbi computruerit, pro oleo similiter vtitor. *Aliud.* Ladani partes duas, polytrichi quod quidā Adiantum appellant partē i: vino & oleo myrteo excipe ac vtire. Nos aut pro myrteo, nardino vli sumus. **C** *Aliud, quod ipsum & Subnigros reddit.* Baccharum myrti nigrarū quadrantem, ladani tantundem, dissoluta cum acaciæ fructus, hoc est siliquarū ipsius spinæ appellatarum, decocto, contere: atq̄ vbi limi crassitiē acceperint, nardino, aut myrteo, aut aliquo alio hedysmate i. odorato vnguento, excipe. **C** *Aliud Vnguentum Conseruans pilos, quod ipsum etiam Subnigros reddit.* Baccharum myrti nigrarū sextarium i, seminis apij sextarium i, seminis betæ sextarium i, virgultorū myrti sextarium i, adiātū sextarij dimidiū, ladani tantundē, vini nigri sextarios vi: vsq̄ quo penitus dissoluantur coquito: atq̄ vbi tertia pars superfuerit, olei cuiusdā, aut hedysmatis i. odoriferi vnguenti, sextarios ij aut iij addito, rursus q̄ coquito. Vbi verò bis aut ter ebullierit, liquorē exprimito ac diligenter per saccū excolatum in hydriam recondito. Vsu verò expetente † in præfatis penitus † vtitor, illitis ex eo bis per diem capillis. *Aliud.* Passi cretici sextarium i, ladani vnc. i, corticis nucū pinearū vsti sextantē, polytrichi vsti vnc. * i, adipis vrlini libram i, succi betæ cyathos ij. Ladanū & passum donec cogant in vnā cōpagem coquito, deinde reliqua inijcito, & sublata in vas plumbeum seruato. Vsus autem tempore, quantum sufficit in quocunq̄ velis suaueolente vnguento diluito. Vsus eius debet esse quotidianus. Quidam verò raso capiti pharmacū illeuerūt nulla re dilutum. *Aliud.* Ladani vnc. i, passi sextariū i: corticis nucum pinearum vsti drach. ij, alii sesquidrachmam habent, † alii cyathos ii, vel sesquicyathum: † spongiā marinā vstā tritam vnā, pāniculi Cilicii vsti triti cyathos iij, polytrichi vsti triti cyath. ii, adipis vrlini lib. i: coquito & apparato, vt dictum est. **C** *Aliud quod Pilos Conseruat, & Defluentibus quoq̄ auxiliatur.* Seminis apij sextantem, betæ seminis sextantem, callitrichi sextantem, thuris sextantem, nuces iuglandes numero xv, ladani

† ΑΓ. κινῶν
ταυτελῶς, i.
omnino com-
mouens.

* Αβ. γ.

* μέλας.

Iadani sextantē, corticis nucis pineæ lib. i. Omnia in nouā ollā coniecta, & cū argilla probè obturata, in balnei fornace affato: deinde extracta terito, & adiecta adipis vrlini libra vna subigito, & in pyxide ilicea {aut cīprina} reponito. Vsu verò expetēte quātū, satis videbit ex pharmaco accipito, ac quocūq; velis hedyfmate {i. odorato vngvine} conuassato, ex eo q; caput bis in die illinito. Quidā verò vbi caput ēt abraferint, medicamēto excepto adipe vrlino illiniunt. *C. Aliud ad Caluiciem, quo vsus est Andromachus iunior.* Leporū ventres sex accipito, probe q; siccatos in testaceo vase torrefacito: ad eos q; baccarū myrti quadrantē, et virgultorū eiusdē tātundē, conijcito: inde q; adīā thi quadrantē addito, acaciæ succi tātundē, fructuū canis rubi tātundē: oīa q; simul attētē torrefacta tūdito, ac per angustū cribellū excernito, deinde adipis vrlī † lib. i. ac phocē tantundē, subigito: sublatum q; pharmacū in pyxidē plumbeam recondito. At verò vbi vsus tempus insiterit, quocūq; velis hedyfmate. ipsum diluito, ac vtitur. Atq; de his quidem hæc tenus.

† Al. vnciam
vnam.

De Tincturis Capillorum.

C. A. P. 3.

C Vm verò post præscripta pharmaca Crito alia quædam scribat, quæ quidem conseruationē capillorū promittūt, verū primum ipsorū opus est vt tingant ipsos, quò siue nigri, siue flauī reddātur, visum sanè est mihi in principio ea relinquere, cum omnia talia manifestē comptorij generis existant. Quandoquidem aut haud scio, quomodo dogma cōe inoluerit, vt vetulæ fœminæ capitis capillos denigrent, tanquam turpe sit canos habere: atque hoc ipsum etiam masculis est visum, qui turpe {spectaculum} esse aiunt, aniculam vxorem cano capite habere: quæcūq; quidē præ delicis se ipsas ornant, harum nulli tale quippiā à me petenti exhibui: Quæcūq; verò magis venerandæ, vt notam effugerent, tum maritorum suorum importunitatem vitarent, pilos suos nigrōs aliquo modo reddere cupierunt, neq; ex adstrictoria vi nigrorem inducentiū obladi, illis cōsului cedriæ vsum, ita vt tribus aut quatuor horis ante balneum illinirent, et postea detergerēt, id q; per quatuor aut quinque dies facere pergerēt. Ad hoc. n. quòd nihil lædit, amplius ēt commoda est eis quæ faciliè à frigore offenduntur, nimirum pharmacum existens cedria quod abūde calefaciet. Oportet aut ipsam citra olei admittionem adhibere capitibus vehemēti resiccatione & calefactione indigētibus, quibus scilicet humida & frigida intemperies per se inest: alijs verò oleo mistum adhibere pharmacū oportet. Quin & defluentes capillos corrigit, & non defluentes auctiores reddit. Caterum odorem eius vitent delicatæ mulierculæ, qui sanè non iniucundus est ijs quæ sustinēt ad consuetudinem vsus peruenire. Porro in Asia apud nos agrestes mulierculæ montana incolentes, non cedria solum illinuntur oleo permixta, verum tum corpus vniuersum, tum caput inungunt. Quin et picem liquidam cum oleo eodem modo permixtam, ad radices capillorum capitis illinūt: G vocant q; hoc compolitum pharmacū pilleæon hoc est oleum picatū, quod omnino aliud est ab eo quod pissanthos hoc est flos picis, appellatur, quod ipsum liquide pici incumbit, & superstat, te nuium magis partium q; ipsa pix existens, tum compage, tum etiam facultate. Huiusmodi itaque pharmaca tardè canescere faciunt, nulla vtentium oblatione: at verò quæ ex austeris & acerbis compolita sunt, magnopere lædunt. Caterum materiam ex qua confiunt hæc, adstringentis qualitatis ac facultatis existentem, et quippiam tenuium partium habere oportet, quò non in superficie tantum, sed & in profundo cutem permutent, vsq; ad locum radicū capillorum progrediēdo. Atq; hæc quidem est Methodus componendi ea. Habes autem in simplicium pharmacorum tractatu particulatim materias ipsorū, in quibus facultates & qualitates earum dicte sunt. Quapropter ex illis tum ea quæ iam à prioribus compolita sunt iudicare, ac quali nam vi prædita sint inuenire potes, tum etiam per te ipsum de integro noua componere. Vtile aut hoc est & ad cognitionem affectionum quas iam incurrerunt aliquæ mulieres, & ad futurarum prænotionem, præsentium que sanationem. Non solum enim in periculo versatas sæpe scio fœminas, sed & mortuas, ex perfrigeratione capitis per huiusmodi pharmaca inducæ. Læsiō autem eis maxime accidit, aliquādo quidē in stuporem attonitum, aut comitiale, aut veterum, aut soporem profundiorē, aut animi H apprehensionem, {catalepsiū Græcis appellatam,} delabentibus: aliquādo verò destillationibus solutu difficilibus capiuntur, vt antè quā soluantur, pulmones malè habere incipiāt, exinde que tabes consequantur. Offenduntur autem citius quæ frigidius temperamentum capitis habent, tardius verò quæ calidius: frigida enim particula frigidis affectionibus, calida calidis, facilius corripiuntur. Atqui periculum minus subeunt, vt pote cum à minore causa lædantur, quæ frigidius temperamentum habent: at verò calida, propterea q; agrè & vix tādē à frigidis caulis lædi possunt, cum sanè à magnis causis fuerint exuperata, maiorem læsionem incurrunt, quæ communi & vniuersali rationi subiacet, in Aphorismis ab Hippocrate relata, ³ || In morbis minus periculū subeunt agrotantes, quibus congruus naturæ, ætati, habitui, ac tempori, adfuerit morbus, quā in quibus nihil secundum hæc ipsa congruerit.

A 2^a. Aph. 34.
Ex. ord. 17. c

B † Quidā veteres g. cod. caput hoc a superiore distinctū non habent.

C* Al. tingētibus.

D † Ap. Aeliā capparim tritā Ap. folia capparis trita.

^b † De Pharmacis Capillos Denigrantibus, Archigenis.

Paulo antè dixi, q; nō ex mea sententiā medicus eiusmodi pharmaca contrectat, verū cum regiæ aliqñ fœminæ, quibus minime negare licet, nigros aut flauos capillos reddere expetant, eam sanè ob rem et Archigenē puto, quāquā honestissimū virū, de illis scripsisse in hæc ferè verba. *C. Denigrant Capillos hæc.* ^d † Radicē capparis tritā cū muliebri lacte aut, vt alijs placet, alinino, ad tertias coquito,

A. l. 4. f. 7. l. 1
19. fol. 509. c

Acoquito, & ad noctem pro cataplasmate imposito. Aut vrina canis in quinque aut sex dies adseruata lauato. Aut corticē radicis * ilicis donec mollis fiat coquito, eū q̄ cataplasmatīs modo imposito, cum aqua verò decoctū lauato. Aut quod in pheinio intrinsecus nigrū est, cū oleo myrteo tritū affricato. Aut spumā argenti, cimoliam, alumen liquidum, pari mēsurā, praelous & siccatis capillis in noctē illinito, & betē folijs supernē obligato. Aut selinuliam terrā, argenti spumam, calcem, cū aqua ad mellis crassitudinē redige: & vbi liquido lixiuio praelaueris, capillū vicissim inunge, similiter q̄ betā folijs impolitis obligato: manē verò excusillos capillos applanato. Aut ablinthij, ossium palmarū syriacarū, fabarum ægyptiarum, oīum vstorū cinerem pari mēsurā cum vino Mendelio ad strigmētū crassitudinē redigito, & cerato myrteo liquido admisto affricato. Aut corticis salicis succū cum oleo affricato: summē denigrat. Aut nodos ad racemorū similitudinem ex arbore nuce enatos ex oleo cogto, & bitumine liquido admisto vtor. Post predicta ē hęc Archigenes adscripsit: Denigrant barbā, Suber aridum, & plumbū vstum, cum betē crudē succo mellis spissitudine illita: finito vsq̄ ad prandium, deinde abluito. Aut ferri retrimētum ac plumbum in aceto cocta ad tertias, illine citra oleum. Post hęc Archigenes ex cōptoria dānata arte accepta hęc scripsit: Fuluos aut reddūt capillos lupini crudi cū aqua & nitro illiti. Hęc de flauescētia. De crispantibus aut capillos dicit: Crispos aut reddes capillos, si spuma salis cum myrrha cōfricaueris. Aut succo carpalī illine, & manebunt crispī ac nigri. Aut myrti baccis ac betā semine æquali pondere cum oleo tritis vtor. Aut asphodeli radicē cum mero illine. Aut lupinorū cortices ac parū nitri in aqua ad quatrīdium macerato, ac vtor. Horum pharmacorum mentionem ob id feci, vt ostenderem necessario quosdā ē honestissimos viros talium sibi comptiorū experientiam parare. Quando enim Archigenes hęc scribere non est veritus, multo amplior venia Critonī dāda est, qui in Imperatorijs adibus est medicatus. Apparet aut & Heraclidem Tarētinum multa et probata pharmaca comptoriē speculationis scripsisse, quanquam non dum tantæ deliciæ fœminas occupant, quantæ nunc sunt. Verū Heraclidæ, & Cleopatraz, & aliorū quicunq̄ post ipsos interiecto tempore medici fuerunt, pharmaca oīa Crito coaceruauit: ad quem sanē remitto eos qui quomodo capilli nigrescant, aut flauescant, & alia huiusmodi, discere volunt. Scripsit enim quatuor de ornatu libros, qui in omnium manibus versantur. Quid igitur ego nūc ipsa frustra trascriberem, cum possint ex illo discere qui adeo ea cognoscere velint. In primo quidem libro omnia quæ ad capillos pertinent statim in principio scripta sunt, reliqua verò deinceps iuxta proprium quodq̄ ordinem. Quod itaq̄ faciliē inuenire queant singula talium pharmacorū absq̄ longa inuestigatione, visum mihi est capita singulorum librorum indicare. In primo itaq̄ libro capita hęc sunt.

* melius. quidam tñ timo. i. capiti.

† Additur ex antiquis. Denigrantia pilos barbæ, Archigena.

PRIMI libri Critonis de ornatu capita. Conseruatiā capillos. Augētiā capillos. Præseruatiā capillos. Tincturā canorum. Tincturā flauos & auricolores capillos reddentes. Smegmata capillorū. Illitiones præseruantes. Faciem erugantia. Illitiones faciem nitidā reddentes. Cataplasmata faciem nitidam reddentia. Superciliorum illitiones. Supercilia denigrantia. Oculorum illitiones. Illitiones exstibio. Ad graueolentiā narium. Dentifricia. Manducationes. Ad fœtorem sub alis affriciones. Manducationes ad fœtorem oris.

SECUNDI libri capita. Quæ nigredines collī repurgent. Illitiones ad exudationes sub alis. Illitiones māmillas conseruantes. Ventrē purgantia. Smegmata manus nitidas reddentia. Ad nigredines à partu. Ad rugas à partu. Ad fissuras à partu. Illitiones ad eminentes vmbilicos. Quæ pueros impuberes cōseruant. Quæ virginitatē cōseruant. Ad humectas & frigidas mulierculas. Ad cicatrices nigras. Depilatoria pilorū. Smegmata attenuatiā omnis generis. Illitiones capillos abolētes. Smegmata totius corporis. Repurgatoria nitorem inducētiā oīgena. Cōspersiones aromaticæ vestiū. Odorata tincturā vestiū. Aspersiones thalamorū et ambulatorū. Suffimētorum oīgenorum cōpositiones. Illitionum & vnguentorū oīs generis cōpositiones, videlicet amygdalini, balanini, nucum, sesamini, myrtei, lentilcini, laurini, rosacei, gleucini, melini, cœnathini, sampsiuchini, telini, sulini quod aliqui crininū hoc est liliaceū appellāt, cicini, irini, narcissini, phœnici, cyprini, crocini, nardini, amaracini, hedychroi, mendesii, malabathrini.

TERTII libri Critonis capita. Ad furfures omnigenos. Ad capitis eruptiones. Ad achoras, hoc est vlcera manātia. Ad pediculos & lendes. Ad alopecias. Ad scabiosas faciei affectiones. Ad lētigines. Ad maculas à Sole prouocatas. Lotiones faciei. Ad strigmata. Ad liuētiā. Ad sugillata. Ad varos. Ad pustulas noctē erūpentes. Ad mēti tubercula. Ad mēti impetigines, impetiginū illitiones. Epithemata excoriatoria. Emplastrā viridia, q̄ ab excoriatione imponunt. Emplastrā alba ad cicatricē inducēdā. Pharmaca emolliētiā, q̄ impetiginibus affricant.

QUARTI libri capita. Ad alphas, id est vitiligines nigras & albas. Ad cicatrices nigras. Ad leucas, hoc est vitiligines altius insidentes. Ad lepras. Ad vngues scabiosos. Ad pruriginosas affectiones. Ad tubercula parua plidracas Græcis appellata, & ad excoriata. Ad serpiginosas affectiones. Ad scabidos. Ad thymos, verrucæ genus. Ad pentiles verrucas. Ad fornicarias latiores ue verrucas. Ad vmbilici inflationem. Ad intestinorum delapsionem. Ad hydrocelas. Ad apellas. Ad procidentes anos. Ad chimethla, hyemis tempore oborta vlcera. Ad rimas pedū. In his quatuor libris Crito diligentissimē omnia fermē exornatoria pharmaca scripsit,

scripsit, appositis ēt comptorijs quę spuriam pulchritudinem nō veram inducunt: quapropter ēt E ego ea relinquam, solum quę mentionem eorum faciā quę pulchritudinem secūdum naturam conseruant. Quāq; n. vel maximē cognita habeam smegmata corpori nitorem inducentia, itē q; quę in virgīnibus māmillas conseruant, & quę impuberum puerorum testiculos ad multum tēpus paruos conseruant, similiter & quę pilorum exortum cohibent, verecundor tñ eiūsmodi scribere, atq; multo magis eas quas Crito tradidit conspersiones vestium aromaticas, odoratas q; vestium infectiones, & aspersiones thalamorum ac ambulacrorum: suffimentorum item omnis generis varietates, illitionum q; & vnguentorum. Extra enī medicinę documenta talia existunt. At verō vbi decoris secundum naturā conseruatiua scripsit, si qñ locus ita tulerit ea referam: ac primum quidem quę circa capillos medicis vtilia mihi videntur, docebo.

De Pharmacis Pilos Corruptentibus.

CAP. 4.

Quemadmodum ex pharmacis quę pilos augment, alia medici vsus, alia comptorij existunt, eodem modo & quę ipsos corrumpunt. Aliqñ. n. & his medici necessariō vtuntur iuxta triplicem eorum differentiam: Nempē cū quędam ex eis propriē pilothra appellātur, alia attenuatoria capillorum, alia verō ipsos penitus extirpantia. Hęc itaq; postremo loco nominata periculosi sunt vsus. Ex eis. n. illitę corporis partes, non solū in posterū depiles oēs penitus reddunt, sed & vsq; ad caput, & mentum, supercilia q;, et palpebrarum pilos, nuditas ipsa procedit. Reliquę verō duę differentię vsum minimē periculosum habent. Et quę quidem pilorum denuatoria sunt, & propriē, vt dixi, pilothra vocant, tñ non quotidie in oīum muliercularum, fermē ēt quorundam virorum, vsu habent. Altera verō quę tenuiores pilos reddunt & minores, eis cōueniunt qui duos & magnos, multos q; & crassos, pilos habent, & ob id suillis non ablimiles existunt. Ceterum hęc ipsa secundum excessum & defectum inter se differunt, cum vnum genus sit pharmacorum quod in hunc vsum compositum est, nimirum eorum quę erodētem & vitoriam, habent facultatem. Pręstant aut erodentem facultatem habentia, quōd minori periculo admouentur. Periculosiora aut quodammodo sunt vstoria, quę, si quis paulo negligentius adhibeat, bullas excitant, & exulcerant, & aliquantulū cutem exurunt. At verō particularem eorum syluam oēm in commentarijs de simplicium pharmacorum facultate tradidi: sed tñ exempli gratia ea quibus assiduē vtor recēsebo. Ex liquidis igit est lixiuium tali vi pręditum. Ex aridis aut & metallicis, arsenicum, & sandaracha, & calx non extincta, quam pleriq; viuā, Gręci verō ēt solius Asbesti i. nō extinctę nomine appellant. Manifestū itaq; est vehementem ipsorum vim per admistionem imbecilliorum pharmacorū tum liquidorū tum aridorū frangi. Quorum congruētem misturā modum coniecturaliter primum faciet viriū eorum expertus: deinde verō per experiētiam defectū corriget, aut ēt addet. Quō verō ēt eorū quę per experiētiam iudicata sunt notitiā habeatis, adscribā ea quę in primo libro de ornatu a Critone sunt relata, vbi prius ostēdero ēt medicis sepiusculē ipsorum vsum necessarium esse. Quemadmodū tincturas expetentibus, honestē negare possumus, vt quę comptorię sint malicię: sic depilatoria negare minimē licet. Si. n. moderatos quispiam habeat capillos, non subseruiemus ipsi ad superfluas delicias. Si verō admodū multos & longos duos q; habeat, honestum esse videt & rōnabile ipsos pauciores, & tenuiores, molliores q; ac rariores facere. Contingit aut aliqñ necessitas, vt eis qui multos & altē fixos, non tñ duos habent, in totum pilos tollamus, qñ aut picatione opus habet totum corpus, qñq; n. hoc pręsidio iuxta medicinę rationem vtimur: aut qñ pharmacum Emplaston, hoc est quod meatus obducit, imponere velimus: tunc. n. necessariō a parte pilos prius tollimus, quod quidem etiam per nouaculam facere licet. Quidam verō siue re vera, siue fictē, nouaculę timorem confitentur, qñ periculum sit ex ea cutem sauciari. Quidam aut non citra rationem fortassē metuunt, maximē cum partes gutturis radi oportet. Quapropter necessarium est medicum etiam huiusmodi pharmacorum experientiam habere, tum quod ad compositionem, tum quod ad vsum attinet.

Pilothra a Critone hac Verborum serie conscripta.

Pilothra Capillorum. Auripigmenti auricoloris ^a, scrupulos vii, aut x, calcis viuę tantundē, amyli sextantē, terrę q Romanis Selinusia appellat, ^b vnc. i. } Omnia trita & per angustissimum cribrum excussa reponito. Vsus verō tpe ex pharmaco quod sufficit acceptum aqua cōquassato, deinde illinire iubeto, ac animaduertere ne exurat. *Alud euestigio læuem reddit.* Calcis viuę partes duas, auripigmenti partem i. Hęc in mortarium plumbeum coniecta, aqua aut ptisanę succo affuso terito, atq; vbi nigra reddentur, calefacta illini maximē in balneo iubeto, læue enim corpus reddunt. Quōd si verō tenuis capillus enascens subeat, calcem coquito, & auripigmentum cum aqua terito, & vbi in vas fictile aconitum conieceris coquito, atq; vbi coacta fuerint nigra q; reddita illinito. *Paridis salratoris Pilothrum statim pilos aufert.* Sandarachę ^c vnc. i. } calcis viuę sextariū i. Trita cum aqua diligenter coquito, ^d atq; vbi ebullire cōperint, ablatis vtitor. Experimentum huius facies, si pinnulam in ipsum pilothrum immergas, breui enim glabra fiet. *Alud.* Amyli vnc. i, calcis viuę vnc. i, auripigmenti ^e vnc. i. } contusa & cribrata repone, vterē que vt dictum est. *Heracleidę Tarentini Pilothrum euestigio pilos tollit.* Calcis viuę sextarium i, cimolię sextarium i, pumicis vsti sextariū i, auripigmenti partes quatuor: trita ac læuigata reponito. Vsus verō tempore

A † AE. vncias duas.

B † AE. vncias duas.

C † AE. vncias duas.

D † *Al ex antiquis, atq; ubi cōperit opari, ablato vtite. Experimentū autem huius rei fiet, si pinnula in ipsum pilothrum immissa breui tibi glabra reddatur.*

E † AP. vnciam js.

A. 1. 4. f. 7. t. 1
7. fol. 507. h

A tempore aqua dilutis, vt dictum est, vtitor. Hæc quidem igitur Crito scripsit. Caterum eorum vsus melior est, quemadmodum nunc mulieres vtuntur, post corporis videlicet illitionem, in tepidam balnei domum ingredientibus, atq; vbi exudare cœperint, strigili pharmacum ex aliqua corporis parte detrahentes, deinde cum simul auferri pilos senserint, reliquum corpus omne abluentes.

Quæ Pilos Disperdant.

Scriptum quoq; de iis est, quæ pilos disperdant in cōptorijs libris, quæ sanè iam ex medica materia exciderunt. Quapropter & ego simplicium tñ ex eis faciam mentionem, in simplicium item pharmacorum tractatu à me relatorum. Iuxta rationem enim propolita pharmaca cōponunt, Ex lepore marino, hepate thunni putrefacto, cedria, ranarum in viridibus arundinetis degentiũ cruore siue mucosum, marine testudinis sanguine, lachryma vitis albe, lachryma hederæ, similiter que bryonia, ac oleo quod insulsum appellat: Ex marinis itē scolopēdris, vrtica que marina, & stellis marinis, nitro ac amurca ad hæc admistis. Quin & fortiora his ex erinaceis & salamandra componunt in oleo coctis. Admiserunt autē ipsi & alcyonia & sandarachē, & quæcūq; alia eius generis existūt.

Quæ Pilos Attenuant.

CAP. 5.

VTetur ēt aliqñ medicus velut dixi, iis quæ pilos attenuant, quæ nō eandem cum depilatorijs facultatem habent. Quam enim in simplicium pharmacorum commentarijs exterforiam facultatem appellauimus, eiūdem sunt ēt ea quæ pilos attenuant. Quemadmodum autē in omnibus eiūdem generis pharmacis, differentia secundum excellum & defectum existit, sic ēt in exterforijs habet. Hordei itaq; farina, & fabarum, amplius que erui, spuma nitri, ac ipsum nitrum, familiaria pharmaca sunt omnibus ad tollendas sordes vsurpata. Assiduus autē eorum vsus ēt pilos attenuat. Quæcūq; verò fortiori vi exterforia prædita sunt, in iis qui valde duros & magnos pilos habēt, assumpta congruunt. Eius itaq; generis pharmacorum est nitrum vsum, & nitri spuma, & aphroditrum spumosum. In assiduo autē vsu faciunt item purpurea appellata vasa ficilia Alexandrotica, contusa videlicet, & tenui cribro excreta. Caterum pauperibus ego ēt ficilium, & clibanorū in quibus aliquid sub textu coquitur, testas, item que pumicē vsum, ac non vsum indicaui. Vili autem & gratis habuerit quis circa mare degens, aut vrbe quapiam non longē à mari sita, testas vstas tūm buccinorum, tūm purpurarum, aliorum que ostreorum: sepia verò testam etiam citra vstionem. Atq; hæc quidem pro valde egenis indico, pro alijs verò alcyonium, & herbam lanariā, vtrūq; veratrum, bryonia item & dracunculi radicem, aristolochias, cāchry, & panacis radicem, & quæcūq; eius generis existunt: plura enim, vt dixi, relata sunt in simplicium pharmacorum tractatu. At verò si hæc ipsa odorata facere volueris, cyperum, & melilotum, rosas que siccas, & iunci odorati florem, iridem illyricam, melissophyllum que, et cydoniam herbā, eis admiscebis. Et si pro diuitibus paraueris, spicam nardi indicam, celticam que, & montanam iniicies: & terrā Eretriada. Adde ēt folium malabathri, amomum, myrrham, crocum, costū, et hedychoū. Qui verò preciosiori materiæ parandæ non sufficit, ei viliores ij, qui exornatoria composuerunt, excogitauerunt. Quorum ēt Crito meminit in primo de ornatu sic scribens: Ollam nouam figulinam magnam, operculum habentem accipito, in eam que cimolia glebas pro sitis rōne coniecto. Cōponantur autem hæc quantum fieri potest ad theatri formam, vt in medio ipsarum locus vacuus relinquatur. Inter glebas autem vicissim mala cotonea recentia viginti locentur, hæc autem per intervalla variare iubeto: deinde operculo imposito marcescere ipsa mala sinito. Vsu autem expetente, quantum satis videbitur accipito, terito, ac vt iubeto. Post psilothrorum verò impositionem, suauem quendam odorem habet. *Aliud.* Rosas q; odoratissimas per diem vnam in vmbra refrigeratas, quò humor saltem ab eis desiccet, in vas figulinum composito: eodem que modo, vt dictum est, glebas cimoliae indito, ita vt rosæ substernantur, rursus que inter glebas eadem imponantur: deinde operculo addito, combibere sinito. Vsus iam demonstratus est.

† Additur in
gracis mala-
bathrum, &
in aliquib; aut
marabathrum.
fœniculū, &.

* Al. d. r. de-
siv. ablatis-
nem.

De Furfuratione.

CAP. 6.

QUibusdam se scalpentibus, furfuribus similia ex capitis cute decidunt, & propterea furfurationem medici hanc accessionem siue symptoma appellāt, à vitiatas saniebus prouenientē: quas consumere scopus est eis, qui malū hoc sanare volunt. Manifestū igitur est disculso-ria & exterforia pharmaca adhibenda esse, præparato prius vniuerso corpore, si vitiatas humoribus repletum videatur: in omnibus enim huius rei meminisse oportebit, etiam si aliqñ in sermone relinquatur. Admiserunt autem quidam prædictis pharmacis quædam adstringentia, quò per ea affectum membrum corroboretur, vt ne facile in se ipsum suscipiat influētes humores serosus, sed resistat, eos que repellat: & ob hoc sanè Archigenes in pharmaco ex atramento sutorio cōposito hæc verba adiecit: Hoc, inquit, adeo efficax est, vt neq; sinat in posterum fieri. Crito equidē in tertio libro de ornatu, eiūsmodi pharmacorum syluam scripsit in principio statim ipsius libri. Quare velut paulo antè dixi, minimè necessariū est me ipsa hic rursus describere, cum omnes illius habeāt libros. Cæterū quæ Archigenes scripsit indicabo ob id maxime, quò quibusdam ex eis adscripserit, quò non permittant symptoma hoc rursus fieri. Scribit autem hoc modo suis ipsius verbis: Victus ratio constituatur flatus expers, nihil ex crassi succi cibis habens admistum, quales sunt tubera, fungi, bulbi, legumina, carnes que, maxime bubulæ, ac quæ similia existunt.

Sint

Sint autē cibi quibus vescunt boni succi, faciles concoctur, & mel ipsdem addatur. Intinctus confertur, acetum cum sapa. Condimenta, cuminum, et fœniculum: alijs parçē vtantur, et à bellarijs oibus maximè abstineant. Vinum conducit eis album & tenue: voluptatis verò gratia dulce, & vinum mulsum. Ex fructibus optima est vua arefacta, deinde ficus, quibus ante cibum reliquum vesci præstat. Verum antè oia bonæ concoctionis cura habenda est. Deambulationes lenes plurimè & manè & vesperi optimæ sunt. Lauatio ex frigida balneis præstat. Si verò quis calida lauit, incōgrua ei est longior in aere mora: & perfulio capitis præ folio est eligenda, postea verò larga frigidæ adfusionē refrigerato. Dormire ad satietatē vsq; vtile est. Ira, indignatio, versatio in Sole, & vehemens refrigeratio vitanda, omnia item quæ caput replent. *¶ Archigenus ad Furfurationem capitis.*

Quibus furfures caput occuparunt, his cum fœnogræco, betæ succo, ac nitro, præfrictis & externalis, cimoliam felle bubulo aut suillo aceto q; subactam illine. Deinde post horam ablue, atramentum q; sutorium ac nitrum cum oleo trita illine. Aut myrobalanum, id est vnguentariam nucem, & fabaceam farinam, æquali pondere trita, in aqua coque, & affrica. *Aliud.* Amygdalas "amaras decorricatas cum aqua aut aceto affrica, cum q; exaruerint capilli, calida ablue. *Aliud.* Aut maluā syluestrem aqua marina ad decimæ partis reliduum coctam terito & affricato. *Aliud.* Aut nitri spumam & atramentum sutorium, equis partibus cum vino, ter aut quater in mense affricato: hoc F adeo efficax est vt neq; in posterum fiant. *Aliud.* Aut vini Rhodii facem, & pumicem, & nitrū, pari pondere cum lupinis affrica. *Aliud.* Aut cimoliam cum fœnigræci cremore adhibe. *Aliud.* Aut nitrum assatū & bulbum. Aut hæc omnia simul pari pondere læuigata affrica. *Aliud.* Aut vbi picis liquida serum illeueris, alumen insperge.

De Phthiriasi, hoc est Morbo Pediculari.

CAP. 7.

Pediculorum generatio quibusdam in capite contingit aceruatim, ex multis videlicet humoribus calidis quidem, sed non ad tantam caliditatem progressis, ad quantam perueniūt acres ichores, id est sanies. Quare manifestum est, in profundo cutis pedicularis morbi affectionem fieri, vbi ē animalia hæc generari possibile est, non in superficie cutis, in qua furfures consistere diximus. Pharmaca itaq; ipsorū necessariò exiccantia sunt, & quæ ex alto trahere ac euacuare possunt, magis vtiq; q; ea quæ furfuribus conueniunt. Atq; hæc quidem Methodus est ea cōponendī. Verum sylua eorum quæ experientia constant (oportet enim, vt dixi, in omnibus maximè attendere ac confidere his quibus experimentum testimonium præbet) in tertio libro Critonis de ornatu scripta est. Apponam autem etiam nunc ego ab Archigene scripta hac serie verborum. *¶ Remedia Morbi Pedicularis.* Morbo pediculari affectis hæc conferunt. Staphidis syluestris, id est herbæ G pedicularis partes ij: sandarachē et nitri, vtriusq; partē i: cū aceto & oleo capiti illine. Aut Rhoen, qui in obsonia additur, cum oleo tritum similiter illinito. Aut oxylapathi i. acutæ rumicis, radicē cum oleo eodem modo. Aut veratrum album, & staphidem syluestrem i. herbam pedicularem, & nitrum, pari pondere cum oleo in balneo adhibe. Aut aqua marina, aut muria meraca cum aceto, perfundito. Quod si nuditas pilorum adsit, syluestrem staphidem i. herbam pedicularem { emplastri more } cum oleo & aceto imponito. Aut alumen tritum cum oleo illinito.

De Achoribus, hoc est Vlcerebus Capitis manantibus: & Cerijs, id est Fauis.

CAP. 8.

Inter affectiones cutis capitis cōnumeratur quoq; ea quæ Achor appellat, ex genere tumorum præter naturam existens: propriam autem & singularem appellationem naçta, ob accessionū quæ ad eam consequunt proprietatem: valde. n. tenuibus foraminibus eroditur, quæ tenuem in se humorem modicè viscosum complectunt. Ad similitudinem verò eius proximè accedit alia cutis affectio quæ Fauus, Græcis Cerion vocatur: maiora tm foramina habens, in quibus humor mellis, quod est in fauis, similis continetur. Generatio ipsius ex humore misto est, qui partim tenuem serosum q; ac mordacem, partim verò crassum succū, in se habet. Tenuis itaq; humor vtpote mordax, primum quidem ad scalpendum ipsos impellit, progressu verò tps, ad scalpaturam tum tumor au- H gescit, tum foramina in ipso erumpunt. Manifestū igitur est euacuare oportere humores affectionem ipsam operantes. Qui si ē influant amplius, prohibendus primum est ipsorum influxus per capitis euacuationem, atq; totius corporis purgationem, velut in alopeciis est proditum. At vero si parua affectio existat, sola localia & partialia appellata remedia (quæ s. locis affectis adhibentur) citra totius corporis euacuationem suffecerint. Cōuenient autē ipsis ob crassitudinē videlicet & viscositatē humoris eas generantis, pharmaca quæ ipsum incidant, quæq; facultate sua necessariò discutiant & repellant. Atqui acetū ex incidentium ordine existens, vltra hoc quod discutit, præcipuum quiddā in se habet, quo reprimat, ac quod influit depellit, vtpotē quod substantia sua parum calidum est, plurimum verò frigidum, & partium tenuium: tali nanq; facultate præditum esse, in primo de simplicium pharmacorum facultate demonstratum est. Sit itaq; acetum exquisitè acidū, in quo nulla penitus vini qualitas appareat: hoc ipso sanè pharmaca metallica appellata, modò hoc, modò aliud imbues, achoribus q; ex eis medeberis. Incipere autē ab imbecillioribus pstat, præsertim si dolor simul ipsis adsit. Cimolia igitur ad hanc rem apta est, & Cretica lemnia q; terra, et samia, pompholyx q;, & spodium, spuma argenti, & cadmia tenella. Quod si neq; ex his quiescat malum, pharmacū ex charra siccū aceto dilutum illinito. Neq; obscurum est tollendos prius capillos, antequam

A. ibidem. d

A. l. 4. f. 7. t. 3.
c. 26. fo. 518. b

A. ibidem. c

Antequam talia admoucas. Si verò acius tibi ex charta pharmacum appareat, miscebis ipsi argenti spumam, si quidē abundē mordacitatem eius exoluere velis, pari copia: si verò pauxillum mitigare velis, minori: quemadmodum etiam si plurimum eius vim exoluere placeat, maiorem eius copiam addes. Porro cum aliqui ruri degenti mihi pharmacum ex charta ad manū non esset, conspecta in agri domo inutili aliā charta, faculā postulauī, exulta q̄ charta ac aceto diluta, locū affictum illeui, hominem q̄ ad me postridie venire iussi, sciebam enim q̄, cum durā carnis esset, pharmacum ferre posset: qui vbi venisset, parū aberat quin curatus esset: quare ad aliud pharmacum non transiui, sed eodē vii iussim, postera die perfectē sanitati restitutum cōspexi. Prudenti igitur viro, quod sape iam dixi, opus est: & qui tum curandorum morborum substantiam, tum agri naturam, probē norit. Insuper q̄ pharmacorū facultatem non iuxta genus tantū, sed & iuxta quantitatem, cognoscat, quod singulis diebus quali præsidiō opus sit coniectet. In extendenda enim aut exoluenda pharmaci, quod prioribus diebus admotū fuit facultate, in quantum sanē affeū ipsa indicat, cōgrua curatio consistit. *Ad Achoras inflammatos.* Quod si quando in vlcus manans inflammatum simul & dolorosum incidas, lenies primū per humectum concoctiorum q̄ ac emolliens & acrimoniā arcens pharmacum dolorem. Tale autem est parygrum appellatum, ab Hera alijs q̄ plurimis descriptum. Satis manifestum autem est, q̄ ipsum in manu per specillum latum cum rosaceo emollitum, & ad vnguenti formam redactum, non emplastri forma, qualem a principio habebat, adhibere oportet. Cōueniunt etiam hoc tempore, ea quæ ad sedem ex vlcerebus aut rupturis dolētem faciūt, de quibus priuatim destinato sermone ac tempore dicitur. Sicut etiam conueniunt ea quæ caneros mitigant. Hæc igitur omnia vbi prius consideraueris etiā particularem pharmacorum varietatem vtiliter cognosces. De qua ego quoq̄ dicere aggrediar, medicamenta apud præstantissimum quenq̄ medicum laudata, ordine scripturus. *Ad Achoras Archigenis.* Archigenes in primo pharmacorum iuxta genus, ad Achoras sic scripsit: In quibus Achores, aut papulæ feruidæ, aut eruptiones circa caput vlcerosæ sunt, ab omni acri & salso abstinēant, item q̄ acuto. Dein de deraſis capillis, aut ter aut sæpius quotidie ex calida, in qua myrtus, aut lentiscus, aut rubus, aut bryonia, aut sycomorus, aut lupini, aut lentes, aut asparagi radix, incōcta sint, lotis, & maximē vbi multa sanies effluerit, salicis folia ex aqua emplastri more apponito: aut lentem cum melle, aut asparagi radicem coctam eodem modo. † Aut fœnum græcum betæ succo maceratum pinguibus emplastris vsu cognitis admisceto ac vtiſor. *Aliud præciare faciens.* Pinus corticem cum cerato. Aut cadmiā cū oleo veteri illinito. Aut cinnabari similiter emplastri more vtere læuigato. Licebit & myrti baccas, aut hordeum vstum, aut argenti spumā, aut cerussam, aut ostreorum testas vstas, admiscere: singula etiam cum oleo veteri illinire. Aut cinerulam & mannam ex vino. Egregiē constanter facit & chalcitis cum aceto & oleo veteri illinita. Aut betæ decoctum cum exigua cimolia, sale & vino admistis, in balneo affrica. Aut hyoscyamū & semperuiuum minus, trita cum rosaceo mellis spissitudine illine. Aut vlcerebus ex smegmate quopiam repurgatis, terram cimoliam torrefactam cum vino, aut facem vini Rhodij vstam cum aceto veteri, aut radicis cucumeris syluestris decoctum adfundito ac proluito. Aut tragacanthā, aut argenti spumam, aut sandarachæ duplum, cum vino aut etiam cum oleo myrteo aut pingui quopiam illinito. Aut argenti spumam & calcem pari pondere cum aceto & oleo illine. Aut chalcitidē cum myrteo oleo, vel suillo felle liquido, illine. Hæc quidem Archigenes scripsit, doctriſinam tradens non modo Empiricam, sed etiam indefinitam. Inuenire itaq̄ est apud Empiricos, qui sanē non in contentiosis sermonibus vitam contriuerunt, sed in medicæ artis operibus diligenter versati sunt, quod in quibusdam apparentibus cognitionibus euidentia discrimina retulerunt, qualia & ego paulo antē in alopecia feci. Faciam autem & nunc in his quæ Archigenes scripsit pharmacis. Quædam enim ex eis incipientes achoras, citra humorum in vniuerso corpore vitiationem aut eorundem multitudinem redundantem, sanant, adstringentem nimirum & repulſoriam vim habentia. Quædam verò vbi magnū quoddā malum minant Achores, eos augeri phibent, simul & quod influit repellentia, simul q̄ quod iam in eis cōtinetur concoquentia & discutientia, quæ euidentia est miltæ facultatis esse oportere. Quædam autem eis quæ in superficie hærent, paruis q̄ tantum auxiliantur, quæ moderatis viribus prædita esse oportet, & nihil quod irriter habere, ex disculſoria nimirum facultate. Alia autem viribus omnino robustissima sunt, adeo vt etiam Achoras ex crassis ac viscosis humoribus obortos, inelutibiliter q̄ cuti infartos euacuare possint, atq̄ id adeo validē, vt etiam si obduratum quid habeant, id ipsum deturbare valeant, quā uis morbus ipsum cutis habitum adeo vitiet, vt quod influit corrūpatur, etiam si cōmodum id existat. Hæc autem sunt ex efficacissimis pharmacis cōposita, quale retulit Archigenes vbi salem ad reliqua disculſoria admiscet. Sal. n. & chalcitis, & vini fæx vsta, & sandaracha, & calx viua, fortissima viribus pharmaca sunt, calfacientia, mordentia, & discutientia. Eius generis est etiam fel calidorum & siccorum animalium, quorum non meminit Archigenes, sed vnius suilli tantum, quod omnium moderatissimum existit: ad cuius facultatem etiam proximē cinnabari accedit. Propinquum deinde locum habent cōchæ vstæ, & hordecum, & post hæc oleum vetustum. Quemadmodum autem hæc emouent, secant, & discutiunt violenter impactū, sic repellunt adstringentia, ali-

Quinta Classis.

RRRRR

qua

† Additur in
quibusdam cod.
Aut bryonia
eodem modo.

qua quidem simpliciter citra contrariæ facultatis admistionē, aliqua verò per dominium adstringentis in eis facultatis. Myrti equidem earum quæ bacca, & pinus cortex, ex eorū numero sunt quæ non habent contrariæ facultatis admistionē, velut etiam rubus & sycomorus, quāvis moderatius adstringant, quæ myrti earum quæ bacca, sed tñ adstringendi vim sensibilibiter in se habent. Mistæ autē facultatis est oleū myrteum: nam & ex oleo, & ex baccarum myrti, aut ipsius etiam myrti succo, est compositum. Oleum autem ipsum emollientē habet facultatem, Myrtus autem eius quæ bacca adstringentem, non mollire sed cogere & stringere natam. Rosaceum item quāquā minus quæ myrteum astringat, tñ & ipsum mistæ facultatis existit. Quemadmodum autē hæc per præparationem mistas vires habent, sic alia spontē naturæ talia sunt, velut lentiscus, cyperus, & lētes: quod ipsum in sermone de his est demonstratum. Ceterum discussoria & repurgatoria, citra sensibilem caliditatem facultate præstant ex eis quæ iam Archigenes retulit, Beta ipsa, & cimolia vsta: priusquæ verò vritur, imbecillior viribus quæ beta est. Sed fortior his est cucumeris, & bryoniæ, ac asparagi facultas. Spuma vero argenti præstantius quidem quæ cimolia vsta pharmacum est, multum verò debilius quæ ad propositæ affectionis sufficiat medelā. Cadmia autem moderatē habet ad mediā magnitudinis achoras. Citra mordacitatē verò resiccat cinerula. Māna autē etiā concoquit. Oleum verò, ut iam dixi, laxantem quidem habet vim, sed eam non adeo fortem, atque ob id per misturam facile exuperatur. Itaque ubi fuerit cū obducentibus meatus & refrigerantibus permistū, velut est cerussa, possibile est hanc magis vim suā demonstrare, quæ est cogere, oppilare, & adstringere substantiam corporum quæ contingunt. Porro hæc omnia in Archigenis sermone confusa sunt, neque in quibus achoris, neque quā eis utendum sit, ipso demonstrante. Vritur autem & vino in eodē sermone, neque apponit quale prober. Atqui multijuga circa vinum differentia existit. Aliud, n. austerrum, aliud acerbum, aliud dulce, aliud acre manifestē est: aliqua etiam plures qualitates simul ex se ostendunt, nimirum & dulce quippiam & adstringens & acre completentia. Quā igitur simpliciter quis scribat, dilui debere quippiam vino, lectorem coniectare oportet quem scopum pharmaci compositio habeat, & ad illum respiciendo, id quod aptum fuerit vinum eligere. Adstringens quidem ubi repellere velit, acre verò in quibus discutere. Reliquis item vritur, quemadmodum vniuscuiusque vim demonstrauimus in loco ubi de vinorum differentiis docuimus. Acetum verò in omni occasione ad achoras aptissimum est, utpote crassos & viscosos humores secans, atque id quod influit discutiens quæ & repellens. Verum ipso non utique per se quispiā vritur, si quidem non proluere aut expurgare achoras velit, sed eo pharmaca diluet, moderata quidem, in quibus incipit & adhuc parua est affectio, fortia verò in maioribus & diuturnioribus, fortiora autem adhuc in inueteratis iam & ægerrimè curabilibus. Verum differentia pharmacorum iuxta fortitudinē iam antè à me relata est. Ceterum ex relatis ab Archigene pharmacis, in totum non uti exoptem semper uiuo quæ & cerussa. Illud enim strenuius refrigerat, quæ conuenit incipientes achoras refrigerari. Cerussa verò exigua quidem habet frigiditatem, & ex pharmacis est obducētibz meatus, emplastica vocant, pro ea autem uti possumus cinerula & pompholyge.

Quæ Apollonius in Primo de Parabilibus ad Achoras scripsit.

Apollonius in Primo de Parabilibus ad achoras, Primū quidē sic scripsit: Rosaceo oleo caput illi ne. Deinde post hoc, Betae succum similiter illine. Tertium deinceps, Testudinis sanguinē eodem modo adhibe. Quartum, Laurino oleo caput illine. Et quintum, Crocinum vnguentum inūge eodem modo. Ex his sanè primum debilissimū est, pueris & mulierculis teneræ carnis in principio affectionis vtile existens: cōcoquit enim & discutit ac repellit, ea quæ omnia moderatē facit. Secundum verò ubi beta succo uti consulit, efficacius quidē est rosaceo, discussoriam vim habens, non tñ ad fortes ac iam obfirmatos achoras sufficit. At verò testitudinis sanguis curiosum & supuacaneum est pharmacum, neque vni quæ tentari eius periculum facere. Quod verò deinceps scriptū est, laurinum, fortiter calfacit & discutit: opus quæ habet corporis totius & capitis euacuatione, quo discutiat humores achoras facientes. Crocinum deinde vnguentum discussorium quiddā habet & adstringens, & cōcoctorium: atque ea tria fortiora in ipso sunt quæ in rosacei natura: ex eis igitur quæ de illo dicta sunt, etiam de hoc ratiocinari licet. Post hæc autē ipsius verbis ita scriptum est: Tauri vrinā affrica. deinde sequitur, Facit & cameli vrina eodē modo. Utendū autem eis, inquit, ad plures dies. Verum ego utique dixerim ad ipsum, nō esse quod ad multos dies, sed ne ad vñ quidem, purus homo tolerare queat, ut vilius alicuius eiusmodi animalis vrina capiti affundat, præsertim in affectione adeo parua, & quæ faciliè curari potest. Bis enim per omnia, quod dicitur, distās est, rosaceo videlicet uti, quod penitus exigua habet ad propositū symptoma facultatē: & tauri ac cameli vrina, quæ acerrimè grauissimè quæ & penitus iniucūdā existunt. Deiceps verò tale quoddā pharmacum his verbis scriptū est: Furfurū choenice mediū in aquæ heminis duabus madefacito, postea quæ terito ac succū excolato, cum quæ media aceti hemina ad limi spissitudinem coquito: & ex eo caput fricato, deinde aqua in qua beta, aut foenum græcū, aut lupini cocti sint, abluito. Vnguento autē vritor fece irini. Hoc pharmacū discussorium est citra mordacitatē, ex repurgantibus atque extergentibus appellatis cōpositū. Eiusmodi, n. facultatis sunt furfur, beta, & lupini: discutit autē simul quæ calefacit nō vehementer foenum græcum: ex eo autē genere est & irini vnguenti fex.

De aceti

* hoc, f. oleum.
* contingit.

A De aceti verò facultate antea quoq; dictum est, q; aptum sit ad achorum affectionem, quare hoc vt conuenientissimo, & efficacissimo pharmaco vtendum est. Aliud deinde post hoc pharmacum scriptum est ab Apollonio his verbis: Cucumeris syluestris radices decoquito, & succum affricato. Didicimus aut cucumeris radici plurimū discussoriae facultatis esse. Et postea hoc pharmacū scriptum est: Terrae cimoliae, sulphuris viui, par pondus cum aceto terito, & in balneo affricato, calida q; abluito. Hoc illinire et conuenit pharmacum, non solū, vt dixit, in balneo adhibere: oēs enim habet facultates quibus affectio indiget, aceto quidem ipsas habēte, velut antea est dictum. Solum verò sulfur vltius q; conuenit exalfacere & discutere potest: quapropter cimolia ei admiscuit, quā cōpositionem ex vitroq; ad moderatam temperaturā reducit. Ceterum quod sequit pharmacum vbi inquit, maluam exiccatam & tusam in vrinam inspergito ac affricato, reprehendo, in quantum et superius vrinae vsum detestatus sum, etiam si facultatem eius affectioni conuenire non negauerim. At quod deinceps scriptum est, in quo ait, Fici folia in aqua coquito, & aquam insolato, iniecia q; in ipsam fece vsta affricato, post hac verò repurgantibus pilos, eluito. acre valde hoc exterforium medicamentū est: q; si in balneo tm adhibeatur, non vehementer valet achoras irritare, praesertim si quis, vt ipse deinceps iubet, proluat, hoc est ex aqua dulci caput perfundat. Ad illitionem verò eiusmodi pharmaco vtī periculosum est: est. n. plurimū acre medicamentum fax vsta, quemadmodum in libris de simplicium medicamentorum facultate est cōmonstratum. Quod verò sequit pharmacū securū vsum habet, eo q; confidenter quis vtetur ex spuma argenti laurino q; composito. Miror autem quō, vt laurino simile, oleum simplex admiscet, sic quodāmodo scribens, Argenti spumam cum oleo albo, aut laurino tritam, vbi calida praelaueris circūlinito. longe. n. deficit à laurini facultate oleū cōe, quod albū appellauit, e regione ipsum à laurino distinguens. Quin & quod post hoc scriptum est, consimilem habet absurditatem. Pro spuma. n. argenti, cerussa vtitur: diluit aut ipsam myrteo aut laurino, cū multā omnino differentiā hac pharmaca habeant: alterū. n. repulforium est, alterū verò plurimū calfacit & discutit. Vsus q; eorum est repulforij quidē in principio, disculforij verò, vbi humor qui achoras generat, iam est firmatus. Amplius aut deinceps cū rubi canini folia contundere & exuccare iubet, deinde q; oleo miscere, imbecille est pharmacum, & incipienti affectioni solūmodo aptum, vtpotē cū rubus caninus adstringat. Tale pharmacum est et plumbago cum cerussa vino subacta, vsquequo ad compagem quā illini queat redigantur. Porro contrariae praedictis facultatis sunt, quorum aequaliter nulla distinctione apposita meminit, id videlicet quod ex nasturtio, & quod ex scilla constat, De priore quidem hac verba tradens: Nasturtij & salis parem modū adipi anserino admisceto, terito ac vtor: De altero verò sic scribens: Scilla in fornace velut cucurbitam cinere obruito, cū q; mollis fiet, exprimito, deinde ad succum oleo nō multo admisto, illinito. Manifestū verò est multo vehementius esse, q; hoc quod ex nasturtio apparat. Quod verò deinceps tradit, ex mitigatoriorū pharmacorū genere est, quod vbi dolor quispia vehemens circa achoras existit, donec eum leniat, conuenienter adhibetur: si verò duros & inueteratos achoras discutere velimus, oīno imbecille est. Scripsit aut in hunc modū de eo Apollonius: *Et Mitigatoria ad Achoras inflamatos, Et ad Rhagades aut intumescentes rimas quae ac fissuras sedis &c.* Olei q; optimi hemina in pilā plumbeā infundito, & plumbago pistillo terito, donec crassum & subnigrū reddat: deinde seorsim spumae argenti lib. vnam & cerussae tantūdem terito, oleo q; admisceto. Postea verò eloto & siccato capite, pharmacū illinito. Neq; verò ex simplici tm oleo, sed qnq; rosaceo, qnq; myrteo apparabis, & ad rugas ani intumescentes rimas q; ac fissuras sedis, ad vlcera q; dolentia, omnia q; alia quae ex fortiorum pharmacorum vfu exacerbata sunt, optimum medicamentum habebis. Egregie enim ea lenit, etiam si serpendo exedentia, aut etiam cancrosa, aut quocunq; maligna exstant. Nequaq; igitur eius cōpositionem nunc scribere oportuit, sed quemadmodū ego antea dixi, sufficebat illud dicere, q; dolori

Drofici achores eiusmodi pharmacis mitigantur: cōmune. n. hoc est in oībus dolore affectis, propriē autem faciens ad achoras. Deinceps aut tale pharmacum scripsit: Spumae argenti 3 viij, foliorum rutae tenerorū 3 v, olei 3 viij, aceti heminae quartam partē: simul trita capiti illinito. Hoc sane pharmacum multo vfu habemus exploratum. Propinquū aut ipsi facultate est id quod consequenter ab eo est cōscriptum, iuxta hanc cōmensurationem: Cerussae 3 vi, spumae argenti 3 iij, cerae tantūdem, sulphuris 3 vi, olei rosacei aut myrtei quod satis est, vt ceratum liquidum fiat. Arida cum cerato cōmittito, caput q; inde illinito. Hoc aut & ad oēs in toto corpore eruptiones vehementer commodum est, vt rite sit ab Apollonio cōscriptum. Quin & quod postea sequitur, plurimū disculforium est, vt quod spumā nitri habeat multā, adeo vt, n. si olei multitudine calugetur, acius sit quā conuenit. Iubet autem ad vnam spumae argenti partem, quincuplum spumae nitri admisceri, his q; dum teruntur paulatim oleum adfundi, donec ad compagē illiioni aptam redigantur.

Qua Cruto ad Achoras pharmaca scripsit.

In Methodo de curandis morbis vniuersales facultates pharmacorum ad singulos morbos recensui, verū paucorū definita materiae exemplorum mentionem feci, reiecta illic multitudinis ipsorum commemoratione. At verò in praesenti, quam nunc in manibus habemus, tractatione omnia quidem quae omnes pharmaca scripserunt, longum fuerit recensere: Quae verò à probatis

Quinta Classis.

RRRRR ij medicis

7. Affnouem.

medicis per experientiam tradita sunt, ea omnia visum est mihi conducibilius enumerare, quod E etiam inter se propinqua, & quæ omnino eadē apparent, paululum verò iuxta appōderationem aut præparationem euariant, si qui in his scriptis versantur cognoscant, ea q̄ maximè præparent quorum materias in prōptu habent. Contingit enim aliquando, vt aut in totum ea quæ in cōpositionem miscentur non reperiāmus: aut talia reperiāmus, vt ipsa iniicere non audeamus. Cæterū eius maximè in componendis pharmacis cura habēda est, vt bona integra q̄ & in vigore sint omnia quæ admiscentur. Ob id igitur etiam iam omnium quæ Crito tradidit, mentionem faciam: nā is sanè diligentius achorum curam tractasse mihi videtur. In quinq; itaq; sermones doctrinam de iplis distinxit, quorum primum & ipse recensebo.

PRIMVS Critonis sermo de Achorū curatione. Scribit itaq; Crito hæc verba: Ad achoras in capite cōtingētes, q̄ plerūq; furfuribus p̄cedētibus fiūt, & fermē ēt scabie, in principio subscriptis cōpositionibus vtēmur. *¶ Ad achoras recentes.* Glutē fabrilē aqua coctū obline. *Alud.* Papaue ris syluestris & hyoscyami folia cum oleo emplastri more appone. *Alud.* Fici syluestris virgulta aut folia tenera trita cū aqua imposito. In inueteratis verò cum aceto terito. *Alud.* Nucum amararum nucleos in aquam tepidam iniectos & decorticatos, cū aqua terito, & cerati crassitudine p̄ralis imposito. In inueteratis cum aceto diluito. *Alud.* Recrementi ferri & rosarum par pōdus F cum vino terito & imposito. Quidam verò trita cerato rosaceo excepta adhibent.

SECUNDVM sermonem ad Achorum affectionem his verbis conscripsit: Circumtenſa autē cute, & ob id molestiam inferente, subiectis cōpositionibus vtendum est. *¶ Lipara seu Pinguis cōpositio ad Achoras, Psdracas, Papulas feruidas, intertrigines.* Est commoda quoq; Vitis sedis. Spumæ argenti 3 l, foliorum rutæ tenerorum 3 xxv, aceto diluito: & rosaceo aut myrteo excepta, cum penna illinito. *Alia.* Spumæ argenti 3 cc, cerussæ 3 cl, rutæ 3 c, staphydis syluestris 3 xxv, aceti sextarios iij, myrtei libras iij: particulatim singula terito, & affuso liquore, vt dictum est componito. *Alia.*

Cerussæ 3 cl, spumæ argenti 3 cc, rutæ 3 centum, myrtei sextarios iij: particulatim tritus aquam affundito. *Alia.* Cerussæ vitæ 3 centum, rutæ 3 c, mannae thuris tantundem, corticis pinus 3 l, olei myrtei sextarios ij, aceti tantundem, similiter cōponito. *Alia.* Recrementi plumbi 3 c, pāpinorū vitis 3 c, thuris 3 centum, myrrhæ & spumæ niri tantundem, aceti & myrtei quantum sufficit.

IN TERTIO autem hac tradit: At vbi affectio inueterata fuerit, subscriptis cōpositionibus vtendum est. Et deinceps ita scribit. *¶ Democratica cōpositio ad Achoras humectos & inueteratos.* Ladani 3 viij, cerussæ tantūdem, sulfuris viui 3 iij: vino & myrteo oleo subactis vtitor. *Alia.* Spumæ argenti 5 viij, pampinorum vitis 3 viij, succi hypocystidis 3 iij, spumæ niri 3 ij, gallarum 3 iij, G. aut ij: ex aceto & myrteo adhibe. *Alia.* Malicorij, gallarum, acaciæ fuluæ † tantundem: malicorium & gallas vino macerata coquito, acaciam verò vino dilutam reliquis probè tritis adijcito, cumque rectè omnia comparata fuerint, myrteo excipito. *Alia.* Spumæ argenti, cerussæ, hyoscyami, misyos vlti, ramulorum cicutæ, æquales portiones: thuris vlti, ramulorum oleæ, tantundem: aceto & oleo lentiscino exceptis vtēre. *Alia valde commoda.* † Cerussæ vitæ 3 viij, spumæ argenti 3 viij, atramenti sutorij 3 iij, rhois rubri 3 iij, sulfuris viui 3 ij, opij 3 ij, myrrhæ 3 ij, aceto & lentiscino oleo excipe. †

QUARTVM verò sermonem de Achoribus curandis hac verborum serie conscripsit: Quādo verò ex his quæ ad achoras scripta sunt, pleraque reliccant, magis q̄ dolorem inferunt, vtpote cute in iplis affectis circumtenſa, subscriptis cōpositionibus vtendum est, per quas post hæc omnia citra dolorem emendari licet. *¶ Leuce Emplastrum album inexuperabile, faciens ad humectos Achoras, & qui egre tolli possunt.* Facit & ad Papulas feruidas, & Intertrigines. Spumæ argenti drac. c: ceræ 3 c, alij l habent: cerussæ drach. c, thuris drach. xxv, aluminis scissi drach. xvi, terebinthinæ drach. xxv, piperis albi drach. iij, olei sextarium vnum, arida tundito. Oleum verò & argenti spumam ac cerussam in ollam neuam coniecta ad prunas coquito, atq; vbi mutationem acceperint, ceram & refinam addito, ac donec non inquinēt amplius manus agitato: deinde ab igne ablatis, & quodammodo refrigeratis arida adijcito, & in pilam translata diligēter emollito. Vtitor autem in linteolum impactis, soluto q̄ tertia die. Magis autem commodari pharmacum hoc, si cum melino emplastro Pasionis fuerit permistū, ita vt emplastri Leuces inexuperabilis, Anicetū Græci hoc appellant, partes duæ, melini aut Pasionis vna pars committantur. *Alia.* Cerussæ drac. cxx, spumæ argenti drac. lxxx, ceræ drac. xxiiij, terebinthinæ drac. xij, mannae drac. xvi, aluminis scissilis viij, olei heminas ij, committe vt dictum est. *¶ Melinum Leuci Emplastrum, quod omnem Fluxum resiccet, faciens ad Achoras inueteratos & humectos.* Ceræ drac. viij, sandarachæ drac. iij, adipis vitulini 3 iij, terebinthinæ 3 ij, thuris 3 i, myrrhæ 3 i, aluminis scissi vlti 3 i, corticis pinus 3 i, olei myrtei quod satis est: liquefacta cum aridis committito. *¶ Aliud Melinum Hygient, resiccans omnem Fluxum.* Spumæ argenti librā i, cerussæ lib. i, salis fossilis lib. i, aluminis scissi libræ dimidium, atramenti sutorij sexuncem, olei sextarios ij, aceti sextarium i. Oleum, salem, cerussam, spumam argenti, donec non inquinēt manus coquito: arida verò tusa, cribrata, acetoque diluta, ad refrigeratum pharmacum addito, paulatim adstillando ac assidue agitando: deinde in pilam translata ac probè emollita tollito ac vtitor. *¶ Thebæi Emplastrum ad Achoras humectos.* Spumæ argenti 3 xlviij, cerussæ drach. xxiiij,

* Aliter I.

* Aliter I.

† irov.

† In antiquis cod. ita legit. Cerussæ vitæ drach. iij, spumæ argenti dra. iij, atramenti sutorij drac. ii, rhois rubri 3 ii, sulfuris viui dra. ii, myrrhæ drach. ii, aceto & lentiscino oleo excipe.

A xxiiii, corticis thuris 3 xij, gallæ omphacitidis 3 xij, ceræ 3 viij, resinæ terebinthinæ 3 xvi, olei sesquiheminam: composito vt dictum est.

QVINTVM postremum sermonem de Achoribus Crito ita orditur: Cæterū vbi affectio decreuerit, & cicatrix perfectē fuerit obducta, ad totius mali translationem subsequētibz compositionibus vtendum est. Deinde sinegmata plura scribit, vnumquodq; iuxta hanc compositionis formam. **¶ Smegma ad Achoras, Furfures, Asperitates & Scabies.** Terræ cimoliæ lib. i, nitri rubri lib. i: expressiōis nucis vnguentariæ sexuncen, alij lib. s. habēt: myrrhæ 3^a octo, piperis albi 3^b octo, nardi celticæ 3 iij, casia 3 iij, costi 3 iij, confusa & cribrata repone, ac vtire in balneo. *Aliud.* Nitri rubri lib. iij, terræ cimoliæ tantundem, expressiōis nucis vnguentariæ lib. ij: cyperi lib. i, alij iij: baccarum lauri lib. i, iridis aridæ lib. i: radicis bryoniæ, alcyonij, amygdalarum repurgatarum, cornu ceruini vsti, singulorum librā vnam: cōponito vt dictū est. *Aliud.* Facis vini vstæ, quā Romani seculam, nos trygam appellamus, lib. xxiiij, aquæ pluuiæ sextarios xlvij, thuris lib. ij, terre samia lib. ij: olei sabini lib. iij, alij sextarios iij: ceræ lib. ij & dimidiam. Fecem & aquam in doliū figulinum non picatum coniecta ad dies vij madescere finito, & ter in die cum ferula agitato. Sequenti deinde die dissolutū & sacco excolatum liquorem in vas æreum splendidum transferto, & igni impositum coquito, luculentiore autem igne vtaris: atq; vbi tertia pars reliqua sit, oleū & ceram iniice, rursus q; ad lentum ignem decoque: postquam verò iniecia fuerint liquefacta, thus & terram samiam trita addito, conquassato, & in vitreum vas robustum transferto, tenuia. n. rumpūtur. Vfus aut tempore affectos locos circūlinens & diligenter confricans, abluere iube. Præstaret quidem in balneo id facere: q; si fieri nequeat, in domo abluatur. Commodum est pharmacum ad omnes sordes, asperitatem q; ac scabiē cutis, item q; ad impetigines. *Aliud.* Fecis vini vstæ lib. i, aquæ pluuiæ sextarios vi, thuris albi lib. ij, mastiches lib. ij, alcyonij lib. i, ammoniaci thymiamatis lib. ij, terræ samia lib. ij, olei rosacei lib. ij, ceræ Tyrrhenicæ albæ lib. ii. Fecē in aqua vt dictū est macerato, ter singulis diebus cum ferula strenuē agitando. Deinde excolatum per saccum liquorem in vas splendidum transferto, positum q; ad ignem ad dimidiam partem coquito: deinde liquefci bilia adiecit, atq; vbi dissoluta fuerint, alcyonium tenuissimē tritum inspergito. Habeas autē ad manum prompta, in facis aqua dissoluta, pbe q; trita, thus, ammoniacum, mastichē, terrā samiam, ea q; strigmētica p̄dicta crassitudine: hæc vbi adieceris, ac diligenter subegeris insperge, & ablatis vtitor. *Aliud Diasmyrnum appellatū.* Fecis vstæ lib. xxiiii, aquæ pluuiæ sextarios xlviii, olei sabini lib. iiii, ceræ lib. iiii, terræ samia lib. ii, thuris lib. ii, mastiches † libram i, 3 ammoniaci Thymiamatis lib. i, alcyonii lib. i, myrrhæ 3 viii. Composito ac vtitor vt dictum est.

A * AP. duas.
† * Additur
i quibusda cod.
iridis 3. viij.
B * AP. duas.
C * AP. vnciam
vnam.

* Aliter q.

† AE lib. ij.

Quæ Cleopatra in libro de Ornatu ad Achoras scripsit.

Porro quæ Cleopatra ad achoras scripserit, ea deinceps referentur illius ipsius verbis: **¶ Fœnogræco** tenui cocto, & in betæ nigræ succo macerato, caput eluatur: aut betæ decocto: aut terra cimolia in his macerata, atq; exoluta, inungat: aut myrto leuigata ex vino & oleo οινέλαιον vocāt, superne q; betæ folia imponentur. *Aliud ad valde vlceros.* Cerussæ frictæ 3 ii, thuris 3 ii, sulfuris 3 i, trita ex oleo illinito. *Aliud, quod & ad Furfures facit.* Nitri, atramenti, sutorij, vtriusq; 3 i: tritis oleū affundito, & illinito. *Aliud ad Achoras.* Myrrham & myrti albæ folia viridia vino trita illinito.

Aut terram cimoliam torrefactam cum vino nigro illinito. Aut cerussæ & plūbaginis æquales partes cum myrteo tritas illinito. Aut sulfuris viui 3 vi, thuris masculi 3 i: aluminis scissi, staphidis syluestris id est pedicularis herbæ, eruce, spumæ nitri, singulorum 3 i: atramenti sutorij 3 i, rutæ ramulos tres. Terito aceto moderatē affuso, item laurino, aut myrteo, aut crocino, aut oleo veteri adstillato, quo pinguis cōpositio fiat, eā q; vbi prius hoc smegma affricaueris illinito. **¶ Smegma.** Hyssopi chœnicem i, lupinorum chœnices ii, ptisanæ chœnicē i, fabæ fresæ chœnicē i, radicis cucumeris syluestris 3 iiii. Hæc trita misceto, & adricada p̄beto. Idem & ad lepram & ad varos facit.

Quæ Pharmaca Soranus ad Achoras scripsit.

D Quando quidem verò & Soranus de achoribus, tū in quarto de medicina, tum in vnico medēdi libro, quem Monobibulum inscriplit, pharmaca quædam tradidit, quæ etiam nobis per experientiam constāt, partim quidem proprio, partim verò præceptorum, aut medicorum amicorum vsu cognita: Quare etiam ea ipsa hic apponemus iuxta ipsius dictionem hoc modo tradita. **¶ Vbi** multus saniei fluor existat, & vexatio doloris vehementer incumbat, lenticulam coctam tritam cū exiguo melle cataplasmatismodo imposito. Aut panem cum coriandro, aut plantagine, aut solano, aut seride, aut polygono, aut perdicio herba. Soranus quidem igitur velut in implicata affectione, eiusmodi remedia adhibet, iuxta propriam sectam ratiocinatus. Apparent autem reuera commoda in principijs & circa generationes, cōmuni repellēdi ratione. Deinceps verò inquit: Vbi autem exacerbationes remiserint, radendi sunt loci, & fœnigræci decocto aut betæ, & limillium, ex aqua, non vrina, confricandi: Quemadmodum etiam nos prius reprehendimus eos, qui per vrinam eiusmodi frictiones faciunt. Postea verò pharmaca scribit, etiam nobis, vt dixi, cognita. **¶ Plumbaginis,** sulfuris viui, æquales partes terito: & affuso rosaceo, aut myrteo, aut lēticino donec strigmentosum reddatur, illinito. *Aliud.* Sulfuris viui, spumæ argenti, cerussæ, omnium æquales partes, croci dimidiam, trita cum passo cretico illinito. *Aliud.* Rutæ læuigatæ 3 iiii,

Quinta Classis.

RRRRR iiii spumæ

DE COMPOS. PHARMAC.

A Al. viij.

B Al. viij.

† Additur in aliquibus ant. olei heminam vnam.

C Al. viij.

D Al. iij.

spumæ argenti 3 viij, aceto & oleo rosaceo admisto illine. *Aliud.* Spumæ argenti 3^axx, calcis vi- E
uæ 3^bxx, aceti heminam vnam, † terito ac velut liparan aliquam seu pinguem compositionē illi-
nito. *Aliud.* Chalcitidis 3^cij, sandaraches 3^diiii, spumæ argenti 3^di, vino austero & myrteo oleo si-
mul trita illinito. Huic verò deinceps, Soranus aliud forte pharmacum scripsit, quod pro suæ se-
ctæ instituto Metasyncriticum, hoc est quod ex alto euocat humores ac transfert, appellauit. Cō-
uenit aut in inueteratis & ægrè cedentibus achoribus, ex eius q̄ vsu quidā medicus nobis amicus
magnū nomen adeptus est. Olei cedrini sextarium i, aceti acris sextarios iij: coquito donec exha-
let acetum: deinde adijce adipis suilli veteris sale seruati lib. ij: eo q̄ liquefacto ollam ab igne au-
ferto, & nitri triti bellem, sulfuris viui sexuncem, sandaraches 3 i, infarcito. Postquā verò illitum
pharmacū exaruerit, in balneo per prædicta smegmata confricari iube, per q̄ vinum & oua ac ni-
trum, & per radicū cucumeris syluestris decoctum: aut facie rhodia & pumice, cū aqua calida.

*Ad Psyracria, & Achoras, Puslulasq; Vlcerosas, helcydria Græcis
appellatas, & Exanthemata in capite.*

C AP. 9.

AD præscriptas affectiones conuenienti victus ratione vti oportet, corporis q̄ ac capitis pur-
gationem adhibere, per pilulas ex aloe, colocynthide, & scammonia, ita vt brassicæ succo co-
actæ ex his pilulæ exhibeantur. Deinde ipsa locali curatione vtendum est, cuius generis est, adian F
tum cum rosaceo illitum. Aut fœnigræci decoctum adfrictum. Aut malua cum farina hordea-
cea pro cataplasmate imposita. Aut melilotum cum farina fœnigræci ex vino impositum, & cice-
rum decocto: ipsum q̄ cicer coctum impositum, nuces amaræ commansæ & illitæ. Discutit autē
maximè & lilij radix affricta, & thus cum vino & aqua, & lupinorum amarorum decoctum affri-
ctum, bulbi cum nitro affricti, thus ex aceto illitum, putamen mali punici cum laurino illitum.
Aut anchusæ radicem vstam & tritam cum oleo donec strigmenticiam crassitudinem accipiat,
cum penna illinito, & ægrum iuuabis.

GALENI DE COMPOSITIONE MEDICAMENTORVM LOCALIVM SIVE SECVNDVM LOCOS LIBER SECVNDVS

ARGVMENTVM LIBRI

Medicamenta exponuntur ad Dolores, Contusiones, Vlceraq; &
Cæteros Capitis affectus.

De omni Capitis Doloze, Dimidiæq; eius partis Affectione, Vniuersalis Doctrina. C AP. 1.



Vicunq; citra distinctionē indiscriminatim q̄ doloris capitis auxilia scripse-
runt, maius detrinētum, q̄ emolumentū, ijs qui eis fidem habuerunt, attule-
runt. Neq; n. oēs ob vnam affectionē caput dolent, sed tum ipsæ affectiones
plures sunt, tū curatio ipsarū singularū propria existit. Vna etenim affectio
est iuxta intemperie simplicē citra humorū cōplexum: Alia iuxta humorū
qualitatem: velut ē Tertia quæpiam alia iuxta multitudinem tm ipsorū hu-
morū contingit. Quibus accedit ea quæ fit, cū humores transitus liquorū
ac vaporū obturarint. Et ad hæc alia est, cū in quibusdam capitis partibus, p- H

pter imbecillitatē flatuosus spūs innascitur. Qñq; ē ob causam aliquā externam, pcatarticē Gre-
ci appellant, velut est ardor externus, frigiditas, ebrietas, plaga, capitis dolor contingit. Vehemē-
tissimi igitur capitis dolores fiunt iuxta caliditatē & frigiditatē, maximè cū inæquales existāt: mo-
derati verò iuxta siccitatē: ad humiditates verò nullus consequitur dolor. Eodem modo cū ob
redundantes humores siue iuxta oēs capitis partes, siue iuxta vnam quācunq; tandem, siue duas,
dolor cōtingit, vehementior quidē ob calidos & frigidos, moderatior autem ob resiccantes citra
caliditatē aut frigiditatē manifestā oboritur. Humectātes verò penitus nullum dolorē inducunt,
quātum ad qualitātē ipsorū attinet: ob multitudinē sanē instrumentaliū partium morbos faciūt,
nō tm similariū partiū vllū aliquē, in quibus solū affectiones iuxta intemperie simplicem fiunt.
At verò affectiones ob humorū multitudinē, citra quidem obturationē, caput grauāt: cum obtu-
ratione verò, si quidē ea moderata fuerit, moderatē dolorosæ, sin fortis, fortiter cōtingunt. Quod
si ē mordacem qualitātē humorū multitudo cōplectatur, etiā iuxta hanc dolorem augebit. Atq;
hæ quidē differētiæ sunt affectionū, quantū ad causas attinet eas pducetes. Aliæ verò sunt iuxta
affectarū partiū naturā. Aliqn enim extra caluariā affectio est, aliqn intra. Et q̄ q̄ quidē omniū
exteriorum aut interiorū est: qñq; nō omnium, sed vnus tm corporū generis arteriarū videlicet,
aut

A. l. 3. f. 1. 2. 1.
c. 1. fo. 189. a

A. ibidem.

pilosa eius pars definit: iuxta vtrumq; verò eius latus, vbi pili ipsi ad aures necluntur: exinde verò E post verticem, non tñ longè inferius. Neq; n. facilè exurit capitis ea pars quæ occiput, & Græcis Inion, appellatur: neq; et citra molestiam, refrigerantia sustinet, propterea q̄ illuc principiū medullæ spinalis existat, ad itipitis modum in multos ramulos diuisa, in sexaginta ferme iuxta numerum nervos. At verò regio capitis iuxta sinciput, ppter laxitatē coarticulationis iuxta coronalem futurā, & ob ossium tenuitatem & raritatem, facilè tum caliditatē tum frigiditatē omnīū quæ adhibentur pharmacorum intrò distribuit. Quare siue refrigerare oporteat ex caliditate ardorem, siue calfacere frigiditatem, aptissimus est capitis iuxta sinciput locus. Optima aut in principio refrigeratio ex rosaceo frigido, æstiuo tempore existente, in quo maximè ardoris affectio oboriri consuevit. Dictum autem est mihi de rosaceo iam sæpe, q̄ optimum est ex oleo crudo, quod Omotribes & Omphacinon bifariam appellant, citra salis admistionem confecto, rosas quàm plurimis ad ipsius irrigationem preparatis. Sit autem rosaceum non vetus, sed eo ipso anno confectum, siue in vere, siue principio æstatis. Proximum à rosaceo chamæmelinum oleum locū habet, in iis corporibus quibus vehementem frigiditatem inducere veremur, qualia sunt fœminarū, & eunuchorū, ac puerorum: & quicunq; molli carne præditi, albumq; habentes colorē. Oli sunt infusi. Mensuram autem tum rosacci tum chamæmeli, quod ad refrigerationē attinet, ex prædictis corporis habitibus, & ex ardoris magnitudine, inuenire oportet, considerata simul ægriatate, & ambiētis nos aeris temperie, non minus autem & domo in qua æger decumbit. Refrigerabis autem quæcunq; adhibere voles, in aqua vehementer frigida collocata: quæ si non adlit, niuem vasculo circumpones. Hoc auxiliū siue humorū siue vaporū multitudo in caput impetum faciat, præclare auxiliat: repellit. n. eos infra q; in corpus detrudit, adeo vt ego in sexcentis hoc medēdi modo vsus, nullo alio habuerim opus. Nam & frigidorum fontium multa Romæ vbertas est, & niuis, quemadmodum apud nos in Pergamo, & in plurimis Asiæ Græciæ q; ciuitatibus. At verò in calidis regionibus, qualis est Aegyptus, in qua & fontium frigidorum & niuis penuria est, necessarium est præfrigerato rosaceo per expositionē sub diuum per integram noctem, & per obuersionem ad auræ alii cuius afflatum, ita demum addere ei semperuiui succū, aut portulacæ, aut lactucæ, aut pŷyllij, aut polygoni: quin & solani aliquā paululū, & pāpinorū vitis, & vuarū immaturarū, tales. n. sunt adhuc tempore æstatis. A papaueris verò & mandragoræ succo abstinentum, non enim citra damnum refrigerat. Vitanda etiam quæ cū refrigeratione manifestè adstringunt: quare si quando necessitas possidet, parum quiddā ex eis ad refrigerantia admiscere oportet. Propterea sanè & solani succum, aut nunq; penitus, aut omnino parce admiscemus, sic et mali punici, & mali, & mespili. Ad hanc tñ rem malorum punicorū acidorum succus præstantior est, magis enim refrigerat. Porro cū aliquā ruri degereim, nihil q; horū ad manum esset, cucurbitæ ramēta exuccata ad vix immaturæ succū admiscui. Poterit aut quispiam in tali loco et seridis succo uti, lactucæ q; tum hortensis, tum sylvestris, quam propriè Thridacinen Græci appellant: hortensem enim Thridaca vocant: Et συκκίνων id est mororum, succus aptus ad refrigerandum: sint autem nō valde matura. Quod si calius sit æger, aut omnino breues habeat pilos, maxima vbertas refrigerantium existit. Quæcunq; enim ad erysipelata auxiliaria scimus ex cataplasmatibus & ceromatis humidis, ea omnia ab ardore exultis conueniunt. Caterum Apollonius Ricini folia tenera tusa in aquam coniungere iubet: & deinde per totam noctem vasculum in quo continentur sub diuum exponere, & postera die uti. Ego quidem igitur non valde expertus sum ricini facultatem: verisimile est autem Apollonium qui longo tempore in Alexandria vixit, per magnam experientiam vim eius cognouisse. Atqui oleum ex ricino factum manifestè cognoui calidius esse facultate oleo quod apud nos est: quare etiam si non præsens sit, veteri utimur. Puto autem & Potamogetonē & Niliacū Stratioten quiddam refrigerantium habere, miror q; eorum Apollonium nullam mentionem fecisse. Quin & Tribulus apud nos, velut et Polygonum, quiddā refrigerans habent, tenera videlicet, & non dum dura ac sicca facta. Conyzam autem non solum refrigerare impossibile est, verū & moderate calfacere potentem noui, & miror sanè cur Apollonius eam inter refrigerantia retulerit. Quod si & ab arboribus & fruticibus auxilia ad caput præter naturam calidius petere oporteat, Vitex conuenientior ad hoc existit, & Vitis, & Lentiscus, & Platanus, si quis eorū teneris germibus acceptis, deinde tritis, ab ipsis succū exprimat. Erasistratus verò magnū quoddam præseruatium in calidioribus habitibus tradit, cū videlicet eos Solem perferre oportet, si spongiā latam & densam ac cauā in aqua madefactā, & probè expressam, capiti imponas. Porro signa dolētū caput ob frigiditatem, contraria sunt eis quæ ex ardore oboriuntur. Nam & incōtracta minimeq; arefacta, & decolor, ipsorum facies existit: & frigidis neq; gaudent, neq; ab eis iuuantur. Quemadmodum autem ardor non ægrè solubilis affectio est, ita neq; frigiditas ex ambiente nos aere contracta difficulter curatur si recens est, sed sufficit oleum Rutaceū calidū sincipiti vt dictum est affusum, perfectè hominem liberare. Si verò vehementiori calfactione opus sit, Euphorbiū ad oleum coniiciatur, & quacunque ex pipere pharmaca constant. Inungenda autem est frons, aurium & narium meatus, hisce vnguentis, maximè quidem Irino & Amaracino, & Nardino. Quin &

† AE Cōmage-
nū vnguentū.

† comptoria vnguenta } ex calfacientium numero existunt, atque adeo ipsa opulentarum fœ-
minarum

Aminarum pretiosa vnguenta, quæ foliata & spicata Romæ appellant. Opobalsamum verò sæpe experti sumus, nullum manifestum commodum ad ullam aliquam affectionem callatione indigentem conferre. Quemadmodum autem Rutaceum oleum conuenire dixi, sic et Sampfuchinū & Laurinum laudo, item quæ Serpyllinum, sæpe & in plerisque ipsis usus. Dandum est vinum tenuiū partium, & motus corporis præcipiendus, lauacraque calida, & quandoque à raphano vomitus.

De Inueteratis Capitis Affectionibus Calidis & Frigidis.

In inueteratis capitis doloribus ac affectionibus necessario pilos radimus, aut valde ad ipsam usque cutem præsecamus: pharmaca quæ tum emplastrorū acceratorū forma, tum et liquida adhibemus: atque ea quidē quæ emplastrorum acceratorū formam habent, ralis penitus adhibemus, liquida verò his qui breuissimè præsecos pilos habent. Est autem & horū materia multiformis, quæ partim quidē magis, partim verò minus, refrigerent quæ & calfaciāt. Ea igitur quæ frigefaciunt, ex iis quæ erysipelata curant, transferenda sunt: calfacientia verò, ex pharmacis calfacitorijs componenda: quorū simplicissimū est ex euphorbio præparatū. Sufficit autem vnciā euphorbij vnā, ad tres ceræ liquefactæ in olei libra vna coniungere. Utendū autem oleo ad omnes affectiones calefactione opus habentes, neque omphacino, neque eo quod vulgò ab oibus Hispanum appellatur, neque oīno eo quod cum olearum germinibus præparatur, sed eo quod ex maturis oliuis conficitur apud plerasque gentes citra germinum iniectionem. Optimum autem ex eis quæ ego noui, est Sabinum, non procul ab vrbe Roma in Sabinorū regione prognatum. Cæterum pharmaca quæ recentiores medici se ipsos Methodicos appellantes, Metasyncritica hoc est ex alto euocantia ac transferentia, appellant, ea omnia ad huiusmodi affectiones commoda existunt: ex quibus optima etiam in septimo libro huiusmodi tractationis, quæ ante hanc à me edita est, relata sunt. Tempus igitur iam est me ad aliam capitis transire affectionem, adscripturū primo quæ ab Apollonio conscripta sunt, quæ iuxta illius dictionem hoc modo habent.

{ Quæ Apollonius ad Capitis Dolorem ex Ebrietate & meri potu scripserit. }

Utendum est oibus descriptis auxiliis ad dolorem capitis ab ardore obortum. Quod si dolores amplius inualecant, rutæ folia cum aceto & rosaceo trita strigmenti crassitudine capiti illinenda.

Aliud. Nuces amaras cum aceto & rosaceo ad strigmentitiam spissitudinem tritas capiti illinito.

Aliud. Iridem siccam ac viticem aridum cum aceto & rosaceo, eodem adhibe modo.

Aliud. Lauri baccam & rutæ folia cum aceto & rosaceo trita adhibeto. Cōuenientia autem somnus, fames, quies, corporis tranquillitas. In potu aqua calida, aqua mulsæ, & euacuatio.

Hæc quidē Apollonius scripsit. Atque huius rei gratia laudare virum decet, quæ cum discrimine de vnoquoque auxilio scripsit, cum neque

C Archigenes id ipsum fecerit, quem cum posterior Apollonio natu sit, apponere quidpiam ad discriminiū certitudinem oportebat: verum quæ ipse in priore de Pharmacis libro conscripsit, paulo post referentur. At verò quæ ego per longā experiētiā de capitis dolore ex vini potu cognoui, iam exponam, utpote qui spem quidē vtilitatis ipso ex affectione inueni, diligētem autem comprobationem per multā experiētiā feci. Capitis itaque dolorem ex vinorū temperatura calidorum productum indicat, quæ ipsum caput omnino vaporibus repletur, quoniam et humoribus calida temperie præditis: nam & citra vini potū eiusmodi ad caput promptè deferunt. Curatione itaque opus est, quæ scopum primum vniuersalem & cōem oibus habeat, nimirum euacuatione indigentem. Cum verò calidi sint qui caput repleuerunt humores, et refrigerante eos medela opus erit. Iubendi igitur sunt, si crudum adhuc in eis vinum permaneat, ut tepida aqua hausta vomat: quæ si et post concoctionem caput doleant, refrigerantibus utendum est ac repellentibus: quale est rosaceū per se et cum aceto, aut hederæ aut brassicæ succo. Quin & ipsa brassicæ folia calida irrigata, capiti quæ circumposita ac obligata, naturaliter ebrietati resistunt. Cæterum somni ac quietis cura in primis habenda est: quod ubi factum fuerit per totum diem, ad vesperam lotum, boni succi cibis non tamen calfacientibus nutrire oportet. Sunt autem tales ptisanæ succus, & sorbitio ex alica, & panis ex aqua, &

Doua forbilia absque garo: admisceatur autem eis ex melle quantum ad condimentum satis fuerit: si verò ad mel accipiendum non fuerint appositi, sales conditorij miscentur. Ex oleribus est lactuca, utpote boni succi & refrigeratoria: & brassica, ut quæ vapores relicet. Sic & ex leguminibus lēs est. Potu verò omnino aqua utendum est. At verò cum stomachus in quibusdam propter aquæ potum subuertatur, malum punicum eis insuper exhibendum est, aut solum per se, aut cum alica hac cida calida, probe cocta. Quin & mala cestiana appellata in vrbe Romana, citra cocturam quidem sunt austera, post cocturam verò stomacho satis commoda fiunt. Coquenda autem sunt ipsa in ollam nouam aqua modica infusa, deinde malo in olla suspenso, igne quæ sub ollam coniecto, quo vapor ex aqua calidus sublatus cocturam ipsi malo præbeat. Vux passæ et pyra, aliqua quidē cruda, aliqua verò ut malum ipsum cocta, stomachum corroborant. Abstinentum verò à glandibus palmarum, proprietatem enim quandam habent capitis dolorem inducendi. Quod si verò post hæc probe dormire non possint, ad balneum postridie quæ celerrimè inducatur, calida quæ aqua eis in balneo sæpe affundatur: deinde ubi dormierint, aut omnino interposito tempore quicuerint, rursum ad balneum ducendi sunt: deinde veluti pridie connutriendi. Si verò moderatè habeant, & aqua bibere non possint, permittendus est eis potus aquosus ex aquosis vinis, quale est in Italia Sabinū, in Asia Titacazēnū, & Arsyenium, & Ariusium. Quin & moderatè habentibus gallorū testiculi,

*Αλ γλωρᾱ i.
viridum.

sticuli & alæ, & ex piscibus petrosi & teneris carnibus præditi, exhibebuntur, & columbarum pul E
 li. Hæc verò omnia citra garum, & vinum, in albis ac simplicibus iusculis coquant, in quibus aqua
 sola cum oleo, & anetho, ac exiguo porro, cocturam perficiat, exiguo adiecto sale, non statim in
 principio cocturæ, sed cum iam aliquo modo flaccida facta fuerint ac victa. Manifestū verò quòd
 tum hos, tum omnes qui caput dolent, augescere adhuc & vigente dolore, quiescere melius est:
 remittenti verò ac decrescere, in locis aptis deambulare. Apti sunt autem ijs qui calferi opus ha-
 bent, loci calidiores: qui frigefieri, frigidiores. Et ante cibum quidem pluribus deambulationibus
 utendum, post acceptum verò cibum breuibus & lentis. Oportet autem neq; multa comedere, neq;
 statim deambulare, sed post duas aut tres aut etiam plures horas. Quòd si quando ex vaporibus
 & humoribus in caput sublati reliquæ quædam relinquantur, tenuibus poris ac meatibus impa-
 ciæ, & ob id etiam capitis dolor perseueret, à rosaceo quidem abstinere expedit. Vtendum est au-
 tem primum quidem Chamæmelino moderatè calido, postea verò Irino: maximopere enim hu-
 iusmodi affectiones iuuant. In balneo verò caput calida perfundatur, non solum ob id vt quippiā
 circa ipsum discutiatur, sed & somni conciliandi gratia. Quapropter etiam secundum, aut tertium
 etiam, ad vesperam balneum apparandum est, acceptis ab eo lactucis ex aceto, exiguo aut omnino
 nullo addito garo, verum aqua affusa multa, vt acetum planè exæquet, nisi omnino aquosum sit F
 acetum, nam et huiusmodi magis q̄ acerrimo opus habent, caliditatem enim in se aliquam tale ace-
 tum complectitur. Post hæc verò postera die, quæ magis caput calfaciant adhibenda: ita vt ad Iri-
 num aliquando Amaracinum vnguentum addamus, aliquando verò Nardinum, quādoq; etiam
 pretiosa, quibus opulentæ fœminæ etiam si nihil habeant mali, vt consueuerunt. Per huiusmodi
 sanè medicationis ductum, capitis dolores ex vini potu obortos in totū persanaui, nullo ab Apol-
 lonio præscripto pharmaco vsus. Cum enim & per ea, quæ iam dixi, scopum cōtingerem, nullum
 ex Apollonij scriptis spem mihi adiecit, vt probè dictum esset, et superuacaneum amplius erat eo-
 rum experimentum facere. Ceterum post prædictas tres affectiones capitis dolorem inducentes,
 Apollonius quartam hanc insuper addidit.

Ad Dolorem Capitis ex Plaga aut Casu, Apollonij.

¶ Rosaceo & aceto tepefactis caput rigato. *Aliud.* Rosæ siccis maxime coctis, aut certe in passo
 maceratis, aut aqua mulla tritis, pro cataplasmate vtitor. *Aliud.* Meliloto similiter apparato vtitor.
Aliud. Myrti albæ folia tenera cum vino & myrrha trita emplastri more imponito. *Aliud.*
 Irino vnguento & aceto illinito. *Aliud.* Ablinthium tritum cum vino & myrrha itidem trita im-
 ponito. *Aliud.* Pulegio trita ex vino similiter vtitor. *Aliud.* Pulegium & myrrham trita simili- G
 ter adhibeto. *Aliud.* Apij comas cum vino coctas ac tritas imponito. *Aliud.* Mala cotonea co-
 cta ex vino imponito. Conuenient & fomenta per spongas aqua calida imbutas, & mollium la-
 narum fasciculi aceto & rosaceo conspersi. Ad hæc & quies, & corporis tranquillitas, subtractio
 cibi, euacuatio, fuga eorum quæ offendere possunt, qualia sunt Sol, balneum, vini potus, clamor,
 contentio: & ex ijs quæ alimenti loco exhibentur, acida & acria ac salsa. Hæc quidem Apollonius
 scripsit de capitis doloribus ex conspicua plaga obortis. Verum operæpretium est nosse nos, eius-
 modi affectionem nullam aliam quàm inflammationem esse, quæ non ex plaga solum aut casu,
 sed citra etiam manifestam causam, iuxta omnes corporis partes, propter humorum influxionem
 fieri consuevit. Si quidem igitur plaga vulneris aut contusionis causa existat, plures scopi erunt
 ad remediorum inuentionem. Vnus quidem in vulnere, ad quod conglutinantibus & inflam-
 mationem arcentibus pharmacis vti oportet, postquam vlcis labia fibulis impositis constrin-
 xerimus. Alter verò in contusione: & Tertius in doloribus, qui quandoque in ipsis solis percus-
 sis partibus fiunt, plerumque verò etiam ad vicinas partes extenduntur. Etenim membrana quæ
 caluariam ambit, & cutis quæ forinsecus circuntenditur, vtrique propriam substantiam conti-
 nuam habet per omne caput extensam: & ob id sanè sepe ipsum vniuersum dolere contingit, præ- H
 fertim si vsque ad membranam os caluæ ambientem plaga penetret, quam diducta membrana cal-
 uariam ambiente, ossæ quæ conscalpto abrafo'ue, carne generanda curare oportet. Quòd si per cō-
 munione membranae caluam ambientis, quam ad duram cerebri membranam circa futuras ha-
 bet, etiam intra caluariam inflammatio ipsa distribuatur, nō absq; periculo eiusmodi capitis dolor
 existit. Contingit autem non parum saepe in casu, præsertim ex sublimi facto, vt quædam circa ce-
 rebrum aut membranas eius, partes abrumpantur: quod vbi contigit, etiam amplius capitis do-
 lor inualefcit, ipsa quæ affectio tota ægrè curabilis redditur, & periculum ingens ac præceps im-
 minet. Optimum itaque fuerit in his, nisi ætas prohibeat, & nisi vitalis facultas debilis appareat,
 à venæ sectione curationis initium facere: & conuenientibus capitis irrigationibus vtī, ex lana
 nimirum oleo dulci imbuta, capite quæ ex ea contexto. Quòd si quippiam horum, siue ætas, si-
 ue virium debilitas, aut etiam ambo simul, sanguinis detractionem fieri præpediant, alium per
 clysterem euacuabimus, tum vt superflua in ipso recrementa extrahamus, tum vt humores qui
 ad affectas partes inde ferri consueuerunt reuellamus: atque inde auxilijs ad inflammationes
 commodis vtetur. Si verò membrana cerebri fuerit vulnerata, egregiè ipsam conglutinat, in-
 quit Archigenes, calaminthæ succus infusus, & farina milii arida inpersa. Deinde butyrum,
 & ro-

A & rosaceum, ac adeps suillus infusus vetus, tepefacta ac mistum infusa. Carterū hoc modo affectos a vino & cibis crassioribus abstinere oportet, maximē si febris sint correpti. Atqui prædictam euacuationem consulit etiam Apollonius, qualem autem fieri oporteat non ostendit. At vero acetum rosaceo admisceri iubet, quemadmodum in phreneticis & lethargicis in principio plurimi medici facere consueverunt, verum non recte mensuram vtriusq; dicere reliquit, Empiricorum simili transi-
tione vsus, nō indicatione Dogmaticorum. Affectio enim ipsa nobis indicat auxilia: Quantita-
tem autem singulorum, & particularem materiarum differentiam, simul tum affecta particula, tum
aëri temperamentum indicat: & ad hæc vitalis facultas: deinde ætas: & ambientis nos aeris tem-
peratura, iuxta regiones, anni que tempora, et prædominantem anni constitutionem, euarians. In
phreneticis quidem igitur, cum omnia quæ extra caluariam, circa q; cutem & pelliculam caluariam
ambientem, ab affectu immunia sint, veteres conuenienter acetum admiscuerunt: ea ratione
persuasi, quam in commentarijs de pharmacorum compositione per longum recensui: quando
videlicet ad affectiones in profundo corporis obortas, pharmaca diuersa ab ijs, quæ ad affectiones
in superficie hæretes destinata sunt, adhiberi oportere dixi. Exoluitur enim omnium ipsorum vis
in transi-
tione per profundum, & ob id ad propria affectioni auxilia aliquando contraria & nocē-
B tis facultatis pharmaca admiscemus. Cum nanq; inflammatio dolorem inducat, maximē contra-
rium est acetum reliquis auxilijs admiscere, vtpote quod neq; mitigandi, neque laxandi, vim ali-
quam in se complectatur. Sed cum per sinciput (neque enim per aliam quampiam capitis partem
transitus patet) pharmaci facultatem intra penetrare velimus, tunc sanè ad admissionem alicuius
eorum que propria natura auxiliantur ac in profundum ducunt, deuenimus, tenuium partiū sub-
stantiam quandam inuenientes, quandoque quidem frigidam, velut acetum: quandoque verò ca-
lidam, velut euphorbium, affectione quæ curationi subiacet considerata ac perspecta, num calfa-
cientibus opus habeat an refrigerantibus. Iuxta hanc igitur ratiocinationem, si quidem crassa ce-
rebri membranæ nudæ rosaceum offeratur, quemadmodum in illis quibus capitis ossiculum ali-
quod excisum est, fieri consuevit, solum ipsum leniter tepefactum adhibemus. Cum verò citra de-
nudationem per capitis iuxta sinciput partem, sana & integra existente caluaria, rosaceum ad cere-
bri membranam perucnire velimus, acetum ei, vt eò perducatur admiscemus: cuiusatem rursus ve-
hemens facultas tum per viarum transi-
tione, tum per rosacei misturam, exoluitur. Quapropter
Apollonius in eo quod acetū rosaceo indefinitè admiscere iussit, peccauit. Cutis enim capitis aut
quæ post eam est membranæ caluariam ambientis inflammationes, citra quidem vehementem do-
C lorem obortæ, per exigui sanè acetū ad rosaceum admissionem iuari possunt: lædentur autem vbi
magnæ fuerint, dolorem que vehementem induxerint. Deliquit amplius Apollonius, quod ne-
que tempus vsus singulorum ab eo descriptorum auxiliorum apposuit. Quædam enim incipien-
tibus & nascentibus adhuc inflammationibus auxiliantur: quædam etiam in vigore consistenti-
bus, aut decreascentibus, aut etiam induratis, opem ferunt. Rosaceum itaque cum aceto incipienti-
bus: in vigore verò consistentibus, rosaceum solum adhibemus: quemadmodum etiam in indu-
ratis absinthium q; ac pulegium ei admiscemus: ac verò quæ citra indurationem decreascent in flā-
mationes, pharmacis laxantibus appellatis solum opus habet. Relata est autem tum materia tum
compositio ipsorum in prioribus huiusmodi tractationis commentarijs, quos addidimus, ante-
quam hoc opus sumus aggressi, in quo affecti loci multam indicationem faciunt simul cum ipsis
affectionibus ad inuentionem remediorū. Cum igitur affectiones ab Apollonio descriptæ qua-
tuor sint, que capitis dolorem faciunt, ob manifestas causas obortæ: deinde verò ex ordine tran-
sit ad eas, quæ ex obscuris causis producuntur: merito sanè quis ipsum reprehenderit, non solum
q; a dogmatica desciuerit doctrina, sed q; neque empirica sit vsus. Distinguunt enim etiam hi affe-
ctiones per symptomatum concursus, syndromas ab ipsis appellatos, qui sanè accidentiū ad mor-
D bos ipsos congregationes sunt, quæ omnibus euidenter apparent: in quibus concurrant etiam
externas causas ipsi comprehendunt, tanquam partes totius concursus existant. Verum nullam
talem congregationem, neque symptomatum siue accidentium, neque signorum, Apollonius
scripsit, quemadmodum discimus vbi & ad sequentem viri doctrinam non minus quam ad prio-
rem animum adhibebimus.

Condependens ex præcedenti Apollonij doctrina, ad Temporum ac totius

Capitis Dolores, intra manifestas causas obortos.

C Vnguento Mendefio caput illine. *Aliud.* Adipem anserinum Mendefio vnguento dilutum
illine. *Aliud.* Myrrham vino quàm optimo tritam, & ad succi ptisanæ crassitudinem redactam,
illine. *Aliud.* Myrrham vnguento pretiosissimo tritam similiter adhibe. In pueris autem sinci-
put dolentibus, myrrha cum oleo trita vti-
tor. *Aliud.* Viticis semen tritum & aqua dilutum im-
ponito, aut linteolo illitum similiter imponito. *Aliud.* Lolii farinam cum adipe anserino contri-
tam pro cataplasmate imponito, adipe prius liquefacto. *Aliud.* Portulacam per se & cum lini se-
mine tritam imponito. *Aliud.* Oleæ folia tenerrima oleo ac vino nigro affuso terito ac imponi-
to. *Aliud.* Cinerem quemcunque habes aceto aut aqua diluito, eo que caput rigato. *Aliud.* So-
lanum & terram figulinam trita ac laeuigata imponito. *Aliud.* Halicacabi fructum cum adipe
anserino,

anserino, aut vnguento balanino tritum adhibeto. *Aliud.* Lentisci folia trita ex aqua imponito. *E*
Aliud. Blitum tritum ac oleo dilutum adhibeto. *Aliud.* Ricini semen aqua tritum imponito.
Aliud. Coriandri semen & anethi trita ac melle mista imponito. *Aliud.* Melanthium tritum ac
oleo dilutum imponito. *Aliud.* Cuminum & adipem anserinum trita imponito. *Aliud.* Succū
papaueris fabæ ægyptiacæ quantitate, & salis partes duas, & pulegij partem vnā, cum aceto &
vnguento optimo trita illinito. Conuenit item cibum subtrahere, & aluum euacuare, caput que
contegere: amplius verò & quietè agere, omnem q̄ motum vitare. Quòd igitur Apollonius,
quemadmodum dixi, indefinitè tradendo hæc remedia ad capitis dolores absq; manifesta causa fa-
ctos dupliciter peccarit, neq; vt dogmaticus vir affectiones explicans, neq; vt empiricus earū con-
cursus, id ipsum ex illius ipsius dictione didicimus. Quòd verò & pharmacorum facultates inter
se non parum differant, ex tota viriū ipsorum perpenſione discere licet. Etenim primum ab eo
descriptum simplicis est potentia laxantis: talis enim est Mendesii vnguenti facultas. Secundum
verò eandem vim intensè possidet, in quo ad Mendesium vnguentum anserinus adeps admisce-
tur. Tertium autem propter myrrham quidem resiccatorium est, vna q̄ calfacit, propter vinum
vero adstringit, vtile iis existens in quibus redundantem humiditatem simul repellere ac discute-
re proposuimus. Scimus porro myrrhæ odorem plurimis etiam sanis dolorem capitis inducere: F
quare sanè eos ipsos, qui iam caput dolent, non parum offendet. Eiusdem autem facultatis est &
quod sequitur quartum. Quintum verò nō propè ad horū vim accedit, vbi sc. cataplasma ex aqua
& viticis semine componit, quod non solum ab vtraq; facultate tum calfaciendi, tum resiccandi,
quibus ea præstant quæ ex myrrha composita sunt, multum deficit, sed & cōtrarium facere potest
in iis qui caput ob frigiditatem dolent. Quod verò deinde sequitur ex lolij farina & anserino adi-
pe compositum, in quibus resiccare intendimus vtile est, neq; in capite solum sed & in alijs parti-
bus rationabiliter adhibetur: id ipsum verò ob anserinum adipem citra molestiam resiccātem cō-
tingit, abundè enim pharmacum hoc & mitigat & sedat dolorem. Verum quòd deinceps sequi-
tur, de quo hæc verba scripsit: Portulacam per se & cum lini semine tritam imponito, refrigerato-
rium est pharmacum, præclare faciens ad affectiones calidas. Quod verò post hoc scriptū est hoc
modo: Oleæ folia tenerrima oleo ac vino nigro affuso terito & imponito, dolorem quidem non
mitigat, verum humiditates succorum euacuat. At verò quod deinceps scriptum est, forti faculta-
te præstat, in quo videlicet iubet cinerem aceto aut aqua dilui, eo q̄ caput rigari. Si quidem enim
ex aceto præparetur, inueteratas affectiones & in scirrhum induratas sanare potest, non tamen do-
loris mitigatiuum existit. Si verò cum aqua cinis diluatur ac percoletur, fortitudine quidem pluri G
mum ab eo deficiet quod ex aceto constat, neq; tñ sic doloris mitigatiuum erit. Quemadmodum
neq; id quod postea descriptum est, ex terra figulina & solano compositum. Superfluam autem
compositionem Apollonius in eo quod ex halicacabi fructu constat, ostentat, vtpote quod neq;
prædictis, neq; postea dicendis, quicq; amplius habeat. Quemadmodum sanè ea quæ deinceps se-
quuntur singula, alia facultate prædita sunt. Non ritè autem fecit hæc omnia indefinitè tradendo.
Quid enim simile habeat cataplasma ex blito cum oleo trito, ad illud quod ex ricini semine, aut co-
riandri, aut cumini, aut melanthij, componitur? Calefaciunt. n. hæc & resiccant, blitum verò debi-
liter humectat & frigefacit. Porro quod in fine sermonis ipsius scriptum est, primum neq; ab vilo
in vsum assumi experiundi gratia cōsuluerim, ne dum sepe. Rarò. n. cogimur pharmacis ex opio
vti, cum videlicet præ doloris vehementia homo de vita periclitatur: quanq; & tunc solidæ partes
ex eius vfu offendantur, adeo vt post hæc correctione opus habeant. Sic & ex opio collyria multis
detrimento fuerunt, adeo vt debilem oculum reddiderint, & visus hebetudinem, amblyopiā Græ-
cis appellatam, induxerint: Velut etiam auditus grauitatem inducunt, quæcunq; ad vehementem
aurium dolorem ex papaueris succo †, composita sunt. At verò ob capitis dolorem vehementem
nemo vnquam animi deliquio comprehensus mortuus est, neq; se ipsum occidit, quemadmodum H
quidam colli dolore vexati fecerunt. Vt cunq; enim doleant, longè minor ipsorum dolor est, quàm
eorum qui colli, aut auris, aut oculi, aut dentis, dolore vexantur. Mitigantur illi ipsi perfusionibus,
& illitionibus, & cataplasmatum impositione.

Quæ Archigenes ad Capitis Dolorem Remedia conscripserit.

Relato igitur iam Apollonio, ad Archigenem transeamus, qui in priore libro de Pharmacis
secundū genus ei inscripto, hoc modo scripsit. *¶ Archigenis ad Capitis Dolores citra febrem abortos.*
Communiter in principio auxiliatur eis aquæ potus, parcitas cibi, solutio alui. Hæc præfatus de-
inceps pharmaca multiformia conscribit. Prestabilius igitur mihi videtur singulatim vnāquamq;
ipsius dictionem in manus sumptam considerare: & primum sanè principium eius collaudare, in
quo manifestè discrimen ab eo quod quis non febricit inducitur, distinxit. Fuit itaq; Archigēnes
non quidem vulgaris medicus, velut & Mantias, & Heraclides empiricus: verum ad diligentiam
quam circa artem fecit, etiam hoc Archigeni accessit, quod posterior natu illis ipsis fuit. Cæterum
maximum hoc cenſeri debet iis, qui artem quancunque tandem rationalem ediscere rite volunt,
cū natura apti ad eam fuerint, ingeniosi q̄, & à pueris in primis disciplinis eruditi. Pleriq; aut ex
iis qui eiusmodi artes tractant, non vt ipsi sapientes in iis euadant, sed vt vulgo tales videantur,
studio

† Additur
πλεϊονος i. co
ριστο, in cod.
antiquis.

aP. Apolloni.

A studio habent. At vero Archigenes, ut si quis alius, quæ ad medicam speculationem attinent, diligenter re vera ediscere studuit, atq; ob id merito scripta q; plurima memorabilia reliquit. Non tñ in omnibus sanè quæ tradidit irreprehensibilis mihi videtur: verum velut ipse pleraq; eorum virorum à quibus adiutus optimus evauit, reprehendit, sic par est ipsum delinquentem a nobis posteris examinari. Difficile enim est, ut, qui homo sit, non in mulis peccet, quædam videlicet penitus ignorando, quædam verò malè iudicando, & quædam tandem negligentius scriptis tradèdo. Quemadmodum sanè & nunc mihi in distinguendo non febrientes a febricitantibus, peccasse videtur, cum non omnes eorum qui non feбриunt distinctiones & discrimina apposuerit.

De his qui ex Stomacho Caput dolent.

Statim igitur primum in his discrimen est doloris capitis ex stomacho produci. Quidam enim etiam si pauxillus quispiam humor acris in ventre, & præsertim circa os eius, congregetur, statim caput dolent: Atq; ob id si diutius famem tolerant, offenduntur, augetur. n. iplis in ediam ferentibus eiusmodi humorum malitia. Eos igitur qui hoc modo affliguntur sanare oportet, ita ut nihil remediorum capiti adhibeamus, quandoquidem neque proprius est hic capiti affectus, sed ab humorum in vêtre malignos vapores excitantium in ipsum adscensu affligitur: Quemadmodum alij in suffusorum symptomata ob huiusmodi humores incidunt. Quæ igitur horum erit cura? ut videlicet affligentes in ventre humores quam celerrimè euacuemus. Euacuantur autem ad vomitum procliuēs, facile ab aque potu: egrè vomentibus verò difficilius, adeo ut etiam digitorum siue pinularum immisione venter ad vomitum irritatus, quibusdam nihil amplius effuderit. His igitur conabimur quam primum cibum boni succi ac stomacho commodum exhibere, si res ita ferat à balneo: si non, ante balneum tantum cibi offeremus, ut ne lædantur inde postea lauantes. † A cœna autem modicum absinthium in potu dabimus: atque ita et postridie faciemus: eo que modo in posterum dietam iplis constituemus, donec valde bene concoquentes ipsos videamus: atque tum sanè panis pauxillum eis præbebitur circa tertiam aut quartam horam, aut paulò prius, vel etiam ferius, ut satis amplum spatium ad consuetam balnei horam intersit. Quicumq; vero panem citra obsonium edere non possunt, ijs oliuas, aut palmulas, aut vuas, aut tale quiddam addemus, per experientiam cognoscendo quid ex eis præstet, cum aliud alio melius sit iuxta naturæ proprietatem.

† Actius habet, A cœna parum bibis, postmodum ne ab his et eadem dieta vitentur.

l. l. f. 4. c. 13.
ol. 77. a

Cæterum ad vitiosorum in ventre humorum redundantiam tum facultatis concoctoriæ debilitas, tum oris vêtre infirmitas, plurimum conferunt. Quemadmodum etiam sensuum molities, & ad hæc caput ad eiusmodi humorum vapores suscipiendos aptum, quemadmodum & in quibusdam oculi. Ego quidem igitur sæpe & in multis expertus sum hæc quam narraui curandi viā, ad capitis ex stomacho dolorem commodam. Archigenes verò cum simpliciter ad omnem capitis dolorem citra febrem, cibi paritatem auxiliarem scribat, palam facit se nihil de eo qui ex bilioso humore oboritur scire. Quod sanè etiam amplius quis crediderit, qui postremam eius dictionē legerit, quæ hoc modo habet. † Archigenes. In his verò qui ex stomacho caput dolent, flatuose q; distenduntur, acetum in quo papaueris capita incocta sint affundito, aut spongas eo imbutas imposito: deinde polentam cum menta & aceto frōti pro cataplasmate imposito. Aut pulegiū cum iisdem. Aut solani succum cum rosaceo illinito. Stomachum equidem os ventris appellat, cum & medici hanc partem ita appellare sint adueri, qui etiam stomachica animi deliquia appellant: et quosdam stomachicos esse dicunt, à quopiam videlicet in eo loco oborto affectu ita appellant, velut etiam hepaticos ab hepate, & colicos à colo, & nephriticos à renibus, & splenicis à splene affectos. Vnam autem ex stomacho affectionem dolorosam scripsit quæ caput occupet, eorum quos ipse flatuosè distentos vocauit, quam ex vini largi potu magis oboriri scio. Qui enim propter humores acres caput dolent, mordacem dolorem, non distendentem, percipiunt. Fames igitur in distensionibus comoda est, at non ijs qui mordaces humores in ore ventris habent.

D Cum itaque hic mordax humor fuerit amarus, pallida & flaua bilis appellatur, quæ ob naturalem leuitatem ad ventris os sursum fertur: Cum vero pituitosus, aut acidus, aut salis fuerit, magis in totius ventris spatio continetur, quam q; in ore iplius firmetur. Optimum autem fuerit (quātum sanè nunc in his dicere licet) in fundo ventris ipsum contineri, facile enim relicto ventre in intestinum delabitur: Pessima autem fit affectio vbi vitiosi humores in ventris tunicas ineluibiler fuerint imbibiti: Quorum optimum remedium est ex aloë pharmacum, quod aliqui pierā hoc est amarum, aliqui hieram id est sacrum, ex aloë appellant: in q; eius compositionem aloës drachmas centum coniungunt, & sex vniuscuiusque reliquorum, quæ etiam sex numero existunt, cinnamomum, spica nardi, xylobalsamum, malliche chia, asarum, crocus. Præstantius autem fit pharmacum vbi minus de aloë additur. Visa nanque mihi est, nimia eius copia centum drachmæ esse, ad proportionem reliquorum quibus hæc adduntur, quapropter etiam per xc drachmas ipsum composui, & per lxxx: Quin et per pauciores aliquando crocum, propterea quod quidam ex eius usu capite lædantur, quod ipsum sæpe ex solo croci odore perpetimur. Quare optimam eius esse compositionem iudicans, quæ ex aloës drachmis xc, & croci drachmis v, constat, hac ego vtor. His verò qui neq; croci odorem citra molestia ferunt, sed statim capite replentur, ex quatuor croci drachmis pharmacum compono. Cogor autem assidue hoc pharmacū preparare, propterea quod non solum

l. 5. fu. t. t. 2.
l. 531. e

solum his de quibus iam dixi, sed & suffusorum specie patientibus, aut etiam alia symptomata ex E stomachi affectione habentibus, id ipsum exhibeam, & praeterea iis qui alio adstricta laborant, & mulieribus quae non probe purgantur. In quibus maiorem efficaciam habet, ubi aloes drachma lxxx, & croci vi, fuerint commixtae. Praestat autem & carpelium pro asaro conijcere, quanquam etiam vtriusque coniectus aliquando composuerim. Datur ad summum ex pharmaco hoc drachma vna, cum aquae calidae cyathis non pluribus quam tribus: minimum vero dimidium eius praeberetur. Datur & intra hos modos, quantitate iuxta aetatem, corporis magnitudinem, consuetudinem quae permutata.

Quae Archigenes consequenter ad Primam dictionem scripsit, In quibus est etiam Galeni censura.

De ijs quidem igitur qui caput ex stomacho dolent haec suffecerint. Transeundum itaque iam ad ea quae Archigenes post primam dictionem deinceps scripsit. Faciam autem iuxta singula ipsorum consimilem expensionem, qualem circa primam feci, conectendo ad ipsa propter rerum consequentiam etiam ultimam ipsius dictionem. Sed nunc a secunda initium faciam. Irrigationes autem, si quidem a frigore aut hyeme patiantur, conveniunt, oleum tepidum, & illitio narium, succus est baccis lauri expressus, aut oleum laurinum, aut unguentum Syriacum, aut cicinum, aut styra cinum, aut gleucinum, aut tale aliquod aliud calfactorium. Ut igitur a postremo exordiar, opinor ipsum relinam, quae sua sponte emanat, dicere, quae plurima in Lacedaemone provenit: & Capne laeon, hoc est oleum fumosum Ciliciae: & Amaricinum ac Styracinum in Cyzico, & quod in Perga apparatus Irinum. His vero unguentis nares oblinere operae pretium ducit, quod per odorem ipsorum caput caleat: quod ipsum inde evenire manifeste apparet adeo, ut & idiotae vulgo his utantur, & maxime eis quae facile parari possunt. Parabilia autem sunt alijs alia, quae videlicet apud singulos redundant. Et apud nos sane in Asia agrestibus & ruri degentibus hominibus cedrino appellato uti mos est: & si quando eius inopia sit, pisselæo, quo nomine id appellant quod ex oleo & liquida pice constat. Admiserunt autem tum huic, tum cedrino, oleum aliqui plus, aliqui minus, in quantum virium ipsorum vehementiam exolvere velint. Utuntur autem omnibus quae dixi & circa caput, & praeterea circa sinciput, veluti dixi. Illinunt & frontem ex eis, & aurium meatus: quidam etiam vestigia pedum, ac sedem. Ceterum cum Archigenes succum est baccis lauri expressum dicit, quod simpliciter laurinum dicitur, ipsum nominare putandum est: velut id quod oleum admixtum habet, laurinum oleum appellatur. Syriacum vero unguentum, eum dicere Comagenum existimo, quando quidem id ipsum nobis ex Syria apportatur. Aetate vero, aut ubi alias aestuose distenduntur, per acetum & oleum, aut aquam & rosaceum. Amplius vero & per polygoni succum, aut portulacae, aut solani, aut aliquo alio ex refrigerantibus irrigato, spongas quae posita imbutas capiti imposito. In hoc sane sermone videbitur forte quibusdam negligentius legentibus, unam simplicem affectionem Archigenes curare: verum non ita habet. Ex eo enim quod aestuose dicit, calidam affectionem indicat: ex eo vero quod addit, distenduntur, affectionem quae hoc modo a flatu ventoso affligitur ostendit: ut non solum secundum intemperiem mutata sit, sed etiam vaporosi flatus redundantia adsit. In principio itaque in eiusmodi vtriusque affectionibus, refrigerantium auxiliorum facultas apta est, quae intemperiem calidam refrigeret, & ventosi flatus allationem repellat & retundat. Atque mea quidem opinione praestiterit diligentior rei inquisitionem facere. Aliquando etenim ex corpore ventosus flatus affertur, quemadmodum in doloribus capitis ex stomacho relatum est: aliquando vero in ipso capite generatur. Venter namque interdum aegre solubili modo inflatur: interdum vero etiam post ipsum sita intestina, quandoque quidem ieiunum, aut tenue intestinum, quandoque etiam colum. Nihil igitur mirum est, neque impossibile, eandem affectionem in quibusdam iuxta caput partibus obortam, ventosum flatum generare: Cuius generationis in locis circa ventrem causam inuenimus, tanti caloris inopiam, ut ex cibis ac potibus vaporosum & ventosum flatum generet: propter infirmitatem vero comprehensivae facultatis, interna ita affectarum partium capacitas inflatur & expleatur, ut propter expletionem quidem distendatur, propter tensionem vero dolore afficiatur. Inuentum equidem & hoc nobis in commentarijs est, in quibus communes & generales dolorum causas considerabamus, quod ob dissolutionem continuitatis similium partium, dolor oboriatur. Dissoluunt autem ipsam erodentia, diffecantia, distendentia, & vehementer calfacientia ac refrigerantia. Quapropter in doloribus circa caput, aegros interrogare consuevi, qualis nam eorum qualitas sit. Quidam enim velut erodantur corpora, doloris sensum perceptant: quidam vero velut distendantur, aut grauentur, aut tundantur, aut solius vehementer inualecentis caliditatis aut frigiditatis. Si quidem enim velut erodantur, aut pungantur, senserint, vel humorum vel eiusmodi flatus a credo causa putanda est: si vero citra morsum distendantur, repletionem distensarum partium, vel per ventosum flatum, vel per multi humoris influxum, causam putabimus: In quo genere & inflammatio & erysipelas existit: inflammatio quidem, ubi inflammata corporis pars multum sanguinem in se continuerit: erysipelas vero, ubi biliosum continuerit humorem: quod si ex vtriusque redundantibus pars aliqua expleatur, aut inflammatio erysipelacea, aut erysipelas inflammatum, oborietur. Et ne existimet quis longum nos sermonem de vna particula iuxta unum symptoma affecta facere: communis enim omnium dolore affectarum ratio est: & si quis diligenter in articulos digesserit, promptior ac expeditior

A expeditior ad auxiliorum inuentionem in omni affectia parte fuerit. Quod enim artis coniecturalis est, id maxime in affectionum cognitione consilium. Quæ ubi inuenta fuerint, curationem non coniecturaliter, sed scientificè indicant, cum hoc quod & cognoscere datur, quam ægre aliqua affectiones medelis cedant: in quibus rationabiliter iuxta indicationem remedijs utimur, etiam si nihil efficere in principio appareant. Atq; hoc est quod in aphorismo dictum est, in quo ait, Oia secundum rationem facienti, si iuxta rationem non succedat, ad alia transcendendum non est, manente eo quod visum est à principio. Aliquando enim adeo vehementer in angustijs meatuum flatus vaporosus infarcitur, atq; eo adhuc magis viscosus aut crassus humor, ut multo tempore opus sit ad curationem. Etenim quæ sic infarta sunt attenuare oportet, meatusque dilatare per quos excernantur, habita simul prouidentia ne quid aliud, puta humor, aut eiusmodi flatus, amplius influat: & ad hæc corroborandum est affectum membrum, ut neq; ipsum ventosum flatum gignat. Qui igitur primi ad eiusmodi affectiones pharmaca composuerunt, merito varia materia opus habuerunt. Siquidem influentem substantiam, siue humor, siue vapor fuerit, repellere necessarium existit: impactam verò concoquere & attenuare, eandemq; ipsam discutere: atque nihilo minus, immo magis, circa affectiam partem firmitatem inducere, ne videlicet quod influit suscipiat, attenua-

2^a Aph. 12 Ex. ord. 10. d

B tum verò excernat, impactumq; concoquat & attenuet. Verum in mistura pharmacorum hac facultate prædicatorum, alius alio feliciore coniectura usus: alius minus, alius magis, commodam fecit compositionem. Quapropter velut nostis (ad vos enim sodales loquar quibus maxime hæc scribuntur) duo omnino vidistis mihi præparata pharmaca eundem effectum promittentia, quandoq; etiam tria & quatuor, & ex horum mistura in ægrè curabilibus affectionibus a me sæpe quod oportuit factum esse. Considero nanque in quo nam eorum copia, simplex pharmacum calfaciens superet, aut frigefaciens, velut etiã reliccans, aut humectans, aut tenuium partium, aut crassarum: Deinde contemplans quid effecerit quod ægro iam fuit admotum, secundum usum aut per aliud quoddam, aut per hoc ipsum facio: sæpe quidem ad aliud quod idem promittit transeo: aliquando verò vtraque committo, ac medium quiddam ex eis conficio. Talia autem omnia abunde a me non vniuersim tantum, sed & particulatim, in medendi methodo relata sunt: nosseque oportet, quod & iam antè dixi, hanc tractationem illam sequi: & cogor tamen etiam nunc rursus meminisse, quò magis ea quæ istuc tradidi assequamini. In prædicta itaque affectione, calore doloroso prædominante vnà cum flatu ventoso, in principio quidem repulsoria curatione utendum est, quæ ex refrigerantium facultate constat: quod ubi moderatè factum est, ex mitigatorijs ac conco-

Ccoctorijs medicamentis quippiam admiscere ad repulsoria oportet. Deinde etiam discussoria addenda, ita ut paulatim repulsoria pharmaca detrahamus, donec ad contrariã misturam perueniat pharmacum ei, quam à principio habuit, hoc est ut plurimum quidem discussorium sit & attenuatorium, minus verò concoctorium et mitigatorium, minimum autem repulsorium. Portulacã quidem igitur refrigerantis & aquosæ substantiæ esse didicistis: minus ea Polygonum: in Solano aut tantum admistum esse crassæ & terree, quantum adstrictionis. Acetum verò repulsoriam simul et attenuatoriam, & discussoriam habet facultatem, tanquam quod temperamento, tenui frigiditate præpolleat, quemadmodum exactè serenus aquilonaris aer. Didicistis etiam Rosacei facultatē, quòd videlicet & repulsorium quiddam habeat: habet autem & concoctorium & mitigatorium, & ad hæc etiam discussorium. Merito igitur Archigenes in prædicta affectione eiusmodi pharmacis utitur, ipsum quidem per se solum acetum neq; alibi exhibens, neq; hic, ob facultatis ipsius vehementiam: admiscet autem ei vel rosaceum vel aquam. † Transeamus autem iam ad sequen-

† in codice æci qui simo præci hæc habent iteriecta, quæ tamen in alijs non inueniuntur. De cephalgia per sympathiam facta. Si vero per sympathiam stomachi fiat, qui mibe cibus circa concolitionem sit, vel materiam isepi aliquam aut bilis aut puris, aut pituitosam contineat, vel non recte concoquat, consideranda rursum, an per calidam intemperiem vel frigidam, siq; per frigidum, necesse est per corroborantia ac calefacientia prouidentiam facere: si vero per calidam, per refrigerantia & contempe-

tem Archigenis dictionem. Si verò augescat affectio, perfectã cibi abstinentia congrua est. Deinde venæ sectio è cubito, & alui euacuatio per validum clysterem. De his auxilijs dictum à me prius est, quando Apollonii dicta considerabam. Vbi sanè in biliosis causis fami renunciaui, ve-

Dlut etiam venæ sectionem in pueris & senibus ac viribus debilitatis fieri prohibui: laudavi autem euacuationem per clysterem, non solum propter euacuationem eorum quæ in intestinis continentur, sed etiam ob reuulsionem eorum quæ ad caput feruntur. Atque ob id probe in his quæ scripsit Archigenes non simpliciter dixit, Euacuatio alui per clysterem, sed addidit validum: multum enim in huiusmodi clysteri situm est, quantum ad reuulsionem attinet, vltra hoc quòd non solum ea quæ circa ventrem & mesaræum sunt euacuat, sed etiam quæ circa hepatis lima-

1.1.5.4.c.17.
177.c

hærent. **C** Archigenis. Irrigationes autem, ruta cum aceto & oleo trita. Memores affectionis ad quam auxilia scribere proposuit, sic iudicamus vnumquodque eorum quæ recensere cœpit.

Affectionem itaque sic scripsit: Æstate verò, aut ubi alias æstuosè distenduntur. Deinceps verò refrigerantis facultatis auxilia subiecit. Et postea inquit: Si verò augescat affectio, perfectã cibi abstinentia, & venæ sectio, & clyster validus adhibeatur. Et post hæc propositam conscripsit dictionem, in qua cum aceto & oleo tritam rutam adhibere iussit, non apponens an viridem an aridam velit: est enim non parua differentia, cum arida multo acrior & calidior, quam viridis existat. Mihi sanè viridem consulere videtur, neque enim acruatim subito ue à refrigerantibus ad contraria transgressus est. Acetum verò ad hoc quòd refrigerat & repellit, discussorium quid habere antea dictum est. Mitigatoria autem & laxatoria facultatis existens oleum

merito

merito ipsis admiscuit. *Alia.* Succus è lauri baccis expressus cum aceto & ruta. Hæc priore longè efficacior existit: ad succum nanq; è lauri baccis expressum fortiter calfacientem, rutā admiscuit cum aceto, relicto oleo. *Alia.* Succus radicū iridis cum aceto. Hoc remedium nihil calfactorium habet, melius itaq; fuerat ipsum primū in trālitu ad præclariora auxilia positum esse. *Alia.* Salicis folia trita cum aqua. Hoc præscripto ex iride imbecillius est, atq; iis quæ oīum primū scripta sunt simile, vt intempestiuè nunc ab eo sit relatum. *Alia.* Serpyllum cum aceto et oleo tritum. De aceto & oleo prius dictum est: adiecit autem nunc eis serpyllum acris qualitatis pharmacum, & ob id etiam calfactoriæ facultatis. Negligenter verò etiam hic reliquit, an viride aut aridum velit: præstiterit autem fortassis viride intelligere. *Alia.* Polygonum cum ruta oleo & aceto dilutū. Polygoni succo primo sermone vt refrigerante vsus est, nam & re uera talis existit. Quare etiam ad inueteratos dolores iuxta primum trālitum rationabiliter quis eo vtetur, ruta admitta. Animaduersione autem dignum est in singulis contrariæ facultatis pharmacorum misturis, vt in principio parum ex præstantiore admisceamus: iuxta secundum verò et tertium vsus, copiā augeamus. *Alia.* Amygdalæ amaræ delibratæ tritæ cum aceto & oleo irrigationis modo adhibitæ, aut cerati crassitudine in linteolo fronti impositæ. Et hoc ad primum trālitum pertinet: didicimus enim discussoriam citra mordacitatem facultatem amygdalas amaras habere. *Alia.* Ruta sylvestris cum oleo F & aceto eodem modo. Inordinate rursus hoc, valde forte pharmacum interposuit, in doloribus multum inueteratis merito adhibendum. *Alia.* Populi albæ fructus cum aceto tritus. Discussoriæ facultatis est albæ populi fructus. In quibusdam aut exemplaribus non cum aceto, sed cum posca, scriptum reperitur. *Alia.* Ocymi semen cum aqua. Ocymi semen calfactoriæ & attenuatoriæ est facultatis, non tñ vehementer: cū aqua aut sola in inueterata affectione minimè rationabiliter quis eo vtatur, melius enim erat oleum & acetum, velut in alijs dixit, etiam huic admiscere. *Alia.* Facit & balsamum, peucedanum, castorium, simul & singulatim vnumquodq; cum oleo & aceto. Hoc pharmacum rursus vehemens est, maxime cū ipsum peucedanum solum adhibeatur citra castorij admistionem. Quid verò balsamum nunc vocet, non habeo dicere: num videlicet plantæ fructum, aut succum quem opobalsamum vocant, aut ramulos ipsius xylobalsamum appellatos. Melius tñ mihi videt opobalsamum accipere, quod tenuium partium & discussoriæ substantiæ existit, non tñ manifestè calētis. *Alia.* Lauri folia, & populi albæ, & viticis, cum oleo & aceto. Et hoc pharmacum ex simplicibus facultatibus differentibus composuit: lauri enim folia calidissima, viticis verò moderatè refrigerantia sunt, in medio virorumq; populi folia existunt. *Alia.* Panacem cum oleo illinito. Nihil hic refrigerantium admistum est: & ob id valde inueteratis affectionibus G & nihil amplius caliditatis habentibus vtile existit. Quapropter merito quis ipsum reprehenderit, citra distinctionem pharmaca auxiliaria conscribentem. Panacem verò negligenter nunc ipsum dicere puto, panacis radicem: neq; n. opopanaca putandum est ab ipso panacem dictum esse: differt aut à radice hic non paruo caliditatis excessu. *Alia.* Viticem aut mentam, amygdalas amaras, iridem, equali mensura cum aceto & rosaceo mista adhibeto. Aliorum vires supra relatæ sunt: mentæ autem nunc primum mentionem fecit, pharmaci calfactoriæ facultatis. *Alia.* Aut mororum succo cum aceto admisto rigato. Hoc pharmacum euidenter apparet refrigerantium medicamentorum generis ab ipso conscriptorum esse, quæ incipiente affectione conueniunt, minime q; rectè nunc ad pharmaca auctis affectionibus commoda admiscuntur. *Alia.* Inueterata autem affectione pilis denudato, illitionibus q; & rigationibus prædictis, crassius tamen apparatus viitor. *Alia.* Resinam cum melle tēporibus & fronti illine. Aut muscerdas cum aceto & rosaceo. Tertium hoc tempus est & opportunitas in capitis remedijs adhibendis. Primum nanq; erat incipiente affectione. Secundum verò, vt ipse scripsit, augefcente. Tertium autem hic, cū aut inueterata, quod ipsum vehemētiore auxilijs opus habet, quorum aliqua non rectè prioribus admiscuit.

De iis, qui ob Biliosum humorem Caput dolent.

Signa in his similia sunt eis quæ ex ardore oboriuntur, accedit his maior morsus, & faciei pallor, & aliquando oris amaritudo. Etati aut vigoris, & temperaturis calidioribus, & vitæ curiosæ, & iis qui flauam bilem congregant, hæc affectio præcipuè contingere solet. Itaq; balnea temperata, & vnctiones, & potus dilutus, eis exhibenda sunt, omnis q; victus ratio liquidior & boni succi constituenda. Euacuandus item biliosus humor per absinthij cremorem, aut per aloen, & per ipsam picram antidotum per se datam aut modica addita scāmonia, vel per catapotia ex aloe confecta. Illinenda frons pastillo croceo, aut Trigono appellato, aut aliquo alio his consimili.

De Doloze Capitis per Consensum.

Si quidē vniuerso corpori caput per consensum coafficitur, illi cū aduersus intemperiem, tū aduersus exuperantem materiam, instandum. Et si quidem humorum multitudo, & maxime circa venas fuerit, venā secabimus. Si verò qualitas magis inualuerit, purgatio pharmaco vtetur.

Si verò vni alicui parti condoleat, velut hepati, aut vētri, aut stomacho, his ipsis auxiliabimur: calida quidē in ipsis subsistēte intemperatura, panē ex vino diluto exhibendo, & sorbitiones ex alica: Et foris irrigationes moderatè refrigerantes, & firmitatem addentes, velut antea dictum est.

Si verò propter viscosos & crassos in stomacho contentos humores caput doleant, etiam hos exturbabimus,

A exturbabimus, acetum mulsum in potu præbendo, oxymeli dicunt, tum simplex, tum Iulianum appellatum. Ex hyssopo et ac origano portionibus, & quæ his adhuc fortiores sunt, magis quæ in dendi vi prædant, utemur, & vomitu à raphanis, irrigationibus quæ ac cataplasmatis calidioribus.

De Capitis in Febris Dolor.

In doloribus capitis qui in principio cum febris irruunt, vena secanda est post primam aut secundam remissionem, nisi quid impediatur, & præsertim in corporibus bonæ habitudinis. & multo sanguine redundantibus. Animaduertendum autem num ob vapores à ventre sublato, aut ob alui suppressionem, capitis dolor contingat. Quod si serius post septimum tandem irruat dies, alio per clysterem qui aliquid operepretii faciat, præeacuata, cucurbitæ ad occiput siue cervicem affigantur, caput quæ irrigationibus ex oleo mitigetur, rosaceo quidem in calidioribus ac hora æstiva, & cum exiguo aceto: chamæmelino verò in frigidioribus habitudinibus ac hyeme, quinta aceti parte adiecta. Illud da frons ex cyphi in frigidioribus, ex crocomagmate in calidioribus. Ceterum ad capitis dolores ob febris magnitudinem obortos, medelæ præscriptæ sunt in febrium tractatu. Porro vitare oportet hæc, non solum in dolore capitis per consensum stomachi oborto, sed omnibus et alijs circa caput obortis affectionibus: sunt autem ea quæ sequuntur: Viticis semen, ablinthij succus, lac in potu, glandes quercinæ in cibo, oliuæ nigre, arbuti fructus memecylon Græcis appellatus, eruum quod ipsum et articulos dissolvit. Amplius autem offendunt myrrha, thus, hederæ cacumina. Mentem et perturbant lentisci fructus, crocus, peucedanum, cyclaminus sicca cum vino potata. Stryax paucus quidem potatus tristitiam vultus discutit, multus verò somnos multum turbulentos inducit.

De Cephalæa Capitis dolore antiquo.

CAP. 2.

Cephalæa inueteratus & ægrè cedens capitis dolor appellatur, qui ex facili occasione, maximas exacerbationes habet, adeo ut neque strepitus, neque vocem vehementiorem, neque lumen splendidum, neque vini potum, neque odora menta caput repleant, tolerare possint, neque item motum, sed in quiete & tenebris ob dolorum magnitudinem decubere velint: tanquam à malleo enim pertundi sibi videntur. Quidam enim velut contundantur, aut distendantur ea quæ circa caput sunt, sentiunt: non paucis verò usque ad oculorum radices dolor progreditur. Habet autem hæc affectio aliquam quidem continuos dolores: aliquam verò exacerbationes, & intervalla siue ordinata, siue inordinata. Inter mittunt enim quævis eiusmodi exacerbationes, velut in comitiali morbo apprehensis, intercedit quævis tempus aliquod quod omnino accusari non potest. Manifestum igitur est hanc affectionem consimilem aptitudinem capitis ut facile lædatur, velut in cephalalgicis id est capitis dolore vexatis, habere: verum ad maiorem debilitatem deveniunt in hac affecta capitis partes. Et quidam ex eis cerebri involucria dolitant, quidam verò membranam tantum calvariæ ambientem. Dolores igitur cum gravitate, humorum multitudinem significant: cum mordacitate verò, aut humorum, aut vaporum acedine: cum pulsu autem, inflammationem: cum tensione verò, si quidem citra gravitatem & pulsum fiat, flatus tenuis & ventosi multitudinem demonstrant: cum pulsu verò, membranosi corporis inflammationem. Si verò cum gravitate distentio fiat, humorum multitudinem intra membranas contentam, & dolores quidem in superficie hærentes, membranae os calvariæ ambientis affectionem significant: qui verò in profundo sunt, cerebri involucrium: quibuscumque enim affectio intra calvariæ est, his usque ad oculorum radices dolores procedunt, propterea quod oculorum tunica ex cerebri involucrio habeat ortum. Si verò humor putrefactus calidior fiat, cum febre caput dolitant. Febricitant autem omnino & qui ex inflammatione dolent. Si quidem igitur humorum aut vaporum multitudinem repereris causam, si quidem propter totius corporis repletionem facta est, uniuerso corpore euacuato capitis dolorem sanabis. Si verò velut debile existens caput ad se sublato humores ac vapores susceperit, materiam reuellere oportet in totum corpus, atque ita particula mederi. Per clysteres itaque reuulsio fit, & ligaturis extremitatum, & pluribus infernarum partium frictionibus: interdum etiam sanguinis ex cubito detractione: quod si amplius sanguis redundare videatur, etiam ex naribus aperta vena, & quantum sufficere videtur sanguine euacuato. Deinde hieram dabimus exacutam. Et postea apophlegmatismis pituitam detrahentibus, & medicamentis quæ naribus induntur utendum est, qualia sunt quæ ex elaterio & cyclamino cum lacte & porro apparantur. Caput autem curabis, quoniam quidem reuulsorij uti oportet, per repulsorias irrigationes. Ceterum post totius corporis euacuationem, iam caput euacuandis uteris, deinde iis quæ firmitatem addere possunt admotis. Repellit igitur oleum omphacinum, & rosaceum, per se & cum aceto, & quod ex papaueris capitibus, & oleæ teneris germinibus, & hederæ cacuminibus, ac menta viridi apparatur. Afferantur autem remedia tepida quidem, ubi frigidior & crudior fuerit humorum multitudo, frigida verò ubi calidior & biliolior extiterit. Discutit autem oleum dulcissimum calidum, & magis inueteratum, item quæ sicyonium. Si verò crassior sit humorum multitudo, spondylium, aut serpillum, aut pulegij comam, aut calaminthen, aut mentam oleo incoquendo, multitudinem euacuabis. Eadem hæc etiam firmitatem parti addunt, quapropter usque ad perfectam curationem eis uti convenit. Omnium porro longe maxime discutit, & perfecte corroborat verbenaca recta maxime viridis: immo & arida cum radicibus, & simul cum serpillio, oleo incocta. Conueniunt etiam ad ea crocodiliadis maximæ iuxta aquas nascentis radix.

Quinta Classis,

SSSSS

Quin

Quin & ipsam per se verbenacā si oleo incoxeris, caput q̄ inde rigaueris, omni capitis dolori anti E quo ex frigiditate, aut ex crassis humoribus, oborto medeberis. Maximē etiam profunt sub aqua-rio vase nascentes aselli, Millepedæ appellati, si oleo incoquantur.

Archigenes de Apophlegmatismis.

¶ Post hæc verò Apophlegmatismi, quibus pituita à capite detrahît, ex sinapi, aut hyssopo cū passio cocto: Aut ex staphide sylvestri i. pedicularia herba cū pipere & melle trita: Aut ex oleo ad misto melle: Aut ex staphide sylvestri per se, vel cum melle trita. Pharmacorum quippe quæ pituitam à capite euacuant, & medicis pro more Apophlegmatismi appellantur, materiam postea referam: Nunc autem tñ ostendere cōmodum fuerit, q̄ hocce auxiliū pituitæ infestantis est medela, quemadmodum sanè & ipsum nomen eius apud Græcos ostendit. Archigenes autem calidā & flatuosam affectionem se curaturum pollicitus est, non frigidam & pituitosam. Iuuantur autem plurimū lauri, aut rutæ, aut panacis, aut papaueris capitum, aut baccarum lauri, decocto perfusi. Fortibus calefacientibus pharmacis, non scio quomodo papaueris capita non instrenuē refrigerantia annumerauerit, cum in sermonis contextu lingulis dictis aliquem per se vti posse ostēderit, & fortasse etiam aliqñ simul mistis: Non tñ manifestum fecerit, num quippiam ex papaueris capitibus iplis adijciendum sit, quò videlicet aliorum pharmacorum vehementia minuatur & mitigetur: an & solis aliqñ vtendum sit, quod sanè incipiente & augescēte affectione tempestiuus fieret: inueterata enim affectione non solum non profunt, sed etiam nocentiora capita papaueris existunt. Commodum est & ex salibus fomentum. Omnem rōnem Archigenes hīc confudit, cum fomenti mentionem faciat per pharmacum resiccans quidē nōn strenuē, verū & calfaciorum quiddam in se habens. Meminisse enim eum oportebat, q̄ cū calidam affectionem curare assumpsisset, aut semper ab illa ipsa indicationem seruaret, aut de transmutatione in diuersam speciem quippiam diceret, iuxta quā temporis progressu calore sedato, obduratio, aut intētio, aut tale quiddam accessisset, quod contraria curatione indigeat, & non ea quæ in principio fuit determinata. Post perfusiones verò aut fomenta iuuantur, si lini semē rosaceo infartum adhibeas, & lanas sordidas ex aceto rosaceo calidas circūponas ac obligeas. Hoc mitigatiuum est auxiliū, cū vehementer infestat dolo, vñā cum hoc q̄ & subiectæ commodet affectioni. Quare vbi ad intensum capitis dolorem remedia scripsit, istic præstiterat ēt de hoc fomento mentionem facere. Verū pro præsentis temporis opportunitate, de qua nunc sermo instat, si quis fomētis aut cataplasmatis vti velit, fomenta ex milio meliora fuerint. Quemadmodum enim ¶ Hippocrates ait, Leue & lene milium existit. Sales verò ob grauitatem molesti sunt, præsertim capiti admoti.

De Cataplasmatis in Capitis dolore, Archigenis.

¶ Cataplasmatis verò vtēre hordeacea cruda farina quæ iridem contusam habeat admistā. Aut rutæ semine eodem modo. Aut fœniculi radice similiter. Aut cruda hordeacea farina cum aceto mulso apparatus. Aut polenta & pulegio mistis. Et hæc cataplasmata ad secundam tēporis opportunitatem pertinent, quā suprā augescēte capitis dolore constituit: nam & hunc mitigant, & affectionem iuuāt. Aut Nilei pharmacum, castorij & iridis decima parte admista, cum aceto & rosaceo imposito. Nilei quidem igitur pharmacum quod ad emplastri formam paratum est, iam olim nobile, & laudatum pharmacum est, & ob id omnibus notum: promittit autem reliquiarū inflammationū in præcordijs inueteratarum curationem: verū eorum quæ ei admiscuntur, castorij videlicet & iridis, Archigenes obscure misionē conscripsit: incertum enim num alterius ipso- rum decimam Niliceæ malagmatis partē esse velit, an vtriusq̄. Verūm mihi præstabilius videtur vtriusq̄ decimam partem admiscere. Oportet aut castorium atq̄ iridem probē trita esse, & Nilei pharmaco diligenter emollito paulatim hæc admisceri, manibus partim rosaceo, partim aceto madefactis. Aut nuces amaras decorticas, & rutam, ac parum ex iride, cum aceto & rosaceo committito, & malagmatis forma imposito. Cū eiusmodi multa pharmaca circa secundum propoli- H tæ affectionis tempus Archigenes conscripserit, facultatis ipso- rum expositionem illis feci. Aut viticis seminis, persææ viridis foliorum, & myrrhæ, æquales partes cum vnguento Ægyptio fronti cataplasmatis modo imposito. In sola Alexādia persææ arborem vidī, & in nulla alia Romanis subdita gente. Quidam Persion ipsam appellant, aiunt q̄ in Persis lethalem eius arboris fructū esse, cū qui in Ægyptiorum regione, innocuus existat. At verò Ægyptium vnguentum, non solū sic, sed & Mendelium nominatur. Quidam ēt Megaleum vocari aiunt, vtroq̄ cognomine à Megalo, qui ipsum cōposuit accepto: & ab illius quidem proprio nomine in denominatiuorum forma Megaleū, à patria verò iplius Mendelium, appellari. Est aut laxatoriū, & sedat dolores. Aut sulfur, castoriū, baccas lauri, æquis portionibus cū cerato rosaceo infarta, tēporibus & fronti imposito. Hoc pharmacum multum calfacit, & frigidās affectiones relaxare potest. Aut castorium & peucedanum pari mensura. Confimilis est & huius pharmaci facultas cum præscripta.

Quod si affectio perseveret, venæ sectione à naso aut frōte, aut cucurbitis ad occiput affixis, vti tor. Sanguinis à locis affectis detractiones in affectionibus inueteratis conuenire oēs ferē medici consentunt. Verū cucurbitæ ad occiput affixæ, ex reuulsorijs auxilijs sunt, cum humores ad oculos, aut ad anteriorem capitis partem ferri consuetos auertere conamur. Aut sternutatorio quopiam

* non particulam, Græci vteret quidā co- dices non habent.

de Rat. vict. cō. 2. t. 6. 7. 117. a

A quopiam concutito, fasciola q̄ collo circūposita spiritum cohibere iubeto. Vilitatem ex hoc auxilio indicauit per verbi concutito adiectionē. Quod vero fasciolam collo circūdare iubet, ad vehementiorem affectionē pertinet. Aut per nares purgato. Hoc praefatus deinceps ea quae per nares purgant recēset, de quibus ego sermonē deinceps faciā, velut ē de Apophlegmatismus, vbi pharmacorū quae capiti adhibent tractationē absoluerō. At vero in vehementer inue eratis sinapi vt moris est, capiti adhibe & perure. In oībus plurimū inueteratis affectionibus, cū nihil profecerint reliqua auxilia, curationē Metasyncriticā à methodicis appellatā oēs ferē adhibere cōsueuerunt, prioribus medicis haud scio qua rōcinatione primum ad eius vsum progressis. Ego verō cū intemperies quāpiam humida & frigida, aut per se ipsam in partibus affectus adeit, aut propter eiusmodi humorum frigiditatē fuerit oborta, ex sinapi & thaplia ac limilibus adhibeo pharmaca: calidis verō & siccis non adhibeo. Ceterū hi qui affectiones cognoscere non possunt, ad eiusmodi pharmaca velut ad sacrā appellatā anchoram confugiunt, & ob id sepe quod conuenit periciunt, quod plerōq; hominū eiusmodi affectiones propter malam & vitiatam diætā insequuntur.

Archigenes, de iis qui ex Ebrietate Caput dolent.

C In ijs qui ebrietate caput dolent, iridē siccā & viticis folia ex aceto & rosaceo adhibe. Aut aprij comas coctas in vino impone. Aut pulegium ex vino eodem modo. Aut Mendelium vnguentum per se, vel cum anserino adipe irrorā. Aut myrrhā cum vino Mendelio impone. Aut rutae folia, baccas lauri, viticem, populi albæ fructum aequali mensura trita, cum aceto & oleo tepesacta irrorā. Ceterum Amethiūta quae ab ebrietate praeseruent, eiusmodi esse poterūt. Ablinthium mane ieiunis bibendum prebe. Aut myrri florem & myrrham ac rutam trita ex aqua. De iis qui ex ebrietate caput dolent satis dictum à me est, cū ea quae Apollonius ad hanc rē tradidit expedierem. At verō post hanc praescriptam Archigenis dictionem alia sequitur de iis, qui caput ex sio macho dolent, de qua iam dictum est.

Eiusdem Archigenis Amuleta quae Capiti coronae modo circumposita

& alligata, Dolorem eius arcunt.

Quandoquidem verō & Amuleta ad dolorem capitis Archigenes scripsit, quae quidem nullā medicam rōnem habent, ea his qui talia per experientiā cognouerūt, & secundū mirabilē quandā contrarietate hominū incognitam efficacia esse dicunt, relinquam: Quae verō ab eo iuxta medicā rōnē tradita sunt, selecta referam tm̄, iuxta illius ipsius dictionem, quēadmodū hactenus de pharmacis facere consueui. **C** Polygoni duos ramulos coronae modo imposito. Quod polygonū calidis & flatuosis capitis doloribus conueniat, ipse prius dixit. Nihil itaq; miri est, in talibus saepe ipsum iuuisse: nam propter ardorem & ebrietatem dolores capitis assidue contingunt. At verō q̄ duos omnino ramulos esse oporteat, ab illis adiectum est qui polygoni vtilitatem ex incognita contrarietate, & nō ex ipsius tēperamēto, procedere volunt. Aut cichorium quod Romani Intubum olus appellāt, aegri capiti imposito, & maxime si ex ardore doleat. Rectissime appositū si ex ardore: Ego verō etiam apponam, si ex ebrietate: sic enim & rosaceae coronae iuuant. Eas igitur volenti iridem licebit adscribere, numerum q̄, quencunq; tandē velit, addere, & ex totidē rolis nexam coronam capiti mederi asseuerare. Deinceps callitricho coronare caput operapretium ducit, quod trichomanes, inquit, quidam appellāt. Ego verō eos qui de herbis scripserunt, adiant magis appellare callitrichum scio q̄ trichomanes. Deinde paulo post philanthropio herba coronari iubet, & palmulā masculā cortice summo. Etpost hac in hac verba scribit: Aut aduersus Solem aegrū expositum, donec dolor quiescat finito. In Amuletorū sermone & hoc ab eo relatū est, quod quidem ex frigiditate dolens caput iuuare potest, si neq; humoribus omnibus aequaliter redundet homo, neq; ex cruditate laboret, aut aliquem vitiatum humorem in vētre, maximē circa cāuitatem eius habeat: verū calidos capitis dolores, ex quorū numero sunt & ex

**Al. s. u. i. os.*

D ardore ac ebrietate oborti, non parum laedet. Cōsimilia his deinceps scribens ad chamamelum peruenit: cuius experientiam habemus quod capitis dolorem iuuat, si quis eo, velut antē dictum, queat vri. Appellat autē Archigenes anthemidem hanc herbam, quemadmodum alii multi: & ait florem quidem ipsius tritū olfactu prodesse, folia verō olfactu summe nocere. Liberat à capitis dolore verbenaca herba, quam aliqui hieram idest sacram vocant, tum coronae modo circumposita, tum illita ex rosaceo & aceto. Hoc auxilium oportebat eum non nunc inter amuleta, sed prius inter medicamenta referre, si quidem re uera ei confidit, per longam experientiam cognito & probato. Aut testudinis palustris, quam quidem amyda hoc est lutariam, vocant, sanguinem lincipiti instilla. Et hoc, si quidem verum est, inter pharmaca, & cum discrimine referri conueniebat. Nisi sane hoc vult q̄ omnem capitis dolorem iuuat, id q̄ omni tēporis occasione. Ita enim & nos contrarietatis testimonium ei praebimus, non efficaciae, quam ex temperamento habet. Absoluto igitur de amuletis sermone, deinceps hac scribit.

Archigenes de Fissuris & Contusionibus in Capite factis.

C De Vulneribus porro in capite factis deinceps dicitur. Parua autē fissura facta, aliqui myrrhā aceto tritam, aut aloen cum linamentis indunt: glutinatur q̄; ita, & absq; inflammatione mirabiliter adseruat. Ceterum in cōtusionibus citra disparationē ac fissurā circa caput factis polēta imposita

Quinta Classis.

SSSSS ij commoda

commoda est. Amplius verò & Oesypum hoc est lanæ sordes, atq; ipsæ adeo lanæ fordibus sudor-
 ris succidæ eodem modo. Magis autē propriè similaginē ex aqua pro cataplasmate impones.
 Aut origanum cum polēta. Hæc vtilia iudicata esse quid attinet referre? verū alterius nego-
 cij atq; operis sunt, q̃ vt ob hmoi causam caput dolentibus apta esse iudicans ea adscripsisse putan-
 dus sit: sed vt quæ obortas inflammationes curare, aut easdem prohibere, possint. Atqui in aliqui-
 bus exēplaribus hæc in totū non habentur, velut in alijs et plura his in huncce modum. In me-
 diocribus capitis vulneribus, aut quæ oīno legitimo medico non habent opus, In quibus quidē
 nuditas per se nō adest, pilos rademus, fibulis q̃z impositis constringemus, ac glutinantibus expe-
 rimento cognitis vtemur. Egregiè glutinat vulneratā cerebri mēbranā, calaminthæ succus infu-
 sus, & farina milij arida inspersa, deinde butyrō, & rosaceo, ac adipe suillo veteri mistis ac repera-
 ctis infusis. In quibus verò os denudatū est, diuisa membrana caluariā ambiente, os ipsum scalpe-
 mus, & per futuræ adductionem, tanquā nō sit denudatum curabimus. Si verò non permaneant
 futuræ, iuxta concarnationē, velut et aliorum vulnerū curam faciemus. Referetur autē hmoi cura-
 tionis ductus in pprio loco. Cæterū in quibus vulneribus aut ppter paruitatem, aut aliās futuris
 vti non licet, linamentum conuulsum cum aceto & oleo imposito, aut cū myrti succo, aut lētiscē,
 aut rubi, aut conyzæ tenuia folia habentis: ad aliquem eorum exiguo admisto melle, ita vt linamē
 F. tum ex his imbutum imponas. Et folijs alicuius ex prædictis pro cataplasmate vti-
 tor. Aut spon-
 giam nouā aceto & oleo imbutam imposito. Aut lanam sordidam eodem modo. At verò ad ip-
 sum vulnus brassicæ folia apponito, aut polētam aceto subactā per se imposito, aut cū brassicæ fo-
 lijs tritis. Hæc quidē Archigenes scripsit ad capitis dolorē, discriminibus simul quibusdam ad-
 ditis, quemadmodum et Apollonius fecit. Asclepiades verò varia quidem pharmaca scripsit, sed
 eorum discrimina iuxta affectiones non ita multū apposuit, sed saltem in incipientibus & inuete-
 ratis: quanq̃ neq; hoc in multis fecerit, sed in primo solum & postremis duobus. Postrema igitur
 credere quis possit inueteratis efficacia esse, vtpote ex fortibus simplicibus pharmacis composita.
 Primū verò ob id fortassis solū quis in vsum talē adsumpserit, q̃ papaueris succū non paucum ad-
 militum habet: huiusmodi autem didicimus, non propterea q̃ affectionibus proliant, sed q̃ sensi-
 lē facultatē stupefaciant, dolores mitigare solere. Quare et ea omnia deinceps à me conscribentur.

Quæ Asclepiades ad Capitis Dolorem in Primo externorum scripsit.

¶ *Ad recentes Capitis Dolores Irrigatio, quæ vsus est Nicomedes.* † Foliorum rutæ drach. ij, mentæ 3 ij,
 peucedani 3 iij, iridis 3 ij, seminis ocymi 3 viij: seminis papaueris nigri 3 iij, alijs 3 viij: poscæ hemi-
 nas ij. Ad dimidium coquito, & expressum succum cum rosaceo conuassato, & caput assidue ex G
 eo irrigato. *Aliud quo vsus est Charicles.* Amygdalarum amararum depuratarum 3 ij, floris viticis
 3 ij, radices peucedani 3 ij, mentæ viridis siue aridæ 3 ij, ramulorum rutæ 3 ij, baccarum lauri depura-
 tarum 3 ij, serpylli 3 ij, spondilij 3 ij, castorii 3 ij, rosarum viridium aut siccarum 3 iiii, aceti heminas
 duas, rosacei quod satis est. Apparato ac vtere vt dictum est.

*Pastillus ad Capitis Dolorem, quo vsus est Antonius herbarius
 qui multa artis experientia clarus fuit.*

¶ *Succi* peucedani 3 vi, succi papaueris 3 iij, ^a† croci 3 iij, myrrhæ 3 iiii, scāmoniæ 3 iiii. Omnia
 trita cum aceto in pastillos redigito, eos q̃z in vmbra resiccato. Vfus autem tempore aceto dilutos
 fronti illinito, à tempore altero initio sumpto & vsq; ad alterum tempus progrediendo: In feбри-
 citantibus ex aqua illinito. ¶ *Quo Alexander vsus est, sic habet.* Peucedani radices aut succi 3^b i, cro-
 ci 3 i, myrrhæ 3 i, opii 3 i. Aceto excipe ac redige in pastillos: Vsu verò exigēte aceto dissolutos lo-
 cis sensum doloris perceptatibus illinito^c †. ¶ *Aliud Antigoni, qui in castris exercitus insignis medicus
 fuit.* Baccarum lauri siccarum purgatarum tritarum 3 iiii, scammoniæ 3 iiii, succi papaueris 3 iiii, se-
 minis apii 3 viii, croci 3 viii, myrrhæ 3 iiii, omphacii 3 iiii, serpylli 3 viii, aceti quod satis est. Præpa-
 ra ac vtere vt dictum est. H

Ad Inueteratum Capitis Dolorem Epithema, quo Charicles vsus est.

¶ *Retrimentorum* quæ ab expresso irino vnguento supersunt, peucedani, castorii, singulorū
 partem vnam, baccarum lauri partes duas, seminis viticis partes duas, rosarum siccarum partes ii,
 ramulorum rutæ partes iiii. Aceto dissoluta cerato ex rosaceo apparato excipito: deinde linteolo
 impacta præralis capillis per omne caput imposito, & fasciola obligato: atq; vsq; in sequentem
 diem obligata custodito, rursus q̃z imposito. *Aliud valde bonum.* Amygdalarum amararum, flo-
 ris viticis, peucedani radices, mentæ viridis, ramulorum rutæ, baccarum lauri, serpylli, sphondilij,
 castorii, singulorum partem vnam: rosarum partes duas. Appara & vtere vt dictum est. Post
 hæc præscripta pharmaca Archigenes & Apollonius, item q̃z Asclepiades, pharmaca conscripse-
 runt, quorum aliqua per os, aliqua per nares caput purgant. Cæterum quæ Archigenes tradidit,
 hæc sunt iuxta illius ipsius dictionem.

Archigenis de Apophlegmatismis, & quæ Naribus infunduntur.

Post hæc verò Apophlegmatismi ex sinapi aut hyssopo cum passo cocto, aut ex staphide syl-
 uestri cum pipere trita, aut ex melle oleo admisto, aut ex staphide syluestri per se & cum melle
 trita. Hæc quidē Archigenes inter remedia doloris capitis scripsit. Apollonius verò de iis
 quæ ad

† Nostra qdē
 snia, huiusce
 medicamenti
 cōpositio hoc
 mō est scriben-
 da, præsertim si
 recētibus capi-
 tis doloribus
 sit cōductura.
 Nobis auctori-
 tas cuiusdā an-
 tiqui cod. ali-
 qua in pre sub
 scribit. Boni
 medici cōside-
 rēt ac indicēt.
 Rutæ foliorū
 3 ii, mētæ 3 ii,
 peucedani 3 ii,
 iridis 3 ii, semi-
 nis ocymi 3 ii:
 seminis papa-
 ueris nigri 3 i:
 aliqui autē ii.
 poscæ hemi-
 nas duas & c.

A† Ex duo-
 bus antiquissi-
 mis cod. græ-
 cis hæc addu-
 tur, anisi dra-
 uy, semi. hyo-
 scyami 3 iij.
 B Aliter ij.
 C Additur ex
 antiquis cod.
 statim dolores
 soluit.

A quæ ad dentium dolores, in primo parabilium tradidit, hæc verba scripsit. *¶ Quæ Naribus infundantur in Dentium dolore.* Radicis betæ succum per se in nasum infundito, & dolores dentium soluet. *Aliud.* Cumini quantum tribus digitis apprehendi potest, & myrrhæ ad magnitudinem fabæ, medullæ cucumeris sylvestris duplū, trita & lacte muliebri subacta in collyria redigito: ea q̄ in vtranq; narem indito: deinde quandiu quis quinq; stadia percurrere possit, attrahere, & postea emungere iubeto. Hoc pharmacum & ad aurium dolores facit. Asclepiades aut in primo exteriorum ita scripsit. *¶ Asclepiades de ijs quæ Naribus induntur, et de Sternutatorijs, & Apophlegmatismis pituitam è capite detrahentibus.* Errhina^u quæ Naribus indita Caput purgant. Commodant etiam Veteri Lippitudine oculorum infestatis. Faciunt & ad Comitiali morbo apprehensos, ducunt q̄ multam humiditatem. Melanthij 3 viij, salis ammoniaci 3 i, elaterij 3 i, trita & quam tenuissimè læuigata sicyonio oleo, aut irino vnguento, aut cyprino excipe, quo ad ceratiliquidi crassitudinem perducantur: & reconditis in cornea pyxide vtitor, subtilis inde naribus, atque ægris attrahere iussis. *Aliud cura molestiam purgans, Dolorem q̄ euestigio sedans.* Cyclamini sicca 3 viij, iridis sicca 3 ij, nitri rubri 3 i. Ego elaterio vsus sum diligenter trito, & per arundinem insufflato, ægro ipsum attrahere iussio, atque deinde deorsum pronuere, quò videlicet coactus liquor destillet. Post hæc verò Asclepiades in hæc

B verba scripsit. *¶ De Sternutatorijs.* Sternutatoria Caput purgantia Heraclide Tarēti. Cumini æthiopici, piperis albi, struthij, castorij, singulorum æquales partes contusas & cribratas in ærea pyxide reponito. Vsu verò exigente, pyxidem concurtito, & apertam naribus admoueto, aut cum digito adhibeto, aut etiam per arundinem insufflato. *Aliud.* Zingiberis 3 ij, struthij 3 ij, piperis albi 3 i, calicæ 3 i: vt utrumq; dictum est. *¶ Ad Veterem Capitis dolorem Sternutatoria Ptolemæi.* Facit ad Vertiginem & Comitiali affectos. Veratri albi 3 iij, alij vnam habent: radicis cucumeris sylvestris 3 i, struthij 3 i, nitri rubri 3 i, castorij 3 i, piperis albi 3 i. Vtere vt dictum est. *Aliud.* Veratri albi, radicis cucumeris sylvestris, struthij, singulorum partes duas: castorij, acori, nitri rubri, cumini æthiopici, singulorum partem vnam: euphorbij partem vnam. Tritis vt dictum est vt utrumq; dictum est. At verò post dictorum sternutatoriorum descriptionem Asclepiades in hunc modum scripsit. *¶ Quæ mansa Caput purgant, & multam humiditatem ducant.* Piperis albi 3 ij, staphidis sylvestris 3 ij, origani 3 ij, calicæ 3 ij. Excipe vuarum passerarum exacinarum, aut ficuum pinguium carne, & mandenda præbe. Mandentes verò deorsum pronuere oportet, & per intervalla hiare, quò collectus humor destillet. Post verò etiam aqua calida in ore continenda: quæ etiam vbi multam perceperint mordacitatem eis etiam frigida exhibenda est. *Aliud.* Staphidis sylvestris, pyrethri, piperis albi, hyssopi, cardamomi, singulorum æquales partes, polentæ duplum. Aqua subigito ac vtitor vt dictum est.

Porro ex subscriptis pharmacis quibusdam præceptores meos vsos scio, quibusdam amicos, alii quæ etiam ipse in vsu adsumpsi, vt ex multo vsu fidem suam mihi probauerint. Sunt autem hæc:

¶ Foliorum cucumeris sylvestris succus naribus infunditur tum per se solus, tum betæ addito decocto aut succo. *Aliud.* Myrrham melle coctam naribus infundito. *Aliud.* Aloes, nitri, melanthij id est nigellæ, parem mensuram, cum oleo veteri ad strigmentorum crassitudinem redacta.

Aliud quod Manditur. Nitri sexuncem, anisi trientem, staphidis sylvestris quadrantem: foliorum lauri viridium, & vuarum passæ exacinarum, parem mensuram: excipe, & ex hac mistura pastillos trium drachmarum coge, & singulos vsu expetente mandendos præbe. *Aliud quod Naribus inditur.* Euphorbij drach. dimidiam, thapsiæ 3 i, iridis 3 i, mellis cocti sesquidrachmam, succi radicis betæ quantum sufficit. Ex hoc ad milij magnitudinem accipe, & aqua dilutū specillo q̄ exceptum naribus infunde. *Aliud quod Naribus infunditur.* Succus cyclamini cyathos ij, succi foliorum hederæ cyathum vnum, peucedani obolum vnum, elaterij obolum vnum. In vitreo vase recondito, vsu verò expostulante lacte muliebri dissoluta naribus infundito. *Aliud.* Myrrhæ trientem: euphorbij trientem, piperis albi grana *xxv. Myrrham aqua prius dissoluito, vna q̄ ipsum euphorbium: de-

D inde piper tritum addito, & adiecto olei gleucini sexunce vtitor. *Aliud, quod Naribus infusum multam pituitam per os detrahunt.* Olei communis † sextarios duos, saponis libram vnam, resinæ frictæ sesquilibram, opopanacis vnc. i. Per anchusam colorato ac vtitor, ore prius aqua expleto. *Aliud quod in Os illinitur.* Saponem betæ succo dilutum iuxta palatum illinito, atq; itidem iuxta oris colum mellam. Idem etiam naribus infundi potest.

Quæ Crito in Primo de Pharmacis scripsit his verbis.

¶ Apophlegmatismi. Staphidis sylvestris per se & cum pulegio mansa. *Aliud.* Staphidis sylvestris & origani, vtriusq; acetabulum, nitri 3 ij, trita cochlearij mensura manducanda præbeto, donec os pituita repleatur: deinde aperto ore effluere sinito. *Aliud.* Origani 3 iij, hyssopi drach. iij, staphidis sylvestris 3 iij, spumæ nitri 3 ij, sinapis 3 ij, pyrethri 3 ij. Tritis vt utrumq; dictum est. *Aliud.* Sinapis partem vnam: staphidis sylvestris partem vnam: contulis vt utrumq; dictum est. Hoc pharmacopolæ vtitur. *Aliud.* Hyssopo, thymo, origano, tum per se, tum simul mistis, vt utrumq; dictum est. *Aliud.* Medullæ colocynthidis in aceto ad multum tempus coctæ, aut etiam per longum tempus in vino maceratæ, liquorem in ore contineto. *Aliud.* Allia cum erucæ semine & nitro. *Aliud.* Staphidis sylvestris drach. viij, pyrethri drach. iij, hyssopi drac. i. Contusa in orbiculares pastillos cogito, eos q̄ drachmæ pondere formatos, manducandos exhibeto.

Quinta Classis.

SSSSS iij Quæ

DE COMPOS. PHARMAC.

Quæ Pharmaca Naribus indenda Crito Ictericis seu arquato infestatis conscripsit.

E

¶ *Pharmacum quod Naribus infunditur, & tum per nares tum per os excernit. Ob id ipsum verò ne consterneris, si palatum calefaciat aut exasperet: ex alto enim auocat ac transfert humores. Staphidis syluestris drachmam vnam, melanthij drach. iij. Cum aceto trita ad formam strigmento liquidiorē redigito, & per dies quinque in nares infundito donec expurgetur æger: id autem alternis diebus facito. Aliud. Hedera folia decem, lauri folia decem, cum oleo terendo ad strigmenti crassitudinē redigito, & naribus similiter instillato. Aliud. Egregiè facit & elaterium insufflatum in ipso nares. Cæterum si quis hoc citra detrimentum facere velit, in calidæ solium ægrū immittet, atque ita toto corpore præter faciem in eo immerso elaterium insufflabit: largè enim bilē per nares educit. Aliud. Elaterium ad magnitudinem erui in lacte muliebri dilutum naribus infundito: atque ubi purgatio prodierit, in calidè labrum demittito a lauato, & per diætā reficito.*

Quæ Aeneas per experientiam Pituitam detrahentia tradidit.

• A℞ semis.
• A℞ drac. iij.
Al. xij.

Quorum experientiam per Aeneas vsum habeo, à quo etiam descriptiones accepi. ¶ *Pharmacum quod Naribus inditur, atq; pituitam detrahit. Saponis lib. sēx, adipis caprini lib. j, cera lib. iij: picis aridæ trientem, quidam verò quadrātem habent: nitri tantundem, lixiuij acris cyathos * iij. Vsus tempore aqua diluïto, & dum vteris per specillum infundito, attrahere q̃s iubeto. Caput verò irino prærigato, & post vsum aquam mulsam sepe gargarissandā præbeto. Aliud. Euphorbij 3 vj, lycij indici drach. iij, succo betæ excipe, ac melle addito coge. Vsus tempore aqua aut lacte dilue. Aliud. Succu cyclamini cyath. ij, succu cacuminum hedere cyath. j, succu peucedani obolum vnū, elaterij obolum vnum. Vtere in balneo cum lacte muliebri. Aliud. Pyrethri, piperis, hyssopi, staphidis syluestris, parem mensuram in pastillos drachmæ pondere cogito: quorum vnum manducandum præbeto, & post factam, ab ipso purgationem, sale & melle curato. Sternutatorium. Piperis albi, veratri albi, castorij, euphorbij, struthij, succu cyclamini aridi, æquali mensura, penna præirritatis insufflato.*

De Vsu omnium Fortium Pharmacorum.

Quam vtendi rationem de prædictis pharmacis dixero, eam ad omnia alia quæcunque fortem vim habent transferre oportet. Non enim statim à principio efficacissima adhibere conuenit, sed à debilioribus auspicari. Quin & ipsa fortia pharmaca mitigatiorum admistione lenita, moderata fiunt. Et ob id ego quædam ex eis muliebri lacte recenti & aqua diluo, & post hoc oleo dulci, deinde betæ succo, & anagallidis quæ cœruleum florem habet itidem succo: atq; ita sensim in vsum eorum progredior, donec postremum etiam per opobalsamum talia dissoluo. Ac primum quidē lacte admisto adhibeo: quod ubi leuiter ferunt egri, etiam citra lactis adiectionem admoveo. Porro parabili sæpe pharmaco vsus sum, quod naribus infunditur, Melanthio aliquando quidē aceto acri rigato ac pridie macerato, deinde sequenti rursus cum aceto trito, & naribus infuso, aut ægro ipsum absorbere in nares iussu. Aliquando verò oleo veteri idem melanthium contriui, atque ita intro instillans vsus sum, quo modo etiam Archigenes eo vtitur in narium obturatione. Priore verò quod cum aceto infunditur, Crito vtitur ad arquati morbum.

De Hemicrania, hoc est dimidiæ partis capitis affectione.

CAP. 3.

Hemicrania affectio dolorosa circa dimidiam capitis partem aliquando dexteram, aliquando alteram, contingit, quæ iuxta futuram secundum longitudinem eius extensam terminatur: & vt plurimum per circuitum exacerbatur, influxu vaporum aut humorum siue multorum, siue calidorum, siue frigidorum, causam dolori suggerente. Quidam igitur ipsorum circa tēporum musculos vehementer dolitant, & pleraq; sanè ipsorum pars hoc modo affligitur. Quidam verò dolorem ad sublimiora ascendentem habent. Et quidam adeo vehementer dolent, vt neque manuum contactum facile ferant: in quibus palam est pelliculam caluam ambientem esse affectam, & neq; cutem ipsam omnino ab affectione immunē existere. Rationabile igitur est vaporum, aut humorum, aut vtrorunque influxum, siue per venas, siue per arterias, siue per vtrasque contingere: cum interdum ea sola quæ intra caluam continentur, hoc est cerebrum eius q̃s membrana, quod in ipsis redundat foras protrudant: interdum verò corpus infra caput positum vitiatos vapores aut humores sursum mittat. Quapropter ubi quis hemicraniam curare aggreditur, prius quali purgatione aut venæ sectione eger opus habeat, consideret: Atque ita deinde ad capitis auxilia progrediendo, tum per digitos suæ manus, tum per linteam, dimidiam frontis partem, & eam maximè quæ circa temporum musculum est, confricando exalfaciat, atque id ante iritationis tempus faciendum est. Post exacerbationem verò pharmacis hemicranicis à medicis appellatis vtendum, si quidem multa caliditas in doloribus percipiatur, ijs quæ refrigerans quippiam habent: citra verò hanc, ijs quæ multum exalfaciant. Vtriusq; verò aliquid ex ijs quæ firmitatem ac robur addunt misceatur, quod adstringentem videlicet habeat facultatem. Demiror autem quod neq; Apollonius, neq; Archigenes, neq; Asclepiades quicquam de hemicranicis pharmacis, quæ merito post doloris capitis totius pharmaca subiicienda erant, conscripserunt. Iacebat enim ipsos, tametsi nihil priuatim in se habeant, propterea q̃ inter ea quæ totius capitis dolori destinata sunt, contineantur, id ipsum saltem annotare. Similiter autē & ab Hera & à Critone, vberior

A vberior de hac affectione tractatio neglecta est. Caterum per quæ pharmaca inueterato capitis dolori medentur, per eadem constat eos etiam hemicranicis affectionibus auxiliari. Heras itaq; in medicamentario libro statim à principio in hac verba ad capitis dolorem pharmaca conscripsit.

Pharmaca ex libris Heræ ad Capitis dolorem.

A. l. 5. f. 2. r. 1.
fol. 55 a. b

¶ Crocomagmatis partem i, galleg partem i: trita ex vino fronti ac temporibus illinito. ¶ *Pa-*
stillus ad Capitis Dolorem egregie faciens, a tempore ad tempus bis aut ter illitus. Croci 3 xv, atramenti sutorij
3 x, aluminis scissi 3 xij, myrrhæ 3 iij, opij 3 iij, omphacij 3 iij, chalcitidis 3 iij, gūmi 3 xv. Tritis omni
bus vini falerni austeri quod satis est allunde, & ut collyrium tere, inde q; in pastillos omnia redi-
ge. Vsu verò expetente posca aut aceto dilutis vtere. ¶ *Malagma ad Capitis Dolorem.* Aeruginis ra-
tilis 3 iij, aris vsti 3 iij, squamæ stomomatis ferri 3 iij, cimolæ 3 iij, calcitidis 3 iij, pumicis crudi 3 iij:
terebinthinæ 3 j, ceræ 3 xxxvj & dimidiā, olei veteris cyathos ij. Aridis tenuissimè tritis liquefibi-
lia liquefacta allunde, emolli, ac vtere. Quod si durius videatur pharmacū oleo amygdalino emol-
lito. Hæc quidem pharmaca Heras ad capitis dolorem scripsit. Viuntur autem eis quidam etiā
ad hemicranicos dolores, quemadmodum etiam alijs medicamentis quæ prædicti viri ad inuete-
ratos capitis dolores destinauerunt. Non tamen per omnem frontem pharmacum extendunt, sed

A. l. 3. f. 1. r. 2. c.
3. fol. 192. f

B per affectam solū partem. Caterum ex præceptoribus nostris quispiam hoc pharmacum ad
inueteratas hemicranias in usu habebat. ¶ Piperis albi drac. ij, crocomagmatis 3 j, euphorbij
drach. dimidiā: vtere. Porro de euphorbij facultate iam mihi relatum est, quod citò exoluatur:
quare in eiusmodi pharmaca nō verus conijcere oportet. Dictum etiam recēs albidius esse, quod
verò inueteratum est, flauioris aut pallidioris coloris reddi. Verū si non valde vetus sit euphor-
bium, sed duorum aut trium annorum, duplum eius adijcies, hoc est drac. j. Quemadmodum au-
tem euphorbium recens conijciendum est, sic itidem stercoris columbini drachmæ dimidium ex
columbis montanis, quas in turribus nutriunt sibi ipsis victum quærentes, non velut quæ in vrbi-
bus intra domos nutriuntur. At verò & atramenti scriptorij æqua portio, hoc est, drachmæ dimi-
dium ad columbinum stercus inijcitur: atque ad hanc rem nostrum Pergamenum præstat, eo. n.
semper præceptor noster utebatur. Aut igitur illud ipsum ex Pergamo atramentū inijcere oport-
et, aut aliquod aliud optimè præparatum. Atq; ita omnibus his mistis & probè subactis aceto q;
acerrimo imbutis ac dilutis temporis musculus, & dimidium frontis, & affecta capitis pars illinen-
da est. *Aliud Pharmacum, quod non solum in Hemicrania, sed & in omni Inueterata Capitis affectione illi-*
tur: In Capitis quidem dolore, per omnem frontem: In Hemicrania verò per mediam capitis partem affectam.

C Croci drachmas xv, atramenti sutorij drachmas decem, aluminis scissi drac. xij, myrrhæ drac.
ij, opij 3 iij, chalciteos 3 iij, omphacij 3 iij, gummi 3 xv. Omnibus tritis vinum falernum adijce, &
rursus ut collyrium teræ, deinde que in pastillos redige. Vsu verò tempore posca dilutos aut ace-
to illine. *Aliud ad Easdem Affectiones.* Scammonia drac. vj, croci 3 j, comæ hederæ 3 vj, sulfuris vi-
ui drachmas quatuor, seminis anisi drac. viij, seminis apij 3 viij, diligēter trita cum ocymi succo in
pastillos cogito. Hoc pharmacum multo rosaceo dissolutum capitibus lethargicorum rigādis sit
commodum. *Aliud Pharmacum non isdem solum conueniens, sed & Veriginosis auxiliare.* Radicis peu-
cedani drachmas quatuor, iridis illyricæ 3 j, aeruginis drachmam vnam, acori 3 j, sphondilij 3 iij,
piperis nigri 3 j & dimidiā, castorij 3 j & dimidiā, serpilli 3 iij & dimidiā, myrrhæ 3 j, bac-
carum lauri numero xxxv, rutæ viridis 3 viij, mentæ viridis drac. quatuor, opij drachmam vnam.
Aceto excipe, & in pastillos redige. Vsu exigente aceto & rosaceo dilutos illine. Verū cerato
rosaceo exceptum hoc pharmacum ut malagma imponitur. ¶ *Pastillus non solum Hemicrania labo-*
rantibus commodus, sed & Coxendicum morbo affectis auxiliarius. Thapliæ 3 iij, euphorbij drac. quatuor,
laseris siue succi medici drach. iij, myrrhæ drac. j, opopanacis drach. j. Simul contusa in pastillos co-
gito, quos deinde vsus tempore aceto tritos illinito. Hæc quidem composita sunt pharmaca.

D Sæpe vero & ex tēpore ac improviso pharmaca præparare coactus, simpliciter euphorbij illitione
usus sum, exigua cera compagis acquirendæ gratia adiecta. Sufficit autem in libram olei siue sa-
bini, siue alterius ei propinqui, ceræ quadrantem inijcere, & euphorbij vnc. j: atque ex hoc dimi-
diam frontis partem illinere, vnā cum temporis videlicet musculo. Caterum in quibus suspicio
nem habueris à calidis vaporibus aut humoribus, dimidiā capitis partis fieri dolorem, in his ne ad-
moueris hoc pharmacum: his verò qui ob frigidas causas infestantur, commodissimum adeo est,
ut sæpe semel ante balneum illitum, quā citissimè affectionem persanet, ut à balneo omnino sa-
ni egri euadant. Iuuat etiam hos si oleum tepidum in aurem instilletur, modico euphorbio
ad oleum iniecto: Nimirum ad libram olei vnam, euphorbij vncia dimidia, si va-
lidum euphorbium existat: si verò non, etiam amplius inijcere con-
uenit. Verū in corporibus molli ac tenero sensu præ-
ditis, etiam si minus q; dimidiā vnciam
inieceris, melius res procedet.

GALENI DE COMPOSITIONE MEDICAMENTORVM LOCALIVM SIVE SECVNDVM LOCOS LIBER TERTIVS

ARGVMENTVM LIBRI

Docet Medicamenta ad Aurium & Narium Affectiones.

De Aurium Affectionibus, & ob Quot causas Aures dolore affligantur.

CAP. 1.



Aurium dolores aliqui ex frigiditate fiunt, quos sanè in peregrinationibus à frigidis ventis perflati patiuntur. Aliqui verò ex balneis frigidis, & quibusdam medicatis aquis, oboriuntur, in quibus quidam ob delicias lauant: quāquam sint qui & ob corporis cōmoditatem id faciant. Fiunt & auris dolores ex inflammatione, interdum quidē solius circa meatū cutis, interdum verò in profundū progressa, qñ videlicet nervus auditorius, ad inflāmatam affe- F
ctionē peruēnit. Qua verò rōne inflammatio partes inflammatas distendēs dolorem producit, iuxta eundem modū ē flatus ventosus transitum non habēs dolorem excitat. At verò consimilis dolor est ex serosis & saniolis humoribus in corpore aurium generatis ei, qui ex mordacium humorum illapsu forinsecus factio contingit.

De Dolore Auris ex Frigiditate.

Dolores quidem igitur à sola frigiditate obortos calfacientia quā celerrimè curāt. Atq; in hūc vsum quosdam rurales homines magnas cepas exculpere vidi: deinde oleo eas explere, & in feruente cinere moderatè calefacere, atq; ita auribus infundere. Quosdam verò non cepas tantū sed & alliū in oleo cōtūdere, vel feruefacere, atq; ita infundere vidi. Ego verò euphorbio oīno exiguo ad multum vetus oleum admisto vtor, velut ēt pipere exquisitissimè trito: aurium. n. dolores à frigiditate inductos eiusmodi calfacientia magnopere iuuant. Prodest ēt Amaracinū oleum eis infundi, & optimum nardum, & quod apud Romanos Foliatū, item q; quod Spicatū appellat: prodest eis & Cōmagenum. Atq; si rutam quoq; oleo non adstringenti amplius q; tenuium partiū incoxeris, velut est Sabīnum, magnopere iuueris. ¶ *De Dolore Auris ex aqua medicata.* Cū verò ex aqua medicata quippiā circa auditorium meatū cōtineat, oleū assidue infundere cōuenit, quo G
ipsum eluamus: deinde lana molli extergere, rursus q; infundere. Magnificè autē eos mitigat oui cādidū quo ēt ad lippitudines vtimur, item q; lac muliebre. Manifestū verò est, quicquid adhibetur, mediocriter calidū eē oportere. Plurimū iuuant quoq; ex adipe anserino, atq; item vulpino.

A. 1. 3. f. 4. c. 1. c.
5. fol. 235. c.

De Dolore Auris ex Inflammatione oborto.

Quod si inflammatio adsit, optimum ad eam pharmacū vnguentum nardinū cum exiguo basilico appellato pharmaco infunditur: idem ēt tetrapharmacū appellatur: & Commagenū quoq; aptum est: & ex adipibus pharmacum, cuius compositionem paulo pōst describam. Cogēte verò dolore necessarium est etiam ijs quæ sensum stupefaciunt vti, quemadmodum etiam in ijs qui colum, aut renes, aut quācunq; tandem partem affecti vehementi dolore affliguntur, facere consueuimus. Miscetur autem opium muliebris lacti & oui candido, quæ ipsa & per se sæpe aurium inflammationibus profuere. Miscetur & castorio opium. Verū multo ante vsum tempore, siue parī pondere, siue duplo, castorio admisceatur, præparatum id esse conuenit: & miscetur quidē in vehementissimis doloribus parī, in minoribus verò duplo. Liqueor verò quo hæc diluuntur, ex musto sapa sit: multo. n. magis q; dulcia vina, dolorem hæc sedat. Statim itaq; in principio prædicta pharmaca diligenter trita cum sapa misceantur, castoriū quidem diligenter prius tritum & la- H
uigatum, papaueris verò succus ipsa sapa dissolutus, atq; ita hæc tria mista probè lauiantur. Deinde verò vfu postulante rursus sapa diluantur in eiusmodi compagem, vt per aurisuforia specilla ad lucernam tepesacta infundi possint. Verū ego nullum pharmacum dolore vexatis infundo, neq; etiam per lanam instillo: vtpote qui experientia edoctus sim, q; præstat neq; omnino contingere doloris tempore auditorium meatum: sed per auriculare specillum lana mollissima oblutum dolore vexatos foueo: pharmacum q; ita moderato tepore in aurisuforio specillo præparatum iniicio, vt interrogato per nos ægro, num tepidum ei videatur, & num calidius ipsum ferre possit, ad tantam caliditatem procedam, vt nihil amplius offendat. Tinctum itaque in hoc modo præparato pharmaco specillū ad principium meatus moderatè imposito, & in altum defluere ex eo pharmacū permittito: & postea iterum iterum q; & sæpius tingito, idem q; facito nullo tempore intermisso. Palam est autem cum hoc fit, etiam foris omnino aliquid effluxurum esse, expleto nimirum toto auditorio meatu: hoc igitur quantum possibile est moderatè excipe, nec aurem cōtingas. Postquam verò probè foueris, meatum pharmaco expletum finito, & mollem lanam forinsecus tum meatus osculo, tum vniuersæ auri imposito: atq; vbi rursus fomēta adhibere oportebit, incumbentem foris lanam leniter tollito: rursus que similiter foueto, quantum possibile fuerit

A fuerit diligēter cauens, ne vel auditoriū meatum, vel aliam quāpiam auris partem, attingas. Ad hoc verò præceptum maximè animum aduertias, utpote quod omnium potissimum sit in aurium curatione. Fomenta verò fiant per ea quæ, velut dictū est, dolorem sedant, quale est optimum Nardinum vnguentum paucissimo in eo tetrapharmaco dissoluto. Deinde ē Cōmagenum & Sulinū, & pretiosa diuitum muliercularū vnguenta, quæ ipsæ spicata & foliata appellant. Sunt autē spissiora quæ ut infundi queant: quapropter per nardinum vnguentum ea dissolvere oportet: & æstatis tēpore, & si caloris sensus ægrum circa inflamatā aurem infelicit, per rosaceū bonū: aut si hoc non adlit, amygdalinum. Memineris autē quod bonum semper rosaceum dico, in quo plurimæ rosæ maceratae sunt: verū oleum in quo hæ macerantur, omphacinum sit ex crudis oliuis & nec dum penitus maturis expressum, citra salis additionem præparatum. Immo neque ē aliud quicquid ad rosas conficiatur, quemadmodum illi faciunt qui spissamenta stygmata Græcis appellata addunt, quod videlicet per multum tempus ipsum rosaceum odoratum permaneat.

De Dolore Auris ex Flatu Ventoso, aut Crasso & Viscosis humoribus.

Si verò flatum ventosum, aut crassum aliquem & viscosum humorem, qui transitum non habeat, inclusum esse conieceris, etiam ex pharmacis ab obturatione liberatibus quippiam admisce. **B** Artificiosa enim coniectura causarum dolorem efficientium tibi continget, si tum prægressa, tum præsentia percunctatus fueris. Frigiditate. n. antegressa flatus ventosus congregatur: grauitate verò capitis, cibus quæ pituitosis & mali succi, frigidi & crassi humores. His enim si frigiditas accedat, dolores contingunt, eis nimirū quæ prius distabantur propter densitatem inclusis & retentis. In his igitur spuma nitri, & nitrum ipsum molle, eiusmodi quæ aphronitrum, & oleum amygdalinum appellatum rationabiliter in auricularia pharmaca miscenī. Ex hoc genere album item ac nigrum veratrum est, & struthium, ac amygdalæ amaræ, & ex tribus aristolochiis quæcūque fuerit ad manū, & iris Illyrica. Iniicias autē & cinnamomū si habueris, aut casiam illo non præsentē, tū eam quæ Zigeres, tum quæ Metodes appellatur. Item carpesium, quod plurimū in Sida Pamphylia nascit, & ob id vilissimo pretio venditur. Quintus sanè, cū cinnamomi inopia esset, carpesium pro ipso iniecit duplo pondere, velut aliqui eius loco casiam. Caterum aurium meatus ab obturatione liberant et quæ lapides in renibus atterunt, omnia quæ insuper tenuium partium citra mordacitatem, ut ne dolorem exacerbent. Ex quorum numero est et cucumeris sylvestris radix, item quæ bryonia, & ari, & dracunculi, ac centaureæ, & polii, & omnino omnium amarorum: citra mordacitatem namque & absque molestia expurgant hæc meatus, dissoluiunt quæ & dissecant obturata. Verū ob id multa huiusmodi exēpla scribo, quibus sanè omnia in libris de simplicium pharmacorum facultatibus retulerim, quod videlicet omnibus terræ locis remedijs vos abundare volo, ut ipsorum memoriam in promptu habeatis. Alia. n. in alijs regionibus abundant, & meliora iis quæ alibi nascuntur existunt. Alioqui sanè ex adipibus compositum pharmacum tibi sufficiet, & ex simplicibus quæcūque paulo antè recensui doloris mitigatiua. Mirari porro subit medicos qui citra distinctionem ad aurium dolores pharmaca quedam conscripserunt. Quæ etenim à frigiditate dolent, per calfacientia celerrimè curantur: si verò à mordaci acredine, aut à pulsati inflammatione, dolor fiat, maximum detrimentum continget, si eiusmodi pharmaca adhibeantur. At qui moderatæ inflammationes & non pulsatiles et per eiusmodi pharmaca curantur: quale est acetum cū rosaceo tepefactum, vtriusque diligenter simul commixtis. Sic etiam Glaucium in cote medica cū aceto tritum moderatis inflammationis doloribus prodest. Præstet autē pastillum ex glaucio multæ sanè utilitatis pharmacum, prius præparatum habere, qui fit ex glaucio probè cum aqua pluuiali trito, deinde in pastillum redacto et exiccato. Si verò fragilius videatur glaucium quod ut in pastillos formari possit, parum gummi ei addes: sufficit autē id duodecimam, aut quintam & decimam, glaucii partem esse. Quin & collyria ex glaucio eodem modo cum aceto trita, eis profunt auribus instillata, atque his nihilo minus **D** collyria ex croco. Hæc quidem igitur sunt doloris & inflammationis remedia. Caterum de alijs affectionibus, quæ in auribus oboriuntur, ubi pharmaca quæ per experientiam cognoui recensuero, ita deinde ad ea quæ à prioribus medicis scripta sunt transibo.

De Vlceribus Aurium.

Vlcera aurium recentia tum Glaucium solum cū aceto tritum, ut iam dictum est, curat, tum collyria ex eo omnia, et collyria ex croco, & ex rosis medicis appellata, velut et quod Nilo inscribitur. Curat item ea Damocratis collyrium ex myrrha. Quæ verò pure manant citra dolorem, atque id moderatè patiunt, per eadem curantur. Verū quæ fortiter affliguntur, per eiusmodi qualis est pastillus Andronius, & pastillus Musæ, cum sapa & exiguo aceto dilutus. In quibus componendis varietas rursus dicitur. Vbi verò & hæc à malo vincant, scoria siue recremento ferri ad plurimos dies in Sole cum acerrimo aceto trita & lauigata confidenter vtere: etiam si præter rationem videatur aurem acerrima pharmaca sustinere posse, quam paulo antè dixi neque molliorum infusorum admotionem & allapsum citra molestiam sustinere, sed & hæc ipsa ostendere ipsam videri.

De Audiendi Difficultate, et de Sonitu Aurium.

Restat itaque adhuc de audiendi difficultate, & de sono aurium differere, quæ nihil cum doloribus & vlceribus commune habent. De quibus deinceps dicam, ubi prius compositiones auricularcs

riculares à celeberrimis medicis magnificè laudatas recensuero, iuxta quam rationem eas compo- E
fuerint tandem illi, initio ab ea quam Heras scripsit sumpto.

Compositio Auricularis, Heras.

Heras[†] quidē igitur ita scripsit. *Compositio Auricularis ad omnem Dolorem, omneq; Vlcus. Hac in Fe-*
briente quodā vsus sum, & ob dolores delirante, & feliciter successit. Myrrhæ drach. i, thuris drach. iiii alii
vij, spumæ nitri drach. iij, croci drach. iiii alij i, succi papaueris drach. iij, chalbanū drach. ii, amygda-
las amaras delibratas xx: aceto excipito. Vfus verò tpe, si quidem dolor adlit, rosaceo diluta instil-
lato: si verò audiendi difficultas adlit, aceto. Heras itaq; vnum hoc pharmacum scribere contē-
tus fuit, ad omnem dolorē, ac aurium exulcerationem, remedium. Ego verò dolores per pharma-
cum ex adipibus constans, & per nardinum vnguētum tetrapharmaco admixto, leniri dico, vna q; &
& affectiones ipsas iuuari, velut ēt oui candido, & lacte muliebri: per papaueris vero succum mi-
gari solum dolores, nihil q; iuuari affectiones. Verū per accidens, non primario, etiam affec-
tiones inde opem sentire quis dicere possit: sedato enim dolore, & somno consequente, natura affe-
ctiones dolorem efficientes concoquit. Ceterū vlcera in auribus omnino cum glaucio ex aceto
curaui: quemadmodum ēt quę cum fluxione aut purulentia consistunt, per pastillos, à mitioribus
auspicatus, qualis est Polydæ, & post eum Andronius, & ab illo Bithynus appellatus, cui similis F
est meus, hoc est ex charta vsta constans, & velut ego iudico, eo ēt præstantior. Minimè verò sem-
per oīum vsu opus habemus, sed sufficit omnino vnus, si quis ipso vti norit, aliquñ quidē per sapā
diluto, si quidem mitius reddere pharmacum velit: & rursus per vinum dulce, deinde per acetum
non acre, deinde ēt per acre, ac postremo per longē acerrimum. Quapropter cum per eiusmodi mi-
sturam aliā aliter parabilem, huiuscemodi pharmaci vehementiam exoluere possis, fortissimum
tantū præparatum habere poteris. Verū mirari ritē, velut dixi, licet plerosq; medicos, qui
citra discrimen omnigena aurium doloris pharmaca conscripserunt, ea q; commiscuerunt in vnū
ordinem redacta, quę vel maximè contrarias habent vires. Quemadmodum statim (à veteribus
enim auspicari prælat) Apollonius Herophilū secūtor, in parabilium pharmacorum descriptio-
ne, in principio quidem libri, capitis doloris remedia scribens, primū omnium ea quę ex ardo-
re oborto conueniunt, locauit: Deinde consequenter ea, quę dolori congruunt ex frigiditate: De-
inde ea, quę ex ebrietate & meri potu oborto medent, sic enim ipse appellauit. Quarto loco ea quę
plagę aut casui dolores capitis inducentibus adhibenda sunt, subiecit. Et postremū iuxta illius
præscriptum ea, quę ad temporum & totius capitis dolores citra manifestam causam obortos con-
ducunt. Verū in aurium dolore nullam omnino apposuit distinctionem, sed simpliciter, Ad au-
G rium dolores, titulo præscripto, deinceps pharmaca recenset, aliqua calefacientia, aliqua refrigerā-
tia, quędam humectantia, quādam reliccantia: & iuxta secundas facultates ac qualitates, aultera,
acrida, amara, acrida, acida, falsa: & ad hæc insuper alia discutientia, alia adstringentia & cogentia, ac
repellentia influxiones, alia extrahētia ē profundo corporis, alia ab obturationibus liberantia, alia
repurgantia & extergentia, alia sensum stupefacientia. Si quidem igitur vna affectio dolorum est
causa, rationale est etiam vnā esse remediorum ipsius facultatem: si verò multa, tantum reme-
diorum numerum esse oportet, quātus est efficientium causarum. Cū itaq; Herophilus distin-
ctiones in tantum, vt haud sciam si quis alius, laudet: ipse q; Apollonius capitis doloris pharmaca
distinctē scripserit: magis utiq; miror, q; circa aurium dolores ita indiscriminatim omnia tractauit.
Et quintū insuper pharmacorum genus penitus indistinctum reliquit, illud scilicet quod po-
stremum ad capitis dolores citra manifestam causam obortos descripsit. Quāq; & huiusmodi ca-
pitis dolores necesse sit primū communibus generibus causarum dolores efficiētium subiectos
esse, solutioni videlicet continuitatis, aut intemperiei, quemadmodum à nobis est demonstratum:
deinde etiam ijs, quę has ipsas operantur. Quę omnia à me proprio huic rei & tractationi loco
sunt determinata: Nunc autem eorum quę ad aurium dolores pertinent solum mentionem faciā, H
cū omnium postrema, velut sæpe in methodi medēdi libris dictum est, hæc tractatio exiliat. Ete-
nim curandi methodos illic tradens, vnum atque alterum particulare exemplum apposui, multi-
tudine pharmacorum quę ex multis compono, in præsentem tractationem reiecta. Quare medē-
di methodum de Simplicium pharmacorum facultate libri xj meritò præcedunt: post hos verò
xiiij de medendi Methodo ritē consequuntur: his demum de Compositione pharmacorum libri,
quos nunc in manibus habemus, succedunt.

Quæ Apollonius ad Aurium Dolores scripserit.

Quod verò Apollonius deliquisse dixi, in eo quod non distinxerit, in quali aurium dolore
vnumquodq; eorum quę describit pharmacorum vtile existat, ne falsò virum reprehendisse co-
arguar, ex paucis exemplis demonstrabo. Cū enim præscripsisset, vt dixi, ad aurium dolorem
infundenda, inter ea q; scripsisset, "Anserinum aut gallinaceum adipem liquefactū sensim instilla.
rursus deinceps scribit, Fel taurinum aut caprinum cum porri succo instilla. Adeps quidem igit
horum quę dixi animalium maximè mitigat omnes affectiones dolores inducentes, simul q; ipsa-
rum aliquibus magnificè auxiliatur: † Fel verò ipsum cum porro, tum ex inflammatione, tum ex
acribus & mordacibus humoribus, obortos dolores augent: solos autē iuuant ob obturationem,
aut

† Ex cod. Ve-
tustissimo. Fel
vero ipsum cū
porro tum ex
inflammatio-
ne obortos dolo-
res augent: tū
ins, quę ex acri-
bus & mordaci-
bus humoribus
facti sunt,
nullam opem
ferunt.

A aut frigiditatem inductos: siue ob nudam intemperiem frigiditatis, solidæ partes dolore vexentur: siue propterea q̄ in eiusmodi affectionibus ventosi flatus & frigidi humores generentur, excerni autem prohibeantur propter continentis corporis condensationem, citra inflammationem faciã. Vbi enim ab huiusmodi acerbis & calidis pharmacis dolorũ causæ fuerint exclusæ, curatio simul & doloris sedatio contingit. Gallinaceus itaq; et anserinus adeps, si quidem euacuatum corpus inuenerint, & humorem qui inflammata affectionem excitat, non amplius influentem, duabus rationibus tum mitigandi, tum curandi, profuerint. Si verò influente adhuc causâ adhibeantur, affectioni quidem nihil auxiliatur, leniunt tñ doloris accessionem siue symptoma, quemadmodum est si ob humorum acredinem mordacitas contingat. Verum fel cū porri succo nunq; in eiusmodi affectionibus quicq; commodum efficere potest: quemadmodum neq; piper: Et tñ eo est medicũ quendam vsum scio in muliercula, ex calidarum naturæ spõte aquarum vfu aurem dolente. Cum enim per omnia parabilium pharmacorum Apollonii libris fidem haberet, & iam antè feliciter saepe ex pipere remedio vsum esset, etiã tunc sperauit se in auris dolore opitulaturum: verum adeo ab ipso exacerbata est muliercula, vt parũ abesset quin se ipsam strangularet. Scribit itaq; Apollonius in hunc modum: **C** Piper in vino feruifacitum terito, & mediocri crassitudine intillato.

B Scribit aut consequenter post hoc est hæc: Lycio, & papaueris succo, pari pondere lacte muliebri dilutis vtire. Et post hoc rursum aliud, hoc scilicet: Castorij & papaueris succi par pondus in testa, præcipue quidem Attica, sin minus, Romana, torrefacito: & trita passo diluta intillato. Pharmacæ igit ex papaueris succo oia sensum stupefaciunt: & ob id sanè necessariò cogimur ipsis vti, vbi nullum aliud mitigatiuũ opem tulit. At verò ex pipere pharmacũ alterius generis est: Quemadmodum est quod ex adipibus constat: Et velut id quod deinceps scriptũ est hoc modo: Galbanum fusino vnguento diluito, & mel ac rosaceum admisceto, atq; lanam sordidam auriculario spicillo obuolutam in eis agitando imbuo, & tepesacta intillato. Discussorium est citra molestiam hoc pharmacum, inflammationibus conducens, in quas nihil amplius influit. Probè est fecerit in ijs qui ex frigiditate dolore vexant. Cæterum quæret fortassis aliquis, quam ob causam, cū nō solũ Apollonius, sed aliq; et quidam celebres viri, papaueris succum & castorium torrefacere iusserint, quò videlicet vehementia virium ipsorum minueretur, ego ad priorem meum sermonem id apponere reliquerim. nimirũ suprà, cū auris doloris curandi rōnem scribebam. Huic ego respōdebo in hunc modum: Castorium quidem igitur neq; omnino torreret operæpretium exilimo: neque enim tanq; sensus stupefactiuum ad papaueris succum admiscemus, sed ob contrariam oino rationem, vt videlicet vehementiam refrigerandi facultatis in eo obtundat. Quare qui papaueris succũ torreret iubent, probè id faciunt: In castorio verò omnino absurdè id præcipiunt, ipsum enim per se concoctoriã agrè solubilem & in scirrhum induratarum affectionum vim habet. Abundè igit satis esset papaueris succi lenitas, quæ ex eorũ compositionis perennitate comparatur, torrefactus enim efficaciam amittit. At si castorio misceatur, perennaret, quippe manet & nunc abundè efficacia, eius verò malignitas obscuratur: ex qua est aliqui læduntur, vt obscurius videant per multos omnino dies, & capitis grauitatem sentiant, & neq; probè concoquāt cibos †: & ob hanc sanè eius malignitatem pleriq; medici ad torrefactionem confugerunt. Verum cū rursus in torrefaciedo efficacia ipsius pellundari videatur, id quod saepe sum expertus, melius esse existimaui intostũ quidem misceri, sed post tēpus aliquod inueterata iã cōpositione in vsum adsumi. Hæc itaq; extra rem dicta sunt, sed quæ tñ vtilia existant. Cæterum vt ad id quod propositum erat reuertamur, non parum noxæ inferunt illi qui indefinitis pharmacorum descriptionibus fidem per omnia habent. Porro multi alii iuxta eundem modum in plerisq; tñ locis, tum affectionibus indefinita pharmacæ scripserunt, neq; cognouerunt quantam vim habeat certa distinctio ad artis cōstitutionem.

In quibus sanè nihil miror q̄ omnia indiscriminatim cōfuderunt, quemadmodum in Apollonio D Herophili sectatore mihi accidit: vtpote qui norit, q̄ iubeat Herophilus Medicum omnino anni ti debere, vt sciat, quæ & qualis & quanta sit morbi causa, & vbi maximè ea dominet, quò videlicet & curationem vnicuiq; conuenientem faciat. Magis verò adhuc Archigenem quis miretur, qui & ipse non pauca indefinitè & indistinctè scripsit cū in aliis curationibus, tum in eis præsertim quæ ad aurium dolores destinauit. Vna enim tantũ in ipsis distinctione vsum est, à vehemenua nimirum & mediocritate doloris. Atqui & ipsius totam tibi adscribam dictionem.

Quæ Pharmaca Archigenes ad Aurium Dolores conscripsit.

In priore de pharmacis fm genus libro, Archigenes in hũc modum hæc verba scripsit. **C** In aurũ dolore, precedente alia victus ratione quam ad capitis dolorem ordinauimus. Si quidẽ moderatus fuerit, simplicia vnguenta tepida instilla, velut crocinum, aut irinum, aut rosaceum, aut nucum amararum succum, aut calix vnguentum, aut simplicem nardum, aut fusinum, aut amygdalinum, aut rosarum, aut mali punici, aut papaueris succum cum oleo calido, aut porri semen tritum.

Aut veratrum album cum rosaceo tritum, tepidum per strigilem infunde. Aut opij parum cum lacte muliebri. Aut opij succum eliquatum cum lacte eodem modo. At verò vbi vehemens sit dolor, alius per clysterem validè subducatur, & sanguis à cubito detrahatur, & quæcunque similia adhibeantur. Inde q̄ fomentum ex decocto lauri, aut simili quopiam, fiat, aut ex sulfure viuo in aquam

† In antiquis additur ei rosaceum iñ bibat

aquam insperfo. Exprimantur autē vehementer spongiæ, auribus q̄z apponantur, facillimè enim ab E humore soluuntur ac laxantur. Quapropter fomenta sicca longè commodiora eis existunt, ex sale videlicet aut milio, aut delicatis pileis, molliter uē effigiatis. Aut rutam feruefacito, cuius que decoctum in angustiori vasculum transfundito, lana q̄z os eius obturato, & auriculæ admoueto, quò vapor inde per lanam ad aurem penetrare possit. Quidam in posca ēt exiguo oleo rutam coquūt, atq̄ ita liquorem in vasculum infundunt, ex eo q̄z fomentum parant. Post fomenta verò aurem concutito, & balsamum cum rosaceo dilutum infundito, aut aliquod ex prædictis vnguentis tepidum. Aut aliquod aliud conueniens ad auri dolorem ex ijs, quæ mox describentur imposito. Aut papaueris calicem tenuem farina admista, & in aqua mulsa coctum. Aut papaueris calicem cum hordeacea farina in vino coctum. Aut fœnugræcum aqua mulsa coctum. Aut semē lini eodem modo. Summè auxiliatur spongia ocularis melle cocto atque adhuc calido imbuta, & imposita. Aut ceratum ex irino, styrace ad ipsum admisto. Egregiè facit ad aurium dolorē aloë rosaceo permista, & mellis crassitudine infusa. Aut chalcitis vino diluta. Aut perdicis succus tepidus instillatus per se, et cum melle. Aut nitrum exigua aqua diluito, admisto q̄z oleo tepidum instillato. Aut aristolochiæ radicem cum oleo. Aut veratrum album cum rosaceo tritum tepidum per strigilem instillato. Probè facit opium in testa torrefactum, similiter q̄z castorium, pari pondere, cum rosaceo & passo ad mellis spissitudinem redacta: in quibus deinde post fomentum, specillum lana obvolutum intingitur & imponitur. Aut succum fœniculi cum aliquo ex prædictis vnguentis in principio instilla. Aut anguis senectam cum calicibus papaueris coquito & infundito, aut cum quopiam ex prædictis vnguentis. Aut garum Hispanum calefactum per strigilem instillato. Facit & acopon foetidum tepidum infusum. Aut papaueris succus rosaceo, & exiguo crocino dilutus. Omnibus tamen præstat Hiera aromatica cum quopiam ex vnguentis. Egregiè facit & veratrum album tritum, cum melle & rosaceo infusum, meatu per purpuræ lanam obturato. Præclare facit & veratrum cū irino oleo vel vnguento. Facit & cedria cum nardino vnguento infusa. Seuerus autē Asellos in aquariis vasis nascentes, millepedas Latini vocant, cū vnguētis tritos vlcera infundebat. Quidam verò frigidam aquam dolenti auriculæ infundunt: & confestim quidem longè magis dolitant paulo post verò perfectè à dolore liberantur. Alij melius faciunt, & in alteram non dolentem aurem frigidam infundunt, quemadmodum Lúcius solet. Præclare faciūt & aloë & crocinum cum vnguento amygdalino instillata. Aut æs tritum cum aceto & aliquo vnguento. Summè prodest Silphium cū rosaceo, si exulceratio adsit. Mirabiliter cōfert in excellēti aurium dolore porri succus, & caprina vrina, & rosaceum, cum exigua myrrha infusa. Aut Sciuri G adeps in strigili tepefactus instillatus. Aut alumen scissum, & mentæ succum, cum passo instilla. Aut piper album & salem pari pondere, cū sapa, sinistra manu ter aut † quater aut quinquies infunde. Aut cochleam siue limacem aphricanam putridam compungito, & rosaceo impleto, & feructum calidius per strigilem infundito. Quòd si ex plaga, externa pars auriculæ doleat, ad micam thuris lac affundito, semel q̄z atq̄ iterum diffundito, ac tertio macerari in eo finito, et agitatum infundito, statim enim dolorem sedat. Hæc quidē Archigenes valde indistinctè scripsit: possit autem quispiam mente præditus, reuocatis in memoriam ijs quæ prius dixi, facile animo concipere quale tandem ex prædictis pharmacis, singulis relatis aurium doloribus conueniat: nimirum si memor sit facultatis eorum: de qua in simplicium pharmacorum libris mentionem feci. Verum ego iam ad auriculares compositiones ab Andromacho scriptas transibo.

Auriculares Compositiones Andromachi numero xxiiij.

Quatuor & viginti compositiones auricular es ex ordine Andromachus conscripsit: quarum aliquibus distinctionem quandam, aliquibus nullam, apposuit. Et prima quidē ex eis hoc modo scripta est: *Compositio Auricularis ex Libris Galli, qua vtor.* Myrrhæ ʒj, salis ʒ iiii, thuris ʒ iij, spumæ nitri ʒ iij, croci ʒ iij, succi papaueris ʒ iij, amygdalas amaras xx, galbani ʒ ii, aceti boni quantum H satis est. Descriptio hæc ad Menemachū referi. Multi vsus hanc compositionem auricularem Andromachus scripsit, multis simul affectionibus aurium destinatam. Verū antea à me dictum q̄ huiusmodi compositiones nihil magnopere corrigunt, neq̄ ēt error ex earum vsu nobis contingit. Quæ verò vni affectioni cōgruūt, illā ipsam optimè curāt: alias verò aliqñ, vltra hoc q̄ nihil iuuāt, amplius etiā exacerbant. Secundam deinceps compositionem post prædictam scripsit hanc.

Compositio Auricularis Aelij Galli ad Inflammationem, & Intensos Dolores. Galbani drach. octo, cinamomi drach. ii, myrrhæ drach. viii, croci drach. viii, thuris drach. très, spumæ nitri drach. iii, succi papaueris drach. iii, aceti vt mellis accipiat spissitudinem. Oportet autem nitro prius præparare, ne pingue quicquam adsit, deinde pharmacum ipsum infundere. Et hinc rursus ab obturatione liberantia, & concoctoria, & laxatoria, & discussoria pharmaca, mista sunt, quæ vehementes dolores sanare non possunt, & ob hoc ipsis papaueris succus admistus est. Tertiā auricularem huiusmodi conscripsit. *Auricularis Compositio Laodici Regis, qua assidue vtor.* Castorii drach. ii, succi papaueris drach. iiii, opopanacis drach. ii, spumæ lycii drach. i: passo excipe, & tepefactis vttere. Hæc euidenter intensis doloribus conuenit, non tamen aliis affectionibus. Ego verò quemadmodum dixi, in vnaquaq̄ affectione proprio pharmaco vtor: semper q̄z papaueris succū fugio, neq̄ nisi

A. l. 5. fu. 2. t. fol. 52. c.

* Aliter vel

* Al. Decius

† Al. quinquies aut sepius.

* Aliter duas

* Aliter octo

* Al. sordidū.

A nisi vrgēte necessitate, ad eius vsum peruenio. Quartā deinceps auricularē sic scripsit. *Alia*

A. ibidem. f

ad Inflammationem & Purulentas ac Veteres Affectiones. Fabae Aegyptiae internae amarae, aluminis scissi, piperis albi, spumae nitri, croci, opij, malicorii, myrrhae, thuris, nardi, singulorum drach. ij: castorii drach. i: aceti & mellis quantum sufficit, alij mellis drac. vi conijciunt. In hac compositione, pharmacum alia disculforia, & reliccantia, & obduratione liberantia sunt: & quaedam et concoctoria, velut myrrha & thus existunt. Alumen aut scissile fortiter adstringens pharmacum cum sit, ad reficandum purulenta admistum est. Adiectum est & opium doloris sedandi gratia, oppositum quod est ei castorium, velut antea dixi: sed in eiusmodi affectionibus non solum ut oppositum, sed & ut concoctorium earum, & tanquam reliccatium, merito inijcitur. Quintam deinde auricularem Andromachus scripsit his verbis. *Alia Xenocratis, quae saepe vsum sum.* Spumae lycii drach. ii, myrrhae 3 j, croci obolos iii, thuris drach. j, aluminis scissi obolos iii, spumae nitri obolos ij. Trita cum aceto reponito. Vtere cum aceto. Et haec multum vsum est, non tamen in dolore forti conuenit, ut quae neque opium, neque castorium habeat, neque quippiam ex adipibus sedantibus dolorem, neque galbanum. Sexta compositio auricularis consequenter hac verborum serie scripta est. *Alia Prytanidis, concordat cum Harpali compositione.* Myrrhae obolos ij, nardi obolos iii, croci obol. iii, aeris vsti obolos v, opij

Bobol. ii, castorii obol. iiii, aluminis scissi drach. j, & rotundi drach. i. Excipe passum ubi fluxus fuerit: cum dolor, rosaceo: ubi vero vermiculi generentur, veratri nigri 3 ii, admisceto. Probe fecit quod in fine vsum eius adiecit, quem nos sane dixissemus, si ipse adscribere neglexisset. Septima similis praescripta, in hunc modum descripta est. *Alia diui Gaii compositioni consona.* Veratri nigri obol. ij, myrrhae obolum i & dimidium, opij obolos iii, aeris vsti obolos iiii, aluminis scissi obolos ii, castorii obolum i, croci obolos iiii, nardi obolos iiii: cum passum vtere. Octaua praescriptis omnino similis est. De nona vero hoc modo ipse scripsit. *Alia qua vtor in Doloris vexatione & Sonitu.* Nitri drach. vnam, myrrhae drach. vnam, rosacei cyathum i, aceti cyathum i: simul tritis vtere. Hoc pharmacum non ad dolorem in inflammationibus conuenit, sed ad eos dolores qui ex obturatione, & flatu frigido ac vaporoso, similiterque ex humore, oboriuntur. Decimam deinde hoc modo scripsit. *Ad Aures Purulentas Harpocratonis.* Florum mali punici, mali corii, aristolochiae, chalcitidis, misyos cyprii, gallae, squamae aeris, singulorum drach. j: myrrhae, thuris, vtriusque obolos iii: atramenti futorii assati, aluminis scissilis, vtriusque obolos iii. Cum passum pastillos formato ac vtritor. Quod si etiam ipse pharmaci promissionem non praescripisset, facillimum tamen erat nobis eam animo assequi, memoria repetentibus ea quae in principio praefatus sum. Est enim aurium purulenta

tarum reficatum hoc pharmacum, quod ipsum malum ex fluxione quapiam ex capite delabente contingit, ob quam si diu perseveret etiam exulcerationes accidere videmus. Vndecimam auricularem sic scripsit. *Auricularis Compositio in multis consona.* Croci drach. j, myrrhae drach. j, castorii drach. ii, aluminis scissi drach. quatuor, thuris 3 i. Cum passum ad mellis crassitudinem redigito, deinde etiam sic dilutis vtritor. Et haec moderatas affectiones sanat, quemadmodum etiam ea quae hanc sequitur. Ceterum quae deinceps post hanc ab Andromacho adscriptae sunt auriculares compositiones, eas citra meam expositionem adscribam, cum ipsas per se diiudicare possint, qui praedita memoria tenent. Verum quarum ipse cum distinctione fecit descriptionem, earum nulla amplius nostra interpretatione opus habet. Deinceps igitur omnes describentur, ne videlicet amplius alicuius alterius auricularis compositionis, ab aliquo alio medico conscriptae, mentionem facere opus habeam. In his enim varietas omnium ipsarum comprehensa est. *Auricularis ut Solon Dicitur.* Myrrhae drach. iiii, aluminis scissi drach. iiii, castorii drach. ii, thuris drac. i, croci drach. vnam, opij drach. i. Cum cretico aut vino mulso ad mellis crassitudinem redige. *Auricularis Compositio Antipatri ad Doloris vexationes.* Croci sextantem alij 3 i, myrrhae 3 i, salis ammoniaci 3 i: aluminis scissi, ammoniaci thymiamatis, vtriusque 3 dimidium: facis vnguenti irini aut Syriaci sextantem. *Aliter.*

* AF. vnam.

D Cum vino mulso aut cretico ad mellis tenuis spissitudinem redige, ac vtere. *Auricularis alia valde commoda.* Opopanacis drach. ii, succi papaueris drach. iiii, spumae lycii drach. iiii, castorii drach. ii, aluminis scissilis obolos iii, croci obolos iii, myrrhae drach. vnam. Vsum eius est cum lacte muliebri. *Ad Aures Purulentas compositio Spondusae.* Fellis porci castrati partes ii, mellis attici partem i. Vase vitreo simul indita in feruido cinere usque ad dimidium calcacito, atque ita vtritor. *Auricularis Harpocratis ad Affectiones & Dolores.* Spice nardi drach. vi, myrrhae drach. vi, piperis drach. vi, spumae nitri drach. vi, floris salis drach. vi, croci drach. vii, nuces amarae x, succi papaueris drach. vii, vini veteris quantum sufficit. Stanneo vasi pharmacum infundito. *Ad Grauitatem Auditus et Sonitus.* Veratri albi drac. i, castorii obolum i, spumae nitri sesquiobolum. Cum aceto optimo vtere. *Alia ad Sonitus pulchra.* Struthii drach. i, croci cilicii drach. i, castorii drach. i, veratri albi 3 iiii, nitri 3 vnam. Redigito in pastillos, & vsum expetente, vino dilutis vtere. *Ad Aures Purulentas.* Alumen scissum vsum & myrrham cum melle terito, & praelota auricula pharmacum lana exceptum imponito. *Auricularis Chrysanthi Gratiani, ad Inflammationes & Exulcerationes.* Blattas detractis pennis xii, vini veteris & mellis vtriusque sexuncem, mali punici putamen vnum, succi porri sesqui cyathum. In olla noua donec mali punici putamen flaccidum fiat coquito: deinde terito, & vnguenti Syriaci vnciam vnam adiicito, picis liquidae sesquiunciam, caprarum quatuor succum

* Aliter.

* AF. iiii.

* AF. libras ii.

cum expressum: & contrita simul reponito. Vsu verò expetente tepefacta lana excepta indito. **E**
¶ Auricularis compositio ad Inflammatam & Purulentam. Nardi indicæ drach. i. aluminis scissi drach. ii. opij
 drach. iiij. malicorij drach. iiij. croci drach. iiij. myrrhæ drach. iiij. thuris drach. iiij. mellis attici drach.
 iiij. spumæ nitri drach. iiij. castorij drach. ii. amygdalarum amararum drach. viij. piperis albi grana
 xxx. acetij cyath. i. vrinæ suis syluestris tantundem, fabæ Ægyptiæ viridis internæ amaræ drach. iiij.
 Trita simul in stanneo vase reponito. Vsus tempore cum rosaceo instillato, & lanæ purpura infe-
 ctæ tomētum indito. **¶ Auricularis ad Desperatam, velut Zoilus Ophthalmicus tradidit.** ^a ¶ Seminis hyo-
 scyami obolos iiij. aluminis scissi oboli dimidium, myrrhæ drach. vnam, castorij obol. iiij. succi papa-
 ueris obolos iiij. gallæ obolos iiij. croci obolos iiij. cinnamomi obol. iiij. thuris obol. ii. spumæ nitri
 obol. ii. sandarachæ obol. ii. ^b ¶ opij recentis cochlearia iiij. vrinæ suis feræ masculæ cochlearia tria;
 sanguinis conchilij obol. ii. succi mandragoræ obol. i. mellis attici quantum sufficit: conchylio au-
 tem obturato. **¶ Auricularis alia ad Inflammatam & Purulentam mirabilis.** Rutæ obo. iiij. myrrhæ obo. iiij.
^c ¶ baccarum lauri amotis corticibus obol. iiij. 3 succi hyoscyami drach. vnam, opij drach. vnam, cro-
 ci drach. i. Cum lacte muliebri vtere, & tepidum infunde. **¶ Auricularis compositio valde bona et pro-
 bata, ex Apollonij libris.** Myrrhæ drach. ii. thuris drach. i. nucum amararum drach. vnam, spumæ ni-
 tri drach. i. aluminis scissilis drach. i. malicorij drach. vnam, spicæ nardi 3 vnam, aloes drach. iiij. vini
 nulli veteris cyath. iiij. Arida trita vino mulso admisce, & cocta in stanneo vase reponere: vsu verò
 exigente tepido vtere.

A ¶ Sed hæc cō-
positio nō con-
sentit vetustis-
simo Venetorū
codici. Habet
enim ille opij
obo. iiij. de hic
paulo inferius
thuris obol. i.
spumæ nitri
obo. i. sandara-
chæ obo. i.

B ¶ Olei amyg-
dalarū amara-
rū μετρίσιον
appellari.

C ¶ δεινόν δ' οὐ
ἀνίκευμένον
τρίωλον.

Compositiones Auriculares ab Asclepiade in Primo Externorum scriptæ.

¶ Auriculares cōpositiones ad Dolores Aurium recentes, quibus Niceratus vsus est. Inter eas optima hæc est.
 Asellorum domesticorum: est autem animal multipes in aquarijs vasis & sterquilinijs enascens,
 quod ad digitorum cōtactum in orbem se contrahit: horum tres aut quatuor in oleo feruefacto,
 et expressum oleum auribus infundito. Facit & cucurbitæ succus cum rosaceo, aut nardino mistus
 & tepefactus. Et perdicij herbæ succus cum oleo coctus. Et centaureæ succus aqua multa dilutus.
 Et hyoscyami succus rosaceo mistus. Facit & papaueris succi parum lacte muliebri dissolutum.
 Et serofus cruor qui a carnibus bubulis dum torrentur destillat. Has itaq; crudas recentes prunis
 imponere oportet, & crudas adhuc exprimere, & expressum liquorem calidum infundere. Facit
 etiam nucum putrefactarum internarum liquor aceto dilutus addito rosaceo. Facit et Aphricana
 linaca in propria testa, cum oleo nardino aut rosaceo feruefacta. Facit & iuis quæ non peperit, fel
 pari melle attico admistum. *Aliud.* Succij papaueris, castorij, vtriusque obolos ii passio diluito: &
 pauco rosaceo adiecto tepida infundito. *Aliud.* Succij papaueris, & succi peucedani, æquales par-
 tes dissolutas infundito.

Ad Inflammationes cum exulceratione, Charixeni.

¶ Myrrhæ, opij, castorii, singulorū æquales partes passio dilutas tepidas infunde. *Aliud.* Hyo-
 scyami succi, succi papaueris, myrrhæ, castorii, singulorum drach. iiij: piperis, drach. i: passi protro-
 pi quantum satis est. **¶ Ad Siccas & non humentes Vlcerationes.** Optime conuenit & in Pello oppositū.
 Oelypi drach. iiij, medullæ ceruinæ drach. iiij, butyri drach. iiij, adipis anserini drach. iiij, ceræ Tyr-
 rhænicæ drach. iiij, terebinthinæ drach. iiij, olei cicini cyath. ii, olei amygdalini cyath. ii, olei cyprini
 cyath. ii, pissellæ id est olei picini cyath. i. Componito, & vtitor, quantum sufficit oleo nardino di-
 luto, & ad mellis crassitudinem redacto. **¶ Aliud valde commodum. Facit & ad Nervorum affectiones.**
 Olei cyprini cyath. ii: irini, rosacæ, amygdalini, olei veteris, singulorum cyath. ii: pissellæ cyath. ii,
 ceræ sextantem, terebinthinæ vnc. i, adipis anserini vnc. i: componito & vtitor. **¶ Aliud ad Ab-
 scessus in profundo, Antony Musæ.** Croci drach. ii, myrrhæ drach. ii, bdellii drach. iiij, nucum amararum
 drach. viij, succi marrubii heminæ dimidium, passi protropi heminæ dimidium. Liqueores coqui-
 to, & admistis reliquis excipito. Vtere in passio, dissoluens quantum sufficit. *Aliud.* Croci, myr-
 rhæ, castorii, centaureæ, singulorum drach. ii: spumæ nitri drach. vnam, amygdalarum amara-
 rum depuratarum drach. viij, succi helxines sesquiseptarium, passi protropi sesquiseptarium.
 Componito, ac vtitor vt dictum est. **¶ Ad Inflammationes cum fluxu, quo vsus est Cleon.** Myrrhæ,
 aloes, thuris, succi papaueris, singulorum drach. ii: misios crudi drach. vnam: aceto excipe, & vsu
 expetente, passio diluta infunde. **¶ Aliud Aru Tarsensis.** Myrrhæ drach. iiij, thuris drach. iiij, mi-
 syos crudi drach. ii, lycii Indici drach. iiij: aceto excipe. Vsus iam indicatus est. Quod si multus
 fluxus oboriatur, subscriptis compositionibus vtendum est. Croci, thuris, myrrhæ, opij, seminis
 viticis, singulorum drach. vnam: lycii Indici, florum malij punici, florum rosarum, singulorum
 drach. ii: acetij heminam vnam. Viticis semen, mali punici flores, rosarum flores in aceto coqui-
 to: & vbi dissoluta fuerint, reliquis adiecto: & excepta reponito. Vsus tempore passio diluta infun-
 dito. **¶ Aliud ad Purulentas Aures cum dolore, quo vsus est Cimon.** Castorii 3 ii: aluminis scissi, croci,
 myrrhæ, thuris, singulorum 3 i. Passio aut vino myrrite excipe: ac vtere ad recens malum cum vino
 mulso, ad inueteratum cum aceto. **¶ Aliud Claudij Damonicij ad Purulentam, et Inueteratam Affectionem.**
 Croci drach. iiij, myrrhæ drach. vnam, nuces amaras depuratas numero xxx: spumæ nitri, nardi sy-
 riacæ, aluminis scissi, singulorum drach. vnam: thuris obolos. iii. Aceto acerrimo excipiuntur,
 & per acetū diluuntur. **¶ Ad Fæctorem, & Nomen siue Vlcus depascendo proserpens, Cōpositio Hispanorū
 appellata.**

appellata.

Appellata. Gari nigri quod Romani Sociorum appellant, sextariū vnum: acetū scillitici sextariū vnum, mellis atuci sesquiseptariū, ad compagē coquito: & in vitreo vase repolitis vitor. In aliis descriptionibus sic legere est: Succū cucurbitę sextariū vnum, composito: facit ad fœtorem cum inflammatione. *Charixeni ad Corruptiones & Fœtores.* Aluminis † Melii 3 viii, atramenti futorii 3 viii, aloes 3 viii, crocomagmatis 3 viii, myrrhæ 3 viii, vini myrthitæ sextariū dimidium. Alumen & vinum ipsum coquito: atq; vbi in compagē coierint, reliqua aceto dissoluta iniicito: & repositis vitor. *Ad Carnium Incrementum, quo vsus est Heraclides Tarentinus.* Æruginis rasæ 3 viii: squamæ aris 3 viii, in alio exemplari 3 iiii: mellis hemina dimidium. Arida trita, ac melle excepta, donec rubefiant, coquito: & ablatis vitor. *Aliud.* Æruginis 3 iiii, atramenti futorii 3 iiii, myrrhæ 3 iiii, succi marrubii cyath. iiii, mellis quantum sufficit: prepara vt dictum est. *Chalcedonia ad Inueteratas Affectiones.* Veratri albi 3 iiii, croci 3 iiii, myrrhæ 3 iiii, castorii 3 iiii, thuris 3 iiii, opii 3 iiii, atramenti futorii 3 xvi, piperis 3 ii. Myrrham, opium, thus, castorium, in aceto cui malicorū incoctum est, vsq; ad dissolutionem macerato: deinde veratrum, crocum, piper, atramentum futorii, contusa iniicito, atq; omnia simul diligenter terito: quod vbi probè factum fuerit, vini mulsi quantum satis est affundito, vt ad diluti mellis crassitudinem redigantur. Vsu verò expetente tepefacta infundito. Ex huius pharmaci vsu sæpe egregiè mihi successit, verum tps progressu omphaci 3 j, ad hanc descriptionem adieci. *Aegyptia ad Easdem Affectiones, etiam si sint connatae.* Amygdalarum amararum depuratarum 3 ii: fabarum ægyptiarum interioris partis amaræ, piperis albi, croci, myrrhæ, opii, singulorum 3 ii: thuris 3 ii, omphaci 3 iiii, aluminis scissi 3 iiii, castorii 3 ii, atramenti futorii 3 iiii, spumæ niuri 3 ii, aceto in quo malicorium incoctum est excepta, ad limi crassitudinem redigito. Vsu verò tempore quantum suffecerit ex pharmaco acceptum, ac nardino vnguento dissolutum, infundito. *Ad Sanguinis ex Auribus eruptiones, Heraclide Tarentini.* Facit vt ne in grumos coeat. Marrubii succum coquito & admisto aceto infundito. Aut mali punici in aceto cocti succum exprimito & infundito. Aut polygonii succum cum exiguo aceto. Aut acaciæ, aut amurcam, aut lycium cum aceto. *Aliud Boerhous sinit Sanguinis Eruptiones.* Succum rubi, & succū galbarum in aceto coctarum, simul mistos infundito.

† Al. Melle
libram unam.
al. vñ. viii. i.
non laus.

* Al. xaxxi
dovia.

* Al. ex 9 i
+ ac. exprimi
to.

Quæ Pharmaca Archigenes post prius scripta subiecerit.

Pharmaca ad aurium dolores ab Archigene scripta supra relata sunt. Nūc verò ēt ea quæ ad alias affectiones conscripsit apponā. *Humentibus verò polygoni succū cum pari rosarū succo infundito.* Aut crocū & myrrham cū passō & rosaceo tepefacta infundito. Purulentis aut prodest *C*quidem polygonū cū rosaceo infusum. Verū egregiè conuenit eis vinum, in quo conizæ tenuia folia habentis folia sint incocta, instillatum. Quidam ēt thus ad vinū admiscet. Aut lycium rosaceo dilutum instillato. Aut marrubii syluestris semen cū aceto & rosaceo eodem modo. Aut cumini & crociæquale pondus cum vino austero. Aut croci & myrrhæ vtriusq; 3 ii, nuces amaras decorticas numero xxxv. Nuces tritas cū mellis hemina dimidia, & porri succi hemina dimidia, cōmisceto, & reliqua itē probè trita iisdem liquoribus diluito, ac simul deinde tepefacta instillato.

{ Eiusdem } De Auribus Exulceratis.

*C*aterum exulceratis auribus & cruentis ac dolentibus, galbanum & opium cū passō & rosaceo mellis crassitudine instilla. Aut pro galbano peucedani succum admisce, & magis succedet. Aut cinerulā assatam cū rosaceo tritam infundito. Aut lycium cū lacte muliebri. Magnificè opitula ēt ipsum mel per se tepidum infusum, præsertim si fœtores simul adsint. Quidā alellos mille pedas appellatos, qui in aquariis vasis reperiuntur, cū vnguento quopiam instillāt, & eximie opē sentiūt. Aut blattas domesticas cum rosaceo instillato. Probè facit ad omnem auris affectionem adeps vulpinus { recens & } inueteratus, liquatus & instillatus. Aut sphōdylii interiorem velut medullam cū melle & rosaceo infunde. Aut elota & conscalpta auricula porri aut marrubii succū *D*cum melle infunde. Aut lixiuium figularium cum melle feruefactū. Aut thus cum aceto in mali punici putamine feruefactum infunde. { Aut crocum & alumen scissile cum vino mulso in mali punici putamine eodem modo feruefactum infunde. } Aut gallam tritam linteolo illigatam in vino coquito, & ex hoc instillato, statim à dolore liberat.

{ Eiusdem } De Vermibus Aurium.

C Porro in quibus vermes sunt, veratrū album cū melle immitte, aut aridum insuffla. Aut rubi succū infunde. Quod si verò auriculę os corrosū, { vel pingui humore imbutum sit, } fissura retro aurem impacta, ipsum scalpito, deinde vrito, ac citra molestiam cicatricem inducito.

De Sonitu in Auribus.

Sonitus quidam ex flatuoso spiritu generantur. Quidam ob exquisitam sensus audiendi subtilitatem fiunt, quemadmodum in oculis imaginariæ suffusiones, propter vapores ex ore vëtris exhalantes. Cæterum neutrius affectionis certa cognitio in principio haberi potest. Non conuenit tñ citra artē, aut cognitionē aut curationē auspicari. Dictum. n. iam sepe est, atq; ēt demonstratum, non vnū coniecturalis spei genus esse: atq; artificialem quandā coniecturam ex causis forinsecus laceffentibus, procatarcticis à Græcis appellatis, facere licet, si quis ipsarum vires norit, cum alia affectio ex frigidityte, alia ex ardore fiat. Quæadmodum etiam ex prægressa plaga, aut tali vel tali morbo:

morbo: velut & ex cruditate, aut largo vini potu, aut violento & multo vomito: aliquñ & ob phar E
 macorum auricularium vsum: sonitus quidam fiunt. Quin & si vel paulatim cōgregetur, vel coa
 ceruatim irruat sonitus, id ipsum quoq; ad inuentionē affectionis conducit. Insuper q; si per inter
 ualla repetat, vel continenter hoc symptoma perseueret. Verum certa cognitio tpe cōtingit, post
 vsum pharmacorū artificiali coniectura exhibitorū. Si quidem " igitur in febribus sonitus fiant,
 minimē inturbandi sunt: vt plurimum. n. statim sedantur. Si verò ob flatum ventosum, cui trā
 situs interclusus sit, sonitus fieri suspicatus quispiā fuerit: & ob hanc rē diffecantibus & attenuato-
 rijs ac discussorijs pharmacis admotis, nihil profecerit: simul q; apophlegmatismis vsus sit, & toto
 capiti prospexerit: huic meritō in hanc suspicionē inclinatus animus erit, sensus audiēdi videlicet
 subtilitatem sonitus causam esse, præsertim si acuto audiēdi sensu æger p̄ditus appareat. In eiusmodi
 itaq; quendā, qui p̄dictis pharmacis vsus erat, neq; quicq; opis senserat, cū ego fortē incidissem,
 ex stupefaciētibus sensum quippiā admiscui, velut est mandragoræ succus, & papaueris succus: ex
 eis q; a sonitus symptomate liber euasit. Quæ igit a prioribus medicis ad hmōi symptomata et ac
 cessoria mala conscriptæ sunt auriculares compositiones, ex discussorijs & incidētibus pharmacis
 constant. Suprà itaq; in Catalogo & enumeratione compositionum auricularium ab Androma
 cho descriptarū, ex eiusmodi materia composita quedam recensebantur, quas ipse ad sonitus con- F
 uenire scripsit: Nunc verò eas quas Archigenes ad hanc rem conscripsit recensēbo.

A. l. 3. f. 4. t. 1. c.
 21. fol. 237. d

Compositiones ab Archigene ad Sonitus conscriptæ.

¶ In sonitibus repentinis acetum cū rosaceo instilla. Aut cuminum et oleum crassitudine mellis.
 Aut radicis cucumeris syluestris succum. Aut ipsam radicem oleo incoctam. Si verò ad multū
 tempus perseuerent, omnibus amaris & acris, attenuatorijs q; & discussorijs, quæ ad dolorē ex
 crassis humoribus obortum descripta sunt, vtaris, singulis in aceto coctis et admisto melle. Aut re
 clinato agro, & nitro crudo trito in aurem insperso, acre acetum tepidum infunde: ac postquā fer
 uere desierit, lana scalpendo exterge: & nucum amararum succum infunde, et lana obtura. Aut ni
 trum & myrrham probē vnita, cum rosaceo & aceto ac atramento scriptorio crasso instilla: aut pē
 na in eis immerfa bis in die inde. Aut castorio ac nardino pari mensura cum aceto & rosaceo vte
 re. Aut aceto ac nitro melle q; mistis collue. Caterum quibus ob multam sensus subtilitatem so
 nitus oboriuntur, castorium & cicutæ semen cum aceto trita instilla. Ex " morbo verò obortis so
 nitibus, vbi fomentum ex decoctione ablinthij adhibueris, acetum & rosaceum instilla. Aut ra
 phani succum cum rosaceo: aut aloen optimam cum vino mulso dilutam. Si verò perdurent, vera
 trum nigrum aceto decoctum adhibe. Huiusmodi quidem Archigenes ad sonitus aurium con- G
 scripsit: Verum Apollonius in primo parabilium subscripta habet.

A. ibidem. e

Quæ Apollonius ad Sonitus & Susurros Sibilos q; ac Inflationes Aurium conscripsit.

¶ Acetum acre tepidum instilla. Oleum & acetum tepidum instilla. Mel atticum calidū instilla.
 Laurinum oleum eodem modo. Porri succum cū lacte muliebri aut rosaceo infunde. Cucume
 ris syluestris foliorum aut fructus succum per linteolum instilla. Cucurbitæ syluestris medullam
 oleo dilutam infunde. Cuminum tritum cum medulla vitulina instilla. Cucumeris syluestris me
 dullā oleo dilutam infunde. † Glandem vnguentariā terito, & adipe anserino ac resina pari men
 sura admistis instillato. Semen lini tritum & vnguento Arabico dilutum instilla. Misy terito &
 vnguento rosaceo dilutum instillato. Rutam & cuminum pari mensura trita & aceto diluta, ad
 misto melle infunde. Hyssopum tritū & cedrino oleo dilutam instilla. Amygdalarum amararū
 oleum melle mistū eodem modo. Quod si efficacius reddere velis hoc cum priore cōmittito. * Viti
 cēm & stellionis caput pari pondere trita admisto oleo instilla. Nitrum & resinam & adipem anse
 rinum, æquis partibus cum oleo admisto dissoluta instilla. Capas & allium & adipem anserinum
 pari mensura trita, & excolata infunde: & aqua collutis prius calida, nitrum tritum insuffla.

Ad Aures Exulceratas & Purulentas, eiusdem.

H

Primū quidem collutiones Apollonius scripsit. Secundū deinde locū infusilia habent. Tertiū
 relicatoria, & Quartum quæ insufflant, iuxta subscriptā ipsius dictionem. ¶ Collutiones. Aqua
 calida assidue collue. Lenticulæ decocto eodē modo. Aqua mulsa calida similiter. Hedere cremo
 re aut decocto cū vino vtitor. Malicorij cremore aut decocto similiter cū vino. Gallæ plenæ de
 cocto cū vino. Myrto in vino decocto elue. Vino cum exiguo alumine trito vttere. Stœbes semī
 ne in vino cocto elue. Vrina & vino mistis ac calfactis elue. ¶ Infusilia. Picis serum infunde. †
 Myrrhā cum vetere vino contritā infunde. Oleæ folia exuccato, & admisto melle coquito ac vtī
 tor. Papaueris succū passo dilutum instilla. Caparum succo cū melle vttere. Rutæ syluestris suc
 cum cū vino & oleo rosaceo in mali punici putamine calfactis instilla. { Fel bouis vel suis in pu
 tamine mali punici tepefactum infunde. Fel capræ, vel ouis, vel marinæ testudinis, cum muliebri
 lacte tepefactū infunde. } Cardamomū tritū cū melle instilla. Peucedani succū rosaceo dilutū in
 stilla. Aloen & erocomagma diluta instilla. Absinthio cū melle trito vttere. Myrrhā & resinam
 ac anserinū adipē cū oleo trita infunde. Pinguitudinē caseo in figulinū vas recēs coacto supersta
 tem tepefactā instillato. Diphryges tritum cum melle instillato. Alumē scissum tritum cū passo
 & aceto ad mellis crassitiem coquito, ac vtitor. ¶ Resicatoria. Cedriam melle mistam instilla.

Piperis

† in antiquo
 cod. græco hæc
 reperiuntur
 Aloen, folia
 viridia ama
 ranthi, rutā,
 lilacien, origa
 num, terra in
 testina, ana
 partem vnā.
 Vbi coxeris
 hac vnā cum
 oleo vsq; ad cō
 plemētū horū,
 ex ipso oleo te
 pido instilla in
 aurem.

* Α. λεγων
 i. leporem.

† Additur in
 antiquis codi.
 Vitrū vino di
 lutū infunde.

A Piperis albi grana tria vnguento Ægyptio diluta, & in parua concha trita instilla. Crocū & cerussam pari mensura trita, & rosaceo diluta, infunde. Melanthium & sulfur pari pōdere terito, & rosaceo diluito: & vnguento irino adipe q̄z anserino pari mensura additis rursus terito ac vñtor.

Myrrham & sulfur æquis partibus trita & oleo mista instillato. Myrrhā, & putamen mali punici dulcis æquis partibus trita ac melle diluta infundito. Animalcula ex arboribus, veluti rubri vermes, trita & oleo diluta instilla. Animalculum quod Intestinum terræ appellatur, coctum & excolatum instilla. Resinam & mel ac oleum pari mensura mista ac dissoluta instilla. Malū punicum dulce accipito, & execto eius vmbilico acinos eiecit: deinde passi cyathum vnum infundito, & atramenti sutorij triti obolos duos infarcito, & ad mediocrem crassitudinem coquendo redigito: ac tepido vñtor. *¶ Quæ Insufflantur.* Gallam tritam insuffla. Piper rotundum cum vino contritum insperge. Eodem etiam magis diluto pro insulili vtendum est. Omphacium & gallam torrefactam æquis partibus trita insuffla. Cinerulā cypriam laeuigatā insuffla. Vtendū ē deambulationibus, & ventris euacuationibus, & ciborum subtractione, & purgatione aurium diligentiore. *¶ Ad Aures Humectas.* Cæterū ad aures humore madidas, ita enim Apollonius appellat, subscripta pharmaca commoda esse ait. Misy in linteolo vsitum & cum ipso laeuigatum in

B sufflato. Galla vsita ac trita similiter vñtor. Spodio trito eodem modo: attamen in testa torrefactum & affuso oleo tritum insufflato. Cæterum eadem diligentia circa diætā vñtor.

Ad Auditus Grauitatem.

Porro in subfurdis, siue grauitate & difficulter audientibus, aut etiam surdastris appellatis, vtpote qui exiguas voces penitus non audiunt, magnas autem vix percipiunt, hoc ipsum symptoma valde suspectum habere oportet: paulatim enim augescens, temporis progressu perfectam surditatem inducit. Quapropter per hieram purgandi sunt, & per catapotia ex colocynthide: pituita q̄z eis per apophlegmatismos detrahenda, ac caput resiccandum est: omni q̄z modo curandum vt robur ei addatur, quemadmodum iam sæpe est demonstratum. Vtendum etiam attenuatoria victus ratione. Atq; in ipsam auriculam pharmaca conijcienda sunt, quæ crassos & viscosos humores findant ac secent attenuent q̄z: Quorum sylua eiusmodi est.

Quæ Apollonius in Primo Parabilem ad Auditus Grauitatem

Pharmaca conscripsit in hæc verba.

¶ Ad Auditus Grauitatem repentinam, & ex Doloze capitis obortam. Fomenta. Absinthium cū aqua decoquito, & per stipulam fomentum inde facito, quo modo aliàs per arundinem id fieri demonstrauimus. Baccis lauri aut folijs eiusdem in aqua decoctis similiter vñtor. Similiter ē origano, atq; item hyssopo. Aqua quoq; marina & aceto eodem modo. Eisdem aut & in olla coctis vtendum est. Fomentum verò per ollam quomodo fiat iam demonstratū est. *¶ Collutiones.* Aceto albo & aqua pari mensura cum nitro trito feruefactis ad plures dies eluito, atq; inde aqua simplici calida eluito. *¶ Insuffila.* Et sic ea quæ ad hanc rem descripta sunt infundito. Mārrubij succum & irinum vnguentum mista infundito. Fel tauri & capræ ac vnguentum rosaceum mista instillato. Ceparum succo & resina oleo dilutis æqualiter vñtor. Oleo nucum & resina mistis pariter vñtor. Alumen aceto dilutum instillato. Myrrham & alumen pari pondere trita & aceto diluta infundito. Adipem anserinum, & fel bouis, ac laurinū, pari mensura mista instillato. Hedera syluestris baccarum succū per linteolum expressum instillato. Veratrū nigrum aceto tritum, melle q̄z multum cocto exceptum in parua collyria ad formam glandis redigito, ea q̄z meatui indito, ac per dies quinque finito. Senectam anguium aceto tritam instillato. Eadem & cum felle bubulo, aut caprino, aut testudinis marinæ, aut collionymī piscis, diluta vñtor. Nasturtij quantum sufficit, & nitri parum, carne ficus reiectis granis excipito: inde q̄z collyrium auditorio meatui congruum formato ac indito. Per triduum autem ipsum eximito. Hoc multas fordes educit, & confestim leuius malum reddit. Cæterum reliqui corporis quoq; cura habenda est. Deambulationibus itaq; pro viribus multis vtendum est, & capitis reliquorum q̄z membrorum frictione. Insuper & apophlegmatismis, & collutionibus, quæ pituitam extrahere possunt. Cibis vtendum est copia moderatis, & ex genere eorum quæ facile exoluuntur, facile q̄z excernuntur. Plurimū autē auxiliatur in huiusmodi affectione constitutis spōgia tenuissimē contrita in orbem q̄z cōuoluta, melle q̄z imbuta & auriculæ indita. Idem remedium cōmodum est & ad carnē in auditorio meatu enascentem. Post hæc verò inquit vtendum esse ollæ fomento iam antè a se indicato. Indicauit autem hoc ipse inter reliqua auditis prælidia: verum ego ipsum velut a me condemnatum reliqui, propterea q̄ ad elotionem quidem præstet in aurium dolore, vtilitatem autē de se omnino nullā præbeat. Quapropter nunc ipsum apponā: verisimile est enim surdastros inde iuuari, vtpote qui cōtrarijs prælidis opus habeant his, qui aurium doloribus vexantur. In doloribus enim affectæ partes exquisita quiete opus habent: Surdastri vero vehementi motu, & ferè dixerim trāsmutatione in contrariam ei quæ iam adest affectionem indigent.

Fomenta ad Aurium Dolorem ab Apollonio his verbis conscripta.

¶ Fomentis porro vtendum est per spongas aqua calida imbutas ac sufficienter expressas. Item q̄z per cucurbitas affixas. Amplius verò & per vaporem ex arundinibus perforatis allatū.

Quinta Classis.

TTTTT

Oportet

*AP. adipem.

Oportet autem alterum arundinis extremum concavitati auriculæ congruens esse: alterum verò E in ollam perforatū operculum habentē, & vndiq; obturatā incumbere. Sit aut in olla absinthium in aqua feruefactum, quo vapor inde sublatus ad auditorium meatū perferatur. Similiter & per fermentum in veru assatum fomentum adhibendum est. Vehementer etiam subscriptus fomēti modus conuenit. Vrinam tauri maximē, aut certē bouis vetustissimam, in ollam nouam angustī oris infundito: & aceti tertiam vrinæ partem, ac myrtum contusam admisceto: deinde testas pro olla magnitudine satis multas, igni candefacias in ollam conijcito: postea q̄ hominē inclinatum apposita ad aurem olla fomentum admittere iubeto. Circum aurem verò fasciculum ex lana in orbem circumponito, ne videlicet circūlitæ partes exurantur. Utendum & farina hordeacea ac triticea in vino cocta: itē q̄ vnguento irino calido, gratia fomenti. Supernē verò auriculæ imponendæ sunt lanæ molles ac puræ, vino & oleo imbutę. Hordeacea itidem & triticea farina, aliquādo quidem per se cocta, cum vino & vnguento irino: aliquando verò columbino stercore, & aristolochia tenui, æquis partibus admistis. Confert autem & cibi abstinentia, & diæta tenuis, & alui euacuatio larga & memorabilis. Insuper & quies, ocium, capitis velamen. In potu aqua calida, aqua mulsa, ptisanæ succus cum melle, donec remiserint dolores.

Quæ Archigenes ad Auditus Gravitate ac Surditatem his verbis conscripsit.

F

¶ In auditus gravitate Succū corticis raphani cum rosacco aut cyprino tepefactū instilla. Aut galbanum cum aceto & melle feruefactum. Quod si surditas succedat, Veratrum nigrum erui magnitudine in cocto melle indito, ac donec quod impedit erodat finito. Aut vbi absinthij decocto elueris, mel & oleum instillato. Aut collyrio ex nitro ficu & sinapi immisso, per triduum id non extrahimus. Postea "verò acutis vocibus assiduis & vicissim grauib; inclamamus, & per turbam sonitu immisso malum depellere conamur. Post hæc & asphodeli radices oleo veteri incoctas vtiliter infundimus, caprina q̄ vrina assidue eluimus. Caterū surditate ex capitis dolore oborta, Raphani succum cum rosacco infunde. Aut foliorum cucumeris sylvestris succum. Aut castorium cum baccis lauri & aceto. Aut nigrum veratrū albo aceto irrigatum sub orobi quantitate cocto mellī miscens, glandulas q̄ componens impone.

Eiusdem de Corpufculus, quæ Auribus illabuntur.

¶ Quod si aqua in aurem illabatur, auxiliatur acetum, & altero pede affectæ auriculæ propinquo exilire, aliquid se ipsum reclinando, hoc. n. modo facile excernitur. Quin & exueto simplex pos, aut et per stipulam, egregie aquam extrahit: quod vbi factum fuerit, conscalpta per lanam auriculæ, ex p̄dictis vnguentis aliquod instilla. Si verò calculus, aut faba, aut con simile quippiam, G in auditorium meatum illapsum fuerit, eluito: aut lana circa auricularium specillum obuoluta, & resina tincta extrahito. Idem & per glutinosum aliquod pharmacum fieri potest. Quod si neq; sic sequatur, sternutatorio in nares iniecto os ac nares obturato: facta enim spiritus conclusi extēsiōne, id quod incidit efflatur: id q̄ assidue, donec excidat facito: si. n. intus manserit, aure inflammata conuulsionē inducet. Optimē et confert ad eorū quæ illapsa sunt eiectionem, concussio. Si itaq; puer fuerit, pede comprehensum & in caput eleuatum cum concussione vibrabis. Si verò perfectæ ætatis quispiam ita fuerit affectus, ipsum in tabulā secundū affectam aurem reclinatū caput ad tabulam firmare iubeto: deinde leuata tabulæ circa caput parte deferri finito, id q̄ sæpe repetito. Mouebitur. n. quod incidit, & ad expeditiores meatus partes progredietur: atq; ita angusta & concaua specilli parte immissa scitē extrahito. Si verò faba aut con simile quippiam in aurē illapsum in ea maneat, madefactum q̄ & tumefactum dolores inducat, impossibile quidem est ipsum integrū eximere. Quare per specilli concauū industriē partiri ac diuidere ipsum oportet, atq; ita particulatim extrahere: deinde sapam aut vinum dulce calidum infundere, ac lenire meatū ex lancinatione offensus. At verò si animal aliquod illapsum sit, scāmoniam aceto dilutam, aut absinthij succum, aut peucedani succum, nitrum q̄ ac sulfur cum raphani succo instillato.

H

Apollonij de Isdem.

Apollonius aut de iisdē sic scripsit. ¶ Ad Pulices & Vermiculos in Auribus, Reliquaq; earum poro illapsa. Acetū & oleū instilla. Aut capparis succū instilla. Aut amygdalas amaras terito, & oleosum ab ipsis expressum instillato. Veratrū albū tritū inspergito. Aut aristolochiā tritā inspergito. Aut calaminthæ succū infundito. Aut cinnabarim viridē instillato. Aut veratrū albū cū vino infundito. Aut aluminis, & seminis cucurbitæ sylvestris, siue medullæ eius, æquas partes tritas cū oleo cedrino instilla. Aut cepam tritā & œsypū æquis partibus in vino diluito ac infundito. Aut myrrhā tritā, aceto q̄ ac melle pariter dilutā, adhibe. Aut chalcitidē crudā tritam ac melle dilutā infunde. In vniuersum verò eximendū est quicquid in meatū incidit hoc modo. Per auriscalpiū nimirum aut volsellā, aut lanam mollem specillo obuolutā & resinatam, aut et quæ vncinum habeat tenuē appensum. ¶ Ad Aurium Sordem. Nitrum assatum tritum auriculæ inspergito, & acetum instillato, ac lana apposita per noctē finito: sequenti verò die aqua & oleo calido eluito. Caterū ad aquā in aurē acceptā cepæ succū & adipem anserinum tepefactum instilla. Aut mali punici nucleo carentis dulcis & acidī succum in æreo vase, donec duæ partes supersint, coquito: inde q̄ duas guttas instillato. Aut myrrham ex aceto & melle tritam infundito.

Auricularia

A. l. 3. f. 4. c. 1. c.
5. fol. 235. f.

*AP. hyssopū.

A

Auricularia Pharmaca à Critone conscripta his verbis.

C *Ad Sonitus aurium à morbis.* Absinthium in aqua decoctum pro fomento adhibe, & rosaceū cum melle instilla. Aut raphani corticis succum cū rosaceo instilla. Aut aloen cum vino & melle. Aut thus cum aceto & rosaceo in malicorio ad mellis spissitudinem coquēdo redactum. Aut hyoscyami succum cum rosaceo tepidum. Aut radicem calami viridis succum cum lacte. Aut rhamni succum cum celtica nardo. Aut gallam nigram cum pari myrrhā ex melle. Aut lycium cum vino mulso instilla. Aut vulpis adipem. **C** *Ad Dolores Aurium cū humiditate & purulentia.* Vini veteris sesquiunciam, mellis cortici 3 j, nitri rubri vnciæ dimidium, lycij indicij 3 j. Lycium cum vino & nitro tritum læuigato, ac mel admisceto: & in vitreo vase reposita infundito, hyeme quidem bis in die, æstate verò sæpius: & tōmentū lanæ conchylio infectæ indito. **C** *Ad Aures Purulentas.* Alumen scissile terito, & affuso aceto ad liquidiorē strigmento compagem redactum lana conuoluta excipito, & reliccata lana, ex ipsa in aurem indito: aut hoc ipsum pharmacū liquidum per lanam specillo obuolutam in aurem demittito, eam q̄ ex eo quotidie illinito. Expe-
dit & paululum passi adfundere, ne pharmacum exarescat.

* Al. uucisins
i. mæto
* abique.

† xpoat da ve
3 xpoat. i.
floccum vel fo-
mentum lanæ
conchylij.

Archigenes ad Aurium Affectiones Extra meatum.

B Cæterum ad affectiones aurium extra meatum auditorium Archigenes hæc conscripsit.

C *Ad Aures Contusas.* Myrrham, thus, thuris mannam, terram nigrā qua aliqui se tanq̄ smegmate confricāt, cum acri aceto probe vnita, cerati crassitudine imposito, & nequaquam amplius irritato. Aut cerussam & apij semen pariter accepta, cum melle obline: quidam absinthium pro cerussa scribunt. Aut sulfur viuum, myrrham, & thus, cum pice liquida in splenio imposito. Aut glutinum fabrilis & asphaltum siue bitumen eodem modo: quidam etiam mannam, hoc est thuris micas admiscunt. Aut cephalico Asclepiadeo emplastro vtire. Aut pastillis pudendis destitatis illine. Porro in quibus cōtusa sunt aures, intrinsecam expeditiorem concavitatem chartilagineam figulina terra expleto: & sequenti die, vbi exaruerit, solanum cum cerussa illinito, viquequo in integrum restituantur. Verum in aurium vulneribus & fissuris chartilagine probe coaptata fibulas imposito: deinde inflammationē arcenibus, & reliquo glutinatorio ductu, vitior.

* AP. εὐπρά-
σας, i. empla-
stri more illi-
nito.

At verò inflammata in aurium puerorum pulpis foramina, oleum, quod in ærea lucerna æruginē contraxerit, illinēdo perfanabis. Cæterum Asclepiades huiusmodi ad contusas & fractas aures cōpositione vsus est: Paruas cochleas vbi cum testis cōtriuieris, & rubrica tinxeris, appone.

Aliud. Aloes partem vnā, glutinis fabrilis cum aceto cocti partem vnā, mista imposito: aliqui

C manna siue micas thuris admiscēt. **C** *Epithemata ad Contusas Aures.* Cotyledonis herbæ 3 viij, amygdalarum amararum depuratarū drach. duas, tragacanthi drach. ij, aceto dilue: & visco quercino excepta, & linteolo infarta impone. Aut cera 3 viij, galbani 3 viij, t nucum amararum 3 viij, visci quercini 3 xvi, thuris 3 viij, misyos assati 3 viij: cōponito ac vitior. **C** Apollonius autem hoc modo tum aurium inflammationes in superficie cutis ex humorum impressione aut plaga obortas, tum tumores ac rubores, curauit. Butyrum recens excolatum instilla. Aut adipem anserinum, & lac muliebre mista instilla. Aut glandis vnguentariæ succum & resinam liquidam tepidam affunde. Aut adipem bubulum ac anserinum æquis partibus liquefactos instilla. Aut ocy-mi succum ac adipem anserinum æquis portionibus misce & instilla. *Aliud, quod illini potest.* Papa ueris succum aqua dilutum penna illinito. Aut crocum tritum & muliebri lacte dilutum illinito. Aut argenti spumam cum aqua & nardo tenui tritam illinito. Aut cerussam coriandri aut polygoni aut solani succo dilutam illine. **C** *Cataplasmata.* Absinthium tritum ex aqua pro cataplasmate impone. Aut sesamum aqua tritum impone. Lentem in aqua coctam ac tritam cum melle impone. Aut mali punici dulcis putamina cocta & trita in vino: hoc valde commodum pharmacum existit. Aut myrrham & adipem anserinum, vel butyrū, vel resinā, & conchilij par-

* AP. iiiij.
† xpoat, i. an-
tiquis cathry-
os.

* AP. putamen
mali graui.

D tem internam, æquis partibus trita, super aurē & propinqua tempora impone. Cōuenit aut ad hæc ciborū abstinentia, alui euacuatio, in super quies, & velamē capitis, & corporis requies. Longē verò remota esse debent ardor, frigiditas, balneum, vomitus, clamor, & omnis distenuo.

{ *Eiusdem* } *Ad Exulceratas ex plaga { in superficie } & Fractas Aures.*

C Panē calidū internum cum melle tritum impone. Myrrham cum vino veteri tritā illine. Cochlearum colla { vnā cū testis } terito: & dimidiā myrrhæ partem addito, ac imposito. Absinthij & apij seminis æquales partes tritas cum melle imposito. Picē circūline, & sulfur tritum, aut thuris micas insperge. Verū ne obliges ista, neq̄ frequenter repetito epithematum detractiones.

De Parotidibus.

CAP. 2.

P Arotides è genere quidem sunt inflammationum: fiunt autē glandulis circa aures affectis: non tñ in ipsis vtimur prima parte curationis partium inflammationum. In illis. n. vt plurimum curatione reprimēte ac repulsoria à medicis appellata vt conuenit: atq̄ id maximē, cū neq̄ malignū sit, neq̄ multum quod influit, neq̄ corpus humoribus ex æquo redundet. Sic nanq̄ spongia sola ex posca imposita incipientes inflammationes repressit, neq̄ quicquam ex eo totum corpus fuit offensus. Verum in parotidibus ipsum contrarium facimus, pharmaca attractoria adhibentes: atq̄ si hæc nihil memorabile efficiant, etiam cucurbitam affigentes, aut fomēta assidua adhi-

Quinta Classis.

TTTTT ij bentes

bentes. Annitimur enim vt affligens humor ex profundo ad cutem attrahatur, præsertim si in ca-
 pite affectio sit firmata, humoribus videlicet in ipso obfirmatis. Quin & cum citra capitis affe-
 ctionem in febribus acutis natura superfluos humores ex valis effundens, ad regionem inter cu-
 tem & subiecta corpora deponit, quando sanè & glandulæ ex effusis humoribus participant, me-
 lius vtique etiam tunc videtur naturam adiuuare per humorum ex loco in locum impetuofum il-
 lapsum febres curantem. At verò cum vehementi impetu fluxus illabitur, nihil nos curiosius
 agentes omnia naturæ permittimus. Si enim siue cucurbitam, siue aliud pharmacum humores
 ex alto ad cutem attrahens, admouerimus, vehemens dolor hominem apprehendit: vnde & vigi-
 liæ fiunt, & febres succedunt, ac vires exoluuntur. Mitigare itaq; tunc, & non humorum influxui
 opitulari conuenit, per cataplasmatum maximè lenientium vsum: Velut est quod ex frumenti,
 aut hordei, aut seminis lini farina, cum aqua mulsæ, aut sœnigraci, aut althææ, aut chamæmelorum
 decocto coquitur: & quæcunq; ad hoc quod moderatè humectam habent caliditatem, per quam
 mitigare dolores valent, etiam influentes humores concoquere possunt ac suppurare, quemad-
 modum de his in cataplasmatum tractatu sermonem fecimus. Quòd si etiam sanguis redunda-
 re videatur, per venæ sectionem ipsum euacuabimus, præsertim si id vires permittant. Nunc ve-
 rò ad pharmacorum compositionem progredientes, quam etiam à principio nos tractaturos re-
 cepimus, qua ratione tum compositio ipsorum, tum vsus constet, docebimus. Si itaque tumor nō
 discutitur, suppurantibus pharmacis vtendum est, velut est frumenti farina cum caricarum deco-
 cto & oleo. Item quod ex polline, & quod ex fermento constat pharmacum. Si verò suppuratæ
 fuerint parotides, tunc aut per sectionem pus elicere oportet, vlcusque velut in eiusmodi fieri mo-
 ris est ac omnibus notum curare: Aut sanè per pharmacum acre abscessum rūpere, quale est Smi-
 lium appellatum, & quod ex allijs constat: Aut tentare vt ipsum per medicamenta attractoria &
 tenuium partium vim habentia discutiamus, bis per diem ipsam ablatis, & fomentis admotis, do-
 nec remiserint & laxati fuerint dolores. Quando verò iam plurimum puris fuerit discussum, tūc
 iam primum semel soluere ea medicamenta, & fomenta adhibere oportet: deinde verò neque ex-
 re est id facere, sed ipsis pharmacis permittere, vt si quid reliquum in profundo hæreat, id ipsum
 discutiant. Quòd si duricies adsit, ea ipsa quoque mollienda est: quare hoc tēpore ex mista phar-
 macorum facultate compositio parabitur, emollientibus videlicet ad attractoria admistis. Post-
 quam verò omnis purulentia fuerit euacuata, & adhuc duricies aliqua relinquatur, emollientibus
 pharmacis vtendum est: quorum syluæ siue materiæ, itemque compositionis varietatem, in ma-
 lagmatum sermone demonstraui. Manifestum autem est, quòd moderatas parotidas, in qui-
 bus neque humorum multitudo redundans in particulas irruit, in tantum vt vehementes dolo-
 res excitet, neque caliditas cum humore adest, faciliè per hæc sanare possimus: neque enim ad sup-
 purationem festinant, neq; vehementem dolorem inducunt. Verum licet etiam fomentis ex mu-
 ria vti, & cataplasmata magis calefacientia q̃ & discutientia adhibere, & medicamenta eandem fa-
 cultatem propè attingentia. Cum verò pleriq; medici & parotidum pharmaca indistinctè con-
 scripserint, si quis prædictis in memoriam reuocatis ad eorum vsum accesserit, faciliè intelliget qui-
 bus tandem ad singulas parotidas vtendum sit. Verum præexercitabo etiam ego vos ad hanc rē
 per exempla, quæ Archigenes in primo pharmacorum secundum genus his verbis scripsit.

¶ *Archigenis ad Parotidas.* Parotidas dissoluere volentes plantaginem cū sale tritam assidue pro
 cataplasmate imponimus. Aut caprinum stercus ex aceto. Aut rumicis syluestris radices coctas
 in vino. Aut ficum tritam cum atramento sutorio. Aut ficum coctam cum absinthio & vino tri-
 tis. Aut buccina marina, aut purpuras vstas, melle aut axungia exceptas imposito, & confestim
 discutientur. Idem etiam ostreorum testa vsta & cum melle imposita facit. Aut ceratum rosaceū
 siue cyprinum ruta admista aut sulfure viuo addito emollitum, aut cimolia cum aceto. Discutit
 maximè ficus aqua marina aut muria cocta ac trita imposita. Idem facit & marrubium tritum cū
 sale. Et lana butyro imbuta ac imposita inchoatibus parotidibus opitulatur. Quemadmodum
 huic postremo loco ab eo relato rectè Archigenes discrimen apposuit, incipientes parotidas è bu-
 tyro opem sentire testatus, sic conueniebat ipsum etiam circa alia medicamenta vtendi tempus
 adijcere, velut ego paulo antè feci. Quin & circa hoc ipsum butyrum, non satis est ex solo paroti-
 dum principio facere discrimen, nisi apponatur num vehementer aut molliter concitetur, & num
 dolenter, velut cum pulsationibus & vigilijs infestet, an cum moderato dolore: Deinde qui sit
 morbi status: Num magna omnino laxitate opus habeat, an per minorem iudicari ac finiri pos-
 sit: tali nanq; suffecerit butyrum, in corporibus præsertim mollibus eunuchorum, puerorum, &
 mulierum, & eorum qui teneram habent carnem. Si verò cum vehementi dolore fiat, cataplas-
 mate dolorem sedante opus habet, simulque assiduo fomento vel per solam aquam, vel etiam
 cum exiguo iniectione ad eam sale. Quandoquidem verò primum omnium pharmacum conscri-
 pfit plantaginem cum sale, ab illo sanè etiam nos rursus initium faciemus, plantaginis naturam re-
 cordantes ex mistis facultatibus discussoria q̃ & repulsoria compositam esse. Ego verò nunquā
 pharmacis ad parotidas destinatis repulsoria admisceri operapretium existimo, præterquam si
 aliquando, raro tamen, ad multam discussoriorum copiam parum quiddam ex eis addatur, atq; id
 tum

A tum demum, vbi citra vehementem dolorem parotides irruant. Quod verò deinceps scriptum est, Stercus caprinum ex aceto inueterata ac indurata, nullum q̄z amplius memorabilem dolorem habentis parotidis pharmacum esse possit, velut etiam lienis in scirrhum indurati. Tertio deinde loco cōsequenter, Radices rumicis syluestris in vino coctas tradidit. Si sanè & qualitatem & ætatem vini apposuillet, fortassis & ego tentassem de eo iudicium ferre: Cum verò nō adiecerit, multum q̄z differat acerbum, aut austerum, aut acre, aut dulce, aut recens, aut vetus, aut crassum, aut tenue, aut fuluum, aut album, aut nigrū vinum esse, ob id etiam ego nihil habeo quod de hoc pharmaco dicam. At cū vobis hoc cognitū sit, q̄ maiori discutiendi vi præditum sit vetus, præsertim si ex genere natura calidiorum sit, velut sunt in totum fulua, contraria verò huic secundum vires tum austerum tum acerbum, huiusmodi quidem vinum vitare oportet. In fuluo verò & mediocriter vetusto, & tenuium partium, rumicis radices coquentes, in parotidibus citra vehementē dolorem abortis ijs vti poteritis. Scribit deinceps, Ficum tritam cum atramento sutorio. Discussoria quidem igitur & concoctoria facultatis est ficus, præsertim arida: recens verò discutiendi quidem vim habet, verū concoquere non potest. Verū atramentum sutorium nemo ignorat vtrasq; facultates fortes repulsiuam & discussoria cōplecti, quapropter etiam vehementia eius vitanda est. Cocta deinde fico nimirū arida, cum absinthio & vino tritis vti iubet. His sanè etiam vos vtemini in tempore, ad medias magnitudine ac tēpore inflammationes: quemadmodum ēt buccinis, & purpuris, & ostreis vstis, in durescētibus ac vetustis: est enim pharmacum quod oēm afflictionem & acrimoniā mitigat & discutit, non solum si melle quis eorum cinerem imbuat, sed & multo magis si adipē suillū insulsum, vetustū, & à fibris depuratum admisceat: citra oēm enim molestiam oēs inueteratas inflāmationes discutit, etiam si ex rheumatica afflictione sint abortæ.

Deinceps cerato rosaceo ēt cyprino cū ruta vti iubet: quod discussorium quidem pharmacū est, verū nihil vehemens neq; violentum in se habet. Paulo verò efficacior fit cōpositio, si sulfur viuū pro ruta admisceamus. Quæ sequitur deinde Cimolia cū aceto, neq; fortē, neq; dolorosam, neq; magnam parotidem curare potest. Ficus verò aqua marina cocta in inueteratis iam cōmoda fuerit, vtpote discussoria vi prædita, velut etiam si aquæ marinæ penuria muria quis vtatur. Simile huic est, quemadmodum etiā ipse Archigenes dixit, Marrubium cum sale. Posthæc verò de buryro scripsit, cuius vt vltimi circa illius dictionis ordinem paulo antè mētionem feci: Post quod rursus ad generosum pharmacū transiit, Pyrethrum tritum fico excipi iubens. Deinde calce viuæ cum melle trita vti præcipit. Et post hoc mustelæ sanguinis illinēdi meminit. At verò talia tan-

Cquam curiosa & superuacanea, & quæ magnā rei medicamentaria egestatē indicent, si per alia auxilia citra sanguinis mustelæ adhibitionem parotidas curare nequeat, neq; in vsum adsumpsi, neq; eorum experimentū habeo. Sed neq; ex amicis nostris quispiam alius vti tentauit. † Verū cerebrum illinire quodcunq; tandem, mediocriū parotidum medela existit. Post hoc verò hæc verba scribit: Aceto feruenti perfundito, aut spongiam in acida muria imbutam imposito. Fossorū ac messorū fortassis ea fuerit medela, non hominum vrbanoꝝ. Deinceps acris mentionem facit pharmaci ex mustela vsta, cuius cinerē cerato irino excipi iussit. Verū eiusmodi pharmacis, qn̄ diu durant, & in scirrhum indurantur, vtendum est: pleraq; enim ab eo scripta veterascuntium & agrè solubilem parotidum remedia existunt. Quapropter etiam ipse ad pharmacū hoc adiecit, quod etiam Strumas probè sanare possit. Post hoc verò eiusmodi dictio inordinate inserta est, tum assidua calidæ dispersio, tum assidua crudæ hordeaceæ farinæ impositio. Quod ipsum siue quis per se legat, siue prioris dictionis finem huius dictionis principium faciat, vtrunque malè dictum est. Manifestum verò hoc erit, vbi præcedentis dictionis finem præposuerimus, vt totus sermo eiusmodi fiat: Mirabiliter discutit & strumas, sæpe etiam parotidas, tum assidua calidæ adpersio, tum assidua crudæ hordeaceæ farinæ impositio. Etenim apertum mendacium est strumas datq; parotidas mirabiliter ex assidua aquæ calidæ aspersione, assidua q̄ crudæ hordeaceæ farinæ impositione, discuti. Si verò de parotidibus solum dicatur, certa distinctio aberit, quæ doceat nos in quibus & qualibus parotidibus aquæ calidæ aspersio, & assidua crudæ hordeaceæ farinæ adhibitio, conueniat. Non enim in omni, sed quam citissime velimus suppurari, hæc facienda sunt, quemadmodum in superiori sermone est indicatum. Hoc itaque vitiosè, vt dixi, interserum est.

Caterū Archigenes ad consequētia transgressus rursus pharmaca scribit, non apponens quod induratis & inueteratis parotidibus salutaria existant, cū nos ex materia ipsoꝝ ipsa talia esse cognoscamus. Adscribam autem iam vobis ipsius Archigenis dictionē, quæ sic habet: ¶ Propriè verò lupinorum amarorum farinam cum melle coctam, exigua calce viuæ addita, pro cataplasma te imposito. Egregiè discutit & hoc. Picis brutiæ, mannæ siue micarum thuris, equales partes: terebinthinæ, palmarum Syriacarum non vetustarum pinguium carnis puræ, vtriusq; duplum: chalbanī dimidium mannæ: probè vnitis vtitor: si verò dura sit, resinam misceto. Aut nitrum & rubricæ sinopidis tertiam partem cum vnguento cyprino ad strigmentitiam crassitudinem redacta, ac linteolo infarta imposito. Aut calcem viuam cum strigmentis eodem modo. Aut caricæ, chalbanum, nitrum, pari mensura: sulfuris tertiam partem: terebinthing, opopanacis, vtriusq; parum quiddam: vnitis vtete. Aut calcem viuam cum aceto tritam impone. Quod si neque per

Quinta Classis.

TTTTT iij hæc

*AR. vel

† τὸ δ' ἐγχεσθὲν κατὰ γὰρ εἰν οἷον δὲ ποτὶ τὴν ε. ἐστὶν ἰπρεσίς, ὡς τὰ σπύλιν cornar. ἰαντικὸς τὸ δ' ἐγχεσθὲν κατὰ γὰρ εἰν οἷον δὲ ποτὶ τὴν ε. ἐστὶν ἰπρεσίς, ὡς τὰ σπύλιν cornar. ἰαντικὸς τὸ δ' ἐγχεσθὲν κατὰ γὰρ εἰν οἷον δὲ ποτὶ τὴν ε. ἐστὶν ἰπρεσίς, ὡς τὰ σπύλιν cornar.

A. 1. 4. f. 3. c. 2.
B. 8. fo. 45 B. c

hæc discutiantur, adiuuabimus per mutationem in suppurationem per frequentia ex calida cru- E
da q̄ hordeacea farina cataplasmata. Dehinc rursus digerendum per largam & frequentē decocti
lauri aut baccarum eius perfusionē, aut sulfure, vel conlimili quopiam in aquam insperfo, siue ni-
tro, siue columbino stercore in ea admisto: aut etiam cucurbita cum scarificatione affixa. Deinde
ad chirurgiam perueniendū est, & crudi abscessus sectionē: optimū enim in his, vt quā celerri-
mē fluxio foras euellatur. Hæc quidem Archigenes scripsit. Sunt autē & multa emplastra quæ
parotidas discutiant, aliqua quidem iam inueteratas & induratas: aliqua verò eas, in quibus seda-
to dolore nulla amplius puris suspicio est: quemadmodum etiam aliqua quæ iam suppuratas cu-
rare possunt. Talia verò inter discussoria emplastra, singula cum virium suarum professione con-
scripita sunt: velut etiam ea quæ simplices parotidas curant, laxatoria appellata, omnibus nota sunt.
Exempla ipsorum sunt, Emplastrum Mnascæ, & quod ex succis constat, & quod ex ptisana. His
etiam præstant quæ molliora sunt, & cerati forma constant, cum ex butyro, tum ex ælypo confla-
ta, ostreis aut buccinis aut purpuris vltis additis, cuiusmodi est hæc: Adipis porcini veteris insulsi
quadrantem, quidam semissem: butyri vnciam vnam, ceræ sextantem & vnciæ dimidium, ostreo-
rum vltorum quā tenuissimē tritorum sextantem. Liquefabilia liquefacito, ostrea q̄ infarcito,
ac vnitis vtitor confidenter. Efficacissimum hoc ad parotidas existit. F

De Affectionibus Narium.

CAP. 3.

EX genere tumorum præter naturam Polypodes in naribus generantur: ex genere verò vlce-
rum Ozænæ. Secundum genus autem excretionum præter naturam Sanguinis eruptiones
fiunt in morbis acutis iuxta rationem earum, quas recentiores medici priuatim superexcretionem
appellant, nimirum in quibus natura ad iudicatorium auxilium concitata modū excessit. Primū
itaq; de ozænis sermonē faciam, quæ ex humorum acrium & putrescibilium influxu generatur:
ita vt si acres solū sint, ægrè curabilia vlcera producere consueuerint, non tñ graueolentia. Cæ-
terum cura cōmunis ambobus his est, item q̄ polypī, vt videlicet primū caput liccetur & firmet̃,
cū palām sit ob vitiatorum humorum redundantiam defluxum ex eo in nares prouenire. Quo
modo verò caput totum corroborare oporteat, quō nullum recrementum ex eo ad inferas partes
delegetur, sæpe iam dictum est. Cū igitur per illa caput validum reddideris, ad naris progredieris
curationem scopo in ozænis proposito, vt affecta pars per mistæ facultatis pharmaca tum repellē-
tia, tum discutientia reficet̃. Repellunt itaque tum austera, tum acerba, quæ communem ad-
stringentium appellationem habent: discutiant autem calida & sicca facultate prædita, quorum
fylua talis est. *Archigenis Pharmaca ad Ozænas.* Cū ozæna in naribus fuerit, calaminthæ suc- G
cū infunde. Aut ipsam calaminthē aridā per fistulam insuffla. Aut veratrum album cū seminis
nasturtij chema quotidie insuffla: post hoc verò caput perfunde. Obline autē eos vel chalcitide,
aut atramento sutorio, aut pſorico cum melle. Aut instillato in narem melle, & per sternutatoriū
facta concussione tectoria vlceri obducta excutito: deinde præscriptum ex nasturtio & veratro
pharmacum per narem attrahere quā plurimum iubeto: & postea amurcam cum melle illinito.
Aut myrrham & nasturtium cum melle. Aut ranunculi succum cum alumine liquido in narem
infunde, egrum q̄ resupinatum donec ad os penetret attrahere iube: atq; id vsquequo percuraue-
ris, identidem repete. Si verò vetera sint vlcera, etiam acetum vetus admisce, aut sulfur tritum.
Acres item acetum in vasculum angustī oris fusum ad multum tēpus ad respirationem ipsorū ap-
pone: deinde misy cyprium & dimidiū eius nardi Indicæ cum vino chio ad mellis crassitudinem
redige: ex eo q̄ meatus penna obline, & per lanam obtura. *Ad Vlcera in Naso.* Vlcera in na-
so ex malorum puniceorum succo in æreo vase ad medietatem cocto perline. Aut malū punicū
dulce integrum in vino coctum terito, & forinsecus imposito. Aut æris squamam & aruginē
cum alba viola ex aqua affricato. Aut rubi succum & alumen Melium cum aqua diluta eodem
modo. Si verò vetus sit vlcus cum aceto diluito. Aut itidem & sandaracham cum melle oblini- H
to. Aut adipem vitulinum & resinam illinito.

De Polypo Narium.

Polypus tumor est, qui præter naturā in naribus generatur polypodis carni assimilis iuxta sub-
stantiæ proprietatem. Manifestum itaque est affectionem hanc ex crassis & viscosis humoribus
generari: atque ob id mista materia medicamentaria opus habet, vt videlicet partim adstringat,
partim secet & attenuet, partim etiam discutiat, & condēset. *Archigenis ad Polypodas.* In po-
lypode nasturtij tenuis chemam siue drachmam dimidiam cum veratri albi obolis duobus nare
attrahere iube. Vbi verò exciderit, linamentis cum anthera siue florido emplastro ex melle vtē,
aut lycio eodem modo. *Asclepiades ad Ozænas & Polypos.* Asclepiades in quinto exteriorum
sic scripsit. *Aridum ad Ozænas.* Aluminis scissi drachmas quattuor, myrrhæ drach. iij, sanda-
rachæ drach. iij, gallæ drachmam vnam, † atramenti sutorij † vlti drachmam vnam. Tritis vtē, na-
ribus prius vino odorato elotis, & pharmaco per specilli extremum siue nucleū admoto. *Aliud.*
Seminis ericæ drach. viij, myrrhæ drach. viij, nitri rubri 3 viij, malicorij 3 viij, seminis tamaricis
drachmam vnam, crocomagmatis 3 ij: tritis vtē. *Aliud.* Soreos ægyptij friabilis 3 ij, chalcitidis
vstæ 3 ij, seminis tamaricis 3 j, croci 3 j, myrrhæ drac. j: tritis vtē. *Aliud.* Chalcitidis vstæ drach. ij,
atramenti

* Al. excidet

* AP. duas

† AP. çtis

A atramenti futorij affati 3 ij, misyos 3 ij, amomi 3 j, myrrhæ 3 iiij, croci 3 j: tritis vtere. *Alia Compositio, quæ Flavescens appellatur.* Aluminis scissi 3 viij, chalcitidis crudæ 3 vj, sandaracha 3 iiij, putaminis mali punici drach. ij, atramenti futorij vsti drach. ij, misyos affati drach. ij: tritis vtere. *Alia.* Atramenti futorij vsti drach. iiij, diphrygis drach. ij, calcis viuæ drach. ij, sandarachæ drach. ij: arida admo-ue, aut linamentum tortum aqua madefactum ac pharmaco imbutum inde. *Aliud.* Misyos affati drach. ij, mannæ thuris drach. ij, calcitidis affatæ drach. ij, squamæ aris sesquidrachmam, cruginis drach. vnam: arida adhibe.

*Aliter ii.

Lamponis ad Oxanas, Aegipolas, Polypodas, & Multa alia.

C Ad Oxanas & Aegipolas, ac Polypodas, & quæcumq; Velis cura sectionem ac vitionem submouere. Dirimit etiam Offa corrupta. Facit & ad Vlcera serpentia ac putrida inpersa: & ad sordida vlcera, linamento excepta ac induta cum melle. Scobis aris rubri vnc. j, salis ammoniaci sextantem, ammoniaci thymiamatis sextantem, aluminis rotundi quadrantem, acetii acerrimi heminas vj. Arida terito, & affuso aceto omnia in vas aris rubri transferto, in eo: que ad Solem sub caniculæ ardore cum aris rubri radio agitato donec pharmacum exarescat: deinde in mortarium translatum diligenter terito, & in ficuli recondito. Vsu verò exigente aquam absorbendam dato, deinde etiam in ore continenda m: phar-

B macum verò per fistulam insufflato. *Scribonij Largi, facit ad omnem Extuberationem.* Misyos vsti, chalcitidis vstæ, atramenti futorij vsti, sorcos, squamæ aris, singulorum 3 viij: arida admo-ue. Oportet autem præcedenti die quiescere, deinde sequenti pharmacum post cibum indere. Illinen-dæ etiam nares antea cum bitumine, aut liquida pice, aut myrrha stacte. *Philoxeni Chirurghi ad Polypodas, Oxanas, omnem Excrecentem carnem, Hemorrhoidas, & Quibuscunque crustam inducere Velis.*

l. l. s. fu. 2. t. 3.
o. 552 h

Aris vsti, auripigmenti torrefacti, misyos affati, singulorum drach. duas: diphrygis 3 iiij: chalciti-dis vstæ, atramenti futorij vsti, squamæ aris, singulorum drach. quatuor: tritis vtere. Cæterum post pharmacorum adhibitionem etiam sternutatorijs vtimur, quò videlicet tectoria vlceri obducta excutiamus, quæ tribus aut quatuor diebus ferè excidere consueverunt. Vbi verò exciderint, adipe anserino ac butyro cum rosaceo cerato curantur. Verum Asclepiades in primo pharmaco-rum exteriorum sic scripsit. *Asclepiadæ ad Oxanas, quo vsus est Meges.* Seminis ericæ 3 iiij, myr-rhæ 3 iiij, nitri rubri 3 iiij, putaminis mali punici 3 iiij, croci 3 ij, costi 3 ij: trita insufflato. *Aliud.* Alu-minis scissi 3 iiij, myrrhæ 3 iiij, sandarachæ 3 ij, rhois rubri drach. duas, salis fossilis drach. ij, costi 3 ij, croci drach. ij: trita insufflato. Ante curam verò nares vino odorato & optimo melle eluere cona-mur. *Ad Narium Polypodas, quo vsus est Antipater.* Aris vsti drach. iiij, minij sinopici drachmam

*Aliter i.

*Aliter i.

*Aliter iii.

C vnam, trita per arundinem insufflato. Quin & per specilli nucleum admo-ue. *Aliud Antony Musæ.* Atramenti futorij partem vnam, sandarachæ partem vnam, trita insuffla. *Aliud Chari-xeni post chirurgiam.* Cornu cerui vsti drach. iiij, squamæ aris rubri drach. iiij, auripigmenti drach. vnam, trita insuffla. *Aliud.* Bryoniæ radice vstæ drach. iiij, atramenti futorij drach. iiij, spumæ ni-tri drach. iiij, elaterij drach. iiij, trita insuffla. *Ad Vlcera in Naribus.* Recrementi plumbi, vini veteris, olei myrtei, singulorum æquales partes. Plumbi recrementum, vt quàm læuissimum fiat, terito: & adfuso vino, rursus laugato: deinde myrteum addito, omnia que simul misceto ac con-quassato: & in figulinū vas coniecta prunis imposito, assidue q; agitato: atq; vbi strigmentosum redditū fuerit pharmacū, sublatum in pyxide plumbea seruato. *Aliud.* Plumbi vsti & loti 3 viij, vi-ni rosati quātum sufficit, olei myrtei quod satis est: apparato, & vtitur vt dictum est. *Aliud.* Spu-mæ argenti drach. vj, cerussæ drach. viij, malicorij drach. iiij, aluminis scissilis drach. iiij, vini ami-næi quantum sufficit, olei myrtei quod satis est. Arida tusa & cribrata, in mortarium coniecta, cū vino ad strigmentitiam crassitudinem redigito: postea verò myrteo oleo affuso conquassato: & ablatis in pyxide plumbea reconditis, vt dictum est, vtitur. Sint autem myrtei heminae quatuor, vini cyathi. iiij. *Diogenis Pharmacum accommodatum.* Adipis anserini drach. iiij, æsypi sesqui-

*Aliter ii.

*Aliter viii.

D drachmam, medullæ ceruinæ drach. ij, ceræ tyrrhenicæ drach. viij, plumbi vsti & loti drach. quatuor, stibij vsti & loti drach. viij, ladani drach. ij, adipis vitulini drach. ij, terebinthinæ drach. iiij, cerussæ drach. ij, spumæ argenti drach. j, rosacei quantum sufficit. Liquida cum aridis committito, & repo-sitis vtitur. Vsu autem expetente quantum satis fuerit tollito, & rosaceo dilutum naribus sublini-to. Ex primo de Parabilibus Apollonijs. Ad affectiones in naribus. *Ad Narium Exulceratio-nes, & Putredines, ac Fætores.* Mali punici nucleo carentis dulcis item q; acidi succum in æreo vase, donec duæ partes superflint coquito: ac vtitur quā penitissime illinendo. Facit & malum punicū dulce cum vino coctum & contritum, & forinsecus impositum, atq; intro illitum. *Ad Excre-scentem carnem in Naribus & Polypum.* Diphryges tritum admo-ue, & linamento nares disparto.

Aliud. Veratrum terito, ei q; origani par pondus tritum addito, ac naribus bis in die insufflato.

Aliud. Veratrum nigrum cum pari sandaracha terito, & admisto oleo lana excipito, eo q; narem expleto. *Aliud.* Florem aris, & aruginem, ac silphij succum, pari mensura, oleo admisto terito: & ad vnguenti crassitudinem redacta ad dies quinq; naribus sublinito: deinde per vossellam eximi-to. *Aliud.* Auripigmentum & calcem trita cum specillo largè adhibeto. Vbi verò intumuerit & eleuatus fuerit polypus, veratro nigro arido trito moderatè vtitur: vt plurimum enim in diebus septem nasus vacuus redditur. Deinde diphrygis cum melle vsu expurgato. *Aliud.* Auripigmē-

Quinta Classis.

TTTTT iiij tum

tum & calcem ac veratrum album trita cum specillo admoueto. *¶ Ad ea quæ Naribus illabuntur. E*

† *Al. quibus
autē ego usus
sum.*

Quæ naribus illabuntur, auriscalpio aut volsella extrahito: aut sternutatorio admoto os apprehēdito, atq; alteram narem comprimito, si quidem non in vtraq; nare affectio existat. Hæc quidē Apollonius quibus ipse vsus est tradidit.† Verū vt ego vsus sum, & in polypis ac ozænis narium, probatissima repperi, subscripta: Ac primū quidem quod ex malis punicis cōstat pharmacum. Sint aut pari numero ac magnitudine ex tribus eorum differentijs accepta: aliqua enim ex his sunt austera, aliqua dulcia, & quædam acida. Contundenda itaq; sunt recentia & matura, atque integra diligenter confringenda, quò succus ex eis exprimi possit: quem in vase stanneo depositum adseruare oportet modicè coctum, si quidem liquidior q̃ oporteat videatur. Quòd verò ab eo reliquum est solidum & crassum, rursus diligenter contundendum est, vt à cōtusione rursus in pila atteri ac læuigari possit, inde q̃ collyriorum formæ effingi, quæ congruam ad ægri nares proportionem habeant. Induntur. n. hæc in naribus quam polypus obsedit, meatū, quò citra mordacitatem & consensum, qualem acris pharmaca excitare solent, per longiorem moram ipsum expurgēt. Quòd si humectior & mollior tibi appareat polypus, plus ex austeris malis punicis cōjicies: si durior, ex acidis. Quandoquidem verò perpetuò tolerare collyrium molestum est, ab eius vsu interquiescere conuenit, atq; eo tempore quo ipsum non indis, per expressum succum ægrum curare, & sanè oris diducto rictu hianti, etiam circa illas partes iuxta quas nasus ad palatum perforatus est, liquidum ipsum expressum pharmacum illinere vel cum penna, vel cum lana specillo duos nucleos siue cuspides habenti obuoluta. Cæterum ex aridis pharmacis diphryge citra mordacitatem aliquando per multum tempus consumptum polypum noui. Probatur etiam in ipsis prædictum collyrium ex malis punicis effectum, si vbi exaruerit, probè contundatur, cribretur q̃ ac leuigetur, inde q̃ insusilletur, aut etiam per specilli nucleū indatur. Omnia autem hæc assidue facere oportet, vt nunquā ab affecta parte pharmacum ablit, cum facile ab humiditate eluatur. Quemadmodum igitur in lippientibus, sic & in his semper, si possibile est, pharmacum adhibere oportet: abluuntur enim facile, vt dixi, ab influente humiditate. Porro cum eunuchus quidam nullius pharmaci ferre posset adhibitionem, sed ab omnibus iritaretur, rosas aridas cōtulis ac probè tritis atq; inditis, mirum q̃ viderim hominem magnopere citra omnem mordacitatem adiutum. Quare in corporibus mollibus & humidis, aut quibus ægrè vlcera ipsa sanescunt, rursus eodem pharmaco vsus sum: cōiungitq; ex duobus alterum, aut vt nihil noceret, aut omnino citra molestiam opus suū perficeret: pleraq; enim eorum quæ polypodas exterunt, eos exacerbant, vbi à scopo aberrēt. Cæterum vlcera in narium meatibus semper per pastillos curauī, Andronij videlicet, & Pasionis, & G Polyidæ, & Bythini, & per eum quem ego composui, his ipsis aliquando vino dulci dissolutis, aliquando austero, & quandoq; moderatæ ætatis, quandoq; veteri. Interdum etiam aceto dilui vel vinofo, vel simpliciter acido, vel etiam acri valdè & vetusto, iuxta prædictas indicationes, vsu pharmacorum secundum symptomata affectionum reperto. In diuite verò quopiam qui odoratū pharmacū sibi adhiberi expetebat in ozænæ curatione, hedychroi vsus excogitauī, ipsum q̃ vino falerno veteri dissolui, & mirū q̃ breui affectio ipsa sit curata. Relata est hedychroi compositio circa theriacæ antidoti descriptionem.

Heraclidæ ad eruptiones Sanguinis è Naribus ad Antiochidem.

CAP. 4.

Sufficienter quidem de sanguinis eruptionibus in curandi Methodi libris dictum est, verū nunc quæ ex sylua vsu cognita constant, & à prædecessoribus nostris approbata sunt, referentur. *¶* Vbi grumos sanguinis eduxeris, lanā specillo obuoluito, eam q̃ in lycio aqua diluto imbuito, & sanguine manantem locū illinito. Aut linamentū longum lycio imbutum indito, deinde forinsecus cum digitis apprehensum nasum comprimito, donec cōstiterit sanguis. Aut chalcitidem mediocriter læuigato, & linamentum ex ellychnio contortum in frigidam aquā demittito, deinde in chalcitide obuoluito. Aut linamentū priapi siue pudendi forma naribus indito. Aut linamento fissili vitior q̃ penitissimè intruso. Præstat aut digitum ad palatum immittere, ne eo linamentum fissile deferatur. Aut thus confringito, & polygoni aut seminis porri succo diluito, in eoq; linamentum fissile, aut ex ellychnio obuolutū, indito. Aut mentā tritam indito. Aut spongiam siccam immittito. Aut spongiam in acre & feruidum acetum coniectam imposito: & sanguine manantem narem specillo forinsecus donec impellat, apprimito. Præstat aut spongiæ principium filo per acum trāsmitti, quò facile extrahi possit: extrahito aut cum opus suum perfecisse existimaueris. Si verò inarescat spongia, intus q̃ agglutinetur, per auricularem clysterem frigidā aquam immittito, ac infundendo humectato, atq; ita extrahito. Vere ēt compositionibus vulnerrarijs & sanguinem sistentibus quæ describentur. Accommodatum est & frōtem spongijs refrigerare, item quæ partes quæ ad caput sunt sublimes facere: brachia autem & manuum iuncturas, fœmora q̃, & inguina, atque gēnuā, qua parte contracta sunt, deligare, quemadmodum in venarum sectionibus facere moris est: lubendi q̃ sunt vt ea membra moueant, manus quidem confricando, pedes verò ambulando: expletis enim sanguine quæ in eis sunt venis, nares sanguine manare cessant. In potu amplius exhibenda sunt ea quæ ad sanguinis reiectionem conscribentur. Aures quoque intensè per linteola ac ceram obturentur, & in ore aqua pluuiialis frigida contineatur,

A contineatur. Quod si quid ex sanguine deglutitum esse videatur, et id ipsum ubi multa eius sit copia, per euacuatium educito: in ventre enim & intestinis in grumos coactum inflationem facit. *¶ Pharmaca Asclepiade in quinto Externorum ad Sanguinis Narium eruptiones scripta, quæ Marcellus inscribit.* Platani pilulas collectas in umbra exiccato, & delicates super pannum asperum in discum distendito, eas quæ aspera ipsius panni siue tunice parte confricato, aut in panno ex pilis siue setis composito obuoluito: ac semen quidam pilularum abiectum, tomēta verò collecta in testaceum vas nouum reponito. Vsu autem experite ea ipsa lanuginosa platani tomēta in arundinem, cuius geniculi recti sunt, indito: & qua parte excauata est arundo, naribus imposito ac insufflato: cōpendio hoc vincit sanguinis eruptionem. *Aliud.* Atramentum sutorium diligenter tritum reponito: vsu verò postulante rasuram quæpiam linteolorum in pharmacum immersam indito. *Aliud.* Spongiam cruda pice imbutam exurito, ubi verò aliquid huius linamento torto exceperis, indito. *Aliud.* Putaminis oui partem i, gallæ acerbæ partem vnam, trita linamento torto aqua aut aceto madefacto excipito, & indito: frontem verò & nasum gypso aut luto figulino integito: aures autem fortiter continere iubeto. Quidam spongiam aphricanā aceto acerrimo incoquunt, deinde exprimunt, eam quæ in ignito lapide frequenter obuoluunt: atque ita suffitum & vaporem excitant, quem naribus attrahere iubent.

.1.3. f. 5. t. 1.
.9. fo. 241. a

B

Quæ Andromachus scripsit.

Ad sanguinis quidam ex naribus eruptiones nihil priuatim Andromachus scripsit. Verum inter ea quæ sanguinem cohibent, pleraque et hæmorrhagias narium sistunt. Quapropter et ego adscribam eiusmodi pharmaca, quo modo ab ipso descripta sunt. *¶ Compositio Ischemos, id est sanguinem sistēs, qua vtor.* Chalcitidis, misyos, mannæ thuris, singulorum 3 iiii, tritis vtor. *¶ Flaua, qua vtor.* Chalcitidis 5 centum, atramenti sutorii 1, misyos allati 3 viginti quinque, æris vsti 3 xii & dimidiam: tritis vttere. *¶ Ischemos magna.* Misyos cyprii 3 vii, atramenti sutorii 3 vii, corticis pini 3 iiii, squamæ æris 3 iiii: mannæ siue micarum thuris 3 iiii, alii 3 xv habent: æris vsti 3 xv, chalcitidis 3 xv: calcis viuæ drac. octodecim, alii xl: gypsi torrefacti 3 iiii, alii octo: tritis vttere. *¶ Ischemos Aphrodis.* Chalcitidis 3 vi, mannæ thuris 3 ii: resinæ terebinthinæ frictæ 3 iiii, alii tres accipiunt: tritis vtor.

* Aliis xii.

* Aliis viii.

* Aliis v.

GALENI DE COMPOSITIONE MEDICAMENTORVM LOCALIVM SIVE SECUNDVM LOCOS LIBER QVARTVS

ARGVMENTVM LIBRI

Agit de Medicamentis, quæ Affectis Oculis soleant adhiberi.

Doctrina Affectionum quæ in Oculis fiunt, inter quas etiam de Pharmacis acrimonia carentibus, & Meatus obducentibus, & de Alijs omnibus.

CAP. 1.



D

Non equidem alia est componendi, alia vtendi methodus in his pharmacis. Ipsa. n. compositio velut ad usum relata conficit, ita ut ij qui pharmaca componunt, scopum habeant vtilitatem ex usu ipsorum emergentem. Verum quemadmodum in alijs, sic etiam in his affectionibus quidam indefinite pharmacorum vsus scripserunt, verbi gratia: Quod ad dolorem accommodatum est hoc pharmacum, non apponentes affectionem in qua dolor sit obortus. Quidam verò et affectiones adscripserunt, alii quidem magis iuxta experientiam: alii autem magis secundum rationem: iuxta experientiam quidem magis, quicumque ex conspicuis circa oculos signis discrimen fecerunt: Secundum rationem verò magis, qui ex obscure apparentibus, aut neque in totum apparentibus idem fecerunt. Conspicue itaque apparet fluxus multus & modicus, mordacitas & lenitas, rubor quæ plus aut minus, velut itidem venæ paucæ & multo sanguine plene, et inflammationis tumor minor aut maior. Quemadmodum et colores præter naturam variegati, & oculorum sordes siue lemæ plures aut pauciores, aut minores, aut maiores, progredientes. Apparet item nobis manifeste asperitates in palpebris oculorum. Quid verò attinet dicere, quod & vlcerum & pustulæ tum secundum locos, tum magnitudine, non paruum differentiam habent, item quæ quæcunque eius generis alia existunt: Quin iuxta alium sanè modum ex eorum, quæ conspicue apparent, numero sunt et ipsi adeo dolores. Nihil enim interest siue nobis siue ægris appareant: etenim quod dolent, & quo modo dolent, quippe quod cum compressione, aut tensione, aut obturatione, aut corrosione, aut quibusdam pulsationibus dolent, nobis aperte denunciant. Cæterum eiusmodi discrimina non apparent (velut alii qui scribunt) ad fluxum, qui ab iis quæ intra cranium id est caluariam sunt: aut ad fluxum, qui ab iis quæ extra cranium sunt: aut etiam per Iouem ad eum, qui ex arteriis aut ex venis affertur. Et cum quidam dicant distensionem aut obturationem in profundo oculorum esse, humoribus videlicet crassis, aut viscolis, aut multis impactis, nullum symptoma adeo ægros grauat, velut vehemens dolor

DE COMPOS. PHARMAC.

dolor circa quodcunq; tandem membrum, non sanè circa oculos solos, adeo vt mortem aliqui vltro elegerint, melius fore rati hanc semel obire, q̃ vnum integrum diem dolorem ferre. Ego verò cum in alijs quibusdam, tū duodecimo de curandis morbis Methodi in vniuersum manifestè scriptum de differentia affectionum, in quibus vehementer dolēt, tum quæ causa vniuscuiusq; ipsarum existat. Scripti item in decimotertio eiusdem operis omnia, quæ necesse est medicum de oculorum affectionibus nosse, & quæ ad ipsarum curationes requiruntur. Referam nihilo minus tamen & nunc breuibus, capitibus tantum repetitis eorum, quæ ad præsentem tractationem vtilia sunt, hoc est eorum quæ cum materiæ medicæ doctrina coherent. Nam & liquores, & succi, & semina, & fructus, & plantarum particulae ocularibus compositionibus induntur, veluti etiam non pauca ex ijs quæ metallica appellantur, aliqua quidem extremè austera & acerba atq; acria: aliqua verò his moderatiora, & tamen fortia: quemadmodum item aliqua omnis mordacitatis expertia ac lenissima per lotionem reddita.

De Pharmacis Mordacitatis Expertibus, ac lenibus.

Pompholyx igitur lota nulli pharmacorum mordacitatis expertium inferior est: atq; ob id ea vtitur ad tenues & acres fluxiones, capite videlicet prius simul'que vniuerso corpore euacuato. At verò manifestum est quòd per venæ sectionem ac purgationem totum corpus euacuamus, per apophlegmatismos verò caput à pituita vindicamus. Potest enim pompholyx lota, quemadmodum etiam spodium, atq; amyllum, simul et moderatè humores resiccare, simul q̃ ne per tuniculas
* euacuetur ea, quæ in magnis ipsorum venis superflua humiditas continetur, prohibere. Quare si quis prius q̃ caput ab humoribus ad oculos defluentibus expurget, obturantibus pharmacis vtat, vehementem dolorem ex distentis tunicis efficiet, & ex multitudine influentium humorum aliquando rupturam aut erosionem ipsorum inducet. Eiusdem generis cū prædictis pharmacis subtenuis ouorum liquor existit, ex redundanti potens humiditates abluere, & exasperata oblinere. Verum obturandi meatus vim cum illis æqualiter non habet, sicut neque vim resiccandi. Atqui fœnigræci succus quod ad viscositatem attinet, similis est albo ouorum liquori: discussoriam autē habet facultatem, & moderatè calfactoriam, atq; ob id multos dolores mitigare consuevit.

De Pharmacis Acribus.

Prædictorum pharmacorum sylvæ secundum genus maximè contraria acrium liquorum materia est, veluti liquoris cyrenaici, & medici, & sagapeni, & euphorbij, atq; simpliciter loquendo omnium vehementer calfacientium citra exasperationem. Atq; hæc ipsa sylua non solum in liquoribus, sed & in succis, & seminibus, & floribus, & plantarum fructibus continetur. G

De Extergentibus siue repurgantibus.

Tertio consequenter post prædictas fortis facultas est extergētium pharmacorum, qualis squamæ æris est, & chalcitidis vstæ, & æris vsti, item q̃ floris eius, & misyos, ac foreos, item q̃ stibij.

De Erodentibus.

His adhuc aliud quid genus adiacet erodentium videlicet, quale est auripigmentum, & sandarachæ, & Asiæ petrae flos: participat & misy paululum eiusmodi facultate.

De Astringentibus.

Est & aliud genus pharmacorum quod in oculares compositiones iniicitur, eorū videlicet quæ natura adstringunt. Quæ igitur mediocriter hanc vim habent, influxiones repellunt: quæ verò vehementer, amplio rem dolorem infligunt tunicas exasperando, q̃ iuuent influxionum impetū repellendo. Miscet aut aliquando vtiliter ex eis parum quid in compositiones oculorum aciem exacuentes, vtpote quæ oculorum substantiam cogant & adstringant. Verum quæ mediocriter adstringunt, lippitudinibus commodissima existunt: conferunt autem & reliquis ferè omnibus affectionibus cum vlcerum, tum pustularum, tum fluxionum. Sunt verò eiusmodi, Folia rosarum & flores & succus, ericæ q̃ fructus, & nardi spica, amplius q̃ & malabathri folium, & crocus, & lyciū, H & quæ hypocyrtis appellatur. Porro vehementiorem his adstringendi vim acacia habet & omphacium, quæ & ipsa in succorum genere numerantur. Item balaustium, & cytini, & gallæ omphacitides, ex genere eorum sunt, quæ multum adstringunt.

De Concoquentibus.

Inflammationes, item q̃ alias affectiones cōcoquunt hæc, myrrha, crocus, castorium, & thus, & fœnigræci cocti succus: quæ etiam discussoria vi prædita sunt, & præsertim ex eis myrrha. Atque hæc quidem est ocularium medicamentorū sylua. Et quicumq; sanè naturali intelligentia præstāt, ratiocinatione q̃ exercitati sunt, nihil amplius opus habent mea instructione, potentes nimirum ad singulas oculorū affectiones aptum componere pharmacum. Quandoquidē verò pauci tales existunt, & multorum vtilitatis potiore rationem habere conuenit, præstabilius mihi visum est compositionis ipsorum rationem integrè recensere, vbi repetiuero prius perspicacitatis gratia cōmunem in genere vim singulorū quorum mentionem feci pharmacorū: Quæ vniuersim quidem in quinto de simplicium pharmacorū tractatione cōmentario à me relata est, & per consequentes sex libros particulatim vsq; ad extremum. Vtar aut appellationibus facultatū in pharmacis, iisdem quas in prædicta tractatione posui: Velut exēpli clarioris gratia, quædā substantia terrestri dico,
citra

A citra refrigerationem manifestam aut caliditatem, in medio quodammodo vtriusq; consistentia: atq; ex his aliqua quidem parum quid ex frigiditate aut caliditate complectuntur, aliqua vero in totum nullam eiusmodi facultatem ex se ostendunt: Totum aut hoc genus pharmacorum emplasticum, hoc est meatus obducens & obturans, appellari, contrariam vim habens iis quæ ab obturatione liberantia ephrastica sunt appellata: qualis est Samius alter, magis tenuium partiū existēs q̄ quæ simpliciter Samia terra appellat: & pompholyx lota, velut ē cinis eius lotus, & cadmia vltia ac lota. Videtur autem mihi parum quid exterforium in ipsa cadmia inesse, siue post vltionem, siue citra eam lauef. Pompholygi vero & spodio parum quid adstringens inest: quemadmodum etiam plumbo post vltionem & lotionem, nam & hoc pharmacum omnis acrimoniæ expers est parum quid adstringens habens: neq; refert siue masculino siue muliebri genere pompholygem dicere velis. Eodem modo etiam amylum habet: quod et ipsum lotum exquisitè mordacitatis expers est & medium, vt neq; adstrictionem neq; acredinem habeat, hoc est neq; frigiditate neque caliditate participet. Quin & cerussa lota proxime ad facultatem vlti ac loti plumbi accedit: manifestum q̄ signum stringenti exhibetur, q̄ penitus qualitatis omnis expers sit, id quod amylum, & samius alter, gustu & odore ostendunt. Vniuersum igitur huiusmodi pharmacorum genus, siue

B exiguum in gustu aut odore qualitatem exhibeat, siue penitus nullam ostendat, consimiliter vt purissima aqua qualitatis expers nominatur, & per solam terrestrem substantiam moderatè à natura resiccat. Quapropter etiam longiori tempore commoditatem ex se proficiscentem sensui perceptibilem faciunt, vtpote quæ per primos dies nihil iuuissè putentur. Adhibentur tamē à medicis tanquam acrimoniæ expertia circa agrè curabiles affectiones, in quibus vlcus est siue solum, siue cum erosione corniformis tunicæ, & prolapsu viformis appellatæ, serosis humoribus longè mordacissimis affluentibus: In his enim nullum aliud pharmacum conuenire potest, vtpote cum adstringentiā cohibeant effluentes humores, atque per hoc dolorem ex mordacitate ipsorum obortum intendant: Acria verò affectionem simul adaugeant, siue in solis oculis affectio sit, in eiusmodi malum habitum partibus perductis, vt quod influit corrumpant: siue etiam ipsum quod influit vitiatum sit, aut propter solum caput, aut etiam ob totum corpus, tale existens. Vnde etiam affectā partem quò ad curationem apta fiat præparamus, tum totius corporis purgationibus, tum reuulsionibus, primum quidem ad infernam corporis partem, deinde etiam ad occiput, & capitis cutē.

l. 3. f. 3. r. i. c.
fol. 222. g

Vtimur etiam sectionibus arteriarum quandq; retro caput, porrectas iuxta aures arterias incidētes. Excidimus quoq; partem arteriarum in temporibus, tantum vt curemus in tunicis oculorum

C factam affectionem, ob quam etiā bonus sanguis per venas ad ipsas tunicas delatus corrumpitur. Ad has igitur affectiones solas conuenire videtur prædictorum medicamentorū genus, citra mordacitatem resiccans in affecta parte vitiatos humores, qui vt dictum est, id quod influit corrumpunt. Adstringentium enim facultas neq; resiccat talem affectionem, cohibet que mordacium humorum serosorum effluxus: Calidorum verò & acrium facultas, non solum nihil iuuat, sed etiam simul auget mordacium humorum qualitatem. At verò relaxantium ac discussoriorū pharmacorum vis euacuare quidem potest quod generatur: verum vlcusculum neq; renutrire, aut ad cicatricem perducere potest, neque quod procidit retrudere & concludere: Quemadmodum etiam neque concoquentium facultas id præstare potest, etiam si concoquere affectiones non paruum commodum complectatur: ex eorum verò genere sunt crocus, myrrha, & thus, quemadmodum dixi.

Quid porro dicere refert de his pharmacis, quæ acidas aut amaras habēt vires, q̄ mordacia & exacerbatiua eiusmodi affectionum existant? Verum his adhuc ampliore malitia prædita sunt, quæ nitrosam, aut salinam, aut austeram vim habēt. Reliquum igitur est genus id quod vlcera cum acrifluxione curare potest, eorum videlicet quæ paulo antè mordacitatis expertia pharmaca dixi, quæ longiori tempore affectæ partis vitiatum humorem consumunt. Appellantur talia à medicis Collyria lybiana, & cygni, ob colorem quidem album, qualem etiam cygni habent, prævalente in ipsis amylo, & terra samia, ac cerussa rhodiaca. Nam & aliàs optima hæc est, & colore albidior ac leuior, magis q̄ tenuium partiū, quàm quæ in alio quopiam loco conficiantur. Ceterum in quibus alia pharmaca prædominantur, colorem iuxta suam ipsorum substantiam efficiunt, veluti si quis albo colori paucum cœruleum admisceret. Hęc ipsa verò collyria quidam in cotibus terunt boni succi lacte ex nutritum vberibus instillato, vt obductoriā meatuum vim quæ in ipsis ouis est euent, cum in lacte serosa quædam exterforia vis contineatur, cuius vsus congruens est ad propositam curationem. Relatum enim in tertio curandi methodi est, quòd vlcera explēda citra acrimoniam extergentibus medicamentis opus habeant. Quòd si huiusmodi lac haberi nequeat, per fœnigræci decoctum collyria terere præstiterit, vtpote quod exterforiam quandam vim habet, qua oua ipsa in totum carent.

† Additur in
antiquo codi.
p. 222. r. l. 116
notis.

De Aspritudinibus Palpebrarum.

Cū agrè curabiles prædictæ affectiones existant, adhuc molestius se extendunt, vbi accesserint aspritudines palpebrarum, à quibus etiam in lippitudinibus oculorum tunicæ concisæ dolore affliguntur. Verū in illis audemus ad inflammationi propria pharmaca miscere paulū quid de extergētibus, velut est collyriū ex vino aspritudinibus accommodatum, quò primum ea quæ palpebris succreuerint,

succreuerint, deprimantur: vbi verò inflammatio oculorum mitior euaserit, aspritudines repurgētur: In his verò qui vlcus habent cum mordaci fluxione, impossibile est eiusmodi vti pharmaco: corniformis enim tunica amplius erodetur, & vniuersalis magis procidet, & vehemens dolor hominem apprehendet, augebitur q̄ malignitas fluxionis. In huiusmodi itaq̄ affectionum complexu medici ad consilij inopiam redacti solum remedium velut in desperatis reppererunt, vt palpebras ipsas inuerfas citra pharmacorum vsum repurgent & abstergant, Aliqui quidem specilli cōcauto superficiem deradentes, deinde molli spongia id quod defluit excipientes, palpebras q̄ q̄ ad reliquum aspritudinis ad æqualitatem redigentes: Aliqui verò ēt marinorum quorūdam animalium coria in superficie aspera in eiusmodi vsum congruē adsumunt. Quidam ex præceptoribus meis etiam ex pumice collyrium fecit, atq̄ eo versis palpebris aspritudines deradebat. Manifestum est aut̄ pumicem exquisitè læuigatum esse oportere, atq̄ vbi id factum fuerit cum tragacantha aut gummi in collyrium formari. Ceterum vbi temporis progressu per prædicta collyria fluxio fuerit sedata, audemus iam pharmaca quæ extergant palpebris ad mouere, parum tñ quidpiam ex eis principio admiscendo: qđ vbi homo perpeti posse videbit̄, paulatim copiā augebimus. Postq̄ verò palpebræ moderatè habuerint, & fluxus fuerit reliccatus, caua vlcera collyrio ex thure explere oportet, ita vt in principio pauillum collyrij ex vino ei admisceamus, & paulatim eius copiā extendamus, vt ne palpebræ amplius tunicas oculorum infestent, & vlcera munda reddita exactè impleantur, & ad cicatricem perducantur. De his itaq̄ sufficiēter dictum est. Transeundi enim iam tempus ad reliquas oculorum tum affectiones, tum pharmacorum ad easdem compositiones.

De Lippitudine siue Ophthalmia.

CAP. 2.

EXordium autem à frequētissima oculorum affectione sumam, quam propriè ophthalmiam, hoc est lippitudinem, appellant. Est autem velut didicistis, inflammatio tunice os capitis & caluariam ambientis. Neq̄ refert si pelliculam quis, aut quocunq̄ tandem nomine appellare velit. Vocant autem & membranam agnatam, propterea qđ alijs quæ oculum ipsum constituunt, tunicis forinsecus agnata sit, ligamentum existens toti oculo ad circumfusa ossa: & ob id omnia quæ circum circa oculos sita sunt vsq̄ ad malas qñq̄ in vehemēti lippitudine simul attolluntur. In propatulo itaq̄ est omnia pharmaca huiusmodi affectionem curantia sub communem omnium inflammationum curationem cadere, assumere q̄ necessariò quippiam pro partis ipsius natura, quæ excellentem mollitiem & ad hoc vt lædatur aptitudinem super omnem totius corporis cutem nacta est propter sensus subtilitatem & substantiæ raritatem. Adhibenda sunt aut̄ pharmaca repulsoria nō exasperantia, hoc est non vehementem sortita adstrictionem, sed quæ tum propria sua substantia sunt moderatiora, tum lenitiui liquoris admistione adhuc magis talia fiant. Lenitiuos autem liquores dixi oui candidum, & fœnigræci decoctum, & ad hæc amplius ipsum lac: in quo prouidum esse conuenit, vt iuuenulæ simul q̄ boni succi fœminæ existat, vberibus ipsius in cotem in qua collyrium teritur expressis, quò calidum adhuc oculis infundatur. Ceterum hoc in vehemēti dolore afflictis, aut propter inflammationis magnitudinem, aut ob influentium humorum acritudinem, facere cogimur. Vt plurimum verò albus oui liquor cum accommodatis pharmacis lippitudines curare sufficit, per collyria videlicet Monohemera hoc est vnus diei, appellata. Adeo. n. hæc non parum sæpe magnas inflammationes mitigauerunt, vt in vesperam quidem homo balneo vteret̄: in sequenti verò die nardino collyrio ad instauratorem & corroboratorem inungeretur. Admiscere aut̄ ei circa primam inunctionem minimum quiddam acrium & sistendum medicamentorū oportet, & circa secundam paulò amplius quiddam priore. Sufficiunt. n. hæc duæ pharmaci adhibitiones & deambulatione aliqua non multa ante balneum. Porro collyria Monohemera appellata, quædam priuatim faculenta dicta multam in se habent acaciam: quædam siue omnino exiguum, siue neq̄ in totum habet. Complectunt̄ aut̄ alia quidem æris squamam: alia verò æs vstum exiguum additis multis alijs quæ mediocriter adstringunt, & concoquunt, & discutiunt. Talia aut̄ sunt, crocus, myrrha, lycium Indicum: & castorium quidem, & thus citra adstrictionē concoquūt simul q̄ discutiunt. In quibus igitur adstringentia prædominantur, plurimum oui liquorē, et paucissimum pharmacum esse oportet, præsertim si quid ex metallicis pharmacum in se complectat̄: In quibus verò crocus, & myrrha, castoriū q̄ ac thus, & lycium perualeant, paulo crassiore pharmaco vtendum est. Fomentum præterea omnino adhibendum est ipsis per spongiā, si quidem mediocris sit dolor, semel aut bis in die: si verò vehementior dolor vrgeat, prestat ter aut quater & sæpius vt̄ in longis præsertim æstiuis diebus. Fiat autem fomentum per meliloti & fœnigræci decoctum. Delippitudine itaq̄ satis dictum est, deinceps de vlcerebus dicam.

De Vlcerebus Oculorum.

CAP. 3.

VLcera oculorum eandem fm genus curationem requirunt, quam alia vlcera, eam videlicet quam per longum in tertio & quarto curatiuæ methodi recensui: verum ob partis naturam q̄ lenissima adhibenda sunt, ex quorū numero id quod ex pōpholyge lota cōstat esse dixi. Admiserunt̄ eis ēt succi quidam non solum oīno mordacitatis expertes, sed qui ēt vehemētissimos dolores mitigare possunt, velut est mandragoræ succus. Quidam ēt polygoni succū admiscuerūt, quē admodum alij ipsorum etiam ouorum candidum. Manifestum verò est, qđ vbi iam propemodum instat

A instat tempus præparandi pharmacum, tum demum huiusmodi admiscenſi, propterea q̃ facile aceſcant. Eodem tempore etiã roſarum additur ſuccus. Cæterum ſylua medicamentorum quæ proprie ad oculorum vlcera pertinet, itidem ſcopum habet, vt vlcus mundum ſeruetur, vtpote partium natura ipſum explente, & ad cicatricem perducente, quemadmodũ in alijs vlceribus eſt prædictum. Si itaq; inflammatio adhuc circa oculum exiſtat, aut quiſpiam etiã dolor, collyria ex thure, & metallicis lotis, & ſuccis mordacitatis expertibus adhibenſi: vbi verò ſordida reddita ex eorũ vſu vlcera fuerint, de repurgantibus quippiã admiscere oportet, quale eſt paccianum ex vino croceum, quo vtimur, minimum quid ex eo prædictis pharmacis addentes. Habet aut̃ hoc plurimum in ſe crocum, vnde et̃ croceum appellat̃: habet et̃ ex repurgantibus metallicis aliqua, quapropter et̃ aſpitudines extirpat non paruas modò, ſed magnas, quas ſycoseis Græci à granorum ficus ſimilitudine appellant: attenuat item pterygia hoc eſt oculorũ vngues. De his itaq; medicamētis paulo poſt dicitur. At verò vlcera quæ per eroſionem tunicæ corniformis fiunt, vt etiam ex vniſormi quid pronuat, manifeſtum eſt q̃ tum propter ſe ipſa, tum ob prolapſionem repellētib; & adſtringentibus pharmacis opus habent. Conandum eſt aut̃ vt ex ipſis eligamus quæ nullam aſpitudinem faciunt. Verũ his contraria pharmaca, hoc eſt diſcuſſoria, puſtule expetunt, & pus quod intra corniformem eſt generatum. Recentia igitur & adhuc inflammata pharmacis ex myrrha, thure, & croco ſedantur: vetuſtiora aut̃ ex diſcuſſorijs et̃ quid depoſcunt, quemadmodum item indurata inflammationes tunicarum. In his enim & per acres liquores hæc ipſa pharmaca in collyriorum formam redacta proficiunt, & quæ priuatim à medicis inunctiles liquidæ compositiones appellantur, quales et̃ in iis qui ſuſfuſionis principium ſentiunt, apparāt. In pterygijs verò & ſycoli repurgantia, vt dixi, pharmaca adhibentur, partim in collyriorum formam reducta, partim arida citra alicuius figuræ inductionem: in quibus aliqui et̃ ex erodentibus pharmacis aliquid addiderũt. His vicina ſunt quæ ſcabras in palpebris affectiones perſanant, atq; ob id pſorica appellantur. Fortiſſima verò omnium ſunt quæ antiquos callos liquefaciunt, & quæ pterygia dicta curant, ex repurgantibus & erodentibus medicamentis conflata.

De Ocularium Pharmacorum Viribus.

CAP. 4.

Porro cũ iam omnium ferè in oculis affectionum, pharmacorum que eorundem, ſecũdum genus expoſitionem fecerim: relata q̃ ſint à me pharmaca ſecundum genus mordacitatis expertia, qualia ex lotis metallicis componi dixi: melius fore mihi videtur ſi etiam aliorum oculariũ pharmacorum vires exponam. Ex hoc enim exiſtimo ad componendum promptiores futuros, & de iam compoſitis foelicius iudicatuſſe eos qui in ipſis fuerint exercitati. Cum igitur mordacitatis maxime expertia ſint pharmaca quæ dixi: ſint q̃ acrimoniæ ois expertes tres liquores, quorũ primus ſœnigræci decoctum erat, alter lac, tertius tenuis ouorum liquor: in hoc genere eſſe exiſtimandum eſt tum gummi, tum tragacantham. Et niſi prædicta tria copia q̃ & vlu prompta & expedita eſſent, poſſimus parum gummi aut tragacanthæ in multa aqua maceratum in eundẽ vſum velut illa aſſumere: ita vt per ipſa in medica cote collyria tereremus, et per ſola etiam inſuſa ſeroſos in affectis oculis generatos humores elueremus. Sed tamen etiam nunc ipſis circa omnia ferè collyria vrimur: pauciſſimis enim demptis, omnia poſtquam trita ſunt, moderatè his ipſis pharmacis maſefacta excipiuntur. Vnum ſanè hoc genus ocularium pharmacorum numeretur, in tribus liquoribus, tragacantha q̃ ac gummi, & lotis metallicis, contentum. Alterum verò genus eorum eſt, quæ exiguam habent mordacitatem, propterea quòd quædam eis admiſta ſunt quæ parum adſtringunt & extergent: qualia pharmaca ſunt roſæ & thus, roſæ quidem paucam habentes adſtrictionem, thus verò modicam vim extergendi. Et cũ thus mediocriter calida vi præditum exiſtat, eam ob rem habet quid concoctiorum, & quod dolorem ſedat. Ex eodem genere cum ipſo, quantum ad concoctionem & diſcuſſionem attinet, cenſendus eſt crocus & myrrha: quæ inter ſe in eo differunt, quòd crocus moderatè adſtringat, myrrha verò citra adſtrictionem non ingeneroſè diſcutiat & reſiccet humiditates. Sunt que ſanè hæc viribus præſtantiora thure, & ob id etiam maiorem diſcutiendĩ vim habent: verũ exterſoria vi carentia, ad vlcerum curationem thure inferiora exiſtunt. Huius generis medicamentorum, concoctiorii inquam & diſcuſſorii, Lycium quoque eſt & Caſtorium: neque obſcurum eſſe puto, Indicũ lycium à me dici, non hoc quod apud noſtros populos provenit. Proximè verò ad horum facultatem accedit Sarcocolla dicta, quæ concoctiorium & diſcuſſorium eſt medicamentum: atq; ipſa magis adhuc Galbanum prædictas vires habet. Meliloti verò decoctum ad concoctioriam facultatem aſſumplit etiam quid adſtrictorium, eiũdem ferè generis cum croco exiſtens. Inicitur etiam in oculares compoſitiones lapis Hæmatites appellatus, humores reſiccandĩ vim habens, velut & Cadmia. Mitius autem pharmacum lapis ipſe quàm cadmia exiſtit, vtpote ex humida ſubſtantia, non terreſtri, velut cadmia, generationem adeptus. Hanc enim eius naturā indicat ſolutio, quæ fit in medica cote, cũ per attritionem cum liquore quopiam in ſuccum reſoluitur. Quin & cũ ſolus per ſe citra liquoris alicuius aſfuſionem teritur, non in terreæ fragmenta diſſoluitur velut cadmia, ſed in æqualium partium & cohærens corpus. Conſimilis ſubſtantia ei eſt & lapis Schiſtus appellatus, ſed fortiorem facultatem habet. Quòd verò Subium appellatur, illorum quidem fortem

ex

ex se ostendat adstringēdi facultatem: lotum verò exoluitur, vt propè ad mordacitatis expertium E vim accedat. Vchemētē aut extensoriā facultatem Æs vñtum habet, item q̄ Squama eius & flos. Neq̄ minus efficax, sed minus mordacitatis expertus Chalcitis vñta est. Quod si lauentur talia phar maca, extensoria quidem adhuc manēt, tanto aut efficacia imbecilliora, quantū mordacitatis magis expertia sūt. Huius generis sunt etiā Misy & Ærugo, fortissima pharmaca ijs quæ sycosi & callis conueniunt admitta. Quidam verò ipsis ēt gallas iniecerunt, vehementer adstringens pharmacū: quemadmodum aliqui chalcanthū neutro genere appellatum, atq̄ ēt, vt aliqui vsurpant, chalcanthum tum masculino tum muliebri genere, quod ad adstringendum vnā cum acredine vehemētissimum inter hæc omnia pharmacum existit. Manifestum est aut q̄ multo moderatius redditur vñtum & lotum. Ad hanc syluam pertinet ēt Stomomatis squama. At Thuris cortex adstringit quidem & ipse non ingenerosē, verūm prædictis omnibus longè inferior est. Atqui & Misy ipsum tum ad easdem affectiones, tum amplius ad scabras palpebras quidam in collyria miscuerunt. Qñquidem verò & Mannæ quidam mentionem fecerunt, & videt aliquibus nihil à thure trito ac læuigato differre, cognosse operæpretium est, q̄ mannam propriè appellāt, id quod excussum est à thure circa magna onera confracto: auferuntur, n. simul ab ipso fragmenta quædā parua corticis thuris. Quare à thure differt tale pharmacum in hoc q̄ parum quid adstrictorium adsumplīt. F

Quæcunq̄ igitur ex adstringentibus multam terream compagem habent, aspritudines & sycoseis ac callos consumunt. Cæterum quæ ex succorum genere sunt, velut Omphacium & Hypocistis, eluuntur facili in subliationibus diffuentia simul cum lachrymis. Ex hoc genere est & Glau cium & Acacia. Citra mordacitatem verò extergit cerui Cornu vñtum, velut ēt caprarum. Dictū est autem & Thus ex talium genere esse, verūm hoc, velut dictū est, oīno exigua participat extergendi facultate, doloris sedatiuum & concoctorium existens. Cornua verò prædictorum animalium extergendi quidem vim habent, sed neq̄ dolorem sedant, neq̄ concoctoria facultate prædita sunt, frigidi nimirum & sicci temperamenti existentia. Habet aut & quod Armenium vocatur, extergendi vim, quemadmodum & Atramētum Indicum appellatum, & ob id sanè vlceribus inflammatione carentibus citra molestiam adhibet. Mistæ verò quodammodo facultatis est Aloe, veluti etiam Rosa: habet enim quid in se amarum, quod extergendi à natura aptitudinem habet: inest autem ei etiam quid adstrictorium, vt committat & ad cicatricem vlcera perducatur.

Quæ ad Scabras Affectiones conueniant.

Ex pharmacorum ad scabras in palpebris affectiones cōuenientium numero sunt Sales ammoniaci: & Lapis alius tum ipse, tum flos ipsius: & quod psoricum appellatur, non simplex neq̄ spō G te naturæ productum, sed præparationis modum quendam habens: quem etiam Dioscorides cōscripsit, & alii ferè omnes, qui de medica materia commentati sunt. Admiscetur his & Misy vñtū, & Sandaracha, & quod à veteribus Græcis Arrhenicum, nostro verò æuo Arsenicum appellāt. Ex medicamentis verò aromaticis id est odoratis Casia, & Malabathri folium. Quin & Amomū, & Cinnamomum quidam ocularibus compositionibus admiscuerūt, cum disculforiam quidem vim habeat cinnamomum, reliqua verò etiam adstringendi facultate participant. In cōmuni porro de omnibus repurgantibus siue extergentibus & rhypticis à Græcis appellatis medicamentis, id nosse oportet, tum eis quæ moderata sunt, tum eis quæ sycoseis & callos consumunt, q̄ hæc omnia etiam ad cicatrices crassas conueniant. Attenuant enim ipsarum crassitudinem, et substantiam superficiē deradunt ac remouent.

Quæ Induratis auxiliantur.

Compositiones quæ ad induratas oculorum tunicas conueniunt, ex succis constant & ammoniaci thymiamate, quemadmodum ēt antea dixi. Miscentur aut eis moderatiora quædam, quæ viribus eorum tamen non oblucentur, myrrha videlicet, & thus, & galbanum, alia q̄ consimilia.

Quæ Suffusis conueniant.

Ad suffusos verò quidam medici liquida pharmaca composuerunt. Ac prima ferè omniū compositionum est, Quæ ex fœniculi succo, et hyænæ felle, ac melle attico constat: quidam verò etiā caprinum fel addiderunt. Verūm postea alius aliud fel admiscuit, alius galli, alius viperæ, alius testudinis marinæ, alius callionymī piscis. Nunc verò in pretio est Pharmacum ex felle scarorum: quæadmodum et Quod ex myrrha stacte constat. Promissiones itaq̄ omnium horum pharmacorum magnæ sunt: verūm effectus aliquando nullus, aliquando valde exiguus.

De Aridis Medicamentis Oculis conducentibus.

CAP. 5.

EX præscripta materiæ medicæ sylua composita sunt à medicis pharmaca arida, quæ priuatim ab ipsis arida collyria appellantur. Quorum aliqua quidem callos & sycoseis consumunt, excrescentem itē iuxta nasi angulum carnem encanthida appellatam, & pterygia quæ ēt vngues dicunt. Aliqua verò scabris palpebris conueniunt & ad palpebrarū defluuia, quæ Mylphæ appellantur, cōducunt: verūm aliam ab acribus collyriis facultatem habent, vnde ēt à quibusdam medicis Apodacrytica id est delachrymatia, & repulsoria appellātur, velut ēt ipsa collyria visa sunt appellari. Ex his aut pleræque etiam obtusè cernentibus siue per ætatem, siue crassitudinem aut frigiditatem humorum in oculis, aut ēt flatu caliginoli redundantiam, id contingat, non parum profunt.

Aliqua

A Aliqua deinde ex aridis pharmacis affectionē aliquam in oculis congregari prohibēt, impediēdo videlicet influxiones humorum, ex quibus oculi ladi cōsueuerunt. Prestantissimum verō horum apparuit, & experientia iudicatum est, quod ego composui, & ob id apud multos in vsu est, ac ferē per oēs gentes, quibus imperant Romani. Ac primū sanē ipsius compositionē scribam, cū prestantius putem esse nullis omnino affectionibus corripī, q̄ eas quæ iam præoccuparunt optimē sanare. Qñ verō ēt Asclepiades plurimam q̄ & optimam tū aridorum tum liquidorum collyriorū cōscripsit sylvam, ab aridis primū initio factō: & ego sanē mihi rectē facturus videor, si cōsimili scribēdi ordine vtar. Quare vbi meum aridum adscripsero, deinceps oīa quæ Asclepiades habet in primo externorum quem Marcella inscribit, iuxta ipsius ordinē subiungā. Et post hæc cataplasmata oculis accōmodata agglutinatoria q̄; et inunctilia pharmaca ab Asclepiade descripta adiciā. Præstabilius. n. mihi videtur & istorum ordinem in scribendo seruare, atq; ita ad collyria ac liquida pharmaca transire omnibus appositis, velut Asclepiades ipse recensuit, illius ipsius verbis.

Pharmacum Aridum ad Tuendam Oculorum Valtudinem à me compositum.

Vtilissimum sanis oculis præseruatium ego cōposui pharmacum, quod oēs iam in vsu habēt. Vrit Lapis Phrygius in minutas partes contractus, vt maior tñ sit nuce quæ pontica à quibusdā vocat̄, ab alijs nux parua. Modus vrendi idem qui in alijs est, lapide in ollulā nouam coniecto, deinde q̄; ollula forinsecus luto circūlita operculum perforatum vel in solo vertice: vel quod melius est, ēt circa alias plures partes imponimus, quō per ipsa foramina fuliginosæ & fumosæ eorum quæ vruntur exhalationes facilius efferant̄. Postq̄ verō totus lapis ignitus factus fuerit, tum sanē ollulā in purum quoddam vasculum euacuare oportet, butyrum q̄; infundere nō vetustum, et circūagitare vsti lapidis partes, donec oēs extinguant̄, atq; tunc cessare: Et sic rursus easdem in ollulam coniectas vrere, rursus prunis candefactis ab igne ollulam imponēdo, vt nihil fumosum in se habeāt: ventilatione ēt easdem excitare cūuenit, quō citius vstio perficiatur: Deinde cū iam igniti facti fuerint lapides, & nulla amplius fuligo effertur, rursus eosdē eximere oportet, & vino falerno extinguere, aut aliquo fuluo & odorato, velut est imolites ariusium q̄; & lesbium: Deinde rursus in ollulam coniectos tertio vrere: et postq̄ ignitus fuerit lapis, rursus extinguere melle attico nō multo: reddetur. n. pharmacum non aridum, sed viscolitate aliqua præditum. Cæterum pluribus diebus trita & prælauigata in promptu habere oportet, ita vt in tenuissimum puluerem redacta sint subscripta. Aeris vsti 5 j, quod est 3 viij: piperis albi tantundem: folii malabathri tantundem: stibii hemiolium, quod est 3 xii: his admisce lapidis vsti lib. j. Et postq̄ omnia probē fuerint laeuigata, & Creponere medicamentum velis, adice opobalsami Syriaci sesquiunciam, quod totum 3 xii facit. Sit verō opobalsamum tenue, & pellucēti compage, non crassum, quemadmodum solet in valis circa fundum considere ac spissari: quod. n. ita crassum est, ariditatem pharmaci impedit. Porro vsus ipsius ad solas palpebras cōpetit cum specillo inducti, citra tunicarū ipsius oculi contactum. Vt plurimum itaq; sufficit circa solam infernam palpebrā specillum inducere. Nihil verō vetat ēt supernam palpebram similiter illinere, vbi præsertim pharmaco opus fuerit, hoc est vbi iam manifestē perturbationem quandam perceperit oculus: non tñ expectare conuenit donec id fiat. Verūm præoccupare oportet circa primū affectionis sensum, in omni tpe diei, ēt si quis biberit & coenauerit. Et planē frequens eius competit vsus cum cautione, vt dixi, ne tunica oculorum eo contingantur. Oportet aut̄ & eum cui induci pharmacum palpebras exertas & extentas exhibere, & cū inungitur nequaq̄ cum ipsis nictare. Hoc sanē pharmacum à me compositum est, non permittens eum qui ipso rectē vtatur oculorum lippitudine apprehendi. Deinceps verō quæ ad affectiones comoda sunt medicamenta conscribam, initio ab iis quæ Asclepiades scripsit factō.

Arida Pharmaca ad Oculos ab Asclepiade conscripta.

CAP. 6.

IN primo libro Pharmacorum externorum quæ Marcella inscribit, in hunc modum hæc verba scribuntur. **C** Aridum ex pforicis Heraclida ad Circumwos oculos Angulos. Spodii cyprii 3 iiii, omphacii aridi 3 duās, nardi obolos iiii, piperis fricti grana quindécim: tritis vt̄re. **C** Pforicum ^{* AP. vnam.} *Achy.* Cadmiæ drach. iiii, aeris vsti drach. ii, cum aceto in Sole terito, & reliccato: rursus q̄; laeuigatis & repositis vt̄itor. *Aliud.* Cadmiæ 3 j, aeris vsti drach. j, nardi indicæ drach. j, piperis fricti obolos duos: tritis vt̄re vt pharmacum vehemēter commodo. *Aliud.* Chalcitidis partes duas, cadmiæ partem vnam, tusa & cribrata terito in Sole adiecto vino sufficienti: deinde reliccato, & laeuigatis repositis vt̄itor. **C** Ex libris Philoxeni aridum Achariston. Cadmiæ drach. ii, chalcitidis drach. octo, aloes obolos ii, æruginis obolos duos, piperis grana x, florum rosarum drachmam vnam: tritis vt̄itor. **C** Eiusdem ad Lippitudinem siccam, & Sycosin, Putrescentia, & Excrecentem carnem. Cadmiæ drach. decem, chalcitidis drach. octo, piperis grana xv, nardi celticæ drach. vnam. Cadmiā & chalcitidem cum vino terito: atq; vbi exaruerint, nardum & piper inuicito, ac in puluillum redactis vt̄itor. *Aliud.* Cadmiæ drach. viginti, chalcitidis drach. quadrāginta, nardi indicæ drach. duas, myrrhæ torrefactæ drach. duas, piperis grana trigintaquinq; cum aceto acerrimo apparato. **C** Capironis ad Lippitudines siccas, & Oculos humeflos, ac Angulos circumwos, & Palpebras ficosas. Cadmiā cypriam ad polentā magnitudinem confringimus, deinde attico melle subactam in vasculum fictile coniicimus. Huius autem ore obturato ac luto circumlito, foramen iuxta medium oris facimus,

* AP. vnam.

* Alo. octo.

* Aliiter octo

* Aliiter duas

mus, quò id quod affatur inde transpiret. Ipsum verò vasculum intra prunas erectum statuētes suc E centis prunis vrīmus. Atq; vbi exignitum fuerit, exhalationum per foramē elatarum animaduer- sionem habemus: quæ si nigriores efferantur, amplius vrīmus: cum verò albidiores apparuerint, affationem sufficien- em factam putamus: ablato q; vasculo & dempto operculo cadmiam vino Italico extingui- mus, & in pilam translatam terimus, resiccatam q; ad pharmaci confectiōem re- ponimus, quæ hoc modo habet. Cadmiæ 3 viij, æris vsti drach. viij, stibij drach. viij: tritis & abla- tis vtēre, cum specilli extremo palpebris manē & vespere ex eo sublitis. *Aliud.* Cadmiæ vsta ve- lut prædictum est, drach. viij, æris vsti drach. viij, stibij drach. iij, armenij drach. ij: tritis & repositis vtitor. Nos cadmiā & reliqua adipe viperæ excepta assauimus, deinde vino extinctis ac tritis vli su- mus. *¶ Pharmaca ex lapide Hæmatite ad Scabras Palpebras accommodata, Capitonis ocularij.* Cadmiæ cy- priæ drach. xxiiij: lapidis hæmatitæ drach. vi, in alio exemplari drach. xvi: æris vsti drach. xxiiij. Ari- da ad polentæ magnitudinem contunduntur, melle q; excepta velut prædictum est, affantur, ac vi- no extinguuntur: deinde resiccata leuigantur. Vfus demonstratus est. *Aliud.* Cadmiæ drach. xx, æris vsti drach. x, lapidis hæmatitæ drach. x, tomentorum purpuræ laconicæ drach. viij: melle exce- pta & vsta composito vt dictum est. *¶ Sossandri ad Palpebrarum defluuia, & Inueteratas affections. Fa- cit & ad Excrecentem iuxta Nasi angulum carnem.* Cadmiæ, stibij, chalcitidis crudæ, misyos peregrini, singulorum drach. viij: contusa & melle excepta velut dictum est, affato: deinde vino extincta trita q; & resiccata reposito, ac vtitor. *Aliud.* Chalcitidis crudæ, cadmiæ, stibij, misyos peregrini, singulorum 3 viij: nardi indicæ drach. ij, croci torrefacti drach. ij, piperis drach. i. Metallica melle subiguntur ac vruntur, vt dictum est: deinde vino extinguuntur & teruntur: adijcitur q; his nar- dus, & crocus torrefactus, item q; piper: postea verò simul læuigatis ac repositis vtīmur. *¶ Phar- macum Calliblepharon Exornandis Palpebris accommodum. Facit & ad Inueteratas Lippitudines.* Stibij vsti ac vino extincti drach. xvi, plumbi vsti & loti drach. viij: fuliginis thuris, spicæ nardi, myrrhæ tor- refactæ, croci, squamæ æris, singulorum drach. j. Omnibus tritis ac repositis vtitor. *Aliud ex croco.* Croci vnc. j, glaucij vnc. j, sarcocollæ 3 j. Ego etiam opij vnc. j adieci. *¶ Aliud Seuerianum.* Cad- miæ vsta & lotæ sextantem: † salis ammoniaci, piperis albi, vtriūque sextantem: 3 folij, drach. ij: probè tritis vtitor. *¶ Aliud Pueris maxime commodum.* Stibij drach. xvi, plumbi drach. viij, squamæ æris drach. j, croci 3 j, florum rosarum 3 vnam, myrrhæ drach. vnam: nardi indicæ, thuris masculi, pi- peris albi, singulorum drachmam vnam: palmularum officula decem. Omnia in figulinum vas coniecta diligenter affato: deinde in pilam translatis ac tritis opobalsami cochlearia duo adijcito: conuassato, resiccato, & vtitor. *¶ Aridum Philoxeni ad Pruriginosos ac circumfros Angulos. Facit & G ad Obtusum Visum.* Cadmiæ drach. quatuor, salis ammoniaci drach. ij, piperis albi drach. 3 vnam: tri- tis vtēre. Ego hæc ita adparo. Cadmiæ 3 viij, croci 3 ij, piperis albi drach. j, salis ammoniaci 3 ij, nardi indicæ 3 j: tritis vtitor.

Liquide Oculares Compositiones ad Ficosas eminentias, ac omnem Extuberantiam carnis. Facit & ad Carnem circa Nasi angulum excrecentem, & ad incipientem Lippitudinem.

CAP. 7.

Compositio qua vsus est Philippus in Cæsaria. Misyos affati drach. viij, myrrhæ drach. iij, cadmiæ drach. viij, croci drach. ij, salis ammoniaci drach. ij: nardi indicæ, piperis albi, vtriūq; drach. vnam: mellis attici cyathum vnum. *Aliud.* Mysios affati drach. vi, atramenti sutorij drach. qua- tuor, myrrhæ drach. iij, æris vsti drach. vnam, mellis attici cyathum vnum. *¶ Panchrestos id est omnisarij vsus, Erasistrati, ad Aspritudines, ac omnes Lippitudines, Aures q; purulentas, & ad Vlcera ægrè recipiē- tia cicatricem, & ad Nomas hoc est Vlcera serpentia oris.* Æris vsti drach. 3 duās, myrrhæ drach. vnam, pi- peris obolos duos, mysios affati drach. vnam, croci obolos iij, vini Chij heminam vnam, 3 passi cre- tici heminæ dimidium. Arida terito affuso vino: atq; vbi imbibitum fuerit vinum, affunde etiam passum: & conuassata in æreum vasculum transferto, ac ad lentum ignem coquito: deinde in py H xidem æream reponito. *¶ Ad Callos & Omnem eminentiam.* Æris vsti drach. ij, mysios vsti drach. vnam, myrrhæ drach. vnam, croci drach. vnam, omphacij drach. vnam, vini Chij cyathos duos, mellis attici libram dimidiam: vtitor. *¶ Philoxeni Liquida Visum exacuens, Cicatrices et Callos exterit.* Ammoniaci thymiamatis drach. iij, æruginis drach. ii, vino diluta & cōtrita melle attico excipito. *Aliud.* Ammoniaci thymiamatis drach. 3 xii, æruginis drach. vi, myrrhæ drach. ii: composito vt dictum est. *¶ Aliud Phædri Rhinion id est limula.* Ammoniaci thymiamatis drach. 3 quatuor, ærugi- nis drach. vnam, alcyonij torrefacti drach. vnam, floris lapidis alii obolos tres: composito ac vtitor vt dictum est. *Aliud.* 3 Ammoniaci thymiamatis drach. viij, æruginis drach. viij, floris lapidis alii drach. ii obol. ii, alcyonii drach. vnam obol. ii, opii sesquidrachmam, myrrhæ sesquidrachmam: composito ac vtitor vt dictum est. 3 *¶ Aegyptia ad Callos & Albugines, aufert etiam Pelliculas conse- sum.* Æruginis Corinthiæ drach. vi, ammoniaci thymiamatis drach. vi obol. iiii, salis fossilis 3 iiii, medullæ colocynthidis drach. 3 quatuor, fellis taurini drach. 3 ii. nitri nigri sesquidrachmam, pipe- ris albi grana quadraginta, mellis attici cyathos sex. Composito vt dictum est, & in pyxide ilicea reposito vtitor. *¶ Alia Aegyptia ad Callos & Albugines, ac Inueteratas affections.* Æruginis drach. vi, ammoniaci thymiamatis drach. vi, medullæ colocynthidis drach. iij, fellis taurini drach. ii, nitri nigri

† AP. salis am-
moniaci vnc. i,
piperis albi sex
tantem.

A * Aliter duas

B * AP. vnam

C * *Al. γλυ-
κῆος οἶνον i.
dulcis vini.*

D † *Al. iiii.*

E * Aliter vnā.

F † Codex anti-
quiss. Venetorū
hæc cōpōnē ha-
bēt. Ammonia-
ci thymiamati-
tis 3 viij, ærugi-
nis 3 vi, floris
lapidis alii 3 ii
obol. ii, alcyo-
nii 3 i obol. v,
radiculę 3 i o-
bol. ii. *Aliud.*
Ammoniaci, 3
i obol. iiii, opii
sesquidrachmā,
myrrhæ sesqui-
drachmā: com-
posito & vtī-
tor vt p̄dictū ē.

Alii codi. ita
habēt. Ammo-
niaci thymia-
matis, 3 viij, æ-
ruginis 3 vi, flo-
ris lapidis alii
3 ii ob. ii, alcyo-
nii 3 i obol. v,
struthii 3 i ob.
ii, salis ammo-
niaci 3 i ob. ii,
opii &c.

G * Al. iiii obol.
iiii.

H † *Al. iiii.*

A nigri drach. ij: excipe mellis attici cyathis sex, & vttere. *Compositio Exacuens Vifum, faciens & ad Glaucedinem, Antony Musæ.* Fellis perdicis syluestris partem vnam, in alio exemplari succi herbae perdicij, aliqui succi centaureæ partes inij, mellis attici tantundem. *Aliud.* Fellis gallinæ veteris partem vnam, succi centaureæ partem vnam, mellis attici partes tres. Facit ad glaucedines. *Compositio Larys Exacuens Vifum.* Succi fœniculi radicis partem vnam, mellis tantundem. Reponito in pyxidem æream ac vtitor. *Aliud.* Succi radicis fœniculi partem vnam, succi chelidonæ tantundem, mellis attici tantundem. *Ally Galii ad Suffusiones.* Fellis testudinis marinæ 3 viij, mellis attici tantundem, fellis taurini 3 ij, croci 3 ij, opobalsami 3 ij: contulis vttere. *Casu ad Suffusiones.* Fel taurinum in æream pyxidem euacuatum per dies decem finito: deinde myrrhæ, croci, vtriufque 3 ij: opopanax 3 ij, opobalsami 3 ij, piperis grana xij, mellis attici duplum omnium accipito: omnia que cum felle misceto, & in æreo vase coquito: deinde in ærea pyxide repositis vtitor. *Quida Basilis hoc est regina: hanc Reparatricem appellamus.* Omphacij 3 ij, myrrhæ 3 ij, fellis aquilæ 3 ij, opobalsami drach. ij, lachrymæ oleæ drach. ij, ammoniaci thymiamatis drach. j, fellis hyænæ 3 ij: excipe melle attico. *Aliud.* Omphacij drach. ij, myrrhæ drach. vnam, salis ammoniaci 3 j, croci 3 vnam, opobalsami 3 j, lachrymæ oleæ 3 j, ammoniaci thymiamatis 3 j, fellis hyænæ 3 viij: excipe attico melle.

B In alio, olei veteris cyathos duos. *Antony Musæ.* Fellis hyænæ 3 vnam, fellis vrlî drach. ij, opobalsami drach. ij, salis fossilis 3 j, croci drachmam vnam, myrrhæ drachmam vnam, mellis attici cyathos duos, succi fœniculi cyathos ij. *Philoxeni.* Fellis hyænæ sesquidrachmam, adipis viperæ sesquidrachmam, croci 3 vnam, omphacij 3 j, myrrhæ drach. dimidium, opobalsami 3 j, mellis attici 3 viij. *Tinctura Albuginum.* Gallam tritam ac læuigatam in prompto repositam seruat: vsu verò expetente, cum specilli nucleo calfacto adhibeto: deinde atramentum sutorium aqua dilutū admoueto. *Aliud.* Malicorium tritum adhibeto, inde q; atramentum sutorium aqua dilutum admoueto. *Aliud.* Misys, atramenti sutorij, gallarum omphacinarum, singulorum æquales partes, contusas & cribratas reponito. Vsus verò tempore aridum adhibeto. *Ad Glaucos oculos, quò Pupilla nigre reddantur.* Malicorij dulcis succum infundito: deinde post temporis interitum hyoscyami florem cum vino aut hyoscyami succo tritum instillato. Verum hæc opportuno tempore colligere & reponere conuenit. *Aliud.* Acaciæ fructum & gallarum parum quid diligenter trita phernij succo excipito, & ad mellis crassitudinem redigito. Deinde exprellum per linteolū liquorem referuato, ac vtitor vt dictum est. *Ad Pilos pungentes in Palpebris enascentes, Trichiasin appellant Græci, Antony Musæ.* Fel auiculæ, quæ cinædus appellatur, & aconiti dimidium eius, mista reponito. Vsus verò exigente, euulso pilo locum ex pharmaco illinito. *Aliud.* Fel piscis phagri, & aconiti dimidium, cum squama ferri lota, adipe subijcito: atq; his amygdalini olei parum adijcito, & sanguinis vespertilionis quantum suffecerit. Inde mistis & repositis vtitor vt dictum est.

Agglutinatoria Pilorum, Heraclide Tarentini. Ceræ drach. vnam, picis drach. j, lithocollæ drach. vnam, simul liquefacta reponito. Vsus verò postulante specilli summum candefacito, & quod ex pharmaco dissoluto adheferit adhibeto, eo q; pilos agglutinato. *Aliud.* Resinæ siccæ, picis siccæ, vtriufque drach. vnam, sulfuris viui drach. j, bituminis drachmam j, ceræ drach. ij: liquefactis vtitor.

Ad Paruos instar hordei oblongos circa pilos palpebrarum Abscessus, Crithas & Pothias Græci appellant, Antony Musæ. Galbani partem vnam cum exiguo nitro mistam imponito. *Aliud.* Ceram & misys crudi paulū admisceto. Faciunt & ficus aridæ in vino mulso coctæ & trite, exiguo simul galbano contrito. Facit & farina hordeacea in vino mulso cocta ac trita, itidem exiguo galbano simul contrito. *Dionysii Milesii ad Pilos Palpebrarum pungentes.* Leporem marinum in figulino nouo vrito, & cinerem tritum caninarum muscarum sanguine excipito, & reposito in cornea pyxide vtitor euullis antea pilis. *Aliud.* Salamandræ vstæ cinerem, terretrium erinaceorum felle excipito, ac vtitor vt dictum est. Quidam castorio vli sunt cum melle misto. Aut castorio & hircinis vstæ cinere. Aut cicuta semen tritum, ac Thunnæ sanguine exceptum, præuullis pilis illuerunt.

Ad Crithas i. hordeulos & Chalazia hoc est instar grandinis in palpebris tubercula. Sagapeno cum aceto trito vtitor. *Aliud ad Aegilopas.* Succus illecebræ, succi solani, vtriufque libræ dimidium: thuris drach. viij, mastiches quadrantem, galbani libram dimidiam. Succos cum thure coquito, atq; vbi dissolutum fuerit galbanum inijcito: mastichen enim improbamus. *Aliud.* Thuris drach. viij, ladani drach. iij, aluminis scissilis drach. iij, myrrhæ drach. viij, ceræ drach. iij, spumæ nitri drach. iij, coaguli leporis drach. iij. Contunditur hoc pharmacum, & cum vnguenti irini facie mollitur.

*Aliter iii.

*Aliter ii.

*Aliter ii.

*Aliter ii.

*Al. Galienus.

Cataplasmata in eodem Libro Primo Externorum, ab Asclepiade ad Oculos

descripta, itemq; Agglutinatoria, & Inunctilia.

Cataplasmata Lippienatum, ad Doloris vexationes ac maximas Epiphoras, quibus vsus est Heraclides Tarentinus. Rosarum viridium aut siccarum drach. iij, croci drachmam vnam, opij drach. vnam, excipe meliori decocto, aut passo. *Aliud.* Rosarum, violarum albarum, meliloti, capitum papaue-
ris, singulorum drach. ij, croci drachmam vnam, opij drach. vnam, myrrhæ drach. vnam, oui allati vitellum: tritis & passo subactis vttere vt dictum est. *Illustrones ad Doloris, quibus vsus est Galienus.*

Aloes, lycij indicij, rosarum viridium, croci, opij, myrrhæ, singulorum æquales partes, vino subactis

Quinta Classis.

V V V V V

in

in pastillos formato, eos q̄ in vmbra siccato. Vsu verò exigente passo dilutos oculis illinito, itē q̄ E fronti ac temporibus. *Philoxeni ad Fluxionem multam & Dolores.* Foliorum rosarum recentium drach. ij, seminis hyoscyami 3 viij, thuris 3 trēs, myrrhæ 3 iiij, farinæ polentæ acetabulum, oui assati vnus quod intus est, succi mandragoræ drach. iiij, croci 3 ij, opii 3 iiij, vini austeri quantum sufficit. In pastillos redigito, ac vtitor veluti dictum est. *Illitio Anthera eadem hora iuuans.* Croci drach. quatuor, thuris drach. ij, cinnabaris drach. iiij, gummi drach. ij, vino excipito. Vsus tempore vbi triueris, & ad solidum redegeris, pauxillū mellis adijcito. *Aliud Lychnum inscriptum.* Croci drach. j, thuris drach. ij, opij drach. duās, gummi drach. ij, cinnabaris drach. ij, aqua pluuiæ excipito. Alij habent, croci rosas specie referentis drach. iiij, cinnabaris drach. ij: myrrhæ, opij, vtriufq; drach. ij: aqua pluuiæ excipito. *Illusiones mordaces quæ euestigio Fluxionem cohibent. Faciunt & ad Lippitudinem scabram ac aridam.* Æris vsti drach. iiij, croci drach. iiij, piperis albi drach. ii, opii drachmas ii, gummi drach. iiij: cum aqua pluuiæ forinsecus illinuntur. Relidit hoc pharmacū maximas epiphoras: ceterum cauere oportet ne quid ex eo in oculum præterlabatur. *Aliud, Phlogium hoc est flammæum inscriptum.* Æris vsti & loti drach. duodecim, croci drach. vi, piperis albi drachmas iiij, myrrhæ drach. iii, opii drach. iii, gummi drach. duodecim, vino aminæ excipito.

Agglutinatoria quæ Fluxiones cohibent. Pollinis partem vnā, myrrhæ partem vnā, mānæ thuris partem vnā, candido oui excipe: deinde in linteolum impacta impone temporibus ac frōti.

Aliud. Seminis hyoscyami drach. ii, opii drach. j, croci drach. vnā, pollinis drach. iiij, ouorum assatorum vitellos duos, castorij drach. j: omnibus simul coactis vtitor. *Collyrium ad Epiphoram, & Dolores, ac Fluxionem multam, quo Moschion familiaris vsus est.* Glaucij drach. sedecim, sarcocollæ drachmas viij, croci drach. iiij, gummi drach. ii, tragacanthæ drach. ij, succi mandragoræ drach. ii, opii drach. j, aqua pluuiæ excipito ac vtitor cum ouo. *Heronis ophthalmici Psittaces, ad Dolores, & Fluxum largum, euestigio Somnum inducit.* Glaucij drach. sedecim, croci drach. viij, sarcocollæ drach. viij, opii 3 iiij, succi mandragoræ drach. ii, tragacanthæ drach. viij, aqua pluuiæ excipe. *Ad Prædictas affectiones, Neapolitæ.* Glaucij drach. quadraginta octo, sarcocollæ drach. xxiiii, croci drach. xxiiii, lapidis hæmatitæ drach. duodecim, † opii drach. xii, succi mandragoræ drach. viij, } gummi drach. sedecim, tragacanthæ drach. duodecim, excipe aqua pluuiæ. *Sergij ophthalmici Babylonij.* Glaucij drach. viginti quatuor, sarcocollæ drach. sedecim, croci drach. duodecim, opii drach. iiij, lapidis hæmatitæ drach. vi, gummi drach. duodecim, excipito aqua pluuiæ. Illinito per vnum atque alterum diem: atque vbi affectio non soluitur, ad insequentes illusiones transimus. *Aliud, Diasmyrnum Glaucidanum inscriptum.* Glaucij drach. quadraginta octo, sarcocollæ drach. xlviii, croci drach. G viginti quatuor, opii drach. sex, myrrhæ drach. sex, hæmatitæ drach. vi, tragacanthæ drach. xlviii, aqua pluuiæ excipe, ac vtire cum ouo.

Diasmyrnum ex Hæmatite. † Glaucij drach. lxiiii, sarcocollæ drach. xxxii, croci drach. duodecim, opii drach. viij, myrrhæ drach. vi, hæmatitæ drach. xvi, tragacanthæ drach. † xlviii: gummi drach. xvi, in alio exemplari drach. xlviii: } excipiuntur aqua pluuiæ. Vsus eius est cum ouo. *Phosphorus ad Doloris vexationem, omnem q; Inflammationem, & intensas Epiphoras.* Glaucij drach. xxiiii, sarcocollæ drach. viij: croci, opii, vtriufque drach. viij: myrrhæ drach. viij, mifyos vsti drach. viij, gummi drach. nouēdecim, excipe aqua pluuiæ: vtire cum ouo. *Euchroum* id est boni coloris, excellentis & mirabilis efficacitæ. Glaucij drach. xx, sarcocollæ drach. vii, croci drach. vii, myrrhæ drach. vii, opii drach. vii, mifyos vsti drach. vii, gummi drach. duodecim, excipe aqua pluuiæ: vtire cū ouo.

Pharmacum ex succis, Dolorem sedans. Facit ad omnem Doloris vexationem, Somnum euestigio inducit. Glaucij drach. xlviii: sarcocollæ, tragacanthæ, vtriufq; drach. xvi: croci drach. viij, opii drach. iiij, succi rosarum drach. iiij, lycii indicij drach. iiij, hyoscyami drach. iiij, succi mandragoræ drach. iiij, } succi cicutæ drach. iiij, } gummi drach. viij: excipiuntur meliloti decocto. Componuntur autem hoc modo: Meliloti libram vnā, & aquæ pluuiæ heminas xii, ad tertias coquito: & excolato liquore ad pharmaci compositionem vtitor. *Aliud.* Glaucij 3 H xlviii, sarcocollæ drach. xxiiij, croci drachmas xxiiij, opii drach. xii, lycii indicij drach. xii, succi hyoscyami drachmas duodecim, succi cicutæ drach. duodecim, rosarum viridum refectis extremitatibus drach. xlviii, gummi drach. quadraginta octo, aqua pluuiæ excipe: vtire cum ouo. *Pharmacum Phæon id est fuscum, inscriptum, accommodatum ad Doloris molestias.* Cadmiæ drach. duodecim aut xvi, æris vsti drach. vi, myrrhæ drachmas iii, opii drach. ii, acaciæ drach. vii, excipito aqua pluuiæ, velut demonstratum est. *Aliud Phæon ad omnem Fluxum, & omnem Lippitudinem. In alio Pædicon id est puerile legitur.* Æris vsti drach. duodecim, cadmiæ drach. xxxii, gummi drachmas xxxij, acaciæ drach. xxxij, myrrhæ drach. iiij, opii drachmas iiij, aqua pluuiæ excipe.

Aliud ex libris Philoxeni. Spodii cyprii id est cinerulæ cypriæ drach. xii, æris vsti & loti drach. trēs: opii, myrrhæ, vtriufque drach. trēs: acaciæ, gummi, vtriufq; drach. septēm: aqua pluuiæ excepta cum ouo in vsum veniūt, vt dictum est. *Pharmacum Berytium inscriptum, quo vsus est Straton Berytius ad maximas Epiphoras: euestigio auxiliatur.* Æris vsti & loti drach. xvi, acaciæ drach. xvi, spodii pompholygis drach. xvi, opii drachmas sedecim, gummi drach. xvi, croci drachmas xii, myrrhæ drach. ii, aqua pluuiæ excipe: vtire cum ouo. Oportet hoc assidue infundere.

Aliud ad easdem affectiones. Spodii pompholygis drach. xvi, opii drachmas xii, myrrhæ drach. xii, gummi drach. xvi, æris vsti & loti drach. xvi, aqua

* Aliter sex.

* Aliter ii.

* Aliter i.

* Al. duas.

† Al. opii 3 iij, succi mandragoræ 3 ii.

* Aliter viii.
† Al. Glaucij 3 lxiiii, sarcocollæ 3 xxxii, croci 3 xxiiii, opii 3 vi, myrrhæ 3 vi, hæmatitæ dra. vi, tragacanthæ 3 xvi, gummi 3 xii.

† Al. lxviij.

* Aliter xii.

Al. xviii.

Aliter xvi.

Aliter ii.

Aliter xii.

* Aliter xii.

A aqua excipito pluuiali, ac vti tor cum ouo. **¶** *Pharmacum Acharystum inscriptum, ad maximas Epiphoras. Huius solius vsu medici Aegyptij feliciter medicantur, in agrestioribus praesertim corporibus.* Cadmia drach. xvj, acaciae drach. viij, æris vsti & loti drach. iij, opij drach. iij, fructus ericæ drach. iij, myrrhæ drach. iij, gummi drach. xvj: aqua excipito, ac vti tor cum lacte muliebri. Temperatura media est: vbi verò circa oculos affectio sit, ab hoc collyrio abstinere oportet. **¶** *Quo Ipse vsus sum, sic habet.*

† Al. iij.

Cadmia drach. xvj, fructus ericæ drach. ij, æris vsti & loti drach. iij, opij drach. ij, myrrhæ drach. vnam, acaciae drach. iij, gummi drach. viij: aqua excipito, vsus indicatus est. **¶** *Aliud.* Cadmia drach. mas vj, fructus ericæ drach. iij, opij drach. vj, thuris drach. ij, myrrhæ drach. viij, lapidis scissilis drach. ij, acaciae drach. viij, æris vsti & loti drach. iij, gummi drach. xx: composito, ac vti tor vt dictum est.

† Al. ij.

¶ *Nectarium Marci, facit ad incipientem Lippitudinem, facit & ad illationē Fluxus tenuis, ad Chemoseus, Tumores, Pellicularum eminentias, & fere ad omnem Lippitudinem facit, & ad Palpebris crassas.* Oportet autem præ omnibus fomentum adhibere, deinde ipsum infundere, in principio quidem fluxionis cum aquoso oui liquore: vbi verò processerit hæc curatio, paulatim hanc temperaturam extendere & augere oportet. Cæterum ad palpebras asperas collyrio cum aqua vtimur. Apud alios Sphragis appellatur. Æris vsti & loti drach. iij: cadmia drach. iij, acaciae drach. iij, croci

B drachmas ij, opij drach. ij, gummi drach. vj, aqua excipe ac vt ere vt indicatum est. **¶** *Sergij ophthalmici Monobemerum inscriptum, hoc est vna die efficaciam suam demonstrans.* Cadmiæ vstæ & lotæ drach. iij, spodij pompholygis vsti & loti drach. iij, æris vsti & loti drach. iij, croci drach. ij, opij drach. ij, acaciae drach. vj, gummi drach. vj: aqua pluuiali excipe, ac vt ere cum ouo. Temperatura est aquosa. Postquam lachrymæ proiectione fuerint, candidum oui infundere oportet, & rursus sublinere.

Vbi verò morsus consequeretur, fomentum adhibendum est, rursus q; oui candidum infundendum: postea verò collyrio nigro inscripto illinito. **¶** *Sphragis Neapolitæ.* Cadmiæ drach. viij, æris vsti & loti drach. viij, acaciae drach. viij, spodij cyprij drach. iij, croci drach. iij, opij drach. quatuor gummi drach. xij, aqua excipe: vsus indicatus est. **¶** *Sphragis Pacci.* Cadmiæ vstæ & lacte caprino siue muliebri extinctæ ac lotæ, & in umbra siccata, drachmas x, æris vsti & loti drach. x, acaciae drach. x, opij drach. vj, croci drach. vj, gummi drach. xv, aqua pluuiali excipito. Zouli sphragis cū Pacci concordat.

* Aliter ij.

¶ *Philotæ Aphroditæ inscriptum.* Cadmiæ lotæ drachmas xxij, acaciæ drachmas xxxvj, æris vsti & loti drach. xij, croci drach. xij, opij drach. xij, spodii cyprij loti drach. xij, gummi drach. xlviii, excipe aqua pluuiali: ac vt ere cum ouo assidue infundendo. Post curationē verò lauari iubeto. Hoc assidue vsus sum in maximis epiphoris.

C *Alid Neapolitæ, facit ad maximas Epiphoras, maxime in oculis qui egre rigantur & subalbicant circa inflammationes, vt simile quiddam chemosi appareat. Hoc nos vsi sumus, post illationes egros lauare in vsu.* Lapidis schisti drach. viii, thuris drach. vii, æris vsti & loti drach. viii, opij drach. viii, myrrhæ drach. iiii, gummi drach. viii, excipe vino, ac vt ere cum ouo. Temperamentum est aquosum. Sæpe verò hoc infundere oportet, & post intervallum ab illitione lauari iubere.

¶ *Fuscum Olympionico inscriptum, facit ad maximos Dolores, facit & ad Chemoseus, & omnino ex accommodatissimis collyrijs est, nam statim liberat.* Cadmiæ vstæ & lotæ drach. viii, acaciae drach. viii, stibii vsti & loti drach. viii, aloes indicæ drach. viii, croci drach. iiii, myrrhæ drach. iiii, opij drach. iiii, gummi drach. viii, aqua excipe, ac vt ere cum ouo. Temperamentum est crassum. Ego etiam pompholygis ac thuris vtriusq; drach. iiii adieci.

¶ *Aliud Zosimi inscriptum Odorum, facit ad dolores & recentes affectiones.* Cadmiæ vstæ & lotæ vino Italico hoc est extinctæ drach. viii, aloes drach. viii, stibii drach. viii, æris vsti & loti drach. viii aut ii, croci drach. duas, myrrhæ drach. vnam, nardi indicæ drach. vnam, opij drach. vnam, acaciae drach. nouendecim, gummi drach. duodecim, aqua pluuiali excipe.

* Aliter xij.

¶ *Hermæ ophthalmici Lutron id est balneum appellatum, ad maximos Dolores, eadem die ad summum auxilians. Facit & ad inueteratas Lippitudines.* Aloes drach. viii, æris vsti & loti drach. xvi, opij drach. sedecim, myrrhæ drach. duodecim, croci drach. viii.

* Aliter x.

* Al. xvi.

D cadmiæ drachmas quatuor, thuris drachmas tres, gummi drach. xvi, vino Mendesio excipe, ac vt ere cum ouo. Temperatura est aquosa. Oportet hoc per intervalla trium aut quatuor horarum infundere, & vsq; ad mali depullionem linere: atq; tunc lauari iubeto. **¶** *Theodorion Phlaccianum, Harpocratum inscriptum, ad maximas Epiphoras & Dolores: liberat citra venæ sectionem.* Succus acaciæ drach. vigintiquatuor, cadmiæ drach. viii, æris vsti & loti drach. viii, stibii drachmas xvi, aloes drach. quatuor, croci drachmas tres, myrrhæ drachmas tres, lycii idici drachmas duas, castorii drach. j, opij drachmas duas, gummi drachmas vigintiquatuor, aqua pluuiali excipe, ac vt ere cum ouo. Temperatura est crassior. Hoc collyrium tumorem palpebris inducit.

¶ *Scylacium Pharmacum accommodatum eadem die curans. Euestigio soluit Inflammationes.* Stibii drachmas xl, acaciæ drach. xl, cadmiæ drach. xvi, æris vsti & loti drach. xiiii, cerussæ drach. viii, myrrhæ drachmas quatuor, nardi indicæ drachmas quatuor, croci drachmas duas, lycii idici drachmas quatuor, castorii drachmas duas, aloes drach. ii, opij drach. ii, chalcididis assæ drachmas duas, gummi drachmas duas, excipe rosarū decocto ac vt ere cum ouo. Temperatura est crassior.

* Aliter xl.

¶ *Neapolitæ Phanton id est lampas seu facula, ad maximas Epiphoras & Dolores molestias. Facit & ad Affectiones.* Cadmiæ lotæ drachmas octo, acaciæ drachmas octo, æris vsti & loti drachmas sex, stibii loti drachmas viginti, plimythii drach. sex, myrrhæ drach. ii, aloes drach. duas, nardi celticæ sesquidrachmam, opij sesquidrachmā, croci

A * AE. xx.

B * AE. ii, & aliter viii.

C * AE. ii.

D * AE. viii.

Quinta Classis.

VVVVV ij drach.

DE COMPOS. PHARMAC.

drach.vnam, castorij drachmæ dimidium, gummi drachmas viginti, aqua pluuiæ excipe, vtere il- E
linendo. ¶ *Aliud Phanton Serapiacum inscriptum.* Acaciæ drach. xl, stibij drach. xl, cadmiæ drach.
xvi, æris vsti & loti drach. duodecim, aloes drach. tres, myrrhæ drachmas quatuor, cerussæ drach.
duodecim, opij drach. ij, croci drach. ij, castorij drach. ij, nardi indicæ felsquidrachmam, gummi dra-
chmas xxv, aqua pluuiali excepta illinito. ¶ *Malabathrum nostrum, facit ad Doloris vexationes, &*
Affectiones in declinatione. Cadmiæ drachmas xvi, acaciæ drach. xl, æris vsti & loti drachmas xiiij,
opij drachmas duas, lycij indicati drach. ij, myrrhæ drachmas quatuor, malabathri drach. ij, nardi in-
dicæ drach. ij, castorij drach. ij, croci drach. ij, aloes drach. ij, cerussæ drach. viij, stibij loti drachmas
viij, gummi drachmas xl: aqua pluuiali excipe: & vtere cum ouo in principio affectionum, & in
declinatione facta illitione pharmaci panchresti appellati. Descriptum hoc inter mordacia colly-
ria habetur. ¶ *Aliud Philadelphium inscriptum, facit ad Declinationes inflammationum, & Vlcera sordida,*
& Pustularum eruptiones. Eucstigio auxiliatur. Stibij vsti & loti 3 xx, plumbi vsti & loti drach. x, cad-
miæ drac. viij, acaciæ drach. ij, æris vsti & loti drach. iij, aloes drach. iij, cerussæ drach. iij, lycij indi-
ci drach. ij & dimidiam, myrrhæ drach. ij & dimidiam, nardi indicæ drachmas ij, croci drach. ij, ca-
storij drac. vnam, opij drach. j. gummi drac. viij, aquam, & ad exceptionem candidum ouorum x.

* Aliter viij.
* Aliter y.

¶ *Collyrium Album ad Epiphoras & Affectiones.* Inscribitur Triphorum id est delicatum. Cadmiæ^o lo- F A. l. 3. f. 3. c. 2. c.
tæ drach. xvi, cerussæ drachmas viij, amyli drachmas iij, gummi drachmas iij, tragacanthæ drach.
quatuor, opij drachmas ij: excipe aqua pluuiæ: vsus est cum ouo. 5. fol. 224. ii

† Al. xvij.

¶ *Collyrium ex terra Samia Ter-
renum inscriptum, ad Epiphoras & Affectiones.* Cadmiæ lotæ drach. † xij, cerussæ drach. duodecim, ter-
ræ Samiæ drach. duodecim, opij drac. j. gummi drac. iij, aqua excipe ac vtere cum ouo. ¶ *Aliud
Dolorem sedans, ad Fluxum omnis generis, Vlcera, Dolores, Papulas & Tubercula, Prolapsus, Chemosis, & omni
genas Affectiones.* Cerussæ drachmas viij, terræ Samiæ drac. viij, spodij pompholygis drach. xij, tra-
gacanthæ drach. ij, opij drac. ij, gummi drac. iij, aqua pluuiæ excipe, ac vtere cum ouo. ¶ *Aliud
Diocleum inscriptum, ad Doloris molestias, & Epiphoras, ad Suppuratos oculos, Vlcera, Pustulas. Hoc pharma-
cum d. licatus existit.* Tragacanthæ 3 viij, gummi drachmas quatuor, amyli 3 quatuor, spodij pom-
pholygis drach. xvi, cerussæ drachmas octo, opij torrefacti drachmas duas: aqua pluuiæ excepta
admoue cum ouo. ¶ *Pharmacum ex Thure, accommodatum ad Fluxiones & Chemosis.* Cadmiæ drac.
viginti, thuris drac. viginti, cerussæ drach. xl, opij drachmas sex, gummi 3 sex, aqua pluuiæ exci-
pito. Cæterum nos sic apparauimus: Cadmiæ 3 decem, pompholygis 3 decem, thuris 3 decem, ce-
russæ drach. xl, opii drach. vi, gummi drach. vi: aqua pluuiæ excepta admoue cum ouo. ¶ *Aliud
Tripheron id est delicatum inscriptum, ad Inusiones epicuimata Græcis dictas, Pustulas, Chemosis, maxime in vs
qui nullam mordacitatem perferre possunt.* Cadmiæ lotæ 3 viginti, amyli 3 viginti, thuris drach. viij, ce-
russæ drachmas xlviij, opij drach. sex, gummi drach. xvi, aqua pluuiæ excipe: vsus indicatus est.

* Aliter xii.

¶ *Cygnus inscriptus Regine, ad maximus Dolores & Affectiones.* Cadmiæ drachmas sedecim, cerussæ
lotæ drach. octo, amyli drachmas duas, tragacanthæ drachmas duas, acaciæ drachmas duas, opij
drachmas duas, gummi drachmas duodecim, excipe aqua pluuiæ, & ad excipiendum adijce ouo
rum crudorum recentium candida quatuor.

* Aliter viii.

¶ *Aerianum Diomedii inscriptum, Collyrium accommoda-
tum ad Epiphoras, & Veteres Affectiones item q; recentes.* Spodij pompholygis drachmas octo, cerussæ
drach. iij, æuginis drachmas quatuor, myrrhæ drach. xiiij, thuris drachmas tres, opij drach.
tres, gummi drachmas octo, excipe aqua pluuiæ, ac vtere cum ouo. ¶ *Cygnus ex terra Samia, ad
Vlcera omnis generis, ad Epiphoras, Dolores circum circa molestates, Suppuratos que oculos.* Spodij loti drac.
xvi, cerussæ lotæ drachmas octo, terræ Samiæ drachmas quatuor, amyli drachmas quatuor, acaciæ
drac. quatuor, opii drac. quatuor, gummi 3 quatuor, tragacanthæ drachmas duas, aqua pluuiæ ex-
cipe, ac vtere cum ouo.

* Aliter xxxii.

¶ *Aliud Dionysio inscriptum.* Cerussæ drach. triginta octo, æuginis vermi-
culatæ drac. xvi, succi papaueris drachmas octo, gummi drachmas quatuor, excipe aqua pluuiæ, ac
vtere cum lacte. ¶ *Aerianum Pharmacum nostrum, ad Veteres ac recentes Affectiones accommodatum.* H

* Aliter viii.

Cerussæ drachmas viginti quatuor, cadmiæ vstæ & lotæ 3 decem, stibij vsti & loti 3 decem, thuris
3 decem, squamæ æris 3 quinque, opii 3 tres, myrrhæ 3 tres, gummi drach. duodecim, excipe aqua
pluuiæ, ac vtere cum ouo.

† Aliter viii,
acaciæ 3 xx.

† Aliter viij.
† Aliter viij.

* Aliter ii.

¶ *Collyrium Gennadij.* Cerussæ drac. octodecim, stibii drachmas duo-
decim, myrrhæ drachmas duodecim, squamæ æris drach. duodecim, opii drach. vi, gummi drach.
viginti quatuor, excipe aqua pluuiæ. ¶ *Collyrium ex terra Samia, Paccy ophthalmici ad Affectiones in
tensas.* Cadmiæ drach. xvi, cerussæ 3 sedecim, terræ Samiæ drachmas quatuor, opii drach. duas, thu-
ris drac. duas, stibii drach. quinque, gummi 3 v, excipe aqua, ac vtere cum ouo.

A. l. 5. fo. 2. t.
fol. 59. f.

¶ *Therinum id est
æstium inscriptum.* Cadmiæ vstæ & lotæ 3 † viginti, acaciæ drac. duas, terræ samiæ drac. † xx, cerussæ
drac. † xx, squamæ æris vstæ & lotæ drach. duodecim, corticis thuris drach. duas, tragacanthi drac.
v, gummi drachmas xvi, aqua pluuiæ excipe, vtere cum ouo.

¶ *Collyrium Hygidion appellatum.*
Cadmiæ drach. viij, myrrhæ drach. octo, acaciæ drach. vi, opii drach. ii, æris vsti & loti drac. ii, gum-
mi drac. vi, fructus ericæ drachmam vnam, aqua pluuiæ excipito. ¶ *Aster Anicetus, hoc est mexu-
perabilis, ad Doloris vexationes, Pustulas, Staphylomata, Vlcera sordida & serpentia. Facit & ad Inueteratas
affectiones, & Cicatrices exerit.* Cadmiæ vstæ & lotæ drach. xvi, cerussæ lotæ drachmas xvi, amyli
drach. duodecim, stibii vsti drac. xii, spodij 3 viii, plumbi vsti ac loti drac. viii, terræ Samiæ drac. viii,
myrrhæ

A myrrhæ drach. ij, opij drach. ij, tragacanthæ drach. viij, excipe aqua pluuiali. *Libyanum*, ad *Pustulas*, *Inuisiones*, *Rupturas*, *Concauitates*, *Oculos purulentos*, *Chomoseis*, *Staphylomata*. Facit & ad circummolestiam *Dolorem*, & *Affectiones*: & *Cicatrices* exierit. *Cadmia* vltæ & lotæ drach. xvi, cerullæ lotæ drach. xvi, stibij vlti & loti drach. sedecim, plumbi vlti & loti drach. viij, amyli drach. duodecim, spodij pompholygis drachmas octo, myrrhæ drachmas octo, terræ asteris drach. viij, tragacanthæ drach. viij, opij drachmas duas: aqua esto pluuialis, & ad exceptionem ouorum albumina decem. *Aliud Libyanum*. Pompholygis drachmas octo, cadmiæ vltæ & lotæ drachmas sedecim, † stibij vlti & loti drachmas duodecim, † cerullæ lotæ drach. sedecim, amyli drach. duodecim, terræ samia drach. viij, plumbi vlti & loti drach. viij, myrrhæ drach. ij, opij drach. ij, tragacanthæ drach. ij: excipe aqua pluuiali. *Collyrium ex Cornu ceruino*, ad *Vlcera*, *Pustulas*: *Cicatrices* exierit. *Cornu ceruini* vlti & loti drach. iij, thuris drach. quatuor, plumbi vlti & loti drach. quatuor, squamæ æris lotæ drach. ij, opij drachmam vnam, gummi drach. quatuor, excipe aqua pluuiali. *Aliud ex Cornu ceruino*, *Neapoli*.

* *Aliter xii.*

* *Aliter xviii.*

† Non est in quibusdam antiquis exemplaribus.

Plumbi vlti & loti drach. xvi, cornu cerui vlti drach. xvi, thuris drach. viij, acaciæ drach. viij, spodij cyprii drach. viij, amyli drach. iij, opij drach. ij, squamæ æris drach. ij, croci drach. viij, myrrhæ drach. iij, tragacanthæ drach. j, gummi drach. viij, hyoscyami cremore excipito. *Viride ad Affectiones*. Spodij cyprii drach. xvi, amyli drach. xvi, croci drach. octo, stibij drach. octo, opij drach. iij, gummi drach. iij, excipe aqua pluuiali, ac vtere cum ouo. *Aliud Viride Zoili ophthalmici id est ocularij*. Spodij cyprii drach. octo, croci drachmas octo, amyli drach. octo, opij drach. ij, stibij drach. octo, gummi drachmas quatuor: anagallidis succo excipito. *Aliud alia exemplaria ita habent*.

Zoili viride. *Cadmia* vltæ ac lotæ & vino Italico extinctæ drachmas octo, croci drach. iij, stibii vlti & lacte extincti drach. iij, amyli drach. vnam, gummi drachmas duas: excipito succo anagallidis quæ cœruleum habet florem. *Ex libris Scribonij Largi*, *Psittacinum inscriptum*, ad *Doloris molestias*, *Pustulas*, *Inuisiones*, *Cicatrices resolutas*, *Prolapsus*, *Confusiones*, & ubi multus sanguis æstate suffunditur. *Commodat etiam ad Alias affectiones*, & præsertim in oculis molli sensu præditis, in quibus tenuis lachryma profluit. *Cōpositio* hoc modo habet. *Cadmia* drach. octo, croci drach. viij, stibii drach. viij, amyli recentis drach. octo, opii drach. quatuor, gummi drach. quatuor, aqua pluuiali excipito, vtitor cum ouo. *Naucratitæ* *Pharmacum Affectionibus accommodatum*. *Cadmia* drach. duodecim, croci drach. duodecim, opii drach. vi, squamæ stomomatis purgatæ drach. v, squamæ æris drach. vi, succi rosarum drach. xvi, plumbi vlti & loti drach. v, myrrhæ drach. iij, nardi drachmas duas, acaciæ drach. duas, gummi drach. duodecim, excipito aqua pluuiali. *Antei Viride*. *Cadmia* drach. xlviii, myrrhæ drach.

* *Aliter ii.*

viginti quatuor, croci drach. xlviii, opii drach. xxiii, plumbi vlti & loti drach. viij, squamæ æris drach. vi, nardi indicæ drach. vi, acaciæ drach. vi, gummi drachmas viginti quatuor, aqua pluuiali excipito. *Pharmacum ex Galbano*, quo vsus est *Nicetes*, ad *Dolores* & *Lippitudines*. *Cadmia* drach. octo, spodii cyprii drach. viij, æris vlti & loti drachmas octo, opii drachmas octo, myrrhæ drach. octo, chalbanii drachmas octo: aqua pharmacum excipito. Ex valde approbatus est, recipit q̄ amplius gummi item drachmas octo. *Alia exemplaria spodium non habent*. *Aliud*. *Cadmia* drach. xvi, æris vlti & loti drach. viij, myrrhæ, chalbanii, singulorum drach. octo: opii drach. octo, atramēti futorij drach. vi, gummi drach. vi, aqua pluuiali excipito. *Collyrium Diarrhodon Nili ex rosis*, velut *Andreas* tradit, ad *Doloris molestias*, *Fluxum vberem ac tenuem*, *Pustulas*, *Prolapsus*. *Foliorum rosarum resectis extremitatibus* drachmas quatuor, croci drach. duas, opii obo. j, nardi indicæ obo. j: gummi drach. iij, alii drach. vnam habent: aqua pluuiā excipe, ac vtere cum ouo. *Temperatura diloluta est*. *Aliud ex rosis Nili*, quo vsus est *Gallio ophthalmicus id est ocularius*. *Rosarum* drach. quatuor, croci drach. ii, acaciæ drach. i, opii obo. j, nardi indicæ obo. j, gummi drach. iij, aqua pluuiā excipe: vtere cum ouo. *Temperatura est diluta*. *Aliud ex rosis Horæum id est tempestiuum*, appellatum, ad easdem *Affectiones*. *Rosarum resectis vnguibus* drach. xxiii, croci drach. xii, amyli drach. vi, balaustij drachmas quatuor, opii drach. quatuor, tragacanthæ drach. octo, hyoscyami foliorum succo excipe. In præceptoris & Ioannis libro scriptum erat, cupressi succo. *Aliud*. *Rosarum* drach. octo, croci drach. quatuor, æris vlti & loti drach. vnam, gummi drach. vnam, aqua pluuiā excipe, ac vtere cum ouo. *Aliud Diarrhodon ex rosis Terenty, constans ex pompholyge*. *Rosarum recentium* drach. xii, spodii cyprii drach. quatuor, croci drach. quatuor, opii drach. quatuor, nardi drach. quatuor, gummi drach. quatuor, excipito aqua pluuiali. *Aliud Diarrhodon*. *Rosarum recentium* drach. duas, croci drach. vi, spodii cyprii drach. duas, amyli drach. ii, acaciæ drachmam vnam, nardi indicæ drach. vnam, gummi drach. ii, tragacanthæ 3 ii, excipito aqua pluuiali. *Diarrhodon Euelpidion, Diasmyrnum appellatum*. *Rosarum* drach. c, croci drach. l, opii drach. octo, myrrhæ sesquidrachmam, gummi drach. l, vino

* *AE. j iis.*

odoro excipe, ac vtere cum ouo. *Aliud Diarrhodon*. *Rosarum* 3 c, croci drach. l, opii drachmas viij, myrrhæ drach. octo, gummi drach. l, vino odorato excipe, ac vtere cum ouo. Ego hoc apparui pro foliis rosarum florum earundem drach. c iniiciens, atque feliciter successit. *Diarrhodon ex rosarum lxxij drachmis* *Magnum appellatum*. Hoc vsus est *Leucius* præceptor ad *Doloris molestias*, *Pustulas*, *Inuisiones*, *Staphylomata*, *Prolapsus*, ad *Oculos purulentos*, ad *Fluxiones antiquas, inueteratas Lippitudines*, & *Affectiones ægre cedentes*. *Rosarum viridium resectis vnguibus* 3 lxxii, cadmiæ vltæ ac lotæ drach. xxiii, croci 3 sexaginta, opii 3 iij: stibii 3 iij, alii drach. vi: eruginis drach. ij, alij iij: squamæ æris 3 duas, nardi

* *Aliter lii.*

* *Aliter vi.*

Quinta Classis.

V V V V V iij indicæ

A. l. 5. fu. 2. 2. 1.
fol. 550. f

indicæ drach.ii: myrrhæ drach.vi,alii iiii: gummi drach. vigintiquatuor, excipito aqua pluuiali. E
Aliud ex drachmis lxxij. Rosarum drac.lxxii,cadmie vstæ & lotæ drac.xxiiii: croci drac. vi, alii viii:
 opii drach.iii, stibii drach.iii,myrrhæ drach.iii,squamæ eris drachmas duas,æruginis drach.duas:
 nardi drac.vnam,alii ij: gummi drac.xxiiii, excipe aqua pluuiali, ac vtere cum lacte. ¶ *Pharma-*
cum ex Violis albis, accommodatum ad Epiphoras & Affectiones. Acaciæ drach.xlviii, succi violarum al-
 barum drach.xlviii,spodii cyprii drac.vigintiquatuor,croci drach.xxiiii,myrrhæ drach.quatuor:
 opii drach.iiii,alii vi: succi hyoscyami drach.iiii,arisi vsti & loti drach.iiii, gummi drach.quatuor,
 excipe vino falerno. ¶ *Collyrium* quo vsus est Phlorus in Antonia Drusi matre, quæ parum absuit vt ab
 alijs medicis excæcetur. Acaciæ drach.xlviii, rosarum siccarum drac.xlviii, melilotorū drac.xlvi ii,
 spodij cyprii drach.xxiiij,malorum mandragoræ drachmas duas,croci drac. xxiiii, opii drach.vi:
 feminis hyoscyami acetabula ij,alii drachmas xxiiii: myrrhæ drach. iiii, arisi vsti & loti drachmas
 quatuor,gummi drachmas xl: vini falerni,aquæ pluuialis, vtriusque heminas iii. Vinum & aquā
 misceto,eis q̄z rosas,melilotum, semen hyoscyami,mandragoræ mala,aut si hæc non adsint, corti-
 cem inijcito,& ad dies iij aut v macerari finito: deinde expresso liquore ad pharmaci composi-
 tionem vitior: probatissimum hoc existit. ¶ *Melinum delicatum,commodum ijs qui nullam penitus phar-*
macorum mordacitatem perferre possunt. Facit ad Pustulas,Prolapsus,Fluxum acrem & Vberem, Inuersiones q̄z, &
ad recentes Affectiones. Cadmiæ vstæ a lacte extinctæ drachmas xvi,cerussæ lotæ drachmas octo,cro-
 ci drachmas quatuor,opii drach.j,tragacanthæ drach.ii,aqua pluuiali excipito ac vitior cum ouo.
 ¶ *Aliud ad Inuersiones,Pustulas,Prolapsus, Dolores.* Cerussæ drach.xxiiii, amyli drach.xii,cadmie lo-
 tæ drach.x,thuris drach.x,croci drach.viii,opii drach.viii, gummi drach.x,tragacanthæ drach.ii,
 excipe aqua pluuiali, & vtere cum ouo. ¶ *Diarhodon inculpabile.* Cadmiæ vstæ & lotæ drachmas
 xxiiii, cerussæ drach.xii,opii drach.vi,florum rosarum drach.vi, croci drachmas vi, lapidis schisti
 drach.duodecim,gummi drach.† x,excipe aqua pluuiali: ac vtere ad vlcera sordida cum lacte, ad
 munda cum ouo. *Aliud.* Cadmiæ vstæ & lotæ drach. xxiiii,cerussæ drach.xii,lapis schisti drach.
 iiii,florum rosarum drach.vi, croci drach.vi, opii drach.vi,gummi drac.vi, excipe aqua pluuiali:
 ac vtere ad sordida vlcera cum lacte,ad repurgata cum ouo. ¶ *Croceum,Pædicon id est puerile,inscri-*
ptum,ex pompholyge, ad Epiphoras, & molestias Doloris, & ad Affectiones ex plagis. Spodii pompholy-
 gis drach.xvi,croci drach.xvi,opii drach.xvi,tragacanthæ drach.viii,excipe aqua pluuiā, adhibi-
 tis simul albuminibus ouorum iiii. ¶ *Collyrium Gaij ophthalmici id est ocularij.* Spodii cyprii drach.
 quatuor,amyli recentis drach.xii,croci drachmas duas,myrrhæ drachmam vnam, succi mandra-
 goræ drachmam vnam,gummi drac.iii,excipe aqua pluuiali ac vtere cum ouo. ¶ *Atimæri Ly-*
siponion hoc est soluens dolorem. Atramenti sutorii crudi drach.xl, pompholygis crudæ drachmas xl,
 cerussæ drach.vigintiquatuor,opii drachmas duas, croci drac.iii. Crocus in aquam coniicitur ac
 maceratur,& ex cremore hoc collyrium apparatur: quod verò reliquum est ex croco teritur, reli-
 quis q̄z admiscetur,additis item gummi drach.trigintaduabus. ¶ *Diomedis Lysiponion ad Dolores.†*
 Atramenti sutorii crudi drachmas trigintaduas,cerussæ drachmas trigintāunam,spodii pompho-
 lygis drach.sedecim,croci drach. xvi,thuris drach.viii, myrrhæ drachmas duas, gummi drac.xvi,
 aqua pluuiali excipito,ac vitior cum ouo: præclarū est hoc collyrium. ¶ *Zoili Pharmacum faciens*
ad Lippitudines antiquas,Myocephalos,Staphylomata, & Fluxiones antiquas. Cadmiæ drach.viii, eris vsti
 drach.viii,cerussæ drachmas quatuor,aloes sesquidrachmam: foliorum croci,chalcitidis assæ,atra-
 menti sutorii,opii, lycii, singulorū drach.vnam: myrrhæ drachmas ii, acaciæ drach.ũginti,spicæ
 nardi sesquidrachmam,gummi drachmas viginti,castorii drachmas quatuor,stibii vsti drachmas
 viii,excipe, aqua pluuiali. ¶ *Asclepiadem Pacci,ad Dolorum vexationes,Fluxum tenuem & multum,*
Inuersionem,Pustulas,Pellicularum eminentias,Aspritudines,Inueteratas affectiones, & eos qui à multis illitionibus
lesi sunt: confectum opitulatur. Compositio sic habet. Cadmiæ drach.duodecim,eris vsti drach.xii,cro-
 ci drach.xii,squamæ eris drach.xii,myrrhæ drachmas quatuor,nardi indicæ drachmas quatuor,ro-
 sarum siccarum drachmas quatuor,opii drachmas quatuor, lapidis hematitæ drachmas quatuor,
 piperis albi grana xxiiii,gummi drachmas duodecim, vini chii quantum sufficit: vtere cum ouo.
 Aliud exemplar habet rosarum drach.iii,piperis grana.xxv. ¶ *Pharmacum accommodatum Neēta-*
rium inscriptum. Cadmiæ 3 xii,squamæ eris cypriæ lotæ 3 xii,croci 3 xii,opii drach.iiii, eris vsti & loti
 drach.xii,myrrhæ drach.iiii,lapis hematitæ 3 iiii,rosarum siccarum drach. iiii, spicæ nardi drach.
 quatuor, misyos assæ drach.iiii, casie fistulæ drach.iiii, piperis albi grana xxv,gummi drach.xii:
 vino exceptis vtere. ¶ *Antigoni Croceum Leontarium hoc est leunculus,appellatum, propterea quod Leonis*
imago ei imprimeretur. Facit ad Epiphoras,molestiam Doloris,inueteratas Affectiones. Est & Aspritudinibus cō-
modum. Cicatrices & Callos exterit. Maxime vero pueris commodum est. Spodii cyprii drach.xlviii, croci
 drachmas vigintiquatuor,myrrhæ drachmas duodecim,lapis hematitæ drach.octo, opij 3 xii,pi-
 peris albi grana xxxvi, gummi drach. octoginta, vino falerno excipito. Aliud. Spodii cyprii
 drach.lxxx,croci drach.xl, myrrhæ drachmas † viginti, opii drachmas ũginti, lapidis hæmatitæ
 drach.duodecim,piperis grana.lx,gummi drac.lxxx, vini falerni quantum sufficit. ¶ *Ex Libris*
Scribonij Largi Asclepios Machaonis, ad veteres Affectiones, & Oculos suppuratos. Spodii pompholigis 3
 trigintaduas,eris vsti drach.xxxii, croci siculi drach.xvi, myrrhæ drachmas sex, lapidis hæmatitæ
 drach.

* Aliter xxiiii.

* Aliter xl.

* Aliter xii.

A.l. 5. fu. 2. c. 2.
fol. 55 2. c

* Aliter sex.

† Aliter vi.

* Al. Gally.

* Aliter xvi.

* Al. Atmeti

* Al. xxxviij.

† Additur ex
quibusdā cod.
gracis, statim
solut dolores.

* Aliter xxxvi.

* Al. y, & ali-
ter viij.

* Aliter ii.

* Aliter xlii.

* AP. xlviii.

† Aliter viij.

* AP. duas, &
aliter viii.

* Aliter xvi.

A drach. x, nardī indicæ drach. vi, opij drach. vi, piperis grana. xl, gummi drach. xl, vino chio excipito. In libro de Athenippis Asclepijs, opij drachmæ octo habentur. *¶* **E**uemerī ad Dolores, & Affectiones. Æris vsti & loti drach. xxxij, spodij pompholygis drach. xvi, croci drachmas xvi, myrrhæ drach. viij, lapidis hæmatitæ vsti & loti drach. viij, spicæ nardī drach. iij, misyos vsti drac. quatuor, opij torrefacti drach. iij, gummi drach. xvi, vini Italici quod satis est. *¶* **D**iasmyrnum odorum Synerotis, pharmacum accommodatum ad Inueteratas affectiones. Facit & ad Rhœadas hoc est angulos antrofos, & Aegilopas. Cadmiæ lotæ drach. xxviij, lapidis hæmatitæ vsti & loti drach. vīgintiquinque, spodij cyprij drachmas vīgintiquatuor, myrrhæ drach. xlvij, croci drach. quatuor, opij hispani drach. octo, piperis albi grana xxx, gummi drac. vi, vino Italico excipito: vitior cum ouo in recentibus affectionibus. Temperatura aquosa est. Aliqui croci drac. xij, inijciunt. *¶* **H**æmatinum Synerotis aspritudinibus commodum, facit ad Veteres affectiones, ad Ficosa, & ad omnem Extuberantiam si cum odore Synerotis commisceatur. Æris vsti & loti drach. xxiiij, lapidis hæmatitæ drach. vnām, croci drach. iij, opij drachmas iij, gummi drach. xij, excipe aceto acerrimo. Aliud. Æris vsti drach. xlvij, croci drach. xxiiij, opij drach. iij, gummi Thebaici drach. xxiiij, pompholygis drach. xlvij, myrrhæ drach. xviii, salis ammoniaci drach. duodecim, lapidis hæmatitæ drac. vnām, æruginis drach. iij, vitior. *¶* **H**ieracis ad Aspritudines. Misyos vsti drach. viij, croci drach. octo, opii drac. viij, lapidis hæmatitæ loti drac. viij, æris vsti & loti drac. duodecim, myrrhæ drac. duodecim, gummi 3 xii, aceto acerrimo excipito. *¶* **A**pollonij Phœnix "collyriū" Hieracium ad aspritudines. Per hoc catulo egre giē medicatus est. Facit & ad Palpebrarum defluuia, & Inueteratas affectiones. Lapidis hæmatitæ vsti & loti drachmas trigintaduas, æris vsti & loti drach. xvi, æruginis rasilis drac. sedecim: opii drach. viij, alij vi: cadmiæ botrytidis drachmas quatuor, chalcitidis affatæ drachmas quatuor, gummi drach. xvi, excipe aqua pluuiali. Phœnix Apollonij aliter, Velut Arius Asclepiades inscripsit in libro, quo propria pharmaca coaceruauit. Lapidis hæmatitæ drach. xxiiij, lapidis schisti vsti & loti drach. xxiiij, cadmiæ drach. duodecim, æris vsti drach. duodecim, opii drac. viij: chalcitidis affatæ drac. iij, alij drac. viij. In alio exemplari etiam æruginis 3 duodecim, gummi 3 sedecim, excipe aqua pluuiali. *¶* Aliud collyrium ad Aspritudines. Chalcitidis vstæ 3 duodecim, misyos vsti & loti drac. viij: croci, opii, vtri usq; drach. vi: lapidis hæmatitæ drach. viij, gummi 3 duodecim, acerrimo aceto excipito. *¶* **C**ollyrium ad Scabries orbiculare. Cicatrices, & Callos detergit. Facit & ad veteres Affectus. Æris vsti & loti 3 xxiiij, spodij pōpholygis 3 sedecim, myrrhæ 3 sedecim, salis ammoniaci 3 duodecim, lapidis hæmatitæ drac. xxiiij, opii drach. iij: piperis grana. xii, alij xvi: gummi drachmas octo: vino excipito ac vitior. *¶* **E**uemerī, Cicatrices, & Callos exterit. Facit & ad Inueteratas affectiones. Cadmiæ drac. lx, croci drac. l, spicæ nardī 3 xx, squamæ æris torrefactæ & lotæ 3 l, myrrhæ drach. l, opii drach. triginta, æris vsti drach. lx, misyos crudi drach. l, gummi drach. lxx, excipe vino chio. *¶* Aliud Pyrami, Cicatrices & Callos exterens, deprimit omnem Extuberantiam. Cadmiæ cypriæ drach. xl, lapidis hæmatitæ drach. xl, æris vsti drach. xl, misyos vsti drach. a viginti, croci drach. b viginti, ammoniaci thymiamatis drac. c viginti, squamæ æris vstæ & lotæ drac. d viginti, opii drach. e xx, myrrhæ 3 f xx, gummi libram vnā: cum acerrimo aceto vtēre. *¶* Aliud Euemerī, ad Easdem affectiones. Æris vsti & loti drach. xxiiij, spodij pompholygis drach. duodecim, myrrhæ drac. viij, salis ammoniaci drach. duodecim, lapidis hæmatitæ 3 iij, g[†] piperis drac. h duodecim, gummi drac. viij, vini chii quod satis est. *¶* **L**yncæus, ad Affectiones callosas, exacuit Visum, Cicatrices & Callos exterit. Cadmiæ 3 duodecim, æris vsti & loti drach. duodecim, ammoniaci thymiamatis 3 duodecim, myrræ 3 i xvi, lapidis hæmatitæ drach. vi, opii drach. vi, aloes drachmas quatuor, fellis taurini drach. iij, galbani drach. iij, æruginis drach. j, opoponacis drach. quatuor, salis ammoniaci drach. ii: gūmi drac. vi, alij ii: aqua pluuiali excipito. *¶* **C**ollyrium Rhinema hoc est lima, inscriptum, facit ad Callosas affectiones, Cicatrices exterit. Facit & ad Suffusiones. Cadmiæ drach. xlviii, ammoniaci thymiamatis drach. xlviii, æris vsti drach. xlviii, opii drach. sedecim, æruginis cypriæ 3 sedecim, aloes 3 sedecim, myrrhæ 3 sedecim, lapidis hæmatitæ drach. xxiiij, chalbani drach. xvi, opoponacis drac. xviii, felis taurini drach. octo, salis ammoniaci drach. iij, gummi 3 lx, aqua pluuiali excipe. Temperatura aquosa est. *¶* **C**ollyrium Harmatium id est currus, inscriptum, quo vsus est Ptolemæus Rex extersina facultate præditum. Exterit Cicatrices, acuit Visum, est & Aspritudinibus commodum. Æris vsti & loti drach. viij, ammoniaci thymiamatis drac. viij, lapidis hæmatitæ 3 octo, corticis thuris 3 octo, gummi 3 octo, excipe aqua pluuiali, ac vtēre cum aqua. Alia exemplaria etiam æruginis drachmas duas habent. *¶* **C**ollyrium Oxyderci cum hoc est visum exacuens, ex hæmatite, Cicatrices & Callos exterit. Ammoniaci thymiamatis drachmas vīgintiquatuor, æris vsti & loti drach. vīgintiquatuor, lapidis hæmatitæ drach. vīgintiquatuor, gummi drac. vīgintiquatuor, æruginis drac. viij, excipe aqua pluuiali. *¶* **C**ollyrium Artemonium inscriptum quo Bajus sodalis meus vsus est. Facit ad Fluxiones antiquas, & Aspritudines palpebrarū, ad Putrescentes & erosos angulos, ad Oculos humectos, & Membranarum extuberantias. Cicatrices & Callos exterit. Et quod maximum in eo est, post illitiones oculos imperturbatos conseruat. Stibii drachmas quatuor, æris vsti drac. duas, cerussæ drachmas duas, croci drachmam vnā, myrrhæ 3 vnā, corticis thuris 3 vnā, æruginis vermiculatæ drachmam vnā, gallarum omphacinarum drachmam vnā, piperis albi 3 drachmam vnā, gummi drach. vnām, vino excipe: vtēre cum aqua. *¶* Aliud Pharmacum ac-

Quinta Classis.

V V V V V

iij commodatum

* Aliter viii.

* Aliter xxviii.

* Aliter xxiiii.

* Aliter iiii.

* Aliter iiii.

† Al. εἰς πᾶν τὸν.

* Aliter xvi.

* Aliter xii.

A Aliter viij.

B Aliter viij.

C Aliter viij.

D Aliter viij.

E Aliter viij.

F Aliter viij.

G† Additur i antiquis οπι- ou. & d. i. opy drach. iij.

H Aliter iiii.

I. Aliter vi.

commodatum. Cadmiæ drach.viij, stibij drach.viij, cerussæ drach.viij, æris vsti drachmas iij, corticis E
thuris drachmas duas, croci drachmas ij, myrrhæ drachmas ij, æruginis vermiculatæ drach.ij,
gallarum omphacinarum drachmas ij, piperis albi drachmam j, gummi drach.iiij: excipe vino.

¶ Collyrium Indicum Arianum inscriptum, præoccupat ac præcipit omnes Lippitudines. Facit ad obtusum Vi
sum, & Scabras affectiones, ac Erosos angulos. Cicatrices exterit, & quod maximum est, post illitionem oculos im
perturbatos conseruat. Cerussæ rhodiæ drach.xlviii, cadmiæ cypriæ drach.xxiiij, atramenti indici 3
octo, b^t opij drach.octo, piperis albi drach.viij aut vi, opobalsami drach.viij aut vi, gummi drach.

xvi: cinnamomi drach. ij, alij xij: aqua pluuiali excipito. ¶ Hermophyli Collyrium Thalassærum,
accommodatum ad Suffusiones, & ad omnem Hebetudinem visus. Facit & ad incipientem Suffusionem, est que
odoratissimum pharmacum. Cadmiæ drach.xvi, atramenti indici drach.xvi, piperis albi drach.viij, æru
ginis drach.iiij, succi medici drach.iiij, opobalsami drach.iiij, gummi drach.xij: aqua excipe, vt ere
cum aqua. Temperatura diuersa est iuxta affectiones. ¶ Pomponij Bassi, facit ad incipientem Suffusio
nem. Cadmiæ drach.xxviij, atramenti indici 3 xvi, piperis longi drach. xvi, piperis albi drach.xij,
succu cyrenaici drach. v, opobalsami drach.vi, spicæ nardi drach.vi, sagapeni drach.v, opopana
cis drach.v, opij drach.iiij, euphorbij drach.j, cinnamomi drach.j, gummi drach.triginta, fœniculi
succo excipito. ¶ Indicum Basilicon id est regium inscriptum. Facit ad incipientem Suffusionem, & omnem

visus hebetudinem. Cicatrices exterit. Cadmiæ vstæ & lotæ libram j & trientem, atramenti indici vnc.
vi, cerussæ trientem, piperis albi sexuncem, fel hyanæ integrum quantuncunq; ponderis, fel scaro
rum decem, fel perdicum quatuor, succi papaueris unciam j, opobalsami sextantem, opopana
cis sextantem, sagapeni sextantem, gummi libram vnam: excipe succo fœniculi, aut herbæ hera
cleæ appellatæ. ¶ Enslacton id est instillatitium, Paccij, vt Themison. Cadmiæ drach. sexagintaquatuor,
mislyos 3 xxxij, atramenti sutorij 3 xxxij, stibij 3 xxxij, piperis albi 3 xxxij, opij 3 xvi, æruginis drach.
sedecim, opobalsami 3 xvi, gumi 3 lxiiij: excipe aqua pluuiali. ¶ Collyrium Chelidonum inscriptum.

Cadmiæ drach. xlvij, stibij drach.xij, mislyos drach.viij, piperis albi drach. vi, atramenti sutorij 3
vi, opij drach.vi, æruginis drach.vi, opobalsami drach.iiij, gummi drach.xxiiij, excipe aqua pluuiali.
¶ Hieracium, ad Obtusum visum, & Scabras affectiones. Cerussæ drach.xvi, cadmiæ drach.viij, æru
gis drach.ij, piperis albi 3 ij, omphacij id est succi vuæ acerbæ 3 ij, opii drach.ij, gummi drach.vi,
excipe aqua pluuiali, ac vt ere cum aqua. Aliud. Cicatrices & Callos exterit. Cadmiæ drach. sedecim,
cerussæ drach.octo, piperis albi drach. quatuor, æruginis drachmas duas, opobalsami drach.ij, om
phacij drach.ij, gummi drach.iiij, excipe aqua pluuiali. ¶ Collyrium Fuluum panchrestum, ab omnimoda
utilitate inscriptum, accommodatum ad Scabros & circumrosos angulos, ac intensos Pruritus, & Palpebras fico
sas. Cadmiæ drach.octoginta, chalcitidis vstæ drach.xl, piperis albi drach.xl, gummi drach.xl, aqua
pluuiali excipito. In alio exemplari æqualis omnium apponderatio habetur. Aliud. Cadmiæ
drach.octoginta, chalcitidis vstæ drach. xl, piperis albi drach.xl, croci drach. duodecim, myrrhæ
drach.xij, gummi drach.xl, aquæ pluuialis quod satis est. ¶ Tryphonis orbiculare Sphæricum dictum.

Cadmiæ drach.xlvij, squamæ æris drach. trigintaduas, æris vsti & loti drach. trigintaduas, piperis
albi drachmas trigintaduas, opij drach.viij, myrrhæ drach.viii, opobalsami drachmas iiii, gummi
drachmas trigintaduas, excipe aqua pluuiali. ¶ Collyrium Galli Oxydericum. Cadmiæ 3 xlvij,
chalcitidis vstæ drach. viginti quatuor, piperis albi drach.vi, squamæ æris drach.viii, opii drach.vi,
omphacij drach.iiij, myrrhæ drach.ij, opobalsami drach. iiii, gummi drach.xij, aquæ pluuialis quā
tum sufficit. ¶ Collyrium Aromaticum appellatum. Æris vsti & loti drach.xvi, æruginis drach.iiij,
myrrhæ drach.iiij, opii drach.iiij, piperis albi drach.iiij, nardi drach.ii, croci drach.iiij, opobalsami
drach.iiij, gummi drach.iiij, aqua pluuiali excipito. ¶ Heracleida Aromaticum croceum ex hæmatite.

Æris vsti & loti drach.xlvij, cadmiæ 3 viginti quatuor, croci 3 viginti quatuor, lapidis hæmatitæ
drach.viginti quatuor, opii 3 duodecim, myrrhæ drach.xii, piperis albi drach.xii, gummi 3 xxiiii,
vino falerno excipito. ¶ Croceum Asclepium oxydericum. Æris vsti drach. xlvij, croci drach.xii, H
omphacii drach.iiij, opii 3 duodecim, myrrhæ drachmas ii, opobalsami drach.iiij, gummi 3 xii, piperis
albi 3 x, aquæ pluuialis quantum satis est. ¶ Collyrium Isochryson hoc est auro compar, ad Corrosos
angulos, Scabras affectiones, inueteratas Lippitudines, Aspritudines, Ficosas eminentias. Cicatrices & Callos ex
terit. Cadmiæ 3 sex, lapidis hæmatitæ drachmas sedecim, myrrhæ drach.xvi, opii 3 xvi, croci drach.
viginti quatuor, piperis longi 3 xii, piperis albi 3 viginti quatuor, gummi drach.lxiiii, vini Italici
quantum satis est. ¶ Collyrium Cinnabarium, celebris ophthalmici Stoli Britannici, ad Corrosos angulos,
Lippitudines ad malum habitum perductas, intensos Pruritus, & Inueteratas affectiones. Psorici drach.vigin
ti quatuor, cadmiæ drach.vigin ti quatuor, croci 3 xvi, piperis albi 3 sedecim, cinnabaris 3 sedecim,
opii drachmas duodecim, gummi 3 xxiiii, aquæ pluuiæ quod satis est. Aliud. Psorici 3 xxiiii, pipe
ris drach.xxiiii, cadmiæ drach. xxiiii, croci drach.xxiiii, sandarachæ drach.viii, opii drach.viii, cinna
baris drach.viii, gummi drach.viii, aqua pluuiali excipito. ¶ Melinum Atarachum à perturbationibus
amoliendis appellatum. Facit ad omnem Oculorum hebetudinem, & ad Affectiones antiquas. Cicatrices & Callos
exterit. Cadmiæ drach.viginti quatuor, omphacii drach.xii, salis ammoniaci drachmas quatuor,
ammoniaci thymiamatis drach.xii, opii drachmas xiiii, gummi drach.xiiii, cerussæ drach. xxiiii,
croci drach.xvi, piperis albi drachmas xxiiii, aquæ pluuialis quantum sufficit. ¶ Lucij præceptoris
Melinum,

A. l. 5. fu. 2. t. 2.
fo. 52. b

A* Aliter v.
B† Additur i
antiquo codi.
græco, ἀρνεύ
ου < ε, & ὀπ
κς < ε, & μ
ν η < ε, & μ
φ α λ ο υ < ε
i. armenij dra
chmas 7, pso
rici drach. 7,
myrrhæ 3 7,
omphacij 3 7.
C* Aliter v.
D† Aliter xij.
E Aliter viij
F AP. 3 iiii.
G Aliter 3 vi.
H Aliter 3 i.
I AP. 3 iiii.
K AP. 3 viij.
L Aliter lx.
M AP. xxxii.
N† in cod. i.
preßis græcis
est opij solum,
in alijs ærugi
nis solum, in
aliquibus sunt
utraq.
O Aliter vi.
P Aliter iiii.

* Aliter ii.

* Aliter xvi.

† in impressis
est, κινναβα
ρίον ἀξίου. in
antiquis qui
busdam, κιν
ναβαρίον va
ξίου.

* Aliter xxiiii.

A Melinum, ad Scabros & corrosos angulos, intensos Pruritus, Oculos humectos, ad omnem Visus hebetudinem. Cicatrices & callos exierit. Cerussæ drach. xxiii, croci drach. xxiii, ammoniaci thymiamatis drach. vi, falis ammoniaci drach. vi, nardi indicæ drach. vi, opii drach. vi, myrrhæ drach. vi, omphacii drach. vi, gummi drach. xxiii, excipe aqua pluuiæ. **C** Aliud collyrium Proteus, cui nullum conferri potest. Facit ad incipientem Suffusionem, & ad omnem Visus obtusitatem. Cicatrices & Callos exierit. Cadmiæ drach. xl, chalcitidis crudæ drach. xl, cerussæ drach. xl, piperis albi drach. xxx, succi cyrenaici drach. xx, croci drach. xvi, opii drach. xii, sagapeni drach. xii, lachrymæ oleæ drach. xii, auripigmenti drach. viii, myrrhæ drach. xii, gummi drach. ^a xx, opopanacis drach. ^b xx, opobalsami drach. ^c xii: apparato cum aqua pluuiali, ac vtitor cum aqua. **C** ^d Hygieni collyrium Aureum, ad Corrosos angulos, & Scabras affectiones. Sandarachæ drach. xxiii, piperis albi grana xii, myrrhæ drach. vi, croci drach. vi, gummi drach. ^e duodecim: cum aqua pluuiali apparato. *Aliter Aureum collyrium.* Sandarachæ drach. xvi, croci drach. xvi, piperis drach. xvi, myrrhæ drach. iii, gummi drach. xii: vsus ostensus est. *Aliter.* Sandarachæ drach. xxiii, piperis albi drach. xii, myrrhæ drach. vi, croci drach. vi, gummi drach. xii, aqua pluuiali excipito. **C** Eumeri Psoricum, facit ad Corrosos angulos, & Scabras cicatrices, ac Callos exierit. Facit et ad Inueteratas affectiones, & Lippitudines ad malum habitum perductas, item q; ad Aspritudines. Psorici drach. **B** xxiii, croci drach. xii: opii, cerusæ, vtriusq; drach. iii: piperis albi drach. iii, omphacii drach. iii, gummi drach. iii: vino falerno excipito. **C** Basilidion hoc est regincum, psoricum. Psorici drach. xlviii, croci drach. xxiii, opii drach. viii, floris lapidis asii drach. viii, cerussæ 3 viii, piperis drach. vi, opobalsami drach. iii, omphacii drach. iii, gummi drach. xvi: vino falerno excipe. **C** Panchrestum Atheni-
pion. Psorici drachmas lxiii, croci drach. xvi, chalcitidis vstæ drach. xvi, sandarachæ drach. xx, myrrhæ drach. viii, piperis albi drach. xvi, casia fistulæ drach. viii, foliorum malabathri drachmas iii, opii drach. xvi, omphacii drach. iii, misyos vsti drach. ii, gummi drach. xxiii: excipe aqua pluuiali. **C** Ptolemæi familiaris Pharmacum, accommodatum ad Scabros & corrosos angulos, intensos Pruritus, Desluta palpebrarum, Hebetem Visum. Psorici drach. xl, sandarachæ drach. xxx, chalcitidis vstæ drach. xxiii, croci drach. xxiii, myrrhæ drach. xii, opii drach. ii, casia fistulæ drach. xii, piperis drach. quatuor, piperis albi 3 vii, omphacii drach. vi, misyos vsti drach. iii, foliorum malabathri 3 j, gummi 3 xxxvi, aquæ pluuiæ quantum sufficit. **C** Collyrium Malabathri oxydericum, facit ad Corrosos angulos. Stibii drach. xxiii, cadmiæ drach. xxiii, acaciæ drach. xxiii, piperis albi drach. xxiii, nardi indicæ drach. xii, opii drach. vi, croci drach. vi, myrrhæ drach. vi, omphacii drach. vi, gummi drach. xxxvi: aqua pluuiali excipito. **Aliud.** Stibii vsti & loti drach. xl, acaciæ drach. xlv, nardi celticæ drach. vi, myrrhæ drach. viii, croci drach. viii, omphacii drach. xi, opii drach. vi, cadmiæ 3 xxxvi, gummi drach. xxxij, aquæ pluuialis quod satis est.

A Alit. viii
B Aliter viii
C Aliter viii
D Al. i, typus
E Aliter xvi.

** Al. Atheni-
pion.*

** Aliter xiii.*

** Al. μέλαν
id est nigrum.*

** Al. indica.*

*Remedia ad affectos Oculos, ab Archigene in Primo Pharmacorum
secundum genus conscripta.*

CAP. 8.

IN fluxionibus circa oculos in principio conuenit cibi ac potus parcitas, aquæ potus, & maxime omnium rei venereæ abstinencia. Alius ipsa subducatur, & facies assidue primum multa frigida, deinde et aceto admisto, proluatur. Quidam atramentum sutorium aqua dilutum proluendum exhibent. Fugiant odores acres, & pulueres, fumum q; & tum Solis tum lucernarum splendor. Ad noctem lanas puras ex vino, aut sordidas ex aqua frigida, imponent: mane q; velut dictum est, se proluant. Quod si augeat fluxio, accedat q; dolor, venæ sectio congrua est, & perfecta cibi abstinencia ac sitis, nisi exurantur, & malum inde augeat. Conuenit & solutio ventris valida, siue per purgatorium conueniens medicamentum, siue per clysteres robustos. Post hæc verò circa frontem imposita assidue vitis folia viridia auxiliantur. Aut myrti, aut lentisci, aut rubi succus: aut brassicæ, aut vitis folia cum flore farinæ polentæ. Aut cupressus, sampsuchus, ocymum, sisymbrium, cenanthe, crocus hortensis item q; agrestis, portulaca, mali punici satiui flores cytini appellati, vitex, folia recentia mali cotoneæ, singula cum vino & flore farinæ polentæ. Super ipsos verò oculos lana pura oui cado madefacta imponat. Aut oui albi luteum. Aut melilotum in passo coctum. Aut asphodeli radix cum vino & flore farinæ polentæ. Aut iris contusa cum vino & flore farinæ polentæ. Aut mali punici succus cum flore farinæ polentæ. Aut ipsum malum in vino maris experte coctum. Aut iuniperi bacca trita cum vino & flore farinæ polentæ fronti imponentur, aut et super ipsos oculos adhibeantur. Ad hæc verò eryngii & foeniculi sylvestris radix trita ex aqua, et ci cutem semen eodem modo apparatus, opitulantur. Caseus item mollis & nuper salsus cum apij folijs cataplasmati modo impositus. Aut papauer sylvestre passo coctum ac tritum impositum. Similiter et melilotum passo coctum, exiguo croco & papaueris succo admistis. Panis item ex vino, rosaceo admisto mirabiliter auxiliatur. Aut tribulum recentem per se imposito: immo & polenta admista egregie opitulantur. Et vt summatim dicam, omnia ex adstringentium genere, & repulsoria, in principiis prosunt, velut est cicuta, & psyllium, apium solanum, lentes palustres, serpyllum, sampsuchus, folia vitis, coriandrum, portulaca, semperuiuum, folia papaueris, vrtica. Quæ singula ex vino trita imponentur: psyllium verò ex aqua, eodem q; modo palustris lenticula.

Ad Fluxionem Calidam.

C Brassicam tritam cum polentæ flore ex aqua imposito. Aut ocymi folia eodem modo.
Aut

*† Al. νεοπαγής
i. nuper coagu-
latus.*

Aut rutæ folia cum adipe anserino: aut sampſuchi folia: aut halicacabum tritam. Cæterum largū fluxum ſiſtunt papaueris capita, & hyoſcyamus cum polentæ flore ex vino: oportet autem fomentum prius adhibere, atq; ita imponere. Poſtquam verò ſtatus & vigor præterierit, & cum nō amplius opportunum eſt adſtringentibus uti, non incommodum fuerit, tum oculorum, tum capitis, fomenta adhibere. Magnificè verò auxiliatur, inſlāmationes q̄ ſoluit, & ſi qua diſtentio adſit, eam laxat, linteolum molle butyro madefactum, ac oculis ſuperpolitur.

De Chymoſi hoc eſt Vtriuſq; palpebræ diſtortione, ex inflammatione oborta.

In quibus verò chymoliſis fortis contingit, oui luteum cum muſcæ carne terito: atq; vbi ad cerati formam deducta fuerint, linteolo excepta impone: conſeſtim ſedant.

Oblitiones Oculorum.

☉ Panis puruſ uſtuſ, acaciæ & hedere permixtuſ cū aqua. Verū ad doloris vexationes roſas virides aut aridas paſſo maceratas terito, & admiſto oui aſſi vitello, ac croco ſufficienti, cū paſſo vititor.

Aut crudam hordeaceā vel triticeam farinā paſſo coctā adhibeto. Si verò maior dolor fuerit, papaueris folia recentia admiſceto, aut corticem papaueris capitum. Aut hyoſcyami folia drachmarum iij pondere cum oui vitello. Aut liſymbrium aqua coctum terito ſufficienti aſſuſo vino, & imposito. Aut papaueris albi capita paſſo cocta ac trita imposito. Aut apii recentis coma, F item q̄ pulegio recenti ſimiliter vititor. Aut peponis, aut cucumeris carne. Aut oui aſſi luteum cū exiguo croco ac pauco vino tritum imposito. Cæterum dolentes ex inflammatione oculos, cū panace & pulegio vino ſubaſtiſ integito. Præclare facit & pini cortex, & polenta cum vino.

Aut hyoſcyami folia, et opium trita imposito. Aut papaueris cortices terito, roſis q̄ ac meliloto myrrha q̄ admiſtiſ, albumine oui diluto, atq; ita imposito. Aut aloë ac opium cum aqua diluta, linteolo q̄ excepta, in emplatri morem appone, vitādo ne quid in oculū præterlabatur. Cæterū in hiſ qui dolore vexant, crocum bonū cum lacte inſtillato. Verū ad vehemētes dolorum moleſtiās coriandri ſuccuſ cū muliebri lacte oculorū anguliſ inſtillatuſ: Similiter q̄ papaueris ſuccuſ torrefactiſ auxiliā. Folia item platani trita cum farinæ polentæ flore oculis ſuperpone, emplatri more appoſita. Cataplaſmata verò in fluxionibus cōueniunt, Cupreſſuſ viridis cum vino. Aut paliuri folia, {aut ſpinæ folia.} Aut portulaca trita cū adipe anſerino & croco. Aut iris ſicca cum melle. Aut micæ thuris, & myrrhā cū oui cādido lana excepta fronti imposito. Aut apiū cū polenta, aut ſeſeliſ flores vino maceratos imposito. Aut papaueris folia recentia adglutinato. Qd ſi vigiliæ inſit, mandragoræ radicē & ſuccū, papaueris folia, & polentā aquis partibuſ in maſſam cogito, eam q̄ odorandā exhibeto, & obdormiſcēt. Porro in magniſ fluxionibus, pulegi recētis G ſemē, & maximè fuluū, cū aceto ad malagmatiſ formā redigito, ac ſincipiti imposito, lanis ſuperne additiſ, ac leni vinculo cōſtrictiſ. Aliqui ēt papauer recēſ ei admiſcent, aut opii minimū qd, aut roſas, aut melilotū coctum. Aut amylo ex vino aut oui cādido oculos ipſoſ integito. Præclare faciūt ad fluxionē vberem, tenuē ac vetuſtā, itē q̄ vlcera, pōpholygiſ drach. iij, opii torrefacti ſ obo. iij, gummi drach. iij: aqua pluuiālī aut fontana excipe. ☉ Agglutinatoriū ad Fluxionē. Similaginē, & mannae thuris dimidium eiſ, cum oui albumine ad emplatri formam redigito, & in principio frontū in linteolo coctum. Aut oui aſſati vitellum cum thure. Aut cochleam cum teſta ſua & oui candido ad ſtrigementitiā formam redactā in ſplenio à tpe altero ad alterum extēdendo imposito. Sua ſpontē decidit, vbi reſtiterit fluxuſ. Aut Moſchi malagma, aut barbarum emplaſtrum, aut viride, aut aliquod aliud eorum quæ aceto conſtant, ſplenio inditum fronti imposito.

† Al. drach. iij, & oboli. iij.

Ad Hemalopas & Hypophagmata ideſt cruentatoſ oculos, & ſugillatoſ.

☉ Ad plagas oculiſ illatoſ, & ad oborienteſ ex eiſ cruentatoſ ſuffuſioneſ, ſtatim in principio tum ad inſlāmationem, tum ad dolorem compeſcendum facit columbinuſ ſanguis inſtillatuſ, & præſertim iſ qui ex teneriſ penniſ exprimitur. Candidum ēt oui eodem modo in oculum inſtillatū, atq; amplius pura lana exceptum & ſupernē impoſitum. Prodeſt ēt oui aſſi luteum cum vino impoſitum, aut melilotum coctum cum vino eodem modo. Inſuper & folia roſarum ac floſ per ſe & cū vino trita, item q̄ cum flore farinæ polentæ. Aut braſſicæ folia in cataplaſmate. Vbi verò diutius cruentatio perſiſterit, thure & bitumine aquis portionibuſ acceptiſ ac miſtiſ oculū ſuffito. Aut hyſſopi comam tritam lineo panniculo illigatam in feruentem aquam demittito, oculo q̄ admo- ueto. Sequitur enim cruor adeo, ut ex linteolo compreſſo exprimi queat. † Aut nitrum, & terram Æthiopicā, ac myrrham, pari pondere cum aqua illinīto. Aut foliorum oleæ viridiū ſuccum ſublinīto. Aut ammiū & hyſſopum cum lacte bubulo terito, agitato, ac ſublinīto. Aut ſemen lini tritum cum butyro per linteolum exprimito, ac ſublinīto: caput verò frigida perfundito.

† Aliq. tñ cod. hñt. Aut nitrū & Aethiopicā myrrham pari pondere & c.

Curatio Tumorū.

☉ Ad tumoreſ ex plaga circa oculos obortoſ valde conuenit fomētum per mollem ſpongiam aſſiduē factum, ita ut noua ſpongia poſtea aceto diluto madefacta imponatur. Conuenit inſuper ſinapi vetuſtum ex aqua tritum, aſſiduē circūpoſitum & ablatum. Similiter & naſturtiū, ſi poſt eorum ablationem loci aſſiduē calida aqua foueantur.

* Α. προστι- θέμενον i. appo- ſitum.

Ad Oculos Scabroſ ac aridoſ.

Ad oculos propter Solem, aut omnino puluerem, ſcabroſ atque aridoſ factōſ, aqua multa aſtare

Aestate quidem frigida, hyeme verò calida affusa, commodat. Conuenit & spongiæ calida aut lentis decocto imbutæ fomentum. Iplis verò oculorum angulis, rubi, lentisci, myrti, rosarum succū, vnumquēq; per se cū aqua adhibeto. Aut rosas aridas tritas cum vino: aut earum florem. Aut vinum maris experts, ac oleum vetus, maximè vbi dormire voluerint, ad moueto. Cōducit præterea his, vt à fallis, acribus, amplius q; acidis omnibus abstineant. Porro ad inueteratas & callosas circa palpebras affectiones, amurcam coctam cum oleo tritam illinito.

Ad Glabras, simul q; nascentes alias palpebras, Prilos Græcis dictos.

¶ In ijs qui Glabras, simul q; nascentes alias palpebras, qui q; pilos non habent, egregiè facit, ac pilos producit, hoc medicamentum. Acaciæ 3 ij: atramenti librarij aridi, aut si fieri potest memphitici 3 v: succi porri heminas quatuor, vini maris expertis heminas iiii: coquito donec strigmentitiam formam induant, & repolitis in pyxide vtitor. Aut muscerdas & caprarum sterora vsta pari mensura, cineris calami Græci duplum, cum melle attico illinito. Hoc verò etiam palpebrarū defluuia emendat. Æruginis tritæ partem vnam, ammoniaci thymiamatis tantundem, trita adhibeto. Facit idem & egregiè ad scabros oculos. Aut cadmiam tritam melle subactam in ollula vrito ac affato: deinde æris vsti tantundem admisceto, ac tritis vtitor.

B *Ad Pilos inutiles & pungentes in palpebris nascentes, Trichiasin hoc malum Græci appellant.*

¶ Pilos inutiliter in palpebris supernascentes euellito, & sanguinem cimum illinito, & non enascenē. Papias Laodicēsis Autolyçi medicus multa in his tentabat: euellebat primū ipsos pilos, deinde locum diligenter cum dropace iritabat, & cum chamæleone albo trito viridium ranarum sanguine permulto (sunt aut ranæ quæ in arundinibus degunt) illinebat: neque enim postea enascuntur. Potes & euullis prius pilis cedriam cum tellinarum cinere mistam ac tritam illinere. Ad eandē quoq; rem auiculæ cinēdi appellatæ felle vtitor. Aut phagri marini piscis itidem felle. Aut ricini à cane fœmina adempti sanguine. Egregiè facit hoc. Fellis & sanguinis erinacei terrestris pares partes, fellis chamæleonis tantundem, castorii parum, ad formā squamularum pisciū reducto: & pilis radicitus euullis vtitor, squamulam vnam oris saliuæ matutina dilutam illinēdo, locum q; ad dimidium horæ obligando. Dolitant equidem ex medicamēti huius vsu, sed pili amplius non enascuntur. Aut felle hyænæ fœminæ mox ab euulsione illinito. Aut tellinarū tenuissimam puluerem oblinito. Aut euullis pilis, cicutæ folium & cedriam equalibus partibus cum vespertilionis sanguine illine, illitum q; donec exarescat tene: si enim hoc oculum contingat, eius humorem corrumpit. Aut ab euulsione, capræ fel cum brassicæ succo illinito. Aut capni siue fumaricæ herbæ succo palpebræ alam siue summitatem illinito: deinde pilos euellito, rursus q; illinito. Testatus est & Hermeas spumam aquæ post dropacum adhibitionem illitam summè conducere.

De Staphylomatus siue Vuis, & Albuginibus.

¶ Staphylomata tolles cantharidum succo illito. Albugines verò citò sanat nitrum cum oleo veteri diligēter tritum & illitū. Aut lacertæ sterus illine, & tolles. Aut nycticoracis ouum illine, & tinges ipsas. Aut croci, piperis, æquales partes, cum felis felle in collyria formato, ac illinito. Aut lepiæ testam tritam melle subigito, ac vrito, & læuigato, postea pharmaco hoc sublinito.

Curatio Obfuscationis visus, & Suffusionis.

¶ Obfuscationē oēm, aut et incipiētem suffusionē per sanat vulturis fel cum marrubii succo ac melle attico. Aut myrrhæ & piperis partes æquales cum melle. Aut solanum nigrum illine. Facit & Cyprus in ærea pyxide repolita. Aut fœniculi succum, & fel taurinum liquidū, paribus partibus, mellis attici duplum, illinito. Aut croci, & piperis equas porciones felle taurino excipito, atq; in collyria redigito, ac illinito. Aut populi nigræ liquorem cum duplo mellis attici illinito.

De Humorū Suffusionibus.

¶ Fellis testudinis marinæ partem vnam, mellis attici quadruplum illinito. Fel ipsum etiam D per se sufficit cum aqua illitum.

Ad Pterygia.

¶ In pterygijs oculorum, atramenti sutorij, salis ammoniaci, æquales partes, gummi dimidium, cum aceto in collyria formato, ac illinito. Aut populi nigræ liquorem cum duplo mellis attici mistum ac tritum illinito.

Ad Glaucos Oculos, & Nyctalopas hoc est lusciosos.

¶ Solani succus instillatus glaucos oculos denigrat. In lusciosis verò, hepar hircinum affato, ipsum q; inter affandum destillantem cruorem coadunato, atq; hoc quidem ipsos illinito: ipsum verò hepar edendum præbeto. Auxiliatur & columbinus sanguis illitus, et fel capræ. Aut hepar caprinum coquito, eos q; obuelatos in ollam intendere iubeto, quò elatum inde vaporem oculis susceperint. Ipsum verò hepar assiduè edendum dato: ex hoc enim citò auxilium sentient. Aut elaterii obolum, seminis portulacæ 3 j, cum melle inunge. Aut sterus asini recens exuccato ac illinito. Vescatur ager beta, vulturis iecore affato, eius q; felle illinatur.

Ad Crithas i. instar hordei oblongos circa palpebrarum pilos abscessus, qui item Posthia Græcis appellantur.

¶ Abscessus circa palpebrarum ciliacrihas ab hordei similitudine Græcis appellatas ceræ albæ fomento discuties. Aut muscæ caput auellito, ac reliquo corpore abscessum ipsum confricato.

Galenī

GALENI DE COMPOSITIONE MEDICAMENTORVM LOCALIVM SIVE SECUNDVM LOCOS LIBER QVINTVS

ARGVMENTVM LIBRI

Ad reliquas Faciei, Dentium, ac Gingiuarum affectiones, Medicamenta.

De Sugillatione sub oculis, Hypopion Græci dicunt.

CAP. 1.

delis q̄ in me-
dicat. fi. cō. 3.
tex. 30. 7. 219.
c. Et d Liquid.
vsu a principio.
Et de Fract. cō.
2. tex. 28. 7.
235. g. De Ar-
t. c. 4. 68. 292. c



Vod "Hypopion sub oculis fiat, nomen ipsum indicat: idē enim est velut si quis hypophthalmium dicat, quod ipsum sub oculis sonat. Est autē ex genere effusionū, ecchymomatū appellatū. Appellat ita || Hippocrates & alii mul-
ti medici, circa cutē affectionē, cum tenuibus in ipsa venis contulis sanguis p
fissuras effundit, nō vno loco aceruatim ac statim ita excretus in grumos co-
ies, sed post q̄ per persultationē hoc est diapedelin, vt ipsi appellāt, effusio ip-
sa facta est. Cōtingit sanē aliquñ vbi ita coierit, tps progressu liuescere et deni-
grari, paruis nimirū grumulis ex dispo in multas cutis partes sanguine coa-

A. l. 4. f. 7. r. 2. c.
6. fol. 311. c.

ctis. Quare meritō ad eius curationē statim festināt medici, priusq̄ denigrescat, scopū medēdi ha-
bētes vt sanguis discutiat, cū sciāt id quod in grumos coierit ex sanguine, ægerrimē discuti posse.
Cū vero tunica venarū, ex qbus sanguis exilit rumpat, parū quiddā ex adstringētibus ad discuti-
tiā admisceat: si. n. ex sola simplici facultate discussoria pharmacū a principio adhibeat, non solū
quod effusum est discutiet, sed & p fissuras aliquid attrahet ex sanguine in cōtulis venis cōtēto.
Postq̄ verō in suā naturā redierint venulæ, ad discussoria pharmaca citra adstringentiū admistio-
nē opportunē transimus. Quēadmodum autē in alijs affectibus pleriq̄ medicorū indistinctē auxi-
lia cōscripserunt, ita ēt in his citra eas quas iā recēsi distictiones, simpliciter sugillatorū remedia
prodiderūt. Porro si vos eorū q̄ in libris de simpliciū pharmacorum facultate didicistis, memores
fueritis, faciliē discernere poteritis, quas nā sugillationes sola discussione digerere oporteat absque
adstrictione, & in quibus admiscere cōueniat quippiā ex parcē adstringētibus. Quin & ex ipsis di-
scussorijs imbecilliora primū adhibenda esse manifestū est, fortiora verō inueteratis & denigratis
admouēda. Exēpli itaq̄ loco primū ea quibus ipse vtōr indicabo, inde ad ea q̄ probati medici tradi-
derūt progressurus. Appellat autē collyriū Neli ex rosīs diarhodon, multis iam annis præclarū &
celebratū, cuius cōpositionē proximo libro tradidi: hoc ipsum in oculariorū coticula ex aqua con-
tero, atq̄ sugillationi illino, fertulæ cāpanæ ac fœnigraci decocto prius pro fomēto admoto, dein-
de ēt collyrio ex eo decocto dissoluto, postea ēt ex ipsius solius fœnigraci decocto. Quod si reliq̄
quæpiā affectionis resistēt, in fœnigraci decocto collyria ex myrrha, diasmyrna appellata, soluo ac
illino. Cōducit autē bis in die pharmacū hoc illinere, simul q̄ fomentū decoctorum calidorum per
mollē spongiā prius admouere, ita vt primū ex ambobus fœnograco & meliloto decoctū fiat:
inueterato aut malo ex solo fœnograco. Hic curādī modus vt plurimū perfectē sugillata p̄sanat
paucis oīno subterfugientibus eum q̄ respuentibus: in quibus collyrium ex sandice commodum
est, & ex pharmacis ad sugillata a medicis descriptis ea q̄ generosē discutiendi vim habēt. Initium
autem faciam ab eis quę Archigenes in primo pharmacorum fm genus conscripsit, propositurus
quidē ipsius verba: postea verō si quid ab eo ad distictionem pertinēs relictū est, appositurus.

A. ibidem. f

Archigenis. Pharmaca ad Sugillata, iuxta ipsius dictiōnem.

C Sugillata euestigio sanat raphanus impositus: auferes autē ipsum postq̄ mordere inceperit.
Rectē fecit in eo, quod adscripsit tollendum esse vbi mordere cōperit: si. n. diutius maneat, venu-
las contusas commordendo oscula ipsarum aperiet. Quapropter & a principio eo vtendum non
est: vbi verō inueteratæ fuerint sugillationes & iam denigratæ, etiā si quis longiori tpe incumbere
ipsum sinat, magis iuuabit. Facit & caseus recens salsus impositus. Ipse quidem caseus vim ob-
struendī meatus habet, verū recens salsus & non dum inueteratus mistam facultatem habet, ob-
ducitricem ex se ipso, discussoriam verō & aliquāliter adstringentem ex sale: quare nihil absurdi est
eo etiam in principio vti. Aut ceratum cum ablinthio, vel raphani succo subactum. Aut hyssopī
coma leuigata eodem modo. Siue cum ablinthij coma trita, siue cū succo ceratum subactum ad-
hibeas, eandem vim demonstrabit: verum ad tactum mollius reddetur pharmacum si succus cum
cerato committatur. At verō raphani succus, aut hyssopum cerato addita efficacius reddunt phar-
macum, q̄ vt a principio statim adhiberi conueniat, nisi iam planē liuida aut nigra facta sit sugilla-
tio, qd etiam ipse deinceps dicet. Summē facit ad recētia & liuida sugillata spongia muria tincta
& assiduē imposita ac ablata: postea verō fomentum assiduū ex calida aqua prōdest. Quemad-
modum raphano in principio vti minimē tutum est, ob eam quam dixi causam, sic etiam muria:
quapropter

H

A quapropter etiam post eius vsum, calida fomentum probat, quò videlicet acrimonia ex muria inducitur cōpescatur. Neq; verò in omnibus sugillatis in principio fomento ex muria vti consulit, sed in ijs quæ statim liuescunt. Breui itaq; tempore in ijs muria vtendum est: in quibus verò cruentus, aut subflauus, aut subpallidus est color, fugere muriam oportet. Cataplasmate autem vtere faba fresa contrita, ablinthio, hysso, origano, raphani cortice, vua passa exacinata, vnoquoque per se cum melle, aut aceto, aut aqua. Imperfectè primum hæc remedia conscripsit, cum non apponat ad sermonem, coctis ne an crudis vti iubeat faba fresa, et ablinthio, et hysso. Videtur autem crudorum vsum præcipere: nam ad finem ubi dicit, cum melle, aut aceto, aut aqua, singulis prædictis vtendum esse, tum quidem coctis apposuisse. Quin & eo ipso sermone tria viribus inæqualia medicamenta tradens, minimè rectè mihi videtur præcipere cum hoc vel cū illo esse vtendum. Aqua. n. {calida} acrimoniæ omnis expertissima est, non in cute tantum, sed iplis etiam vlceribus. Mel verò vlceribus mordax est, cutem autem non offendit. Acetum verò vtrisque mordax existit. Neq; verò raphani cortex vuæ passæ viribus par est, sicut neq; ablinthium, ac hysso, & origanum: fortia enim hæc sunt, & discussoria vi prædita: moderata autem est vua passa, & omnis acrimoniæ experts. Et bulbus albus cum ouo & melle. Bulbum flatuum vt acriorem in principio statim B adhibere recusat. Scimus autē mel discussoriæ facultatis esse, quapropter ouum iplis admiscere videtur, quòd mitigandi facultate multum præstat. Cyclaminos per se, & cum vua passa. Neque hic paruum est, quod interest inter cyclaminum et vuam passam. Quare haud scio, qua ratione per se cyclamino vtatur, & admista vua passa, etenim per se vehementissimum est medicamentum: at cum vua passa commiscēs, tantū auferet facultatis, quanta fuerit admista vuæ passæ moles. Aut nitrum cum hysso & vua passa melle exceptum. Hic sermo priore rectior est, in quo etiam folius cyclamini vsum permittebat. Nam si etiam nunc hysso ipsum per se adhibere consuluisset, non apponendo inueteratis sugillationibus id conuenire, similiter vtique deliquisset. Myrtum cum sale & aqua. Dictum etiam antea à me est, quòd ex discussoriis medicamentis, in principio præstantiora sunt quæ exiguam adstringendi vim complectuntur, qualia sunt rose, & melilotum, & crocus. Non tamen ex eiusmodi pharmacorum numero est myrtus, vtpote vehementer adstringens: quapropter ego nunquam ipsa vti audeam, præsertim si iam liuidus sit color sugillationum. Sinapi cum adipe ouillo. Inueteratis & nigrefactis sugillationibus solum, hoc medicamentum conuenit, & maximè si non omnino paucum sit sinapi adipi admistum. Myrica folia & fructus trita cum aqua, per se et simul mista. Et hoc pharmacum non solum discussoriam, sed C & contractoriam quandam vim habet: quare inueteratis & nigrefactis sugillationibus non conducit. Facit & spongia, & linteolum, aceto ac melle imbuta & apposita. Hoc remedium in principio adhibitum non valde acri aceto opus habet: in progressu autem temporis liquefacta aut denigrata sugillatione nihil profuerit absque acerrimo aceto præparatum. Aut fabam fresam cōmanducatam imposito cum melle. Quin & fabæ lomentum etiam citra manducationem cū melle subactum liuida discutit: ex manducatione autem summè discussorium redditur, nimirum viribus à salua adsumptis. Oui vitellum eodem modo. Si mel ad oui vitellum miscuerimus, velut antè dixi de faba fresa, simile faciemus prædicto medicamento tum in apparatu, tum in facultate. Aut porci pulmonem calidum imposito. Hoc remedium non tolerarit vir mundiciæ amans. Aut myricæ decocto prolue. Non ita longè antè de myricæ facultate dictum est. Aut cardamomum cum myrrha impone. Discussorium quidem pharmacum est myrrha, verum acre cardamomum. Hæc sanè sufficere videntur mihi ex Archigenis scriptis exempli gratia prolata ostēso simul modo examinandi pharmaca, qualia scilicet in principio conueniant, antequam liuida aut nigra sugillatio fiat: & qualia liuidis, aut iam nigrefactis, & inueteratis sint adhibenda. Quare quæ consequantur apud eum deinceps, ea sola per se adscribam iplius Archigenis verbis. Aut ce D rullæ, & spumæ argenti æquales partes cum melle terito: & admista faba fresa ad cerati formam reducito, ac vtitor. Aut anguium senectam cum aqua marina tritam illine. Aut cuminum linteo illigatum & in feruenti aqua tinctum pro fomento adhibe. Aut sinapi cum cerato impone. Aut foeniculum tritum impone. Aut thus & thapsiam aquis portionibus cum cerato rosaceo. Aut mentam & argenti spumam parī pondere impone. Aut hordeaceam farinam cum aceto mulso coctam. Aut fabam vino maceratam donec tenera fiat, tritam splenii modo impone. Aut cicer eruinum vocatum eodem modo. Aut furnorum fuliginem cum parī cerulla ex vino odorato illine. Aut thapsiam & eruinae farinæ triplum eodem modo. Aut crudum fassamentum, omotrichon Græci vocant, exprimito: deinde in vino odorato tritam imposito. Caterum ad vetustiores sugillationes similacis fructus cum vua nigra tritus facit. Aut thapsiæ radix trita, & succus eius adipe exceptus, ac assidue appositus. In vetustis exemplaribus non vetustiores comparatiuè scriptum est, sed vetustissimas superlatiuè. Dictū est porro à me statim in principio, quòd in eiusmodi sugillationibus pharmacis forti discussoria vi prædita vti oporteat, qualia sunt sanè ab eo his verbis descripta, & quædam item ex superioribus, velut est indicatum. Atque hæc quidem Archigenes prodidit. Verum Apollonius diligentius & cum pluribus distinctionibus in primo Parabulum in hunc modum scripsit.

Pharmaca ab Apollonio conscripta ad Sugillata recentia ac liuida.

E

¶ Spongiā in aqua marina feruente tinctā assidue locis pro fomento adhibeto. Aut spōgia in acri muria tincta similiter foueto. Aut in aceto feruenti, & pariter in vino. Imponendū est & splenium melle & aceto madefactum, aut lana, aut spongia. Cataplasmate aut vtere, ablinthio trito cū melle: aut hyssopo laeuigato cum melle: & faba fresa eodem modo. Origano similiter: raphani cortice cum melle. Bulbis tritis per se, aut cū melle & oui vitello. Lini semine & salibus tritis cum oleo & oui vitello. Silphio trito cum oleo et vino. Sampsucho trito cum melle: myrto et sale tritis cum aceto: fœniculo trito cum cerato: hyssopo & nitro cum melle & aceto: calce viua cū cerato: linapi trito cum adipe vitulino, aut cum cerato. ¶ *Ad Sugillata Inueterata.* Ari radicem raphani ac melle subactam in linteolum illitam imponito: vtere et discussorijis facultatibus et compositionibus, quæ ex descriptionibus commentariorū apparantur. ¶ *Ad Sugillata cum Tumore.* Spōgiā aceto imbutam imponito, et præmonstratis fomentis frequentius vtor: cataplasmatibus loco farinā hordaceam ex aceto mulso coctam imponito, donec locus sugillatus humilior reddatur: de cetero verò subscriptis cataplasmatibus vtor. ¶ *Ad Sugillata cum Inflammatione.* Aqua calida foue, & pro cataplasmate lenticulam coctam tritam cum melle impone. Aut cochleam ægyptiam contusam impone. Vbi verò inflammatio remiserit, tūc iam et alijs pharmacis vtere. ¶ *Ad Sugillata cū F Pertusione.* In ipsam quidem pertusionis fissuram ex medicamentis, quæ cruentis vulneribus conueniunt, inde: circūlitis verò partibus cataplasma ex medicamentis ad sugillata citra pertusionem conscriptis impone. Præstabat fortassis hic iam sermonem de sugillatis desinere, verum cum ea quæ ex consentiente experimento iudicata sunt, alijs stabiliora existant, visum est mihi etiam ea quæ Crito in tertio de Ornatu scripsit apponere, quæ sanè iuxta illius dictionem ita habent.

Quæ Crito ad Sugillata recentia, Medicamenta scripsit.

¶ Cicutam tritam ex aqua impone. Ablinthium tritū ex aqua, & in linteolum infartū imponito: q si tenera sit cutis, parum mellis adicieto. Hyssopum cilicium ex aqua tritum, & in linteolum ligatum in globulos cogito, atq; his in feruentem aquam tinctis sensim foueto. Bryoniæ radicem tritam cum melle imponito: aut rosaceo cerato exceptam adhibeto. Muriam acrem facito, spongijs q in ea madefactis foueto: & post hæc raphani corticem tritum cum melle, & linteolo infartū imponito. Aut linapi tritum cerato exceptum, & exiguo adipe vitulino addito, in linteum infartum imponito. Et de his quidem in tantum. Quod si inueteratæ sint sugillationes, aut etiam appellati liuores, † subscriptis compositionibus vtendum est. ¶ *Ad Liures, & Sugillationes profundas.* Tordylii partes duas, terræ samia partem vnam, aceto excipito, paulum q mellis simul con-G quassato. Animaduertere autem oportet diligenter, ne cutis exulceretur. ¶ *Medicamentum detens Sugillata, Aristarchi.* Hyssopi cilicij drachmam j, radicis thapsiæ tantundem, thuris integri non secti tantundem, ceræ tyrrenicæ 3 ij, resinæ terebinthinæ 3 j. Arida cum liquecibilibus committito, deinde linteolo infarta imponito, animaduersione habita ne locus exulceretur: & ob hoc sanè frequenter tollere oportet. *Aliud.* Radicis thapsiæ 3 xii, aut succi 3 vi, thuris infecti drach. viii, veratri albi 3 ij, ablinthii drac. j, cerati rosacei drac. xvi: mollita reponere, ac linteolo infartus vtere. Oportet etiam hoc assidue amouere. *Aliud.* Viticis albæ obolos tres, struthij tantundem, glandis ægyptiæ tantundem, pulmonis caprini vsti tantundem, radicis asparagi tantundem, bdellij tantundem, succi thapsiæ tantundem: aceto mulso exceptis vtor. *Aliud.* Seminis viticis albæ drach. iij, radicis struthij tantundem, nitri rubri tantundem, succi raphani tantundem, hyssopi cilicij tantundem, farinæ fabarum tantundem, glandis vnguentariæ drach. xl, myricæ drac. xl, pulmonis caprini vsti drach. xl, bulbōrum rubrorum drach. xl, radicis thapsiæ drach. xl, thuris drach. xii: excipe cerato rosaceo, ac vtere, vt dictum est.

Medicamentum ab Hera conscriptum ad Sugillata.

Aufert, vt inquit Heras, tribus horis: q si inflammatio fiat, cataplasma ex viridi caseo probat, et H fomentum ex pane. ¶ Succu cicutæ obolos duos, croci drachmas ij, myrrhæ drachmam vnam, acaciæ drachmam vnam, opij drachmas ij, succi thapsiæ drachmas duas, gummi drachmam vnam, cum aqua cogito. Hoc equidem Heras scripsit. Ego " verò nucem per ætatem iam oleosam factā expertus sum aliquando ad cruentatos facientem. Oportet autem ipsam nucem diligenter terere, atq; ita imponere homini supine reclinato, quò ad horas duas & tres pharmacum adhæreat: vbi enim sic fecerit, etiam si postea surgat, ad multum tempus adhæret: oportet q; priore delapso aliud statim imponere. † ¶ *Eiusdem Heræ ad Aegilopas.* Maluæ folia cum sale et melle trita imponito: destruit hoc ac extirpat ægilopas. Alicam etiam in aceto coctam incipienti ægilopi imponito. Aut myrti recentissimas baccas cataplasmatibus modo adhibe, vbi videlicet fluxio infestauerit. Similiter facit & lemnia terra, si illinatur.

De Aegilope.

CAP. 2.

I Nter " nasios & magnum iuxta oculum angulum, paruum quoddam abscessui simile tuberculum oriri solet: & rumpitur sanè sæpe in angulum, vt ægrè curabile reddatur, nisi maturè occurratur. Mederi igitur oportet ipsi cum discussorijis medicamentis, quæ citra mordacitatem efficacia sunt: coafficitur enim oculus ab acribus, atq; ita etiā affectæ partis inflammatio augetur. Verum

† *Al. προγε-
γραμμέναις
supra scriptis.*

* AP. agnini.

* *Al. βόλων.*

† *Hic incipit
Caput 2. in an-
tiquissimo cod.
græco.*

A.1.4.f.7.12.
6.fol.511.g

A.1.3.f.3.12.
14.fol.225.f

A Verum affectio ipsa non ob id solum aegre curabilis est, sed & propterea qd cū multa liquida phar-
maca in experimentum adsumi possint, ea nō tolerat locus ipse: necessariō enim ex eis in oculum
quid influit. Neq; verō adhærere eiusmodi queant citra obligationem, quæ totum oculum com-
plectatur, quam impossibile est tot diebus aliquem perferre posse, quot ad malī curationem re-
quiruntur. Ob hanc igitur causam Apollonius nulla pharma ad egilopas scripsit. Archigenes
verō paucis enumeratis, deinceps ad curationem ipsorum per chirurgiam progreditur, quanqu-
res ipsæ non manuaria opera, sed pharmanis secundum genus, sit subiecta. Itaque totam ipsius di-
ctionem adscribam hoc modo habentem.

Quæ Archigenes ad Aegilopas scripsit in primo Pharmacorum secundum genus.

C Aegilopas qui circa oculorum angulos oriuntur eruo cum melle integimus: aut cinere vitis
cum aceto subacto. Probè facit & thus cum columbino stercore recenti impositum. Aut succum
herbæ ægilopis, auenam nostri dicunt, cum melle illine. Cæterum in non dum perforatis staphi-
dem syluestrem, & ammoniacum thymiam cum melle veluti splenium, impone. Aut alumē scis-
sile cum terebinthina splenij forma impone. Aut lanē tomentum sanguine marini leporis tinctū
inde. Aut melanteriam tritam adhibe. Quod si neque sic sanentur, diuiso angulo, & cum tenui
B perforato terebello continuis foraminibus incussis disparato, capitale emplastrum adhibeto: di-
scedent enim squamæ, & sanabuntur. Aut osse denudato cauterium admoue, & sic squamulæ di-
scedunt ac sanantur. Quidam diuidentes angulum, ossi, qua parte perforatum est, angustum in-
fundibulum admouent, ac plumbum liquefactum infundentes vrunt, atque hoc modo optime sa-
nant. Hæc quidem Archigenes scripsit.

Quæ Asclepiades ad Aegilopas conscripsit.

Porro Asclepiades in primo exteriorum hæc prodidit. **C** Succi illecebræ libram dimidiū,
succu solani lib. dimidiam, thuris 3 viij, mastiches drach. iij, galbani libræ dimidiū. Succos cum thu-
re coquito, & vbi dissolutum fuerit galbanum inijcito, mastichen verō dimitte. *Aliud.* Thuris 3
viii, myrrhæ 3 viii, ladani 3 iiii, ceræ 3 iiii: aluminis scissi, coaguli leporis, vtriusq; 3 iiii: spumæ nitri 3
iiii: pharmacum contundito, & emollito irini vnguenti face.

De Varis.

CAP. 3.

Tumor paruus & durus in faciei cute oriū, Varus Latinis, Græcis Ionthos appellatus, à crasso
videlicet succo congregatus, demonstransq; sui ipsius curationē rationabiliter per pharma-
emollientia & discussoria futuram. Etenim duricies ipsius emollientibus, tumor vero præter natu-
C ram discutientibus, opus habet. Cū igitur iam sæpe tum in superioribus libris, tum in de simpli-
cium pharmacorum facultate commētariis, prædictæ sint mihi materiæ tum discussoriorum, tum
emollientium medicamentorum, compositio sanè ipsorum particularis per experientiam iudica-
ta utilis erit ad rectum relatorum vsum, quæ videlicet paulo post referentur, vbi saltem prius deter-
minauero, quæ similes sint varis affectiones, & aliqua parte ab ipsis differentes.

De Ficosis Tumoribus.

CAP. 4.

VNa quædam hæc affectio est ex iis, quæ in mento enascunt, differens à varis in eo qd non so-
lū crassius sit qui hos tumores efficiat humor, sed & serosa tenuitate participet: ob quā ēt citō
exulcerantur, si non vt debent curent: & ob id magis reliccantibus pharmanis q̃ vari opus habet.

De Lichenosis Impetiginosis ue Tumoribus.

CAP. 5.

EThæc affectio ex misto quoque generatur humore, serosis nimirum ac tenuibus et acribus
succis cum crassis permistis: quapropter ēt facile in pforam, id est scabiē, & lepram transit: in-
diget q̃ ēt ipsa pharmanis fortiter reliccantibus. Postq̃ verō in pforam aut lepram transierit, ultra
hoc qd reliccantibus indiget pharmanis, etiam repurgantia & extersoria expostulat.

De Mentis Eruptionibus.

CAP. 6.

Hoc eruptionū, siue, vt Græci dicunt, Exanthematum nomen quidam in cōmuni vsurpant,
de affectionibus videlicet vlcerosi & asperis in mento sua sponte prouenientibus, quemad-
modum etiam Archigenes facit. Indiget aut & hæc ipsa affectio reliccantibus medicamentis.

De Furunculis.

CAP. 7.

FVrunculi Dothienes Græcis dicti ex similibus humoribus, veluti vari, generant per vniuer-
sum corpus, duplices existentes, Aliqui quidē, vt ita dixerim, varoli, duri, & aegre concoctiles:
Aliqui verō inflāmati, in quibus aliqñ ēt febres consistunt, & tumor in magnitudinem excrescit,
& in pus transmutatur: vnde curatio ipsorum vt plurimum eadem quæ inflammationis existit.

Ex Critone ad Varos.

Crito in tertio de ornatu hæc verba scripsit. **C** Ad Varos in facie. Mellis attici cyathum vnum
siue drach. xii, aceti acerrimi tantundem, misceto diligenter: & pharmaco varos illinito, digito af-
fricando. *Aliud.* Spumę argenti chemam siue drach. iij, terebinthine purę ad sabę Egyptię ma-
gnitudinem, addito olei albi parum: atque vbi prius faciem deterferis, ex medicamento hoc pau-
lum digito excipe, deinde ambabus manibus terendo varos obline. Hoc pharmacum etiam à
rugis liberam & mundam faciem conseruat. *Aliud.* Amygdalas amaras aceto dilutas ac pro-
bè tritas faciei obline. *Aliud.* Alumen scissum probè læuigatum terebinthina excipe, & emol-
litum

DE COMPOS. PHARMAC.

litum impone. *Aliud.* Costum Indicum tustum et tenuissimo cribro cretum felle caprino excipe: E ac ad cerati crassitudinem redactum varis circa vesperam illine: manè verò vbi surrexerit, lacte agrum faciem proluere iube. Inueteratis porro varis subscriptis compositionibus vtendum est.

Ad Varos Callosos.

☞ Saponis gallici 3 iiii, ammoniaci thymiamatis drach. j, thuris drach. j, aqua dissoluito, & cerati spissitudinem facito, eo q; illinito, & post horę interstitium tepida ablueri iubeto. *Aliud.* Nitri rubri, hyssopi, pulegij, salis fossilis, æquales partes tundito, & per tenuissimum cribrum cribrato, exceptis q; cerato rosaceo vtitor. *Aliud.* Seminis ocymij, nitri rubri, pulegij viridis, aluminis scissi, colti indici, singulorum æquales partes tustas & cribratas adipe anserino seu gallinaceo excipe, vt cerati fiat crassitudo: ex eo verò in linteolum infarcito, & imposito donec penitus persanescat.

Aliud. Salis assati, pulegij, hyssopi, ammoniaci thymiamatis, rhois coriarij, singulorum par pondus, rosaceo cerato exceptum, donec persanentur, imposito.

Ad Affectiones eminentiores, & in Facie pruritus, ac principium Elephantiasis.

☞ Gummi albi, spumæ nitri, thuris, sulfuris viui, singulorū æquales partes aceto dilutas ac probè tritas in pastillos redige, eos q; in vmbra exicca. Vsu verò expetere aceto dilutos illine, atq; vbi reliccati fuerint, subscripta cōpositione deterge. Saponis gallici librā vnā, ammoniaci thymiamatis tantundem, thuris quadrantem, mastiches quadrātem, spumæ nitri quadrantē. Saponem & ammoniacū in vas fictile coniecta, & aquæ sextarijs duobus affusis coquito: atq; vbi dissoluta fuerint, arida contusa & cribrata adijcito: deinde in mortariū translata ac probè conquassata, vase vitreo reponito. Vsu verò postulante faciē ex eo smeumate inquinato, & post modicum tēpōis spatiū larga aqua molliter perfricando abluito. Vtendū est hoc smeumate per oēm varorū curationem.

Ad Ficosas Menti Papularum eruptiones.

Crito in tertio de ornatu in hunc modum de eis scripsit. ☞ *Ad Ficosas in Mento eruptiones, velut Leucius præceptor tradit.* Spumæ argēti, misyos crudi, æquas partes tritas insperge. *Aliud.* Thuris drach. ij, spumæ argenti drach. iiii, salis fossilis drach. octo, sandarachę drach. ij: trita insperge. *Aliud.* Cerussę drach. iij, myseos crudi drach. iij, salis fossilis drach. ij, sandarachę drach. ij: trita insperge. *Aliud.* Atramenti futoriij drach. ij, sulfuris viui drach. ij, æruginis drach. j, nitri rubri drach. ij: trita insperge. *Aliud.* Elaterij drach. iij, salis fossilis drach. iij, atramenti futoriij drach. ij: mista insperge, & cum specilli humecti extremo admoue, quò videlicet pharmacum ipsum adhæreat. Caterū post pharmaci impositionē semine lini ex aqua trito vtendū est. Porro vbi humidiora fuerint vlcera, vt ab ipsis aqua pura velut à fonte defluat, subscriptis cōpositionibus vtendum erit.

☞ *Pa G stillus ad Ficosas Menti Papulus.* Vsus est eo Artemidorus. Reprimit omnes Tumores, qui accidunt ijs quibus Cicatrix male inducitur, veluti in ijs qui futura vfi sunt, contingit. Compositio hæc est. Squamæ æris drach. quatuor, atramenti futoriij drach. ij, aluminis scissi drach. ij, glutini fabrilis perlucidi drach. ii. Arida tunduntur & cribrantur, glutinum verò aceto maceratur, & tritis affunditur: rursus q; leuigatur, & formantur pastilli, quos vsus tempore aceto dilutos illinimus. Hoc medicamentum etiam fistularum callos extirpat. ☞ *Alius Magni Clinici.* Aluminis scissi, æruginis corinthiæ, rubricæ linopidis, chalcitidis, glutinis fabrilis, singulorum æquas portiones: composito, ac vtitor vt dictum est.

☞ *Alius Ary Asclepiadei.* Milti siue rubricæ linopidis, æruginis corinthiæ, aluminis scissi, gallæ omphacitidis, malicorij, æquas singulorum partes, gummi duplum: aceto excipito, ac vtere vt dictum est. ☞ *Alius Apollony, vt Charixenus tradit.* Squamæ æris, misyos assati, auripigmenti, singulorum drach. ij, diphyrgis drach. iij, æris vsti drach. iiii, chalcitidis vstæ drach. iij, glutinis fabrilis drach. iij, aceto diluito, & pastillos formato: quibus velut superioribus vtitor. ☞ *Andronis Pharmacum accommodatum.* Atramenti futoriij drach. ij, myrrhæ drach. ii, thuris drach. iiii, aluminis scissi drach. iiii, malicorij drach. viii, gallarum drach. octo, aristolochiæ drach. octo: vino austero exceptis vt prædictis vtere.

Critonis, ad Lichenas in mento.

Consequenter verò Crito ad lichenas menti scripsit hoc modo. Ad mēti lichenas quæ iniucū diffima est affectio. Nā & pruriginē inducit, & affectarū partium circūtentionem, & periculū nō modicum: proserpit enim aliqñ per totam faciem, oculos q; contingit, et fermè extreme foeditatis causa existit. Quapropter diligentiore cura vtendum est inspiciēdo tum paroxysmos i. iritationes, tum interualla & remissiones, ita vt etiam ab inueteratis recentes disparemus: in quibus cōueniet vti resiccantibus medicamentis. Cū verò in psoram aut lepram transierint, supra resiccantia etiā exterforiorum & repurgantium erit vsus, & postea sanè subscriptarum item compositionum.

Crispi amici ad recentes in Mento, siue alia Faciei parte Lichenas.

☞ Tritici grana multa in incudem imposito, deinde laminam æris igni candefactam tritico superponito, & resolutum ab eo liquorem calidum adhuc auferto, ac super lichenas linito. Hoc solo multos curatos scimus. *Aliud.* Maluæ agrestis semen tenerum adhuc colligito, mundato, ac tundito, succum que reponito, atq; eo assidue illinito. *Aliud.* Portulacæ succum assidue illinito.

Aliud. Oleæ athiopiciæ lachrymam cum aqua terito, & pauco adiecto styrace misceto, & imposito. *Aliud.* Vlmi lachrymam aqua dissolutam imposito. Quò si inueterati sint lichenas, sequentes

Aquentes compositiones adhibendæ sunt: Albuci radicem aceto coctam & tritam illinito. Vitis folia trita cum aceto imposito. Capparis folia trita cum aceto imposito. Rumicis hortensis radicis corticem ex aceto tritum, loco prius cum nitro præparato, imposito. Chamæleonis radicem aceto coctam & tritam imposito. Caterum cum ad lichenum curationem multa & varia medicamina existant, particulatim de singulis transigam, initio à pastillis sumpto. *¶ Pastilli Lichenici.* Glutinis fabrilis drach. iij, alij duas habent: sulfuris viui drach. ij, chamæleonis drach. iij, thuris drach. ij, aceti hemina dimidium: glutinum aceto dissoluitur, deinde aridis adijcitur. Vfus tempore, quantum satis est, aceto dissoluito, calidum q̄ imposito. In alijs exemplaribus singulorum par pondus continet. *Alius.* Chamæleonis, sulfuris viui, vtriusq; iij: lachrymæ oleæ æthiopice 3 ij, thuris 3 j, aceti quatum satis est. Iuxta alios, Alcyonii 3 ij, chamæleonis nigri 3 iij, pyrethri 3 ij, sulfuris viui 3 iij, thuris drach. iij, glutini 3 iij, aceti acerrimi heminas iij. *Alius.* Lachrymæ oleæ æthiopice drach. iij, sulfuris viui 3 iij, alcyonii drach. viij, spumæ nitri drach. octo, alicæ aceto coctæ 3 octo, aceti quod satis est. *Alius.* Alcyonii vsti 3 ij, chamæleonis nigri 3 iij, radicis albuci drach. iij, sulfuris viui 3 duas, thuris drach. ij, pyrethri drach. ij, spumæ nitri drach. ij, glutinis 3 iij, aceti quod satis est. Porro extenta iam affectione & callosa reddita, sequentibus vtendum est me-

*Aliter iij.

Bdicamentis. *¶ Humida ad Impetiginum affectus.* Misyos peregrini, thuris, myrrhæ, aluminis scissi, singulorum drach. octo: aloes, sulfuris viui, vtriusq; drach. iij: excipe passo, vt frigmentitiâ spissitudinem accipiant, & bis aut ter in die præfrictis, illine: forinsecus autem conseruandi pharmaci gratia, vesicæ pelliculam, aut oui testam, aut viridia folia quatum satis est impone. *Aliud.* Misyos drach. iij, acaciæ 3 ij, squamæ æris 3 iij, sulfuris viui 3 vi, chalcitidis drach. viij, gummi drach. viii, aceti quod satis est: in quo vbi gummi dissolueris, reliqua q̄ admiscueris, amurcam iniice, & probe cōquassata reconde, ac vtire vt dictum est. *Aliud.* Sulfuris viui, thuris, myrrhæ, atramenti sutorii, misyos crudi, singulorum 3 ii: gummi 3 iiii: aceto & cedrino oleo quod satis est dissoluito, eodē q̄ vtire modo. *¶ Ex scriptis Zeuxidis.* *Aliud.* Chalcitidis crudæ, misyos crudi, myrrhæ aminææ, sulfuris viui, singulorum æquales partes: gummi duplum aceto dissolutū: excipe oleo cedrino. Verum cedrinum prius coquere oportet vsq; ad mellis crassitudinem. *¶ Aliud Diodori.* Lachrymæ oleæ æthiopice 3 xx, gummi 3 xl, atramenti sutorii 3 xvi, sulfuris viui 3 x, thuris drach. x, æruginis 3 x, acaciæ drach. x, myrrhæ aminææ 3 x, aceti quod satis est. Et vbi dissoluta fuerint singula, ac laeuissima reddita, excipe amurca condensata, & repositis vtire. Adnectantur porro & aliæ compositiones. *¶ Illitio cocta ad Lichenas inueteratos, quæ citra vlcerationem persanat.* Atramenti sutorii,

*Aliter iij.

Coenigraci moliti, cardamomi, singulorum 3 ii, melanthii sesquidrach. foliorum caprifici sesquidrach. aceti acerrimi quod satis est. Lauigata ad mellis spissitudinem reducito, deinde coquito, & postq̄ nigrum factum fuerit & condensatum pharmacum, tollito, illinito, t̄ insuper q̄ lichenas abluito. *¶ Heracides Tarentini Illitio Lichenica, sanat citra vlcerationem.* Polentarum 3 viii, glutini 3 vi, atramenti sutorii 3 iiii, chalcitidis 3 iiii, sulfuris viui 3 iiii, spumæ nitri 3 vi, alcyonii 3 iiii, myrrhæ aminææ 3 ii, aceti heminas iij. *¶ Dionysii condiscipuli, sanat citra vlcerationem.* Farinæ hordeaceæ sextarium vnum, atramenti sutorij vnc. j, corticis radicis rumicis syluestris sextarium vnum, sulfuris viui vnc. j, myrrhæ sesquiunciam, gummi vnc. j, aceti heminas vi. Rumicis radicē coquito, & vbi dissoluta fuerit, extractam terito: hordeaceam verò farinam in residuum liquorem coniectam coquito: atq; vbi reficere habuerit, reliqua iniicito, & ablatis vtitor. *¶ Illitio Socratonis cocta.* Farinæ alicæ sextarios sex, sulfuris viui 3 xvi, misyos peregrini 3 xvi, cimoliæ 3 xvi, chalcitidis drach. xvi, spumæ nitri drach. viii, alcyonii drach. viii, aluminis scissi drach. viii, radicis albuci vnc. viii, myrrhæ drach. viii, thuris 3 viii: lachrymæ oleæ drach. viii, ammoniaci thymiamatis drach. viii, aceti heminas tres. Alcyonium & albucom in aceto coquito, vbi verò ad dimidias redactum fuerit percolato, & in colamento ammoniacum, myrrham, thus, oleæ lachrymam, dissoluito: deinde terito, arida q̄ iniicito: alicam verò in residuo liquore coquito, & dissolutam reliquis adijcito, simul q̄ terito ac vtitor. *In alijs Collectaneis sic habet.* Sulfuris viui, misyos peregrini, chalcitidis, singulorum drachmas xvi: nitri, aluminis scissi, alcyonii, radicis albuci, thuris, lachrymæ oleæ, terræ cimoliæ, ammoniaci thymiamatis, singulorum drach. viii: aceti heminam vnam. *¶ Alia valde efficax.* Aceti acerrimi sextarios vi, farinæ hordei sextar. duos, manne sextarium j, radicis rumicis agrestis 3 xx, veratri albi drach. x, alcyonii drach. xv, cardamomi drach. iiii, terræ cimoliæ drach. viii, glutinis 3 xvi, spumæ nitri drach. xvi, halicacabi virgultorum viridiū manipulum. Componito. Quan-

*Al. καρδάμου.

† Aliter πρὸ ἀπαιττωμένου, id est prius ipsos abluens.

*Aliter iij.

*Aliter sextarios.

Dda q̄ iniicito: alicam verò in residuo liquore coquito, & dissolutam reliquis adijcito, simul q̄ terito ac vtitor. *In alijs Collectaneis sic habet.* Sulfuris viui, misyos peregrini, chalcitidis, singulorum drachmas xvi: nitri, aluminis scissi, alcyonii, radicis albuci, thuris, lachrymæ oleæ, terræ cimoliæ, ammoniaci thymiamatis, singulorum drach. viii: aceti heminam vnam. *¶ Alia valde efficax.* Aceti acerrimi sextarios vi, farinæ hordei sextar. duos, manne sextarium j, radicis rumicis agrestis 3 xx, veratri albi drach. x, alcyonii drach. xv, cardamomi drach. iiii, terræ cimoliæ drach. viii, glutinis 3 xvi, spumæ nitri drach. xvi, halicacabi virgultorum viridiū manipulum. Componito. Quandoquidem verò multi pharmacorum quæ illinuntur cōpositiones recusant, amant q̄ magis emplastrorum impositiones, vtpote quæ neq; sudoribus obortis disfluunt, neq; reliccata cutem circuntendunt, merito etiam ipsorum præparationes subiungimus.

*Aliter vnum.

† In textu sunt quinque, aliter octo.

Emplastrum Lichenica, quæ citra exulcerationem liberant.

¶ Cera picis coctæ, thuris, terebinthinæ, sulfuris viui, singulorum libræ dimidium: liquabilia cum aridis committito. *Aliud.* Thuris drachmas viii, aluminis {rotundi} drach. viii, atramenti sutorij drach. octo, sulfuris viui drach. quatuor, glutinis 3 quatuor, radicis chamæleonis 3 iij, ceræ drach. octo, picis crudæ heminas duas. Picem & glutinū coquito, atq; vbi condensata fuerint cerā iniicito, aridis q̄ affundito, ac repositis vtitor. *Aliud, Facit ad Lichenas eleuatos, adeo vt reprimat ea quæ*

Quinta Classis.

XXXXX

residua

DE COMPOS. PHARMAC.

residua putantur. Mannæ thuris, picis, vtriusq; drac. octo: bituminis 3 octo: ceræ 3 octo, resinæ pinus E 3 octo, sulfuris viui 3 viij, olei cyprini parū. Coquito vt dictū est, & sublatis vtitor in linteolū aut pelliculam tenuem infartis. *¶ Aliud, citra vlcerationem remouet.* Picis brutiæ liquidæ † sextarium vnum, 3 mannæ lib. j, sulfuris viui lib. j, farinæ lupinorum lib. j: pro consuetudine composito, deinde chalbani sextantem adijcito. Est hoc ex valde probatis. Alia exemplaria farinam non habēt, neq; chalbanum. *¶ Emplastrum Lichenicum Philotæ, citra vlcerationem sanans. Exhibitū est à Philotæ soldati, per versus scriptum.* Chalcitidis assatæ, chrysocollæ, misyos assati, squamæ æris, diphrygis, salis ammoniaci, terræ eretria, singulorum drach. quatuor: sulfuris viui drach. xij: atramenti futorij, floris lapidis asij, æris vsti, singulorum 3 vj: foreos drach. v, aluminis liquidi drach. iij. Hæc omnia terito, deinde aceti heminis xij affulsis, per dies v sub canicula Soli exposita itidem probe terito, donec pharmacum redditum fuerit eruginosum siccum ve. Porro in alio mortario thuris uncia vna, myrrhæ sextans, aloes vnc. j, ladani quadrans, opopanacis quadrans, aceto dissoluta ad strigmentitiam crassitudinem præparentur, atq; vbi recte habuerint, ad ea quæ in Sole læuigata sunt adijciantur, rursus q; terantur, addatur q; aristolochiæ rotundæ & longæ, vtriusq; tusæ & tenuissimo cribro excusæ drach. j. Postquam verò iam trita emplastri formam acceperint, liquefcebilia prius liquefacta & frigefacta inijsito. Sunt autem hæc: Ceræ 3 ex, terebinthinæ 3 xx, chalbani 3 x, olei hemin. j: & probe emollitis ac repositis vtitor. Hoc pharmacum duplicem aspectum videntibus exhibet. Cæterum si affectio pertinacius perseueret, & pharmacorum impositionem respuat, excoriatorijs appellatis remedijs vtendum erit: promptè enim superficiem aucllunt.

De Excoriatorijs Lichenum.

¶ Excoriatorium Lichenum, quo Pamphilus Romæ vsus plurima lucratus est, cum in vrbe Mentagra appellatus morbus inualesceret. Squamæ æris drach. vi, auripigmenti drach. iij, sandarachæ drach. iij, æris vsti sesquidrach. veratri albi sesquidrachmam, ventrium cantharidum sesquidrach. Singula per se terito: deinde simul mista, cedria excipito: & ad strigmenti densitudinem reducta pyxide eris cyprij reponito. Vsu autem expetete, nitro & aceto exiguo perfrictis lichenibus, pharmacum hoc cum spatula illine, ac affrica: deinde interiectio spacio derade, rursus q; pharmacum impone: deinde vbi bis vel ter hoc feceris, quò faciliè deradi possit, rursus imponere tenta, illitis locis cum vesicæ bubulæ aut alterius cuiusdam animalis pellicula interiectis, hæc enim pharmacum ne defluat cōseruat, & aliàs leuis est: post pelliculæ autem impositionem, fasciola leuiter obligatum finito. Præstitit quidem per noctem adherere, aut saltem ad aliquot horas, vsquequo bullas excitet saniem complectentes crassam & glutinosam. Deinde verò lauare præcipimus, & in balneo morari: nam G & hoc ad hanc curationem auxiliatur: sit autem calidius balneum. Quo siquid vti prohibeat, fomentum aquæ multæ calidæ adhibendum est: quo deterso panis ex aqua mulla subactus cataplasmatismis modo imponatur. Porro vbi sordida iam facta fuerint vlcera, splenium ex emplastro viridi imponito, exigua parte de excoriatorio adiecta. Cæterum sanie exclusa & nulla crustula vlceri incumbente, splenium album imponito: atque hac curandi ratione donec cicatrix penitus inducatur vtitor, singulis diebus fomentum adhibens, & nouum splenium imponens. Post cicatricē plenè inductam, si qua suspicio reliqua sit, eodem curationis ductu vtendum est. Antequam verò excoriatoria imponantur, circumlitas & vicinas licheni partes pharmaco aliquo inflammationent arcete in splenio excepto, integere ac tueri oportet, nimirum lichene sua extrema linea semper parum quiddam ex sanis corporibus affricante & inuadente. Hæc communis Mentagræ curationis est. *¶ Aliud Excoriatorium Axiory.* Squamæ æris drachmas sex, atramenti futorij drac. quatuor cantharidum sesquidrachmam, veratri albi sesquidrach. sandarachæ drach. j: excipe cedria.

¶ Aliud Apij Phasci, ad Mentagras, quod citra cicatricis vestigium sanat. Facit & ad Alopecias inueteratas. Cæterum alopecias in Sole aut ad ignem illinito, & bulla excitata eam acu perpungito, ac humore excluso cum ceratis curationem perficito: post inductam enim cicatricem enascuntur pili. H Atq; hæc quidem in alopecijs: in lichenibus verò velut prædictum est vtitor. Pharmacum ipsum hoc modo habet. Sandarachæ 3 ij, auripigmenti 3 ij, squamæ æris drach. ij, veratri nigri drach. j, elaterij drach. j, ventrium cantharidum drach. j: excipe cedria. *¶ Aliud.* Cantharidum drach. j & dimidiam, veratri albi tantundem, auripigmenti drach. duas, squamæ æris tantundem, atramenti futorij drach. j, scammonia drach. duas, excipe cedria. *¶ Aliud.* Auripigmenti vsti drach. duas, squamæ æris cyprij drach. vi, chrysocollæ drach. j, atramenti futorij drach. j, veratri nigri drach. j, aluminis scissi drach. j, succi thapliæ drac. j, scammonia drach. j, cantharidum drach. i, cedriæ quod satis est.

¶ Emplastra Viridia Lichenica. Post excoriatoriorum vsum emplastra viridia & alba imponere oportet, quare rōnabile est & illorū præparationes adscribere. *¶ Emplastrum Viride Pamphili.* Hoc vsus est Pamphilus in Mentagra post rupturam bullarum. Ceræ lib. j, eruginis rasæ sexuncem, resinæ frictæ lib. duas, olei cyath. iij, aceti acerrimi quantum sufficit. Æruginem cum aceto in Sole terere oportet: liquefcebilia autem liquantur & refrigerantur, ac deraduntur, liquidis que adijciuntur.

¶ Viride Demosthenis. Ceræ lib. ij, resinæ frictæ lib. j, eruginis rasæ trientem, mannæ trientem, olei estate cyath. iij, hyeme cyath. vi, aceti quantum sufficit. *¶ Viride Herophili.* Æruginis drach. ij, manne drach. iij, adipis vitulini drach. xij, chalbani drach. iij, ceræ drach. lxxx, resinæ drac. viginti, aceti

† Aliter lib. i.

* Aliter vi.

* AP. sextans.

* AP. 3 iij.

* Aliter vnc. i.
aliter 3 ii.

* Al. Phibhu-
sci.

* Aliter i.

* Aliter Aeris.

* AP. quadratē.

A aceti quod satis est. *Tryphonus antiqui Emplastrum Euchrum à bono colore dictum.* † Aeris vsti trientem, aluminis rotundi sextantem, eruginis rasæ sextantē, salis ammoniaci sextantē, manne sextantē, cere lib. ij, resinę frictæ lib. ij, olei dextantē, aceti quod satis est. *Antonini Emplastrum.* Hoc Timocrates post Lichenas excoxiatos imponit. Cere 3 c, colophonias 3 cc, squamæ cypriæ drach. x. j, aluminis rotundi 3 xij, eruginis 3 xij, manne 3 xii, chalbanus 3 xii, olei heminā vnā, aceti quod satis est.

Annectendæ his etiam emplastrorū alborum præparationes: nam his post viridia vtendū est mundis iam factis ab excoxiatione vlceribus. Etenim cura habenda est vt citra calum cicatrix inducatur, atque ea gratia eiusmodi pharmaca in vsum veniunt, quæ multam ad taciū lenitatem inducunt. *Emplastrum Album Aquosum appellatum.* Hoc Magnus circulator vñs est post Lichenas excoxiatos. Spumæ argenti lib. j, ceræ tyrrenicæ lib. j, olei sextarium j, cerullæ lib. j, aquæ sextariū j. Spumā argenti, cerullam, & aquam terito, atq; vbi leuigata reddita fuerint, paulatim oleū adtitillato, assidue q; terito: & postquā vnita fuerint, in vas fictile translata igni imposito, assidue q; agitato: & absorpta iam aqua ceram iniicito, qua dissoluta in mortarium transferro: & emollitis repositis vñtor. *Emplastrum Pancratiastarum siue athletarum, Thrypherum id est delicatum appellatum.* Facit item Ambustus, vt citra cicatricis vñgium sanentur. Spumæ argenti 3 xxv, cerullæ 3 xxv, plūbagi

B nis lotæ 3 xxv, ceræ 3 xvi, terebinthinæ 3 xvi, olei heminam vnā, aquæ tantundem: composito vt dictum est. *Megetis Chirurgi.* Cerullæ lib. ij, ceræ lib. j, terebinthinæ vñc. † j, spumæ argenti lib. j, olei lib. iij, aquæ sextarios ij: composito. *Diophanti ad Ambusta, & Intertrigenes.* Conseruat & faciem rosaceo dissolutum. Spumæ argenti tōrrefactæ 3 xii, medullę ceruicę drac. xvi, cerullæ tōrrefactę 3 xii, ceræ 3 octo, terebinthinæ 3 octo, thuris 3 octo, olei heminas quatuor: pro more composito.

Manna Emplastrum, medicamentum accommodatum. Spumę argenti 3 c, cerullæ 3 c, ceræ 3 l, terebinthinæ drac. xxv, manne drach. xvi, aluminis scissi drac. † xl, olei heminas ij & dimidiā: composito, & reposito vñtor. Affricus porro & extritis lichenibus à quocunq; tandem medicamento, præsertim verò ab excoxiatoriis, subscriptis vtendum est.

Compositio Menecratis, quæ Proteus excoxiatorium appellatur.

Picis brutiæ pellucidę liccæ & electę drach. ii & dimidiā, resinę pinus pellucidę lib. j, & quadrantem, cere ponticę tantundem, chalbanus quadrantem, aceti heminam vnā. Liquefactis, lia ad splendidum ignem donec non inquinent coquito, deinde chalbanum adiecto: atque vbi dissolutum fuerit, ab igne ablatis, acutum paulatim instillato, assidue q; moueto, animaduersione habita ne ebulliat: & insumpto iam aceto pharmacum in magnum mortarium transferro, ac diligenter terito, donec ad melinum colorem reducat: deinde in pelliculam albam inspissatam repositum seruato. Vñs verò exigente, in pelliculas quantum ad integendos affectos locos satis est, infartū imposito, & tertio quoq; die soluto: nō nunquam vsq; in diem duodecimū imposito, ita vt quatuor fiant solutiones. Hoc pharmacum squamas discedere facit, & corpora attenuat, ac solida facit ad convenientes excoxiationes.

Quæ Archigenes in Secundo Pharmacorum secundum genus Pharmaca scripsit ad Papularum in mento eruptiones † & ad Ficosas eminentias.

*Papularum in mento eruptiones, ex myrti baccis, malicorio, argenti spuma, cris flore, paribus partibus exceptis, cum vño obline: In ficosis verò menti papulis, mentagris appellatis, & ab aliquibus lichenibus agrestibus siue feris, faciunt quidem robustiora ex iis quę ad lichenas relata sunt: Amplius autem & quę ad psoras & lepras describentur. Mirabiliter verò hæc compositio cōuenit: Atramenti sutorii drach. j, veratri nigri drach. j, auripigmenti drach. j, ventrium cantharidum drach. ii, quidam etiam obolos tres insuper addunt: tritis vñtor cum oleo, aut cedria, aut rosaceo, præfrictio prius loco. Fiunt enim bullę, quibus per specilli culpidem rupus, rursus affricato, quod penetrare pharmacum possit & mordere: deinde post horā fomento adhibito, ceratum rosaceum imposito, hoc vsquequo ad cicatricem perueniat facito. Quod si primum non expuerit, iterum iterū q; illinito. Facit & ad lepras & leucas, alopecias q; & psoras, excellenter. *Heraclides Tarentini, ex libris ad Antiochidem, ad Capitis & Mentis Ficosos tumores, atque etiam alijs partibus eminentia vñscula.* Elaterii & salis pares partes misceto ac vñtor: supernē verò lini semen crudū ex aqua imposito, aut ficus paruas tritas. Eodem etiam ad tubercula vtendum est.*

De Dentium Affectionibus.

CAP. 9.

Ex dentium affectionibus aliqua sanē omnibus euidenter apparent: Quemadmodum cum perforati sunt, aut denigrati, aut detriti: aut neq; frigida ferunt, neq; calida, sed ex vñtisque, aut altero solo dolor eis contingit. Quędam verò non manifestē apparent in ipsis affectiones, veluti cum ipse æger se sentire dicit circa corpus dentis dolorem in profundo obortum. Quidam enim contradicunt asserentes, cum os sit dens, eum citra dolorem affici, veluti cum aliquando prominentiores per limulam deterere cogimur, aut etiam ob aliam quampiam causam, de quibus paulo post mentionem faciam. Nunc enim citra rationalem & naturalem demonstrationē testimonium his perhibere volo, qui ipsum dentem dolere aiunt. Etenim cum ego aliquando dolerem, diligētem super me ipso animaduersionem habui, vtpote qui iam audieram de hac dubitatione: percepi q; manifestē non dolentem modo, sed etiam pullantem dentem, quemadmodum carnosę

Quinta Classis.

XXXXX ij partes

† Al. Aeris vsti 3 iij, aluminis rotundi 3 iij, eruginis rasæ 3 ii, salis ammoniaci 3 ii, manne & c.
* Al. heminas duas.

† Aliter ij.

* Al. Ablung.

* Al. Ablung.

† Aliter iij.

* Aliter vel.

* Aliter 3 iij.

† Aliter, sum alias sum ficosas.

* vñceret.

† Aliter staphyomata.

partes inflammatione vexata consueuerunt. Quare mirum mihi videbatur quod & hæc affectio E quam phlegmonem siue inflammationem appellamus, in dente oriri posset, qui lapideam & durā substantiam habet. Atqui cum etiā alio tempore dentem dolerē, manifestē senti non ipsius dentis, sed gingiuarum dolorem eum esse, inflammationis videlicet ipsis, ut etiam citra coarctationem dolerent: quin & ob vicinitatem dentium natura durorum, aucto dolore ob coarctationem. Quapropter vtriusque doloris sensum expertus, alium quidē in gingiue, alium in ipsius dentis substantia, esse clarē scio: & id asserentibus testimoniū præbeo, quod ipsi aliquando dentes dolent. At verò nerui, qui ad radicem dentis enatus & substratus est, dolore aliquando fieri, neruo imaginationē confusam & indiscriminatā incertā ve apud plerosq; exhibente, tanquā ipse dens doleat, consentaneū rationi est: nam & huius rei manifestum periculū aliquando in me ipso feci. Et sanē quod remaneat adhuc parua doloris portio exempto dente, innascitur ob nerui inflammationem, cum dolor nerui leuior tantū reddatur cū ob id q; non amplius tendatur ob coherentiam ossis extendentis, tum q; liber facilius respirationem quandam habeat, eū q; remedia quæ adhibentur contingere possint. Neq; enim per contactum, neq; per distributionē, possibile fuerit inflammatum neruum curare, vtrinq; a dentium locellis coarctatum, & ab anteriori parte ab ipso dente. Si verò liuidi per omnem suā substantiā facti appareant dentes, nihil mirum est ipsos quid inflammationi simile pati. Cui rei ex eo quis amplius fidē habeat, q; ex nutrimento ferē per omnē animantis etatem incrementum accipiant. Id quod euidenter sæpenumero apparet in ijs dentibus qui exemptis oppositi sunt, utpote qui semper augescunt: quantum verò augescunt, tantum in ciborum māsu deteruntur. Cum verò impossibile sit incrementum accipere citra nutrimentum, omnino duabus affectionibus, & his contrarijs obnoxij erunt, inopiæ videlicet & redundantia alimentum quod eis suppeditatur. Inopia igitur aridiores & macriores alimentum q; non sentientes, & ob id tenuiores eos reddit: redundantia verò consimilem in eis affectionem excitare potest, qualis est circa carnosas partes inflammatio. Eius igitur curatio fiet iuxta eundem scopum quem habent propolitū qui inflammationes curant: qui sanē est ut redundantia euacuetur, partim discutiendo, partim eā repellendo. Cæterum tenuitatis dentium ob alimēti inopiam remedium nullum est: laxari enim tunc & moueri ipsos necessarium est, compage ipsorum laxiore facta, cum non solum ipsi dentes, sed & locelli eos complectentes sint attenuati. Hæc itaq; affectio † senibus accedit citius aut ferius, velut etiam magis aut minus: quæ verò proportionem ad inflammationem habet, magis iuuenes corripit. Auxiliari tñ etiā senibus oportet, auxilio gingiuis exhibito: ita autem appellatur carnes quæ dentes comprehendunt, vbi primum ē locellis emergunt. Ipsas itaq; adstringentibus G medicamentis robustiores, & magis circa dentem adstrictas, facere oportet, tanq; quæ & ipsæ aliquid faciant ad stabilitatem ac firmitatem dentium, quæ ob exactam cōpagis ipsorum conglutinationem contingit. At verò foramina dentium ex humorum acrium & erodentiū influxu perficiuntur, velut vlcera in cute citra externā causam. Verum in cute id assidue & multis: in ossibus rarò contingit, quanto videlicet minus, q; cutis, noxæ expolita sunt ob duritiem naturalem. Manifestum igitur quod erosorum corporum medela erit per resiccationem vitiatum influentis humoris: qui si paucus fuerit, localibus auxilijs ex resiccantibus pharmacis contingere medela potest: eorum verò materiā paulo post dicemus. Si verò multus influens humor fuerit, vniuersi capitis ratio ac prouidentia habenda est: atq; si ipsum quandoq; propter totum corpus affectum sit, etiā reliqui corporis cura habenda erit. Porro erosos dentes qui id mali præ mollicie perpeffi sunt, reddere oportet duriores & affectioni minus obnoxios, atq; id per austerā & acerba medicamenta. Cæterum liuidos redditos per resiccantia curare oportet, ut qui ex humorum vitiorum influxu id patiantur. Simili igitur curatione indigent cum perforatis.

† Additur in antiquis, ἐξ ἀνάγκης, id est ex necessitate.

De Gingiuarum Curatione.

CAP. 9.

Gingiuis ex inflammatione dolentibus optimum pharmacum est oleū lentiscinum caliditate temperatum ore retentum. Sit autem recens, nam vetustius tanto recētiore peius est, quanto etate antecellit. Imponatur autē vasculū in quo calefit lentiscinū, in aliud maius vas quod satis aque calidę complectatur. Maximopere itaq; inflammationi gingiuarum hoc conducit. Nec verò minus etiam si iuxta aliam quandam partem, cum pelliculę linguam ambientis, tum succingentis rotum os, aliquis dolor ob inflammationem oriatur, dolorem sedat lentiscinum: repellit enim citra molestiam & absque asperitate, quā pleraque austerorum habent: discutit q; citra mordacitatem, cuius rei inflammationis præcipuus vsus existit. Quidā verò medici cōmuni quadā falsā ratiocinatione vtentes inflammata ledunt: quare ea re semel perpenſa de cætero vitare oportet. Existimant. n. si adstringentia solū id quod influat repellendo, inflammationis profunt, atq; aliquando etiā quid ex contento circa inflammatam partem, ad venas membrū ipsum nutrientes exprimendo, verisimile ob id esse, id quod amplius adstringit, amplius prodesse: eodem modo etiam id quod magis digerendo discutit, magis auxiliari opinantur, quā ea quæ moderatē idē præstant: non animaduertentes quod alterū ipsorum intentum inflammationis dolorosum existit. A vehementer. n. adstringentibus partes simile quiddam contusioni perpetiuntur, nimirum cum substantia ipsarum violenter cōdensetur: ab acribus verò erosioni quid simile contingit. Merito igitur moderatum in vtraq;

A in vtraq; facultate immoderatis praefertur. Hac igitur sufficienter mihi praefatus videor. Ceterum de affectionibus citra dolores deinceps narrabo. In dolore dentium citra gingivarum inflammationem, aliquando in ipso proprio dentium, veluti dixi, corpore, aliquando vero in nervo, dolorem fieri contingit. Vehementissimis igitur opus est medicamentis, siue quis repellere, siue discutere velit doloris causam, siue humor sit, siue status ventosus. Et propterea sane pleraq; ipsorum ex acerrimo aceto preparantur. Adscribam autem ex ordine quae aliorum relatione nobis tradita sunt, initio ab ijs quae Archigenes tradidit sumpto.

Quae Archigenes ad Dentium Dolores conscripsit.

C Dolentes dentes colluat acri aceto calido cum galla. Aut halicacabi radice cum aceto & galla. Aut pinguis tædis in aceto feruefactis. Aut myrti ramulis & galla cum pice in aceto tepefactis. Aut hyoscyami semine & folis cum aceto. Aut cedria, vel propoli, vel nardo, vel solano aut succo eius, vel cappari, vel allijs, vel myrti ramulis siue in aceto siue vini fæce calida feruefactis. Aut polij folijs, vel ipsa herba, vel agrestis cucumeris radice, vel marrubio, singulis cum aceto, pipere, & nitro. Aut radice chamaeleonis eodem modo. Aut hyssopo, vel staphide sylvestri, vel ruta cum vino. Aut pulegio cum aceto mulso. Aut platani pilulas, vel rosas aridas, in vino albo ad tertias coquito: & vinum in fictili seruat, eo q; assidue dentes colluito. Eodem modo vtere pēta phili siue quinquefolij, quae ab aliquibus eupatorium dicitur radice cocta ex vino, aut pulegij large cocti decocto. Aut cornu cerui in posca cocti colluito. Aut brassicae cauliculos tres, & loreos 5 ij, in aceti sextario vno ad tertias coquito, & colluito. Egregie vero facere fertur ranc in aqua & aceto probe coctæ decoctum diutius ore retentum. Mirifice facit dens caninus vltus & tritus deinde cum aceto coctus & ore retentus. Aut malicorio & galla aceto incoctis vitior. Aut squilla ex aceto calido. Aut squille medullam in minutas partes dilectam sub libræ vnius pōdere, & in aceti sextarium inieci, in vase fictili cōdito ac inueterari sinito, vase in asinino stercore ad dies xxx defosso, & vitior. Aut asinino lacte colluito: hoc & eos qui mobiles sunt corroborat. Aut halicacabi corticis, & tæde in aceto extinctæ, decocto large incocto colluito. Aut cornu cerui in acido garo incoctum colluito. Aut idem ex aceto colluito. Aut tithymalli radicem in vino ad dimidias coctam colluito. Aut hyoscyami radicem aceto mulso coctam colluito. Aut tædarum ramenta, malicorium, alumen rotundum siue scissum, in aceto ad tertias coquito, ac tepidum colluito. Aut helixines radicem in aceto ad tertias coctam in ore detineto: atq; ubi os salua refertum fuerit, eo aperto effluere sinito. Aut allium & arundinem alexandrinam acerrimo aceto feruefactam colluito.

C Aut hyssopum, aut thymum, aut origanum, per se & simul aceto cocta colluito. Aut pyrethrum cum hyssopo, & colocynthidis medulla, similiter in aceto coquito: liquorem q; ex eis lōgo temporis spatio in ore cōtineto. Aut colocynthidē vino calido macerato, & diutius ore teneto: multam enim pituitā ducit & dolorem leuat. Aut alliorū, & erucæ seminis, ac nitri decocto collue. Aut ranunculum in vino coquito, & pramundato prius dente colluito. Aut sycamini hoc est mori, arboris lac in vinū infunde, simul q; lanas succidas in ipsum exprime, tepesce, & per lanas sordidas maxillae infunde: extrahit pituitā & dolorē tollit. In his oibus Archigenes catalogū fecit pharmacorum incidendi, discutiendi, ac calefaciendi vi praedictorum, raro aliquid ex acerbis admiscens, quale est ipsa galla. Porro cū semel rātum solanum posuerit, miratus sum cur id admisceri velit, cum nulla ratione iuuare possit, præterq; ea, iuxta quam colica pharmaca profunt, stupefaciēdo videlicet doloris sensum. Quid igitur amplius parabilem Apollonij relationem faciam, cū parum absit quin omnia comprehenderit Archigenes? Quandoquidē verō Apollonius ipse quibusdā a se traditis testimonium præbet, tanq; cunctis sedantibus dentium dolores, visum etiam mihi est illa ipsa adscribere secundum ipsius Apollonij verba, quae hoc modo habent.

Apollonij, quosdam Dolores Dentium sedat.

D **C** Alliorum nucleos v, thuris masculi obolos iij, myrti ramulos lōgitudinis duorū palmorum duos, ex his folia decerpta p se terito, similiter & alliū & thus: deinde simul omnia in nouam ollā conijcito, & aceti heminā i superfundito: ac coquito spatula ex tæda agitādo, donec ad dimidias redigatur: atq; ita tepido vitior. Oportet aut liquorē hunc in dolente parte ad multū tēpus tenere, donec liquor ipse consumatur. Cōmodū est & ante hoc balsami succū colluere, aut corticē imponere super dolentē dentē: qui si nō adsit, panacis succo contuso, inde defluentē liquorē insillare.

Post prædicta, Archigenes remedia Perforatorum Dentium cum dolore

& absq; dolore conscripsit in hæc verba.

Oblitionibus porro & epithematis eiusmodi vitior. **C** Sory ægyptium resina terebinthina exceptū obline, idem q; cauernæ inde. Aut compositionem ex duobus piperis generibus inde, nardino aut rosaceo dissolutam, & maximē amygdalino: quin & in auri eiusdem partis insilla, summē facit. Aut gallam læuigatam, aut lycio, aut resina terebinthina exceptā, obline præpur-gato dente. Aut pulegij comam tritam denti indito. Ceterum in maximis dentium doloribus summē facit hoc: Anguis senectam exurito, & cum oleo ad mellis solidi spissitudinem redigito, ac dentem præpur-gatum ex eo integito, omnia q; circumlita oblinito, item q; cauernis indito. Aut senectam anguis non vltam dentibus apprimito, & excident. Aut vermes terrenos tostos cauernæ

† Hæc omiserat interpres. Aut sulphurem non exceptum in lycio exceptum, cauernæ inde, aut obline præpur-gato dente.

Quinta Classis.

XXXXX iij pramundata

præmundatæ insperge. Aut arancorum oua vnguento nardino diluta inde. Aut melanthium E torrefactum cum oleo obline: atq; vbi parumper concluso ore tenuerit, pituitam collectam rejice re iube. Aut piper vel cāchry, hoc est rorisinarini semē, opio exceptū in cauernā inde. Porro vbi veluti inflammatione correpti fuerint, nitrum rubrum & ossium perliorum nucleum vnita resina excipe, & dentē ex eis intege, ac donec dēciderint sine: in cauernam verò piper, spumam nitri, & chalbanum cum melle inde. Aut strigmenta cum pipere eodem modo. Aut pyrethrum cum myrrhā. Aut succum cyrenaicum & piper æquali pondere cum chalbano. Aut melāthiū, & allij dimidium eius, ac parū salis simul trita obline: dolorem tollit. Aut blattę pistinarię auulso capite adipem cum rosaceo calefactum & in aurē instilla, & in cauernā inde. Aut gallā tritā cum cedria adhibe. Aut in aurem denti vicinam oleum sesaminum, in quo vermes terreni cocti sunt instilla.

Verū ipso dolente dente hyoscyamum conterant. Aut hederæ albæ cacumina quinq; cū rosaceo terito: & in mali punici putamine tepesacta, bis aut ter in die in aurē vicinā instillato. Quin & ipse fructus cum vino tritus denti illitus iuuat. Cæterū his relatis Archigenes etiam hæc subdit. Summē facit cruentatis gingiuis, alumen liquidum duplo aloes pondere addito admotum.

Aut alumen scissum & myrtum tenuissime trita affricato. Vbi verò restrictæ fuerint, melle ipsas illinito. Aut nucleorum ossium siue machærarum perliorum partes ij, myrrhæ partem j, præmū- F dato denti indito: à dolore liberat. At verò perfractis & dolentibus dentibus cauterium ignitū adinoueto. ¶ *Apophlegmatismi Pituitam extrahentes.* Post prædicta verò Archigenes ita scripsit. Apophlegmatismi optimi sunt in dentium dolore, Staphis agrestis per se & cum pulegio mādūcata. Aut quod intra gallam est nigrum, dolenti dente conterat, sinat q; pituitam esiluire: in oppositam autem aurē duos hederæ corymbos cum rosaceo tritos instilla. Aut myricæ fructus 3 ij, spumæ nitri 3 j, aluminis paulum, alliorum nucleos v, myrti folia pauca, cum aceto ad dimidias coque. spatula ex tæda agitando: id q; decoctum, colluendum ac ore continendum præbeto: deinde hianre ore pituitam esiluire permittito: & post hoc rosaceo ore colluto, pisanam sorbendā exhibeto. Si verò ex colluendo aliqua circa os vlcera fuerint, croco & rosarum succo inungito.

¶ *De Fomentis.* Fomenta ad dentium dolorem faciunt, forinsecus ex sale torrefactio, & millio in sacculos coniectis: aut per sordidos pāniculos probè calfactos. Quin & Epithemata cōducunt citra aquā apparata, velut sunt quæ ex hordeacea farina fiūt, siue ex semine lini. Ipsiū verò dolētis dentis fomentum hoc modo adhibeatur. Origanī aridi ramulum in feruens oleū tinctum dolenti denti superne affricato. Aut ricini cauliculū eodem modo. Aut staphidem agrestem stilo cui piā acuto infixam, eodem modo. Aut cera dolenti dēti imposita, specilli extremū calidissimū assidue G adhibe. Aut opoponacem & peucedani succum vnita linteolo illigato, & in feruenti oleo liquefacito: cū vero inceperit feruere pharmacum, denti imposito, & cū specillo apprimito: vt ere manē & vesperi. Atq; in vniuersum oī fomento cū forinsecus tum intrinsecus ante cibum, nec non post cibum, haud admodum multo temporis spatio ad cibum rursus spectante, vt ere. Cæterū species fomenti & hæc est: Dentem valde bene præpurgato, & ægro cōtectō ac hiare iussō, hyoscyami semine suffito. Quod si ad nullum prædictorum malum ipsum cedat, & dolor vehementer perseueret, tenui terebello dentē perforato, ac dictis remedijs vitor: hoc. n. modo magis prodesse consueuerunt. Si vero neq; sic profeceris, & videatur dens tollēdus esse, citra dolorem tollere possis valde conuenienti pharmaco hoc: Pyrethrum acerrimo aceto ad dies xl condito, terito, & reponito: vsu verò exigente, reliquis cera obturatis & probe munitis, ipsum dolentē præmundatum hoc pharmaco integito: deinde hora interposita digitis extrahito, aut scalpello exigito. Aut fori cum acerrimo aceto ad multos dies imposito, & excidet. Aut plumbaginem tritam ccrato exceptam imposito. Educunt fortiter tithymalli succus & fori cum chalbano imposita.

De his quæ Apollonius scripsit in Primo Parabilium.

Primū quidē eorum caput, sunt collutiones dentium doloribus conferentes, quæ nihil ampliū H A. l. 3. f. 6. c. 3. habent ijs, quæ Archigenes tradidit. Secūdo loco refert quæ ad erosos dolentes dētes imponātur fo. 248. c. & indantur. Tertium locum obtinent fomenta & vstiones. Quartū suffitiones ad dentium dolores. Quinto habentur commanducationes & purgationes. Sexto gargarisationes. Septimo postremum capite ea scripsit, quæ in dolore dentium auribus infunduntur: quorum nullius mentionem facere volui, cum si quis ea expetat ex libro illius petere possit, qui non adeo difficulter parabilis existit. Ego sanē ijs quæ Archigenes prodidit contentus fui. Cum vero Apollonius quæ naribus infunduntur consequenter tradat, visa sunt mihi etiam ea ipsa apponenda esse.

Quæ in Doloze Dentium Naribus infundantur, ex Apollonio in Primo Parabilium.

¶ Radicis betæ succū per se in nasum instillato, & solues dētiū dolorē. Cumini quātū tribus digitis apprehendi potest, & myrrhæ magnitudinē fabæ, & duplum interioris cucumeris terito, & lacte muliebri mista in collyria redigito, ea q; in vtranq; narem indito: atq; ita attrahere iubeto, donec quis quinq; stadia pcurrere possit: deinde pharmacū emungat. Idem ad aurium dolorē facit.

Ne Erosi Dentes Vacillent, neq; Fætores faciant.

¶ Veratrum nigrū crui magnitudine melle cocto exceptum cauernis inde. ¶ *Ad dentes denigratos.* Testam Callainam assatam ac tritam dentibus affricato. Hoc etiam gingiuas corroborat.

Aliud

* Al. ἀποση
vbi i. l. quatuor
et al.

* Al. naribus
vov.

A *Aliud.* Sal fossile melle subactum in testula torreto, terito, ac modica myrrha admista similiter affricato. *Aliud.* Pulegij partem vnā, salis tantundem, melle subacta in eodem, donec in carbonem transierint, torreto, ac trita dentibus affricato. *Aliud.* Caricas exurito ac terito, modica q̄ nar do ac melle admisto vtitor: hoc & gingiuas comprimit. *Aliud.* Polentam acerrimo aceto subacta exurito, ac tritam dentibus affricato: hoc & gingiuas fortificat. *Aliud.* Alabastris vlti 3 viii, pumicis vlti 3 iiii, salis torrefacti 3 iiii, tritis eodem vtire modo. Ab horum vsu collutione vtendum est, vino odorato, in quo ad multum tempus iris sicca fuit macerata.

Quæ Asclepiades in Primo Externorum ad Dentes scripsit.

Heraclida Tarentini ad Motos Dentes.

C Vtendum est spodio cyprio, vt per id gingiuæ comprimatur: item q̄ verbasci radicibus coctis: postea ablutio fiat ex aqua myrti, aut rubi, aut lauri: deinde spodio rursus admoto quies precipiatur. *Aliud.* Veratri nigri manipulum, radicis mandragoræ 3 iij, radicis hyoscyami 3 iij, in vas fictile conijcito, & vini chij aut coi quā optimi heminas tres superfundito, ac ad prunas luscultas ad dimidias coquito, inde q̄ liquorem excolatum ore retinendum prebeto. *C* *Aridum ad Motos Dentes.* Terebinthi fructuū torrefactorum 3 octo, aluminis scissi vlti 3 i, viii, balaustij 3 ij, * *Aliter ij.* *†* *Al. y.*
B gallarum 3 j, croci 3 j, myrrhæ 3 j: tritis vtitor. *Aliud.* Cornu cerui vlti 3 viii, rhois rubri 3 iij, omphacij 3 ij, balaustij 3 iij, corticis pinus 3 j, myrrhæ Aminnæ 3 j: tritis vtire. *C* *Collutio ad Molarium Dolores.* Radices smyrnij cum aceto mulso coquito, & excolatum liquorem ore tenendum exhibeto. *Aliud.* Rumicis agrestis radicem & platanī pilulas ex aceto mulso coquito, atque vt dictū est exhibeto. *C* *Commanducationes ad Molarium Dolores.* Canchryos 3 ij, organī 3 duās, piperis albi 3 j, myrrhæ drach. j, vūæ passæ albæ, aut alterius quā pinguiissimæ sextarij dimidium. Vuam passam diligenter tundito, myrrham verò melle dissoluito: arida autem tundito, ac tenui cribello cernito: postea vūæ passæ ac myrrhæ adijcito, misceto q̄, ac instar malagmatis emollito. Vfus verò tempore, nucis ponticæ magnitudinem commanducandam præbeto. Postquam verò collecta pituita fuerit, ægrum hiare ac prouere oportebit, quò liquor facile profluat: quo factio, vinum colluere iubeto. *Aliud.* Vūæ passæ pinguis exacinatæ sextarium dimidium, piperis albi acetabulū, grani cnidij 3 ij, spicē nardi 3 ij, calisæ 3 vnā, pyrethri 3 ij: myrrhæ 3 ij: apparato, ac vtitor vt dictum est. *C* *Ad Corrosos Dentes Præseruatium.* Per huius vsum conseruauit erosos dentes absq; dolore. Zingiber cum aceto mulso coquito ac probe terito: inde q̄ in cauernam indito, foris q̄ dentem ex eo integito. *Aliud.* Hederæ lachrymam chalbano misceto, aut tithymalli, siue ficus syluestris, succo dissoluito, ac vtitor vt dictum est. *C* *Aliud^o Dolorem tollens, ad Dolentes & Erosos Dentes.* Conducit itidem *Fusi.* Succī papaueris 3 ij, piperis albi tuli & cribrati drach. j, myrrhæ drach. ij, styracis drach. ij, chalbani drach. j, passi quod satis est his excipiendis: contundito simul, & catapotia formato, denti q̄ circumponito, & cauernæ indito. *Aliud.* Succī hyoscyami 3 ij, myrrhæ 3 ij, opij 3 ij, chalbani 3 ij, styracis 3 ij, zingiberis 3 ij, piperis drach. j, succi syriaci tantundem, passi quod satis est: præparato, ac vtitor vt dictum est.

Molare Emplastrum bonum, quod in multis miraculo fuit.

C Lachrymæ oleæ 3 vnā, myrrhæ 3 ij, veratri nigri 3 j, balsami liquoris 3 j, styracis 3 j, piperis 3 j, * *Aliter ii.* hyoscyami 3 j, succi papaueris 3 j, castorij obolos iiii, chalbani 3 vj, succi cyrenaici 3 j, succi carpassi 3 j, panacis 3 j, sagapeni obolos quatuor, pyrethri obol. quatuor, staphydis syluestris 3 ij, cedriæ quod satis est, quò emplastri formam acquirat. *Aliud.* Sulfuris viui 3 iij, bituminis drac. ij, amurcæ olei drach. quatuor, picis liquidæ 3 viij, cedriæ 3 xij, piperis longi drac. quatuor, opij 3 iij, pyrethri 3 iij, * *Aliter ii.* staphydis syluestris drachmam vnā, veratri nigri drach. j, grani cnidij drac. j, opopanacis drac. j, picis aridæ lib. j. Arida aceto excipito, deinde liquida affundito, ac ablatis vtitor. Ex pharmaco hoc molaris dens est integendus.

D *Ad Dentes, qui Pessum eunt, vt citra dolorem excutiantur.*

C Pyrethrum in acetum coniectum ad dies iij aut iiii finito, deinde terito, & malè affecto dēti imponito, vicinis dentibus optimè præmunitis, eodem q̄ diligēter pmundato, ita vt per duos aut tres dies dēte ex hoc pharmaco integas: ita enim citra dolorem excutietur. *Aliud.* Cucumeris syluestris radices eodem modo vt pyrethrum preparato, ac vtitor vt dictum est.

De Mobilibus Dentibus ac Prominentibus.

Relatum à me etiam antè est, quòd ob senilem etatem aliqui dentes resiccati mobiles fiūt, modicum omnino auxilium ex adstringentibus pharmacis, quibus gingiuæ coarctātur, ferētes. Referetur autem & nunc, quòd aliqui ex plaga mobiles fiunt. Quidam verò etiam citra plagam: in quibus coniecturam facio neruum, qui ad radices ipsorum adnatus & substratus est, per multam humiditatem rigatum, laxatum esse, & ob hoc resiccantibus medicamentis ad curationem opus esse. Postq̄ autem motos dentes reliquis prominentiores factos videbam, & maximè cum & plaga id essent perpeffi, visum est mihi eos lima atterendos esse in tantum, quātum super reliquos prominent, ne scilicet oppositos sibi offendant tum in loquendo, tum in manducando: atq; sanè repperi experimētum mihi fauens ac testimoniū præbens. Ferream itaq; limulam quò celerius opus succederet feci, multę enim aggressiones dētem mobilem faciūt: cui quiete & minimo

Quinta Classis.

XXXXX iij motu

DE COMPOS. PHARMAC.

motu opus est, si saltem stabiliri debeat. Quandoq; igitur eminentiæ inæquales apparent in dentibus, & iuxta aliquas tantum partes lima opus habent. Aliquando verò æquales sunt extremitates, & equali similiter lima indigent. Oportet autem gingiuis linteolum molle vsq; ad radices dentium circundare, deinde cum digitis sinistrae manus leniter amplecti, simul q; tute & citra cōpressionem, ne concutiatui cui limam adhibemus, atq; ita chirurgiam aggredi. Quod si dolorem percipiat, dum limula admouetur, & affecta pars digitis vehementius non contingitur, quiescere quidem ab opere statim conuenit: Vbi verò ex pharmacis † quæ post referētur, } interea aliquid exhibuerimus, rursus vt dictum est aggredi, iterum q; modice cessare, donec extremitates circa dentes deterantur: atq; id non prima tantum die bis & ter, sed etiam sequenti faciendum est: ac imperandum egro vt neq; loquatur, neq; durum aliquem cibum accipiat. Utatur autem alimento succo ptisanæ, & sorbitione ex alica, & pane madido, atq; alijs ad hunc modum mollibus. Ceterum materiei sylua quæ motis dentibus commoda est, talis existit.

† *Aliter eipn
μένων i. quæ
dicta sunt.
intulerimus.*

Ab Archigene scripta, quæ Mobiles Dentes corroborant.

† *Aliter len-
tissi.*

☉ Mobiles dentium stabilire volens, myrrhæ, pompholygis, † aluminis scissi, } amyli, æquales singulorum partes tritas admoue. Aut oliuarum albarum succum, & rutam, melle mista affrica: deinde nardum cum alumine liquido obline. Aut alumen rotundum cum duplo sale dentibus F adperge. Aut aluminis scissi & misyos æquales partes cum cedria ad cerati liquidi spissitudinem redactas dentibus obline, & pituitam defluere sine. Quo facto, asininum lac colluant calidum, aut acetum, aut vinum in quo malicorium & galla sunt incocta.

Ad Debilitatos Dentes tum alios, tum molares.

☉ Mel, ceram, æquis portionibus ad Solem calida aqua diluito, & picis dimidiū admisceto, ac ad emplastri formam deducito, atq; manducanda exhibeto. Quod si aridum sit pharmacum, parū olei addito. Summè facit & mastiche chia commanducata.

{ Ad Stuporem Dentium. }

☉ Ceterum in dentium stupore portulacam manducant. Aut oleum calidum ore contineāt.

De Dentitione Puerorum, vt Archigenes scripsit.

☉ Infantibus qui dentunt, si doluerint, canino lacte gingiuas obline. Aut si leporino cerebello infantis gingiuas illeueris, citò dentes proueniunt.

Amuleta Dolori Dentium reluctantia, quibus fidem deberi putant, hæc sunt.

☉ Si batrachij siue ranunculij folia ei, qui dētē dolet, in eiusdē partis brachiū imposueris, dolore q; dē liberabit: brachiū autē exulcerabitur, cuius curā prout cōuenit facies. Si verò infans cui dentes prouenire incipiunt dolores habeat, vteris cochleæ cornu pelliculæ illigatū p amuleto appende.

* *παλαϊν.
aliter παλαι
ν.*

De Doloribus Gingiuarum.

☉ Gingiuis dolentibus collutiones ferè eedem faciunt, quæ ad dolores dentium sunt descriptæ: Magis tamen proprie facit acetum, cui hyoscyami radix est incocta. Verum inflammatis gingiuis alumen cum salis quarta parte tritum admoue: post morsum vero perceptum, vino aut foliorum oleo decocto ipsas colluant. At verò fluxione laborantibus gingiuis, & corrosis cum tumore & dolore, & per nomen depastis, præclare conducit fomentum, quod fit per auriscalpium, cui lana obuoluta est, in feruēs oleum tinctum, & gingiuis vsquequo exequenti admotum, & donec circumcirca albæ reddantur: ita. n. listitur nome, & ex sana carne id quod corrosus est connutritur: postea vero affricationibus vtere, & ijs quæ ad dentes sunt descripta. Proprie autem conuenit galla tenuissime trita acetabuli mensura, cū myrrha magnitudine fabæ: tritis itaq; ac leuigatis vtor. Quod si enascens dens difficulter oritur & pungit gingiuam, cyperum cum butyro & vnguento susino iuxta exortum illinito. Ceterum in epulide, hoc est supercrescente ex inflammatione carne, atramentum sutorium cum parī myrto, & modico alumine scisso admoueto. Faciunt plerq; etiam ex Antheris, id est floridis appellatis compositionibus.

H

Quæ Dentes Præseruent.

Quin & doloris dentium præseruatua Archigenes his verbis tradidit. ☉ In Dentium doloribus præseruantia à dolore conueniunt eiusmodi. Tithymalli radices in vino ad dimidias coquito, & bis in mē se colluito, ac nunq̃ dolebis. Optime conseruat citra dolorē & fortes dentes, si fabam ægyptiā, reiecto interno amarulento, triueris, ac dentibus & gingiuis semel in anno affricueris. Aut alumine scisso cum modica myrrha confricato, & nunquam erodentur: si verò adstringat hoc nimium, melle vtor. Aut granorum iuniperi paruorum & cupressi foliorum parem portionem, & gallæ parum, melle cocto excipito, & in pastillos drachmæ pondere reducito: ac vtor, vnum ex his commanducando, insuper q; vino odorato colluendo. Aut iridis illyricæ nucis ponticæ magnitudinē mande, similiter q; collue. Aut sali gallam omphacinen id est acerbam, in vino odorato coctā, misceto & mandito. ☉ Optime præterea tum ad Præseruandos à Dolorē Dentes, tum ad Corroborandos eosdem, ac pariter Gingiuas, amplius q; ad Decorem, faciunt Smegmata subscripta. Lanæ succidas linteolo illigatas exuri: o, deinde salis tertia parte addita affricato. Aliud. Aut dasypodis caput vstum tritū. Aliud. Aut salem & mel ad cerati formam terendo redigito, deinde mundo linteolo illigata exurito, & admista iride illyrica modica dentes confricato.

A. l. j. f. 7. l. 1.
fol. 248. b

Quæ

A

*Quæ Andromachus scripsit ad Omnes Dentium Dolores.*A. l. 5. f. u. 2. c. 4.
fol. 553. a

¶ *Compositio* Molaris eadem hora Dolorem sedans. Piperis, pyrethri, succi tithymalli, chalbani, singulorum drach. vnam: galbano excepta in cauernâ inde. ¶ *Molaris Antiphani*, etiam si non præmundatus indito, & dentem ex ea integito. Seminis hyoscyami, opij, nitri, myrrhæ, pyrethri, piperis, singulorum drach. vnam, galbani drach. ii, tritis ex vino vitior. ¶ *Alia Molaris, qua vitior*. Aluminis scissi drach. vnam, piperis albi drach. duas, opopanacis aut piperis longi obolos quatuor, foreos obolos quatuor, gummi aqua macerati drach. duas, ceræ duplum totius ponderis omnium, cætera continens in aqua calida misceto, atque ita vitior. ¶ *Alia Chereæ*. Myrrhæ drach. vnam, veratri sesqui drachmâ, pyrethri sesquidrachmâ, iridis illiricæ sesquidrachmâ, aluminis scissi obolos tres, aqua terito, & dentem oblinito, ac supernè ceram imponito. ¶ *Alia Molaris ex libris Aphrodæ*. Aluminis scissi drach. quatuor, myrrhæ obolos tres, piperis grana quinque: ego obolos tres accipio, & melius facit: resina excipe, & præmundatæ cauernæ inde, & splenium illitum superimponere.

¶ *Alia Molaris eiusdem*. Etiam non præmundatæ cauernæ hanc inde, & supernè splenium ex pharmaco item impone, & probè faciet. Seminis hyoscyami, succi papaueris, myrrhæ, nitri, pyrethri, piperis albi, singulorum partem vnam, galbani ¶ partes duas: } cum aceto tritis vitior. ¶ *Alia ex libris Aphrodæ*.

* Al. partē vna.

B Succi peucedani drach. vnam: succi papaueris drach. vnam: tithymalli myrsinitæ, succi cyrenaici, singulorum drach. vnam: galbani drach. vnam & dimidiam galbano excipe, et in cauernam inde, & ubi præpurgaris dentem, in splenium illine: in vna hora dolorem sedat. ¶ *Molaris bona*. Scissum alumen papaueris succo exceptum indito & oblinito. ¶ *Alia vt Aristocrates*. Papaueris drach. duas, sagapeni sesquiobolum, succi cyrenaici tantundem, piperis drachmâ vnam, sphōdij tantundem, myrrhæ tantundem: galbani, pyrethri, croci, singulorum tantundem: mel quod strigmentitiam spilitudinem accipiat.

* Aliter i.

Ad Dolores Dentium, Gingiuarum, Alia q; multa, Aristocrati grammatici.

¶ Mellis libram vnam, aceti acris sextarium vnum, aluminis scissi sexuncem, alij liquidi trientē habent, coquito donec nigrescat. ¶ *Ad Dentes Moros*. Aluminis scissi partem vnam, manne partem vnam: tritis vttere, conspergendo motum ex eis dentem.

Ad Erosionem & Dolorem Dentium.

¶ Quinquifolij radices in vino coctas à cœna colluendas præbè: coquito autem ad tertias. *Aliud*. Rumicis radices cum vino aut aceto coquito, & modicum auripigmenti triti inspergito, ac liquorem ore retinendum exhibeto. Coquatur itidem ad tertias. ¶ *Ad Gingiuas Madore laxas*.

C Pyrethri drach. tres, thymi drach. ii, aluminis scissi obolos tres, iridis illyricæ drach. vnam: tritis vttere, ac gingiuis impone.

Pythij, ad Moros Dentes, Gingiuas humore grauidas, & subcorruptas.

¶ Alumen scissum chartæ inuolutum vititur, deinde tritum rubrica coloratur, atq; ita gingiuis admouetur: similiter q; subcorruptis inditur.

Dioclis medici ad Dentium Dolores.

¶ Galbani, opij, piperis, ceræ, staphydis syluestris, grani cnidij, singulorum drachmâ vnam: trita cera excipito & illinito.

Aliud commodum ad Corrosos Dentes.

¶ Succum silphij indito, aut ipsam radicem. Aut galbanum cum pipere. Aut opium cum galbano. Facit et opopanax in cauernas infartus. ¶ *Ad Dentium Dolores*. Soreos drach. ij, aluminis scissi drach. ij, misyos drach. vnam: aridis vitior.

Smegma Dentium quo vitior, Gingiuas contrahit.

¶ Cornu cerui viti libras ij, lanæ succidæ teneræ quadrantem, salis ammoniaci trientem, piperis albi sextantem, costi vnciam j, aluminis scissi sextantem: lentisci, & perdicij herbæ vstæ cum lanis, ¶ *Al. drach. ii.* Dant ¶ per se solum, vtriusq; quartam libræ partem: } foliorū malabathri vnc. j: contusis simul vttere.

Quæ Crito scripsit ad Omnes Dentium Affectiones. Quædam ex eis etiam Gingiuas conferunt, & ad Fœtorem oris, & Nigros in superficie dentes.

¶ Hordeum & sale melle ac vino subacta in charta ligato ac vitito, & ex læuigatis gingiuas cōfricato. *Aliud*. Atramentum sutorium, alumen, putamina mali punici dulcis, æqualibus partibus trita ac læuigata, gingiuis in ieiunio affrica: deinde vino adstringente collue. ¶ *Aliud ad Gingiuas Vlcernas*. Nitri vsti, cyperi vsti, hordei vsti, cuiusque pares partes læuigatas cum melle illine.

¶ *Aliud ad Gingiuas, & Dentes Moros*. Iridis trientem, corticis pinus trientem, aluminis scissi vnciam vnam: aridis vttere. ¶ *Aliud ad Moros Dentes*. Lentiscum, myrtum, gallam, in vino cocta colluenda præbeto. *Aliud*. Salis partes duas, aluminis scissi vsti & acri aceto extincti partem vnam: tritis vitior, deinde vino colluito. ¶ *Ad Moros Dentes stabiliendos*. Atramentum sutorium cum oleo terito, & cum lana dentium radicibus admoueto. Facit & ad erosos dentes cera exceptum & inditum. Item cum myrto pari tritum ac melle exceptum. *Aliud*. Vlmi corticem in vino coquito, & decoctum ore tenendum exhibeto. Item cerui cornua in vino cocta. ¶ *Ad Corrosos vero Dentes*. Capparis radicem cum acri aceto ad dimidias coquito, ac repidum colluito. Cornace item eodem vitior modo. Idem ad dolores facit. ¶ *Fomentum Dentium Corrosorum, & Dolentium*. Sulfuris

D E C O M P O S . P H A R M A C .

Sulfuris viui partem vnam, butyri partem vnam, liquefacito, & cum his per auriscalpium foueto. E
Aliud. Dentes ex sale præfricato, et lixiuiũ tepefactum mediocri tempore in ore contineto. Opor
 tebat hic apponere, in gingiuarum dolore hoc conuenire.

Compositio Molaris, eadem hora siue die Dolorem sedans.

* *Aliter draci.* ¶ Piperis, pyrethri, succi tithymalli, galbani, singulorum drac. vnam, terito, & galbano excepta
 in cauernam indito. *Alia.* Piperis sesquiobolum, grani cnidij tantundem, galbani sesquidrach-
 mam, spumæ nitri obolos duos, croci sesquiobolum, iridis sicce sesquiobolum, rosarum tenerarum
 drachmæ dimidium: trita melle excipe, & ad emplastri formam redactis molarem dentem intege.

¶ *Ad Corrosos Molares.* Melanthium torrefacito, & ex acri aceto terito, inde q̃ molarium cauer-
 nã integito, & non amplius erodeat, sed manebit vt est. Quidam etiam nitri drachma vna cum acri
 aceto vtuntur. *Ad idem.* Castorii, pyrethri torrefacti, galbani, singulorum æquales partes mistas
 indito. ¶ *Vt Molaris citra dolorem tollatur.* Farinæ cicërum, puræ drachmas duas, succo tithymalli
 exceptas denti imponito, supra q̃ hederæ folia addito, & ad horam finito, tollito, & sua spõte in mi-
 nutas partes frangetur. Facit idem ad erosos, verum vsus tempore ceram emollitam circumponi-
 to. ¶ *Aliud, vt Dens Dignus tollatur.* Præmundato antea circumcirca dentem: & foreos, gallæ om-
 phacines, staphidis syluestris, aluminis scissi, sulfuris viui, piperis longi, æquales partes leuigatas ce
 F
 dria excipe et impone, cera q̃ liquefacta dentem egregie circumline. Ençit ipsos etiam pyrethrũ,
 & tithymalli myrlinitæ succus cum farina erui ad massæ fermenti modum coactus & impolitus.

† *Aliter qua* Aut pyrethrum ad dies † xl, aceto maceratum & denti circumpositum. ¶ *Aliud ad Sauciãtos.*
 Castorii, pyrethri, opii, galbani, singulorum æquas portiones mistas indito.

* *Al. βεβρω-
μενος i. erosos*

De Dentifriciorum Compositione, quibus vtor.

Quædam ex dentifricijs à me compositis experimento comprobata, & generosa efficacia præ-
 dita, digna mihi visa sunt quæ conscriberentur, & primùm sanè ea quæ frigidas dentium affectio-
 nes curant, siue ob immoderatam frigidæ aquæ potionem, siue ex fructibus per niuem frigescentis,
 siue ex quibusdam aliis edulis, aut potionibus, sint productæ: insuper q̃ si propter frigidum hu-
 morem è capite in ipsos deluẽtem ortum habeant. Dentes igitur ob humorem refrigeratos ma-
 gnificè iuuat apophlegmatismus: quo modo verò hunc præparare oporteat, alio capite priuatim
 conscriptum habes. Eos verò qui citra humorem frigescenti sunt, per solum medicamentum hoc
 quod nunc referetur curare decet. Præstat eo etiam post apophlegmatismum vt, vt non solum no-
 xium euacues humorem, sed etiam generatam ab ipso affectionem persanes. ¶ *Compositio Phar-*
maci hoc modo habet. Accipito herbas duas, quarum altera sideritis, altera perdicias, appellat: eas q̃ G
 domi sensim citra Solis admissionem siccato, vt neq̃ humidæ amplius neq̃ siccæ adeo extent: &
 vrito in tantum, vt vbi primùm contulioni & sectioni aptæ fuerint, ab vrẽdo cesses: vilciscit enim
 & corrumpitur vis earum si diutius vrantur. In alia porrò ollula sal fossilis vratur cum alumine
 scisso, attico melle subactus. Deinde hæc alijs permista tundantur, & per angustissimum excreta
 cribrum, rursus in mortario terantur: melius enim erit pharmacum, quanto diligentius fuerit læ-
 uigatum. Vtendum autem eo est solum ad dentes confricandos, citra gingiuarum circũsitarum
 contactum, nisi humore fuerint prægnantes. Cum enim resiccandi vim habeat pharmacũ, aptum
 quidem est gingiuis humentibus, inimicum verò siccis: attamen ipsas dentium radices post gin-
 giuas litas, eo confricare oportet itidem, vt ipsos dentes. Caterum eorum quæ in compositionẽ
 miscentur, eiusmodi ponderum proportio esse debet: Herbarum quidem post vstionem drachmę
 xvi: salis verò cum alumine vsti drachmæ xi. Ante verò vstionem vtriusque herbe par pondus mi-
 sceatur: sal autem quadruplici aluminis pondere admisceatur. Aliarum autem rerum nihil vra-
 tur, sed arida iniiciantur iuxta subscriptam apponderationem. Comæ origani drach. ij, piperis
 drach. nouẽm, pyrethri drach. ij, costi drach. iij, seminis apii drach. ij, iridis illyricæ drach. v, mentæ
 siccæ drach. ij, cornu cerui aut capræ vsti drach. duãs: seseleos, hyssopi, vtriusq̃ drach. ij. Si odora- H
 tum esse velis, calicæ aut amomi drach. ij, admisceto. Si vero in Regis vsum preparaueris, cinnamo-
 mi drachmam vnam addito.

Ad Mobiles Dentes aliud, quo vtor.

† *Al. sextariũ i.* ¶ Seminis callitrichi † libram vnam: } aluminis scissi et rotundi, vtriusq̃ quadrãtem: spice nar-
 * *Aliter vnc.* di sextantem, malabathri foliorum vnciam vnam, piperis albi vnciam vnam, pyrethri drach. v,
 contundito & cribrato simul omnia, ac gingiuis vsque ad radices dentium admoueto. ¶ *Timo-*
cratis Dentifricium, ad Gingiuas madore laxatas, putrescentes q̃; ac cruentatas: Mobiles Molares, Concussos dentes,
Oxenas, Putrefactiones, Parulidas, & Omnia Oris vitia, ac Dentium dolores. Accipito herbæ perdicidis mo-
 dium italicum, alij minam habent: salis albi tenuis sextarium vnum, mellis hexagium. Contundi-
 to vt massa friabilior reddatur: qua in ollam nouam coniecta, ollam luto figulino obturato: oper-
 culum autem adaptetur circa medium perforatum, quod per ipsum foramẽ rudicula immissa phar-
 macum super prunas positum agitetur, donec neq̃ fumosum quippiam, neque vaporosum effe-
 ratur. Deinde ab igne tollito & refrigerato. Et sumito ex hoc toto drach. xiiij, piperis albi drach.
 quinq̃, piperis nigri drach. sex, pyrethri drachmas sex, aluminis scissi vsti & vino austero extin-
 cti drach. ij: pumicis, myrrhæ, hyssopi, seminis apii, pulegij, singulorum sextantem: mentæ, iridis
 illyricæ,

* *Al. drach. ii.*

A illyricæ, vtriusq; drach. iij. Hæc omnia in Sole præsuccata tundito & cribrato, ac reliquis ex olla læuigatis admisceto. *Alud.* Perdicij recentis 3 x, mellis 3 iij, aluminis scissi 3 iiii, iridis illiricæ drach. iiii, piperis albi 3 octo, nigri 3 iij, pumicis 3 ii, myrrhæ 3 iij, pyrethri 3 ii, mentæ sicce drach. iiii, hylſopi drach. ii, pulegij drach. ii, seminis apii drach. ii, herbæ sideritidis drach. iiii, salis fossilis drach. xiiii. Perdiciam & sideritidem ac mel & salem mista vrito: alumen verò per se vltum vino extinguito: deinde simul omnibus contulis vitior. *Alud.* Salis affati cum melle & perdicia 3 xiiii: aluminis scissi affati & vino austero extincti, iridis illiricæ, vtriusq; drach. iiii: helxines, myrrhæ, mentæ sicce, singulorum drach. iiii: pulegii sicci, pumicis, pyrethri, hylſopi, seminis apii, singulorum drach. ii: folii malabathri drach. .ij, piperis albi drach. v, nigri drach. vi, Tufis & cribratis vitior. *Alud.* Salis tosti cum melle & perdicia drach. xiiii, pulegii drach. ii, aluminis scissi vsti & vino austero extincti drach. iiii, iridis illyricæ drach. iiii, piperis albi drach. v, nigri drach. vi, pumicis drach. ii, myrrhæ drach. iiii, mentæ drach. iiii, pyrethri drach. ii, hylſopi drach. ii, seminis apii 3 ii. Sal lotus melle probè subigitur, tritusq; in ollam nouā mittitur: deinde etiam perdicia inditur sale vndiq; conspersa: quo facto, operculum ollæ imponitur, ipsa que luto oblita in clibanum datur: indita torrentur, & exempta simul cum alijs teruntur: oportet enim valde læuigata in vsum adsumere. *¶ Smegma*
B *Dentium, quo albi & odorati redduntur, & ab erosione adseruantur.* Nitri vnciam vnam, testæ sepia vnciam vnam, myrrhæ vnciam vnam: tritis vitior. *¶ Dentifricum optimum.* Aluminis scissi sexuncem, mastiches vnciam vnam, comæ rosarum quadrantem, iridis trientem, Tritis vttere, inde q; aquam tepidam colluendam prebe.

* Aliter v.

† Aliter xii.

* καλῶς. Ἀλβ
ter uttico.

* Al. drach. vi.

* Al. drach. iij.

* Al. drach. iiii.

Dentifricum Damocrati inscriptum.

Libellus paruus extat Pythici appellatus, quem Damocrates Pythicum inscripsit, ab eo qui ipsi pharmacorum ori destinatum compositiones tradidit, appellatione ducta: in quo sanè libello iuxta finem etiam hæc conscripta reperiuntur.

Si dentifricijs voles vti bonis,

Quæ candidos custodiant, immobiles
Dentes q; reddant: oris & graueolentiam,
Laxas q; gingiuas sedent, & comprimant:
Album hoc parabis optimum sic pharmacum.

Cerui cape cornu sic quater vsti quàm optimè,
Quartam libræ partem, salis solam libram.

In Alio Exemplari sic repperi.

1. 5. fu. 2. t. 4.
2. 5. 5. 3. b

Cerui^u cape cornu sic quater vsti quàm optimè
Libram mediam, rursus salis vncias duas,
Ammoniæ sicci nec amari hinc amplius,
Alicæ q; mastiches chia solam libram:
Costi quadrantem, aut paululum quid amplius:
Albi q; iunci tantum, & albi mox piperis
Vnam vnciam, malabathri at vncias duas.

Contusa, cribrata omnia hæc mortario,
Vtenda præbebis modo quem dixero.
Quod si velis parare quando ad phlegmonas,
Et vtile gingiuas cruentis, faucibus,
Carnem q; callosam simul prominentibus,
Aluminis coniungito his scissi libram.

Alud Damocratis Dentifricium.

D Verum magis parabile hoc fortasse erit,
Et promptius factum, minus nec commodum,
Admista & hoc quadam simul dulcedine.
Multum sideritin viridem capito herbulam,
Magnam in nouam quam tu patinam mox inditam,
Miscebis hordeo recenti sed modico.
Sic hordeo vt posito sequatur fasciculus
Herbæ, sal hinc, herba atq; iterum, mox hordeum.
Fiant q; tam diu vicissim hæc omnia,
Donec patinæ omnem expleris amplitudinem,
Vt mox supernum rursus herba habeat locum.
Furno q; mox calente, vel clibano indita,
Torrenda per noctem fines, vel sic potius
Vrenda, quò teri queant ita promptius,
Cribro q; mox sed arctiore hinc excuti.
Odoris addes gratia his parum tamen

Albi

Albi piperis, thuris q³ mox item modicum.
 Hinc iunci odorū plus, cyperi q³ optimæ.
 At omnibus mistis probe, & iam sepositis
 Plus mastiches aridæ chiæ coniunxeris.
 Dabis sed hinc in vesperam volentibus,
 Mane q³ rursus maximè puris viris.
 Sed colluant à pharmaco mox Bromium
 Lymphis sociatum, & maximè hoc in vesperam,
 Sed manè acetum mulsum aquosum præstiterit
 Oris leuandis turpibus fœtoribus.

† AP. malaba-
thri drach. i.

¶ *Aliud Aurely.* Alumen in testa area aut figulina vrito, ac vino austero extinguito, eius q³ do-
 drantem accipito: & mastiches sexuncem, thuris vnciam vnam, folij malabathri drach. iij, cyperi
 drach. iij, misceto, ac vtor. *Aliud quo vtor.* Cornu cerui vsti drach. ij, † marmoris vnciam j, † ori-
 gani drach. quatuor: vtor.

Compositio Pharmaci Dentes præseruantis.

† τῆς τῖβε-
πίας.

¶ *Tragorigani* 3 ii, *hyssopi* 3 iiii: herbæ perdicij † seu perdicialis, † melle & sale tenui subactæ, et F
 in olla exusta donec in prunas redigatur, quadrantē: piperis 3 iiii, tūdito & cribrato: & post vsum
 reponito. Neq³ dolbunt dentes, neq³ hindentur, neq³ parulides producentur, neq³ gingiue super-
 flua carne redundabunt, neq³ fluxione infestabuntur. Habebis autem os odorum, & splendidos
 dentes. Quidam salsamenta in olla exusta ad pharmacum addunt, aut etiam cybium: si quis enim
 eorum cinere per se vtatur, dentis dolorem non percipiet.

* τριχους, est i
cod. græ. impf-
fis asterisco no-
tatum. Aliq ha-
bet τριχους
i. salsamenta.
Alii βετρά-
χους i. ranas,
in olla exustas.

GALENI DE COMPOSITIONE MEDICA- MENTORVM LOCALIVM SIVE SECUNDVM LOCOS LIBER SEXTVS

ARGVMENTVM LIBRI

Declarat Medicamenta, quibus succurritur Affectibus, qui in Ore contingunt.

De Affectionibus in Ore, & de Pharmacis ad eas commodis.

CAP. I.



Verus profectò sermo est, quem pleriq³ artifices in ore habent, Quòd nō idem
 sit neq³ simile à viua voce discere, & ex libro legere: at verò industrii & natu-
 ra prudentes hoies non vulgarē sape vtilitatem consequunt^r, si in libros inci-
 dant nō obscure conscriptos. Itaq³ cū sciā non parū vtilitatem ex hac tra-
 ctatione, primū quidē amicis ac sodalibus accessurū esse, qui videlicet etiam
 per opera cognouerunt, quantā vim habeat rōnalis methodus ad medicamē-
 torū copiam parandā: deinde verò ēt aliis singulis, qui optimarū rerū studio
 se fatigare nō cessant, rē gratam facere volēs: ad huius operis explicationem
 progressus sum, nō festinabundo & cōpendiario docēdi modo in hoc instituto, sed prolixo & lon-
 giorē, qualī ēt in sermonibus, quos frequēter citra scriptū ad amicos habeo, vtī soleo. Præstat. n. rō-
 nalis auxiliorū inuentio experimētatrici, quemadmodū ēt antē iam mihi in sermone de sauciatis
 neruis dictū est, in cognitione vniuersali facultatis pharmacorū, quorū vsus circa singulas affectio-
 nes cōtingit. In pharmacis itaq³ ori destinatis, ob id stomaticis appellatis, velut est quod ex moris H
 constat oibus notum, primus medendi scopus est cōis omnium partium inflammatarū: deinde cō-
 sequenter alter scopus priuatim ex ea, quæ curatur. Quæ igitur sit affectio inflammatorum, prius
 nolle oportet, si ex ipsa indicationem quandam auxiliorum accipere velimus. Prædicimus autē,
 et prius demonstratum habemus inflammationes ex calidi sanguinis influxu fieri. Didicimus etiā
 quòd hunc ipsum influxum in principio quidem reprimere ac repellere oporteat, præterquam si
 ad partem aliquam principalem recursurus sit, atq³ aliud quoddam grauius malum effecturus. Ve-
 rum nūc adeo nihil opus habemus eiusmodi determinationibus: sic nos enim vbi ad memoriam
 reuocauerimus, quomodo totum corpus præparare ad curationem affectuum circa quācūq³ par-
 tem consistentium oporteat, ad institutum progrediemur. Etenim venæ sectione vtimur, & pur-
 gatione, & clysteribus, & inedia, vbi totum corpus apparuerit aut multitudine humorum refertū,
 aut eorundem malitia vitiatum. Si verò neutrum horum adsit, statim ad curationem per localia
 remedia peruenimus. Quomodo igitur inuenire ipsa oporteat eum, qui oris inflammationes ri-
 tē curare velit, præsens sermo statim te docebit: & quomodo inuentis conuenienter vtī oporteat:
 Sodalibus autem in memoriam reuocabo, cū ij me sepe viderint pharmacis eorum medicorum,
 qui me in consiliū aduocarunt, curantem eas affectiones, quarum gratia vocatus fui. Impossibile
 enim

A. l. 3. l. 9. c. 1
fo. 254. d

Aenim est pharmaco ritè uti eum, qui vim ipsius non nescit, iuxta cuius efficaciam auxiliatur. Eodem igitur modo in inflammationibus in ore consistentibus, communis scopus omnium ipsarum si adsumperit ex natura particulæ indicationem, reperiet primum quidem genus pharmacorum quibus uti conueniet: Deinde consequenter etiã particulares in ipsis differentias, si quidem præcognouerit simplicium pharmacorum facultatem, velut iam sæpe est demonstratum. Genus igitur repellentium pharmacorum in principio inflammationum, in refrigerantium materia situm est. Hæc autem ipsa cum duplicia existant, ut didicimus, quæcunq; adstringendi natura prædita sunt, efficacior vim habent ad influxum citius repellendum. Inest autem ipsis statim etiam vis coeundi & densandi superficiem corporis, cui adhibentur. Communis igitur scopus hic est prohibendi incipientes inflammationes, ab ipsius affectionis indicatione inuentus. Alter verò a particulæ quæ curatur natura ipsi accedit, cum sciamus rariorem esse ac molliorem superficiem tunicæ oris non paulo, quàm est cutis quæ totum corpus ambit. Inest autem & aliud quiddam particulis oris, atque id duplex, quod non adest ipsi cuti. Insuauitatem enim medicamentorum quæ adhibentur sentiunt: & duos meatus subiacentes habent, per quos in ventrem & pulmonem defluere quippiam ex stomacis pharmacis potest, quale est & quod per atramentum sutorium constat. Et sane medicus quidam siue imprudens, siue inexpertus facultatis pharmacorum, ubi hoc miscuisset pharmaco ori destinato, multo quidem fortius ipsum reddiderat, verum vehementer lædens, si quidem ad gulam, aut asperam arteriæ extremum quidpiam fortè fuisset præterlapsus: atq; hæc quidem ut statim occurrentia, per ipsa verò & ventrem, & asperam arteriam, & pulmonem. Adest autem pharmaco ipsi circa gustum insuauitas, quæ tum vsus tempore molesta est, tum per totam perseverat diem, adeo ut etiam in cibis accipiendis iniucunda sit. Huiusmodi itaque fortibus & quæ venenosam habent facultatem non conuenit uti ad affectionum oris curationem, nisi magna necessitas urgeat. Neque verò de inflammationibus solum hunc sermonem intelligere oportet, cum neq; ex harum indicatione ipsum inuenerimus, sed communem esse de omnibus oris affectionibus intelligendum est, ut qui indicationem ex ipsa particulæ natura habet. His igitur consideratis ab eo qui pharmacum ex succo mororum composuit, primum quidem ipsum cum melle coxit, quo repolitur in promptu haberet per totum annum, non illo tempore solum, quo expresso fructu, succo uti licet. Melior enim solus est incipientibus inflammationibus, ideo quia sæpe ipso in huiusmodi inflammationibus uti vidistis. Magis idoneus autem est priuatim cum melle apparatus. Appellauit autem magis idoneum, non solum quia cito corrumpitur citra cocturam cum melle repositus, ita ut sequenti anni tempore eo uti non possimus: sed etiam propterea quia utilior est, ad sequentia inflammationis tempora, usque ad perfectam curationem. Quemadmodum enim in principio commoda sunt pharmaca id quod influit repellentia, sic post principium usque ad finem, pharmaco opus est ex utrisque misto, repellente videlicet & discutiente facultate prædito: ac primo quidem tempore adstringens præcellere oportet, ad finem verò discutiens, interposito verò tempore æquales utrorumque partes esse conuenit. Quando verò velut induratum quiddam de inflammatione relinquitur, penitus non conuenit adstringens ad discussorium admiscere, si quidem totum corpus sit euacuatum. Atqui neque in principio bonum est discussorium adstringenti admiscere. Caterum qui pharmacum ex succo mororum composuit, parum ex croco & myrrha ei commiscuisse videtur, quod communem habeant facultatem concoctoriam inflammationum: priuatam verò utrumque, crocus quidem quod adstringat, myrrha autem quod calfaciat in tantum, ut sufficienter discutiat. Penetrat enim magis in altum corporum myrrha quàm crocus, utpote substantiam tenuium partium habens: atque ex hoc duplicem utilitatem exhibet, simul introducens quidem secum vires admistorum, & persanans usque in altum inflàmata. Et tamen adiuuant se mutuo crocus & myrrha in penetrando in profundum, crocus quidem velut impellens myrrham: myrrha verò velut dux præcedens, peditem sequentem crocū, si ita dicere liceat, deducens. Quæadmodum enim crocus ob adstringendi vim, minus habet substantiam tenuium partium quàm myrrha, sic myrrha substantia tenuiorum partium prædita, citius quidem vim suam in altum transmittit: citius autem etiã ad cutem recurrit, simul secū efferens ea quæ in profundo sunt attenuata. Hanc igitur recursus eius velocitatem impediunt adstringentiū misturæ: non enim hoc solus facit crocus. Est itaque in pharmaco stomacico ex moris appellato, tum mororum succus qui non modicam habet adstringentem qualitatem & facultatem, tum alia quædam etiam admiscuntur, ubi quis forte pharmacum reddere velit. Hæc igitur adstringentia deducuntur quidem per myrrham, quæ vicissim ab illis compellitur, atque ita se mutuo adiuuant, quod vis ipsorum amplius progrediat. Vidistis autem sæpe me ad pharmacum ex moris in principio quidem rhois succū, aut vuae acerbæ succum, quem priuatim omphacium appellant, admiscere. Si verò hæc non adsint, florē rosarum, aut ipsas rosas siccas, balauistium, cytinus, & malicorium aridū, & gallam omphacitin appellatā: amplius autem & pini corticē, item que thuris, & tum hypocistidis, tum lentisci succū: & ut compendio dicam, omnia adstringentia, præter ea quæ corruptentem habent facultatem, quam venenosam vocant, & lethalium species quædam existit. Didicistis enim quod non omne lethale statim etiam est venenosum. Quemadmodum autem in principio inflammationis harum rerum

mistura

mistura fortius efficit medicamentum stomaticum, sic cum restiterit quod influit, nullo eiusmodi E opus habet solo: sufficit enim tunc id pharmacum quod crocum & myrrham assumplit ad inflammationem concoquendam. Nam ubi iam fuerit concocta, addimus etiā aliquid ex disculforijs, velut saepe vidistis me iniungere spumam nitri, & aliquā ipsū nitrum, quod tenuium partium existit, & iam ab omnibus Berenicium appellatur: ultra hoc ē sulfur viuū vocatum, aliquā etiā sapā, origano quāq; incocto, interdum etiam hyssopo, aut alio quopiam simili, pulegio videlicet, thymbra, thymo, calamintha hortensi ac agresti. Hoc igitur modo quis recte utetur pharmaco ex moris, si iuxta indicationum vniuersalium quantitatem ipsius vsum permutet. Quousque enim quicquam influit, id ipsum repellere conuenit: ubi verò restiterit, concoctoria afferre, et deinde consequenter disculforia. Manifestum enim, quod per huius methodi vsum, nemo qui simplicium pharmacorum facultatem nouit, vnquam auxiliorum inopia laborabit, siue per montes venetur, siue quid operetur in agro, siue in peregrinatione quāq; preparatis careat medicamentis, velut Erasistratus scripsit, qui se ipsum curauit ad rubi succum progressus, cum in illo loco Andronius pastillus praesens non esset. Cum enim sciret pastillum Andronium in adstringendo curandi dominium habere, materiam adstringentem perquisiuit, non velut Serapion & Menodotus aiunt, empirica transiitione ad simile vsum. Iuxta hanc. n. vobis demonstraui plurimam dissimilitudinem succi rubi ad pastillum F Andronium esse, paucissimam verò similitudinem iuxta vnum solum, vim videlicet adstringendi. Verum qui generalem facultatem, quam vniuersalem vocant, nouit, in quacunque materia eam reppererit, confidenter ea utetur. Huiusmodi autem materierum ingens est aceruus, quibus omnibus vti licet, ita ut solum fugiamus quae vim quandam iniucundam aut venenosam habent. Sic igitur etiā ego pharmacum ex succo nucum viridium preparauī, nullo doctore vsum, neque aliquod praescriptum secutus. Cuius vim expertus sum multum aliorum stomaticorum facultatem excedentem: alia autem dico, id quod ex moris constat: & id quod ex succo rubi mororum preparatur, ita enim rubi fructum appellant: & tertium quod ex multo: & quartum quod ex puniceorum succo: & quintum id quod per adstringentia mala componitur, ex quorum numero optima sunt cydonia & siruthia appellata, & post haec ad praesentem vsum quae celtiana à Romanis appellant. Caeterum composita ex multis talibus sunt quae ex fructibus preparantur.

De Stomatico Medicamento ex Nucibus.

Ego autem quā primum ex Alexandria in patriam meā redi, agrum pertransiui, & inueni quandam hortulanum ab vna & tonsillis ac gladiis ferè suffocatum: utebatur autem collutione aquae mulse rosae in ipsa incoctis. Cum igitur vidissem fructum nucum in vigore esse, iussi detracium ab G eis externum corticem, quo etiam tinctores videram vtentes, statim in mortario contundi, & succum eius per linteum excolari, non dum sciens quo modo iuxta crassitiem aut tenuitatem haberet. Cum verò repperissem aquosum & compage tenuem, gargarizare eum iussi ipsum hortulanum. Postquam verò valde tenuis apparebat, praecoxi: & mel commensuratè, velut in eo quod ex moris fit, fieri sciebam, admiscui: atque ubi iam ad compagem mellis redactum esset, hortulano vtendum reliqui. Porro cum viderem celerrimam vtilitatem ipsi inde oboriri, praestabile ratus sum in multis experiri: atque ex hoc sufficiente experimēto accepto de facultate eius pharmaci, semper ipso vtor, velut nolis. Merito itaque mirandum nullum ex prioribus medicis aliquid de hoc pharmaco mente concepisit, ut tum parabili tum generoso hoc succo vterentur, maxime cum viderint quo modo etiam manus inficiantur eorum, qui virides nuces decorticant. Ex his enim apparet qualis sit earum succus, & quāgrè elui possit ipsarum adstringendi vis, adeo ut neque per fortissima exterioria elui queat. Amplius autem adhuc miratus sum de medicis, quod non cogitauerint fortem esse ipsarum vim, cum etiam tinctores videant eiusmodi nucum corticibus vti. Nisi enim in profundum manuum descenderet, & nisi per omnem substantiam lanarum penetraret, non certè agrè eluibilis esset: cum verò descendat, indicat planè substantiam succi tenuium partium esse. Rationi H autem consentaneum est adstringendi vim maximè proficere, ubi in eiusmodi substantia contineatur: etenim quae ex adstringentibus crassas partes habent, per adstrictionē cogunt & condensant superficiem corporum quibus adhibentur, & à progressu in altū ipsorum corporum se impediunt: quibus enim etiā aliàs ob substantiae crassitudinem impossibile erat progredi in altum, his sanè amplius impossibile fuerit densato corpore iuuare id quod totum est inflammatum. Optimum itaque esse nucum succum persuasus, ut qui etiam coctum cum melle gustarim nihil insuauè habentem, eum in quatuor partes diuido: & ad primam statim aliquid ex adstringentibus iniicio, ad secundam ex croco & myrrha, ad tertiam sulfuris quiddam ac nitri addo: quartam verò solam synceram seruo, pueris vtilem futuram ob dulcorem, immo etiam viris ob delicias mente fractus, et mulierculis. Ego quidem igitur à ratione inductus inueni, quemadmodum neruorum fauciatorum curationem, ita etiam hoc pharmacum, quod omnibus praestat. Est equidem id quod ex rubi moris constat, fortius eo quod ex moris fit: quemadmodum hoc eo, quod ex musto paratur: Omnibus autem his praestat id quod ex nucum succo inuenimus, in principijs quidem inflammationum cum his quae fortiter adstringunt confectum: in vigore verò croco & myrrha aditis: quanquam etiam solum aliquando moderatas inflammationes sanare queat. Quando vero

Aro humorem qui inflammationem produxit impactum digerere ac discutere oportet, cum acriū mistura commodum existit. Verum dixerit fortassis quispiam mihi ex medicis pauperioribus, se amplecti quidem ipsum medicamentum, si vnam pyxidem expleri iubeam hoc pharmaco semel preparato: Me autem præcipere, aut statim à principio quatuor facere compositiones: aut vnam ex melle & succo compositam reponere, atque vsu expetente ei admiscere, vsque quo quidem influxerit quippiam inflammatis, ea quæ vehementer adstringunt: postquam autem quieverit fluxus, concoquentia: vbi verò euacuationem postulauerint ea quæ influxerunt, discutientia: Operosum autem hoc esse & difficile iis qui domi nō habent suppellectilem omnium simplicium pharmacorum: Immo neq; ad peregrinationes me commodam confectionem exponere, in quibus impossibile sit quatuor vniuscuiusq; medicamenti differentias circumferre. Ob id igitur excogitata sunt, tum mihi, tum alijs etiam prioribus medicis, pharmaca medias facultates habentia, & ad peregrinationes idonea futura, & pauperculis medicis vtilia. Quæ verò hæc ipsa sint, paulo post referam. Nunc autem pauperum medicorum sermoni respondere volo. Quemadmodum enim ipsi exilem apparatus laudant, sic oportet etiam diuitibus permittere, vt confectiones pharmacorum pro opulentia suæ dignitate comparent. Satis enim scio etiam ipse, non solum multos

B pauperes esse medicos, sed & qui ab ipsis curantur: quibus satis est vbi agrotent, alicam cum aqua mulla accipere, & mundum panem habere, aut aliquam farinam vtilem ad cataplasma. Verum eū qui curandi tractationem scribit, omnis materiae meminisse operæpretium est, quod tum diuitibus copia sit ipsis artificiosè vtendi, tum pauperibus electio sit illarum tantum, quibus vnusquisque pro opportunitate abundet.

De Mediorum Pharmacorum Compositione.

Dicamus igitur iam aliquid de compositione mediorum pharmacorum, initio ab eo quod ex moris constat sumpto. Commune est autem omnibus medijs, vt congruēs modus mellis ad succum ipsum decernatur. Inuenitur autem hic modus per experientiam. Vbi enim succum ipsum cum melle miscueris ac gustaueris, si quidem apparuerit moderatè habere, rursus similiter ipsa misceris: si verò deficere quid videbitur, addes. Velut exempli gratia, in mororum succo si quinta pars mellis addatur, medium fuerit temperamentum, vt hoc modo cōctum pharmacum plurimis valde placeat: & hanc misturam pauci reprehendant, alij quidem velut dulciorem, alij verò vt aut steriorem. Quemadmodum enim aliqui aquam mullam dilutiorem, aliqui dulciorem, libentius bibunt: sic etiam his pharmacis vtrique delectantur iuxta propriam naturam. Quando igitur aliquis pharmacū sibi præparari postularit, semper vtrique vidistis me ei qui dulcioribus delectatur, plus mellis iniicere, qui verò contrariis minus. In pharmacis igitur quæ deglutuntur, maximè coniectare oportet naturam eorum qui ipsa sument: quod enim cū molestia aut iniucundè acceptum est, stomachum subuertit: In pharmacis autem stomaticis eiusmodi diligentiam aliquando contemnere licet. Medium itaq; temperamentum, velut dixi, succi ad mel, quintuplū habeat multitudinem succum. Audito autem me, diligenter animaduertens quibus vtor verbis in symmetria seu commensuratione medicamentorum, quæ inuicem miscuntur. Iam etenim præcepi quintuplū esse debere multitudinem ipsum succum ad mel, quod nihil differt ab eo si dicam mole quintuplum esse ipsum oportere: vtrius enim modo dicatur, mensurare oportet pharmaca permiscenda. At verò si pondere iubeam quintuplum esse hoc pharmacum, per lancē vtrique facere oporteat symmetriam grauitatis ipsorum. Cæterum ad permissionem succi ad mel, non est necessarium hemina, aut cyathi meminisse, sed sufficit dicere, quintuplum esse oportere succum, mellis respectu. Si verò quid aliud his admiscendum sit ex dictis paulo antè, necessarium est dicere, quota quantitatis mole ipsis existentibus, quantū addendum sit illorum in lance appensorum. Velut in ipso adeo pharmaco ex moris, in Heræ Cappadocis medicamentario libro, mellis quidem coniicitur libra

D vna, succi autem mororum libra sex: admiscet autem ipsis croci drachmam vnam, myrrhæ duplū: par etiam croci pondus coniicit ex succo vuar acerba, qui omphacium appellatur, atque eius dimidium ex alumine scisso. Mihi verò placet quintuplum succum ad mel coniicere: par autē pondus croci & myrrhæ, vtriusq; drachmam vnā & dimidiam, ita vt ex vtriusque tres drachmæ constentur. Quod si quis omphacium addat, & vini austeri item heminam vnam, velut Heræ videtur, rectè sanè drachmā vnam omphacii addet. Si verò citra vinum præparetur, multo plus de ipso coniicere conuenit: si quidē medium temperamento pharmacū efficere velis, vnciam vnā: si verò austerius, vt in principiis conueniat, nihil peccaris si omnino duas aut tres admiscueris. Quod si non sit omphacium, pro ipso rhois succum iniice: & si volueris par pondus vtriusque indere, neque sic quicquam deliqueris. Heras tamen in symmetria huius pharmaci etiam hoc adscripsit, hoc modo: Quidam autem & heminam vnam dulcis vini. Mustum eum velle indicare palam est: prædixit enim vini austeri maris expertis heminam vnam. Mihi verò non placet, sufficiente melle iam coniecto, vnā cum hoc quod et heminam austeri vini addidit, rursus aliam misceri vini heminam: reddetur enim valde vinosum medicamentum. Coquunt autem hoc ex moris medicamentum, aliqui quidem à principio miscentes succum mororum, aliqui verò modicè præcoquentes. Heras autem videtur velle succum solum diutius coquendum esse. Scripsit igitur hoc modo, Succi mororum

rorum heminas sex ad strigmentitiam crassitudinem coquito: deinde trita admisceto, croci drach E, mam vnam, & reliqua videlicet iam dicta. Quin & ego censeo succum ipsum solum per se prae-
 quendum esse, deinde verò adijciendum mel: atq; vbi iam cacabum ab igne auferre velis, reliqua
 admiscēda esse: verum Heras videtur simul cum melle etiam alia admisceri iubere. Et vinum qui-
 dem rationabiliter quis tunc admiscuerit, myrrham verò & crocum melius est in fine cocturę inij-
 cere, eoque saltem cum alijs coquendo, aut olla in terram posita mouendo, donec omnia probe
 vniantur: Amplior autem coctura ipsorum destruit facultatem aromaticorum medicamentorum.
 Spuma argenti equidem, & plumbago, atq; alia multa metallica per cocturam meliora fiunt, Cro-
 cus autem & myrrha multa q; alia aromata in decoquendo vires amittunt. Itaq; medii facultate
 pharmaci & symmetria & coctura, moderatis inflammationibus congrua, amplius q; in maiorū
 vigore, atq; insuper in principijs & augmentis eorundem conueniens, iam relata est. Cæterum
 ad induratas inflammationes, cum iam præterierit vigor, & nihil amplius influxerit, venerit au-
 tem tempus discutiendi, admiscere conuenit ad stomaticum pharmacum aliqua discussoriorum:
 Talia autem sunt spuma nitri, & ipsum nitrum molle, aliæ q; petrae flos, & sulfur viuum. Sufficit
 porro ad prædictam medij pharmaci commensurationem admisceri, nitri quidem vnciam dimi-
 diam, sulfuris autem † vncias duas. } Quod si neq; sic præparatum habeas ipsum, neq; præstò sit ti-
 bi nitrum, aut sulfur, aut alię petrae flos: organum in sapa, quam alij sireon, nostri omnes hepsēma
 vocant, feruefacito, stomaticum q; pharmacum addito, ac gargarissare iubeto. Si verò neque sapa
 adlit, in aqua multa organum coquito. Nihil autem refert etiam, si hyssopum coniicias pro origa-
 no, aut pulegium, aut thymum, aut thymbra, aut calaminthen, aut mintham odoram quam ve-
 teres hedyolimon appellant. At verò in vigore inflammationum, non solum nihil ex eiusmodi
 pharmacis adhibere oportet, sed etiam contrarium totum: atq; rarò quidem stomaticis medicamē-
 tis vti, collutionibus autem & gargarismis mitigatorijs concoquere inflammationem: cuius gene-
 ris est, Decoctum pinguis caricarum, & oleum lentiscinum in duplo vase tepescitum. Quin &
 ipsum stomaticum pharmacum in vigoribus gargarissare conuenit, aqua multa dilutiore permi-
 stum, aut calida sapa: quæ si non adsint, aqua calida. Præualere enim oportet tunc mitigatorium et
 concoctorium ductum, velut in declinationibus discussorium, qui ex fortioribus constat medica-
 mentis. Porro meum pharmacum ex succo nucum omnium aliorum esse fortissimum opere ex-
 perti estis: ad vos enim sodales loquor, in quorum gratiam maximè ad hanc tractationem progres-
 sus sum. Quod verò etiam omnium vilissimum & parabilissimum sit, nemo ignorat: proiciunt
 enim hortulani viridium nucum cortices, vbi ipsas decorticarunt, vt vel maximos corbes nobis
 explorare liceat gratis. Mel igitur solum, vt pauperibus medicis (nam & illis oportet nos ea quæ nar-
 ramus communicare) deficit, cum eius fuerit penuria, nihil verò aliud, nisi quis vltro adeo aliud ve-
 lit. Sæpe enim hoc modo confectum pharmacum nihilo deterius apparuit eo, quod ex moris con-
 stat, in quod tum crocum, tum myrrham, indebamus. Quin etiam si alumen ipsi addere velimus,
 non est necesse scissum iniicere. Sufficiens enim adstringit etiam liquidum, quod aliqui phori-
 mon appellant, quod vilis prætij & maximè parabile in omnibus regionibus existit: tenuitate ta-
 men partium à scillo deficit, & ob id etiam minus efficax est. At verò si hortulanus aliquis aut ru-
 ralis hoc pharmacum sibi præparare velit, habuerit gratis quos coniiciat Cytinos aridos contusos
 & cribratos: nominantur autem sic primogenita punica. Quo tempore enim arbor florere desi-
 nit, fructus ipsius apparet figuratus in speciem punici mali: quem ablatum & resiccatum adserua-
 re licet ad tempus fructus nucum. In fine enim veris cytini generantur: desinente autem æstate ad
 perfectionem veniunt nuces. Quin & in terram decidunt multi cytini, aut à vêtō decussi, aut alio
 quopiam modo: quos collectos liccare licet: vt neq; hac parte egenos medicos quicquam impen-
 dere opus sit. Nostis autem acidorum & acerborum punicorum (quorum fructus parum abest vt
 elitari nequeat) cytinos meliores esse: quare etiam si ex arboribus, eos auellas, aut nemo penitus te
 prohibebit, aut certè vilissimum pretium sibi dari pro eis postulabit. Cæterum Balauustum ap-
 pellatum penitus cibus non conuenit: & si quis colligere id velit, quemadmodum organum, &
 thymbra, ac thymum, atq; alia huiusmodi, gratis licebit. Itaq; si balauustum velit quis crudum tu-
 sum ac cribratum iniicere iuxta proportionem quā antea dixi, parī omphacio pondere, vtile phar-
 macum efficiet. At verò & cortices punicorum malorum, valde parabiles res sunt, adstringendi
 vim sufficientissimam habentes, & qui ad prædicta statim in principio coniici queant. Optimum
 autem pharmacum reddetur, si iuxta id tempus quo punica non dum perfectè matura sunt, non
 tamen longè à perfectione absunt, eos cortices detractos conieceris, atq; id statim in principio co-
 cturę succi. Oportet autem prius in mortario tundere, quò ipsorum vis vniuersa citius in medica-
 mentum quod paras diffundatur.

De Confectione Pharmaci ex Malis punicis, & Malis, Alijs q; stomaticis.

Cum verò tres sint punicorum malorum differentia: aliqua enim ipsorum sunt austera, aliqua
 verò dulcia, & quædam acida: si quidem sola austera iniicias, magis adstringens pharmacum red-
 detur: si verò dulcia, suauius: quemadmodum sanè fortius fiet, si acida tantum indas. Ego autem
 consueui par pondus vniuscuiusq; generis admiscere. Nam & aliàs ipsa sola matura punica mala
 integra

† AP. 3 xvij, q-
 dā ē 3 ij, velu-
 ti etiam vetus
 interpret.

* AP. πολλοί i.
 multi.

A integra vna cum corticibus tundo, deinde succum exprimo, ac cū melle coquo: & non solū stomachicum pharmacum ori cōmodum habeo, sed & ad multa alia vtile, veluti rursus dico. Atq; hic succus ad omnia præstantior ex tribus punicorum speciebus, aut generibus, aut differentiis, aut quomocunq; quis appellare velit. Miscemus autem & ruborum fructus, quos aliqui quidem à planta denominant, batina, hoc est rubina appellant: aliqui autē composita appellatione moras appellant, apponentes quæ à rubis producuntur. Ex quibus sane succus similiter succo mororum præparatus, melius illo pharmacum redditur: sed minus validum eo, quod ex nucū succo paraf.

Quin & malorum cotoneorum, & pyrorū sylvestrium, ac mespilorū succus similiter præparatus, stomachicum pharmacum efficitur, deuorari q; aptum, cum hoc quod ex nucibus cōtat, deuorare non liceat: quanq̃. n. noxiū non sit, velut atramentum sutoriū, tamen stomacho non est cōmodum. Manifestum verò quod & ex punicis constans pharmacum, aptum est fractio & cibos satisficienti stomacho: deficit tamen ab eo quod ex malis constat. Innocuus est etiam rubi mororum succus deuoratus, velut etiam ipsorum mororum: sed succus rubi mororum habet quid quod stomachum corroborat, quod ipsum mororum succus non habet. Porro mel his omnibus succis nō eadem proportione inijcitur. Plurimo. n. nucum succus opus habet, & post eū rubi mororū: mo-

B dico aut malorum, & punicorum, & pyrorum sylvestrium: medius autē inter hos est mespilorum succus. At vero & ex cornis ac brabylis & prunis apud nos appellatis, præparantur apud nos stomachica pharmaca eodem modo, quem in principio de moris recensui, in quorum omnium confectioe rationem quandam communem referam hāc. Si quidem crassus apparuerit succus, statim mel admiscere oportet: si vero liquidior sit succus præcoquatur. Suscipit autē pyrorum ac malorum succus, amplius vero etiam plurimorum fructuum, parem sibi ipsis mēsuram mellis: succus verò eorum quæ multum acerba sunt, velut est corni fructus, aliquñ duplum, aliquando triplum, mellis adsumit. Omnia igitur hæc citra noxam deuorantur: si vero atramentum sutorium admissum sit, non valde deglutire oportet cōfectum pharmacum, præterq; si iuxta stomachū aut aliuū vlcerosam affectionem fieri suspicemur. Quin & si in ipso ore maligna vlcera fiant, præstant ex atramento sutorio medicamēta. Sufficit autem drachma ad prædictam compositionem admissa, in qua vnā mellis libram coniici est relatum: sed & plus quandoq; recte inijcitur ad vlcera putrefacta. Singula porro quæ dixi inijcere licet aliquando & multo vuarum austerarū, quas Amineas appellant. Præstat autem vltimum mustum in hunc vsum: quod enim in principio fuit liquidius est, & aqualius. Inijcienda vero sunt ex prædictis pharmacis acerbiora, quemadmodum

C sæpe vidistis me aut punica mala, aut balauitium, aut cytinosa, aut ægyptiæ spinæ fructum, aut corna, aut aliud quid ex huiusmodi adstringentibus, admiscere! Maxime vero aptus est rhus, siue masculino, siue muliebri genere, ipsum velis nominare. Est autem duplex: alter obsonis inspergitur, stomacho cōmodus: alter à tinctoribus coriorum expetitur. Vterq; vero musto incoctus stomachicum efficit medicamentum, cui admiscere licet etiam alia iuxta eādem proportionem, velut in eo quod ex moris constat relatum est. At vero citra mellis mēsuram, mustū solū per se in mellis compagem redactum, exemptis etiam quæ aliā indūt, bonum sit pharmacum in principiis, augmentis, & vigoribus: ad declinationes autem, si tædas addideris pingues: aut etiam in tenuia frustula contusas & fractas easdem vna cum rhoe in mustum cōieceris, deinde q; interposita vna die coxeris, donec suam ipsorum qualitatem in ipsum mustum transmittant. Tunc enim tædas quidem eximere ac proijcere oportet: mustum vero vsq; ad aptam cōpagem coquere, quo videlicet illiniri commodè possit. Quæcunq; autem prius ex adstringentibus inijci dixi in id quod ex nucibus præparatur medicamentum, ea omnia etiam accipienda sunt recte in mustū addi. Quod si vero pretiosius efficere pharmacum velis, inijcies etiam calix corucē, aut nardum indicam, aut malabathri folium: æque enim vt pauperibus, sic etiā diuitibus nos pharmaca scribere oportet.

D Eadem etiam prædictis stomachicis pharmacis miscetur. Sufficit autem drachma vna singulorum ex his tribus ad tantam medicamenti symmetriam ac commensurationem, iuxta quam libra mellis vna coniicitur. Nihil vero læseris, si ad singulas drachmas adhuc dimidiam apponas, vt in totū quatuor drachmæ & dimidia fiant. Caterum ad induratas inflammationes coniiciuntur quæ generosius discutere possunt, tusa videlicet & cribrata. Tempus autem indendi ipsa non est principium, sed vbi propè perfectè coctum fuerit pharmacum, aut etiam penitus coctū, olla iam in terram deposita. Sūt autem hæc, costus, amomum, & quod macer appellatur: nominatur autem sic cortex quidam aromaticus qui ex India affertur, multum calefaciens & adstringens. Quin & cyrenæicus succus ad discutiendas induratas inflammationes aptus est, quemadmodum etiam medicus, aut aliquis eorum qui postea celebres facti sunt. Pauperibus porro pro sumptuosius discusso rijs pharmacis, aut dictamnū, aut acorum, aut meon, aut pyrethrum, aut cardamomi quippiam & sinapi æquale inijciendum censeo, ita vt ad trium drachmarum pondus eorum multorum moles perueniat, ad prædictam in principio stomachicorum pharmacorum symmetriam, in qua mellis libra habebatur. Si vero quatuor aut quinque drachmarum pondus ex his explere velis, magis discussorium pharmacum habebis. Semper enim pro constitutionis affectuum proportionem, augeri ac minui pharmacorum vehementiam oportet.

DE COMPOS. PHARMAC.

De Confectione Pharmaci ex Musto, in quo etiam parabilia diuersa.

E

In pharmaco ex musto, ad decem musti heminas, tres iniicimus heminas rhois coriariorum, aut eius qui obsonijs inspergitur: si verò vtrunq; iniicimus, vtriufq; vnam & dimidiam, aut paulo plus sumimus: iuxta proportionem verò est ex disculforijs, cuiuscunq; quidem suppetat facultas. Quod si vnū tñ habeamus adstringendi vim habens quod in principio iniiciamus, aut vnū saltem disculforiū quod iuxta finem indamus, ex illo totū pondus immittimus quod ex omnibus alijs conflaret. Quæ igitur dicta sunt in medicamentum ex nucibus coniicienda, ea omnia etiā in pharmacum ex musto indantur. Quin & quæ istic nō dicta sunt, amplius iniicere licet, velut gal- lam omphacitin appellatam, aut extremitates mollis rubi, aut rubi canini, & corni, cuius etiā fructum diximus iniici oportere, velut etiā pruna, & myrti baccas, & fructū myricæ, ac spinæ egyptiæ fructum, omnia q; adstringentia, præter ea quæ medicamentariam vim habent, ne videlicet deuorata lædant. Omnia porro stomatica pharmaca quomodocunq; parata iuxta propria tempora opportuna ac commoda fiunt. Si quidem enim austeriora fiant, in principiis & vehementibus influxionibus conueniunt: si vero moderatiora, in vigoribus: si autem magis disculforia vi prædita, in declinationibus. Quare etiā si non ipsi præparauerimus quid, neq; symmetriam iniectio- rum nouerimus, sed tñ ipsum compositum pharmacum gustauerimus, cognoscemus quomodo eo sit vtendum. Hæc igitur si memoria cōseruabitis, quādo necessitate aliquādo vrgēte eorum, quæ experimento constant, pharmacorum copia non sit, ex parabili illius loci materia, vos ipsi ex tempore aptum medicamentum componere poteritis. Non solum autem in hanc rem utilis fuerit prædictorum memoria, sed etiā ad iam inuentorum conuenientem vsum. Si enim in ipsis ad stringentem qualitatem præualere inueneritis, in principiis eis vtimini: si vero mitigatoriam & laxatoriam ac concoctoriam, in doloribus & vigoribus inflammationum: si verò obduratū quip- iam & ægre solubile inflammationis relinquatur, in declinationibus. Eodem modo etiā in me- dijs temporibus, media relatorum pharmacorum medicamenta offeretis, ab repulsijs ad discul- toria paulatim transeundo, atq; si vnum duntaxat vobis præstō sit medicamentum, id ipsum per aquæ simplicis misturam exoluentes, & per additionem parabilium intensius reddentes. Sunt aut parabilia ex adstringentibus rosæ, & myrti bacca, & myrtus, & lentiscus, & rubus, & rubus cani- nus, & galla omphacitis appellata, & egyptiæ spinæ fructus, omnia q; aluminis genera. Post hæc parabilia sunt rhus culinarijs & coriarijs, & succus qui ex Syria affertur: atq; hic quidem per se admiscetur, culinarijs aut & coriarijs rhus aqua prius decocti, vtiles mistura fiūt. Est autem & glaucium ex parabilibus, & omphaciū, & cytini, & balaustia. Ex disculforijs aut parabilia mo- derata sunt caricarum & furfurum decoctum: & aqua mulla, in qua origanum, aut hyssopum aut thymus, aut calamintha, aut pulegium, aut mintha odora quam hedyolimū vocāt, sint incocta. Fortiora autem sunt etiā hæc, si diutius coquatur: amplius autē & niri spuma, aut ipsum adeo nitrum vsum: fortius verò his est sulfur viuum.

Stomaticorum Pharmacorum Compositio, in quibus etiam quæ ex Moris constat, Heras.

Proprie quidem Stomatica appellantur quæ ad vuas, tonsillas, ac omnes quæ in ore fiunt de- repente inflammationes, conueniunt. Componuntur autem per prædictam materiam, ex qua sa- nē multæ particulares compositiones à medicis sunt confectæ. Ego verò etiā hic celebrium tan- tum mentionem faciam.

Compositio Pharmaci ex Moris iuxta Heram.

Pharmacum ex Moris stomaticum, faciens ad tōllas, & vuas, atq; alias in ore inflammationes, tum illitū, tū gargariū, velut est prædictum. Præparat aut ipsum Heras hoc modo. C Succi mororū heminas vi, ad strigmentiam spissitudinē coquito: deinde tritas croci 3 j, myrrhæ 3 ij, om- phacii 3 j, aluminis scissi obol. iij, mellis heminam vnam, addito. Ipse aut Heras se etiā aliter præ- parare ipsum ait, hoc modo, vt croci drachma dimidiā iniiciatur, & passi hemina vna, & vini ma- ris expertis austeri hemina vna. Coctura autem fit vsq; ad compagem melleam.

* Aliter iij s.
& aliter vi.

Andromachi Descriptio Pharmaci ex Moris.

Andromachus aut de pharmaco ex moris in hæc verba scripsit: C Succi mororū heminas vi accipito, & in ipsum gallas v conicito, radicis autem dulcis 3 xx, vini chij heminam j: & insolato, aut coquito: deinde vbi coactum & spissatum fuerit pharmacum, radices tollito ac proicito: gal- las autem tritas admisceto, & myrrhæ drach. j, croci 3 j, aluminis scissi 3 j, omphacii drac. duas: qui- dam autem aluminis 3 ij, mellis attici heminam vnam. Manifestum autem est, quod hoc pharma- cum magis adstrictorium est q; præscriptum, maxime si alumen adsumat. Sufficientes enim erāt gallæ, & omphacium, vt multum adstringens redderent pharmacum, verum vbi alumen amplius additur, plurimum in ipso adstrictoria vis augetur. Recte tamen in eius confectionē admitta est dulcis radix, quæ exasperata lenit, & propterea asperitatem ex adstringentibus inductam lenire potest. Cæterum pro mororum succo conicitur etiā mororum rubi succus, alijs quomodocunq; velis appositis, siue vt Heras, siue vt Andromachus scripsit. Relatum autem à me antea est, quo- modo liceat ipsum variare, per eorum quæ adijciuntur admistionem. Dictum est etiā, quod per succum nucum componi queat hoc pharmacū, reliquis eodem modo iniectis. Quin & per puni- corum

Acorum malorum succum similiter præparatur, tum succo solo cum melle præparato, tū iam dictis iniectis. Sic vero & rubi fructus cū melle confectus sufficienter adstringens sit pharmacū, quem admodū sane & quod ex nucū succo parat, veluti prius est dictū. At vero etiā varia cōpositione pharmaca ex puniceorum succo à medicis conscripta sunt, velut ēt ab Andromacho his verbis.

Stomaticon ex malis Puniceis, Andromachi.

C Punicorum dulcium nucleis carentium partes ij, & acidorum partem j: succi in aneum vas congij mēsurā exprimito: deinde excolatū ad lentum ignem ad tertias coquito. Sint aut leuigate myrrhē minēæ 3 vij, crocomagmatis 3 vij, omphacij 3 viij, illyridis 3 viij, aluminis 3 iij, gallē 3 viij: vbi solueris, hæc per liquoris affusionem laeuigato, & ad melleam spissitudinem coquito: rursus p projectionem in pilam laeuigato: ac vti tor, quandoq; cum melle, quandoq; syncero. Hic non simul coquit mel cum punicorum malorum succo, sed postea cum paratum est, dupliciter pharmaco vti iubet, aliqñ quidem syncero, ad inflammationes videlicet adstrictionis indigas: aliquando vero cum melle, cum discussione indigent. Multitudinem autem succi cōgium esse iubet, hoc est sextarios sex Romanos. Cum enim Romæ medicatus sit, semper eius vrbis mensuris vti tor. Inijcit autem in ipsum myrrham, & crocomagma, & gallam, & indem illyricam, ipsam enim illyrida **B** appellare solet: amplius autem ad hæc omphacium: omnium quinq; numero, singulorum vnc. j, octo enim drachmæ vnciam efficiūt: ex alumine verò scilicet vnc. dimidiam. Scripsit porro deinceps Andromachus etiam id quod ex musto fit stomaticum, sic in hæc verba.

Andromachi Stomaticum ex Musto, quo utor.

¶ Gallas †xxx, rhois coriarij sextarios ij, musti sextar. vj. Gallas contrafras cum rhoe per diem † *Auster l.*
& noctem in multo macerato: deinde coquito, donec ex toto quarta pars superlit: & per linteolū
colato, exprimito, & in olla ad mellis crassitudinem spissato: deinde trita addito, aluminis scissi 3j, † *Al. y.*
croci 3j, myrrhæ 3j: permista reponito atq; vitior. De musto nihil manifeste retulit, ex quali vua
ipsum sumi velit, num ea quæ austerum vinum fundit, an quæ dulce, an quæ medium. Nos igitur
nosse oportet quod pharmacum ex dulci confectum magis mitigatorium & moderatum erit, ac
minus efficax. In quibus autem opus est vti vehementiore adstrictione, id quod ex acerbis vinis
fieret, vehementius quidem adstringit, leniendi autem vim non habet. Palam est autem ex medio
vino paratum, etiam mediam facultatem habere.

Critonis Stomaticum ex malis Punicis.

Crito pharmacum ex succo punicorum his verbis descripsit. **ꝥ** Stomacicum ex Punicis ad V lce-
Cra & Aphthas oris. Succi punicorum dulcium heminas sex in aereo vase ad tertias coquito: deinde
cinnamomi ʒj, calia ʒj, myrrhæ ʒj, omphacij obolos tres, croci obolos tres, nardi indicæ obolos iij,
terito: eis q̄ mellis heminam j admisceto: atq; ita adinfuso succo ad lentum ignem moueto: ac do-
nec spilletur, coquito, ac vutor. Scribit autem & aliam compositionem pharmaci ex punicis hu-
iusmodi. Malorum punicorum dulcium vnā cum corticibus tuorum ac exprellorum sextarios
vj, mellis boni sextarium j, in ollam cōiecta coquito ad spissitudinem mellis: deinde aluminis scis-
si ūnciam vnā, myrrhæ vnc, dimidiam, terito, addito, ac misctis vutor. Magis adstringēs scripsit cer-
te hoc pharmacum Crito q̄ præcedens. Ridicule igitur quidam faciunt interrogantes, vtrū ipso-
rum altero melius sit, alterutrum enim in proprio tempore altero melius est: atq; hoc quidem po-
sterius ad ea, quæ vehementi adstrictiōne indigent: ad ea verò quæ discussione, prius, maxime cū
& cinnamomum iniecerit in ipsum, disculſorium medicamentum. Scripsit autē & ex musto me-
dicamentum Crito hoc modo.

Critonis Stomaticum ex Musto.

C Stomaticum ex Musto, facit & ad Animum & Sedes Vlcera. Musti sextarios sex, ad sextarios ij, decoquito: deinde rhois coriarij 3 iij, alij drach. ij, misceto: & gallarum 3 iij, alij verò gallas triginta. D croci 3 ij, alij 3 j: aluminis scissi 3 ij: quidam etiam myrrhedrachmam vnā, mellis sextarium vnū: mistis vitior. Multa verò alia pharmaca ex prædictis succis à multis medicis scripta sunt iuxta commensurationem variantia, cum aliqui quidem omnia prædicta coniungant: quidam verò autem rant, alius aliud: & alius plus, alius minus. In quibus, velut dixi, inspicere oportet quid redundet, an adstringens & repulforium, aut lenitium & concoctorium, aut discussorium: ita enim rectissimi mei ipsi vtemur. Quare relinquam particulares eorum quæ scripserunt differentias: Tranſibo autem ad alia pharmaca citra hos succos præparata.

Stomatica Pharmaca citra succos composita, ex aceto & gallis.

Stomaticum pharmacum scripsit tum Andromachus, tum Crito, eandem habēs symmetriā. Sufficiet itaq; descriptionem Andromachi referre hoc modo habentē his verbis. **¶** *Stomaticum Aristoclis ad Synanchas, quas anomas Latini vocant. ¶ Reliquas in ore affectiones. Hac ¶ Antipater vsus est.*

Gallas numero xxx, aceti albi felseuicyathum, alij cyathos ix, myrrhæ drach. viij, nardi indicæ drachmam vnam: rhois culinarij felseuicyathū, alij cyathos ix: aluminis scissi drachmam vnam, piperis grana viginti: mellis artici cyathos ij, alij felseuicyathum. Coquuntur gallæ in aceto donec flaccescant, deinde tritæ melli miscentur tempore vius. Quidam etiam seminis mandragoræ, ꝓ vnciam vnam ꝑ addunt. Hæc quidem Andromachus scripsit. Fortassis autem dubitauerit quispiā,

Quinta Classis.

Y Y Y Y Y ii propter

propter quid, cum scripisset, Aceti sesquicyathum. mox adscripserit, Alij cyathos ix. multū enim E mensura altera alteram excedit: Quemadmodum etiam rursus cum ait, Rhois culinarij sesquicyathum, alij cyathos ix. Singulatim itaq; vtrunq; expensum dubitationem affert: si vero inter se cōplicentur, conuenienter scripta sunt. Si etenim cyathos ix iniecerimus, iniiciemus etiam rhois culinarij eisdem ix cyathos: si verò aceti sesquicyathum, sufficiet etiam rhois culinarij sesquicyathus. Quare in pharmaco plus aceti habente, diuturnior coctura facienda est: in minus habente, breuior: præstat autem diutius fieri cocturam, ita enim gallæ molles reddentur. Conspicuum vero est Generosum esse hoc pharmacum ex contrarijs compositum: gallæ enim, & acetum, & rhus, magis adstringentia sunt, & maxime repellunt: valde autem discussorium est piper, sed mistæ facultatis est nardus. Myrrha verò discussoriam habet vim, sed & lenem ac mitigatoriam vnā cum hoc, q̄ etiam concoquit. Discussoriæ facultatis est etiam mel, sed citra mordacitatem earū affectionum quæ in ore fiunt, cum in oculis mordax existat. Verum de aceti viribus iam sæpe mentionē fecimus, quod & secat, & discutit, & repellit. Album autem in descriptione addidit, vt videlicet tenuium partium indicet. Quidam verò tum aceti quinq; cyathos, tum rhois eisdem iniiciunt, medium quodam modo apprehendentes inter eos, qui plurimum, & qui minimum, de vtroq; coniiciunt. Manifestum igitur est eos medium quoq; pharmacum iuxta facultatem præparare, quæ admodum symmetria ipsa media existit.

Stomatica Illitio ex Besafa, hoc est Semine Rutæ sylvestris.

Celebre est & hoc pharmacum ab Andromacho hac verborum serie descriptum. *Stomaticum ad Anginas ex Besafa, faciens ad Desperata, quo vtor.* Seminis anisi, seminis apij, seminis ammi, floris iunci odorati rotundi, aluminis scissi, iridis illyricæ, besafa quod aliqui harmala vocant, cinnamomi, myrrhæ troglodyticæ, aristolochiæ longæ, singulorum vnc. vnam: calix, rosarum siccarum, vtriq; 3 j: crocomagnatis 3 j: costi, cineris hirundinū recentis, vtriq; quadrantem: croci sesquiunciam: nardi indicæ, amomi, vtriq; vnciæ dimidium: gallas viii: tritis cum melle vttere. Verum vsus tempore tandem mel adde. Hoc ipsum pharmacum etiam Heras scripsit, vt parum ablit quo minus penitus idem sit: solas enim rosas variavit, & non ipsas coniicit, sed florē ipsarum: & ad finem addit: Quidam etiam calix fuluæ 3 j. De hirundinibus autem ambo obscure tradiderunt, quanq̄ alij clare scripserint, nisi q̄ inter ipsos non conuenit. Alij enim nidum vttere iubent ex stercorebus hirundinum maxime compositum: alij ipsas hirundines: alij ipsarum pullos. Hi verò obscurius scripserunt: & Andromachus quidem, cineris hirundinum recentis: oportebat autem ipsum apponere vstarum: tale enim quiddam cineris vox significat, nisi nidum ipsum terere ac leuigare iubet: Heras autem, hirundinum recrementi, non apponens vsti. Fortē igitur neuter vult comburi debere hirundinum recrementum, quemadmodum alij. In quibusdam tamen exemplaribus sic scriptum est. Hirundinum tenerarum vnciam j: quemadmodum in alijs, hirundinum a trabibus. Palam est autem quod acre & discussorium est hirundinum excrementum, quemadmodum etiam alia omnia omnium animalium stercorea, aliqua magis, aliqua minus: velut etiam ipsorum animalium vstarum cinis. Dictum est etiam nobis de besafa in simplicium pharmacorum tractatu, quod tertij sit ordinis calfacientium: & nunc sanē quod eiusmodi admissum est etiam prædicto medicamento, quod plurima discussoriæ facultatis in se habet, quemadmodum aliqua ex alijs stomaticis, adstringentis & repulsiuæ. Etenim iam relata pharmaca valde discussoria sunt, & ad hæc amplius cinnamomum super omnia vim tenuium partium & discussoriam habens. Quin & semina anisi, apij, & ammi, discussoria sunt: & iris, & aristolochia, ex discussorijs sunt, velut etiam myrrha. Mistæ autem facultatis ex discussoria & adstringente est calix, & crocus, & nardus, & amomum, & costus: præcellit autem in ipsis calfactoria & discussoria, & maxime in costo. Mistæ facultatis est & iunci rotundi odorati flos, sed vtrāque imbecillitum adstringente, tum calfaciente. Gallæ vero (clarum est quod de omphacitidum genere loquor) ex adstringentibus multum sunt pharmacis, velut etiam alumen scissum. Rosæ autem rursus debilissimā habent adstringendi vim. Ex contrarijs igitur facultatibus particularium pharmacorum, hoc medicamentum propositum iam constat, & non solum contrarijs, sed etiam vtriq; fortibus: atq; velut dixi antea, multo fortioribus discussorijs, q̄ adstringentibus. Quando verò confectionē eius clare conscripserit Heras, visum est ob id etiam illius verba in commune proponere ac adscribere, quæ hoc modo habent.

Stomaticum ex Besafa, Hera.

Stomaticum faciens ad Anginas, & Inflammatas Tonsillas, ac Vlcera facta in ore. Conuenit etiam Stomachicis & Dysentericis summe, in frigida exhibita magnitudine sabæ. Est & Arteriaca bona, & dolorem sedat. Anisi vnciam j, ammi vnciam j, apij seminis vnciam j, costi sesquiunciam, floris iunci odorati vnciam j, iridis illyricæ vnciam j, aluminis scissi vnciam j, gallas omphacitidas mediæ magnitudinis octo, crocomagnatis vnciam vnā, croci sesquiunciam, myrrhæ vnciæ dimidiū, floris rosarum vncias duas, aristolochiæ longæ vnciam j, seminis besafa vnc. j, cinnamomi vnciam j, spicæ nardi sesquiunciam, amomi racemī vnciæ dimidium: quidam etiam calix fuluæ vnc. j, cineris hirundinum recrementi vnc. vnā. Myrrham cum melle terito, reliqua vero omnia contusa & cribrata in mortarium

* Aliter ij.

* Aliter ij.

* Aliter ij.

† Ant. cod. habet: *εὐπρεπὴς*, quā vocē etiā habuit vtus interpret. im pressi in codi. greci hēnt dia- phoreticē, seu discussoriā.

A. l. j. f. 9. c. ii
fo. 255. f

* Aliter ii.

† Al. unc. i.

* Aliter ii.

A in mortarium conijcito: atq; vbi miscueris, per pistillum myrrham cum melle moderato agitato, vt pharmacum melle crassius reddatur. Vfus verò tempore melle dilutum illine, atq; ex aqua gar garissandum præbe, aut ex aqua mulsâ vel succo pûsanâ. Caterum pharmacum hoc in stanneo vase reponitur ac adseruatur.

Aliud Stomaticum ex Hirundinibus absq; Besasa, Asclepiade.

Scriptit etiam Asclepiades stomaticam illitionem his verbis. **C** *Aliud Stomaticum. Facti & ad Anginas.* Hirundinum syluestrium vstarum cineris 3 iij, croci 3 j, nardi indicæ 3 j, melle excipe. Mi stura fit cum iam sub manibus sunt affectiones. Hirundines porro vruntur hoc modo. Pullos sa- le conspersos vnâ cum pennis in fictile conijcimus, obturatum q; prunis imponimus. Gratia ha- benda est Asclepiadæ ob id, q; tam diligenter describit, quo modo hirundinum pullos vriubeat: & q; ipsa animalia, & non eorum recrementa, in pharmaci compositionem præparanda censeat. Scriptit verò etiam Andromachus stomaticum pharmacum ex hirundinibus, hoc modo.

Stomaticum ex Hirundinibus ad Anginas, vt Harpocras.

C Pullorum hirundinum vstorum numero xj: mellis cyathum j, alij cyath. ij habêt: succi myr- ti viridis cyathum j, alij cyath. ij: myrrhæ obol. iij: pullos vrito, omnibus q; mistis actritis vrito. **B** Clare etiam hic hoc loco pullos comburi iubet. Hæc itaq; duo præscripta pharmaca ex hirundi- nibus sunt absq; besasa. Alia autem duo stomatica hæc præcedentia ex hirundinibus vnâ cum besasa constant. Est autem & tertia coniugatio pharmacorum eiusdem generis, in qua ea quæ ex besasa citra hirundines præparantur, continentur.

Alia Stomatica Illitiones Andromachi.

Præstat autem opinor neq; alias relinquere oris illitiones, quæ sanè laudâtur ab ijs, qui de phar- macorum experientia sunt curiosi, maxime cum multorum ex eis etiam ipsi experimentum fece- rimus, partim quidem ex nostro vsu, partim vero eorum qui nobiscum sunt medicati. Incipiam autem ab ijs quæ Andromachus scripsit, ipsas compositurus iuxta illius verba.

Ad Columellam laxatam.

C Mellis lib. j, aluminis liquidi lib. j, florum rosarum libram dimidiam, succi hypocistidis qua- drantem. Alumen in melle coquito, deinde sicca inspergito, atq; ita vrito: coquito autē modice. Vere bonum est hoc pharmacum, eo q; tribus modis vti oportet, quemadmodū vidistis me plu- rimis stomaticis pharmacis vti. Vnus vtendi modus est & maxime in principio, vt dissoluatur p aquam calidam aut aquam mulsam, ac gargarissetur: nam & mitigatorium est hoc, & quod con- uenit efficit. Interea aut dum eo sic vtimur, etiâ syncero pharmaco vti conuenit, partim quidem cum digitis illinendo, partim verò per cochleare admouendo, vnâ cū hoc q; reprimamus & intre- pide foras columellâ ipsam ducamus. Confert enim quàm maxime ad linguam ipsam vergere, & à recitidine secedere, quam habet vt plurimum ad ipsius asperæ arteriæ extremum.

Aliud Stomaticum eiusdem Andromachi ad omnia Vitia oris.

C Crocomagmatis drach. ij, iridis drach. iij: sandarachæ drac. dimidium, hoc est obol. iij: tere- binthinæ drach. ij, lycij indicæ drach. j, vuæ passæ drach. octo, aloes drach. j, omphacij drach. j, nu- cum pinearum tostarum drach. octo, succi glycyrrhizæ drach. j, aluminis scissi drach. j, balaustij drach. j, floris rosarum drach. ij: mellis heminas duas & dimidiam, in quibusdam exemplaribus sesquihemina habetur. Ipse quidem Andromachus sic scripsit, non ostendens, quomodo mel mi- scere oporteat, num crudum, aut coctum, aut despumatum tantum. Ego vero despumatum mi- scendū esse censeo. Scripsit etiam alias stomaticas illitiones Andromachus omnes bonas: qua- re minimè relinquendas putavi: ideo que subscribam omnes deinceps, quemadmodum ipse præ scripsit.

C *Stomaticum, quo ipse se vti dicit.* Floris rosarum drach. ij, nucum pinearum drach. j, cro- ci drach. j, excipe melle. *Aliud, quo item se vti dicit.* Iridis illyricæ drach. vij: croci drach. vij, alij iij: florum rosarum drach. iij: excipe melle. *Aliud.* Misyos cyprj drach. vij, iridis illyricæ drach. iij, myrrhæ drach. † ij, croci drach. j: excipe melle. **C** *Aliud odorum, tenerum, ad Inflammationes & Cru- stas commodum.* Nucum pinearum drach. ij, amyli drach. ij, aluminis scissi drach. j, floris rosarū 3 j, croci obolos iij: excipe melle. Hæc ex ferula Cratippi esse ait. **C** *Aliud Stomaticum Menecratis.*

Croci drach. iij, balaustij drach. ij: florum rosarum drach. j, alij dimidiā: fructus ericæ drach. j, malabathri drach. j, nardi indicæ drach. j, nucum pinearum numero xx: excipe melle. **C** *Aliud, quod ex libris Mēliti esse ait.* Rhœis rubri drac. ij, florum rosarum drac. j: costi, croci, vtriusq; obol. iij: excipe melle. Hanc etiam gargarisari cum passo, aut aqua mulsâ ait: neq; scio cur hoc hic adseri- pserit, cum omnia gargarisari possint. **C** *Aliud Stomaticum quod etiam ipse laudat.* Floris iunci ro- rundi odorati, myrrhæ, croci, calix, aluminis scissi, illyridis, lingulorum drach. iij: nardi indicæ drach. vnam: excipe melle cocto. Hic quidem igitur cocto adiecit: in prioribus verò semper sim- pliciter melle dixit, permittens nobis, quomodocunq; præparare velimus. Ego autem velut dixi, melle despumato vtor.

Alia Illitiones Stomaticæ, quas Asclepiades scripsit.

C *Illitio ad Purredines oris Asclepiadæ.* Rhœis rubri drach. iij, acaciæ drach. j, medullæ drach. iij: vi- no Pramnio dissoluta excipe melle cocto. & vtere ad illitionem. Haud scio, quomodo reliquerit

Quinta Classis

YYYYY iij adscribere

n id est vij, est
in cod. impres-
sus, i aliquibus
x i. xx.

† Aliter vij.

* Aliter sesqui-
drachmam.

* AE Mēphyti.

adscribere ad medullam, num ceruinam, an vitulinam, conijci velit. Quando igitur nō adscripsit, E
tutius est ceruinam adijcere: forte enim esse vult medicamentum, fortior autem est medulla cerui-
na quā bubula. *Alia.* Succu hypocistidis drach. ij, balaustij drach. j, lycij drach. j, acaciae drach. j: ex
cipe oliuæ immaturæ succo, & melle subactis vttere.

Illitiones Oris, aptæ eis, qui medicamentarias qualitates ægre admittunt.

Porrò de mulierculis quid attinet dicere, & maxime diuitibus, quæ præ delicijs stomatica medi-
camenta ægre admittunt? Iam vero etiam viri quidam non solum præ delicijs, sed etiā natura quo-
dam modo malum stomachum habentes, eiusmodi pharmaca non ferunt. Et sane præterlabentia
sepenumero in stomachum, non solum iniucunda aliquo modo sunt, sed etiam noxia. Mansuetis-
sima igitur ex ipsis crocum habent & myrrham, & alumen. Melius igitur est al iquas stomaticas
compositiones absq; his factas habere. In moderatis itaq; inflammationibus auti tonsillarum, aut
vulg, aut alterius alicuius partis, sufficiunt succi soli fructuum iam dictorum, velut rubi, & mororū,
punicorum, & quæ malorum, & cotoneorum. Quin & succus nucum, vbi cum solo melle paratur,
suauem gustum habet: item q; mustum ex acerbioribus vuīs, ex quibus aminæum vinum fundi-
tur, si in ipsum rhus addatur: hoc enim velut adscripsit optimum fit pharmacum, coctum vt di-
ctū est. Ad eas vero inflammationes quæ multa adstrictione indigent, illitiones stomaticas hu-
iusmodi parauī. Austerorum punicorum succum, aut austerorum cotoneorum, aut etiam vtro-
runq; simul, iuxta prædictam proportionem cum melle miscui, atq; sufficiens erat. At verò moro-
rum succus debile pharmacum est. Sed inter hunc & prædictos, medius est iuxta adstringēdi vim
succus rubi mororum. Fortis autem est nullo minus ex corticibus nucum, quanq̃ non sit etiam in
gustu acerbus. Vnicuiq; verò ex his licet vuas acerbæ expressas miscere, si quidem vehementius
efficere velis, eadem mensura: si verò non, omnino tamen dimidium succi ipsarum addes. Vehe-
mentissimum autem reddetur pharmacum, si punica integra tundas vnā cum corticibus, inde q;
succum exprimas, atq; hoc magis si fuerint acerbæ. Amplius vero acerbissimū ex his fiet, si ad pu-
nicorum austerorum ita tusorum succum, vuæ acerbæ succus superaddatur cum moderato melle.
Præstantius adhuc erit, si tota contusa punica mala passo cocta excoles. Licebit etiam ex solis dul-
cibus punicis pharmacū præparare, vt debilius, ita suauius, & magis si ex solo succo citra cortices
composueris. Ego vero sæpe tria punicorum genera permiscui, austera, acida & dulcia: ne vero
valde exasperet, admisto glycyrrhizæ succo, optimum pharmacum efficies. Quin & ex fructibus
factum per se solum optimum est medicamentum, tum ijs qui gargarissando colluere, tum qui il-
linire, oris inflammationes volunt: est autem & hoc partim austerius, partim moderatius in ad-
stringendo, dicetur q; de compositione ipsius paulo post. Quando vero non solum repulforium
pharmacum nos habere oportet, sed etiam discussorium, si quid appareat induratum, in hunc mo-
dum ipsum parabis. Iis quæ medias facultates habent ex prædictis, injicies aliquid dum coquun-
tur, ex pulegio, aut thymo, aut origano, hyssopo, mintha, aut calamintha: deinde colabis, & habe-
bis optimum medicamentum: si vero calidius efficere velis, piper addes. Præparauī quandoque
etiā sine pulegio, aut thymo, aut aliquo huiusmodi, id quod ex succis constat, solo pipere in ipsum
coniecto. Omnibus autem si glycyrrhizæ succus addatur, melius pharmacum efficietur. Quod si
pro opulētis componas, etiam amomi quid misceris. Quantitas autem huiusmodi rerum eadem
tibi seruetur cum ijs, quæ crocum & alumen ac myrrham adsumunt, velut præscriptum est: pro il-
lis enim tibi hic amomum erit. Quin & mastichen chian quādoq; inieci, post factam videlicet co-
laturam, & postquam ea quæ incocta sunt fuerint exempta.

De Crustis in Ore.

CAP. 2.

IN calidis & humidis corporis locis, quale est os, citò putredo accedit, ex quacunq; tandem cau-
sa fuerit exulceratum. Confert ad hanc rem etiam id, quod nihil penitus in ipso ex pharmacis
incumbere queat, velut in alijs vlceribus potest: eluuntur enim omnia à saliuā. Quapropter etiā H
fortissimis pharmacis sæpe ad ea vtī cogimur. Fortissima autem sunt quæ crustam, escharan
Græcis dictam, efficiunt ad modum cauteriorum. In externis igitur vlceribus, vbi parti cu-
randæ crusta fuerit inducta, à fortibus pharmacis desistimus, ad ea quæ crustas tollunt transgre-
dientes, quæ manifestum est exterforiæ qualitatis ac facultatis esse: In ijs verò quæ in ore fiunt,
propter loci naturam, tutius mihi esse videtur admiscere ad exterforia pharmaca quædam fortia,
quæ singulatim admota crustas infligunt. Ob hanc igitur causam melli vehementissima extergē-
di vi prædito pharmaca admiscemus ipsas crustas efficientia. Quemadmodum sane in sordidis
vlceribus in cuticula obortis diximus admisceri oportere melli, quæ parum extergent, thus,
eruum, iridem, aristolochiam, & quæcunque alia huiusmodi, eadem ratiocinatione contraria ap-
ponentes, velut Hippocrates dixit: Vna enim eademque ratiocinatio in vtriusq; est, vt videlicet ex-
terforium pharmacum moderate habens ad affectionem adhibeatur. Habebis autem commode-
ratum pharmacum ipsum mel, in vlcerum quidem forde, debilibus exterforijs permiscum: In qui-
bus autem ob loci naturam, putredinis accessionem formidamus, ex fortioribus quippiam ad
ipsum mel admiscemus. Rationabiliter igitur ad oris vlcera arida medicamenta cum melle com-
miscuerūt, per quæ crustas inducimus. Quædam igitur ex huiusmodi pharmacis prius recensui
in eo

A in eo loco, quo ad nomas oris medicamenta scripta sunt: eadem enim etiam ad crustas convenire dixi, si mel ipsis addatur: quin etiam nunc de ipsis scribam, omnia tamen bis dici cuiuspiam videatur. Quae igitur ab Andromacho scripta sunt paulo ante, in memoriam saltē me reuocare oportet ex eo loco, in quo docuit quae pharmaca ad nomas oris conveniant: apponam autē principia ipsorum tantum. Vnum igitur pharmacū sic cōscripsit. Andromachi stomaticum odorem tenerū ad inflammationes & crustas commodum. Composuit autem ipsum ex nucibus pineis, amylo, & alumine scisso, flore rosarum, ac croco, melle admisto. Alterum autē hoc modo scripsit. Palsillus ad affectiones in ore, crustas, ac nomas, quo etiam ipso, cum melle vitur. Quin & omnia alia ab ipso ad nomas descripta, etiam ad crustas commoda sunt cum melle.

Quae Crito ad Crustas conscripsit.

Quae verò Crito ad crustas scripsit, illius ipsius verbis sic habet. **C** Misy crudū euestigio tollit: in alio exēplari cum melle tostum habetur: Ad oris verò crustas aqua diluto ac modico vtere. Sint autem misyos torrefacti 3 iij, mellis boni cyathi sex, commisce ac vtere. Similiter facit & chalcitis assata cum melle, ut strigimentitia sit spissitudo.

Quae Archigenes ad Crustas scripsit.

B Archigenes autem de his sic tradidit. **C** In crustis quae Eschara Gracis appellatur, priuatim commodum est Stercus caninum cum melle illitum. Aut atramentū sutorium purpurā marinē tomento inuolutum vrito, neq; agitato: deinde cum melle tritum illinito. Aut pice liquida cū pari melle, pauxillo autem cedriae admisto, vitur. Aut rhois coriarij quantum satis sit irrigati aqua, donec strigimentosa euadat, ubi coxeris, melli misceto & vitur. Facit & Syriacus rhus cum melle. Aut hirundinum vstarum, & stercoris humani, parem modum cum melle illine. Aut hepatis lupi aridi cochlearia duo trita bibenda prebe. Horū pharmacorum maximā partē laudo: quod verò ex rhoe constat dāno, cum adstringentis sit facultas, quae nequaquā crustis conveniet. Verū de lupino hepate non habeo quod dicā. Ad hepaticas enim affectus scio hoc pharmacum tum per se, tum pharmaco ex eupatorio mistum, bibi: an verò etiam ad crustas in ore potū conveniat, iuxta aliquam totius substantiae proprietatem, per solam experientiam iudicare oportet: de qua non est quod dicam, ut qui hoc non tam vsus in huiusmodi affectionibus. Caninum autem stercus, ubi ossa comederint canes, per omnia optimum est: nam & magnopere auxiliatur, neq; vllā insuauitatem exhibet videnti: Humanum verò tanquam abominandum semper detestatus sum. Vfus est itaq; ipso quidam non praedicens, sed latere conatus. Accepit autem nō vulgare, sed pueris dabat in cibo panem cum leguminibus quae lupini vocantur, atq; ira resiccātū habebat in prōptu ad quaecunq; eo utiq; opus esset. Quin & Musa plurimum vsus est primus adeo stercore canino, album semper adsumens. Scribit igitur in praesenti affectione similiter eodem canino stercore se vsū, his adeo verbis.

Musa ad Anginam.

C Ad Anginam stercus caninum album accipito ac resiccato, tritum q; cribro medico cribrato, & in prōptu habeto. Vfus tēpore melle diluito, atq; tunc ut deuoretur illinito. Hæc cum scribat Musa, meritō ei ad stipulamur: hoc enim pharmaco fortius nullum nouimus, neq; in angina, neq; in magna tonsillarum inflammatione, aut ijs quibus ex glandulis suffocationis periculū imminet. **C** Ex Sorano. Experti fumus etiam Sorano scripta pharmaca probe facere, quae his verbis tradidit. † Chalcitidis tostae, mellis attici, quod satis est: chalcitidē cum melle terito ad strigimentitiam crassitudinē, ac vitur. **C** Aliud ad Crustas faciens & humore praegnantēs Ginguas, item q; foetentes. Misyos vsti 3 viij, iridis illyricae 3 iij, croci 3 i: hæc trita ac mista in pyxide lignea reposito, & tum per se, tum cum melle, vitur. Consequenter verò etiam hæc hoc modo prodidit: **C** Aliud pharmacum Anthera, ad praedicta faciens. Iridis illyricae, sandarachae, cyperī, singulorum 3 iij: aluminis discissi, † croci, crocomagmatis, singulorum 3 ij: his tritis ac mistis vtere. Quidam verò & florum rosarum, & gallae, vtriusq; 3 ij adijciunt. Vtere autem ad putredines, & disparatas per abscessum ac cruentas ginguas arido: ad crustas cum melle.

† Additur in quibusda cod. Ad escharas seu crustas stomaticas.

† Additur in quibusda, myrrhae.

Quae Heraclides Tarentinus ad Crustas in Ore scripsit.

Heraclides Tarentinus in scriptis suis ad Antiochidem in hunc modum scripsit, de putredinibus in ore. **C** Facit quidem & anthera sicca admota. Si verò validior sit putrefactio, appolita est hæc compositio. Libri vsti partes iij, auripigmenti partem j: tritis, mistis vitur: & supernē linamentū conuulsum impone, rosaceo tinctum ac expressum. Quidam libri partes viij, capiunt. **C** Aliud ad robustas Putrefactiones Oris, ac reliqui corporis. Chalcitidis partem vnam, calcis viuae tantundē, auripigmenti partem dimidiā: tritis, mistis vtere. **C** Aliud ad Putredines in Ore, & Ginguarum abscessus. Florū rosarum drach. iij, aluminis scissi drach. ij, gallae drach. ij, myrrhae drach. j: trita melli misceto ac vitur. Verum ad vlcera leuiter crustosa, in ijsce aluminis drac. quatuor, myrrhae obol. ij, gallarum drach. j. Aliud. Aceti acerrimi heminam vnam accipito, in ipsum q; tantum falis donec non amplius liquetur conijcito, deinde donec licetur coquito, & ex illo accipito, atque aceti cyathum vnum affundito, ac ore detinendum exhibeto per satis multum tempus: deinde iterum atque iterum idem facito ter aut quater per diem, respectu habito ad subiectas partes.

* βδελίου, i. bdely est in impressis, licet in manuscriptis sit βελίου, i. libri.

Quinta Classis.

Y Y Y Y Y iij In pueris

In pueris verò lanas circum specillum apponito, intingito q̄, ac locum confricato, ea corporis figura ordinata ne ipsam deuoret. Quidam verò arido sale vtuntur terentes ipsum cum aceto & re liccantes. Faciunt & alumen rotundum ac fori, pari pondere. Oportet autem colluere lentium decoctum modico admisto melle, aut rosarum cremorem cum melle. Quod si non exuperetur per hæc putrefactio, vrere iube, munitis & contectis in orbem circumlitis locis. Sit autem candens ac pellucens cauterium, quod admoueatur, donec nullus humor amplius defluat, & locus videatur exuperatus. Postea colluenda prædicta, & Anthera compositione vtendum ex melle, vsquequo crusta circumrumpatur: atq; tum sanè melle vteris. *¶ Aliud odorum, tenerum, ad Inflammationes & Crustas commodum.* Nucum pinearū drachmas iij, amyli drachmas duas, aluminis scissi, drachmam j, florum rosarum drachmam j, croci obolos iij, excipe melle. Hoc medicamentum ex Ferula Cratippi sumptum dicit.

Ad Columellam siue Gurgulionem.

CAP. 3.

CArnosa quædam particula in summo ore apparet dependens, si quis aperto plurimum ore toto lingua deprimat. Hæc ipsa caruncula duobus nominibus appellatur à veteribus Græcis, gargareon & cion, hoc est gurgulio & columna: cæterum posteriores medici ferè omnes non ita, sed cionidem id est columellā, vocant. Nam qui staphylen id est vuam, ipsam appellant, eorum Enecq; meminisse præstat: nos. n. non particulam ipsam, sed vnam aliquam eius affectionem, staphylen siue vuam nominamus. Rarò aut hæc affectio circa columellā cōtingit: verum valde sæpe inflammatur. Et sanè quemadmodū in alijs omnibus, in quibus ex humorū influxu contingit morbus, ita etiam hîc prima auxilia reprimunt fluxū. Adstringētis igitur facultatis hæc esse oportet: & si quidem moderatus sit influxus, moderatè adstringentis, quam austeram priuatim dicūt: vbi verò vehementior fuerit influxus, acerbæ: ambæ enim adstringunt, sed debilius austera, vehementius autem acerbæ. Relatæ sunt autem sæpe ambarum materiæ: verum præstat & nunc meminisse, quò in paruis inflammationibus debiles, in magnis vehementes, adhibeatis. Collutiones itaq; moderatæ sunt ex palmulis, aut phoenicobalanis, aut quomodocūq; appellare velis, decoctis quandoq; sola aqua, quandoq; modico melle iniecto. Huic consimilis est collutio ex decocto rosarum, pampinorum vitis, rubi, rubi canini, lentisci, hederæ, cypri, terebinthi, rhamni, aspalathi, cyperi, ac cytitorum, item siliquarum, & radicum mori, hypocistidis, malorum austerorum, & pyrorum acerborum, ac *ὄων* id est sorborum, quæ multi apponentes ad primam nominis syllabam *ο*, *ουα* appellant, vt nominis quidem tres sint in vniuersum literæ, tum *ο* tum *ο* tum *α*: apud græcissantes verò cum *ο* tum *α*. His fortiora sunt myrti ac baccarum eius decoctum, & ex acerbis cotoneis Gmalis, & virgultorum tenerorum ilicis, arbuti, smilacis, ac phagi, & ipsarum gladium, mespilorū item, & cornorum, & fructus mēmacyli. Generosissimū autem est decoctum gallarum, & rhois culinarij ac coriarij, ac fructus myricæ, & spinæ ægyptiæ. Ex his singula tum per se, tum etiam mistim, cocta ex aqua gargarizare oportet: mirum enim quā misturæ ipsorum vtiliores sæpe fiunt ipso simplici vsu. Quin & aridis tritis columellam contingere oportet, sensim quodammodo ad supernam regionem & externam, ad linguam videlicet ducendo. Verum trita arida pharmaca cochleario excipiantur: & melius est vt ipsum cochlearium ad finem in obliquam lineam desinat, q̄ in rectam. Et ex his ipsis, moderatæ quidē sunt rosæ, & flos ipfarum, & virgulta iam enumeratarū plantarū, hypocistis, rheon: lapis quo sutores muliebria calciamenta expoliunt, vocatur autē Ageratus velut nō senescens: aloë q̄, & cyperus, & iunci rotūdi odorati flos, radix † nardi indicæ, ac nostræ montanæ. Fortiora his sunt, & citra manifestam aspritudinem adstringunt, fructus spinæ ægyptiæ, rheon, & quod diphryges appellatur, rhus obsoniorum siue culinarij: & ex acerbis balauistium est, cytini, malicoriū, galla, & magis exactè cum omphacitis fuerit. Adstringunt etiam eximiè omnia aluminis genera: scissum verò inter ea tenuiorū partiū est, & ob id vilius. Atramentum verò futorium vehementem habet adstringendi vim, sed non expers est calfaciendi, & H propterea putredinolis vlceribus cōuenit: & tñ exacerbat columellā, etiam si iam sit in scirrhum indurata. Succī porro adstringentes ex omnibus dictis plantis sunt, & fructibus ipfarum cōsimiliter: dictum est de ipsis inter illitiones stomaticas, quarum aliquæ ex musti, aliquæ ex mellis, mistura præparantur: corrumpuntur enim succi omnino si absq; melle reponantur, aut rursus resiccantur si plurimum fuerint cocti. Quidam verò succi etiam si ad Solem æstiuum siccentur, ad moderatam spissitudinem, per tempus tamen exarescunt: & si ad plures annos durarint, in eam perueniunt ariditatem, vt conteri queant in modum cytitorum & balauistorum. Tales sunt hypocistidis succus, & vuæ acerbæ, ac glycyrrhizæ, & centaurij. Et, vt in summa dicam, omnes succi et si absq; melle diutius fuerint cocti, non quidem corrumpuntur, verum tempore fiūt aridi: & quidam sanè velut dixi, conteri possunt: quidam verò natura videlicet tenaces & viscosi, in laminam magis abeunt, quā vt conterantur. Atq; hæc quidem simplicia commoda existunt. Composita autem ex ipsis iuxta duplicem vtilitatem fiūt: Vnam quidem ex ijs quæ eiusdem generis sunt, quando vehementi molle admiscemus, carentes scilicet medio, velut florem rosarum aut ipsas rosas, cum galla aut alumine permiscentes, & vnumquodq; ex prædictis lenibus pharmacis cum vehementi complicantes. Non pauca enim numero iuxta huiusmodi permutationem erunt. Immo

& iuxta

* *Al. κοκκο-
μύλων. quam
dictionem in-
terpres infe-
rius transtulit
prunum.*

† *legitur in
antiquis, nar-
ditum celticæ
tum indicæ.*

Aet iuxta mixturam ipsam ex duabus faciam plura pharmaca fient, cum alia's alia quantitate miscetur: Velut si duplus sit rosarum flos quantitate aluminis, aut vice versa duplum alumen ad florem rosarum. Possit aut non solum duplum, sed & triplū, & quadruplum, alterum alteri misceri: neque clām est et par pari, atque hoc quidem medium fuerit inter summa siue extrema: reliqua verò omnia partim propius molliori accedunt, quæ videlicet plus rosarum habent: partim autem vehementissimo, quæ scilicet plus aluminis capiunt. In utrisque vero non obscurum est magis & minus. Cū enim duo sunt pharmaca, forte quidem est in quo alumen rosas excellit: fortius autē est in quo triplum alumen ad rosas continetur, quā pharmacum quod duplum saltem habet. Quod igitur semper me dicere audiistis, etiam nunc dicam. Stulti sunt qui inter duo eiusdem generis pharmaca, utrum ipsorum melius sit quærunt, aut quod tandem omnium optimum existat. Perinde enim faciunt ac si quis quærat, præter ne alicam aut ptisanam agris exhibere: aut, num vinum, an acetum mulsum, aut aliquod purgatorium medicamentum: aut num melius sit veratrum album an nigrū: aut si in vniuersum quis de omnibus auxilijs interroget, quod ipsorum optimum existat. Omnia enim respectu ad aliquid, tum emolumentum, tum detrimētum, in se habent: quod || ipsum etiam cū Hippocrates dixerit primus omnium quos sciam, ij qui post ipsum fuerunt, insequuti sunt: ex recentioribus autē medicis aliqui, quemadmodum alia multa nugantur, sic et talia. Vidistis porro sæpe opere perfecta quam dico veritatem. Intempestiue namque aliqui pharmacis quæ habebant vsu, deinde quæ exacerbari affectionem his viderent, ad alia citra methodum transgressi, & neque his quicquā efficientes, ad tertiam deinceps transitionem, aliquando etiam quartā, præter rationem delati, & affectum iam malignū esse iudicantes, me in consilium adhibuerunt: quibus ostendere mihi iussis pharmaca quæ habebant, id quod commodū esset ad præsentem constitutionem indicaui. Atque cū ipsi dicerent per pharmacum quod ego consulebam, ægrum exacerbatum esse, & ob id se eo vti formidare, verum et sic persuasos à me, ad ipsius vsum compuli, & tum illis, tum nobis utrumque quod Herophilus dixit, verum esse ostendi. Siue enim dixeris pharmaca nihil esse sola per se ipsa, recte dices: nihil enim sunt, nisi utentē eis recte fuerint adepta. Siue rursus pharmaca veluti deorum manus esse dixeris, et hoc recte dices: iuuant enim maxime, si is qui eis vtitur, in rationali methodo fuerit exercitatus, & cum hoc natura prudens: quidam enim haud sane præstantiores existentes, de sapientia cum prudentissimis contendunt. Mistura itaque medicamentorum eiusdem generis, mediōrum pharmacorum vsus gratia fit. Et ob id semper duo contraria facultatibus pharmaca in vnoquoque affectu vos habere operæpretium duco: permiscendo. n. ipsa omnino multis medijs pharmacis abundabit. Vna igitur mixturæ eiusdem generis pharmacorum causa hæc est, iam videlicet relata. Vna vero alia mixtura ex diuersi generis pharmacis, ex huiusmodi ratiocinatione cœpit. Rarò equidem inuenierit quis affectionem aut discussorijs tñ, aut repulsorijs, indigentē. Paruæ etenim, & affectionis nomine vix à medicis dignatæ, confestim sedantur. Vbi vero generatus affectus maiorem habuerit causam, impossibile est ipsum per repulsoria perfecte sanare, & maxime vbi ægri corpus fuerit humoribus multis refertum, aut particula affecta natura debilis. Ob id igitur cogimur sæpe quidem in principio, sæpe vero paulo post, admiscere quippiam ex discussorijs: si verò dolor affuerit simul vehemens, etiam ex mitigatorijs. Itaque tunc opus est vnicuique prædictorum pharmacorum aliquid ex discussorijs addere. At vero cum & hæc omnino multa sint, à mollioribus auspicandum erit: ab acribus enim inflammata exacerbantur. Atque ea gratia cōposita medicamenta in vsum venerunt cū ad aliarū partium inflammationes, tum gurgulionis: veluti cū ad alumen iridem illyricā admiscemus, aut farinam eruina, aut thus, aut myrrhā. Cū enim adstringentia sint multa, & non pauca citra acrimoniam discutientia, varietas pharmacorū ad columellas inflammatas merito multi iuga facta est. Cæterum tu perspecta inflammationis magnitudine ac caliditate, & considerata influxus quantitate, amplius quæ copiam humorum in toto corpore per coniecturam assecutus, pharmaco in quo aut adstringentium aut discutientium vis excellit, vteris. Adscribam aut rursus etiam hic pharmaca quæ ab expertissimis tradita sunt, aliqua quidem cum proprijs discriminibus, non pauca verò etiam citra distinctiones. In quibus sane ego, velut etiam in alijs quæ supra tradidi, propria discrimina apponam.

Quæ Archigenes scripsit ad Gurguliones inflammatos.

Ad propositam affectionem sic scripsit Archigenes in primo Pharmacorum. **C** Vna laxata succū dissolutum admoue, aut gallam tritam cū sale, aut ipsum sal dissolutum, aut lycij radicem tritā, aut omphaciū cum melle. Si vero fortius velis, atramenti futuri, squamę æris, aluminis scissi, mysos, myrrhæ, gallæ, æquas partes tritas ac vino exceptas illine. Si sola hæc Archigenes tradidisset & sic cessasset, haud iniuria ipsum reprehenderim citra discrimen scribentem pharmaca facultatis penitus contrariæ: quoniam vero in his quæ deinceps scribuntur, corrigit interdum ipsam horū indistinctionem, recte facit. Quod vero indiscriminatim hæc dicta sint, hinc discere licet. Vna inquit laxata succum dissolutum admoue. Oportebat equidem etiam hic apponere, qualem succum dicat: verum cū omnibus iam persuasum sit cyrenaicum succum optime facere ad columellam inflammata, non apposuit cyrenaicum: & ob id igitur quispiam haud ipsi succensuerit. At vero quod acerrimum & maxime calfactorium pharmacum, ipsum cyrenaicum succum cum

lib. de Alimentis
to iuxta finē.

* Al. vitiosis.

cū contrarijs scripsit, non apponens discrimen, neq; ostendens quando ipso succo vti conueniat, E
& quando astringentibus pharmacis, in hoc perperam fecit. Atramentū sutorium enim, & squa-
mam teris, & alumen scissum, & misy, & gallam, omnia æquis partibus in vino terere iubens, am-
plius q; ad hæc myrrham pari pondere addens, hoc modo composito pharmaco vuā illinit, quod
fortissima adstringendi facultate præditum est. Verū huius scripturæ indeterminatam incerti-
tudinem mox mitigauit, præscribendo videlicet hæc verba pharmaci cōpositioni, Si verò fortius
velis. hoc enim scripsit tanq; scientibus nobis quando fortibus vtendum sit. Porro mistū phar-
macum est & hoc vbi scripsit, Aut gallam tritam cum sale. Galla enim vehementer adstringit: sal
verò discutit cum modica adstrictione. In principio verò sale non est priuatim vtendū, sicut neq;
succo, sed in indurata iam & diuturna columellæ inflammatione: ipse autē non columella scripsit,
sed vna laxata, cum vulgo existimans columellæ inflammationem vuam appellari. Et quid mirū
hoc putandum, quando etiam ex nostratibus quidam ob atticismum superciliosus & iactabun-
dus, vuam ipsam particulam appellari existimauit? Maior enim huius q; Archigenis ignorantia
fuit, quanq; tum ex alijs veteribus huius appellationis vsus parabilis sit: tum ex Hippocrate con-
stet, ex his adeo in || Pranotionum libro, verbis: Gurguliones cū periculo exciduntur, vruntur, ac
refecantur, quandiu rubri fuerint, & magni: nam & inflammatio ad hoc consequitur, & sangui- F
nis eruptio. Verū tales graciles reddere alijs artibus hoc tempore oportet. Hæc præfatus Hip-
pocrates deinceps ait: Cū verò totum fuerit separatum, quod sanè vuam vocant, & extremum
gurgulionis maius & liuidum fuerit factum, superior verò pars tenuior, in hoc sanè tempore tu-
rum est manus admoliri. Præstiterit autem aluo prius euacuata manum adhibere, si tempus hoc
permittat, & non suffocetur homo. Manifestius autem adhuc Diocles interpretatus est, qualis
sit affectio vuæ appellata, & post eum Praxagoras, & Mantias, & quicunque concomitantia affe-
ctus conscripserunt. Quidam verò etiam ob id affectionem vuam appellatā esse dixerunt, quod
† vuæ fructui extremum gurgulionis simile apparet. Quæ porro deinceps ab Archigene scri-
pta sunt, rectè dicta sunt, discrimina nimirum vsus ipsorum eo adscribente. Habent autem sic.

¶ *Commune pharmacum Columellæ & Tonsillarum.* In commune tum tonsillis, tum columellæ in-
flāmati, aut exulcerati, in principio conuenit quies, inedia, & consequens diæta, gargarismi sim-
plices leniter adstringentes, posca dilutior tepida, aut aqua mulsā: aut palmularum, aut vitis pāpi-
norum, aut malorum cotoneorum, aut mespilorum, aut pyralstrorum, aut rosarum decoctum: ita
vt ad austerā decocta parum mellis admisceatur. Pulchrè hic adscripsit, austeris oportere mellis
pauillum miscere, verū paulo antè cum aqua mulsā per se vti iussit in principio inflammatio- G
num, non rectè fecit. Nihil enim adstringens habet aqua mulsā, sed rectissime quis ipsam exter-
foriam dixerit: & si simul discussoriam dicat, nihil deliquerit. Quæ verò deinceps ab eo scripta
sunt, rectè habent in hunc modum. Facit & acaciæ succus aqua dilutus. Illinenda sunt etiam con-
similia stomatica medicamenta, velut est quod ex moris constat simplex. Rhosis item syriacæ ac
coriariæ cremore cocto ad spissitudinem, cum melle misto vttere. Aut punicorum dulcium atque
acidorum succum ad mellis crassitudinem decoquito ac vtitor. Aut vuæ acerbæ succum expres-
sum adhibeto. Aut rubi, aut lentisci, aut terebinthi, aut myrti, aut rosarū succo cū melle vttere. Et
postea forinsecus alumen scissum cum dimidia aloes parte, ac modica acacia cum succo solani im-
ponere consulens, hæc verba infert: Quod si moretur inflammatio, acetum tepidum per se garga-
risset, aut galla trita admista, aut rubi, aut agrestis oleæ radice. Aut cyperi decoctum cum mel-
le. Aut passum cum aqua. Aut sycites vinum calidum. Aut maluæ decoctum. Manifestum est
enim hæc auxilia communia esse, velut prædictum est, tum columellæ, tum tonsillarum. Verū
non rectè videtur mihi passum cum aqua confidere, vt pote imbecilli ad talia medicamento: quem-
admodum etiam vino sycite, & maluæ decocto, priusquam ad suppurationem perueniat affe-
ctus: oportebat autem hoc ipsum ab eo indicari. Connecit deinde Archigenes ad prædicta sic H
scribens: Illinito & ea quæ supra ad vlcuscula in naribus scripta sunt. Priuatim autem picem cum
oleo aut melle. Aut crocomagma cum modica galla & melle. Aut alumen rotundum cum flo-
re rosarum tritum, aut rosas aridas, aut florem ipsarum, trita insperge: aut tum tonsillis, tum vuæ
insuffla. Aut cyperi radicem, vel myrrum, aut lentiscum, vel rubum, aut gallam, aut salem tenuem,
similiter insperge. Aut omphacium, vel alumen scissum, cum melle illine. Aut florem rosa-
rum vel crocum cum mali punici succo. Hic rursus adstringentia ad discussoria citra discrimen
permiscuit. Nihil enim simile est inspergere salem tenuem, aut rosas siccas, vel florem ipsarum:
aut pice cum oleo vti, quod pharmacum est calfactorium ac discussorium: aut galla & alumi-
ne, quæ pharmaca sunt maximè adstringentia. Caterum senescente atque indurata iam in-
flammatione rectè pix liquida adhibeatur, aut arida oleo liquefacta. Tunc verò etiam sal com-
modus fuerit, corpore videlicet prius euacuato. Incipiente verò aut augescente & cum multa
caliditate vigente, maximè contrarium auxilium est pix cum oleo, eademque ratione etiam sal.

Consequenter autem rectè descripsit Archigenes ad vigentem affectionem auxilia. Indicat
autem ex eo, augescens & nihil opus sentiens ex præscriptis malum. Habet sermo eius hoc mo-
do. Si verò in vigorem peruenerit affectio, aut aluus subducatur, aut furfurum loturam calidam
gargarisset,

com. 3. tex. 25.
4. 209. c

† παρὶς σαφὲς
λ. 5.

A gargariffet, aut ptisanæ succum, aut passum tepidum, aut radicis dulcis decoctum cum passo & hyssopo, aut ficus vino incoctas, aut ptisanæ succum in quo vix passæ sunt incoctæ. Magnopere iuuantur si amygdalinum oleum in aures infuderis, forinsecusque spongijs expressis leniter foueris. Quin & dissolutum crudum ex hordeacea farina imponendum, aut ex farina seminis lini aut fœnigræci, aut etiam mistura ex his omnibus facta. Si ita prope suppurationem fuerint tonsillæ, coadiuuare assidue per ficuum decoctum oportet, & ferme indefinenter id ad gargarissandū exhibere, similiterque aquam mulsam calidam. Si verò nihil tale apparuerit, augetur tamen malum, ita ut ægrè transglutire possint ægri, & suffocationis principium sit nobis suspectum, aliud fortè clystere aut glande subducenda est, & vena cubiti secanda, cucurbitæque cum scarificatione collo ac mento affigendæ: fomentis etiam ac cataplasmatibus frequentius & robustius vtendum, & assiduis gargarismis. Quòd si ad nullum horum præsidiorum cedat, sed augeatur, venæ sub lingua secetur, aut iuxta angulos oculorum, atque ea quæ in fronte est. Illinatur autem assidue fel tauri, & elaterium cum melle, aut sal & oleum vetus cum melle et aceto. Aut centaurea cum melle. Aut absinthium cum nitro & melle. Aut hirundines integras vnâ cum pennis vstas ac tritas cum melle illinito. Aiunt aliqui etiam summè facere hirundinum pullos teneros valde, siue recentes, siue sale conditos, assatos, & in cibos exhibitos: statim enim leuant suffocationem. Siue autem pueri sint, siue senes, sulfur & iridem cum melle delingenda dato. Quòd hæ communes medellæ sint vtriusque, velut in principio dixit, vix videlicet & tonsillarum, manifestum fecit ex his quæ consequenter infert, cum ait: Aliqui angina prehenfis, quos tum synanchicos tum cynanchicos Græci appellant, elaterij, & fellis tauri, vtriusque obolos duos, cum aqua mulla tepida bibendos præbent. Quidam verò asellos sub aquarijs valis nascentes in potu exhibent, aut delingendos dant, aut dolentibus & affectis partibus illinunt, & valde se iuuari testantur. Quin & per vaporem intra os receptum hoc modo fomentum adhibetur. Origanum aut hyssopum, autatureiam, cum sufficienti aceto diligenter in olla feruifacito obturata. Operculum autè circa medium habeat foramen: deinde arundinem ad foramen operculi ac os ægri adaptato, ac fomentum admittito. Si verò os à feruore arundinis comburatur, ouum vacuum vtrinque perforatum ægri in ore contineant, & per ipsum arundo inseratur. Mollius fit fomentum, si pro aceto aqua sumatur. Quidam nitrum, & origanum, & nasturtii semen, ac oleum, in posca trita miscent, & similiter pro fomento adhibent. Aut cinerem pullorum hirundinum implumium illine. Aut solani succum, & butyrum, æquis partibus cum rosaceo cerato mento impone. Eis verò qui suffocantur, picem cum aqua & nitro in potu præbe. Hæc quidem Archigenes scripsit. Ego verò nunquam tentavi vlli alicui, ea quæ bibuntur pharmaca, in eiusmodi affectionibus exhibere, qualium sanè tum ipse, tum alij quidam, meminerunt. Itaque hoc, quod ad finem sermonis præscripti habetur his verbis: Eis verò qui suffocantur, picem & nitrum cum aqua in potu præbe. non possum mihi persuadere, qua ratione sit dictum. Immo neque ex præceptoribus aliquem, neque alium vllum, eo vtentem vidi, neque etiam ipse in vsum assumere tentavi. At verò venam secare eis qui suffocantur, & eluere fortè atque acri clystere, & purgatoria exhibere, gratia euacuandi vniuersum corpus, & transferendi infra humorum momentum qui ad affectas partes feruntur, rationabile est, & multa experientia iudicatum ac cognitum. Similiter etiam post totius corporis euacuationem, & diuersionem ad infernas partes, pharmacis acerbis multum discussoriis vti rationi consentaneum est, & experientiam testem habet. Picem verò cum aqua & nitro in potu præbere abstinui, vtpote cum neque alium vtentem viderim, neque rationem ad hunc vsum ducem habeam.

Quæ Apollonius in primo Parabulum tradidit.

Apollonius in primo parabulum sic ad verbum scripsit. **¶** *Ad Inflammatam Columellam Illitio-*
Dnes. Sale trito & melle illinens reprimes columellam. Picem illinens per digitum apprimito. Succum cyrenaicum aqua diluito, & columellæ adhibeto. Chalcitidem tritam similiter admoueto. Omphacio trito cum melle vtitor. Hæc Apollonius. Licet autem nobis videre in his quæ absque discrimine scripta sunt. Quòd si quis non vniuscuiusque indefinitè scripti facultates noverit, quò in opportuno tempore eis vtatur, maximum omnino nocumentum inferet. Scriptum est itaq; hic primum omnium, Sale trito et melle vtendum esse: postremum autem, Omphacio cum melle. Contraria autem facultas est omphacii ad salem. Quare si quis in principio sale vtatur, maximè si humores in corpore ex æquo abundant, aut etiam circa caput hæreant, extremè ægrum lædet. Omphacium verò in principio commodissimum est, non trahens, neque euellens ad se ex alto, velut sal cum melle, sed repellens. Sales autem cum melle discussoriam vim habent, modica adstrictoria vi sali commissa, quæ sanè per admisionem mellis penitus euertitur. Caterum id quod ex pice constat, inueteratis inflammationibus, & iam in scirrhum, vti ita dicā, induratis conuenit: quemadmodum etiā cyrenaicus succus non incipientibus, sed vbi iam quod influit per adstringentia repressum est, prodest. Chalcitis verò in totum inepta est, præterquam si valde inueterata & ægrè curabilis sit affectio: est enim medicamentum mordax si cruda adhibeatur: quapropter vim ipsius diminuamus, vsta frequentius vtimur. Deinceps Apollonius hæc ad verbū scripsit:

¶ Gargarismi

DE COMPOS. PHARMAC.

† Additur in aliquibus cod. græc. ταῦτα μὲν ὁ Ἀπολλώνιος ἐγγράφει, ἰ. hæc quidem Apollonius scripsit.

† Additur in aliquibus cod. græc. πότεν ἀντιόχου διὰ τὴν διαβήτην, ἰ. potio ad eundem de affectione.

☞ *Gargarismi ad Pendulam Columellam.* Origanum tritam aceto & aqua affusis feruefacito, & cum Ecaricarum succo misceto, ac utitur ad gargarissandum. Aut hyssopum terito, & caricarum coctarum succo misceto, ac utitur velut origano. Mentam ac rutam & coriandrum lacte asinino trita gargarissanda præbe. Apiū & lauri folia trita, & vino aut lentis decocto diluta gargarissato. † No ui quendam, qui omnibus ab Apollonio scriptis indiscriminatim utitur, in principio inflammationis gurgulionis vno ex his usum esse, & ægrum extremè læsisse: præter alia enim neque sciebat quid pendula columella esset, cum vellet Apollonius valde laxatam absq; inflammatione, gurgulionis affectionem ostendere: quam etiam refecare consueuimus: atq; in hac, re vera pituitam detrahentia & calfacientia pharmaca commoda existunt, nam in totū subalbida sit & exanguior. Deinde Apollonius hæc subdit. † Lotium asini plurimum & calidissimum bibendum præbe. Idem etiam in angina. Miror equidē eiusmodi auxilia tradentes: certè enim scio omnes homines, paucis omnino exceptis, citius mori velle, q̃ vrinam asini bibere: verū hic etiam plurimam addit. Et aliàs velut antea dixi, absurdissimum est curantem oris inflammationē pharmacum potabile exhibere, nisi si ex purgantium numero existat: hæc enim alterius vsus gratia dantur. Ex alijs sufficiūt quæ citra transglutitionem auxiliari possunt. Quin & quod postea scriptum est ab ipso pharmacum, quod itidem bibere iubet, similem habet absurditatem. Scribit itaq; sic de ipso: Lauri folia trita ex vino & aqua bibenda præbeto.

Quæ ab Hera tradita sunt.

Heras igitur multo melius q̃ Apollonius scripsit hoc modo. ☞ *Ad Columellam Laxatā.* Gallæ omphacitidis partem vnā, aluminis scissi partem vnā, salis ammoniaci partem vnā: vtrunque per se ac simul terito, & expleto inde cochleario vnam contingito. Aut lapidem ageratum appellatum, quo sutores ad muliebria calciamenta expolienda vtuntur, deradito, exinde q̃ cochlearium expletum vug adhibeto. Ex his duobus pharmacis, alterum posterius omni molestia caret, neque nocere potens, neque magnopere iuuare, quocunque tandem tempore quis eo vtatur: fortius est prius. In principio itaq; & cum valde rubent, minimè aptum est: si verò præeuacuato toto corpore, & post repulsiuorum pharmacorum usum adhibeatur, vbi non valde rubens sit gurgulio, iuuare potest: ex contrarijs enim fortibus componitur facultatibus, repulsoria & discussoria. Quare non rectè fecit Heras indiscriminatim ipsa tradendo.

Quæ Heraclides Tarentinus tradiderit.

Tarentinus porro Heraclides in libris ad Antiochidem, ad inflamas columellas sic scripsit: ☞ Omphacium siccum terito, & admisto sufficienti melle adhibeto. Aut gallam tritam cum melle: Aut alumen scissum eodem modo. Aut succum cyrenaicum cum melle. Aut melāteriam qua sutores vtuntur. Aut Andronium pastillum, quem in vulnerarijs medicamentis referam, cum vino. Oportet autem post hæc lentium decoctum gargarissare. Rectè ad finem hoc adscripsit. Vehementia enim sunt omnia præscripta ab ipso pharmaca, acerba qualitate prædita, & ob id exasperanti: itaq; aspritudinem ab ipsis inductam mitigare vult per lentium decoctum. In moderata inflammatione non est necesse talibus uti: quemadmodum neq; vbi columellæ valde rubræ fuerint, & calidam inflammationem habent: immo neque in declinatione earum, tunc enim discussorium medicamentorum vim prædominari oportet.

Ab Asclepiade prodita.

Asclepiades ad easdem sic scripsit. ☞ *Siccum ad Laxatas Columellas.* Anethū vna cum semine & radicibus quod satis est accipe, & in vas fictile coniectum, cuius os sit subobturatum & ipsum vas luto oblitum, in furnum donec vas ignescat mitte: deinde ex furno extractum anethum vsutere, & sublatum reponere. Vsu verò expetente anethi partes duas accipe, & iridis illyricæ in tenuissimum puluillum redactæ partem vnā admisce, ac per arundinem insuffla. *Aliud.* Rosarū siccarum sextarium vnum, nardi celticæ vnā cum radicibus & adhærente terra fasciculum vnum, nidi hirundinum syluestrium aridi drachmas tres, myrrhæ drachmas octo, gallas omphacitidas numero quindecim: contusa et trita insuffla, & cum digitis adhibe. Ex his duobus pharmacis prius penitus nihil ex repulsijs habet, sed est totum discussorium. Alterum verò ex contrarijs mistum est facultatibus, multā enim discussoriam vim habet syluestrium hirundinū nidus, adstringentem autem gallæ. Mediæ verò potentia est myrrha, & mistæ nardus celtica, ita vt tum discussoria, tum adstrictoria facultas, ambæ in eo sint moderatæ. Cæterum per arundinem eiusmodi pharmaca insufflari valde improbo: defertur enim ex ipsis multum tum in gulæ summum, tum in ipsam gulam. Præstat itaq; cochleario indita apprimere, quemadmodū ego uti soleo, vt vidistis. Quin & tertium pharmacum Asclepiades post prædicta duo conscripsit his verbis. ☞ *Siccum ad Laxatam Columellam & tumentem, Neapolitæ.* Piperis albi drach. vnā, myrrhæ drach. vnā, aluminis scissi drach. duas, gallæ omphacitidis drach. duas: trita admoue. Hoc pharmacum à principio vsque ad finem vtile esse poterit, præterquam in vehementer rubentibus: in his enim vitare oportet acriū ac mordacium valde misturam, quale hoc loco piper existit. Aliud deinceps eiusdem facultatis scripsit ad tumentes columellas ex his compositum. Lapidis agerati drachmas quatuor, floris lapidis asii drachmas quatuor, terræ samia drachmas quatuor, aluminis scissi drachmas duas, croci torrefacti

*. Al. hexagium

A torrefacti drachmas duas, gallarum omphacitidum drach. duas: tritis vtire. Hoc & nos vfi sumus ſæpe vt optimo, & quod omni tempore iuuare poſſit, præterquam velut in præcedenti dixi, ſtatim in principio, & cum ruber & calidus fuerit inflammationis tumor. In inueteratis autem iam, & corpore euacuato, poſt vnum vſum ſtatim magnam commoditatem exhibet: ſunt enim vehementer adſtringentia, ac diſcutientia, & ea quæ mediæ materiæ ſunt, in ipſo temperatè miſta.

Critonis Pharmacum hoc modo ſcriptum ad Columellas.

Hoc pharmacum ad ipſam temporis opportunitatem apparato. **¶** Offium palmularum, nucum tenerarum immaturarum ſiccarum, vtrorunq; drachmas quatuor, vrito, ac in puluillum terito. Vtere arido admoto. Et in hoc pharmaco offium palmularum viſ ſatis diſcuſſoria eſt: nam & in alijs affectionibus eorum experientiam habemus, q̃ eiufmodi viribus ſint prædita. Nucum verò tenerarum ſiccarum cinis diſcuſſoriam vim habet vnà cum adſtringente.

Sorani ad Columellas.

Quin & Soranus pharmacum indiſcriminatim ſcripſit, non apponens in quibus priuatim faciat. Habent autem verba eius hoc modo. **¶** Radicem dulcem contundito, & mel & dulcem aquam pari menſura aſfundito, deinde coquito, & ſuccum gargariffandum præbeto. Peccauit in hoc quòd non adſcripſit, maxime mitigatorium hoc pharmacum eſſe, quod in vigore inflammationum magnopere auxiliari poteſt. Huius vſus commodus etiam eſt, vbi ex acerbis pharmacis immoderatiſ quìs irarit & exaſperarit columellam inflammata: hanc enim lenit hoc pharmacum.

De Pharmacis ad Vlcera Oris Aphthas appellatas.

CAP. 4.

A. l. 3. f. 6. c. 23.
fol. 246. f

VLcerationes* in ſuperficie oris obortas Aphthas appellant, habentes quippiam igneæ caliditatis. Fiunt autem vt plurimum pueris lactentibus, cum aut vitioſum fuerit lac nutritis, aut non probè ipſum concoxerit infans. Curantur facilè, vtpote quæ ex moderatè adſtringentibus ſedantur. Quandoque tamen diuturnæ fiunt ac ægrè ſolubiles, & progreſſu temporis putredinoſum quid acquirunt, quod à medicis nomen id eſt vlcus depaſcens, appellatur. Scripta itaque ſunt & ad ipſas medicamenta, moderata quidem ad eas quæ nihil maligni habent: fortia verò ad eas, quæ iam quid putredinoſum & ſerpendo depaſcens habent. Mentionem faciam eorum quæ recentiores coaceruarunt: nam ex iis quæ veteres conſcripſerunt, optima cum magna experientia ipſi elegerunt, & quædam eorum quæ poſtea inuenta ſunt appoſuerunt. Inuenias autem poſt veteres, etiam Mantia & Heraclidæ Tarentini plurima pharmaca ſcripta. Similiter **C** & Menecrates librum optimorum pharmacorum inſcripſit, ex quibus plurima ipſe inuenit, quemadmodum & cappadox Heras: Andromachus autem duos, & tertium in quo oculorum pharmaca continentur. Plures autem libros compoſuerunt Antonius Muſa, et poſt eum Aſclepiadæ duo, & poſt hos Crito. Verùm hi quidem tres poſt Andromachum nati ſunt, Heras autem ante Andromachum, & ante ipſum etiam Muſa ac Menecrates. Longo verò tempore etiam hos præceſſit Heraclides, & præceptor eius Mantias: verùm Mantias velut ab initio Herophili ſectator fuit, ita etiam per omnia manſit: Heraclides autem ad medicorum empiricorum ſectam declinauit, optimus medicus tum circa alias artis partes factus, tum plurimorum pharmacorum expertus. Cum itaque aphthæ (de his enim ſermo inſtitutus eſt) malignæ euadunt, fortioribus medicamentis egent, qualia etiam alias in tonſillis ac ore affectiones ſanant. Prædicto igitur ſcopo compoſitionis eorum, nihil amplius opus habeo de ijs dicere, ſed ad narrationem progrediar præcognitorum, initio ſumpto ab iis quæ Andromachus ſcripſit, quemadmodum conſueui ad verbum ipſa tranſcribere.

Quæ Andromachus ſcripſit ad Aphthas.

Non ſolum Andromachus, ſed & alij multi duo pharmacorum genera ad aphthas conſcripſerunt, ad eas quidem quæ nihil maligni habent, moderata viribus pharmaca componentes: ad iam malignas verò fortiora. Adſcribunt autem in his ipſi aliquando, quòd ad aphthas & vlcera hoc pharmacum conuenit: aliquando, quòd ad aphthas putredinoſas. Cum verò ſimpliciter ad aphthas adſcripſerint, ſimplices indicant & nihil maligni habentes. Andromachus igitur ad malignas aphthas ſic ſcripſit. **¶** Ad Aphthas in Ore & Vlcera. Aluminis ſciſſi vſti drac. duas, fructus ericæ drachmam vnam, oleo excipito, et per digitum locis apprimito. *Aliud.* Æruginis drachmas duas, aluminis ſciſſi † partes duas, } gallæ in puluillum redactæ partem vnam: terito & per linteo lum concernito: deinde digitum oleo madefacito, ſiccum q̃ excipito, & tonſillis extergendis apprimito: item palato, & vuæ. Diſparat pelliculas, & tollit aſperitates circa ipſum os, callos excoriat, & vlcera ad cicatricem perducit. Ceterum ad aphthas in ſuperficie herentes ſic ſcripſit. Ad aphthas lycium Indicum vino tritum circumlitum facit, & ericæ fructus tritus, aut roſæ ſiccæ cum melle. Hæc præfatus infert: Si verò nigræ ſint & malignæ, vuæ paſſæ puræ partes tres, aniſi tantundem, trita cum melle illine, deinde collue.

† Al. partē vuæ.

Quæ Crito ad Aphthas ſcripſit.

Crito verò ſic ad aphthas ſcripſit. **¶** Portulacam in melle tinctam manducet. Aut oleq; folijs in vino coctis os colluat: Aut foliorum myrtialbæ decocto ex vino. Aut æruginis vermiculata obelos

obolos tres, in vini heminae parte quarta tritos colluat. Quin & galla in acri aceto contrita illinuntur. In pueris autem tædulas, bouinam quæ medullam ubi coxeris, minutim concisas porrige. Faciunt & amygdalæ amaræ cum melle. Nigrefactas autem aphthas, vna passa exacinata & aniso tritis cum melle illine. Tarentinus autem Heraclides, ubi exterferis, ait, farina erui cum melle, gallam cum melle adhibe. Conuenit & rhus obsoniorum cum mentæ ramulis. Sit autem rhois copia quantum tribus digitis præbendi potest, mentæ verò ramuli tres, & rosarum folia septem, & nuces pineæ septem: his omnibus cum melle tritis utitor: Aut lycio ex aqua. Conuenit & fex vini dulcis illita cum melle. Aut alumen, & malicorium punici dulcis, æquis portionibus terito, & adipe anserino mista illinito, atque aquam calidam frequentius colluendam præbeto, amplius quæ adipem anserinū admoueto. *¶ Aliud Musæ.* Fructus myricæ drachmas sex, aluminis scissi drachmas duas, oleo excepta admoue. *¶ Aliud maxime in Pueris.* Rhoen rubrum tritum melle mistum illine. Aut adipem suillum & mel liquefacta. Præbeto eis etiam gargarissandum lac alininū. Quod si multa saliuā feratur, gallam & solanum aceto diluta gargarissare facito: aut violas albas ficas cum melle tritas illinito. Hæc cum scripserit Crito, merito quis ei successeat, velut etiam alios semper reprehendo, qui ex ordine indiscriminatim auxilia recensent, non apponentes, an incipiente affectione, aut progrediente, aut decedente, aut vigente, aut decrecente, conueniant: & num parua existente affectione & mansueta, aut adeo maligna, ut iam putredinosum quid habeat. Ex his enim quæ scripsit aliqua simplicissima sunt, in pueris maxime conuenientia nullam affectionem habentibus: Velut cum adipem suillum & mel liquefacta assumit: & multo magis cum alinum lac colluere præcipit. Simplicissimum pharmacum est & portulaca melle tincta & manducata: & collutio ex foliis oleæ, similiter quæ ex myrto alba. Fortissimum verò quod ex ærugine & vino constat: Quemadmodum etiam galla, acri aceto trita ac illita: valde enim forte hoc pharmacum, velut etiam id quod ex ærugine constat. Verum in illo paucissima est ærugo, obolos enim tres dixit in vini quarta heminae parte terendos esse ac colluendos: debilisque fit copia mixturæ vini exoluta. Gallam verò aceto acri trita ut crassia fiat, & illitioni apta, valde vehemens est pharmacum: Quemadmodum etiam quod ex alumine & malicorio punici dulcis componitur: quod nisi ad adipem anserinum admixtum esset, ad putrefactiones fortes congruens esset. Forte est et quod ex myricæ fructu ac alumine constat, sed non adeo velut id quod ex galla & aceto. Semel porro tantum recte fecit apponendo in verborum serie sic, Quod si multa saliuā feratur, gallam et solanum aceto diluta gargarissare facito: multam enim saliuam ferri, maiorem affectionem esse significat. Præstabilius autem fuisset statim dixisse, Quod si pascendo proserpat affectio, aut vlcera profunda fiant, aut eiusmodi quippiam, adscripsisse.

De his quæ Asclepiades ad Aphthas scripsit.

Recte igitur fecit Asclepiades, tametsi non multa pharmaca ad aphthas conscripsit. Verumtamen in duobus quæ in principio tradidit sic, Ad aphthas citra nomen, id est non pascentes. deinde post duo rursus adscribens, Ad aphthas depascentes. Lenia enim sunt duo pharmaca, Alterū quidem prius in quo ait, Medullam bubulam melle mistam ac tepesactam illinito. maxime verò pueris infantibus est commodum: Alterū verò est, Adipe suillo mellis admixto utitor. Cæterum ad depascentes aphthas, gailarum decocti cyathum vnum ac mellis tantundem miscere iubet, et feruefacto uti. Verum ego tum hoc pharmacum, tum alia tria post ipsum tradita, paulo antè in pharmacis ad nomas præscriptis: neque enim referre puto, siue ex aphthis, siue ex alio quopiam, transitio ad nomen id est vlcus depascens, contingat.

Quæ ab Apollonio ad Aphthas scripta sunt.

Apollonius autem Herophili sectator, in primo Parabilem pharmacorum sic scripsit ad verbum. *¶ Ad Aphthas albas.* Chalcitidem oleo tritam penna illinito: hoc euestigio sedat. Postquam verò pura facta fuerit, Myricæ fructum tritum, & aqua mulsa aut vino dilutum, illinito: maxime infantibus est ex usu. Deinceps autem aliud scribit, & maxime ad nigras aphthas. Vuam passam exacinatam, & anisum trita cum melle illinito. Et rursus aliud, Atramento futorio trito cum melle utitor. Videtur sanè in malignis, eiusmodi pharmacis iubere uti. Adscripsit itaque ad primum, Ad aphthas albas. Ad secundum, Ad nigras. ostendens per id colorem præter naturam, & magnitudinem affectionis. Consequenter adscribit & collutiones ad aphthas hac verborum serie. Vino nigro austero & subadstringente colluito. Oleæ foliis in vino coctis, colluito. Myrti albæ foliorum decocto cum vino similiter utere. Hæ collutiones citra discrimen scriptæ nullum detrimentum inferunt: nam & in moderatis, & in maioribus, & in maximis affectionibus, conueniunt. Recte verò deinceps aliud valde efficax scripsit: Æruginis vermiculata obolos tres, in vini quarta heminae parte gargarissandos præbe: deinde etiam vinum colluendum præbe. Hoc enim in fortioribus conuenit, quemadmodum etiam quod consequenter sic scriptum est: Muriam oliuarum & acetum pari mensura mista colluenda dato, inde quæ vino colluito, postea etiam aqua mulsa, & deinde aqua: In pueris autem oleum colluendum præbe. Post hæc, duo pharmaca scribit diuersis formis ac speciebus aphtharum congrua. Hylsopum enim tritum ad calidas & erosas affectiones, item quæ puras maxime contrarium

Arium est: congruit autem sordidis & inflammatis aphthis. Omphacium verò cum vino aptum est puris, & mordacitatem sentientibus, acerosis. Iubet autem omphacium cum vino tritum collui, hyssopum verò cum vino aut aqua mulla. Validum valde est quod ab his sequitur pharmacum, ut iam pascendo proserpentibus aphthis conueniat, quod ipsum componit, myricæ fructum coquens cum aceto. Validum est & quod deinceps ab eo scriptum est, in quo ait, Gallam tritam in acri aceto colluendam præbe. Hoc verò quod postea sequitur, in quo ait, Succo silphij diluto similiter, vitior: & postea oleum colluendum dato: etiam ipsum acre & mordax est ac discussorium, non adstringens. Non rectè itaque adstringentia & acerbæ ac repulsoria, discussoriis admista sunt ac acribus, atque hoc nullo discrimine adiecto. Quod verò sequitur ex aceto apparatus generosus est. Quoniam autem ad acetum non apposuit acre, & quoniam per semen lini, moderatius euadit, adiecit autem ipsi etiam lolium, pharmacum multum discussorium: atque propterea ipsum ad linguæ tumores conuenire ait. Verum adscribam omnem ipsius dictionem. Semen lini, ac lolium, æquis partibus aceto trita colluito. Hoc itidem ad linguæ tumores facit.

Longè lenius his omnibus pharmacum deinceps scripsit hoc modo. Folia pruni contusa ac lacte permista colluito. Cum enim adiecerit sermoni, colluito, manifestum est quod multo lacti pauca folia admiscet. Nam si folia cum lacte trita pro pharmaco inunctili esse iussisset, palam utique esset, quod multa folia, paucum verò lac, esse iussisset. Deinceps porro etiam quæ mansa aphthas iuuent, annectit. Mandendæ sunt oliuæ muria conditæ. Manifestum est lenissimum hoc pharmacum esse. Et rursus. Portulaca melle tincta manducetur. Et hoc similiter mite est. Differunt hæc duo inter se in eo, quod oliuæ muria conditæ & adstringunt & discutiunt, plurimam verò in se adstringendi vim habent: portulaca verò cum melle imbecillius est pharmacum. Consequenter probè fecit, cum ait in pueris conuenire, quæ dicturus est medicamenta. Scribit verò de eis in hæc verba. Vbi puerulus aphthas habeat, similaginem & medullam bubulam ac farinam coquens, infanti mande, si iam ipse ab vberibus mandere nequeat. *Aliud.* Lienem bubulum in vino coquens & cum melle terens mande. Hoc pharmacum superuacaneum est, & plus æquo curiosum. Deinceps rectè scripsit, Abstinendum circa dietam, ab acribus, & falsis, & acidis, tum edulis, tum potibus. Deinde haud scio, quo modo in hanc sententiam scribit, Atramentum sutorium tritum † cum melle illinito. Hoc enim medicamentum superius scribere oportuit cum aliis fortibus pharmacis.

Quæ Archigenes scripsit ad Aphthas.

C Quædam ex his quæ Archigenes ad aphthas scripsit, eadem sunt cum præscriptis. Verum visum est mihi ex ordine omnem ipsius sermonem adscribere, ita ut nihil ex eo relinquam. Scribit igitur sic. *¶ Ad Aphthas Collutiones faciunt,* Foliorum oleæ decoctum. Aut foliorum myrti albæ eodem modo. Aut aqua oliuæ colymbadis appellatæ, { hoc est muria innatantis }. Facit et amurea, & marrubii succus, aut lentis decoctum, seu rubri, aut † cypri. Aut æruginis vermiculata obolos tres, in vini cnidij quarta hemina parte dissolutos, colluat. *¶ Illitiones autem faciunt* pleraque ex descriptis stomaticis medicamentis: priuatim autem congruunt hæc. Aluminis scissi, florum rosarum, æquales partes: fructus myricæ duplum: utere siccis. Aut thus & glycyrrhizæ succum æquis portionibus: gallæ, myrrhæ, anisi, singulorum parum quid: cum vino protropo illine.

Aliud. Mannam & salem pari pondere sicca, per pennam adhibeto. *Aliud.* Fæcem vini dulcis cum melle illinito. *Aliud.* Misy & alumen & rhoem cum melle, aut chalcitidem cum oleo, per pennam illinito: vehementer bonum est. Aut oleæ folia cum oleo illinito. Postquam verò repurgatæ fuerint, myricæ fructum cum aqua mulla aut vino illine. Aut ubi cum erui farina & melle exteferis, gallam cum melle adhibe. Aut myricæ semen & aluminis tertiam partem cum oleo illine. Hoc etiam ad nomas facit. Aut adipem suillum aut anserinum manna indispersa illinito. Aut gallam tritam cum oleo. Aut liquidum alumen dilutum. Aut † cypri folia manducant. Aut lycij radicem aridam adhibe. Aut oleæ germina trita ex melle. Aut gallam cum sale. Si verò extendatur affectio, & serpendo putredinose depascat, collutionibus quidem & gargarismis utendum est ad aphthas descriptis fortioribus: priuatim autem muria frequentius colluenda est. Aut herbam sacram aqua aut vino incoctam colluendam aut gargarillandam dato. Illitionibus etiam ad aphthas descriptis fortioribus utantur: Priuatim verò cornu cerui tritum affrica. Aut atramentum sutorium totum tritum cum melle. Aut æruginem aris siue squamam cum melle. Summè facit ad nomas, fœniculi radice vstæ cinis. Hæc ad aphthas Archigenes in primo de pharmacis scripsit, quæ parum abest ut omnia etiam aliis sint scripta. Quid igitur operepretium duxi eadem bis scribere, quamuis cauerim ne hoc facerem? Quod sanè & Archigenem, quem scimus maiore quam alios dignitate, etiam communia cum proprijs discriminibus scribere posse, videbam nunc ipsum in pluribus eiusmodi doctrinæ negligentem. Nunc enim omnia confusim proiicit auxilia, vnà cum hoc quod continenter inter se scribendo commiscuit lenissima & acerrima. Quid enim simile habet ærugo ad lentis & rubi ac cypri decoctum? quid galla simile adipi anserino aut suillo? Acre enim & erodens fortiter quæ resiccans pharmacum est erugo: rubus autem & † cyprus, & lens, paucissimam habent adstringendi facultatem.

Sic

† *κεραυό -
ννσι. vsta, ad-
ditur i mulis
cod. antiquis.*

† *Al. cypri.*

† *Al. cypri.*

† *Al. cyperus.*

Sic etiam galla fortissime adstringens, contrariam vim habet suillo ac anserino adipi. Quin & de-E
inceps ab eo scripta, plane quod omnia quorum mentionem facit, eandem confusionem perturbati
ordinis habent. Præstabat autem, velut semel alicubi in sermone apponendo dixit, Hoc etiam ad
nomas facit. eodem modo etiam alia distinxisse, ut adscriberet videlicet, Hoc quidem infantibus
ac pueris conuenit, hoc verò perfectis: & hoc incipientibus aut moderatis aphthis, hoc autem vi-
gentibus & fortibus: maxime verò omnium, aut inflammatis & calidis, aut magis frigidioribus:
& ex inflammatis, hoc quidem rubicundioribus, hoc verò flauioribus: alia enim ex sanguine, alie
ex flaua bile inflammationem habent: quemadmodum illa rursus non inflammata pituitosa in
totum existunt: quemadmodum aliqua ex inueteratis, humoris atræ bilis malignitatem acquirunt.

Cognoscuntur hæc omnes facile visu simul & tactu. Visu quidem ex coloribus, quemadmodum
etiam nunc dictum est: rubicundiores enim sanguineum humorem præualere ostendunt: flauio-
res autem amaram bilem: quemadmodum rursus albescences pituitosiores, liuescentes et nigre-
scentes, atræ bilis succum. Qui enim hæc rite discreuerit, nouerit quod amplius singulorum simpli-
cium pharmacorum facultatem, quemadmodum in libris de ipsis à me scriptum est, is in vnaquaque
aphthæ specie, tum simplicibus, tum compositis uti sciet, velut iam sæpe est prædictum. Confide-
rabit autem simul & corporum naturas, num molles sint & humida, velut in pueris, eunuchis, & F
mulierculis: an duræ & arida, velut in piscatoribus, ac nautis, & venatoribus: atque agricolis. For-

† In antiquis
cod. græ-
cis hoc in loco
additur hæc
Veritas, is est
hoc, non pos-
sibile est, Qui-
bus ego medi-
camentis utar
ad aphthas, ut
hic incipiat ca-
pitulum nouum, atque
hæc sit veluti
inscriptio.

tiorebus enim corporibus fortiora adhibebis pharmaca, debiliorebus molliora. † Ego porro in-
fantibus quibus nutrices cibum mandunt, lentem cum modico pane & medulla cerui, aut vituli,
præbeo. Admisceo etiam cibus, ex malis cotoneis, atque alijs quæ adstringunt, velut Romæ cestiana
appellata. Quin & ex pyris addo, sorbis quod, ac mespilis, & cornis. Quandoque etiam de lactuca, & feri
de, ac solano, & portulaca, in cibos qui manduntur permisceo, si aphtha fuerit inflammata. Quod
si non adhuc quid mandiqueat, nutricem eiusmodi victu alo, ei que simul bonam concoctionem
prospicio. Veruntamen etiam infantes pharmacis illino, si quidem subrubras videro aphthas, in
principio quidē ijs quæ moderatissime adstringunt ac frigefaciunt: deinde verò ijs quæ citra mor-
dicitatem discutiunt. Si verò subflauas videro, iisdem quidem utor, sed magis refrigerantibus. Si
verò pituitosiores, adstringentibus. Si nigrescentes, discussorijs generosioribus. Caterum in ma-
ioribus pueris, eiusdem generis facultatibus pharmacorum utor, auctis tantum viribus ipsorum.
Quemadmodum sanè etiam in perfectis & duris corporibus, singulis relatis facultatibus fortissi-
mis utor. Placebat autem mihi in his per omnia misios usus cum vino adstringente, quod tum in-
tendit, tum remittit vim suam, prout magis aut minus vinum fuerit adstringens, & prout crassius G
aut liquidius efficitur pharmacum ex misyos ac vini mistura. Quod si sordida appareat aphtha,
misy cum vino mulso tero. Iis verò qui fortioribus quam misy est, pharmacis opus habent, æru-
go similiter cum vino & vino mulso utilis existit. Illinendæ autem sunt ex his pharmacis affectæ
oris partes. Commodum est etiam pharmacum ad hanc rem, chalcitis oleo trita. Atque hæc quidē
efficaciora. Moderata verò & maxime ad incipientes affectiones omphacium cum vino, & vino
mulso. Similiter etiam rhus. In pueris sufficit rosarum flos, & ipsa rosa sicca, & collutiones mo-
deratè adstringentes, pro ætatis & naturæ eiusmodi corporum ratione. Et in summa moderatæ
aphthæ maxime in teneris corporibus moderatis pharmacis opus habent: fortes verò & maxime
in duris corporibus, à fortioribus curantur. Fortia pharmaca dico, tum quæ fortiter adstringunt,
tum quæ mordent: sicut sanè moderata, quæ haud omnino quidem mordent, parum autem adtrin-
gunt. Fiunt porro etiam in his, velut in alijs prius dictum est affectionibus, composita medica-
menta, & sæpe etiam ex contrarijs, quale est quod ex oleo & chalcitide constat. Ipsum equidem
oleum per se infestissimum est aphthæ affectui, velut etiam chalcitis: quādoquidem alterum qui-
dem humectat & sordidum facit, mordet autem vehementer chalcitis: verum mistura ipsorum
ubi fuerit moderata, optimum pharmacum efficit. Quemadmodum igitur ex cerato & æruginè, H
incarnans effici pharmacum ostensum est, cum tamen ambo incarnationi contraria existant:

eadem ratione ex oleo & chalcitide aptum medicamentum efficitur. Si verò in putre-
dinem aphtha vertatur & exulcerationes faciat, neque aphtham amplius affectionem
nominare conuenit, neque pharmaca eiusmodi affectiones curantia, inter ea
quæ aphthis commoda sunt, connumerare. Quemadmodum neque inter
erysipelata sanantia, recte connumerantur ea quæ præclare discutiunt
liuidas & duras partes, ex frigidiorum medicamentorum ad-
hibitione tales factas, & iam ad induratum in scirrhum
affectionem ex erysipelate delapsas. Profecto enim
qui eiusmodi scripturarum indiscriminata incer-
titudine decepti, erysipelatis calida et discus-
soria medicamenta, aphthis autem
ea quæ putrefactis conueniunt,
adhibent, non parum de-
trimenti inducunt.

GALENI DE COMPOSITIONE MEDICA-
MENTORVM LOCALIVM SIVE
SECUNDVM LOCOS LIBER SEPTIMVS

ARGVMENTVM LIBRI

Ostendit Quæ Medicamenta congruant Affectis Partibus, per
quas Vox æditur, ac Respiratio.

De Affectionibus circa Partes Respirationis contingentibus.

CAP. 1.



B

Os est recentioribus medicis arteriæ pharmaca, Arteriæ appellare, nō ap-
ponentibus, num antidotos dicant, an iuxta aliud significatum: quidā verò
Eclecta nominant ipsa, non apponentes pharmaca: & quidā penitus nullū
discrimen ipsis adscripserunt: aliqui verò rarò addiderūt: alij, ad vocem in-
terceptā: alij adhuc generalius, ad vocē læsam: sunt qui & ad exasperatam ar-
teriam, & ad exulceratā, scripserūt: adeo vt rōnabile sit eos, qui arteriæ ap-
pellatis pharmacis indiscriminatim vtunt, aliquñ foeliciter eis vtī, aliquñ vero
nihil penitus ægros iuuare, sed maximè lædere. Palā est autē q̄ asperam arte-

riam in huiusmodi affectionibus criminantur. Quondā igitur qñ non dum eas, quæ similiter vt
cor pulsant, arterias sic noiabant, in solam eā quæ ex pulmone in laryngem emergit arteriā, ipsum
arteriæ nomen inferebant, venas appellantes in totū, velut alias quæ nō pulsant, sic ēt pulsan-
tes. Postea verò consuetudine obtinente arteriæ appellationē in pulsantibus dici, propter æqui-
uocationem asperæ nomen apponentes, eā quæ ex larynge in pulmonem descendit arteriā, asperā ar-
teriā appellauerunt, vnā cum hoc q̄ ipsam etiam bronchum vocant, qñ quidem cartilaginosa cor-
puscula, quæ plurima eius pars sunt, bronchia appellant. Ambit autē ipsam arteriam intrinsecus
† crassa pellicula, ‡ quā ob crassitudinē aliqui tunicam vocant. Cū igitur affectio aliqua aut cir-
ca hanc, aut circa laryngis (quī summa arteriæ pars est) musculos cōtingit, arteriæ appellant cu-
rantes ipsam, nō apponentes, velut dixi, antidotos. Dissimiles autē facultatibus sunt ab ipsis descri-

* ἰσχυρὰς ὑ-
μῶν ἢ. fortis
membrana, est
in antiquis.

Cptæ, & ob id contingit vtentes ipsis absq; discrimine, à scopo aberrare. Quod verò multa sit diffe-
rentia earū quæ in medicamentarijs libris scriptæ sunt, ex tribus exemplis discere licet, quorum
Primum omnis acrimoniæ expers est, & exquisitè meatus obturat, læuigans asperitates: Alterū
huic contrariū est, acrimoniæ mordacis non parum habens, vt si sanè particulæ adhibeatur, ipsam
exasperet: Medium deinde inter ambo dicta aliud genus arteriacorū pharmacorum est, lenis &
citra acrimoniam extergētis facultatis. Id igitur quod meatus obducit, ex passo cretico, & gūmī,
& tragacantha, ac radice dulci apparatur: Acre verò ex pipere, & casia, & cinnamomo, & chalba-
no, ac resina terebinthina: Medium autē amborum ex pitisanā constat succo, & amygdalis, & fabis
fresis elixis, & alijs huius generis. Inter medium autem & vtrunq; extremū plura pharmaca sunt,
partim magis, partim minus, à medio progressa: de quibus deinceps determinabo, eos quidē qui
discrimen aliquod addiderunt laudaturus, qui verò simpliciter protulerunt, neq; admitturus. In
horum medio locandi sunt, qui discrimina non tñ integra fecerunt, qualia sunt corū qui scripse-
runt: Arteriæ ad interceptam vocem, aut rursus, Arteriæ ad raucam vocem. Etenim " vox
intercepta, hoc est non posse loqui, ad plures causas sequitur, partim quidem ad destillationes à ca-
pite diuturnas: partim verò suppuratis pectore, ac tabidis: & ijs qui ex magno & multo clamore
Dlasi sunt, & deinde non probè curati sunt: aut etiā affectionē, quæ adhuc generatur, habent. Eodē
modo etiam raucosa vox fit ob easdem causas, & amplius ob frigidi aeris inspirationē. Affectio
itaq; interceptæ ac raucosæ vocis eiusdem generis est. Magnitudine tñ differunt inter se hæc ma-
la. Cū enim vocis organa ab humiditate vehementius & vt ægrè solui possit, fuerint madefa-
cta, vox intercipitur: qñ verò moderatius sunt humecta, raucedo oboritur: organa vocis cum di-
co, arteriam accipite, & eius summum, aut fauces. Qui igit ex vehemēti clamore vocē amplius
oblāsam habent, his similis quædā affectio contigit ei quæ manibus, & cruribus, & lumbis, & spi-
næ, & musculis, vbi plurimum laborē pertulerint, accidit. Vocant autē aliqui exercitiorū magistri
eiusmodi affectionem musculorū, in quibus cōsistit, lassitudinē inflammātam. Itaq; iuxta arteriā
intrinseca ipsius pellicula, aut tunica, aut quomodocūq; quis noiare velit, à spiritu in magnis vo-
ciferationibus extra prolato percussa, in affectionem inflāmatam deuenit: atq; hoc multo magis
si ad magnitudinē vocis, acumē quoddā accesserit. Iuxta arteriæ verò summū vltra hanc plagā, ēt
musculorum ipsius mouentium actio offensa, maiorem affectionē efficit. Porro curationis ipsa-
rum genus in omni particula secundum materias euariat. Etenim crura, & manus, & spinam, per
oleum confricare faciliè licet, cū per cutem in adiacētes ipsi musculos vis ipsius olei penetrare
possit. Iuxta asperam verò arteriam cartilagine post cutem sita, prohibent in subiectam pellicu-

* ὑποκειμένη
νοσος, ἢ. subie-
ctos, est in ma-
nuscriptis.

Quinta Classis.

ZZZZZ

lam

DE COMPOS. PHARMAC.

Iam transitum facultatis emollientium vnguentorum. Quemadmodum enim oleum, sic etiā alia multa composita pharmaca eandē vtilitatem præbent. Quin & ea quæ in principio Acopa tantū appellata sunt, hoc est lassitudines emendantia, paulatim appellationem suā à se ipsis extenderūt ad similia cōpage medicamenta, etiā si gratia vehementer calfaciendi assumātur. Cæterum cōmunis materia auxiliorum ad vocis organa, præter reliqua, est quæ ex balneis contingit: manifestum est autem q̄ dulcium aquarum dico. Marina enim balnea, & sulphurea, & aluminosa, & atramentum sutorium olentia, ac bituminosa, propterea q̄ fortiter resiccant, inepta sunt. Et sanè ita faciūt phonaſci, qui magno vocis exercitio vtuntur, cum contendendo oblaſerint vocem (sunt autem hi citharædi, & præcones, & tragædiam ac comædiam personati repræsentantes) balneis enim multis vtuntur, & cibos lenes ac laxantes edunt. Si verò etiam aspritudinem percipiāt, cibos qui infarciūtur particulis quas contingunt, assumunt. Vna enim est tunica sibi ipsi coherens & continua, quæ summo gulæ, summo asperæ arteriæ: gulæ etiā, atq; ipsi asperæ arteriæ: intrinsecus prætenditur. Quod si ex victu ac balneis oborta affectio non sedetur in organis vocis, ad arteriacas transeunt, per totum hoc tempus cibis vtentes qui ex lacte, amylo, alica, ouis, & dulciarijs libis cōponuntur. Si verò per hæc non curentur, inuenta sunt à medicis pharmaca sub lingua tenenda, inde etiā hypoglottides appellata. Sunt autem ea eiūdem cum arteriacis inflammationem arcētibus facultatis, ex vino theræo, & gummi, ac tragacantha, & glycyrrhiza, cōposita: quæ vt dixi, leuigant simul q̄ remittunt asperitates: quicquid verò reliqui est in partibus inflammationis, hoc concoquunt, & citò perſanāt. Induſtrium porrò esse oportet qui pharmacum linguæ subdit, quò eo paulatim liqueſcente, summum asperæ arteriæ id quod in ipsum defluit suscipiat, renitendo oborienti tussi. Obluctantes enim vt ne tussiant, permittent quippiam ex pharmaco in arteriæ summum, ipsam q̄ adeo arteriam demanare. At verò sic curatos claram vocem habere impossibile est, citra vsum pharmacorum absq; acrimonia extergentiū, quale "est faba fresa elixa, & pūſana, & semen lini torrefactum: huiusmodi enim mediū obtinent inter ea, quæ media facultate prædita sunt, & ea quæ meatus obducunt pharmaca. Magis autē q̄ hæc abstergunt resina terebinthina, thus, mel despumatū, ac amygdalæ amaræ. Quemadmodum etiā & his rursus fortiora sunt, oroborū farina, homini semen, iridis panacis q̄ semen. Cæterū his omnibus vina mollia, † & passum creticum, & theræū, ac scybelites apta sunt: & ad hæc haud scio quomodo neglectū id, quod à Græcis in nostra Asia hepsēma appellatur {Latini sapa dicūt}. Verū atticiſſantes ipsum Siræū vocant: Quæadmodū alij caricarū decoctū siræū appellandū cēlent, pugnāt q̄ inter se vtrū ipsorū siræum vocare oporteat. Est sanè & hoc ipsum siræum, quod pinguibus caricis in aqua decoctis fit, mediæ facultatis, quam lenem & citra acrimoniam extergentē appellauimus. Multum quidē igitur coctum {hoc est sapa ipsa,} lenissimum pharmacum est, & maximè meatus oblinens: caricarum autē decoctum magis discutit & extergit. Quemadmodum igitur in præcedentibus dixi, Omnium simplicium medicamentorū vires exquisitè nosse oportet eum, qui compositū quoddā sit facturū: atq; hic ipse etiā ab alijs cōpositis rectè vtetur, & maximè vbi indiscriminatum fuerint conscripta, quæadmodū plures arteriacæ habentur. Palā est etiā quod hic ipse ijs, quæ cum discrimine prodita sunt, rectius vtetur. Etenim iuxta exactā rōnem, in quantum apparatus affectionum transmutatur, tm̄ etiā cōmodum ipsi pharmacum permutare oportet: hoc ipsum verò solus is qui singulorum simplicium pharmacorum vim nouit, exactè præstabit, ad primum pharmacum parū quiddā ex sequenti ordine apponēdo. Velut exempli gratia, In lassitudinibus inflammationis cū in summi ipsius asperæ arteriæ musculis fiūt, In principio qdē lenissima edulia cōueniūt, pharmaca verò meatus obducuntia: Consistente autem inflammatione parū quid extergentium addendū est: deinde consequenter amplius: deinde rursus aliud illo præstantius, quo paulatim cōpositio ad medium exterſorium perueniat: & rursus secundum eundē modum ab hoc magis discussorium ac exterſorium: ita progressu ad vehementissimū factū, vbi diutius velut in scirrhum indurata affectio in vocis organis perſisterit. Primi itaq; ordinis est tragacantha, & gummi, & saminus alter, amyllum q̄, & ex alica ac trago probè coctis sorbitio. Quin & lac aptum est, & dulciarij panes, & oua sorbilia, ac nuces pineæ quas nunc oēs Græci strobilos vocant, quondam autem apud Atticos conī vocabantur. Sefama etiā ex hoc genere sunt. Ab his autem deinceps est butyrum, quod etiā butyros masculino genere Græcis appellatur: & decoctum radicis dulcis ad crassitudinē artici mellis liquidū redactum. Atqui radicem dulcem quam glycyrrhizam vocant, præstat in primo tempore in aqua, velut dixi, coctam, ad siræum siue sapa ex musto paratam ad miscere: ad passum itē Creticum idem decoctum misceri potest. Siue autem cum sapa, siue cum passo Cretico fuerit permistum, rursus post misturam decoquendum est. Hæc "igitur in affectionibus inflammationis iuxta arteriam eius q̄ summum cōmoda in principio sunt, donec inflammatio moderata fiat: & præ omnibus à vini potu hoc tempore abstinendū. Cum verò moderatior facta est inflammatio, vinum dulce theræum, aut scybelite bibere licet, aut ex nostra Asia caryinum, & deinde thérinum appellatum, deinde etiā dulce tmolite. Eo tempore etiā butyrum aptum est, & sorbitio ex amygdalis, sorbitio itē ex lacte & melle diutius coctis amylo iniecto: & si amyllum non adsit, siligine Romanis appellata iniecta. Manifestum est autem quod per huiusmodi victum

"ταχέως i. ci
to, est i impres
sis. ταχέως id
est perfecte, est
in manuſcrip
pto.

† Legitur in
antiquis κεί
νλον κείν, ὅτι
ὁ κρητικός, i.
et dulcia, qui
leſt creticū.

A. l. 3. f. 10. l. 1.
c. 6. fol. 258. b

A. l. 3. f. 10. l.
c. 3. fol. 263. a

A viſum, inflammatio tum pellicularum, tum mufculorū circa arteriam eius q̄; ſummum ſedatur. Relinquitur aut̄ humiditas multa, ob quā impoſſibile eſt clarā vocē proferri. Quare tranſire tunc conuenit ab his edulijs ad omnia ex melle cocta, & ad fabam friſam elixatam, & ptiſanā, ac braſſicam, & porrum probē coctum. Pharmacorum porro vſus idoneus eſt, quo tempore aut inflammatio, aut aſpritudo praualeſcunt, eorū, quæ ſub lingua detinentur, de quorum compoſitione dicam: poſt hæc magis exteſoria & reſiccantia damus: & deinde rurfus his iſtis adhuc magis exteſoria, & magis reſiccantia, vſquequo ad ea quæ aliquid acridinis habent perueniamus, ita vt ē in his à moderatioribus initio factio, ad vehementiora paulatim tranſeamus. Itaq; qualem formā eſſe conueniat viſus, antea dictum eſt, quemadmodum etiam ſimplicium pharmacorum ſpecies eſt relata. Cæterū cōpoſita ex iſtis pharmaca multiformiter alij iuxta aliam ſymmetriam & cōmenſurationem cōſcripſerunt. Et quibuſdā ſanē ex tribus aut quatuor ſimplicibus cōpoſitum pharmacum ſufficit: quidam verò in maiorem numerū extenderunt. Et quidam, velut dictum eſt, ex molliſſima & leniſſima materia arteriacas confectiones compoſuerunt: alij vice verſa ex acri, calida, extergente, ac multum reſiccante: ſunt & qui tertium genus medium inter ambo iſta fecerunt. Poſt hos verò alij mediij generis inter medium & molliſſimum, alij mediij generis inter medium & acerrimū: & iuxta eandem rurfus rationem, quidam magis, quidam minus, à medijs facultate pharmaciſ digreſſi, diuerſas cōpoſitiones fecerunt: Quibus omnibus ſolus iſ reſtē vtetur, qui ſingulorum ſimpliciū pharmacorū vires nouit: ipſe. n. ſciēt & ordinem pharmaci, & quanta diſtantia ſit à medijs digreſſum. Porro eiufmodi pharmaca ſcripſerunt etiam qui ante Mantian & Heraclidem, & qui poſt hos, vixerunt: verū multo præſtantiora à prædictis viris tradita ſunt per libros quos nobis reliquerunt, & in quibus medicamentariam artū partem auxerunt, partim iſi cōponentes, partim ab alijs cōpoſita tranſcribentes. Progreſſu verò temporis tum hæc, tum etiam priora, exacta & longa experientia cognita, à viris electa & coaceruata ſunt, quorum iam ſæpe in hoc opere mentionem fecimus: ſunt autē hi, Aſclepiades, Muſa, Andromachus, Heras, Crito, & Menecrates: quin & multa alia pharmaca Archigenes & Philippus ſcripſerūt: Vt nullo amplius ex veteribus opus habeamus: hi. n. oia ab antiquioribus inuenta optimē, velut dixi, tradiderunt.

De Arteriaca ab Andromacho deſcriptis.

CAP. 2.

Purimas arteriacas confectiones ſcripſit Andromachus, vt promptum ſit à debiliſſimis ad fortiſſima paulatim per media tranſitu factio progredi, ſi quis iſſorum differentiam nouit: ipſe. n. Andromachus indiſcriminatius iſſas prodidit. Verū ego diſcrimina apponā, in memoriam reuocatis iſs quæ paulo antē dixi. Quod enim circa ſimplicium pharmacorum tractatū præ exercitatum eſſe oporteat eum, qui dicenda allequi velit, ſæpe à me dictum eſt: citra enim ſingulorum ſimplicium exactam ac certam cognitionem impoſſibile eſt cognoscere, ex quo ordine eiufdem generis medicamentorū cōpoſitum ſit, num ex molliſſimo, an vehementiſſimo, aut medio, aut alio aliquo inter hunc & alios intermedio.

Primam itaq; Arteriacam confectionem non longē à principio libri, in quo affectionum corporis internarum curationē tradit, hoc modo in hæc verba ſcripſit. **Arteriaca, qua vitor.** Thuris drachmam j, alij iij: myrrhæ 3 j, alij iij: croci 3 j, alij iij: ſcyllæ 3 ij, paſſi cretici ſextar. iij. Scylla in paſſo coquitur donec paſſum ſpilletur, deinde ſcylla abiecta, reliqua inſpergunt. Hoc pharmacū ſi ſcyllam nō reciperet, inter exactē molliſſima numerandū eſſet, vtpote in tres paſſi cretici ſextarios, pauciſſimo thure, ac myrrha, & croco coniectis, vt parū abſit quo minus torū paſſum creticū exiſtat. Manifeſtū eſt aut̄ q̄ pharmacum hoc, eclecton hoc eſt delingibile, efficitur: vocant autem huiusmodi etiam ſub ſceminino genere eclectas, hoc eſt delingibiles, confectiones.

Conſequenter ad præſcriptā Alteram addidit Andromachus hoc modo. **Artheriace Decoction i. ex capitibus papaueris.** Capita papaueris viridia mille & ducēta, mellis attici lib. quatuor: croci cilicij 3 v, alij x: ſucci hypociftidis 3 x, acaciæ 3 x, aquam pluuiam ad capita papaueris. Aqua qui dem pluuiā addit, quod minus putredini obnoxium ſit pharmacū: habet aut̄ & adſtringens qui piam in ſe hæc aqua. Scopuſ eſt p̄dicto pharmaco cōcoquere affectionē circa arteriā, ¶ quod ſanē cōtinget, ¶ per ſomnū, & cōcoctoria cū adſtringēdi vi non adeo multa. Cæterū ſimplex pharmacū ex papaueris capitibus vt ego facere cōſueui, ſola capita habet in aquā coniecta: atq; vbi flaccida reddita fuerint, iſſa quidē proijcimus, aquā verò iſſorū ad ſolum mel atticū admicemus, vſq; ad cōpagem delingibilis pharmaci facta coctura, quomodo ſanē ego apparare cōſueui. Quātam aut̄ copiā aquæ item q̄ mellis miſcere oporteat in huiusmodi pharmacorum præparatione, in ſequentibus dicā eo loco, ¶ quo talia verba ſcripturus ſum: ¶ Confectio ex capitibus papaueris.

Tertiam deinceps confectionem arteriacam Andromachus hanc prodidit. **Arteriace, qua vitor.** Blaſti ad Tabefcentes valde bona. Nardi celticæ 3 iij, amomi 3 viij, cinnamomi 3 x, malabathri 3 iij, nardi indicæ 3 iij, floris iunci rotundi odorati 3 ij, calic 3 viij, thuris 3 iij, myrrhæ 3 j, coſti 3 iij, ſæcis vnguenti malabathrini 3 vj, ſucci glycyrrhizæ 3 iij, ſucci mādragoræ 3 v, maſtiches chiæ 3 iij, croci 3 vj. Palmulas in vino mulſo aut protropo coquito: deinde in iſſum decoctum nuceſ pineas xx cōj cito ac terito. Poſtea ex pharmaco ad nucis ponticæ magnitudinem, aut paulo minus, accipito: & ad aliquot dieſ cum hoc decocto vitor: deinde etiam ſimplici pharmaco vtariſ. Poſtea autem ad

Quinta Claſſis.

ZZZZZ ij duos

* Aliter v.

† Alquecumq; calit.

† vbi in codi. impreſſis græcis legitur ἐρ-θὴ γὰρ τῶν ἰσχυρῶν τοῦ αὐτοῦ, Ἀντι-κὴν ἔχει ἐν-θὴ τῶν ἀ-ντι-τοῦ αὐτοῦ τῶν, i. quo præ-ſcriptione ſen-ſitulum faci-ent.

D E C O M P O S . P H A R M A C .

duos vel tres dies hiera ex aloë vteris, cochlearij mensura ex aqua in diem data. Vtere pharmaco E etiam cum lacte in ijs, qui arteria affecti sunt, ad gargarissandum: & rursus facto interstitio vtere pharmaco fabę ægyptiæ magnitudine. Cum verò fortis fuerit fluxio, opium & castorium in antidotum miscemus, vtriusq; parum quid: In his autem qui stomacho malè affecti sunt, ea ipsa vitamus. Manifestum igitur ex ipsis verbis quæ scripsit Andromachus, quod in fluxionibus partiũ thoracis, & pulmonis, ac arteriæ, præscripta confectio confusæ est facultatis. Dixit enim ipse, cum fortis fuerit fluxio, opium & castorium in antidotum miscemus, vtriusq; modicam partem, rescicare nimirum fluxionem & sanam reddere volentes. Varium autem est pharmacum, & ex multo rum mistura constans, vt ad omnes conueniat affectiones, quæ etiã diuturnæ & malignæ existunt ac ægrè curabiles, etiam si vlcus sit circa arteriam aut eius summam extremitatem, laryngem Græcis dictam, & multo magis si iuxta pulmonem. Talia enim fortibus adeo opus habet pharmacis, quò ad longius tempus sufficere queant tabidam affectionem habentes. Cum enim obrigerit eis regio sicca, & in conuenientis victus ac pharmacorum vsu perseuerarint, quã diutissime renitentur consuetas actiones moderatè obeuntes. Hanc igitur confectioem non censuerim admiscendam esse ijs quæ priuatim Arteriæ appellatur.

Quartam deinceps cõfectionẽ Andromachus sic scripsit. ¶ *Altera eiusdem.* Blasti videlicet di F cit, de quo circa præcedentẽ arteriã scriptũ est, Arteriaca Blasti qua vtor. Cõpositionẽ autẽ eius talẽ facit. Aloes sextantẽ, croci 3 j, mastiches 3 j. Palã est hoc pharmacũ ex eorum numero esse, quæ priuatim stercorũ eductiua appellantur, vnã cum hoc, q̃ concoctorium quiddã habet crocus. At verò cum concoctorium dico, intelligere oportet eius affectionis, cuius gratia exhibetur.

Quintam ex ordine cõpositionem Andromachus talem prodidit. ¶ *Confectio sedans Dolorẽ, eiusdem.* Opij quadrantem, croci 3 j, myrrhæ sextantem, acaciæ vnciã dimidium, succi radiceis dulcis 3 iij: excipe melle. Hæc Andromachus. Verum ego non auidẽ recipio eiusmodi cõpositionẽ pharmacorũ, vbi non ostenditur affectio, in qua ea sit vtendũ. Scimus etenim componendi sedantia dolorum scopum, cum somnum videlicet inducere voluerimus, & vehementem dolo rem stupefacere. Acaciæ autẽ mistura velut ad vlcus est, quemadmodum radiceis dulcis succus ad lenienda exasperata. Crocum autem & myrrham in cõpositiones dolorem leuantes miscere plurimis placuit: videntur enim ipsis omnes affectiones sufficienter concoquere posse.

* Aliter ii.

Sextam consequenter cõfectionem Andromachus hoc modo scripsit. ¶ *Arteriace eiusdem.* Thuris vnc. j, succi radiceis dulcis vnc. j, myrrhæ 3 iij, tragacanthæ 3 vj, nardi drach. vnã, amomi 3 iij, croci 3 iij: mellis attici quod satis est. Non obscurum est etiam hanc ad respirationis organo G rum affectiones cõpositam esse ex concoctorijs, mitigatorijs, adstringentibus, & extergentibus. Myrrha enim, & thus, & crocus, affectiones concoquunt. Radiceis dulcis succus exasperata mitigat: idem etiam tragacantha facit. Amomum fortiter rescicat cum modica adstringendi facultate. Mel autem calfactoriam & extensoriam vim habet.

Septimam post relatas cõpositiones Andromachus scripsit ex multis valdè medicamentis cõstantem, quæ omnes ferme facultates habent: nam & adstringentia, & mordentia, & attenuantia, & mitigantia, & læuigantia in ea continentur: quin & soporifera vis, & discussoria, ac extensoria in ipsa habentur. In quibus omnibus multifariam mistis facultatibus communis ratio est, quẽadmodum et antea dixi, q̃ videlicet quispiam ex omnibus pharmacum quoddam cõponere voluit, spe faciendi vnũ medicamentũ ad omnes eiusdem generis affectiones cõmodum. Verum ex ipsis aliqua quidem per experientiam cognita sunt maligna, & propterea relicta: aliqua verò feliciter pro ipsius componentis coniectura, efficacia euaserunt, & ob id recepta. Quin & præparandi ipsam modũ Andromachus adscripsit, quãquã hoc facere aliàs non soleat. Quòd verò ex pharmacis cõposita sit eas, quas dixi, facultates complectentibus, præstat meminisse eos qui hos libros in manus fument: si tñ non promptam habeant memoriam, eo sanè tẽpore quo huiusmodi phar- H maca discunt, sextum & septimum ac octauum de simplicium pharmacorum facultate librum legant: in illis enim omnem pharmacorum materiam conscripsi, qua radices, & folia, & flores, & semina, & fructus, & liquores, & succi omnium ex terra nascentium plantarum existunt. His itaq; præmissis iam animũ ad ea quæ Andromachus de hoc medicamento scripsit aduerte. ¶ *Arteriaca, qua vtor.* Radiceis filicis crassissimæ lauantur donec purissimæ fiant, & omne terreum deponant: deinde per diem vnum perfrigerantur, & in frustra magnitudinis trium digitorum secta conquassantur: atque ex eis libræ x in ollam emerco luto oblitam, aquæ dulcis sextarios decem cõplectentem, iniiciuntur, & ad dimidias, hoc est vt sextarij v reliqui fiant, coquuntur: exprimuntur, & liquor quidem in duplum vas diffunditur, & aromata crassa ac integris partibus adduntur: Nardi indicæ 3 iij, cinnamomi 3 vj, radiceis dulcis 3 vj, calicis 3 iij, rhei pontici 3 iij, balauitij drac. vj: rosarum siccarum drach. iij, aliij vj. Hæc similiter ad dimidias coquuntur, ac exprimuntur: & ad decoctum, mellis attici sextarius vnus additur: sit autem mel præcoctum, & in duplici vase priuatim spissatum, vsquequo manus non inquinat: adiiciuntur & terebinthinæ pellucidæ drach. tres, chalbani drach. ij, croci drach. v, succi hyoscyami drach. j, succi hypocistidis drach. j, mandragoræ succi oboli iij, pipæris albi drach. octo.

* Aliter vna.

Octauam

A Octauam deinceps confectionem scripsit, summa facultatis ipsius indicata, quod ipsum in omnibus fecisse oportuit. Habet autem sic. *¶ Arteriacae laudata Mithridatis ad Thoracis affectiones, Subpurgat & leuigat.* Irionis torrefacti 3 xx: in quibusdam exemplaribus fabae fressae scriptum est: sunt aut ambo exterforiae potentiae. Seminis lini tostii 3 xx: & hoc exterforiam vim habet. Nucis pineae 3 xx: hae laeuigandi vim habent. Vuæ palae exacinatae 3 iij: & hae ob id q̄ modicè subadstringat, simul q̄ commodus corpori cibis sit, meritò admista est: habet autem & passi facultatem, qualem in quarto de simplicium pharmacorum viribus indicauimus. Croci obol. ij: minimū quid ex croco coniecit, qui pharmacum composuit, vt propè nihil sit aliorum proportione: diximus de croco eum concoquendi vim habere vnā cum adstrictione: dictum est etiam q̄ adstrictio corpora cogit, cōstringit, & corroborat. Adiecit aut̄ et mellis heminas iij } a vino dulci ac supra digressus: vult enim hoc modo præparatum pharmacum velut præfatus est, in pectore hærentes collectiones depurgare: cæterum in huiusmodi pharmacis ea, quæ crassos succos habent, impediunt repurgationem. His admiscuit tragacanthā 3 iij: quod pharmacum laeuigat exasperata: prædictum est autem quod vult hoc propositum medicamentum repurgare, & laeuigare ea quæ iuxta thoracem hærent: scopus enim huiusmodi est, attenuare, & abstergere, ac ad educationem supernè aptas face

B re collectiones in thorace: verū sedandi doloris gratia, & ne nimium tussiant partes exasperatæ, laeuigantia apponuntur. Maximum hoc est, atq̄ ipsius per omnia meminisse oportet, Nimirum quod saepe vnus scopus sit, in quem pharmacum componitur: ne verò hoc ipsum aliquo modo offendat, vtraq̄ miscetur primum vtilitatis scopum nequaquam habentia.

† Cod. rō im-
probi rōi na
bona, iij. etiam
partem huius-
modi.

Nonam arteriacen post has Andromachus his verbis tradidit. *¶ Arteriacae Marini.* Croci 3 j, gummi sextantem, tragacanthā 3 j, mellis attici sextarium j: coquito donec cum diffunditur non inquinet. Hoc pharmacum medium est facultate: esset q̄ exactè mitigatorium ac dolorem sedās, si neq̄ crocum haberet, neq̄ mellis sextarium, sed pro ipso theracum vinum creticum: aut sapam ex musto cocto factam, quam nos Asiani, vt dixi, hepsēma appellamus. Verū hoc loco importunè inter relata fortia pharmaca locatū est, vtpote quæ suppuratis & tabescentibus conueniunt.

Decimam consequenter recenset, quæ inter exactè laeuissimam ac mediā, qualem sanè esse dixi præcedentem, intermedia est. Ex gummi igitur hanc, & passio cretico, ac aqua componit, melle et̄ admisto: & gummi quidem inijcit bellēm, passi sextarium vnum, mellis libram vnā, dissoluere cū aqua iubens ipsum gummi, copia eius non expressa. Itaq̄ ob gummi, & passum, & aquam, penitus nihil exterforiū habet: ob mel verò, à leuissimo & laeuigatē est digressa: scimus enim exterforiū esse mel. Coqui aut̄ super prunas oportere ipsum dixit, hoc est ad mollem & non fumantem ignē. Melius verò fecisset, si et̄ ad alias omnes hoc adscripsisset. Ego itaq̄ sic ipsum præparo, & ne que ad prunas adhuc ardentes cocturam facio, ne videlicet inde quid acre & fumosum sublatum, acrimoniā non necessariā medicamento ipsi affricet. Mellis equidē acedinē toleramus, quanq̄ ea non sit vehemens, propter aliam ipsius vtilitatem, verū fumi nulla est vtilitas. Quare fugiendus est fumus, in quantum possibile est, circa omnium huiusmodi pharmacorum preparationem. Prestat autem & in ijs quæ meatus obducunt, lignis fumum non edentibus vti.

Vndecimam confectionem sic prodidit. *¶ Arteriacae alia bona.* Cinnamomi, thuris vtriusq̄ vnc. j, fucci radice dulcis vnc. j, myrrhæ 3 iij, tragacanthæ drach. sex, nardi indicæ 3 iij, amomi 3 iij, croci 3 j: melle attico excipe. Recte dixit bonam hanc arteriacā esse, verū deest sermoni, ad quas affectiones bona sit: dictum enim in principio est & per vociferationem, & per distillationem lædi arteriam, amplius q̄ propter vlcus & inflammationem obduratam. Hæc autem confectio quā nunc Andromachus descripsit, etiam ad tabidos aptum pharmacum est, & simpliciter omnes inueteratas thoracis ac pulmonis affectiones. Cinnamomi etenim natura tenuium partiū & reliccatoria et̄ induratas affectiones sanare potest. Ab eo proximum locū amomi facultas habet, simul q̄ adstringens quippiam habet. Verū ob horū actionem vehementem rōnabiliter admista sunt, thus, & radice dulcis succus, & tragacanthā, pharmaca exasperata lenire à natura apta. De croco & myrrha sepe diximus, esse videlicet concoctoria & modicè reliccatoria huiusmodi affectionum.

* Aliter iij.

Duodecimam arteriacā Andromachus hoc modo scripsit. *¶ Alia ex libris.* Galli ad Arteriam affectam, Vlcera pulmonis, Puris et Sanguinis reiectiones, & Fluxiones in thoracem, & ad Ea quæ egre cūci possunt, vehementer efficax. Resinæ terebinthinæ 3 iij, croci ciliç 3 iij, thuris 3 iij, myrrhæ troglodyti- cæ 3 iij, cinnamomi 3 iij, amomi 3 iij, nucis pineæ 3 iij, radice dulcis eiecta medulla 3 iij, nardi syriacæ 3 ij & dimidiam, calicæ nigræ 3 ij, tragacanthæ 3 iij, palmularum syriacarum carnis 3 iij, asteris samij 3 iij, chalbani puri obol. iij: costi 3 iij, alij 3 j: mellis attici heminas iij. Mel & resina in duplo vase coquuntur, atq̄ vbi spissari cœperint chalbanum miscetur, donec non inquinent: deinde refrigeratis reliqua trita admisce, & sic vtere. Recte fecit in hoc pharmaco, tum quod ad quas affectiones conueniat, tum quod quomodo præparare ipsum oporteat, adscripsit. Ratio autem compositionis ex superioribus constat.

* Al. corceq.

Decimam tertiam arteriacen Andromachus his verbis tradidit. *¶ Arteriacae Galli, eadem etiam antidotus est ad eadem efficax.* Nardi syriacæ 3 iij, myrrhæ 3 iij, croci 3 quatuor: costi 3 iij, alij drach- mam vnā: piperis albi grana xxx, radice dulcis drachmam vnā, nuces pineas centum, styra-

* Aliter ii.

Quinta Classis.

ZZZZZ iij cis

DE COMPOS. PHARMAC.

cis drach. j. tragacanthæ 3 j. cinnamomi drach. vnam, amomi 3 j. thuris 3 j. obol. iij, casia fistulæ 3 j. E balaustij drach. tres obol. iij: mellis attici aut passi cretici heminas duas. Passum in duplo vasculo coquitur ad spissitudinem mellis, atque ita ad arida trita affunditur: tragacantha autem & styrax per diem antea in sufficiente protropo macerantur, & ita ad reliqua admiscuntur: reponitur pyxi de argentea aut vitrea. Rectè fecit & hic quod tum ea quæ promittit hoc pharmacum, tum quomodo præparatur, adscripsit. Ego verò propterea omnes ab ipso descriptas arteriacas apposui, ne quis alium scriptorem requirere cogatur: omne enim facultatum genus in iplis continetur, mollium, fortium, ac mediorum.

Decimaquarta arteriaca eius est, de qua sic prodit. *Arteriaca ex libris Aphrodæ, Moschionis. Est eius facultas non modice medias transgressa ad sortes. Habet vim Secandi & Attenuandi ac Calfaciendi ex multis pharmacis, quibus etiam lenta quedam admista sunt ob eam quam dixi causam. Compolitio eius hæc est: Rubricæ lemnia, thuris, myrrhæ, nardi, amomi, casia rufæ, croci, iridis illyricæ, floris iunci odorati, singulorum 3 ij: cinnamomi 3 iij, resinæ terebinthinæ 3 iij, floris rosarum 3 iij, opobalsami 3 ij, mellis heminam vnam, aut passi cretici heminæ dimidium amplius q̄ quartam eius partem: liquore & resinam donec fulua reddantur coquito, deinde ab igne ablatis reliqua addito ac conquassato. Datur in thoracis & arteriæ affectionibus fabæ græcæ magnitudine, cū aqua, quarta hemine par- te: reliquis forma eclegmatis delingendum.*

Decimaquintam arteriacam sic scripsit. *Arteriace ad Gutturis siue Arteriæ aspritudinem, Vocem interceptam, & Sanguinem reiectantes, quæ auctor. Ex libris Apolloniæ & Alcimionis. Tragacanthæ drach. †vj, gūmi 3 vj, thuris 3 j. obol. vnum, myrrhæ 3 j. obol. ij, croci 3 j. obol. ij, succi radices dulcis 3 j. obol. iij, aut radices sesquidrac. piperis albi grana xxv: palmularū pinguium carnis 3 iij, alij palmulas v aut tres habent. Tragacanthā passō maceratā ac tritā reliquis aridis tritis committe, ex eis q̄ omnibus catapotia fabæ magnitudine effice, sub lingua q̄ tenenda exhibe. Huiusmodi confectiones hypoglottidas medici, ab eo quod sub linguā dantur, appellant: iubet q̄ id, quod à dissoluto phar- maco defluit, sensim in asperæ arteriæ summum excipere, obnitendo simul ne tussis excitetur.*

Decimasexta ex ordine sic scripta est. *Arteriace delingibilis ad omnes Internas affectiones, maxime Tabescentes & Suppuratos, ad Hydrops incipientes, Tussis Veteres. Datur per diem & noctem, cochlearij mensura. Succi scyllæ sextarios iij, passi cretici sextarios iij, vini falerni sextar. viij, mellis attici sextar. iij, myrrhæ trientem, croci sextantem, thuris sextantem, aristolochiæ dactylitidis minam vnam & dimidiam, glycyrrhizæ minam vnam, radices eryngij sextantem, casia vnc. j, nardi celticæ †vnc. j, xylobalsami bēlsem. Aristolochiam, eryngium, glycyrrhizā, xylobalsamum, casia, nardum, in cras- sas partes confusa in vini sextariis viij macerato ad triduum: deinde ad lentum ignem ad tertias coquito, atq̄ ita exprimito: & recrementis abiectis passum, mel, & scyllæ succum committito, & ad mellis crassitudinem coquito. Crocum verò, thus, & myrrham cum vino terito: atq̄ vbi optime habuerit pharmacū, addito: & vbi modicè fuerint liquata ab igne tollito, & repolitis vtitor. Rectè facit & hic Andromachus q̄ quæ promittit, & quomodo præparetur, adscripsit.*

Decimaseptima confectio talis ab eo traditur. *Arteriaca alia vt Heraclides Tarentinus. Succi scyllæ sextarios iij, passi cretici sextar. iij, mellis attici heminam vnam: croci trientem, alij sextantē: myrrhæ quadrantem, tragacanthæ vnc. j, succi radices dulcis sextantem, thuris vnc. j, opobalsami sexuncem: vtere præparato. Iuxta hanc confectionem neq̄ quæ promittat, neq̄ quomodo præparetur, tradidit, tanquam iam ante sententiam ipsius legentes intelligere queant. Ex eo enim quod dicit: Alia Arteriaca, similia præscripta ipsam promittere, nos intelligere conuenit. Preparatio- nem autem ex antea relatis computare oportet.*

Decima octaua confectio sic tradita est. *Arteriaca ex libris Perigenis, ad omnes Arteriæ affectus. Cruci 3 j, vna passæ, exacinata 3 †j, amygdalarum 3 viij, myrrhæ obol. iij, tragacanthæ 3 iij, piperis albi obol. iij, mel coctum. Vna passa torretur, amygdalæ excorticantur: tragacantha in aqua maceratur per diem vnum, & teritur, ac reliquis admiscetur. Et hic rectè ab eo factum eo, q̄ tū pro- missionem, tum compositionem eius adiecit. Cæterum mediæ facultatis pharmacum existit, qua re ad omnes affectus ipsum commodum esse ait: est enim mediorum pharmacorum natura talis. Vnde etiam iplis mediis affectionibus propriè & primariò cōuenit: iis verò qui mollibus aut for- tibus opus habent, neq̄ emolumentum neq̄ detrimentum magnum affert.*

Vltimam omnium arteriacam hoc modo descripsit. Vini mulsi veteris sextarios iij ad vnū de- coquito: deinde nucum pinearum tostiarum heminam adiecit, piperis albi sextantem: ac vtitor. Esset sanè hoc pharmacum ex mollissimis, si non piper accessisset: hoc verò addito, ad mediam fa- cultatem peruenit: propterea etiam eiusdem generis cum præscripto esse ratus subscripsit.

Arteriace à Critone conscriptæ Quatuor numero.

Ex arteriacis à Critone conscriptis quatuor pduxisse suffecerit. De prima scribit in hæc verba.

Ad Vocem interceptam ob contentionem. Ficum & eryngium probè coquito, & ad decoctū gū- mi misceto, vt melle durior confectio fiat: dato ad noctem. Facit & ammoniacum. Ob id sanè pharmaci huius mentionem feci, quod in principio apta est hæc præscripta confectio, si per eryn- gium præparetur: ammoniacum autem inueteratis commodum, forte enim pharmacum existit.

Non

† Aliter iij.

* Aliter ii.

* Aliter 3 5. & aliter 3 ii.

† Al. sextantē.

* Al. sextantē.

* Aliter vnc. i.

† Aliter iij.

A Non rectè igitur Crito fecit, q̄ cum moderato fortissimum pharmacū indiscriminatim tradidit: si enim ab v̄si duri immutaueris, non solum nihil iuueris, sed etiam lædes hominem. Alteram arteriacam scripsit Crito mediam facultate, concoctoriam & lenem his verbis. *¶ Alia faciens maxime ad Phonscos, & Asperam arteriam, & Tussis iritationes, Dolorem aurium, Vlcera in auribus, ac pudendo. Concoquit etiam Destillationes.* Thuris oboli.iiij, myrrhæ 3 ij, passi cyathos iij: passum ad mellis spissitudinem decoquito, deinde myrrham & thus trita cum passo senicocto ablato adijcito. Facit ē ad dysentericos, coeliacos. Quidam croci etiam drachmam addunt, & fit auribus commoda, atque oculis inflammatis. Hæc Crito perspicuè & probè scripsit: neq̄ opus est me eiusmodi pharmacorum expositionem apponere, vt qui sæpe iam de his dixerim. Porro alias duas prædictæ quidē similes, verū moderatiori facultate & simplicissimas sic scripsit. *¶ Eclegma Faustianum appellatur.* Vini falerni sextarium j, mellis attici lib. j: in duplici vase coquito, rutæ ramulo agitando. Alterum pharmacum tale est. *¶ Eclegma ex vino scybelite quo v̄timur.* Vini scybelitis sextarium j, gūmi quadrantem, mellis dodrantem: coquito in duplici vasculo, gūmi prius macero ac dissoluto. Hoc solum loco apposuit in duplici vasculo, hoc est diplomate, cocturā fieri debere. Rectissime autem fecerit, qui omnes arteriacas quæ mitigatoriam, concoctoriam, & lenitoriam vini habere **B** prædicantur, in duplo vase coxerit, quod Diploma Græcis vocatur, quomodo sanè vnguentarij vnguenta præparant: nimirum calidam aquam in magnum quendam lebetem infundentes: ac postea vasculum, quod pharmacum coquendum in se habet, imponentes: & sic præstas prunas, aut ligna fumum non ædentia succedentes.

Confectio Diacodyon id est ex capitibus papaueris, iuxta Veterum traditionem.

Quin & circa huius compositionem veteribus indiscreta discordia fuit. Quidam enim ex ipsis ad capita papaueris cxx, aquæ sextarios xx infundendos censent, vt qualibet sextarij mensuræ sex papaueris capita recipiat. Quidam verò in lxxx sextarios octingenta papaueris capita iniiciunt, vt singuli sextarij capita x accipiant. Quidam ita temperauerunt, vt sextario vni viij capita tribuerentur. Quidam autem haud scio qua ratione, in aquæ sextarios tres, capita papaueris lxxx coniiciunt. Alij capita cxx in eisdem tres sextarios addunt: verum mihi videtur valde pauca aqua esse, ad tantam copiam capitum.

Confectio ex Capitibus papaueris, Andromachi.

Andromachus igitur, velut supra in arteriacis præscriptum est, alteram ex ipsis præparans sic scripsit: Capita papaueris viridia mille ducenta, deinde ad finem: Aquam pluuiam. non apprehens aquæ quantitatem.

Confectio ex Capitibus papaueris, Critonis,

Crito verò sic. *Confectio ex Capitibus papaueris simplex.* Capita papaueris agrestis octingenta, aque sextarios lxxx: coquito ad tertias, atq̄ expressis addito mellis lib. x. Si verò variā efficere velis, adde croci, myrrhæ, succi hypocistidis, lingulorum 3 xij: thuris 3 vi, acaciæ 3 xij. Rectè videtur mihi ad singulos sextarios capita x coniungere: ita enim contingit, cum scribat ipse, capita octingenta in aquæ sextarios lxxx indendos esse. Et ego sanè hoc modo preparo non apponens, neq̄ crocum, neq̄ myrrham, neq̄ aliud quicquam: optima est enim simplicissima.

Confectio ex Capitibus papaueris, Heræ.

At verò Heras ad capita cxx, aque pluuiæ sextarios iij infundit, modicam omnino quantitatem: tamen si in quibusdam exemplaribus non numerus capitum papaueris cxx scriptus sit, sed pondus totidem drachmarum. Adscribam autem totam ipsius dictionem sic habentem. Capita papaueris viridia cxx in vas coni cito: & affuls aquæ pluuiæ sextarijs tribus, ad triduum madescere sinito, deinde ad tertias coquito: & ablata ab igne exprimito ac colato, admisto q̄ mellis sextario in duplici vase coquito: atq̄ vbi spissari coeperit, acaciæ rusæ 3 j, succi hypocistidis 3 j, adijcito. Ceterū **D** cum ipsa capita coxeris in aqua, croci 3 j linteolo illigatam simul coqui permittito. Quidā etiam myrrhæ 3 j addunt, ipsa q̄ cum modico passo terunt, atq̄ ita indunt: ac simul coquunt, donec aliquantulum fuerit confectio inspissata. Quod si tamen non medicamentariam confectioem facere velis, cum capitum decocto ad tertias redacto mel coques, reliquis non adiectis.

Confectio ex Capitibus papaueris, Damocratis.

Hoc pharmacum primum à Themisone preparatum est, inquit Damocrates in libro, Damocratis Philiatrus, { hoc est rerum medicarum studiosus, } inscripto. Scimus autem ex verbis eū constare. Aiunt Themisonem hoc pharmacum primum præparasse ad tusses humidas, dolorem arteriæ, & gulæ, species fluxionum simpliciter omnium quæ circa thoracem consistunt, & ad vigiliis, quarum sanè illæ existunt causæ.

Papaueris quod nominant ipsi agricolæ
Agrestis (nam spontaneum est, nec conferitur)
Capita virentia & recentia, integra,
Semen rubens non dum nigrum gerentia,
Centena bis q̄ dena magnitudinis
Mediocris, in nouam ollulam ore amplo indito.

Quinta Classis.

ZZZZZ iij Infunde

Infunde tres pluuiā de aqua sextarios:
 Macerato in his totam diem noctem simul:
 Dein coquito lento igne, ac diutiusculè, &
 Omnem liquorem expressum in ollulam excipe,
 Et mellis atticī libras tres addito.
 Decoquito rursus leniorem ad flammulam,
 Dum non liquentis mellis instar duruerit.
 Mox frige facta in vitreum vas condito.
 Sic nos quidem. At Themison prior qui prodidit
 Vsum, addidit myrrham, acaciam, & rubens crocum, &
 Hypocistidis succum. At ea obsoleta iam,
 Simplex enim parata commodissima est,
 Iucunda valde, lenis atq; viribus.
 Ex hac datur mystri minutī quantitas,
 Aliquando plus sub noctem, & ad diem minus,
 Vt hanc in ore quis breui sic detineat,
 Iussus liquentem sensim ita vt post deuoret.
 Quod si voles aluum morandi gratia, &
 Siftatur vt pulmonis & stomachi fluor,
 Eruptioq; sanguinis septum supra,
 Facere, eupatoricæ aut tu potius hinc ponticæ
 Addes rhois succi simul drachmas duas,
 Tantundem & acaciæ bonæ, non veteris:
 Auferre iam volens ab igne pharmacum,
 Diluta passo ambo hæc simul confundito,
 Paulatim adhuc in ollula feruentibus,
 Quò ferueant parum simul: mox vasculo
 Refrigerata indantur inde vitreo.

Confectio ex Capitibus papaueris, Sorani.

Sorani porro ita præparandam censet. Capitum papaueris numero cl, aquæ sextar. xx, in lebetem nouum cōiecta ad dimidias coquito: & reiectis capitibus mellis sextar. j addito: postea vero myrrhæ, croci, hypocistidis, & acaciæ succi, singulorum drach. j obolos tres, linteolo illigato: & in ollam siue lebetem suspendito, quò simul cum melle coquantur: postq; verò crassescere inceperit, fasciculum colligatum tollito, & in mortarium coniectum cum passi cyathis iij terito: indeq; in lebetem coniectum, lentè simul donec spissetur coquito. Verum mitior est confectio quæ ex solo melle & capitum papaueris cremore constat. Efficacior autem redditur, si in fasciculum linteoli pro adstringentibus melilotum & radicem dulcem addideris.

Confectio ex Capitibus papaueris, Galeni.

Ceterum velut ego compono confectiōem ex papaueris capitibus, ita ea vtendum censeo. Etenim cum de prædictis confectiōibus experimentum sumpserim, præstātor ea visa est, in qua ad vnum aquæ sextarium capita decem iniiciuntur, quæadmodū Crito scripsit: aut ad duos sextarios quindecim capita, velut Soranus: in medio autem horū amborum terminorum est, vbi octo aut nouem capita in vnum sextarium conijciamus. Præmacero autem ea non ad triduum, velut Heras, sed neq; statim ablatas coquo, sed si quidem humidiora & molliora fuerint, ad vnum diē. Accipienda est aut in omnibus huiusmodi sermonibus etiā nox: quemadmodum etiā annum dierum ccclxv esse solemus dicere. Si verò duriora & sicciora sint, etiā longiori tempore ipsa macerent: præstat autem accipere nondum indurata. Manifestum verò qd etiā valde mollia abijcienda sint: sicciora enim exiguum succum habent: humectiora verò crassum quidem, sed crudū adhuc & aquosum ac debilem: quapropter ex humidis ac palustribus locis accepta fugienda sunt. At verò numerum quem dixi iniici oportere iuxta proportionem aquæ, de mediocribus intelligere oportet. Cum enim quædam maiora moderatis, quædam minora existant, quædam verò inter hæc media, quemadmodum vt plurimum esse solent, ex his prædictum numerum ad sextariū conijcere oportet. Terminus autem cocturæ sit non vt tertia, aut quarta, aut aliqua talis pars aquæ fiat reliqua, verum vbi primum in totum flaccida fuerint facta: succum enim ipsorum exprimere volumus, hoc verò sufficienter continget ipsis flaccidis factis: superuacuum igitur diutius coquere. Ceterum mellis dimidiam mensuram huic succo admiscendam censeo, & coquendam simul ad lentum ignem ad compagem atticī mellis. Verum in aqua pluuiā quidam capitum cocturam fecerunt, ne videlicet ipsa ad aliam putredinosam qualitatem transmutetur: tibi verò etiā fontana sufficiet, pluuiā non præsentē: satis est & ipsam mundam esse, & omnis misturæ exortem. Ob quam rem ea quæ per plumbeos canales deriuatur fugienda erit, limus enim quidam ex plumbo in ea continetur. Vnde etiā qui aquæ eiusmodi faciem combibunt, dysenterici euadunt.

A.l.3. f.10. r.3.
c.3. fol.265.2

*Aliter multū.

A De Vsu Confectionis ex Papaueris capitibus.

Vsus eius est in ijs qui somno opus habent, quibus etiam ex opio constantia sæpe exhibere cogimur. Opus habent maximè huiusmodi pharmacis ijs, quibus tenuis fluxus à capite ad asperam arteriam destillat, non permittens dormire ob consequentem tussim. In talibus ego etiam ex sapa pharmaci confectionem parare soleo. Dictum autem à me antea est sapam, id est hepsema, à nobis appellari mustum coctum, quod etiam siræum quidam medici vocant. Sufficiens coctura eius ad huiusmodi est, vbi capita papaueris ad medietatem aquæ fuerint decocta. Quin & per passum, aut theræum creticum, melius est quàm per mel cocturam fieri, vbi fluxus valde tenuis extiterit: scimus enim attenuantis facultatis mel esse: fugiendum igitur tunc, tenues enim fluxiones auget. Miscenda etiam huiusmodi pharmaco dum coquitur, radix dulcis, quo simul coquatur: vbi verò hæc non adlit, succus qui ex Creta apportatur. Si verò circa pulmonem consistat copia fluoris à capite delati, confectio ex melle melior est. Quemadmodum enim somno opus habentibus, ea quæ ex sapa constat: lic reiectione per sputum indigentibus, ea quæ ex melle sit, commodior exilit. Contrà vrgenti igitur renitendo, vbi in somnum vertitur æger, aut quod ex melle constat, aut quod citra hoc apparatus est, pharmacum exhibebis: aliquando etiam ambobus permistis, scopum habens ipsum vrgens, circa misturam, ex vitro amplius coniicere oporteat: appello autem vrgens id, quod maiori auxilio opus habet. Datur commodior mensura duorum cochleariorum satis magnorum copia. Augebis autem & minues hanc copiam ad magnitudinem corporis cui exhibiturus es, respiciens, item ad ætatem, & anni horam, ac regionem: in omnibus enim his, frigidioribus minimum dabis, calidioribus amplius. Quod verò etiam multitudinis ac qualitatibus ipsius destillationis respectu, aut plus aut minus dabis, manifestum exilit: commune enim hoc in omnibus auxilijs est. Suffecerant equidem præscriptæ arteriæ, verum apponere amplius mihi visum etiam eas, quæ Asclepiades in secundo Interiorum scripsit. Aliquæ enim ex eis penitus eadem sunt: quædam præscriptis valde vicine, vt & ex eo certitudo descriptio num confirmetur. Quin ultra hæc præparandi & vtendi modus, diligentius ab ipso Asclepiade traditus est.

Arteriæ ab Asclepiade conscriptæ in Secundo Interiorum, quæ Mnasoni inscribit. Antonij Muse, ad Vocem interceptam.

C Brassicæ viridis cauliculos depuratos manducandos præbe, & quod instar palearum exuccū est, expuere iube, succum verò deglutire. *Alia.* Brassicæ succum cum melle coctum delingendum exhibe: auxiliatur confestim. *Alia.* Succus eryngij in aqua cocti heminas duas excipito, & succi ficuum in aqua coctarum tantundem: his adde gummi subtilissimè dissoluti drach. viij: coquito diligenter ad arteriæ spissitudinē, & inde cubitum ituris ad cyathi mensurā delingendum præbe.

C *Alia Arteriæ Charixenus facit ad Sonum vocis fractum, Destillationes in arteriam, Vocem interceptam & raucosam, ad Interceptiones vocis ex distensione.* Croci drach. ij, succi cyrenaici drach. i, mellis attici cyath. vi: mel coquito, & vbi spissatum fuerit, reliquis admisceto: ac vtitor velut dictum est pilulis inde formatis, quæ sub lingua detineantur. *Alia.* Galbani drach. vi, piperis drach. i, nitri drach. j, mellis attici cyathos sex: galbanum & mel coquito, & densata reliquis vnito: vtitor vt dictum est.

C *Alia ad Exulceratam arteriam Charixenus. Facit Phonscus ante & post certamen data. Facit ad Oculorū dolores forinsecus imposita, lana ex ea madesacta. Facit & ad Internas affectiones linctū accepta.* Gummi, tragacanthæ, vtriusq; drach. sex: thuris, myrrhæ, vtriusq; drach. i, obolos tres: croci, hypocistidis succi, vtriusq; drach. vnam: passi scybelitæ aut theræi sextarios sex. Gummi, tragacantham, myrrham, thus vnā cum hypocistidis succo macerato affusa ipsis passi portione: atque vbi dissoluta fuerint, diligenter terito, & ad passum misceto, assidue que mouendo coquito. Crocum verò sacculo sturpa contexto *κροκοφάντιον* vocant, alij *κροκοφάντον* initis in sublimi contentis inditum, vnā cū **D**pharmaco coquito: deinde exemptum passo dilutum ac tritum ad pharmacum coniicito: & repositis vtitor. *Alia.* Succus radicis dulcis, tragacanthæ, vtriusq; iij: croci, myrrhæ, vtriusq; 3j: thuris, spicæ nardi, vtriusq; obolos tres: protropi sextarios tres: vtire. **C** *Alia Lysia ad Easdem affectiones.* Croci, myrrhæ, succi radicis dulcis, thuris, casie, singulorum drach. vnam: piperis grana xxiiij, passi cretici sextarios tres, mellis attici cyathos vi: vtire. **C** *Alia Charixenus.* Croci drach. iij, myrrhæ drach. vnam & dimidiam: thuris, succi glycyrrhizæ, vtriusq; drach. vnam: passi cretici sextarios tres. Facit ad sonum fractum, destillationes in arteriam, interceptam vocem, conillas inflamas, facit etiam ad phonscos ante & post certamen data. luvat perfrigeratos, facit ad recentem & veterem tussim, ad spuentes sanguinem, eundem q; sursum reiectantibus prodest, & coeliacis. Conducit item ad spiritus foetorem. **C** *Alia Hypoglossus, sub lingua tenenda, facit ad Arteriam exasperatam, & Vocem interceptam, item q; Reliquas affectiones.* Tragacanthæ, gummi thebaici, vtriusq; drach. tres: myrrhæ, thuris non secti, vtriusq; drach. vnam obolos tres: croci drach. vnam, succi glycyrrhizæ obolos tres, phœnicobalanorum trium carnem, passi protropi aut theræi quod satis est his excipiendis: decoquatur ad crassitudinem mellis. Datur fabæ ægyptiæ magnitudine sub lingua tenenda, & dissoluta transglutienda. **C** *Alia Hypoglossus Dioscoridæ.* Croci, myrrhæ, tragacanthæ, radicis dulcis succi, singulorum drach. j: nuces pineas repurgatas numero sexaginta, amygdalas

las mundatas totidem: excipe melle cocto. Datur nucis ponticæ magnitudine sub lingua tenēda. E

¶ *Alia Scribonij Largi Hypoglossis, facit ad Vocem interceptam.* { Croci, terebinthinæ, singulorum drach. octodecim: iridis illyricæ drach. sedecim, tragacanthæ drach. octo, piperis grana cccx: excipe melle cocto, & terebinthina simul cocta: vtere sub lingua nucis pōticæ magnitudine. } ¶ *Alia Scribonij Largi Hypoglossis, facit ad Vocem interceptam.* Glycyrrhizæ drach. octo, myrrhæ drach. vigin tiquatuor, terebinthinæ drach. trigintaduas, tragacanthæ drach. triginta octo. Arida singula per se tundito ac cribrato: resinam autem in pilam coniectam tundito, arida ad ipsam inspergendo: deinde ex vnitis omnibus pastillos formato fabæ ægyptiæ magnitudinis, quos in umbra liccato: atque vsus tempore vnum aut duos sub lingua tenendos dato, ac liquefcentes deuorandos. Oportet autem hoc pharmacum confestim in pastillos conformare. Quo tempore igitur pastillos cogis, eodem etiam tundes, reliccantur enim citò: & ob id pastillos ex eo formantem ad manum simul tundere oportet. ¶ *Alia Aromatica Mithridatis, facit ad Arteriæ affectiones, Pulmonis Vlcerationes, Spuēs sanguinem, Tabescentes, Suppuratos, & Peripneumonicos.* Croci drach. duas, & dimidiam: myrrhæ, resinæ terebinthinæ, vtriუსq; drach. ij: thuris sesquidrachmam: nardi, cinnamomi, calicæ, tragacanthæ, singulorum drach. vnam: mellis attici heminam i. Mel & resinam coquito, vt tractilia hant ac fibrola, & non inquinent in frigidam aquam instillata: dein cum aridis committito, ac probè con- F tundito, & reponito. Vtere nucis ponticæ magnitudine sub lingua detenta, vt prædictum est.

¶ *Alia Mithridatis.* Myrrhæ, croci, vtriუსque drach. quatuor: nardi indicæ, terebinthinæ, vtriუსque drach. duas: thuris, calicæ, cinnamomi, singulorum drach. vnam: passi cretici heminas tres. Passum & terebinthinam ad perfectam compagem coquito, & cum liccis committito: inde q; ad nucis ponticæ magnitudinem sub lingua tenendum dato. ¶ *Alia ex Filice Andromachi aromatica. Prodest Hæmoptoicis, Pleuriticis, Tabescentibus, Splenicis, Hepaticis, Ictericis. Facit & ad Affectiones circa Vterum & Vesicam.* Radices filicis q; crassissimæ lauantur diligenter, donec omne terreū ab eis decedat: deinde perfrigerantur ad diem vnam: & ex ipsiς libra ꝑ x, in frusta digitalis magnitudinis secantur, & conquassantur, ac in vas figulinum coniunguntur. Infunduntur deinde aquæ dulcis sextarij x, & ad ignem positæ coquuntur. Cum verò ad dimidias deuenerint per cocturam, eas tollimus, & in duplum vas vnguentarium excolamus. Et radices quidem expressas proiciamus: in aquam vero crasso modo contusa coniungimus, Balaustrij drach. vj: nardi indicæ, rosarum siccarum, vtriუსq; drach. iij: cinnamomi drach. ij, glycyrrhizæ drach. vi, calicæ drach. quatuor, rhu pontici drach. iij. Deinde rursus ad ignem admota coquimus: & vbi ad dimidias peruenerint, rursus in aliud paruum vas vnguentarium excolamus: & aridā quidem expressa reijcimus, ad aquam verò G mellis attici heminas quatuor addimus, probe q; mista & igni adhibita rursus coquimus: & cum instillata in frigidam non inquinari, his resinæ terebinthinæ drach. tres, chaibani non lignosi tantundem, admiscemus. Hac verò liquefacta ad subscripta deplemus: sunt autem hæc, Croci, succi hyoscyami, succi mandragoræ, piperis albi, succi hypocistidis, singulorum drachma vna. Omnia hæc tenuissimè trita, & cum primo filicis succo vnita habeto, vt strigmentitiam crassitudinem habeant. Postquam igitur inuicem permista ac probè conquassata fuerint, in vitreum aut argenteum vas reponimus. Datur ex pharmaco cochlearium. Maxime iuuat vocem interceptam.

¶ *Alia Panacea Mithridatis, ad Phonscos ante & post certamen. Facit & ad Glandularum inflammationes, Laxatas columellas. Facit ad Ginguas humore prægnantes, & Nomias in ore, & motos Dentes. Prodest Destillationibus, recenti ac Veteri Tussi, Hæmoptoicis, Empyricis, & Anaphoricis.* Vtor pharmaco hoc quandoq; puro, quandoq; passo dissoluto, aut vino scybelite, & aqua calida. Etenim ad tonsillarum inflammationes dissoluto pharmaco vtendum est: ad affectiones verò in profundo, puro. Compositio sic habet. Capita papaueris agrestis numero cl, filicis lotæ drach. iij: symphyti depurgati, corticis mandragoræ, rhu pontici, rosarum siccarum, iridis, chalcidoniæ, glycyrrhizæ ponticæ, balaustrij, singulorum trientem: cinnamomi drach. ij, nardi celticæ sesquidrachmam, aquæ pluuiæ sextarios xv. Prædicta in crassas partes contusa in vase duplici vnguentario ad triduum macerantur: sequenti deinde die ad tertias coquuntur: & postea in quallū coniecta exprimimus ab ipsiς in aliud vas vnguentarium liquorem: & res decoctas abijcimus quidem, verum de expresso liquore quantum sufficit accipientes, subscriptas res in ipso dissoluimus: sunt autem hæc, Gummi, tragacanthæ albæ, vtriუსque libra vna: myrrhæ, succi radicis dulcis, succi hypocistidis, singulorum sextans: croci, mastiches, vtriußque vncia vna. Hæc dissoluta diligenter terimus, paulatim de expresso liquore aditillantes: postea ad pharmaci confectionem vino scybelite, aut theræo, aut pramnio vtimur: sint autem eius sextarij xxiiij. Passum in vas fictile diffusum coquimus: atq; vbi mellis spissitudinem acceperit, ipsi dissoluta & trita pharmaca adiungimus, rursus q; coquimus ad compagem: & sublato in vas vitreum aut argenteum vtimur, quemadmodum dictum est antea. Aliam ad destillationes, & omnes tussiculosas affectiones Asclepiades in secundo internorum sic tradidit.

¶ *Ad Destillationes pharmacum, quo vsus est Comō philosophus: auxiliatur statim.* Pyrethri, costi, vtriußque drach. ij: piperis albi drach. j: tusa & cribrata reponito: vsu verò expetere naribus ad mouere, & pharmacum attrahere, iubeto. *Alia.* Piperis albi drach. vnam, seminis vrticæ tantundem: costi, myrrhæ, croci, singulorum obolos tres: preparato ac vtitor vt dictum est. ¶ *Alia Dolorem sedans,*

Antonij

A l. 5. fu. 2. t. 5.
fol. 553 g

† *Aliter xii.*

* *Aliter lignosa*

* *Aliter libras*

* *Al. drach. iij.*

* *Al. vncia i.*

H

A Antonij Musæ. Facit ad Destillationem, & Vocem interceptam. Opii, myrrhæ, seminis hyoscyami, singulorum drach. duas: singula in cicuta decocto macerato, ac diligenter terito: & ex multis catapotia erui magnitudine formato, & duo ex iplis ante somnum dato. *Alia facit ad Hæmopticos.* Seminis hyoscyami albi drach. octo, nardi indicæ drac. sex, croci drach. quatuor: opii, amyli, anisi, singulorum drach. duas: rubricæ lemnis drach. vnam: cum aqua catapotia erui magnitudine formato, ac vtitor vt dictum est. *Alia Delingibilis, ad Tusses extremas & inueteratas.* Vini sulermi sextarium vnum, mellis attici libram vnam, coquito assidue agitando cum ramulis rutæ: dato inde mystrum. Facit & ad stomachicos. *Alia Petri, ad Vlcera & Suppurationes in profundo.* Vini mulli veteris † sextarium vnum: Axungia veteris sextantem, alij vnciam vnam. Axungiam probe cum vino mulso terito ac dissoluito, inde q̄ in vas fictile transferto, & ad prunas ramulis rutæ agitando coquito: & vbi densata fuerint. in vase vitreo reponito: ac mystrum delingendū vt prædictum est exhibeto. *Alia Origani.* Glycyrrhizæ ponticæ drach. duas: seminis vrticæ totius leminis lini tosti, vtriusq; drach. vnam: myrrhæ, croci, vtriusq; obolum i: mellis attici, aquæ, vtriusq; cyathos sex. Glycyrrhizā aqua coquito, deinde expresse liquore, reliqua terito, & melle cocto excipito, ac delingenda præbeto. *Alia.* Ari tosti drach. vnam: ammi torrefacti, nucum pinearum tostiarum, irionis tosti, singulorum drach. vnam: excipe melle cocto. *Alia Placentula, hoc est coptarium ad Tussientes.* Seminis lini torrefacti cōtusi & cribrati, vix passæ pinguis citra acinos, vtriusq; sextarium vnum: nucum pinearum tostiarum, nucum ponticarum depurgatarum, vtrarumque heminam vnam: piperis albi sextantem: myrrhæ, croci, vtriusque vnc. j: mellis attici libras quatuor: contusa vt oportet trita q̄ reponito. Semen lini cum melle coquito, et vbi densata fuerint reliquis addito, misceto, ac contundito. Datur nucis ponticæ magnitudine. *Alia, facit et ad Thoracis affectiones.* Farinæ fabacæ tenuissimæ tostæ heminam vnam, iridis illyricæ contusæ quadrantem, nucum pinearum tostiarum sextantem, pulegij aridi contusi sesquidrachmam, seminis vrticæ drach. vnam, piperis vnc. dimidiam, mellis boni sextarios ij: farinam cum melle ad densitatem coquito. Seminis lini etiam tusti, tosti, & cribrati heminā vnam in promptu habeto & adiecto. *Alia ad Tussim, & Spiritus prolationem, valde probe expurgans.* Hyssopi, pulegij, vtriusq; sextantem: iridis, seminis sinapis, cardamomi, singulorum vnciam vnam: anisi, piperis, vtriusq; vnciam vnam: tusa & cribrata melle cocto excipito. Datur cochlearij boni mensura. Si vero hyems sit, & accepturus nō febrat, piperis sextantem, & pro aniso sceniculum aut cuminum, & pro cardamomo sinapi duplū, conijcito. *Catapotium ad Tussim recentem, Panacea pharmacum Dolorem leuans, inducens Somnum facit* **C** ad Hæmopticos, ad Empyicos & Anaphoricos. Styrcis drach. octo: opii, myrrhæ, vtriusq; drach. quatuor: diluta passo in catapotia cogito, & erui magnitudine cubitum euntibus dato. Alia exemplaria par pondus omnium habent. *Alud Platonis inscriptum: euestigio auxiliatur.* Styrcis, myrrhæ, opij, galbani, singulorum par pondus: passo diluta in catapotia redige. *Alud Bassi inscriptum, pharmacum accommodatum: auxiliatur statim. Facit Hæmopticos, Sanguinem reijcientibus, Suppuratis.* Galbani, styrcis, iridis illyricæ, corticis pinus, singulorum drach. duas: enulæ, opij, vtriusq; drac. vñā: excipe melle cocto, & præbe ciceris magnitudine ex aquæ mulsæ cyathis iij. *Confectio ex Marrubio Platonis.* Myrrhæ, styrcis, opij, succi marrubij, galbani, croci, æquales partes: præpara ac vtere melle exceptis cocto. *Catapotium Dolorem sedans, pharmacum accommodatum ad Inueteratas affectiones. Facit ad Destillationem, Dolorem capitis, Agre spirantes, Peripneumonicos, ad Vesicæ & Vteri affectiones. Inscribitur Panacea accommodata, ab aliquibus Stichus.* Myrrhæ, piperis, cardamomi, opii, styrcis, castorii, galbani, æquas partes excipe passo: fac catapotia, & vtere. *Alud pharmacum valde bonum, inscribitur Harmonia. Facit ad Destillationes, & inextinguibilem Defluxum.* Styrcis, castorii, piperis, cardamomi, singulorum drach. tres: opij, myrrhæ, seminis hyoscyami albi, singulorum drach. quatuor: excipe passo, reduc in catapotia, dato ciceris magnitudine ad somnum. *Alud.* Croci, sulfuris viui, myrrhæ, opii, singulorum drac. quatuor: seminis hyoscyami albi, cardamomi, piperis albi, singulorum drach. octo: mellis cocti quincuncem, aut quod satis est. Vtus præmonstratus est. Dat cubitum euntibus. *Confectio Proxeni, ad Tusses inueteratas, & valde diu durantes Humectas affectiones, appellatur Symphonos, & Lexopyretos id est optime sedans febrem. Hac vsus est Antonius Musa.* Piperis albi, opii, cardamomi, singulorum drach. mas octo: croci, sulfuris viui, myrrhæ, seminis hyoscyami albi, singulorum drac. quatuor: mellis cocti sexuncem. Datur nucis ponucæ magnitudine cum aquæ mulsæ cyathis tribus.

Confectiones ad Tussim ab Andromacho libro Secundo de

Confectionibus Internis conscriptæ.

CAP. 3.

Postquam multas ad tussim Andromachus scripsit confectiones, deinceps omnes soporem inducentes, & ob id soporiferas appellatas, tradidit. Ceterum hæ omnes tenues fluxiones inspissare possunt resiccantes simul que refrigerantes: & propterea aliquæ non tantum opium, sed & mandragoræ succum, aut radicis corticem, aut hyoscyami semen: aliquæ etiam duo, aut tria, aut etiam omnia huiusmodi habent: quemadmodum aliæ styrcem, & crocum. Rationaliter autem his alij partim calfacientia admiscuerunt, partim cum modica adstringendi vi aromatica & resiccantia, item que semina quedam familiaria, velut anisi, sceniculi, apii, dauci, seselis, vt pote

* Aliter ii.

* Aliter drac. ij.

* Aliter vnc.

DE COMPOS. PHARMAC.

utpote quæ tum pharmacorum iniucunditatem ac vim obtundunt, tum vrinam etiam proleſcunt. E Quædam verò etiam aſpitudines læuigant, velut ſunt tragacantha, glycyrrhiza, & vina dulcia. At verò ex iis, quæ minus de aromaticis complectuntur, eas etiam tabeſcentibus præbent. *Confe*
ctio ad Tuſſim ex duobus piperis generibus. Cinnamomi drach. vnam, ſucci papaueris drac. vnam, myr-
rhæ obolos tres, piperis nigri obolos tres, coſti obolos tres, caſtorij obolos tres, piperis albi obolos
tres, chalbanij obolos tres, croci dimidium: redigito in paſtillos, dato cū melle aut paſſo. *Alia*
ad Tuſſim excellenter effiçax. Eadem Febres ſedat. Seminij hyoſcyami vnc. dimidium: vnum exemplar

* *Aliter vnc.*

vnc vnam habet: cardamomi drach. vnam, ſucci papaueris vnc. vnam: myrrhæ, ſulphuris viui, cro-
ci, ſingulorum vnciam dimidium: piperis albi iuxta Heram ſeſquiunciam, mellis attici quod ſatis
eſt. *Aliud ad Tuſſim ſiccā.* Styraçis partem i, ſucci papaueris tantundem, croci partem dimi-
diam: contundito ſimul, & catapotia inde exhibeto. *Confeçtio ad Tuſſim, qua vr̃or, ſacrificuli bo-*
na. Succij papaueris drach. decem, ſeminis lactuæ drach. xx: caſtorij drach. xviii, alij xvi: rutæ hor-
tenſis aridæ drach. xiiii, ſeminis lini drach. ſedecim, panacis drach. trigintaſex, myrrhæ drach. qua-
tuordecim: croci drach. vii, alij vnciam vnam: excipe melle. Datur pro viribus ægyptiæ fabæ ma-
gnitudine, febrientibus ex aqua, febre carentibus ex vino, ad noctem. *Catapotium ad Tuſſim quo*
vr̃or. Styraçis, myrrhæ, opij, ſingulorum drach. quatuor: opobalfami, croci, vtriuſq; drach. duas: F
ſimul trita excipe, ac vtere. *Ad Tuſſim ſiccā.* Succij radicis dulcis drach. ii, ſtyraçis drac. vnam:
opij, croci, myrrhæ, ſingulorum obolos tres: excipe paſſo aut aqua, & ad fabæ græcæ magnitudi-
nem redigito, ac vtitor. *Potio qua vr̃or ad Phthiſicos, Rhipali, multis commoda, appellatur Menodorios,*
& Ambroſia. Facit ad Febres per circuitum repetentes. Nardi, croci, myrrhæ, coſti, calig. cinnamomi, iun-
ci rotundi odorati, piperis nigri & albi, caſtorij, galbani, terebinthinæ, ſtyraçis, ſucci papaueris, ſe-
minis hyoſcyami, ſingulorum drach. tres: aniſi drach. vnam, apij ſeminis drach. vnam, tragacan-
thæ drach. ſex, mellis quod ſatis eſt, vini falerni heminam vnam: tragacantham vino ſufficiēti ma-
cerato, & reliqua ſimul cum melle committito. Datur febrientibus ſeſquidrachma ex aqua muſſa:
febre carentibus vncia dimidia cum melle, & aceti cochleario vno, & vini falerni cyathis duobus.

A. l. 5. ſu. 2. 5.
fo. 553-g

Apollonij Confeçtio, ſacit ad multa, præſertim ad Tuſſes, egregiè. Cardamomi drach. octodecim, myr-
rhæ drach. duodecim, hyoſcyami drach. duodecim: opij drach. decem, alij duodecim: ſeminis pe-
troſelini drach. duodecim, croci drach. quindecim, malorum mandragoræ drach. decem, zingibe-
ris drach. octo, ſulphuris viui drach. vi, ari drach. ſex, thuris drach. vi, coſti drac. vi, piperis albi drach-
mas ſex, mellis attici. *Alia ad Internos Abſceſſus, probè repurgans.* Sagapeni drachmas ii, myrrhæ
3 ii: cardamomi drach. quatuor, alij drach. vnam: caſtorij drac. vnam, piperis albi obolos tres, opij G
drachmas duas: cum aqua in paſtillos formato duorum obolorum ponderis. Dantur cum aqua.

Aliter xvij

Iſotheos ad Tuſſim, ad Tabem, ad omnes Internas & per Circuitum repetentes affectiones. Nardi drach.
duas, myrrhæ drach. vnam, croci drach. vnam & dimidium, coſti drach. vnam, piperis albi drach.
vnam, ſacis opobalfami drach. duas, cinnamomi drach. duas, ſucci mandragoræ drach. ii, caſtorij
drach. duas, ſeminis dauci drach. vnam & dimidium, opij drach. duas, amomi ſeſquidrachmam, ca-
ſiæ nigre ſeſquidrachmam, mel coctum. Facit ad dolores ſtomachi, hepatis, pulmonis, oculorum,
ſanguinis reiectionem, abſceſſus: prodeſt dyſentericis, voluulolis, nephriticis, iſchiadicis, ægrè ſpi-
rantibus: vrinæ ſuppreſſæ, doloribus laterum, præcordiorum: fluxui muliebri, & vteri ſtrangula-
tioni. Admiranda eſt antidotus ad lethalia venena, ante & poſt cibum ſumpta, ad omnem ſangi-
nis eruptionem cū frigida: & ad morſos à vipera, & percuſſos à phalangis, in vini cyathis tribus.
Quartanariis prælotis dantur ante horam acceſſionis oboli duo, ex vini cyathis tribus. *Potio*
ad Tuſſim, Dyſpnœam, & alia multa, Antipatri, qua vr̃or. Styraçis drach. vi, terebinthinæ drach. qua-
tuor, opopanacis drach. duas, galbani drach. duas, iridis illyricæ drach. duas, myrrhæ drach. duas,
ſeminis hyoſcyami albi obolos quatuor, ſpumæ nitri obolos quatuor, piperis albi obol. quatuor,
opij obolos v. Datur quantitate fabæ ægyptiæ ad ſomnum. Quidam opij obolos tres, alij drachmā H
vnam, coniiciunt. *Eclegma ad Tuſſim.* Nucleorum nucum pinearum drac. duodecim, ſeminis
lini toſti drach. octo, tragacanthæ drach. duodecim, carnis palmularum drach. octodecim, iridis il-
lyricæ drach. duodecim, amygdalarum dulcium drach. ſedecim, mel coctum. Dato delingendum
bis per diem, manè & veſperi. In quibuſdam tragacantham aqua pluuiæ diſſolutam primum cum
melle coquito. *Catapotium ad Tuſſim, Criſpi Liberti.* Myrrhæ, piperis albi, galbani, caſtorij, ſty-
raçis, croci, opij, ſingulorum par pondus: ſtyraçis dimidium. Dato inde catapotia ii ad noctem.

* *Aliter i.*

Scribonij, ad Tuſſim. Seminij apij, drach. duas: floris iunci odorati, nardi, celticæ, ſtyraçis, croci,
ſingulorum drach. vnam: balauſtij obolos tres, ſucci papaueris drach. quatuor: mellis quod ſatis
eſt. Datur magnitudo fabæ non febrientibus ex aceto muſſo, febricitantibus cum aqua. *Aſcle-*
piade, ad Tuſſim. Rhu pontici, croci cilicii, ſucci papaueris, ſpicæ nardi, thuris, myrrhæ, ſingulorum
a drac. vnam: radicis nardi celticæ ſextantem, ſtyraçis b quadrantem. Datur drach. i cum vino mul
ſo. *Theſpiana Apollonij, ad Internos abſceſſus.* Seminij apij drach. tres, ſucci papaueris drachmas
tres, melanthij drach. tres, iridis illyricæ drach. c ſeptem, caſtorij drach. duas, ſeminis dauci drach.
d ſeptem, ſinopidis rubricæ drach. ſeptem: excipe melle cocto, & dato nucis pontice magnitudine
ex aqua. *Catapotium Reficcatorij, ad Fluxiones thoracis, ad Molæ dolorem, Affectiones per circuitum re-*
petentes,

A* *Aliter vnc.*

B* *Al. vnc. vi*

C* *Aliter ij.*

D* *Aliter ij.*

Aperentes, & percussos à Scorpio. Succipapaueris, seminis hyoscyami, vtriusq; par pondus: cum passo aut melle ad fabæ græcæ magnitudinem formato. Dato ad noctem: somnum inducendo prodest.

☞ *Confectio finiens Febrem, Phamphili pharmacopolæ bona.* Seminis hyoscyami vnciam i, cardamomi exenterati vnciam i, succipapaueris vnc. i, sulfuris viui vnc. dimidiam, croci vnc. dimidiā, myrrhæ vnc. dimidiam, euphorbiæ drach. ij, costi drach. ij, iridis illyricæ drach. ij, piperis albi drach. quatuor & dimidiam, mellis quod satis est: vttere. ☞ *Catapotium ad Tussim & alia multa commodum, & præsertim ad tussim humidam.* lunci odorati drach. sex, opii drachmas quatuor, galbani drach. sex, styracis drach. quatuor: fiant catapotia aræci magnitudine, dentur ad somnum. ☞ *Alia sedans Febrem Duri.* Hac antidoto usus est ad oia, ad Tonsillas, Tussis, & Anginas. Croci vnc. vnā, piperis quincuncem, myrrhæ vnciam vnā, succipapaueris vnc. vnā, thuris tantundem, seminis hyoscyami tantundem, cardamomi tantundem, costi drach. quatuor, iridis illyricæ drach. tres, aristolochiæ drach. ii: melle attico excipito. ☞ *Aliud ad omnem Tussim expertum.* Anisi drachmam vnā, costi obolos iii, myrrhæ drach. vnā: castorii, galbani, piperis albi, seminis hyoscyami, opii, succi radices dulcis, singulorum drach. vnā: excipe passo, redige in catapotia ciceris magnitudine. Dato in noctem.

☞ *Catapotium Concoctorum ex libris Perigenis, ad Tussim & Destillationem.* Styracis obolos duos, piperis grana viginti, myrrhæ drach. duas & dimidiam, seminis hyoscyami obolos quatuor, euphorbiæ drach. duas, iridis illyricæ drach. ii, opopanacis drach. ii, croci obolos tres, opii obolos tres, terebinthinæ drachmam vnā, piperis albi obolos tres, galbani drach. duas: trita excipe galbano ac resina, opio q; & styrace. Datur, prout sunt vires. ☞ *Apolloni Confectio ad Tussim commoda.* Foliorum malabathri drach. octo, croci drach. sex, opobalsami drach. vnā, spicæ nardi drach. vnā: rosarum siccarum, floris iunci odorati, singulorum drach. vnā: costi, calicæ, styracis, myrrhæ, mei, singulorum drach. tres: vix passæ mundæ drach. sedecim, succi mandragoræ drach. sex, mellis quod satis est. Vuam passam in cretico passo per noctem & diem macerato, deinde admistis aridis terito, & mel misceto, ac reposito vtitor. ☞ *Potio ad Tussim ex libris Apolloni, item ad Muliebrem fluxum.* Seminis hyoscyami drachmas tres, myrrhæ drach. tres: croci, succi mandragoræ, thuris, singulorum drach. tres: piperis albi, & nigri, vtriusq; drachmas quatuor: viticis drach. tres, opii drach. tres, mellis & vini chii quod satis est. Datur magnitudo fabæ. ☞ *Ad Tussim, incipientem Phthisim, Hæmopticos, ac Fluxiones.* Seminis hyoscyami drach. quatuor, radices nigræ mandragoræ drach. quatuor, rhu drach. iii, corallii drach. tres, opii drach. tres, lycii drach. duas, balaustii drach. tres, thuris drach. quinque, tragacanthæ drach. duas, croci drach. tres: cum aqua pastillos triobolares formato. Datur

☞ *Chæmoptois ex posca, reliqs in aqua.* ☞ *Potio prodita à Clerico Abascanto, ad Tabescentes, quæ vror abunde: Verum inepta est ad sanguinis reiectionem.* Aristolochiæ dactylitidis drach. viginti, sulfuris viui drach. xx, corticis mandragoræ drach. viginti, thuris drach. quadraginta, gentianæ drach. xxx, fese lis drach. xxx, opii drach. quadraginta, seminis hyoscyami albi drach. xl, myrrhæ drach. xl, croci drach. octo, piperis albi grana c, euphorbiæ drach. decem, baccarum lauri drach. septem & dimidiā, costi drach. septem & dimidiam, cardamomi drach. septem. Euphorbium et myrrham in vino tundo, opium vero & hyoscyamum in vino mulso: reliqua priuatim tundo, ac simul misceto ad mel coctum. Vtere pharmaco non recenti. Recte apposuit Andromachus ad hoc pharmacum, quod sit ad sanguinis reiectionem ineptum, ob sulfur videlicet viuum, & euphorbium, partim etiā ob lauri baccas. ☞ *Catapotium ad Tussim, statim auxilians.* Iridis obolos quatuor, croci cilicii sesquibolum, myrrhæ obol. duos, cinnamomi obolos quatuor, calicæ obolos quatuor, seminis hyoscyami albi obolos duos, seminis papaueris nigri obolos duos, seminis cicutæ obol. duos, & seminis lactucæ nigræ obol. ii: redige in pastillos obolares aut semiobolares cum passo, & præbe in passi quarta hemine parte. ☞ *Aliud, Ad omnem Tussim, et Fluxionem, & Abscessus internos, ut Apollonius.* Sagapeni, gentianæ, myrrhæ, opopanacis, piperis albi, singulorum drach. ii: baccarum lauri mundarum drach. quatuor: trita cum aqua reduc ad magnitudinem fabæ græcæ. Dato autem ischiadicis paulo plus ex vini diluti cyathis tribus. ☞ *Ad Phthisicos aliud, quod à Flauiano Crætenfi assecutus sum.* Succipapaueris drach. octo, myrrhæ drach. octo, castorii drach. sex, thuris drach. octo, succi rhois drach. ix, sagapeni drach. sex, succipapaueris drach. octo, anisi drach. nouem, seminis apii drach. octo, liquoris panacis drach. quinque, seminis hyoscyami drach. octo, styracis & octo, croci & x, liquoris cyrenaici drach. vnā, seminis dauci drach. octo, marrubii drach. i, corticis mandragoræ drach. x, piperis longi drach. octo, & albi drach. quinque & dimidiam, verbenacæ supinæ drach. vnā, mel coctum. ☞ *Catapotium album, ut Prætorius & Apollo.* Myrrhæ, seminis hyoscyami albi, opii, styracis, singulorum æquale pondus: formato catapotia quanta deuorari possunt, hæc ipsa vix passa, aut passo, aut palmularum carne excipiens. ☞ *Catapotium ex libris Perigenis, Ad Tussim.* Seminis hyoscyami, castorii, myrrhæ styracis, singulorum par pondus: dato magnitudinem fabæ cum passo, aut aqua mulsa. ☞ *Catapotia ad Tussim humidam ex libris Perigenis.* Styracis, chalbani, ammoniaci thymiamatis, castorii, opii, singulorum æquales partes: in catapotia erui magnitudinis redigito, ex eis q; duo exhibeto.

De Reiectione Sanguinis.

CAP. 4.

In reiectione sanguinis primum periculum est, ne immoderata eius euacuatio fiat. Secundum

* Al. orobi.
* Aliter drac.

* Aliter ii.
* Aliter ii.

* Aliter i.

* Apocortis.
* Al. uanpōu
i. longi.

* Aliter v.

* Aliter x.

† Al. Epidaurios
μελαίνης
idest lactuca
nigra.

* Al. Critone.
* AE. myrr.

† Aliter ix.

* AP. ad tussim

dum verò post suppressum sanguinem. Curatio autē eius quidem quæ ex apertione osculi alicuius valis contigit, per obturationem fit oris dilatati: eius verò quæ ex valis ruptura, per eiusdem conglutinationem: quemadmodum eius quæ ex erosione, per renutritionem erosorum. Obturatur igitur osculum dilatatum per adstringentia: conglutinetur autem ruptum per eadem, & quæcunq; ipsis in compositione miscentur citra mordacitatem reliccantia, & glutinosum quiddam habentia: velut est lemnia terra sphragis appellata, & samius alter. Renutrientur autem corrofa per cibos boni succi, & pharmaca carnem gignentia, sarcotica Græcis appellata: de quorum facultate dictum est in secundo opere huiusce tractationis. Iuxta primam quidem igitur rationem, ex talibus pharmaca componuntur ad reiectionem sanguinis curandam convenientia: iuxta secundam verò, in iis qui ex pulmone, aut thorace, aut arteria, aut summa arteriæ parte, sanguinem reieciunt. Miscentur enim prædictis congruenti mensura tum calida, tum tenuium partium existentia, quæ infestissima sunt prædictis tribus affectionibus, apertioni videlicet orarum, rupturæ, et corrosioni. Cuius rei gratia itaq; miscentur: distributionis nimirum ipsorum in corpus. Etenim adstringentia & viscosa ac tenacia sibi ipsis vias præcludunt, quare opus habent facultate ipsis viam struente ac preparante. Porro cum ex locis circa stomachum, aut aluum, aut aliquod intestinum, sanguis educitur, huiusmodi pharmacorum mistura non est opus. Verum rursus infestissimum his est hoc genus pharmacorum, quæ in tantum refrigerant, ut affectionē stupefaciant: & tamen etiam hæc admiscuntur medicamentis ad hæmoptoicos convenienter paratis, ut quæ altiore somnum ac soporem inducant: & commodissima sunt iis qui à tussi lancinantur, sistentia nimirum sanguinem qui ad affectum vas deferretur, atque hoc per suam frigiditatem. Atque hi quidem sunt componendi scopi. Copia autem materiæ pharmacorum, quæ sufficientem experientiam prioribus medicis, qui circa curatiuam artis partem diligenter versati sunt, exhibuerunt, deinceps referetur.

Quæ ab Andromacho ad Sanguinis Reiectionem scripta sunt.

Primum ex iis quæ sanguinem reicientibus conueniunt pharmacis, Andromachus sic tradidit. *Ad Sanguinis Reiectionem, quo ego vtor.* Acaciæ drachmas viij, rosarum siccarum drach. viij, balaustii drach. viij, gummi drach. ij, tragacanthæ drach. j: cum aqua pastillos facito drachmæ vnus: dato ex aqua pluuiæ. *Aliud Apollonij.* Seminis hyoscyami drach. viij, opii drach. iij, thuris 5 viij, terræ samie drach. iij, amyli drach. ij, rubricæ lemnie drach. ij: aut si hæc non sit, sinopice drach. iij: coralli drach. iij, costi drach. iij: floris balaustii obolos tres, alij drach. ij: excipe succo polygoni, ac redige in pastillos triobolares, quos ex frigida præbeto. Quidam cicutæ seminis drach. ij, G adiciunt. *Aliud, quo vtor.* Cytinorum drach. vi, spinæ ægyptiæ drach. vi, succi papaueris drach. iij, hypocistidis drach. vi, balaustii drach. vi, acaciæ drach. vi, lycii indicis drach. quatuor, myrrhæ drach. duas: excipe myrti baccarum decocto, & fac pastillos drachmæ vnus. Ex eodem decocto præbe bibendos. *Aliud sistens Sanguinem.* Croci cilicii, myrrhæ, iridis, nardi indicæ, thuris, acaciæ, singulorum vnciam vnam: succi papaueris, costi, piperis, singulorum vnciam dimidiam: rosarum siccarum trientem: melle excipito. Datur fabæ ægyptiæ magnitudo. *Aliud Fluxiones sistens.* Prodest Fluxionibus internis, Tonsillarum, & Vnæ, & ad exulceratam Arteriam gargarijsitum: & ad Sanguinis fluxum ex aqua frigida. Pluribus ex posca magnitudine Ponticæ nucis. Congruit etiam Mungentibus sanguinem, & Fluxui muliebri, potum & appositum. Myrrhæ vnciam vnam, nardi indicæ vnciam vnam, cinnamomi vnciam vnam, thuris vnciam vnam, croci vnciam dimidiam, piperis drach. iij, succi acaciæ drach. iij, costi drach. quatuor, styracis drach. quatuor, iridis illyricæ sextantem, rosarum siccarum sextantem: excipe melle cocto. *Aliud Sistens fluxiones, ex libris Galli.* Facit probè & ad Sanguinis reiectionem. Croci, myrrhæ, iridis, nardi syriacæ, calicæ nigre, rhu pontici, singulorum^b drachmam vnam: styracis, piperis albi, vtriusq; vnciam dimidiam: rosarum siccarum quincuncem: tritis mellis attici quod satis est affunde. Datur nucis ponticæ magnitudine ex aquæ cyathis tribus. H

Aliud ad Hæmoptoicos, ex libris Apollonij. Succii hypocistidis drach. duodecim: balaustii, acaciæ, cytinorum, singulorum drach. duodecim: gallæ drach. duodecim, succi papaueris drach. vi, croci drach. vi: redigito in pastillos triobolares. *Aliud ad Hæmoptoicos.* Succii papaueris obol.º duos, amyli obolos tres, gummi obolos duos: dato ex aqua. *Aliud ad Sanguinis educationem, & omnem Sanguinis eruptionem, ex aqua potum.* Succii papaueris drachmam vnam, cinnamomi drachmam vnam, castorii drachmam vnam: costi, piperis longi, et rotundi, myrrhæ, singulorum obolos^d tres, croci sesquiobolum, coralli obolos ii, balaustii drach.º vnam, anisi drach.º vnam, gummi drachmā vnam: ex tritis pastillos formato ac vitior. *Aliud ad Sanguinis reiectionem.* Rubricæ sinopice drach. quatuor, thuris drach. viij, anisi drach. i, seminis cicutæ drach. quatuor, succi papaueris drach. quatuor, lapidis hematitæ drach. quatuor, seminis hyoscyami drach. octo, terræ samie drach. tres: dato pharmacum ieiunis ex aqua. *Aliud.* Succii hypocistidis drach. vnam, opii obolos tres, balaustii drach. i, acaciæ drach. vnam: ex aqua. *Aliud ad Sanguinis educationem, ut Herophilus.* Radicis symphyti quadrantem, terræ alteris vnciam vnam, thuris sextantem, balaustii vnciam i, hypocistidis vnciam i, croci obolos iij, myrrhæ drach. ii, opii drachmam i, rubricæ lemnie quadrantem & obol. tres, gummi drach. i: excipe succo polygoni aut plantaginis. *Aliud ad Hæmoptoicos, Boni præceptoris.*

A. l. 5. su. 2. t. 5.
fol. 553. g

† Aliter ij.

† Additur in antiquis xv. 250 i. succi.

A* Al. dimidiam.

B* Al. vnciam

C* Aliter i.

D* Aliter i.

E* Aliter ij.

F* Aliter ij.

G† Additur i

antiquo codice

græco, coralli

torrefacti obo

los tres, thuris

obolos ij, acaciæ

obol. tres:

oni vnus albu

menterito, &

gummi oboli

vnum admi-

sceto. Totius

huius dimidii

dato cū aqua

cotyles quarta

darte ad bibē-

dū. Ad sū

guinis reiectionem

valde bonum.

A *præceptoris.* Balaustii drach. ii, acaciæ drach. ii, tragacanthæ drach. quatuor, succi hypocistidis drach. quatuor, florum rosarum drach. quatuor, opii drach. duas, thuris drach. iii, myrrhæ drach. duas, seminis hyoscyami obolos quatuor: excipe succo sanguinariæ quæ Græcis est polygonum. *¶ Aliud Sanguinem reiicientibus, vt Acacios.* Terræ samiacæ drachmas quatuor, coralli drach. quatuor, rubricæ sinopicæ drach. ii, balausti obolos tres, opii drach. quatuor, amyli drach. xii, thuris drach. viii, seminis hyoscyami drach. octo: cum polygoni succo pastillos triobolares formato. Dato in posca, si fluxio sit multa cum vitello oui allato & aqua plantaginis. *¶ Aliud ad Hæmopticos, & Dysentericos.* Floris rosarum, opii, acaciæ, gummi, balausti, hypocistidis, singulorum quadrantem: gallæ vnciam vnam: seminis plantaginis eiusdem q; succi, vtriusque sextantem: lycii indicii vnciam vnam, succi rosarum vnc. i: redigito in pastillos drachmales. Quidam etiam omphacii vnciæ dimidium addunt. Dysentericis etiam infunditur. *¶ Aliud ad Hæmopticos, Carteri robustissimi.* Seminis cicutæ drach. duas, seminis hyoscyami drach. vnam, amyli drach. vnam, nardi obolos tres: rubricæ lemnis obolos tres, alii quatuor: anisi obolos quatuor, alii tres: croci obolos tres. Dato cum vitello oui allato, ex aquæ lactosæ cyathis tribus. Facit & ad destillationes. *¶ Aliud ad Hæmopticos, magni Philadelphi.* Coralli obol. ii, asteris samii obol. iiii, succi sanguinariæ cyathos sex. Dato hoc totum

B pro duabus vicibus in potu.

Vfus Prædictorum Andromachi pharmacorum.

Iam antè quidem palā est ex iis, quæ in principio sermonis de reiectione sanguinis dixi, quis sit vsus præscriptorum pharmacorum: verum maioris lucis gratia repetam ēt nunc id quod primum omnium ex acacia, rosis laccis, balaustio, gummi, tragacantha q; est compositum. Manifestū autem est acaciam quidem, et rosam, & balaustium, adstringentia habere: gummi verò & tragacantham viscosa et glutinatoria. Igitur impossibile est ipsum vsque ad thoracem et pulmonem per se deferri, si non habeat quæ adstringentia & viscosa ac tenacia deducant. Et quod his amplius accedit, neq; mellis quicq; eius compolitor addidit: sed per aquam pluuiam, quæ & ipsa adstringentem vim habet, tum compositio ipsius, tum exhibitio tradita est, vt ad sanguinis ex stomacho & vtre educationes conuenire possit. Quin & si possibile sit ex intestino ieiuno aliquid per nauseam elferri, ad hoc etiam commodum pharmacum fiet. Contrariam autem vicissim ad præscriptum pharmacum compositionem habet quintum ex ordine scriptum, item q; nonum: nimirum cum cinna momum, & piper, & costus & myrrha eis sint admixta. Reliqua verò omnia, media quodam modo inter hæc sunt, neq; exactè adstringentia per totam sui compositionem, neq; fortiter calfacientibus permixta. Cæterum opium, & hyoscyamus, & cicute semen maximè quidem iis, qui à tussi, aut etiam aliàs lancinantur, apta sunt: quanq; omnibus quomodocunq; sanguinem reiicientibus conueniant. Quare ipsa miscere licet tum in iis, qui ex nutritiuis organis sanguinem sursum educunt, tum quibus ex spiritalibus organis idem contingit.

Quæ Asclepiades ad Hæmopticos scripsit ad verbum.

¶ Ad Sanguinis reiectionem. Radicis symphyti sexuncem, balaustii drach. ii aut iiii, aquæ sextarium i: coquito ad tertias, & expresso liquori hæc addito: Amyli drach. i, gummi thebaici tantundem: dato in potu. *¶ Aliud.* Cucumerum satiuorum lib. i in tenuia frusta dissecato, & aquæ potabilis sextarium j affundito, ac ad tertias coquito. Expresso deinde liquori terræ samiacæ sesquidrachmam inspergito, ac bibendum exhibeto. *¶ Charixenis Pharmacum accommodatum.* Radicis polygoni manipulum, radicis symphyti tantundem, rhois rubri acetabulum, aquæ sextarios iiii: coquito ad tertias, & expressi liquoris cyathum vnum dato, cum gummi tenuissimè triti ac dissoluti drach. vna. *¶ Pharmacum Arrhabiani, quod Ponticum dicitur.* Vuæ vrli libras xvi, aquæ pluuiæ sextarios xvi: coquito ad tertias, & expressum liquorem reponito. *¶ Aliud.* Mororum rubrorum non dum maturorum libras xvi, aquæ pluuiæ sextarios xvi: coquito ad tertias, & expressum liquorem reponito. *¶ Aliud.* Fructus corni libras xvi, aquæ pluuiæ sextarios xvi: fac eodem modo.

¶ Aliud. Pahnularum thebaicarum lib. xvi, aquæ pluuiæ sextarios xvi: coquito ad tertias, & postq; expresseris liquorem, ad prius expressos liquores infundito, omnes q; probè mistos ad tertias coquito, & in fictili vase reponito: & inde cyathum vnum ante cibum dato. Pharmacum hoc est valde bonum, & regenerationem prohibens. Oportet autem singula suo proprio tempore præparare, & ad pharmaci confectionem reponere. *¶ De Vrsi Vuæ.* Quæ vrli vuæ appellatur, in Ponto nascitur. Planta est humilis & fruticosa, folio memaclyli, fructum ferens rubrum & rotundum, gustu austerum, quem vrli vuam appellant. *¶ Medicamentum quod Inspergitur, Græcis λευκον ad Hæmopticos.* Corticis thuris, terre samiacæ, amyli, singulorum drachmas quatuor: tusa & cribrata reponito. Vsu verò expetente, cochlearium vnum in aquæ frigide cyatho dato. *¶ Aliud.* Balaustii, terre samiacæ, corticis thuris, gummi, singulorum equale pondus: tusa & cribrata exhibe vt prædictum est. *¶ Ad Sanguinis reiectionem Eclegma Amaranti, pharmacum accommodatum.* Vini falerini sextarium vnum, mellis attici libram vnam, in vas fictile coniecta & conuassata super prunas reponito: & vbi arteriæ acceperint spissitudinem, ab igne ablata refrigerari finito: eis que con tusa & cribrata addito gummi cochlearia iiii: balaustii, thuris, terre samiacæ, singulorum drachmas duas: & rursus ad ignem admota & calfacta reponito. Dato, vt prædictum est. *¶ Aliud*

Origenis.

Origenia. Succu gentianæ, succu symphyti, balaustij, singulorum drach. viij: croci, myrrhæ, succu ra- E
dicis dulcis, singulorum drach. iij: protropi, aut theræi, aut scebelitæ, sextarios vi: præpara ac exhi-
be, vt dictum est. ¶ *Catapota ad Sanguinis reiectionem dolorem sedantia. Vfus est Charixenes*. Succu hy-
pocistidis, balaustiorum, opii, singulorum drachmas iij: excipe vino myrtite, & fac catapota. Da-
to ex his trioboli pondus. In alijs exemplaribus opij drachmæ duæ habentur. *Aliud*. Succu hypo-
cistidis, succu acaciæ, succu rhois syriacæ, singulorum drach. iij: balaustij, opij, gummi, singulorum
drach. iij: vini myrtitæ quod satis est. Vfus ostensus est. ¶ *Pastillus Hæmoptoicus, pharmacum acco-*
modatum, inscribitur Trypherum, hoc est Delicatum. Amyli, balaustij, terræ samia, succu hypocistidis, gū-
mi, croci, opii, singulorum drach. ij: excipe succo plantaginis, & exhibe drach. vnam. Liquor ipse
huic affectioni sit conueniens. *Aliud*. Amyli {drach. iij:} terræ samie, hypocistidis, singulorum
drach. duas: opii, croci, balaustij, tragacanthæ, singulorum drach. vnam: excipe succo plantaginis.

¶ *Pastillus ex Succino, facit Hæmoptoicus, diuturnæ & recentis Tussi, Phthisicis, Anaphoricis, Suppuratis,*
Cœliacis, Dysentericis, & Inflatibus. Est etiam Auricularis bona. Psyllij mundi drach. xlv: iridis illyricæ, ma-
stiches, ramentorum succini, croci, singulorum drach. xxx: opij drachmas xv. Psyllium in aquam
calidam coniectum macerari sinito: atq; vbi viscosum ac glutinosum de se in aquam deposuerit,
liquorem exprimito, & cum eo pharmacum præparato, in pastillos ipsum cogendo: ex quibus F
obol. iij, ad somnum euntibus dato. Sint autem aquæ sextarij iij. In alijs exemplaribus psyllium ad
triduum madescit, deinde ter donec ebulliat coquitur, & ab igne ademptum rursus ad triduum si-
nitur, atq; tunc liquor ad pharmaci confectionem segregatur. ¶ *Pastillus Neapolitæ facit Hæmo-*

* *rheumaticis.*

proicus, Suppuratis, Phthisicis, Affectionibus fluidis. Seminis hyoscyami albi, succu mandragoræ, vtriusq;
drach. v: thuris masculi, opij hispani, styracis, coaguli hinnuli, singulorū drach. x: mastiches drac.

† *Aliter viij.*

† xx: ramentorum succini, iridis illyricæ, croci, singulorum drach. xxx: psyllij drach. xlv, aquæ sex-
tarios. iij: præpara ac vtere vt prædictum est. ¶ *Pastillus ex Corallio, vt Niceratus*. Corallij, terræ
samia, vtriusq; drach. viij: balaustiorum, amyli, terræ lemnia, singulorum drachmas iij: seminis
hyoscyami albi, opii, hypocistidis, singulorum drach. ij: excipe succo arnoglossæ, coge pastillos, ac
exhibe. ¶ *Aliter Diocles Chalcedonijs*. Corallij drach. viij: succu hypocistidis, balaustij, succu acaciæ,

* *Aliter rheu-*

rhū pontici, terræ samia, opij, thuris, succu symphyti, singulorum drach. ij: excipe succo plantagi-
nis. ¶ *Aphrodisiacum* "Clidion, pharmacum accommodatum. Facit Hæmoptoicus, Cœliacis, Dysentericis, &
qui Stomachi fluxionibus laborant. Cytinorum, spinæ ægyptiæ, balaustiorum, succu hypocistidis, succu
acaciæ, singulorum drach. vi: lycij, rhu pontici, opij, singulorum drach. iij: myrrhæ drach. ij: con-
tusa & cribrata diligenter baccarum myrti decoctio excipe, & pastillos coge. Exhibe pro viribus G
cum rosarum decocto, aut baccarum myrti, aut aqua frigida. Forinfecus spongiam posca imbu-
tam imponito. Postq; verò fluxus constiterit, pectus & fluxione infestatos locos omphacio cum
aceto dissoluto illinito: tepesciat autem ad cinerem calidam, donec aliquātulum spissetur. ¶ *Phi-*
lippi Pharmacum accommodatum Dysentericis, et Hæmoptoicis. Balaustij, acaciæ, hypocistidis succu, opij,
rhois, thuris, myrrhæ, croci, gallæ, lycij, aloes, rhu pontici, baccarum myrti nigrarum, malicorij, lin-
gulum drach. iij: excipe vino Italico, & redige in pastillos triobolares. Dato febrientibus ex
aqua, non febrientibus cum vino.

Confectiones Dolorem sedantes, Tabescentibus, & Sanguinem reiectantibus commoda,

Item q; alijs quibusdam accommodata, præterquam colicis.

CAP. 5.

I N ijs equidem qui sanguinem reiectant, non dum tñ exactè tabe apprehensi sunt, hoc genus
pharmacorum dolorem sedantium priores medici composuerunt, ipsum q; anodynon appella-
uerunt, Conueniens & ijs qui sanguinem reiciunt, & qui tum hoc perpetiuntur, tum etiam iam
tabescunt: item q; ad alios dolores & affectus, qui circa pulmones, & arteriam, & thoracem, atque
alias quasdam partes consistunt, colicis tantum exceptis. Differunt enim hæc pharmaca ab ijs que
priuatim colica appellantur, aromatum, & odoratorum ac vrinam cientium seminū, mistura. Coli H
cæ enim confectiones his vehementiores sunt, stupefactoriam vim prædominantem habentes ex
multitudine refrigerantium pharmacorum: quale est hyoscyami semen, & cicuta, & papaueris suc-
cus, & cortex radice mandragoræ: his nanq; in colicis vti cogimur ob magnitudinem doloris.

Quas Andromachus scripsit ad Prædictas affectiones.

† *Additur in*
antiquis, & vob-
duos, i. dolores
sedantes.

¶ *Confectio Sedans dolorem, ad omnes Internos affectus, & Pleuritidas, qua vtor*. Radicis panacis, se-
minis dauci, vtriusq; drach. iij: castorij drachmas iij, alij drach. ij: seminis hyoscyami, opij, vtrius-
que drach. iij, alij drach. ij: mellis quod sufficit. Dantur oboli quatuor, cum aquæ cyathis tribus.

¶ *Alia Sedans dolorem, Marcellini*. Anisi drach. ij, seminis hyoscyami drach. ij, succu papaueris
drach. j, seminis apii drach. ij, croci obol. iij, rosarum liccarum drach. j, myrrhæ drach. j, amomi drac.
j: trita cum aqua in pastillos trigintaduos redige. Dato ad somni tempus cum aquæ cyathis duo-
bus aut tribus. ¶ *Alia Sedans dolorem, ex Seminibus*. Seminis apii drach. viij, opii drach. ii, ammii
drach. viij, anisi drach. iij, fœniculi drach. iij, calia nigra drach. ij: cum aqua fac pastillos triobola-
res. Dato ex passo, sexta & decima hemina parte, aut ex aqua. ¶ *Alia Achillis Compunctoris*. Ani-
si 3 † viij, ammij drach. viij: seminis fœniculi, seminis apij, singulorum drach. iij: opii drach. ij, nar-
di indicæ drachmas ij, myrrhæ drach. ij, piperis drach. j, calia nigra drach. ij: fac pastillos triobola-
res

† *Aliter vi.*

Ares, qui resiccati pōderent obol. ij. Dato vt reliquos. *Alia Dolorem sedans vt Xenocrates, qua vtor maxime ad Tormina & Dysentericos.* Seminis apij 3 ij, anisi 3 j, piperis albi 3 j, myrrhæ obol. iij, castorij obol. iij, opij obol. ij, croci obol. iij, gentianæ drach. ij. Fac pastillos triobolares, & varie exhibe. *Alia Sphragis dicta, Sedans dolorem, resiccans Fluxiones, & Tormina ac Tusses, qua vtor.* Myrrhæ obol. v, alij vi: corticis mandragoræ 3 iij, succi papaueris 3 v: seminis hyoscyami drach. iij, alij 5 ij: thuris drach. v, croci drach. v: excipe vino. Exhibe pro viribus, aliquibus fabæ ægyptiæ magnitudine, aliquibus obol. ij. *Alia, Aster appellata, Sistens dolorem, qua vtor ad omnem Fluxum, Dolorem, & omnes Internos affectus, & Destillationes, ad Vesicam, ad Suffocationes, Fluxum muliebrem, Stomachi fluxionem, Dysentericos, Sanguinem reijcientes, facit & ad resolutos.* Croci obol. iij, seminis hyoscyami drach. vi, seminis apij drach. vi, anisi drach. iij, styracis drach. iij, seminis dauci drach. iij, castorij drach. ij, opij drach. ij, myrrhæ drach. ij: quidam etiam mandragoræ succi drach. iij: vt verò Xenocrates, etiam piperis albi drach. vi: cum aqua fac pastillos triobolares. Dato ex aqua. *Alia Sedans dolorem, Lycomedis. Resiccatur Destillationes arteriæ, & Fluxiones oculorum.* Seminis hyoscyami drach. ij, seminis apij drach. ij, opij drach. ij, anisi drach. j, croci obol. iij, rosarum siccarum drach. ij: myrrhæ drach. vnā, alij drach. ij: cum aqua redigito in pastillos triobolares. Vtere quemadmodum Trigono appellato. *Alia Sedans dolorem, Resicatoria, facit & ad Hæmopticos, Cœliacos, Dysentericos, Rupta & Conuulsa.* Anisi drach. iij, seminis apij drach. iij, opij drach. iij, croci drach. j, seminis hyoscyami drach. iij, styracis drach. j, floris iunci odorati drach. j: balaustij obol. iij, quidam drach. vij: foliorum rosarum drach. j, nardi indicæ obol. iij: cum aqua formato pastillos diobolares. Dato ex vino, aut aqua, aut protropo. *Alia Dolorem sedans potio, Rufi, qua vtor.* Corticis mandragoræ drach. iij, thuris drach. v, piperis albi drach. ij & dimidiam, croci drach. v, seminis hyoscyami drach. iij, succi papaueris drach. v, myrrhæ drach. v, nardi obol. iij, calix nigre drach. ij: trita cum passo in pastillos drach. males cogito, ac reposito ne humecti fiant. Dantur ex aquæ calidæ cyathis duobus, choleris, hoc est, biliosa superne & inferne reddentibus, ex frigida. *Alia Sedans dolorem, ad omnes Internas affectiones, qua vtor.* Calix nigra, myrrhæ, opij, styracis, croci, singulorum drach. vnam, quidam drach. j, & obol. iij: cogito in pastillos trium aut duorum obolorum. Præbe febrientibus ex aqua, non febricitantibus in vino: hepaticis in aqua mulsa, itidem & pleuriticis. Efficax est & ad tussim. *Alia Trigonos vocata, Resicatoria, & Sedans dolorem.* Seminis hyoscyami drach. iij, seminis apij 3 iij, anisi 3 ij, opij drach. ij: cum aqua pastillos formato. Dantur cum frigida, manè & vespere, vnus pro vice. *Alia Sedans dolorem, Asclepiadæ, ad omnes Internos affectus.* Sēselis, chamæpityos, herbæ saluix, seminis rutæ syluestris, seminis dauci, singulorum drach. vj: seminis hyoscyami, opij, vtriusq; drach. viij: castorii drach. xxv, rheu pontici drach. xiiii: excipe melle. *Alia, vt Charicles.* Tordilii drach. viii, chamæpityos drach. viii, rhū pontici drach. vi, castorii drach. duodecim & dimidiam, herbæ saluix drach. viii, seminis rutæ syluestris drach. j viii, seminis dauci drach. viii, opij drach. iiii, seminis hyoscyami drach. iiii, croci drach. v: quidam addunt mel atticum, reliqua ipso excipientes. *Alia Dolorem sedans, Iucunda appellata. Facit & ad Tabescentes, & Inflatos.* Illyricæ drach. xxx: succini, croci, mastiches chiæ, singulorum drach. xxx: psyllii drach. xlv, aut xxx: succi papaueris drach. xv: cum aqua pluuiæ pastillos drach. j & obol. ij ponderantes formato, ac exhibeto. Psyllium per diem & noctem aqua pluuiali macerato, deinde coquito & exprimito, atque sic cum reliquis committito. *Alia Potio sedans Dolorem, ex libris Aphrodæ, ad omnem Dolorem in Nervis, vtero, coxendicibus.* Succi papaueris drach. j, opobalsami drach. j, aut carpobalsami drach. j obolos duos: myrrhæ, seminis hyoscyami, castorii, styracis, singulorum drach. vnam: excipe passo, & fac pastillos oboli vnus & dimidii. Dato ex aquæ calidæ cyathis duobus aut tribus. *Aliud Sedans dolorem Catapotium ex libris Aphrodæ, ad omnes Internos affectus, & ad Quartanarios, qui interualli tempore in diem ferunt, & deinde accipiunt. Facit & ad Calculosos, Dysentericos, Stomachicos, & iam Desperatos atque anxios. Est & Oculis valde commodum.* Seminis hyoscyami, {seminis apij,} anisi, styracis, singulorum 3 iiii: croci, opij, vtriusq; 3 iiii: castorii drachmas ii: fac catapotia ægyptiæ fabæ magnitudine. Præbe ex aquæ cyathis duobus. *Alia Dolorem sedans, ad omnes Internos affectus, & Sanguinis reiectationem vndecunque feratur: etiam si ex vulnere prodeat quibusdam prodest. Facit & ad Nephriticos et Hepaticos. Hanc ne prius dederis quàm mercedem acceperis.* Cinnamomi, calix, vtriusq; drach. duas: myrrhæ 3 j, piperis albi drach. j, & longi drach. j, chalbanī drach. j, opij drach. ii: trita cum melle pauco in catapotia redige, partim magnitudine fabæ, partim quātitate araci. Dato pro viribus cum aqua, aut pro iudicio tuo. *Alia Dolorem sedans ad Omnia interna.* Seminis apij drach. ii, anisi drach. ii, piperis longi drach. ii, nigri drach. j, castorii obol. iiii: myrrhæ, opij, vtriusque obol. iiii: panacis, gentianæ, vtriusq; obol. iiii: cinnamomi obolos tres, succi radicis dulcis obol. tres: fac pastillos triobolares: dysentericis drachmē vnus. *Alia sedans Dolorem, Crateri, ad Tabescentes, & Sanguinem reijcientes.* Myrrhæ drach. vi, mandragoræ drach. iiii, seminis hyoscyami drach. iiii, opij drach. v: croci, thuris, vtriusque drach. v: rhu drach. v: seminis cicutæ, styracis, vtriusq; drach. v: excipe vino mulso. *Alia Sedativa doloris, Mysterium appellata, vt Niceratus. Ad Phthysicos, Tussientes, Cœliacos, Dysentericos, Destillationes: confestim auxiliatur.* Croci, costi, castorii, asari, seminis hyoscyami, opij, styracis, singulorum 3 j: quidam hyoscyami seminis 3 dimidiam: excipe melle, ac vtere. *Alia Doloris se-*

† Aliter ij.

* Aliter piperis.

* rheu.

† Aliter iij.

† *Aliter y.* drach. ij, spica nardi 3 j, croci 3 j: rubrica sinopica obolos 7 iij, aut lemnia drac. j: formato pastillos
 † *Aliter iij.* xxx: Dato duos in noctem cum aqua.

Quæ ab Asclepiade scripta sunt ad easdem affectiones.

† *In Aldino*
codi. & quoti-
quoti uidi ma-
nuscriptis, le-
gitur, ἐκλεικ-
τον, φάρμακον
καλούμενον. οὐ-
νοῦ. & c. i.
Medicamen-
tum quod lin-
gitur, pharos
vocatū. Vini
sextarii & c.
ut pharos sit
nomē medica-
menti. ut etiā
inferius pag.
200 a. conside-
ra.

† *Eclegma.* Farris Clusini appellati sextarii dimidium, decocti marrubij viridis sextarii vnū. Hæc in vas vitreum coniecta per diem & noctem macerari linito. Sequenti die pharmacum molito, quemadmodum alicam maceramus: atque vbi penitus dissolutum fuerit, exprimito liquorē, ei que pinguedinem aliquam addito: & igni admota assidue mouens coquito, donec spillata mel lis crassitudinem acceperint. Ex hoc mystrum datur ante cibum, & post cibum tantundē. *Aliud.* Foliorum marrubij tenerimorum manipulum cum sufficienti aqua in fictili coquito: & vbi exoluta fuerint, eximito ac terito: & decocto diluta rursus coquito, pollinis acetabulum inspergens, & pinguedinis arietinae probe subactæ quadrantem addens: & vbi coctura recte habuerit, veluti reliquæ forbitiones præparantur. Ablata ab igne, & modico sale conspersa, forbenda exhibe. Amplius absorptum amplius iuuat. *Aliud Nicerati, facit Suppuratis, Dyspnoicis, Veteri Tussi, Viscosum ac glutinosum reiectantibus, & Is quæ à partu non purgantur, Secundas deducit. Prodest etiam Infantibus alimentum non sentientibus, si nutribus præbeat.* Succum marrubij sextarios sex, verum probe hūc succum colligere oportet à recenti marrubio tuso expressum: vini falerni sextar. j, mellis attici tantundem: piperis albi, myrrhæ, thuris, singulorum 3 octo: vinum & succum ad tertias coquito, deinde mel addito: quibus inspillatis arida inspergito: & diligenter mista in vitreum vasculū trāsferto. Dato mystrum ante cibum. *Aliud, Scribonij Largi.* Succum marrubij sextarios vi, succi semperuiui tantundem: mellis attici sextar. iiii, alij sextar. j: vini Italici sextar. j: picis liquidæ brutiæ tantundem: nardi indicæ, croci, myrrhæ, thuris, piperis albi, singulorum 3 octo: præpara, ac vtere ut prædictum est. *Aliud Phthysicus, & ad Fluxiones Thoracis.* Seminis cucumeris hortensis decoricati drach. octo, amyli drach. iiii: seminis lini, seminis papaueris albi, vtriusq; drach. ij: tusa & cribrata excipe tragacanthæ cremore, & in drachmales pastillos redige. Datur oboli tres, non febrientibus ex vino & myrti cremore, febrientibus cum rhois succo. *Aliud.* Amyli drach. iiii: seminis cucumeris fatiui tosti, seminis papaueris albi tosti, amygdalarum depurgatarum, singulorum 3 ij: tragacanthæ drach. j, obol. iij: croci drach. j: excipe tragacanthæ cremore, & postea etiam vino scybelite cocto. Vtere eodem modo. *Aliud Scribonij Largi Cataportium, Phthysicus, Sanguinem reiectantibus, Suppuratis, educit Pelliculas, Repurgat sufficienter. Verum immorari pharmaco oportet.* Sagapeni, myrrhæ, vtriusque drac. ij: opij, cardamomi, vtriusque drac. iiii: castorii drac. iiii: piperis albi obol. iiii: *G* excipe passo, fac catapotia. Da ex aquæ calidæ cyathis iiii. *Alia confectio Thespiana, facit Suppuratis, & ad Abscessus occultos.* Seminis apii, opii, melanthii, 7 singulorū drach. iiii: castorii drach. ii: seminis dauci, sinonis, iridis, singulorum drach. vi: excipe melle cocto: præbe nucis ponticæ magnitudine ex calidæ cyathis iiii. *Alia Cōsi, ad Humores a grē educiles, Suppuratos, Peripneumonicos. Maxime autem ijs, qui Crassa & glutinosa educunt, vtilis est.* Mellis attici cocti ad glutinis compagem librā vnam: piperis contuli & cribrati, myrræ, vtriusq; vnc. j: myrrhæ & piper trita melle cocto excipe, & nucis pōticæ magnitudine in pillulas diuidens deuorāda pbe. In alijs exemplaribus habetur. Mellis lib. j, piperis vnc. j: myrrhæ, opopanacis, vtriusq; 3 vi: præpara, ac exhibe similiter ut prædictū est. *Pastillus ex Mandragora, inscribitur Sphragis. Facit ad Hæmoptoicos, Anaphoricos, Empyicos. Resiccant omnem Fluxionem.* Radicis mandragoræ corticis drach. iiii, 7 seminis hyoscyami drach. iiii: 7 thuris masculi, succi papaueris, croci, myrrhæ, singulorum drach. v: trita redige in pastillos obolares, & præbe conuenienter iuxta affectiones. *Aliud Ptolemæi familiaris.* Styracis, opii, thuris, croci, singulorum drach. v: corticis mandragoræ, seminis hyoscyami albi, dauci cretici, singulorū drach. iiii: casia drach. ii: excipe vino aminæo, ac præbe obolum cum aquæ calidæ cyathis duobus. *Aliud ad easdem affectiones.* Styracis drach. vi: myrrhæ, opii, seminis hyoscyami, irionis *H* torrefacti, singulorum drach. iiii: corticis mandragoræ, opopanacis, vtriusque drach. ii: piperis albi, spumæ nitri, vtriusque drachmam vnam: excipe melle cocto. Dato magnitudine ciceris.

† *Græci cod. an-*
tiqui ita hēnt,
feminis hyo-
scyami albi 3
iiii, lauri creti-
ci 3 iiii.

Alia confectio Panchrestus ab omnimoda commoditate dicta. Facit ad Tussim antiquam, Suppuratos, Orthopnoicos, Tabescentes. Prodest Hypochondriorum hoc est præcordiorum distentionibus, & ad omnem Inflationem. Mulieribus menses, & quæ à sæctu corrupto, aut à partu relinquuntur, Secundas deducit. Liberat etiam ab Affectionibus circa vesicam. Terebinthinæ drach. viii, styracis drac. vi, myrrhæ drach. v: croci, iridis, chalbani, singulorum drachmas iiii: seminis hyoscyami, corticis mandragoræ, irionis torrefacti, opopanacis, singulorum drac. ii: piperis, spumæ nitri, vtriusque drachmam vnam: excipe passo.

Charixenus, facit Peripneumonicis, Phthysicis, Anaphoricis, Empyicis, Hæmoptoicis, ac Veteri Tussi. Myrrhæ, corticis thuris: in alio exemplari opii, mandragoræ, sagapeni, seminis hyoscyami albi, opopanacis, dictamni cretici, pilularum marrubii, singulorum drach. iiii: subigito cum aqua, & in pastillos cogito. Dato ex his obol. iiii ex aquæ mulsæ cyathis tribus. *Alia Asclepiade, qui Philophysicus, à naturalium rerum studio, appellatus est, Pharmacum accommodatum.* Corticis mandragoræ, seminis apii, vtriusque drac. quatuor: myrrhæ, croci, anisi, seminis dauci, succi rhois rubri, seminis hyoscyami, piperis albi, castorii, sagapeni, opopanacis, singulorum drachmas j: excipe melle cocto. Dato pro viribus.

* *Aliter philo-*
sophicus.

Al. s. fu. 2. t. 5.
fol. 554. b

A viribus. Liquor verò ex quo exhibetur, sit conueniens affectioni. *C^o Antidotus Thibesiensis, Phthi-
siccis, Sanguinem reiectantibus, Suppuratis. Facit & ad Alias internas affectiones, & præ omnibus Cibi appeten-
tiam excitat. Seminis apii 3 xii: myrrhæ, anisi, opii, singulorum 3 vi: piperis albi 3 v: petroselinii, nar-
di, piperis longi, singulorum drach. iiii: castorii, floris iunci odorati, croci, singulorum drach. tres:
cinnamomi 3 ii, calicæ aromaticæ 3 iiii: excipe melle cocto. Dato nucis ponticæ magnitudine ad
noctem, cum aqua cyathis tribus.* *C^o Antidotus Aristarchi, Compositum admiranda, hanc Paulinam ap-
pellamus. Facit Hæmoptoicis, Tussientibus, Phthysicis, Suppuratis, Peripneumonicis, ad Convulsam, Ruptam, ad Sto-
machi subuersionem, & Bilem vomentes ac secermentes, Celiacos, Dysentericos. Facit ad Affectiones circa Ves-
sicam, Suffocationes Vteri, Febres per circuitum repetentes, vna hora ante exacerbationem exhibita. Facit in Ma-
lum habitum delapsis, Cibum non sentientibus, & ad Lethalia pharmaca, ac Plagas Venenum iaculantium bestia-
rum. Cinnamomi, costi, chalbanii, castorii, succi papaueris, piperis nigri & longi, styracis, singulo-
rum vnciam vnam: mellis sextarium vnum: arida tunduntur & cribrantur per angustissimum
cribrum: chalbanum coquitur cum melle, & vbi dissolutum fuerit, mel excolatur, ipsi q̄ reliqua
adduntur & tunduntur: deinde in pyxidem vitream aut argenteam reponuntur. Vfus est ad præ-
dictas affectiones. Datur fabæ ægyptiacæ magnitudine, cum aqua mellæ cyathis duobus, irro-
tis de digito guttis acetii nouem.* *C^o Alia Antony Musæ Panacea. Vfus est ea Diōtas lustraliptes. Facit ad* ** Al. Theophr.*
*eos qui per circuitum à Rigore infestantur, delet Febres antiquas, ac Reliquos morbos. Facit ad Tussim veterem,
Phthysicos, Sanguinem reiectantes, Suppuratos, Dyspnoicos, Convulsam, Ruptam, Inueteratas inflammationes, Sple-
nicos, Hydropicos inueteratos, Celiacos. Extrahit Lapides e renibus, probe cit Vrinam. Prodest omnium Repti-
lium plagæ, & ad Lethalia Venena, & ad omnem Materiam Venenosam ac corruptoriam vim habentem. Pipe-
ris albi aut longi 3 viii: seminis hyoscyami albi, cinnamomi, cardamomi, myrrhæ, thuris, singulo-
rum 3 xii: opii, croci, vtriusq; 3 x: sulfuris viui 3 vi: costi, aristolochiæ longæ, corticis mandragoræ
aut ipsorum malorum vel foliorum, euphorbii, singulorum drac. iiii: mellis attici cocti quod satis
est. Datur iis qui per circuitum infestantur, magnitudine nucis ponticæ, reliquis pro viribus.*

*C^o Alia Cerusiana, data est a Philippo Tralliano. Huius Vsu Phthysicos & Suppuratos liberabat. Piperis al-
bi, succi cyrenaici, syriaci, succi papaueris, singulorum quadrantem: myrrhæ, croci, sulfuris viui, se-
minis hyoscyami albi, singulorum vnciam dimidiam: malorum mandragoræ drach. ii, cardamo-
mi vnc. j, mellis attici libram vnam. Datur pro viribus vt dictum est. Porro alterum exemplar sic
scriptum habebat. Piperis quadrantem, succi cyrenaici vnc. j, succi papaueris vnc. dimidiam, suc-
ci syriaci vnc. dimidiam, croci vnc. vnam, sulfuris viui vnc. dimidiam, myrrhæ vnciam dimidiam: ** Al. dimidia*
*C^o seminis hyoscyami albi, malorum mandragoræ, vtriusq; drach. ii: cardamomi vnc. j, mellis attici
lib. j. Datur pro viribus, vt dictum est.**

De Orthopnœa seu Asthmate.

CAP. 6.

Qui citra febrem densè respirant, qualiter faciunt qui velociter cucurrerunt, ab accessione
hac medicis Græcis asthmatici, {Latinis anhelosi} appellantur. Eisdem etiam ab alia ac-
cessione orthopnoicos vocant, propterea quòd thoracis corpus penitus rectum habere
coguntur ob timorem suffocationis: quin & stratum circa supernas partes ad quas thorax reclina-
tur, sibi ipsis crectius faciunt, ne dormientes strangulentur: minus est enim quod inspirant quàm
pro vsu respirationis, quamuis thorax plurimum ipsis dilatetur. Ex quo manifestum fit intrinse-
cus ipsis coarctationem locorum factam esse præter naturam, quam etiam ægri ipsi non obscuro
sensu percipiunt. Fit equidem & suppuratis locorum coarctatio ob coaceruatam inter thoracem
& pulmonem humorem. Fit etiam peripneumonicis ob pulmonis inflammationem. Restant
autem adhuc duæ affectiones, quæ locorum coarctationem efficiunt in viis, per quas aer inspira-
tur, cum sanè aut humorum crassorum ac viscosorum multitudo pulmonis bronchijs fuerit in-
farta: aut tumor abscessui similis in ipso cõstitit. Ceterum curatio ambarum affectionum aliquid
commune habet, aliquid priuatum, & alteri tantum proprium. Commune quidem vtriusq; est, vt
redundantia humoris affectiones generantis expendatur & consumatur. Proprium autem affe-
ctioni viscosorum ac crassorum humorum, vt per attenuantia & extergentia pharmaca consuma-
tur: ei verò quæ propter tumorem abscessui similem contingit, vt per attenuantia & reliccantia ea-
dem consumptio fiat: quæ curatio rursus omnibus in profundo corporis abscessibus communis
existit. Vini itaq; potus ambabus conuenit tenuis substantia. Omnis autem potus modicus sit in
ijs, qui alicubi abscessum habent: multus contra in ijs, quibus bronchia viscolis ac crassis humo-
ribus sunt obturata. Etenim pharmaca quæ eiusmodi ipsorum humores abstergunt, necessariò
quidem tusses mouent, non verò facile per sputum reicitur quod abstersum est, ob crassitudinem
videlicet: quapropter humectatione multa opus habent, quò facile efferatur. Porro quemad-
modum in alijs pharmacis plurimi medici sic etiam in iis quæ ad ambas has affectiones commo-
da sunt, delinquant, indiscriminatim ipsa tradentes, cum tamen composita sint quædam pharma-
ca, alteri affectioni commoda, quædam rursus alteri, quædam verò sic vt ad ambas quidem mode-
ratè conueniant, verum nihil operæpretium efficiant. Quare recensendo pharmaca alicuius pre-
tij à prioribus medicis prodita, indicabo iuxta singula, quali facultate prædita sunt, initio ab iis
quæ Asclepiades scripsit in Secundo Internorum, factò.

Quinta Classis.

aaaaa ij Asclepiades

Al. s. fu. 1. t. 1.
fol. 554. a

¶ *Eclegma ad Dyspnoicos, Antonij Muse.* Asellorum sub hydriis nascentium sextarium vnum in vas fictile conijcito, & ad prunas torreto: inalbato autem terito, ac melle cocto excipito: & ante cibum mystrum delingendum dato. *Aliud.* Scillæ crudæ succum exprimito, ei q̄ parem mellis atticī mensuram addito, & ad prunas admota coquito. Dato inde ante & post cibum mystri mensuram. ¶ *Aliud Charixenis.* Origani 3 viij: comæ thymi, iridis illyricæ, calaminthæ siccæ, piperis albi, anisi torrefacti, singulorum tantundem: tundito, & per angustissimum cribrum concernito, ac melle cocto excipito. Dato nucis ponticæ magnitudinem. *Aliud.* Piperis albi libræ j, libyistici trientem: calaminthæ siccæ, anisi tosti, pulegij semen nō gerentis, singulorum quadrantem: seminis apij, comæ thymi, vtriusq̄ vnciam vnam: excipe melle, & preparato vtere vt prædictum est.

¶ *Potio ad Dyspnoicos, Chariclis Pharmacum accommodatum: auxiliatur confestim.* Vux passæ rhodiæ exacinata acetabulum, fœnigræci loti tantundem, aquæ pluuiæ sextarium j: coquito donec dissoluantur, & liquorem excolatum reponito. Ex hoc præbeto assidue & iuxta singulas iritationes cyathi mensuram calefactam. *Alia Potio.* Abrotoni partes duas, vux passæ pinguis tantundem, summitatum rutæ partem vnā, aquæ pluuiæ sextarios iij: coquito ad tertias, & exprimito liquorem: ei q̄ mellis vnc. j addito, rursus q̄ coquito: ac dato, vt prædictum est. ¶ *Catapodium Dyspnoicis, & Asthmaticis.* Abrotoni, virgultorum rutæ, comæ absinthij, singulorum drach. iij: tusa & cribrata aceto subigito: & catapotia xij formato. Dato ex aceto mulso. ¶ *Aliud Nucerati.* Castorij, ammoniaci thymiamatis, abrotoni, singulorum drach. ij: absinthij, cumini æthiopici, vtriusque drach. j: aceto subigito, ac catapotia formato: ac dato ad ciceris magnitudinem. ¶ *Pharmacum ex Sulfure viuo Dyspnoicis.* Anisi, sulfuris viui, vtriusque quadrantem: ammoniaci thymiamatis, castorij, melanthij, singulorum 3 iij: aqua diluta in catapotia cogito: vnum q̄ in aceti mulsi cyath. iij dato. *Aliud.* Seminis rutæ syluestris drach. iij: aristolochiæ, abrotoni, absinthij, ammoniaci thymiamatis, sulfuris viui, singulorum tantundem: aceto subigito, & catapotia ciceris magnitudinis formato: ex quibus duo cum aceti mulsi calidi cyathis tribus exhibeto. Hæc omnia pharmaca ab Asclepiade conscripta ijs, qui propriè dyspnoici, hoc est egrè spirantes, appellatur, conueniunt. Vocant aut sic eos quibus bronchia pulmonis crassis & viscosis humoribus sunt obfarta: in quibus velut dixi, vltra hoc q̄ crassitudinem & viscositatem humorū necessariò secamus atq̄ attenuamus, humiditatem quandā cum pharmacis, tum victui, adesse oportet. At verò abscessus qui attenuantibus & resiccantibus opus habent, maximè gaudent aromatum facultatibus: quas omnes ostendimus tenuium partium esse, & resiccatorias, vnā cum hoc q̄ calfaciant. Quare ijs qui proprie orthopnoici & asthmatici appellantur, pharmaca conuenient secātia citra calfaciōnem: & ob id maximè eos iuuat acetum scylliticū appellatū, atq̄ ipsa adeo scylla, & acetū mulsum ex eiusmodi aceto confectū. Ceterū asellorum sub hydriis nascentium meminit inter ea, † vt qui attenuatoriam & discussoriam vim habeant: verū quo consilio ad vsum ipsorum peruenierit, non habeo quod dicam. Quemadmodum autem in hac affectione vehementer cauendum est ne calfaciamus, propterea q̄ viscosi & crassi humores non solum nihil ab his auxilij sentiunt, sed etiam offenduntur: Eodem modo etiam quæ valdè refrigerant vitanda sunt: omnia. n. crassesciunt, & coeunt, ac coagmentant humores, eos q̄ ægrè eluibiles reddunt. Et ob hanc rem sanè rectè fecerūt, qui eiusmodi pharmaca composuerunt, q̄ neq̄ papaueris succum, neq̄ mandragoræ succum, aut radicis corticem, aut hyoscyami semen, aut cicutæ, aut psyllij, aut semen lini, admiscuerunt: & multo magis, q̄ neque ex adstringentibus quippiam pharmacis addiderunt: maximè enim contraria sunt eiusmodi affectionibus, vt palam videtis.

Quæ Pharmaca Andromachus ad Huiusmodi Affectiones conscripsit.

¶ *Ad Dyspnœam.* Sulfuris viui drachmam j, seminis rutæ syluestris drach. j: aristolochiæ, absinthij, ammoniaci thymiamatis, abrotoni, singulorum drach. iiii: trita cum aceto ad catapotia magnitudine fabæ redige. Dato manè tria, & vesperti totidem. ¶ *Aliud ad Dyspnœam, vt Alcimus.*

Colocynthis carnis obolos iij, panacis obol. iij, anisi obolum vnum: fac cum aqua catapotia iiii: & resiccatorum † obol. j. præbeto. Præcedente autem die æger simplici euacuatorio euacuetur. *Aliud.* Colocynthis sesquidrachmam, iridis illyricæ drach. ii: radicis opopanacis drach. ii, abrotoni drach. vnam: nitri drach. j, alii obol. iij: excipe aqua, & redige ad fabæ magnitudinem. Dantur catapotia quatuor, & post semihoræ spatium datur aquæ mulsæ hemina dimidia. *Aliud.*

Sinapis drachmam vnam, salis communis obol. iij: elaterii obol. iij, alii obol. j & dimidium: terito cum aqua: fac pastillos viii: dato alternis diebus cum hydromelite. *Aliud.* Ammoniaci thymiamatis drach. j, abrotoni drach. ii, sulfuris viui drach. j: formato cum aqua pastillos, & cum aquæ mulsæ cyathis tribus præbeto. ¶ *Aliud ad Orthopnoicos.* Elaterii oboli dimidium, asellos ex sterquiliniis iij, terito simul: & dimidium ex aquæ cyatho vno dato. ¶ *Aliud vt Philinus ad Anhelos & Dyspnœam.* Cardamomi 3 iij, iridis sesquidrachmam, panacis sesquidrachmam, casie sesquidrachmam, struthii sesquidrachmam, styracis 3 ii, thymi drach. viii, seminis rutæ syluestris drach. octo, abrotoni drach. viii: aristolochiæ clematidis, sulfuris viui, ammoniaci thymiamatis, singulorum drachmas viii: cum acri aceto ad cerati crassitudinem redige: præbe fabæ ægyptiæ magnitudinem

A. l. 3. fu. 2. 2. j.
fol. 55 4. c

A. l. 3. fu. 2. 1.
c. 40. fo. 261. d

† tanquam.

† ΑΙ. τὸ δ' ὅλον,
i. totum.

* ΑΙ. πάντα
καὶ ἰ. panacis.

Adine ex aqua cyath. iij. *Ad Orthopneas, ut Apollonius.* Scyllæ partem vnam: sulfuris viui bitu-
minis, singulorum partem vnā. Dantur oboli tres in aceto mulso. *Ad Orthopneam, quæritur.*
Opopanacis 3 j, myrrhæ 3 j, piperis grana xl, rutæ fasciculum quantus duobus digitis apprehendi
potest: ex tritis catapotia xx formato. Dato manē item q̄; vesperi vnum, febricitantibus in aqua
cyathis duobus, alijs ex vino. *Ad Orthopneam, Andronici.* Sulfuris viui obol. iij, ammoniaci thy-
miamatis 3 j: anisi, myrrhæ, castorij, singulorum 3 j: cumini aethiopici 3 j: cum aqua paillos cogi-
to scrupulorum trium aut quatuor. Dato ad noctem ex aqua cyathis duobus. *Ad Orthopneu-*
cos, Tuscentes, Peripneumonicos, Tabescentes, Aegre spirantes, Hepaticos, ut Eugenius. Croci 3 viij, misyos
3 iij, baccarum lauri 3 ij: piperis albi, & longi, vtriusq; 3 j: opij 3 iij, costi obol. iij, terebinthinæ obol.
v, chalbani obol. iij, succi radiceis dulcis obol. ii, gummi obol. j, mellis lib. dimidiam. Dato cochlea-
rium vnum cum aqua cyathis duobus aut tribus: si res vrgeat, ante & post cibum. *Ad Ortho-*
pneicos, Valerius. Opopanacis 3 ij, carnis colocynthidis 3 j. Tantum datur ad summum. *Aliud*
Onetri. Castorij 3 j, ammoniaci thymiamatis 3 j. Detur dimidiū ex aqua multa. *Ad Dyspnæam,*
Podanthe. Sinapis 3 j, salis 3 j, nitri obol. iij: redigito in catapotia viij. Dato ex his duo ad noctem
& intermittens diem, postea etiam sex deinceps dato: } aqua excipe.

in quibusdā
antiquis codi-
cibus, ut au-
tē est, & cum
mellis, ut an-
thij drachmas
vnam.

Al. Onetri.

In cod. græ-
co athenico no-
tatur, etia
καὶ ἐξ ὀπίου.
in manuscrip-
tis etia καὶ
ἐξ ὀπίου, &
postea con-
sequenter dato,
id est post ali-
dato duo, &
ita consequen-
ter.

GALENI DE COMPOSITIONE MEDICA- MENTORVM LOCALIVM SIVE SECVNDVM LOCOS LIBER OCTAVVS

ARGVMENTVM LIBRI

Refert ea Medicamenta, quæ facere ad Ventriculi, ac
Hepatis Affectiones prodita sunt.

De Pharmacis Stomacho congruis.

CAP. I.



Quod semper dico, etiam nunc proloquar, nimirum persuasum me habere q̄
difficillimum sit ad veritatē reuocare eos qui sectæ alicuius seruituti se addi-
xerunt. Verū qui prudentes sunt, simul q̄; veritatem sincere amant, eos spe-
ro custodituros esse ea quæ veluti iudicandi insira nobis à natura data sunt
ad actionum vitæ cognitionē, experientia dico, & rationem. Quæ quidem
vtraq; ex æquo quibusdam conferunt ad artē, quibusdā verò alterum altero
amplius: & tñ tanq̄; semper ad perfectionē alterum altero opus habeat. Sic
sanē ad residuum sermonis & doctrinæ huius absoluendū progrediar. Falsē
etenim opiniones animas hominū præoccupantes, non solū surdos, sed & cæcos faciunt, ita vt vi-
dere nequeant quæ alijs conspicuē appareāt. Quod ipsum vel maxime circa affectiones oris ven-
tris videre contingit, præsertim cū fuerit inflammatū. Eius. n. item q̄; iocineris inflammationes ad
stringentium complexu opus habent: si nanq̄; per laxatoriū medicationis ductū, citra admistio-
nem facultatis robur addentis, curentur, periculum incurrunt de ipsa vita. Atq; hoc ipsum cū om-
nes empirici medici per experientiam edocti sint, & omnes dogmatici in ipsis artis operibus ob-
seruent, non pauci tñ huius temporis methodici (neq; enim de omnibus dico) innumeros quidē
stomachicos ipsi in tanimi deliquium } inducunt, omnes verò hepaticos occidunt: nullum enim
ego vidi seruatum ex iis qui in eiusmodi medicum inciderunt. Quidam tamen ex ipsis quanquā
pauci, oleo eos fouent in quo ablinthij coma est seruata, & lanam nardino vnguento imbutam
obligant. Quidam verò etiam mastichen chiam, aut aloen admiscunt, aut etiam pro nardino me-
linum adhibent. In diutibus verò mulierculis foliatum & spicatum ab eisdem appellata vnguen-
ta admouent: atq; cū hæc faciunt, laxatorium ductū se seruare putant, tantum scilicet habent
experimenti facultatis pharmacorum. Malim autem ego omnes sic indoctos esse, quā q̄; adstrin-
gentia quæ sint, sciant, vsum tamen ipsorum vitent. Quæcunq; igitur adstringentia in fomen-
ta & cataplasmata misceantur, in hepatis aut oris ventris, quod sanē & stomachū vocant, affectio-
nibus, non est præsentis sermonis explicare. Quæcunq; verò in emplastra & ceratiformia medi-
camenta, quæ forinsecus imponuntur, commoda sunt, & quæcunq; vtiliter deuorantur, hæc ipsa
indicabo, ea quæ inflammatus profunt primum tradendo, quandoquidem etiam in ipsis agri ma-
ximè periclitantur. Ceratum igitur quo assidue vtor, ex aloë, & mastiche, & cera pontica amara,
atq; vnguento nardino, constat. Componitur autem hyeme, ad vii drachmas ceræ, vncia j men-
surali Romana vnguenti nardini coniecta: Æstate autem ad vii, eadem vnguenti proportionē.
Optimum aut vnguentum esse oportet, quale antea quidem in sola Laodicea Asiæ præparabatur:
nunc verò etiam in alijs multis Asianis vrbibus similiter componitur. Cera si non pontica ama-
ra tibi in promptu sit, quam ponticā cōijce: & neq; illa præsentē, eam quæ tyrrenica appellatur:

Quinta Clasis.

aaaaa iij i. verò

synopsen.

si verò neq; hæc adsit, aliam aliquam odoratā & pinguem: si neq; talem habeas, eam quam habere E potes lotam adde. Liquefiat autem in duplici vase, atq; ita refrigeratum & erasum ceratum cum tritis reliquis probè permisce, cum aloe videlicet & mastiche. Sit aut vtriusq; drach. j, & quādoq; plus, non tñ vt sesquidrachmam transgrediaris. Quod si ampliori opus sit adstrictione, nimirum debilitate tanta existente, vt cibum retinere non possint, omphacium pari pōdere addatur, vt triū singulorum drachma sit vna, aloes vna, mastiches vna, & tertia omphacij. Cæterum in cerati præparatione primū omphaciū misceatur, deinde etiam alia his vniantur. At verò quemadmodum omphacium, sic etiā ablinthij succum admisceto, qñq; etiam ambo, & tertium insuper hypocistidis, & quartum cenanthes: sic autem appello vitium syluestrium † germen vnā cum floribus, ex quo succedentibus diebus vna fit: quin & rhois succum non rarò admiscui. Sed & cerati nardini copiam augere oportet iuxta proportionem numeri reliquorum pharmacorum, ita vt si quatuor drachmæ aliarum rerum accumuluntur, triens sit nardini cerati, sextans quidem ceræ, sextans itē nardini vnguenti, hoc est vtriusq; drach. xvj. Porro si inueterata fuerit inflāmatio & iam obdura- rata, magis varia pharmaca adhibere oportet, & quæ ex aromaticis quippiam habeant, ac mollien- tibus, & discussorijs: quale est quod fit ex meliloto. Est autem compositio ipsius multiformis, pro- pterea q̃ omnibus iuxta præcordia inflāmmatis conuenit, non magnis adeo differentijs euarians, F ita vt aliqua ipsi præparatio inflāmato hepatis sit cōmodior, alia stomacho, aut aluo, aut spleni, aut quibusdam istius loci musculis, quæ oēs communi descriptione comprehensæ sunt in malag- matum compositionibus. Verum in præsentī loco ea quæ prioribus medicis ad oēs stomachi affe- ctiones scripta sunt, & non solum forinsecus impolita, sed etiam in potu accepta auxiliantur, om- nia conscribentur: quædam verò ex ipsis communia sunt etiam affectionibus ventris.

De Stomachi Affectionibus sine inflammatione.

Sæpenumero iam dictum est, q̃ medici in more habent os ventris, veluti cardiacum, hoc est cor, sic etiam stomachū appellare: verū quondam frequentior cardiacæ appellatio erat: nunc autem ab ea adhuc restant, cardioflema id est corde dolere, & cardialgia id est cordis dolor: qbus vocibus nō cordis, sed oris ventris, dolores significantur. Particulam autem ipsam stomachum vocant æqui- uocē cum illa particula, quæ cibum ex ore in ipsam defert. Scripserūt igitur priores medici phar- maca ad affectiones in ipso, cum alias, tum subuersiones ab ipsis appellatas: vidētur autem sic vo- care tum appetitus perditionem, tum nauseosas dispositiones, in quibus aliquñ quidem vomitus contingunt. Fiūt autē & morsus quidam in ipso, quemadmodum etiam magnæ famis & anxio- sæ affectiones. In quibus omnibus cōmunis quidam adstringentium pharmacorum vsus inuen- G tus est: admista autem sunt plerisq; ipsorum calfacientia & resiccantia. Fiunt & aliæ affectiones rariores, humectantibus, aut refrigerantibus, aut vtrisque simul, opus habentes. Cæterum qui ab experientia citra rationalē methodum auxilia inueniunt, meritò ea quæ sæpe iuuerunt in memo- riam reuocant, & in vsum conuertunt: eorum enim quæ sæpe eodem modo facere visa sunt, ob- seruationem & memoriam, suam ipsorum experientiam esse aiunt. Quemadmodū autem in ore ventris, sic etiam circa ipsum totum, singula q; intestina, & vt cōprehensim dicam, circa omnem corporis particulam, eadem intemperaturæ obortæ actiones similariū partium offendunt: quas si quis non esse morbos ipsarum credet, nihil circa cognitionem efficit, qua ignorata neq; cura- tionem inueniet. Habēt autem non modicam coniecturam cognitiones ipsæ affectuum in pro- fundo corporis consistētium: & ob id vtilissima medicæ artis pars est, quæ cognitionē docet eius- modi affectionum: Quas neq; q̃ primæ & maximæ sunt, plerique ex vulgo medici sciunt: quare meritò neq; cognitionē ipsarum, neq; curationē inuestigarunt. Coguntur igitur, etiam si dogma- tici sint, † in rationalibus methodis ad solam experientiam peruenire: vt iuste miremur q̃ cum absq; febre & inflāmatōne abscessu q; & vlceratione quispiam debiliter concoquat, aut penitus non concoquat, promissione facta se inuenturos curationem, quærant an contritione ciborū con- H coctio fiat: & deinde vbi hoc vt maximū inuenerint, edulia quæ faciliè conterantur exhibent, neq; quod promptissimum est intelligentes: quod etiam quispiam rei medicæ rudis, aliàs autem pru- dens vir me interrogauit: Quomodo prodest scire per contritionem ciborum fieri concoctionē ad hoc, vt quis affectionem ventris sanet, in qua debilitatur ad concoctionem ciborum: cum nō per exhibitionem alimentorum quæ faciliè conterantur curatio fiat, sed læsio tantū euitetur, velut etiam per paucum alimentum ac inediā. Quemadmodum enim qui inediā perfert, in concoctio- nis quidem debilitatem non incurrit, non tamen ab affectione hoc modo curatur: sic neq; qui in cibo accipit ea, quæ in totum nulla contritione opus habent: quale est lac, pitufanæ succus, & sorbi- tiones ex alica. Hæc quidem igitur in libris de curandi methodo sufficienter tradita sunt, & non obscurum est præsentem doctrinam vtilem esse ijs qui se in illis præexercuerunt. Quemadmo- dum autem in alijs quæ prius tradidi, reuocatis in memoriam singulis illic mihi præmonstratis capitibus, ad pharmacorum compositionem progressus sum, sic etiam nunc faciam. Cum octo sint in singulis partibus corporis intemperaturæ, atq; hæc omnes aut circa solas nudas qualitates, aut cum alicuius humoris complexu fiant, Intemperiem quidem siccam humectare oportet, humi- dam autem siccare: sic & calidam refrigerare, frigidam calfacere: similiter verò etiam compo- sitas

† Additur in aliquibus cod. græcis, ἄνθος n. s. florem uel

* Legitur in antiquis τὸν ἰ. ipsum, i. os uentris.

† Cod. manu- scripti græci habent τὰς λογικὰς ἀφέντες μεθόδους ἰ. rōnales me- thodos præter mittendo, ad solam & c.

Atas intemperaturas aut calfacere & siccare, aut humectare & calfacere, aut refrigerare & humectare, aut liccare & refrigerare oportet. Quando verò velut dixi, plurimæ intemperaturæ hominibus ex redundantia humorum magis, q̃ ex inopia fiunt, pharmaca reliccantia plerisq; magis iuuant. At vero cūm reliccantia partim quidem adstringant cogendo ac adstringendo substantiam eorum quæ contingunt: partim verò discutiant, & in hoc substantiam ipsorum dissoluant: ob hoc ipsum sanè plures sunt qui adstringentibus indigent: verum si humida intemperies cum frigidityte fiat, læduntur qui per sola adstringentia curantur, quæ frigida facultatis existit. Quapropter merito plurima pharmaca per experientiam inuenta ex multa materia componuntur, adstringente videlicet & calfaciente. Verum ipsorum differentiam cognosces, si simplicium pharmacorum facultatem memoria tenueris. Dictum enim iam mihi sæpe est, neminem posse rationabiliter, & secundum methodum vti his, quæ in hoc opere conscripta sunt, si non memoria teneat, quæ in duobus operibus ante hoc opus æditis prodita sunt, de simplicium pharmacorum facultate, & curandi methodo, dico. Quidam enim absq; discrimine pharmaca ad eiusmodi affectiones stomachi & ventris conscripserunt: quidam vero aliqua discrimina attigerunt à symptomatis id est accidentibus, quæ omnibus apparent. Quò igitur & vos cognoscere sciatis facultates vniuscuiusq; pharmaci per experientiam longam approbati, etiam si non inueneritis differentias affectionū, in quibus conueniunt, adscriptas, primum quidem ea quæ Andromachus prodidit, adscribam: deinde, quæ Asclepiades: & post hæc, si ita videbitur, etiam alia quædam.

Confectiones Stomachicæ Andromachi.

CAP. 2.

Andromachus postquā præscripsit, Stomachicæ, post hanc præscriptionem, sic auspicatur. *Ad Stomachicos Hiera, qua vtor.* Et deinceps totam eius compositionem adscribit in hunc modum. Floris iunci odorati, xylobalsami, mastiches, croci, nardi indicæ, afari, cinnamomi, singulorum 3 vj: aloes lotæ 3 c: simul trita repone. Præbe ieiunis cochlearia duo, alij vnum præbent cum aquæ frigida cyathis quatuor, aut calidæ. Hæc quidem Andromachus scripsit, neq; quos stomachicos nominet ostendens ac declarans: neq; an omnibus ipsis hoc pharmacum cōueniat, an pluribus. Itaq; id mihi necessarium est dicere: cū ex ijs, qui stomachici dicuntur, aliqui quidem statim magnopere ex prædictæ hieræ vsu iuuentur, aliqui vero ledantur. Pleriq; equidem vulgo homines eos qui appetentiam perdididerunt ita vocant: & quibus post acceptum cibū ventris os grauat, atq; opprimitur, & quandam ægre tolerabilem anxietatem habet. Appellant eodem modo et illos quibus nausea contingit, & maxime si ad vomitum impellat: & adhuc magis si simul cibi corrumpantur, qñq; acidi, qñq; nidorosi facti, qñq; etiam aliam vitiatam qualitatem adepti. Et præ his omnibus adhuc magis illos stomachicos nominant, quibus ructus eiusmodi cum molestia quadam & anxietate ac subuersione contingunt sæpe, cū non dum cibum acceperunt.

Quin et si per plurimum tempus cibi in ore ventris morentur grauantes & vix descendentes, hos etiam stomachicos appellant. Alios item appetitum caninum appellatum habentes, vt & plurima edant, & maxime grauati paulo post reuomant, similiter vocat. Alios rursus qui fortiter exoluuntur, vbi diutius in ediam pertulerint: & si non citius cibum accipiant, in ore ventris morsus percipiunt: eodem modo stomachicos vocant. Horum ipsorum verò aliqui facile nauseosi sunt, {nisi} citius potum ac cibum acceptent. Itaq; qui secundū rationalem methodum auxilia inuestigat, ad affectionis inquisitionem procedit: qua inuenta abundaturum se sperat proprijs ipsi auxilijs. Qui vero per solam experientiam auxilia accumulatur, ipse suā fortuitam occasionē expectat, & à prioribus tradita relegit. Cū verò plurima ab ipsis indiscriminatim prodita sint, & in plerisq; etiam inter se differant ac dissentiant, meritò etiam ipse aliàs aliud sentit, maxime vbi ab ipsis auxilijs aliqui quidem iuari stomachicos videt, aliqui verò lædi: Quemadmodum in propolita hiera contingere solet: quam equidem oēs qui nunc Romæ medicantur, picrā hoc est amaram, nominant, quando quidem hieræ appellationem pharmaco ex colocynthide id est ex cucurbita syluestri, censuerint adscribendā. Verum qui ante nos Romæ medicinā exercuerunt, ambo ea pharmaca hieras appellarūt, & distinctionis gratia alteri ex colocynthide, alteri ex aloë, appositionem addiderunt, sic scribentes: Hiera ex colocynthide: Hiera ex aloë. Hiera itaq; ex aloë dupliciter præparatur, Ab aliquibus, velut Andromachus describit, ac centum aloes drachmas singulorum aliorum drachmis sex admistis: Ab aliquibus verò nō sex, sed octo. Quidam verò in octoginta aloes drachmas, sex aliorum addunt. Plurimi autem ad pharmaca, quæ aloë miscentur, & sex numero sunt, etiam florem iunci odorati apponunt. At verò ipsam aloë Andromachus quidem lotam, aliqui verò ex alijs etiam sic, aliqui verò illotā adijciunt. Verum nosse operepretium est ad vtrius subductionē illotam aloë aptiorē esse: multū verò de medicamentaria vi deponere lotam, quam etiam febricitantibus dare aliquis audeat, si non vehemens, sed valde debilis, sit febris. Quidam verò etiā ex illota aloë pharmacū multis sic febricitantibus exhibuerunt, deinde q̃ cum nihil manifeste lesissent, in alijs rursus magnam experti sunt cladē. Infelicitissima est enim aloë, etiam lota, ijs qui citra vitiatos humores ex intemperie calida & licca affligunt. Proximam ab his cladē percipiūt, qui siccam intemperie habent cū frigidityte implicata: Et in vniuersum qui ex sola qualitate particulā aliquam affectā ac lesam habent. Etenim in humoribus intemperaturæ, pharmacis ipsas eu-

Quinta Classis.

aaaaa iij cuantibus

euantibus egent: quæ verò absq; his consistunt, penitus in tabem deueniunt ex pharmaci huius E ex aloe constantis vsu. Itaq; vbi humiditas vitiatas tunicas ventris perrigat, Picra ex aloe utilis est, expurgans humiditatem: Omnino autem sic affectis accessio nausæ plus aut minus adest. Euacuatio igitur affligentis humoris per solam aloen contingit, quæ purgatoriam vim nō fortem habet, sed vt ea quæ circa aluum sunt, quæ etiam contingit, purgare possit. Et si aliquando ampliori pondere exhibeatur, vsq; ad locos circa hepar conscendit: non tamen totius corporis purgatoria aloe existit. Cæterum ex ijs quæ ei admiscuntur, mastiche vt stomacho commoda & odora, & quæ medicamentariam aloes vim frangere queat, admiscetur. Cinnamomum verò eadem gratia: & propterea q̄ tenuissimarum partium est, vt aperire ventris meatus possit, extergere q̄ ac attenuare si quid viscosum aut crassum in humoribus feratur: crassos enim humores ob purgatorie facultatis imbecillitatem aloe trahere non potest. Quapropter biliosarum ventris affectionū optimum pharmacum est, adeo vt in vno die sæpe multos stomacho ita affectos credita sit pernasce. Iuuat aut & hos & alios omnes affectus ex vitiatas humoribus ortos cinnamomum admistū, vtpote quod alterantem habet facultatē vitiosarū qualitātū in id, quod secundum naturā habet. Quare scire oportet affectiones in humoribus vitiatas circa ventrem & stomachum, maxime per medicamenta ex aloe iuari: in maximū verò detrimentum peruenire ex adstringentium eduliorum, potuum, ac pharmacorum vsu: Quemadmodum vice versa, in quibus humiditas multa, & velut mador quispīam est circa affectā partem, citra vitiatos humores, qui ipse sola quātitate & copia affligat, & velut irriguum ventris os reddat, vtilissimus adstringentium eduliorum, potuū, ac pharmacorum vsus existit, languida nimirum & exoluta tunc reddita affecta particula ad modum laxatorum articulorum: in quibus ipsis etiam adstringentium vsus corrigit affectionē. Cæterum picra confectio (de hac enim nobis sermo est) velut cinnamomum, sic ēt alia partim vt stomacho commoda, partim vt tenuium partium & extergentia, assumit: quæ robore quidem multum à cinnamomo deficiunt, idem verò facultatis genus habent. Secundā^a præscripta cōpositione Andromachus sic ad verbū tradidit. *¶ Aliud ut Lampon Pelusiota.* Cinnamomi, calami aromatici, calisæ nigræ, xylobalsami, floris iunci odorati, palmæ elates, singulorum quadrātem, alij vnciam vnam: omnia in crassas partes tusa in ollam nouam conijce: & aquæ pluuiæ sextarijs tribus infusis donec dimidium super sit coque, & excola: & accepta aloes indicæ libra vna, aquam pluuiā sufficientem superfundito: & sub caniculę estus donec reliccetur terito: atq; vbi primum per hanc aquam aloem ipsam edulcaris, postea eam quæ ab aromatis excolata est, aquam affundito, & in Sole donec reliccetur terito: inde q̄ trita hæc quæ sequuntur admisceto: Croci, myrrhæ, mastiches, G singulorum quadrantem, alij vnciam j: conterito simul omnia, & relicca reponito: Atq; in potionibus ad conuulsa, rupta, plagas internarum partium, incipientes laterum dolores vtitor: Item ad inflatos, dolentes stomachum, tarde concoquentes, reiectantes sanguinem, & ischiadicos. Datur ad summum obolus vnus, aut duo, ex aque cyatho vno: reliquis pro viribus præbeto. In vulneribus & inflammationibus dilutum aceto mulso vtiliter imponitur: In oculorum inflammationibus succo mentæ, aut calaminthæ, aut solani, aut alicuius consimilis: In podicis inflammationibus cum rosaceo aut vino aminæo. Vtere ēt in vnguium abscessibus, paronychias Græci vocant, sicco, superne linamento cum rosaceo imposito: Et ad sanguinis eruptiones sicco cum aceto. Et ad crustas in ore, ex passo gargariandum dato. Hoc pharmacum quod Pelusiotæ Lāponis esse ait, ad multas affectiones cōmodum est, polychresta ob id talia Græci appellant: de quibus ēt ante aliquid dictum est, q̄ videlicet deficient ab ijs quæ vnum quoddam optime faciunt, ob multitudinem eorum quæ promittunt. Apparatur autem cum vnū habere viginti affectionibus congruū malum, q̄ tot numero alia: cum tñ ad singulas affectiones vnum aliquod destinātū eo, quod ad plures paratum est, melius existat. Facultas autem ipsius per quam in prædictis efficax est, tenuiū partium existit & calfactoria, secans, extergens, & aperiens, & ob id discussoria redundantium in H quibusdam partibus serosorum succorum ac humorum. Et propterea etiam prædictis in sermone affectibus conuenit, discutiens, vt dixi, vitiosos & serosos succos ac humores affectarum partium. Quare etiam prædictas alui affectiones, in quibus picra confectio moderatam purgationē operatur, curauerit per modicam resiccationem, non per coaceruatam euacuationem. Præstātor igitur est ad huiusmodi affectus picra cōpositio prima descripta. Tertium post prædicta pharmacum Andromachus sic descripsit. *¶ Ad Stomachicos & Celiacos Pastillus amarus, Mollit aluum, facit ad Somnum. Est autem ex libris Aphrodisæ. Facit & ad Vesicam, & Coli affectus.* Seminis apij drach. sex, anisi drach. sex, piperis albi sesquidrachmam, castorij drach. duas, myrrhæ sesquidrachmam, nardi celticę floris sesquidrachmam, opij sesquidrachmam, cinnamomi sesquidrachmam, comæ absinthij drachmas tres, aloes obolos tres, mastiches drachmam vnam: cum aqua pastillos formato triobolares aut drachmales, & dato cum aquæ cyathis tribus. Neque in hoc pharmaco adscripsit Andromachus, quos nam stomachicos dicat ex ijs, qui quidpiam patiuntur: verum ex eo quod compositioni additum est opium, manifestum fit compolitorem huius pharmaci intentionem suam eo direxisse, vt resiccatorium simul & doloris sedatorium pharmacum efficeret, somnum q̄ aliquem induceret, non tamen contentiose contra vnam aliquam ex prædictis affectionibus

Afectionibus instando, quò videlicet breui ipsam excideret. Quartum deinde pharmacum Andromachus scripsit, neq; ad vnam aliq; affectionem contentiose compositum, neq; ad multas moderate. Habet descriptio hoc modo. *¶ Ad Stomachicos Hiera Antipatri.* Aloes bonæ drach. iiii, mastiches drach. duas, asari drach. quatuor: rosarum siccarum, iunci odorati, mei, phu, calix, singulorum semiunciam. Vtere arido trito quemadmodum in hiera ex aloë. Quintum post hæc pharmacum, quod ex plantaginis succo præparatur, & ipsum Apollonij esse ait, tale est. *¶ Succu plātaginis aridi* drach. tres, mastiches drach. duas, myrrhæ drach. j, mentæ drach. j, zingiberis drach. vnam. Videtur mihi Apollonius hanc compositionem experimento cognouisse in stomacho calidiorē affectionem habente, atque ita ipsam indiscriminatim extulisse, non potentem frigidis affectionibus conuenire: refrigeratorius enim est plantaginis succus. Porro quæ sequitur videtur mihi composita esse ab eodem autore, in prioris vsu succellum non sentiente, & recognoscen- te pharmacum refrigeratorium se effecisse, & ob id castorij modicum, & aloes quippiam apponē- te quæ euacuare potest: & mastichen, vt stomacho commodam: ac crocum & myrrham, vt quæ concoquere queant. Quapropter neq; hoc, neq; præcedens pharmacum adhibuerim in stomachi- ca affectione, cum nullam probe curare possint, præterq; multum calidam. Scripsit de ea hoc mo- do. *¶ Succu plantaginis sicci* drach. x, aloes Indicæ drach. j, mastiches drach. i, croci obolos duos, opij obolos tres, castorij obolos tres, myrrhæ drach. j: formato ad magnitudinem ciceris. Simi- liter autem neque consequenter scriptum citra discrimen recte quis adhibuerit in alia affectione, quam quæ moderata liccatione & adstrictione opus habeat, in humoribus quidem modicis, qua- litate verò non vitiatis: componitur enim ex succino & mastiche, sic ipso Andromacho proden- te. *¶ Succini*, mastiches chiæ. Succini plus conice. Dato cochlearium vnum ex aqua tritum.

Cæterum quod sequitur pharmacum, hac descriptione, Stomachica Galli, affectioni quæ cal- fieri & secari postulat, utilis existit, ex fœniculo, aceto, & melle constans, quod ipsum Androma- chus his verbis tradidit. *¶ Stomachica Galli.* Corticis radicis fœniculi libræ dimidium, aceti acris sextarium vnum eius q; dimidium, aloes quadratē, mellis attici libram j. Radices lotas ad triduū aceto macerato, deinde coquito: atque vbi coctæ fuerint, expressas proticito, & affuso ad acetū mel- le simul coquito: deinde aloem inspergito: & cochlearia tria cum aqua dato. Alcetiū sophista ad hanc descriptionem addidit rutæ, & apij, semina gerentium, vtriusq; manipulum, iubens cum radi- cibus macerari ac coqui: & acetij sextarium dimidium, & mellis libras duas conijcit: atque hanc laudat. Post præscripta pharmaca Andromachus sic ait. *¶ Stomachica, vt Nicostriatus.* Succini, mastiches chiæ puræ, iridis illyricæ, singulorum trientem: floris rosarum sextantem. Dato aridi tri- ti cochlearia duo, cū aqua lactosa: statim enim dolorem leuat. Reponatur in corneo vase. Et hoc pharmacum palam est adstringentiū quodammodo esse: optat quæ affectionem humidiorē in humoribus non multis, neque valde mordacibus: in quibus sane experimentum pharmaci fecisse eius authorem opinor: aut certe assiduo eius vsu ægrum a dolore leuasse, atque inde vniuersalem pronunciationem ipsi apposuisse, quò videlicet statim ægrum dolore leuet, cum non possit id in multis præstare. Postremum deinceps pharmacum ab Andromacho scriptum hoc modo est.

¶ Ad Stomachicos. Corticis radicis fœniculi drachmas duas, vini cyathos tres, coquito ad tertias, vt vnus cyathus super sit: ac totum præbeto. Et hoc ex calfacientibus est, opus q; habet affectione quæ cal fieri exoptat.

Stomachica Pharmaca ab Asclepiade in Primo Internorum conscripta.

CAP. 3.

A Selepiades porro de Stomachicis scripturus, de ipsis sic orditur: Ad stomachi subuersiones. Quas verò subuersiones dicat, non manifeste indicauit. Potest enim & appetitus perditionē ita appellare. Potest et nauseosas affectiones ab accepto cibo fientes: aliquando enim hoc vnum so- lum symptoma accedit accepto cibo, vt si paulo fortiori motu moueantur, statim vomant: appel- lant igitur aliqui et tales stomachicos, & stomachū ipsis supinū reddi aiunt. Sequitur aut hoc sym- ptoma qnq; ad solā oris ventris debilitatem, q; cibos amplecti, eis q; obuolui non potest, velut tota ventris amplitudo solet. Qnq; verò & cum vitiatæ alicuius modicæ tñ humiditatis complexu: etenim multa, quemadmodum et valde vitiatæ etiam citra cibum, nauseam efficit. Cæterum quæ à multis vulgò supinitas stomachi appellat, contingit quidem iuxta intemperiem q; cunq; tādē citra vitiatos humores. Fit etiam per humiditatē multam quidem, non tñ malignæ qualitatis: irri- guus enim stomachus per largam humectationem similiter, vt ligamenta neruorum, laxatur. Fa- cillime itaque curabilis hæc est affectio ex omnibus ferè alijs, pharmacis indigens, quæ siccare hu- miditatem, & coagmentare & constringere laxatum corpus, valent. Vbi igitur per profundum fuerit extensa humiditas, crassa q; sit & viscosa, opus est mistura pharmaci attenuatorij, & si ita di- cere libeat, perrosiui, quale est acetum, & acetum mulsum. Si verò neque talis sit humiditas, neque in altum extensa, adstringentia sola suffecerint ad curationē. Propositum igitur in sermone phar- macum nō moderatarum supinitatum, sed fortiorum, est curatiuum: esset autem & moderatarum sanatiuum, si adstringentia sola sufficerint ad curationē. Si verò neque talis sit humiditas, neque in altum extensa, adstringentia sola suffecerint ad curationē. Propositum igitur in sermone phar- macum nō moderatarum supinitatum, sed fortiorum, est curatiuum: esset autem & moderatarum sanatiuum, si adstringentia sola sufficerint ad curationē. Sufficiens autem signum est frigidæ affectionis, si eger se non sitire per- cipiat: vbi enim neque siticulosus fuerit, neque ardorem senserit in ore ventris, palam est affe- ctionem

† Quidā legūt, sextarios sex.

diter xii.

ctionem non calidam esse. Idonea itaq; sunt ad huiusmodi ventris affectus quatuor pharmaca ab E Asclepiade conscripta, quæ etiam ego nunc scribam, ipsius Asclepiadæ & verbis & ordine seruatis. *¶ Ad Stomachi Subuersiones.* Nucleorum mali punici acidi tusorum succi sextarios tres, succi mentæ sextarium vnum, mellis attici sextarium vnum, in vas fictile conijcito, ac coquito assidue agitando: & ubi defata fuerint, ab igne ablata reponito. Tempore vsus dato mystrum vnum aut duos ante cibum. *¶ Aliud, facit ad Dysentericos, & Vomentes cibum.* Radicis mali cotoneæ libram vnam, vini myrtei sextarios tres, coquito ad tertias: deinde exprimito liquorem, & mellis attici sesquilibram addito: rursusque coquito assidue mouendo. Dato ex repolito velut dictum est. *¶ Confectio ex Fructibus, facit ad Stomachi subuersionem, Cæliacos, & Dysentericos.* Mala cotonea numero decem, sorba numero quinquaginta, mespila quinquaginta, rhois rubri sextarium vnũ, aque congios septem. Fructus rufos & in aquam coniectos diligenter coquito: & ubi dissoluti fuerint, liquorem exprimito: ac rursus coquito eiectione eo, quod ex fructibus instar palcarum exucum reliquum est: cum verò tertia pars liquoris superfuerit, mellis attici libras quatuor addito, & ad prunas assidue agitando coquito, ac spissata reponito. Vsus ostensus est. *¶ Aliud Pharmacum.* Borborum maturorum sextarium vnum, baccarum myrti nigrarum sextarium vnum, rhois syriaci sextarium vnum, prunorum syluestrium sextarium vnum, mespilorum sextarium vnum, F phœnicobalanorum thebaicorum libras duas, mala cotonea decem, mala punica integra vnã cū nucleis decem, musti aminæ sextarios xlvij. Prepara pro consuetudine, & expressum liquorem rursus diligenter coque donec spilletur. Vtere vt dictum est. Porro post præscriptas confectiones quintam scripsit Asclepiades hoc modo. *¶ Catapotia ad Stomachi subuersiones, Origenæ, bona & valde probata.* Florum rosarum drach. viij, baccarum myrti nigræ exacinarum acetabulum, seminis hyoscyami acetabuli dimidium. Terito simul diligenter, sufficiente protropo paulatim instillato: deinde his palmularum passarum, patetos Græci vocant, decem numero carnem addito: & ex contritis catapotia ciceris magnitudine formato: & tres aut quatuor cum aquæ mulsæ veteris dilute cyath. ij exhibeto. Et hoc pharmacum in iisdem affectionibus commodum est, in quibus quatuor præscripta. Voluit autem author huius pharmaci per seminis hyoscyami milturam, doloris sedationem & somnum inducere vnã cum reliccatione. Manifestum est autem refrigeratorium quippiam hyoscyami semen habere, velut etiam papaueris semen habet: quare ad calidos affectus facit. Simile præscripto pharmacum deinceps proditum ab ipso est his verbis: Rosarum recentium defectis vnguibus drach. viij, seminis papaueris albi drach. iij, seminis hyoscyami drach. ij, aloes obol. ij, asari obol. ij: cum aqua diluta in pilulas redigito, & ciceris magnitudinem præbe G to. Septimum post prædicta pharmacum Asclepiades scripsit appposito discrimine a symptoma te palam apparente: ait enim ardori stomachi ipsum conuenire, & propterea Adipson idest litim extinguens, appellat, compositionem ipsius sic tradens. *¶ Ad Ardorem Stomachi Adipson catapotium.* Seminis cucumeris satui drach. octo, seminis portulacæ drach. octo, tragacanthæ drach. quatuor. Tragacantham ouorum crudorum recentium candido dissolue, & probe tritis alijs adde: & ex mistis catapotia forma, ea que in vmbra relicca: atque vnum sub lingua tenendum præbe, ac liquorem inde solum deuorare iube. Quin & quod postea sequitur, refrigerat ac corroborat stomachum madore prægnantem, & qui humidam ac calidam affectionem habet. Scribit autem de ipso Asclepiades hæc verba. *¶ Aliud, facit ad Stomachi subuersionem, maxime commodum est.* Ardorem multum perferentibus, & qui Stomacho exuruntur. Foliorum rosarum viridum drachmas sex, glycyrrhizæ drach. quatuor, nardi Indicæ drachmas quatuor. Excipe vino dulci aut protropo, & redige in catapotia: ex quibus vnum sub lingua tenendum præbe: aut ciceris magnitudinem cum frigida aqua dissolue, & in potu exhibe. Nonum deinceps pharmacum Asclepiades scripsit hoc modo. *¶ Ad Singultum, & Stomachi debilitatem, & Cibi reiectionem.* Reiectione itaq; hoc est vomitus ex genere est supinitatum. Quando enim os ventris fortiter afficitur, hoc autem velut di-H xi, ob vitiosos humores, quos venter abrumpere conatus, propter debilitatem nausæa symptoma perpetitur, atque hanc etiam tum ante acceptionem cibi, tum post ingestum cibum, ob extremam debilitatem perfert. Supinitates igitur ex vitiatas humoribus obortas picra confectione quàm celerrime curat, nempe vitiatos humores expurgans. Vomitus verò ob imbecillitatem grauati stomachi oborti curantur per intemperaturæ correctionem. Non parum sæpe contingit etiam non solum stomachum, sed & ventrem, ob debilitatem ferre non posse ciborum onus, atque ideo reicere aliquando quidem ad infernam partem, ubi illis robustior sit stomachus: aliquando verò sursum ob stomachi imbecillitatem, quando sanè hic debiliior fuerit infernis partibus. Hoc itaque vomitus symptoma vnum quidem est, sequitur autem ad multas affectiones diuersam medelam exigentes. Similiter & singultus stomacho interdum ob frigiditatem aut repletionem accedit: interdum ob mordacitatem humorum acrium, & medicamentaria qualitate præditorum. Impossibile itaque est pharmacum inuenire omnibus dictis affectionibus aptum. Caterum quæ deinceps scripsit Asclepiades duo pharmaca, ostensa sunt substantiam habere multum ab humana natura diuersam, quæ ipsa maxime omnium inter reliquas corporis partes stomachus non fert ob excellentiam sensus, qua præditus existit. Magnopere igitur affligitur stomachus etiam

A etiam vbi ex stomaticis pharmacis quippiā in ipsum fuerit præterlapsum, maxime quæ atramentum sutorium, aut tale quid, in se habet. Quod enim ex fructibus constat, ex comestibili materia compositum est: verum atramentum sutorium contrariæ penitus homini naturæ est: quemadmodum est mandragora. Fugienda itaq; sunt hæc duo pharmaca ex chrysobalano & radice mandragoræ cortice composita: apponam tñ est ipsorum compositionē. Et prioris quidem descriptio hæc est. Chrysobalani libram j, mastiches chiæ libræ dimidium, corticis radice mandragoræ quadrantem: tusa & cribrata excipe mentæ succo, & redige in catapotia. Da inde obolos tres cum aquæ frigidae cyathis tribus. Posterioris autem descriptio hæc est. Mastiches chiæ lib. j, tragacanthæ albæ lib. vnam, corticis radice mandragoræ sextantem: tusa & cribrata reponito. Vsu exigēte dato cochlearium inspersum aquæ frigidae cyatho vni. Post præscriptas cōfectiones Asclepiades sic scripsit. Ad voluulosas stomachi subuersiones. Coniectarit quispiam ipsum voluulosas appellare fortes: quemadmodum enim in voluulis subuersiones fiunt cum magna contentione & violentia, adeo vt stercus etiam euomant, sic et alios vomitus concitatos quis appellare voluulosos possit. Sequitur autem huiusmodi vomitus, vbi affectæ partes à medicatis serolis humoribus magnopere fuerint afflictæ: si verò etiam imbecilliores fuerint, duplicatur malum. Erit itaq; ob id curationis sco-

A.I.1. f.4. c.5.
fol.74. g;

B pus, vt simul ad affectas partes odoratas qualitates opponamus, quales aromatum sunt, & quorundam seminum in ciborum vsum venientium, velut est anisum, apium, daucus, cuminum, & fœli. Iuxta hanc itaq; rationem Hippocrates in pleuritidis purgatiuum exhibens medicamentum, misceri aliquid ex his iussit, sic scribēs: || Si vero sub septo transuerso sit dolor, et ad claviculam nō se extendat, mollire ventrem oportet veratro nigro, aut pepilio: ad veratrum quidem dauco, aut fœlide, aut cumino, aut aniso, aut alio quopiam odorato addito. Apparet enim quod in his miscendis maximè odorem ipsorum respiciat, quo medicamentariam vim, quæ hominis naturæ contraria est, mitiget & obtundat: quemadmodum enim graueolentia omnia stomachum subvertere solent, sic odorata corroborare. Si verò vltra hoc etiam in ciborum vsum veniant, multipliciter auxiliantur stomacho ob vitiatos serosos humores subuerso. Atque iuxta hanc ratiocinationem auctor propositi pharmaci anisum & apium admiscuit: absinthium verò propterea qd à natura vim habet extergendi, ac repurgandi, & subducendi vitiatos stomachi humores, amplius que densat & cōstringit ac robur addit parti affectæ. Cinnamomum autem addidit, vt quod omnibus foetidis & putredinosis serolis humoribus se opponat iuxta vtranque facultatem suam, alteratiuam & discussoriam: nō paruam enim ex odore suo exhibet vtilitatem omnibus malis affectionibus. Opii

2. de Rat. vict.
acu. tex. 11. 7.
117. b

C verò parum pharmaco immiscuit, sensum stomachi hebetare volens: qua ratione etiam coeliacis ipsum damus, vt quod profundum quendam soporem inducere possit. Quod verò vehementem opij frigiditatem compositor ipse corrigeret, castorium ipsi adiecit, oppositum ferme ipsi in facultate: eadem ratione etiam piper admistum est. De myrrha verò operepretium est scire, qd in quantum facultas ipsius est concoctoria humorum præter naturam & vitiosorum, in tantum conuenienter admiscetur: in quantum autem medicamentaria est, non conuenienter: verum paucitas eius ad concoctionem quippiam confert, qualitatis autem peregrinitas non apparet, vtpote victa ab odoratis. Ego itaque hoc pharmacum etiam sine myrrha preparare consueui, ad securitatem perducere semper tentans vsum omnium pharmacorum, præsertim vbi in acuta febre tale quid exhibetur. Cum igitur cinnamomum habeat hoc pharmacum, & semina calida vrinam cientia, ac piper, & præterea castorium, ac opium, merito multis affectionibus commodum est, quandoque cum vino stomacho grato datum, quale protropum est: quandoque cum myrti baccarum decocto, velut in dysentericis: aut cum aceto mulso, velut in splenicis: in cholera vero & bilis vomitu ac effluxu, cum frigida, velut Asclepiades scripsit, sed addito discrimine, si siticulosior est nunc quàm antea, aut nauseæ calidæ sensus circa os ventris ipsi contingat, aut frigidam bibere sanus cō-

* κακὰς. ἀλ-
τερ, κακὸς -
μυρ.

D suevit. Ego sanè hoc medicamentum ad securiorem vsum perduxim, myrrham que dimisi, & piperis quantitatem auxi. Cum verò plurimum cinnamomum accipiat, necessarium nobis est vbi cinnamomo caremus, caliam optimam conijciamus, aut plus quàm duplo cinnamomi pondere, aut omnino non minus. Caterum commensuratio ac apponderatio pharmacorum quæ ipsum cōstituant, ab Asclepiade his verbis proditur. **Ad Voluulosas Stomachi subuersiones Pastillus Amaronum.** Facit ad Inflatos, Ardorem stomachi, & Vomientes cibum. Facit & ad Internas affectiones. Seminis apij drachmas sex, anisi drachmas sex, absinthij drachmas quatuor, piperis drachmas duas, myrrhæ drachmas duas, cinnamomi drachmas sex, opii drachmas duas, castorij drachmas duas. Cum aqua pastillos formato, & summum drachmam vnam dato, stomachicis cum protropi diluti cyathis tribus: cholericis & vomentibus cibum, cum frigida: coeliacis & dysentericis cum baccarum myrti decocto: splenicis cum aceti mulsi cyath. iij. Aliud pharmacum deinceps scripsit Asclepiades, non solum ad voluulosas stomachi subuersiones ipsum conuenire promittens, sed & ad intensos singultus, & stomachicos, qui ardorem, hoc est multam caliditatem percipiunt. Dictum autem iam sæpe à me est impossibile esse inuenire pharmacum ad multas affectiones optimum: inuenitur enim in vnaquaque ipsarum id, quod propriè ipsis destinatum est præstantius esse. Verum iis qui vnum pharmacum ad multos affectus habere volunt, etiam horum præparatio

ac

A.I.5. fu. 2. t. 6.
p. 554 g

ac compositio utilis existit. Continetur tamē ambiguitas quædam in huiusmodi pharmacorum E promissionibus, qualem Asclepiades nunc de propolito pharmaco fecit. Putabant enim fortassis aliqui ex ignaris, tum singulorum trium symptomatum curationem promitti, tum duorum simul coincidentium, aut omnium simul: Velut cum lancinatur vehementer nauseans æger, & singulrit, & multę anxiosę caliditatis sensum circa stomachum percipit. Et de tali sane affectione primo dicam, in qua tria hæc mala simul hominem infestant, nimirum ardoris sensus, & singultus, & affectio voluulosa. || Hippocrates quidem igitur conuulsionem fieri dixit ex repletionem et euacuatione, & additum est ad aphorismum ferme in omnibus exemplaribus, Sic autem & singultus. Ego vero in cōuulsionem tertiam aliquam causam supra euacuationem et repletionem non dum reperi: Singultum autem sine his fieri video, acribus humoribus, aut serolis, & medicatis, stomachum mordentibus, quos ubi vomitu reiecerint, statim singultu liberant. Quin & multi deuorato pharmaco ex tribus piperis generibus constante, si statim vinum insuper bibant, omnino singultiunt, ex quorum numero etiam ego sum. Amplius autem & cibo in mordacem qualitatem corrupto aliqui singultiunt: et quod à vomitu statim liberatur, omnibus notum est. Quidam etiam ex rigore oris ventris singultiunt. Verum pueros maxime frequenter singultire contingit tum ob corruptionem alimenti in ventre, tum ob partis frigiditatem. An vero & ob nimiam euacuationem fiat F singultus, veluti etiam cquullio, dignū consideratione est. Verum si in præsens hac consideratione relicta eos, qui ob frigiditatem, aut ciborum copiam, aut mordacem acredinem, grauantur, intueamur, vomitum reperiemus sufficientem medelam eorum, qui ob copiam aut morsum singultiunt, caliditatem vero eorum qui ob frigiditatem. Alio autē modo reperiemus et sensus stupefactionem per refrigerantia, & permutationem ac discussionem mordacium per attenuantia & resiccantia. Componitur autem ex huiusmodi ipsum pharmacum. Opium enim, & rosę, & psyllii succus, ex refrigerantibus sunt. Spica nardi verò, & chrysobalanos, ex discutientibus & corroborantibus. Asarum autem per urinam deducit vitiosos humores. Aloe verò vitiatos humores expurgat, & inferne per ventrem euacuat. Crocus autem concoquit & roborat partes, per temperamentum quidem caliditatis concoctionem efficiens, per adstringendi vero vim quæ ipsi adest, robur addens. Costus autem sufficienter calfacit, moderate vero adstringit, quod & ex gustu eius percipitur. Ex his porro compositum pharmacum aptum est singultientibus: aptum est et is, qui ad vomendum lancinantur: & qui circa præcedens pharmacum dicti sunt, verum nō similiter ut illud, neq; aliquid aliud ex odoratis habet, neque cinnamomum. Refrigerantium autem in ipso mititura stupefacere sensum potens mitigando molestiam ex mordacitate serosorum & aliorum et humorum obortam, vere aptum pharmacum efficit ad nauseosę affectionis imminutionem. Quandoquidem verò etiam ad stomachi ardorem conuenire pharmacum dixit, repugnat autem huic sermoni calfaciens costus, operæpretium fuerit & de eo dicere. Quemadmodum in antidotis colicis appellatis, & à quibusdam, dolorum sedatorijs, qualis est Philonis antidotus, scopus componendi pharmacum est stupefacere sensum dolentium. Quò verò non cum magno detrimento id fiat, & ut per altum dolentium corporum frigiditas {celeriter} penetret, calfacientia miscantur, quæ refrigerantium stupefactionem deducere possunt, cum illa ipsa per se tardi transitus existant. Hæc igitur ubi quis inaudiuerit, quantitatem consideret simplicium pharmacorum quæ in compositiones miscantur: ex hac enim sciet, num magis an minus, efficere possit compositum pharmacum ea quę promittit. Si nanque refrigerantia plura apparuerint, sensum affectorum magis obtundit, & quantum caloris in ipsa particula fuerit, etiam hunc extinguit: ubi verò calfacientia fuerint aucta, minus quidem hæc efficiet ipsum pharmacum, innocentius autem reddet. Nolle enim oportet corpora viuentium mortificationi simile quippiam perpeti ab omnium ex opio & hyoscyamo et mādragora compositorum pharmacorum usu, nimirum causis dolorem infligentibus insensibilibus factis: & multi sane qui assidue talia accipiunt, ad immedicabilem frigiditatem particulas perdunt. Quemadmodum aut in refrigerantium & calfacientium oppositione, vtrorunq; quantitas ostendit prædominantem pharmaci actionem, eodem modo etiam in alijs considerationem facere oportet: velut densantibus & rarefacientibus, coagulantibus & diffundentibus, odoratis & graueolentibus, humectantibus & siccantibus, discutientibus & cohibentibus. Itaq; ubi subscripsero his mistorum in compositione quantitatem, ad coherentia trālibo. Scripsit aut ipsam Asclepiades in hæc verba. ¶ Stomachicus Ardorem sentientibus, & intensos Singultus, & Voluulosas Stomachi affectiones. Costi drach. quatuor, spicę nardi drach. quatuor, chrysobalanorum drach. quatuor, rosarum viridium drach. quatuor, mastiches drach. quatuor, aloes drach. duas, asari drac. duas, opij drachmam vnā. Excipe succo psyllij, & reduc ad pastillorum formam, & exhibe obolos tres. Liquor sit affectioni conueniens. Post præscripta pharmaca Antidotum Hieram iam antea in Andromachi pharmacis conscriptam, ex aloe & cinnamomo compositam, etiam ipse tradidit non iuxta eandem commensurationem & symmetriam. Habent autem verba eius in hunc modum.

¶ Antidotus Hiera hoc est Sacra, Themisonis, ad Stomachi subuersiones. Facit & ad sentientes Ardorem, & oēm Inflationem, tardam Concoctionem, & affectiones Vteri. Probe cit Urinā, et omnino admiranda confectio est Hydropicis, Hepaticis, & Nephriticis. Deduct & fœminis Menses. Aloes drach. c, mastiches vnciam vnā, croci

62. Aph. apho.
39. Ex. ord. 50. f

¶ ὁ ὕψις ἡ frigidi-
tatem, est
impressus. δὲ
ἐστὶ ἡ mordi-
cationibus, est
ἡ aliquibus an-
siquis.

† διατάξαι
τα το προ-
γεγραμμένων
ἐπιμεύας δι-
τάξαι, est in an-
tiquis, i. ob caus-
jam in præcedē-
te pharmaco
dictas.

A. L. 3. f. 13. r. 6.
c. 19. fol. 308. c

A croci vnc. j, nardi indicæ vnc. j, cinnamomi vnc. j, carpobalsami vnc. j, afari vnc. j: tundito, & angustissimo cribro excernito, atq; aridum vt ne transpiret seruato. Vfus eius est ad tarde concoquentes, atq; ita sanos, drach. j cum frigide cyath. iij: vomentibus bilem, aut aliâs fluxione laborantibus drachmæ dimidiū: ad inflammationes internas conuenit cum aqua mulsa bibitū: verū quibus vrinam ciere volumus, aut menses deducere, pharmacū cum vino damus. Est autem medicamentum inspersile in pulueris ac farinæ formam redactum. Hæc quidem scripsit Asclepiades de prædicto pharmaco. Videamus autem primum in his de quantitate pharmacorum ipsum constituentium quatenus consensit, & dissensit, cum Andromacho: deinde consequenter de promissione & vsu. Equidem in mistura pharmacorum consenserunt inter se Andromachus & Asclepiades in hoc, quod aloes drachmas centum coniiciunt: Dissentiunt autem in eo, quod Asclepiades simpliciter aloes scripsit, Andromachus autem lotæ apposuit: Et quod Asclepiades reliquorum singulorum singulas vncias admiscuit, hoc est drachmas argenteas octo, aut septem & dimidiā, Andromachus vero sex: Amplius etiam in eo quod Asclepiades carpobalsamum, Andromachus xylobalsamum iniicit: & præterea quod Asclepiades florem iunci odorati penitus relinquit. Cæterum circa promissionem operum Andromachus nihil amplius scripsit, quā quibusdam vnum cochlearium, quibusdam duo, cum aquæ frigidæ aut calidæ cyathis tribus exhibere: verum Asclepiades plura de vsu propositæ antidoti prodidit. Ad tardas enim concoctiones sanorum drachmā vnam dari iubet, cum aquæ frigidæ cyath. quatuor: opinor autem ipsum dicere drachmam argenteā, etenim sic fere omnes recentiores medici appellare in more habent: neq; ipsa rei natura aliud nos intelligere cogit: manifestum est autem quod drachmam dicimus nūc in huiusmodi omnes, quod Romani denarium appellant. Verum non omnibus tarde concoquentibus expedit præbere hoc pharmacum, sed iis solum quibus ob vitiosos humores tarda concoctio contingit, & maxime cum tenues fuerint & biliosi. Fecerit & quietem in iis, quibus citra vitiatos humores humida intemperies intantum affectam partem perrigauit, vt exoluatur & laxetur ad modum ligatiorum neruorum circa laxatos articulos. At vero qui bilem in ventre habent, quæ præsertim ipsis in tunicis in alto continetur, præstantius pharmacum non reppererint. Verum haud scio quâ ratione parum de ipso exhibeat Asclepiades, cū moderata exhibitio ipsius ad drachmas tres progrediatur. Porro ad inflammationem habentes non simpliciter in omni inflammationis tempore dandum est, sed vbi concocta fuerit & declinarit. || Concocta enim medicanda recte censet Hippocrates, non cruda, neque in principijs, nisi sua sponte concitata id expetant, hoc est nili motus ad excretionem nos adducat, qui non dum firmam aliquam inclinationem ac stationem ad vnam partem habeat. Recte autem hoc pharmacum tarde concoquentibus, aut bilem vomentibus, aut aliâs stomachi fluxione laborantibus, aquæ cyathis quatuor inspergens præbet, nimirum subuersionem stomacho ex melle oborientem formidans. Ad declinationem autem internarum inflammationum cum aqua mulsa tempestiue quis exhibuerit: Quemadmodum etiā vrinam ciere volens, aut menses euacuare, Asclepiades quidem ex vino dādum ait. Præstiterit autem, vt ego sentio, cum vino mulso pharmacum præberi: ita enim simul & quæ circa distributionem & delationem ex ventre in vrinam, & quæ circa vterum instant, secat ac dissoluit: et robur partibus addit per quas trāsitus facit: amplius q; & locorum per quos fertur caliditatem auget, quæ & ipsa non parum confert ad instantes humores fundendos ac euacuandos. Post præscriptam Hierā Themisonis antidotum, Asclepiades aliam sic scripsit. *Alia ex Mantia compositionibus Attica. Facit ad Stomachicos & Reijcentes cibum, Cholicos, Cœliacos, Dysentericos.* Compolitio sic habet. Croci 3 ij, nardi drach. duas, seminis hyoscyami drachmam vnā, aloes vnc. vnam, balaustii vnc. vnam, tragacanthæ vnc. i, piperis albi vnc. i, acaciæ vnc. i, rheu pontici vnc. i, rhois syriaci culinarii vnc. i: excipe succo rosarum in vino austero coctarum, & redige in pastillos drachmæ vnus: tragacanthā d vero succo præmaceratam vnito. Hoc pharmacum nihil priori simile habet: illud enim purgatorium est: hoc adstringens, iis qui stomachum aut totum ventrem ob multam humiditatem exolutum ac laxum habent, conueniens: quemadmodum etiam in articulis eiusmodi laxitates contingunt, ligamentis ipsorum multa humiditate perrigatis, quæ plurimi medici neruos ligatorios appellare solent. Multæ enim eiusmodi affectiones tum in ventre, tum in stomacho, fiunt iis qui multo potu se explent, aut fructus humectantes, aut etiā edulia talis temperamenti, ingerunt. Cum itaque multi sint qui tali victu vtiuntur, rationabiliter etiā prædictæ facultatis pharmaca sæpe successu clara euadunt, vt quæ prædominantem adstringendi vim habeant. Vbi vero aut vitiatos humores euacuare, aut affectam particulam calfacere oportet, non solum nihil iuuat ita adstringentium pharmacorum vsus, sed etiā nocet. Post præscriptum medicamentum, aliorum duorum Asclepiades meminit, quæ & ipsa ambo bona sunt, & ex multis compolita, ac propterea multi ad varios affectus vsus, & præsertim posterius. Quod vero tale sit quale ipsum esse dicit, etiam nobis ipsis facile erit iudicare, vbi in memoriam reuocarimus simplicia in ipso pharmaca, qualia singula sint, amplius q; methodum compositionis eius audierimus. *Alia Stomachicus, facit ad eos quibus Cibus in Ventre acescit, ad Tormina, Desillationes, Dolorem capitis, spuentes Sanguinem, Tibescentes, Affectiones circa Vesicam & Vterum.* Preparatur sic. Succu mandragoræ drach. quatuor, myrrhæ drach. quatuor,

12. Aph. apho.
22. Ex. ord. 10. b
† ἡν μὴ ὀργὰ.
† ἐπὶ τοῖς
est impressa.
sed clarus in
manuscriptis.
ἐπὶ τοῖς, i.
incut. vt etiā
in aphorismis.

DE COMPOS. PHARMAC.

quatuor, balaustij drachmas quatuor, castorij drachmas quatuor, croci drachmas quatuor, opij E drachmas sex, anisi drachmas octo, feminis apij drachmas octo, styracis drachmas octo, hyalopi cretici drachmas duodecim, feminis hyoscyami albi drachmas duodecim. Composito pro more, & digerito in pastillos: dato pro vinibus. Liqueor sit affectioni conueniens. *¶* *Aster aster innox perabilis, pharmacum accommodatum, sedans Dolorem, inducens Somnum, multi vsus ad varios affectus. Nam* *¶* *Stomachi morbus mirabiliter sanat a ructibus acidis, agris concoctionibus, torminibus, Volubilis, inflationibus. Facit* *¶* *ad Capitis dolores potatum, & foris illitum fronti, aceto dilutum. Facit* *¶* *ad Oculorum dolorem pastillus perducij succo dilutus. Facit* *¶* *ad Dentium dolorem cauernæ inditus, tritus ac galbano exceptus, aut pici succo. Prodest ad Influxus Oculorum, & Tonsillarum inflammationes, vino dulci dilutus, ita vt ad oculos lanam eo imbutam imponamus: in tonsillis vero affectis tepefactum † colluamus. Facit ad omnem Sanguinis fluxum vino myrtite dissolutus: & ad Veteres ac recentes Tussis & Destillationes dilutus vino theriaco, aut protropo, aut scybelite. Facit* *¶* *Inhibiscus, Suppuratus, marrubij succo dissolutus. Hæmoptoicus, Dysentericus, Cholericus, sanguinariæ succo dilutus: & ad omnis Reptilis plagam cum rui & decocto potatus. Soluit Irritationes per circuitum repentes, duabus ante eius inuasionem horis, ex vini diluti cyathis tribus acceptus. Menses etiam foeminarum ducit, artemisiæ decocto dilutus. Facit* *¶* *ad Vesicæ affectiones vino mulso dissolutus. Similiter etiam q̃, quæ ab utero suffocantur, auxiliatur. Facit* *¶* *Arthriticus, Podagricus, gentianæ decocto dilutus. Et de his quidem quæ efficit hæcenus. Compōsi-* *¶* *tio verò hoc modo habet. Myrrhæ drachmas quatuor, styracis drachmas quatuor, nardi Indicæ drachmas quatuor, calicæ fistulæ drachmas quatuor: terræ lemnicæ quæ sphragis, hoc est sigillum, appellatur, drachmas quatuor: corticis mandragoræ drachmas quatuor. In alio exemplari etiam piperis drachmas quatuor, croci drachmas sex, succi papaueris drachmas sex, feminis dauci cretici drachmas octo, anisi drachmas octo, seselis massiliensis drachmas octo, feminis apij drachmas octo. Myrrha, et styrax, atque opium, vino dissoluuntur odorato & teruntur: arida vero tunduntur & cribrantur, ac deinde simul miscentur: subiguntur, ac in pastillos coguntur ponderis drachmæ dimidiæ, & in vmbra reliccantur. Vtus ostensus est. In alijs exemplaribus pastillorum pondus drachmale proditur.*

*Quæ Archigenes in Primo Pharmacorum secundum genus prodidit, de
Affectionibus circa Stomachum.*

CAP. 4.

¹⁸ ἀπεψίας.

Cum multa & varia sint circa stomachum affectiones, atq; hæc omnes ferè in totum ex cruditate oboriantur, totis viribus considerandum. Et si quidem aquarum aut aeris malitia ostendatur, vniuersali via ac ratione q̃ maxime licet vtentes hæc immutando, hominẽ liberare est opus: **G** Si vero ob inconfectos cibos, eis interdicens: Si vero ob copiam, cibos contrahemus: Et in vniuersum ex quacunq; causa suspicati fuerimus fieri, eam prohibebimus. Quod si in omnibus ipsi bono ordine tractetur, & iuxta ipsum stomachum tñ concoctiones impediuntur, vñctionibus, & exercitijs, vociferationibus q̃, & alijs huiusmodi, per expertum artificem adhibitis, stomachus corroboretur. Verum ructu acido affectis coriandrum cochlearij mensura ante reliquum cibũ edendum dato, & merum insuper bibendum. Quod si qñq; moderata crudititas & quæ contemni possit oboriatur, longiore tempore in lecto decumbendum est: & si negocia id non permittant, quanto possibile est, omnis diltentio & labor, amplius q̃ æstus † ac ira, vitanda sunt. Serius etiam q̃ pro confucto tpe ex feruida aqua lauandum est: & in priore balnei domo aqua tepida haurita, omnia "in stomachum coaceruata p̃tuitosa reuomenda: & modico cibo item q̃ potu prima die vtendũ. Si vero fortis ciborum corruptio fiat, stomachi q̃ morsum sentiant, ac ipsos eructent, amplius q̃ nausea afficiantur, aqua tepida exhibita vomere cogito, donec omne corruptum expurgetur: deinde caput mollibus linteolis ad ignem calefactis obducito: aut huiusmodi aliquo non inani ductu locos circa stomachum foueto, & præcordia mitigato: summas item partes molli frictione aut etiam constrictione lenito. Atque ita in lectulo quiescere finito, ac in ediam per totam sequentem diem **H** perferre. Si non absurdum quid inde consequatur, fortiores quidem, vt prædictum est, effectos lauacione curato: si vero infirmi essent, moderate ad diem vnum refectos, in sequentem lauato, moderatis cibus ac potibus ad triduum vti iussos. Et cruditatis quidem talis quædam (vt rudi quadam forma expressi) curatio existit. Verum de ijs quæ ex ipsa proueniunt, velut profluuium ventris, aut bilis per vomitum ac secessum reiectione, aut alijs eiusmodi, in proprio loco dicitur. Cæterum in alijs stomachi molestijs, iis quidem qui stomacho exuruntur cum exolutione, aut animi deliquio, aut appetentia perdita, ex qualicunque tandem causa, præter febrem, cyathos tres aut quatuor aquæ frigidæ absorbendos dato, bis aut ter per intervalla: & si quidem inde mitius habeant, ipsos reuocatos tum cibo, tum etiam alijs, refocillare tentabis. Si vero permaneat malum, † deprehensis atque læuigatis † extremitatibus, huiusmodi quendam cremorem assidue absorbendum dato, velut palmularum, malorum cotoneorum, pyrorum, mespilorum, baccarum iuniperi, pampinorum vitis, rosarum, mali item punici nucleum non habentis succum, aut nucas pineas viginti, & seminis cucumeris grana xxv, baccas myrti viginti, croci obolos duos, & rosarum duarum folia ex aqua bibenda exhibeto. Aut aquam frigidam cū omphacij succo præbeto. Aut florem rosarum cum nardo & aqua frigida. Aut etiam portulacæ semen admisceto, aut atriplicis semen

A.1.3.f.13.r.
c.5.fol.298.f

† Additur in antiquis græc.
 χύψυχος, i. et frigus.

† *Ap. ligatis & calefactis.*

Al. vnum.
et al. dimidiū.

A semen, aut malorum cotoneorum decoctum. Aut cucumerum satiuorum semina quinquaginta trita, ex frigida præbe. Aut orizam coctam cum butyro edendam exhibe. Aut tragoriganum tritam & exuccatam cum aqua edendam præbe. Aut fabas ægyptias decem, & nardi celticæ obolos duos, vtræq; tosta & trita bibenda exhibe cū mali punici acidi ac dulcis succo, & aqua, pari vtriusq; mensura. Aut mentæ ramulum contritum bibendum dato. Aut cenanthen similiter tritam cum nardo indica bibendam dato. Aut lentes coctos tritos ex aqua præbeto. Aut phœnicobalanos cum rosis. Aut marrubij succum cum melle: & vbi paululum quieuerint, vinum cum polëta exhibeto. Aut cardamomi drachmam vnam, cum aceti nulli cyathis tribus potandam dato, ac quiescere finito. Porro iis qui saliuam multam in stomacho aggregarunt, aridam conyzam manducandam dato: Forinsecus vero stomacho imponatur vitis folia viridia trita: aut mala cotonea, aut palmlæ, aut mespila cū cerato. Aut myrti folia tenera, vel rubi, vel lentisci, trita cum polente flore frigida subactio. Aut portulaca viridis similiter preparata. Aut caseus recens mollis cū polëta et apij folijs. Aut seridis folia cum aceto & polenta ac apij folijs. Si vero multum sint æstuoli, velicam aqua expletâ imponito. Aut niuem superdato. Aut cucurbitarum ramēta imponito, & omnino oia quibus in cardiacis vtimur. Dolores autē stomachi lenit, et maxime iis quibus tristitia aliqua

B aut desperatio accedūt, lac asininum, aut muliebre, aut bubulum, silicibus incoctis potatum. Aut vnguentum nardinum vel aliquod pretiosum dato ex aqua. Aut decoctum floris iunci odorati, rosarum flore simul insperfo. Aut portulacæ succum, quandoq; per se, qñq; cum nardo. Aut oui vitellum tostum et in farinam comminutum, cum polenta bibendum dato. Aut amaras nuces cū cucumeris semine & nuce pinea. Aut rumicis syluestris seminis obolos tres bibendos præbeto.

Oēs vero circa stomachum dolores & displicentias ac molestias sedari aiunt cochlea aphricana

cruda integra vorata. Exoluto aut solum & nauseabundo facto stomacho, lactucæ albæ semē modicum ex aquæ cyathis quatuor aut vno bibendum dato. Aut passerum sterus aridum velut polentam, siue aquam biberint, siue vinum, inspergito. Aut mastiches chiæ cochlearium ex aqua frigida dato. Aut glaciem ieiunis quotidie exhibeto, vt ea assidue manducata saliuam expuāt. Aut conyzam aridam manducent. Si vero vna cum humectatione ē inflammatio aliqua adlit, cenanthen cū meliloro, aut rosam siccam cum cerato rosaceo parum resinæ vstæ habente, impone. Aut acaciæ & aluminis melij pares partes dupla cerati proportionē excipe, & vt malagma impone.

C Caterum quibus bilem atram generantibus stomachus inflat, spōgias aceto acerrimo calido imbutas ad stomachum imponito, atq; hoc maxime tempore distentionum: & si postea etiamnum perseverarint, alumen liquidum cum atramento sutorio trito melle exceptum imponito. Aut hæc & aloen pari portione mista & cerato myrteo excepta imponito. Aut hederæ folijs vino coctis pro cataplasmate vtitor. Aut plantaginis cum sale tritis. Aut armentariæ bouis sterus aridū vino coctum. Aut marrubiū cum pane & rosaceo subactum. Aut bulbos rufos et alumen pari portione imponito. Post hæc antidorus apyretos appellata, aut hiera, aut alia quæpiam quæ cuiq; per experientiam cognita est, in potu exhibenda est. In cibo stomachicis cōueniunt beta, lens, tragus, oryza, alica: malis cotoneis, aut palmulis, aut mespilis, aut mali punici nucleo carentis granis, aut melaprys, simul incoctis: aut teneris lentisci, aut myrti, aut rubi ramulis, admistis. Panis lit summe tm fermentatus, aut penitus absq; fermento preparatus. Ex oleribus cōueniunt cruda, cichorium, meconides, eryngium, intubus, gingidium, feris, lactucæ: coctia maxime commoda est brassica & sisarum. Ex reliquis aut coctis conueniunt cochleæ & bulbi. Ex carnibus venter, rostra, pedes: turdi, perdices, attagenes, turtures, palumbes, anates, lepores, dorcades. Ex piscibus squillæ, gammari, natatrices siue colymbænæ, locustæ, loligenes, sepia: & ex ijs qui duras carnes habent nulli: ex testaceis maxime buccina, purpure, pectines, glauci, cerri, glandes, siue balani. Verum sisarum à reliquis omnibus acceptum, vt stomacho gratum, & refectiōi commodum, ad plerâq; oēs stomachi

D accessiones conueniens est. In potu prodest vinum quod vnusquisq; libenter bibit. At vero iis qui inflantur & stomacho distenduntur, polii fasciculum coquito & bibendum dato. Aut calaminthæ decoctum per noctem sub dio expositum, modico melle, & piperis drachma vna, admistis, bibendum præbeto. Aut spongiâ acerrimo aceto imbutâ pedibus ac brachijs imponito, vsquequo bullæ excitentur, maxime si cibos reiecient. Aut scœnigræci farinam aceto subactam. Aut sinapitritum cum aceto, vsquequo rubefiat locus. Aut psyllium aceto & aqua maceratū et in mortario tulum, pari portione carniū cochlearum admista, in malagmatis forma imponito. **¶ Que Stomachicis Dolorem eximant.** Cuminū tostum & apium, vtrūq; modica portione cū aqua bibendū præbe. Aut aloes obolos duos cū vino mulso, aut vino, aut aqua, bibēdos dato. Aut abrotoni, & thymi, vtriusq; obolos duos, ex vino præbe bibēdos. Ligaturas in super extremarū partiū fortiter adhibe, & circa ipsum stomachū cucurbitulis & fomētis varijs vtire. Quod si vehementer valida sit distentio, ēt venæ sectio efficax auxiliū erit, & alui solutio per supposititiā glandem. Deinceps post p̄scripta Archigenes de fame ingēti, bulimo Græcis appellata, itē q; de lingultu, prodit quæ sequunt. **¶** Porro eos qui exingenti fame in vijs vel alio quocunq; modo aio linguunt, reuocabimus odoramentis aceti, aut pulegij: aut q̄ fortē obtingit terra aceto macerata: aut malis, aut pyris, aut alijs similibus fructibus, qui ad manū sunt. Panē in super odorandū dabimus, et ingerere cogemus.

† συττιπας
μα νειας, i.
aluminis nō le-
uis est in p̄res-
sis. i. manifesti-
pus est, συττι-
πας νειας
μα νειας, i.
aluminis hu-
midi nō leuis.
Et ita etiam
in veteri tralis
tione.

* Aliter y.

mus. Ad hæc enim singula confestim excitantur, & præterea ad suillam carnem assatam ac coctam, E & in vniuersum ad omne quod multum alit, & præsertim ea quæ odorem nidorosum ac probe cōditum abundanter habet: per huiusmodi enim odores vt plurimum tales reuocantur. Nihilo minus tamen etiam extremæ partes ipsorum constringendæ sunt, ipsi q̄ excitandi tum maxillarum punctura, † tum capillorum ac aurium distentione. Refocillabis porro ab exolutione, panem in vino diluto, aut etiam aliud quippiam ex ijs quæ acruatim reficere vires possunt, exhibendo: velut sunt oua forbilia, bulbi, cochleæ. Etenim singula hæc stomachi humiditatem eximūt, & in modica mole multam vim complexa cumulati corrobora. Singultientibus autem rutam cum vino dato, aut nitrum in aqua mulsæ, aut opium, aut castorium, aut abrotonum, aut aristolochiā, aut daucum creticum, aut cuminum, aut anisum, aut zingiberis radicem, aut scyllam cū aceto & oleo, aut tordilion, aut dictamnium, aut calaminthen, aut acorum, asarum item & nardum celticum, & pulegium, singula tum per se, tum simul mista.

Pharmacum Nostrium, ex Succo malorum Cotoneorum constans.

Magnæ equidem oris ventris affectiones à prædictis pharmacis curantur: moderatas verò omnes ferme, præter eas quæ ex vehementi ardore fiunt, subscriptum medicamentum iuuat. C Succo malorum cotoneorum sextarios duos, mellis attici sextarios duos, aceti sesquiseptarium: si vero F multum acre fuerit, sextarium vnum: zingiberis quadratē, piperis albi vnciam vnā: arida insperges, vbi malorum succus cum melle & aceto coctus ad lentum ignem attici mellis crassitudinē acceperit. C Aliud ex malorum Cotoneorum Carne constans. Malorum cotoneorum carnis libras iij, mellis libras iij, aceti albi lib. iij, piperis quadrantem, zingiberis quadrantem, petroselinī macedonici vnciam vnā,

De Pharmacis, quæ Forinsecus Ori Ventris imponuntur.

C AP. 5.

Vocant quidem plurimi medici, haud scio quare, velut Asclepiades & Andromachus, omnia pharmaca quæ forinsecus imponuntur, siue adstringendo condensent, siue indurent, Malagmata, {quæ vox emollitionis significationem habet.} Verum nos permittemus ipsis, etiā si non propriæ appellant. Quæ autem conscripserunt ad stomachi affectiones commoda pharmaca, per experientiam non illorum solum, sed etiam nostram approbata, ea nunc adscribemus, ab ijs quæ Asclepiades prodidit initio factio.

Quæ Pharmaca Asclepiades ad Stomachi affectiones in Quarto Externorum tradidit, quæ Marcella inscribit.

Eueni, ad Stomachi Subuersiones Dolores q̄ facit, partim etiam ad Inflammationes. C Oenanthes drach. G viij, croci drach. * ij, rosarum siccarum drach. iij, meliloti drach. iij, mastiches drach. iij, ramentorum succini drachmas quatuor, carnis phœnicobalanorum quadratē, vini myrtei quod satis est. Arida tundito & per angustissimum cribrum concernito, & cum vino myrteo diluto, vt cerati spissioris crassitudinem accipiant: his carnem phœnicobalanorum addito, & conuassata cerato ex rosaceo apparato excipito, & linteolo infarta ori ventris imposito. Facit & ad oculos inflammatos. Aliud. Oenanthes drach. vi, croci drach. duas, myrrhæ drach. quatuor, floris rosarum drach. iij: meliloti, mastiches, vtriusque drach. iij: aloes drach. iij, corticis mandragoræ drach. iij, carnis palmularum quadrantem: excipe cerato ex rosaceo apparato. C Asclepiadæ qui Philophysicus dictus est, hoc est nature studiosus, ad Stomachi subuersiones. Facit C Cœliaci & Dysentericis. Seminis hyoscyami 3 iij, seminis apij drach. quatuor, floris rosarum drach. ij, seminis anisi drach. ij, succi hypocistidis drach. ij, myrrhæ drach. duas, croci sesquidrachmam, opii sesquidrachmam. Arida tundito & per angustissimum cribrum excernito: hypocistidem vero & myrrham, & papaueris succum vino myrteo dissoluta aridis adicito: & pastillos formato, eos q̄ in umbra reficcato. Vnus tempore quantum opus est tufum, melle cocto excipito, & deinde linteolo infartum locis affectis imposito. Si fortis fuerit fluxio, succi hypocistidis aliam adhuc drachmam addito, & floris rosarum tantundem. C Aliud Galli Marci Asclepiadei, ad Easdem affectiones. Seminis hyoscyami drachmas iij, florum rosarum drachmas duas, anisi drachmas duas, seminis apii drachmas quatuor, opii drachmam j, succi hypocistidis drach. ij, myrrhæ trogloditidis drachmas ij, croci sesquidrachmam, vini myrtei quod satis est, mellis cocti quod sufficit, præpara, ac vtere vt dictum est. Eiusmodi pharmaca etiam bibuntur, & valde auxiliantur. Cohibito autem fluxu & sequente dolore, tantundem ponderis cerati rosacei ad pharmaci confectionē addere oportet. Si vero multa fluxio contingit, ad pharmacum succi hypocistidis drachmas tres conijcito, & florum rosarum aliam drachmam.

Vigilijs infestantibus, etiam succi papaueris aliam drachmam addito. C Aliud Nicerati, Cœliaci, Dysentericis, valde generosum. Oenanthes drachmas duas, rosarum siccarum vnciam vnā, mastiches vnc. j, aloes vnc. j, gallarum omphacitidum vnc. i, aluminis rotūdi vnc. j, acaciæ vnc. j, cere lib. i, picis brutiæ quadrantem, olei myrtei lib. j, arida cum liquidis committito. C Aliud valde præclarum. Oenanthes vnciam i, omphacii vnc. i, gallæ omphacitidis vnc. i, aluminis scissi vnc. i, acaciæ vnciam i: cytinorum mali punici, balauftii, mastiches, singulorum vnc. i: vini myrtitæ quantum satis est his subigendis, carnis phœnicobalanorum sexuncem: excipe cerato præparato ex lētiscini libra vna, præpara ac vtere vt dictum est. Hæc quidem igif præscripta pharmaca facultatis sunt adstringentioris:

† καὶ τριχας
ἢ ὅταν ἀνατεῖ
νῶντας, est in
impressis, vt
translulit in-
terpres. in ali-
quibus manu-
scriptis, καὶ τρι-
χας εἰς τὰ
ἄνω τεῖνον-
τας, i. tum ca-
pillorum ad su-
periora tra-
ctū.

* Aliter ii.

* Aliter iij.

* Aliter iiii.

* Al. philoso-
phicus.

* Aliter ii.

* AE vnciam.

Aadstringentioris: Quæ verò deinceps ab Asclepiade prodita sunt, mistam facultatem habent, adeo ut etiam induratas inflammationes curent: & propterea etiam hepaticis utilia sunt, opus enim habent etiam illi adstringentium ad laxantia mistura, non tamen æque ut stomachici: in stomachicis enim medicamentis qualitas adstrictoria prædominatur. *Malagma Nilo inscriptum, facit ad* † *Distentiones, & ad Articulorum dolores. Dissolvit omnem Duritiem. Facit & ad Exarticulata & Luxata post declinationem inflammationum impositum. Facit Splenicis & Hepaticis.* Cerae libram j, ammoniaci thymiamatis lib. j, olei cyprini lib. j, croci semunciam, aceti quod satis est: ammoniacum dissoluito, deinde sic arida adiungito. *Aliud ex libris Arij Asclepiadei.* Ammoniaci thymiamatis lib. ij, diligenter tritas in vas fictile conijce, ei q̄ flor. salis lib. j adde, & olei cyprini sesquilibram. Coque ad lentum ignem assidue agitando: atq; ubi emplastri formam acceperint, adijce cerae lib. ij: qua eliquata cum pharmacum amplius non inquinaverit, eximito, & in mortarium transferto, conquassatum q̄ diligenter reponito, ac vitior. *Malagma Nilei crocorum, pharmacum accommodatum ad Prædictas affectiones, facit & ad Erysipelata. Hoc usus est Licinius Atticus.* Ammoniaci thymiamatis lib. j, cerae lib. j, olei rosacei libram j, croci vnciam vnam, aceti quantum sufficit: preparato pro more.

† *Hypochondriorum, est in cod. græco.*

* *κροκινόν, al. κρόκινον, al. κίρρον.*

Aliud Melinum inscriptum aromaticum, Hepaticis, Stomachicis, & ad Præcordia distenta, & omnem Nervorum per consensum affectionem. Ammoniaci thymiamatis drach. c, cere ponticæ 3 c, melilotorū 3 † xij: croci, myrrhæ, bdellij, singulorum 3 viij: olei cyprini lib. j. *Aliud facit Stomachicis, Hepaticis, ad Præcordia inflammata, & omnem Nervorum per consensum affectionem.* Cerae drach. c, croci drach. xij, ammoniaci thymiamatis drach. c, myrrhæ drach. xij, bdellij 3 viij, confectiois hedychroi quadrantem, vini dulcis quantum sufficit, olei cyprini lib. j: præpara pro more. *Aliud Napolitæ, Aromaticum inscriptum, pharmacum accommodatum ad Internas affectiones.* Ammoniaci thymiamatis lib. ij, cerae lib. ij, olei rosacei lib. ij, confectiois hedychroi libræ dimidium, meliloti libræ dimidiū, cyperi libræ dimidium, nardi celticæ libræ dimidium, flor. iunci odorati libræ dimidium, vini dulcis quod satis est. Arida cum liquidis subacta committito. *Malagmata bona Inflammationum circa debilitate inueteratarum: quæ ad Hepatis inflammationes similiter conueniunt. Malagma Asclepiade ex Meliloto Hieraticon, hoc est pontificium inscriptum, Stomachicis, Hepaticis, & ad Viscerum dolores.* Nardi celticæ drach. x, cyperi 3 x, myrrhæ drach. x, cardamomi drach. viij, meliloti drach. xl, croci drach. viij, amomi drach. viij, cypheos hieratici hoc est sacrificulorum drach. xvi, ammoniaci thymiamatis drach. xl, resinæ terebinthinæ drach. lxxx, cere minam vnam, {olei cyprini minam vnam,} vini odorati Italici heminam vnam. Præpara, ut dictum est, ac vitere. *Aliud Basilicum, hoc est Regium inscriptum, faciens*

† *Additur in manuscriptis, stomachi.*

ad Prædictas affectiones, omnem q̄ per consensum Nervorum affectionem. Cerae minas ij, ammoniaci thymiamatis minas ij, resinæ frictæ minam vnam, meliloti minæ dimidiū, propoleos drach. xxv, myrrhæ drach. xxv, nardi celticæ drach. xxv, styracis drach. xxv, cyperi drach. xxv, iridis illyricæ drach. xxv: cardamomi, panacis, vtriusque drach. xxv: croci, casia, mastiches, opobalsami, amomi, flor. iunci odorati, singulorum drachmas xvi: vini Italici odorati quantum sufficit. Arida cum nardini Aliani aromatici libris quatuor subacta pro more præparato. *Malagma Polyarchion facit Peripneumoniacis, Stomachicis, Splenicis, Hydropticis. Facit ad Affectiones circa Vesicam aut Vterum: ad omnem Nervorum per consensum affectionem.* Cerae minam vnam, terebinthinæ minam vnam, bdellij minam vnam: ammoniaci thymiamatis, cardamomi, cyperi, singulorum minam vnam: meliloti, amomi, nardi indicæ, croci, myrrhæ, thuris, xylocinnamomi, singulorum drach. xxv: olei cyprini heminam vnam, vini italici quod satis est. Præpara pro more ac vitere quandoque immisto, quandoq; dissoluto cum cerato cyprino. *Polyarchi Pharmacum accommodatum, facit ad Prædictas affectiones, & omnem Nervorum per consensum affectionem. Facit etiam ad assiduas Cruditates, & Corruptentes cibum, & Vomentes bilem, ac omnes Inueteratas affectiones. Usus est eo Iulius Agrippa. Compositio hoc modo habet.*

Castorij, amomi, vtriusque sescunciam: piperis albi sescunciam, & longi sescunciā, myrrhæ quadrantem, confectiois hedychroi quadrantem, carpobalsami quadrantem, croci quadrantem: foliorum malabathri, casia rosas referentis, panacis, opobalsami, nardi indicæ, singulorum quadrantem: flor. iunci odorati, cinnamomi, vtriusq; trientem: pyrethri, croci, cardamomi, singulorū trientem: cyperi semissem: iridis illyricæ, aristolochiæ longæ & rotundæ, singulorum semissem: cerae lib. iij, terebinthinæ lib. ij, resinæ laricis quadrantem: In alio exemplari, etiam bdellij trientem, ammoniaci thymiamatis trientem: vnguenti nardini aliani lib. iij: vini falerni quod satis est: præpara pro more. Ego autem adijcio mastiches, cinnamomi, ammoniaci thymiamatis, styracis, aloes, opobalsami singulorum quadrantem. *Malagma Andromachi ex Meliloto.* Nardi celticæ drachmas octo, cyperi drach. octo, iridis illyricæ drach. octo, myrrhæ drach. octo, croci drach. quatuor, meliloti drach. xxv, ammoniaci thymiamatis drach. l, terebinthinæ drach. l, cerae drach. c, cyprini heminæ dimidium, aceti quod satis est: quidam ammoniaci drach. c conijciunt. Facit ad omnia interna. *Malagma Polyarchi ex epistola ad Omnia interna.* Cyperi minam vnam, cardamomi minam, mannæ tantundem, cerae tantundem, terebinthinæ frictæ sesquiminam, aut liquide minas iij, cyprini quantum sufficit. Ego etiam bdellij appono minam vnam. *Aliud, altera descriptio.* Cyperi, cardamomi, amomi, bdellij, thuris, balsami, singulorum minam vnam: cere sesquiminā, resinæ frictæ minas quatuor, cyprini hemine dimidium, vini odorati sesquiheminam. Præpara ut

* *costi.*

* *AE vncias ii.*

* *Aliter decem.*

Quinta Classis.

bbbbb

meris

DE COMPOS. PHARMAC.

moris est, ac vtere velut praescriptis. Vt ego componere soleo: Cyperi, cardamomi, amomi, bdel- E
lij, thuris, singulorum minam vnam: cereae minae dimidium, resinae frictae aut terebinthinae minas
iij, cyprini heminam, caliae minae quartam partem, ammoniaci thymiamatis minae quartam partem:
nardi indicae, croci, myrrhae, singulorum minae quartam partem: vinum odoratum.

De Hepate & eius Affectionibus.

CAP. 7.

Cum haec tractatio postrema omnium à me conscribatur, omnibus sanè manifestum esse opi-
nor, quod ex duobus his alterum verum sit, Aut alias oēs inutiles esse & superuacaneas, si quis
ex hac sola iussiciens sit oēs affectiones curare, quae medelam per pharmaca requirant: Aut, si qui-
dem illae utiles existant, primum ipsas legendas esse, & in memoriam reuocandas illis, qui hinc ali-
quid commodi auferre velint. Ipsas etenim methodos curandi praedictas affectiones in quatuor-
decim libris de curandi Methodo inscriptis prodidi: nunc verò tanquā his ipsis cognitis, citra prae-
dictas demonstrationes in memoriam reuoco, ostēdēns oīno, quō nos pharmaca componamus,
& quae à prioribus scripta sunt iudicemus, inde quod in vsum agere ac allumere confidamus. Et sanè
utilis haec speculatio existit. Nam empirici qui suam artem rationis expertem esse volunt, om-
nia quidem legenda esse cēsent, quae à probatis medicis sunt conscripta: non aut statim in vsum af-
sumenda esse, sed prius iudicanda, an singula ex ipsis ea quae promittunt, opere etiā demonstrare
possint. Nos autem experientiam in omni arte magnum quid posse persuasi speculationes tum
per rationalem methodum, tum per rationalem indicationem, inuentas, ad ea quae ab ipsis de iur-
dicationis historia tradita sunt, apponimus, demonstrantes, qualem facultatem ad ambulandum
vtrunquē crux exhibet, talem in medicina experientiam & rationem habere. Itaque in tractatione
de simplicibus pharmacis per vndecim libros conscripta, singulorum sponte naturae productōrū
pharmacorum facultatem qua methodo quis inueniat recēsuimus: atque etiam ad particularem
ipsorum materiam progressi, vtilissimam ad artis opera facultatem omnem secundum species pro-
didimus. Consequenter autem ab illo opere, etiam curatiuam tractationem, quomodo quis opti-
me nō solum simplicibus, sed etiam compositis, vtatur, exposuimus: simul quod vias compositionis
ipsorum omnes indicauimus. Caterum in proposito iam opere, quomodo varietas composito-
rum medicamentorum inducta sit ostendimus, ac certos iuxta speciem scopos tum compositio-
nem, tum vsum, ipsorum deducētes, amplius quod iudicationem eorum quae iam ante scripta sunt
docentes. Cum igitur consequenter post praedicta ad affectionum hepatis doctrinam progredi
velimus, affectus circa ipsum consistentes non nuda doctrina, sed ratione exquisitos, referemus,
& ab vniuersalibus scopis curationis ipsorum, quos in curandi methodo tradidimus, ad compo- G
sitionum doctrinam perueniemus. Primum igitur omnium discernendum est, num debilitas quae
dam visceris addit, quemadmodum etiam de ventre diximus: aut etiam alia quaedam affectio ipsum
apprehenderit: aut citra debilitatē affectū sit, inflammatione, aut induratione, aut abscessu laborans,
aut obturatione: quemadmodum etiam an erysipelatofam habeat affectionem, aut vlcus, aut ali-
quam putrefactionem, nam & in hoc hepaticam affectionem dicunt: Quemadmodum etiam ore
ventris affecto plerique quod medici ac idiotae stomachicam affectionem vocant, in multis symptomati-
bus, non tamen omnibus, circa vnā affectionem accedentibus contingētē, sed circa multas vna
quadam generali cōmunitate comprehensas, & tamē inter se in tantum differentes, vt aliquae ipsa-
rum maxime contrariae existant. Quomodo enim non maxime contrariam quis dixerit frigidā in
temperaturā calidā, humidā sicca, quanquā secundum genus eadem sint: Ferme autem omnia cō-
traria eadem genere si quis dixerit, non peccabit: contrariorum enim notio contingit, vbi pluri-
mum inter se distant. Plurimum autē distant à medijs in quocunquē genere ea quae extrema sunt,
adeo vt contraria saepe quidem eadem videantur iuxta communis generis fines: saepe vero gene-
ralioribus contrarijs supra ipsa ascendētibz, ab illis comprehendantur. Illa ipsa vero ob id oīno
contraria sunt, quod cum vnus generis sint, plurimum inter se distent, adeo vt quae his subiacent, H
primū & supremum genus cōmune habeant. Atque hoc quidē, hoc loco semel à nobis obiter & ac-
cessionis loco dictū, semper in memoria teneatur, ne videlicet cuiuspiā videri possit à se ipso dissen-
tire, qui aliquando vnā affectionē in duobus hominibus eandē esse dixerit: aliquando non vnā,
neque eandem, sed duas contrarias. Intemperiem enim vnā quādam affectionē generaliter appel-
lant, sed quae in contrarias differentias secetur. Licet enim secundum hoc quod diximus, duo &
tria & plura iuxta particulares differentias inter se contrarijssima esse †: & secundum hoc debilita-
tis hepatis affectionem vnā esse, quā intemperiem vocant, praefatus, non male rursus dixerō non
vnā, sed octo affectiones esse, propterea quod tot differentiae intemperierum existant. Etenim
rursus iuxta aliam sectionem duae intemperierum differentiae fiunt, & rursus iuxta aliam tres: haec
quidem in qualitatibus solis, affectis partibus alteratis: haec verò cum humoribus quibusdam, aut
in spatijs affectarū partium cōtētis, aut in ipsis corporibus irriguis ab illis factis. Circa ventrē
igitur & intestina vna in singulis est cauitas, quae vitiatam humiditatem suscipere potest: Verum
circa hepar tot numero sunt, quot sunt arteriae & venae. Cum verò haec omnes angusta oscula ha-
beant, qua parte lima huius visceris cum g gbbis coeunt ac committuntur, obturatio & oppilatio vi-
tiosorum humorum aliquando contingunt, ad quas putrefactio consequitur in calidis breui, in
frigidis

* πείραν.

* χρῆσιν.

* θεωρηματα.

* Al. γεννω-
τάτων i. gene-
ralissimus.

† Additur in
antiquis λέ-
γειν i. dicere.

A. l. 3 f. 14. t. 1
c. 13. fol. 309.

A frigidis intemperaturis verò non citò, sed temporis progressu accedens. Fit autem intemperatura iuxta propriam hepatis substantiam, quam Erasistratus putat præterfusionem quandam, hoc est parenchyma, & non principalissimam visceris partem esse. Fit etiam intemperatura circa contentas in ipso venas & arterias, & iuxta materias in spatijs ipsarum contentas. Cum autem habeat hoc viscus non vnam sed plures facultates actionum, quas vitæ tempore operatur, easque tot numero, quot sunt actionum species, contingit sæpe vnam ipsarum præcipuè lædi, sæpe duas, & tres, atque omnes quatuor simul. Actio nanque ipsius vna quidem attrahere cibum & alimentum in sese: altera verò obuoluere & continere, donec permutans ipsum sui ipsius faciat partem. Est igitur hæc ipsius facultas principalissima & ferè prima, concoquere videlicet & permutare ac alterare atque assimilare sibi ipsi alimentum, quam alterationem vocamus: quæ verò iuxta hanc alterationem remanent recrementa, ea per aliam facultatem, quam excretiuam & expulsiuam nominamus, expelluntur. Oñsum autem est quòd hæ facultates omnes in omnibus sunt partibus corporis per omne vitæ tempus: omnes enim familiare sibi attrahunt, & alienum excernunt, attractum quæ temporis progressu alterant, quo tempore etiam retinent & constringunt. Vocatur autem alteratio ipsa, vsque quò in similitudinem partis quæ nutritur transmutatur, concoctio: vbi

B verò iam parti apponitur, nutritio. Cum igitur hepar præ imbecillitate ex ventre & intestinis alimentum trahere non potest, liquida & non dum iusto modo exuccata per sedem excernuntur: & si quidem venter simul cum hoc viscere fuerit imbecillis ac non probè concoquens, cruda: si verò validus fuerit, concocta quidem, sed liquida, propterea quod nulla aut omnino modica digestio ac distributio ad hepar est facta. Si verò traxerit quidem hepar in se ipsum ex ventre & intestinis alimentum, sanguificare autem ipsum præ debilitate nequit, quemadmodum in ventre multiformis corruptio contingit eorum quæ cruda remanent, sic etiam circa hepar. Dico autem nunc cruditatem solam, non comprehendens hoc sermone tardam concoctionem. Quòd si velis alimentum vbi crudum permanet, & alterationem quæ fit à particula iuxta naturam, non assumpsit, itidem crudum appellare, neque ego fugio appellationem, si mihi saltem differentia rerum conseruetur. Peior enim est ea transmutatio quæ in peregrinam qualitatem iuxta cruditatem fit: Moderatior verò ea est, in qua alimentum suam naturam quam diutissimè seruat nulla alteratione ex particula, quæ ad ipsum concoquendum à natura destinata est, suscepta: Atque & tertia præter has species est frustrata concoctionis, cum semicoctum fit alimentum. Et circa ipsam sanè exactam concoctionem frustratam, hepaticis sanguinolentus humor per aluum excernitur talis consistentiæ,

C veluti si quis sanguinem cum aqua confudisset: & plerique sanè medici imaginem eius depingentes scripserunt talem eius compagem esse, velut si quis victime recens maciata carnes aqua lauallet. Et plurimæ hepaticæ affectiones ab eiusmodi excretionibus initium capiunt, non dū magnam debilitatem hepate habente, sed adhuc concoquere, & alimentum alterare velut in formam sanguinis, potente. Aucta autem affectione nihil amplius tale excernitur, sed multiformes aliæ qualitates & compages, velut à ventre ex cruditate laborante. Verum in ventre ciborum ipsorum corruptiones manifestè apparent: circa hepar verò distributum alimentum ad sanguinem prius in viscere existentem admiscetur, corrumpitur quæ temporis progressu etiam hic, vna cum alimento circa ipsum non concoctio. Calida igitur intemperie circa viscus existente colliquationes fiunt, primum humorum, deinde etiam carnis ipsius hepatis: & euacuatur per ventrem bilis crassa, graueolens, & abundè colorata, quemadmodum in pestilentibus febribus contingit. Frigida verò intemperie existente, neque assiduæ excretiones, neque multæ fiunt: durat tamè affectus diutius, & per aliquos dies profluet ipsis venter maiori copia, cuius neque fætor similis est ijs quæ ex calore sunt liquefacta, neque color similis, aut compages, verum minus graueolentia ab his excernuntur, speciem putrefacti sanguinis, non colliquata carnis, habentia. Aliquando verò id quod excernitur, velut sanguis niger apparebit: verum diligenter consideranti neque sanguis niger est, neque grumus, sed velut limus quidam sanguinis crassi, qui propè ad atram bilem accedat: & plures ac ægrè iudicabiles colores circa eiusmodi affectionem in egestionibus apparent. In vtraque autem intemperie tum calida, tum frigida, quando intemperatura humida & sicca fuerint admixta, liquidiora in humiditatis complexu, sicciora verò ex siccitatis copula, fiunt recrementa. Scopus igitur curationis in eiusmodi affectionibus fit communis quidem iuxta intemperiei contrarietatem, peculiaris autem unicuique per cuiusque contrarietatem. Affectio igitur Hepatica peculiariter appellata, veluti etiam coeliaca, & stomachica, citra tumores præter naturam circa ipsas partes contingit. Inflammatum enim esse hepar, aut abscessu laborare, aut induratum esse, medici dicunt, aut aliud quippiam tale, non tamen hepaticum vocant hominem ipsum, cui tale quippiam accidit: verum quando citra manifestum aliquod in viscere malum, in proprijs actionibus debilitatur, tunc ægrum hepaticum appellant. Videamus igitur primum ea quæ scripserunt ij qui ante nos de pharmacis optimè & studiosissimè tradere sætegerunt, initio ab ijs quæ Andromachus prodidit factò. Hic enim vir in libro internarum affectionum curationes continente, multas hepaticas confectiones conscripsit, quarum omnium faciam mentionem hoc loco, ipsius verbis in medium adductis, & primum sanè Antidotos adscribam.

† Aliter i.
† Aliter j. s.

Andromachi antidotus Cyphoides ad Hepaticos, & omnia Thoracis vitia. Vuæ passæ carnis drach. xxv, alij drac. centum: croci drac. j, alij obol. iij: calami drac. † ij & dimidiam, bdellij † drachmas duas & dimidiam, calix sesquidrachmam, cinnamomi obolos tres, spicæ nardi drach. tres, floris iunci odorati drach. duas & dimidiam, myrrhæ drachmas quatuor: terebinthinæ drach. iij, alij drach. xvi: ramentorum aspalathi drach. ij, mellis drach. xvi: vini quod satis est. Hæc quidem est antidoti descriptio. Appellavit autem ipsam Cyphoide, hoc est cypheiformem, ob similitudinem: nam & odore & gustu similis est cyphi ab Ægyptijs appellato, qui sanè primi hoc pharmacum composuerunt, & vtuntur eo quotidie ad vaporem ædendum accenso in deorum honorem. Plurima autem eorum quæ in illo thymiamate & suffumigio scripta sunt, eadem sunt cū ijs quæ in hoc pharmaco habentur: quin & suffumigari hoc ipsum similiter vt cyphi potest. Compositum est autem ex moderatè adstringentibus, & resiccantibus, ac discutientibus vitiosos serosos humores, & corrigentibus humorum malitiā, & contrariam vim habentibus aduersum putrefactiones, quorum plurima ex aromatum sylua existunt. Habet itaq; pharmacum hoc cinnamomum omnes putredinosas & venenosas facultates corrigens, non solum serosorum & aliorum humorum, sed etiam lethalium pharmacorum: quemadmodum & feris virus eiulantibus contrarium existit. Consequenter autem post cinnamomum calix eandem vim habet, optima videlicet & cognata ipsi cinnamomo. Et post hanc omne aromatum genus velut hic est nardus, & iuncus odoratus, calamus ꝑ, & myrrha: hæc enim ad propositum pharmacum iniecta sunt iuxta iam dictam ratiocinationem & modum: quemadmodum etiam ex ijs quæ apud nos gignuntur, aspalathus, & crocus, adstringens & concoctorium pharmacum, & quod corrigit putrefactiones.

Cæterum vuæ passæ contemptilis videri possit ob familiarem eius vsum: at verò hoc ipsum eam facit vtiliorem, nam cū familiaris nobis sit, in tantum adstringens est, quantum opus habet viscus affectum. Habet autem & vim concoctoriā crudorum humorum, & vim coercēdi maligna: fit que ipsa haud facile putredini obnoxia, & vltra hæc secundum totam substantiam visceri ipsi familiaris est & propria. Didicimus enim quòd alimenta secundum totam suam substantiam, proprietatem ac familiaritatem habent ad ea quæ aluntur, quod maximum est in huiusmodi affectionibus curandis quæ iuxta intemperiem fiunt: optimè enim in ipsis faciunt quæ vnà cum hoc q̄ intemperiem curant, etiam alere possunt. Et ob id etiam vinum conuenientissimum est citra inflammationem, aut erysipelas, aut abscessum, aut calidam intemperaturam, ægrotantibus: nam & nutrit, & concoquit, & roborat, & putrefactioni resistit: & si intemperies ex humiditate facta sit & frigiditate, eam citra omnem molestiam ac securè persanat. Eadem est & mellis facultas, præterquam quòd non condensat substantiam corporum quæ contingit, sed pro hoc vim extergendi, & aperiendi, ac puros reddendi meatus, & vrinam ciendi, non parua sanè auxilia possidet. Porro admissum est à compositorum pharmaci bdellium, sufficienter emolliens & concoquens, velut didicimus, amplius que moderatè discutiens. Consimilem fermè vim terebinthina resina habet, supra hoc quòd angustos meatus extergit & expurgat: quibus auxilijs viscus curandum opus habet, quòd osculorum venarum in ipso commissuræ laxæ & ab obturatione liberæ permancant: didicimus nanque quomodo obturatio efficiat putrefactiones. Aliqui tamen huiusmodi confessionum compositores, quemadmodum etiam prius in stomachicis dictum est, opium, aut hyoscyamum, aut quippiam aliud ex refrigerantibus miscendo, ad calidas intemperies vtile pharmacum effecerunt. Et ob id etiam Philonis Antidotus mirificè semel tantum exhibita hepaticam intemperiem sanauit, id quod & compositor eius testatum reliquit. Verum ex pharmacis hepaticis ab Andromacho conscriptis nullum est huiusmodi. Et sanè vehementer refrigerans nullum esse debet, sed qualia tum ab alijs, tum ab Asclepiade, sunt scripta. Nunc igitur hepaticas antidotos consequenter ab Andromacho proditas subscribam, modò memoria nos teneamus nullam

* Aliter ii.

Alia Cyphoides ad Hepaticos, ex libris Galli, ad Tussis item & Reiterationes. Croci drachmam vnam, cinnamomi drach. j, myrrhæ drach. vnā, bdellij drach. quatuor aspalathi obol. iij, iunci odorati drach. iij, calami drach. ij, calix drach. j, nardi indicæ drach. vnam, terebinthinæ drach. vi, carnis passerum vuarum drach. clx, mellis heminam dimidiam, vini chij quod satis est ad macerandam vuam passam bdellium que ac myrrham: resinam verò melle liquefacito: & deinde omnia mista ac trita reponito. **Alia** ad Hepaticos & Ictericos. Amygdalarum amararum drachmas duas, anisi drach. j: ablinthij, cumini, seminis apij, singulorum drach. j: cornu cerui obol. iij: trita cum aqua in pastillos triobolares redigito, ex eis q; vnum manè ac vesperti cum vino mulso dato. **Nectarea** Antidotus ad Hepaticos, & Arquato laborantes. Helēnij sesquibram, crocomagmatis lib. ij, aristolochiæ vnc. j, petroselinij vnc. j, piperis nigri vnc. dimidia, myrrhæ vnc. i, mel quod satis est. **Antidotus** Hepatica, Athanasia appellata. Facit & ad Nephriticos & Ictericos, multum Mouet sudorem. Croci drac. ij, cinnamomi drac. j, nardi drac. ij: calix, myrrhæ, iunci odorati, singulorum drach. j: melle attico excipe. Datur fabæ græcæ magnitudine, febricitantibus ex aqua

* Al. σελίφου
i. apy.

A. l. 5. f. u. 1. 2. 1.
fol. 526. h

Al. c. fu. 1. c. 1. 1.
c. 330. d

A aqua mulsa. *¶ Hepatica^a admiranda, qua Pharnaces herbarius agrosus usus est.* Croci drach. ij: mei, asa-
ri, phu pontici, dauci, petroselini, myrrhæ, singulorum drach. iij: nardi indicæ & celticæ, vtriusque
drach. vi: costi, calix, iunci odorati, singulorum obol. iij: carpobalsami drach. iij & dimidiam, ru-
biæ drach. octo, succi radiceis dulcis drac. ij, hemionitidis herbæ drach. iij, polij drach. iij, succi balsa-
mi drac. vi, confectiōis hedychoi drac. v, mellis quod satis est: vttere. Ad omnia vitia efficax est,
nucis ponticæ magnitudine, cum vino mulso. *¶ Antidotus Hepatica a Neuro laudata.* Radicis pa-
natis, rubiæ, eryngij, eupatorij, helenij radiceis, polij, costi, aristolochiæ, piperis, scelopendrij herbæ,
seminis cucumeris, chamæpityos, radiceis gentianæ, mili suæ rubricæ sinopidis, fellis vtrini, spicæ
nardi, baccharum iuniperi, seminis brassicæ, seminis erucæ, singulorum par pondus: melle attico
cocto excipe ac vttere. *¶ Antidotus Hepatica Diâscori.* Cinnamomi, calix, vtriusq; drach. iij: cro-
ci, nardi, costi, seminis balsami, hyperici, glycyrrhizæ, singulorum drac. viij: excipe melle attico, ac
exhibe nucis ponticæ magnitudine. *¶ Alia ad Hepaticos, & reliquos Internos affectus, vt Angustiles.*
Piperis grana xl, myrrhæ drac. viij: croci, costi, mei, acori, nardi, dauci seminis, petroselini, scordij,
singulorum drach. iij: cinnamomi drach. xij, calix drach. xij, mellis quod sufficit. Datur nucis pō-
tica magnitudine. *¶ Potio ad Hepaticos, Spleneticos, Nephreticos, Hydropicos. Auxiliatur & Stomachu-
bus, & molestijs ex Partu, & Conuulsis. Prodest Conualescentibus & se resipientibus ex infirmitate. Facit ad Vi-
tiosos humores, Ictericos, & Tu- jes, ac Pleuriticos. Est etiam antidotus ad iustalia pharmaca, & ad Forarum pla-
gas.* Nardi indicæ 3 ij, costi 3 ij, calix 3 j, croci drach. j: piperis albi obol. v, alij 3 ij: seminis apij drac.
j obol. iij, iridis illyricæ tantundem, acori drach. j obol. j, opobalsami drac. j, succi ari masculi drach.
iij, vix passæ exacinate drach. vi: terito cum pasto, aut melle excipito: & drachmam vnam cum vi-
no diluto dato, aut cum aquæ mulsæ cyathis quatuor, aut vt conueniens fuerit. Hæ quidem sunt
Hepaticæ confectiōes ab Andromacho proditæ. Trālibo autem iam inde ad eas, quas Asclepia-
des tradidit in tertio internorum, quæ Mnasoni inscribit.

Confectiōes Hepaticæ ab Asclepiade conscriptæ.

CAP. 8.

Primam equidem confectiōem Asclepiades Antonij Musæ esse dicit, hoc modo composi-
tam. *¶ Succi cichorij cyathum vnum cum aquæ calidæ cyathis tribus dato, mellis attici co-
chleario addito. Aut filicis vel anethi succi cyathum vnum cū aquæ mulsæ cyathis iij dato. Aut
picridis recentis, aut seridis recētis, succi cyathum vnum cum aquæ mulsæ calidæ cyathis iij. Hæc
prima est descriptio trium pharmacorum in Asclepiadæ libro. Cichoria itaq; & seris cibarij ge-
neris existunt: apud nos nanq; rurales ambo hæc edunt & cruda & cocta: vtitur eis etiam Erasli-
stratus abunde in affectiōum circa aluum cura. Facultas horum olerum subfrigida est & subama-
ra ac moderate adstringens, & propter has qualitates, optima pharmaca calidis intemperaturis ip-
sius hepatis existunt: vltra hoc enim quod moderate refrigerant, amplius & robur visceri addunt
per adstrictoriam facultatem. Insuper q; commissuras osculorum venarum in sima visceris parte
ad eas quæ in gibba sunt, extergent. Neque verò frigiditas intemperies magnopere ledunt, quem-
admodum, quæ frigidam humiditatem absque adstrictione aut amaritudine possident, facere so-
lent. Iutare etiam viscus talium olerum substantia potest, etiam si citra serosorum aut aliorum hu-
morum vitiationem intemperies fiat per se, & cum humiditatis cuiuscunque complexu: ex mistu-
ra enim mellis, humiditatem per vrinam educunt: quapropter etiam si siccata tusa quis potioni in-
spergat, itidem iuuant: quin & decoctorum decoctum potatum multum commodi affert. Si ve-
ro non calida aliqua intemperies infestet, aut si obturatio quædam sit circa viscus, magnopere au-
xiliantur ex vino albo tenui potata cum ijs quæ vrinam ciunt. Vtilis autem non solum succus ip-
sorum est tum recens, tum exiccatus: sed & ipsa olera exiccata tusa que ac trita potui inspersa, &
eorum decoctum in potu acceptum, auxiliantur. Cæterum ad visceris expurgationem & mea-
tum apertionem, citra manifestam calfactionem aut refrigerationem, optimum pharmacum fi-
dix est, prædominantem habens amaram qualitatem. Anethum verò nihil forte habet ad huius-
modi affectiōes, sed modice refrigerati ac condensati visceris curatiuum existit. At verò catapo-
tium ex chamæpity, cuius itidem meminit, eiusdem cum prædictis facultatis est, amarum enim &
hoc pharmacum est: nihil igitur mirum est, ipsam chamæpityn tum per se, tum cum cichorio po-
tatam, hepaticas intemperaturas iuare: Quemadmodum Asclepiades scripsit in hæc verba.*

¶ Catapotium Hepaticis. Radicis chamæpityos drach. octo, radiceis cichorij drach. quatuor: con-
tunde & excipe melle cocto: ac præbe nucis ponticæ magnitudinem, & aquæ calidæ cyathos tres
insuper bibendos. Hæc Asclepiades scripsit. Iuuant autem prædictæ herbæ hepaticos, non solū
radicibus ipsarum acceptis & præparatis, velut Asclepiades prodidit, sed & succo, & decocto, &
arida coma vna cum semine tusa ac trita, assumptis. Quin & Sphendarni, id est aceris, radix tu-
sa & trita nam & huius meminit, eiusdem est cum prædictis facultatis. Exhibet autem ex ea drach.
j cum vini nulli diluti cyathis tribus. Insuper & ex nardo celtica pharmacum, cuius item memi-
nit, his consimile est: scripsit autem ipsum sic: Nardi celticæ partes tres, absinthij partem vnam,
tusa & cribrata melle cocto excipito, & mystrum delingendum dato. Et quod post hoc scriptum
est, consimile ipsi existens in reliquis, plus habet de vi expurgandi ipsum viscus per vrinas. Scri-
psit autem sic Asclepiades de ipso: *¶ Pylillus Hepaticus amarus.* Anili, seminis apij, asari, amyg-

Quinta Classis.

bbbbb ij dalarum

Al. c. 2. c. 129
c. 330. d

† *Aliter y.*

dalarum amararum mundatarum, absinthij, singulorum 3.iiij: præpara cum aqua & reduc in pa-
stillos: ac febre carētibz exhibe 3 † j, cum vini diluti cyathis iij, febriculis cū aqua mulsa. Hoc
pharmacum leniter quodammodo est calidum propter vrinam cientium mīsturam: reliqua ve-
ro omnia superiora, aut prædominantem habent frigiditatem, aut omnino neque hanc, neque ca-
liditatem: verum vim extergendi, & vias digestionis ab obturatione vindicandi omnia habent.

Alia insuper medicamenta ab Asclepiade scripta sunt, partim extergendi ac aperiendi & secā-
di vim habentia, partim verò calidiora paululum quam sunt media: media autem dico quæ neq;
calfaciunt, neq; refrigerant manifeste. Vnum verò inter ipsa calfactorium est, vbi ait: Costi triti
cochlearium præbe cum aquæ mulsæ calidæ cyath. iij. Reliqua verò, quæ propè ad medium tem-
peramentum accedentia, ad caliditatem vergunt, hæc sunt. Helenij drach. xij, crocomagmatis
drach. octo, excipe cichorij succo: & fac catapotia, ea que pro viribus exhibe: datur ad summum
drachma ex vini mulsi diluti calidi cyathis tribus. Hoc pharmacum poterat & absque helenio ca-
lidis intemperaturis conuenire. Quoniam autem helenium extergentibus admistum est, ad cali-
ditatem vergit, nisi quis omnino modicū de eo cum multa frigida permisceat. Quin & id quod
ex fœniculo constat calfactorium est, sic habens: Fœniculi drach. j, petroselini drac. ij: anisi, amyg-
dalarum amararum, absinthij, singulorum drach. j: croci, myrrhæ, vtriusq; obol. iij: excipe aqua, ac
redige in pastillos: & dato drach. j, vt supra dictum est. Etenim hoc loco fœniculum quidem &
petroselinum multum calfaciunt, reliqua verò moderate. Amygdalæ verò attenuatoriæ sunt fa-
cultatis, & præsertim si fuerint amaræ. Medium autem quodammodo inter calfacientia & refri-
gerantia est hoc pharmacū, quod Asclepiades scripsit hoc modo.

¶ *Eclegma Hepaticum Paulini: au-
xiliatur confestim.* Chamæpityos sicæ lib. j, myrrhæ vnc. j, passi protropi sextar. iij: chamæpityn &
vinum dulce coquito: & vbi superfuerit tertia pars, liquorem exprimito, ei q; mellis attici libram
dimidiam adijcito, ac rursus coquito: postea verò myrrham addito assidue agitando: atq; vbi dis-
soluta fuerit, ab igne ablata reponito: & ante cibum mystrum exhibeto. Scripsit & ex cochleis
pharmacum hepaticum Asclepiades huiusmodi. Cochlearum trium carnem valde probe teri-
to, & affusis vini nigri cyathis tribus calfacito, ac bibendum dato. Videntur autem hæc iuxta totā
substantiam efficacia esse, non secundum vnam aut alteram qualitatem: Quale est & lupinum he-
par, cuius abunde experimentum habemus. Vfus autem ipsius consimilis cochleis est: teritur. n.
exacte hepar lupinum, & datur drachma vna cum vino aliquo dulci, qualia sunt theræum, creti-
cum, & scybelite, ac dulce protropum. Benigna enim hæc sunt viscera, ipsum nutrire potentia, &
media iuxta calidi & frigidi oppositionem: & ob id talia pharmaca omnibus intemperaturis con-
uenire videntur, vt quæ ex substantiæ proprietate commoditatem de se exhibent, & neque cali-
das, neq; frigidas, intemperies lædant. Atqui in febricitantibus manifesta febris, aut non obscure,
velut solet aliquibus hepaticis accidere, melius est ex aqua calida pharmacū præbere, aut ex aliquo
prædictorū succorū, velut est seridis succus. Ad induratas hepatis affectiones. Et ad has Ascle-
piades quatuor pharmaca his verbis scripsit.

¶ *Confectio ciens Vrinam, facit ad induratas Hepatis affe-
ctiones, ad Splenicis, & Agre se à morbo recolligentes, ad Hydropicos, & in vniuersum Bonum colorem inducit.*
Crocī, nardi, calix, singulorum drach. ij: costi, floris iunci odorati, cinnamomi, myrrhæ stactæ, sin-
gulorum drac. j: mellis cocti drach. xxv. Datur fabæ ægyptiæ magnitudine cum vini mulsi cyath.
iij.

¶ *Alia, qua Vfus est Pasicrates, Vrinam multam ducit.* Seminis dauci sesquidrachmam: radicis
rheu ponticæ, floris iunci odorati, seminis balsami, cedridum, anisi, nardi indicæ, croci, cinnamo-
mi, calix, phu, afari, petroselini, chamæpityos, singulorum drach. j & dimidiam: mentæ sicæ obol.
iij, nucleorum pincarum nucum repurgatorum numero l: excipe melle cocto, & dato nucis pon-
ticæ magnitudinem cum vini mulsi diluti cyathis iij.

¶ *Alia antidotus ex Felle Vrsino, pharmacum ac-
commodatum ad induratas Hepatis affectiones.* Chamæpityos, marrubij, seminis petroselini, gentianæ,
seminis viticis, fellis vrli, sinapis, seminis cucumeris, scolopendrij, panacis, rubricæ lemnix, rubiæ,
seminis brassicæ, aristolochiæ, piperis, nardi indicæ, costi, seminis apij, seminis erucae, eryngij, po-
lij, echij, eupatorij, baccarum iuniperi, singulorum drac. vnam: tusa & cribrata melle excipe. Da-
tur nucis auellanae magnitudo in vini mulsi cyathis duobus.

¶ *Alia accommodata. Facit & ad alias
Internas affectiones curatissim.* Radicis gētiang, chamæpityos, marrubij, seminis petroselini, fellis vr-
li, sinapis, seminis cucumeris, scolopendrij, panacis, rubricæ sinopice, rubiæ, seminis brassicæ, ari-
stolochiæ longæ, piperis albi, spicæ nardi, costi, seminis erucae, eryngij, baccarum iuniperi,
fructus fraxini, chamædryos, dictamni cretici, seminis cestri, seminis dauci, singulorum vn-
ciam vnam: mellis attici quod satis est. Datur nucis ponticæ magnitudo. Liquor sit passi creti-
ci cyathi duo. Hoc pharmacum vsu & experimento approbatum est. In alio exemplari etiam pe-
lecini tantundem habetur. Circa prædicta quatuor pharmaca recte fecit Asclepiades, quod nō
simpliciter adscripsit, velut in alijs, quod ad hepaticos ipsis sit vtendum, sed cum appositione,
ad induratas videlicet affectiones. Humidæ etenim visceris affectiones exolutum & imbecille
ipsum facere solent, veluti sunt articuli laxati: siue autem cum frigiditate, siue cum calidita-
te, siue sine his, laxitas ipsius sola constiterit, penitus adstringentibus pharmacis opus habent:
verum hoc aut cum calfacientium mīstura, si frigida qualitas prædominetur: aut cum refri-
gerantium,

Agerantium, si calida. Quæ verò ob frigidos & crassos ac viscosos humores in solidis corporibus imbibitos induratur, ex necessitate frigidam habent affectionem: quare & calfacientibus, simulque tenuium partium pharmacis opus habent: hæc enim sufficientia sunt, & ad viscositatem humorum induratis partibus infartorum extergendam, & ad secandam crassitudinem, & discutientes ita extenuatos. Verum in quinto de simplicium pharmacorum facultate, ubi de eiusmodi affectionibus sermo mihi habitus est, emollientium medicamentorum misturam laudavi nimirum ut præparantem indurata corpora, & prædictis pharmacis idonea facientem: citra verò præmolitionem diffunduntur quodammodo ea ipsa corpora, & euestigio manifestam imminutionem habent: sed in immedicabiles reliquias terminatur res ubi fuerint superreficcata. Hæc eadem & in decimoquarto Methodi curatoria nobis sunt dicta. Igitur & circa hepar coniectare oportet emollientium misturam: nam cum compagis humectæ sit hepatis corpus, valde moderatis opus habet emollientibus. Prædominatur itaque in ipso præter aliarum partium induratarum morem, calfacientium & attenuantium mistura. Merito itaque ex præscriptis quatuor pharmacis Asclepiades postremum maxime laudat, ut quod multam de se experientiam præbuit: ex aromatis enim componitur attenuare ac discutere valentibus: alia quæ pharmacata adsumpsit, acriter secantia quæ ac discussoria: mitigatoria autem his admixta sunt, cucumeris semen ac iuniperi bacca: deinde verò mel & eryngium velut urinam cientia his addita sunt, quò exterius visceris affectionis per urinas deductio fiat.

Quæ Archigenes ad Hepaticos in Secundo Pharmacorum secundum genus scripsit.

CAP. 9.

In hepaticis conueniente prægresso ductu per alimenta, vnciones, communia cataplasmata, venæ sectionem, cucurbitas, sinapismos, dropaces, & consimilem diætā, amplius conscribendis compositis potionibus & malagmatis, optime ipsis conuenientibus, utaris. Et potionibus quidem his: Senecionis decoctum ut valde commodum exhibeto: nascitur autem huius caulibus maxime in tegulis. Aut vnguenti nardini cochlearia quatuor quotidie bibenda dato, & maxime in induratis. Aut aristolochiæ obolos tres propinato febrientibus ex aqua, febre carentibus ex vino: valde benefacit. Aut trifolium acidum in aqua coquito ad tertias, & per triduum bibendum dato pro vice cyathum vnum. Aut fel ursinum in vase leniter feruefacito, & in Sole reficcato, atque ex eo hepaticis cochlearium vnum dato. Aut radicis rubi corticis minam vnam, cum aquæ congio vno, in nouo vasculo ad residuum quartæ partis coquito: & ad succum per noctem sub dio expositum mellis cyathos vi admisceto: & ieiunis ad triduum bibendum dato. Aut Cypseudobunii obolum vnum dato cum melle ieiunis. Aut dauici & fœniculi radicis dimidium, cum aceto mulso ad tertias coquito: & ieiunis cyathum vnum exhibeto. Aut glycyrrhizæ succi obolum vnum aut duos ieiunis dato: & aluum subducit, & urinam mouet. In magna duritia, abrotoni succum quàm crassissimum præbe bibendum. Aut acori obolum vnum, panacis tantundem, cum aqua propinato. Aut spicæ nardi decoctum assidue exhibeto. **¶ De Cataplasmatibus.** Cataplasma porro Hepaticum fit, malis cotoneis cum farina hordeacea & fœnogræco coctis. Aut semine lini trito cum polæta in vino cocta: aut ipso lini semine in passo cocto. Aut semine lini trito cum melle subacto. Aut capparis radice in aceto mulso cocta. Aut farina hordeacea cum ficibus. Aut oleæ radice in vino cocta. Aut myrobalano tusa cum vino. Aut cerato ex phœnicobalanis factum: summe enim ad hepatis inflammationes facit, maxime in quibus etiam stomachus affectus est, & costæ distentæ sunt. Aut palmulam reiecto interno nucleo diligenter tundito, & cum æquali parte cerati rosacei in mortario probe vnito rosaceum adstillando, atque ita imposito. Aut myrrham aminæo vino macerato, & palmulis admisceto, & linteolo infarto imposito.

*Ap. oxymelite.

Cæterum malagmata quibus quis uti possit in inflammatione hepatis citra manifestam causam, post irrigationes & cataplasmata, iam ante scripta sunt in sermone de oris ventris inflammatione, nimirum communia illi & hepati existentia: in quibus sunt etiam quæ ex meliloto præparantur, & polyarchium. Verum etiam nunc apponentur quædam ex ipso Andromacho.

¶ Malagma Andromachi ad Hepaticos. Ammoniæ thymiamatis drachmas cxliii, alii drachmas centum habent: bdellii drachmas xxiiii, alij centum: aceti hemine quartam partem: cyprini heminam vnam, ego verò heminæ dimidium. **¶ Malagma Apolloniani.** Cera drachmas lxxx, bdellii drachmas lxxx, ammoniaci thymiamatis drachmas lxxx, terebinthine drachmas xl, mannae thuris drachmas xl: cum irino contundito.

Malagmata à Damocrate conscripta ad Hepar & Præcordia. Quædam ex eis etiam ad totum Ventrem & Splenem.

CAP. 10.

Affecta si quis per stomachum præcordia, Et per iecur, intestina per, dein per colum, Per ventriculum, aut viscus aliud sic propriè Dictum, volet inquam læsa quis præcordia Malagmate integere bono & percommodo, Primum paratum habebit hoc longe antea. Recens enim, est ægris minus firmum ac valens.

Quinta Classis.

bbbbbb iiij Cera

Ceræ capît quod Ponticæ libras duas,
 Ammoniâci thymiamatis solam libram,
 Terebinthinę frictę pariter solam libram,
 Vstę q̄ resinę piceę simul libram,
 Et post trientem cardamomi seminis,
 Aridę cyperi tantundem, item myrrhę bonę,
 Pondus q̄ par vni horum iridis mox candida,
 Sextantem & inde Celticę spicę integrę,
 His vnciam vnam & dimidiam croci boni,
 Et sex meliloti, item duas, bessẽm puto.
 Verũ melilotum prestiterit hĩc atticum.
 Recentis & cyprini libras olei duas.

Oleum cyprinum tu cum reliquis liquoribus
 Et decoque lenta flammula, & deradito.
 Dein tusa, cribrata & reliqua, vino bono
 Rigata per noctem integram & totam diem,
 Vinum omne donec combibant, seponito.
 Vinctis q̄ post cyprino manibus hęc pharmaca
 Mortario amplo vni, & simul committito,
 Molli q̄ pelle tecta simul reponito.

Aliud Malagma eiusdem.

Aliud valens, ætas itidem si accesserit.
 Verum hoc mage affectus vitiantes mox habitum.
 Quicunq̄ non cum flatibus, feruentibus
 Et phlegmonis lædunt diutioribus,
 Et viscera iritant grauib; doloribus,
 Iuuat, Solubiles male & iam duritias
 Soluit, soluta mole earum celeriter.

Paratur hoc modo, vt bonæ terebinthinæ
 † Libram mediã, tantum q̄ ceræ ponticæ,
 Fœni q̄ græci vnam capias puri libram.
 Et de nitro, & de panace, vnicam libram,
 Rursus anisi seminis vnicam libram,
 Pinguedinis puræ vituli simul libram,
 Pondus q̄ par contusę & albide iridis.
 Parum de aceto, tres cyathos sine dimidio.
 Mellis duas libras recentis atticı.

Ammoniâci thymiamatis solam libram
 Quidam addidere, verũ alij libras duas.
 Sic tusa, cribro excussa q̄ tenuissimo,
 Cataplasmatibus modo, sed & mel addito
 Nec omne acetum, coquito: vbi molle fuerit,
 Addas calenti exiguum aceti stillulam,
 Ceræ liquatę infusor, & pinguedini,
 Terebinthinę q̄: cocta q̄ egregie simul
 Omnia manibus exactius committito,
 Et vasculo maiore derafa excipito,
 Vsurus haud mox: Inualidum est factum recens.

Aliud Damocratis Malagma.

Odorum & hoc, tollens q̄ mox vitia hepatis,
 Affectiones renibus, colo & graues,
 Stomacho simul & vuluæ diutiusculas.
 Idem q̄ iam corrupto habitu superdatur,
 Morbo q̄ longo pallidis, hydropicis,
 Et qui minus coquunt cibum & fastidiunt.
 Habet hoc amomi Scythici, xylobalsami,
 Et cardamomi, bdellii q̄ lucidi,
 Aridæ cyperi, thuris boni, omnium parem
 Modum, libram: post casia daphnitidis,
 Myrrhæ bonæ, pariter croci, de singulis
 Librę trientem, aut amplius quid paululum.

Nardi

† Al. libras
 duas cum di-
 midia.

G

H

- A Nardū bonā pōst Syriacā vncias duas,
Terebinthinā purā bonā libras duas,
Albāq; cerā perpolitā vnam libram, †
Recectis vnguēti cyprini † libram vnicam,
Vini tuleri hinc optimi sextarium.

† Additur in
antiquis, et di
midiam.

Contusa alia cribro tenui concernito:

† Al. libras
duas.

Thus, bdellium in mortarium conijcito.
Myrrham bonam, simul crocum q; his addito:
Fractis q; pauco cyprinum vino indito.
Dein tundito, mellis q; crassitudinem
Formato, & his aromata mox trita addito.
Et quod superest vinum addito, committito
Totam diem noctem simul quò combibant.
Terebinthinam verò, cyprinum, ceram & simul
Igni liquata lentulo his affundito.

- B Vnctis q; post manibus per vnguen quodpiam,
Subacta sic committito, & reponito.

Nec mox parato vti velis tu pharmaco,
Sed tempore interiecto. Et vt cerotulum
Sit mollius, quandoq; derafum diu
Misceto, solo rarius sed vitor.

Aliud Damocratis Malagma.

Aliud malagma ad iam relatas commodum

Affectiones, si fuerint diutinae.
Confert lienosis vel omnium optimè,
Si palleant, febris laborent ac grauiter,
Aquam q; habeant præcordia his si pauculam:
Multam nequeunt curare enim malagmata.

Ficus cape pingues sicciore, sed nouas,
Et semine eiecto, simul vmbiliculo,

- C Appende drachmas quinquies tres, ac decem,
Albæ q; ceræ ponticæ parem modum,
Myrobalani pinguis libram post integram,
Nitri marini sed libram modo dimidiam,
Aluminis scissi duas supra et decem
Drachmas, super q; dimidiam, triobolon.
Et mox onychis, quod sic vocatur, bdellij
Addes parem tu aluminis dictum modum,
Nitro parem florem lapidis sed Alii,
Ammoniaci tantum q; thymiamatis:
Et seminis post filiculæ, & nasturtij,
Et cardamomi, quàm optimi q; origani,
De singulis sextarij quartam modo.
Vini q; post, irini vnguinis, quod sufficit.

Paratur at tandem malagma in hunc modum.

- D Vino rigatum suauē olenti bdellium
Mortario emollito, & hinc adijcito
Ficus, simul rursus q; ritè tundito,
Quò trita vini stillulis fiant probè.
Mistura mox addatur inde inspersilis.
At post rigatam feruida ceram ex aqua,
Mollem manibus factam q; latam adijcito.
Et tusa mox ligni radio compingito,
Guttis & vnguinis frequens madefacito.

Vfus malagmatum omnium, quæ ventriculo
Induntur, & stomacho, simul interaneis,
Est tempus, in quo qui cibus congestus est,
Non amplius relidet, sed aluum iam subiit.

GALENI DE COMPOSITIONE MEDICA- MENTORVM LOCALIVM SIVE SECVNDVM LOCOS LIBER NONVS

ARGVMENTVM LIBRI

Reliqua affecti Hepatis Medicamenta, Lienis item, Intestinatorum,
Sedis, Pudendorum, ac Vteri, explicantur.

De Ictericis.

CAP. I.



* Al. comaginū

Elunt quidē IctERICI rōne bonę iudicationis in febribus, prouēte nimirū ad cu-
tē bilioso humore. Et faciliē sanē hi curant balneis aquarū potabiliū, & olei di-
scussorii affricū, oīum q̄ rarefacientiū cutem: quale est anethinū oleū, & cha-
mæmelinum, ac cicinū: post hæc ēt vnguēta faciunt, gleucinū, crocinū, de-
inde irinū & amaracinū. Verū alias confectiōes priuatim Ictericas appella-
tas suis authoribus, ne putes ad hmōi iCTERICOS cōuenire (neque. n. hoc illi ipsi
de his pdiderūt) sed ad eos iCTERICOS q̄ ob valōrū circa hepar obturationē fiūt:
Immo ēt eos qui ex inflāmatione iCTERICI fiūt. Itaq; qui iCTERū seu regiū mor-
bū ex obturatione incurrūt, sine febre permanēt: qui verō ex inflāmatione, oīno febricitāt. Qui-
cunq; igitur in pharmacis iCTERICIS adscripserunt, in quibus ea ipsa conuenire dicant, hi rectē fece-
runt: qui verō indiscriminatim & simpliciter protulerunt, non parū peccauerunt. Etenim q̄ mul-
tū medicamentaria sunt, itidē q̄ facultate calida, magnopere febricitātes lædunt: talia sunt gentia-
na, struthiō, heleniū, costus, aristolochia, polion, centaurea. Conueniunt autē iCTERICIS ex inflāmato
hepate, quęcunq; inflāmationes sanant: quemadmodū ēt iis qui ex obturatione, omnia quęcunq;
strenuē extergent, etiā si medicamentariam substantiam habeant, & calidæ sint facultatis: si verō
coincidāt simul obturatio & inflāmatio, laxantibus, simul q̄ extergentibus opus erit. Fugiēda autē
quęcunq; medicamentariæ substantiæ, & calidæ facultatis, existūt. Cum igitur & pleriq; ante me
IctERICA pharmaca indiscriminatim conscripserint, ego propria discrimina singulis ipforum adij-
ciam, quo sciatis quibus nam in febribus citra periculum vti queatis: & quibus maius ex acerbati-
one febris & inflāmationis detrimentum subsequat, q̄ ex absterisione emolumentum resulet.

De Pharmacis Ictericis ab Andromacho scriptis.

Andromachus quatuor pharmaca ad IctERICOS indiscriminatim tradidit, minimē quidē pericu-
losi vsus in ijs qui nō febricitant, verū non securi in febricitantibus, & maximē si cū vino aut vino
mulso ea, quis exhibeat, quemadmodū aliqñ damus in febribus moderatis, & visceris obturatione.
Quare ex aceto mulso nō valde acido securius est tūc ea propinare. Sunt autē huiusmodi quatuor
pharmaca iuxta illius ipsius distinctionem subscripta. **¶ Ad IctERICOS.** In colocynthidis calicē vi-
nū fundito, calfacito, ac bibendū dato: subducit aluū. Idē & thus facit. **¶ Aliud ad IctERICOS.** Adia-
nti obol. iij, nardi obol. ij, absinthij 3 j, myrrhæ obol. iij: excipe passo, ac dato nucis auellanae magni-
tudine ex aquæ cyathis ij. **¶ Aliud ad IctERICOS, quo vtor.** Struthion cum croco coloratum nucis
pōticæ magnitudine ex aqua, aut aqua mulsa, dato. Dat & anchusa cochlearij mēsurā. **¶ Aliud**
ad IctERICOS, vt Apollonius. Eruiz ʒxxiij, cornu cerui vsti^b drac. viij, thuris 3 iij, nardi celticę 3^c duās,
nardi syriacę 3 j, piperis sesquidrachmam, floris iunci odorati 3 i, myrrhæ obol. ij, costi obol. ij, caliaę
obol. i, cinnamomi obolum i. Vtere sicco cum vini mulsi cyathis tribus.

A Al. xx.

B* Al. xij.

C* Aliter i.

De Pharmacis Ictericis ab Asclepiade scriptis, in Tertio Internorum.

H Ex ijs q̄ antea dixi cognobile fit, ēt si citra discrimē pharmaca prodant, q̄ fugienda sint febricitā-
tibus. Confucit autē Asclepiades aliqñ distinguere apponendo, febrientibus hoc modo exhibere
oportere medicamentum, non febrientibus hoc modo: vbi verō omnino nihil apponit, ijs in non
febrientibus magis est vtendum: quemadmodum sanē ēt, qñ ex vino solo, aut vino mulso, vsum
fieri debere censemus, talia. n. non febrientibus conueniunt. Verū scripta ab ipso pharmaca hæc
sunt. **¶ Potio ad IctERICOS.** Cichorii succi cyath. vi febrientibus per se dato, nō febrientibus autē cū
vini cyathis iij. **¶ Aliud.** Solani succi cyath. i, vini mulsi diluti dimidium. **¶ Aliud Insperibile.** An-
chusæ tenuissimæ tritaę cochlearia ij cum aqua potabili exhibe. **¶ Aliud.** Struthij cochleariū i dato
cum mulsi diluti cyathis iij. **¶ Aliud Nicerati ciens Vrinam.** Cicerum siccorum sextarium j, rosma-
riini manipulum, aquæ sextar. vi, fœniculi manipulum, asparagorū palustrium radicū manipulū:
preparato ac dato, vt dictū est, coctum ac excolatū liquorem febrientibus simpliciter & assiduē bi-
bēdum, non febrientibus cū vino diluto. **¶ Aliud.** Cicerum sextariū i, adiantū manipulū, aquæ sex-
tar. vi, asparagorū palustrium radicū manipulum: preparato et exhibeto, velut dictū est. **¶ Pa-
stillus ad IctERICOS, facit & ad Hepaticos.** Amygdalarum amararum mūdatarum 3 iij: anisi, absinthij,
vtriūsq; drach. vnām: nardi Indicaę, asari, vtriūsq; 3 i: tusa & cribrata aqua subigito, ac formatis
pastillis

* Aliter ii.

A pastillis drach. i cum vini mulsi cyathis iij, non febrientibus dato. *Aliud, quo vsus est Charixenes.* Asari, absinthij, vtriusq; 3 viij: seminis anili, fœniculi, apij, amygdalarum amararū repurgatarum, singulorum 3 iij: aqua subige ac forma pastillos: & exhibe vt dictum est. *Nicerati Errhini medicamentum, quod naribus attractum morbum Regium expurgat, quando reliquum corpus iuxta naturam habuerit, oculi vero pallidi permanserint.* Aceti acerrimi cochlearium vnum in balneo naribus attrahendum exhibe: detrahât multæ bilis fluxionem. *Eiusdem aliud.* Nasturtij viridis folia tenera, aut rosinarini viridis folia tenerima, terito: & expresso inde liquore, vt prædictum est vtor. *Aliud eiusdem.* Elaterium cum lacte muliebris tritum naribus infundito, & attrahere iubeto. *Aliud.* Cyclamini succum ex aqua dissolutum: vtere sicuti dictum est.

Quæ Pharmaca Archigenes ad Ictericos conscripsit in Secundo Pharmacorum secundum genus.

C Ad Ictericos conuenienti diæta & ductu per frequentes deambulationes, & multam vnguëtorum frictionem vtaris, amplius q̃q; fomentis siccis & subscriptis medicamentis. Aut eos qui in febribus morbum regium incidunt, rubi canini fuluo fructu comesto statim probè iuari. Auxiliatur & chelidoniæ herbæ succus cum vino aut aqua mulsa potatus. Aut adianti vel rubiæ radicis obol. iij cum aqua mulsa exhibe. Aut struthion cum melle delingant. Aut fellis vrsini cyathum bibendum dato. Aut hyperici 3 i ex vino mulso propinato, vel aquæ mulsæ cyatho vno. Aut helxinæ decoctum ad dies v vel vj cum vino mulso. Aut stercoris canini albi sextantem cū mellis quadrante ad triduum bibendum dato. Aut lichenas in petris nascentes cum aqua mulsa propina. Aut lichenis in tegulis vel lapidibus nascentis drac. vnam, ex meraco propina. Aut nasturtium cum olei cyatho vno bibendum præbeto, radicem verò eius in nares indito. Aut absinthij cochlearia iij, anisi cochlearia iij, exhibeto ex aceto mulso. Aut oxylapathi siue lapathi radicis trita acetabulum dato ex aqua mulsa: si non febrat, cum vino aut vino mulso. Aut adianti & mentæ & rubiæ parem mensuram in aqua feruefacito, & heminam inde bibendam exhibeto diutius ad Solem insolato, ac sitienti, & anheloso, quò post acceptum potum exudet: statim transmutat colorem. Aut adianti, & myrrhæ eius dimidium, ieiuno à balneo exhibeto in vini hemina dimidia. Aut leporis coagulum cum meraco ad dies quinque vel sex præbeto. Aut scolopendrii 3 iij ieiunis ex vino ad dies quinque vel sex dato. Aut mentæ & rubiæ ac adianti æquas portiones cū aquæ cyathis duobus propinato. Aut betæ foliorum crudorum 3 vi, myrrhæ obol. ii, cū aqua mulsa ieiunis exhibeto: aut prælotis ac ieiunis cum vini hemina dimidia dato. Aut adianti 3 i, myrrhæ 3 ij, mētæ 3 i, in aquæ heminis duabus coquito donec medietas super sit: deinde vbi plurimum deambulauerit, probè fricato, & spiritu adhuc sublimiore existente bibendam dato: hoc ad biduum facito. Aut cicer eruinum in aqua sub dio per noctem exposito, aquam q̃q; bibendam dato, & cicer insuper comedendum manè ac vesperi: inde verò per triduum absinthium ex aqua mulsa bibant. Aut cum cyclamini succo purgatis naribus lauato. Aut herbam orontium appellatam coquito, & cum decocto lauato, & decoctum confestim viride reddes. Aut venam sub lingua secato. Quòd si ad nullum horum auxiliorum malum cedat, expurgatione per scammoniam & exquisita diæta vtantur, atq; ita ad exercitia progrediantur.

De Splenis affectionibus.

CAP. 2.

Quòd oēs corporis particula familiarem sibi ipsis ex venis trahant humorem, in commentariis de naturalibus facultatibus edocti: in iisdem q̃q; est q̃ velut fecem sanguinis, ex qua attrahitur bilis, hoc viscus alimentum habet, instituti: & vltra hæc memoria tenētes ea, quæ in curandi methodo de splene sunt dicta: faciliè assequemini ea, quæ nunc referentur. Quorum primum & principalissimum hoc est, q̃ hoc viscus à natura celerrimè indurari soleat, sanguine nimium in venis ipsius obturato, & ob crassitudinem neque excerni neq; discuti faciliè potente. Attendantibus igitur opus habet pharmacis citra manifestam caliditatem, vt ne vehementius incrasset. Dscat succus crassus in ipso obturatus: quò verò actiones ipsius conseruetur, ex austeris aliquid his admiscetur, quale est etiam adstringentium genus. Didicistis enim in naturalium facultatum commentariis, q̃ cum oēs particule suæ conseruationis gratia habeant facultates, tum familiarium attractoriam, tum alienorum expulsoariam, item q̃ assimilatricem sibi ipsis eorum quæ attraxerint, aliquibus ipsarum insuper inest per accidens magnopere iuuare totum corpus. Ex horum genere est & lien, qui ex hepate in se ipsum velut fecem sanguinis trahit, quemadmodum vesica in hepate bilem, & renes urinā. Si igitur præ imbecillitate eiusmodi sanguinē ad sese trahere non potest, vitiosus humor vniuerso corpori affricatur. Ob id itaq; naturalem ipsius firmitatē custodire oportet, quò conueniens sibi alimentum attrahat: per quam actionem vniuerso corpori ad humorum bonitatem confert, & generata in ipso recrementa in ventrem demittere potest, vna cum ciborum recrementis excernenda. Ea gratia igitur valde amara medicamenta ipsi offerimus, quædam q̃q; ipsi ex austeris miscemus. Quædam verò ad materiam commoda, ad ceratorū videlicet et malagmatum preparationem apponimus, quale pharmacum est cera, & resina, & pix, & bitumen, & quæcunq; alia huiuscemodi. Iuxta primam aut rationem acetum, & acetum multum, visceri commoda sunt, vt pote secare & attenuare crassos humores potētia citra calfactionem. Quemadmodum igitur in aliis particulis ea quæ per cataplasmata, aut liquida pharmaca imposita, aut affusa, fortius auxiliantur,

† In antiquis est ἀπυρέτους, i. qui sine febre sunt.

A. l. 3. f. 15. r. 1.
c. 6. fol. 327. b

A. l. 3. f. 15. r. 1.
c. 6. fol. 329. g

DE COMPOS. PHARMAC.

auxiliantur, in alio opere relata sunt: Ita & nunc relictis his quę inflammato spleni commodant, E
eorum solū mentionem faciam, quę indurato visceri opitulantur, quod ipsum etiam in medica-
mentarijs libris fecerunt, qui ante me scripserunt, proprię eos splenicos appellantes, qui induratā
splenis affectionem habent.

Pharmaca Potabilia ab Andromacho ad Splenicos conscripta.

* Al. σκολο-
πένδριον.

A * ὁ ποῦ. In
quibusdā cod.
non habet hęc
dictio. in alijs
asterisco est no-
tata.

B * Aliter iiii.

C * ἡ ὑλῶ.

D * Aliter viii.

E † In aliqui-
bus codi. addi-
tur τὰ δὲ λοι-
πὰ ἀναεῖ, i.
reliquorum ve-
ro ana drach.
sex.

F † In aliqui-
bus addit̃ eva-
i. ὑνῆς, pastil-
lum.

G * Aliter ii.

H * Aliter iiii.

¶ Potio ad Splenicos Antipatri, vt Nilus. Carnis myrabolani drach. iij: hemionitidis herbę, quam
quidam asplenium, quidam scolopendram, dicunt, drach. vi: corticis radicis capparis drach. iij, co-
liti drach. iij, chamædryos drach. vi, polij drach. iij, radicis cotyledonis drach. ij, corymborum he-
dere nigre grana xxv, ammoniaci thymiamatis drac. iij, seminis hyperici drach. ij, galbani drach.
ij, seminis periclymeni drach. i, aut radicis drach. iij, nasturtij nigri scilicet drach. iij, succi fructus
scyllę drach. xvi. Dantur oboli duo in aceto mulso. ¶ Aliud Splenicis Potabile. Glandis vnguen-
tarie drach. iij, hederę albę grana xxiiij, costi drach. b duas, seminis periclymeni 3 ii: hyperici
drach. i, alij drach. iij: galbani drach. i obol. ii, nasturtij drach. iij: excipe c succo scillę cocto. Dato
fabam gręcā in aceto mulso. Aliud. Carnis myrobolani drach. iij, hyperici drach. vi, seminis
periclymeni drach. vi, radicis dauci drach. vi: rubię, acori, plu pontici, croci, singulorum drach.
vi: iunci odorati drach. iij, mei drach. vi: nasturtij, chamæpityos, radicis capparis, singulorū drac. F
d sex: polij drach. vi, alij drach. iij: † ammoniaci thymiamatis drach. iij: cum aceto mulso pastil-
los duorum obolorum ponderis formato, & vnum in aceto mulso dato. Facit & ad hepaticos, &
hydropicos. ¶ Aliud, facit ad Splenicos. Trixaginis drach. iij, polij drach. v, chamæpityos drach.
iij, rubię drach. v, ammoniaci thymiamatis drach. iij, artemisię drach. iij, myrobolani 3 iij, corticis
radicis capparis drac. iij, aristolochię 3 vi, tragacanthę drac. ij: cum aqua in pastillos triobolares re-
digito, ac dato † † ex aceto mulso. ¶ Aliud Stomacho commodum. Vt etiam ad omnem affectionem Sple-
nis, Facit & ad Conuulsia, Influa, & Vicia Muliebria. Myrrhę drach. s quatuor, nardi Indicę 3 iij, corti-
cis radicis capparis drach. iij, costi drac. v, radicis panacis drach. iij, radicis peucedani drach. iij, di-
ctamni 3 iij, polij drach. b duas, corticis radicis periclymeni 3 iij, rubię 3 iij & dimidiā, ammoniaci
thymiamatis 3 iij & dimidiā, aliqui etiam iridis 3 iij & dimidiā: excipe aceto mulso: præbe
obolos duos in aceto mulso. ¶ Aliud Splenicis, Orihopnoicis. Struthii, scyllę assatę, panacis, radicis
capparis, singulorum 3 v: crocomagnatis 3 ii & dimidiā: excipe aceto, & præbe in aceto scyllitico.
Aliud. Struthii, corticis radicis capparis, trixaginis, panacis, singulorum 3 x: fructus myricę 3 iij:
excipe aceto scyllitico: & 3 i ex aceto scyllitico exhibeto.

Pharmaca Potabilia ab Asclepiade ad Splenem conscripta.

G

¶ Cynoglossi manipulum cum vini cyathis iij terito, & expressum liquorem ante cibum bibē
dum dato: facit & succus per se. Colligere autem oportet herbā sinistra manu ante Solis exortū.
Aliud. Trixaginis manipulum cum vini sextario vno coquito, & expressum liquorem reponito,
atq; ex eo cyathos duos ante cibum dato. ¶ Pharmacum Insersile Splenicis. Myricę fructum tu-
sum & cribratū reponito. Vfus verō tēpore cochlearia duo cū aceti nulli diluti cyathis tribus da-
to. Aut herbam pelargitīn apellatā tusam ac cribratā dato vt prædictū est. Aliud. Asini aut equi
sylvestrium lienem siccatum tūdito ac reponito: & cochlearia duo cum vini diluti cyathis tribus
exhibeto. ¶ Cataportium Splenicis. Corymborum hederę albę grana tria deuoranda præbe, & ace-
ti nulli cyathos iij insuper bibendos. ¶ Cataportium Andreę, Pæonii dictum. Myricę fructum tu-
sum & cribratū galbano excipe, & in catapotia redige, ea q; pro viribus exhibe. ¶ Pastillus Sple-
nicus, Tumorem eliquat. Fructus ericę 3 iij: piperis albi, nardi syriacę, ammoniaci thymiamatis, sin-
gulorum 3 ii: arida tunduntur & cribrantur: ammoniacum aceto scyllitico dissoluitur, et aridis ad-
ditum in pastillos cogitur. Fiunt aut pastilli drachmę pondere, datur q; 3 i ex aceti nulli cyathis iij.
Qui pharmacum hoc tradidit, dixit porcellum ad triduum hoc bibisse, & postea refectum sine lie-
ne inuentum esse. ¶ Aliud Splenem tumentem eliquans & consumens. Ammoniaci thymiamatis, fo-

* Aliter vi.

A. l. 3. f. 15. t. 1.
c. 7. fol. 330. c

liorum rubi tenerrimorum, vtrorumq; 3 viii: corticis capparis 3 iij: myricę fructus, herbę asplenī,
quę & scolopendrium & hemionitis dicitur, vtriusq; 3 ii: nuclei scyllę assatę & purgatę, piperis al-
bi, vtriusq; 3 ii: excipe aqua, & redige in pastillos: atq; exhibe 3 i cum aceti nulli cyathis tribus.
¶ Chrysermi Pastillus, Splenicis, Hydropicis, cit Vrinam, mollit Alium. Scyllam magnam luto oblitam as-
sato, & corticem detrahito ac quod ad fundum est durum: ex nucleo verō libras duas accipito: se-
minis dauci 3 viii, hoc est vnc. i: anisi, fefelis, radicis panacis, iridis, singulorum tantundem: semi-
nis vrticę, baccarum cedri, vtrorumq; 3 xii: myrrhę 3 iij, erui moliti chœnicem, vini odorati quod
fatis est: subacta in pastillos redigito. Datur drach. i cum aceti nulli cyathis iij. ¶ Aliud Eugera-
się. Scyllę assatę depuratę minas ii, radicis bryonię minas viii, piperis albi tantundem, petroselinī
tantundem, seminis dauci cretici tantundem, erui moliti tantundem: cedridum, hoc est cedri bac-
carum sextar. vi, habeat verō sextarius vnc. viii: iridis, radicis panacis, myrrhę, singulorum qua-
drantem: vini falerni quantum satis est his in pastillos cogendis. Formatos autem pastillos in vm
bræ resicca, & vnciam i cum vini diluti cyathis iij, exhibe.

* Aliter drach.

Epihemata & Emplastra eiusdem Asclepiadę ad recentes Splenis inflammationes.

¶ Foliorū tenerrimorū arboris sambuci lib. iij, aloes lib. i, cū aceto subigito: & linteolo infarta
imponito.

A imponito. *Aliud.* Ericæ fructus semissem: galbani lib. i, alij semissem: fructum tundito ac cribrato: atq; ita galbanum addito, ac diligenter misceto: atq; in linteolum impac̃ia imponito. *Pharmacum Idiotæ, accommodatum.* Visci quercini lib. ^a i, calcis viuæ lib. ^b vnam: viscum in vas fictile coniectum, ac prunis appositum, dissoluito: & dissoluto calcem viuam inspergito, misceto, & calidum ^c albæ pelli infartum imponito. Oportet autem cum adherente adhuc pharmaco lauari, atq; ita finire donec sua sponte cadat. Curam item habere oportet vt disparatæ splenij partes relectentur.

Aliud. Visci quercini [†] lib. i, [‡] calcis vnc. i, floris lapidis alij trientem, cedriæ vnc. i: preparato pro more ac vt ere, quotidie auferens pharmacum, & spongijs calidis fouens locos, rursus q; imponēs. Hoc pharmacum vrinam mouet. *Malagma aurī colorem referens, valde commodum.* Cerae, resinę pinus & frictæ, singulorum lib. ij: arsenici, aluminis scissi, calcis viuæ, singulorum sextantem: aceti, olei, vtriusq; cyathos viij: apparato pro more. *Aliud valde generosum, quo vsus est Andromachus.* Cerae, resinę pinus, picis brutię aride, singulorum lib. ij: arsenici, aluminis scissi, calcis viuæ, singulorum sextantem: aceti cyathos viij: præpara pro consuetudine. Facit ad splenicos, hydropicos, & ad præcordia distenta. Facit & ad ischiadicos, arthriticos. Nos ad pharmacum hoc apposuius myrrhæ sextantem & vnciam dimidiam, visci trientem.

B

Ad induratas Splenis affectiones, vsus est Tryphon Gortyniates.

Pharmacum Foenigraci moliti, sinapis, manne thuris, singulorum sextarium vnum: retrimentorū à myrobalano expressa reliquorum sextarij dimidium, spumæ nitri quadrantem: tenuissimè trita ac miscta, cedria cocta excipe, vt emplastri liquidi habeant spissitudinē. Vfus eius est per interualla: pharmacū aut impositum fasciolis complectere & obliga. Tempus imponēdi est ante balneum, q̃tum possibile est agrum ferre: postea verò obligatum adhuc in balneum inducito, & post reliqui corporis curationem in solium demittito, atq; ita in aqua fasciam resolutito. *Aliud ad Splenicos per vnam diem sanans. Verum supra pharmaci impositionem per tres dies certo viuendi modo vtimur.* Myrrhæ, manne thuris, vtriusq; quadrantem: sinapis alexandrini, nasturtij, vtriusq; sextantē: aceti scillitici quod satis est: sinapi & nasturtium tundito ac cribrato, mannā verò & myrrham dissoluito, eis q; arida addito, & simul aceto subacta ad malagmatis formam reducito: & à secunda hora vsq; ad nonā imponito. Postea verò duabus fascijs obligatum in balneum inducimus, atq; vbi relaxatus fuerit in calidæ solium demittimus. In solio verò longiori temporis spatio moretur cruribus extra aquā emotis. Ne verò in animi deliquium delabatur, acetum & pulegium odoret, & fascias paulatim resoluat. Egresso porro è balneo salsamētum citra panem exhibendum est, & vinum mari mistum.

C Sequenti die eadem offerenda sunt. Tertia verò gymnasiis vtendum, quæ spiritum acutum reddere valent. *Aliud Arytarsensis. Vfus est per interualla.* Ficuum pinguisimarum, sinapis, radices capparis corticis, singulorum lib. i: aceti quantū satis est. *Aliud Diodori.* Sinapis, nasturtij, fœnigræci, seminis lini, retrimentorum ab expressa myrobalano reliquorum, singulorum 3 octo: excipe cedria cocta aceto scyllitico admisto. Vfus est ante balneum: pharmacum bonum est, & post vsum sanguinem mingunt.

Pharmaca ab Asclepiade in Quarto Externorum conscripta, ad Splenicos, & Hydropicos.

Quæ iuxta dictionem eius sic habent.

Epithema Splenicis, tumorem eliquat. Foliorum tenerorum sambuci lib. iij, aloes pinguis lib. i, terito cum aceto, & linteolo excepta imponito. *Aliud.* Fructus ericæ lib. i, galbani lib. i: fructum tundito & cribrato ac galbano excipito: rursus q; tundito vnguenti irini facē admota, quo ad malagmatis formam redigantur: deinde linteolo infarta imponito. *Malagma ad Splenicos.* Myrobalani corticum tusorum cribratorum minam dimidiam, & retrimētorum ab expresso succo eiusdem residuorum tantundem, ceræ drach. vi, resinę terebinthinæ drach. xxxij, galbani drach. x, irini parum: arida cum liquidis committito. *Aliud valde præclarum.* Farinæ myrobalani quadrantem:

D nitri vnc. i, alij vnc. iij: ceræ semissem, terebinthinæ bessem, aceti quod sufficit: splenem eliquat. *Malagma ex Cedria Splenicis, Hydropicis, medicamentum accommodatum. Vrinam cit multam, & Splenem eliquat. Oportet autem vnā cum pharmaco lauare, & quod ab eo disparatum est, à splenio videlicet, de corporis cuticula defecare: sinendum enim est adhærescens pharmacum, donec sua sponte dilabatur.* Compositio hæc est.

Visci quercini lib. i, calcis viuæ semissem, floris lapidis alij trientem, cedriæ quadrantem: viscum ærea patina coquito, & postq̃ fuluum factum fuerit, cedriam adjicito, assidue q; moueto, ac arida trita inspergito: deinde ab igne ablata aliquāliter frige fieri sinito: atq; in pellem albam à spina appellatam infarta affectis locis imponito: & vnā cum pharmaco lauare iubeto, donec splenium sua sponte delabatur. Oportet tamen, vt prædictum est, disparatas splenij partes defecare. *Aliud valde præclarum.* Floris lapidis alij sextantem, lapidis gagatæ vnc. i, calcis viuæ bessem, visci quercini lib. vnam: præpara ac vt ere vt dictum est. *Malagma Antiochidis, ad Splenicos, Hydropicos, Ischiadicos, Arthriticos. Præparatum est Fabullæ.* Cerae lib. iij, resinę terebinthinę lib. iij, retrimentorum ab expressa myrobalano reliquorum librā vnam, spumę nitri lib. i, floris lapidis alij lib. i, ammoniaci thymiamatis lib. i, olei cyprini lib. iij, acetum ad ammoniacum dissoluendum. *Aliud Fabullæ compositum, valde præclarum, ad Easdem affectiones.* Myrrhæ stactæ, bdellij, onychis, medullæ ceruinæ, ammoniaci thymiamatis, iridis siccæ, singulorum libras duas: opopanacis lib. vnam, chalbani lib. i,

A Aliter y.

B Aliter ii.

C Al. de quod v. calida.

† Al. semissem.

** Aliter drac. ii.*

** Aliter drac. ij.*

** Al. vnc. vna*

** Al. vnc. i.*

** Al. vnc. i.*

DE COMPOS. PHARMAC.

lib. i. mastiches lib. i. floris lapidis alii lib. i. styracis lib. i. succi sycomororū lib. i. cāchryos lib. i. pipe-
ris albi semissem, ceræ lib. v. terebinthinę lib. v. Pharmacū est tūtile, id est quod contunditur. Opor-
tet autem tundentes vnguenti irini fecem adiouere, donec q̄ mollissimum pharmacum redda-
tur: repolūtum enim mollissimum euadit. ¶ *Malagma*, quod *Aurei coloris appellamus*. Auripig-

† *Aliter y.*

† *Aliter y.*

menti vnc. † i. aluminis scissi sextantem, calcis viuæ sextantem: arida tundimus ac cribramus, & in
mortarium cōijcimus, his q̄ acetū cyathos viij superfundimus, & probē trita liquidis excipimus.
Sunt autem liquida hæc, Ceræ lib. † i. resinæ frictæ lib. ij. pinus lib. ij. olei cōmunis cyath. viij. Hæc
frigetieri post eliquationem sinimus, & sic erasa tritis adiicimus. Nos ad pharmaci præparatio-
nem etiam myrrhę sextantē apposuius. ¶ *Aliud*, hoc vsus est *Andromachus*, facit *Splenici Hydropi-
cis*, & ad *Præcordia disenta*: Facit item *Ischiadicis*, *Arthriticis*, & ad *Inueteratas affectiones*. Ceræ lib. i. pi-
cis brutiæ lib. i. pro resina fricta, picem addimus, olei cyath. viij, auripigmenti auricoloris sextan-
tem, aluminis scissi sextantem, calcis viuæ sextantem: præpara vt dictum est. Nos ad pharmacum
etiam myrrhæ sextantem, & visci quercini trientē, apposuius. ¶ *Ad* *Inueteratas induratas Sple-
nis affectiones*, *Authemerom*, ab eo quod per vnam diem curat, appellatum. Oportet autem cum pharmaci impo-
sitione eorum ad triduum conuenienti diætā vti. Myrrhæ, mannę thuris, vtriusque quadrantem: sina-
pis alexandrini sextantem, nasturtij sextantem, acetū scyllitici quod satis est. Arida tundito & cribra
to, & cum aceto ad malagmatis formam subigito: & linteolo excepta ab hora secunda vsq; ad no-
nam imposito, ita vt completaris & contineas incūbens malagma fasciola obligata. Deinde ve-
ro ita obligatum in balneum mittito, & vbi probē laxatus fuerit, in solum delidere facito, & pedes
extra solum extendere iubeto, ac longiori tempore in ipso immorari. Cæterum ad reuocandos
in animi deliquium collapsos acetum cum pulegio naribus adiouemus, & paulatim resoluere fa-
scias tentamus. Sint autem duæ fasciæ malagmati incumbentes: cū enim fasciæ tolluntur, auferi-
mus etiam incumbens malagma, & post affectos locos sufficiēter fouemus. Egresso de balneo sal-
samentum citra panem exhibemus, & vinum mari mistum. Idem etiam sequenti die facimus. Et
tertia similiter, in super q̄ gymnasiis vtimur quæ spiritum acutum reddere possunt.

A. l. 5. fu. 2. t. 6.
fol. 555. d

Aliud Tryphonis Gortyniatæ Cretensis pharmacum accommodatum.

¶ *Fœnigraci* moliti sextarium unum, retrimentorum ab expressa myrobalano reliquorū sex-
tarium dimidium, spumæ nitri quadrantem: omnia trita cedria excipe: Verum hāc prius coctam
condensare oportet ad cerati spissitudinem. Vfus est ante balneum, quantum æger ferre potest: à
balneo cerotariū imponimus. ¶ *Aliud Authemerō inscriptum*, liberat ab affectione. Pyrethri † drach-
mas xx, } myrobalani bessem, nasturtij bessem, piperis bessem, seminis vrticæ bessem, sinapis sexta
rium dimidium: omnia trita & aceto subacta per interualla imposito ad horas tres, si æger tolera-
re possit: deinde ablato pharmaco lauari iube. Post balneum verò cerato vtendum est ex rosaceo
apparato. ¶ *Aliud Tumorem liquescit*. Floris lapidis alii, nitri rubri, retrimentorum expressæ my-
robalani, ammoniaci thymiamatis, singulorū drachmas viginti quatuor: corticis radicis cappar-
is drachmas octo: seminis raphani drachmas decē, aut succi cyathum vnum: acetū acerrimi quod sa-
tis est, visci quercini drach. xl: ammoniacum sambuci succo, aut myricæ, aut trifolij, dissolue: arida
uerò tunde, & angustissimo cribro excute, ac aceto subige: inde q̄ admisto visco omnia simul
contunde, & vttere.

† *Al. bessem.*

* *Al. de vti-
pæ i. secundo.*

*Pharmaca ab Splenicis ad Archigene in Primō Medicamentorum
secundum genus conscripta.*

¶ In splenicis porrò præcedente similiter tota diætā, ex describēdis compositionibus his vtitor.
Potus quidem sit aqua in qua ignitum ferrum sepe sit extinctum, non febrientibus cum vino, fe-
bricitantibus uerò aqua sola. Aut anagallidis cœruleum florem habentis obolum vnum exhibe-
to cum aceto mulso. Aut serpillum cum aceto. Aut panacis radicem viridem cum aqua mulsa:
Aut semen similiter: Aquam mulsam verò per noctem sub dio exponito. Aut corticis radicis H
periclymeni & seminis eius quantum tribus digitis apprehendi potest, in vino albo meraco cali-
do ieiunis bibendū ad dies xl exhibeto. Aut vulpis hepar siccum cū aceto mulso exhibe bibendū.
Aut cuminum ethiopicum similiter vt hepar ex aceto mulso. Aut radicis ari corticis drachmam
dimidiam cum acetū mulsi cyathis iij. Aut polium similiter cum aceto mulso. Aut hederæ albæ
grana tria cum acetū mulsi cyathis iij. Aut arida trita capparidis folia propinato. Cataplasmata
aut eadem impones splenicis quæ hepaticis. Amplius q̄ cinerem ex ferraria officina cum aceto.
Aut capparim maceratam aceto ac trita cerato cyprino exceptam. Aut nasturtium & fœnū græ-
cū ac calcem viuam, & nitrum, cum melle mollita imposito. Aut fœnum græcum, & calcem, ac
nitrum, item cum melle imposito. Aut lepidij folia imposito: cū verò iam morsum percepe-
rint, in balneum inducito: & ablato pharmaco in feruidæ solum demittito, ac detineto: agrē. n. fe-
runt nimiam mordacitatem, verum sanī exeunt. Idem etiam in ischiadicis facit. Aut myrobalani
expressæ retrimentum aceto maceratum, rosaceo cerato excipe ac impone. Aut fœnigraci & na-
sturtij par pondus, mannæ duplum, calcis viuæ parum, cum melle splenia velut emplastra facito,
ac imposito. Aut fecē acris acetū imposito. Aut capparidis radicē cum aceto. Aut spongiā acer-
rimo aceto imbutā. Egregiè faciunt myrobalani cortices, & nitri tertia ipsorum pars: trita aceto
subigito,

A. l. 5. f. 15. l. 2.
c. 7. fo. 330. c

A subigito: & resinam ac ceram cum modico oleo liquefacta affundito, & mollitis vitior. Perseuerante malo cucurbitas cum scarificatione affigito. Amulera autem, & per contrarietatem quandam naturalem ad hepar & splenem facere credita, hæc sunt: Venam retro sinistram aurem secato, & detractio sanguine affectum splenem confricato.

De Hydrope siue aqua inter cutem.

CAP. 3.

Hydropicorum medicamenta, & alia cōmunia ad splenicos ipsos, item q̄; quaedam multiplicis vsus ad varias affectiones tum iam prædictas, tum duritias, & ubi quid discutere oportet, etiam si iam purulenta sit cōpages, dicere aggrediar, initio ab ijs quæ Asclepiades tradidit sumpto.

Pharmaca ab Asclepiade conscripta ad Prædictas affectiones in Quarto

Externorum, quæ Marcella inscribit:

E Epithema Hydropicis valde commodum, quod adjacentem humorem absorbet. † Farris, quod zeam vocant, moliti sextar. ij: floris lapidis alii sextar. i, manne lib. i: probe trita adipe suillo veteri probe subacto, & vino per integram noctem macerato, excipito: sit autē tanta adipis copia, quanta ad molle faciendum pharmacum satis est. *Aliud.* Befasa: est autē semē rutę sylvestris quod in Syria nascitur, & vernacula lingua Harmana ab illis appellatur: huius ruti sextarium i, mannæ sextariū dimidiū, B adipis suilli veteris quantum sufficit, præparato vt dictum est. *Aliud.* Ficuū pinguisimarum lib. ij, aphronitri lib. i, origani lib. i: quidam cumini lib. i, sulfuris viui quadrantem, cochlearum africanarum lib. i: arida tundito & cribrato, & tulis ficubus vnā cum carne cochlearum excepta, ac in linteolum infarctā imponito, melle cocto sufficenti addito. *Aliud ex Critone.* Foenigræci moliti ac cribrati sextarios. ij: sulfuris viui lib. ij, & dimidiam: in alijs lib. ij, nitri lib. ij, ablinthij licci contusi sextarios duos & dimidium: } arida tenuissime trita melle cocto excipito, inde q̄; linteolo infarctā per noctem imponito. In die vtere & gestatione, & confectione subscripta: Cerae lib. i, picis aridæ lib. i, lapidis alii lib. i, olei veteris lib. i: arida cum liquidis misceto. *Malagma Ipoterium inscriptum, Resorbet humiditates ex alto, & Duras dissoluit.* Cerae, picis aridæ, vtriusque lib. ij: aluminis liquidi, sulfuris viui, mannæ, nitri rubri, singulorum lib. i: relinq̄; frictę lib. iij, olei veteris heminam vnam, aceti q̄tum satis est ad arida dissoluenda: præpara ac vtere vt probato. *Aliud præclarum Ipoterium, pharmacum accommodatum. Facit Hydropicis, Splenicis, & ad Inueteratas affectiones.* Relinq̄; frictę lib. iij, cerę lib. ij, sulfuris viui lib. i, mannæ lib. i, picis liquidæ lib. ij, aluminis liquidi lib. i, nitri rubri lib. i, aristolochię quadrantem, bdellij quadrantem, amomi racemi quadrantem, radices cucumeris sylvestris quadrantem, aloes semissem, pyrethri quadrantem, ammoniaci thymiamatis quadrantē, C visci quercini quadratē, succi fycomororum quadrantē: aceti sesquiseptariū, aut pro aceto vini Italici tantūdem: olei heminas. iij: præparato pro more. *Malagma ex Baccis lauri, ad Splenicis, Hydropicis. Dissoluit oēm Duritiem, absorbet Abscessus in profundo.* Cerae lib. i, resinæ pinus lib. i, picis brutiæ { aridæ } lib. i, baccarum lauri liccarū lib. i, nitri rubri lib. i, ammoniaci thymiamatis lib. i, adipis vitulini subacti lib. i: arida tundito & cribrato per angustissimum cribrum: liquecibilia liquantur, & frige facta aridis adijciuntur: atq; ita contulis simul ac repositis vtimur. *Aliud.* Baccarum lauri lib. i, picis lib. i, mannæ lib. i, adipis taurini lib. i, ammoniaci thymiamatis lib. i, ceræ lib. i: præparato vt prædictū est. *Emplastrum Tonsoris appellatione, ad Splenicis, & Hydropicis. Hoc tōsor quidā vir Buthyniensis vsus Ischiadicis a coxendicū morbo penitus liberauit.* Picis aridæ lib. iij, ceræ lib. ij, resinæ pinus lib. iij, ammoniaci thymiamatis lib. ij, nitri rubri lib. ij, { baccarum lauri aridarū lib. ij, } adipis taurini lib. i. In alio exemplari ēt iridis lib. ij: habentur, canchrysos vncię xvij, farine fœnigræci sextarius i, pollinis sextar. i, radices chamæleonis nigre tenuissime tuse sextar. i, cumini tenuissimē triti sesquiseptarius, passii sextar. i. In alio exemplari anisi triti sextarius dimidiū habetur, & pollē deest. *Aliud Buthynum appellatum, pharmacum accommodatum ad Prædictas affectiones.* Picis brutię lib. quatuor: resinę pinus, ceræ, ammoniaci thymiamatis, singulorum libras duas: medullę ceruinæ lib. i, D adipis taurini subacti lib. i, succi fycomororū libram vnam, floris lapidis alii semissem, radices chamæleonis contusæ semissem, baccarum lauri siccarum libram dimidiam, farine loliaceæ libram dimidiam, seminis dauci cretici contuli trientem, petroselinī trientem, cumini ethiopici trientem, anisi trientem, salis hispani sexuncem, aphronitri sexuncem, cyprini sexuncem, vini falerni quod satis est: arida cum liquidis pro more apparato. *Malagma ex Seminibus, pharmacum accommodatum ad Prædictas affectiones, hoc vsus est Olympius.* Cerę drachmas centum, terebinthine drach. c, ammoniaci thymiamatis drach. c, adipis taurini drach. c, anisi drach. c, fœnigræci drach. c, petroselinī drach. centum: ammiij, iridis illyricę, vtriusq; drach. quinquaginta: panacis drach. c, nitri drach. l, glycyrrhizę drach. l, cyperi drach. xxv, sabine drach. xxv, sampsuchi drach. xxv, meliloti 3 xxv, cardamomi drach. xij & dimidiam, calicę fistulæ drach. xij & dimidiam: nardi celticę, radices dauci cretici, vtriusque drach. xij & dimidiam: mellis heminam & dimidiam, vini odorati quod sufficit: præpara pro consueto more. *Aliud.* Cerę minam vnam, ammoniaci thymiamatis minā vnam, terebinthine minam. i: sampsuchi, { baccarum lauri, cyperi, singulorum } minam dimidiam: iridis illyricę minæ quartam partem, hoc est drach. xxv: seminis lini tolti minæ quartam partem: { fœnugreci, panacis, vtriusq; minę quartam partem: } adipis taurini minę quartam partē: radices cucumeris sylvestris, anisi, seminis apij, ammiij, cumini, fœniculi, nitri, singulorum minæ quartam partem:

† Multi codi. antiquissimi graeci habent, edpos nardiu si pitou zeas nardiarou, id est pharos vocant. Frumētū illius, quod zea dicitur, moliti ēc. vt i ha. ros sit nomen medicamenti: vt etia supra pag. 183 ēc. zea sit quidem species frumētū, non tamen sit far.

* Aliter l.

* Aliter c.

* x', idest quadraginta, est in textu.

DE COMPOS. PHARMAC.

partem: piperis drach. xij & dimidiam, mellis heminam, vini sesquiheminam, cyprini sesquihemi E nam, aceti sesquiheminam: composito ac vitior.

Ex Andromacho ad Hydropicos & Inflationes.

¶ Picis liquidæ libras duas, ceræ libram vnam, nitri vncias sex, sulfuris viui sexuncem, aluminis sexuncem. ¶ *Ad Hydropicos Cleophanti.* Ceræ, resinæ, spumæ nitri, singulorū drach. c: chalbani drac. xij & dimidiam, propolis drach. xij & dimidiam, ammoniaci thymiamatis drach. xij & dimidiam, cyprini cyathos ij, aceti cyathos duos.

Ex Archigenis Secundo libro Pharmacorum secundum genus.

¶ Hydropicis diætā conuenientem constitue. Pro cataplasmate[†] quidem stercus bouis armentariæ impone. Resicca aut ipsū stercus diligenter, & tritum in posca velut crudam hordeaceam farinam coque, insperfa sulfuris viui quarta parte: cataplasma verò per omnem ventris amplitudinem impone. Musa verò cataplasma ad ipsos preparauit ex elaterio, staphide syluestri, hyssopo, felle tauri, æqualibus partibus ipsorum ficibus contulis exceptis. Aut radicis cucumeris syluestris minam vnam in vino coquito, & ficuum minam dimidiam similiter coquito: atq; hæc simul terito affuso eorum decocto, donec malagmatis forma euadat: inde q̄z althææ radicis trita tantundem admisceto, simul q̄z coquito ac terito: atq; ita imposito. Aut caprinum stercus in vrina pueri impubis veneris expertis, vel ipsius capræ vrina coctum, ad strigmentitiam spissitudinem redigito, ac imposito: egregie ipsū per aluum purgat. Aut veratrum nigrum, fel taurinum, nitrum, piper, æquis partibus cum melle aluo per dimidiæ horæ spatiū imposito. Porro per omne curationis tempus vnam aliquam ex his potionibus ipsis propinato. Cotyledonis 3 i, scyllæ aridæ mundæ drach. i, in vino mulso diluto quotidie exhibe. Aut corticis radicis ari 3 i. Aut cneori, quam aliqui chamælæan appellant, teneras eminentias ad calamorum radices nascentes exuccato, ac succi cyathos ij prædictis admistis quotidie exhibeto. Optimè facit & hoc: Cancri fluuiialis licci triti, pedibus ac eminentijs omnibus amputatis, drach. i, asari drach. i: misceto aqua ex ipso flumine vnde cancri extracti sunt accepta, & propinato. Aliquando verò pro asaro, opobalsami par pōdus additur. Aut corallij drach. i, aluminis scissi † drach. i. 3 obol. ij, cum calaminthæ cremore terito, & in pastillos duorum obolorum ponderis redigito, & obolum inde ex calaminthæ aqua bibendum dato. Summè facit & ad nephriticos. Aut radicem calaminthæ coctam propina. Aut sion { quod lauer Latini dicunt } itidem coctum propina: idem q̄z etiam edendum exhibe. Aut tribuli folia siue radicem cum vino dato. Aut in balneo cum sale & oleo diligenter, vsq; quo exudent, illitos educito: & solis testibus exudantibus ablutis, primū linteis, deinde etiam reliquis G amiculis, coniectos curato: ac panem furnaceum cum sufficiens caricis edendum dato: vinum verò nigrum Italicum aut, Spicatum recens, in quo ficuum triens in vini sextariis vj, incoctus est, donec tertia pars superfuit, bibendum exhibeto: purgat per vrinam. Aut vrinæ capræ cochlearium vnum cum nardi drachma vna calfactum bibendum dato. Aut cucumim syluestrem vino nardino vel aminæo macerato, & ex cremore ter cyathum vnum bibendum præbeto, & paulatim vsq; ad cyathos tres progreditor. Aut seseli in potu vel cibo exhibe. Aut daphnoides tritum lupini magnitudine inspergēs bibendum dato: ducit vrinam multam. Aut corticem radicis ari ex vino. Aut squamæ eris drachmam vnam, panis medulla excipito, et catapotia facito ac exhibeto: fortiter aquam ducunt. Aut eris vsti drach. i, rutæ ramulos tres, stercoris columbæ drach. i, salis communis parum, cum vino ephelio & aqua, ita vt tota mistura † heminæ dimidiæ } sit, præbeto. Summè faciunt & Theriacæ omnes vrinam cientes. Insuper q̄z potiones aquā ducentes, quæ vni cuiq; per experientiam cognitæ sunt minimè periculosæ. Similiter & catapotia. Caterū hydropicos diutius ad Solem, cōfecto capite, inungito ex oleo multo sale admisto, & multa salsugine calida perfundito. Inflatos verò maximè locos, vesicis magnis probè inflatis quotidie continenter pulsato, inde enim arctantur ac contrahuntur. Scarificatis itē ipsorum talis & vulnusculis impactis, H ipsos in ferculo aut lectica gestato ac circūuehito: multus. n. humor hoc mō ipsis profluere solet.

¶ *Ad Easdem affectiones Confectio Biennij.* Croci, opij, opopanacis, myrrhæ, iridis, acori, mandragoræ, asari, costi, nardi Indice, dauci cretici, mei, singulorum drach. viij: piperis albi & longi, gentianæ, stœchadis, calisæ, phu pontie, singulorum drach. viij: excipe melle.

De Pharmacis Dolorem sedantibus, anodynīs & colicis appellatis.

CAP. 4.

Huiusmodi pharmacis, magni doloris, aut vigiliarum gratia, aut ne per violentā tussim lancinemur, velut in sanguinis reiectione & grauibus distillationibus aliquando contingit, vtī solemus. In moderatioribus tamen prædictis affectionibus confectiones ex seminibus, priuatim tussiculares appellatæ sufficiunt, quæ & ipsæ omnino aliquid ex soporiferis seminibus habēt: verū modicum inter multa adeo semina, quæ odorata & tenuium partium ac vrinam ciētia existunt. Appellant autem hæc medici sæpe citra appellationis seminis appositionem, Cuminum dicentes, & daucum, & seseli, apium q̄z, & anisum. Eiusmodi igitur pharmacorum compositiones inter tussiculares appellatas confectiones sunt relatæ: verū dolorem sedantes anodinæ q̄z & colicæ dictæ, quæ eiusdem quidem generis cum illis sunt, multo autem facultatibus illas exuperant, in hoc sermone ostenduntur. Prima itaq; ex ipsis priscis tēporibus, vt apparet, celebris fuit, quā Philo

A. l. 3. f. 14. r.
c. 13. fo. 323.

† Cod. quidā
manuscripti
græci non ha-
bent. hæc dictio
nes.

¶ AF. Africanis.

† AF. cyathi di-
midij.

A Philo prodidit, & de qua ipse hanc Elegiam fecit.

Philonis Antidotus.

En me Tarsensis medici prægrande Philonis

Inuentum, mala quod multa dolore leuo.

Siue colum doleas, seu tu iecur, auxiliabor:

Seu lapis infestet, difficile aut lotium.

Et medeor spleni hinc, orthopnoæ q̄ molestæ:

Conuulsa atq; tabem protinus exupero.

Pleuritîm q̄ malam, & sputum vomitum q̄ cruoris,

Euinco, mortis terror & hostis ego.

Viscera tentantes omnes ego sedo dolores,

Interna & quicquid membra dolore quatit.

Tussim, singultum, desillantes q̄ fluores

Sillo, etiam si quid istrangulet excipio.

Me dedit ille author sapienti munera magna

B Discipulo, stupidos nil ego curo viros.

O D O R V M fuluum q̄ pilum pueri cape, cuius

Fulget adhuc campis Mercurij ille cruor,

Pondus ad humanos sensus perpendito prudens,

Dein drachmæ pondo Nauplion Euboicum.

Inde Menœtiadæ occisoris ponito drachmam,

Qui pecoris dentis ventribus excipitur.

Viginti & drachmas candentis conijce flammæ,

Et totidem fabæ post suis Arcadicæ.

Et drachmam dictæ falso radicis, ab ipsa

Terra, Pissæo quæ Ioue clara manet.

Cum q̄ pîon scribes, voci caput amplius addes,

Malculum Achiuorum nominis articulum.

Inde q̄ post drachmas expensæ sumito lancis

Quinq; bis. Atq; istæc prouidus excipito

C Natarum tauri textura Cecropidarum.

Sicmecum Tricæ progenies q̄ facit.

In his versibus Philo iubet croci drach. v coniici, pîrethri vnam, euphorbij vnâ, spicæ nardi vnâ: piperis autem albi & hyoscyami par pondus, vtriusq; drach. xx: opij verò drach. x. Primi quidē igitur duo versus crocum indicant, vt qui fuluus colore sit, & tenuis ad formam pilorum. Cruorem autem Croci fulgere adhuc in campis Mercurij dicit. Adolescens enim Crocus appellatus cum Mercurio disco ludens, & incuriosius consistens, illapso in caput ipsius disco statim mortuus est: ex sanguine autem ipsius in terram acto crocus natus est. Fulgere verò cruorem dixit, hoc est sanguinem iam occisi, propter coloris croci splendorem. Scribitur autem non solum campis, sed & herbis in versu, hoc modo, Fulget adhuc herbis Mercurij ille cruor. Caterū pondus croci 3 v, esse vult, cum ad humanos sensus perpendere iussit, qui quinq; numero existunt. Quod verò drachmas quinque esse velit, & neq; obolos, neq; libras, neq; aliud quicquam tale, per sequentia com monstrat, primum quidem cum ait, Dein drachmæ pondo Nauplion Euboicum. Deinde verò & consequenter cum alijs idem drachmæ nomen apponit. Nauplion itaque Euboicum, pyrethrum vocat, propterea quòd Nauplius magnis pyris incēsis, vt aiunt, circa Eubœæ portum, multos Græcorum decepit, vt perirent, tanquam ad regionem portus bonos habentem applicantes. Id ipsum vero ob Palamedis necem ipsum fecisse tradunt. At verò & Euphorbium similiter his ænigmatice vocauit, cum ait, Inde Menœtiadæ occisoris ponito drachmam. Quandoquidē poeta Patroclum sic loquentem facit:

“ Sed me parca ferox, Latonæ & filius aufert,

“ Atq; vir Euphorbus.

Pecoris autem, hoc est cuius ventribus excipi & adseruari euphorbium ait, propterea q̄ hos solos non corrumpit, & ob hoc in his reponi pharmacum potest. Est porro Euphorbium plantę cuiusdam spinosę in Maurusiorum terra nascentis succus, facultate calidissimus: & de ipso libellus paruus scriptus est lubę regi Maurusiorum. Cōsequenter verò Philo ait, Viginti & drachmas candētis conijce flammę. piper album per hoc significans. Est autem stomacho commodius & acrius q̄ nigrum. Viginti insuper drachmas seminis hyoscyami iniungere iubet, quod enigmatice fabam suis Arcadicę appellat, quandoquidem aprum Erymanthium Hercules occidisse fertur, qui in Arcadium terra fuit connutritus. Quin & nardi ipsius drach. j consciendam censet, quam radicem falso dictam appellat, quandoquidem spica nardi vere nominatur. Vult autem eā Creticam esse, cum ait: Ab ipsa terra, Pissæo quę Ioue clara manet. Quandoquidem fabularum

Quinta Classis.

cccc scriptores

scriptores Iouem in Dictæo Cretæ monte educatum aiunt, occultatum ibidem à matre Rhea, ne E & ipse à patre Saturno deuoraretur. Apposuit autem Ioui epitheton Pissæi, quemadmodum multi etiam extra poeticam, in communi sermone dicere solent, per Æsculapium Pergameū, per Dianam Ephesiam, per Delphicum Apollinem, per Vestam Eleusiniam. Quidam verò non Creticam terram, sed Indicam, indicatam esse aiunt, ex qua ebur affertur, ex hoc enim statuam Iouis in Pissâ factam ac formatam esse. His omnibus & papaueris succum admisceri iubet, qui recepto à medicis more priuatim opium appellatur, cum nullus aliorum succorum quantumuis multi sint, in neutro genere, opium videlicet, nominetur. Quando igitur ipsum nomen opion, ex voce o, & pion componitur, ob id sane inquit:

Cum q̄ pion scribes, voci caput amplius addes

Masculum Achiuorum nominis articulum.

Inde q̄ post drachmas expensæ sumito lancis

Quinq̄ bis, & c.

Hoc est inijce & opij drach. x. Superest postremum quo omnia hæc trita excipiuntur, ipsum mel, itidem coniecturaliter ab ipso appellatum: Natarum tauri textura. q̄n quidem ex putrescentibus tauris apes generari tradunt. Quod autem atticum ipsum mel esse velit, ea gratia addidit, Cecropidarum, hoc est Atheniensium. Caterum per extremū versum ostēdit etiam Asclepiadas hoc pharmacum sic præparare. Ex Tricca. n. generis sui originem ducunt, ex quorum ordine & poeta est. Hæc ferme prima antidotorum dolores sedantium celebris facta est. Iuxta hanc autem alijs partim ad ipsam appositis, partim detractis, aut apponderationibus permutatis, posteri magnum antidotorum dolores sedantium numerum fecerunt: quas etiam colicas vocant, denominatione ab affectione quæ maximos dolores habet, deducta. Ego verò primū quidem generales componendi ipsas modos referam: deinde velut cōsueui, etiam particularium materierum seriem quantum latissime se expandit, subscribam. Opium itaq̄ fortissimum est ex ijs quæ sensum stupefaciunt, ac somnum soporiferum inducunt. Operatur aut hæc etiam solum sapia dilutum, deinde tomento exceptum ac sedi inditum: item q̄ fronti ac naribus illitum: si verò cum alio quopiam vim ipsius moderante misceatur, moderatius hæc facit. Verum quæ admiscuntur ipsi, aut concoquere, aut mitigare dolorosam affectionem, oportet, aut humores affectionem efficientes discutere, aut secare, aut attenuare, aut iuxta totam substantiam alterare. At verò neque ignorare nos puto optimum esse compositionis scopum, qui trium coniectationi sit intentus: nimirum ut & sensus stupefiat, & nullum in posterum inde circa particulam detrimentum permaneat, amplius q̄ ut affectio ipsa maxime inde iuuetur. Ad hæc igitur respiciens Philo mihi videtur hoc pharmacum, de quo iam proposuimus dicere, composuisse, Ex opij quidem & hyoscyami mistura somnum soporiferū, & sensitiuæ facultatis stuporem inducere volēs. Quod verò citius distribuerentur, & totorum affectorum corporum profundum penetrarent, calfaciētia admiscuit, pyrethrum, & euphorbium, & piper: quæ nocentes humores discutere possunt, & extergere viscosos, ac secare crassos, & ventosos flatus attenuare ac euacuare. Est autem non modica cōcoctoria vis omnium frigidarum affectionum in nardo sita: verū Creticam nardū inijcere nō oportet: neq̄ omnino eam quæ apud nos nascitur, quam montanam & herbā Narditen magis q̄ nardum appellant. Est igitur Celtica nardus optimum pharmacum, efficiens quæcunq̄ ēt indica nardus solet, verum ab ipsa viribus deficit, velut etiam à celtica, montana. Quemadmodum autem ex aromaticis appellatis medicamentis Philo solam nardum iniecit, sic posteriorum alius aliud apposuit, aliqui etiam plura: quæ verò apponuntur, sunt flos iunci odorati, & calia, cinnamomum, amomū, & costus. Quemadmodum autem rursus crocum addidit, crudorum humorum concoctorium item q̄ affectionum medicatarū, sic alij myrrham & castorium admiscuerunt. Plurimi autem ex ipsis, neq̄ male in hoc facientes, & hæc familiaria semina, de quibus etiam antea in confectionibus ex seminibus constantibus dictum est, addiderunt: quod videlicet amarorū medicamentorum iniuncunditatem mitigent, & totum pharmacum ad distributionem & vrinæ propulsionem instigēt. Si verò & humorum crassitudo attenuari expetat, etiam hoc ipsum faciunt: dico aut apij semen, cumini, dauci, petroselinī, anisi, & quæcunq̄ eiusmodi existunt. Apponam igitur iam & copiam ac seriem particularium materierum, à prioribus medicis vsu ac experientia cognitarum.

De Colicis Pharmacis ab Andromacho conscriptis.

Prima itaq̄ ipsarum hæc in verba scripta est. **Colica Cassi.** Anisi drach. vj, seminis apij 3 xij: nardi 3 iiij, alij drach. vj: castorij drach. iiij: petroselinī drach. iiij, alij drach. iiij: piperis albi drach. v, & longi drach. v, myrrhæ drach. vj, iunci odorati drach. iiij, succi papaueris drach. vj, croci drach. iiij: excipe melle cocto. Quidam etiam cinnamomi drach. j, aut calia drach. ij. Datur ad summum nuci regiae parua magnitudo ex aquæ calidæ cyathis tribus, minimum nucis ponticæ magnitudo. Colica secunda ab Andromacho scripta hæc est. **Colica Cassi, ut Crispus.** Facit & foris imposita. Anisi 3 xii, seminis apij 3 xxiiii, nardi indicæ tantundem, castorii drach. sex, seminis petroselinī drach. xvi, myrrhæ 3 xii, piperis albi 3 xii, & longi drach. x, iunci odorati 3 sex: opii, croci, calia, singulorum drach. xii: costi, acori, vtriusq̄ drach. vj: excipe melle cocto. Præbe nucis ponticæ magnitudine ex aquæ calidæ cyathis iiij. Hæc igitur præscriptæ duæ confectiones ex medicamentis de quibus

† *Alit. xiiij.*

* *Aliter iii.*

A quibus paulo antè dixi compositæ sunt. Quæ verò deinceps sequitur, quæ se vsum esse ipse ait, habet etiam alia quædam præter priora, eiusdem generis cum opio & hyoscyami semine existentia, velut malorum mandragoræ succum, aut qui ex radice ipsius expressus est, & succum cicutæ. Habet item phu ponticum, quod partim nardo celticæ, partim petroselino, & vrinam cientibus seminibus, simile existit. At verò sylvestris brassicæ semen ex maximè attenuatorijs est, & quæ multum siccare ac discutere possunt. Ex vrinam cientibus est & meon, & asarum. Illyris verò, quam neq; nominavit iridem illyricam, concoctorium est & attenuatorium pharmacum. Stœchas autem à putrefactione vindicat & attenuat. Ipsum pharmacum autem sic describitur. *Colica Tully, quæ vtor.* Succus malorum mandragoræ drach. octo, aut succi radicis eiusdem drach. x. phu pontici drach. octo, seminis brassicæ sylvestris drach. octo, succi cicutæ drach. xvi: costi, piperis albi, & longi, myrrhæ, opij, singulorum drach. octo: opopanacis drach. sex: stœchadis, seminis dauci, mei, asari, singulorum drach. xij: cinnamomi, illyridis, acori, singulorum drach. octo. *Sequitur post præscriptas Colica Abascanti, quam apud me consonam repperi.* Anili drach. x. seminis felis drach. xx: petroselini, nardi indicæ, piperis albi, & longi, singulorum drach. tres & obolos iij: opij drach. x. myrrhæ drach. x: cumini æthiopici, castorij, vtriusq; drach. v: iunci odorati, croci, vtriusq; drach. v: ex-

* Aliter xvi.

* Al. apii.

* Aliter vi.

Bcipe ac præpara cum melle cocto. *Colica admirabilis quæ vtor, & ad Voluulos, & qui Stercus sursum euomunt in magnis doloribus. Datur magnitudine fabæ in aqua frigida cyathis iij, aut iij.* Piperis albi, seminis hyoscyami, vtriusq; drach. xl: opij drach. xx, croci 3 x: spicæ nardi, euphorbij, pyrethri, singulorum 3 ij: excipe melle cocto. *Alia non inefficax Adipptos ob id dicta, ad omnem etiam Inflationem.* Sinonis, seminis hyoscyami, piperis albi, singulorum drachmas xl: succi papaueris drach. xx, croci drach. vi, opobalsami drach. iij: excipe melle cocto. *Colica Terentij Valenti.* Sinonis, piperis albi, seminis hyoscyami, singulorum 3 xl: succi papaueris 3 xx: croci 3 octo, alij 3 vj: corticis radicis mandragoræ drach. iij, mellis quod satis est: quidam etiam opobalsami 3 iij. *Colica Apollonij.* Nardi drach. iij: castorij, foeniculi, succi mandragoræ, costi, singulorum drach. j: asari, spicæ, vtriusq; drach. iij: opopanacis drach. j, dauci cretici drach. iij, cinnamomi drach. v: piperis albi, & longi, iridis, myrrhæ, singulorum drach. iij: lemnia sphragidis drach. x, ablinthij drach. iij: excipe melle.

* Marathri, al. Malabathri. *Al. stœchados.*

† Aliter ij.

† Aliter i.

* Al. vncias.

* Grace zve-χας. al. Seve-χας i. Seneca

* Al. myrrhæ.

† Al. trachylæ.

* Al. drac. vi.

† Aliter 3 ii.

Datur drachma vna ex aqua. *Colica " vt Nicostatus, Isorheos appellata, empta talentis duobus. Facit ad Stomachicos, Oculorum dolores & vexationes, Vulus labores, ex aqua mulsæ incocta ruta.* Croci sesquidrachmam, nardi drach. iij, myrrhæ drach. j: costi, piperis albi, & longi, chalbanij, singulorum 3 j: opobalsami drach. iij: cinnamomi, succi mandragoræ, castorij, singulorum drach. j: seminis dauci drach. iij & dimidiam, sagapeni 3 iij, calia 3 iij: excipe melle attico. *Colica, vt Scribonius.* Cineris cornu cerui teneri vsti heminam: piperis albi, myrrhæ, vtriusq; drach. ij: ex tritis cochlearium vnū exhibeto. Et cochleam vnā crudam tritam cum vini cyathis duobus & aqua calida. *Colica, quæ si diu vtebatur, perfecte liberans & malum extirpans.* Zingiberis 3 iij, corticis salicis 3 iij, rutæ ramulos tres aut quatuor, phœnicobalanorum drach. iij, aquæ cyathos vj: conijcito in vasculum nouū, & coquito donec tertia pars super sit: & bibendum dato ad triduum post iritationem: & facto interstitio idem facito, ad plures dies pharmacum in potu exhibendo. *Colica Tully bona, quæ et ipse vtor.* Seminis brassicæ sylvestris, phu pontici, vtriusq; semillem: piperis albi, & longi, seminis dauci, mei, singulorum drach. j: costi, opij, corticis mandragoræ, nardi indicæ, asari, illyridis, acori, myrrhæ, singulorum drach. vi: opopanacis 3 iiii, seminis cicutæ drach. ij, stœchadis drach. ix, cinnamomi drach. j, calia daphnitidis drach. xviii: excipe melle cocto. Da fabæ ægyptiæ magnitudine. *Colica, quam admiratus est Ariston, vt Diophantus Lycius.* Succus centaureæ, castorij, scyllæ affata, piperis albi, & longi, myrrhæ, rutæ hortensis, hyssopi, abrotoni, iridis illyricæ, singulorum drach. ii: croci, ammoniaci thymiamatis, radicis acori, phu pontici, zingiberis, veratri albi, singulorum drach. j: excipe aceto mulso. Datur etiam drach. j ex aceto mulso. *Colica, vt Publius in*

† Aliter vi.

D *Putiolis & Apollonio.* Polij drach. vi, scordij drach. xii, gentianæ drach. v, seminis rutæ sylvestris 3 iiii, succi cyrenaici drach. j: iij, rubricæ lemnia 3 v, myrrhæ 3 vii, opobalsami 3 octo, piperis albi drach. ij & dimidiam, cachryos drach. iij, verbenacæ herbæ drach. ii, pentaphylli drach. v: excipe melle attico. Da magnitudinem nucis ponticæ.

Quæ Asclepiades ad Coli affectus prodidit.

Pharmacum inspersile ad Coli inflationes, Antony pharmacopole. Hoc vsus sanus erat. Chrysobalani drach. duas: felis, astragali, vtriusque sextantem: illyricæ, tragorigani, vtriusque unc. j. Hæc simul tusa & cribrata, cochlearij vnus plus minus mensura, ex aquæ calidæ cyathis quatuor ante cibum exhibeto. *Aliud.* Gallinarum interanea omnia exempta & in vas fictile coniecta affato, ac trita reponito: vsus verò tempore cochlearium vnum & dimidiū, & seminis dauci cretici tusi & cribrati tantundem, ex aquæ mulsæ calidæ cyathis tribus exhibeto. *Ad Coli inflationes, Chariclis.*

† Al. Antonini medicamentū valde generosum.

* Al. drac. ij.

* Al. drac.

† Aliter i.

Cumini æthiopici drach. vi, seminis apii drach. v, seminis dauci cretici drach. j: iij, piperis albi 3 j: tusa & cribrata reponito. Dantur ex eo cochlearia duo cum aquæ mulsæ cyathis tribus. *Aliud.*

Seminis rutæ sylvestris aridi, felis massilici, vtriusque drach. octo: petroselini drach. quatuor, sinonis syriaci drach. iij, piperis albi drach. ii: tusa & cribrata exhibe vt dictum est. *Eclegma Colicis Noctæreum. Facit & Pleuriticis, & Dyspnoicis Deducit mulieribus Menses. Est & Concoctorium.*

Quinta Classis.

cccc ij Cumini

A. l. j. fu. 2. r. 6.
fol. 556. b

Vide infra lite
ra G.

DE COMPOS. PHARMAC.

Cumini hispani vnc. i: piperis albi, zingiberis, vtriusq; tantundem: vini dulcis aut scybelite, aut E protropi, sextarios. iiii: vini falerni sextarium vnum, mellis attici libram vnam. Arida tunduntur & cribrantur crassiore cribro, deinde cum vino coquuntur donec tertia pars super sit: deinde affunditur vinum dulce ac rursus coquitur. Mouere autem oportet ramulis rutę virga salicis exceptis, & salicis cortice obligatis. Habenda est ad manum etiam altera virga similiter rutę ramulos recentiores complectens, quod prioribus exiccatis recentioribus moueas. Postq; autem liquor semel atq; iterum ebullierit, iniice mel ac rursus coque: & excolatum per saccum liquorem repone. Vsu ex petente, † mystra tria, † ante & post cibum prebe. *Alia Scribonij Largi ex Salice, Liberat à tota affectione.* Corticis salicis drach. iiii, zingiberis aride drach. iiii, phœnicobalanos vi numero, aquę sextarium vnum & dimidium: coquito omnia rutę ramulis mouens: & vbi tertia pars liquoris restiterit, tum excolato: & cyathos duos quotidie bibendos dato. Hoc verò per triduum facere oportet: & post triginta dierum interstitium rursus repetere, quod per annum potiones xxxvi fiant: bibitur enim hoc pharmacum per annum totum. In alijs exemplaribus hoc modo habetur: Corticis salicis viridis drach. v, zingiberis sicci drach. iiii, piperis albi drach. iiii: palmularum passiarum maximarum, quas Gręci patetos appellant, numero duas aut tres: rutę viridis ramulos v, aquę pluuię sextarios iiii: coquito ad tertias, & dato vt prædictum est. *Alia Paccij Antiochi, à Tora affectione liberans.* Cornu cerui recens enati mollissimi vsti ad albedinem cochlearia iiii maioris magnitudinis, piperis albi grana x aut ix, myrrhę parũ odoris gratia: omnia teruntur, & cochlea africana varij coloris vnā cum testa itidem teritur, vino falerno per saccum non excolato affuso: sit autem vini mensura cyathorum trium. Hęc omnia in fictili vase permista ad prunas calfacimus, diligenter mouentes, ne quid ex pharmaco subsidat: calfactum verò in ipsis iritationibus bibendũ dato, item q; sequentibus duobus diebus. Oportet autem diem vnam antè, cibum differre, & reliquis diebus prandio solo vt, in eo q; assumere cibum qui facillè confici potest. *Alia Confectio.*

† Al. mystrum vnũ vel duo.

Al. iiii.

Succi fœniculi sexta. iiii, mellis attici sextar. † ii, croci drach. iiii: crocum in linteolum purum ligato, succum verò & mel mista in vase fictili coquito, & fasciculo croci moueto: vbi verò densata fuerit ad arteriã spissitudinem, crocum quidem expressum reijcito, pharmacum verò reponito. Vsus tempore mistrum unum aut duo ante cibum dato. *Colica Sigonis, qua vsus est Valens, facit in summis Doloribus. Dat nucis ponticę magnitudine, ex aquę calidę cyathis tribus, et confestim minuit dolores, & maxime si pruritus per totum corpus fiat. Facit & ad inueteratos Splenicos, & ad Voluulosas affectiones. Facit Hepaticus & ad Febres per circuitum repetentes, ac Vuluę strangulatus, & Vesicę affectus. Est & Arteriaca bona. Sinonis syriaci aut hispani drach. lx, piperis albi drach. xl, seminis hyoscyami albi drach. xl: G opij, corticis mandragorę, vtriusque drach. x: croci drach. vi, mellis cocti quod satis est his excipiendis. Quantitas exhibitionis ostensa est. Alia exemplaria sic habent: Sinonis hispani drach. lx: piperis albi, seminis hyoscyami albi, vtriusque drach. xl: cornu cerui vsti, opij, vtriusque 3 xx: corticis mandragorę drach. x croci drach. vi, mellis quod sufficit. Confectio Lingonis Colica: data ex frigida statim soluit Dolores. Seminis hyoscyami albi drach. xx: opij, seminis dauci cretici, vtriusque drach. x: petroselinĩ drach. vi: croci, spicę nardi, pyrethri, singulorum drach. iiii: euphorbij, opobalsami, cinnamomi, singulorum drach. ij: excipe melle cocto: & exhibe fabę ægyptię magnitudine cum aquę tepidę aut frigidę cyath. iiii, in iritationibus. Colica sedans Dolorem, qua vsus est Caspius. Facit & ad Internorum affectiones, pharmacum est valde bonum. Anisi, nardi syriacę, myrrhę, singulorum drach. viii: piperis albi, & longi, vtriusque drach. xii: seminis selselis drach. vi, opij tantundem: croci, castorij, petroselinĩ, iunci odorati, singulorum drach. iiii: mellis attici cocti quod satis est. Datur ponticę nucis magnitudine. Colica sedans Dolorem Lucij: confestim eximit dolores, & inscribitur Sicula. Myrrhę, succi hyoscyami, opij, singulorum drach. † viii: radicis mādragorę, piperis albi, croci, thuris, singulorum drach. x: excipe melle: & prebe fabę ægyptię magnitudinem ex aquę calidę cyathis tribus ad noctem. Colica sedans Dolorem Euschemo Spadoni inscripta, bibitur in H dies triginta. Seminis brassicę syluestris, phu, cinnamomi, iridis illyricę, acori, asari, opopanacis, myrrhę, nardi indicę, opij, costi, succi mandragorę, castorij, singulorum 3 vi: trium piperis generum, mei, seminis dauci cretici decorticati, singulorum 3 xii: stœchadis, seminis cicutę, singulorum 3 viii: excipe melle cocto: ac prebe fabę ægyptię magnitudinem, febre carentibus cum vini mulsi diluti cyathis quatuor, febrientibus cum aqua mulsa. Hac etiam in infusis utebatur nucis ponticę magnitudine, cum fœnigręci decocto cyathorum quatuor, & oleo cui ruta incocta est itē cyathorũ quatuor. Ad Easdem affectiones confectio Brēniti. Croci, opij, opopanacis, myrrhę, iridis, acori, mandragorę, asari, costi, nardi indicę, dauci cretici, mei, singulorum drach. vi: piperis albi, & longi, gentianę, stœchadis, calię, phu pontici, singulorum drach. viii: excipe melle.*

† Additur in antiquis dvo-πνοιοσ, i. difficulter spirantibus.

* Al. Glichomis.

* Al. Apii.

† Al. x, idest viginti. Vide supra littera C.

Al. Bienniti.

De Dysentericis.

CAP. 5.

DE dysentericis equidẽ quę in vniuersum nosse oportet, iam antè dictũ est, tũ in curadi methodi libris, tũ et nũc in sermone de hepaticis habito. Reliquũ est igit de verè dysentericis agere, i qbus neq; hepar affectũ est, neq; alia aliqua affectio est, pter intestinorũ vlcerationẽ, aut nudã, aut cũ putrefactiõe aliqua obortã, quã medici cõsueti vocabulo nomẽ appellāt. Quacũq; igit ad tales affectiões cõmoda sũt medicamẽta, & iã frequẽti expimẽto cognita, ea i principio suscribẽt.

Quę

A

Quæ ab Andromacho ad Dysenteriam scripta sunt.

¶ Potio ad Dysentericos & Hemoptoicos. Floris rosarum, opij, acaciæ, gummi, singulorum drach. iij: balaustij tantundem, succi hypocistidis tantundem, gallarum drach. ij, seminis plantaginis tantundem, & succi eius tantundem, lycij indicati drach. † j, succi rosarum drach. j: fac pastillos drachmæ vnius. Vtere varie. ¶ Ad Dysentericos & Celiacos, confectio ex Fructibus. Mala punica integra xx, mala cotonea xx, erui sextar. j, prunorum sylvestrium sextar. ij, sorborum ephelinorum sextar. ij, rhois syriaci sextar. iij, pyra terentiana xx, mala cestiana xxx, siliquas xl, baccarum myrti nigrarum sextar. iij, musti aminæ ad tertias decocti sextar. xlvij: coquito simul ad mellis spissitudinem, & in figulino reponito. ¶ Alia ex Fructibus ad Eadem, Stomachum subuersum restituit, Imponitur etiam forissecus. Mala punica x, cotonea xx, mala orbiculata xv, sorborum sextar. duos, mespilorum sextar. j, glandium sextarium vnum, rhois syriaci sextarium vnum, rubi fasciculum manipularē, baccarum myrti nigrarum sextarium vnum: palmas passas, patetos Græci dicunt, xxx: acinorum aridorum sextarium dimidium, prunorum sylvestrium sextarium vnum, siliquas magnas x, cœnantes sexuncē, cornorum sextarium vnum, mala citria v, passi cretici sextarios xvj: coquito simul & reponito in vitro: vtere vt priore.

* Al. vnc.

† Al. vnc.

* Al. vnc.

* Al. vnc.

* Aliter i.

B

¶ Ad Dysentericos, qua vtor. Gallæ, fructus ericæ, opij, singulorum drach. iij: cum aqua redigito in pastillos duorum obolorum. Dato ex aqua aut vino.

¶ Ad Dysentericos Clidion. Nardi, croci, vtriusq; drach. viij: aloes drach. iij, ego drach. ij: thuris drach. ij, acaciæ drach. iij, myrrhæ drach. iij: succi hypocistidis drach. iij, alij 3 vj: rosarum siccarum drach. iij, lycij indicati drach. iij, tragacanthæ drach. iij: opij drach. iij, alij 3 j obolos ij: piperis drach. ij: alij etiam iridis drach. ij: excipe aqua: quidam etiam cinnamomi drach. ij & dimidiam, gallæ 3 ij: fac pastillos obolorum duorum ponderis. Exhibe cum vino myrteo. ¶ Ad Dysentericos & Celiacos, Pastillus Beritij. Nardi, croci, vtriusque drach. ij: myrrhæ, succi hypocistidis, aloes, opij, tragacanthæ, lycij indicati, gallæ, anisi, acaciæ, piperis, rhu pontici, singulorum drach. j: tragacantham in vino macerato, & reliqua trita commisceto, pastillos q; drac. j formato, atq; ipsos ex vino dato.

¶ Clidion ad Dysentericos. Acaciæ 3 xxv, succi papaueris drach. † xxii, seminis hyoscyami 3 lvi, baccarum myrti tusarum drach. † clx, rhois syriaci drach. lxx, & succi eius drach. ii & dimidiam, thuris drach. lxxv: omnia torrefacta terito, & vino nigro excipito. Datur summum drachma vna.

† Al. xxv.

* Aliter l.

† Aliter c.

¶ Ad Dysentericos & Celiacos. Vini falerni sextar. vj, mellis attici lib. vi, coquito simul ad multam spissitudinem: vtere pleno cochleario, ad delingendum dato. ¶ Ad Dysentericos, & omnia interna vitia, Pastillus ab Eudemo seniore. Croci, calicæ fistulæ, vtriusq; 3 ii: nardi 3 i: myrrhæ, aluminis, succi papaueris, singulorum 3 ii: cum aqua pastillos formato: & dysentericis ex vini cyathis duobus dato, febrientibus ex aqua, hepaticis & peripneumoniacis ex aqua mulla. Ita etiam pleureticis & tussientibus. ¶ Aliud, ad Dysentericos. Seminis foeniculi, anisi, apij, malicorii, singulorum 3 iiii: opij 3 ii: cum aqua redige in pastillos duorum obolorum. Dato vnum ex aqua. ¶ Ad Dysentericos & Celiacos, ex libris Antipatri. Piperis nigri 3 iiii, gallæ 3 iiii, myrrhæ 3 ii, croci drach. ii, nardi drach. j, lycii drach. j: succi hypocistidis, acaciæ, ramentorum loti, gummi, singulorum drach. ii: opij, aloes, anisi, singulorum drach. j: rhois obsoniorum drach. duos: excipe succo rubi & vtere. ¶ Ad Dysentericos, Celiacos, & Hemoptoicos, è Cornelio medico. Myrrhæ, thuris, aloes, croci, opij, rhois syriacæ & coriariæ, lycii indicati, acaciæ, malicorii, succi hypocistidis, gallæ, balaustiorum, singulorum par pondus: in pastillos cogito: & ad noctem febre carentibus ex vino, febricitantibus ex frigida, dato.

* Aliter iiii.

¶ Aliud ad Dysentericos, Valentis. Myricæ fructus, rhois syriacæ, opij, petroselinii, singulorum par pondus: torreto, ac terito: & cum aqua in pastillos reducito magnitudine fabæ. Da in noctem febricitantibus ex aqua calida, non febrientibus ex vino. ¶ Ad Dysentericos ex scriptis Lucij. Styraçis drachmas duas: opij, croci, acaciæ, gallæ, fructus myricæ, singulorum drach. j: cum aqua pastillos facito: ac dato fabæ egyptiæ magnitudinē cum vino. ¶ Ad Dysentericos & Hemoptoicos: statim

D à prima potione cohibet fluxum. Cochlearum vstarum drach. duodecim, cornu cerui vsti drach. † xx obol. ii, 3 baccarum myrti nigrarum drach. xv, opij torrefacti drach. v obo. ij, gallæ tostæ drach. v obol. ii, cœnantes drach. vi, succi hypocistidis drach. v obol. ii, radicis mandragoræ drach. xii: succi rhois, terre asteris, vtriusque drach. xii: rhois culinarii drach. xxiii, malicorii tosti drach. vii, thuris drach. oçto, corticis pinus torrefacti drach. vi, seminis apij drach. xiiii, hyoscyami tosti drach. dēcem, rhois coriarii sextar. † ii, acaciæ tostæ drach. v obol. ii: vini nigri, quo rhus coquatur vt crassissimus succus fiat. Coquito itaque cum vino, atque colato: & cum succo reliqua subacta in pastillos drachmales & triobolares ac diobolares cogito: & pro habitu exhibeto, febricitantibus cum aque calidæ cyathis iij, non febrientibus cum vini cyathis ii. In aliis exemplaribus cornu cerui drachmæ sex obol. ii habentur, & succi hypocistidis drachmæ septem & oboli ii, & acaciæ tantundem.

† Aliter drach. v obol. vi.

* Al. quinq;.

† Aliter i.

¶ Ad Dysentericos Flauij Pyretæ, id est pugilis. Baccarum myrti aridarum tusarum sextarium vnū, rosarum siccarum tusarum sextarium dimidium, fecis malabathri drach. ii, baccarum iuniperi drach. xxx, pyrorum aridorum tusarum sextar. i, corticis pinus drach. xii, myrrhæ drach. i, gallas v, siliquarum tusarum sextarium vnum. Dantur ad summum drach. viii. Dato aridum cum vino diluto. Quæ verò crassiora sunt, palmulis pinguibus excepta exhibeto. ¶ Ad Celiacos: sistit fluorem confectum. Fructus myricæ drach. iiii, rhois cibarii drach. iiii, baccarum myrti nigrarum drach. iiii,

Quinta Classis.

cccc iiij acaciæ

DE COMPOS. PHARMAC.

acaciæ drach.ii, succi papaueris drach.i: excipe malorum spissamento: & fac pastillos drachmæ pō E deris, ac vtere cum oī allati vitello. Vbi verò bibendum dare volueris, radicem rubi, aut myrtū, aut mala cotonea coquito, atq; decoctum horum frigidum cyathorum iij mensura cum pharma co dato. Facit & lientericis. *¶ Potio ad Internos Fluores. Forinfecus etiam cum melle coctum impositum fa* *ci.* { Seminis apij, hyoscyami, vtriuscq; 3 iij: } anisi drach.ij, succi hypocistidis sesquidrachmam, seminis rosarum sesquidrachmam, succi papaueris drach. vnam, myrrhæ drachmam vnam, cro- comagmatis drach.i. Dantur cū aqua obol. iij, & duo, & vnus item. *¶ Potio ad omnem Fluxionem* *& Inflationem Lucy Tarsensis.* Anisi, seminis apij, vtriuscq; drach.ij: seminis anethi, dauci, tordylii, singulorum drach. iij: opij, seminis hyoscyami, vtriuscq; sesquidrach. excipe aqua, atq; ita vtere. *¶ Potio ad Fluxum Muliebrem sistendum, vt Apollonius.* Coralli obol. iij, balauitij obolos iij, gummī obolum vnum, excipe oī crudi candido: & dimidium totius cum aqua cyath. iij præbe.

Infusa Dyfentericis commoda.

* γενομένης i. factas, est in impresis. in antiquis autē quibusdā ve γενομένης i. de pascentes.

¶ Infusum ad Dyfentericos, Isidori, ad Exulcerationes factas in intestino recto. Cineris chartæ drach.x, aluminis scissi 3 iij, auripigmenti 3 iij, sandarachæ 3 iij: squamæ æris, omphacii, vtriuscq; 3 iij: croci, suc ci papaueris, vtriuscq; 3 ij: calcis viuæ 3 v: trita misce & excipe vino dulci, ac forma pastillos drach- marum trium, & duarū, ac vnus, ponderis. Vfus tempore vino austero diluuntur ad strigmenti- F tiā crassitudinē, miscentur q; succi ptisanæ cyathi duo. Infundito hæc simul ægroto, ita vt tum de ptisanæ succo, tum de pharmaco, pro viribus ipsius sumas. *¶ Infusum Faustianum.* Auripigmenti 3 xij, chartæ vstæ 3 xxx, sandarachæ 3 vj: calcis viuæ 3 x, alij xij: cogito in pastillos quatuor drachma- rum: & cum plantaginis succo, in quo spissamenta incocta sunt, iufundito, aut vino diluto cya- this iij. *¶ Infusum, quo vtor, Athenæi, concordat Harpocræ, Magno Philadelpho, Aristotao.* Omphacii 3 vi, aluminis scissi 3 vi: calcis viuæ, squamæ æris, utriusque drachmas vj: auripigmenti drach. octo, sandarachæ 3 iij, chartæ vstæ drach. xv, cum vino myrteo pastillos drachmarum iij, aut iij, for- mato. Infunde cum vini diluti cyathis quatuor & aquæ tepidæ cyathis duobus: quandoq; etiam cum aqua pluuiali. *¶ Infusum, quo vtor.* Chartæ vstæ 3 xxx, auripigmenti 3 xij, gallæ 3 ix, calcis vi uæ 3 xvj, bituminis drach. xvj, sulfuris vini drach. xvj, sandarachæ drach. xvi. *¶ Infusum aliud, vt Idius.* Aeris vsti drach. xxiij: calcis viuæ, aluminis scissi, vtriusque tantundem: chartæ vstæ drach. xxx, auripigmenti drach. xij, sandarachæ 3 xij: excipe vino myrteo, aut rosarum decocto, quæ cum vino austero addimidias coctæ sint & expressæ: forma pastillos, eos q; infunde cum aqua. *¶ Infusum ab Eubulo.* Squamæ æris drach. uiginti, chartæ vstæ drach. xvi, calcis viuæ drach. vi, auripigmenti 3 viij, sandarachæ 3 xv, acaciæ drach. quinq; omphacii 3 iij, facis vini vstæ G drach. i: excipe vino myrteo, & infunde cum vino diluto calido. *¶ Infusum Heræ.* Chartæ vstæ vnc. j, calcis viuæ vnciam dimidiam, cadmiæ vnc. j, auripigmenti vnc. j: ex hoc arido cochlea- ria duo cum decocto baccarum myrti, aut vino myrteo, cyathorum iij, mensura infunde: cal- cem verò cum succo plantaginis extingue. *¶ Infusum aliud eiusdem.* Sandarachæ, auripigmenti, vtriusque drach. octo: acaciæ 3 iij, calcis viuæ 3 iij: excipe vino austero, & coge pastillos drachma rum trium. In debilibus verò minus cum vino diluto infunde. *¶ Aliud.* Sandarachæ drach. viii, calcis viuæ recentis 3 x: chartæ vstæ drach. octo, alij drach. xxx: malicorij, gallarum, acaciæ, singu- lorum 3 v: menarum aceto conditarum ad dies viginti vnum, ac vstarum, drach. iij: auripigmen- ti 3 xvj: vruntur mænæ in olla cruda: & aliqui arido medicamento vtuntur, aliqui in pastillos cum myrti baccarum decocto cogunt. Si verò non moretur pharmacum retentum, ante eius vsum polygoni succum aut muriam infundito. *¶ Infusum, quo vtor, Aphtha appellatum.* Rhois syriaci, gallarum vstarum, vtriusque 3 xv: chartæ vstæ tantundem, suberis vsti 3 xv, panis ale- xandrini sicci vsti 3 xv, auripigmenti 3 viii, sandarachæ 3 x, acaciæ drach. v, cerussæ 3 xx, calcis vi- uæ 3 x, spumæ argenti 3 iij: excipe vino veteri, & forma pastillos, alios duarum, alios trium, alios quatuor, dragmarum pondere. In principio quidem per plantaginis, aut sanguinariæ, aut hel- H xines succum infundito: qui si non adsint, per aquā. Si verò vigor sit, & morbus fortis cum do- lore, cum fœnigræci aut seminis lini decoctione infunde. In declinatione aut cum decocto myrti & rubi, vino coctorum. In pueris cyathorum duorum copia, in fœminis trium, in viris quatuor.

* Al. viii.

* Al. iiii.

* Al. x.

† Al. viii. ali ter. v.

Al. Agathi ni.

¶ Infusum, quo vtor, Gemelli. Auripigmenti 3 viij, sandarachæ 3 iij, calcis viuæ 3 viij, squamæ æris drach. vi, aluminis scissi tantundē, omphacii 3 viii, lxcii indicī tantundem, succi papaueris 3 iij, succi hypocistidis tantundem: croci drach. ii, ego autem drach. iiii: chartæ vstæ drach. xx, aliqui drach. xv: excipe vino myrtite: fac globulos, quorum singuli sint drach. iiii, & trium. Infunde cū vino diluto *¶ Infusum Agathij.* Auripigmenti drach. ii, sandarachæ drach. v, calcis viuæ drach. iij, chartæ vstæ drach. iiii. Ex hoc pharmacho drach. iiii cum sale trito infundito in aquæ frigidæ cya this. vi. *¶ Infusum Nicostriati ad Dyfentericos, quo Menander vsus est.* Calcis viuæ drach. i, gypli drach. viii, acaciæ drach. ii, omphacii drachmam i, stibii drach. iiii, thuris drach. i, gallæ drach. iiii, traga- canthæ drach. ii: cum vino myrteo cogito in pastillos. Reponūtur in reliquiis ab expresso vuarū succo restantibus stipati, ne trāspirent. *¶ Infusum ad Ad Dyfentericos Thamyra.* Auripigmenti drach mas duas, aluminis scissi drach. ii, cadmiæ tantundem, calcis viuæ nouæ drach. i, chartæ vstæ drach- mas duas, suberis ex dolio vini falerni vsti drach. vii & dimidiam: cum sapa aut passo hispano apud

A apud te decocto pastillos cogito. Cæterum pastillis rursus tritis cochlearia ij infundito. Reliquis pro viribus cum lenticulæ decocto: si lenticula non ablit, rubū cū rosis aridis decoquito, & seorsim myrti baccas cum vino austero coquito, & vtriusq; cyathū vnū misceto: quandoq; verò vini austeri cyathos iij, & rubi decocti cyathos ij. Facit item in potu acceptū pro viribus ad cochlearij plus minus ue mensuram ex frigida aqua. *¶ Infusum, vt Deletius Epagathus.* Auripigmenti drach. xij, succi hypocythidis drach. iij, sandarachæ drach. iij, chartæ vstæ drac. † xxx, calcis viuæ drac. † xxiiij, † *Aliter iiii.* balauftij drach. xlvij. Balauftium in vino veteri austero coquitur, deinde cum decocto reliqua teruntur, formantur q; pastilli drachmarū quatuor: quidam vnciæ ponderis faciunt. Infunduntur autem ante cœnam in myrti baccarum & lenticulæ decocto. † *Aliter xiiii.*

Quæ ab Asclepiade ad Dysentericos scripta sunt: Quorum aliqua etiam Cœliacis conueniunt.

¶ Vini myrtitæ sextar. iij, rhois rubri heminā i: mellis attici cocti lib. i: rhoem & vinum coquito rubi ramulis mouēdo: & vbi tertia pars restiterit, liquorem exprimito, ei q; mel adijcito: ac rursus coquito, donec spissetur. Datur mystrum ante cibum. *¶ Aliud.* Rhois syriaci, farinæ polentæ, vix passæ non exacinatæ, singulorum drach. ij: malicorij tusi & cribrati drach. j: excipe melle cocto. Dato mystrum ante & post cibum. *¶ Pastillus Cœliacis & Dysentericis.* Ouum crudum recens perforato, & in vasculum euacuato, & cum testa subscripta mensurato olei omphacini testam oui vnā, piperis albi tenuissime triti tantundem, rhois syriaci tenuissime triti tantundem, & gallarum omphacitidum tantundem, farinæ tritici tantundem: omnia subacta & mollita in pastillos redigito, & in sartagine fricta ante cibū dato. *¶ Aliud.* Hoc scimus multos vsos à morbo liberatos esse. Gallarum subtilissime tritarū cochlearium: piperis albi, rhois rubri, malicorij tenuissime triti, singulorum æqualē partē: omnia mista oui luteo excipe, & in vacuam mali punici testam conijce, atque obturato cū farina osculo ipsius ad prunas torre: deinde depurgata mali punici testa cochlearium vnum comedendum exhibe. *¶ Catapotia, Cœliacis, Dysentericis.* Gallarum omphacitidum non perforatarum 3 iij, opij hispani 3 ij, petroselinī 3 i: excipe aqua, fac catapotia, & da magnitudi neciceris, virium tamen ratione circa mensuram habita. *¶ Aliud Aspasu, pharmacum generosum.* Petroselinī, fructus ericæ, rhois syriaci, opij, singulorum 3 ij, cum myrti decocto in catapotia redigito, ac dato vt dictum est. *¶ Pastillus sedans Dolorem, Cœliacis & Dysentericis & bibitur & infunditur.* Quandoq; etiam ipso pro cataplasmate vtimur excipientes melle cocto. Seminīs hyoscyami 3 iij, seminīs apij tantundem: anisi, florum rosarum, vtriusque 3 ij: hypocystidis, {balauftij,} opij, vtriusq; 3 i: cum aqua trita in pastillos reducito: & obolos tres exhibeto, febrem non habentibus cum uini diluti cyathis tribus, febricitantibus cum aqua. *¶ Aliud. Cœliacis, Dysentericis, pharmacum accommodatum, et bibitur, & infunditur, & forissecus impositum auxiliatur.* Seminīs apij, seminīs hyoscyami, anisi, sceniculi, singulorum 3 iij: opij, rhois syriaci, vtriusq; 3 ij: succi hypocystidis, balauftij, singulorum drac. i: † excipe aqua, & coge pastillos: dato vt prædictum est. *¶ Pastillus Aromaticus, Cœliacis, Dysentericis, Beryty appellatus, pharmacum accommodatum. Sislit confestim.* Croci drach. iij: nardi indicæ, anisi, vtriusq; tantundem: myrrhæ 3 ij: aloes indicæ, succi hypocystidis, lycij indicis, succi acaciæ, succi papaueris, gallarum omphacitidum, tragacanthæ, piperis albi, singulorum tantundem: excipe vino, & forma pastillos: dato obolos tres. *¶ Pastillus Philippi, ad Dysentericos mueteratos, sedans Dolorem: bibitur & infunditur.* Balauftij, acaciæ, succi hypocystidis, rhois, opij, thuris, myrrhæ, baccarum myrti nigrarum, croci, gallarum, lycij, aloes, rhu pontici, malicorij, singulorum 3 iij: excipe vino Italico, & coge pastillos pondere obolorum triū. Da non febrientibus cum vino, febrientibus cum aqua nulla. *¶ Pastillus sedans Dolore, præclare inducens Somnū, ad mueteratos Dysentericos.* Chartæ vstæ 3 x, sandarachæ, auripigmenti, squamæ æris, aluminis scissi, omphacij, calcis viuæ, singulorū drac. v: croci, opij, vtriusq; 3 ij: singula diligenter trita in pastillos drachmæ tres, mediū duæ, minimū vna. In conficiendo

Daū, omphacium cum opio tibi sit in vino myrtite maceratum. Crocus seorsum teratur, deinde simul mista probè terito, & additis aridis vnito, animaduersione habita ne pharmacum à calce viua exuratur: si tamen tale quid consequatur, de myrtite sufficienter affunde, vt omnia dissoluantur. Oportet autem calente adhuc pharmaco pastillos formare. Vfus iuxta apponderationis variationem fit, secundum quod ægri subtili aut hebetè sensu præditi id tolerare possunt, & secundum magnitudinem affectionis. Infundito autem diligenter in non febricitantibus cum vini austeri diluti cyathis sex, in febrientibus cum aqua, aut decocto palmularum, aut rosarum, aut myrti. Ante infusionem detur panis non febrientibus cū vino diluto, febricitantibus ex aqua. *¶ Alius Dysentericis non febrientibus: facit confestim.* Chartæ vstæ 3 x: sandarachæ, auripigmenti, squamæ æris, aluminis scissi, omphacij, lycij indicis, succi acaciæ, succi hypocystidis, calcis viuæ, singulorum 3 v: croci, opij, vtriusq; 3 ii: excipe vino myrteo, & forma pastillos magnitudine differentes. Infunduntur ad summū drachmæ quatuor. Infundere autem oportet quātitate pharmaci ad magnitudinē affectionis appōderata. Sit q; liquor passum creticū dilutū, & ex eo ad summū cyathi lex infundatur.

¶ Epihemata Cœliacis, Dysentericis. Seminīs hyoscyami albi, apij, vtriusq; trientē: anisi, floris rosarum, succi hypocystidis, balauftij, rhois syriaci, singulorum sextantem: succi papaueris vnc. i: hæc singula cū vino myrteo terito, deinde mista in pastillos cogito, eos q; in vmbra liccato. Inde verò

Quinta Classis.

cccc iij quantum

A.1.5. 12.1.6.
60.556.2

† Additur in antiquis, & di midiam.

DE COMPOS. PHARMAC.

quantum sufficit tundens & cribrans palmis passis excipito, deinde linteolo infarta ventri imposito. *Aliud.* Succu acaciæ, malicorij, seminis hyoscyami, opij, gallarum, omphacij, rhois syriaci culinarij, singulorum quadrantem: baccarum myrti nigrarum heminam j: tundito, cribrato, & vino austero iubacta in pastillos coagmentato, eos q3 in vmbra siccato. Vfus iam ostensus est.

De Affectionibus & Virtus Sedis.

CAP. 6.

Sedis vitia & affectus ob multas causas difficilem curam accipiunt, multo enim sensu particula hæc prædita est. Dicitur aut sape est eiusmodi particulas facile per aciora & austera pharmaca irritari. At verò & ipse retrimentorum alimeti transitus per se mordax est, & hoc magis vbi eruperit ipsa bilis, & seroli quidam aliquando humores: Quibus accedit & hoc, quod neq3 itatum tempus habeant medici ad imponenda pharmaca, sed plerunq3 tempore minime conuenienti ægri ad excernendum cõcitantur. Quin & humiditas ac caliditas ipsius loci siccantibus simul q3 frigefacientibus opus habens, non parum cõfert ad hoc, vt ægre curabilis ani affectio existat: siquidem mordent adstringentia, verum locus subtili sensu præditus acrimoniã ferre non potest. Ob id igitur aptissima ipsis pharmaca sunt, quæ citra aspretudinem adstringunt: qualia maximè sunt ex metallicis, quæ neq3 acria, neq3 acerba, penitus existunt: hæc enim lota citra mordacitatem id quod oportet, operantur. Horum itaq3 in summa dictorum memores deinceps materiæ sylum experimento cognitam subscriptam habebitis.

Medicamenta Sedis seu Ani, ab Andromacho conscripta.

F

¶ *Medicamentum Sedis quo utor.* Cerussæ, spumæ argenti, vtriusque 3 v: thuris, aluminis scissi, vtriusq3 drach. iiii: croci obol. iij, vini & rosacei quod satis est. **¶** *Aliud ad Sedem, vt Apollonius, quo utor.* Lycij indicij sextantem, cœsypij vnc. i: ceræ tyrrenicæ trientem, alij sextantem: rosacei quod satis est. *Aliud.* Butyri fescunciam, ceræ fescunciam, medullæ ceruinæ unc. i, cœsypij vnciam i, thuris vnc. i, aluminis scissi quadrantem, lycij sextantem, vini & rosacei quod satis est. **¶** *Aliud, vt Nicostyratus.* Ceræ tyrrenicæ vnc. i, lycij indicij sextantem, balaustij vnc. dimidiam, cœsypij vnc. i, acaciæ vnc. dimidiam, rosacei trientem. **¶** *Aliud, vt Herophilus.* Rosarum siccarum aut viridum 3 ij, cerussæ 3 ij, pompholygis 3 ij, croci drach. ij, spumæ argenti lotæ drach. ij, meliloti drach. ij, iunci odorati drach. i, succi papaueris drach. i, cœsypij drach. i, oui assati vitellum i, rosacei quod sufficit, succi plantaginis cyathos duos. **¶** *Aliud, faciens & ad Pruritus.* Spumæ argenti lib. dimidiã: j thuris, terræ samiæ, utriusque vnc. i: cœsypij sextantem, rosacei sex antem, melini libram dimidiã: arida in vmbra cum vino falerno terito, cœsypum q3 infarcito, & affusis duobus vnguentis terito ac cõmisceto. **¶** *Aliud ad Sedem, quo utor, ad Condylomata Inflammationes ani, acrimas.* Ammoniaci thymiamatis, lapidis hæmatitæ, thuris, aluminis rotundi, singulorum drach. ij: galleg, croci, vtriusq3 3 j, terebinthinæ drach. i, ceræ tyrrenicæ drach. xij, rosacei j heminas. iij: excipe pello, cum syraco, in

† Additur in quibusdã codicibus cerussæ libram dimidiã.

† Al. hemina quarta partē.

reliquis cum rosaceo. **¶** *Medicamentum Sedis ex Cerebellis.* Adipis anserini curati, ceræ, thuris, medullæ cerui, florum rosarum, pompholygis, cadmiæ, plumbi loti, singulorum drach. iij: cerussæ drach. viii, cerebri gruis drach. ii, succi papaueris sesquidrachmam, cœsypij drach. v, succi feridis heminam vnam, rosacei heminam dimidiã. **¶** *Medicamentum Sedis à Rustico, quo utor.* Rosarum viridium drach. viii, lactis muliebris heminam i, spumæ argenti drach. xl, succi papaueris drach. xl, oua cruda integra duo, butyri drach. xvi, cœsypij drach. xvi, malicorij drach. xvi, mellis drach. c. In alio exemplari heminam dimidiã, ceræ drach. xl, rosacei aut myrtei heminam dimidiã. Verum Heras pro cœsypo adipem anserinum pari pondere coniecit, & spumæ argenti drach. x, lactis j heminas iij, & oui vitellum assatum. **¶** *Aliud à Tyranno.* Spumæ argenti sextantem, cerussæ sextantem & vnc. dimidiã, thuris vnc. i, myrrhæ vnc. i, cadmiæ fescunciam, aluminis scissi trientem, ceræ trientem, vinum & rosaceum. **¶** *Aliud Samithræ ad multa commodum.* Spumæ argenti drach. xij, cerussæ drach. ij, chalcitidis drach. ij, misyos assati drach. i, terebinthinæ drach. vi, olei & aquæ j heminas iij. **¶** *Pinguis compositio ad Achoras & Psoras.* Spumæ argenti, cerussæ, vtriusque drach. xxxij: atramenti futorij drach. xvi, sulfuris viui drach. viii, olei myrtei & aceti quod sufficit. **¶** *Alia Pinguis Galli.* Spumæ argenti drach. xxiii, cerussæ drach. xxiii, myrrhæ drach. viii, thuris drach. x, olei myrtei drach. xiiii, vini austeri tantūdem. **¶** *Alia Pinguis, qua utor, Cleophanti.* Olei myrtei, lentiscini, rosacei, singulorum drach. j xvi: cerussæ lib. i, spumæ argenti lotæ sexuncem, vini veteris Italici sextarium dimidiũ, ceræ trientem. **¶** *Alia ex nouem medicamentis constans, Enneapharmacos dicta.* Mellis partem i, ceræ albæ partem i: medullæ ceruinæ, myrrhæ, vtriusq3 partem i: butyri partem i: adipis anserini, adipis vitulini, vtriusq3 partem i: terebinthinæ partem j: olei rosacei partem j, aliqui & ricinini partem j. **¶** *Alia Xantæ muli Vfus.* Ceræ drach. xvi, butyri drach. x, cœsypij drach. x, adipis anserini drach. viij, terebinthinæ drach. viij, medullæ ceruinæ drach. iij, rosacei parum. **¶** *Alia ex Ruta.* Spumæ argenti minam vnam: rutæ minam dimidiã, alij minā vnā, aceti drach. iij, olei quod satis est. **¶** *Alia ad Obturationes, & alia Sedis Viti.*

† Al. hemina quarta partem.

* Al. dra. iiii.

† Aliter xii.

† Al. hemina quarta partem.

† Aliter vi.

* Al. Axanthea.

* Aliter vitulini

† Aliter viii.

Plumbi vsti & loti drach. j x, cerussæ drach. iij, ceræ drach. xij, adipis porcini vel anserini drach. iij, olei quantū sufficit. **¶** *Ad Obturationes & Viti Sedis compositio Icodoti, qua Astinus curatus est.* Cœsypij drach. i, obol. iij, adipis anserini per hyemen curati drach. vj, per estatem drach. iij, medullæ cerui aut cameli drachmas ij, ceræ tyrrenicæ drach. viij, plumbi vsti & loti drach. iij, ladani drach. ij,

A. l. 3. f. 17. t. 1.
c. 1. fo. 352. h

A drach. ij, adipis vitulini drach. iij, terebinthinæ 3 iij, cerussæ drach. ij, spumæ argenti 3 i: rosacei hemina quartam partem, hoc est sesquicyathum, hoc est sextantem & vnciam dimidiam: arida cum liquidis committito. Quando verò temporis progressu fuerit induratum, dissolvitur rosaceo, & adipe anserino. Facit & ad contractos articulos. *Ad Condylomata, quo melius nullum reperitur.* Aluminis scissi drach. iij, ceræ drach. viij, croci drach. iij, opobalsami drach. vnam, cœsypidrac. viij, thuris drach. iij, aloes drach. iij: liquefabilia liquefacito, ac cum aridis tritis committito.

Ad Prolabentem Podicem Asclepiadæ Pharmaca ex Quinto Externorum.

Ad Prolabentes Podices, vt Archelaus. Recremeti plumbi 3 viij, rhois syriaci drachmas octo, floribus rosarum drach. quatuor, myrrhæ minæ drach. ii. Admoue siccum, vbi prælauers vino austero, aut lentisci decocto. *Aliud.* Gallæ omphacine, malicorii sicci, rhois coriariæ, singulorum drach. ii: plumbi vsti drach. iij, spumæ argenti drach. viij, thuris drach. ii: trita inspergito. *Aliud.* Balauitii drach. i, malicorii drach. ii, seminis hyoscyami drach. ii, cerussæ drach. viij, myrrhæ drach. ii: plumbi loti, thuris, singul. 3 ii: tritis vitior. *Aliud.* Corticis pinus, spumæ argenti, mannæ, singulorum drach. ii: pilularum cupressi aridarum drach. ii, plumbaginis drach. ii: trita insperge, vbi prælauers vino acerbo. *Pharmacum nostrum ad Procidentem sedem.* Fructus ericæ, gallarum, acaciæ, cerussæ, succi hypocyttidis, corticis pinus, thuris, myrrhæ minæ, singulorum drach. quatuor: arida trita insperge, vino austero prælotis locis.

De Hemorrhoidibus.

CAP. 7.

QUe Asclepiades in quinto externorum de hemorrhoidibus scripsit, in subscripto sermone continentur. Quandoquidem verò plurimæ hemorrhoides opus habent extractione ad facilem pharmacorum impositionem, necesse est etiam huiusmodi compositiones subscribere. *Extractorium Hemorrhoidum Magni Tarsensis, Pharmacum accommodatum.* Piperis, nitri, vtriusq; drach. i: terito & admoueto ante reliquorum pharmacorum impositionem. *Aliud.* Spumæ nitri, fellis tauri, staphidis syluestris, singulorum drach. i: trita adhibe, modico addito melle. *Aliud.* Succus ablinthii drach. i, fellis tauri, staphidis syluestris, vtriusq; 3 i. *Aliud, vt Diogenes.* Succus cydamini, mellis, vtriusque parem mensuram: coquito in vase greco ad cerati liquidi ipsitudinem. *Aliud ex scriptis Lægi, quod vix pronuentes extrahit hemorrhoidas.* Succus centaureæ drach. ii, aluminis liquidi drach. ii, mylios drach. i, staphidis syluestris drach. i: excipe melle, & anum obline, aut lanam ex eo madefactam in sedem inde. Postquam verò hoc pharmacum promptitudinem induxerit ad egerendum, & tumor hemorrhoidum prociderit, pharmaca ad hemorrhoidas cōscripta adhibeto. Quando verò aliquod huiusmodi pharmacum illitum sedem ac anum ipsum extrahit, necessariò tales confectioes adhibemus, qualis est & Nicodemi Romæ medicantis quæ Euaphiō à lenitudine appellatur. Cerussæ vnc. i, spumæ argenti quincuncem, cadmiæ bellem, aut pompholygis vnc. i, olei myrtei bellem, vini boni bellem, butyri vnc. *Ad Sedem inflamatā ac prolapsam.* Gallam flauam coctam ac tritam imposito, cum vino si fortiore vti velis: aut cum aqua, si mitiore. Succus item echini facit ad inflammationes & prolapsam sedem. *Aliud.* Corticis pinus drach. viij: pilularum cupressi aridarum drach. ii: prælotis vino austero inspergito. Cæterum ad arduos sedis dolores, oui assati vitellum vino albo terito, & cerato rosaceo exceptum illinito. Verum ad pruritus cimoliam tritam cerato myrteo excipito. Ad rimas verò tum sedis, tum pudendi, rasuram linteolorum vrito, eiusq; cinerem cum pari amylo tritum succo foliorum oleæ admisto illinito. *Pastillus ad Eminentias.* Aloes, croci, vtriusq; drach. ii, & dimidiam: aluminis scissi vnciam vnam: terito vino aminæo, ac vitior.

Ad Pudendorum Affectiones.

CAP. 8.

EXulcerati pudendi cognitio ex manifesto circa ipsum dolore contingit vna cum hoc, quod et circa mictiones excernitur quid ex corpusculis vlceri ipsi insidentibus. Discernuntur autem hæc ab eis quæ ex vesica feruntur, quod statim circa primum exitum illa appareant, verum ex vesica delata ipsis vrinis admista sunt. Cæterum vlcera pudendorum & circa sedem citra inflammationem consistentia resiccantibus valde indigent pharmacis, qualia sunt, quod ex charta vsta fiat, & anethum vstum siccum, & cucurbita vsta. Verum siccis & recentibus vlceribus etiam aloë bonum est pharmacum, si eius arida puluillus inspergatur. Omnium autem maximè dolorem sedat, neque vllò minus efficax est pompholyx. Si verò humectiora sint vlcera, pinus cortex per se & lapis hæmatites: verum si profunda etiam sint vlcera, manna prædictis addatur. Porro quæ circa vterum aut vesicam sunt vlcerationes, iisdem pharmacis indigent: sed instrumentis insuper opus habent, quæ ipsa intromittant, quæ metrenchytæ, & catheteres, Græcis appellantur. Aptiora itaq; sunt arida, qualis est crocus, & pompholyx, & aloë, quæ facile plantaginis aut alteri tali succo miscentur. *Ad Scroti & Pudendi dolores.* Butyro & resina pari mensura vtere. Aut semen lini cum aqua coquito, & admista myrrhæ ferme decima parte, resinæ tantundem et imposito. *Ad Pudendum intumescens.* Foliorum vitis tenerorum drach. i, cerussæ drach. v, trita cataplasmatibus vice impone. Vtere etiam marinæ aquæ frigida perfusione, & quiete, & colis religatione. *Aliud.* Lenticulam in aqua coquito, & cum mali punici cortice tritam imposito. Si verò à sudoribus vlcerata in scroto fiant, gallam tritam cum alumine inspergito. Ad tubercula verò in pudendis nascen-

tia,

Al. 3. fu. 2. t. 6.
fol. b

Al. 3. f. 17. t. 1.
24. fol. 353. d

* Al. vnc. viij

* Al. vnc. x.

DE COMPOS. PHARMAC.

tia, pyri semen inspergito, & fel hircinum oblinito. Ceterum fissuras ac rimas pudendorum iuuat E
resina fricta cum rosaceo trita ad strigmentitiam crassitudinem, admisto et oui allati vitello. Aut
rosacci, & amyli, ac thuris, singulorum vnc. vna. Aut foliorum hederæ aridorum vstorum cinis
cum oleo in mortario plumbeo tritus. Ad inflammationes autem pudendorum, vuâ passam exa
cinatam, & cuminum trita imponito. Aut farinam hordeaceam aqua mulsâ coquito, & vitis folia
tenera cum polenta terito, omnia q̃ simul imponito. Aut cuminum tritum cum butyri & resinæ
æqualibus partibus eliquatis committito. Testiculos porro vlcere aphthæ non absimili apprehē
sos ex terra cimolia cum aqua oblinito, & exiccari finito: inde q̃ aqua calida ablutos myrto arida
trita & modico simyrnio item trito conspergito. Excrescentem verò testium carnem cinis farmē
titius cum nitro & aqua subactius sanat, cataplasmatibus vice impositus.

De Priapismo.

CAP. 9.

Priapismus[†] est auctio pudendi stabilis in longitudinem ac orbem tumefacti, citra rei venereę
appetētiā. Est aut̃ status ventosus, videlicet qui membrum ipsum tumefacit, ex humoribus
viscolis ac crassis generatus per moderatam caliditatem. Palam est igitur non oportere membra
ipsa calfacere, sed refrigerare leniter per ceratum rosaceum in aqua conquassatum: item per chame
melinum ceratum tum pudendo, tum lumbis impositum. Vicius et pharmaca exhibeant attenua
torię facultatis citra manifestam calfactionem. Adhibēda sunt etiam † naturali efficacia prædita
per experientiam inuenta: nymphæa q̃ in potu danda, ac viticis semē: ruta et viridis obsonijs ad
misceatur, verum hoc à principio ne fiat, multum enim calfacit, sed posterius post aliorum exte
nuantium vsum. Quod si euacuatione vri libeat, per vomitum id fiat: quæ enim per inferiorem
ventrem fiunt euacuationes, sæpenumero vicinas partes fluxione infestant. *Ad Eos, qui sem
somnia permingunt.* Velicam caprinam aut ouillam vltam ex posca bibendam præbeto, & ad vespē
ram siticulosos somnū petere iubeto. Facit & leporis testiculus in vino odorato feruefactus, atq̃
ita potatus. *Aliud.* Calamintham & myrrham in vino ante cœnam bibēda dato. Oblinat autem
& pudendum cimolia terra cum perdicij succo.

† φυσικὴς
ἀνεργουμένη.

A. l. 3. f. 26. r. 1.
c. 37. fol. 377. c.

Ad Vteri Affectus.

CAP. 10.

In vteri[†] suffocatione contingit sensus ac motus priuatio, & pulsus obscurus ac paruus & peni
tus interceptus. In aliquibus verò tum sensus, tum motus adest, item q̃ ratio, verum vix respi
rant. Aliquibus et vox intercipitur. Alijs contrahuntur artus. Fiunt igitur & sensus & motus &
spirationis interceptiones ob frigiditatem, cum ipse sola perspiratione totius corporis per arterias
contingente contentæ sint, & respirationem per os non experant: atq̃ hoc, vt dictum est, ob frigi
ditatem, qñ sanè in priori tpe probè purgatæ, & concipientes, ac viris coeuntes, his ipsis priuatæ
fuerint, vt palam sit humidum & frigidum in ipsis semen totum corpus perfrigerare. Ad vuluæ
igitur strangulatus conuenit agarici ʒi in potu accepta ex vino. Plantaginis semē & succus cum
vino. Onyx detractus ex conchylio potatus. Acetum scylliticum absorptum. Ceterum olfactu
excitant strangulatas bitumē, castorium, chalbanum, pix liquida, cedria, pili vsti, ruta, allium, cæpa.
Eandem in rem cornu cerui suffitur. Et ruta cum melle lana excepta in anum inditur.

A. l. 3. f. 21. r. 4.
c. 16. fo. 396. a. b.

GALENI DE COMPOSITIONE MEDICA MENTORVM LOCALIVM SIVE SECUNDVM LOCOS LIBER DECIMVS

ARGVMENTVM LIBRI

Recensentur Medicamenta, quæ Renum, Vesicæ, Coxæ ac
Articulorum, Affectibus succurrunt.

H

De Nephriticis.

CAP. 1.

* συνάμει.



Quod nephriticas antidotos et cōpositiones appellēt, q̃ renibus affectis cōmo
dāt, ex ipsa appellatione manifestū est: Nephritice. n. nihil aliud q̃ renales so
nāt. Est aut̃ differētia ipsarū generalissima duplex. Quædā. n. calculosos re
nes iuuat: q̃dā verò inflāmatos et vlceratos, q̃ et ad vesicā similiter affectā cō
ueniunt. Maxime verò cōtrariæ inter se sunt prædictorū pharmacorū facul
tates. Quæ. n. ad inflāmatas et vlceratas affectiones componunt, mitigatorijs
medicamentis opus habet: cū verò impossibile sit hæc citò ad regiones renū
peruenire, ob id ipsis pharmaca vrinā ciētia miscemus. Quæ verò calculosis au
xiliant, vnica facultate indigent, q̃ secare & extergere cū manifesta caliditate pōt: sunt aut̃ talia ferè
oia amara. Quemadmodū igit̃ in alijs, sic et in his materiā experimento cognitā deinceps subscri
bā, initiū ab ijs quæ ad vlceratas & inflāmatas affectiones conueniunt facturus, à quibus et An
dromachi sectatores & Asclepiadis orsi, inde ad cōpositiones calculos frangentes tranſierunt.

Conſeſtiones

A *Confectiones Renales ab Andromacho ad Renum & Vesicæ affectiones conscriptæ.*

¶ Potio. Seminis lini, seminis papaveris albi, seminis cucumeris, tragacanthæ, singulorū drachmas duas: amyli drach. quatuor: cum aqua in pastillos redigito, & ad velicam ulceratam ac vrinæ emittendæ difficultatem exhibeto. *Alia.* Nuces pineas xxx, amygdalas xx, palmas xv, tragacanthæ drachmas quatuor, succi radicis dulcis drach. ij, croci obolum vnum, myrrhæ obol. i: vino protropo diluito, ac vtitur vt accommodato.

¶ Alia, ad Vesicæ affectus et ulcerationes, Pastillus, quo vtor. Seminis cucumeris drach. xij, seminis hyoscyami drach. vi: seminis cicutæ, opij, fœniculi, croci, lingulorum drach. iij: casia drac. quatuor, amygdalas x, nuces ponticas x, seminis apij drach. sex, seminis maluæ sylvestris drach. tres: excipe passo cretico, & præbe obolos tres non febrientibus ex passo. Quidam cicutæ drach. sex habent.

¶ Alia, ad Eadem & Vesicæ dolores. Croci, seminis besaliae hoc est rutæ sylvestris, seminis maluæ sylvestris, singulorum drach. sex: seminis hyoscyami drach. xij, opij drachmas sex, seminis apij drach. xij, nuces auellanas viij, amygdalas xx, seminis cucumeris drach. xij, mellis attici quod satis est. Datur magnitudo nucis ponticæ cum vini muli cyath. tribus.

¶ Alia, ad Profluvia sanguinis ex Vesica. Aluminis drachmam vnam, tragacanthæ drachmas duas, gummi obolum vnum. Dato ex passo quandoque obolum vnum, quandoq; ij.

B *Vesicæ affectiones, Vrinam ciens, à Macedone profecta. Facit & ad Hepaticos, Hydropicos, Ictericos, Nephriticos, ac Omnia Vesicæ symptomata: frangit etiam Lapides.* Acori drach. l, phu drach. xxv, nardi celicæ xxiij, seminis dauci drach. xxiij, cinnamomi drach. xxxii, mei drach. xvi, asari drach. xxiij, petroselinij xvi, opobalsami drach. xvi, & carpobalsami tantundem, croci drach. xxiij, myrrhæ drach. xx, radicis dulcis drach. xvj, nardi Indicæ drach. xvi, calicæ drach. xij, amomi drach. xvj, vuc pallæ drac. viij, tragacanthæ drach. ix: arida melle excipito, & tragacantham vino amineo macerato. Dato nucis ponticæ magnitudinem cum vini cyathis quatuor, febricitantibus cum aqua mulsa.

¶ Alia ad Vesicæ Vlcera & inflammationes. Nuces pineas xx, seminis cucumeris sylvestris grana xl, amyli obol. tres, nardi drachmam vnam, seminis apij cyath. ij: nardus & apium in aque sextario vno coquantur, deinde ex decocto duo cyathi præscriptis admiscuntur. **¶ Alia ad Calculosos, qua Bassa vxor Marij curata est.** Frangit ita vt neque rursus gignantur. Calicæ drach. duas, seminis apij drach. iij, myrrhæ mince drach. quatuor, piperis albi drach. ij, thuris drach. tres, lapidis syriaci masculi 3 j, aut fœmine drachmam vnam: seminis pastinacæ, anisi, vtriusque drach. ij: styracis drach. iij, iridis illyricæ drac. iij, seminis papaveris albi drac. duas, spice nardi tantundem: amygdalarum amararum mundatarum, asari vtriusque drach. tres: seminis smyrnij, cyperi, vtriusque drach. ii: mellis attici quod satis est.

C *Dato quotidie. Alia ad Calculosos, frangens & paulatim expellens, donec mundam Vesicam reddat, deinde æger pellucida lotia reddat: & quod maximum est, curat vt non amplius renascantur.* Seminis dauci, anisi, seminis cucumeris, petroselinij, myrrhæ, singulorum drachmas sex: calicæ daphnitiidis, cinnamomi, nardi celticæ, singulorum drachmas quatuor: terito, & cum aqua ad parui lupini quantitatem coagmentato: & ieiunis quotidie per dies triginta ex aquæ cyathis tribus præbeto. Hoc verò pharmacum quemadmodum accepimus, cum quadam religione præparatur: ligneo enim mortario ac pistillo tunditur: oportet q; eum qui tundit neq; anulum habere ferreum, neq; calciamenta clauis ferreis transfixa. Hoc à rustico vt mysterium accepimus. **¶ Alia ad Nephriticos & omnem Fluxionem, vt Apollonius.** Corticis mandragoræ tosti sesquidrachmam: hyoscyami seminis tosti, seminis papaveris nigri tosti, vtriusque sesquidrachmam: anisi tosti sesquidrachmam: tragacanthi, carnis palmarum, vtriusque drachmas tres: dato cum melle.

Nephriticæ Compositiones ab Asclepiade conscriptæ.

¶ Antonij Musæ. Fructuum pini, qui pityides vocantur, fustorum et cribratorum, 3; xx: seminis papaveris albi, tragacanthæ, vtriusque drach. ij: nardi celticæ, croci, anisi decorticati, radicis dauci cretici, singulorum drach. i: costi obol. iij: præpara cum protropo, & repone in pyxide. Dato nucis ponticæ magnitudinem cum protropi cyatho vno, & aquæ calidæ cyathis duobus.

¶ Alia. Seminis cucumeris satiuu tosti drach. iij, seminis maluæ drach. v, nucum pinearum drach. vi, seminis apij drach. viij, seminis lini drach. vnam, amygdalarum amararum mundatarum 3 ix: excipe passo, & exhibe vt prædictum est. **¶ Alia ad Nephriticos Onesidemi.** Amygdalarum amararum 3 xvi: seminis dauci cretici, seminis maluæ, vtriusque drach. vi: radicis iridis sylvestris drach. viii: cornu ceruini vsti, tragacanthæ, nardi celticæ, seminis cucumeris satiuu, singulorum 3 vi: passi quantum sufficit, præpara vt dictum est. **¶ Aliud Pharmacum accommodatum.** Hoc scimus multos nephriticos vfos esse, & à tota affectione penitus liberatos. Oportet per multos dies in pharmaci huius vsu perseverare. Datur & calculosis, & colicis medetur, ac vesicæ affectibus. Componitur hoc modo: Nucum ponticarum purgatarum, amygdalarum amararum mundatarum, seminis cucumeris repurgati, singulorum drach. iij: seminis cicutæ, croci, seminis maluæ, opij, singulorum drach. sex: seminis hyoscyami albi, seminis apij, vtriusque drach. xii: cogito in pastillos cum melle, ac dato obol. iij, cum aquæ mulsæ cyathis iij: in alio exemplari, & besalia, hoc est seminis rutæ sylvestris 3 vi. **¶ Ad Callosas in Renibus concretiones, Onesidemi.** Symphytum, & lion, & artemonium, cum vino coquito: & expressi liquoris cyathos duos, cum pari aqua dato. **¶ Aliud.** Maluæ sylvestris radicem, & rutæ sylvestris radicem, et apij montani radicem, {cum vino} coquito: & eo qui dictus est modo

A. l. 3. f. 18. r. 2.
c. 12. fol. 360. a

A. l. 3. f. u. 2. r. 6.
fol. 356. d

* Aliter xii.

* Aliter Galeni.

* Aliter i.

* Aliter vi.

+ Alii exacina-
torum.
* Aliter nigri.

DE COMPOS. PHARMAC.

do exhibeto. **C** *Aliud ad Calculosos insperfile.* Seminis balsami partem i, lapidis qui in spongijs reperitur tantundem: pulegij aridi, seminis maluae sylvestris, ocymi aridi, singulorum tantundem: tusa & cribrata reposito, & dato cochlearium cum vini diluti cyathis duobus. *Aliud.* Struthij radicis partem i, iridis sylvestris siccae tantundem, oxalidis siccae tantundem, fremij luteum florem habentis licci tantundem. Tulis & cribratis, ut dictum est, utere. **C** *Catapotia Heraclidæ Tarentini, dissolunt Vesicæ Tophos, commodant & ad Vesicæ Stillicidium.* Piperis, galbani, vtriusq; 3 i: succi lybici 3 ij, myrrhæ 3 iiij, protropi quod satis est: forma catapotia ciceris magnitudine, & tria deuoranda dato, & passi cyath. ij insuper bibendos. *Aliud.* Ammoniacy thymiamatis, piperis, spumæ nitri, singulorum 3 i: carpobalsami 3 ij, myrrhæ 3 iiij: excipe protropo, & forma catapotia ciceris magnitudine: ac tria deuoranda dato, ita ut vini dulcis quadrantem insuper propines. Hoc ad dies 7 xlviij, agro prælo to facies. **C** *Pastillus ciens Vrinam, detrahit Lapillos & Tophos concretiones.* Asari, petroselinii, phurmei, singulorum 3 iiij: acori, seminis anisi, seminis dauci, apij montani, carpobalsami, tragacanthæ, singulorum 3 ij: tragacantham passo dissolutam aridis adijcito, & pastillos formato: inde q; obolos tres cum passi diluti cyathis duobus exhibeto. **C** *Alius pastillus Chariclis, educit Arenosæ subsidentias, facit ad Affectiones Vlcera.* Seminis apij, petroselinii, anisi, singulorum 3 xvi: floris iunci odorati, croci, tragacanthæ, singulorum 3 vi: seminis dauci cretici, piperis albi, vtriusq; 3 iiij: præpara ut dictum est: & da drachmam vnam, cum protropi diluti cyathis tribus. **C** *Antidotus ex Lapidibus, ut Mithridates, facit Nephriticis & ad Vesicæ affectus: atterit Calculos, & Tophos dissoluit.* Seminis smyrnij, cyperi, spicæ nardi, seminis papaueris albi, cinnamomi, casia fistule, piperis albi, seminis pastinacæ, singulorum vnc. i: thuris non secti, seminis apij, croci, styracis, iridis, amygdalarum amararum, acori, singulorum sesquunciam: lapidis syriaci foeminae, aut masculi, vtriusq; semunciam: myrrhæ minnæ sextantem: excipe melle. Datur nucis ponticæ magnitudine. **C** *Alia antidotus Biennitæ, pharmacum accommodatum, sedans Dolorem. Vtile & Nephriticis hoc est renalibus affectionibus, & ad Vesicæ Vlcerationes. Frangit Lapides, & lutum per urinam expellit.* Iridis drach. iiij: mei, sefelis, chamædryos, hyperici, cneori, canchryos, singulorum tantundem: amomi drach. viij, cinnamomi drach. xii: rosmarini montani, nardi indicæ, croci cilicij, petroselinii, polij, seminis rutæ sylvestris, dictamni cretici, singulorum tantundem: glycyrrhizæ, lapidis syriaci masculi, vtriusq; drach. xvi: thlaspeos drach. xxiiij: seminis viticis, myrrhæ, spondylii, singulorum tantundem: cardamomi drach. xlvij: excipe melle cocto, & præbe nucis ponticæ magnitudinem cum vini nulli diluti cyathis quatuor.

Quæ Archigenes ad Renum affectiones scripsit in Secundo Pharmacorum secundum genus.

C Ex renibus laborantes nephriticis appellatos conuenienti diætâ adseruo. Et ceratum quidem rosaceum cum styrace ad malagmatis formam redactum impono. Caterum Antiochus apud Phricen Linophobum, valde iuxta naturalem contrarietatem auxilio fuisse ait ad mali euerfionem prototomi caulis decocti cyathos duos ieiuno ad dies nouem exhibitos. Inspergito autem salem modicum & magis proficies. **C** *Alia Potio.* Foliorum rosarum, amygdalarum decorticatarum, thuris, æquales partes: capitum papaueris duplum: excipe protropo, & in vas fictile repone in loco non humecto: & obolos duos, cum protropo exhibe. Quidam pro amygdalis amyllum coniiciunt, & pro protropo aqua excipiunt, verum cum protropo bibendum exhibent.

De Ischiade coxendicum morbo, Podagra, & morbo Articulari siue arthritide.

CAP. 2.

EX genere arthritidis est tum ischias, tum podagra: quod enim in omnibus articulis arthritidis est, hoc in vno iuxta coxendicem quidam ischiada, hoc est coxendicum morbum, appellant: iuxta pedem autem podagrâ. Incipit igitur plerumq; podagræ generatio ex vno articulo, & progreditur in omnes temporis diuturnitate accedente. Communem habent hi tres affectus humoris redundantiam, quæ affectam occupat coarticulationem: qua expleta in omnem partem circum sita nervosa particulae tenduntur, & ex his dolor oritur. Aliquando quidem igitur irruens humor sanguineus est, ut plurimum verò pituitosus, aut ex pituitoso & bilioso mistus, aut etiam sanguine cum ipsis permisto. Quod si quis exactius interpretari rem velit, non pituitosum humorē, sed qui propriè crudus appellatur, ut plurimum circa arthritidas prædominari dixerit. Est autem hic crassus ad similitudinem puris crassioris: ubi verò in ipsis articulis diutius moram traxerit, non solum crassior, sed & viscosior, redditur. Qui igitur topi seu calli appellantur, horum generatio ex his est: & postquam fuerint producti, ne speraueris ad pristinam constitutionem exacte redire articulum posse. Caterum differentia affligentium humorum facile deprehendi possunt tum coloribus, tum symptomatis coincidentibus: item que per experientiam pharmacorum, quæ adhibentur. Cognitio igitur ipsorum ex colore omnibus expolita est: ex symptomatis verò coincidentibus, tametsi non omnibus, neque ex procinctu, manifesta sit, tamen non adeo difficilis cognitio existit. Biliosus enim sanguis multæ caliditatis sensum agroto exhibet, & calfacientibus impositis exacerbatur, quemadmodum rursus à frigidis relaxatur. Verum ad humoris noxij cognitionem conferet tibi etiam prægressa diætâ siue per exercitia, siue per otium transmissa, & per balnea, post aut ante acceptum cibum. Quemadmodum conferet etiam horum gymnasiorum & eduliorum tum quantitas, tum qualitas: item anni hora, & regionis ac aeris constitutio: insuper q; & ætas, & habitus corporis: quorum omnium facultates sepe in plerisque locis enarraui. Porro principium

* AP. vini dulcis.

† Aliter xl.

A.1.5. su.1.2.2. fol.530.g

A.1.3. f.22.2.2. c.5. fol.401.c.d

A.1.1.f.2.d.3. su. 1.c.7. fol.45.h

A principium curationis sit tibi euacuatio humoris affligere reperti: si quidem humoribus ex quo redundarit corpus, venę sectione primum omnium assumpta, deinde purgatione: quibus accedat pharmacorum dicendorum conueniens & tpe, & ordine, vsus, ita vt in manibus & pedibus pharmacis fluxionem repellentibus vtamur, circa coxendicum verò iuncturam id facere vitemus: cum enim in profundo ea sita sit, sanguis ex vicinis & ambientibus vasis ac musculis ad illam compellitur. Mitigatoris igitur in principio medicamenti opus est in dolore circa coxendicem hærente, quæ neq; refrigerent multū, neq; fortiter calfaciant, qualibus sanè postea opus habet: exacerbatur enim per ipsas fluxiones caliditate nimirum plus attrahente ipsas, q̄ impediēte. Qñquidem verò presentis operis institutum est neque de cataplasmatibus, neque de irrigationibus, quicquam dicere, sed de methodo compolitorum pharmacorum, ad hanc solam progrediar initio ab ischiade sumpto. Rarò equidem fit ischias ex sanguinis multitudine: & citissime curatur, venis circa popliteum aut talos sectis. Quemadmodum autem sæpe sola sanguinis euacuatio sufficiens auxilium existit, sic contra in omni ischiade, et præsertim eo qui ex humorum copia exortus est, si quis ante euacuationem totius corporis acerbis pharmacis circa partem affectam vtatur, ægre curabilem reddet affectionem, copia nimirum indissolubiliter ibidem condensata: præter alia enim & crassa &

B viscosa fit ob calorem & siccitatem acrium pharmacorum, non dissimile quippiam affationi perpetiens. Tanq̄ igitur maximam vim ad affectionis curationem habeat totius corporis euacuatio, ab ipsa incipiendū est nō solum à cruribus, sed & à cubito primū, sanguinis detractione facta. Auxiliantur et vomitus ipsis ischiadicis magis utiq; q̄ euacuationes infernæ per ventrē, vt qui reuelant repetentē deorsum humorē. Faciendi itaq; sunt vomitus in principio ab accepto cibo: postea verò et per vomitoria medicamenta, initio à mediocribus factio. In quibus autem vehemēs humorum densatio, quæ ægre dissolui potest, à medicis intempestiuè acerbis pharmacis vtentibus facta est, his cucurbita affixa maxime auxiliatur, & purgatio per efficaciora infusa, quale est & quod ex colocynthide constat. Si igitur ea quæ nunc dicta sunt præ oculis habueritis, medicamenti sanè à prioribus medicis traditis iuxta methodum vtēmini. Verum in ipsis recēsendis auspicabor ab ijs quæ ab Andromacho scripta sunt in illa parte libri de externis pharmacis conscripti, in qua præscriptis malagmatis proprie appellatis, inde etiam alia omnia prodit, iuxta quencunq; tandem modum inueteratas affectiones iuuantia, in quibus est etiam ischiadicorum appellatorum cura.

Compositiones ab Andromacho conscriptæ ad Ischiadicos.

C Seminis rutę sylvestris 3 iij, silphij 3 iij, spumæ nitri 3 iij, baccarū lauri 3 iij: abrotoni, colocynthidis medullæ, cardamomi, ammeos, singulorum 3 iij: rutæ viridis minæ octauam partem. Quiddam horum singulorum 3 xx accipiunt: & picis, terebinthinæ, myrtei, ceræ, singulorum tantundem: adipis taurini tantundem, chalbanī 3 vi, ammoniaci thymiamatis 3 vi, opopanax 3 iij, sulfuris viui 3 iij. Quod hoc pharmacum fortiter calfactorium sit, si memoria tenuerimus ea quæ in libris de Simpliciu pharmacorum facultate scripta sunt, nihil opus recentiore assertionē. Est enim vehementissimum & calidissimum medicamentum sylvestris rutæ semen, & cum eo silphium, & baccæ lauri, deinde spuma nitri. Post hæc abrotonū, inde q; colocynthis, & cardamomū, & ammi. Ruta et viridis minus quidem his, non tñ contemnendam habet caliditatem, quemadmodum neq; sulfur viuū. Ex profundo itaq; attrahere omnia hæc possunt humores articulū & iuncturam coxendicis vexātes. Quod verò emplastrum ex ipsis fieret, picem & terebinthinā † ac myrteū, & cerā, ac adipem admiscuit is, qui pharmacum composuit. Verum ammoniacum thymiamā, & chalbanum, vltra hoc quod conferunt ad emplastrum compositionem, etiam emolliendi ac mitigandi vim quandā habent. Opopanax verò eiusdē cū ipsis est generis, sed fortiori facultate præditus. Alterā porrò cōpositionē ad eandē affectionem Andromachus sic scripsit. **C** Aliud Malagma ad Ischiadicos, & Alia multa. Ceræ 3 lxxii, terebinthinæ 3 xlviij, ammoniaci thymiamatis 3 xxxij, propolis 3

† in quibusdā codi. dictiones hæ non habentur, in alijs legitur, q̄ p̄tinet et resinā.

D xliij, chalbanī 3 xxxvi, bdellij 3 xxv, croci 3 v, opopanax 3 xij, spumæ nitri 3 xxx: vnguento irino admoto tundito. **C** Aliud Protæ Pelusioræ, ad Coxendicum, & Capitis dolorem, & ad omnes diuturnos Dolores. Ceræ 3 xxiiij, ammoniaci thymiamatis 3 viij, terebinthinæ 3 viij, succi thapsiæ 3 viij, olei cyathū vnum. Quin & aliā cōpositionē inter malagmata Andromachus retulit hoc modo. **C** Ad Ischiadicos ab Hera Cappadoce. Picis liquidæ heminas iij, aut ij & dimidiam, ceræ lib. i, resinæ pini lib. i, nitri sesquilibram, sulfuris viui lib. i, staphidis sylvestris sextarium i, pyrethri lib. dimidiam, facis vini vstæ lib. ij, cardamomi sextarium j, chalbanī lib. dimidiam: arida cū liquidis committito. Hoc pharmacum etiam ipse Heras in proprio libro prope finem scripsit, sed non appositum est ad picem, aut duas & dimidiam, sed simpliciter scriptum est, heminas tres. Præscripsit autem hæc verba: Ceratum ad ischiadicos, quod eruit etiam valde inueteratas affectiones: hoc vsus sum in Frontino. Scripsit autem & alias duas ischiadicas compositiones Heras, quarum altera hoc modo habet. **C** Ad Ischiadicos valde mitigatoria. Picis partes ij, sulfuris viui partem vnam: vtraq; trita mista dolenti loco imposito. Verum prælauare ægrum oportet, vt pharmacum adglutinetur, & superne chartam superponere, ac sinere donec sua sponte dilabatur: licet etiam lauare charta supraposita adhuc incumbēte. In quibusdā exemplaribus, picis pars vna habetur: & licet etiā sic præparare, modo sciamus nos efficacius esse ambo pari mensura misceri. Debilius verò pharmacum, in quo

duplum

duplum picis ad simplum sulfuris conijcitur. Porro quæ restat adhuc tertia compositionū ischia E dicarum, hoc modo ab Hera prodita est. *Alia Ischiadica. Hac usus sum in Frontino, statim in exacerbationibus.* Ceræ 3 c, visci quercini 3 xvi, myrrhæ 3 vi, terebinthinæ 3 xxv, chalbanī 3 vj, iridis illyricæ 3 vi, cedriæ heminam dimidiam, cyprini heminam dimidiam: ceram & cedriam cum cyprino liquefacito, deinde resinam & chalbanum: atque vbi iam ab igne auferre voles iridem inspergito, item q̄ viscum indito. Ablata autem iam olla in promptu sit tibi myrrha trita, ad quam liquefacta distundes, & mistis simul omnibus vteris. Quidam supra hæc omnia etiam nitri 3 v addiderunt.

Quæ pharmaca Asclepiades in Quarto Externorum prodidit, quæ Marcella inscribit.

Nominat equidem & hic omnia huiusmodi malagmata: apponit autē alijs q̄ ad ischiada, alijs quod ad splenem, alijs ad latus aut aliam aliq̄ partem, conducant: quædam etiā varij vsus esse ait: Quemadmodum ē hoc scriptum ab ipso in hæc verba. *Malagma Antiochidis, Splenicis, Hydro-*

picis, Ischiadicis, Arthriticis. Preparatum est Fabulle Libycæ. Ceræ lib. iij, visci quercini lib. iij, resinæ terebinthinæ lib. iij, retrimenti ab expressa myrobalano reliqui lib. i, spumæ nitri lib. i, floris lapidis alii lib. i, ammoniaci thymiamatis lib. i, olei cyprini lib. iij: acetum ad ammoniacum dissoluendum. Post hoc scribit rursus aliud sic. *Aliud Fabulle compositum valde præclarum, ad Eisdem affectiones.* Myrrhæ fractæ lib. ii, bdellii onychis lib. ii, medullæ ceruinæ lib. ii, ammoniaci thymiamatis lib. ii, iridis illyricæ lib. ii, opopanax lib. i: chalbanī, styracis, vtriusque lib. i: maltiches lib. i, floris lapidis alii lib. i, succi sycomororum lib. i, canchrysos lib. vnā, piperis albi lib. i: ceræ, terebinthinæ, vtriusque lib. v: tundendum est pharmacum, ita vt qui tundit fecem vnguenti irini adhibeat, quod mollius pharmacum fiat. Aliud deinceps Asclepiades scripsit hoc modo. *Malagma quod & Aurei coloris appellamus.* Auripigmenti auricoloris, calcis viuæ, vtriusque sextantem: aluminis liquidi, & scissi, vtriusque sextantem: arida tundimus & cribramus, & in pilam coniectis, aceti cyathos octo affundimus, & probe trita liquefactis excipimus. Sunt autem hæc: Cere, resinæ frictæ, & pinus, singulorum lib. ii: olei communis cyath. viii: hæc liquefacta frigefferi sinimus, & erasa tritis admiscemus. Nos ad pharmaci præparationem etiam myrrhæ sextantem addimus. Alii etiam sandarachæ sextantem apponunt aluminis liquidi sextante sublato. Nos aut coniectis omnibus præscriptis cōficimus, & ut efficacius. Post præscriptum aliud subdidit hoc modo. *Hoc vsus est Andromachus. Facit Splenicis, Hydropticis, & ad Præcordia distenta. Facit Ischiadicis, Arthriticis, & ad Inueteratos affectus.* Cere, picis, bruti, vtriusque lib. i: nos pro pice resinam frictam indimus: resinæ pinus lib. i, olei cyath. viii: auripigmenti auricoloris, aluminis scissi, calcis viue, singulorum sextantē: præpara vt dictum est. Nos apposuimus ad pharmacum myrrhæ sextantem, visci quercini trientem.

Post relata alia quædam ad hydropicos & splenicos recenset, & inde rursus multi vsus compositionem tradit, quam etiam ischiadicis cōuenire ait, hoc modo. *Andree Malagma. Compositio admiranda ad Ea quæ velis perforare, dissoluere, adæquare. Educt ossa corrupta, aculeos, & infixæ. Descriptum est etiam a Serapione empirico. Facit & ad Ischiadicis, commodum est Suppuratis, facit & ad Induratas viscerum affectiones. Est & Acopon bonum diutinis resolutionibus, & distortis corporis particulis. Facit etiam ad Ea quæ pingui mucore obfessa sunt: educt enim aliena, & vlcus ad cicatricem perducit.* Grani "cnidii purgati, nitri rubri, salis ammoniaci, aristolochiæ creticæ, radicis cucumeris syluestris, terebinthinæ, singulorum drachmas viginti: piperis rotundi & longi, ammoniaci thymiamatis, & vt quidam volunt amomi, & xylobalsami, singulorum drachmas decem: thuris masculi, myrrhæ, resinæ liccæ, visci subacti, singulorum drachmas decem: succi mororum drachmas decem, cere drach. xxx, adipis caprini drach. xv, fecis vnguenti irini quantum satis excipiendis erit. Arida tunduntur, & angustissimo cribro excernuntur: liquecibilia verò singulatim diligenter tunduntur: deinde omnia simul miscentur, ac rursus tunduntur admota irini fecē: deinde vbi probe fuerint vnita, emollita reponimus. Quod si velis acopo uti, accipe pharmaci quadrantem, adipis anserini quadrantem, olei cyprini quadrantem, ac mistis vtilior. Postea verò consequenter sic scripsit. *Aliud ad Eisdem affectiones.* Pyrethri drach. xx: grani cnidii, spumæ nitri, vtriusque drach. xx: salis ammoniaci, aristolochiæ creticæ tenuis corticis, radicis cucumeris syluestris, terebinthinæ, singulorum drach. viginti: piperis rotundi & longi, ammoniaci, thymiamatis, bdellii, xylobalsami, thuris, myrrhæ, cardamomi, amomi, adipis caprini, resinæ liccæ, singulorum drachmas decem: ceræ drach. xxx, visci probe subacti drach. viii, succi mororum drach. viii, facis vnguenti irini quod sufficit his excipiendis, vini Italici quod satis est: maceratis his quæ dissoluere oportet, pro more apparato. In alio exemplari neq; xylobalsamum, neq; cardamomum, neq; amomum repperi. Post hæc alia pharmaca prodidit, & deinde rursus ischiadicorum meminit, sic scribens. *Aliud eiusdem Epithema, Ischiadicis, & Arthriticis: auxiliatur confestim.* Foenugracum in vas fictile coniicito, & ad ipsum poscam sufficientem affundito, & prunis impositum donec dissoluatur coquito: ad dissolutum verò mellis quod satis est iniice, ac rursus coque: deinde exempta diligenter tere, & in linteolum infarta locis affectis impone, fasciaque obligatos sine. Hoc autem ad biduum & triduum facimus. Ceterum si in terendo pharmacum induretur, ex liquore quantum sufficit addimus: liquor autem tantus sit, vt tractile cataplasma reddatur. *Aliud quod continenter ad prædicta sequitur, hoc modo.* Symphiti sesquilibrium rasam & minutim concisam, ac in mortarium testaceum coniectā, diligenter terito:

A. l. 3. fu. 1. c. ii
fo. 547. c. f

A. l. 3. f. 22. r.
c. 10. fol. 403.

Arito: & ad tritam mannæ quadrantem addito, atque ouorum crudorum recentium trium numero candidum vnâ cum luteo, & rursus terito: & vbi vnita fuerint, his adipis suilli veteris libram vnâ adijcito, & conquassata diligenter atq; in linteolum infarta imposito: mitigat confestim. Post præscriptum aliud deinceps scripsit hoc modo. *Aliud eiusdem Malagma. Ischiadicis statim in irritationibus imponitur. Appellatur Dichymæa. Facit ad Attrita, & omnem Nervorum per consensum affectum: dissolvit omnem Duritiem: facit etiam ad alias Inflammationes: delet malignas Cicatrices: facit ad Luxata & Collisafacit & ad Mammillarum affectiones malignas.* Ceræ, visci quercini, terebinthinæ, iridis siccæ, myrrhæ, chalbanî, singulorum drach. xlvij. olei cyprini aut vnguenti egyptiaci quod satis est. Chalbanum in oleum cyprinum, aut vnguentum ægyptium coniectum: ad ignem dissoluimus: & ceram molimus, ac reliquis mistam probe tundimus: atq; his chalbanum liquefactum cum cyprino iniicimus, ac rursus tundimus, malagma lenissimum tactui reddendo: quo utimur. Consequenter est hoc Asclepiades subdidit. *Aliud eiusdem ex Areo. Facit ad Colicos supra quàm dici potest, in ipsis vexationibus impositum: & Pforas curat cura exulcerationem.* Ceræ, picis liquidæ, vtriusq; lib. i. { picis aridæ lib. i. } sulfuris viui, aluminis scissi, nitri rubri, singulorum lib. dimidiam: liquefabilia liquefacito: arida verò tundito, & per angustissimum cribrum concernito, & ad liquefacta adijcito, paulatim ea inspergendo ac assidue mouendo: inde q; in pilam translata ac tusa reponito, & utitor. Deinceps rursus aliud prodidit hoc modo. *Aliud eiusdem Malagma ex Silphio, Ischiadicis valde commodum.* Ammij 3 xij. silphij, seminis rutæ sylvestris, baccarum lauri purgatarum, singulorū drach. xiiij. medullæ colocynthidis 3 ij, nitri 3 iij, abrotoni thebaici 3 iij, cardamomi 3 iij, ceræ pōticæ minæ octauam partem: picis, resinæ, { adipis anferini, } ammoniaci thymiamatis, singulorum minæ octauam partem: liquida cum aridis committito. Consequenter & hoc ab Asclepiade scriptum est ita. *Aliud eiusdem, quo vsus est Antipater.* Silphij, rutæ sylvestris siccæ, baccarum lauri siccarū, spumæ nitri, medullæ colocynthidis, abrotoni thebaici, ammij, cardamomi, singulorum 3 iiii: rutæ satiuæ viridis, picis siccæ, resinæ terebinthinæ, ammoniaci thymiamatis, adipis vitulini, singulorū minæ octauam partem: chalbanî 3 xvi, opopanacis 3 iij, sulfuris viui 3 iiii, olei cyprini heminas iiii. *Al. anferini.* Vsus tempore oportet prius coriandrum aridum vsum cyprino excipere, & ex eo coxendicem illinere, atque post huius vsum malagma ipsum imponere. Post hoc rursus aliud scripsit hoc modo. *Aliud eiusdem Malagma, in Ischiadicis humores ex alto euocat ac transfert, liberat q; à tota affectione. Facit & Dissolutis, & Trementibus, & Affectionibus inueteratis.* Picis liquidæ brutiæ lib. iiii, facis aridæ vstæ lib. ii, nitri rubri sesquibram, resinæ pini lib. i, ceræ lib. i, staphidis sylvestris lib. i, sulfuris viui lib. i, pyrethri lib. dimidiam, cardamomi sextarium i: picem, ceram, resinam coquito: arida tundito, & cribrato angustissimo cribro, ac cum liquefactis committito: & utitor. Post præscriptū adhuc aliud pharmacum subdidit ita habens. *Aliud eiusdem quo vsus est Philocalus.* Sinapis, foeni græci moliti, vtriusq; sextar. dimidium: pyrethri, staphidis sylvestris, nitri rubri, singulorum 3 iiii: opopanacis drach. ii, chalbanî drach. ii, resinæ terebinthinæ lib. i, ceræ lib. i, olei cyprini lib. i: arida cum liquidis committito & utitor.

Ischiadicorum Cura à Damocrate conscripta, ex Iberide.

Damocratis extat libellus Clinicus inscriptus, in quo versibus Iambicis, quemadmodum solet, de tribus differit medicamētis, Ac primo quidem eo, quod ex herba, quam ipse Iberidem appellat constat: Secundo ex semine dolores sedante composito: Tertio verò purgatorio, & ab ipso Hierapappo appellato. De primo igitur in ischiadicorū curatione in eo libello hæc scripsit. In Iberide inquit medicum quendam amicum suum per hanc herbam curatum esse: quam herbam, vt dixi, ipse Damocrates Iberidem appellat, vt qui ipse visu herbam cognorit, nomē autem eius nullum audierit, cum etiam id ipsum ignorarit is qui eum vsum eius docuit. Verum ex signis quæ scribit videtur Iberidē appellare, quæ à Græcis lepidium nominatur, à regione, in qua amicus eius curatus est, Dappellatione ducta. Describit autem ipsius signa per hos Iambos.

Herba hæc ubiq; multa q; frequens nascitur
 Monumenta iuxta antiqua, muros & veteres,
 Tritas q; quondam publicè pedibus vias,
 Quas iuxta aratrum duxit haud quis agricola.
 Semper virescens, foliis nasturtii
 Florentibus, vere attamen maioribus.
 Caulem cubitalis longitudinis gerit,
 Paulo minorem aut rursus ampliorem. Ab hoc
 Æstate pendent folia, donec multa hyems
 Sarmentitiam deducat hæc ad imaginem, &
 Deiecta & exiccata depereant gelu:
 Adnata radici tamen cernes alia.
 Æstate florem fert colore lacteo
 Multum tenuem varium q; valde cauliculus.
 Ad quem sequitur semen penitus sic exiguum,

Visum

Visum ferè vt fallens, oculos quoq; effugiat.
 Odorem habet radix at inde acerrimum,
 Vero similem quàm maximè nasturtio.
 Per hos quidem versus figuram herbę indicauit. Consequenter aut vsum ipsius per huiusmodi.
 Hanc erutam larga satis cape copia,
 Æstate: nam tunc optima, & fortissima est
 Adhuc recens, siccata fit sed debilior.
 Tusam hinc probè (nam difficulter tunditur)
 Pauca subactamq; excipies axungia:
 Cruri q; toti & maximè coxendici
 Adhibebis, & ligabis, & fines duas
 Horas mulieribus, viris sed quatuor.
 Hinc balneo inductos, nec vlllo ex vnguine,
 Nec smegmate vlllo pinguiore collines,
 Sudore sed modico exiliente in solium
 Merges, manere coge, siquidem sapius
 Morium caloris quempiam ac sensum afferat.
 Verum hinc rigatos leniter producito.
 Illati enim quamuis manibus sint plurium,
 Exhibit attamen suis pedibus valens.
 Ad multum oleum miscebis hinc vinum modicum,
 Et concuties, & illines totos eo.
 Ac mox madore terfo & pinguitudine
 Totum teges crus mollibus tu velleribus,
 Iubens obire assueta vitæ munia,
 Quæcunq; vult, & non grauatim suscipit.
 Hoc auxilium certum atq; constans integrè est,
 Et nullo alio adiiciendo ei simul indigum.
 Expers doloris & vbi manseris, ferè
 Quod accidit, radiculam latus cole.
 Quod si tamen inde affectionis vestigium
 Quoddam superlit, post repetes hoc præsidium,
 Diebus vt multum decem bis præteritis.

Hoc sane vtendi modo et inueteratos capitis dolores, et alias omnes quacunq; corporis parte inue-
 teratas & agrè solubiles affectiones ac resolutiones, se curasse ait. Et oïno vitia in quibus alijs sina-
 pismo appellato, & auxilio ex thapsia conflato, vtitur, se per hanc herbã persanasse dicit. Porro
 de hac lberide et Archigenes scribit in secundo pharmacorũ fm genus, lepidium ipsam appellas.
 Dicit aut splenicis & ischiadicis ipsam conuenire. *Ad Ischiadas & Perfrigerationes, Hygiani Hip-
 parchi.* Herbã lberidem quam aliqui lepidium vocant, aut agriocardamũ id est nasturtiũ syluestre,
 colligito: & radicem eius tusam ac adipe porcino commollitam emplastrĩ vice imposito ad dolen-
 tem locum ad horas tres, inde q; in balneum mittito. Idem præsidium & veteres capitis dolores
 depellit, in consimili vsu adhibitum, quem Damocrates medicus per versus prodidit.

De Podagricis & Arthriticis affectionibus.

CAP. 3.

Dictum antea est in sermone de Ischiade, ex fluxionibus generari eiusmodi affectiones irruen-
 tibus in locos iuncturarũ: quare et curatio ipsarũ iuxta eundem sit modum, nimirũ vt irruen-
 tes fluxiones euacuent. Influentibus igitur adhuc ipsis scopum asserendorum auxiliorum cõi rō H
 ni influentium humorum subiicere oportet, ita vt repellamus ac restringamus. Vbi verò amplius
 non influant, vt discutiamus iam illapsos. Caterum materia pharmacorũ per quæ hæc fiũt mul-
 tiformis est, quemadmodum etiam in alijs affectionibus, excogitantibus videlicet a principio pru-
 dentioribus viris iuxta quandam artificialem cõiecturam modò hoc, modò aliud eorum, quæ opti-
 ma per experiẽtiã sunt iudicata. Quapropter & ego velut in alijs affectionibus, sic etiam in his
 optima ex eis quæ priores medici experientia cognouerunt, adscribam.

*Pharmaca ab Asclepiade ad Prædictas affectiones in Quarto Externorum
 prodita, quæ Marcelle inscribit.*

Epithema Podagricis, Arthriticis, sedans dolorem. Vsus est in ipsis vexationibus. Succĩ papaueris 3 iiii,
 croci 3 i, cum lacte bubulo aut caprino terito: & adiecto pane interno diligenter laeuigato, vt mol-
 le cataplasma fiat, & rosaceo admoto mollito: ac vtitor leni cataplasmate, forinsecus betę aut lactu-
 cę foliis, custodiendi eius gratia, impositis. Quandoque opium & crocum cum lacte trita cerato
 rosaceo excipimus, & linteolo infarta imponimus. Aliud. Styracis 3 ii, opii 3 i: confice ac vtire
 vt dictum est. Aliud, confestim a dolore liberat, Verum ante pharmaci impositionem ægrum lauare oportet,
 et tunc deterfis locis imponere. Succĩ ablinthii pōtici, croci, opii, singulorũ drach. i, cerę pōticę 3 iiii,
 vnguenti

A vnguētī irīnī drach. vi, vīnī cretīcī quātum sufficit: & leuīgata liquidis excipe, & linteolo infarta impone. *Aliud.* Seminīs cicutæ dempro cortice expolitī drach. vi, croci drach. i, {styracis drach. i,} opij drach. i, passi cretīcī quod satis est: trita excipe rosaceo cerato. *Epithema Podagricorum, Arthriticorum, facit ad Maximas affectiones. Vſus est eo Erasistratus Scymus.* Radicis capparis tufæ & cribratæ chœnicem vnum, seminīs hyoscyamī chœnicem dimidiū, radicis chamæleonis nigri chœnicis quartam partem, seminīs cicutæ chœnicis quartam partem, radicis mandragoræ chœnicem i: radicis solanī, aut vt alij doricnī, chœnicis quartam partem: omnia tufa & cribrata multa in vasculum figulinum reponito, & probè obturata seruatō. Vſus verò tempore chœnicis quartā partem inde accipito, & passo tritam in vas ficile non picatum conijcito: & addita facis vīnī aridæ quarta hemina parte, ad prunas polita diligenter mouendo coquito, donec bis aut ter effervant: deinde ab igne ablata quam calidissima imponito, aut quomodo perferre agri possunt. Verum ante huius cataplasmati vſum pedes multa aqua frigida perfundere oportet, & spongijs detergere, atq; ita pharvacum imponere. Supra verò cataplasma linteola tenuissima aceto imbuta imponantur, & fascia circumdata ad horas duas pharvacum incumbere sinatur. Postea verò eo ablato excitatas bullas acubus perforare oportet, ab iis enim humor mucosus multus ac glutinosus profluet: post cuius excretionem multa aqua frigida pedes proluantur, & rursus pharvacum, vt dictum est, imponatur, ita tamen vt pro aceto aqua potabili vtamur, & ex ea rigatum linteolū phar-

B maco superindemus. *Aliud eiusdem.* Hoc pro cucurbitis & hirudinibus utimur: nam serosos sanguinis humores exungit, facit & ad rofos ac Duritias, vt inde dissoluantur. Farinæ fœnigræci sextarium vnum, floris lapidis alii sextarium i: lomenti, fabæ nigrae molitæ, farinæ lupinorum, vtriusque sextarium i: omnia mista, & aqua calida subacta, calida imponito, & fascia constringito. Oportet autem prius affectos locos perfundere, aut etiam in folio lauare. Cū verò fasciæ circumdata madida ac cruenta factæ fuerint, pharvacum tollimus: & fotis locis pastillo ex amygdalis amaris utimur, & malagmate, quod crocum, iridem, & aristolochiam habet: hoc ipsum verò inter malagmata ad podagram descripta habetur. *Pastillus Podagricis, Arthriticis. Vſus eius est in ipsis irritationibus.* Aloes libram i, succi centaurij sexuncem, thuris non secti trientem, myrrhæ trientem, floris lapidis alii sextantem, opij sextantem, succi mandragoræ sextantem, aluminis scissi sextantem: excipe passo, & fac pastillos. Vſu experiente, lacte dissolutos cum pennis illine, & supra illitionem linteolum passo imbutum impone. *Alius Pastillus, Iuppiter appellatur.* Aloes drach. xij, opij drach. viij, succi papaueris drach. vi, succi hyoscyami drach. vi, aconiti drach. iij, hypocistidis drach. vj, glaucij drach. viij, croci & xij, gummi drach. xxiiij, malorum mandragoræ drach. xx, aceti heminas duas: malacum aceto coquito, & expressa prædictis admisceto: & ex dilutis ac probè leuigatis pastillos for-

* Aliter v.

C mato, eos q; in vmbra siccato. Vſus ostensus est. *Malagma Arthriticis, Podagricis, ex cicutæ & agarico accommodatum.* Seminīs cicutæ sextarium i, agartici sextarium i, fœnigræci sextarium i, nitri vnciam i, ceræ libram i, resinæ frictæ libram i, olei veteris libram i, medullæ ceruinæ trientem, illyricæ trientem: arida tufa per angustissimum cribrum concernito: liquecibilia verò eliquato, & frigefieri finito, & sic erasa aridis committito: & contulis ac repoliis vtitor. *Aliud eiusdem.* Ceræ lib. i, olei veteris aut sabini sextarium i, fœnigræci sextarium i, {seminīs} cicutæ sextarium dimidium, resinæ frictæ lib. i, nitri rubri dodrantem, floris lapidis alii semissem, medullæ ceruinæ trientem, illyricæ trientem: præpara vt dictum est. *Aliud Malagma eiusdem ex Tedis, Titi Celsus. Facit Podagricis, & Arthriticis. Emollit omnem Duritiā.* Visci quercini sesquilibram, thuris libram i, ceræ libram i, tedarum pinguium libram i, resinæ pinus lib. i: liquecibilia coquito, ac pinguibus tedis moueto: postq; verò omnis pinguitudo ab ipsis effluerit, ab igne ablatum liquorem excolato, atque huic thus tenuissime tritum inspergito, assidue q; moueto donec ad compagem manus non inquinantem redigatur: & in mortarium translata reponito, ac vtitor. *Aliud.* Tedarum pinguisimarum libram i, thuris masculi lib. i, resinæ pinus libram i, viscī quercini libram dimidiam: præpara, vt prædictum est. *Malagma ex Lapide Asio, Podagricis, Arthriticis valde præclarū. Liberat a tota*

D affectione. Vſus est in cessationibus. Visci quercini, terebinthinæ, vtriusq; lib. i: spumę nitri, floris lapidis alii, thuris, singulorum libram dimidiam: olei cyprini lib. i, adipis quantum satis est: arida tunduntur & cribrantur, ac cum aqua teruntur ad cerati liquidī spissitudinem: liquecibilia verò eliquantur, & tritis adiiciuntur: quibus simul cōquassatis ac repolitis vtimur. *Aliud.* Visci lib. vnā, terebinthinę lib. vnā: lapidis alii, nitri, vtriusq; trientem: manne quadrantem, cyprini sextantem, aque luxurię figulini, quod satis est. *Aliud ad Arthricos valde præclarum: auxiliatur confestim, humores in alto absorbens.* Visci libram i, terebinthinę libram i: adipis taurini, floris lapidis alii, vtriusq; quadrantem: {nitri quadrantem,} calcis viuę quadrantem, mannæ quadrantem, cyprini libram i: præpara vt dictum est. *Aliud Diodori.* {Calcis viuę drach. i: thuris terebinthinę, ammoniaci thymiamatis, ana drach. iij:} adipis taurini & viij, spumę nitri & iij, floris lapidis alii & iij, in alio exemplari & iij: olei cyath. ii: arida cum liquidis committito. Hoc pharvacum valde commodum est. Resorbet etiam collectiones circa articulos consistentes, & à doloribus liberat.



GALENI DE COMPOSITIONE MEDICAMENTORVM PER GENERA LIBRI SEPTEM

Ioanne Andernaco Interprete

*Ad vetustissimorum Græcorum codicum fidem diligenter aliàs ab Augustino Gadaldino
recogniti, & nunc etiam ab eodem aliquibus in locis emendati.*

ARGVMENTVM LIBRI

Agit de Ratione & Vsu Componendorum Medicamentorum: ac recenset Emplastra
quædam, maximè verò candida, quæ cum ad Alia tum ad Cicatricem
inducendam accommodata sunt.

*Quid in Duobus Galeni Libris de Compositione medicamentorum per genera, qui
Romæ una cum alijs incendio conflagrarunt, contineretur.*

CAP. 1.



Crispissimus & iam antea commentarium, cuius priores duo libri in pu-
blicum sanè prodierant: sed cum alijs in apotheca, quæ ad viam sacram G
est, relicti interciderent, quando Pacis delubrum totum, & ingentes pa-
la:ij bibliothecæ incendio conflagrarunt. Tunc enim & aliorum com-
plurium, & mei libri, qui in apotheca illa erant sepositi, interierunt, id quod
cum amicorum nullus, qui Romæ degebant, priorum duorum exem-
plaria habere se fateretur. Efflagitantibus itaque familiaribus, ut idem
opus denuò scriberem, operæpretium mihi visum est prius auditorum
mentionem facere, ne si quis antea in illos inciderit, causam quæreret,
cur bis de eisdem rebus tractauerim. In illis igitur à primis libri exor-
dio disputationem in eos direximus, qui sophistarum modo, compositorum medicaminum pol-
licita seu professionem, quantum licuit, abrogare, non nulla quod simplicium calumnijs deprimere,
conabantur: dicterijs eos pariter incessentes qui scriptum de illis reliquerunt, alia iecur, alia lienem,
alia renes, vel vesicam, vel caput, vel pulmones iuuare. Vtrum enim (aiunt) præses quidam eis im-
perat, quemadmodum in Tragœdia,

Abi quidem tu flumina ipsa ad Inachin,

Thebas at age tu pergito cadmeias.

Sic in his tu quidè ad hepatis portas, tu verò ad vesicam, vel renes duos, proficiscere? An quod in vè-
triculum ingestum est, iecur quidem excipit, inde verò per vniuersas corporis partes deferit? At
hoc scomma eos, qui hæc cauillantur, tam esse medicamentorum facultatis imperitos arguit, ut à
marino lepore pulmonem exulcerari solum ex omnibus corporis particulis ignorent, vesicam
solam à cantharidibus: ab alijs renum lapides conteri: ab alijs rursus ex pulmone atque thorace faci-
les fieri excreationes: quemadmodum ab alijs alia in vna quadam particula peculiariter perfici.
Atqui variè hunc sermonem in primo cōmentariorum iam antea nobis (ut dixi) conscriptorum
libro, sicut rursus in secundo alterum, sumus executi, quod alij quidā putarent in compositione sim-
plicium medicamentorum contrarias inter se potestates omnino corrumpi. Etenim si aqua (in-
quiunt) feruentissimam cum frigidissima temperaueris, neutra illarum, qualis prius extitit, pma-
net, sed tertia quædam ab utraque diuersa generabitur. At hinc quoque vanam ipsorum nugacitatem
ostendimus, qui ignorent ex ijs, quæ corpori admouentur, non nulla pro innatis facultatibus, alia
pro acquisitis qualitatibus, functionem obire. Quis.n. cicutam aut papauer refrigerandi vim ha-
bere dubitat? quin tu si recalfacta ea vehementer, animalis corpori offeras, non secus ac caute-
rium, vlcus concitabunt. Quemadmodum rursus, vbi sinapi in frigido aere cum aqua tritum, fri-
gidissimo

H

Agidissimo hyemis tempore,repente corpori raro ac imbecilli applices, horrebit nihilo minus, q̃ si niue aut crytallo ipsum cōtigisses. Sed si id ipsum sinapi longiore temporis spatio corpori nostro admotum fuerit, principio sanè exigui caloris sensum præbebit, dein maioris, postea tamen refrigerationem, vt siuporem corporibus quālibet acuto sensu antea præditis inferant. Cum igitur id genus omnia in cōmentarijs, qui vndecim numero sunt, de simplicium medicamentorum facultate definiuerimus, iam ad ipsam disciplinam vtilem descendemus, in qua exercitatus, etiā si facultatum, quas polypharmacos græci nominant, scriptiones minus attuleris, non desiderabis cōmoda cuiusq; morbi auxilia, modò simplicium pharmacorum, vt diximus, materiæ non sis imperitus. Ceterum hic liber obiter ostendit & Empiricorum medicorum cōtentionem, qui ad insomniam, fortunam, & casum seu incidentiā, (græce periptosim) medicamenta cōposita propè vniuersa referunt, si paucissima quædā excipias, quæ cōi omnium hoīum rōne, quā epilogisimum ipsi vocant, inuenisse se dicunt. Quemadmodum, vbi eiusdē facultatis pharmaca inuicē miscuerimus, quæ alia in alio corpore melius aut peius functionē suā obijisse vsu ac experimentis didicimus, rōni cōsonum certè nobis esse videtur (Empiricorum aliqui dicunt, non.n.oēs) componere plura

Bhuiusmodi, vt vel vnum ex eis corporis curandī naturæ idoneū inueniatur: Quod in hoc vtiq; recentissimo pharmaco, cui nomen inditum est Cephalicum, quasi capitale dixeris, accidisse ferūt, mistis in eo omnibus ijs, quæ vel per se vlcera carne implere cognoscuntur. Sed qua ratione ærugo cerato simplici mista medicamen farcoticum i. ad gignēdam carnem idoneum faciat, cum neutrum ex illis nutriendæ carnis vim habeat, non item exponunt: siquidem ærugo vlcera carnē erodit, vtpote acre & calidum medicamentum: ceratum mite quidem est, nec mordax, verūm no uæ carnis loco sordes parit vlceribus. Nos verò diximus in tertio methodi medendi libro, quomodo videlicet tum hoc, tum alia quæ ex contrarijs eodem pacto constant, inuicem commisceantur: dicitur nunc quoq; particularis exercitatio, morbi cuiusq; appposito exemplo.

Quæ Præscire conueniat eum, qui Medicamenta probè compositorus sit. CAP. 2.

Expositum est alibi, simplicium medicamentorū vires, non solum cuiusq; generatim noscendas esse, vt quidam scripserūt, dicētes ea vel calefacere, vel refrigerare, vel liccare, vel humectare: verūm distinctè, membratim q̃, & ex quo sint ordine singula, vt nos docuimus. Nā non nulla quidem medicamina obscurè prorsus vnumquodq; prædictorum efficiunt, quædam manifestò, aliqua validè, sicut alia absolutè. Non satis est ergo nouisse pharmacum hoc calefaciendū, aut refrigerandū, virtutem habere, sed quātam habeat, definire oportet. Calefaciunt igitur resinæ omnes, id q̃ sibi cōe habent, attamen maioris minoris q̃ rationem non exiguā in calore sortitæ sunt. Itē succi plures non mediocriter ratione ad maius minus q̃ facta differentes, excalfaciunt. Nam si panacis succum cyrenæo & medico conferas, videbitur tibi hic nihil ceu ad illos esse. At quorsum attinet sermonem ipsorum diuertere longius, cum eorum differentiæ, quibus in cibo vtimur quotidie, possimus meminisse? Anethum igitur, & ruta, cēpa q̃, omnia calefacientia, magno inter se variant discrimine. Quapropter in curationibus quoq; particulae admodū refrigeratæ, medicamē quod impensè calefaciat admouebimus: illi verò, quod paululū à naturali habitu recessit, modico calore præditum: sicut & insigniter refrigeratæ, vehementissimè calefaciens adhibebit. Merito igitur quatuor nos excalfacientium ordines statuimus, separātes è modicè calidis ea quæ euidenti eiusmodi qualitate præcellunt: tum quæ magna: tum quæ vehementi adeo, vt vrere videantur. In singulis aut illis quatuor ordinibus diuersis quædam esse velut incipientis differentiæ, non nulla delinētis, & ei, quæ post hanc existit, propinquæ, alia in medio constituta. Itaq; sunt ex ijs, quæ propter caloris vim exulcerāt: quemadmodum etiā ex illis, quæ {exedētia seu putrifica latine, } septica græce nominantur, alia simulat q̃ corpora contigerint, potestatem suā ostendunt: quædā

D duabus tribus ue, aut quatuor horis, opus habent: nō nulla diem totum, vel et post eum noctem, vel maius dein spatium, requirunt. Hæc iam vt in calefacientibus, ita quoq; in refrigerantibus, intelligere eum oportet, qui medicamen aliquod cōfecturus est: pari modo & in ijs, quæ humectāt exiccant q̃. Ceterum materiæ medicaminum quædā à plantis, quædam à metallis, non nulla ab animantibus, proueniunt: quas oēs in tractatu de simplicibus medicamentis definitè expressas didicistis. Nam cū familiaribus hic mihi sermo potissimū est, qui precibus me adegerunt, hæc nunc propter librorū interitum denuò perscribere. Iam verò vt simplicium medicaminū vniuersorum facultates ad amissim vobis cognoscendæ sunt, quò vbiuis corporibus curationē desiderantibus idonea ex ijs, quæ adsunt, facillè possitis remedia cōponere, ita etiam omnium præter naturam affectionum differentias tenere expedit: quas primum quidem libro de morborum, altero de symptomatum, differentijs: tertio post illos, in quo de caulis morbos efficientibus dissero: comprehensas habetis: ad hæc alijs tribus de symptomatum caulis: vno insuper meo de plenitudine, nec non de febrium differentia, commentario: postremò medendi methodo: in quibus affectiones actionem lædentes didicistis, item curationem harum primam esse (quæadmodum etiam præseruationem) causarum eas parientium. Docti pariter estis, primum curationis scopum à morbolis dispositionibus suggeri: ac cum his vnā patientis particula naturam indicari. Præterea aeris nos ambientis

Quinta Classis.

dddd ij temperamentū,

+ Cod. impres-
si græci habet
et vnum q̃
sa/ hēta to
sa/ hēta c.
Manuscripti,
et hēta to
sa/ hēta
hēta to
sa/ hēta c.
si calida adhi-
bita, imoratis
fuerint, tūc,
c.

temperamentum, constitutionem, aetatem, tempus, locum, vitæ propositum, & *ἑθν.* consuetudines, plures egregij medici inspicunt: de quibus, ubi eorum usus fuerit, aliqua simul & hic nobis dicent. Hæc itaq; in memoria vos omnia sic exprompta habere expedit, si quouis loco medicamentorum, tum simplicium, tum compositorum, copiam habere desideratis. Insuper q; ab vno interim aliquo sponte nato medicamine ac simplici morbus curari possit, interim verò compositi usus requiratur: ac quamobrem id agamus, rationem deinceps explicabimus.

Quis Compositorum Medicaminum Vsus.

CAP. 3.

Si solis simplicibus medicamentis vniuersos præter naturam affectus curare liceret, nullus vtiq; cōpositi vnq; usus foret: at hoc nunc ita comparatum non est, nam sæpe cum corpus aliquatenus calefacere volumus, simplex nullum, quod præstare id queat, habemus: medicamentum enim curans, affectioni cui adhibetur, proportionem nimirum respondere oportet. Ergo si dispositio sit frigida, quatuor numeris à naturali recedens, curaturum ipsam pharmacum totidē gradibus mediocri symmetrō ue calidius esse oportere oibus est manifestū. Porro cum interim tale simplex nullū adiit, si duo habeamus, quorū hoc numeris quicq; illud tribus calidius sit, ea si miscuerimus, medium efficiemus, quatuor numeris symmetron exuperans. Iam quædā simplicia citra alterius misturam ne in usu quidem esse possunt, veluti cum emplastrū pharmacon apponere cuiuspiam volumus, quippe simplex nullum ad talem usum idoneum est. Ergo neq; bitumē, neq; cera, neq; resina, sicut neq; pix, neq; propolis, ac ladanum, multo minus ærugo, & cerussa, vel spuma argenti, F' vel molybdæna, vel aliud quodpiam metallicum medicamen, simili modo nec herbae solæ, emplastron pharmacum efficere possunt. Quare primi emplastrorum authores non temere ex oleo quoque metallica coquere excogitarunt, quæ liquefieri possint, liquefacere, ac siccas herbas contusas cribratas q; eis adijcere. Rursus in alijs affectibus vnum medicamentum solum ex ijs, quæ suapte natura proueniunt, vsurpamus. Cui tñ non nulla adijcimus, aliquñ virium ipsius vehementiæ obtundendæ, interim insuauitatis mitigandæ gratia, quemadmodum Hippocrates in libro de victus rōne in morbis acutis hisce verbis inquit: Si sub transuerso septo dolor sit, ad clauiculam verò signum non fecerit, emolliendus est venter vel nigro veratro, vel peplio: veratro quidem daucum, vel seseli, vel cuminum, vel anisum, vel aliud quid odoriferum miscendo: peplio autem silphij succum. Hac dictione manifestò Hippocrates usum quidem pharmaci purgantis esse ostēdit, sed insuauitatem eius in potu, moram q; in ventriculo, condimentum requirere: multa si quidē, quæ bibuntur pharmaca, tam sunt assumentibus insuauia, vt stomachum subuertant, vomitum q; protinus cieant: quædam licet paululum in ventriculo manere possint, postea tñ euomantur, cū prauas eructationes mouerint. Quemadmodum vero purgantium ceu condimenta sunt eiusmodi medicamina, quorum Hippocrates meminit, ita dolorem leuatiūm quæ anodyna appellantur Græcis, G alia vehementiam mitigant, vt cum papaueris succum, vel hyoscyami semen, præbemus, vel mandragoræ radicis corticem. Quare & hic pharmacorum compositionis usus est: Maximus aut in morbis, qui contrarias simul facultates desiderant, verbi gratia repellendi & digerendi, vel detergendi ac læuigandi, vel incrassandi simul & attenuandi humores: ac veluti plurimi usus medicamenta (Græci polychrestota vocant) & optima, diuersas in se potestates, vt indicabimus, continent. Verū is quoq; medicamentorum cōpositionis usus est, cū vnum aliquod illorū ad multas venenatas feras, vel exitialia pharmaca, efficax habere volumus, qui usus etiam theriacam, vt vocant, antidoton comparauit, item mithridation, alias q; multas. Sunt porro & aliæ quædam utilitates minores quidem prædictis, attamen quæ crebro nos ad medicaminum compositionem descendere cogunt, quas vniuersas hoc in opere docebimini. Nunc. n. ubi primum emplastrum medicaminis, & ad plura utilissimi à me confecti mentionem fecero, iam institutum aggrediar.

De Emplastro pharmaco Dia Chalciteos, id est ex chalcitide confecto, quod

Phoenicinum appellatur.

CAP. 4.

Qua ratione composuerim emplastrum ex chalcitide, quod à palma quam phœnica Græci vocant, Phoenicinum appello, medicamen glutinandis vlceribus, cicatrice obducendis, H & phlegmonis curandis, accommodum (ubi liquefactum humidū cerati crassitudinem obtinet) animum exercete, tum permissis Empiricis suam ipsorum fateri incertitiam, tum relictis quoque Thessali sectatoribus, qui optima pharmaca à medicis inuenta contrarijs constare facultatibus ignorant. Exercete inquam ingenium, vt eisdem mecum vtentes methodis, medicamenta possitis conficere, ac sitis re ipsa persuasi vel ea, quæ à maioribus inuenta sunt, omnia ex ratione componi, nimirum quum Empiricorum incidentia nugatoria sit. Dicenda itaque iam est propositi medicamenti compositionis ratio. Oleum vetus & adeps, digerendi vim obtinent: chalcitis & palmæ succus, repellendi adstringendi que. Ex his igitur pharmacum composui, quo iam complures vt nouistis ideo, quod omnibus sui generis melius esse ex ipsis operibus comprobatum sit. Etenim ratio compositionem inuenit, experientia de inuentorum virtute decernit, vt etiam rationalium methodorum imperitis artificiose confecta fidem faciant. Porro cum modo dictis medicamentis argenti spumam miscui, quæ nihil magni adeo momenti adferre potest, neque repellentibus quod influit, neque digerentibus quod iam particulis phlegmone laborantibus

A tibus infixum est: quippe siccandi virtutem habet, sed non validam. Quare ipsam ceu aptum medicamen in emplastri cōpositionem adiunxi: nam cum prædictis incoquitur, donec substantiam quæ non polluat, consequatur. Adipem verò insulsum, & quàm maximè fieri licet, vetustissimū esse conuenit: tum oleum vetus similiter, quod cū suillo adipe propinquam virtutem habere quodammodo didicistis, licet adeps paulo maiorem emolliendi calefaciendi q̄ vim obtineat. Didicistis quoq; vetustate ipsa tenuiorum partium fieri, & digerere promptius: eo q̄ phlegmonis, quæ magnum dolorem inferunt, magis blanda ac mitia esse ipsa recentia: ijs verò, quæ tales non sunt, cōmodiora vetusta. Et quo phlegmone diuturnior, & contumacior, hoc magis vetera profunt, ac sola curare valent: modò præterea nihil afflictæ parti influat. Quod si quidquam influat, mistā esse medicamenti quoq; virtutem oportet, cuiusmodi habet à me compositum pharmacum. Itaq; propterea chalcitidem & palmam digerentibus admiscui, non ignarus paucas omnino phlegmonas diuturnas existere, quibus nihil influat, nā ob humores in eas confluentes diutina esse solent. Dum autē hæc incipiunt & accrescunt, adstringentium refrigerantium q̄ medicaminum virtus præpollere debet: ideo q̄ hoc emplaston pharmacū adusq; humidi cerati spissitudinem liquefactum multis admodū vtile reddi, interim vino adiecto, vel aceto, vel aqua illiquefescens: non nunquā ex oleo immaturo, vel alio quopiam adstringente, quale est hispanū, & histricū: vel ex dulci aliquo astringentis experte, vel et vetusto. Ego quoq; sæpe myrteo & melino, vbi validius adstringere res postulabat, medicamentum liquefeci. Hæc igitur cōpositio medicaminis tali symmetria conficitur: Vetusti adipis, quem institores axungiam appellant, sint pondo duo, olei veteris pondo tria, argenti spumæ tantundem, chalcitidis pondo vnciæ quatuor. Hæc autem ita coquere oportet. Adipis membranulæ oēs eximuntur, reliquum contundi, vt liquari facile possit: mox ad ignem liquefit: deinde per colum destillat, vt purū fiat, nihil q̄ mēbranæ habeat, pondo duo prædicta pēdens: postea chalcitidis laeuigatæ pondo triens cum olei tribus libris adipi miscetur: his & argenti spumæ pondo tria adiiciunt: ac oīa vbi simul in mortario coierint, coniiciuntur in cacabum, ac rudicula palmæ mouentur. Sufficiet autē tibi ramus vnus maiusculus, vt solida ligni parte mouendo vtaris in modum spathæ dictæ: vocant. n. sic id, quo confecturas mouet, & nos perspicuitatis gratia similiter nominabimus. Quod autē solide ramī partī continuum est, in orbem purgato, ac tenellos ramusculos vtrinq; procedentes cōtusos decide, sed cortice prius exuto, vt segmenta iniecta pharmacum succo suo imbuant inficiant q̄. Igitur statim ab initio spatha vtendum est, sed tenuia palmæ segmenta iniicere oportet, vbi medicamentum cerato similem consistentiā habuerit.

C Nam si à principio ea immittas, succus iniectionū, quem manere volumus, ex decoctione cōsumetur. Insuper spathæ, qua medicamentum initio mouetur, pars in cacabo intincta postq̄ inaruerit, vt propriū succum non amplius seruet, amputatam reiice, reliqua vtere. Hæc rursus, cū medicamento intincta siccata fuerit, simili modo absecato. Constare autē vobis arbitror, q̄ palmæ rami nō multis diebus antè abscisum arbore esse oportet, quippe tēporis interuallo arefcit, & succum amittit. Pridie igitur per hyemem auferatur: æstate, vel eodē ipso die, quo cocturus es pharmacū. Vbi autē sic coctum spissitudinem, vt non inquinet, acquisierit medicamen, ipso vteris emplastro ad vlcerā, quæ cicatricem ægrè ducunt, dysepoluta græcè vocantur: ad cruenta valet oleo liquefactum: benefacit phlegmonis, podagris, articulorum morbis, bubonibus, phymatis, ambustis, perionibus, fracturis ossium, contusionibus, omnibus deniq; affectibus, quos appellant rheumaticos. Iam verò & multi qui hernias absecant, post manus operam statim ipsum cum irrigationibus & cataplasmatibus preparatum imponunt. Si verò chalcitidis vnciæ sex immitatur, quæ est selibra, medicamen ad magna vulnera glutinanda promptius, atq; ad ea quæ cicatricem egrè ducunt, efficacius fiet. Sunt quidem in hoc etiam alia eiusdem potentia medicamenta, ipsi tñ cū oleo liquefacto magis q̄ alijs omnibus, in rheumaticis affectionibus fidēdum est. Cū igitur plurima eiusmodi Romæ existerent, nullū tam celebre probatum q̄ fuit. Cōducit, vt dixi, & podagricis, & articulorum vitio laborantibus quolibet tempore, cū dolores intēli non sunt, qui perfusiones et cataplasmata lenientia postulent. Incipientibus igitur atq; augescētib; etiamnum id genus vitij, liquefactum pharmacū refrigerari finito, id q̄ spathomela deradens pilæ iniicito, cui vinum superfundito, quod vt recipiat, manibus ad pilam subigito: erit autē vinum austerius, ætate quidē mediū, substantia non crassum, sed quā maximè fieri potest, dilucidius: nam huiusmodi, vtpotē substantiæ tenuioris in altū corpus penetrat. Tāisper autē liquefacto medicamini ipsum infundito, manibus conterens, dū excipiat, misceatur q̄, nec humidū adnatet, quod cōtrito ac emollito pharmaco mistū non sit. Ad hæc etiā si nō prius refrigeratū medicamentū deraferis, liquefacto & adhuc calido vinum superfusum permiscere licet. Itaq; in phlegmonon principiis vim repulsoriam validiorē esse oportet: In incremētis verò hæc non nihil imminuenda, quæ digerit virtus augenda est: Cū autē in statum propriū, seu vigorem phlegmones tumor perucnerit, pares inuicem esse potestates conuenit repellendi & digerendi, nisi quis vehemens dolor pharmacum leniens requirat. Ceterū inclinante phlegmone digerendi vim augebitis, vt prorsus nihil vini eo tempore misceatis. Præterea dum id liquefcit, vbi astringentioriam qualitatem satis excellere volumus, hispanum oleum, vel histricū, vel quod omphacinū seu omotribes (latine immaturum seu crudū

Quinta Classis.

dddd iij appellant)

* ἀποπίλας
est in impres-
sis i. abiectos,
interpres autē
videtur legisse
ἀποπίλας.

appellant) iniiciendum est. Vbi æquales vtrāq; facultates habere cupias, oleo dulci nec recenti E nec vetusto liquandum est. Si vt digerat expetis, vetus oleū, vel cicinum, cōmodē sumitur. Emplasti aut medicaminis in liquefendo huiusmodi fiat symmetria: Oleum paulo copiosius quā medicamentū esto, magis q; estate, videlicet vt libram vnā absoluat: medicamēti verō decē vncias inieciſſe abundē ſuffecerit. Clarū est aut cuilibet hoc efficacius reddi emplastrum, quo plus medicamēti habuerit: tāto aut magis mitigare ac dolorē tollere, quāto liquidius fuerit ex rosaceo liquefactum. At cerati, quod inungi possit, cōsistentiā recipit, dum medicaminis pōdo in olei selibra liquatum fuerit. Tale verō phlegmonon inclinationibus ex vsu est. Item sedis, recti q; intestini tumores phlegmonodas sponte obortos omnibus melius iuuat. Ipsum aut tunc liquefactū oportet cum oleo copiosiore, vt per cornu recti foraminis, cui vesica suis alligata sit, immittatur, velut in eiusmodi vsurpare consueuimus. Ad hæc frequenter ipsum in his ex rosaceo liquefecimus, caca bo vasi, in quo liqueſcit, prius subiecto, qui calidam cōtineat: prunis verō ardentibus incumbat, aut flāmæ fumo carenti. Iam verō pro superioris symmetriæ modo liquatū, vt liquidi cerati spissitudinē habeat, & pudēdi & podicis vlcera perſanat, immo & alia omnia vsq; ad vlceratos perniones, & ambuſta. Etenim vniuerſa statim inflāmatione liberat, pura q; reddit, & solida implet carne, præſertim vbi plus chalcitidis adiectum fuerit. Insuper nemo ignorat vinum quoq; medicamento id effectuſſimo admiscendū esse. Quod si acetū acceperit, ambuſtis optimē facit & statim, & postea, quolibet tēpore impositum, siue illa iam pustulas, siue non, habeant. Constat aut, si quis in aqua feruenti vsus fuerit, hunc ēt affectum, pyricauton id est ambuſtum igne, nominari. Porro si pharmacum antē imposueris quā phlegmone sit orta, nihil adeo ipsius generationem impedit prohibet q;. Quapropter, vt dictū est, nō nulli qui hernias secāt, statim eo vtunt, neq; prius vulnere madefacto. Ad hæc cōtusionibus, fracturis, & qualibuscunq; plagis, si liquidū imponitur, accommodatissimum est remedium. Ligamētis aut circundatum fasciarum instar quibus rupturæ deligantur, catagmaticas Græci vocant, œdemata oīa & inflations mirificē iuuat. Cū malo succo corpus abundat, vel admodum sentiens est, quā primū contulis & percussis partibus illud impones, hyoscyamus recens adijcietur: qui si non est recens propter anni tempus aut locum, nihilo magis ipsum desiderabis, si adiungas eum qui per æstatem repositus est, qualis etiā singulis annis ex Creta vobis Romam apportatur. Hoc magis adhuc dolori sedādo opportunum, id est anody non medicamen, succus mandragoræ mistus efficiet: non aut vos latet & hunc à Creta optimum fictilibus poculis afferri: cuius vnciā vnā, libræ olei emplastri liquefacti miscere sufficit: atq; interim amplius, interim minus impones, prout dispositio postulat. Conducit aut in eiusmodi corporibus & pharmacū ex rosaceo liquefactum esse. Caterū ex casu contulis partibus, vel ligno ac lapide percussis, et si ecchymosis quādam contigerit, protinus ab initio medicamen liquatum imponi oportet, vino, vt docui, misto. Quod vinū die tertio, aut certē quarto, si particula inflammatione careat, auferri oportet, oleo aut veteri emplastrū liquare: nam si plus adstringātur ecchymomata, vix queant per halitum digeri. Hoc medicamento etiam vtor aduersus eryſipelata, præfertim phlegmonode, & adhuc longē magis ad phlegmonas eryſipelatodes. Principio igitur impono ipsum liquatum ex rosaceo, quod oleo omoribe id est crudo, & salis experte constat: tale. n. eryſipelatis est accommodatissimum. Ita iam liquefacto solani succus in mortario misceatur, qui totus per totum accuratē subigatur excipiat q;: qui si non adest, psyllij: si æstas fuerit, etiā omphacis i. vūæ acerbæ, cū portulacæ vel sempiuui succo. Etenim vūæ acerbæ liquor per se plus q; oportet adstringit: tanta aut adstricō eryſipelata promouet, vt quæ calorē ipsorū cutē densando includat. Rursus portulacæ succus, neq; is solus præ lentore potest exprimi. Optimum igitur est qui ex vūa acerbâ prius tunſa exprimitur, portulacæ in pila committere, & sic iterum contundere: deinde vbi ex ambobus mistum exactē vnitū fuerit, liquorem elicere. Simili modo etiam sempiuui succū exprimes: nam seorsum neq; ex hoc, quemadmodū neq; ex cotyledone, succum copiosum exprimere quisq; potest. At mandragoræ pomorum maturitate vigentium succus recens adiectus magis aptum medicamen efficiet: quem si tempus non admittat, illius quæ à Creta, vel alio quopiam loco aduehatur, miscere non dubitabis. Quin & hyoscyami succum miscere ei consueuimus, iterum meconiū, ita aut nominatur papaueris succus. Satiū est vnā cū hoc & glaucij quippiam superindere. At his multo imbecillior, sed acquisitu facilis, lactuca succus est, tum agrestis, tum hortensis, quam vniuerſi Græci huius tempestatis non thrīdacinen, sed thrīdaca, nominant, agrestem solam thrīdacinen appellant. His rursus sereos, polygoni, trifolij, & auriculæ muris, succi minus ad refrigerandū efficaces sunt, quanq; & ipsi refrigerant: sed his euidentius lēticula palustribus locis proueniens. Horum omnium penuriā, miscebis acetum & aquā. Porro medicamenta hæc vniuerſa ascititias qualitates frigidas habeant, valis videlicet aquæ admodum frigidæ, aut niui insistentibus. Atqui ipsum quoq; Phœnicinum medicamentum simili modo refrigeratum eryſipelatis admoueatur, donec vehemens ipsorum ardor subsidat. Liqueſcit aut subinde ea, quæ aduentitia qualitate frigida eryſipelatosis affectibus succurrunt, immutanda esse, maxime vbi exactum eryſipelas citra phlegmonē fuerit. Posteaquā verō vehemens ille ardor quieuerit, aut nec perfectum planē eryſipelas affligerit, sed vel eryſipelatodes phlegmone, vel phlegmonodes

A nodes erysipelas, non adhuc externum frigus admolieretur, verum à succis etiam impense frigidis abstinemus, eos medicamini liquefacto miscentes, qui mediocriter refrigerant. Atque ab his iam & lini seminis & chamæmeli succū misceamus, ipsoque solo postea medicamine liquato utemur, nihil aliud præterea immittentes. At si quā liuidum ex frigefacientium vi erysipelas euaserit, tale non amplius erysipelas appellandum est, sed tunc abstinere non à vini mistura modo, sed rosacei quoque & adstringentium oleorum, oportet: nam solum Phœnicinum veteri oleo liquefactū, quod liuorē contraxit, per halitum discutere potest: & tunc affectæ partes aqua calida fouentur, & scarificantur. Vobis si fuerit visum hoc interdū facere, protinus Phœnicini liquefacti humidum medicamen, cui vinum adiectum sit, imponere conuenit, altero die vinum auferendū. Quod si iā plus impendiō erysipelas refrigeratū ab immodicē refrigerantibus medicis acceperimus, ut iam quoque nigricet, perfusione & scarificatione magis utemur, atque citra hæc calcis viuæ quippiam liquido pharmaco immittemus: Si verò laborantes teneri sunt, lotam ipsam usurpabimus. Tunc prodest et succus coriandri pharmaco inditus, qui sanè & cum cerato rosaceo iuuat non mediocriter. Ad hæc sanè similesque affectus alia pleraque medicamenta sequenti sermone dicentur, quædā parī virtute cū Phœnicino, non nulla et efficaciore prædita. Aduersus aut rheumatū i. fluxionum vitia,

B omnium optimum hoc medicamentum est, ac spe maiora frequenter præstitit. Cum itaque femur aliquando prope inguen cruda phlegmone totū id affligente suppurasset, crus ita nobis figurabatur, ut sanies ad inguen conflueret. Facto aut vlcere, dū hoc longiore intervallo cōtingeret, fluxio quæ in femur decubuerat, euacuata est: sed fistulosa quædā dispositio sub femoris totius cute orta est, ut ipsam, iuxta patellā, quæ genu pars epigonatis Græcis dicitur, diuidere cogitarem, quod saniei vtrinque liber esset exitus, medicamentis aut liquidis inditis largius pertranseundi via promptior. Vbi autem femur soluissem postero die, quo incidere ipsum decreueram, inuenta sunt omnia collapso, arida, madorisque expertia. Nemo igitur non nouit, quod rationi consentaneū erat & postero die, & sequentibus similiter, uti pharmaco, quāquidē particula quotidie coloratior ac oīno sanior quā esset reddebatur. Curato itaque hoc modo adolescente, postea multas rheumaticas affectiones hoc medicamine sanauit, quæ quidem osculum simplex haberent, sed ut glutinari non posset, & fistulosum intus esset. Non est autem ab ipsius pharmaci usu desistendum, etiam si multis diebus euidens nullum præsidium afferre videatur, ut quod postea vno interim die simul vniuersam vtilitatē maximā ostēdat. Quare bono animo hoc semper in rheumaticis affectionibus utamini, in teneræ quidē carnis homine, vel puero aliquo, vel muliere, post prædictam symmetriam

C quatuor vncias chalcitidis immittentes: in valido ac duro corpore, ex proportionē, vel vnciā vnā vel duas apponentes, ut quinque vel sex chalcitidis vnciæ sint, tres libræ vtriusque, nēpe olei veteris & argenti spumæ, duæ vetusti adipis, quæ insitiores axungiam appellare diximus. Illuatur autē in rheumatum vitij oleo dulci nec nouo nec veteri, assumatque vinū austerū ætatis mediæ. Hoc pharmacū coarguit Thessali nugacitatē, efficacissimū auxiliū ex contrarijs potentijs compositum ostendens, quarum si alterā adimas, nihil faciet prædictorum. Nam neque ex adstringentibus solū sine laxantibus ad rheumaticos affectus præclarū quidquid perficiet, vel certē ad phlegmonas incipientes & augescentes, neque enim leniendū vim obtinebit: neque ex solis relaxantibus discussorium, sine adstrictione cōfectū, quæ indurata habent emollire. Porro laxabit perfectē, & mediocriter emolliet, si nō admodum vetus oleū & adipem receperit. Quod itaque Mnaseus pharmacū condidit, æqualia inuicē continet tum oleū, tum argenti spumam, tum adipē, sed maximē phlegmonis incipientibus incrementibusque est contrariū. Habet & nostrū videlicet hoc pharmacū eadem omnia, quæ Mnasei, & argenti spumā, & adipē, & oleum: verum si nihil ex ijs, quæ adstringunt acceperit, particulas effœminat, & robur earum dissoluit, ob quod et fluxioni fiunt obnoxia. Didicistis enim non semper ob calorem immodicū, ut quidā arbitrantur, corporis particulas fluxionibus laborare, sed hoc quidē ipsis rarō accidere: ab imbecillitate verō illarū id genus vitij progigni, quæ ut plurimū ex intēperie frigida proficiscitur. Itaque si humectet eas quicquam caletaciatque medicamentis laxantibus, dissolutæ prorsus & infirmæ fiunt. Rursus si tumores in rheumaticis affectionibus fortiter adstringat, initio quidē proficere videbitur, cæterum quod restat, cōtumax & scirrhosum faciet: nam magna ex parte tales affectus ne quidē ferunt nimis adstringentiū impositionē, ut qui illis & dolore & tensione molestantur. Atqui omnis dolor inflāmata exacuit, iritatque, & fluxionibus occasionem præbet, quāuis rheumatica intemperie eger nō afficiatur. Sed miri nihil est Thessalum medicæ artis operū inexpertum, & qui affectiones ratione inuenire nequeat, omnem phlegmonarum curationem ignorare. Vobis autem, qui crebrō tū phœnicini huius, tum aliorum medicamentorum quæ contrarijs constant virtutibus, euidentissima in multis morbis auxilia videritis, conandum est ipsis quoque, vbi iam cōposita interim deliderantur, eadem methodo ex illis, quæcunque regio præbet, conficere: cum phlegmonen suspicamini futuram, vel inceptisse modō, quæ magis adstringunt: in augmento ipso, quæ minus: in statu & inclinatione, quæ magis relaxant & digerunt. Semper tamen vtraque misceatur & repellendi & discutiendi facultas, nisi quando fluxio prorsus consuerit, & corpus vacuum fuerit, tunc ad digerentem, sicut in primis incurlibus ad repulsoariam virtutem, tuta est accessio.

Quoniam in emplastri mei Phœnicini confectura adipem vetustam & oleum digerendi potestatem habere dixi, chalcitidem verò & palmam cogendi repellendi quæ: hæc autem medicamen emplastrum sine argenti spuma procreare non possunt: ob id visum mihi est de ipsius spumæ argenti usu deinceps verba facere: si quidem phœnicini viribus nec eam obelle quidquam, nec conducere, sed materiæ ad emplastri pharmaci cõpositionem tantum idoneæ rationem obtinere putandum est. Non absurdum itaque mihi apparet, si de eiusmodi medicamento exempli gratia de spuma argenti disputationem instituero. Sunt non pauca quæ potestatem aut nullam aut exiguam admodum pharmaco, quod præparatur, simulasserunt, commoditatem verò materiæ præbent, ut vel emplastri, vel cerati, speciem referat. Neque enim argenti spuma manifestò calida est, sicut nec frigida, nec humida, sed exiguam siccandi habet virtutem in primo abscessu ab ijs, quæ ad amissim media sunt inter humida & sicca. Non tantum vis eius est obstruere, sicut nec aperire, ite nec abstergere, quæ admodum nec inquinare euidenter: sed paulum à medijs ad crassius quodammodo recessit. Verum hoc quoque ex diuturna coctione deponit fusa per ignis potestatem, & alterata. Porro sola per se cruda femorum attritus ex itinere iuuat, quo etiam parum exiccare cognoscitur. At neque acrem vel dulcem, neque acidam vel amaram, vel austeram, vel acerbam, vel omnino adstringentem facultatem, ipsam habere gustus abundè testis est. Quemadmodum etiam vlcerum nec ab ea derodi, nec caleheri, nec refrigerari, nec purgari, nec carne impleri, nec cum caro supercreuerit, tolli percipimus. Licet itaque nobis in varium usum administrare argenti spumam, interim ex oleo & aqua coctionem eius ad usum emplastri spissitudinem molientibus, interdum ex oleo & aceto, aliquando ex oleo & vino. Porro in quibuscumque istorum coquatur, melius id medicamento redditur, quod magis coctum fuerit: quod liquidorum, quæ miscentur, copia continget. Est enim ex ijs pharmacis, quæ liquefieri possunt, etiam spuma argenti, dum tota funditur, sicut resina & cera, sed non statim ubi ignem contigerit: unde multis imponit, qui nullo modo ipsam fundi existimant. Igitur si cum oxelæo coquatur, liquefcit citius, perinde ac cum æruginè, quæ & ipsa fundi natura solet, uti chalcitis quoque & misy. Ipsorum itaque celerrimè chalcitis funditur, tardissimè argenti spuma: at in horum medio sunt erugo & misy. Funditur & fori, sed longiore temporis intervallo, ut quod terrestre magis & saxum sit quàm chalcitis & misy: sed de his iterum dicetur. Argenti autem spumam per oxelæum coquens ocyus liquefacies, per hydrelæum tardius, tantum funditur licet quoque, si duplum eius sit uterque humor. Ego certè plus etiam quàm duplum miscui frequenter, ut paulo potest exponam. Atqui melius est statim ab initio hæc tria in mortario miscere, argenti spumam, aquam, & oleum. Quod si candidum medicamen esse cures, oleum purius lucidius quàm inijcito, atque aquam similiter puram ac candidam: coquatur quæ in loco sub dño Soli exposito, quia nubilus aer pharmacum denigrat, syncerus magnum ad albedinem adiumentum adfert, sicut aqua etiam in huiusmodi aere aspersa. Ceterum obseruato, ne coctionem lignis aut carbonibus peruri incipientibus moliaris, nam fumus ei facile nigredinem conciliat. Perustis igitur antea carbonibus, cum exactè ardent, tunc coctionem auspicare: quod si illam per hos absolui non licuerit, in alio foco simili modo carbonibus præparatis cacabum superponito. Quæ ergo medicaminis candidi faciendi gratia obseruanda sunt, abundè satis indicatum est. Iam verò hoc fit glutinantius, quo plus, ut dictum est, liquoris affuerit: quemadmodum si singulorum trium pondo libram vnam inijcias, firmitus adhærebit. At si argenti spuma non illiquefcit, causa est potissimum, cur id facile decidat: sicut diutius adheret cum argenti spuma cocta funditur, alteratur quæ. Candidius sanè erit, citius quæ coquefc, libris duabus aquæ in tres vtriusque, puta, spumæ argenti & olei iniectis: atque hoc in paruis vlceribus uti consueuimus. Medicamento quod aqua coquitur potestas nota est, si meminerimus eorum, quæ in commentario de simplicibus medicamentis dicta sunt.

De Emplastro, quod ex Argenti spuma & Hydrelæo conficitur.

CAP. 6. H

Aqua peculiari substantia semper humectat & refrigerat: ascititio autem calore assumpto, donec ipsum perferuat, excalfacit: frigida facta, refrigerat. Oleum verò si recens sit, pharmaco non renititur, permanet enim humidum & modicè frigidum, quali maximè tenera corpora & vitiosis humoribus repleta indigent. Mulieres itaque & pueri, atque ex grandioribus mollem corporis habitum sortiti (sunt autem hi & candidi cute) eius generis medicamenta requirunt. Porro coctum ostendimus ex oleo copiosiore & aqua reddi tam glutinans, ut ne quidem à lotis decidat. Et verò etiam vlceribus, quæ ad cicatricem veniunt, multis diebus subsequentibus pharmacum immanere expedit, quod melius & citius ita cicatrix ducatur. Notum est huiusmodi pharmacum pruritus, desquamata, & ut vno verbo expediám, parua vlcerum perfanare, in quibus & subliquidum, ut vocant, ceratum, alia que id genus quædam vtiliora sunt ijs, quæ validam potestatem obtinēt, qualia magnis vulneribus imponimus. De quorum omnium vniuersali virtute in tertio libro de morbis curandis dictum est, in quo generales communesque sermones (vniuersales nuncupant) de quaque vlceris differentia tradidi, ostendens quales medicamentorum, quibus illa curabuntur, vires esse conueniat. Hic verò particulares materias recenseo, symmetrias miscendorum definiens: & modos, quibus si præparentur, reddantur optima, demonstrans. Ex hydrelæo itaque argenti

Argenti spuma, sicuti dictum est, preparata, emplastrum tactu blandissimum simul & adherendo pertinax efficit: preterea aspectu album, refrigeratorium vim habens mediocrem, cuius auxilio, exulceratis partibus ne quid influat, impedit, & qd iam influxit, denuo ad partes circumiacentes retrudit, ut res fiat huiusmodi, qualis cum spongiam aqua frigida humentem particulę cuiuspiam corporis imponimus. Nam illa rugosum contractumque totum locum facit, non tantum repellens quod influit, sed etiam quod in eo continetur, ad vicina elidens. Atq; emplastrum modo commemoratum non ex prima facultate, sed per accidens, exiccare dicitur. Nam proprie quidem & primario ea quę digerunt, & temperamenta ad sicciorum statum perducunt, nominantur siccantia: ex accidenti vero etiam ea, quę frigoris causa, id quod influit, propulsant, quod continetur expellunt. In summa nullum humectans vel primario, vel ex accidenti, vlceribus commodum est, ut in tertio Methodi medendi libro monstrauimus. De argenti spuma quę ex hydrelęo preparatur, etiam hæc sufficiunt.

De Emplastro, quod ex Argenti spuma & Oxelęo componitur.

CAP. 7.

Digrediendum modo est ad eam, quę oxelęo constat. Itaq; mediocriter exiccans medicamentum sit, si vtriusq; nempe olei & aceti duplo maior portio q̃ argenti spumę misceatur. At si **B** verus quoq; oleum sit, adhuc etiam magis exiccat. Copiosior vero q̃ duplum sit vtriusq; mensura, valentius facit pharmacum: quapropter fistulas quę non dum callum durum habent, curat. Ceterum spumę argenti vna pars iniicitur, illorum singulorum duę & semis. Quin et tripla vtriusq; parte non nunq̃ mista, toto die coxi medicamentum: unde quidem reddebatur nigrum, sed perinde ac bitumen probum splendebat. Porro maxima siccandi potentia hoc pollet, curat q; vlcera difficilia: & fistulas, quales dixi, iungit: vulnera cruenta glutinat: vno verbo, exiccat sine morfu: huius rei gratia etiam alia vniuersa vlcera sanat, maiora minora q̃, donec ad cicatricem perueniāt.

Æquum est & alia quędam eius opera commemorare, quę forsitan ne quidem speraueris, quantum ad materię humilitatem attinet. Nā cum quis in febre ex parotide suppurata iudicatus fuisset, parua relicta est fistula, quam post sex menses à principio in agro mihi ostenderunt: erat enim puer filius agricolę, annos natus circiter quindecim. Huic cum ex emplastro illo, quanta tunc mihi copia aderat, imponendum dedissem, ipse in urbem reuersus sum: ac pluribus negocijs medicis occupatus, oblitus sum eius qui pharmacum acceperat: sed post duos certē mēses in urbem venit incolumis, cum hoc ego euenturū, non admodū sperassem. Immittētib; enim nobis suillum pilū per fistulā, ad articuli cōmissuram vsq; procedere videbatur. Non multos post dies, cū alius puer fortē **C**te fortuna eiusdem cum priore etatis, eodem q; morbo laborans, mihi esset ostēsus, emplastrū hoc imposui, quo ille pariter integrę sanitati restitutus est. Ab eo tempore plurimos eodē vitio huius medicamenti virtute liberaui, tum pueros, tum adolescentes, tum mulieres. Igitur si vos quoque uti eo ad huiusmodi affectus volueritis, vetustissimum oleum, & acetum q̃ acerrimum ex vino vī delicet solo confectum, iniicitote, non ut quidam aqua mista ipsum præparant, sed purum sit q̃ maxime licet, ac pellucidum: tale siquidem tenuius commodius q; ijs erit, ad quę ipsum requirimus. Hoc pharmaco etiam musculos induratos subinde curauī.

De Emplastro, quod ex Argenti spuma et Oenelęo præparatur.

CAP. 8.

Reliquum est, ut de argenti spuma dicam, quę ex oenelęo componitur, & eandem prædictis symmetriam ac virtutis excessus pro humorum copia respondentes habet. Etenim æquali portione tria mista præparauī, & duplo maiori vtriusq; liquidi mensurę quā argenti spumę, dimidium insuper, ac interdum & triplum, addidi. Confeci autem non nunq̃ ipsum & hoc modo. Per æstatem Sole calido argenti spumam ex vino falerno conterebam singulis diebus quindecim continuis, vinum rursus, si forte primum euaporarat, infundens. Post dictos dies coctum medica-
Dmen, exiccans abunde factum est: quo in rheumaticis quoq; affectionibus perinde ac phœnicino, vsus sum, ex oleo liquefaciens, ut in illo prædictum est. Ac femur iam diu induratum, cruenta q; vulnera eo sanauimus, atq; ad omnia fuit optimum. Itaq; si Falernum ad manum nō habeas, aliud sumito colore fuluum, sed tenue substantia ut pelluceat, cuiusmodi est Ariusium, quod in Chio nascitur: & odorum vehementer Lesbium, in Mitylene paucum, in Eressō & Methymna copiosius melius q; proueniens: item, quod falerno simile est, Tmolite. Est & hoc tenuissimum, perlucidū, fuluum colore, dulce mediocriter, nimis quā odoratum: potes inueteratū hoc vsurpare ad quęcunq; & falerno vteris. Est porro & aliud vinum Tmolite huic tum colore, tum substantia simile, verum neq; dulce, neq; odoratum: habet autem vim quandam adstringendi, sed dulcedine multo inferius est. Hęc itaq; ex cocta spuma argenti fiunt medicamenta.

De Crude Spumę Argenti vsu.

CAP. 9.

Non cocta quidem, per se, ut annotauimus, attritus emēdat. Ex aceto autem seu vino trita siccata q; vlceribus medetur, quę ob humiditatem vix cicatricem recipiunt. Quod si mordacitatis expertem esse cupis, elora vtilior.

Quomodo Lauare oporteat Argenti spumam, & Reliqua metallica.

CAP. 10.

Facile aut eluitur, ut quę statim propter innatā grauitatē liquoribus, in quibus leuigat, substat:

dat: vnde totam mordacitatem in aqua lota exuit: acuti verò sensus corpora parum adeo mordacē E percipiunt, si ex aceto vel vino eluatur. Porro conuenit diligenter toto die contritam, cum liquore per noctem relinquere: postero die mane illum auferre, alium mox superfundere: postea rursus terere similiter, iterum q̄ sequenti aurora liquorem emittere. Quod faciendum est, donec simul cū humore argenti spumæ velut tenuissima quædam portio (achnen hanc Græci vocant) appareat: cum q̄ nihil amplius innatat, nihil ēt magis effundendum est. Attamen cōterere diebus pluribus, & si nihil ei insistat, id q̄ Sole feruenti, satius est: ita. n. accidit, vt medicamentum exiccet valētius.

Porro nouerunt omnes id æstate non solum in argenti spuma, verum in alijs etiā quæ hoc modo præparantur, fieri commodius. Siquidem cadmia, æris squama, æs vstum, ad hæc item quod vocatur diphryges, cerussa, misy, fori, stymmi, & oēs lapides, præterea calx, perinde vt argenti spuma, ex liquore aliquo prædicto eluuntur læuigantur q̄. Interdum ex marina præparationē ipsorum molior, de quibus in sermonis processu rursus agetur: nunc. n. propositū mihi est emplastra percensere, quæ Græci iuniores medici cum rho græca litera in vltima syllaba & scribunt, & enunciat. Quē admodum in Centrio & Melotride facere oēs consueuerunt: liquidem in his prima nominū positio videtur sine rho facta fuisse à verbo quidem centēn, quod est pungere, cēntrio nominato, vltima syllaba rho non habente: melōtride verò composita ex mela & ote i. specillo, & aure. At cum F hoc tempore propē oēs ea cū rho efferant, non peccaueris cum si simili modo, illis pronūcies, præsertim in centrio: quippe ostendimus in opere, quod contra illos, qui solæcismum committentes corripiunt, prodidimus, & ipsos Atticos viros valescentem vsum & cōsuetudinem secutos fuisse. Nam alij quoq̄ ante me indicauerunt Atticorum linguam permultum à proprietate sua decidisse: ac oēs, quorum eloquentiæ laus ac gloria maxima apud Græcos extat, suę quemq̄ tempestatis morem imitatos fuisse. Et nos itaq̄ cum omnes inueniamus iam medicamentarios libros emplastrī nomen cum rho scriptum habere, vsum prævalentem sequemur.

De Medicamentis, quæ ex Molybdæna conficiuntur.

CAP. 11.

Relatum à me est superius quoq̄ molybdænam & argenti spumam in eūdem ferē vsum adhiberi. Omnia enim quæ ex argenti spuma componuntur, etiam ex molybdæna fieri possunt: sed facultate inuicem differunt tantum, vt molybdæna substantiæ crassioris frigidioris q̄ sit: argenti spuma tenuioris, & inter calidam ac frigidam mediæ. Cæterum colores medicamentorum, quæ inde præparantur, molybdæna non nihil euariat, quatenus fusciore ipsos efficit. Quare & alborū emplastrorum, quæ non modo cerussam sed argenti spumam quoq̄ habent, nullum ex molybdæna constat: quippe ex huius mistura color albus cinereus redditur. Potestas autem in albo emplastro, quod ex hydrelæo componitur, melior etiam euadit, præcipuē in teneris corporibus, tantum abest vt pereat. Cum discutere quid volumus, argenti spuma q̄ molybdæna potior est. Pari modo & in reliquis medicaminibus cunctis, quæ ex argenti spuma compositionis titulum sortita sunt, cum molybdænam adiicimus, color & virtus tantum immutantur medicaminis, quantum paulo ante indicauimus.

De Emplastris Albis, quæ ex Argenti spuma & Cerussa fiunt.

CAP. 12.

Vel coloris causa medici cerussam argenti spumæ ad emplastra alba conficienda miscant: vel vt quandam adstringendi, ac refrigerandi vim, medicamento concilient. Videntes autem & huiusmodi nigrescere, cum largius coctū fuerit, præsertim lignis, & ijs quoque fortasse fumidis, nec in aere puro, mox ab igne tollere coguntur, ob quod ipsum nec aquam copiosam, nec oleum, miscere. Merito igitur resinam ei adiungere excogitarunt, quo sequax ac sibi continuum fiat, viscosum quid assumēs, maximē cum liquida resina immittitur. At ex tali mistura deterius ellicitur pharmacū, cū mordax quiddā resina representet: quod vero siccet, nihil admodum generosum, cuius vsum maxime vlcibus esse necessariū didicistis. Quædam itaq̄ vel insigniter mordaces sunt resinae, de quibus vniuersis iterum sermo futurus est. Minusimæ verò duæ inter eas sunt, prima terebinthina, larix altera nuncupatur. Has igitur miscere satius est, vbi id genus emplastrī conficere cogitas. At multo leniora tactu omnia sunt, tum quæ resina constant, si cerę quid adiectum sit: tum quæ ex cera, si resina non nihil admistum habeant. Quam ob rem cera quoq̄ resinae immittenda est: vt autem color emplastrī albus seruetur, albam ceram esse congruit. Est tanē alba, quæ suapte natura provenit, Pontica: sic enim nominari iam consueuit, licet aliunde veniat, quod plurima in Ponto alba nascatur, aliis in regionibus paucissima: ac candida quæ Tyrrenica nominata est, non sponte nascitur, quare nullam euidentem habet acrimoniam. Quæ verò suo instinctu proveniunt, non nullæ acres sunt, quas prius eluere oportet in hunc modum. Liqueantur primum ad ignem, deinde in aqua fontis pura demerguntur: vbi permouentur, expurgantur q̄. Simili ratione & pix & resina, & quod physema dicitur, lauandum est: de quibus iterum exactius commentabimur. In præsentia, quoniam albi emplastrī compositionem tradimus, reliquum eorum, quæ præcepta sunt, deinceps percensēbimus. Posteaquam ergo cerussæ, spumæ q̄ argenti, coctis prius, vsq̄ dum medicamen ad amissim non inficiat, cera simul cum resina fuerit adiecta, cādidum iam emplastrum si placet, habebitis: interim aquam iniicientes, interim oleum duntaxat: id quæ nunc recens, nunc vetus, Prius enim iam audiivistis, quam virtutem aqua, & oleum vetus habeat.

A habeat. Nouistis item quod omphacinum oleum, & id quod colitur in Iberia, quæ nunc Hispania dicitur, adstringens quippiam pharmaco adcit. Histricum non modo exiguam adstrictionem, sed amaritudinem quoque refert. Proinde different tamen ex adstringentibus confectura ab ijs, quæ dulci oleo constant, quanto initio vlcis & fini potiora sunt omnia, quæ non nihil adstringens continet: in medijs, dulcia. Nam in principio medicamenta repellentia profunt vlcibus, ne phlegmone corripi incipiant: inde quæ magis relaxent, si non phlegmone adsit, transpiratus gratia: quod si affuerit, etiam ob illam, ut citius dissoluatur. Enimvero clarum est de parua phlegmone verba fieri: siquidem exigua vlcera, in quibus albis hisce emplastris utimur, magna comitari phlegmone non potest, si error nullus accesserit. Caterum & vlcibus, quæ iam ad cicatricem veniunt, adstringendi qualitatem vtilem esse nullus ignorat. Tempus igitur iam postulat medicaminum, quæ emplastrum album vtilissimum constituunt, symmetriam exponere.

Pondus Emplastri.

Æqua sit portio vtriusque metallici, cerussæ & argenti spumæ: & hæc, si videatur, esto singulorum pondo libra, olei vero mensura amborum simul pondus absoluat: vel ut Romani dicunt, sint pondus librarum duarum, ceræ pondo selibra, terebinthinæ illius dimidium, hoc est pondo vnciarum tres. Quod si & thus admisceas, primum dolori mitigando aptum magis erit: tum parua vlcera, quæ phlegmone infestata, ocyus concoquet, sed ad cicatricem ducendam erit imbecillius: nam carnem supercrescentem promouet, quam thus carnem generat, ut in tertio quoque libro de morbis curandis legistis. Satius itaque est iniungere & aluminis paululum, tum ad cicatricem ducendam: tum alterius causa, quando quidem laxantia medicamenta plethoricis & vitioso succo abundantibus corporibus adhibita, affectis partibus fluxum concitant. Ex his autem omnibus compositum medicamentum tumores præter naturam in molli corpore, qui nec magni adeo nec dolorifici sunt, discutere poterit, præsertim cum thus abunde assumpserit. Erit itaque in prædictis copiosum thus, si æquale ipsi terebinthinæ pondus accipiat: sin eius dimidium, minorem digerendi vim medicamentum habebit: magis autem cicatrici ducendæ erit idoneum, quod duplo copiosius id receperit. Iam si plenius adhuc digerere cupiatis, etiam piperis albi paucillum adiicitote, quod vlcis cicatrici obducendæ nihil obesse potest. Sit igitur aluminis pondo vncia, piperis vero semuncia: ratio siquidem est, huius tres denarios, aluminis sex iniungere. Quoniam vero & aliàs præstat alumen quod scissile nominatur, & colore candidum est, id immittere expedit.

Album Emplastrum ex Pipere, ut Attalus Herasque composuerunt.

C. A. P. 13.

Ciuat senum vlcera, & eorum, qui mollem habent cuticulam: denique omne vlcus curat quod & humidius est, & non facile cicatricem admittit: ad hæc abrafa, quæ aposymata Græci vocant, ut cutis suspensa sit, interim nigrescens in cubito, tibiam, & genu, quibus neque caro, sed membrana sola os ambiens (periostros dicitur) subiecta est. Hisce igitur, ut omnia ordine recenscam, medicamenti compositio constat: Argenti spumæ, cerussæ, vtriusque pondo libra: olei duarum librarum mensura: nuncupatur enim à Romanis æquiuocè ponderalis, ut ita dicam, libra solidorum corporum, & mensuralis libra liquidorum, quæ copiosissima in tota vrbe ex materia cornea constat: præter hæc ceræ pondo selibra, terebinthinæ resine pondo vnciarum trium, thuris vel dimidio ipsius resinæ vel equali pondere, aluminis pondus denarium sex, piperis pondo denarium trium. Coctio manifesta est. Initio quidem metallica in Sole coquunt, dum plane non inficiat, vel est paulo durius fiat: immittuntur aut tunc cera & resina: dein cum omnia in vnum coierint, thus primum, mox alumen & piper addentur. Iniungere autem conuenit cerussam, quam vocant rhodiacam, si emplastrum candidum eximie fieri cupias. Quin etiam in ciuitate Dicearchia olim, nunc Puteolia vocant nonnulli, qui cerussam præparant, similem rhodiacæ albam facere consueuerunt. Porro quod in Sole conficiendum sit emplastrum, & aqua admiscenda, ut albius simul & magis refrigerans fiat, antea discussum est.

D At si maior ad cicatricem ducenda: commodius ipsum reddere, ab aqua in totum abstinere: olei autem veteris pondo vncias duas ac dimidiâ, immo et tres, immittito. Hoc medicamentum non ex eorum numero est, quæ à me primo authore composita sunt, sed iam annis multis ante à Rege nostro Pergamenorum Attalo, viro omnigenorum medicaminum studioso. Constat ratione prædicta. Et sane admirarer, siquid eiusdem speciei hoc ipso præstantius possit confici. Meminit eiusdem Heras quoque in medicamentorum libro, quæ non nulli Nartheca id est promptuarium medicamento rum inscribunt, alij Tonon dynamewon i. robur virium, censens oleum vetus attribuendum, ei quæ parum aquæ mensuram, vel dimidiâ, esse miscendâ. Caterum alia, quæ ad symmetriam spectant, ita habent ut à me scripta sunt, nisi quod ille heminas non libras, tum aquæ tum olei, posuerit, non indicans, quot vnciarum heminam siue ponderis, siue mensuræ, constituant: etenim ponderales vnciarum grauitatē corporum, mensurales molem, decernunt. Cum igitur pharmacum hoc senum vlcera & tenerorum curare dicit, verus est: cum vero omne vlcus sanare scribit, amplius quam par est, ei condonat & tribuit. Si quidem humidiora, eo quæ minus ad cicatricem venientia curat, cacoethes nullum, sicut nec vllum vulnus cruentum: ille autem & hæc omnia permittit. Attamen derafis ipsum mederi scribens, non falsus est: subinde. n. tam derafum os, ut cutis inde cum subiecta quadam carne dependeret, medicamento imposito cum ipsa coaluisse vidi: & quod hoc maius est, interdum iam nigricante: rursus aliud quam hoc etiam

etiam admirabilius, in cubiti gibbero, tibia, & genu, quibus nulla caro, sed os conuestiēs membra-
na, vel latus tendo solus subiectus est. Quare ad abraſa optimum hoc medicamentum habueritis:
ad linus & abſceſſus, nec omnium optimum, nec bonitate optimorum ſecundum: verum ad me-
diocres hos affectus in teneris, mulieribus, pueris, & ſenibus, commendatur. Quare & hic plus, q̃
oportebat Heras medicamento detulit: multo autem magis, cū laudaret ipſum, ſcribens ad mor-
ſus vniuerſos eſſe remedio. Cur enim ſermoni appoſitum eſſe vult vniuerſos? vtrum ſi etiam fera-
rum morſus fuerit, an hominum vniuerſorum tātum, dicit? atqui falſum eſt vtrunq; . In ſeris qui-
dem clarum eſt, quæ enim ab efficaciſ phar macis vix curantur, hæc nemo ab illo ſanari poſſe di-
xerit: q̃ ſi de hominibus dicat, & ſic oratio incerta indiſtincta q̃ eſt, adeo vt auditores magis offen-
dat, q̃ iuuat. Itaque perſuaſit aliquis cuidam medico, vt emplaſtrum hoc adoleſcenti in pancratio
digutum indicem morſo imponeret: qui inde tã male habuit, vt in periculo eſſet, ne pars tota mor-
ſa computreſceret oborta iam putredine: vix autem diuturna curatione glutinatus eſt. At cū non
in neruum, ſed carnem, læſionem acceperit, nihil mirum eſt huiusmodi medicamento ſaluū eua-
ſiſſe. Etenim hominum morſus alijs vlceribus admodū ſimiles ſunt, niſi qui momorderit, vitioſis
humoribus abundet, aut diutius à cibo abſtinuerit, aut ira correptus ſit, vt vniuerſum corpus & et
dentes bile madeāt: neq; in his tñ eiſmodi quicq; mentione dignum medicamen facere videbiſ. F
Atqui ei qui ſubito fuerit vſus, ſatis erit, ſi nihil incōmodi acceperit prius, q̃ phar macū aliquod ta-
libus curandis peculiariter dedicatum, morſæ particulæ impoſuerit: de quibus mox diſputabitur.
Nunc vero tantum dixiſſe ſufficiet in ijs, quos ſiue homo qualem diximus, ſiue ſimia, ſiue canis, ſi-
ue id genus animantium aliud, momorderit. *

*Attalici ſecundum Andromachum Albi narratio & compositio, quod minus
lædit à rabioſis morſos, & nervos vulnēratos.*

CAP. 14.

Alba, quæ oleo recenti & aqua citra piperis atq; thuris miſturā conficiuntur, commorſas par-
tes vehementer offendunt, licet animantis ſaliua quod momorderit, vel pauſillum adeo vi-
rus contineat: at minus illis omnibus Attalicum lædendi naturam obtinet, q̃ terebinthina, oleum
vetus, thus, & piper, adiecta ſint. Pari ēt modo in neruorum vulneribus reliqua alba magis nocēt,
ſed multo minor offeſa eſt ex hoc, quod quidem oleum vetus habet, aquam non itē. Inſuper hoc
magis eueniet, ſi tres vncias thuris integras, & non eius dimidium recipiat. Diſcūm ſiquidem mi-
hi eſt & antea, quod ſi & hoc pacto præparemus, in huiusmodi albis alumen phar maco male con-
gruere: nam opus eſt hic non adſtringentibus, ſed abunde extrahentibus, quæ in alto neruos pun-
ctos affligunt, et venenatam animalium ſaliuam. Heras hoc emplaſtrum ex rhodino, vel myrteo, G
vel myrrhino, dilutū, mederi & ambuſtis igne tradit: & ſi ēt hic longē inferius ſit phar macis, quæ
ambuſta commodè ſanant, de quibus ipſis quoq; rursus ſermonem inſtituemus. Præſtātiora enim
in his ſunt alia candida, quæ neq; thus, neq; reſinam habent. Quin & hæc non parum ab ijs ſupe-
rantur, quæ ambuſtis igne proprie auxilianē: quemadmodum a me compositum eadem ſanare di-
xi, ſi acetum adiungas: illud ſiquidem nullo non tpe commodum eſt. Quod autem ex pipere albū
conſtat, excoriatis aduſtionibus cū ad cicatricem perueniunt, vtile eſt: ante, per ſe nihil cōducit:
dilutū verò ex oleo myrteo prodeſt, non tamen æquali cum ijs medicamētis virtute, quæ ad am-
buſta igne proprie faciunt. Heras morſis ēt ipſum conuenire ſcribit. Sed hic quoq; diſtinctione
vtamur oportet, ſiquidem in duris & ad patiēdum difficilibus imbecillius eſt medicamentum: in
mediocribus, maxime in ſenibus, pueris, mulieribus, & vt breuiter dicam molli carne præditis,
abunde ſufficit. Inſuper variis aptum eſt, quemadmodum & hoc verè prodidit Heras. At de pu-
ſtulis quæ exanthemata Græcis dicuntur, indiſtinctè pronunciauit. Etenim ex harū numero me-
diocriter ſubduras perſanat: quæ vero plus caloris, aut phlegmonodes quippiam, referunt, iritat,
præſertim initio. Poſt commemorata, deinceps in hæc verba Heras diſſeruit: Fecit etiā ad duritiā
triemeſtrē, quæ ex partu proſecta erat, ac perſpiratu diſcuſſit, non impoſſibilia dicēs. At conuenie- H
bat ipſum præſcripiſſe, cuius nam durities eſſet, totius ne vuluæ, an ceruicis ſolius, vel orificij, vel
cornuum, vel externi cuiuſdam corporis ei incumbentis. Iam verò id ipſum emplaſtrum impen-
ſius, q̃ natura comparatum ſit, laudat aduerſus fiſtulas cum alias oēs, tum maxime quæ in dactylio
id eſt podice, oriuntur: ſic. n. appellauit ipſe, cū illud curare adfirmaret. Simili modo ad poda-
grā, carbunculos, epinyctidas, condylomata, lepras, vitiligines, fugillata, propoſitum emplaſtrum
Heras extollit. Si itaq; tanq̃ meliorum penuria eo vſus quiſpiam mediocre præſidium attulerit, ve-
re prædicat: ſin aut vt medicamē ad hæc optimum adducit, manifeſti mendacij arguitur, cum mul-
ta alia præſtātiora inueniantur. Cæterū poſt ipſius laudes his verbis præcipit: Vtere hoc maxi-
me, quum vlcus ab acribus phar macis, & ijs quæ cruentis imponuntur vulneribus (Græci vocāt
enama) ſoluitur, et phlegmonen recipit: tum in abſceſſibus qui circa genu fiunt. Hic quoq; fidei
illius erat apponere pro abſceſſuum quidem ratione, tenera carne præditos, pueros, mulieres, &
ſenes: in vlceribus autem, ſpecies eorum adſcribere: Vti nos faciemus in ſermone de malignis vl-
ceribus: nam iſtud, de quo nūc loquimur, emplaſtrum nulli tam cacoethi ſeu maligno cicatricem
obducit. Verum diſtinguenda ſunt ea, quæ cicatricem ægre ducūt, à cacoethibus: neq; .n. omnia
cacoethe difficulter cicatricem admittunt. At dicetur ſermone procedenti de ipſorum diſſerētia,
& me-

† In aliquibus
legitur, & αλκων
i. vlceribus. vt
intelligatur de
vlceribus ex
morſu vel pun-
ctura.

A & medicaminū, quæ vtriusq; sanandis dicata sunt. Quin ex solis metallicis album emplastrū præparare licet, vt paulo antè in sola argenti spuma cocta admonuimus. Si enim spuma argenti cerussæ committatur: deinde olei, & aquæ, vtriusq; duplum misceatur: et coctionem, vt nuper est dictum, carbonibus antea perustis in aere lucido peragas: tum glutinans ac tenax, tum album colore, medicamentum erit: maiore autem refrigerandi virtute præditum, q̃ quod est ex sola argenti spuma confectum. Quemadmodum enim molybdæna frigidioris crassiorisq; naturæ est, et si argenteæ spumæ eam admisceas, sic etiam cerussa, vel magis adhuc q̃ molybdæna: q̃ si vetus oleum indatur, non parum lentoris & hoc medicamē habiturum est, ne videlicet à corpore facile decidat, cuiuscūq; fuerit impositum. Atqui si emplastrum candidum fieri postularis, oleum q̃ fieri potest purissimū simul & lucidissimum inijcitor: multa enim eius generis non sunt. Mitigans verò ac dolorem sedans erit pharmacum, si & adipis aliquid inieceris, veluti ego facere consueui. Adeps verò anferinus sit, vel huius inopia gallinaceus. Si neq; hunc habemus, suillum inijciamus, non ignari quidem magnam esse anferini ad reliquos eminentiam: vtentes autem peioribus etiā, si quando optimi copia non conceditur: nam & cum cinnamomum desideratur, ad cassiam optimam descendimus. Verū in prædicta symmetria adipis pōdus dimidio minus, q̃ vtriusq; metallici, miscere sufficit: vt argenti spumæ & cerussæ singulorum pars vna adsit, olei dupla, & aquæ dupla, vel etiam paulo amplior, adipis pars dimidia. Cæterum, quomodo dicam ijs, qui lance metiuntur, dupla, dimidia, & æqualia, ante paulum ostensum est, dum Romanæ libræ ponderalis cū mensurali cognitionem, quam vocant homonymiam seu æquiunctionem, interpretarer. Pharmacum hoc varijs modis præparauit: siquidem quatuor pari portione mistis dimidiam adipis, interim quoq; liquidorum vtriusq; vnam & dimidiam, adiunximus. Porro fiet veluti exemplo symmetria talis, argenti spumæ pondo libra, cerussæ pondo libra: olei, aquæ, vtriusq; pondo libra s: postremo adipis pondo selibra. Est cum & pondo trientem adiecerim, sicut & aquæ pondo libram integram. Quod aut̃ idiotæ frequenter dicere solent, & medici ipsis similes, obseruate ne interdum dicatis, ne pe medicamentum quodlibet generosius fieri, si adiectum hoc fuerit, quodecūq; scilicet nominauerint. Nō nulli ignorare se fatentur, rogant q; nos, qualis nam cōpositio præparatio q; sit optima, ignorātes aliam in alio affectu esse cōmodiorem, simpliciter verò & indefinitè ne vnā quidem optimam. Huius itaq; rei gratia ego simplicium pharmacorū virtutes accuratè pernoscere opere pretium esse vobis puto: nam composito probè vti non possitis illorum ignari. Nimirum igitur in proposito hic albo emplastro recens adeps admixtus medicamentum efficit, quod dolorem magis adeo leuat, vt si & inflammatione laboret vlcus, iuuat ipsum: at cicatrice obducenda minus reddet accommodatum: Quod citra adipem conficitur, facilius quidem cicatricē inducit, verū non ex æquo sedat dolorem. Dictum quoq; est prius, q̃ aqua admixta euidentius refrigeret, sed oleo veteri, magis discutiat. Itaq; qui eam facultatem adsecutus est, vt quo potissimum vlcus indigeat, scire possit, is optimè & ipse componet medicamenta, & iam cōpositis vtetur. Atq; vidistis me subinde medicorum, qui me in consiliū aduocarunt, pharmacis multa curasse, à quibus illi sanitatis spem abiecerant. Optimum igitur medicamen dictum est non sermone simplici, sed inter ea quæ hoc aliquid facere pollicentur: quemadmodum ego Phœnicinum optimum esse retuli aduersus rheumatica, si eo iuxta prædictas distinctiones vtamur.

De alijs Emplastris Albis.

CAP. 15.

Alba igitur antè cōmemorata, qua dixi ratione iam olim confecta sunt: post quæ alia diuersa medici posteri excogitarunt, quædā adimentes, addentes, & immutantes: de quibus & ipsis præstat dicere, vt in varia medicamentorum cōpositione vos exerceamini. Scripsit itaq; Andromachus in libro, cui titulū fecit, Virtutes ad exteriora. hisce quodāmodo verbis. *C Album, quod vtor.* Argenti spumæ pondo mina, cerussæ tantundem, ceræ pars quarta, resinæ pars quarta, olei heminae tres, aquæ heminae duæ. Hactenus Andromachus, nec quibus conueniat adscripsit, nec coctionis eius mentionem fecit. Non nulli viginti vncias minam cōtinere tradunt, quidam sedecim. Atque medicamentū utroque modo præparari possit, non tamen rectè mihi parem modum resinæ & ceræ inijcere videtur: nam Attalici cōpositio melior est, quæ ceram resinę duplo copiosiorē accipit. Constat aut̃, si resinæ & ceræ æqualis portio adiecta sit, emplastrum fore glutinātius, non tamen ex æquo suaue gratum q; vlceribus, sed acrimoniam habiturum. Quin etiam eò q̃ indicare noluit, qualis immitti debeat resina, parum rectè fecit: nos autem haud ignari esse meliorē per omnia terebinthinam tum colophoniam, tū eam quæ phrycæ nominatur, illam iniiciemus. At si & laricem habeamus, quid vtī prohibet, cum sibi inuicem propemodum sint adsimiles? Olei heminas tres. atticas puto ipsum scribere, aut certe scripsisset, libras. Atqui miretur quispiam, quomodo Romę degens pro libris heminas nominauerit: eius nēpe regionis illa sunt nomina, libra, sextarius, vncia. Ex multis pharmacis quondam conscriptis, priusquam Romanorum res eò potentię accreuisent, conieci quam illi vocarent heminam, esse æqualem vnciis nouem librę Romanę hodiernę. Nunquid igitur & Andromachus tres heminas censet adijciendas, tanquam singulę vnciis nouem valeāt? eadem q; ratione & aquę duas? Vos ergo si simplicis cuiusq; potestatem cognitam antè habeatis, quomodo cūq; preparato vtī potueritis ad ea, quę cōpositionis modus promittit,

promittit, alijs permittentes inquirere, qualis nam confectio sit optima: oēs. n. optimæ sunt & nō E optimæ, quemadmodum nobis prius ostensum est. Postea Andromachus aliud subiungit huiusmodi. *Album aliud.* Argenti spumæ pondo denariū centum sexaginta, cerussæ pondo denariū ducentorum, ceræ pondo denariū quinquaginta, terebinthinæ pondo denariū xxiiij, olei hemina dimidium, aquæ cyathos vj. Hoc igitur emplastrum priori plus cerussæ, q̄ argenti spumæ, habens, cadidius euadet, magis q̄ refrigerans quod ad hoc attinet, sed facile decidit, minus q̄ adhærescit, licet sedecim vncias & duas partes heminam habere statuamus, quemadmodū non nulli aiūt.

Iuuat sanè ipsum ad hæc terebinthinę mistura, ne friabile fiat pharmacum: quoniam cino alipes, vt Græci dicunt, id est pinguis expers, & aridū esset, pauco oleo & aqua addita. Neque in hoc verò adscripsit Andromachus, vel coctionem, vel quid promittat. *Aliud album.* Aliud post hoc ponit tertium, quod eadem alia omnia cum Attalico ex pipere albo confecto continet. Adiecta aut sunt ei hæc duo, orchis herbæ pondo denariū octio, struthij pondo vnc. duarū. Aquam verò nequaquā huic pharmaco adiungit, sed thuris pondo denariū xxv iniiciendum censet, non adscribens vt Heras consuevit: non nulli aut t̄ xxvi immittunt. Olei tñ & hic ille heminas duas imponit, eandē nobis obscuritatem relinquens, cuius supra memini. Accusauerit quis eum vehementer, q̄ pharmacorum pollicita seu titulum non præfixerit, quippe secundum cum primo & tertio eandem potentiam non obtinet. Heras q̄ sanè laudandus est, qui medicamentorum virtutes adscripserit, vtendi q̄ modos, quos Andromachus in emplastris albis prorsus omisit, raro ad quid valeāt apponēs: quin nec quo pacto coquendum medicamentum sit, indicauit. Attñ nemo forsan eum accusare possit, q̄ iam exercitatis in re medica, non idiotis, scribat. Verum q̄ titulum præterijt, vel vniuersales potentias, non mediocriter peccatum est. Quid enim dicet, qui defensionem eius susceperit: forsan q̄ peritis simplicium medicaminum virtutum hæc tradiderit: atqui illorum nullus Andromachum desiderat, cum & ipse simili modo possit componere.

Album Heræ aduersus Rabiosos morsus.

CAP. 16.

Rursus ad Heram reuertamur, aliud candidum emplastrum post Attalicum iisdem hisce verbis scribentem. *Candidum aduersus Rabiosorum morsus.* Facit exacte etiam ad Aquam expauscentes rabidi canis morsu, præseruat enim statim a periculo vulnere impositum: item deuictis valde catapotium nucus auellana magnitudine ex eo dandum est, id que diebus quadraginta: mutat tamen colorem in splenis, redditur que nigrum. Valet & contra Morsus hominum canum que, Abrasa, & Vlcera quæ cicatricem difficulter admittunt. Tollit etiam Sugillata siliqua vna, Vulnere conglutinat, aufert Phymata, & Rhagadis. Est & Pessus emolliens. G Oportet tamen post diem soluere, & nigredinem vlcerebus obortam spongia detergere: id que tantisper faciendum est, donec nigricies amplius nulla appareat. Iam quoque idem Cicatricem ducit, & ad omnia bonum est. Hæc præfatus Heras deinceps symmetriam emplastri his verbis enarrauit. *Album.* Ceræ albæ ponticæ pondo libras duas, argenti spumæ chrysitidis pondo librā, cerussæ tantundem, myrrhæ pondo vnc. ij, medullæ ceruinæ tantundē, thuris atomi id est insecti pondo vnciam, olei veteris sextariū. Hæc sanè symmetria eorū est, quæ emplastrum constituunt. Coquendi vero modū deinceps ita scripsit: Argenti spuma ex oleo coquit: vbi sordium crassitudinē habere videt, cera, mox cerussa aspergit, mouetur q̄: vnita iā nec polluetia ab igne tollunt, & medulla iniicitur: postq̄ refrixerit medicamentum, myrrha & thus miscet: deinde emollitum subactum q̄ manibus, vsui est. In hoc igitur Heras commendandus est, qui non reliquerit nobis, quomodocūq̄ lubet, emplastrum coquendū, sed ipse apposuerit. Procliue. n. erat cerussam cū argenti spuma, vt in albis alijs, statim ab initio coquere, & nos id plerumq̄ facitare consueuimus, immo & ille ipse in alijs cōscripsit: verum in hoc ipsam secundo iniicere præcipit, non apponens causam, cur id agere præstiterit, etsi ostendat non vnum coquendi modum in omnibus esse similiter vtilem, sed in quibusdam & duos & tres efficere licere, non modo colorem verū & facultatē immutantes medicaminum: quemadmodum in hoc nūc H proposito cerussam cū argenti spuma coquere noluit, sciens ipsam & exactū candorem ex coctione perdere & astrictionē, quam habet cū refrigerandi virtute, deponere. Forasan igitur inquireret aliquis, ecquid cū emplastri author primus, quicūq̄ fuerit, digerens id esse vellet, conatus tñ est cerussam crudā in eo perseruare? Mihi sanè videt huius gratia ad talem venisse confecturam, vt medicamentum repulsoria quoq̄ virtutis quippiam habeat, etenim eiusmodi nullam habentia, plethoricis corporibus nequaquā tuta sunt. Vt ergo conueniat & his, cerussam crudam mistam esse verisimile est. Cæterum neminem latet magna de se propositum medicamē promittere, inde q̄ myrrham & ceruinam medullam assumpserit, sicut & alia quoq̄ eadem cum communibus his emplastris continet. Didicimus aut myrrham valde siccā, tenuiū q̄ admodum partiū, esse medicamentū: medullā rursus nullo inter ea, quæ mollientia vocant, inferiorē. De hac facultate, quemadmodū & de alijs oibus secundis in libro quinto simplicium pharmacorū dictum est. Videtur tñ non ijs tantum medicamenti compositor, sed etiam albæ ceræ ponticæ, quæ vim habet medicamento- sam, confidere, atq̄ ideo plurimum eius immittere. Cæterum sextarij (hoc est xesti) Romani Heram meminisse puto: nam apud Athenienses neque mensura, neq̄ nomen hoc erat: nunc ex quo Romani imperare orbi cœperunt, nomen sextarij apud omnes, quæ Græca lingua vtuntur, nationes

† Græc. codex, q̄, q̄; haud scio q̄ recte, habet δ'ηαδ'ύο καὶ εἰκοσι, i. duodecim et xx. Sunt, qui legēdū putent xxii.

Anes existit: ipsa verò mensura Romanæ æqualis non est, quippe alij aliam sextarij mensuram vsurpant. Apud Romanos sextarius libram vnam, semissem, & sextam illius partem pendet, vt oēs simul iunctæ vnciæ sint viginti: quas plurimum cornibus metiuntur, incilis extrinsecus lineis quibusdam orbicularibus. Non nulli falso romanum sextarium opinati sunt octodecim mensurales vncias capere. Videtur igitur & Heras cum heminam scribit, sextarij dimidium indicare: num vero nouem vncias ex librari cornu, an decem, innuant, etiamnum ignoratur. Item ad rabiosos morsus ne aptum sit pharmacum siue bibitum, siue extrinsecus impositum, ratione cognoscere nemini licet. Indicauimus. n. tota substantiæ proprietate eiusmodi medicamenta efficaciam habere, & ob id experiētia iudicari. At experiri nunq̃ ausus sum hoc pharmacum, quam vim in rabidorum moribus ostenderet, q̃ certo sanans haberem medicamentum ex cancris confectum: cum autem hoc non adest, alia quoq̃ non nulla, quæ nunq̃ prospero successu nos frustrantur. Quare in tam periculoso affectu certis medicaminibus relictis curiosæ experiētiae causa, morli salutem prodere, graue & iniquum mihi videbatur. Iam quidem de rabiosis moribus hæc quoque dicta sufficiunt.

Reliqua verò, quæ Heras de hoc emplastro retulit, vt in Attalico, partim sanè vera predicari, partim impendio magis ab eo extolli, dixerim. Optimum enim est pharmacum, vt inter emplastra, **B** quæ sugillatis dictis admouentur: inter ea verò, quæ cruenta vulnera glutinant, non in primis & optimis est. Summatim permultos inuenio non modo huius tempestatis medicos, sed etiam veteres qui liberos posteritati reliquerunt, hoc genus emplastra supra veri fidem extulisse, de quibus sequenti volumine agetur. In præsentia ad institutum reuersi, iterum Heræ dicta examinabimus. At enim phymatis medicamentum illud mederi, nulla distinctione eorum apposita, quæ ego de Phoenicino protuli. Quædam siquidem calida sunt phymata, et cū vehementia quadam exiliunt: quædam frigida sicca q̃ sunt: permulta alia inter hæc consistunt, alia quidem exacte media illorū, quæ diximus, alia à medio in vtranque partem paulum inclinant: aliqua plus idem faciunt, non nulla summis vicina, vel à medijs quodammodo & summis pari spatio absunt. Quibus vniuersis emplastrum hoc conuenire non potest, nisi cum mollibus quibusdam id velit liquefacere, vt multi modi fiant, quibus eo vtamur, quos explicasse ipsum, sicut in alijs fecit, oportebat. Proinde par esse puto, vt hunc laudemus ob ea quæ tradidit, Andromachum accusemus. Caterum de eo, q̃ emplastrum istud hominum canum q̃ morsibus conferat, eisdē puta à me rationes audire, quas & de Attalico pronunciaui: similiter etiam de alijs, quæ pharmacum commendant: quemadmodum illud, ita hoc quoq̃ bonum esse medicamen dicens, sed multum ab ijs, quæ optime ad vnum-

C quodq̃ illorum faciunt, inferius esse, vt quis eo confidenter vtatur, vbi optima desint omnia. Hoc autem non paruum est in medicamentis, quemadmodum nec in victus ratione, & omnibus quæ circa artem versantur. || Ego contemphi quidem id primum, vt neq̃ dignum esse iudicarem Hippocrate, qui adhortatur nos ita omnia artis opera perficere, vt iuuent, vel non offendant. Postea verò cognoui magnam vim habere, cum scilicet viderem non nullos medicos in pharmacis se primum recte gessisse, vt in admirationem sui alios perducerent: eosdem postea in alijs prospero euentu frustratos, vt risui essent. Ideo q̃ semper conatus sum eiusmodi vti præsidijs, quæ an profutura essent, non nunq̃ sanè dubitabam, q̃ autem nihil asserrent incommodi, certo sciebam. Quæ igitur in Attalico emplastro atq̃ hoc laudauit Heras, non quidem, vt dixi, magna sunt: sed vbi deliderantur, quæ id magnifice efficiant, nemo his vtens manifestam lēSIONEM inferet, et si nihil inuenerit. Atqui si quis hoc pharmacum vti volet in phymatis, ab illis quæ in Phoenicino docui, ipse intelliget, aliàs aliter ipsum liquefaciēs. Tractabitur aut vberius deinceps & phymatum tota curatio, vnde spero vos methodū exactā perfectā q̃ medicaminum, quæ illa iuuare possunt, habituros. Vocet aut vobis emplastrum hoc, Album ad rabiosos morsus, sicut illud quod ex albo constat pipere, Attalicū. Subiungit mox & aliud emplastrum Heras in hanc sententiam. **E** Album Ariabazæ-

Dmon, quo Xenocrates abscissum iam malteratum circa tarsum, & ea pars est in pede, quæ carpo seu brachiali proportionem respondet, & discussit. Deinde eorum, quæ ipsi immittuntur symmetriam, & postea coquendi modum præfatus, ad calcem hæc verba apponit. Maxime facit ad Cacoethe, Pascentia, Contumacia, vniuersaliter ad Omne vlcus. Porro cur eorum, quibus constat pharmacum, symmetriæ tertiam partem recitauerit, compertum non habeo, cum alij integram hoc modo tradiderint: Argenti spumæ denariū pondo ducentorum, ceræ denariū pondo quinquaginta, olei veteris heminas iij, cerussæ denariū pondo octoginta, terebinthinæ denariū pondo triginta duū, cineris buccinorū denariū pondo decem, thuris denariū pondo decē & nouē, & aquæ cyathos duodecim. Hæc oia à me prolata pharmaca Heras ad tertiam partē imminuit, sic: Argenti spumæ denariū pondo sexaginta sex obol. iij, ceræ denariū pondo sedecim obol. iij, olei veteris heminā, cerussæ denariū pondo vigintifex obol. iij, terebinthinæ resinæ denariū pondo decem obol. iij, cineris buccinorum denariū pondo tria obolos ij, thuris denariū pondo sex obolos duos, aquæ cyathos quatuor. Postea coctionem ita subdit: Argenti spumam & cerussam cum aqua & oleo terito, deinde recēti olla igne non acri coquito ferrea spatha sedulo mouens, ne adurantur. Vbi semicocta fuerint, ceram immitto: hac liquefacta, resinam & thus: ac tam diu coquito, dum aliquatenus non inquinet. Posteaq̃ bene habere propemodū videtur, buccinos iniectos reliquo tempore concoquito. Cum perfecte coierint,

1. Epid. com. 2.
tex. 50. claf. 3.
112. f

coierint, in mortarium demittito, aqua exigua prius subiecta, & subacto vtitur. Hoc medicamen- E
tum, vt sine morfu discutiat, pręparatum est, q̄ & cerussę parum ad argenti spumę portionem ha-
beat, & cum hac ab initio coctum sit, valide q̄ exicet ob buccinorum cinerem additum. Non dissimilis
quodammodo facultas est & purpuris & ostreis concrematis: notū est aut sine carnibus ho-
rum animalium testas concremari. Ac Heras quidem vnū de facultatibus librū cōscripsit: Ascle-
piades cognomento Pharmacion, decem, pręter theriacas & gynęcea: apponens & ipse cuiusque
pharmaci titulum, in multis ē coctiōnis, in quibusdam vtēdi modum. Porro Andromachus mul-
tas vires collegit, & ferē non pauciores ijs, quę in decem libris Pharmacionis Asclepiadis habentur,
tribus ipsas libris comprehendens. Primo pharmaca docet, quę extrinsecus imponuntur: altero
quę intrō assumuntur: & tertio quę oculis adhibentur. Reprehēdere autem ipsum iure possis,
vt admonui, q̄ nec confecturas, nec vsus rationem, nec vires, nec quid promittant, adiecerit.

Quę Asclepiades Alba scripsit.

CAP. 17.

AD Asclepiadem igitur iam transgressus producam in medium, quę ipse alba emplastra ad fi-
nem tertij libri exteriorum tradidit. Nā inscribit eorū primam Marcellā, secundam, tertiam,
quartam, quintam: veluti alios interiorum quinque, primū Masonem, secundum, tertium, quartum,
& quintum. Verū in tertia Marcella ad calcem alba emplastra adscripsit: prioris titulū esse ait, F
ad ambusta igne, abraſa, cutem teneram: quod emplastrum Acelin id est medelā, nominari dicit.
Omnia verō simul quatuor, argenti spumam, cerussam, oleum, aquam, pari pondere incoqui oportere
commemorat. Constat q̄ hoc pharmacum fragile & alipes effici, hoc est pinguis expers, vt cu-
ti sine deligatura adhærere non possit: nisi. n. vt p̄fatus sum ante, metallica plenius cocta fuerint,
tale fieri emplastrum necesse est. Coquuntur largius, dum maiorem liquidorum mensuram in mis-
tura cōtinent. Huic aliud emplastrū Asclepiades subdit, eiusdem quidem tituli, sed non eiusdē
confecturę: neq̄. n. æquale metallicorum pondus immittit, verum cerussam argenti spumę scilicet
plam: quin & seuum vitulinum adijcit, totam symmetriam sic faciens: Cerussę denariū pondo
centum viginti, argenti spumę denariū pondo octoginta, adipis vitulini denariū pondo tri-
ginta, cerę denariū pondo viginti quinque, olei heminas duas. Hoc pharmacum olei parum ha-
bet, ceu ad metallicorum proportionem, si quis heminam statuatur valere vnciis nouē romanis, quę
in cornibus cōsuetis libralibus descriptę sunt. Qm̄ verō cerussa in ipso superat, eo q̄ magis adstrin-
gens magis q̄ refrigerās, q̄ superius reddebatur, adipem author admiscuit. Sciens aut bubulū adipē
calidiorem esse suillo, & vehementius digerere, cauē perfecti bouis seuum indere: quippe in omni
animantium genere iuuenilia perfectis humidiorē, minus q̄ calidum, adipem habent. Erit igitur G
& hæc compositio difficilior quidē, ac simplicis albi emplastri quod ante scripsit, sed nihilo valior.

Ab his tertium aliud profert cicatricem ducens album, ex pari cum argenti spuma pondere, cerę
quarta illorum parte, & terebinthinę rursus dimidio minore q̄ in cera: oleū & aqua ferē aqua
portione metallicis mensuris vtriusque simul indita sunt. Voluit. n. medicamento author cerussę, et
argenti spumę, singulorum pondo denariū centum miscere, cerę denariū pōdo viginti quinque,
terebinthinę denariū pondo duodecim, olei & aquę cuiusq̄ heminas duas. Itaq̄ Attalici me-
mores emplastri, quod metallica perinde ac istud continet, sicut etiam oleum simul cum aqua, cerā
dupla portione ad eam quę in hoc medicamento additur, terebinthinam similiter, sciētis manife-
sto, quō nam discrimine medicamenta inter se variant: adiectum namq̄ est illis & thus, alumen, ac
piper. Quin etiam Asclepiades Attalici illius emplastri commemorat, non vocans id Attalicum,
immo nec piper admiscens. Alia verō omnia pariter ita scripsit ad verbum. *C. Albū, quod ad Mna-
seum refertur: Facit & ad Diuturna ac Difficilia.* Argenti spumę, cerussę, cuiusq̄ denariū pondo cē-
rum, cerę denariū pondo quinquaginta: terebinthinę, thuris, singulorum denariū pondo vi-
ginti quinque: aluminis scissi denariū pōdo duodecim, olei heminas duas. Porro ne putetis differ-
re, si drachmas centū alicubi inueniatis loco vnus librę scriptas: sed illud potius considerate, vtrū H
qui scripsit centum denarios, dimidiū cerę ipsis misceat, siue huius dimidiū terebinthinę, vt
sint cerę quidem denarij quinquaginta, terebinthinę viginti quinque, an aliam quādam symmetriā
faciat. Si nāq̄ prædictam, nihil referet dicere libram, & selibram, & tres vncias: siquidem libra de-
narios sex habet ad nonaginta, selibra octo & quadraginta, sic & huius rursus dimidiū quatuor &
viginti. Quapropter eadē proportio seruatur nulla insigni differentia, siue centum drachmis metal-
licorum, siue nonaginta sex, heminę duę olei misceantur. In hoc itaq̄ non variabunt pharmaca,
siue libra nominetur, siue denarij cētum. Illa verō Asclepiadis scriptum pharmacum ab Attalico
emplastro dissiūxit, q̄ Attalicum sex quidē drachmas aluminis scissi, piperis verō albi tres habeat:
Asclepiadis album piper non habeat, sed duplum pondus scissi aluminis. Porro validius adstrin-
gere quodāmodo, ideo q̄ p̄optius cicatricē ducere Asclepiadis pharmacum, Attali magis digere
re, omnes norunt. Vnde, quod dixi & prius, qui rogant, vtrum ipsorum p̄stet, medicamentis vti
nesciunt: Etenim ad cicatricem ducendā Asclepiadis, ad digerēdum Attalicū, est melius. In vni-
uersum meminisse oportet, quod apud Hippocratem scriptum est in libro de Alimēto, || prauum
videlicet & non prauū, noxium & vtile, relatione ad aliquid dici. Alia enim ratione pronuncia-
ueris Attalicum hoc emplastro esse præstantius: alia ad multa vtilius illud esse. Deniq̄ & Ascle-
piades

Apiades ipse post hoc modò recitatum, scribens illud ipsum quod ex pipere fit, non vocat Attalicū sed Pamphilion, ignorans opinor primum ipsius inuentorem. Apponit autem nomen vtentis, ac vnde acceperit: tum quid valeat, his verbis præfixit. *C* Aliud Pamphilion dictum piarmacum accommodatum. Facit ad Vetera, Vix sanabilia, Carbunculos, Epimychidas, Achoras, Psoricos affectus, Sinus glutinatus, facit ad Abscessus, Condylomata, & fere Omnibus vtilius est. Constat ipsum tradit ex ceruilla, argenti spuma, cera, terebinthina, duabus heminis olei, eodem modo sicut & Heras: ad hæc item hisso alumine, & albo pipere: aquæ verò non meminit in confectura, sed neq; thuris. Quidam non quinq; & viginti, sed dimidium immittunt, quin etiam de aqua: cum enim olei veteris heminas duas infundi scripsisset, postea aquæ duas vel vnam adiecit. Ego & sine aqua medicamentum sæpius præparauī, & ad omnia alia melius fieri apparet, præterq; in teneris corporibus: nam in his aquam præstat adhibere, præsertim cum phlegmone tentantur vlcerà. Inde aliud Asclepiades cum superioribus albis emplastris profert, quod rabiosos morsus sanare promittit, quemadmodū & quod apud Heram scriptum est, pollicebatur. Assumit & hoc præter simplex album, quod ex argenti spuma, cerussa, thure, cera constat, insuper medullam ceruinam & myrrham: porro miscet ei argenti spumæ denariū pondo quadraginta, cerussæ denariū pondo triginta, thuris denariū pondo decem, myrrhæ tantundem, medullæ ceruinæ duobus pauciores quā decem, ceræ albæ denariū pondo quinquaginta, olei veteris sextarium. Primū horum omnium, quæ recitauit, prodidit Asclepiades, quod vocat Rhodiaceum, ceu digerens & curans in mammis duritias, & ex his componitur: Argenti spumæ, ceræ ponticæ, singulorum pondo: cerussæ, adipis suilli elaborati, cuiusq; selibra, hoc est vncijs sex: myrrhæ pondo vncijs quatuor, ouorum testorum vitellis duobus, olei hemina vna & semis. Istud etiam sedi benefacere confirmat, non apponens quò nam liquefieri velit, sed nobis coniectandum forsan relinquēs, interim ex rosaceo vnguento, interim myrteo, aliàs ex oleo quopiam, liquandum esse.

Quomodo Candida Emplastra Componenda sint aduersus Vlcerà Cacoethe id est maligna, & Ea quæ cicatricem difficulter admittunt.

CAP. 18.

Quæ dysepulota id est vix ad cicatricem venientia, quæ item cacoethe id est maligna, appellē, distinguendum modò est: quia non solum in præsentem disputationem, sed etiam in futuram, commoda præfinitio est futura. Quæ itaq; ex humorum confluxu, vel multorum, vel acrium, oriunt, sine eo qd locus affectus huiusmodi iam dispositionē habuerit, vt, licet bonum sit quod influit, tñ ipsum corrumpat. Dysepulota nomino: quæ verò dictam dispositionem iam continent, præcipuo vocabulo Cacoethe appello. Nunc igitur, qm̄ priores me emplastra quædam alba, vt quæ dysepulotis cicatricem probè obducant, conicripserunt, propterea ego quoque alia scribo emplastra, quæ aduersus dysepulota omnia, & cacoethe non nulla, quæ non prauum admodum habent statum, cōposui: nam in illis denuò medicamenta accommodata dicentur. Primum & hîc methodum dicturus sum, quaid genus emplastra complura conficere discetis. Duplex porro eius scopus est, alter omnium, quæ rōne componuntur, medicamentorum communis: alter peculiaris, colore ab his differens. Quæ igit in commentario de Simplicibus medicamentis cognouistis, sine rosione quidem ac morsu, validè tñ adeo exiccantia, hæc in memoriam reducite. Oîno autem conueniebat, præterq; qd non mordicent vel adstringūt manifestò, etiam detergere posse: siquidem caua plurima eius generis vlcerà, tanq; ab exesione humorum malignorum, facta apparent, eiusq; rei gratia carne impleri desiderant: ostēdimus autem in tertio therapeutices Methodi libro, omnia quæ carnem generant, medicamenta detergendi facultatem habere. Multa etiam alia siccam obtinent virtutem, huiusmodi vlceribus curandis accommodata. Sed age nunc repetamus ea, quæ aut cōpositi emplastri candorem tueri possint, aut non adeo lædere. Hoc ex genere est cadmia, pompholyx, calx, ostrea concremata, purpura, buccina, & sepiæ pars ossea: parū officiet colori & aris squama, & vsta chalcitidis non fuluum, sed cineritiū, vel subalbidum. Quomodo autem huiusmodi res præparanda sit, rursus in Theriacæ antidoti sermone dicemus. Porro dictorum quodq; si lauetur, totam mordicationē amittet, quemadmodum cera, quæ medicamini conficiendo admiscenda est, tum resina. Cæterum qd cera tyrrhenica vel pontica dicta ad candidi emplastri præparationem sit idonea, prius explicatum est: resinæ verò & quæ laryx vocatur, & terebinthina, aduersus vlcerà maligniora magis valent. Thuris quoq; partem aliquam indere nō ab re fuerit, vt vlcerum maleficorum dispositio coquatur, & ad suppurationem veniat. At non solum ex prædictis medicamentis vnumquodq; lauandum venit, sed etiam metallica quàm maxime in loco soli exposito, cū aqua, vel aceto, vel marina, vel vino, leuigare oportet. Pura autem, & candida, & perspicua, singula hæc erunt, candoris cuiusdam medicamento conciliandi gratia. De cerussa, oleo, coctionis modo, aere circumfluo, & igne, quomodo quodq; eorum ad albedinem aliquid adferat, antè exposuimus. At quæadmodū in alijs, ita in his quoq; facultatis aquæ, aceti, marinæ, vini q; albißimi peritum, id in compositione miscere conuenit, quod maxime curando morbo profuturum est. Etenim in vlceribus prætumidis ac duris (ochthode Græci appellant) quæ oras crassas, callosas, multamq; attenuationem requirentes habent, ex aceto, & marina læuigata, magis, qm̄ quæ per aquam, idonea sunt. In quibus aut acris & mordax est humidū, quod in vlcerà

Quinta Classis.

eeee

fertur,

fertur, ex aqua terere potius singula metallica necesse est: Quemadmodum rursus ex vino magis, E
vbi copiosus humor vlcibus influens apparet. Hec igitur singula quæ dixi, in vnoquoque iam no-
minato humore læuigata diebus pluribus, iniecti frequenter pharmaci, quæ ex argenti spuma &
cerussa confiunt, ea quæ expertus sum omnia cicatricem optime ducere. Verum scriptiones qualdam
amicis quoque dedimus, qui huiusmodi pharmaca desiderarent: à quibus ipsis quoque in experien-
tiam producta, quod titulo promittunt, tueri videbantur. Itaque argenti spuma cum cerussa prius co-
cta, & medicamento propè ad non inquinantem consistentiam perueniente, injicienda est laryx,
vel terebinthina resina cum cera candida. His pulchre unitis adde metallica, quæ huiusmodi symme-
triam habent: Argenti spumæ & cerussæ pro consuetudine singulorum pondo coquatur cum olei
libris duabus, frequenter etiam aquæ sēlibra addita: liquefcit. n. sic argenti spuma citius, & coctio
aquam consumit, ut nihil ad humiditatem pharmaco apertè proficit: resina pondo tres vnciæ, ce-
ra duplum sufficit. Quamvis si duas resina indideritis interim, quatuor ceræ, sic quoque compositio-
nes non adeo differre inuenient. Thuris est pondo vncia semis satisfacit post ceram & resina inie-
cta: deinde tres aliorum vnciæ, quæ drachmæ quatuor sunt ad viginti. Impones autem duorum, trium,
plurium, ac omnium quæ numeravi, quorum singulorum tibi copia contingat: ut si omnia habeas,
æquā portionē cuiusque injicias, cadmiæ dico, & pompholygis, buccinorum cineris vel ostreorum, et
eris squamæ: singulorum denarii sex erunt, qui tres vncias absoluunt. Quod si & calcem lotam mi-
sceas, singulorum drachmæ quinque ponentur. Si vstæ chalcitidis, singulorum drachmæ quatuor,
ut ex omnibus sex cōnitis tres vnciæ fiant. Verum chalcitis vsta sit elota, & colore cinereo, non
qualem multi ex ijs, qui vrunt eam, faciunt, veluti si dicas ex pallido flauam. Si duo quedam ex his
habeas solum, tres vncias ex ambobus ponito, hoc est vtriusque vnam ac semillem. Hec in præ-
sentia ad alborum emplastrorum constitutionem vlcibus dyspulotidis curandis cognoscere vo-
bis sufficit. Atque subhumida cerata candida etiam ex ijs ipsis præparantur, differunt tamen ab
emplastris, quod neque argenti spuma, nec cerussa coquatur: adeps verò vel anserinus, vel gallinaceus,
vel suillus, vel vitulinus indatur. Quod si vinum interim habeas vel acetum, quæ albilissima lucidif-
sima quæ sint, aquæ loco ipsa admiscebis.

Damocrates de albo Emplastro.

CAP. 19.

Quoniam pharmacorum virtutes metris transcriptæ facilius memoria tenentur, & exactam
ipforum symmetriam perservant, satius mihi visum est & horum meminisse. Cum itaque
Damocrates præter alia alba emplastra, etiam candidum scripserit quod commendat, ap-
ponam scripturam ipsius illius versibus, iambico trimetro expressis.

At cum his habere emplastrum medicis conuenit

Album, efficax aduersus abuulsam cutem,
Ambusta, ad vlcera, & per summa corporis
Occasionem citra manifestam edita.

Ita confit: Cerussæ libra sumitur:

Lithargyri, tryphere, eodem simul modo,

Et portio præterea libræ tertia:

Ceræ quæ puræ ponticæ quinque vnciæ,

Terebinthinæ pondo vncia purissimæ:

Thuris quæ mannæ, vel thuris, quinque vnciæ:

duæ libræ. Candidi olei boni recentis sēlibra.

Aquæ superfundetur his sextarius.

Oleum, cerussa, argenti spuma, aqua coquitur

Leni igne, agitur sedulo rudicula.

Cum tota pulchrè desiccata sic aqua,

Et leue medicamentum apparet, candidum,

Et molle, inficiens nec, terebinthina inditur,

Deinde cera succedet, thus postea.

Ab igne cum depones ollulam, moue.

Cum mediocriter est refrigeratum pharmacum,

Mortario superfundas, atque excipe

In mulieribus, vel delicatis puerulis,

In senibus, habitu aut prauo iuuenibus simul.

Huic tertiam partem immisceto Aluminis,

Quod prodidimus emplastrum non multo antea:

Ac vitior ad omnia recentia vulnera.

Ipsi verò rhodion liquefacto immisceas,

Paulum ac ceræ, liparon habebis ac bonum,

Album vinum, parum austerum, si affuderis.

Aluminis, cuius meminit, compositio in quinto huius operis commentario.

Galenus

GALENI DE COMPOSITIONE MEDICA-
MENTORVM PER GENERA
LIBER SECVNDVS

ARGVMENTVM LIBRI

Exponuntur Emplastra Viridia, Melina, Gilua, ac Ceteris coloribus prædita, tum quædam quoque, quæ Cephalica ac Catagmatica appellantur.

*Qui Authores scripserint de Componendis Medicamentis: ac de Ratione ipsorum Componendorum
Exemplo medicamenti ex cera, yosaceo, & æruginè confecti.*

CAP. I.

B



VM propositum opus hunc quoque cum alijs scopum teneat, ut si quoniam librum, quo medicaminum, quibus utimur, compositiones scriptas habemus, perdidimus, ipsi nos perditis similia possimus conficere, necessarium est primum nos in vniuersum formulam quandam viam didicisse, qua propositum inueniamus. Deinde per hanc viam in multis particularibus exerceamur oportet, sciens citra talis studij exercitationem, nullum recte opus perfici. Et vero graue est, quod iam quibusdam accidit medicis duobus mihi cognitis, quorum alter dolore ex talium scripturum interitu contabescens periit: alter ab operibus medicis destitit. Verum exercitatus iudicio meo, præterquam pharmaca vtilia componere, et a superioribus nobis medicis scriptorum arbitris esse licet, comode quoque omnia ea, quæ ab illis prodita sunt, usurpare, atque illa, quæ ipsi methodo inferius posita inuenerint. Melius igitur est experimentis iam comprobata sumere eum, qui usus ipsorum methodum didicerit, licet, quod dixi, necessitas frequenter nos cogat, ut vel experientia incomptis ex tempore utamur. Itaque superiore libro quo ex argenti spuma sola emplastrum præpares docuimus, interim oleo tantum, interim aceto admixto, vel vino, vel huiusmodi alio: item ex quali ipsorum symmetria emplastrum fieri candidum possit, si probe coctum fuerit. Ceterum ex his emplastris quædam ducendæ cicatrici accommodata fieri diximus, quædam vlcibus cruentis glutinandis, quædam phlegmonis exiguis curandis: quædam vlcibus quæ cicatricem agere admittunt sanandis, si non cacoethe sint: quædam ad tumores præter naturam, sed non magnos neque duros, discutiendos. Scriptum simul in eo est non multo post initium, & emplastrum à me compositum, quod Phœnicinum nomino. Præsentem autem hoc libro de viridibus, & melinis, & giluis, & fuscis, & rufis agatur emplastris, quibus etiam adnumerantur quæ dichroma id est bicolora, dicuntur. Inter hæc alia quædam sunt medio inter hæc nomine, ut ex candido melina, & ex nigro viridia, & à similitudine sordium rhyode græcè appellata quasi strigmentosa: adde quæ aerem imitantur, & cœrulea: quædam vero nomine prorsus carentia. Itaque similia inuicem viribus deinceps scribere commodum est, ut qui in plura incidit, vel librum legit, id quod optimum corpori, eius quoque curando affectui sit, eligat. At colore similia tradere, eorum est qui similitudinem non artificialem attendunt: verum quoniam potentes quidam viri interdum nos iubent emplastrum sibi melinum conficere, quod vlcera glutinet, vel cicatricem ducat, vel indurata emolliat, vel aliud huiusmodi facere possit, coacti sunt non nulli recentiorum medicorum, ubi similia colore feriatim conscriberent, proprias cuique professiones apponere. Quamobrem ego multam quædam disciplinam conabor effingere, à magis artificiosa auspicatus. Scribo enim prius, quæ caua vlcera carne implent, quorum plurima colore viridia sunt: adnotans, quot ex his glutinantia sint, quotque in maligna euadentibus medeantur, atque huiusmodi aliud quidquam possint perficere: Deinde de glutinantia non modo recentium vlcerum, sed etiam linuum: ex his & plura sunt, quæ ad vlcis cicatricem vlcera perducant. Atque horum omnium vnam seriem facturum sum, melinorum aliam, barbarorum (ut vocant) aliam, & fuscorum aliam, nec non in reliquis coloribus similiter. Producam in alio quoque vno libro similitudines absque coloribus, quæ vlcera cicatricem vix admittentia (dicuntur & chironia) persanant. In alio rursus post istum, quæ tum hæc, tum alia quædam, curant, quæ dicuntur & sunt usus multiplicis. Ac post hæc omnia, quidquid emplastrorum facultatum reliquum fuit methodo cognoscendum, percensere conabor. Hæc igitur vice proœmij cuiusdam omnium emplastrorum, quæ commemorabuntur, communis præfati, ad ea quæ hoc libro scripta sunt, digrediemur, oratione quadam generali eis præposita, tanquam nihil etiam mihi iam prædictum sit. Compositiones medicamentorum complurium laudabilium primus omnium, quos nouerim, Mantias Herophileus scripsit: cuius discipulus factus Heraclides Tarentinus non solum in pharmacorum usu videtur imitatus illum, sed etiam in ea artis parte, quæ victus rationem docet. Post quos alij sanè quidam non paucis voluminibus, sicut Mantias & Heraclides. Sunt et qui vno aut altero tantum ea conscripserint, quemadmodum Cappadox Heras, qui nec impro-

Quinta Classis.

eeeeee η barum

batum aliquod medicamen tradidit, nec confecturas ipsorum omisit, & vniuersos particulatim E
 vsus recensuit. Per multa pharmaca pluribus libris studiose scripserunt Musa, & Asclepiades, &
 Crito. Verum Andromachus vnico libro medicinalia medicamenta ad exteriora corporis vitia:
 altero, quæ interna curant, memoriæ prodidit: item tertio his minore, oculorum remedia. Paucissi
 mis autem ipsorum tum præparandi modus, tum vtendi, appolitus est: neq; verò horum quispiã,
 nec alius, cuiusq; pharmaci componendi rationem docuit. Ob quod Empirici confidentius, licet
 absurda, pronunciant, vt qui pharmacorum compositionis inuentionem ad calum referunt: inde
 nimirum confidentiæ occasionem sumentes, q; nemo ex dogmaticis medicis confectiois eorum
 regulam absolute scripserit. Nam cum dogmatici interrogati rationē, qua pharmaca singula com
 posita sint, quibus vtuntur, nihil, quod dicant, habeāt: perditis q; illorum scriptionibus ipsi alia cō
 ponere ex tempore non possint: & ipsi merito contemnuntur, & Empiricis contradicendi maio
 rem præbent audaciam. Quod si affectus cuiuslibet eorum, quos curandos suscipiunt, naturam
 scirent: methodum q; cognoscerent, qua & simplicium singulorum medicaminum vires, & sco
 pum curationis, inuenirent: non vtq; compositionis rationem ignorarent. Vt exempli gratia, ca
 uum vlcus apertum, græce aperistaton (nihil enim mali est, vt quidam vocant, breuioris discipli
 næ gratia sic nos quoq; nominare) quomodo quis sanare queat, consideremus: tanq; si non dum F
 aliquod eicurando aptum medicamen inuentum sit. Nam cum docti à ratione fuerimus cauerū
 vlcera curationem subministrari, nascente alia carne loco perditæ, ex ea videlicet quæ subiecta
 est, cogitauimus fieri nō posse hoc, si in vlcere sordes, aut copiosa humiditas, insit. Verum sordes
 medicamina detergentia auferunt, humorem exiccantia discutunt. Conuenit igitur huiusmo
 di pharmacorum materias cognoscere non simpliciter secundum genus, vt Dioscorides alioqui
 scripsit, sed vti nos in commentarijs de Simplicibus medicamentis fecimus, non tantum apponen
 tes vel calefacere, vel refrigerare, vel huiusmodi aliquid aliud quoduis medicamentum facere, ve
 rum etiam quod prima distantia, vel secunda, vel tertia, vel quarta, à medio tale existat. Frequen
 ter etiam, q; in horum media vnaquaq; vel incipiente, vel desinente sit: vt duodecim, pharmaco
 rum quæ per excellentiam quancunq; proferuntur, ordines substant. Interdum enim vel medio
 critè calefaciens, vel exiccans: interdum quod vehementissime quoduis horum facere possit, re
 quirimus. Qui autem simpliciter particulam calefactione indigere intelligit, non magis piper &
 sinapi, quam thus, accipiet. Hæc sanè & prius ostēdimus, diximus verò & in tertio Methodi the
 rapeutices commentario: quasi verò præscientes ea ex demonstratione conuenienti, ad reliqua
 deducam, hinc præsentis sermonis sumpto initio. Quoniam vlcera carne implenda, pharmaco G
 exiccante & detergente mediocriter line morfu indigere demonstrauius, conuenit eiusmodi
 pharmacorum materiam, quæ nam sit, in memoriā reducere. Indicata est autem in libro de Sim
 plicium medicamentorum facultatibus, insuper & conueniens singulorum ordo expolitus est.
 Hoc etenim, sicut dixi, admodum vtile est, vt si quando fortiore quis pharmaco opus habeat, ad
 quod digrediatur, cognoscat. Verum cum simplex nullum habemus, composito vtimur. Atque
 primum fingamus nos habere ceram & æruginem, aliud nihil, quod cauo vlceri manifeste con
 ducat: thus dico, irim, aristolochiam, farinam eruorum, radicem panacis, & quacunque ex hoc
 sunt genere. Cum igitur sciamus cera sola impolita sordidum vlcus euasurum, vt quod neque de
 tergere, neq; exicare, possit: æruginem autem adiecta morsum & rosionem illatum iri, atq; phleg
 monem excitandam: horum sanè vtrunque deuitabimus, medium autem ex ambobus aliud con
 ficiemus, imbecillius quidem æruginem, valentius autem cera: sed quoniam hæc paululo inferior
 est eo, quod commodè queat adhi, ærugo autem multum præcellit, multæ ceræ parum æruginis
 admiscebimus. Quantam ergo quantæ? hoc enim deinceps venit dicendum. Exactè quidem quā
 titatem cuiusque ante experientiam inuenire nemo potest, conijcere tamen, & iudicare, & compo
 nere pharmacum prima potest experientia, nullum insigniter improspere successum habitu. H
 rum: Quemadmodum ego aliquando feci in quodam vico, vbi cum neque ipse medicamentum,
 quod me sequeretur, haberem: neq; alius ex ijs, qui ibidem agebant, copiā mihi facere posset: rep
 peri solum ad compositionem idonea æruginem & ceram. Quibus acceptis, & ad ignem cera li
 quefacta cum oleo rosaceo, vt liquidum ceratum fieret, miscui cerati libræ vnciam vnā æruginis,
 hoc est duodecimam partem: statui enim decimam, vel duodecimam miscere, suspicatus quidem
 maiorem, vt acriorem, cera futuram: minorem, tanquam imbecillio rem. Expertis autem nobis
 compositionem visa sunt partes & decima & duodecima rectè pro corporum differentia commi
 sta. Ostendimus enim, quod etiam vsus attestatur, valida corpora validiora sustinere medicami
 na, imbecilliora huiusmodi non ferre. Validiora dico corpora, quæ temperamento sicciora sunt,
 veluti agricolarum naturam, & venatorū: imbecilliora, molliora vel natura, vel victus consuetu
 dine, cuiusmodi sunt mulierum, eunuchorum, puerorum, & qui naturali temperamento sunt hu
 mido, cadido molli q; corpore præditi. Dura igitur corpora ex copiosiore æruginem cerato admista,
 carnē recipiunt, molliora ex pauciore. Vnde, vt frequenter dictū est, vnum pharmacum omni
 bus nequaquam conuenire potest corporibus, sed oportet medium esse, ceu ad mediam temperaturā
 aptatum: duci vero ad vtranq; eius mediæ partem, dum quotidiano vsu probatur. Si. n. qd' res po
 stulat

Astulat effecisse videat, in eo manere conuenit: si paulū deficiat, augere ipsius vires: quēadmodum etiam adimere, cum prater modū efficax fuerit: Velut in ipso hoc proposito pharmaco quod cerato & æruginē constat, considerare prius oportet, vlcus ne carne obductum sit, an non dum, sed sordibus humore q̄ sit refertum: vel prater q̄ carne impletum non est, mordicationis sensus aliquis laboranti ortus sit: & calidior, vel rubicunda magis, pars vlcera appaueat. Si igitur imbecillius videatur, melle vel æruginē admistis potentiā eius adaugebis: si validius, oleū vel rosaceum miscebis, molliens pharmacum, quod linamentis excipiendum est. Cōmodē quidem ceratum & ærugo sic miscentur, quemadmodū à me non nunq̄ esse mista retuli. Confectura autē medicantibus hæc esto emplastri cōpositi, Viride à colore vocant, sanantis quidē & recentia vulnera, quęcunq; non magna sunt, sed quod ex rhodino simul ad mediocris pharmaci consistentiam potest liquesieri. Quin & resina, vel colophonia, & fricta nominata, vel terebinthina, nō nihil ipsum habere oportebit: ostendimus autē loricē vocatam terebinthina quodāmodo esse similē. Porro quātitas earum misturæ & hic coniecturalis est. Si. n. plus resinæ q̄ ex vsu sit admisceamus, donec manibus subigitur, molle apparet: in linteolum verò illitum, paulo post instar pellis durum erit, facile à corpore decidens. Sin minus iusto resinæ cum cera mistum sit, non habebit hoc quod echel-
Bcollon idest glutinans, Gręcis appellatur, vt distrahendo eo, plurimum extendat. Liqueat autē si aliqui particula imposueris, fore vt difficulter agglutinetur, & protinus ab ipsa delabatur. Quæ igitur mediocris mistura, seu emplastri consistentiæ conueniens: si quidem mihi fidem adhibes, par vtriusq; portio. Nec verò cera, nec resina, sicca vetus q̄ esto: optimum siquidem ita amborum mixture coagmentum est, si ambo pingua & mollia assumantur: si alterum excedat, semper resinā prepollere satius est: quare non nulli vel duplum huius pondus ceræ admiscunt.

Confectura Simplicis Emplastri Viridis Andromachi, & Virtutis ipsius explicatio. CAP. 2.

AC sanē viride non nulli, sic. n. ipsi nominant, ex dupla resinæ portione cōfecerunt: duas quidem eiusdem libras, vnā verò ceræ, & binos olei cyathos, immiscentes. Æruginis autem alij duas, alij tres vncias, huiusmodi ceræ & resinæ mixture immittunt. Sed ē in præparatione, liquesfactis, quæ liquari possunt, æruginē inspergūt: quidam vbi refrigerauerint, mox raserint, in mortario mixture moliuntur. Porro qui medicamentū cruentorum vlcum glutinantius facere statuunt, æruginem in pila prius cum aceto leuigatam iniiciunt, ceratum radentes. Proinde si quis vos roget, quale horum viridum emplastrorū sit præstantissimum, succurrat id, quod identidem à me prædicatur, respondere omnia esse optima ei, qui affectus, quibus singula offeruntur, cognoscit, sicut & eos ignorantia omnia pessima. Mei etenim officij est dicere, id exiccare valentius, qđ acetum assumit. Constat autē, quod plus æruginis continet, id tum validū esse, tum magis exiccans, tum sordida vlcera rectius purgare. Terminus ipsius est, vt hæc citra morsum efficiat: nam adeo valens, vt iam puris vlcibus impositum morsum pariat, nec ea vnquam carne replebit, sed alio modo humida sordida q̄ reddet, sicuti illa, quæ parum integrè siccant detergent q̄. Iam verò ex acrioribus cauum magis vlcus euadit, & rubicundius calidius q̄ est, cum æger etiam ipse morsum eius percipit. Ne igitur quoduis medicamentum simpliciter laudate citra dispositionis, in qua commendatur, appositionem: nec in alio quoquā pharmaco, nec in ijs, quæ modò nobis proponuntur, id agendū est. Quos igitur viridibus ordine suo descriptis affectus, quibus ea conueniunt, distinguere non piguit, minus peccant q̄ ij, qui ne hoc quidē fecerūt. Qui verò sine distinctionibus ac indefinitè scripserunt, cū ad alia transeunt, apponentes, Aliud viride, disciplinam reddunt prauissimā, si modò oportet omnino disciplinā vocare huiusmodi scriptiones. Igitur Andromachus in libro, quē externorū inscribit, paulo post principiū primē fusca posuit, mox rufa, deinde nigra, postremò ad viridia conuersus disciplinæ huiusmodi initium fecit, præfixo nomine, Viridia. Ac quod principem locū habet, scripsit his verbis. *Viride Galli.* Resinæ strobilinae denariū pondo trecentū, ceræ denariū pondo c, æruginis rasæ denariū pondo l, thuris denariū pondo xxv, aceti quantū satis est. Cōueniebat igitur ipsum nō nihil forsitan & de confectura dixisse, nū etiam thus simul cum æruginē in leuorem redigi aceto affuso velit, an solam æruginem: vtrunq; enim licet, atq; in multis compositionibus non nulli hoc, quidam illo modo, scripserunt. Verum in hoc mentem eius conijcere possumus, nempe ambo cum aceto velle conteri, thus puta & æruginem: attamen, in quibus nam affectibus medicamento sit vtēdum, significatum prorsus oportebat. Nunquid igitur, quoniam ante hoc, duo quædam emplastra scripserat, quorum priori preposuit, Ad gangrenas, putredines, nomas vetustas & malignas. secundo, Ad nomas quo vtor, & alia pleraq; ideo viride istud sine appositione deinceps protulit, ostendens ipsi ipsam affectibus conuenire? Ceterū aliud rursus huic subiungens simpliciter dixit, Viride Potamonis: deinde aliud tertium viride, & quartū, quo vtor. Ad hæc quintum aliud, sextum, septimum, octauum, nonum, decimum, vndecimum, duodecimum, decimumtertium, decimumquartum, decimumquintum, decimumsextum, recensuit, vno duntaxat hoc nomine, Aliud, singulis preposito, differentia quidem inter se omnia viribus cōmemorans, non tamen vniuersa ad putredines, nomas, & gangrenas idonea, quemadmodum ex ipsorum materia est cognoscere. Vnde etiam constat pro coloris, non virium, similitudine, simul inuicem hæc ipsum conscripsisse. Itaq; nos cuiusq;

*forte pro ἐμ-
μέσου i. me-
diocis, legen-
dū ἐμώτου, i.
linamento ex-
cipiendi.

eorum potestatem exponemus, à simplicium medicamentorum natura sumpto principio. Nam E hoc longè vtilissimum fuerit ijs, qui non solū in vniuersali compositionis methodum, ac vsum talium medicamentorum, cupiant intelligere, sed etiam suomet ipsorum Marte conficere posse, & quæ à veteribus citra distinctionem tradita sunt, qualem nam potestatem habeant, dignoscere.

Quod igitur primum Andromachus prodidit, inspiciamus, proponētes considerantes q̄ simplicia singula, quibus confectum est. Primum igitur resina strobilina in eo meminit, quæ ut in cōmentarijs de simplicium medicamentorum facultatibus asserui, resinarū longè calidissima est, sicut terebinthina ambabus qualitibus omnium moderatissima: omnes siquidem resinae calefaciunt & exiccant, sed hæ magis, illæ minus. Validissima igitur est strobilina: moderatissima, ut dixi, terebinthina. Quin etiam liccat celerrimè strobilina: & quod peculiari appellatione pitynon physema dicitur, resina quidē & ipsum genere, ceterū siccans & calefaciens, liccando autē à strobilina nō superatur, calefaciendo plurimum. Hæ ergo exiccata pinguis expertes sunt, ideo q̄ emplastra bene adhærentia conficere non habent, ut viscosæ & liquidæ. Inter pitynon physema id est picea, & strobilinam resinam, media calore abietina est, liquida tñ diutius perdurat, sicut etiam colophonia illa, quæ thus redolet, & quæ non nullis sola vocatur colophonia, odoratu suauitatem quandā referens sicut abietina, & colore mediocri prædita ut illa: nascitur autē admodū modica, atq̄ ob id pretiosa est. Humidissima tñ omnium est altera laricis appellata differentia, nam hæc quoq̄ duplex quodammodo est, vna quidem similis in omnibus terebinthinæ: altera hac acrior, calidior, magis liquida, & odoratu grauior, & gustu amarior, calidior q̄. Porro humida resina quæ in continentibus pineam resinam sublidet vasis fictilibus, consistentia & colore terebinthinæ ad amissimū similis, odore & gustu diuersa, ingratiior quidem olfactu, sicut etiā acrior & gustu mordacior. Quare satius est terebinthinam omnibus medicamentis, quæ vlcerā rectè curabūt, admiscere, quoniam primus præcipuus q̄ in eis scopus est, ut id, quod offertur, non mordeat. Igitur ad compositum emplastrum reuertamur, in quo Andromachus strobilinæ resinæ denarium pondo trecen-
torum, ceræ denarijs centum mistis iubet inijcere, neq̄ consistentiam neq̄ virtutem exactè affectus vel ipse, vel qui id composuit. Neq̄, n. glutinans erit, & acre fiet: auxilium verò ei ad vtrunque contulit thus admiscens, verū pro illorum copia paucum adeo, præsertim cum æruginis denarios quinquaginta immittat, octauam partem quadringentorum ex cera resina q̄ collectorum ex plentes. Atqui nemo hoc illi vitio verterit, utpote cui consiliū fuerit medicamen conficere vehementer exiccans, cum & alioquin ipsum carni generandæ, ac mediocribus glutinadīs vulneribus, aptum reddere volenti drachmę quinquaginta misceri rectè possint, ita q̄ lenius, ad carnem pro-
ducendam commodius, adhærendo pertinacius, & ad multa vtilius fieri. Commendāda verò est thuris commistio, q̄ emplastri coagmentum iuuat, anodynū enim est, & concoquit. Quare si æqua ipsius portio ærugini fuisset coniuncta, hoc est denarium pondo quinquaginta, glutinantius, ut dixi, redditum fuisset, & mitius medicamentum. Quoniam verò viginti quinq̄ adiecit, liccantem æruginis vim seruare curans, emplastrum ad glutinandum maiora vulnera, & vlceribus vix sanabilibus curandis, idoneum factum est: quod q̄ tale ipsum fore in animo habuerit, aceti quoq̄ mistura innuit. Penes nos itaque est & vehementius & lenius ipsum facere, vel plus aceti, vel minus miscentes, sicut acrius, vel minus mordax: etenim ex acrioris mistione, quemadmodū etiam copiosioris, medicamen exiccabit fortius, & cruentorum erit glutinantius, si vinosum acetum sit adiectum. Porro præstat in compositione plusculis diebus æruginem ex aceto acri, in Sole calido allæuigare: quod enim in eo mordax est, mitescet, virtus q̄ nihilo fiet minor. Thus autē initio admiscere necessarium non est, verū huic dies vnus satis est. Siquidem meminisse vos puto & huius quod toties repeto, fortium medicamentorum, cuiusmodi est ærugo, misy, chalcitis, forri, æris squama, vel chalcanthum, ex aceto diebus pluribus contritorum mortum obtundi, bonitatem augeri. Quoniam enim metallica, ut quæ crassioribus natura constant partibus, potestatem suam in altum vsque corporis, quod curatur, non extendunt: ideo ut tenuiora fiant, ijs per trituram & acetum adhibendus est cultus: hæc enim curiosè ita attenuata ad intima vsque penetrant. Accedit autem & aliud quoddam cōmodum in huiusmodi medicamentorum præparationibus, q̄ diligenter elaborata corporis meatus nusquam inter eundem retenta pertranseunt: eius q̄ rei gratia & si calidioris naturæ sint, sine morfu munere suo funguntur. Quin & inter humores ipsos in corpore generatos, tenues faciliè citra morsum perspirant: crassiores retenti obstruunt q̄ molestant, ubi mordaces fuerint. Eadem ratio est in metallicis medicamentis cōbustis, sed illa ex ignis cōmercio non nihil mordax perseruant, quod per lauaciones deponunt, ac lenia prorsus redduntur. Quibus autem simile quippiam vsioni ex tritura cum aceto in Sole facta ignis loco accidit, ea neque ex igne genitum calorem consequuntur: si tamen & quæ combusta sunt, ex aceto læuigantur, multo præstantiora fiunt. Igitur tum hæc multorum medicamentorum communia, sunt cognitu necessaria, tum vsus ipsorum similiter, alius quidem in alijs affectibus: in cauis verò vlceribus cum linamentis excepta imponuntur. Propositum itaq̄ emplastrum si ex rosaceo liquefaciens eo vtaris, prodest sordidis & humidis vlceribus: aperistata verò id est aperta, mordicat: cuius rei causa miscendum ei est ceratum liquidum ex cera & resina confectum, vel ex rosaceo, vel ex oleo

A ex oleo liquefactum. Poteris interim & myrteo uti, atq; horū mīstionis methodum quandam intelligas oportet. Olei sanē nomen vnum est, qualitas & facultas diuersa. Nam omphacinum frigidius: ex maturis oleis pressum calidius est, temporis autem processu calefaciendi vim auget. Sic etiam quod salem habet, quantum ex illo sumperit, tanto calidius est, magis q; liccat q; quod ipsius expers est. Quod furculos oleæ, thallos Græci nominant, continet, valentius adstringit. Indicat autē tibi id quod est vtilius & vlceris forma, & corporis ægri natura: vlceris quidem sanandi, contrarijs: corporis autem vlcerati, similibus. Quapropter medicamentum, quod linamento exceptum immittendum est, myrteo liquefacies, cū generata caro flaccidior quā par est, apparet, præsertim vlcere ad cicatricem perueniente propemodum. Nam cum pauxillum quiddam phlegmones in ambientibus particulis relinquitur, optimum est pharmacū ex rosaceo liquare. Rosaceum vero præstantissimum esse nouisti, quod solis rosas pluribus in oleo citra salem preparato diutius maceratis confectū est. Si ergo hæc quispiam in memoria prompta semper habeat: nec oblitus sit, vt præcepimus, omnium simplicium medicamentorum potentia: & varia ipse emplastra viridia cōponet, & singulis iam confectis optime utetur. Emplastrum igitur hæcenus in sermone propositum, quod primum viridium scripsit Andromachus, multifariam licet adaptare, partim

B pro strobilina resina aliquam aliam adiiciendo, partim thus augendo, vel cum eo siccum aliquod carne explens, velut irim, aristolochiam, erui farinam, atq; huius generis alia admiscendo. Quin etiam, quod ora vlceris indurata emolliat, miscendo, compositionem variare licet. Vnde nō nulli guttam ammoniaci, & chalbanum: non nulli medullam ceruinam, aut vitulinam, aut seuum admiscuerunt: sicut rursus alij repellēs aliquod, dum influxus conantur reprimere. Hac ratione igitur alij fistulam alumen, alij rotundum, alij gallam omphacinam id est immaturam, adiecerunt: quidam ladanum vtrāq; virtute præditum, molliendi videlicet & repellendi, vt labra emolliantur, & nihil ex superioribus influat. Insuper qui vix sanabilia curare studuerunt, vt multiplicis vsus medicamentum esset, adiunxerunt enumeratis chrysocollam, vel diphryges, vel æs combustum, vel squamam, aliqui æris, aliqui stomomatis †ferri. Et propē omnia modo enarrata, viridium emplastrorū colorē seruant: alia verō iisdē facultatibus prædita mista corrumpunt. Quare nec ego omnium memini pro qualibet facultate, sed illorum duntaxat, quæ emplastri compoliti colorem tuebuntur: non enim de glutinantibus, vel ijs, quæ carni alendæ sunt, emplastris simpliciter, verum de eisdem viridibus, dicere ēt statuimus. Quamobrē hæc modo narrata, & atramentum sutoriū, & chalcitis cruda, si breui mensura admisceantur, colorē pharmacorū in sermone præcedentium

C reseruant. Itaq; de taliū compositione abunde satis actum est. Vsum vero ipsorum qm Andromachus omisit, a quo traditum esse conueniebat, nos apponemus, communem vnum de talibus medicamentis vsurpandis sermonem planē necessarium præfati: deinde vniuersalē methodum interpretati, particulares, eorum causa qui illam didicerunt, conuenit effingamus. At huiusmodi opus ad dialecticos pertinet in omnibus particulares ipsis perscribere, sicut Heras, Crito, Aesclepiades, alij q; complures fecerunt. Atqui etiam tertia disciplinæ species est, quā nos tractamus, neq; in omnibus particularibus medicamentis vsum scribentes, immo nec vniuersim cōmuni methodi disciplinæ soli totum concedentes, sed hanc quidem primam docentes, inde verō vnum vel alterum, vel etiam tertium exemplum, claritatis & exercitiij discentiū gratia accommodantes. Quē admodum sanē ea & nunc re ipsa ostendimus, vt iam in prioribus quoq; fecimus. Nam quatenus medicamentum exiccet detergat q; cū ex simplicium facultate, quæ id constituunt, inuenerimus, inde simul dispositionem, cui conueniet, indipiscemur. Vbi enim humiditas multa & copiosa fordes est, desiccans euidenter purgans que medicamentum applicare oportet: vbi apertum (Græci aperistaton vocant) vlcus est, carnis indigum, moderatissimum inter exiccantia detergentia q; cōpetit. Verum minoris maiorisq; in eo rationem ab ægri natura sumere conducit. Siquidem durioribus vel ex temperamento naturali, vel ætate, vel loco, vel studiis, corporibus magis exiccantia exhibenda sunt, humidioribus minus. Quapropter primus cuiusq; medicaminis linteolis excepti (emmoton Græcis appellatur) vsus ex prædictis nuper scopis cōiecturali artificio sumitur: Secundus, vt etiam antea monuimus, ex signis in corpore curando apparentibus. Si nanque cauum vlcus citra phlegmonem, & purum inueniatur, nihil nouum tētare oportet: si humidius vel sordidius, intendere desiccans detergens que pharmacū ratio postulat: si cauum magis quā prius exiit, soluere. Intenditur itaque mellis mīstione: mitigatur ex oleo & cerato, vel oleoso quoqiā, cuiusmodi est rosaceum, myrteum, & cyprinum, simpliciter præparata sine spissamentis (stymmata Græci vocant) quæ addunt odoris gratia, vel vt confecta diutius ab iniurijs immunia permanent. Iam vero si contentiosus quispiam nos increpet, tanquam præter id, quod ab initio instituiamus, ad medicamentorum vsus orationem deducamus, polliciti nos de eorū compositione verba facturos, ille considerato, qm in vsu etiam confectura quædam fit, silentium sibi imponat. Prima enim pharmacorum, quæ cerato miscentur, in eo confectio est: altera rosaceo, vel myrteo, vel cyprino, vel lentiscino oleo, vel melle appolito constat. Atq; de his satis. Verū ad emplastra quæ iam per experientiam abunde probata sunt, transeamus. Hæc igitur Andromachus memoratu digna medicamenta vsurpare ipsa sciētib; præscripsit. Vnde cum talia sint, ea deligenda,

† Debet addi
aliqui vel qd
simile.

DE COMPOS. MEDIC.

quæ ex paucioribus, paratū ve facillimis simplicibus componuntur: tum quæ ad plura valent, & E
proposito maximè scopo seruiunt. Res fiet exemplo ita dilucidior. Finge cauum vlceris apertum
in sano corpore: tale verò ab emplastro viridi, quod Lite vocatur, liquefacto ex rosaceo curabitur:
appellant autem Lite quod ex æruginē, cera, & resina conficitur. Ego sanè, vt ostendi, æquam
vtriusque portionem misceo, æruginis decimam, vel duodecimam, vel octauā. Est videlicet duo
decima, si ceræ pondo, & resinæ tantundem, æruginis vncias duas miscuerimus: Decima, si dua-
bus æruginis vncijs, viginti ambarum, resinæ & ceræ, hoc est vtriusque decem, adijciantur: Quin-
etiam si octauam æruginis partem cerato ex cera & resina confecto apponamus, etiam sic bene
habebit: nam acrius quidem magis que detergens huiusmodi medicamentum erit, non tamen in
utile, duris enim corporibus percommode adhibebitur. Melior euadet compositio, vbi octauam
portionem æruginis confecturæ ex cera resinæ que immiscuerimus, æruginē ex aceto quàm acer-
rimo diebus plussculis antè in læuorem redacta. Præstantior erit, si etiam thuris partem dimidio
maïorem, quàm fuit in æruginē, indiderimus. Olei pares numero cyathos æruginis vncijs adijun-
ges, cum sine aceto & thure medicamen conficis. Quando autem thus, acetum que adijcis, si qui-
dem fricta resina pinguior quodammodo mollior que sit, ac æstate pharmacum præparas, misce-
bis nihil: si verò dura, id quod per hyemem conficis, cyathum vnum infundes. Quod si liquidarum
quampiam resinarum ceræ misceas, oleo prorsus carere licet. Liquidissimæ quidem tertiam ceræ
portionem addes, minus liquidæ dimidiam. Fiet autem videlicet huiusmodi quædam compositio.
Ceram resinam que liquatam, vbi refrigeraueris, æruginis parti nunc octauæ, nunc decimæ,
aliàs duodecimæ commisceto: cognoscens duris corporibus primam symmetriam conuenire,
mollibus tertiam, medijs mediam. Æruginem ex aceto læuigabis, si lenius medicamentum voles
efficere, thuris pondus dimidium eius, quod ærugo continet, adiungens: sin hoc mitius, thus &
æruginem equali modo committes. Atqui & resinam cum cera, vbi sine rasura refrigerauerimus,
liquefactas, ærugini thuri que in pila ex aceto tritis superfundimus. Hæ igitur primæ compo-
sitiones sunt viridis emplastri, quod cruenta quidem vulnera non adeo magna glutinat, & reli-
qua adusque cicatricem sanare potest, & carnem in eis producere, ex humido quodam oleoso li-
quatum. Voco autem oleosa, rosaceum, quo maximè ad illum, quem retuli, modum confecto vtē-
dum est: & post hoc myrteo, cyprino, & lentiscino. Sed ipsum oleum, vbi medicamento liquef-
ti calor is quippiam adijcere cordi est, commune hoc miscebis: in quibus refrigerare studes, id quod
omotribes, hoc est immaturum appellatur: vbi adstringere, myrteum: vbi mistæ facultatis ali-
quid, concoquens puta & repellens, rosaceum: in quibus modicam adstringendi vim cum ma-
iore caliditate desideras, cyprinum & lentiscinum. Porro & pleræque aliæ dixi quemadmodum
cōpositiones erunt, dum medicamenti simplicibus modò cōmemoratis, vel carne ex plentia, vel
emollientia, vel adstringentia, vel que difficilia vlceras curant, commiscuntur. Non nulli verò di-
gerentia miscuerunt, sicut etiam cicatricem ducentia. Alijs autem quibusdam omnia commiscen-
tibus, vel confecturam inutilem, vel medicamentum varijs accommodum, præparare contigit.
Quorum materias cognoscens, tum iam inuentis vtī, tum similia componere, ipsi poteritis.
Adscribam tamen & ego non nulla celebria, ab ijs denuò, que Andromachus tradidit auspica-
tus. Sunt itaque ordine à præcedenti triginta: que verò ab ipso commendantur, duntaxat adij-
ciam. Quartum ergo post primum ita expressum est. *Viride, quo vtor.* Æruginis rasæ dena-
riūm pondo nouem, chrysocollæ denariūm pondo nouem, terebinthinæ pondo minam vncia-
rum sedecim, ceræ minæ dimidium, aceti parum. Quid singula emplastra polliceantur, non (vt
prius dixi) præposuit Andromachus, sed ex simplicium medicamentorum materie, ex quibus
propositum componit, nulli obscurum est vel ipsum per se, priusquā liquefiat, vlceribus mederi
posse, ac liquatum linamēto exceptum immitti. Minam verò sedecim vnciarum iniicit, nam quæ
viginti continet, ceu ad chrysocollæ & æruginis equam mensuram, magna est. Post hoc verò
alijs tribus seriatim productis, rursus aliud sic ad verbum subiungit. *Aliud, quo vtor.* Ærugi-
nis rasæ pondo: manne vncias decem, ego libram iniicio: ceræ, resinæ frictæ, resinæ liquidæ, sin-
gularum pondo quinque: olei cyathum, aceti quantum satis est: ego etiam guttæ ammoniaci pō-
do vncias decem pono. Post hæc Andromachus cessat. Liqueat autem, si prædictorum memini-
mus, etiam hoc ipsum emplastrum persimilem superiori facultatem obtinere. Deinde aliud
scribens Andromachus, sic exorsus est. *Aliud Molochinum.* Ac postea simplicium pharma-
corum symmetriam, vnde ipsum conficit, his verbis subscribit. Æruginis rasæ pondo, picis
pondo duo, mannæ pondo, ceræ pondo duo, resinæ pondo duo, olei pondo, aceti quantum suf-
ficiat. Hoc itaque superioribus simile est. Manifestum verò est vtriusque & æruginis, & mannæ
parem portionem ex aceto læuigandam esse: duplam horum, ceræ, picis, & resinæ, hoc est cu-
iusque pondo duo, cum olei libra liquanda. Et licet in læuorem ex aceto redactis admiscere opor-
tet, vtī frequenter nobis dictum est, refrigerantes magis & radentes, quàm infundentes, ne
aere iam frigido encerides appellatas fieri contingat. Aliud ab hoc celebre emplastrum sub-
nectit. *Viride Hecatondrachmon.* Guttæ ammoniaci denariūm pondo octo, squamæ dena-
riūm pondo duodecim, mannæ denariūm pondo octo, resinæ siccæ denariūm pondo duo-
decim,

*minorem.

A decim, eruginis denariorum pondo octo, seu vitulini denariorum pondo quatuordecim, resine terebinthinæ denariorum pondo octo, ceræ denariorum pondo triginta, olei quartam cyathi partem, aceti quantum satis est. Hoc & magna vulnera glutinare potest, & fordida ulcera purgare: ubi ceratum inter liquefcendum adsumplerit, carni producenda est: prius quam verò liquefactum sit, crassas ulcerum oras sanare, & sinus iungere. In totum digerere & repellere potest: nam ex contrarijs facultatibus mistum est. Quod succedit viride nunc commemorato similis & potentie & usus, huiusmodi symmetriam obtinet. ¶ Terebinthinæ pondo minam, serapiadis herbae denariorum pondo viginti quinque, æruginis rasæ denariorum pondo decem, seu vitulini denariorum pondo viginti quinque, ceræ denariorum pondo viginti quinque, thuris denariorum pondo duodecim, cyprinum aridis adiicitur. Accmplastrum, quod ab alijs illis nuncupatur, ipse citra hanc appellationem in hunc modum conscripsit. ¶ Viride Epigoni. Quum autem omnes meminerint, nihilo minus & nunc simplicium in ipso medicamentorum symmetriam adducitur sum, quoniã non nulli in eis dissentiant. Iubet enim immittere æris vsti, salis ammoniaci, æris squamæ, æruginis, guttæ ammoniaci, aristolochiæ, & thuris, singulorum denariorum pondo octo, hoc est vnciam: aloes autem, myrrhæ, chalbani, singulorum sesquiplum, hoc est vnciam semissem, quod

B perinde est, ac si dicas omnium vncias vndecim et s: aluminis rotundi denariorum pondo sex. Misce etiam resinæ colophonis denariorum pondo ducentorum, ceræ dimidium hoc est centum, olei heminæ dimidium. Quosdam ait quartam partem miscere, aceti quantum satis est, dracontij radicis vnciam dimidium, quod est denariorum pondo quatuor. In fine autem hoc adiecit, quod in Iliadis scriptura non continetur, nam Epigonus id apposuit: atque hac ratione illis ab Epigono differt. Iam vero post nuper relata addidit Andromachus viride Pasionis hac symmetria. ¶ Resinæ colophonis denariorum pondo trecentorum, ceræ denariorum pondo centum quinquaginta, æruginis denariorum pondo octo, aluminis rotundi tantundem, æris squamæ denariorum pondo duodecim, thuris denariorum pondo sedecim, æris combusti denariorum pondo octo, salis ammoniaci denariorum pondo octo, olei dimidium cyathi, aceti quantum sufficit. Hoc medicamentum, quia salem ammoniacum prius assumpsit, magis quam superiora extrahit, magis que digerit, in alijs omnibus cum illis conuenit. Fortius autem magis quã ad multa utile prescripto post medium vnum recenset Andromachus, quod Viride Alcimionis nominauit in hac symmetria.

¶ Terebinthinæ denariorum pondo ducentorum, ceræ denariorum pondo centum quinquaginta, æris squamæ denariorum pondo decem & octo, æruginis rasæ denariorum pondo sedecim, aluminis rotundi denariorum pondo sedecim, chalbani denariorum pondo sedecim, thuris denariorum pondo decem, salis ammoniaci denariorum pondo duodecim, æris combusti denariorum pondo sedecim, aristolochiæ denariorum pondo decem, aloes Indicis denariorum pondo duodecim, myrrhæ denariorum pondo sedecim, guttæ ammoniaci denariorum pondo decem & octo: chalbani denariorum pondo duodecim, alij octo: olei heminæ dimidium, aceti tantundem. Aliud inde scribit, cui titulus Athena, id est Minerua, sicut ipse ad calcem refert. Porro simplicium eius medicaminum symmetria, vnde componitur, in hunc modum habet. ¶ Ceræ denarij pondo ducentorum quinquaginta, terebinthinæ denarij pondo ducentorum, frictæ denarij pondo centum, seu vitulini denarij pondo quinquaginta, chalbani denarij pondo viginti quatuor, mannæ denarij pondo viginti quatuor, salis ammoniaci denarij pondo duodecim, æris vsti denarij pondo duodecim, aloes denarij pondo duodecim, æris squamæ denarij pondo viginti quatuor, aluminis rotundi denarij pondo duodecim, & filij denarij pondo octo, chalcanti denarij pondo octo, misyos denarij pondo octo, opopanacis denarij pondo octo, eruginis rasæ denarij pondo sex, guttæ ammoniaci denarij pondo sex, minij sinopici denarij pondo trij, aceti heminas tres, olei heminas duas: minium initio inditur. Athena, hoc est Minerua, vocatur hoc emplastrum, vtilissimum multis, vt

D indicauimus. Quomodo autem vsui erunt emplastra multis vtilia, in sermone de ijs futuro significabitur. Ab hoc deinceps aliud viride his verbis conscripsit. ¶ Viride ex Cyprino Aphrodis. Ceræ denarij pondo viginti quatuor, resinæ aridæ denarij pondo duodecim: æruginis rasæ denarij pondo octo, Aphrodis denarij pondo duodecim: mannæ denarij pondo octo, cyprini dimidium acetabuli. Contunditur autem cum eo, & difficilibus curatu vlcibus potest conducere. Atque hæc causa est, cur ipsum scripserit, tum quod paucis constet, tum quod vtilissimum esse possit. Cum autem multa deinceps viridia alia multiplicis misturæ & vtilitatis adducat Andromachus, visum mihi est ea relinquere, & vt ipsi vocant, Litas duntaxat percensere. Is igitur sic ad verbum scribit. ¶ Aliud Viride Lite, quo vtor. Resinæ pondo libras duodecim, ceræ pondo libras octo, æruginis rasæ pondo libras octo, seu vitulini pondo libras duas, aceti pondo libræ: ego autem mannæ libram injicio. Liquefit igitur acetum cum duabus æruginis libris, & libra thuris, esse laeuigandum, sicut antea præcepi, deinde liquabilia his miscenda: dico autem seu libras octo cum ceræ octo, & resinæ duodecim. Emplastrum hoc Lite ad amussim foret, nisi adipem assumpserit, & mannâ: ita namque ærugo decima amborum simul portio esset, resinæ videlicet & ceræ. Quod si resina dura fuerit, omnino etiam olei quid addendum putabis, vt prius expositum est. Quoniã vero seuum vitulinum recipit, nec amplius exacte est Lite, vt quod molliens & concoquens medicamentum

† Codex antiquus addit, καὶ εὐπριχότερον, i. magis abstergit.

* duas legitur in antiquis. & ita omnino legendum videtur.

camentum acceperit: multo autem magis, si etiam manam assumpserit, quæ concoquit puri quæ mo E uendo est, & carnis gignendæ quandam vim obtinet.

Communis Sermo de Emplastris Colore similibus.

CAP. 3.

QUOD sanè medicamenta non secundum coloris, sed facultatis similitudinem, vnà scribi conueniat, manifestū planè est. Vt ergo Andronachus, sic alij quoque non nulli, ordine tradunt emplastra non solum viridia, sed etiam melina, fusca, & candida. Quo igitur modo fiant cādida, priori volumine dictum est. Viridium vero compositionis, licet antea expolitæ, nunc quoque mentionem faciemus.

Quomodo Viridia fiant.

CAP. 4.

AERUGO non pauca ijs immittitur, ut & aliorum colorem vincat, & omnia in suum permutet. Porro coniungere oportet eum, qui tale emplastrum conficit, præter æruginis quantitatem etiam colorem illorum, quæ ipsi commiscuntur: ad hæc coctionis rationem: in ijs quæ miscuntur quidem, colores pertinaces vitare, cuiusmodi flaua, & rufa, & nigra medicamenta obtinent. Dico autem flaua & rufa, qualia sunt melitites, chalcitis combusta, auripigmentum, sandaracha: nigra vero, quod genus sunt pix, bitumen, terra ampelitis, lapis gagates. At inter coquendū non oportet æruginem super ignem coeuntibus committere, verum ubi in mortario vnitas facta est, admiscere, si colore viride in medicamentum permanere desideras: sin autem melinum voles emplastrum conficere, intelligito in coctione æruginem primum in hunc colorem perducere: postea in giluum, ut emplastrum, quod dichromon id est bicolor, appellant, euadat. Etenim à coctionis tempore paucis diebus post, in summo quidē emplastri fuscus magis redditur color, in inum vero giluius currit. Quā vero de ipsorum colore quæ conueniebant diximus, rursus ad facultatis sermonem reuertemur memoria repetentes, unde primum hoc in libro exordium sumpsimus. Agere autē cœpimus, siquid meminimus, de medicamentis carnem generantibus: quorum potestatis icopus est, ut mediocriter & sine morfu detergeant exiccent quæ: at speciales confecturæ pro diuersa simpliciū pharmacorum materie distulerunt. Cæterum nemo ignorat ea, quæ propriè & primario læconica id est carnem progignentia, nominantur, aperta vlcera carne implere, hoc est, quæ causa quidem sunt, non ramen sordes, aut inflammationem coniunctam habent, magis verò etiam nec prauorū humorum influxionem, neque carnem in cauo vlcere intemperatam: nam prædictorum aliquod cavitati si immistū est, prius illud curādum. Scopi verò curationis ipsorum sunt, sordidis quidem detergentia pharmaca adhibere: eis verò, quæ ex influxione humorū proueniunt, exiccantia, atque repellentia id, quod influit: at si multum & contumax existat, fluoris causa prius amputanda est. G Constat autem & inflammatarum partium phlegmonem sanandam esse, carnem autem intemperatam habentium, hanc ad temperiem reducendam. Porro intemperata illa cum fiat quatuor sanè modis simplicibus, quatuor item compositis, per contrarias qualitates succurretur. Sed de his & postea. Nunc autem de medicamentis vehementer detergentibus agemus.

De Pharmacis vehementer Abstergentibus.

CAP. 5.

QUOD hæc ex prædictorum genere sint, quæ ob moderatam deterfionem cauis vlceribus, puris, apertis, sine omni morfu admovebantur, antea diximus. Intensam verò detergendi virtutem obtinent, quæ copiosas sordes auferunt. Quare non nulla ex prædictis viridibus medicamentis vna re solum, nempe æruginis copia, ab ijs quæ simpliciter carnem produciunt, euariant. Quædam & aliorum vehementer detergentium mistura, sicuti vocatum līs, & Machæionis emplastrum, quod nos pro more vsurpamus, Oleosum ex vsu nuncupant: ubi enim linum carne implere proponimus, copiosiore oleo liquefacientes per cornu recti foraminis, modo clysteris, porcine velicæ cōiuncti, ipsum infundimus. Quin & vocatis pyulcis, hoc est pus trahentibus, in eo utimur: etenim horum etiam ijs, quibus latius foramen est, ad huiusmodi administrationem commodi sunt. Perspicuum autem est linus oppletos sordibus ex meraciore hoc medicamento H purgari, id est oleo pauciore adhibito, rursus puriores ex humectato magis olei vberioris mistura. Itaque si paruē adhuc phlegmones linum infestantis suspicio quæpiam existat, medicamentum ex rosaceo prorsus liquefiat: sin à phlegmone fuerit liber, ex oleo: et si citra mordicationē veteris misturam sustinuerit, illo pharmacum liquetur. Cæterum in huiusmodi vsu non solum hoc, sed Machæionis quoque emplastrum, & līs, atque alia faciunt, quæ maiores nostri perscribere, cerato mista, cauis vlceribus carnem inducere. Omnia namque hæc sine cerati mistura ex oleo & rosacco liquefacta sinibus immittuntur, eo quod consistentia, quæ linamento excipitur (emmoton systalin Greci vocant) sinibus illini non potest. Pari modo & medicamentum siccum, quod combusta charta constat, rosaceo copiosiore diluentes, ipsis infundimus. Quemadmodū verò sinus liquidioribus pharmacis indigent, dum crassiora imponi nequeunt, ita quæ in summo caua vlcera asilugunt, crassius medicamentum desiderant, hac videlicet occasione, quod liquida statim ab eis decidunt, & linamenta sicca relinquuntur. Merito igitur in id genus vitij ceratum valide abstergentibus admiscemus, in sinibus oleum vel rosacei plurimum. Atqui hæc in eū modum abstergentia pharmaca omnino ēdigerunt, ideo quod vehementer exiccant: ac commune quoddā ipsorum genus efficitur, quod Greci polychrestum id est multiplicis vsus, appellant. Accedunt huic generi emplastra admodū acria, qualia

Aqualia sunt ea, quæ di halon id est ex salibus, nominantur: quæ non offerenda sunt ubi carne quid ex-
plere cogitamus. Nam præter alia hoc quoque sal eximium habet, ut adstringat magis quam purget: licca-
re vero nihilo minus quam aphronitrum ac nitrum potest: sed illa adstringendi facultatem non agno-
scunt, sicut nec Alia petra flos: atque huius rei gratia discutere, & ceratis admista ulcerum sordes
tollere, nata sunt: sal propter adstringendi potestatem hoc efficere non potest. Proinde cum hæc
in memoria habeatis, & methodum compositionis ususque omnium eiusmodi medicamentorum
audiueritis, deinceps illa quæ à clarissimis medicis propter optimorum medicaminum cognitio-
nem experimentis probata sunt, enumerabo, Primum sanè Mantia, atque eius discipuli Tarentini
Heraclidis sectatoris, permulta pharmaca, quæ subsequentibus annis per experientiam probantes
distinxerunt, & præstantissima eorum ipsi denuo literis mandarunt: quæ verò minus efficacie ha-
bere videbantur, omiserunt. Iure igitur et ego maiorem facio mentionem eorum, qui illis succes-
serunt. Sunt autem inter eos, qui in medicaminum experientia rectissime se gessisse videntur, Pe-
tronus, Musa, Heras, Andromachus, Asclepiades, & Crito. Iam verò Archigenis & Philippi stu-
diosi non pauca medicamenta prodidere. Quin etiam liber unus est Menecratis, cui nomen indi-
tum est, Insignium pharmacorum autocrator hologrammatos, quasi dicas imperator integris li-
Bteris descriptus. Quæ ergo pulcherrima ipsis tradita sunt medicamina, & commendantur, quo-
rumque nos inter omnia relata experientiam habemus, & quibus præceptores nostri usi sunt, ad hæc
si quod & nobis inuentum sit, deinceps adducam, quo singula genere contineantur, exponens.
Nunc autem viridibus relatis melina protinus subiungam.

Melina Emplastra.

CAP. 6.

Quemadmodum viridium emplastrorum plurima propter æruginem præpollentem talia
sunt, præsertim quæ sunt ex ipsis coloratiora, ita quoque melina. Sed viridia æruginem inco-
ctam habent: melina vero coctam quidam, sed mediocriter: nam si amplius coquas, bico-
lora emplastra quibusdam appellata, quibusdam gilua, efficies. Solent medici viridia simpliciter
melina & rufa nominare, quæ non adeo magna vulnera glutinant, & ulceribus cicatricem obdu-
cunt: quæ mos est medicis appellare aperistata, quasi dicas aperta. Item ex rosaceo liquefacta cauis
carnem gignunt. Multiplicis usus sunt inter ea quæ plura pollicentur. Quædam multa non pro-
mittunt, sed vnum mentione dignum, videlicet vel ulcera cacoethe bene curare, vel plus digerere,
vel meliceridas, vel duritias emollire, vel huiusmodi quid non contemnendum nec curatu facile.

Andromachus itaque quatuordecim melina conscripsit, ex quorum numero quinque æruginem ha-
Cbent, reliqua sine hac confecta sunt. Porro ex ijs, quæ æruginem constant, vnum quidem primum in-
ter quatuordecim positum est, alterum verò quartum, post hoc aliud sextum, inde septimum, &
decimum. Quibus ergo nihil eximij apposuit, omnia simul & conglutinant ulcera, & cicatricem
inducunt. Quæ si ex rosaceo liquefiant, carnem procreant: quin & mediocribus phlegmonis me-
dentur: sicut mediocres etiam duritias emolliunt, atque hoc faciunt euidentius, quæ guttam ammo-
niaci continent: his adhuc ipsis magis, quæ copiosiores reliquorum proportionem eam assumpse-
runt. In quibusdam vero apposuit ipse, tenerum, hoc est tenere cuti conueniens videlicet: & cui præ-
fixit, epispasticum & exipoticum, id est attrahens & cruens, innuit membrorum doloribus, synan-
chæ, & lateris cruciatui benefacere, vel interiores abscessus discutere: magis quoddam testimonium
his adferens, quam simplici sermone scriptis. Igitur omnia ipsa deinceps subiiciam.

Melina Andromachi.

CAP. 7.

Melinum quoque vtor. Spumæ argenti denariorum pondo centum quatuor, olei estate heminam,
hyeme tres cyathos, ceræ denariorum pondo quadraginta octo, colophoniarum denariorum
pondo quadraginta octo, guttæ ammoniaci denariorum pondo viginti quatuor: æruginis rasæ,
chalbani, myrrhæ, singulorum denariorum pondo octo. *Aliud.* Spumæ argenti denariorum pondo
Dcentum, olei tres cyathos, resinæ colophoniarum denariorum pondo sexaginta quatuor, guttæ
ammoniaci denariorum pondo quadraginta, cerussæ denariorum pondo viginti quatuor. *Aliud.*
Spumæ argenti denariorum pondo quadraginta, cerussæ denariorum pondo sex, ceræ tyrreni-
cæ denariorum pondo sedecim, resinæ pityinæ siccæ denariorum pondo sedecim, guttæ ammo-
niaci denariorum pondo duorum, olei heminam. *Aliud.* Spumæ argenti denariorum pondo cen-
tum: colophoniarum denariorum pondo sexaginta quatuor, alij quadraginta octo: ceræ denarium
pondo octoginta quatuor: chalbani, myrrhæ æruginis, singulorum denarium pondo octo: opo-
panacis denarium pondo sex, olei heminam æstate, hyeme verò tres cyathos. *Aliud.* Spumæ ar-
genti denarium pondo centum, resinæ pityinæ denarium pondo centum, ceræ denarium pondo duo-
decim, olei tres cyathos, vini salerni heminæ dimidium. Spuma argenti ex vino lauis fit, do-
nec siccata fuerit, deinde coquitur. *Aliud.* Spumæ argenti denarium pondo centum, olei veteris he-
minas lxx, ceræ denarium pondo centum, æruginis scolecias denarium pondo viginti quinque, cha-
mæleontis nigri denarium pondo duodecim ac semissem, chrysocolle denarium pondo quadra-
ginta. *Aliud.* Spumæ argenti denarium pondo ducentorum, olei veteris heminas tres, ceræ dena-
riorum pondo centum sexaginta octo, guttæ ammoniaci denarium pondo centum, myrrhæ de-
nariorum pondo quatuor, æruginis denarium pondo octo, resinæ colophoniarum denariorum pon-
do

* Al. hemina s.

† Al. hemina.

† Al. hemina s.

* Aliter l.

* Al. hemina s.

† Al. heminam

† Al. heminam

& s.

† Aliter duas.

*

* Aliter xx.

do centum vigintiocto, chalbani denariorum pondo viginti, chamæleontis atri denariorum pondo octo, alij propoleos denariorum pondo octo pro chamæleonte. *Aliud.* Olei veteris, in quo chamæleon feructus sit q̄ copiosissimus, sextarium: spumæ argenti pondo: vbi ebullierit, argenti spumam inspergito, & coquito. *Aliud ad Nomias, id est Vlcera depascentia.* Sandarachæ denariorum pondo trium, aluminis fissi denariorum pondo quatuor, thuris denariorum pondo quatuor, myrrhæ denariorum pondo quatuor, guttæ ammoniaci denariorum pondo octodecim, ceræ denariorum pondo octodecim, terebinthinæ denariorum pondo sex, adipis suilli denariorum pondo duo, mellis decimam sextam heminæ portionem. *Aliud.* Spumæ argenti denariorum pondo centum: octo: ceræ denariorum pondo centum octo, alibi centum inuenio: guttæ ammoniaci denariorum pondo quinquaginta, terebinthinæ denariorum pondo quadraginta, aristolochiæ denariorum pondo viginti quinque, zææ radicis denariorum pondo octo, æruginis scoleciæ denariorum pondo sedecim, aluminis fissilis denariorum pondo sedecim, olei veteris binas heminas. *Aliud Simplex.* Spumæ argenti denariorum pondo centum, axungia denariorum pondo septuaginta quinque, olei veteris pondo denariorum septuaginta quinque. Ad molli carne præditos facit, & digerit. *Aliud Melinum emolliens, Diophrantus, Aphra nominatur, Attrahens, & eruens, quo Articuli curantur.* Visci elaborati pondo, ceræ pondo, resinæ terebinthinæ pondo, chalbani vncias tres: lique factis vtitor. *Aliud Salome, ad omnem Dolorem, & Anginam synanchen cum cucurbitula, & ad Lateris affectum.* Spumæ argenti pondo duo, olei veteris vncias octo, simul coquito. *Aliud Melinum Herachidis, interiores Abscessus sine dolore discutens.* Spumæ argenti denariorum pondo centum, cerussæ denariorum pondo centum, ceræ denariorum pondo octoginta, resinæ aridæ denariorum pondo sexaginta, guttæ ammoniaci denariorum pondo quinquaginta, galbani denariorum pondo sedecim, olei veteris heminas duas. Vt autem Rusticus ille familiaris Isidori, Spumæ argenti denariorum pondo quinquaginta, cerussæ denariorum pondo quinquaginta, guttæ ammoniaci denariorum pondo octo, ceræ denariorum pondo viginti quinque, resinæ aridæ denariorum pondo triginta, vlmī in sacculis ex corio reconditæ denariorum pondo quindecim, galbani denariorum pondo octo, † olei tres cyathos. Inter hæc emplastra, nullius coctionem scriplit Andromachus. Ego verò ad colorem ipsorum pertinere dixi, scilicet neq; æruginem crudam esse oportere, vt in viridibus: neq; nimis coctam, sicut in ijs, quæ bicolora & gilua nominantur: verum vbi iam cacabus ab igne auferendus propemodum est, iniici ærugo debet: deinde cum mutat colorem, & melinum redditur, medicamentum tollere iam ab igne tempus est, si iam nō inquinet: sin minus, paululum super ignem lentissimum remorati sic tollemus, nam in admodum vehemēti facilē in giluum degenerat. Cuius rei gratia quoq; duo insignia emplastra melina, alterum Menœti, alterum Serapionis, subiungam: quorum coquendi rationem pleriq; tradidere, & vos confecturæ eorum, quæ Andromachus scriplit, exemplum habebitis.

Menœti Melinum.

C A P . 8 .

Spumæ argenti pondo quatuor, olei pondo tria, terebinthinæ pellucidæ pondo duo, ceræ pondo: æruginis, thuris, chalbani pinguisissimi, singulorum pondo vncias quatuor: guttæ ammoniaci pondo vncias sex. Argenti spuma ex oleo ad multam spissitudinem vsq; incoquitur: deinde resina cera q̄ iniicitur: cum pulchrè soluta hæc fuerint, cacabus deponitur, & refrigerari bene lini: post illa ærugo immittitur: & vbi infrà motum fuerit, denuò super ignem lenem coquitur, donec melinum colorem representet: postremò chalbanum, et thus, leuia facta, ac in mortarium demissa, vbi ammoniacum ex aceto in leuorem redactum est, vt sordium imaginem habeat: statimq; manibus subacta excipiuntur: & aceto modico affuso in sequentem diem vsque relinquuntur, ac tunc rursus emollita reponuntur.

Melinum Serapionis ad Vulnera, & ad Resoluendum, Pugilibus vtilissimum.

C A P . 9 .

Spumæ argenti denariorum pondo centum, guttæ ammoniaci denariorum pondo vigintiocto, H ceræ denariorum pondo quinquaginta sex, æruginis cypricæ denariorum pondo nouem, myrrhæ denarii pondo vnius, colophonie denariorum pondo quinquaginta sex, chalbani denariorum pondo nouem, olei tres cyathos, estate cyathum & dimidium. Argenti spumam ac oleum coquito: cum inalterata sunt, ammoniacum, deinde ceram: postq̄ deposueris cacabum, chalbanum, æruginem, & reliqua addito, atq; molliter incoquito. Huiusmodi coquendi modos melinorum, quæ scripsimus, emplastrorum multi me priores tradidere, iuxta quorum similitudinem etiam alia melina coquere poteritis. Argenti spumam sanè primùm iniicere conuenit, mox resinas & ammoniacum, deinde chalbanum & æruginem: postea si vel thus, vel myrrham, vel aloë capiat, hæc immittenda sunt, cum medicamentum ab igne tollitur, quippe coctionem non ferentia. Prædiximus autem lentè coquenda esse, præsertim cum ærugo indita fuerit: quin & ipsam miscendam, vbi cacabum in terram deposueris, ac parum refrigeraueris, id q̄ magis, si vas paruum sit, in quo coquitur, nam efferuescenti immissa ærugo, frequenter ex ipso vase diffundi medicamentū cogit. Porro in Menœti primo melino, quod ideo Pycicon id est pugillatorium, vt ita dixerim, vocat, qm̄ pugiles potissimum medicamento eo vtantur, ammoniacū quoq; ex aceto læue in mortario fieri posse, alijs omnibus in cacabo mistis, deinde ex ipso defusis, prius instituti sumus.

Melina

A

Melina Hære Emplastrum.

CAP. 10.

AD Strumas Hære. Quæ ab Hera conscripta sunt, hunc in modum habent. **C** Melinum ad veteres Sinus, & si in vacua perforati sint. Idem etiam discutit Strumas quæ in pueris nuper ortæ sunt. Facit etiam ad Artruse loco moros. Argenti spumæ chrysiidis denarium pondo centum, resinæ pityinæ sicce tantundem, ceræ ponticæ denarium pondo duodecim & scrupulos duos, olei tres cyathos, vini falerni tantundem. Argenti spuma ex vino læuigatur, donec liceat: post vnâ cum oleo sic coquitur, quousque mutata fuerit: & tunc resina læuis additur, ac cera coquitur, donec non inquinet.

C Menæti, coloris aurei, ad Teneros, maxime Eunuchos facit. Aptum est Alrafis, et omni inueterato & recenti Vlcere, iudem Combustis. Est etiam Malagma, discutit Phymata, Paronidas, Strumas, & omnes Duritias. Valet etiam ad Rhagadas, & ad Condylomata. Valde generosum est. Argenti spumæ denariorum pondo centum, olei veteris denariorum pondo centum, resinæ pityinæ aridæ denariorum pondo quinquaginta vel centum, ceræ denariorum pondo quinquaginta. Argenti spumam cum oleo coquito, donec vnitas fieri inceperit: mox resinam læuem indito: hac liquata ceram: vbi bene habuerit medicamen, in mortarium oleo prius inunctum demittito, & denuo tritum excipito. Est autem glutinās, nec polluit. **C** Hygini Emplastrum ad multa boni coloris. Curat Vlcera vix cicatricem ducentia, & Pabronychia. Hoc melius emplastrum non extat. Argenti spumæ chrysiidis minam, ceræ tantundem, chamæleontis nigri radice denariorum pondo triginta sex, æruginis rase denariorum pondo octidécim, chrysocollæ denariorum pondo quadraginta, olei veteris heminas tres. Argenti spuma cum oleo igne non acri coquitur, vsquedum effervescente inceperit: deinde ærugo inspergitur cacabo depolito: atq; iterum reposito emplastrum permouetur, quousque proprium colorem receperit: postea cera: quæ vbi bene se habuerint, chrysocollam & chamæleonem assumunt: demisso iam in mortarium acetum superfunditur. Itaque prædictis affectibus bene facit etiam chrysocolla admista, attramen line hac mitigantissimum est, & præcipue ad neruorum puncturas valet, iudem vbi à musculis vel neruis ablucere quid oportet. Horum trium emplastrorum, quæ Heras conscripsit, primum ex vino & confectionem & titulum habet: multi q; nostri tam præceptores q; amici eo line ærugine videlicet præparato vtuntur, scripto autem ab Andromacho & ferè omnibus, qui varia emplastra composuerunt. Proinde non pauci illorum incuriose ipsum conficientes, contemptum emplastro pariunt. Optimum verò est, si vti tradidimus, ex vino falerno conficiatur, cuius penuria giluum vetus, tenue substantia, quatenus potest giluum hoc esse, immiscebimus: nam candida hoc peculiariter habent, vt pelluceant. Porro præstantissima apud nos sunt in Asia tria, Tmolite vocatum, Lesbium, ac celebratissimum apud veteres Ariusium, in Chio proueniens, quo omnes ad optima medicamenta, præsertim antidotos, sicut nunc Falerno, vtébantur. Huiusmodi igitur vinum si in argenti spumam sub caniculæ astu, vel Sole alioqui calido, mittamus, deinde teramus: vel line Sole etiam diu teramus, vt humor resiccescat, ipsa q; argenti spuma relinquatur vel omnino madoris expers & sicca, vel propè fiat: medicamentum optimum euadit. Vnus sanè ex præceptoribus meis, postq; in vino falerno tritam exicasset, hoc modo ipsam præparabat: Oleum alio, vinum item alio, vase calefaciens, paulatim argenti spumam superfundebat interim vino, in quo læuigatæ probe q; permixtæ oleum adiciebat: interdum ab oleo auspicatus, ad vinum transibat. Alternis autem vicibus hoc sapius agendo vtrunque consumebat, & sic ex mortario in cacabum demittens, pityinam resinam, quam propriæ phlysa Græci vocant, leuem ad amullim factam addebat, mox ceram: & sensim, quoad non inhiçeret, decoquebat. Vtebatur eo & ad linus diuturnos, illinens prius sanguine columbæ non domesticæ, sed ex eis, quæ in turribus nidum collocat, (boscadæ quidam nominant) quas apud nos in agris extruunt: non nulli has agrestes vocant. Pari modo magnis vulneribus, recentibus, huiusmodi sanguine columbino illinens, medicamentum imponebat non mediocri eius confidentia. Vini autem heminam & s indebat, non vt Heras & Andromachus, semilem tantum: atque huius occasione medicamen longe melius factum est. Cæterum vbi ipsum voles boni odoris efficere, opopanax semunciam, quod est denarios quatuor, miscebis. Coloris gratia ceram candidam ponticam adicies. Hoc medicamentum vlcera vel ad vsq; cicatricem probe perducit.

Critonia Melina Medicamenta.

CAP. 11.

QUæ Critonia melina scripsit, Buxea nominat. **C** Buxeam ad Recentia Vlcera. Idem Cicatricem obducit & extrahit. Spumæ argenti pondo quatuor, ceræ pondo totidem, terebinthinæ pondo vncias octo, æruginis tantundem, olei veteris sextarios duos, aceti sextarii dimidium. Spumam argenteam, oleum, æruginem, acetum, vnâ super ignem lentum incoquito: vbi vero coitura sunt, resina ceræ que adiungatur: & in vnum redactis ad recentia vlcera potissimum vti tor. Scripsit & aliud ante hoc Crito, quod Buxeam vocat, simplex quidem quantum ad mistorum numerum pertinet, magnum vero pollicitis. Scripsit igitur de ipso ad verbum hoc modo. **C** Emplastrum ex Chamæleonte, eadem faciens quæ Tyria. Cicatricem Vlcerebus difficilissimis, callosis, & inueteratis, maxime inducit. Nectitur etiam Rhagadys digitorum, Condylomatis, & Duritiis. Spumæ argenteæ pondo minam, ceræ pondo minas sex, æruginis pondo minas quatuor, chamæleontis pondo minas octo, olei pondo minam. Oleo spumam argenteam coquito rudicula mouens, donec

nec consistat, & fiat melinum: post hoc æruginem inspergito, inde ceram adijcito. Porro vbi diligenter liquata ab igne tuleris, chamæleontem indito: cum vnitas facta est, in mortarium demittito: vbi subacta, excipito. Iam verò & alia quedam emplastra Crito tradidit in quarto medicamentorum volumine, Buxea quidem, vt ipse nuncupat: Melina verò, vt alij: attamen non nulla ex iis citra æruginem componuntur: non nulla æruginem quidem assument, sed in alio pharmacorum genere pro facultatis seu virium similitudine dicuntur, in Epuloticis, Epulotica: in ijs quæ succis constant, ex succis composita: in mollientibus, illa quæ mollire nata sunt: quemadmodum & Mna-fæi emplastrum multifaria ab eo in hoc opere conficitur. Nunc igitur ad glutinantia ire iam tempus est, colore inuicem, & à melinis, differentia.

De Giluis Emplastris, quæ & Dichroma id est bicolora, dicuntur.

CAP. 12.

QUADAM ex eadem materia constant, quæ æruginem habentia melina, sicut prius quoque diximus, hoc solo differentia, quod diutius coquantur: omnia liquidem propter crudam æruginem viridia, fiunt melina, vbi mediocriter ipsa cocta fuerit: gilua, vbi liberalius. Manifestum igitur melina gilua quæ oleum copiosius quàm viridia necessario habere, et si reliqua omnia eadem recipiant. Atque huius gratia primum spuma argenti cacabo inicienda est, in quo tantisper coquetur, dum sordium crassitudinem consequatur: mox ærugo, deinde si metallicum aliquod, ceu æs combustum eius quæ squama, immittatur. Ac quando spissitudinem acceperint, tunc ceram & resinam, si hæc etiam medicamentum recipiat, indere conueniet: postremo thus, myrrham, aloem, alia quæ id genus: sicut celeberrimum giluum, quod ex dictamno vocatur, Sacrum & ipsum appellatum, velut illis, quoniam aiunt ea ex sacris Ægypti locis esse allata. Vsum igitur hoc præstat multiplicem, proinde in sequenti sermone simul cum ijs, quæ ad plura valent, paulo post describetur. In præsentia de alijs giluis, tum omnino simplicibus, tum ijs quæ inter hæc & polychresta id est multipliciter vtilia, consilium, verba facturi sumus. Vt igitur viridia emplastra simplicia ex cera, resina, oleo, & ærugine, conficiebantur iuxta dictam illic symmetriam, sic gilua ex argenti spuma & oleo copiosiore, quàm in viridibus, sumpto componuntur. Itaque si emplastrum largius voles coquere, augeas quæ oleum, medicamen habiturus es, quod magis siccet, ideo quæ vulnere cruentorum glutinantius: sin autem mediocriter, tantam olei mensuram, quantum argenti spumæ pondus, esse sufficit: libram enim olei mensuralem Romanorum in argenti spumæ libram ponderalem iniciemus. Iam si pharmacum plenius incoquere placet, non solum vnâ libram & s, sed etiam duas & plures immittemus. Porro inter hæc gilua emplastra sic præparata plus siccant quæ nec resinam, nec ceram, omnino habent, sed ex solis, vt vocant, metallicis conficiuntur: quemadmodum alij quoque non nulli ex prioribus talia scripserunt. Cæterum quo ego semper mea industria composito vtor, in hunc modum coquitur. *¶ Giluum ex Metallicis.* Argenti spumæ cum oleo prius coctæ metallica ex aceto læuigata immitto, et sic coquo, donec non inficiat. Addo his olei libras quatuor, hoc autem quanto vetustius, tanto erit melius, magis quæ si id fuerit sabinum: argentæ spumæ libras tres, aceti quàm acerrimi libras duas: horum trium metallicorum, squamæ eris nigri, æruginis, chalcitidis, singulorum æquale pondus, nimirum uncias duas, hoc est denariorum pondo sedecim. At cum vetus oleum exstiterit, crassum quæ ex vetustate, quatuor libras & s immitto. Nos & quinque interim, id quæ per hyemem indidimus, non ignari hyeme plus olei, quàm per æstatem, immiscendum. At argenti spumam prius videlicet coques, donec sordium crassitudinem recipiat. Quod si & oleum cicinum habeas, id pro vetere usurpato. Medicamentum hoc cruenta vulnera facillè glutinat, magis quæ in duris corporibus quàm mollibus, cuiusmodi sunt mulierum, puerorum, & eunuchorum: dilutum quoque ex oleo cicino vel veteri, ac linteo exceptum impositum quæ, mirum est, quàm vlcera curatu difficillima concoquat, quæ pus nequaquam faciunt. Ad hæc sinus conglutinat, & fistulas adstringit exiccat & prorsus claudit. Atque vbi iam ipsum hæc pulchrè velis efficere, metallica pluribus diebus aceto longè acerrimo conterito, ac potius in Sole: pari modo argenti spumam tritam exiccata, quæ, & oleo postea mistam, eo quo dixi modo incoquito. Attamen ad vlcera, quibus cicatrix difficulter induci potest, metallica sic elaborari, & argenti spumam ita conterere, non est necessum: etenim sine his quoque, epuloticorone, quasi dicas cicatrici ducendæ promptius, illud euadit. Adiciatur autem tunc ei diphrygis, & chrysocollæ, singulorum uncia. At hæc non simul cum squama & ærugine committuntur, vt nec vbi iam coctum medicamentum fuerit omnino, sed eo, quod intercedit, tempore. Tantam enim huiusmodi pharmaca coctionem requirunt, vt exactè cum prioribus in vnum coeant: quod mediocri intervallo accidit, neque multo antè, nec paulo minus, quàm cacabus ab igne tollatur. Solum itaque hoc emplastrum fistulas, sinus, & magna vulnera, glutinare potest. Iuuat ipsum spongia recens, non dura, veteri vino resperfa. Deligatura in sinibus ab imo fiat, ligamento ad orificium perueniente, sicut in sermone de fistulis clarius ostendetur.

De ijs, quæ Cicatricem obducunt.

CAP. 13.

EMPLASTRA cicatricem inducentia, siue synulotica, siue epulotica, nominare velis, sicut etiam alia medicamenta epipasta, id est quæ insperguntur, & quæ linamentorum vsu apponuntur, nihil

A nihil ut ad curationes eorum, differentiæ adfert, si qualis quodque facultatis medicamentum huiusmodi esse debeat memineris: quam simul cum reliquis omnibus in therapeutices Methodi libris explicauimus. Quanto enim glutinantia sarcoticis id est carnem generantibus, siccare magis ostensa sunt, tanto glutinantibus epulotica: nam ipsorum beneficio carnem cauis ulceribus generatam cutem reddere statuimus: ob quod etiam tale pharmacorum genus, siue illinendum, siue inspergendum sit, adstringere oportet. Hic autem illorum duntaxat emplastrorum mentionem facere cogitamus, siquidem ea quæ linamentis excepta imponuntur pharmaca, ex his, rosaceo vel myrteo liquatis, fiunt. Atque myrteum rosaceo hoc magis conducit, quo vehementius adstringit. At si neutrum habearis, ex cyprino, lentiscino, & melino, liquanda sunt: si his quoque carcas, ex omphacino, vel eo quod ab Hispania portatur, Hispanum nominant: ubi nec huius copia adlit, teneros oliuarum surculos contusos alij cuiuspiam vulgari oleo admiscebis: quod si hos etiam desideres, præstat oleo vetere liquefacere, hinc enim medicamentum siccandi virtute augebis. Proinde plerique medicorum à pharmacis, quæ optimi quique medici longi temporis experientia satis probarunt, eo quod nobilia reddiderunt, hac ratione solum abstinere, ut ipsi melius quippiam præter maiores habere videantur. At tamen sciendum est his ipsis celeberrimis medicamentis, quæ ab omnibus laudantur, haud facile aliorum ullum reperiri, quod sit præstantius. Ab antiquo igitur laudata sunt, tum quod ex cadmia, tum quod ex ladano inscribitur, ad cicatricem ducendam utrunque esse præstantissimum. Quamquam apud omnes mixturæ simplicium pharmacorum symmetriam eandem non sit inuenire. Quapropter visum mihi est eas, quæ cuique Scriptori placet, describere, auspiciati à proditis ab Asclepiade in tertio de Exterioribus commentario, quæ Marcellas inscribit.

De Epuloticis Emplastris Asclepiades sic memorie prodidit.

CAP. 14.

Posteaqueam ulcera particularia sine alia dispositione ad cicatricem iam tendunt, utendum est his compositionibus, quæ infra scribuntur. **Emplastrum ex Cadmia, ad Cicatricem ducendum.** Hoc Lucius Cathegetes id est præceptor, usus est. Cadmiæ vsta & ex vino præparata, chalcitidis tosta, singulorum denariorum pondo sedecim: ceræ denariorum pondo octoginta, picis colophoniacæ pondo uncias octo, vini Italici quod satis est. Chalcitis & cadmia ex vino terantur, ut humidi ceræ conspissitudinem habeant: ceram & resinam perfractam in vas fictile immittito, atque his olei myrtei pondo libram adijcito: deinde carbonibus superposito, mouens sine requie: cum soluta fuerint, ab igne tollito: ubi refrigerint, radito, leuigatisque indito, ac mista excipito. In usu oleo myrteo subigito: temperatura dispositioni respondeat. **Aliud ex Cadmia.** Cadmiæ tosta, chalcitidis tosta, diphrygis, singulorum denariorum pondo sedecim: ceræ, resinæ frictæ, olei myrtei, singulorum pondo selibram: vini Italici quantum satis est. Præpara quomodo dictum est: ac utitor nunc diluto, nunc mero pharmaco. **Aliud.** Argenti spumæ, cerullæ, cadmiæ, diphrygis, resinæ, singulorum denariorum pondo octo: chalcitidis denariorum pondo duorum, ceræ denariorum pondo octo, myrtei olei quod sufficit, vini aminæ quod satis est. **Aliud Euphranoris.** Diphrygis, misyos tosti, singulorum denariorum pondo octo: chalcitidis tosta, molybdænæ, singulorum denariorum pondo duorum: cadmiæ denarij pondo unius, ceræ denariorum pondo sex, colophoniacæ pondo uncias tres, myrtei libras tres, vini Italici quod satis est. **Aliud ex Ladano accommodatum medicamentum, non solum Cicatricem ducens, sed etiam Callos excidens, & Male curata instaurans.** Chalcitidis, argenti spumæ, ladani, singulorum denariorum pondo vigintiquatuor: bituminis denariorum pondo octo, ceræ denariorum pondo septuagintaduim: myrtei heminam, alii drachmas decem & octo: vini heminam. Præparato in modum prædictum, cum res exigit, & splenio, & diluto utitor. **Aliud.** Argenti spumæ denariorum pondo centum, picis denariorum pondo quinquaginta, ladani denariorum pondo vigintiquinque: æruginis rase, æris combusti, singulorum denariorum pondo octo: olei myrtei libras duas, æris squamæ denariorum pondo quatuor: conficito utitor. **Aliud quod Pyricanton dicitur, ex Attalicis virtutibus medicamentum accommodatum.** Olei heminam: aluminis fissi, mannæ thuris, argenti spumæ, chalbani, singulorum denarij pondo unius: ceræ denariorum pondo vigintiquatuor, anchusæ denariorum pondo octo: medullæ ceruinæ, adipis suille, æruginis, cerullæ, singulorum denariorum pondo duum: ouorum trium lutea. Quæ liquari possunt, liccis immiscentur. Hoc pharmaco aliàs diluto, aliàs mero utitor. **Aliud Medicamentum accommodatum. Facit ad Vetera, ac Sanatu difficilia.** Cerullæ, argenti spumæ, aluminis fissi, manne, chalbani, thuris, medullæ ceruinæ & vitulinæ, singulorum denarium pondo quatuor: cere, anchusæ, ouorum luteorum, singulorum denarium pondo octo: olei heminas quatuor. Medullas diligenter tundito, & liquato cum iis quæ liqueri possunt, mouens anchusam, ex qua possint ea colorari: deinde ab igne sublata, & in aliud vas coniecta, refrigerari sinito: derafa liccis immisceto, deinde in usum excipito. **Cardidum, quod Magnum dicitur, medicamentum accommodatum. Vallet & ad Diuturna Vulnera, & quæ vix cicatricem recipiunt, ne Scabiosos affectus. Benefacit & Sedis Virus rosaceo diluunt.** Argenti spumæ denarium pondo centum, cere denarium pondo quinquaginta, cerullæ denarium pondo centum, terebinthinæ denariorum pondo vigintiquinque, thuris denariorum pondo vigintiquinque, aluminis fissi denariorum pondo duodecim, olei heminas duas. Composito simili modo: & utitor interim emplastro, interim diluto medicamine. **Aliud, cui nomen est Pamphilon, ad idem.**

† Additur in antiquis libris oleum myrti.

ad idem. Insuper Sinus conglutinat, & Fistulis callum exierit. Valet ad Vlcera fluxiones, tum ad Diuturna, & E
Dyspepilotia, Scabiem q; sanat, tollit Sugillata, benefacit Caput dolentibus, & oculorum Epiphorus fronti impositum,
nec minus Sedi conuenit dilutum rosaceo vel myrteo. Cæterum in hunc modum componitur. Argenti
spumæ denariū pondo centum, ceræ denariū pōdo quinquaginta, terebinthinæ denariū pōdo
viginti quinque, thuris denariū pondo viginti quinque, cerullæ denariū pondo centum, aluminis
fili denariū pondo sedecim, piperis albi denariū pondo trium, olei veteris heminas duas. Li-
quato, vt dictum est, nunc diluto medicamine, nunc emplastri modo vtens. Nam in capitis manā-
tibus vlceribus quæ achores Græcis dicuntur, & oculorum asperitatibus, vel in ijs quas epinycti-
das vocant, vel ani vitijs, dilutum pharmacum myrteo vel lentiscino illinitur. *Aliud Telamonis*
Pharmacum accommodatum. Facit & ad Carbunculos, Sinus exiccat immissum vel instillatum. Ad hæc Cicatrice
probe inducit. Pityinæ, ceræ, calcis viuæ, argenti spumæ, singulorum denariū pondo quinquagin-
ta: cerussæ denariū pondo viginti quinque, olei tres cyathos. Argenti spumam oleum q; dum in
vnum coeant, incoquito, mox ceram, inde refinam. Porro calci & cerussæ in læuorē redactis liqua-
bilia indito. Dum vteris, oleo cineri calido superposito medicamen cōfringendo inijcito: vbi in-
caluerit, mortario superfundito, & diligenter subigito, donec sordium spissitudo fiat. Ab igne de-
posito vitior tanq; maximo pharmaco, aliàs pennis illinens, aliàs instillans. Ceterum carbunculis
vocatīs linteolo illitum adhibeto. *Aliud Moschionis, celebre ad quælibet à Callo vindicanda, & Cicatri-
ce obducenda. Idem & Sedi prodest insigniter.* Argenti spumæ, cerussæ, calcis viuæ, singulorum denariū
pondo octo: medullæ ceruinæ, ceræ, vtriusque denariū pondo sedecim, olei myrtei quantum sa-
tis est. Quæ liquari possunt, aridis immiscetur, & mollita curiosè in pastillos digeruntur. Cum vti
voles, prius aqua vel lacte diluetur quantum lubet, vt sordium crassitudinem habeat: deinde rosa-
cei quod sufficit, immittitur, vel myrtei: contusum diligenter in plumbeam pyxidem reponitur:
vsui est, quemadmodum prædiximus.

Epulotica Andromachi.

CAP. 15.

CAdmiæ pondo libram, chalcitidis vstæ pondo libram, ceræ pondo libram, resinæ aridæ pon-
do libras tres, myrtei pondo libras tres: vinum siccis immiscetur. *Aliud ex Ladano.* Argē-
ti spumæ denariū pondo quadraginta, ladani denariorum pondo triginta duū, chalcanthi de-
nariū pondo octo, aluminis scissilis denariū pondo duodecim, ceræ denariū pondo centum,
squamæ denariū pondo octo, bituminis denariorum pondo triginta duū, myrtei quartā he-
minæ partem: vinum falernum siccis adncitur. *Aliud, vt Alcimion, quod præparauit.* Ladani de-
nariū pondo octo, hyssopi denariū pondo quatuor, propoleos denariū pondo octo, bitumi
nis denariū pondo octo, argenti spumæ denariū pondo quatuor, aris squamæ denariū pon-
do quatuor, misyos crudi denariū pondo quatuor, ceræ denariū pondo viginti quatuor, myr-
tei octauam minæ portionem. *Aliud ex Hordeis.* Cerussæ denariū pondo quinquaginta, ar-
genti spumæ denariū pondo quinquaginta, hordei combusti non triti sextarium, ceræ denariū
pondo quinquaginta, olei sextarium: postremum hordeum adiicitur. *Aliud ad ducendam Cicatri-
cem.* Cadmiæ pondo vncias duas: chalcitidis, ceræ, terebinthinæ, singulorum pondo vncias qua-
tuor: hyssopi pondo vnciam, myrti pondo vncias quatuor, chalcanthi pondo vncias quatuor: vi-
num siccis affunditur. *Aliud ad idem.* Resinæ aridæ denariū pondo xvij, diphyrgis denariū
pondo quatuor, argenti spumæ denariū pondo sedecim, ceræ denariū pondo decem, olei he-
minas quatuor. Post hæc Andromachus alia emplastra sex percensuit cicatricem egrè ducenti-
bus accommoda, quæ sanè hîc nunc adscribere visum non est: dicentur enim simul cum illis quæ
vlcera curatu difficilia sanāt, in quarto huius operis volumine. Cum autem Andromachus ibi-
dem ante prædicta modo epulotica alia quædam tradiderit, non præponens, quod apertis vlceri-
bus cicatricē inducerent, præsertim in pueris, mulieribus, & eunuchis, summam in omnibus qui
teneram habent carnem, statui hæc quoque hucadij cere. Titulum ipsi à colore Andromachus
indidit, vt qui de ijs hîc in modum ad verbum scripserit. *Candida Andromachi Epulotica. Album*
quo vtor. Argenti spumæ pondo minam, cerussæ tantundem: ceræ, resinæ, singulorum quatuor:
olei heminas tres, aquæ heminam. *Aliud.* Argenti spumæ denariū pondo centum sexaginta, ce-
russæ denariū pondo ducentorum, ceræ drachmas quinquaginta, terebinthinæ denariū pon-
do viginti quatuor, olei veteris hemina dimidium, aquæ cyathos sex. *Aliud.* Argenti spumæ de-
nariū pondo centum: cerussæ, ceræ, singulorum denariū pondo quinquaginta: terebinthinæ
denariorum pondo viginti quinque, aluminis fissi denariū pondo sex, piperis albi denariū pon-
do trium, orcheos herbæ denariorum pondo octo, olei veteris cyathos duos, † aliter denariorū pon-
do duū, aquæ heminas duas. *Aliud.* Argenti spumæ denariū pondo viginti quinque, ceræ de-
nariorum pondo quinquaginta septem, adipis suilli denariū pondo triginta septem, myrrhæ de-
nariorum pondo duū: ouorum coctiorum vitellos quatuor, alii crudorum. *Medicamen Are-
te idest virtus, appellatum.* Strigmenti puri heminas duodecim, argenti spumæ pondo minas tres:
squamæ denariorum pondo sex, alii denariorum pondo sedecim: resinæ colophonie pondo mi-
nas sex, alij denariū pondo quinquaginta: ceræ pōdo minam, quidam minas quadraginta quin-
que: marinæ aquæ heminas tres.

Andromachi

Al. ouvri de
i. composito.

Al. βελτιον
ελεξιμων, i.
καλιστα
fieri est

† Codex anti-
quissimus ad-
dit, Struthii
drach. ii, man-
na drac. xxv.
Aliud. Argē-
ti spumæ drac.
lxx, cerussæ
drach. cētum,
ceræ drach.
quinquaginta,
olei cyathos ij.

Andromachi Panacea, i. Vniuersale remedium.

A

* **C** Argenti spumæ denariū pondo centumquingenta, ceræ denariū pondo quadraginta, terebinthinæ denariū pondo quinquagintatrium, † marinæ veteris heminas duas, strigmentii heminas sex, squamæ denariū pondo sedecim, ricini heminas duas, ceruillæ denariū pondo octoginta, guttæ ammoniaci denariū pōdo vigintiquatuor, seui vitulini denariū pondo octoginta, calcis viuæ denariū vigintiquatuor, aristolochiæ denariū pondo vigintiquinq. Coquito vt didicisti. **C** Candidum Telephanus. Argenti spumæ denariū pondo octoginta, ceruillæ denariū pōdo centumviginti, myrrhæ denariū pondo trium obolos duos, sagapeni denariū pondo quinq, thuris denariū pōdo sex obolos quatuor, olei heminas duas & s. Omnia simul incoquito. *Aliud.*

† Sunt, qui le-
gē dūm putēt,
mū veteris
cū apud aucto-
res marina ut
seris nū quavis
mentionem fie-
ri dicant.

Ceræ candidæ pondo libram, myrrhæ pondo vnciam, thuris tantundem, medullæ ceruinæ pondo vncias duas, adipis hyenæ pondo vncias duas, coaguli cerui vel hædi pondo vncias duas, nutri pondo vncias duas, chalbani pondo vnciam, guttæ ammoniaci pondo vncias quatuor, argenti spumæ libram s, ceruillæ denariū pondo sex, olei veteris heminā s, marinæ aquæ tres cyathos. Cau- niace dicitur. *Aliud.* Argenti spumæ denariū pondo ducentorum, ceræ denariū pondo quin- quagintaduūm, olei heminas tres, ceruillæ denariū pondo octoginta, terebinthinæ denariū pon- do trigintaduūm, buccinorum cineris denariū pondo decem, thuris denariū pondo nouemde- cim, aquæ sextarium. *Aliud.* Adipis suilli recentis denariū pondo octoginta octo, ceræ candidæ denariū pondo quadraginta octo, ceruillæ denariū pondo duodecim, argenti spumæ denariū pondo duodecim. Facit ad herpetas, carbunculos, condylomata, rhagadas: phlegmonen prorsus arcet, vt Heras Cappadox meminit. In hoc igitur rectē fecit, quod non simpliciter ceræ scripse- rit, sed candidæ adiecerit: nam sic fieri possit, vt vult, colore candidum. Post hæc autē aliud cō- memorans, neq; ceræ neq; vini candorem apposuit, sed nos adiungere oportet, si emplastrum can- didum reddere statuimus. Porro composino eius his verbis ab ipso Andromacho tradita est.

C *Aliud ex Vino, Publy.* Cadmiæ pondo libram vncias nouem, argenti spumæ pondo libras duas, ceruillæ tantundem, vini græci sextarios duos, rosacei pondo libras quinq, ceræ pōdo libras tres, oua cruda numero duodecim, thuris pondo vncias tres. Hęc incoquito. Candidorum empla- strorum coquendi rationes in priori commentario percensui: simul que methodum non coquē- di modō, sed etiam eorum compositionis, ostendi. Et fortasse nihil amplius eiusmodi emplastro- rum doctrinæ adijciendum restat: sed quia hic liber non solum de carnem generantibus empla- stris, quæ quidem vt plurimum viridia sunt, verū etiam de glutinantium & epuloticorum om- nium ratione egit, quæ vlcera malignitate carentia cicatrice obducunt, quoniam que melina ac- gilua percurri, ideo candida quoque emplastra, quorum in illo libro mētionem nullam fecimus, in hoc producere visum est. Caterū vt nihil præsentī commentario desit, non pigebit adijcere emplastra, quæ ab ipsis cephalica & catagmatica id est capiti fracturis q; medentia, nominantur: & magna vulnera, linus que glutinant: cum verō diluta fuerint, linamentis excipiuntur, & fiunt sarcotica id est carnem progignentia.

De Catagmaticis & Cephalicis, i. ad fracturas & caput, accommodatus Emplastris. CAP. 16.

Q Vi plurima ac optima pharmaca prodiderūt (antea omnes nominatim citauimus) genus quoddam emplastrorum cephalicum & catagmaticum vocant, à caluariæ fracturis pouilli- mum nomen eis imponentes. Sunt aut talia abstergendi, digerendi, & siccandi, potesta- te prædita. Pleriq; paululum ex adstringentibus pharmacis eis admiscuerunt, id q; duplicis vsus gratia sicut diximus, nempe vt id, quod affectis partibus influīt, repelleretur, & abstergentium fa- cultatem in profundum vsq; deduceret. Porro docuimus nos antea, nisi adstringentia elaborent tritura, quoadusq; in puluerem redigantur, noxā magis q̄ præsidium esse allatura ijs, que trahendi vim obtinent. At optimē elaborari ostendimus ea, si ex aceto acri leuiā fiāt. Itaq; huiusmodi phar- macorum seriem ab ijs, quæ Asclepiades tradidit, iam auspicabimur.

De Emplastris ad Fracturas idoneis ab Asclepiade traditis.

CAP. 17.

Primum in tertio extrariorum medicamentorum his verbis perscripsit. **C** *Nigrum Ariston* id est optimum, Catagmaticum. Hoc pharmaco vsus sum in fracturis ossium multorum, ita vt eo- rum plura mouerentur ac innatarent, omnes que hortarentur innatantia illa ossa auferri. At hoc Aristum id fecit, quod præter omnium opinionem est visum: nam fluitantia & ab alijs ossibus se- parata ita copulauit, vt alijs conferruminauerit. Hęc recipit, Argenti spumæ, bituminis, singu- lorum denariū pondo ducentorum: picis aridæ, ceræ, singulorum denariū pondo centum: re- sine terebinthine, denariū pondo quinquaginta: aluminis scissilis, propoleos, singulorum de- nariū pondo triginta: guttæ ammoniaci denariū pondo vigintiquatuor, eruginis denariū pondo decem, olei sextarios quatuor: præparato, vt prædictum est. Alia præpolito generi simi- lia in eodem libro Asclepiades conscripsit in hæc verba. **C** *Aliud Pithionis ad Fracturas, quo Hete- nus usus est.* Valer etiam ad Vulnera ex ictu. Cum exhibebis, sponsia calida madefacta splenium relaxare oportet, nam medicamentum valide glutinat. Benefacit idem ad Strumas & Fijulas. In sinibus autem & fistulis splenium excindere conuenit, hoc est in officio, vt humor, qui excernitur locum habeat: item simul cum medicamentis la- uandum est. Præparatur hoc pacto. Bituminis iudaici pondo libras quinque vncias quatuor, pi-

Quinta Classis.

fffff

cis

cis brutiæ siccæ pares portiones, resinæ frictæ pondo libras octo, ceræ pondo libras quatuor, thu E ris libras quatuor, squamæ rubræ pondo libram vncias quatuor, olei per æstatem pondo libram, hyeme pondo libram & semissem aceti heminā. Quæ liquari possunt, liquefacito: thus & squa mam ex aceto trita reliquis admisceto, attendens ne ebulliant, mouens que in mortarium demit tito: contusa & subacta excipito, ac vitior. In alio exemplari squamæ rubræ pondo libram dimi diam offendi. Liqueat autem efficacius esse, quod copiosiore squamam receperit. ¶ *Moschionis Pharmacum*, ad Fracturas, recentia Vulnere, & Nervos præcisos confectum: item ad Diuisa cum contu sione. Bene facit etiam Fracturis cum Vulnere: etenim Vulneribus succurrit, & ossa cum deligatura conuenienti impositum ad callum perducit. Nec minus incipientibus Hydropicis, & Testium contusionibus prodest, Eminē * tias circa anum reprimi, & Rhagadas butyro dilutum sanat, & Faucium tumores quos Græci bronchocelas ap pellant. Dissoluit omnem duriciam. Insuper valet ad Luxatum & peruersum articulamentum: utidem ad Callosos excessus in manibus, pedibus que, quos clauos appellamus, ita valet, vt sine exulceratione auferat. In summa phar macum est longè vtilissimum. Hoc modo conficitur. Argenti spumæ pondo minam (mina verò in hoc pharmaco habet denarios centumsexaginta) picis denariū pondo centumsexaginta, seui vitulini denariū pondo centumsexaginta, resinæ terebinthinæ denariū pondo octoginta, mā næ thuris denariū pondo octoginta, ceræ denariū pondo quadraginta, æruginis denariū F pondo octo, opopanacis denariū pondo octo, chalbani denariū pondo octo, olei cicini hemi nam, aceti tantundem, liquoris sycamini heminam, picis liquidæ hemine dimidium. Argenti spu ma læuissima & cicinum oleum in vas fictile æreum ue iniecta, & super ignem posita incoquuntur: posteaquam ebullierint, seuum & manna thuris adduntur, mouentur que continuè: cum coi uerint, pix, cera, resina admiscuntur: & coctis quoad vsque non polluant, chalbanum aspergitur, deinde ærugo & opopanax ex aceto resoluta. Liquor verò siccomori, & pix liquida, in alterū vas transfusa coquuntur: vbi coiuerint, priori pharmaco admiscuntur: rursus que supra ignem posi ta, vsque dum non inquinant, coquuntur: & in vinum demersa relinquuntur triduum: inde sub actis vtimur in linteolum illinentes. Oportet autem post medicamenti impositionem vitram re sperfam vino exprimere, & tunc pharmaco circumdare. Quemadmodum verò Lucius præceptor noster preparauit, ita habet: Adeps & oleum prius liquantur: vbi dissoluta fuerint, manna thuris læuissima, & argenti spuma, inspergitur: his in vnū coactis sequentia facimus. Atq; tum in hoc pharmaco, tum in eo, quod proximè subscribitur, minam denarijs centumsexaginta valere ait. Vnde clarum est Alexandriæ minam ipsum intelligere, quæ vncias viginti pendet, & singule vn cie denarios octo habent: sic enim accidet minam centumsexaginta denarios continere. ¶ *Aliud G Claudy Philoxeni Apelum* (forte quasi huius conueniens) inscriptum, ad Cruenta, & Fracturas. Facit etiam ad Prædicta vitia. Argenti spumæ minam, quæ valet drachmas centumsexaginta: seui vitulini drach mas centumsexaginta, thuris drachmas octoginta: opopanacis, resinæ terebinthinæ, drach. lxxx: ceræ drachmas quadraginta: æruginis, aluminis scissilis, chryfocollæ, chalbani, singulorum drach mas duodecim: olei cicini heminam, aceti quantum sit satis: postremū thus, & æruginem, & opo panacem, & alumen, & chryfocollam, & id genus reliqua prius aceto dissoluta & curiose leuiga ta iniicito. In alia scriptura sic habet: Argenti spumæ drach. centumsexaginta, picis drach. centū sexaginta, seui vitulini drachmas centumsexaginta, resinæ terebinthinæ drach. octoginta, mannæ thuris drach. octoginta, ceræ drach. quadraginta: opopanacis, æruginis rasæ, vtriusque drach. se decim: chryfocollæ, aluminis scissilis, vtriusque drachmas duodecim: guttæ ammoniaci drach. sex, ciceos heminam, aceti tantundem: vt catagmatica composito. ¶ *Oenanthe Catagmaticum*, accom modatum pharmacum ad idem. Argenti spumæ denariū pondo centumsexaginta: picis vinariæ de nariū pondo centumsexaginta, hanc ex Italicis dolijs defluentem capimus: resinæ terebinthinæ denariū pondo octoginta, thuris denariū pondo octoginta, seui vitulini elaborati denariū pondo octoginta, medullæ ceruinæ elaboratæ denariū pondo octoginta, ceræ denariū pondo H quadraginta: oenanthe siccæ, symphyti radice, centaurij comæ, singulorum pondo libram: ærugi nis rasæ, opopanacis, singulorum denariū pondo octo: papaueris succi, myrrhæ, aloes, chalba ni, singulorum denariū pondo octo, aceti heminas tres, olei cicini heminam. Symphyton, oenan then, centaurion, non minutim contusa, ac in acetum iniecta, ad tertias coquimus, & humore ex presso ad pharmaci confecturam vtimur. Prodest medicamentum etiam podagricis. Alibi sic scri ptum est: Argenti spumæ, picis vinariæ, singulorum denariū pondo centumsexaginta: medullæ ceruine, resinæ terebinthinæ, seui vitulini, thuris, symphyti radice, succi sycamini, singulorum de nariū pondo octoginta: oenantes aride, centaurij, singulorum pondo: ceræ denariū pondo quadraginta: æruginis, opopanacis, styracis, papaueris succi, mandragoræ succi, myrrhæ, aloes, chalbani, chryfocollæ, aluminis fissi, singulorum denariū pondo duodecim: aceti sextarios tres, olei cicini libram. Præparato quemadmodum prædiximus, & in vinum italicum demergito, vt in catagmatico Moschionis fecimus.

* Al. heminas.

De Emplastris, quæ propriè Cephalica nominantur.

CAP. 18.

C Apitis fracturarum, quæ ad crassæ membranæ duplicaturam vsque peruenere, emplastra ce phalica dici consueuerunt. Eorum virtus est, vt ossiū squamas sursum attrahant ac in pristi num

Anum locum reuocent, & fragmenta tum in capite tum in alijs corporis offibus educant. Non nulli communi genere hæc etiam vocant catagmatica, proprie verò nuncupatis fortiora sunt. Siqui dem catagmatica ab eis dicta purgandi siccandi q̃ facultatem habent: hæc autem acrimoniam et quandam fortita sunt, ut ex alto in superficiẽ extimam non oīa modò, sed his multo magis quoq; humorem crassum aliquem, & viscolum, vel omnino deprauatum, attrahāt. Meminit huiusmodi emplastrorum Asclepiades in tertio libro de Exteriorum medicamētis, quæ sanè in quarto huius operis libro tractamus. Quoniam verò ad cacoethe vlcera & chironia, quædam ipsorum conuenire dixit, tum quod ad Deileontem authorem refert cephalicum, tum hoc sequens ex nigro viride cephalicum, tum post hæc Philotæ cephalicum, tum deinde Ilin quod & ipsum cephalicũ appellat, alia q̃ non nulla huiusmodi, huius generis esse putandum est. Ideo nunc quoq; ipsa nō apposui, sed ad catagmatica & cephalica ab alijs medicis memoriæ mandata transgrediar, ubi generalem viriusq; potentiam exposuerim. Quæ verò & antea, & in hoc libro protulimus, & in opere de Simplicium medicamentorum facultate, in memoriam reducentes, cognoscere vos expedit cephalica catagmaticis esse valentiora, eo q̃ cum cerato carnem producere natura sunt apta. Quapropter & sarcoticis alio quodam modo genere similia sunt. Nam ubi ex cerato vim remiserint, **B** sarcotica fiunt, quæ linamentis excipiuntur, adiectio videlicet interim oleo, alias rosaceo, non nunquam alio quodam huiusmodi.

De Quibus Heras Catagmaticis & Cephalicis scripsit.

CAP. 19.

Primum id genus emplastrorum Ilin vocatum Heras scripsit, medicamentum ad satis multa idoneum: deinde quod ex herbis appellant, quod & ipsum multiplicis esse vsus attestatur id, nempe q̃ cephalicum existat. Quin & quod confectum ex scylla scriptum deinceps est, cum multi satis vsus pharmacum existat, idem pollicetur. Insuper post hæc omnia aliud emplastrum manifestò his verbis exposuit. *Aliud Cephalicum. Ad Capitis fracturas facit, ossa facile reducit, & Squamas separat, reliquaque Omnia facit, quæ & ante ipsum pastillus.* Squamæ æris rubri denariũ pondo xxv, aluminis denariũ pondo viginti, aristolochiæ dactylitidis denariũ pondo viginti, guttæ ammoniaci denariũ pondo vigintiquinque, thuris denariũ pondo vigintiquinque, myrrhæ denariũ pondo duodecim, seui taurini pondo libras quatuor, ceræ libras quatuor, terebinthinæ pondo libras iij, pityinæ siccæ pondo libras quatuor, olei heminam, aceti quantum satis est. Sicca ad læuorem terito, quot sufficiat diebus sub æstu caniculæ: ammoniacum madefactum prius aceto infundito, demum quæ liquari possunt rasa: ac in vnum coactis vtitor. In quibusdam exemplaribus adscriptum est, olei veteris. At cum hoc ipsum emplastrum dixerit efficere, quæ & ante ipsum pastillus, visum mihi est illius quoque compositionem subscribere, quæ secundum Heræ ipsius verba ita habet. *Pastillus Cephalicus triplici mistura constans. Facit ad Capitis fracturas, item ad Phymata, Fistulas, Podagras, Callos, Coxendices.* Terræ erythriadis pondo minas duodecim, squamæ æris rubri pondo minas quatuor, ichtyocollæ ponticæ pondo minas quatuor. † Erythrias & squama seorsum teruntur: deinde simul acetum acre affunditur, ut mellis crassitudinem habeant, & læuigantur: resiccatis acetum rursus admouetur: hoc fit diebus viginti sub caniculæ æstibus: post ichtyocolla ex aceti hemina confringitur, & lento igne liquatur: mox terra squama q̃ addit: quæ in vas æris rubri coniecta, soli octo diebus exponuntur, bis quotidie mouentur, donec coierint: post hæc exempta paulatim in mortario conteruntur aceto affuso, vsquedum consiterint: inde pastilli finguntur & collyria, tum longitudine tum crassitie inæqualia, & refrigerata reponuntur. In vsu ad vnā medicamenti partem ex aceto læuissimam factam tres cerati rosacei portiones admisceto: vtitor platysmate primum, mox splenio, in capitis fractura, desuper lanis succidis ex aceto adiectis. Porro collyrio fistulis impolito, splenium ex hoc cum cerato superdandum est.

Aliud Eiusdem ad multa valens. Posuit aliud quoq; multiplicis vsus emplastrum, ad fracturas quoq; conueniens, de quo sic ad verbum inquit. *Emplastrum ad Fracturas artuum cum vulnere, & sine vulnere, item ad Male curata, & Sinus.* Picis aridæ pondo minam, argenti spumæ tantundem, manna † eius dimidium, ‡ seui vitulini pondo minam, ceræ tyrrhenicæ pondo minas quatuor, opopanax denariũ pondo octo, æruginis rasæ pondo minas sedecim, æris cyprii decimam sextam minæ portionem, chalbanī denarij pondo vnus, terebinthinæ minæ dimidium, ricini vel olei veteris heminam, aceti hemine dimidium. Argenti spumam, oleum, & seuum, lento igne incoquito: ubi colorem mutauerint, picem, resinam, chalbanum adijcito: postea coquito donec coeant: & tunc subtracto igne linens paululum refrigerari, mannam, mox opopanax, & eruginem ex aceto tritam, in ollam fundito: ac ubi tantillum incoxeris, dum bene habeat, tollito. Vnumur facultate, frigida affundentes estate, hyeme gelu adimentes. Ceterum ubi medicamentum tenerius facere animus est, vel ut os maturius abscedat, medulla cerui ipsum diluimus. Iam verò in hoc pharmaco Heras minam sedecim vnciarum esse velle planè ostenditur, aliàs enim decimam sextam minæ partem non scripsisset. *Aliud.* Huic deinceps aliud ad eadem hisce verbis Heras subdidit:

Emplastrum Phlegmonas arcens. Ad Puncturas neruorum, ac fracturas. Hoc frequenter & ad Articulos luxatos ipso die vsi sumus, tum in Fracturis, item in Contorsione tali, vel genu. Discutit Humores incoctos circa genua summe se attollentes, præsertim si partes affectæ duobus vel tribus diebus antè, crui farina oxymelite madefacta

Quinta Classis.

fffff ij illa

* Aliter ii.

† In aliquibus additur, in lib. autè Heræ reperitur mina vna.

‡ Al. pondo minam.

illita sint. *Summatim ad omnem Convulsionem, & Rupturam valet, nam mirifice Phlegmonem arcet.* Argenti E spumæ denariū pondo viginti quinque, bituminis aridi denariū pondo centum, picis aridæ denariū pondo quinquaginta, ceræ denariū pondo quinquaginta, resinæ pityinæ denariū pondo viginti quinque, guttæ ammoniaci denariū pondo quindecim, aluminis fissi denariū pondo quindecim, æruginis denariū pondo quindecim, propoleos denariū pondo quindecim, olei veteris libras tres. Argenti spuma cum oleo coquitur: & ubi confluere cœperint, bitumen adijcitur: vsq; dum probè liquefactū fuerit, incoquitur, liquatur enim pedetentim: dein pix, possea resina, cera, ammoniacum, propolis adduntur: singula autem adhibe contorquēdo, ignem q; subtrahendo: quibus sic spissatis, vt non amplius inquinent, æruginem, ac scissile alumen, adiungito: tum feruore remisso, in ollam, in qua frigida sit, trāsfundito. Hoc, postquam fractura reliqua callum cepit frustulis pluribus innatantibus, vsi sumus, id q; paucis diebus eō rem perduxit, vt callus etiam dum frustula comprehenderet. Valde est in multis vsui. Inde aliud quoque deinceps eiusdem generis cum prædictis emplastris in hunc modū Heras recensuit. *Emplastrum ad Fracturas, & ad Hydropicos.* Picis aridæ pondo minam, picis liquidæ hemina dimidium, liquoris sycomorī heminam, argenti spumæ pondo minam, thuris pondo minam, chalbani denariū pondo octo, terebinthinæ minæ dimidium, adipis vitulinæ pondo minam, ceræ pondo minam, opopanacis denariū pondo octo, æruginis rasæ denariū pondo octo, ricini non adulterati heminas quatuor, aceti acris heminam. Argenti spuma & thus cum ricino & seuo leniter incoquantur: deinde pix adijcitur, cera, resina, chalbani purgatum & pauco aceto dilutum: reliqui aceti tertia pars ærugini, duæ opopanaci, admiscantur, & hæc immittuntur. In alia autem ollula picis liquidæ, sycomorī, & ricini liquoris pars octaua, † ne ærugo † densetur: deinde mediocriter coquitur, vt vnitas fiat: cum bene vnita videbuntur, in vino reponitur pharmacum. Hoc multis hydropici succurrimus, inijciētes ipsum, ac moroso minus victu regentes, solum q; vt bene concoquerent, providentes. Cum verò profecisse se multum ægri sentiunt, descendimus ad emplastrū ei subiunctum, quod ex salibus dicitur.

Catagmaticum Andromachi.

CAP. 20.

Primum Catagmaticum Andromachus ita scripsit. *Catagmaticum, quo continē vitor.* Argenti spumæ pondo minam, picis pondo minam, ceræ pondo minam, seui taurini pondo minam, thuris pondo minam, picis liquidæ hemina dimidium, liquoris sycamini heminam, terebinthinæ pondo minam, opopanacis denariū pondo octo, chalbani, denariū pondo octo, æruginis denariū pondo octo, ricini heminam. Non nulli etiam butyri pondo minam addunt, guttæ ammoniaci denariū pondo viginti quinque: ex vino austero diluitur. Mox post hoc aliud hac sententia scribit. *Aliud Catagmaticum.* Argenti spumæ pondo minam: ceræ minæ dimidium, alij quartam partem: picis pondo minam, terebinthinæ pondo minam, seui vitulini pondo minam, opopanacis denariū pondo octo, æruginis denariū pondo octo: chalbani denariū pondo octo, alij sex: ricini heminam, aceti tantundem. Gallus iniecit scissilis denariū pondo xij, chrysocolle denariū pondo duodecim. Aliud superioribus catagmaticum hoc modo Andromachus subnequit. *Nigrum Catagmaticum.* Argenti spumæ denariū pondo ducentorum, bituminis denariū pondo ducentorum, picis denariū pondo centū, ceræ denariū pondo centum, scissilis denariū pondo triginta, propoleos denariū pondo triginta, terebinthinæ denariū pondo quinquaginta, guttæ ammoniaci denariū pondo viginti quatuor, æruginis rasæ denariū pondo decem: olei sextarios quatuor, alij duos adijciunt. Veteres etiam lapidis pyritæ denariū pondo sexaginta. Hæc igitur ab Andromacho ordine scripta sunt, seorsim verò inter viridia postremū emplastrum quoddam his verbis expressum inuenio. *Aliud Viride Cephalicum ex collectaneis Aphrodæ.* Squamæ denariū pondo quadraginta, terræ erythriadis denariū pondo viginti, aristolochiæ denariū pondo triginta, ichtyocolle denariū pondo sedecim, salis ammoniaci denariū pondo duodecim, misyos denariū pondo duodecim, myrrhæ denariū pondo duodecim, thuris denariū pondo triginta sex, eris vsi denariū pondo sedecim, aluminis fissi denariū pondo duodecim, rotundi denariū pondo sedecim, bryoniæ denariū pondo duodecim, chameleontis nigri denariū pondo duodecim, resinæ vsæ denariū pondo octodecim, guttæ ammoniaci denariū pondo octodecim, argenti spumæ denariū pondo duodecim, illyridis denariū pondo duodecim, chalcanti denariū pondo duodecim, fellis taurini tres cyathos, aceti congiū. Sub caniculæ estu pastillos fingito, qui singuli denarios quatuor pendant, ceræ quartam partem misceto, aceti heminas sex, olei tantundem.

De Emplastris Glutinantibus.

CAP. 21.

Quidam hæc sanguinaria & vulneraria id est cruentis & vulneribus adhibenda, nuncupant. Opus eorum est coniungere diuisas partes, & conglutinare, vt in pristinam vnitatem particula reducat. Verum non modò cruenta protinus glutinantur, ubi sanguinem ex diuisione profluentem adhuc spongia deterferimus, deinde futuris aut fibulis coarctauerimus: sed etiam sinus veteres, cum ab omni inflammatione immunes, & puros medicamentis appolitis effecerimus, committuntur, coeunt q;. Dicitur est in therapeutices Methodi libris medicamentum

† *Al. ἡ αμύ
σις ὅς, i. ne
tanquā miscu.*

* *Aliter xx.*

* *Aliter xx.*

* *Al. legitur ἐν
ἄλλω ἔυρον
θείου ἀπέρις,
i. in alio iuen:
sulfuris ignem
non experti.*

* *Aliter hemi-
næ dimidium.*

A medicamentum primario atq; ex sese sordis deterforium appellari, secundaria verò ratione carnem producens & glutinans. Non enim tanquam ipsum carnem generet aut vniat, neq; tanquā hac naturæ solius opera non sint, sed quòd talibus impositis medicamentis, vlcerā carne replentur ac coeunt, appellationem hanc sortita sunt. Opus ipsorum proprium est affectam partem recrementis vacuare, ne videlicet sanies carnis generationem glutinationem q; impediāt. Indicatum porro est glutinatoria carne explentibus esse sicciora, item quæ carne explent detergēdi vim omnis morfus expertem referre: glutinantibus autem non absterforijs prorsus, verum delicantibus solum, esse licet. At cum cicatricem quoq; ducentia pharmaca multo his (præterquam q̄ abūde adstringunt) sicciora sint, statuamus demum & quæ glutinant & quæ coniungūt, moderatius istis exiccare. Finis autem glutinantium est nullam inter coitura subnasci humiditatem permittere: Cicatricem verò contrahentium non hanc tantum impedire, sed etiam num cōsistētem in ijs, quæ mox cicatricem ducent, consumere, ad hanc callum obducere & adstringendo indurare. Quæ carne implent, sanguinem ad refectionem idoneum tum pro quantitate tum pro qualitate tuentur, ac tantum talem q̄, quanto natura & quali ad carnis generationem indiget. Caterum mordicationis prorsus expers medicamen purum vlcus seruat, si quidem tale acceperit: si verò sordidū, necesse est tantum pro sua ipsius potestate detergens sit, quantum crassitudinis sordes habuerit: quin etiam carnem recens iunctam mordere & exedere debet. Vnde palam colligitur id, cum tale existat, vlceri carnem non esse inducturum, nec cavitatem carnis repleturū, sed quòd potius colliquabit imminuet q̄. Atq; huius rei causa medicamentum, quod sordibus copiosis repurgandis est, quo de antea dixi, non semper carnem potest gignere, nili vel ex vberiore oleo, vel rosaceo liquatum: sicut quod oleosum & quod ex charta inscribitur, deterfionis vehementiam remittat, vel ex cerati mistura mordicationem deponat. Huiusmodi sunt plures multiplicis vsus medicamenta, quemadmodum Machæronis emplastrum, & Iliis. Scopus igitur singulorum id genus in therapeutica Methodi libris declaratus est, simplex facultatum materia in alio opere priori, cōposita in præsentī tractatur. Ac primum sanè in eo meminisse oportet naturę corporum, quę curanda susceperis. Nam humida, eo q̄ mollia, quemadmodum mulierum, puerorū, eunuchorum, & qui muliebriter degunt, imbecillioribus medicamentis indigent: virorum corpora, potissimū qui ex virilibus munijs & Sole durum corporis habitum conciliarunt, ab imbecillibus nihil præsidij sentiunt. Quapropter nec glutinantia vtrorūq; corporum communia sūt, sed quæ ex argēti spuma oleo & aceto præparantur (in priori libro de iplis egimus) imbecillam mollem q̄ carnē glutinant: quæ bitumine ærugine squama aloë & myrrha constant, robustam & duram. Itaq; bitumen ipsum per se in harum virtutum scopo continetur. At nulla ratione solum ex oleo liquatū vsurpare poteris, vt quod friabilius sit, q̄ medicamento emplastri forma faciendo cōueniat. Vt igitur emplastrum fiat, ceram & resinam ei admiscemus: à quibus denuò virtutem eius solutū iri scientes, interdum æs vel eius squamam, sæpe aloen vel myrrham, vel in summa siccans aliquod medicamentum, non ineptè adijcimus.

Ex Bitumine Barbara.

CAP. 22.

Prima hinc quoq; ab Andromacho scripta apponam iplis illius verbis.

Barbara Andromachi.

C Barbarum, quo vtor. Cera, picis, resina, bituminis, singulorum denariū pondo ducentorū: thuris drach. viginti quatuor, olei heminam. *Aliud.* Picis pondo lib. ij: bituminis, cera, singulorum pondo libram: guttæ ammoniaci, manna, singulorum pondo vnc. sex: cerullæ pondo vnc. iij, olei hemina dimidium, aceti heminas quatuor. Hoc Aphrodas admiratus est. *Aliud Nigrum.* Picis arida, resina arida, bituminis, singulorum pondo libram: cerullæ pondo vnc. vi: manna, atramenti sutorij, æruginis rasa, singulorum pondo vnc. iij: olei hemina dimidium, aceti tantundem. *Aliud ex emplastris Galli.* Seui caprini denariū pondo triginta, æruginis denariū pondo octo, cera denariū pondo quinquaginta: aristolochiæ, bituminis, picis, singulorum denariū pondo viginti quinque: guttæ ammoniaci denariū pondo duodecim, chalbanī denariū pondo duodecim, sulphij denariū pondo octo, manne denariū pondo duodecim: preparato. *Aliud, quod Inuictum dicitur.* Cera denariū pondo centum, seui taurini denariū pondo triginta, bituminis denariū pondo viginti quinque, picis denariū pondo viginti quinque, terebinthina denariū pondo viginti quinque, nitri denariū pondo vigintiduū, aristolochiæ denariū pondo duodecim, chalbanī denariū pondo octo, myrrhæ denariū pondo octodecim, thuris denariū pondo duodecim, ammoniaci denariū pondo octo, amomi drach. octo, cardamomi denariū pondo xij, opopanax denariū pondo octo, medullæ ceruinæ denariū pondo quindecim, æruginis denariū pondo duodecim, aloes denariū pondo octo, bdellij denariū pondo sedecim, olei heminas duas. Ego verò adieci propoleos denariū pondo duodecim. *Aliud, quod cruentis Vulneribus imponitur, Iuliani.* Argenti spumæ, bituminis, cera, picis brutiæ, singulorum denariū pondo quinquaginta: resina frictæ denariū pondo quindecim, aris squamæ denariū pondo duodecim, thuris denariū pondo quatuordecim, chalbanī denariū pondo octo, chalcitidis denariū pondo quatuor, aloes denariū pondo sex, gallæ denariū pondo quatuor, myrrhæ denariū pondo

* Aliter xx.

* Aliter xx.

* AP. xii & s.

* Aliter xx.

* Al. cardamomi. nasturtij.

Quinta Classis.

fffff iij quatuor,

DE COMPOS. MEDIC.

quatuor, aristolochiæ longæ denariū pondo sex, aristolochiæ rotundæ denariū pondo quatuor, olei veteris heminas quatuor, nosolei heminas tres.

Barbara Hera.

Quod Heras cōscripsit barbarū, sic habet. ¶ Nigrū Emplastrū, ad cruenta Vulnera, ad Diuisiones notatu dignas, maxime capitis, ad Fistulas, Sinus, Fracturas. Conuenit etiam Hepaticis, & Lienosis, citra inflammationem glatinat. Benefacit etiam Nerus, Cartilaginibus, & Ossibus præcisīs. Cohibet etiam mirifice Sanguinem erumpentem. Insuper valet ad Tubos & Sinus, glutinat enim insigniter. Item in Abscessibus humore ablato hoc imponitur. Est etiam ad Sanguinem cohibendum præstantissimum, præsertim in ijs, qui sanguinem reijciunt: duas Verò in pelles illinito, & Vnam pectori & lateribus imposito, alteram dorso: præter opinionem sanguinem sistit. Valet insuper ad Canum hominum q; morsus, in totum phlegmonem arcet. Idem ea, quæ Vulneribus adhibentur, superat, vt experientia indicauit. Hyeme diebus septem soluitur, per æstatem quinq; si Verò necessitas urgeat, tribus.

*Al. seminiā.

Ceræ, picis, bituminis, pityinæ, singulorum pondo libram: mannæ pondo vncias sex, cerussæ pondo vncias quatuor, chalcanthi pōdo vncias quatuor, opopanacis pōdo vncias duas: olei seminiā, alij selibram: aceti heminas duas. Ceram, bitumen, oleum, acetum paululum relinquens, in olla recenti liquato: deinde picem & resinam adijcto: in minima frusta diligenter concidito: vbi semicoctum fuerit, tollito ollam: & aliquandiu refrigerato, atramentum sutorium percolatum læ F uigatum q; ex duabus aceti heminis paulatim inspergito, ne effuerescat: quando autem effundis, leuiter ignem subministrato mouens: cum non inquinat, cacabum deponito: opopanacem in reliqui aceti parte pridie madefactum infundito, vt dissoluatur: mox cerussam mannāq; vnā pariter trita inspergito: & paululum tepesciens, vt in vnum coeant, obserua ne opopanax & manna adurantur: refusa in mortarium ibi refrigerari finito: ac rursus subacta reponito, atque vtor.

Porro manifestum est etiam alia barbara, quæ tum Andromachus, tum reliqui tradiderunt, eodem modo confici oportere. Quidam opopanacem cacabo non iniiciunt, sed læui ex aceto factō, liquata in mortario superfundunt. Cum eo nō nulli miscunt mannā & cerussā, quemadmodū ego quoq; sapius feci in mortario terens ex aceto, & quæ liquari possunt, liquefacta infundens. Subinde verò atramentum sutorium duntaxat cum opopanace læue factum cacabo indidi, mannā cerussāq; inspergens. ¶ Aliud Barbarum, Hera. Heras soli huic præscripsit, barbarum, ego verò antecedens etiam similiter appellauī, etsi nigrum ab ipso nuncupatum: quoniam plerique ex recentioribus medicis emplastrā ex bitumine, barbara nominare consueuerunt. Heras de ipso sic ad verbum. ¶ Barbarum ad recentia Vulnera, Sinus, Canum hominumq; morsus, Condylomata, Inflammata, ad Articulorum vitia omnia in principio, & Podagram. Ceræ, picis, resinæ frictæ, bituminis iudaici, singulorum pondo minam: argenti spumæ denariū pondo decem, cerussæ denariū pondo quinq; æruginis denariū pondo quinque, opopanacis denariū pondo quatuor, olei heminam, aceti cyathum. Cera, pix, bitumen, resina incoquantur, donec illiquata fuerint: deinde reliqua ex oleo trita iniiciuntur: his ablatis ab igne, & aliquantulum refrigeratis acetum paulatim instillatur. Talis sanè barbarorum emplastrorū formula est. Ego vbi paucis exposuero quomodo ipse vtar, sermonem de eis finiam. Sunt autem duo, vnum ad maxima vulnera, alterum ad minora. Quod itaq; ad maxima adhibetur, hæc recipit.

*Al. heminam.

*Al. cū i. quibus.

Barbarum Galeni.

¶ Picis pondo libras octo, ceræ pondo libras sex & vncias octo, pityinæ pondo libras quinq; & vncias quatuor, bituminis pondo libras quatuor, olei pondo libram & vncias sex: argenti spumæ, cerussæ, æruginis, singulorum denariū pondo viginti quatuor: thuris pondo selibram, aluminis liquidi denariū pondo xij, fissi pondo vncias quatuor: opopanacis, squamæ, chalbanī, singulorum denariū pondo duodecim: aloes, opij, myrrhæ, singulorum denariū pondo quatuor: terebinthinæ pondo vncias viginti quatuor, mandragoræ succi denariū pondo sex: aceti heminas sex, quæ valent libras quinq;. ¶ Simplicioris Barbari symmetria est talis. Picis, ceræ, resinæ pityinæ, H resinæ frictæ, bituminis, horum quinque singulorum pondo libram: argenti spumæ denariū pondo decem, cerussæ denariū pondo quinq; æruginis denariū pondo quinq; opopanacis denariū pondo trium, olei hyeme pondo vncias nouem, æstate pondo vncias sex. Quæ liquari possunt, siccis in mortario aceto acri leuigatis affunduntur. Quod si sedando dolori aptius voles medicamentum reddere, hyoscyami succi denarij pondo vnus s, item opij tantundem, admisceto.

GALENI DE COMPOSITIONE MEDICA-
MENTORVM PER GENERA
LIBER TERTIVS

ARGVMENTVM LIBRI

De Medicamentis, quæ ad Vulneratos, Punctos, Contusos, ac Quocunq;
pacto affectos Nervos adhibentur.

De Vulneribus Nervorum.

CAP. I.

B Thæ amici cōmentaria vobis paro, qui iam ex ipsis medicinae operibus cō-
peristis, q̄ efficax sit nostra nervorū vulneratorū curatio, nempe ex qua oēs
servati sint, non autē manci nec claudi redditī, quæ aliter curatis accidere con-
spexistis, quæadmodū ēt nō nullos conuulsione correptos, vel cū dolore vel
putredine vel febre mortuos. Par autē est hosce libros ad aliorum quoq; ma-
nus peruenturos, qui scriptis bene vti nō possunt, vel quia à præceptore me-
dicæ artis speculationem non didicerunt, sed oīno rudes, quasi vix iniatiati &
prorsus inexercitati permanent: aut quia perperā edocti, adhæserunt ijs, qui
cōposita medicamenta sola experiētia citra rōnem esse inuenta asserunt. Etenim ij manifestō cō-
tentione sua errant. Altero modo nō minus prædictis errant ij, qui nullum pharmacum ex sim-
plicibus facultate contrarijs cōfici oportere arbitrant. Verū hos medicamenta superiore libro cita-
ta coarguunt, vt quæ magnas ipsorū vires ex contrarijs inuicē simplicibus cōpositis ostendent:
immo ēt in libris hunc subsecuturis præstantissima pharmaca ex contrarijs virtutibus cōposita
indicabuntur. Nunc de nostra curandi rōne, quam in nervorum vulneribus excogitauimus, to-
to hoc libro differemus, ostendentes quantam eiusdem facultatis medicaminum copiam, tum ex
generalis sanandi scopi indeptione, tum ex simplicium virtutis cognitione, inuenerimus.

Quis Communis Vulneratorum Nervorum Curationis modus, & quæ Medicamenta specialia. CAP. 2.

C Spectauimus omnes præceptores præsidio, quod iam recentiores medici Sanguinarium seu
Sruentis opitulans (græcis Enamōn dicitur) & glutinatorium appellare solent, vti: nam ini-
tio medicamentum aliquod ex enemis imponentes, vulneris oras cōmittere seu glutinare molie-
bantur. Si vero phlegmone eas obsederat, calida aqua liberaliter fouebant, oleum affundētes: ac
tritici farinam ex hydrelæo decoctam, epiplasma applicabant. Quin etiam gladiatores in patella
vulneratos, supra q̄ hanc in lato tenui q̄ tendine, pari modo ab ipsis curatos vidi: forsan melius
dicas non curatos, sed perditos, paucissimi enim illorum & ij claudi superuixerunt. Et verò etiā
permultos in manu summa tendones, per quos digiti flectuntur extenduntur que, vel contusos,
vel minimo punctu læsos, putrescentes adeo conspexi, vt coctis præsertim diutius in aqua similes
apparerent: non enim secus exoluuntur, & consistentia emollescunt, qui superiorem sanandi mo-
dum experiuntur. Itaq; ipsum reprobauī, vt qui partem vulneratam putrefaceret. Quoniam ve-
rò putrescentia omnia ab humiditate ac caliditate id pati prænoscebam, curationem per siccantia
refrigerantia q̄ moliendam esse deprendi. Rursum apud me cōtemplatus frigidum verè ab Hip-
pocrate || neruis inimicum dici, optimum fore nervorum vulneribus medicamentum intellexi,
quod & liccaret, & medium esset inter calefaciens & refrigerans, vel non multū à medio ad calorē
Drecederet: calidum verò etiam esse satis posse, modò siccandi potestate polleat, etenim calor citra
humiditatem putrefacere nihil habet. Insuper illud quoq; cū cogitando adinuenissem multū
referre, nudæ parti affectæ medicamentum offeras, an per alia corpora ei præposita, conuenire ad-
uertī alijs in nudato neruo vti pharmacis: alijs cū punctus fuerit, partibus quæ ipsi præiacent il-
læsis. Vbi etenim nudo neruo medicamentum adferas, ibi prædictam auxiliorum integram indi-
cationem assumi cōuenit: præpositis autem partibus saluis, tenuius pharmacū inueniendū est, cu-
ius virtus interiacentes particulas permeando non dissoluatur, sed in altum penetret: Hoc autem
efficere tale pharmacum posse, si validè liccet, & si non calore & frigiditate medium sit ac sym-
metron: neq; offendere, dum efficacia ipsius calefaciendi vel refrigerandi in particulis, quæ ner-
uoso corpori præpositæ sunt, penetrandis, imbecillior est reddita. Atqui inuento iam præsidio-
rum scopo in substantiæ eorum tenuitate, deinceps materiæ mentionem facere oportet. Pluri-
ma igitur, quæ calefaciunt, tenuiorum esse partium: permulta rursus, quæ refrigerant, crassiorum:
in simplicium medicamentorum speculatione didicimus. Quippe vna solum inter ea qualitas acida
cum tenui substantia non nunquam fit, eo q̄ inter omnia, quæ refrigerandi vim obtinent, tenuio-
rum partium acetum est acerrimum, quod etiam caloris exigui particeps esse demonstrauius.
Calefacientium verò liquores probi tenuissimam habēt substantiam, & apud omnes iam homi-

Quinta Cassis.

fffff iij nes

5^a. Aph. 18. Ex.
ord. 39. 2

nes Cyrenæus primas tenere cognoscitur: qui si non adsit, etiam medico utimur, & ijs, quæ cum E
 iplis ab orientalibus plagis asferuntur, cuiusmodi est, quod sagapenum appellamus. Hoc genere
 comprehenditur & liquor Euphorbij in occidentis orbis regionibus natus, siue liquorem ipsum,
 siue aliud quid nominare velis: nobis in toto commentario euphorbium hoc medicamentum vo-
 care sufficit, quemadmodum iam omnes consueverunt. Quin immo & inter ea, quæ in nostra re-
 gione proueniunt, & Panacis & Tithymallorum liquores subtili facultate præditi sunt. Et verò
 etiam omnes nominati liquores generose calefaciunt: Opobalsami verò, qui subtilis & ipse est,
 nõ admodum calefacit. Ex terrestribus autem Nitri spuma tenuem substantiam habet: item quod
 ex aqua facile soluitur Aphronitrum, si ad corpora terrestria videlicet relationem fieri inaudia-
 mus. Subsequitur Nitrum nomine Berenicium: & Asia petra, cuius flos etiam omnium terrestrium
 est subtilissimus. Porro ex metallis Auripigmentum & Sulfur, tum subtilia, tum calida sunt: qui-
 bus succedit Misy, Aeris squama, & Chalcitis, paululum simul adstringentia. Quare vsta quoque
 chalcitide frequenter in subtiliorum medicamentorum compositionibus utimur. Citra calorem
 verò manifestum tenuium partium metallica sunt Spodium & Pompholyx: adde, quod vocatur
 Pforicum: subtilis abunde est & Chrysocola. Caterum inter succos Laurinum simul cum eo q
 valide calefacit ut ad sentum, tenuem esse dicimus. Nihil enim minus eo calefacit facultate Cedri F
 nus, calore tamen qui sensibus subiicitur, propter substantiæ suæ tenuitatem, illi cedit. Eiusdem cū
 cedrino generis est lixiuia, quæ itacē id est stillatitia dicitur: atque inter hanc ipsam, ea quæ ex ma-
 teria subtili vsta fit, cedrinum oleum virtute superat. Ex malo igitur & ficu, ea quæ magis agrestis,
 quam vocant caprificum, item ex tithymallis combustis, huiusmodi lixiuiam conficitur. Præstā-
 tissimus est ex tithymallis, qui characias nūcupatur. Caterum ex seminibus frumentarijs, uti no-
 minant, subtilissimum est Eruum, sine insigni calefaciendi potestate, Lolium verò cum insigni:
 Hordeum nequaquam calefacit. Mediam inter ea materiam obtinent, qualitibus amara, quæ mul-
 tum tenuibus substantia cedunt, crassi licet nihil habentia. Non nulla ipsorum a medijs tantillum
 declinarunt, alia ad calorem, alia ad frigiditatem: quorum omnium materias in opere de Simpli-
 cibus medicamentis executus sum, quemadmodum etiam omnium nucum (græcis Acrodrya di-
 cuntur) in quarum numero sunt amygdala amara & pistacia. At stirpium materiæ in præsentia
 non memini, redire enim ad principium cogito, atq; exponere, quando, quoq; modo, singula per
 rationem nobis inuenta vsurpauerimus. Hinc enim puto bonæ indolis iuvenes incitatum iri, ut
 medicamentorum materiam cognoscant ipsimet insipientes, non semel aut bis, sed frequenter,
 quoniam sensibilibus rerum cognitio sedula inspectione confirmatur: cuius rei indicium est cui- G
 dentissimum, qd gemini per omnia similes esse nobis videantur: differentes autem ijs, qui ipsos in
 spicere consueverunt. Itaq; herbarum fructu & arborum materiā prius, q̃ ē terra eximantur, cō-
 templari pulcherrimum est, dum fructus videlicet futuri sunt, dum eduntur, dum augescunt, & dū
 vigent. Hæc siquidem continua eorū speculatio docebit te, quando potissimum ipsos commodè
 decerpas, ac in liccis domunculis repositos custodias, ne a Solis radijs exurantur, neq; ab humidi-
 tate ex tecto vel muris madesiant. Id optimè fiet, si domus neq; subterranea sint, neque alijs vici-
 næ, neq; sub tegulis, sed omnia ad meridiem spectantia habeant, prope quæ tamen medicamenta re-
 poni non debent. Amici vos admoneo, ut in hoc quoque me sequamini, si artis opera pulchrè
 obire velitis: nouistis enim, quomodo ex omni natione præstantissima quotannis medicamenta
 mihi adferantur, eo qd perditū illi omnigenarum rerum coemptores (græcè rhopopolas vocant)
 varijs modis ea contaminant. Præstiterat forsā non hos solum, sed multo magis etiam mercato-
 res qui illa aduchunt incusare: atque his multo magis ipsos herbarios: item nihil minus eos, qui
 radicum liquores, succos, fructus, flores, & germina ex montibus in vrbes conferunt, hi siquidem
 omnium primi in eis dolum exercent. Quisquis igitur auxiliorum vndiq; copiam habere volet,
 omnis stirpium materiæ, animalium, metallorum, & absque metallica natura terrestrium corpo- H
 rum, quæ ad medicinæ vsum ducimus, expertus esto, ut ex eis & exquisita, & notha cognoscat:
 deinde in commentario meo, quem de Simplicium medicamentorum virtute prodidi, sese exer-
 ceat. Nisi enim hoc modo instructus ad præsentis operis præsidia veniat, verbo tenus quidem me
 dendi methodū sciet, opus verò nullum ipsa dignum perficiet. Fingat nanque ipsa, quæ de ner-
 uorum vulneribus prædixi, quædam aliquis cognoscere, adulterata verò medicamenta per igno-
 rantiam compositioni iniicere, vel neque omnino exactè facultates ipsorum intelligere, an non
 erit necessarium frequentius hunc errare, quam rectè agere? mihi quidem vel admodum vi-
 detur. Iam verò accuratè virtutes cognoscere ab eo multum differt, quod est cognoscere.
 Etenim solum cognoscere, scire est, an medicamentum siccare, vel humectare, vel refrigera-
 re, vel calefacere suapte natura nos possit: accuratè verò cognoscere præter hoc etiam virtutis
 quantitatem sciuisse est. Quædam enim pharmaca calorem tepidum generant corporibus no-
 stris admota, quædam moderatum, quemadmodum alia hoc paulo validiorem, non nulla iam sic
 feruentem ut vrere possint. Conuenit igitur medicum non modò affectus qualitatem, sed etiam
 ipsius, ut ita dicam, quantitatem, coniectasse: nam haud ita propriè quantitas in qualitate dici-
 tur, quanquam dicatur tamen, ut febris magna & parua. Ac tantus vsus est eorum, quæ sic di-
 cuntur,

A cunctur, vt iam propriij vim obtineant ipsa, perinde ac pyxis, excusor, pictor, quercus incisor: in totum quæ ex vocato à grammaticis abulu incepterunt, deinde vero propria dici credita sunt. Hæc quidem attulimus propter eos, qui parum opportuno tempore de sermonis proprietate arguantur. Quod autem dicere delij, tale est, nempe, Quod exiccari deliderat, non simpliciter liccante indiget medicamento, sed conuenienti mensura: copiosa quidem humiditate auctum, insigniter exiccante: parua, parum hoc faciente: quemadmodum multa, admodum reliccante, non tamē extremē, neq; in summo, siccitatis enim quantitatem, humiditatis copię, respondere conuenit. Ego itaque dum communem neruorum vulnerum curationis modum immutare primum ausus sum, conieci in quantam humiditatem caliditatem q; affecta pars recidisset. Et cum adolescens quidā mihi ostensus esset in primo articulo medij dextræ manus digiti, totum circa neruum locum humentem adeo ex contusione habens, vt iam computresceret: partem sanē putrescentem cataplasmate ex lixiuā stillatitia & hordei farina (sic autē nosti me omen lylin Græcis dictam nominare) foui: non putrescentem vero, sed tensam dolentem q; oleo calente liberaliter perfudi: inde cum lana sicca madorem exhaustissem, ceratum tam humidum illeui, quā in fracturis vtimur, cui euphorbium sit admistum. Confectum autem mihi fuerat hoc quoq; mea industria huiusmodi occasione. Profectus ad me quispiam hyeme vehementi, ostendens q; genu, facile dicebat rigore id affici, statim vero calefacientibus iuuari. Rogabat igitur huiusmodi aliquod medicamentum darem, vt qui profectus in frigore in algeret doleret q; vehementius quā aliās. Nunc igitur, inquit, loturus discedo, mittam autem ex balneo qui medicamentum accipiat. Hæc cum dixisset abiit. At ego cum tale nullum medicamen ad manus haberem, euphorbium cum oleo triui, & ceram liqua tam immiscui: paulo post cum amicus pharmaco ferendo puerum misisset, exhibui. Dolore protinus cessante, inde in alijs particulis similiter effectus vti præcepimus, de quibus mox dicitur.

Nunc ad nerui vulnerati sermonem redeo pp eos, qui nihil, quod ego nunc dico, intelligunt, vitio autem vertunt dictiunculas: quos inuenire auguror neurotrotus (quasi neruis faucios dicas) perperam eos nominari, qui in tendonibus vulnus acceperint: tendones enim ipsis puto vocari, extra manum toti carpo id est brachiali, et digitis supertensi sunt. Quanq; sanē non ignorē manifestius magis q; proprie tenontotrotus (id est in tendonibus vulneratos) ipsos nominari: tamen cum omnes neurotrotus i. in neruis fauciatos, nuncupare soleant, & ego ne quis innouare me appellationem dicat, consuetam pro vera suscepi, etsi nec illa sine ratione abire in consuetudinem potuerit plerisq; medicis tendones etiam neruorum nomine iam vocitantibus. Verum siue in neruis, siue in tendonibus vulneratos appellasse mauis, neq; ob has voces incolumes erunt, neq; conuulsione laborabunt, quemadmodum neq; manci fient, nec morientur: appellatio siquidem nec seruauit hominem vnquam, nec perdidit, sed medicamentorum facultas vtrunq; efficit. Atq; ego hæc immutans, putrescentes, conuulsos, mancos, non nullos etiam pereuntes, sanos viros q; reddo. Nam neruos contusos habentes sicut ille habuerat, neurotrotus (id est in neruis vulneratos) non neurothlastus (id est in neruis contusos) nuncupare anticiparunt. Cæterum curatio cōis est, & periculum æquale amborū, nempe contusorum & vulneratorū vel neruis vel tendonibus. Itaq; homo ille putredine iam circa primū medij digiti articulū orta, cum superiacentiū tentione dolore q; infestare, multo melius habere cœpit die postero, quo vice hordei farinæ, eruorum farinam stactæ lixiuā cōmiscuimus. Ac tertio sanē cū similiter ē curaretur, iam quidem in alijs particulis dolorem omnino non percepit, ex cōtusione verò neruosum quoddam corpus crassæ membrangæ per simile exertum est: quod mediocriter me commouente facile totum semiputridū excidit. Videbatur omnibus contēplantibus hoc corpus neruus totus esse qui computruisset, vt qui ignorarent, quo pacto tendones hi neruosis mēbranis conuelati per brachiale procedunt, & super totos digitos extenduntur: mihi verò putridū ex contusione attollenti tendo saluus apparuit. Cū igitur

D vel pastillo vno, vel trochisco, vel vtcunque vocasse libet, quorum in numero est & ille Polyide, soluto ex hepsenate, vel sirao id est sapa (nā & hoc pro arbitrio nominare liceat) apparentem nerui particulam prius iunxissem: rursus eodem modo & cataplasmate, & vnctione ex euphorbio, in iisdem locis sicut prius, vtroque vsus sum. Quarto iam die omnia cōposita circa contusum quidem antea, vlceratū vero tunc primū digiti articulū intuitus considerabam, quorsum à cataplasmate transgrederer. Visum igitur est si neruus inflammatione prorsus vacaret, ad cicatricem ducentia transire: si vero phlegmones ipsius scirrhosum quidq; remaneret, aliquod ex abunde liccantibus exhibere. Qm̄ igitur non nihil ex ea reliquum esse videbatur, medicamentum ex dracunculi radice confectum prius vsurpauī, quod alia eadē cum ægyptio pharmaco, quæ līs vocatur, continet: assumpsit autē dracunculi radicem. Ab hoc verò deinceps Athene i. Minerva dicta vsus, inde ad ea, q̄ cicatricē ducunt, perrexi. At cū alium curare pastillo sapa diluto nudatas vulneris partes illinens, euphorbiū extrinsecus imponebā, tñ ceræ ac resine miscens, vnde emplastri crassitudo simul fieret, & euphorbij vires conseruarenī. Cæterū quō ad hos scopos respiciens medicamentū cōponas, deinceps declarabimus. Etenim aliud quoq; ex aceto pharmacū cōfecimus, hoc spectātes, vt ipsius spissitudo, & subtilis acetī virtus, cū refrigerātis facultatis exolutiōe incolumis pmaneat. De his sanē, quō cōposita sint, post paulū tractabitur. Nūc quia neruis vulneratis medendi modū

* προσεσθ-
μένα.

περιπτώσει. ex rationali indicatione nugatorio illo empiricorum casu repudiato inueni, totam cogito ipsam E dicere, ita ut nullam distinctionem præteream, sermonem ab initio rursus repetens. Quando igitur vulneratum aliquem protinus suscipio, interim per liquida pharmaca curationem molior, interim emplastris, lanam extrinsecus quam mollissimam oleo calente imbutam applicans. Quod si medicamentum ex aceto usurpem, aceti parum oleo admisceo, ac bis ter uel quotidie soluo, & oleo calente foueo. Si noctes longæ fuerint, etiam in his soluere consueui: id quod magis facio, dum vlus à medicamentis mordetur: nam ubi initio tali medicamento uienti æger nec se morderi, nec dolere, nec tensionem percipere mihi dicat, die soluo & foueo mane semel, & uespere iterum. Oleum vero quo fouemus, satis calens esto, verum ita, ne vulneratam partem offendar: licet enim frigidum huiusmodi affectibus maxime est contrarium, sic tepens non omnino utile. Nanque in primo de Simplicibus medicamentis volumine didicimus, ut aqua in eo, quod calens aut frigida sit, maxime contraria facere nata est. Ita quoque oleum, nam frigidum corpori admotum, perspiratum quodammodo ipsius obstruit, immo prohibet: calidum vero, digerit ac extenuat. Quod tibi etiam ex carnibus in eo coctis licet condiscere: similiter enim ut præaciditas friabiles efficit, etiam protinus cum animans maceratum est, in eo coquas, aut sartagine frigas. Propter quod et ego fomentum ex oleo satis calente usurpare malui, tepidum semper vitans, adhuc autem magis frigidum. Porro ab aquæ usu in tota curatione ita tempero, ut ne attingat quidem vlus: proinde cum sanguis initio statim à vulnerata parte eluendus est, ex oleo id facere expedit. Ubi autem iam ægri mediocriter habentes lauacro utuntur, neque tunc affectum locum in aquam demergere ipsis concedendum: magna siquidem ex parte nerui in manibus vulnerantur. Memini cuiusdam ex huiusmodi vulneratis, qui cum diem quartum citra omnem dolorem ageret, partem quæ affectam absque phlegmone videret, multo in frigore domo egressus ad opus quoddam necessarium, ei que diu immoratus, domum rediit membro uniuerso ad ceruicem usque tenso, id que cum ingenti ipsius dolore. Postquam uero quodam me accersente profectus ad eum, vidi quibus in malis esset, oleum ex itinere refrigeratum à particula auferri iussi, calente uero totum membrum foui: deinde ceruicis partem aduersam lanis oleo resperxis, & medicamento liquido ex euphorbio simul cum castorio hominem statim mitigaui, & somno post hæc accedente usque ad uesperam omnia cessarunt symptomata.

Præ omnibus igitur danda opera est, ut lana permaneat calida, siue oleo tantum, siue oxelæo hoc est aceto & oleo, quoque imbuta fuerit: fiet hoc si aliæ lanæ siccæ extrinsecus circumponantur, & æger intra tertium, cum hyems fuerit, ad quintum usque vel septimum morbi diem sese contineat. Nam si eousque nec phlegmone aliqua tentetur, vacet que prorsus dolore, & nullam sentiat tensionem, in posterum tutus erit. Curabis autem, ne in aceto vinosum aliquid appareat, quemadmodum oleum quoque ut omni astrictione vacet. Neque igitur quod crudum vel immaturum dicitur, adhibebis: neque id quod ab Hispania uehitur, ac vocant Hispanum: immo nec aliud quodlibet ex istis, quæ olæ furculos habent. Optimum oleum est tenue, quale in Italia Sabinum: alibi uero in nationibus Romano Imperio subiectis, quæ nullam adstringendi vim obtinent.

Iam uero qualis res sit rationalis indicatio, & quanto ditior quam nuda experientia citra methodum, vel hinc condiscas. Cum permultis neruorum vulneribus sæpe in itinere, in nauigio, in agro, vel in ciuitate, sed procul à meis ædibus incidissem: nec medicamenti ex euphorbio copia adesset, nec illius quod ex aceto conficitur, nec alterius: pharmaca, quorum forte fortuna eo loco facultas erat, vulneri imponentes, propositum semper sumus assecuti. Noui etenim me ipsum in agro propolim recentem liquidam & pinguem, quam agricola habebat, vulneri imposuisse: interim fermentum solum, interim ambo commista. At fermentum quam vetustissimum esse: propolim uero contra habere conuenit, quantum ad tempus attinet: sin autem vetustior sit, ex oleo iuxta ignem, vel in Sole, emolliatur. Rursus in alio quodam rustico succum tithymalli fermento mistum imposui, quem prope ipsius cortem succreuisse conspexeram: quippe fermentum ut recens contemnebam. Non nunquam & propolim ex oleo liquefactam fermento subegi, sed prius aceto quam acerrimo dissoluto. Præstat oleum esse uetus in huiusmodi misionibus, puta ex oxymelite & fabarum farina, vel eruorum, vel lolij, vel ciceris, vel lupinorum amarorum, vel tenuiori polentæ puluere, vel hordeacea farina: Quibus, in urbibus, usus sum cataplasmatibus, non solum in istis, quos iam phlegmone prehenderat, sed etiam protinus ab initio. In agro cum & picem liquidam apud fabrum inuenissem, fermento mistam imposui. Item apud alium eruorum farinam illo subactam: cuius penuria etiam prædictarum quæuis misceri potest. Quin etiam oxelæum solum, quod caleret, lana exceptum statim, dum aliud nihil haberem, obtuli, confusus aceto abunde acri & uetusto. In alio refrigerato, quod ante horam unam, vel longius etiam tempus neruus contusus esset, quousque mihi quoddam idoneum medicamen adferretur, expectaui, partem oleo foueri præcipiens: interim aceto prius admisto, quoniam aer per æstatem calidissimus erat, mistura ex utroque diutissime foui, donec aliud medicamentum allatum fuit. Singulis autem prædictis farinis permistam quoque statim sæpe illeui, & mox à principio, & postea, cum homo medicamine quodam, quod cruentis imponitur, non probe usus esset.

Hæc itaque omnia, quomodocumque applies, medicamina calida qualitatibus offeras. Et vero

Aro etiam cum domo mea egredi festinans aliquando, medicamentum nullum in promptu cōpositum haberem, dedi cuidam familiari vetus euphorbium: iniunxi q̄ læue factum ex oleo veteri, donec humidi cerati spissitudinem haberet, tēdinis puncturā in manu admoueret. Reuerfus igitur interrogauī vulneratum, multum ne caloris in parte affecta sentiret: ille mediocrem quandam respondit se percipere. Rursus igitur quæsiui, an mordicationem a medicamento in vulnere sentiret: ille cum se non morderi, sed veluti pruritum quandam sentire dixisset, pharmacum ad noctem vsq; adherere permisi. Quoniam vero cum imposita abstulisset, calor in affecto loco medio cris mihi apparuit, neq; punctura hians, satius mihi visum est eodem vtī medicamento: & verò cū vulneratus altero die prospere haberet, item tertio, & quarto, ad finem vsque idē pharmacum vsurpauī: Quod contemplatus quidam, in alio vulnerato similiter recenti euphorbio in eundem modū vsus est: quare necessario calor agrum multus, & commorsus, & dolor in vlcere subsecutus est, adeo vt homo ad me deductus sit, tanq̄ hoc prater omnium opinionem accidisset. Atque ego statim re intellecta, quod impositum erat abiēci: fotu autē per oleum ipsi adhibito medicamētum ex aceto imposui: quod si non in procinctu fuisset, pharmacum ex euphorbio copiosioris ceræ participes admouissem. Quapropter non oportet, vt paulo ante diximus, probatorum medicaminū

B facultates ac species ignorare, nec quæ celeriter virtutem mutant, tum quæ rursus diutino tempore conseruant. Nam ex iis, quæ caducum ac statim euanescentem calorem habent, euphorbium est. Id autē cognoscēs, ēt si non manduces, colorem contēplatus: quippe non vt ab initio cinereū, verum suppalidum & subflauū redditur inueterascens. Statim etiā liccum abunde videtur tunc, & vix inter læuigandum ex oleo recenti protinus imbibito dissoluitur. At subito ipsum oleo miscendum non est, sed prius in mortario senlim terendum, ne dilatescat. Quid item opus est dicam, quod etiam gustanti tibi recens, percipiatur feruentissimum, vt linguam adurat, vetus autem exiguum efficiat caliditatem: Iam alijs quoque multis pharmacis euanidā potentiam pauculis annis habere contingit, attamen euphorbium post thapsiam: hæc enim anno admodum imbecillis redditur, vt bimula prorsus expiret: euphorbium vero cum principio bonum fuerit, & probe repositum asseruatum, que, etiam anno tertio adhuc vim aliquam retinet, interim & quarto: quinto autē et sexto iam exoluitur, deinde procedente tempore in totum elanguescit. Porro id, quo me aliquando cū inueterato oleo sine cera vsus esse dixi, quinque annorū aut sex erat euphorbium.

Vnde vsus ipsius mensura comprehendere nemo potest. Nam recens oleo decuplo † cū cera tripla commiscetur: veterascens copiosius ei immittendū est: trimum vero et quadrimum, vel duplicatum prioris pondus, vel æquale ceræ. Cum igitur pharmacum consistentia simile ac opis dictis vnctionibus habere volueris (quæ spissitudo liquidi ēt cerati est) oleū ceræ quadruplum esse curabis. Vbi verò ad emplastri speciem fiet, ceram omnino æqualem oleo miscere oportet, maxime si sicca fuerit, & vetusta: sicut recens & pinguis pauciore oleo indiget, vt ceratum in emplastri modum efficiat, id q̄ magis adhuc per æstatem. Itaq; si ceratum emplastri formula facere statueris, ceræ ex oleo liquefactæ, qua dixi symmetria, sextam recentis euphorbij partem admiscebis, vt illius vna sit drachma, ceræ sex, olei item sex vel quinq; Sed quoniam cera glutinans ac viscosa non est, quemadmodum resina & pix, ideo hanc vel illam, vel vtriusque partem, cerato admisceo. Clarū igitur est, dum hæc miscentur, non amplius oleum parī illis portione affundendum. Etenim cera ad liquiditatem multo pingui indiget: at resina quæ quidem arida prorsus sunt, paucio: liquidę et siccam quandam substantiā ad emplastri crassitudinem assumere postulāt. In ceris igitur non magna humiditatis ac liccitatīs differentia est: in resinis, sicut etiam in picis genere, contra, aridæ ab humidis permultum differunt. Omnium ergo resinarum siccissima est, quam non nulli frictam, alij colophoniam, appellant. Huic succedit, quæ ex fictilibus impura nec fricta sumitur: quā si purges, in frictam mutabitur. His ambabus siccior est, quæ dicitur pitynon phycema, ac si dicas picea

D germinatio. Hanc sanē ceu squalidam, in præsentis emplastri compositionem non esse idoneam ratus abiēci: vsus autem sum fricta & liquidis. Iam vero ex his quoque non nullæ diutius liquide permanent, quemadmodum terebinthina: aliæ cito inarescunt, sicut strobilina: media vtriusq; est abietina. Quin etiam facultate calidior est quidem strobilina, mox vero abietina, deinde terebinthina. Cupressi resinam miscere non ausus sum, vt quæ non nihil adstringeret. Putabit forsan aliquis nobiscum dissentire Dioscoridem Anazarbeum in sermone de resinis hæc verba scribentem

“ primo de medica materia commētario. Ex omnibus resinis principatus terebinthinæ datur, post eam lentiscinæ, tum ei quæ de picea raditur & abierte, post quas pinca strobilina, que numeratur. In his enim Dioscorides tanquam de intima strobilina, optima vero terebinthina, sentire videtur. Verum ego ex his tribus resinis strobilina, abietina, terebinthina, principem certē strobilinam calore, secundam abietinam, postremam terebinthinam, esse dixi. Quæ admodum igitur, qui inter Italiæ vina austera optimum ponit vinum Italicum, alius ad qualitatem vnā sermonem referens, alius absolute de tota ipsorum substantia pronuncians, verus deprehenditur: Eadem ratione etiam inter resinas optimam, tanquam medicamentum in multiplices vsus accommodatum, merito terebinthinam affirmaueris, non tamen caliditate primas obtinere. Itaque vt aiebam, licet tibi quamlibet resinam ceræ miscenti simplex ceratum glutinantius efficere, quod

† Additur in antiquis q̄ 3 o decuplo ceræ 1. et duodecim partibus iupurante.

ex oleo & cera duntaxat componimus. Hic vero experientia quoque utilitas est, quae de coniectura. E
ra nostra decernat. Potes enim ubi triplicatam ceram terebinthinam commiscueris, intelligere, empla
stri ne spissitudinem iam medicamentum acceperit: an adhuc liccius sit, ac copiosiorē in super resi
nam delideret. Quapropter ubi hunc in modum experienti tibi, mediocriter habere visum fuerit,
miscbis tunc medicamentum, quod conficis, duodecimam partem euphorbii. At si ignores an euphor
bium exacte sit calidum, an non nihil à tali discedat, post confectionem linteo paululum illius me
dicamenti illitum tuae ipsius tibiae vel cubito horis aliquot imposito: postea si modice calefacere
deprehendis, bene temperatum esse medicamentum arbitraberis. Quod si vel nullum sentilem ca
lorem dat, vel iusto feruentiorem, integrum est aut pharmacum remittere, aut intendere: remitte
re quidem mistura cerati, intendere appposito euphorbio. Atqui si Propolim pinguem habeas, eam
omnibus resinis aptiorem fore tibi intelligito, ut quae vaporosam spiritus crassitiam, humores quae
superfluos elicere, ac ex alto foras ducitare, suapte queat natura. Siquidem resinae cum cera, em
plastrum spissitudinis gratia, non tanquam curationis consilio, assumuntur, propolis autem curationis
ipsius scopo continetur. Atque hac aliquando sola, ut dixi, recenti, quantum ad humiditatem atti
net, usus sum in agricola quodam duro corpore: ac mirum est, quomodo sola ad usque finem adhi
bita adiuverit, adeo ut nullius pharmaci praeterea venerit necessitas. Alteri qui puncturam pro
fundiores haberet, tithymalli cuiusdam exiguum quid liquoris admiscui. Mollioribus vero cor
poribus medicamentum tactu durius apparet, nisi olei mistura vehementer ipsum mollias. Quin
& alia medicamenta omnia quae neruorum vulneribus adhibentur, liquida & mollia esse conue
nit. Mollitiem igitur quoduis oleum conciliare, robur vero medicamenti vetus oleum tueri potest.

Ut autem propolim in agro non nunquam accommodaui, tanquam melius pharmacum ipsae quae tunc affue
rant eligens, ita Fermentum rursus in alio admouui medicamenti inopia, quam in hoc quoque in alto fixa
extrahere & discutere sciebam. Quanto autem vetustius fermentum, tanto est praestantius. Porro
huiusmodi res non solum facile in agris reperiuntur, sed etiam sulphur viuum, quo non nunquam
& ipso sum usus miscens cum tetrapharmaco. Huic igitur & Aphronitrum, & berenicium Litrū,
& Aphrolitrum non lapidosum sed vere aphrolitrum, quod spumae consilientiam habet, adiciens
frequenter vsurpauī, non modo in agris aliorum penuria, sed etiam praesentibus enumeratis me
dicamentis hoc nomine, ut animi sensum experientia explorarem, probarem quae: Ac vulneratus ta
lis rei solo usu conualuit, sicut videlicet oleo. Hoc enim commune tibi esto in omnibus medica
mentis, quae hic dicuntur, neruorum vulneribus conducere. Iam vero & quod à medicis vocatur
Arsenicum, ab ipsis autem, qui attice omnia volunt proferre, Arrhenicum, adiunxi tetrapharmaco, G
quod animo conceperam, experientia volens pertentare: rursus cum id non adesset, sandaracham,
ut vocant, sicut calcem restinctam & viuum, lotam & illotam, minus autem viuam, plus restinctam, &
plus adhuc lotam adieci. Ceterum de exacta cuiusque componende quantitate paulo post dicemus,
ubi haec simplicia omnia, usus quoque ipsorum distinctiones, retulerimus. In hoc enim sermone propter
empiricos, qui ex peripetosi (id est incidentia seu casu) plurima compositorum medicaminum in
uenta esse putant, visum mihi est commemorare neruorum vulnera curandi rationem à me citra
casum repertam inde, quod sanationis ipsorum scopum, & simplicium pharmacorum facultates, co
gnoscerem. Etenim ex casu vnum aliquod simplex medicamentum inuenitur, rationalis autem me
thodus plurima simul inuenit, & varias ipsorum compositiones. Quae igitur ex alto humores edu
cere digerere quoque natura possunt, neruorum vulneribus ex usu sunt. Quandoquidem vero non nul
la caliditatem immoderatam, vel mordacem vehementer acrimoniam, vel acidam qualitatem, con
iunctas habent, alia ipsis pharmaca admisceri ratio est, quae praedictos excessus sine virtutis offensa
temperare queant. At hoc fieri recte non potest, nisi cuiusque medicamenti non modo qualitatis ge
nus, sed etiam quantitatem, in eo cognoscas. Quaedam namque, ut ostendimus in commentario de Sim
plicibus medicamentis, in primo calefacientium ordine collocantur, à temperatis paululum ab
scedentia: alia in secundo, magis inde declinantia: alia tertio: non nulla quarto, quae vrere iam queant. H
Igitur pro vehementiae virtutis cuiusque pharmaci proportionem, miscendorum facultas inuenitur,
modo simplicium omnium temperamenta intelligas. Empiricorum haeresis sola genere consimi
lia propter vniuscuiusque medicamenti naturae ignorantiam miscet: & qui hanc nouerunt, sola ea
dem miscunt, quia excelsus quantitatem certo non cognoscunt. Quod itaque ipse primum pra
parauī medicamentum, ex multis eiusdem generis compositum est, quoniam non dum cuiusque
virtutis quantitatem exacte pernoscebam. Inieci etenim non nihil arsenici, sulfuris, misyos, calcis
lotae & illotae, & pompholygis, similiter spodij, item squamae aris, chalcitidis vstae lotae & illotae,
ad haec non vstae. Haec igitur prius in aceto quam acerrimo diebus multis, Sole aestiuo, laeuiā red
didi. Quae superfundi his debebant, cera erat necessario, & mellis non nihil prius expurgati, re
sinae propemodum omnes, propolis, pix, & ladanum: liquida cyprinum, fusinum, opobalsamum,
amaracinum, gleucinum, cedrinum, & oleum ricinum & vetustum: ex singulis autem liquo
ribus, quos non multo ante recensui, paulum aliquid. Postremo aliam aliud auferens experien
tia gratia, nihilo simpliciora singula, quibus in hunc diem vtor, inferiora esse animaduerti: ipso
rum autem symmetriae mox ponentur. Itaque ex aceto & liquoribus talia confeci, ceram, resinarum,
propoleos,

A l. 4. f. 4. r. 4. c.
2. fol. 476. a

* AP. spumam
nitri.

Apropoleos, & pícis non nihil adiungens, pari modo ex columbarum stercore & herbis tenuium partium. Minus ergo molesta sunt liquida pharmaca cum alijs, tum neruorum maxime vulneribus. Vtuntur etiam emplastri modo compolitis propter eos, qui se lauare volunt: lanis enim ablatis ac tali pharmaco solo adhærente minore cum molestia lauant. Prædictum enim est neque tunc vulnere affectam partem aquis respergendam, si in manu id contigerit: pes vero, si is læsus sit, vt non made fiat fieri non potest, sed tunc à balneo primis quatuor diebus abstinendum est.

Quoniam verò omnium huius tempestatis hominum, & eorum iam etiam, qui ruri degunt, fortitudo perijt, qui lauare se quotidie consueuerunt, equidem qui non adeo delitius affluunt (sunt hi maximè pauperes) vt plurimum obtemperantes nobis habemus: diuites verò & præsertim potentes admodum illos, vel ægrè obtemperantes, vel prorsus im. morigeros experimur. Optimum igitur fuerit nec ipsis mederi: verum cum, nescio quo modo, alius ob aliam causam, quidam nostrum inuiti, quidam vltro, ipsorum mollitiem tolerare coguntur, tale quippiam facilius consueui: Vulneratæ parti pharmacum aliquod in emplastri modum imponens, extrinsecus iterum multiplices pannos oleo tinctos plures superinjicio: quibus rursus extrinsecus fasciam ex linteis accommodo: quam deinde in ipso rursus balneo, cum eger in solium est ingressurus, oleo prius per-

B fundo: & loto videlicet iam omnia imposita aufero, vtorque prædicto totius curationis genere.

At verò patet omnibus eum, qui pulchrè neruorum vulneribus prospecturus est, etiam particularum naturæ peritum esse oportere. Nam antea comprehensum est tendines pariter, in quos musculi plurimi desinunt, non mediocriter condolescere, primum quidem conuulsionem generantes, dein putrescentes & ipsos vicinas simul partes vniuersas inficere. Non nulli autem eorum ceu membranae, tenues latiusque sunt, quales in femorum terminis ad genua spectantibus, tum intra manus, infra que pedes subtenfi sunt. Omnes enim qui in manibus pedibusque sunt, satis quidē coeuntes cutem contingunt: qui verò in patellam perueniunt, à circumposita cute cata darlin id est per excoriationem, abscedunt. Mihi etiam hoc fortè fortuna contigit: etenim neruorum vulnorum curationem iuuenis adhuc, cum primum ex Alexandria in patriam reuenterer, annos viginti octo natus excogitavi. Quia verò singula pharmaca, quæ adinueneram, medicis amicis non solum ciuibus sed etiā vicinis exhibueram, vt omnia vsu ac experimentis firmarentur: visumque erat, haud noui quomodo, ciuitatis nostræ pontifici, gladiatorum curationem mihi soli tradere, quibus iuueni adhuc, vigesimum nonum enim tum primum attingebam: tunc vulneratos in priore inferna quæ femoris parte inuento præsidio curavi: in ijs sanè, qui per transversum percussi erant, re-

Cliquū tendinis ipse amputans, vt tuta esset mihi curatio: qui verò paruum, vel per directū, vulnus acceperant, cum securitate simul & metu totam sanandi deductionem exercens. Nam cum omnes ante nos medici plurimum aqua calente ipsos fouerent, & triticea farina ex hydrelæo modicè decocta illinirent, ego sanè aquam omnino non obtuli: oleo autem frequenter respergens simul cū prædictis pharmacis, statim omnes sanitati restitui. Quandoquidem verò multi superioribus annis fortuito perierunt, mihi tamen ne quidem vnus vel ex neruorū vulnere, vel alio, mortuus est, alter pontifex succedens illi, qui mihi tum medendi officium commiserat, similiter & ipse à septē mensium interuallo gladiatorum curationem fidei meæ concedidit: siquidem primus autumnali solstitio, secundus vigente vere, pontificatum gessit. Rursus post hunc, omnibus à me seruatis, tertius, quartus, & quintus, pari modo gladiatores mihi curandos tradiderunt, vt iam permultum illam medendi curationem exploratam habeam. Quin etiam hoc tempore tale quid industria inuenimus, cui animus aduertere maximè illos medicos conuenit, qui vulnorum curationem rectè administrare cupiunt. Contemplatus enim gladiatorein quendam ex iis quos equites nominant, transversam diuisionem in priore ac inferiore femoris parte habentem, eam que satis altam: ac vulneris labrum intuitus, sursum alterum reuulsum, infra alterum quali ad patellam de-

A. L. 4. f. 4. t. 4.
fol. 475. h

D tractum: non dubitavi distantes inuicem musculorū partes futuris contrahere, curatione illa, quæ cata platos i. per latitudinem dicitur, neglecta. Itaque veritus tendines ipsis consuere, denudatis prius illis sic altioribus futuris vsus sum, haud ignarus carnosam ipsam musculorū partem periculo vacare, tendines verò non item: quamuis hoc nullū ex præceptoribus facientem viderim. Quidam siquidem ipsorū in huiusmodi vulneribus solas cutis oras consuebant: non nulli in carnolis partibus musculos ipsos suere ausi, id in superficie ipsorum facere solebant: proinde si quando vulnus insigniter altum, non secundū membri longitudinem, contigerit, summā quidē musculi partem glutinabant, reliquam vero totam inglutinatam relinquebant. Etenim in vulneribus iuxta membri longitudinem factis deligatura vulnerati musculi partibus inuicem contrahendis sufficit: per transversum vulnere accepto cum deligatura nihil prodelle possit, ex sola futura totum ab soluitur: has igitur nisi quis altas faciat, musculi in profundo partes inglutinatae permanent. Cæterum non nulli opus à me confectum imitantes, anatores imperiti, ab omnibus musculis subiectas membranas auellunt nescientes has simul cum musculis tuto consui, tendines autem similiter ipsis dilatatos non mediocri cum periculo. Verum quomodocunque illi dilatati fuerint, tamen crassiores adhuc durioresque membranis sunt: tenues abunde illos videbis, & in omnibus iuxta abdomen musculis, præterquam duobus rectis, quibus obliquo rum membranosae aponeuroses,

roses (ij sunt neruosi ex musculis exortus) incumbunt. Alius tendo nullus præter enumeratos E membranæ modo dilatatur: quippe seruant omnes, qui dilatantur, crassitudinem magnam satis, vt neminē latere queant. Atqui sympathia id est consensus, superpositarum partiū vsq; ad ipsum neruorū principiū, non minus q̃ iis, qui iuxta femoris articulum, musculis, tum in cubiti gibberum, quē Græci ancona vocant, tum in calcaneū insertis, accidit. Dilatantur itaq; vtriusque tendines, sed ita vt crassitudinem notandam retineant: calcis tendo ex sura descendens magis adhuc robustus crassus q̃; ceu ex tribus neruosis exporrectionibus cōpositus apparet. Latuīt autē hoc atate nobis maiores anatomicos, sicut & pleraq; alia in totis musculis, ac multo etiā magis in venis, arterijs, & neruis. Multi verò iam ex meis sodalibus etiamnum hæc omnia nouerunt, & discipulis ostendunt, libris meis anatomicis perlectis. Memini sanē ex anatome, euidētium nihil, vt quis putauerit, cōe cum opere de medicaminibus cōponendis habentium, timens ne ex huiusmodi inscitia errantes vel vniuersam curandi rationē suspectam haberent, vel frustra mēbranas auellerent, fugientes inde, sicut falsō existimant, noxā futuram. Quemadmodū alij quidam, cum non valeant ligamenta cognoscere, ea tanq̃; neruos & tendines vulneratos suspecta habent à periculo alioquin remota, quomodocunq; afficiantur, vtpotē insensilia, et ex ossibus non ex musculis sicut tendines orta, vel ex cerebro spinali q̃; medulla, vt nerui. Optimē igitur, velut alia pleraq; etiā in his per multi medici clarissimi dixerunt, medicinæ partes mutuam opē requirere, tum quæ manu, tū quæ medicamentis, tum quæ victu medetur (primā græci chirurgicen, alteram pharmaceuticen, tertiā diæteticen nominant,) ac sanē maximē illā quæ manu curat, reliquis duabus indigere. Itaque si frequenter in simijs cuiusque tendinis & nerui positum ac magnitudinem contempleris, exactē poteris etiā si humani corporis incidendi copia tibi vnquam suppetet, singula, vt vidisti, celeriter inuenire: quod si inexercitatus omnino facias, nihil inde promouebis. Quemadmodum nec medici bello germanico, barbarorum corporum infectionis potestatem habentes, amplius quippiā didicerunt ijs, quæ coqui intelligunt. Etenim empiricorū anatome casu contingens prolixū nugamentum est simile capris, quæ iuncis manualibus cōpunguntur. Hac nugacior est ex libris anatomicis institutio, non absimilis ijs, qui secundum parœmiam ex libro gubernare dicuntur. Quandoquidem enim contemplati palam à præceptore ostensos in corpore neruos, & tendines ipsorū, nisi denuò eos videant, & tertiū, & sæpius deinceps, loci accuratē, in quo positi sunt, non meminere, multo minus ex lectione poterunt addiscere. Itaq; huius tēpestatis empiricorū optimus, cum libros omnes anatomicorū perlegisset, puerū stilo in interiore brachij regione, supra medias ipsius partes in schola quandoque punctū pharmaco emplastico curare aggressus est, cuius experientia ex nerui vulnere curatio paulo antē acceperat, puerumque ob id ab inflammatione ac dolore immunē videns in totum curatū putabat, verū repetente septimo die conuulsus periit. Ille igitur cum factum, quasi cuius ratio aut causa dari non faciliē posset, nobis recenseret: ego verò medicamenti cōpositionis scripturā recitaret, postulassē: ei, cum id statim egisset, hæc protinus subieci, nunquid recensendo, quæ puero neruum vulnerato nuper contigerunt, plus aliquid narrationi adiecisti, quàm quod medicamenti mirificē puerum recens vulneratū curantis experimentum habueras? Vt autem ille confessus est nil se aliud sermoni addidisse: rursus igitur, inquam, audi à me quid gestum sit. Notabile vulnus erat nerui percussū, quod medicamento hoc curatum esse dicis: & quidem audaciter in id genus vulneribus iterum eo vti tor: puncturas autem neruorū angustam cutis diuisionem habentes tale pharmacum sanare non potest: sicut nec id, quod puncturis medendis dicatū est, ipsi neruo nudo adhibitū: quippe multo calidius est, magisq; mordet, q̃ vt nudus neruus mordicationem eius & ardorem sustineat. Vbi verò & cutis, & membrana super ipso, item caro præposita est, mordax medicamentum, si tenuiū etiā partium sit, eadem ratione neruo medetur, qua pharmacum tuum, quando ipsum solum nudum neruum affectum contigerit. Præcipua autem danda opera est, vt oræ angustiorum punctuum apertæ sint, vt calidum medicamen extrinsecus applicatum per eas vapores educat, attrahens humiditatem circa affectum locum in alto latentem. Ob quam rem in id genus puncturis orificium duabus in cutem sectionibus secundum rectos angulos diuidere oportet. Atq; tum hæc, tum alia multa prius relata, dixi ei, qui in pueri neruo vulnerati curatione errauerat adeo, vt ex praua medendi ratione ipse conuulsus interierit. Itaque omnes norunt etiā punctæ partis naturam indicare non nunquam vulnus absque periculo, non nunquam suspectum esse, cum neruum subiectū viderimus, vt in puero ad brachium puncto: non enim sermone locus potest exprimi, vbi, quæ per alam in totam manum pertendunt, brachio inferuntur. Et sanē hic quoque demirari est empiricorum litigandi studium, qui quidem in alijs omnibus medicinæ opus quodlibet subinde contemplatū melius ipsum imitari concedunt, quàm si rarò viderit: itidem melius eum quolibet opere perfungi, si frequenter illi adfuerit: Sola verò, quæ ex corporum incisione cognoscuntur, posse quempiam firmiter assequi, modò anatomicorum virorum historiam perlegerit, cum vel ex ijs, qui à præceptore ostensas corporis partes conspexerunt, nemo semel vel iterum speculatus ad amissim memoria tenere possit, sed frequenter illum conspiciere conuenit. Nerui autē non modò magni in alto particulas multas corporis permeant, sed in cutē quoq; solam distributorum tanquam

A.I.I. f.4. c.1.
fol. 70. g

radices

A radices quædã sunt: in quibus vulnerati nisi probè curentur, subiacentiũ neruorũ magnorũ affectũ consensoriũ obtinent, vnde ij prodeũt, quos in anatomicis administrationibus accuratè pertractauimus, ab omnibus, qui me præcesserunt, omisso. Atq; has radices nisi crebro in simijs fueris intuitus, fieri non potest, vt cum humanum corpus in confectionem nactus fueris, exactè deprehendas. Quemadmodum multo minus in anatome fortuita, quam & speculatione vulneraria nominant, locũ ex sola lectione inuenire queas: quanq̃ nec aliquis permulta vulnera ipsemet inspicere poterit, si ea excipias quę in bello contingunt, in quibus & iplis nemo, dum faucium citò curare studet, contemplatur, vbi vulneratis partibus nerui, vbi arteria, veng q; subiaceant. Vident itaq; in huiusmodi affectuũ curationibus anatomes imperiti similes ijs, qui iter in lectica cæci faciunt, eo q; vehementer errant. Verũ qui inter ipsos & partium experientiam ex incisione cognitam, & methodum confectionis vsus q; medicamentorum coniunxerit, is semper neruorum vulnera, vti nos, sine omni periculo curaturus est, vt nec principalior vlla pars condoleat, nec vulneratus neruus aut contusus inflammatione laboret: vbi iam hæc sunt, multo minus vel putredo, vel claudicatio, vel conuulsio, vel ipsa mors comitabitur.

Confectiones Medicamentorum ex Metallicis, ad Neruorum Vulnera.

CAP. 3.

A. 1. 4. f. 4. t. 4.
c. 2. fol. 475. t

BEX^h metallicis medicamentis adstringentia vitare consultum est, præsertim vbi cõpositi phar-
maci vsus in punctura eueniat: quæ verò detergendi vim obtinent, sicut æris squama, ex vsu sunt. Cæterũ omnia metallica cum crassiorũ partium existant (multum enim terrestris substantiæ in se continet) artificij non nihil in præparando requirunt, quò tenuiora fiant. Hoc igitur ex aceto facere q̃ acerrimo excogitauĩ, præsertim quod ex vino non austero confectionem est. † Ac si ex tali non sit, sed admodum vetus, eo vtitor. Attende tñ diligenter in gustu, ne tibi vel minimã vini qualitatem referre videatur, tale quippe acetum validam exedendi, secandi q; vicina, potestatem non habet. Iã verò metallica ex acerrimo, & q̃ fieri potest vetustissimo, substantia q; tenuissimo, læuigare oportet eum, qui consistentiæ crassitudinem deuitat. Præstat autem id in Sole æstiuo perficere. Sunt quidem ex metallicis, quæ nec comminui nec cribrari postulant, cũ faciliè ab aceto soluantur, sicut chalcitis, & misy: non nulla & contundi & cribrari & postea læuigari desiderat, quæ admodum æris squama. Cũ igitur primum præpararem medicamentum, immiscui ei & arsenicum, postea superfluũ esse putauĩ: etenim ex æris squama & misy, & chalcitide, medicamen cõpositum iri abunde mihi satis videbatur. Miscui autẽ prima confectione etiã æruginem combustam: nam quæ ignem experta non erat, tanq̃ iusto mordaciorem suspicatus sum: deinde tñ nō vltè paul-
Cxillum simul adieci, quantum aliorum portio ferebat. Parĩ modo chalcitidem sanè paucissimam, vltam verò æqualem misy & æris squamæ, indidi. Præstantius autẽ omnibus cõpositis fore speraui, immo et experientia deprehendi, in quo plurima æris squama inesset, dein chalcitis combusta, postea misy. Quæcunque igitur miscebis pharmaca, ad Solem, vt dixi, æstiuo tempore, multis deinceps diebus in puluerem ex aceto quàm acerrimo redigantur: quanto enim longiori tempore trita fuerint, hoc tenuiorem substantiam consequentur. Ideo quæ angustis vulneribus aptiora, sicut in neruis denudatis, admodum tenuia exedentia que cauenda sunt: ob quod prædicti pastilli omnibus id genus conueniunt, siquidem non nulla adstringentia quoque assumpserunt. Porro celebres ex illis sunt, qui ad Andronem, Polyidam, & Palionem, authores referuntur. Sunt & alij quidam quartus, & quintus, illis valentiores, quibus ego subinde vtor. Symmetrię verò ipsorum perfectę sermonis processu dicentur. Nunc de eorundem vsu tantum explicasse sufficiat, quòd tritos ipsos aridos, postea rursus sirgo id est sapa, adiecto ita terere conuenit, donec sordium spissitudinem recipiat medicamentum, & æqualiter læue fiat. Vocant autem nunc omnes apud nos & siræon, ex musto decocto natum: id autem nihil vinosum habeat, quale non ex austerarum vuarum, sed quàm maximè dulcium, musto præparatur, neque ex primo fluente, sed postremo.

D Si igitur tale mustum extiterit, coquendum est, dum ad dimidiã partem mensuræ consumatur: sin minus tale, ad tertias coquendum est. Huiusmodi quidem decocto pastillos soluere expedit, vt mellis crassitudine linamentis excepti, neruis denudatis imponantur, maxime q; ex iplis temperatioribus, qualis Polyidæ est. Ac multo sanè magis, si corpus sit tenerum ac molliusculũ: in quo & prorsus à pastillorum vsu te abstinere tutius est, alijs vtentem pharmacis, de quibus iam sermo factus est, iterum que fiet. Neruo autem nudo linamentis cooperto, extrinsecus vnum aliquod ex ijs, quæ ad angusta vulnera conueniunt, superdandum est. Quorum sunt quatuor genera, vnum hoc quod ex metallicis conficitur, alterum quod ex liquoribus: inter quæ refertur & illud, quod ex euphorbio constat: tertiu ex columbarum stercore: & quartũ praon id est mite, à me appellatũ, quo etiã ad neruos tenerorum corporum omnino denudatos vtor. Ex his quatuor vnum quoddam toti affectæ particulæ circundandum est ita, vt sanarum quoque partium multum vnà comprehendat, præsertim superpositarum: quas bis die, vel ter, si necessitas incidit, perfusione fouere oportet. Quin etiã nocte interim, linamentis quidem denudato neruo impositis, cæterum eo, quod extrinsecus admotum erat, ablato. Porro cũ permagna humanorum corporum sit differentia, tum in natiuis ipsorum temperamentis, tum ætatum mutationibus, insuper vitæ studiis, nulla ratione, quod componitur medicamentum, omnibus conuenire potest. Quã ob rem duo in
promptu

† Alac si ex tali
sit, admodum
vetus sit.

promptu habeto, alterum valentius eiusdem generis reliquis, alterum mitius: quibus inuicem mi E
 stis, dum vsus postulat, permulta inter hæc media iuxta misturæ quantitatem constituas. Si nanq;
 parem vtriusq; portionem confuderis, mistum exactè medium amborum erit: q; si alterius plus
 adicias, tñ a medio ad illud summum recedet, quanto mistura superauerit. Esto igitur valentissi
 mum metallicum ex his constructum, vnam partem crudæ chalcitidis habens, duas misyos simili
 ter crudi, tres eris squamæ: Inualidissimum, vnam itidem misyos & chalcitidis, sed vtriusq; combu
 sti, squamæ quatuor. At verò amborum medium, quo subinde vsus sum, tale esto: Misyos, chalcitidis,
 æruginis, cuiusq; vsu pars vna, æris squamæ partes tres. His, sicut prædixi, contritis ceræ in
 valentissimo duplum: in altero duæ partes & s miscentur: in medio, quod intra hæc consistit, par
 tes duæ, & quarta: sicut in primo trium, quod valētissimum esse dixi, oēs partes numero sex, ex mi
 sy, chalcitide, & squama collectæ, nascuntur. His ergo duodecim ceræ partes adijcientur. At in me
 dicamento inualidissimo si metallicorum sex partes existant, ceræ duodecim apponas: in mediocri
 amborum medium, sunt autem inter octodecim et duodecim media quinq; & decem. Siue igitur
 denarium vnum statuas vnam esse partem, omnium videlicet, tot denarios adijcito, quot partes, si
 ue vnciam, siue libram: sic enim apud Romanos consuetudo est nominari tot vncias vel libras.

*A. octodecim

Porro mensura quidem apud ipsos est, qua oleum metiuntur, insecta discretæ q; lineis totam in F
 duodecim partes diuidēbus: atq; integra mensura ab eis libra nominatur: duodecima vero eius
 portio, vncia. Metallica igitur & cera in lance alijs vncijs ponderantur, oleum cornu metiuntur.
 Itaque prædictis pharmacis omnibus iuxta ceræ proportionem oleum immittatur, superet que in
 singulis ipsis dimidio: vt si cera vncias octo compleat, oleum duodecim hoc est integram libram
 pendat. Esto autem id sabino simile, partium tenuiorum minime q; adstringens: at etiam si vetus
 sit, præstat: acerbum verò, & quod ex oleæ furculis confectum est, nequaquam conuenit. Cæte
 rum omnibus medicamentis commemoratis, vbi metallica ex aceto pluribus diebus in mortario
 trita fuerint, thus candidissimum et pingue admisceatur: deinde rursus vnā cum metallicis diebus
 aliquot lauigetur, priusquam ceratum eis inmiscas. Quāta verò ex omnibus metallicis copia col
 ligitur, huius partem dimidiam thus contineat: quod si mollius medicamentum facere postulas,
 amplius q; dimidiam: sicut vbi acius expetis, minus dimidio, adiungas. Et verò etiam ceræ cum
 oleo liquata resinam quandam ex ijs, quas recensuimus, misceas licet, sciens acius ipsum adiecta
 strobilina fieri, mollius terebinthina, medium vtriusq; abietina. Ex harum genere larix quoque
 est, prædictis plane humidior: consistentia verò similis liquidæ piceæ, quam loco terebinthine in
 futores vendunt ignorantibus eas discernere: est autem talis resina odore, gultu, & facultate, q; te
 rebinthina acrior. Cum hac igitur, & terebinthina, persimilem potentiā larix obtinet, sed tenuio
 ribus partibus maiore q; discutiendi virtute prædita est. Miscebis igitur ceræ sextam superiorum
 resinarum partem, volens medicamentum emplastri figuram induere: nam vni ceræ pondo, resi
 næ vncias duas adicias: sin autem liquida insigniter fuerit, vel vnam tantum miscere satis est. At
 tamen si, vt in modum emplastri pharmacum fiat, nihil curas, resinam addere nō admodum opus
 est: & chalbanī verò æquale thuri pondus indes, vbi mitissimum reddere medicamentum statuis:
 dum valentius, dimidium: quando ipsorum medium, id quod inter æquale & dimidium est. Ver
 bi gratia, si quatuor thuris denarij fuerint, duos chalbanī impones, validū permanere medicamen
 postulans: mite, quatuor: medium, tres. Vt enim molle, & dolorem leuans quippiam habet, ita
 quoq; putrificum, quod sanè & plurimis mollientibus accidit. Quare cum neruo denudato phar
 macum adhibes, non adeo chalbanum esse commissum oportet: quod si nudus ille non est, haud
 mediocriter ipsius admistio dolori auferendo conuenit: ideo q; tale etiam medicamentum acuto
 sensu præditis, teneris & cacochymis paratum habere expedit, in quo plus chalbanī adiectum sit.
 Omnia liquidem metallica exasperant, dolorem q; concitant, & ex liquidis acetum: vnde merito
 ex illis confecta pharmaca aspera videntur, & dolorifica: ob quam rem & fatus ex oleo, & chalba
 ni mistura similiter ipsis idonea est: nihilo autem minus tenuium partium adeps chalbano dolorē
 sedat. Quare velim te aliud quoq; medicamen ex his aliquod præparatum habere, quod ex metal
 licis composito miscere possis tum in dictis corporibus, tum in ijs quæ asperum & dolorificum
 quandoq; medicamentum perceperint. Deligēdus autem adeps, qui tenuiorum partium existat,
 cuiusmodi sunt agrestium animantium, maxime leonis, pardī, hyenæ, & vrsi: ad hæc volatiliū,
 maxime anserum: horum inopia agrestium gallorum gallinarum q; ita verò anserum quoq; syl
 uestriū: nam animalium, quæ in viribus aluntur, & tanquam in ocio cōclusa sunt, humidior est
 adeps & crassior. Cæterum quod pharmaci consistentia cerati spissitudinem habeat, ceræ tertia vel
 quarta pars admisceatur: vel si adeps humidus nimis esse tibi videatur, licet & ceræ dimidium adij
 cere: quemadmodum & vbi sicca fuerit, quartam: cum mediocriter habet, tertiā. Porro huiusmo
 di ceratum quod vtile nobis futurum est, dia steaton i. ex seuis, nominetur.

De medicamento, quod ex Euphorbio componitur.

CAP. 4.

Dictum mihi est & antea vetus euphorbiū recentiori multo inferius. Si igitur anniculum
 sit ēt Cyrenæo magis liquore excalfacit, præsertim eo, quem nūc habemus: ex quo per aque
 irrigationem stirpes augent, & ad liquoris copiam generandā præparāt. Nam post annum vnum
 abunde

A abundè calidum est, deficit autem iam non mediocriter à recentī: bimum, adhuc magis à nouo de generat: quemadmodum trium aut quatuor annorum, etiam hoc magis: vetustioris virtus omnino resoluitur. Cognosces autem, vt dixi, quam ætatem, quam q̄ vim obtineat, & colorem & consistentiam eius respiciens. Colore quidem vetus nouo flauidius pallidius q̄ apparet, consistentia durius & siccus. Iam si gustu voles discernere non coniecturalem eius dignotionem, sed firmam habiturus es: quod verò dixi calfactoriam vñtionem ex eo me confecisse extemporalī vsu exigēte, exactissimè pharmaci facultatem tibi indicabit. Constat autem hac symmetria. Vna pars est euphorbii, tres ceræ, olei duodecim: ceram quidem euphorbio triplo copiosiore, oleum verò q̄ ipsa cera, quadruplo esse conuenit. Vbi igitur in hunc modum medicamentum composueris, fricata eo parte aliqua manifestò licebit dignoscas, quātam virtutem obtineat: maximè autem in balneo innotescit, si quidem ab aere quidem mordetur, sed magis adhuc validè ab aqua, cum euphorbium sit calidum, recens, & forte. Tale igitur consecutus, & hanc ipsam commemoratam vñtionem audaciter puncturis imponito, vbi oras conuiuere metus est. Si imbecillius fuerit, auge mensuram euphorbii pro imbecillitatis ratione, interim partem vnam ac dimidiam iniiciens, interim duas, non nunquam etiam pares ceræ, & plures si vetus nimium extiterit. Primus sanè vsus in pū

B cto neruum, vel tendonem, ad secundum te deducet. Si nanq; & vulneratus ipse mordicationem sensisse dicat, tibi q̄ ipsi partes puncturam ambientes calidæ appareant, tum ipsa punctura magis ac par est elata, & oræ inflammatione subafficiantur, vel olei copiosioris mistura vim medicamenti remittes, vel compones aliud ad priorem symmetriam, aut euphorbio vetustiore, moderatum ita efficies. Quod si e contrario quā dixi eueniat, virtutem pharmaci adaugebis. Sin mediocriter omnia habere videbuntur, seruabis. Itaq; confectura ceram triplo euphorbio copiosiore continens aliarum est valentissima, cum illud (quemadmodum diximus) recens additur: quincuplo autem habens, inualidissima: quadruplo capiens, medio inter vtrasq; ordine consistit. At si vnguenta proponis efficere, qualia à medicis acopa i. lassitudinem leuantia, nuncupantur, oleum ceræ quadruplum immiscebis: Si verò vt in fracturis liquidum ceratum parare, duplum: quando cera & sicca & pinguitudinis expers fuerit, etiā amplius q̄ duplum: plerunq; verò sufficit vnus partis dimidium duplo apponere, vt tota ceræ mensura duarum partium & s fiat. Atqui in modū emplastri medicamen cupiēs componere, oleum parī mensura ceræ miscebis, si quidem ambiens fuerit calore temperatus: sin cera vetus & arida, & ille frigidus sit, paulo amplius: sicut cum cera est pinguis, ambiens calidus, paulo minus. Id autem minus duodecima vtroq; versum medij portio est, etenim & vñdecim & tredecim non nunquam olei vñcias ceræ libræ miscui, tum pro eius consistentiæ quantitate, tum aeris circumflui caloris frigoris q̄. Rarè autem paulo plus, vel minus, verum vt colligationem, pinguitudinē, viscositatem q̄ haberet, nec friabile esset, aut facile dissolueretur, aut à cute decideret, adiunxi resinam ei potissimum, si aderat, terebinthinam veram, sin minus paratissimam vbiq; quam frictam & colophoniam appellant, eam q̄ parī cum cera pondere. Conseruat enim medicamentis, quibus iniecta est, priorem cōsistentiam, vbi & ipsa mediocriter habeat: quippe notum est vt in omnibus alijs, sic in resina quoq; maioris minoris q̄ rationem consistere. Itaque si pinguior liquidior q̄ non nunquam appareat, sciendum est ceratum, quod ex cera cum oleo liquata proueniet, liquidius multo, quā fuisset, euasurū: Summatim in neruorum vulneribus, quum interim ab exacta: media q̄, medicamentorum emplastri modo confectorum consistentia erratum fuerit, ad molliorem potius tendere, si inquinaturū quoque sit quod confectum est: simili ratione, & quod consistentia mediocri est. Pix autem cerati consistentiam

C seruat: optima verò sicut dictum est, in talem misturam pinguis existit, quemadmodum & resina. Si liquidam resinam iniicias, quali consistentia est terebinthina, tertiam ipsius partem ceræ esse oportet. Atq; ipsa terebinthina recens, veteri longè est liquidior. Meme ntote igitur, quod de cera & resina audiuisti, id in omnibus obseruare: nec enim ex siccis & aridis, vel tempore vel ex primaria natura, verum ex mediocribus consistentia, tantum cuiusq; miscendum est in medicamentorum compositione, quantum à me scriptum inueniatur. Esto igitur quod vim & substantiam prædicti medicamenti mediocre habet, ceræ, resinæ frictæ, & olei, pares portiones continere, ipsius euphorbii sextam, vt singulorum sit illorum libra, euphorbii vñciæ duæ. Quod si mollius ipsum reddere vouerimus, octauam euphorbii partem iniungere sufficit, hoc est vñciam & s: in recente & calidissimo, velut præcensui, euphorbio symmetria hac definita, nam si vetustius sit, eo que imbecillius, copiosius hoc aliorum portione esse debere prius indicauius. At si non resinam duntaxat, immo etiam picem, iniungere est animus, selibram vtriუსque miscebis, vt modus ceræ sit æqualis: quanquam multo præstat medicamentum, si resinæ picis que loco propolim cere parrem adiungas. Quod si ipsa pinguitudinem non habeat similiter resinis, si adherens pharmacū, vt fascijs ligari non opus sit, esse curemus, terebinthinam, vel laricem nominatam, vel etiam syncomisten pineam, indemus: voco syncomisten, quam in alueis & dolijs comportant ligna multa ac lapidosa corpora in se habentem: quæ liquata, dum percolatur, pura tunc, sicut colophonia & fricta dicta redditur. Quin & resinas autorrhytus id est quasi spōtè fluentes admiscere licet: nominant ipsas in Lacedæmone, ac alijs regionibus non nullis, protorrhytus, quasi primifluas di-

*πρὸτερον id est priorem, in antiquis tamē legitur πρῶτον, i. mītiorem.

æris: in Cilicia verò nuncupant talem resinam capnelæon, liquidis omnibus resinis tum liqui- E
diorem, tum calidiorē, tum partibus tenuioribus præditam: quare potentia quidem hæc medica-
menti quod cōponis conferet, ac maximè injicienda, cū euphorbiū roboris expers fuerit. Porro
& inter alias resinas odorator est, sicut terebinthina, & abietina. Enimvero dictum est antea tere-
binthina abietinā esse calidiorē, hæc verò strobilinam. Differt autem à prædictis resinis quod vo-
catur strobilinum Physma, & pityinum, adeo liccum, pinguedinis expers, arefcens q̄; vtrunq; ce-
leriter, vt in pila contundatur, & cribro secernatur: quare ad propositi medicamenti cōpositionē
neutiquā hæc conueniunt. Vfus tamen sum frequentissimè, cū euphorbium anniculū existeret.

Porro dum cōponitur, olei ceræ, resinæ frictæ, singulorum pondo librā misceo: picis pinguis se-
libram: & his liquefacti euphorbij pondo vncias duas: si imbecillius sit, tres: si terebinthinam ce-
ræ adijcere voles, vnam. Mediocrē pharmaci consistentiā facies, si cera terebinthinam liquidā &
recentem triplo superet. Huius verò exiccata temporis spatio resinæ dimidium pondus oleo adē-
quato. Totum autē ex tribus mistum, oleo inquam, cera, & terebinthina, cū sit libræ vnus ac semis,
sis, euphorbij anniculi vnciam vnā accipiet: si tale non extiterit, vnam & semissem. Vnde sicut iā
subinde dictauimus, euphorbium pro tēporis ratione augere nobis est integrum. Quin etiam, si
vulneri impositum pharmacū primo vsu videtur quodāmodo imbecillius, euphorbium oleo læ- E
uigatum medicamini emplastroso manibus ante subactō licet admiscere: sic. n. nobis facientibus
promptē vnitatē accipit. Caterū in prima pharmaci cōpositione satius est ceratum rasum, seor-
sum vbi præparaueris, ita laui facto euphorbio ex oleo admiscere: quippe ijs, quæ liquata sunt, ip-
si superfusis in mortario plerunq; fiunt encerides nominatæ, præsertim ambiente frigido. Aquā
verò ceræ liquefactæ cum resina cōmittere non est necessarium, sicut ego ab initio facitabam, tā-
tum ei admiscens, quantum in ipsa coctione consumendum erat.

Medicamentum ex Liquabilibus confectum.

CAP. 5.

Liquabilia voco medicamenta, tum quæ ignis commertio colliquantur, tum quæ ex humidis
quibusdā, velut aqua, aceto, & vino. Ex aceto itaq; citra ignem liquefcit gutta ammoniaci,
sagapeni liquor, & panacis similiter, quæ appellatione cōposita opopanacem vocant. Igni verò
liquefcunt propolis, cera, resina, ladanum, seuum, chalbanum, verū hoc in duplici vase colliquare
melius est. Nominamus autē sic, cum in cacabo, qui aquā calidā habeat (prunis. n. incumbit) vas
alterum consistit, præter liquabilia etiam chalbanum continens. Habeto autē tale quoddam con-
fectum medicamentū saltem vnum, & si duo habere præstaret: Quorum validius erit huiusmodi.
Opopanacem ex aceto dissolutum diutius cōterito: huic postea liquefacta super igne propolim, G
chalbanum, resinam terebinthinā, misceto. Singulorum itaq; aliorum pars vna esto, propolis ve-
rò recentis pinguis q̄; sex: q̄ si sicca vetus q̄; contigerit, præstat omnino tali non vtī: at si aliam nō
habes, duas portiones, nō vnam, miscebis. Sin ablit propolis, eius loco picem pinguem immitte,
qualis est brutia, & quæ ex regionibus circa Pontum apporatur, pinguis simul & odorata, quam
in nigrum amaracinum injiciunt, quale prius omne conficiebatur: nunc. n. & sine ea subalbidum
amaracinū componunt. Quod si tali ē careas, alia vtitor terebinthina, sicut prædiximus, duplica-
ta. Ego non nunquā vel solum medicamentum ex pingui pice confectum imposui, quo etiā ad
canū morsus vtior. Hoc nanq; solam picē pingue ex aceto acri coctā huiusmodi symmetria con-
tinet: Sextarium vnum Romanum aceti, libram vnam picis, opopanacis quadrantem, quod est
vncias tres. Hoc pharmacum vlcus ex rabiosi morfu cicatricem ducere non sinit, sed punctis in
neruosa aliqua particula idoneum est, quippe q̄ puncturæ oras conuiuere nequaquā permittat.
Quoniam verò durum est, in duris solum corporibus eo vtēmur, qualia sunt fessorum, & mello-
rum. Sin autem puero, vel muliere, vel molliore corpore puncto, hoc tantum quispiam vestrum
præfens habeat, idē cū vnguento aliquo discussorio, amaracino maximè & opobalsamo, colliqua-
re licet, deinde cū irino & comageno: Hæc si non adsint, gleucino, fusino, & cyprino: His quoq; H
desideratis, oleo veteri liquefaciat, vel si in Alexādria fortē fuerit, ricinino & raphanino: hæc liqui-
dem copiosissima in illa ciuitate habentur, sicut etiam in vniuersa Ægypto. Atqui in illis regio-
nibus sinapinum oleum haud ægrè reperiri potest, cuius & ipsius parte aliquando mista pharma-
cum acerrimum fore nemo ambigit, vt ad puncturas conuiuentes aperiendas conducatur. Patere
autem cuilibet arbitror ex prædictis, si & loco opopanacis sagapeno prius in pila ex aceto trito li-
quefactam resinam propolim & adipem quampiam acriorem adijcias, eiusdem generis medica-
men futurum. Alterum verò mollius est genus pharmacorum liquabilium, sed acetum non ha-
bet, quod resinis & propoli & seuis tantum præparatur, cera quoq; propter spissitudinem adie-
cta, ex cuius mistura pharmacum tactui cōmodius redditur. Adeps porro tenuium partiū acris q̄;
esto, sicut leoninus, & pardalinus, & post hos hyænæ & vrsi. Sed de anserino quid attinet dicere,
præsertim cū anseres rusticæ fuerint? Quin & tauri vetustus adeps & hircinus huc conuenit:
nam cū mistæ naturæ ac facultatis existant, temporis interuallo (quia terrestres acres que sunt)
ad maiorem acrimoniā declinant, similiter videlicet plurimis quæ vetustescunt: sic nanque &
ipse porcīnus adeps omnium cū sit mollissimus, temporis processu acrimoniā acquirit. Idem
vino, aceto, & melli accidit. In horum autem medicamentorum genere sunt etiam medullæ;
longè

Alongè verò præstat ceruina, & vitulina. Horum acrius coagulum, & iam vehementiori pharmacorum generi propinquum existit. Itaq; & huiusmodi aliquod pharmacum habere te consulo, ut cum à forti aliquo medicamento supra modum morsam partem vulneratam indignatâ offenderis, oleo prius sotam huiusmodi quopiam contegas, sic nanque placata ea rursus ad acrem curâ di modum redire poteris. Ego itaq; dum partem in neruo vulneratam quandoq; soluillem, vulnus iritatum contemplatus, pharmacum liquidum forte fortuna præfens, quod ex adipe constat, Ad aures inscriptum, in vase duplici calfactum, affectæ particulæ illeui, ac subitò inde auxilium ipso ægrotantis sensu accessisse percepi: quippe statim omnis dolor quieuit, atq; deinde à nobis soluta secundum naturam habere visa est.

De Pharmaco ex Columbarum Stercore confecto.

CAP. 6.

Columbarum in rusticorum turribus agentium sterco acre est, quo interim ruri vsus sum in adolescente nerui vulnere affecto. Atq; hoc agricola cum vidisset, qui fundi curam gerebat (erat. n. non imprudens) imitatus semper vsurpat, & neruis vulneratis medetur. Porro compositio, & vsus idem est medicamini ex euphorbio, alijs nimirum eodem modo habentibus, sed euphorbij loco stercore indito. Verum sterco hoc subtilitate euphorbio cedit, eo q; duris corporibus in Bagris ex vsu est. Miscui aliquando ipsum & metallicis experiundi gratia, statim à principio cum eis terens ex aceto ad Solem, sicut nuper docui, multo q; acrius medicamentum euasit, quemadmodum & cum æruginem viuam, id est non combustam, acceperit.

De Pharmaco Dia botanum i. ex herbis, composito.

CAP. 7.

Insuper ex herbis tenuium partium ad neruos vulneratos medicamentum composui, initio quidem ex dictamno amaraco & aristolochia tantum, postea verò & ex alijs, mei ipsius periculum faciens, an rectè compositionem ipsorum coniectura assequeretur: atq; omnia, quò volebâ, perduxî. Idoneæ verò ad id herbæ amaritudinem sine adstrictione gustu referant, vel acrimoniâ quidem, non tamen immodicam: tales sunt præter prædictas, maron, amaracum, polium, argemone, chamæpitys, centaurium, quæ q; eius notæ in simplicium medicamentorum doctrina commemoratæ sunt, quemadmodum etiam radices omnium aristolochiarum, dracunculi, cucumeris agrestis, bryoniæ, althææ, iridis, acori, mei, afari, phu, gentianæ, & panacis: omnium enim id genus materiam in simplicium pharmacorum commentarijs exposui. At radices herbæ q; totas nò modò scire oportet accurate contusas tenuibus cribris secernere, sed etiam denuò exactè læuigare, ut arida collyria, quo q; vsq; in puluerem redigantur. Nam quod crassis constat partibus, neruos vulneratos nihil iuuat, qui subtilia, ut diximus, pharmaca requirunt. Caterum concisum medicamen læuigatû q; liquido aliquo excipiatur cerati speciem habente, ea symmetria, quæ in euphorbio prius indicata est. Quantum. n. in illo bimuli euphorbij, tantum ijs dictamni, mei, & acori, iniiciendum est, & quæ his similiter calida gustu percipiuntur: quantum verò illis trimuli, tantum his aristolochiæ, iridis, dracunculi, gentianæ, aliorum q; id genus, quæ perinde atque hæc amara sunt, immittemus.

De Sumptuosis Pharmacorum Confectionibus, ad Neruos Vulneratos.

CAP. 8.

Non ab re fuerit etiam eiusmodi pharmaca cognoscere: vsus enim ipsorum quandoq; sed rarius incidit, quemadmodum simpliciorû frequenter. Vbi enim quispiam pharmacorum medicinæ q; studiosus non plura quingentis myriadibus habens, vllò simpliciore vti dedignabatur, multo magis vel diues aliquis, vel Monarca, odoratum simul, & quod multa constet pecuniâ, volet habere pharmacum. Porro diues citatus, cuius in primo de præcognitione ex pullibus suppresso nomine memini, quemadmodû & nunc, qualis erat, ex duabus ipsius actionibus huiusmodi condiscas. Vlcus famuli malignum ipse sanare conabatur: vbi autem nihil promouit, mihi hominem tradidit: ac cum videret curatum, medicamenti scripturam postulabat, nesciens multas quidem malignorum vlcum esse differentias, multas item medicamentorum, sed arbitratus vnû pharmacum omnibus posse mederi. Cum igitur, qui applicabat, neque artificiosè ipso vteretur, postquam audiuit, quibus constaret, essent q; omnia vilis pretij, hoc, inquit, mendicis serua, me autem sumptuosius aliquod doceto. Quin etiam puellum diu ex auribus laborantem, vbi ipse multis, quibus vsus erat medicaminibus citra methodum, nihil attulisset præsidij, nobis quoque curandum adduci præcepit: postea q; audiens re quadam vili puerum sanatum, non postulauit à me pharmaci scripturam. Hic igitur ipse contemplatus multis, quibus nerui vulnerati erant, digitos & abscisos & putrefactos, quosdam verò perijisse, vel mancos redditos: deinde intelligens nulum ex eis, qui à me curati essent, periclitatum, omnes verò celeriter sanos euasisse: pharmacum cupiebat aliquod à me accipere odoratum simul & sumptuosum, quo neruorum vulnera posset sanare. Ego sanè multas iam sæpe tum familiaribus tum amicis medicis scripturas iuxta prædictam methodum ex tempore compositas tradideram, ut experimentis compositionis ipsorum ratio confirmaretur: sumptuosum verò, cuiusmodi ille volebat, pauperculis hominibus nullum utiq; dedi, ratus melius esse remedia ex paratu facillimis cõponi. Cum igitur diues ille odori sumptuosi q; medicaminis compositionem aliquam sibi dari petijset, plures ei scripturas donauî prædicta methodo factas: quas ille cum experiri festinaret, tum liberis, tum seruis, neruis vulne-

Quinta Classis.

ggggg ij ratos

† Al. partem
unam,

ratos sibi conquirere iniunxit: medicamentis autem supra omnem spem operatis primum sanè E me laudauit, ut qui citra inuidiā ac liberaliter scripturas ei cōcauerim, postea etiam donis profectus est: etenim ad huiusmodi quoq; officia promptus erat. Porro medicaminū, quæ ei dederam, confectura est talis. ¶ Cinnamomi, dictamni, mari, singulorum † denariū pondo quadraginta. Hæc nāq; odorata sunt & subtilia. At amaracū quali non boni odoris nequaquā miscere cogitauī: deinde qm̄ Romæ ægrè poterat inueniri, sicut & marum: videbā aut̄ illum ægrè parabilibus gaudere, quemadmodū & sumptuosis: apposui scripturæ et̄ illius paucillum quiddam partis vnus, ut puto quartam vel quintam portiunculā. Hæc confusa, cribro q̄ subtilissimo secreta, misce re iussi cerato ex opobalsamo optimo & cera tyrrhenica factio: cōmodum verò esse conieci, si ceræ partes octo, opobalsami decem, receperit. At ne friabile medicamentum foret, sed sibi cohærens vnitum q̄, etiam resinæ terebinthinæ, quæ & ipsa est odorata, modò sit optima, partem vnā adieci. Verum si generosius, ut dixi, medicamentū facere proponas, non vnā cuiusq; herbæ commemorata partem immittas, sed amplius, ut vna & semis fiat. Hoc igitur ab experientia probatum est medicamen. Alterū præterea ex eodē cerato, & liquore cyrenæo cōpositū, mistura proportionē euphorbij facta. Tertium q̄ aliud ex ambobus mistis cōfectum. Quartū deinde, quod stacten myrrham accepit. In quibus aut̄ neruus nudus est, ibi ceratum ex cera, quæ myreplice id est vnguentaria vocatur, & vnguentis apud Romanos dictis spicato & foliato composui, duodecimam partem pompholygis ei admiscens siue eloti masculino genere, siue elotæ feminino, malis dicere: nihil. n. quomodocunq; dicas, vel præsidij vel nocuenti pharmaco adferes. Licet autē tibi & ex tyrrhenica cera ipsū præparare. Nec prohibet quicquam, sine prædictis vnguentis tyrrhenicam cerā ex nardo proba liquefacere, in duplici nempe vasculo, quod in omnibus vnguentis cōmune est. At raso cerato, spicæ nardi, amomi, solij malabathri, & pompholygis eloti, pares singulorum portiones miscebis. Etenim in puncturis, sicut prædictum est, acrioribus pharmacis est opus, quæ vulnus apertum perpetuò seruent: denudatis autem, mediocri adstrictione cum digerendi virtute absq; morfu prædita afferre conuenit. Quanc̄q; & amomū adstrictionis sit aliqua tenus particeps, magis autem ipso nardi spica, & malabathri folium.

De Medicamentis ab Alijs medicis aduersus Neruorum Vulnera proditis. CAP. 9.

Vniuersam neruorum vulnera curandi rōnem, quam ego deorum quadam prouidentia composui, nullus ante me conicipluit: medicamenta tamen, quæ neruorum vulnera quædam curare promitterent, cōposuerunt sine distinctione, & vario vtendi modo, neq; in angustis punctibus sanandi rationem, qualis futura esset, indicantes: neq; in latioribus vulneribus, vel denudato G neruo, vel tendine, vel confuso: multo minus si pars affecta phlegmone infestaretur, vel etiā gangræna propemodū. Porro vnū quendam nostræ ætatis medicū pharmaco vtentem vidi, perinde ac meis ex metallicis præparatis, indistinctè quidem & ipsū: qm̄ vero ex paucis sponte nascētibz ipsū cōponi audieram, quod aut̄ multis constat, ego illo tempore præparaueram: cogitauī pluribus adeptis aliud rursus ex paucis compositum inspicere, ac experientia inquirere, multo ne ab eo, quod varia mistura paratur, inferius esse videretur, an paulo. Quouis igitur modo curauī etiam medicaminis, quod medicus nostræ ætatis habebat, scripturā accipere: & statim simile præparatum eadem & ipsū polliceri & præstare, quæ varium illud, comperi. Huius igitur cōpositio in hunc modū scripta erat. ¶ Ceræ pondo vncias sex, olei vncias nouē, misyos pōdo drachmas sex, chalcitidis denarij pondo vnus, squamæ eris pondo vncias duas & s, thuris pondo vnciam & s, chalbanī pondo vnciā. Quæ liquari possunt, hoc est cera & chalbanū, liquefacta metallicis in aceto acri prius accuratè tritis superfunduntur. Hoc pharmacum haud scio quis cōposuerit, neq; enim apud Asclepiadem Pharmacionem scripturam inueni, nec apud Petronam, nec Andromachum, et si omnes antiquiores medici optima medicamenta conscripserint. Planè autē constat nec apud Heram Cappadocem, nec Mantiam, nec Heraclidem Tarentinū, reperiri, qui H magnam pharmacorum experientiam habuerunt: immo nec apud Archigenē, aut Philippum, aut apud aliquem eius discipulū. Insuper Sorani libris de medicamentis perlectis oībz, item Menecratis, Critonis, Damocratis, & aliorum, qui medicaminum cognitione claruerunt, apud nullū hoc modo citatum pharmacum comperi. Quæ verò apud viros iam dictos habentur, deinceps

A. l. 4. f. 4. r. 4. b.
4. fol. 476 f

* Exteriorum.

scripta indicabo: ac initium à Pharmacione Asclepiade facturū sum, qui in tertio Interiorum medicaminum, quas etiam Marcellas inscribit, hunc in modum docet. ¶ Andromachi Aegyptia ad Vulnera cruenta, ut Asclepiades præscribit. Facit ad Nervos, Musculos q̄; præcisos: item ad Punctus, Contusiones, Attritus, Artus fractos. Valet etiā ad Abscessus, est item Lippientibus collyrium, iuuat Capite dolentes, & ad Multas dispositiones vtile est remedium. Argenti spumæ, ceræ, singulorum denariū pondo centū quadragintaquatuor, guttæ ammoniaci denariū pondo septuagintaduū, terebinthinæ denariū pondo triginta sex, lanæ succidæ combustæ denariū pondo duodecim: squamæ æris, squame stomomatis, thuris, aristolochiæ rotundæ, singulorum denariū pondo octo: olei ricinini he minas tres. Argenti spuma & oleum incoquantur: ac vbi mutata fuerint, cera resina q̄ adijcitur: cū non inquinant, ammoniacum indas dilatando, & tunc lanas succidas, ac reliqua. Hoc medicamentū quanto vilius ex stomomatis squama euasit, tanto deterius ad neruorum vulnera factum est: si

* Al. octodecim

A est: si nanq; punctus solū fuerit, etiā aris squama superuacua est. Quippe nullum metallicum his conducit, nili prius ex aceto acri pluribus diebus laue factum fuerit, quanquā in nudis neruis & tendonibus bonum fuerit remedium. At si iam phlegmone coniūcta est, liquare ea ex rosaceo conuenit, & sic emmoto hoc est in linteolos illito, vti: vbi verò non adest phlegmone, molliora humidiora q̄ statim ab initio potiora sunt medicamentis durioribus ac siccioribus, præstat q̄ liquata ipsa in digerente quodam vel mitigatorio medicamine vsurpare. Voco digerentia quidē vetus oleum, & ricinum, & sicyonium: mitigatoria autem rosaceum, chamæmelinum, & quod ex althæa conficitur. His fortiora, eo q̄ durioribus corporibus magis idonea, sunt, quod ex cucumeris agrestis radice in oleo decocta, & quod ex iride, bryonia, & aro paratur. His valētius est ex dracunculo, aristolochia, & panace factum. Porro nos frequenter etiā ex abietis semine, oleo, item ex populi flore confecto, vsi sumus, nam hæc diutius sabino oleo intingimus. Quæ igitur de eiusmodi medicamentorum vsu dicta sunt, vos memoriter seruantes ad alia, quæ explicanda veniunt, traducere operæpretium esse arbitror. Quod autem nobis institutum erat facere, aggrediemur: apponemus enim & alia eiusdem facultatis medicamina, quale est & quod ab Asclepiade post prædictum his verbis scriptum est.

Bria. Argenti spumæ, ceræ, singulorum denariū pondo centumsexaginta, guttæ ammoniaci denariū pondo octoginta, propoleos denariū pondo quadraginta: resina sicce, terebinthinae, squamæ aris, thuris, denariū pondo sedecim: lanæ succidæ combustæ, squamæ stomomatis, singulorum denariū pondo octo: opopanacis denariū pondo quatuor, ricini heminas tres. Hoc igitur pharmacum superiori esse simile omnibus apparet, & vtendi modum eundem cum nuper à me citato habebit. Quin etiā ad hæc duo emplastra aliud tertium Asclepiades sic ad verbū inquiens tradidit.

Al. octodecim
 C Giluum Haliet. Facit ad cruenta Vulnera, & Nervos præcisos: item ad Vetera cicatricem egre ducentia & fluentia Vlcera. Quin & probè emollit Duritias, maximè in māmīs oborientes. Vtimur eo ad Canum hominum quæ morsus. Summe facit ad Psalinacæ, Draconis, Aliorum quæ seuorum piscium ictus. In totum Virtutem habet mirabilem. Argenti spumæ, ceræ, singulorum denariū pondo centum: terebinthine, manæ thuris, chalbanī, minij synopici, singulorum denariū pondo octo, olei sextariū.

** Al. centum.*
 Nec ipse ergo Asclepiades hoc pharmacū ad pūctus tendinū ac neruorū, sed ipsis præcisis, vtile eē promittit, cum videlicet maius vulnus extiterit, & neruus nudus appareat: quippe aptiora tunc sunt medicamenta, quæ mitigatoriam & mediocrem vim obtinent, cuius generis est nuper ab ipso citatum. Itaq; hæc tria emplastra in medio ferè libro Asclepiades produxit: superius etiā

C aliud multiplicis quidem vsus emplastrum, melius autem ijs tribus, ceu ad nervos præcisos corruptos q̄ tradidit. Verba Asclepiadis ita habent. C Moschionis Catagmaticum. Valer ad recentia Vulnera, Nervos præcisos, & cum contusione Diuisiones. Facit etiā ad Fracturas cum Vulnere, etenim Vulneribus auxiliatur, & Ossa callo obducit conuenienti deligatura impositum. Prodest Hydropicis incipientibus, item facit ad Testiculorum contusiones, tollit Circa anum eminentias, sanat Rhagadas butyro dilutum, ad hæc Gutturis tumores quas Græci bronchocelas appellant, soluit omnem Duriciē. Curat Attritus, & Fractos articulos, item Pedum manuum quæ callosas excrecentias, quos clauos vocamus, vt eos etiā citra exulcerationem auferat. Summatim, medicamen est vtilissimum. Confectio hæc recipit. Argenti spumæ pondo minam, quæ continet denarios centumsexaginta: picis aridæ denariū pondo centumsexaginta, seu vitulini denariū pondo centumsexaginta, resinæ terebinthinae denariū pondo octoginta, manæ thuris denariū pondo octoginta, ceræ denariū pondo quadraginta: æruginis, opopanacis, chalbanī, singulorum denariū pondo octo: olei ricinini heminam, aceti parem mensuram, liquoris sycamini heminam, picis liquidæ tres cyathos. Argenti spuma tenuissima & cicinum oleum in vas fictile vel æreum coniecta, igni q̄ supraposita, coquuntur: cum efferbuerint, seuum & manna thuris adijciuntur, mouentur q̄ assidue: vbi confluerint, pix, cera, resina induntur, & donec nō am-

Dplius inquinent, incoquuntur: deinde chalbanum, post ærugo, & opopanax, ex aceto soluta insperguntur. Liquor sycamini, & pix liquida, in aliud vas transfusa coquuntur: & cum commista fuerint, seu confluerint, priorī pharmaco immittuntur: & rursus supra ignem posita, quousque non inquinent, incoquuntur, ac in vinum demissa triduo relinquuntur: postea subactus manu, in linteolum q̄ illitis, vtimur. Oportet autem post medicamen impositum, linteum vino madefactū exprimere, & tunc medicamento circundare. Porro nostri præceptoris Lucij confectio sic habet. Seuum ac oleum prius liquefacimus: ac vbi soluta fuerint, mannam læuissimā factam, & spumam argenti inspergimus: postquam confluerint, reliqua facimus. Caterum laude dignus est hic quoq; Asclepiades, qui confecturæ medicaminum modum adscribat, non, vt Andromachus, omittat, qui nec, quam virtutem habeat, apponit. Denique primum è tribus ab Asclepiade traditis, à me scriptum emplastrum Ægyptium, quod & ipse Andromachi esse cōfirmat, neque cuius sit virtutis, nec quomodo præparandum sit, aut vtendum, Andromachus indicauit. Verum simpliciter tanquā vulgare quoddam pharmacum libro de exterioribus facultatibus, quem ipse secundum inscripsit, proiecit. Primum enim omnium scripsit, quod ipse nominat Pantagathium, quasi dicas ad omnia valens, deinde hoc Ægyptiū, aliud vt dixi nihil adiungens. Habet enim eius dictio in hunc modum.

C Ægyptium. Argenti spumæ denariū pondo centumquadra-

Quinta Cassis. ggggg iij gintaquatuor,

DE COMPOS. MEDIC.

* Aliter tres.

† Addit in antiquis, thuris denariū pondo octo

† Al. duodecim.

gintaquatuor, ricini heminas sex, ceræ denariū pondo centumquadragintaquatuor, guttæ ammoniaci denariū pondo septuagintaduū, terebinthinæ denariū pondo xxxvi, lanæ combustæ denariū pondo octodecim, squamæ stomomatis denariū pondo octo, squamæ cris denariū pondo octo, taristolochiæ denariū pondo octo: non nulli myrrhæ denariū pondo quatuor, opopanacis denariū pondo duū. His ad finē adscripta sunt, marinæ aquæ ad irrigandam cerā heminas octo. Quid sibi velit, cum dicat, ad irrigationem ceræ, manifestō non scimus, intelligere. n. plura licet. Mirandum verò, quomodo in alijs omnibus cum Andromacho conueniat, mensuram ricini parem non ponat: Andromachus enim heminas sex, Asclepiades tres scripsit. Neq; verò etiam apposuit, quod in fine scripturæ ab Andromacho adiectum est, Non nulli myrrhæ denariū pondo quatuor, opopanacis denariū pondo duū. Rursus adiunxit ipse, In combustis lanis succidis, quod in Andromachi scriptura non habetur. Post dictum Ægyptium theriaca emplastra quinq; retulit Andromachus: deinde aliud Fuscum, quod ad Eubulum authorem refert: postea rursus aliud Fuscum, quod Mineruam nominat. Post hæc iterū alia fusca simpliciter duo, quibus subnectit aliud, vbi sic ad verbum scriptum est. **C** Fuscum Nygmaticum, hoc est ad neruorum punctus vtile, Andromachi. Guttæ ammoniaci denariū pondo octo, ceræ nouæ denariū pondo octo, terebinthinæ denariū pondo octo, æris combusti denariū pondo octo: picis aridæ denariū pondo quadraginta, vt autem Zeno ait, minæ dimidium, & quartam partem: argenti spurmæ denariū pondo quatuor, aloes indicæ denariū pondo duū, aristolochiæ denariū pondo duū, chalbanī denariū pondo duū: æruginis denarij pondo vnus, alij denariū pondo duū: thuris denariū pondo duū: olei hyeme quartam heminæ partem, æstate octauam: acetis tres cyathos, quibus ammoniacum dissoluatur. Hoc verisimile est ab ipso nominari Nygmaticū, vt quod neruorum puncturis ex vsu esse queat.

GALENI DE COMPOSITIONE MEDICAMENTORVM PER GENERA LIBER QVARTVS

ARGVMENTVM LIBRI

Docet Medicamenta, quæ faciunt ad Putrida, ac maligna Vlcera, ad Nomas, & Reliqua quæ vix ad cicatricem perueniunt.

De Methodo parandorum Medicamentorum ad Maligna Vlcera & agræ cicatricem admittentia.

CAP. 1.



Rimus sanè liber in alborū emplastrorum confecturis, tum alijs, tum eorum quæ vlcibus cicatricem agræ ducentibus conueniunt, finitus est: vbi distinximus cōiter appellata dysepulota i. cicatricem difficulter admittentia, ab ijs, quæ propriè cacoethe hoc est maligna, dicuntur, & ipsa nimirum dysepulota. Qm̄ verò quædam saniei humorum q; vlceratis partibus influentium vitio cicatricem agræ admittunt: quædā ipsa affecta sede influentē succū quālibet probū corrūpente: vlcera secundo modo habentia, dysepulota & cacoethe propriè noīant: in quibus interīm totam partem affectam excidere, vel adurere, non nulli cogūtur, aut medicamentis crustā inducentibus, aut igne vtentes. At cū ampla sit latitudo vtrinq; in eo, q; alterū altero magis minus ve dysepulotū malignum q; est, tm̄ medicamentum pharmacorū esse numerum oportet, quantus ipsorū quoq; vlcerū extiterit. Meritō igitur oēs, qui vnū duntaxat medicamentū vlcibus malignis cicatricē inducere promittens habēt, successu crebrō frustrantur. Nam duo minimū, quæ idem pollicentur, eādē q; facultatem ostendūt, diuersa alioquin inter se non simpliciter maioris minoris q;, verū vt apertissimè dicam, maximī ac minimī ratione, in promptu adesse illi conuenit, qui omnia id genus vitia curare proposuerit. Quēadmodū igit cōmētario therapeutices Methodi, in vniuersis affectibus primā oīum communem auxiliorū potentiā inueniri docebamur, dein materias, quibus illa continetur: ita nunc quoq; in vlcibus dysepulotis generalem pharmacorum, quibus illa curabuntur facultatem, quæ tandem sit, prius inuentā esse oportet. Indicata verò mihi est & hæc in illo opere, cum quidē nullus vitiosus habitus vlceratas partes infestat, duos scopos habens, vnum, vt id quod influit, repellat: alterum, vt quod affectæ parti inhæret, infixum q; est, discutiat. Hæc autem contrariæ vires præstant: siquidem influxum reprimunt, quæ sunt adstringentia pharmaca: digerunt impacta iam excepta q;, trahendi potestate prædita. Porro quæ adstringunt vt plurimum exasperant, atq; hæc occasione molesta sunt: trahentia verò ac digerentia ex alto humiditates, non citra acrimoniam efficiunt.

A id efficiunt. At acrimoniam dolor quidam necessario sequitur, vlcera tam mordens. Atque sic propter dolorem, quem exasperantia mordentia quae concitant, humores vlcerae partibus influentes irritari contingit: unde quoque vlcus phlegmone obsideri exeditur quae. Ex quibus dictis colligitur vlcerebus dysepulotidis praesidia inueniri difficulter posse: multo magis adhuc malignis. Quare talis pharmacorum materia, quo ad eius fieri possit, inuenienda est, unde vlcus citra doloris liccescat: quod accurate fieri nulla ratione licet medico ignorante, quem effectum medicamentum exhiberit ostenderit. Quippe ambobus componentibus mordente puta & adstringente, necessario validum existit: verum sordes & humiditatis copia id genus vlcerebus incumbens, veluti propugnacula quaedam vlcerae particulis facta mordicationem pharmacis valentibus exoluunt. Itaque attendendum est, quantum primus vlcus humiditatis in vlcere deliccauerit: vel, si etiam sordes habeat, quantum harum quoque absterferit: ac ita secundum, tertium quae vti illo debemus, donec purum & siccum vlcus apparuerit. Vbi vero primum id tale conspexeris, ad aliud medicamentum te conferes, eiusdem quidem speciei, sed priore imbecillius: nam validiora, dum medendo vlcus dolorem inferunt, fluores mouent, & phlegmonas concitant. Quod si rursus multo imbecillius priore pharmacum adhibeas, vlcus humidum sordidum quae euadet. Hac igitur parte artificio vtens

B medicus, eo qui solo experimento innititur, melior est, quae sciat vlcus non alia medicamentorum virtute curari, quam dum affecta pars eam siccitatem consequatur, quam in naturali statu sita possidebat: quod factum intelligimus, vbi neque tenuis amplius sanies influat, neque pus producat. Hanc dispositionem vlcera nanciscuntur, quo dixi modo, siccescunt, hoc est adstringunt, discussa quae: dein vbi siccata quidem fuerint, verum sordida adhuc appareant, deterforis pharmacis repurgantur: de quibus ipsis quoque non nihil in opere de simplicibus medicamentis commemorauimus. Omnis autem absolutissima methodus est tractatu de morbis curandis perscripta, in quo prius exercitatum esse conuenit, qui hinc perfecte frugem reportaturus est. Hoc vobis amici, quibus ista scribuntur, constare manifestum admodum noui: itidem rationem sine exploratione in operibus facia probabilem non esse, quae nunc a me dicuntur, demonstrant. Etenim vidistis subinde illis ipsis pharmacis, quibus sine methodo medici quidam vtentes nihil proficiebant, multa me eius generis vlcera perfrangere. Quamobrem in memoriam reducite medicamenta citra demorsum exiccantia: sunt autem ipsorum pleraque metallica. Atqui hoc etiam meminertis, quae combustis elotis quae mordicatio, quae prius adfuit, edomatur ac interit. His igitur in praesentia vti vobis licet: elotis quidem in pueris, eunuchis, mulieribus, & qui molli natura carne sunt praediti: item qui ad sentiendum habiles admodum sunt, & vitioso succo laborant: In alijs corporibus etiam illota vsurpare potueritis, manere primum ipsa res, qui curantur, vbi probe concoxerint, adhibentes. Si vero & corpus totum praeparationem quandam requirat, & hanc prius factam esse oportet: praecipimus de his in commentario de morbis curandis. Non nullis siquidem vel purgatio sola sufficit, quibusdam sanguinis detractio, alijs vtraque haec adhibere profuerit. Sunt in quibus superiacentem varicem excindere opus est: vel lienem, vel iocinori, prospicere: aliquibus ambientes vlcus partes scarificare, quemadmodum interim laborum callos amputare. Si horum nullo egemus, humoris copia simul cum sordibus inspicienda est: atque ita ad idoneum medicamentum veniemus, rursus simplicium singulorum memores, quae deliccant, non tamen vlcerae sordes abstergunt: item quae abstergunt quidem, non tamen probe deliccant. Quae vero vtrumque possunt efficere, prospiciemus ex quoquoque ordine existat, quod maximum inter ea censeo, quae ad curationem pertinent, neglectum tamen medicinalis materiae scriptoribus. Nam hi soli omnes ipsius vires dicere studuerunt, sicut etiam Dioscorides, quem nulli eorum, qui in ea quali arena defudarunt, secundum esse quisque dixerit. Ego igitur deinceps omnia pharmaca recensere, quae vlcera citra mordicationem exasperationem quae manifestam exicare possunt. Incipiam a metallicis, quibus etiam terrae species adnumerantur. Porro cum varie inter se differant in eo, quae magis minus quae siccant, a medicis orsus ad vehementius vel obscurius exiccantia me conferam. Siccant igitur modice lemnia sphragis, & cadmia, atque haec magis ea, quae sua sponte nascitur citra permutationem, in torrentibus aut riuis ac in cypriorum montibus alijs quae in locis inuenta, praecipue vero vbi metalla sunt. Porro consueui eam magis siccantem reddere, praestitam in Sole pluribus deinceps diebus terens ex aceto, aut vino colore giluo, substantia pellucida. Cuiusmodi est in Italia Falernum, in Asia Tmolite, quod vinorum maxime siccare natum est. Hoc genere comprehenditur & Ariusium in Chionatum: item odoratum Lesbium in Eressio & Mithymna. His succedunt omnia vetera, cum ex albis & adstringentibus inueterata sunt, in Italia Signinum, Tiburtinum, & Marsum, in Sicilia vocatum ab incolis Amineum: in Asia Aphrodisium, & Misyum. Sufficit enim mihi facultatum vniuersalium veluti exempla exposuisse. Iam vero Cadmia ex aceto acrisimiliter multis praestantem diebus in Sole praeparo, siccata quae repono, vt vlcerebus malignitatem assumentibus inspergi possit. Valentius hoc pharmacum est chalcitis combusta eodem modo prius in puluerem redacta: per se autem ignem non experta tam valens medicamentum est, vt crustas faciat. Lotam igitur ipsam, deinde siccata habere satius est: minus enim lota, quae vltima deliccata, ac longe mitior est minus quae mordax. Per simile huic medicamentum est etiam Aergo combusta: quae vero ignem non experta est, fortissimum medicamentum est, sicut etiam chalcitis: verum

hec non nihil etiam adstringit, & ea multo magis Chalcāthum, quod inter metallica maxime siccat: at ærugo huius potentia omnino particeps non est. Misy autem & Sori, ut didicistis, chalcitidi genere cognata sunt, ex vna, ut ita dicam, radice producta: tenuius tamen misy apparet, ac minus mordax & vrens: crassius sori est, & utroque siccat imbecillius: quemadmodum & Stibi maiorem adstringendi siccandique vim ac sori possidet. Porro Diphryges appellatum pharmacum vlcerebus agere humiditatis vitio ad cicatricem venientibus, aptissimum est: valide namque siccat, etsi modice mordeat. Enimvero id quoque præter acrem tum qualitatem, tum potentiam, vim habet adstringentiam: quas tamen ambas fortiores & chalcitis cruda, & chalcanthum repræsentat, siue id masculino genere, siue foeminino, siue neutro, appellasse quis malit: nam hoc vobis semper succurrat, de nominibus contendendum non esse, ubi speculationem ipsius artis usus necessariam ediscere statueritis. Quin & Alumen quodlibet vlcera fatis exiccat, generose adstringens. Vnde nemo solis his ad vlcera vtetur, sicut nec cruda chalcitide, & ærugine: vltima vero & hæc & misy vtilia sunt: ut elota morsum quidem remittunt, verum minus siccant. Itaque lotis ipsis uti tutius est, quoniam per multa corpora, quibus mederi cogimur, vnam quandam dispositionem habent, qua vehementer commorsum ferendo non sunt. Audiuitis autem ipsa frequenter, sed & nunc iterum commemorabo, atque ad omnem sequentem sermonem memoriter teneri operæpretium esse arbitror. Quæ igitur plethora vitioso quoque succo laborant corpora, ad hæc quæ tenera carne prædita, & ad sentiendum insigniter habilia sunt, facile ex morsu phlegmonem recipiunt. In carne molli præditorum numero continentur mulieres videlicet candidæ, pueri, eunuchi, viri cute alba: insuper qui regionem frigidam incolunt, humidi hi quoque & pituitosi, eoque molles & albi: quemadmodum illi, qui calidum tractum inhabitant, ut Ægyptum, & Arabiam, duros corporum habitus & siccos sortiuntur. Itaque horum vobis veluti memoribus appoliturus sum quandam & aliam pharmacorum simplicium materiem, quæ malignis vlcerebus curandis sit idonea. Sarcocolla igitur & Ichtyocolla, & his magis adhuc Chrysocolla tali facultate prædita est. Huc optime facit & Plumbum combustum: post hoc sori, sibi que, hæc quoque combusta: insuper plumbi recrementum probe siccat: quemadmodum & ferri squama, euidentius tamen stomomatis. Porro Æris squama, præter quod siccat, etiam abstergit purgatque, unde pura quoque vlcera efficit: quod reliquæ squamæ non possunt. Quare si hæc omnia medicamenta arida vlcerebus malignis ac contumacibus inspergis, mirifice videbis citra mordicationem ea deliccari, sicut ubi buccinorum testas concrematas, purpurarum, ostreorum, aliorumque id genus, adhibueris. Quin & quod græcè Diaphanes, Romanis lapis dicitur specularis, ex ijs est, quæ leniter ac sine morsu exiccant: qui usus vlcerebus agere cicatricem admittentibus non item malignis ac rebellibus conducit: quippe minus exiccat, quam illa requirant. Idem potest Vitrumustum, ac Ignitum illud, quod in calfactorijs ærariorum fabrorum officinis consistit. Cæterum Ægyptiæ spinæ fructus, Galla omphacitis hoc est immatura, Rheo, Malicorium, radices herbe que non paucæ vltra siccandi, etiam adstringendi potestatem habent. Nam & Aristolochia, iris, acorum, artemisia, panacis radix, argemone, chamaeleontis nigri radix, cyperum, dracunculus, gladiolus, aliatim exiccant. His euidentius adhuc Centaurium, & polium: quibus paulo imbecillior est terra nomine Erethrias, uti valentior est Ampelitis. Talis sane medicamentorum simplicium ad vlcera maligna ac contumacia materies existit. Extrinsecus autem non nulla ipsis apponuntur, quæ quidem per se vehementis potentia gratia non adiuuari, sed alijs misceri, solent, veluti ærugo ignem non dum experta, calx viua & illota, & molle aphrolitrum, quod re vera aphrolitrum est: quanto enim spumantius, tanto præstantius est utraque facultate, tum qua minus mordet, tum qua magis digerit. Didicistis enim & in opere de Simplicibus medicamentis subtiliora crassioribus hac virtute inter omnia, quæ simili specie comprehenduntur, præcellere.

Porro nihil tam nobis euitandum est, quam pharmacum generis oleosi, quæ Hippocrates maltha code id est mollicina, nominat: cuiusmodi sunt omnes adipēs, præsertim porcorum, dein resina, postea cera: Alia verò ratione & quæ indurata remolliunt (malactica Græcis dicuntur) non conueniunt, chalbanum, bdellium, gutta ammoniaci, styrax, medullæ: Item alio modo acria, piper, zingiber, sinapi, canchri, multa que eius generis alia.

Quomodo Medicamentis Siccis modo commemoratis in Vlcerebus ad cicatricem agere venientibus, & malignis, vtendum sit.

CAP. 2.

Huiusmodi vlcera vitioso plena humore necessario existunt, pleraque verò ipsorum etiam fordes copiosas continent. Quoniam ergo siccum aliquod pharmacum ipsis sumus inspersuri, conuenit prius ea linteolo molli, puro, & sicco, extergere. Vbi vlcereis cauitatem medicamento impleueris, platysma emplastri labris attenuandis accommodati extrinsecus superdandum est, atque huic rursus linamentum vndique æquale foris iniiciendum, cui spongiam ex aqua aut vino tinctam applicabimus. At in primis curandum est, ut spongia frigida permaneat: quod ex facili fiet, si frigida ipsam continue citra deligaturæ solutionem foueas. Sed fasciam ei iniicere ac circumdare debes, ut Hippocrates in commentario de Fracturis edocuit, maximam offensam fore ratus ex deligatura, quæ ad elegantem formam, non usum, conducit. Si igitur fascia vna fuerit, inferne sursum tribuenda est, siue tibia, siue genu, siue talus, siue cubitus, siue manus summa, siue alia

A. l. 2. c. 7.
fol. 99. f

A. lib. 2. c. 1. c.
385. fo. 138. g

lib. de vlcereb.
a principio.

com. 3. t. 10. &
15. cl. 7. 243.
d. & h. Et lib.
de Medico cir.
ca medium.

A alia quævis pars, laborauerit. Quod si duabus vti velis vt in fracturis, altera à parte affecta sursum feretur duntaxat: altera deorsum prius, mox in superiore parte delinet, eodem q̄ cū priore perueniet. Quamobrem hæc fascias ex linteis, nō panniculos esse, vt oēs nouistis, expedit. Tertio autē quoq̄ die non singulis soluendum membrum est, sic vt aqua non adhibita, quo dixi modo nuper, in molli puro & siccolinto saniem vlceri abstergas. At si ambientes vlcus partes plegmonodes quippiam repræsentent, humidum medicamentum extrinsecus platysmati superaccommōdādū est ex meo phoenicino, non simpliciter liquefacto, sed cui plurimū, quoad fieri potest, vini adstringentis adiectū sit. Neq̄ tñ obuio quouis oleo liquare ipsum conuenit, verū si rubor quispiam, vel omnino calor, in circumpolitis vlceri partibus exuperet, adstringente & refrigerante aliquo id faciendum est: sunt huiusmodi myrteum & melinū: si hæc non adlint, adhibeto, quod omphacinū & omotribes nominant. Si durities maior extiterit, oleo veteri, vel ricinino, ipsum phoenicinum liquefacies. Sed tutius fuerit, si nihil in ambiente vlcus loco vitiosi appareat, superpositæ regioni liquidum medicamentum ad mouere, quod repellat, liquidum prius vel prauum, vel plus q̄ par est, in fluat, maximè cū in crure vlcus obortum superpositam venam varicosam habeat. Quæ dum magna est, ac colore nec rubrum nec probum sanguinem, sed atrio rem magis q̄ melancholicum, cōtinere videtur, excidenda venit. Interim verò contigit, vt vena tali excisa vlcus statim ad cicatricem veniret, cū iam annum durarat, verū ipsius loco iuxta diuisionem, vbi vena erat excisa, vlcus malignum ac cōtumax oriretur, cui cicatrix induci non potuerit. Igitur id genus vitij præstat, viribus ægri consultis, à venæ incisione auspicari, deinde pharmaco purgare, melancholicum humorem vel cū hoc est pituitosum educere, qm̄ is quoq̄ vnā non nunq̄ cum melancholico influit, dū varices generantur. Postea ipsam venam vlceri suprapositam in longum scarificare commodum est. Vbi abunde vacuaris, ei ipsi venæ sectæ prius medendum. Postquam exactè iam cicatricem ducere videtur, tunc maligni vlceris curationē, vt prædictum est, aggredere. Iam verò lien interdum male affectus, vitiosi talis humoris author est, sicut & iccur. Quibus vbi prospexeris, sic tandem ad vlcus curandum venire oportet. Pari modo, si vnuersum corpus cacochymum vel plethoricum existat, prius expurgare vacuare q̄ ipsum expedit, quàm medicamentum vlceri ad moueas. Porro intra vlceris per arida medicamenta curationem, quotiescunque solueris, aduertendum est, qualem nam in particula effectum ediderint. Sciendum q̄, ac in memoria habēdū, quod quæ desiccare, non autem detergere, valent, cuiusmodi sunt illa quæ adstringendi qualitatem obtinent, vlcus purum non efficiunt: at quæ præterquam q̄ siccant, adhuc etiam detergunt, ea non modo siccam, sed puram quoq̄, totam partem exulceratam efficiunt. Præterea notandum venit pura vlcera ab ijs medicamentis, vnde prius, cum essent sordida, nihil mordicationis percipiebāt, nunc morderi: Quæ causa est, vt à valentioribus absterforijs pharmacis ad mitiora, minus q̄ mordacia, digrediamur, vbi vlcus ad amissim purum inuenerimus: quemadmodum rursus in sordidis ad magis abstergentia transimus, nisi ex mordicatione sordida apparuerint. Hoc liquidem medicis etiam bonis existimatis nō nunquam imposuit, vt ad absterforiū valentius acrius q̄ se cōferrent: vnde iterum vlcus erosum, ex equo sordidum, vel etiam magis adhuc, altera solutione visum fuerit carne à medicamento colliquata ipsum foedare: nam in prauam saniem degenerat colliquefcens caro. Caterum quicquid ex his ipsis tenuioris consistentiæ est, à pharmaco diffilatur: reliquū ibidem circa ulcera concretum, sordes ipsis redditur. Quare animum attendere oportet, vtrum vlcus carne, quæ subest, exesa ac colliquefcente sordidum euaserit: an quia medicamen sordibus auferendis aptum requirat, impositum vero tale non sit. Indicat autem vlceris maior facta cavitās, tum oræ rubentiores calidiores q̄, cum medicamenti acrimonia sordidatur. Forſan igitur superuacaneum fuerit in præſenti commentario compositorum medicaminum vsus rationem modum q̄ adscribere, quippe in Methodo curandi explicatum: at quæ necessaria sunt, & magnam

Dnoxam adferunt neglecta satius est bis ter ue, vt fidelius memoriæ inhæreant, repetere. Ponamus igitur & hoc etiam in talium vlcerum curatione, si quidem citra totius corporis offensam fieri poterit, ægro à balneo abstinere, perfricari linteis largiter, mox oleo, deinde halteribus hoc est saltatorijs pondusculis exerceri, si crus fuerit affectum: vel cursu, si partes superiores male habeant. Quod si à balneo temperare sine totius corporis noxa nō poterit, soluere deligaturam non oportet, verum vt ligatum est, membrum lauare, & aquam calidam ex spongia exprimere, aliā q̄ mox frigidam infundere, vt nullus in deligatura calor sit reliquus. Iam si curatio succedere videatur, etiam absque spongia alligata sanari potest, si phoenicinum liquefactum, vt dixi, extrinsecus imponas, & citra spongiā, quæ fascijs comprehensa velut in fracturis, ægrotae corporis parti orbiculatim circumdatur.

Compositio Medicamentorum, quæ in modum emplastri fiunt.

CAP. 3.

Quoniam malignorum, & difficulter cicatricē recipientiū vlcerum curationis summus est scopus, vt medicamentū citra morsum exiccet, aqua verò & oleū maxime oīum humectāt, ab eis abstinēdū est ita, vt nec p se adhibeant, nec siccis quæ recēsuimus misceant medicamentis. Itaq̄ cera deligēda est neq̄ natura, neq̄ vetustate sicca, verū recēs & pinguis natura. Qua in Sole emollita, aridorū medicaminū dictorū, quodcūq̄ volueris, excipere poteris: sin aut Sol ablit, apud

apud ignem calefacta subigatur, & in calidam aquam demergatur: non enim aqua per totam mi-
 scetur, sed statim ab ea emollescente defluit, anteq̃ vlceri fuerit imposita. Symmetria vero mixtu-
 ræ est talis. *Mediocre Medicamentum hoc modo efficitur.* Quarta pars metallicorum ceræ adijcitur:
 valētius erit, si tertia sumatur. Porro cū ipsa metallica minus magis q̃ immordacia siccaq̃ existant,
 virtus in ijs, quæ magis siccant, intendetur: quæ minus, remittetur: quemadmodum rursus tutior
 leniorum vsus est, mordaciorum periculosior. Dicitum nanque frequenter est, non nullas naturas
 corporum, tum cutem tum carnes magis sensorias habere: quibusdam has ambas minus esse sen-
 sorias. Item pro maioris minoris q̃ sensus ratione doloris etiam affectus sequitur, vt & phlegmo-
 nes. Accedit huc non mediocris differentia, q̃ quis molli sit carne, vel duriore, boni mali q̃ lucci,
 vel plethoricus, vel vacuus, vel medio quodam modo inter enumeratos affectus. Vnde colligo
 vnum omnibus idoneum medicamentum præparari non posse: sed quaecunq̃ ex similibus spe-
 cie confectum fuerit, hoc vti sciet ille, qui methodum isto libro traditam artificiose didicerit. Exē-
 pli gratia in subiecta materie si pares vtriusq̃ æruginis, & æris combusti, partes misceas; aluminis
 scissi partis vnus dimidium: vt totum tribus, vel duobus denarijs, s, vel vncijs totidem, constet;
 sufficiet decem ceræ denarios adijcere denarijs, decem vero vncias vncijs, in temperati & medijs
 facultate pharmaci compositionē: Melius fiet, minus q̃ mordebit, si loco aluminis scissilis diphry-
 ges accipiat: cuius vno denario integro iniecto, quemadmodum æris quoq̃ & æruginis, medica-
 men erit præstantius. Quod si æruginem mordacius facturā suspicari, lene prorsus ipsum fieri po-
 stulemus, combustam apponimus. Insuper si expurgare sordes statuerimus, æris squamæ denarij
 dimidium addetur, vt tota medicamenti symmetria talis euadat: Æris, æruginis vltæ, diphrygis,
 singulorum partes æquales, hoc est cuiusq̃ denarij pondo vnus: æris squamæ denarij dimidium:
 hæc pingui cera, vt dixi, mollita excipiantur. Vbi siccior paulo fuerit, q̃ vt commemorata excipiat,
 miscendum est myrteum molliendo, vel melinum, vel lentiscinum, vel ricininum, vel cyprinum,
 vel omotribes oleum vetus, vel recens Hispanum, vel quod apud nos ex oleæ surculis preparatur.
 Aut si omnino nihil oleosum medicamento adhibere placet, laricem resinam admisceto: cuius si
 copia non est, terebinthina eius loco vtendum. Cæterum hoc semper in memoria tenendum est
 ijs, qui hæc legunt, maximè ad primum, quod dictum est, tanquam præstantissimum veniendum
 esse, mox ad secundum, & tertium, deinde ad alia quæ post tertium sunt, ceu pro pharmacorum
 virtutis et potentiæ proportionē, sermonis ordinem nobis vsurpantibus. His igitur auditis quis-
 piam, & simplicium medicamentorum viribus intellectis dijudicare poterit, quæ maiores nostri
 ad vlcera cacoethe pharmaca conscripsere. Sicut verbi gratia Asclepiades cognomento Pharma-
 cion in tertio Exteriorum in hunc modum tradidit.

Quæ Medicamenta memoriæ prodiderit Asclepiades.

CAP. 4.

AD Chironia & curatu difficilia Vlcera Medicamentum accommodatum. Æris squamæ pondo vnciā,
 æruginis rasæ pondo vnciā, ceræ selibram, resinæ laricis pondo vnciā s. Ea quæ liquari pos-
 sunt, aridis affunduntur: quibus exceptis, ac curiosè mollitis vitior: item platysma exiguum soli
 affectæ parti, vt vlcus tm̃ comprehendat, iniucito. Cæterum ambientes particulas pharmaco, quod
 phlegmonem arceat, circumdare oportet: inter curandū tertio quoq̃ die soluere, deinde fomentis
 mitigare, idem q̃ emplastrum quod à latitudine platysma vocatur, abluendo emollire, ac rursus im-
 ponere donec cicatricē inducere incipiat. Hęc est medicamenti scriptura. Pulchre verò author
 ipse adiunxit, Ad chironia. nominant. n. sic vlcera, nō mediocriter sed maximè maligna cōtuma-
 cia q̃. Generosum hoc medicamen est, vt quod ex tertia ceræ parte metallica contineat, æruginem
 sanè pharmacū valentius, æris squamā multo illo moderatius, attamē & ipsum generosum. Mediā
 ac symmetriā habet temperiem, vt ēt modicè maligna curet, si non triplex, sed quadrupla, ceræ por-
 tio alijs cōmista fuerit: Moderatius adhuc extiterit, si quincupla adijciat, vt non dum cacoethe, sed
 egrè cicatricē ducentia, persanet: Quemadmodū ēt si metallicorum sex partes cera capiat, vt sit æru-
 ginis & squamæ vtriusq̃ denarius, ceræ duodecim, laricis quot exigit proportio: quæ erit, si tres ip-
 sius denarij imponantur. At vbi cera pinguis est, et si minus resinæ addatur, spissitudinem, quanta
 sufficit, medicamentum habebit: siquidem huiusmodi pharmacis resina ob consistētiā inditur,
 veluti & myrteum, vel lentiscinum. Ego certè attico non nunq̃ cæsypo ceram emollitā miscui: ac
 vsu didici, vel nihil, vel parū adeo medicamentū ab illis, quæ sine hoc pparata sunt, superari. Mani-
 festum aut̃ est me hęc ad futuri medicaminis robur referre: nā auxiliū ad aliquid spectat, quippe
 mollius pharmacū ad moderatiora cacoethe id est minus malefica, magis q̃ vehementius cōducit.
 Vbi igitur vlcus ipsum minus malignum est, orē verò prætumidē ac durē, Græci ochthodis ap-
 pellant, potior in his est cæsypus. Benefacit ēt his cerui vituli q̃ medulla, quā leuem ante factā ceræ
 prius admiscere oportet: dein sic in vnitatē coactis ijs metallica trita, vt in puluerē redigant, exci-
 pienda sunt, vt quæ mordicationem pariant. Omnia verò sicca ac terrestria pharmaca, quantum sa-
 tis est, antea leuigent, vt est galla, cytinus, malicorium, egyptiæ spinæ fructus, qm̃ id genus oīa egrè
 fiunt leuia: sicut facile, quæ ex succis & liquoribus resiccatis proueniūt, myrrha, aloë, acacia, & quæ
 his sunt genere finitima. Cæterum rectē Asclepiades ad finem superioris medicamēti scripti hæc
 verba adiecit: Et hęc triduo soluito, fomentis q̃ mitigato, idē q̃ emplastrū ablutum emollito, rur-
 sus q̃

A sus q̄; apponito. Nisi. n. diutius cuti pharmacū adhæserit, nihil efficiet. Quod & plerosq; medicos latuit, arbitrâtes, si ter die sanie ab vlcere deterferint, melius se facturos ijs, qui bis idē faciūt: qui vero semel soluūt, ab ipsis quoq; ægris tanq̄ negligētes malē audiūt. Conuenit hic quoq; vos meminisse, quod in plerisq; nostris cōmētarijs dictū est, qualitates videlicet oīum vicinorū corporū mutuo in se quicq̄ agere, etsi alterū ipsoꝝ multo sit validius: hac nanq; rōne specie quodammodo inter se similes fiunt spatio t̄pis, tametsi permultū differant: vbi aut̄ qualitas medicamenti curādo corpori similis specie fuerit, vtilitas maior sequitur. His igitur rationibus, qui primus emplastro añ imposito vti statuit, laude dignus est: & nos ipsum sequi multo magis decet, cū quod ratione inuenit, experiētia cōprobatum cognouerimus. Nec temerē triduo quoq; ipsum foueri, singulis videlicet solutionibus, præcipit: nā, quia valēs medicamentū est, meritō lenitionem desiderat. Satiū igit̄ est in vlcerebus non ita malignis, cerā quadruplam vel quīcuplā amborum simul metallicorū esse. Post hoc pharmacū, aliud Aselepiades deinceps tradidit, quod his cōstat. **Æ**ruginis pondo vncijs duabus, squamæ pondo vncijs duabus, diphrygis pondo vncia, ceræ pondo libra, laricis pondo vncijs tribus. Hac rursus symmetria simplicium medicamentorū eadem est, q̄ superioris, solo diphryge superās: alia certē oīa priorū duplicata sunt. In illa. n. scriptura æruginis & squamæ, vtriusq; pondo vnciā adijciebat, cerę modum ambabus triplo maiorem: siquidem oēs vncias, sex eius admiscendas censuit, resinæ verō semunciā, supra vtriusq; metallici portionem. Secunda scriptura, illius quidē, loco vncię & semissis, tres iponendas iubet: metallicorū verō pro vna vncia singulorū duas, ceræ libram, cū in priore scriptura selibrā immittat. Clarū itaq; est diphryges solū in secunda eū apposuisse. Ac si vnciā ipsius immittendā alijs duplicatis præcipit, modō simplicibus vniuersis in priore scriptura mistis diphrygis semunciā addideris, talē medicamenti confecturā habiturus es: Squamæ pondo vnciā, æruginis pōdo vnciā, ceræ selibrā, resinæ laricis pondo vnciā s, diphrygis semunciā. Eadē oīno & hæc est priorī, si diphryges excipias, quod tā moderatum est pharmacū, vt ēt solū inspersum vlcerebus, quę cicatricē difficulter admittunt, medeat: similiter & æs cōbustum. Valentior aut̄ longē ærugo, vt vel sordida admodū & humida curandī terminos exceßerit, si solā eam inspergas, exedit. n. & mordet insigniter. Porro in chironijs vlcerebus, alijs mista pharmacis tantum de vehementia quidem virtutis suæ remittit, auget aut̄ illorum, vt cōpositū ex omnibus pharmacum fiat præstantissimū. Qua verō rōne prædictis medicaminibus ærugo mista fuerit, hac & viuā calx, exigua proportionē aliorū multis a quibuscūq; adiecta. Extincta mediocre est pharmacū, elota prorsus leue, & mordacitatis expers. Hoc igitur emplastrū exēpli gratia adscripsi, q̄ iuuenes in particularibus exerceri velim, nec vniuersalibus solis esse contentos. Rursus autem reuocato ad initium sermone ad Andromachi medicamenta digrediar.

De scriptis ab Andromacho Emplastris ad Vlcera Maligna.

CAP. 5.

Apponā igitur causa exempli, quæ ex cōpositis medicamentis ad cacoethe vlcera conuenire vfu probata sunt, ab ijs exorsus, quæ scripsit Andromachus: quē nō iniuriā queas accusare, q̄ citra distinctionem pharmaca tradiderit. Hac. n. omīssa permultos medicos malē ipsis vti cōtingit, ideo q̄; non nunq̄ scopum mirificē adsequi, interim ab illo errare, permultū delabentes. Cū igitur par esset, vt ipse diceret, Hoc ipsum validissimū est, ab hoc rursus aliud moderatissimū, hoc verō imbecillissimū, ille oīa subinde scripsit nulla distinctionē apposita. Auspicatur igitur ea ipsa hoc titulo: **Æ** Cicatricem inducentia. Mox ita subdit: Cadmiæ tostæ pondo libram, chalcitidis vstę pōdo librā, ceræ pondo libras quatuor, resinę aridę pōdo libras iij, myrtei pondo libras iij: vinum aridis miscetur. Ab his verō deinceps in hunc modū scribit ad verbū: *Medicamentum ex Ladano.* Et symmetria apposita, iterū deinceps ait: *Aliter vt Alcimion.* Deinde hic quoq; symmetrijs expositis infert inquiens. *Pharmacum ex Hordeo.* Post huius cōpositionē in hanc sententiā iterum scribit. **Æ** Aliud Cicatricem inducens. Resinæ siccæ denariū pondo octodecim, diphrygis denariū pōdo quatuor, spumæ argenti denariū pondo sedecim, ceræ denariū pondo x, olei cyathum & dimidiū. vt hoc sit ei medicamētū ab initio sextū. His subiungit iterum alia sex, vnicuiq; preponēs, *Aliud*, volens nimirū cicatricem inducens nos inaudire. Quinq; igitur sunt epulotica, quibus vti mos est, nec malignis, nec ægrē cicatricē ducētibus, idoneis. Sextū ad vlcera quidē dysepulota, id est q̄ cicatricem difficulter recipiunt, non tñ iam ad cacoethe, q̄ nobis maligna dicuntur, valet. Reliqua verō sex adiecta malignis profunt, virtute inuicē diuersa: Quibus alterutrū oportebat, nē pē vel rationalem ac methodicam disciplinam conficiendo, adscripsisse in eorū vehemētia differentiam, tanquam nobis intellecturis ad maligniora vlcera valentioribus vtendum remedijs, ad mediocria imbecillioribus: Vel Empiricorum more posuisse, quædam horum medicaminum phagedanicis, in summa q̄; exelis, ac pastis, esse vtilia, quædam cauis, quædam vehementer sordidis: ijs verō, qui phlegmonodem simul aut scirrhum affectum habent, aut labra vlcere dura, vel prætumida, vel nigra, vel alterius cuiusquam coloris, singulis propria: Horum autem nihil ille effecit. Postea sex facultates cicatricem inducendī ordine retulit, quarum ego cōpositionem cum proprijs distinctionibus narraturus sum. Primum itaque ab eo scriptum, quod tamē a principio septimum est, satis validum, vt quod æquale habeat pondus æruginis & squamæ: remisit autem minuit que vim ipsius ceræ mīstura, quæ octo partes vtriusque singillatim, quatuor

tuor amborū simul explet. Etenim æruginis, & squamæ, cuiusq; vnciam miscere præcipit, ceræ vn E
 cias viij: admodū q; cōmodè cauit, qui id cōposuit, miscere aliquod mollicinū, græcè malthacodes
 dicitur: oleum dico, & seuū, & celypum, & butyrū, & resinā. At si pinguis cera, non adfit, metallica
 agrè miscbuntur. Ac si iuxta ignem vel in Sole calido miscere ipsa cogamur, paulo post pharma
 cum indurecet. Quapropter cum vlceri fuerit impositum, sagum suum ager durum contingere
 putabit: quippe eiusmodi medicamenta oīa talem habēt vsum. Si verò calidis manibus tractet, tū
 ex ipsis recipit magnitudinis, vt emollitū dilatātū q; toti vlceri imponat, atq; et oras cōtegat. Cū
 altum vlcus extiterit, totū ipsius cauum medicamine indito replebit. Post q; hoc rursus aliud pla
 tyfma super accommodabit, quod & labra comprehēdat. Huic deinde rursus lintheus pannus fri
 gida madēs tantus vndiq; obijcitur, vt medicamentū occultet. Postremo extrinsecus spongia mol
 lis fasciā ex lintheo excepta, vel semel vel bis affectā partem orbiculatim ambiente, tantæ magnitu
 dinis, quō totū vlcus cū labris, ac superpolitorum ipsis aliquid subiectorum q; complectatur. Deli
 gatio a ducibus principijs fiat: vocant sic quoties tota pars media vinculi affecto loco incumbat,
 crūs aut vtrunq; in oppositum deducatur. Postremo si pannus tā sit validus, vt semel iniectis spon
 giam tuto contineat, illic terminis consuetur, eo, quod superfluit, forfice adempto: sin imbecillis,
 rursus vtrunq; crūs ducetur, simili robore ad id, quod affectū est, attractum: quod in primis obser
 uare conuenit, cū in primo fasciæ traiectu, tum vel maxime in secundo. Quin nec illius obliuisci
 te oportet, cuius primus, quorum ad nos memoria peruenit, || Hippocrates inuentor extitit, olim
 ab omnibus ante ipsum medicis, nunc ab ijs, qui artem parum legitime didicerunt, commissi. Pu
 tant, n. satius esse partem exulceratam incompressam seruare, vtrinq; verò ligamentum ei circum
 ponere: quod q̄ sit incōmodum ac noxiū, Hippocrates demonstrauit. Igitur vbi hæc primo die
 peregeris, altero aqua frigida spongiā perrigato. Si ambiens aer calidus, & siccus fuerit, bis hoc
 ter ve in dies singulos faciendū est: ac deligatura tertio quoq; die soluenda, per hyemem et quarto.
 Cæterum inspiciēda est, a medicamēti virtute facta inalteratio, tū in vlceris cauitate, tum in labris,
 tū in locis ea ambientibus. Porro vnde hæc discas, libri de Tēperamentis suppeditabunt: nec non
 in opere therapeutices Methodi de his vlceribus tractatum est. Vel, n. siccus, vel humidus, vel ca
 lidus, vel frigidus, q̄ prius, & totū membrū affectū, & singulæ eius partes, apparuere. Insuper cōsi
 derabimus, nū quid ex oris ademptū sit: vel emollitæ quodāmodo, vel attenuatæ sint: itē color ne
 mutatus, & an sordidū copia eadem remāserit. Vnde cognosces vtrū fortius, vel mollius, vel simile
 priori medicamen imponendū veniat. Poteris sanē & primū ipsum ex facili immutare, si mollius
 voles reddere, misto inter molliendū paululo cuiusdā olei adstringentis, aut myrtei, aut rosacei, aut G
 melini, aut lentiscini, aut masticini, aut cyprini: Sin validius, aut squama, aut æruginē, ex quibus
 vtriusq; paulū ad amissim laue reddes, vt subigendo adijcias. Nos, vti nouistis, vel mite aliquod
 pharmacū vlceri inspergimus, ei q; medicamē emplastrodes superimponimus. Nulli dubiū est mi
 tria pharmaca mihi dici, diphryges, sarcocollā, chalcitidē vstā, itē cōbustū & æs, & æruginē, & chal
 canthū: quæ ignē non experta, acria oīa sunt: cōbusta, moderata: lota post combustionē, lenia mor
 dacitatis q; sūt expertia. Præstat aut sicut prædiximus, & emplastrū mitioni adaptare, aliquod q;
 ex alijs medicamētis imponere, quorū deinceps meminit Andromachus: id q; nō modo simpliciū
 vires, sed mensurā quoq; inspicientes, vt in eo quod iā cōmemorauimus. Quatuor, n. partes ceræ,
 cū æruginis & squamæ, vtriusq; vna, miscentur: tres fortius ipsum efficiunt, sicut quinq; imbecil
 lius. Eodē modo in alijs agendū est, puta in eo, quod prædictū sequi, octauū ordine, tali symme
 tria. C Chryfocollæ denariū pondo duū, squamæ denariū pondo duū, ceræ denariū pondo sex,
 dyphrygis denariū pondo duū, squamæ argenti denariū pondo octo, rosacei vel myrtei parū. In
 hoc pharmaco chryfocolla & diphryges ipsa per se inspersa malignis vlceribus curādis sufficiūt.
 Squama validius, asperius, mordacius q; medicamentū est: eo q; argenti spumā author admiscuit,
 subueritus squamæ violentiā, cupiens q; ipsam mollioris pharmaci mistura mitigare ac exoluere. H
 Sin absq; cera quatuor illa iuxta dictā tēperaturā misceas, medicamē aridū inspersile, Græci vocant
 epispaston, habiturus es, ad malignorū vlcerum curationē non inefficax. At vbi emplastrū facere
 conaris, cera miscēda est. Et pp metallicorum copiā, necessariū ēt liquidorū in præsentī facultate
 meminit Andromachus, rosacei nēpe, & myrtei: cera nāq; modica nimis est pro metallicorū mō.
 Cū igitur chryfocollæ, squamæ, & diphrygis, binos denarios: argenti spumæ octo misceri iubet,
 quatuordecim videlicet vniuersos efficiens: vel cerā pingūē permultā, vel oleosum aliquod, phar
 maco affundere debebat. In superiore medicamēto cera quadruplo metallica superabat: vnde spu
 ma argenti ablata, ex alijs licet pharmacum cōponere, quemadmodū ego non nunq̄ factitauī. Qd
 si fiat, myrteo non opus erit, cera, vt dixi, pingui adhibita: si dura sit, liquidū aliquod miscere opor
 tebit. Quam ob rem non nulli in id genus pharmacis ceræ apposuisse videntur, alij nouæ, alij recē
 tis, nō per louē ipsius ætatē, sicut in alijs medicaminibus, sed humiditatem requirētes. Est etenim
 re vera melior noua, sed non iam vt bimulā, trimulam ve reijcias. Ceterū ad sequens emplastrū
 ire tēpus est, quod habet in hūc modū. C Diphrygis denariū pōdo octogintaquatuor, argēti
 spumæ denariū pondo ducentorū quadraginta, ceræ denariū pondo trecentorū octidēcim;
 olei heminas sex. Poterit aut hoc pharmacū vlceribus non dū malignis, verū cicatricem egre reci
 pientibus

* Af. caput.

de fract. cō. 3.
 tex. 5. cl. 7. 242.
 g. Et tex. 8.
 243. b

* Af. viginti.

* Af. 6. i. qnq;
 Sūt, qui legēdū
 putent, s. id est
 hemina dimi
 dium.

Apiantibus eam obducere, qm̄ exiccat, sed non valide, vt quod post ipsum scribitur: minori tamen symmetria cōficiendum est, idem enim ei hoc est. **C** Diphrygis denariū pōdo quatuordecim, argenti spumæ denariū pōdo quadraginta, ceræ denariū pōdo quinquagintatrim, olei myrtei pōdo vncias decem. Nam Andromachi pharmaca horum seculpla sunt. Hoc igitur cicatrici obducendæ re vera est respondens ex cadmia confectio, & glyceæ nominata, de quibus sequenti sermone dicemus. Huic subscriptum validius quidem est, non tamen primo ex hisce sex, verum se primo à primordio finitimum: In quo squamam & æruginem ceræ quadruplæ commiscuit: diphrygis enim adhuc denariorum pōdo sedecim, argenti spumæ denariorum pōdo quadraginta octo, ceræ denariorum pōdo sexaginta sex, adiicit. Inde horum copiarum gratia coactus est & myrtei olei heminā s, affundere. Numeretur ergo hoc quoq; inter ea, quæ cicatricem generant. ** Al. et s.*

Quod statim subiūgitur, eiusdem generis est, mitissimum uerò minime q; mordax, ex plumbo combusto & eloto, spodio, cadmia, diphryge, & terebinthina compolitum. Zenonem aiunt chalbani quoque miscere, quod mihi prædictis videtur superfluum. Scribit igitur ipsius symmetriam talem. Eloti plumbi denariorum pōdo duorum, spodij denariorum pōdo quatuor, cadmiæ tantundem, diphrygis † denarij pōdo vnus. } Excipit ea terebinthina denarijs sex. Zeno *† Al. denariū pōdo iij.*
Bnem dicit chalbani addere † denarij dimidium. } Si quidem ceu molliendis labris callosis, ac duris, eo q; Græcè ochthodesi id est verrucosis, appellatis id facit, probè admiscet: sin ad vlceris malignitatem & contumaciā, nō item: tamen si enim chalbani quoq; receperit, etiam sic à malignorum vlcerum prauitate vincetur. Magis autem uerisimile videtur duodecim hæc ordine se consequentia pharmaca ad cicatricē ducendam idonea scripsisse. Etenim præter duo ex ipsis, puta septimum à principio, & octauum, alia omnia vlceribus quidem ægre ad cicatricem venientibus, sed non dū malignis, medentur. Item duodecimum inter ea similiter quidem cicatricē obducit, imbecillius autē est, q; vt cacoeihe persanct. Compositio quoq; huius hæc capit, Molybdænæ denariū pōdo ceterum, diphrygis denariū pōdo sedecim, foreos denariū pōdo decem, misyos cyprij tostij denariū pōdo octo, resine terebinthine denariū pōdo octo, ceræ denariū pōdo quadraginta, myrtei denariū pōdo quadraginta. Porro minoris symmetriæ, quæ huic proportionē respondeat, omnia eiusmodi pharmaca conficere oportet, scientem ipsa confestim duram ac saxeam duritiem acquirere. Tantum igitur cuiusq; præparare satius est, quanti vsus fuerit, præsertim si hyems usum ipsorum excipiat. At si quartam singulorum partem capias, molybdænæ quinq; & viginti denarij erunt, quatuor diphrygis, duo & semis foreos, tostij misyos duo, terebinthinae *† Al. denariū pōdo iij.*

C duo: & ceræ & myrtei pares portiones, vtriusq; decem, amborum simul videlicet viginti. Porro in omnibus eius notæ pharmacis, illa quæ liquari possunt, liquefacta & refrigerata, deinde rasa, sicis diligenter in puluerem redactis admisceto. Nam si liquida ipsis affundas, sepe fient grami cere modo (enceridas Græci vocant) maxime cum frigus fuerit. In Sole feruenti si miltura fiat, licet ea superfundere, mouendo vehementer rudicula primum, deinde cochleario: præstat autem in hisce omnibus rudiculam palmæ esse ramusculū. Hæc Andromachus indistinctè, sicut diximus, duo decim pharmaca tradidit, hoc ipsis tantum communiter præponens, Epulotica hoc est ad cicatricem ducendam idonea. Ego vero differentiam ipsorum manifestò (vt arbitror) exposui, quæ cordatum virum ad dextrum particularium vsus veluti manu ducere queat. Insuper aliorum polychreston id est multiplicis vsus, medicamentorum meminit, vt ad alios plerosq; affectus, ita ad vlcera dyssepulota id est ægrè cicatricem ducentia, aptorum, quæ nos sermone procedente percensuimus, ubi pharmaca, propter variam vtilitatem polychresta Græcis dicta, aggrediemur. In præsentia peculiariter de ijs sermo nobis est, quæ ad maligna, & dyssepulota faciunt, ea quæ potius maligna, quæ chironia non nullis appellantur, quemadmodum & ipsi Andromacho. Ordine itaque ex duodecim medicamentis modo relatis, cum duo ad carbunculos prodiderit, vnum ad herpetas,

D quartum aliud post tria hisce verbis conscripsit. *Epuloticum ad Chironia, Dioscoridis.* Magis varium quidem medicamentum componens, non tamen septimo illo superscripto valentius, in quo ceram quadruplo copiosiore, quàm vtriusque, nempe squamæ & eruginis, miscebat. At in nunc proposito, pauciore cera metallicorum proportionē iniecta liquari ipsam pauco myrteo iubet aut rosaceo, quantitate eorum non adscripta. Iam uerò vniuersam eius sententiam ex Andromachi verbis apponam. **C** Cicatricem obducens, *ad Chironia, Dioscoridis.* Chrysecollæ denariorum pōdo duorū, æruginis rasæ denariorum pōdo duorū, ceræ denariorum pōdo sex, diphrygis denariū pōdo duū, spumæ argenti denariū pōdo octo, rosacei vel myrtei modicum, vt liquefiat. Hoc pharmacum adamussim superiori illi conuenit, quod inter cicatricem obducentia locum, vt dixi, octauum obtinet, post id positum, quod squama atq; æruginē constat, sola illud erugine nimirum superans. Ideo quæ cicatricem illud inducentibus adscripsit: maiora tñ de ipso pollicetur, ad chironia conuenire id dicens. Et uero post hoc quoque optimi medicaminis mentionem facit in istū modū. **C** Medicamentum obducens Cicatricibus ex collectaneis Primonijs, ad Desperata. Hoc nomē, Desperata, vlcera illa, quorū curationem pleriq; aggressi non absoluerunt, sed tanq; ab insaniabilibus destitute, ei significat. Fidendum huic medicamento, quod præter alia vsu quoque probatum est.

Hanc autē eius compositionē scribit. Soreos denariū pōdo viginti quatuor, aluminis scissilis denariū

† *Al. sexagin*
ta.

nariūm pondo sedecim, malicoriū denariūm pondo sedecim, calcis viua denariūm pōdo sedecim, E
thuris denariūm pondo trigintaduūm, gallae denariūm pondo trigintaduūm, ceræ denariūm pō-
do centum viginti, seu vitulini denariūm pondo † centum sexaginta, 3 olei veteris heminā. Hęc
est simplicium medicamentorum symmetria ad præsentis compoliti præparationem. At quomo-
do illud præparandum sit, omisit, vt in alijs ēt multis, quæ confecturę narrationem requirunt, nam
in hoc quidem vel admodum facilius est, vt paulo post dicemus. Caterum vos scire in primis vo-
lo, vt si quando vitulinum pingue desideretur, eius loco vetus suillum, quod nominant axūgiam,
admiscendum, verum salis expers, & non multorum nimis annorum. Vetus itaq; oleum abunde
fatis digerit, sic adeps quoq; id q; citra mordicationem ambo efficiunt: bubulus limiliter quidem
digerit, sed non æquē morfu caret: medium locum obtinet vitulinus, quo porcino acrior, hoc bu-
bulo mollior. Itaq; pharmacum, quo de sermo institutus est, validissima continet, fori, alumen scis-
sile, malicorium, gallam, non digerendi facultate eximia, sed adstringendi vt vocant, prædita. Cla-
rum est autem gallam semper adijciendam esse, quæ vocatur omphacitis id est immatura: alumen
verò Ægyptium, & scissile: cuius penuria rotundum, quod scissili quidem est crassius, sed non mi-
nus adstringens. Quod aut malicoriū putamen mali granati vocatur, oēs nouerunt. Breui adeo
tempore viget, si velis aridum contundere, & in puluerem redigere, seu læuigare: nanq; dum are-
scit malicorium, imbecillior quoc; vim sortitur, cum humore eius discusso pereuntem. Quare
tutius est succosum prius ex vino decoquere, donec optimē læuigari possit. Vinum autē austerū
prorsus, sed neq; recens, esse oportet, nam austera nisi vetera sint, crassarum partium existunt: neq;
vetustū adeo vt iam acre existat, etenim recens penitiora corporis non permeat, vetus acre & mor-
dax est. Ergo ætate medium potius est, quod plurimum intra quinque & decem annos consistit.

Postulat locus hic in memoriam reducere, quod multi sæpe dictarunt, de austeris, acerbis, in to-
tum de adstringentibus, vinis, cibis, & pharmacis: ac primum de harum vocum significationibus
agendum est. Austerum enim Græcis idem sibi vult, quod mediocriter adstringens: Acerbum,
quod valide ac vehementer id facit. Genus vtriq; cōe adstrictionis vocabulo signatur, non etiam
vtrum valide an obscure ea fiat, declarante. Omnia igitur adstringentia contrahunt ac dēfant me-
tus: ad hæc vinciunt ac continent partium sibi inuicem coherentium substantiam: atq; minus ma-
gis q; hoc pro adstrictionis quantitate efficiunt. Caterum stringendo ac densando summa corpo-
ris quod adstringitur, virtus illorum excluditur, & in altum ire prohibetur. Ob quam rationem
pulchre non nulli medicorum huiusmodi pharmacis alia subtilium partium, & acri potestate præ-
dita, indere cogitarunt: à quibus veluti ductæ adstringentium vires in profundum corpus perue-
niant. Hoc igitur pharmaci propositi author considerauit, qui calcem viuā ei addiderit: at in An-
dromachi libro calcis vox omiſsa est, viua nomen adscriptum, medicis compendij gratia & plera-
que alia sic interpretantibus. Nimirum igitur in iplis medicamentis ad vlcera vix cicatricem reci-
pientia & maligna compositis, squama simpliciter apposita, citra adscriptionem æris: & scissile, si-
ne vocabulo aluminis: & terebinthina, absq; adiectione resinæ: subaudimus, quæ ipsi sic in dictio-
ne omiserunt, quemadmodum & nunc in vocabulo, viua, calcem: nuncupant enim per excellen-
tiam ipsam, restinctam, & viuam, appellatione non minus & alijs, quæ vruntur, accōmodata. Itaq;
viua calce mista emplastri huius author acerbis medicaminibus validum compositum reddidit,
vt virtus eius in imum vsq; penetret. Qm̄ verò ex valentissimis confectura est: ac nullum mitiga-
torium, nec leniens, nec concoquens aliquod continet: merito thus ei, quod puri mouendo phar-
macum est, admiscuit. Si igitur sicco composito vtereris, vlceri ipsum inspergens, sic vehemens
admodum esset, mordax, asperum, & exedens: at quia emplastrum id facere proposuimus, per-
spicuum est vnicuiq; resinam, vel ceram, vel adhuc adipem, vel medullam miscendam fuisse: ac si
non dum ex his emplastri spissitudinem acceperit, oleum aliquod affundendum. Cum autē addo
aliquod, inaudiendum est tibi præterq; quod propriē & simpliciter oleum dicitur, ēt quod cū adie-
ctione rosaceum nominatur oleum, vel myrteum, vel cyprinum, vel eius generis aliquod: distin-
ctum nanq; est iam sapius, quid discriminis sit, rosaceum vnguentum dicas, an oleum rosaceum:
& vnguentum cyprinum, an cyprinum oleum: alia q; similia. Merito igitur eiusmodi pharma-
corum misturam non eandem oēs fecerunt, qui id genus emplastra composuere. Nam q; plures
huius differentię causæ existant, non ratione, sed mea iplis experientia, deprehendi. Non nunquā
enim ex paucis numero simplicibus medicamentum subito præparauī, interim ex pluribus, aliās
ex plurimis, vel omnibus, eiusdem generis. Insuper quia nō nulla apud nos abunde copiosa, quę-
dam ex toto non essent aut paucissima eo tempore, ex ijs quæ habebam medicamentum cōposui
vsu ita postulante: deinde cum experimento id probatum inuenissem, ita semper vsurpauī. Sæpe
fortiora quædam pharmaca composita, quædam imbecilliora, vltro facere instituens, vt variis affe-
ctibus accōmodata haberem, diuersas compositiones aggressus sum: præterea hac ratione motus,
q; pars exulceratione laborans plures requirat facultates: vt cū simul & caua est, & fluida, & sordi-
da, & oris prætumida ac dura, & fluxionem ex superioribus recipit. Si nanq; pharmacum ad om-
nia, quæ sic exulceratis partibus acciderunt, valere cupias, diuersarum virium materias miscere ne-
cessarium est. At si vnum aliquod primū, quod vrget, sanare studeas, alijs neglectis non est quod
pharmacorum

Apharmacorum varietatem requiras. Clarū est igitur & illos, qui ante me eiusmodi medicamenta confecerunt, ob prædictam rationē dissenisse: veluti verbi gratia in propolito pharmaco, vitulinum pingue author cepit, q̄ oras induratas emolliat. Proin duplicem ei vsum adhibere debebat, vnū vt molliuiculo medicamini (malthacodes appellauimus) ad vnitatē siccorum faciendam, quę primum erant vtilia: alterum, vt & ipsum aliqua partis affectū symptomata seu accidētia persanaret. Verū multo vtilius medulla ceruina induratis oris adhibet: quæ si nō adsit, vitulina: in vtraq; desideratur, humida aliqua & non acris resina. Nam oēs resinae humiditatis gratia simul & viscolitatis, quā habent cognatam, sicca medicamenta veluti colligant: quia vero non euidentem habent acrimoniam, vlcus nequaquā iritant. Quapropter non nulli merito talibus medicaminū confecturis admiscuerunt vel terebinthinam, vel laricem nominatam, resinam. Meminisse autem vos inter componendum oportet illius ēt, quod a plerisq; medicorum negligitur, a quibusdā per ignorantiam committitur. Credunt enim institoribus, verus oleum dare se affirmantibus, ignari, quō ipsius loco vendant adipem suillum veterem, ex oleo communi liquatum temperatum q̄, sed membranis prius diligenter exemptis. Apparet enim sic, crassum inspicientibus: si odoris, vetustatis graueolentiam representat. Similitudo igitur est fœtoris: qui vero vtriusq; ad vnguem meminit, manifestō alterum ab altero discernit: alia siquidem est odoris adipis, alia veteris olei, proprietates. Accedit huc, q̄ crassitudo ipsius adulterati continua non est, nec similis, quemadmodum olei verū. Quin & crassius in valis fundo, tenuius in summo, euadit: ob quod etiā id adulterantes permouent, dum emptoribus tradunt. At si re vera quoq; sit oleum sine tali astu sua spōte natum, nomen quidem hoc obtinet vetus: vis aut trimuli nō est propinqua trigenario: aut quod annorum quatuor est, nullam continuitatem cum quinquagenario habet: siquidem temporis spatio, cum inueterarunt tum oleum, tum adeps, mordacitatem quandam acquirunt. Sed hæc quidem sunt maxima, maxima vero & facultatis permutatio: maximā enim digerendi facultatem tum oleum, tum adeps, quando inueterata sunt, habent. Atq; hoc ego expertus sum ideo, q̄ oleum ac adipem vetustissima forte quadam haberem a patre multis annis obseruata: quæ ipse rursus ambo admodū iuuenis adhuc, copiosa reposui, vt iam inueteratis eis vti possem, vbi patris essent consumpta. Sed ēt post hæc iterū ambo sæpe recondi, vt vetustescerent, tanta q̄ mihi nunc illorum copia est, quāta vel centum annis victuro sufficiat. Propterea pharmacū, de quo sermo est, oleum & adipem quadraginta annorum recipiens, semper apud me vlcera diuturna præter modum maligna, q̄ opinio ferret, melius sanauit. Sunt huiusmodi vlcera, in quibus ipsa affecta pars in tā vitioso habitu consistit, vt quis sanguis nutriendi causa ad eam perueniens probè sit concoctus, tñ mutet ipsum, corruptat q̄: liue, id quod influit, adeo prauo succo præditum est, vt ēt si pars nihil passa fuerit, ab illo certe ipso solo erodatur. Mirificè igitur medicamenti compositor adstringentia pharmaca repellēdi facultate prædita assumpsit, vt nihil parti affectæ, dum curetur, influat: quædam digerentia, vt fanies in laborante particula contentæ per halitum digerantur, vacuetur q̄. Symmetria vero ipsorum ita habet. **C** Aluminis scissilis, & malicorij, vt quæ validissimè adstringant, minus iniecit, vtriusq; denariū pondo sedecim in idem miscens: foreos sesquiplum vtriusq; hoc est denariū pondo vigintiquatuor, minus quidem adstringentis, non minus autem siccantis: scissilis quoq; & malicorij æquales vtriusq; portiones indidit: gallæ ad triginta denarios, duos apponens: vt omnes ex pharmacis denarij octoginta octo colligerentur. His opposuit valide digerens & siccans medicamentum calcem viuam, contētus sedecim denarijs, qui adstringentium vires sufficiunt deducere. Centū igitur et quatuor denarijs ex metallicis medicaminibus collectis, plus quoq; thuris adijcere conueniebat: & hoc mitius euasisset pharmacū, quo copiosius illud recepisset: ceterum vehemēs ipsum seruare curans, minus adiecit. Tibi autem licet bifariam ipsum componere: nam vbi priora quinq; cōtriuēris, omnia q̄ simul commiseris, aceruo in duas portiones diuiso, alteri parti sedecim thuris denarios, alteri duplum indito, deinde liquato: & postq̄ refrigeraueris, radito ceratum ex liquabilibus medicamentis confectum: quod et ipsum in duas partes seiungito, alterā ei, quod plus thuris habeat, alteram reliquo, admiscens. Atq; de ceræ & adipis symmetria prima coniectura latitudinem magnam satis obtinet, nobis haud planè intelligentibus, quale tandem crassitudine medicamen futurum sit: at postq̄ omnia mista fuerint, clarum fit, tenerius an durius a quo sit redditū. Quare in altera compositione diligentius nobis coniectandum est & de his ipsis, & simul cum his de oleo. Sicut enim citra rationalem methodum medicamenta componere, ita vim illorum certo & accurate cognoscere, sine experientia nemo potest. Hoc itaque medicamentum Andromachus ipse desperatis auxiliari dixit. Ab hoc vero deinceps quoddā ad paronychias tradidit. Ac post hoc rursus sic ad verbum scripsit. **C** Ad Cacoethe Vlcerum Valeria Secunda. Subaudiendum nimirum est, vsum sum. Materia sanè pharmaci innuit curatione quidem se a vehementibus relinqui, sed posse ea, quæ vehemētium medicaminum adhibitione iritantur, mitigare. Compositio itaq; eius hæc capit. Tyrrhenicæ denariū pondo octo, subaudi videlicet ceræ: seu taurini denariū pondo quatuor, terebinthinæ denariū pondo quatuor, plumbi vsti denariū pondo quatuor. Linamentis excepto vutor. Hæc ipsius verba sunt. Male aut fecit, q̄ ad quæ cacoethe seu maligna conuenire id dicat, non declarauit: Nec, quod vehemens sit, aut mitigatorium adiecerit: diuersa

nanq; sunt mitigatoria pharmaca. Nam quædam tantillum etiam affectus iuuant: non nulla vero E vel paululum offendunt: aliqua nec iuuant nec offendunt, sed dolores tantum leniunt, de quibus alias agemus, multa eius generis longo vsu explorata scripturi: ac quædam mirificè adeo symmetrijs composita, vt omnino iuuent: interim etiam ipsos tantum affectus agrestium, vt ita dicam, vlcera perferant. Verum ex illorum materie est cera tyrrenica, & plumbum vstum, non tamen terebinthina, & taurinum seuum. Verum de eiusmodi vlcerebus ac pharmacis sermo, vt dictum est, peculiaris in posterum nos expectat: Nunc de curatu difficilibus, vel chironijs, vel quomodo cunq; appellasse velis, differere propositum est: ex quorum numero sunt & hæc quinq; vniuersa in quarto Critonis libro conscripta.

Quæ Medicamenta Crito scripserit. Medicamentum ex Ladano.

CAP. 6.

Optimum medicamen Epuloticum, ex Ladano. Conuenit Præputium cum duritia Vlcerebus, & cauis: deligatum vero membrum in diem quartum continendum est. Picis aridæ denarium pondo centum, æruginis rasæ denarium pondo vigintiquatuor, eris combusti denarium pondo quindecim, squamæ rubræ denarium pondo vigintiquatuor, ladani pondo uncias nouem, argenteæ spumæ pondo libras tres, olei sextarium vnum s, vini optimi sextarium vnum s. Hoc emplastrum præparauimus & ego materia recepta, quæ nullum malthacodes hoc est mollicinum, pharmacum contineret: sic enim vocat. Hippocrates omne genus medicaminum, quæ connatam humiditatem habent, qualis in pingui est, lingulis que oleolis medicamentis, & quidem in ipso oleo, & aqua. Quin & resina, cera que mollicinum quippiam obtinet. In medio ipsorum, dico autem siccorum temperamento & mollicinorum, pix consistit: eo que ambobus generibus citra offensam admiscetur: quemadmodum tum argenti spuma, tum arida pharmaca, quæ circa mediam temperiem versantur, etiam si non nihil ad vtrumvis excessum interim declinent. Hoc genere comprehenditur pix quoq; quæ secundum siccitatis ac humiditatis oppositionem manifesto iam à medijs recessit: secundum alteram oppositionem calefacientium & refrigerantium, non item: calefacit enim modice, atq; ideo medicamentis quæ pus mouent, admiscetur. Quam ob rem in proposito medicamine arida pix medijs attribuitur, atque hac magis argenti spuma, & alia quæ siccandi vim obtinent.

Lib. de vlcereb.
a principio.

Porro cum & hic error committi possit, disputationem de ipsa instituam, theoremate primum ad multa vtili in memoriam reuocato: quod id in alijs operibus, maxime de Simplici medicina, & Therapeutice satis abunde sim executus. Calidum enim & frigidum, humidum & siccum medicamentum appellamus, quod corpus nostrum calefacere, vel refrigerare, vel siccare, vel humectare queat, ad optimum hominis temperamentum collatione facta. Medium vero quoddam hoc est inter alia G temperamenta vitiosa, quæ etiam calida, vel frigida, vel humida, vel sicca nominamus, a præpollente in ipsis siue qualitate, siue facultate, siue substantia, siue temperie malis dicere, denominationem facientes. Eadem ratione neq; si a superante in mistura elemento vniuersam temperiem denominare velis, rerum scientiam offendes: ostensum enim est in medendi Methodo prædicia per indicationem, ab ipsis quidem affectibus, contrariæ illis temperatura inueniri: a tota vero animantis cuiusque natura, atq; a singularum rursus partium, propriæ & similis. Vnde si & vlcus simplex cauum habeat quis, ab iisdem quidem genere, sed quæ non mediocrem differentiam in particularium speciebus habent, curatio sumitur. Atq; ob id demonstrauimus vlcerebus omnino similibus quædam medicamentis, quæ admodum siccant, perferant, puta radice panacis, aristolochia, achoro, iride: non nulla solo thure, licet hoc carnem non inducat, sed illas naturas ad suppurationem perducant, quas aristolochia carne replet. Sicut autem in corporibus curandis differentia particularis per magna est, ita quoq; in vlcerebus. Nam simplex, cauum, & purum vlcus a mediocriter siccantibus curatur: fordidum vero, & malignum, et oris præputium ac duris quidem, sed carne iuxta cutem fluida, validissime siccantia requirit. In his igitur vlcerebus, quoniam & de ipsis verba facimus, thus est imbecillum medicamen, vt ne pus quidem concoquere, vel mouere possit. Argenti spuma hoc H est validius, sed medijs tamen et ipsum inferius. At pix arida mediorum gregi annuerat: quemadmodum hanc superat exiccando æs combustum, chrysocola, & diphryges. Porro euidenter siccant chalcitis combusta, ærugo, misy, atramentum sutorium, æris squama: atque altero modo quæcunque acerbæ sunt, galla omphacitis id est immatura, malicorium, alumen. Exedunt autem non vsta, chalcitis, ærugo, misy, & calx. Quæ iam fortissimas facultates habent, in omnibus corporibus eadem actionem ostendere videntur: imbecillia manifestam differentiam indicant. At si mentem adhibeas, neque minus in valentibus pharmacis magnum actionis discrimen deprehendes, quam in mollibus & duris corporibus obeunt: etenim mollia citius accendunt, vehementius molestant, & maiores phlegmonas concitant. Cū igitur hæc non modo ad præsentia, sed ad alia quoq; multa, quæ hoc commentario continentur, vtilia dixerim, rursus ad propositum pharmacum reuertar, in quo picis aridæ denarium pondo centum a Critone scriptum fuisse retulimus, argenti spumæ pondo libras tres, cum neutrum propria facultate vlcus cacoethes perferant: verum, vt medicamen, quod componitur, emplastri speciem induat, recte præditijs admixta sunt. Quantitas autem ipsorum artificiali coniectura sumpta dicto nuper pondere statuta est, cauente hoc illo, qui composuit, ne tam exiguum vtriusque validis medicamentis misceatur, vt mordacia erodentia queant fieri,

A fiant, agris molesta: vel tam multa mole, & pondere, vt ipsorum virtutem dissoluant. Nam æris squama admodum siccata abstergit q̄, atq; hac etiam magis ærugo: quæ ambo efficacia sunt, & carnem exedunt. Æs combustum nec a quoquam intendi nec resolui postulat, mediocri facultate presentibus commodum. Constat autem olei mensuram ex illis, quibus cum miscetur, & coctionis quantitate, coniungi: nam quæ metallica præparas ad siccandum sine vlllo morfu, coquere diutius oportet. Atq; hæc ratio est, cur Crito coctionem quoq; ipsis hisce verbis apposuerit: Argenti spumam & oleum coquito, donec aliquatenus coierint: deinde spumam æris, æruginem, dum confluerint & colorem bonum acquirant, mox picem, adijcito: posteaquam refrigeratum fuerit, ladanum ex vino tritum, obseruans ne ex hoc adiecto efferuescat: postremo supra ignem lenē vnita defundito, subigito q̄. Hæc quidem coctionis scriptura est. Licet etiam copiosiore oleo adiecto diutius coquere primum argenti spumam: deinde his iniectam æruginem, squamam, & æs: etenim vbi diutius coquuntur, duplicem in huiusmodi vlceribus potentiam consequuntur, quippe magis siccant, & minus mordent. Itaq; de alijs simplicibus pharmacis, quæ in proposito emplastro Crito percensuit, satis mihi dictum est. Ladani autem sermonem vitæui, q̄ etiam solum ex vino tritum vlceribus ægrè ad cicatricem venientibus conducit, non quia vini potentiam requirit, sed quia durius est, quàm vt emplastro conueniat: sed si oleo admisto id coquas, pharmaci vim obtundas: adeo autem validum non est, vt obtundi desideret, quemadmodum ærugo, vel chalcitis, vel squama, vel tale quippiam, & propter id mollius. Est autē tale recens: nam vlceribus difficulter cicatricem ducētibz accommodatissimum est. In Cypro igitur, vbi plurimum nascitur, medicus quidam recens adhuc & molle, id genus vlceribus ipsum molliens imponebat: q̄ si paulum induruisse, ex myrteo emolliebat: huius inopia ex cyprino, vel rosaceo. Aliud autem medicamentum non multo post hoc in quarto volumine Crito hisce verbis conscripsit. *¶ Pharmacum ex Chamæleonte, facit ad eadem, quæ Tyria. Inducit egregiè Cicatricem vlceribus curatu difficilibz, callosis, & veteribus. Medetur itidem ani Rhagadiis, Condylomatibus, & Duritijs.* Argenti spumæ minā, ceræ minæ dimidiū, æruginis minæ partē quartā, chamæleontis octauā, olei minam. Oleum & argenti spumam incoquito, rudicula mouens, donec crassitudinem accipiat, & fiat melinum: quod vbi feceris, æruginē inspergito: deinde ceram diligenter liquatam adijcito: & ab igne sublato chamæleontē indito: cū in vnitatem coierint, in mortariū fundito, ibi q̄ subactum excipito. Hoc medicamen vice ladanī, chamæleontem eiusdem sanē virtutis accepit: ambo namq; vlceribus vix sanabilibus cicatricē inducunt. Differunt tñ, q̄ illud æs combustum habeat, minimè verò cerā: hoc ceram quidem, sed Cæs non contineat. Atq; hic rectè auctor fecit, qui in illo ceræ loco ladanum ad siccorum medicaminū vnitatem faciendam vsurpauerit: hic verò nihil tale habens ceram miscuit, quæ sanè remollit mediocriter, non tamen cicatricem generat: potuisset autē & hic plus olei infundere, sicut vetus, vel ricininum. Ego verò huiusmodi pharmacis lentiscinum quoq; iniicio, quod plurimum facultatum est particeps: siquidem emollit non nihil, digerit, & adstringit: quibus omnibus difficilia cicatrici obducendæ vlcera cum oris induratis indigent.

Quæ Medicamenta prodiderit Heraclides.

CAP. 7.

O Pportunum iam est etiam pharmacorum ab Heraclide Tarentino in tertio libro ad Alistydamantem scriptorum meminisse. Vir namq; fide dignus est, si quisquam alius, qui sola experimentis suis probata commemoret. Is igitur vir hunc in modum conscripsit ad verbum.

¶ Aduersus Vlcera vetera. Squamæ pars vna, æruginis rasa partes quatuor, cerati myrteī partibus octo excipiuntur. Heraclides itaq; tanquā medicis cōmentariū scribens adiecit, Cerato myrteo excipito. Sunt autem pleriq; huius tempestatis tam audaces, vt priusq; à præceptoribus habitum quendam medicum acquisierint, huiusmodi libris confidentes, optimis pharmacis citra methodum vtantur, ideo q̄ frequenter de prospero successu frustrentur. Iam verò myrteī cerati plus minusve adijcientem, nunc humidiorē & molliorē medicamento, nunc duriorē & sicciorē, vti licet: in primo quidem vsu latiorē coniectura, sicut dictum est, in secundo propius accedente. Nam vlcus intuentes, si minus quā par est exiccatum sit, vehementius pharmacum reddemus, vt magis siccet: sin plus ac conuenit, mollius ipsum copiosioris myrteī cerati mistura faciemus: quia metallicorum vis non solum ab hoc, sed etiam quouis cerato resoluitur. Ab hoc cū deinceps scripsisset, *Alia*, inaudire autē videlicet oportet Virtus ista subiunxit: *¶ Squamæ læuigatæ acetum affundito, ac sub canicula læuigato, mellis spissitudinem faciens, vel incoquito: postquam siccum fuerit, in puluerem redactum, cerati partes octo misceto: ac vtitor ad recentia vulnera, & vetera vlcera, & rasa, & attritus, & perniones non nimis vlcerosos.* Hæc vobis de hoc pharmaco sunt intelligenda. Ad alia quidem, mediocriter octo partes cerati squamæ adieceris: ad vetera nimium, hoc est curatu difficilia, si partes sex aut quinque illius apponas, nihil peccabis: valentioribus. n. indigent. Inde hanc de medicamento narrationē sic scripsit Heraclides dicens: Potes insuper squama super ignem reliccata vti. Illius autem sermo innuit, si alio quopiam tempore medicamentum conficiamus, loco caloris ex Sole, igne vtendum esse: quanquā huiusmodi omnia æstiuo Sole meliora fiant multis diebus trita, quædam ex vino, quædā ex aceto. Subtiliora igitur fiunt, quæ ex aceto læuigantur: atq; ob id melius detrahunt, attenuant, siccant q̄: verum ad cicatrices ducen-

Quinta Classis.

h h h h

das

das ex vino trita meliora. In usu sunt hæc prius exiccatis, deinde prepurgatis vlceribus, quæ cicatricem egrè recipiunt. Siccabuntur itaq; ijs quæ validè siccant, purgabuntur per detergentia, cicatricem ducunt adstringentibus. *Aliud.* Deinceps aliud pharmacum scripsit Heraclides, eiusdem quidem materiæ, sed non validum, quia argenti spumæ multum cum diphryge mistum est. Etenim argenti spumæ trigintaquinque denarios, diphrygis octo, in id coniiciendas esse consulit: atq; hæc cerato excipit, quod ceræ denarios quadraginta, olei tres heminas, capiat. Ego subinde usus sum solo diphryge cum tali cerato, non quidem ad phagedenica, & chironia, & putrida (multum enim virtute abest ab ijs, quæ talia curant) sed ad illa quæ citra magnam malignitatem ægrè cicatricem ducunt. Quare si & argenti spumam ipsi admisceas, eam q; copiosam, medicamen reddes imbecillum. Post hoc, aliud ad eadem ita scriptum est. C Ceræ denariū pōdo duodecim, resinæ terebinthinæ denariū pondo trium, squamæ denariū pondo quatuor, ladanū denariū pondo quatuor, bituminis denariū pondo trium. Ladanum & squama separatim teruntur, deinde alia liquefacta ex myrteo oleo miscentur: quod si molle ladanū fuerit, liquefacito. Hac scriptura palam indicauit Heraclides ladanum durum mortario solum ipsum esse læuigandum, humidum simul & molle super ignem liquandum, vel solum, vel cum oleo modico: quod me non modicè in hoc, verum in gutta ammoniaci quoq; perpetuo facientē vidistis. Est verò &, quod post hoc sequitur, medicamentū à Tarentino cōscriptum ad eadem, hac symmetria cōpositum. C Chalcitidis denariū pondo viginti quinque, cadmiæ denariū pondo duodecim & s. Scorsum teruntur: vinum {originale, quod Græcis dicitur,} aparachytō, miscetur: vbi efferbuerint, superfunditur, vt hæc modicè irrigentur: postea læuigantur, donec siccescant: Ad hæc liquatorum ceræ denariorū quinquaginta, resinæ terebinthinæ denariorum triginta, myrtei heminæ partis octauæ, cerato è siccis confecto denarij viginti miscentur. Hoc quoq; medicamentum nihil habet ex ijs, quæ malthacode hoc est mollicina, nominauimus: verum in mitione ad ceratum, qui exercitatus est methodis rationalibus à me propositis, is conuenientem in singulis vlceribus mitionis quātitatem cōmodè faciet. Pulchrè autem vinum aparachyton hoc est cui marina non addita est, calidū chalcitidi & cadmiæ affundit, vt qui chalcitidis acrimoniam caloris ipsius beneficio auferre studeat.

Aliud huic proximum in ligne pharmacū scriptum est, ex tot & talibus simplicibus cōpositū. C Squamæ stomomatis denarij quatuor: æruginis rasæ denariū pondo duū, in quibusdam exemplaribus scriptum est denarij pondo vnius: chryfocollæ denariū pondo quīdecim: ceræ denariū pondo xxv, in quibusdam verò exemplaribus nec ceram nec æruginem inuenimus. Læuigatis alijs ceram cum resina modica liquefacito, ne pharmacum dure scat: vbi commiscueris, vtitor: de- G super autem spongiā aceto expressam imposito. Demetrius Bithynus aiebat ipsam chryfocollam solam calente admodum cera exceptam se vsurpare. Ostendit item Heraclides hoc in medicamine resinam non primo usu eiusmodi pharmacis misceri, sed vt lentorem quandam ad emplastrī spissitudinem conciliandam ipsis exhibeat, præsertim cum cera nec natura pinguis, nec recens, sed dura atq; arida fuerit: & quidem stomomatis squama præterquā quod adstringendi vim habet, etiam validè exsiccat. Demetrium autem Bithynum dixit chryfocolla sola cera excepta vti, quod nimirum rectè faciēs Demetrius in hunc modum vsurpauit: quemadmodum ego quoq; sepe non chryfocollam duntaxat, sed alia quoq; singula ipsa per se molli cera resoluens ad huiusmodi vtor. Nemini verò dubium est me alia singula dixisse, nimirum ea, quæ id genus vlceribus prodesse supra recensui: & tēre in singulis, quæ curo, ægrè sanabilibus vlceribus talia medicamenta cum cera componentem. Interdum enim chryfocollam cera excipio, non nunquam æs combustum, vel squamam, eam q; vel stomomatis, vel ferri, vel æris: interim æruginem viuam, vel combustam, sicut etiam misy & chalcitidem. Aliquando ex austeris aliquid miscemus, quorum supra meminimus, quoties id quod influit, repellere conamur: ex quorum numero est alumen, malicorium, galla, cytini, balaustium, alia q; his similia. Itaq; fide mihi adhibita nullum hæcenus cōmemoratum medicamen repudiandum esse, exercete vsus eorum methodum, qua voti compotes fiatis, quemadmodum ego. Cæterū cum alia quoq; duo haudquaquā contemnenda medicamina deinceps à Tarentino scripta sint, non ab re mihi visum est ea quoq; addidisse. Eorum itaque prius sic tradidit. C Squamæ denariū pondo quatuor, manne denariū pōdo quatuor, aluminis scissi denariū pondo duū, misyos denariū pondo duū: trita ex aceto in pastillos digerito, quin singuli pendant denarios duos, & reponito. Cum vsus poscet, ceræ denariū pondo quatuor, resinæ pityinæ denariū pondo duū, seui taurini denariū pondo quatuor: liquata refrigerare sinito, pistillo q; misceto: vtitor ad vulnera tanquā glutinatorio, & quod inflammationem arceat. Hæc quidem Tarentinus. Nos verò sic tēperato ad vlcerā cōmodè vsurpari dicimus, verum ad cacoethe tale ceratum miscendum non est, quippe cera sola, veluti in prioribus declaratum est, hīc sufficit. Ac si ex mollicinis quippiam miscere oportebit, id exiguum myrteum, vel cyprinum, vel rosaceum esto. Nihil item lædes, si resinam laricem appellatam adiungas: nec si terebinthinam, quæ licet minus idonea sit aduersus hoc genus vlcerā, non tamen reiicienda est. Alias vero resinas nisi prædictarum magna sit inopia, miscere non oportet. Sic de seuo intelligendum venit: neque enim hoc apponere debemus, nisi vlceris oras emollire cupiamus. Porro q; taurinum pingue inter

* Aliter vnius & s.

* Aliter xxv.

* Αλετὰ δ' αὖ
i. extendere.

* Aliter xl.

A inter alia omnia, quæ mansuetorum animantium sunt, maximè siccet, non semel audiuiſtis: quippe superat ipsum subtilitate, tum leonis, tum pardī, tum hyænæ adeps. Potius igitur est, ubi adipē miscere oportet, anserinum indere, vel magis anserum in pascuis degētium, satis enim est tenuis, & mitigans. Iā cum adhuc restet medicamentum superiori proximum, in quo disciplinæ principium fecit, ita fatus Heraclides, Ipoterion quasi dicas expressioſum, præsertim ad teneros: quoniam alterius tum materiæ, tum virtutis, quam diximus conuenire ijs, qui valida medicamenta nō sustinent, sed mordentur, exagitantur, & fluxionem acquirunt: sermonem de eo differemus, cum de id genus medicamenti agemus, exponendum. Nunc ad similia præscriptis descendam, tantū insuper de ijs apponens, quod etiam altero libro, quem Stratiotem hoc est militem, Heraclides inscripsit, eadem pharmaca repetijt, in tertio sibi ipsi duntaxat dissentiens. Hic enim simpliciter scripsit, ceræ denariū pondo quadraginta. verū in Stratiote, appositum est, alij denarium pondo sedecim. atq; hoc rectius est, quia multa ceræ mistura medicamenti vim minuit. Præterea in libris quos ad Antiochidem scripsit, horum ipsorum medicaminum meminit Heraclides, atque in primis primi, quemadmodum in his, ita in illis quoq; commentatus. *Ad nimis quā Inueterata & Callosa hoc Veteris.* Squamæ parte vna, æruginis in quibusdam exemplaribus punctis distinctum. Δ . **B** scriptum est: in alijs lineam superscriptam habet oblongam Δ , vt vel quatuor partes, vel vnus quartam partem significet. Idem in prædictis exemplaribus variè ipsum scriptum inueni. Quare in hoc quoq; utilitas propositi operis est, vt pharmacorum differentias possis pernoscere, nam solus ipsis rectè vti possis. Hoc igitur ipsum medicamen quod propositum est, si quatuor æruginis portiones capiat, admodum acre futurum est. At si quartam æruginis partē iniicias vni squamæ portiunculæ, mediocri pharmacum habebis, puta ad maligna: potissimum q̄ si non ex sola cera, sed cerato ipsas temperes. Prædiximus ceram, & mollem & nouam esse oportere: si talis nō sit, apud ignem paratum, calefaciendam, vel in Sole, & cum myrtei pauxillo emolliendam: ita q̄ æruginem & squamam ei commiscendam. Ostendimus quoq; in huius commentarij principio optimum hoc esse pharmacum, ex squama & æruginē confectum, si cera quadrupla adiecta sit. Atque ob id frequenter ipso vtor, cum æris combusti æquali pondere, plurimum admisto. Apposuit autem medicaminis huius vsui in libro, quem ad Antiochidem Tarentinus ædidit, ea quæ suis commentarijs supra nominatis omisit. Vniuersam igitur ipsius seriem orationis adducam: habet autem in hunc modum. *Ad Vetera quidem admodum & Callosa hoc Veteris.* Squamæ parte vna, æruginis quarta: hæc læuigata, myrteo cerato duro, quod octo partes contineat, excipiuntur, **C** vsui quæ sunt, sed prius aqua frigida vlcus eluitur. Apposuit præterea elui oportere vlcus aqua frigida. Modò producam quæ ex Andromachi pharmacis eadem promittentibus omiserā. Antea namq; emplastra duntaxat retuli: quæ verò medicamenta ex pastillis præparata, ceratis admistis dum vsus postulat, agrè sanabiliū vlcum epulotica hoc est ad cicatricem ducendam apta, esse dicit, vel quæ sicca insperguntur, ea in præsentiarum subiungam, ab illo quod inter arida iuxta finem scribitur, exorsus.

Sicca Andromachi. Aristum Cicatricem ducens.

CAP. 8.

O ssum combusti denariū pondo duū, mannæ denarij pondo vnus: cadmiæ obolorum pondo quatuor, aliās denariū pondo quatuor. Tritis vitor etiā ad nomas. *Aliud aridum, ad idem.* Piceæ corticis denariū pondo sex, aristolochiæ, denariū pondo sex, pumicis denariū pondo quatuor, resinæ siccæ denariū pondo quatuor, mannæ denariū pondo sex, clarum est, colophoniam ipsum dicere: iridis illyricæ denariū pondo duū. Leuigatis vitor. *Aliud Cicatricem ducens, etiam malignis.* Piceæ corticis denariū pondo sex, cornu ceruini combusti denariū pondo quatuor, cadmiæ denariū pondo octodecim, mannæ denariū pondo quatuor, æruginis rase denariū pondo duū. Tritis vitor. *Aliud.* Gallæ denariū pondo quatuor, cerussæ denariū pondo octo, myrti denariū pondo quatuor, spumæ argenti denariū pondo octo, retrimenti plumbi denariū pondo quatuor. Tritis vitor. Horū quatuor medicaminum, primū simplex est admodum, sine morſu siccans, obscuræ adstrictionis particeps. Secundum ob piceæ corticem adiectum, sensibilem adstringendi potentiam obtinet, qualem habere conuenit ea, quæ cicatricem probè ductura sunt. Tertium non modò corticem piceæ sed æruginem quoq; capiēs, ijs conducit, quæ sordiciem faciliè vlceraſis adnascentem fouent: quippe sordes ipsorum tollit, & cicatricem non impedit. Quartum loco piceæ corticis, myrtum habet, alia q̄ citra mordacitatem exiccantia. Post hæc, ubi alia tria arida scripserit, quartum ita ad verbum subdit. *Aliud Aridum ad Excrescentia, Cicatricem ducens sine morſu, vt Harpocras.* Sandarachæ, chryfocollæ, arsenici, pares singulorum portiones. Facit & ad maligniora. Hoc pharmacum nihil cum prioribus similitudinis habet, sed vlcibus propter nimiam humiditatem carne excrescentibus conuenit, vt quæ etiā repurget. Nam talis potentia est sandaracha, & arsenicum, quibus vnum ex ijs, quæ mirificè maligna iuuant adiectum est, nempe chryfocolla.

* Al. ostreorū.

* Al. cerussæ.

Quæ adscripserit Archigenes.

CAP. 9.

Quæ Archigenes de id genus vlcibus in secundo medicamentorum libro scripsit, sic ex illius dictione ad verbum sonāt. *De Vlcibus quibus callus obducere non potest, & Vlcibus.* Quinta Classis. h h h h h ij Vlcera

Vlcera vetera ita cicatricem ducent, communi quodam expurgatis oleum vetustissimum cum E linamentis imponitur. Vel ergo rafa cum cerato rosaceo, quod paulum resinæ habeat, excepta imponitur. Item squamæ aris rubri quâ plurimum cerato myrteo exceptû, vsurpatur. Vel amyli eloti partes tres, seu vitulini partes tres, ceræ tyrrhenicæ pars vna: liquatis quæ liquari possunt, amyllum miscetur, & vsui est. Vel diphrygis & squamæ aris, singulorum denariû pondo quatuor: manna denariû pondo octo: ex aceto probè læuigentur, dum mellis spissitudo fiat: ceram denarijs trigintaduobus cum olei hemina & s liquefactam superfundito, ac vnita vitior. Linamēto excipito vel paucius oleum, & splenion facito. Vel chalcitidis, cerussæ, parem mensuram: salis communis duplam: argenti spumæ portionem duplo, quàm salis, maiorem: vino oleo q; alternis læuigans, vt liparo hoc est pingui, medicamento vitior. Vel argenti spumæ, cerussæ, diphrygis, æquale pondus: calcis viua duplum, cum myrteo cerato vsurpato. Vel diphryges, squamam, gallam, pari mensura: æruginem dimidia, cum cerato myrteo: non nulli & pitynam resinam admiscunt. Vel cucumeris agrestis radicem inspergito: desuper verò linamentum filatim excerptum ex frigida repurgat, & cicatricem obducit. *Ad Vlcera in quocunq; corporis loco, quæ cicatricem egre ducunt.* Erylimi semine læuigato, misto q; dum sordium habeat speciem, splenij modo unpolito, celerrimè vlcera ad cicatricem perueniunt, vel maligna. *Aliud, Cicatricem inducens senilibus.* Ad senilia retrimēto plumbi cum myrteo cerato vitior: si vetustum ipsum cupias, adipem porcinum addito. Quæ nigricant vlcera, † prius pane hordeaceo fouebis, & pani cocto butyrû & cerussam pari pondere diligenter in vnitatem rediges, & vteris.

† Aliter ubi prius panibus fouebis hordeaceis nuper coctis.

De Putridis & Nomis.

CAP. 10.

Putridis & nomis crui farinam, alumen liquidum, panis similaginei internam micam, porci veteris vel alterius carnem salam vetustam illotam, terebinthinam liquidam, mel optimum, pari mēsurā: imposito omnia læuigata. Vel aristolochiæ ac cicinorum foliorum succi æquales partes, æruginis dimidiam ex aqua, sed mellis spissitudine illinito, paululum partis incolumis apprehendens. Si crusta non decidat, elaterij, æruginis, parem modum adijcito. Bene facit ad putredines, fori tritum crassius inspersum, & supra siccum linamentum conceptum. Vel aristolochiā rotundam, & gallam, equali pōdere ex oleo circumline. Vel cucumeris agrestis radicem, vel brassicæ, vel betæ, vellapathi, folijs illigatam, calido cinere recondito. Cum autem emollita fuerit, contritam imposito: validè purgat. Vel summos germinantis oleæ surculos in vino coctos cum melle aspergito: vel chalcitidem inspergito, desuper verò panniculos siccis filatim excerptos accommodato. Elaterium, vel lini semen tritum cum chalcantio imposito. Vel thymo, & staphide agrestis aut sativa, cum ficis coctis aspergito. Vel ficulneis folijs in puluerem redactis cum melle. Vel nitrum cum cumino. Et farinam cum melle. Vel ficus agrestis radicem cum melle. Vel squilla coctæ ex melle. Vel veratri cum melle. Faciunt itidem hæc ad phagedenas, nigritias, & nomas. Vel foreos denariû pondo duodecim, chalcitidis denariû pondo decem, mistos denariû pondo quatuor, cum aceto acerrimo tribus cyathis conterito donec inarescant, & excipito: vtere verò specillum ex eis tingens, atq; in vlcus deuoluēs: deinde linteolum simplex ex ceneleo madens superimposito. Quod si phlegmone adest, alterci semen quod hyoscyamon dicitur, cum polenta, vel brassicam cum melle, inspergito. Quibus autē vermes adsunt, cerussam & poliū equali pondere cum pice liquida inungito.

De Vlcerebus Cancrosis.

CAP. 11.

Cancrosis & malignis vlcerebus canceri fluuiatilis combusti, cadmiæ, pares portiones tritas inspergito. Aut cinerem cancrorum cum cerato imposito. Aut erylimi semen læuissimum ex melle seculentum faciens, splenij modo imposito. Summè facit ad chironia, & vetusta, & cicatricem egre ducentia: item ad contumaces & malignas nigritias tibiæ, & quæ in mammillis sunt: strumas, ac parotidas extrahit, si inspergas seu bubuli pondo libras tres (vt quidam aiunt, H quinque) terebinthinæ pondo vncias quinque, manne pondo semunciam, terre fardæ dictæ, qua tinctiores vtuntur, pondo vncias quinque: quæ liquari possunt, aridis misceto, ac in vnū coactis vitior. Aut lentem coctam cum melle, aut oleæ virentis surculos, aut vtrunq; inspergito.

De Vlcerebus Callosis.

CAP. 12.

In ijs quæ callum contraxerunt, & pretumidas oras ac duras habent, dulcia q; vocantur vlcera, communiter quidem per experientiam bene facient vrentia, propriè verò litrum torrefactum. Calcem viuam cum vrina pueri incorrupti circūlinito: aut æruginem, thus, salem, mel inungito.

De Emplastris, quæ Asclepiades ad Huiusmodi Vlcera conscripsit.

CAP. 13.

Prastantissima de id genus vlcerebus Asclepiades tradidit cognomento Pharmacion. Cū. n. vnum sit omnibus iplis cōmune, nempe vt difficulter ad cicatricem veniant: quedā, q; malè curantur, vel molliuscule victu à medico reguntur, cicatricem non ducunt, nullam de se malignitatem habentia: quedam verò suo vitio egre sanantur, vel q; prauis humores iplis influant, vel q; exulcerata pars talem iam affectum habuerit, vt quauis probus qui influat sanguis existat, ipsum corripat. Asclepiades igitur eiusmodi vlcera tribus distinguēs generibus, de singulis propriū sermonem instituit, quæ ego quoque illius verbis deinceps adscribam, enarrans decernens q; i

ambiguitas

Al 4. f. 3. r. 2. c
18. fol. 460. c

Ambiguitas quæpiam in sermone appareat. Itaq; de primo horum vlcerum ac medicaminum genere ita Asclepiades ad verbum differit. *¶ Vbi callum partes contraxerint, & ægræ ad cicatricem veniunt, confecturus infra positus vrendum est. Andreæ Emplastrum, omnem Excrecentiam regimient, Item Vlcibus cruentis ac Vulnibus conuenit, Inflammationem arce, facit ad Pustula, Sinus unguit. Valet ad Vlcera fluentia, diuturna, & quæ difficulter cicatricem admittunt.* Argenti spumæ pondo tria squamæ aris, chalcitidis, æruginis rasæ, singulorum vncias tres: aceti heminam, olei veteris pondo libras octo. Preparatur, sicut prædictum est. *¶ Asteris Medicamentum ad idem accommodatum. Probe autem cicatricem digne.*

Argenti spumæ pondo libram, olei veteris pondo libras duas s, æruginis pondo vnciam, chalcitidis pondo vnciam, squamæ rubræ pondo vnciam vnam, aceti heminam. *¶ Amphionis ad idem.*

Argenti spumæ pondo libras duas, olei veteris pondo libras quatuor, chalcitidis pondo vncias nouem, squamæ aris denarium pondo quatuor, aceti heminam: conficito in eundem modum.

¶ Turpilliani quod philosophorum dicitur. Facit ad Vlcera fluida, & diuturna, ægre q; Cicatricem sumunt: ossa corrupta reducit. Argenti spumæ pondo libras tres, olei veteris sextarios tres, chalcitidis pondo libras ij s, æris squamæ denarium pondo xxv, aceti heminam. Argenti spumam & oleū vsq; ad consistentiam incoquito: deinde squamam læuissimam factā adijcito, assidue mouens: ac cum bene **B** habet, chalcitidem ex aceto tritam paulatim medicamento aliquatenus refrigerato immittito: de inde ponēs supra ignem rursus incoquito, vsq; dum non coinquinet: cū in pilam demissum rursus contuderis ac subegeris, excipito, & ad supradicta vitia vitior. *¶ Isis vocatum Emplastrum giliuum, ad Fluentia, Diuturna, Maligna valet, ac Vix curabilia, maxime in partibus extremis. Conficiendum est mollius ac tenerius, densatur enim repositum, & siccius euadit. Ita habet.* Argenti spumæ denarium pondo cētum, minij sinopici denariū pondo octo: diphrygis, ceræ, chalcitidis cōbustæ, singulorum vnciā, in alio exēplari, singulorum pondo denarium quatuor: chalcitidis crudæ denarium pondo duū, olei heminas duas. Argenti spuma & oleū coquuntur, dū iterū ac tertio efferuescant: hoc facto, aquæ modicū digitis insullat: mox diphryges, chalcitis tosta lauis facta inspergit, sub manuaquā insullando, donec non amplius medicamen inter coquendum strepat: vbi constiterit, ceram indito. Adhuc autem chalcitis cruda, & minium, ex oleo modico contrita: cū bene habet pharmacū, hæc immittito, continuē mouens: cum recte se habet, in pilam conficito, ac rursus tundito, subigito q; excipiens vitior. *¶ Aliud Scribonij Largi Pharmacum accommodatum. Ceræ denarium pondo cētum, argenti spumæ denariū pondo quinquaginta, olei myrtei heminā vnā: misyos combusti, chalcitidis vstæ, aluminis scissi vsti, cerulle, resinæ terebinthinæ, singulorum denarium pondo xij:*

Componitur eodem modo. *¶ Aliud, Compescit in oculis Staphylo mata, valet ad Vlcera curatu difficilia.* Minij sinopici denarium pondo xv, argenti spumæ denarium pondo cētum, ceræ denarium pondo quadraginta, pūyinx denarium pondo xx, chalcitidis denarium pondo xxx, salis ammoniaci denarium pondo vnus, thuris denarij pondo vnus, olei heminam. Preparato, quo dixi, modo.

¶ Aliud, ut Aphrodisi. Facit item ad Condylomata, & Rhagadas cutumaces. Argenti spumæ denariū pondo quadraginta octo, terebinthinæ denarium pondo xxviij: misyos tosti, chalcitidis toste, singulorum denarium pondo octo: minij sinopici, chalcathi, singulorum denariū pondo quatuor: olei veteris heminam, aquæ heminam, ceræ denariū pondo quadraginta: ricini pondo libram, alij cyathi dimidium: sicca ex aqua laeuigantur. Atq; de his hæc tenus.

De Secundo Vix curabilium Vlcum genere, de quibus Asclepiades hoc modo scripsit ad verbum.

¶ Ad Fluentia Vlcera, & curatu Difficilia confecturus infra scriptus vrendur. Medicamentum ex Chamæleon re, quo vsus est Philoxenus ad Fluentia & ægrè curabilia Vlcera. Argenti spumæ pondo librā, olei veteris pondo libras duas, chamæleontis radicis pondo trientem, aristolochiæ pondo trientē, chalbani pondo vncias duas, gallæ pondo vncias duas, thuris pondo vncias duas: cōficito, sicut prius.

¶ Aliud, quod Thebano adscribitur. Argenti spumæ pondo libram, olei veteris sextarium vnum, **D** chalcanthi denariū pondo vigintiquatuor, chamæleontis denariū pondo xij, aristolochiæ tantundem, chalbani denariū pondo octo, thuris denariū pondo octo: composito similiter.

¶ Aliud ex Arundinibus, ad Fluentia, & Chronia Vlcera, item ad cuiuslibet Serpentis vltum. Argenti spumæ pondo libram, olei veteris pondo libras duas: chamæleontis nigri radicis, aristolochiæ, gal larum immaturarum, singulorum pondo denariū quatuor: chalbani, guttæ ammoniaci, thuris, singulorum pondo vncias ij: prepara mouens radicibus arundinū viridiū. *¶ Aliud Casti nominatum Gangrenicum, Pharmacum accommodatum.* Argenti spumæ denariū pondo centumviginti, olei sextarios duos & dimidium, chamæleontis nigri radicis denariū pondo sedecim, aceti sextarios duos & dimidium, æruginis denariū pondo octo, piceæ corticis denariū pondo octo, myrrhæ denariū pondo quatuor: preparato sicut prius.

¶ Nigrum ex Pyrae lapide vocatum, quod ad Dæmonicum refertur. Valet ad Fluentia, Difficilia curatu, & Phagedænica Vlcera. Facit item ad Fistulas impostum, emollit que omnem Duritiā. Argenti spumæ, bituminis, singulorum denariū pondo centum: picis, ceræ, singulorum denariū pondo octo: pyritis, terebinthinæ, vtriūsq; denariū pondo xxv: propolis, aluminis scissi, singulorum denariū pondo quindecim: ammoniaci thymiamatis drach. xij: chalbani, aloes, vtriūsq; drach. viij: æruginis, māng, vtriūsq; drac. v: olei veteris sextarios duos. Argenti spuma cum oleo incoquitur, donec coierint: mox bitumen, pix, cera, resina,

Quinta Classis. h h h h h iij propolis,

Aliter l.

Aliter xx.

Aliter l.

propolis inijcitur: quibus liquefactis refrigeratis q̄ ærugo & lapis pyrites immittitur, deinde ammoniacum: cum cacabus ab igne sublatus modicè refrigerit, alumen, chalbanum, manna q̄ inditur: & mediocriter cocta in frigidam demittuntur, ac diem noctem q̄ linuntur. Subactis vitior.

¶ *Aliud. Facit ad Curatu difficilia.* Picis, ceræ, pyritæ, singulorum pondo denariū duodecim: guttæ ammoniaci denariū pondo decem, bituminis denariū pondo quinquaginta, argenti spumę denariū pondo quadraginta, propolis denariū pondo octo, scissilis denariū pondo quinq̄, æruginis denariū pondo duū, olei sextarium. ¶ *Aliud Nigrum ex Salicibus ad idem.* Misyos peregrini, aluminis rotundi, chalcitidis, cretæ sutoriæ quæ melanteria Græcis dī, æruginis rasæ, aluminis scissilis, gallarum immaturarum, cerullæ, singulorum pondo selibram: ceræ, resinæ siccæ, picis brutiæ, bituminis, singulorum pondo libras duas: aceti acris sextarij dimidium, olei omphacini pondo libras duas, salicis furculorum tenerorum foliorum pondo libras duas. Folia salicis in acetum mittito, igni q̄ supraposita coquito mouens sine requie, dum tertia liquoris pars relicta fuerit: sicca verò tundito, & cribro tenuissimo secernito: deinde in mortarium coniecta his humorem expressum adijcito, terito q̄ diligenter, tanq̄ cephalica medicamina. Quæ autē liquefieri possunt, vsq̄ dum non coinquinent, coquito: posteaq̄ refrigerata raseris, læuigatis immisceto: ac in pilam coniecta excipiens vitior. ¶ *Indum Tharseti Chirurgi, ad eadem.* Cerę, resinæ frictę, picis arida, bituminis liquidi zacynthij, singulorum pondo libras duas: cerullæ, æruginis, chalcitidis, misyos peregrini, melanteriæ, aluminis & scissilis & rotundi, gallæ omphacitidis hoc est immaturæ, malicorij, thuris, singulorum pondo selibram: aceti, quantum sufficit. Quæ liquantur eò spissitudinis, vt non inquinent, coquito: sicca tundito, tenuissimo cribro cernito, aceto perfundito, & liquabilibus excipito. ¶ *Aliud Cyzicenum. Facit ad Diuturnos affectus, & Nervos præcisos.* Thuris quā optimi, ceræ, myrrhæ, aristolochiæ, chalcitidis, illyricæ, chalbanī, singulorū pondo denariū quatuor: terebinthinæ, argenti spumę, singulorum denariū pondo octo: olei heminam. Oia in vas æreum conijcito: super cinerem molliusculum coquito mouens, donec in frigidam descendens mellis habeat spissitudinem: deinde tollito mouens. Hoc in pelliculam illitum imponito, & soluito hyeme post septimū diem, æstate à quinto. ¶ *Aliud ex collectaneis Philoxeni.* Thuris, myrrhæ, croci, illyricæ, bdellij, squamæ æris, {chalcanthi,} chalcitidis, aluminis rotundi, & fissi, misyos peregrini, guttæ ammoniaci, propolis, visci quercini, opopanacis, malicorij inclusi, singulorū denariū pondo iij: aristolochiæ denariū pondo octo: ceræ denariū pondo centum, quod minā inscribit: seui taurini denariū pondo centum: resinæ terebinthinæ denariū pōdo lxxv, quod græcè triatettara nuncupat. Resina in ollam fictilem nouam coniecta coquatur, donec odorem G amittat: deinde seuū & cera purgata adijciantur, liquentur q̄: sicca tundantur, & tenuissimo cribro incernantur. Deinde ab igne deposita, quæ liquefacta sunt, aliquandiu refrigerari permittantur: quibus sicca inspergito, curiosè mouens: myrrham verò, thus, bdellium, opopanacem, ex aceto trita ea habere oportet: quibus ea, quæ in olla sunt, immittenda, terenda q̄, ne in grumos ceræ modo coeant. Cum bene habuerit pharmacum, pyxide lignea irino prius illita reponito.

De Tertio genere Vlcera, quæ Vix ad sanitatem perueniunt, Asclepiades hæc ad verbum scripsit.

¶ *Ad Vlcera quæ nequaquam coeunt: aut si coeunt, rursus solvuntur, vel carne corrupta, vel etiam ossibus subiectis labefactis: huiusmodi confecturis vtiendum est.* Ad Chironia, & quæ Difficilem curationem habent, Medicamentum confectum. Squamæ æris, æruginis rasæ, singulorum pondo vnciam, ceræ pondo selibram, resinæ laricis pondo vnciam s. Quæ liquantur, aridis misceto, excipito q̄, ac vitior curiosè subigens, latiusculum ceratum soli affectæ parti inijciens, vt vlcus tantum comprehendat: ambientes verò particulas medicaminē, quod phlegmonen propellit, cicundare oportet: tertio curationis die vlcus soluere, dein fomentis lenire, ipsum q̄ ceratum ablutum emollire, ac rursus imponere, donec cicatrix appareat. ¶ *Aliud accommodatum.* Æruginis, squamæ æris, singulorum pondo vncias duas: diphrygis pondo vnciam vnam, ceræ pondo libram, laricis pondo vncias H tres: præparato, ac vitior, sicut prædictum est. Post hæc de medicamentis, quæ nominantur Cephalica idest capiti accommodata, sic ad verbum Asclepiades tradidit. ¶ *Deileontis Cephalicum ad Diuturna, & quæ difficulter sanantur. Ossa corrupta educit.* Æris squamę, mannę thuris, resinæ siccæ, singulorū denariū pōdo centū: aceti heminas xij. Terito squamam ex aceto, & cum lævis facta fuerit, thus in minutissimum puluerem redactum adijcito, & resinam: pastillos fingito, quos in vmbra desiccabis. In vsu, cum callum auferre conaris, medicamenti partem vnam, cerati ex rosaceo confecti æqualem sumito. In alijs verò sit medicamenti portio vna, cerati partes tres vel quatuor: nam temperamentum subiectis affectibus conuenire oportet. ¶ *Cephalicum Melanchloron idest ex nigro viride, quo vsus est Tryphon Archæus. Facit ad Diuturna, & Vix sanabilia. Ossa corrupta reducit.* Æris squamæ pondo denariū xij: mannæ thuris, guttæ ammoniaci, resinæ pitynię siccę, seui vitulini curati, resinę terebinthinę, singulorum pondo denariū sedecim: cerę, olei, vtriusq̄ quartam minā partem: aceti heminam: conficito ad modum prædictum. ¶ *Philotæ Cephalicum, ad Diuturna, Difficilia q̄ sanatu. Ossa corrupta reducit, & Callos consumit.* Terre erethriadis denariū pondo centum, æris squamæ denariū pondo quinquaginta, ichthyocolle denariū pōdo xxv, aceti heminas duodecim, Ichthyocollam minutim cōtulam in vas vitreum conijcere oportet, acetum affundere,

* In impressis
græcæ legitur
mau, in antiq̄s
p225.

* Alit. nino.

Adere, vt irrigetur, dissolutam medicamini præparato immittere: vbi miscuerimus, pastillos efformare: vsus indicatus est. *¶ Dionysii Samii.* Terræ crethriadis pondo minam, eris squamæ pondo minæ dimidium, ichthyocollæ quartā partē, thuris octauam, aruginis rasæ octauā, myrrhæ decimā sextā, acetī cōgios duos. Cōponito sub cōstu caniculæ, in Sole oia cū aceto simul terēs: ichthyocollā verò tenuē faciens aceto modico in vase vitreo imbuto: deinde cum miscueris ijs, quæ sunt in mortario, pastillos fingito quatuor singulos denariorū, quosdā octo, & desiccato. Vbi vtendum erit, medicamenti partem vnā cū tribus cerati ex rosaceo confecti sumito, splenis lanam succidā aceto madentem superdato, fistulis pharmaci partem vnā, cerati rosacei duas, collyria faciens imponito. *¶ Emplastrum Diabutanon hoc est ex herbis, vt Lucius præceptor conficiebat.* Anagallidis flore coeruleo denariū pondo quinquaginta sex, papaueris agrestis denarium pondo quinquaginta sex: hyoscyami viridis foliorū, & porrorum viridium, singulorum denariū pondo quinquaginta sex: squamæ eris denariū pondo xxv, manne denariū pondo xx, resinę pityinę liccę denariū pondo sedecim, aloes denariū pondo sex, aluminis scissilis denariū pondo quatuor, rotundi tantundem, salis ammoniaci denariū pondo quatuor, cerę pondo minam, olei veteris heminas duas, acetī quantum satis est. Herbis diligenter contusis, aceto q̄ solutis, humorem ad medicamentū ti confecturam exprimito. *¶ Iſis Cephalica id est capiti accommodata, ad Chironia, & Curatu difficilia.* Est item Cruentis idoneum, quod Græci enamon appellant. Cerę denariū pondo cētum, resinę colophoniacę denariū pondo ducentū: guttę ammoniaci, squamę eris, thuris combusti, aristolochię tenuis, eruginis, salis ammoniaci, singulorū denariū pōdo octo: chalbani, manne, myrrhę, aloes singulorum pondo denariū xij: aluminis rotundi denariū pondo sex, olei veteris heminam, acetī quantum sufficit. Præparato ac vtitor interim mero, interim diluto medicamine.

De scriptis ab Hera vtilibus Emplastris ad Vix sanabilia Vlcera.

CAP. 14.

Alia sanē quedam emplastra vsus multiplicis tradidit, quę vlceribus quoq; egrē cicatricem ducentibus & malignis esse accommodata affirmat. Vnius verò propriē ad ea sola condūcentis meminit, sic ferē de ipso scribēs ad verbum. *¶ Emplastrum ipsius Hygini ad multa vtile, boni coloris: Facit bene Vlceribus, quæ ad cicatricem egrē perueniūt: item ad Paronychia, quo nullum extat præstātum.*

Argenti spumę chrysitidis pondo minam, cerę pondo minā, chameleontis nigri radici denariū pondo xxxvj, eruginis rasę denariū pondo xvij, chryfocollę denariū pondo xxxx, olei heminas tres. Argenti spumam cum oleo leni igne coquito, donec inferuescere incipiat: deinde cū ab igne deposueris, eruginem inspergito: iterum coquens moueto, quousq; colorē proprium receperit: C mox ceram indito, cū bene medicamentum habet, chryfocollā, & chameleontem: in mortariū dimissis acetū instillato. Valet ad eadē chryfocolla etiam contenta, quanq; & sine hac longē mitigantissimum est, summe q̄ iuuat neruorum punctus, item cū à neruis vel musculis eluere quid oportet. Ac rectē fecit Heras, ad finē sermonis de emplastro, scribens chryfocolla addita nō esse mitigatorium, seu leniens: quippe adstringens aliquid pharmacum hoc continet, at quę ob dolorem videlicet mitigantur, relaxantibus indigēt. Nam in hoc solum accidens mitigari postulat, & subinde mitigantia dolorificum ipsum affectū offendunt. Verū vehementiori malo succurrētes, dolorē primo lenimus, deinde sic ad ea, quæ morbum curare possunt, accedimus. Itaq; Chryfocolla, sicut & prius dictum est, medicamen est ex ijs, quæ ad vlcera vix curabilia mirificē faciunt, quēadmodum pleraq; alia, quæ præterq; q̄ vehementer siccant, et non nihil adstringunt. Porro nullū huiusmodi medicamentum est mitigatorium. Quoniam verò minā, & heminę meminit, spumę argēti minam vnā iniicere præcipiens, olei heminam (dictū nanq; mihi est euā in superioribus commentarijs, non nullos viginti vncijs, quosdam sedecim, minam æstimare, vt heminam alios vncijs nouem, alios duodecim) distinguenda quoque hæc veniunt. Sumetur autem distinctio ab ijs, quæ pharmacum promittit, & metallicorum quantitate. Etenim propter pollicitationem coqui affatim postulat, eo q̄ plus olei accipere: ob metallicorum autem mitionem, quæ non pauca sunt, oleosam humiditatem exigit. Cū igitur nec pingue, nec medullam, nec resinam liquidam capiat, oleum augere ratio est. Itaq; si minam ceu viginti vncijs æstimemus, olei certē tres heminas infundemus, singulas vnciarum xij: sin autem sedecim reputauerimus, olei heminam ceu vnciarum nouem licet immittere. Potest etiam addi, si vncias duodecim pendat, propter coctionē diutius celebrandam: nam id talibus medicamentis est vtilissimum vel metallicorum causa, quorum non mediocris copia existit. Si enim chamæleontis denarios triginta sex adnumeres, eruginis quidem octodecim, chryfocollæ quadraginta denarijs, fient vniuersi nonagintaquatuor, qui & ipsi copiosi olei misturam requirunt, maximē cū ceræ denarios simul centū addi præcipiat, omnino enim vel sic multo oleo erit opus. Hoc igitur emplastrum Heras conscripsit, adfirmans vlceribus ægrē cicatricem contrahentibus ex vsu esse. Alijs verò vsus multiplicis eodem in libro scriptis, post multa ipsorum opera subdidit: *Cicatricem egrē sumentibus, vel Malignis quoque, vel Chironis idonea.* Nam & Aribarzanion ab ipso dictum commendat aduersus maligna, pascentia, & difficilia curatu: Item llim vt gangrænas coercentem. Deinde tertium his verbis aupicatur: *Boni coloris, Cruentis idoneum, Cicatricem inducens.* Quod chironiis simul auxiliari dicit: Insuper quartum, cui nomen indidit, Panacea: ad hæc quintum, Icesiam. De emplastris igitur, vario vsui accommo-

Quinta Classis.

h h h h h iij datis

DE COMPOS. MEDIC.

† Al. denariū
pondo.

dati sequenti libro disputabimus, vbi simul ea quę Heras cōmendauit, adscribentur: Hic autem E quę vix sanabilibus (chironia non nulli vocant) medentur, longo vsu tum à præceptoribus nostris, tum à nobis ipsi explorata: quorū non nulla ab antiquioribus quoq; viris præclaris approbata sunt, quemadmodum & illud, quod in libro, cui titulus est Mantia pharmacopola de re medica, scriptū inuenio. Verba ipsius ita sonant. *¶ Aeruginosum Mantia.* Aeris vsti, † pōdo minas} quatuor, resinę pityinę siccę denariū pondo octo, cerę denariū pondo octo, eruginis denariū pondo x, olei heminam, terre cimolię denariū pondo iij, thuris denariū pondo quatuor, squame grise denariū pondo quatuor. Sicca læuigata in mortario finito, ceram liquefactam cum oleo tritis superfundito, finito q; pauxillo tempore combibere, aceti heminam addito: per triduum terito, quantum aceti excipiat, immittens, vt liquidi cerati fiat spissitudo. Vtitor ad omne vulnus & ad vetera & vix ad cicatricem venientia vlcera, & quęcunq; cancrofa sunt, cum panniculis filamentis cōceptis: supra splenium vero lanam succidam vino oleo q; madētem leuiter alligare oportet, biduo per astatem soluere, hyme triduo, ac vlcera tepente aqua abluere, in profundis vulneribus ipsas oras leuiter linamentis intercipere: quippe medicamen linamento excipi aptum est, & pus mouet. Hac ratione pura fient vlcera, & crusta excidet, ceram miscendo æqualem ærugini ad cicatricem perueniet. Exterit & carbunculos citra dolorem, omne q; pascens malignum silit, * perfanat q; Vtitor quoq; ad herpetas, & vngues putridos: similiter aut & ad omnia vino & oleo vtendum est cum lana. Præterea dentes erosos medicamine repleto. *¶ Bonum nostrum.* Cerę, picis, bituminis, singulorum pondo libram: manna, eruginis, cerussę, singulorum pondo selibram: malicorij, gallę, spinę ægyptiæ, iridis illyricę, aristolochię rotundę, chalcanti, singulorum pondo trientem, hoc est vncias quatuor: aristolochię verò longę, & eris combusti, vtriusq; pondo sextantem, hoc est vncias duas. Sicca ex aceto pluribus diebus terito, vt etiam prius ostensum est: ijs probè elaboratis, quę liquari possunt, cum oleo liquatis, heminam ipsis superfundito, mannam inspergens: vbi liquefacta frigefeceris, & deraferis, aridis ex aceto læuigatis sic admisceto, vt ne interfundendum grumos cerę modo facias, id que potissimum ambientenos aere frigido.

† In antiquis
quęcis non nul
la additur, em
entium Gale
zu.

¶ Aliud nostrum. Bituminis, aluminis liquidi, singulorum pondo libram: picis, resinę pityinę, cerę pondo libras duas: aristolochię rotundę, gallę, spinę ægyptiæ, singulorum pondo vncias octo: malicorij, eris vsti, manna, aristolochię longę, singulorum pondo vncias quatuor: olei ricinini, aut veteris, si illud non adsit, pondo libras duas, quarum singule vncias duodecim contineant, vt omnes simul vnciæ collectę sint vigintiquatuor. Preparato hoc quoque eodem modo cum prædicto, metallica ex aceto teruntur, deinde sicca adijciuntur, rursus que leuigantur: postea cum luti ipsissitudinem habuerint, liquata miscentur, vt prædiximus. *¶ Aliud.* Bituminis, resinę terebinthinę, picis bruti, singulorum pondo: olei denariū pondo vigintiquatuor: argenti spume, cerussę, manna, æruginis, squamę, opopanacis, singulorum pares portiones denarijs olei vigintiquatuor: ladani pondo vncias duas, quę valent denarijs sedecim: aceti heminas duas. Hoc quoq; pharmacum perinde ac superiora duo, conficitur. *¶ Aliud.* Chrysocollę, squamę, siomomatus, singulorum denariū pondo quatuor: æruginis, & chalcanti, vtriusq; dimidium, hoc est singulorum pondo denariū duū: cerę denariū pondo viginti quinque, hoc est vncias tres, & denarium vnum: resinę terebinthinę pondo vncias duas, hoc est denarios sedecim. Ceram cum terebinthina liquefacito, deinde alijs admisceto, bifariam medicamentum conficiens, interim vt prius citata aceto conterens arida, interim sine hoc curiosè læuigata liquefactis misceto. Esto autem terebinthina liquidior, sicut plerūq; larix appellata. In summa, omnibus his pharmacis, quę chironijs conuenire palam est, laricem resinam si loco terebinthinę misceas, non peccabis.

¶ Aliud. Cerę pondo vncias tres, hoc est denariū pondo vigintiquatuor: aeris vsti, squamę, æruginis, singulorum pondo denariū duū, vt trium horum simul denarij sex existant. Cera esto pinguis, vt quę cum rosaceo vel myrteo modico emolliatur. Arida probè læuigata excipiatur, H quemadmodum in omnibus medicamentis, quę ad chironia parantur, vehementer est necessarium. Quin etiam vbi sicca cerę fuerint admista, melius est ea diu in mortario contundere. *¶ Aliud.*

Cerę pondo vncias sex: æruginis partem sextam, quę est vncia vna: eris combusti, resinę laricis, singulorum pondo denariū trium, vt ambo simul habeant denarios sex. Cera pinguis esto: in q; aquam calentem proiecta, quò mollior fiat, manibus subigatur, æuginem & æs in eam recipiendo, postea contundendo in pila, vbi resinę quoque mistio paulatim instillando fiet. *¶ Aliud.* Cadmię pondo vncias tres, dimidio chalcitidis ponderi misceto, quod est vnciæ semissi. Tritis probè vinum austerum affundito, & rursus læuigato: vbi mellis consistentiam habuerit, ceratum, ex cera, & resina fricta, compositum immittito. Sint autem cuiusque pares portiones vnius vnciæ, vt ambę duas vncias efficiant, myrtei liquefacti pauxillum adijcito. *¶ Aliud.* Olei veteris, vel ricinini heminam: cerę, picis, bituminis, singulorum pondo: manna, æruginis, cerussę, dimidio minus, quàm in prædictis, quod est cuiusq; selibram: malicorij, gallę, spinę ægyptiæ, iridis, aristolochię rotundę, chalcanti, singulorum trientem, qui valet vncias quatuor: aeris combusti, aristolochię longę, cuiusq; sextantem, qui pendit vncias duas. Quę liquantur, aridis antea ex aceto læuigatis commiscebis, vt prædictum est. *¶ Aliud.* Cadmię, chalcitidis, singulorum pondo denariū quadraginta.

A quadraginta. Ex vino tritis pluribus diebus, ceratum quod ex oleo & cera constat, immittes. Sicut autem olei libræ duæ, ceræ denarij ducenti. At satius est hoc minori symmetria conficere, Cadmiæ, & chalcitidis, singulorum denarium pondo decem, ceræ & olei, cuiusque denarios quinquaginta, iniiciendo. *Aliud.* Cadmiæ combuitæ, chalcitidis vsta, terebinthinæ, ceræ, singulorum parem mensuram. Arida ex vino conteres. *¶ Aliud ex Ricino.* Æruginis denarij pondo vnus, aluminis liquidi pondo libram: malicorij, æris combusti, manna, singulorum trientem, qui valet vncijs quatuor: gallæ duplum adicias, quod est vncias octo: picis, pityinæ, singulorum pōdo libras duas: bituminis dimidio minus, hoc est pondo vnū: cui aluminis liquidi et indideris, aristolochiæ rotundæ, & gallæ, singulorum pondo vncias octo: longæ aristolochiæ dimidium, hoc est vncias quatuor: olei ricinini pōdo libras duas. Metallica ex aceto coteruntur, ut in superioribus. *Aliud.*

Ceræ pōdo vnciæ tres: æris cōbusti, squamæ, æruginis, singulorum pondo duo. Ceram prius in aqua calente calefacies: manibus rosaceū admiscens emolles: deinde arida excepta in mortario cōtundes diutius, ut verè omnium fiat vnitas. Tertio quarto ue die hoc & alia huiusmodi omnia soluito, spongiā extrinsecus ex aqua vel posca imponens. *Aliud.* Ceræ pondo vncias sex: resinæ laricis eius dimidium, hoc est vncias tres: æruginis triplo minus, q̄ laricis fuit, hoc est vnciā: picis **B** brutiæ pondo denariū trium, chalcitidis vsta similiter denariū pondo trium. Conficito & hoc ut prædictum. *Aliud.* Æris combusti, squamæ, æruginis, parem cuiusque mensurā: ceræ sescuplam misceto. Ceram, ut prædictum est, calente prius aqua madidam subigito: ac interea dum hoc agis, vel rosaceum, vel myrteum adijcito: deinde in pilam immittito. Præstat autem trium pondo ceram æqualem miscere quā recentissimam, molliissimam, pinguiissimam, ne multo humore oleoso indigeas. *Aliud.* Æruginis, terebinthinæ, pares vtriusque partes: ceræ triplo plures: aluminis scissilis, cadmiæ, squamæ, singulorum quadruplum, ut æruginis pars vna sit, item terebinthinæ vna, cere tres: squamæ, cadmiæ, aluminis scissilis, vniuscuiusque quatuor. Vbi arida contuderis, cribraueris, in puluerem exactè redegeris, in mortarium coniectam ceram & terebinthinam contundito, sicca aspergens, pistillum myrteo vel rosaceo madefaciens in aere calido, nā in hoc facile tundentur, maxime si id æstiuo Sole fiat. Vfus est is, qui aliorū quoque, nimirū vlcere prius deterso aphroditro, & postea eloto per melicratum, tū per spongiā probe purgato, ut madoris sit expers: deinde super id platysmate hoc est latiore linteo, cui emplastrum illitum sit, imposito: postea duplici linamento aqua frigida tincto extrinsecus superdato, præterea noua spōgia molli: & tertio aut quarto die id resolues. *¶ Acerum hoc est absque cera, nostrum.* Argenti spumæ pondo libras tres, olei ricinini

C veteris pondo libras quatuor s, aceti quā acerrimi libras duas: æris squamæ nigre, chalcitidis, æruginis, singulorum pondo vncias duas. Argenti spumam cum oleo prius coquere oportet, donec sitrigmenti spissitudinem accipiat: deinde metallica plusculis diebus ex aceto trita adijcere: atque sic incoques, quousque non coinquinet. Licet et statim ab initio argenti spumam cum oleo & aceto diligenter mistam coquere: ac vbi semicocta fuerint, squamam, chalcitidem, & æruginem immittere. Voco autem nunc libram olei & aceti Romanam, quæ vncias duodecim peculiare continet. Quin & sex olei libras tribus argenti spumæ pondo interdum committo: & nimirum secundum hanc symmetriam diutius incoquuntur. Cum preparas & hoc pharmacum, præstat argenti spumam cum solo oleo esse coctam: deinde metallica cum aceto iniici. Vbi verò tria fuerint, cuiusque vncias duas dixi immittendas aceti libris duabus, argenti spumæ tribus, olei ricinini veteris libris sex, vel, ut prius dixi, quatuor s. Hoc medicamentum & fistulas iungit, & callosas iam exicat, contrahit, & claudit. At si bona victus ratione vsus quis fuerit, non resoluuntur: plenitudine verò insigni collecta, periculum est ne pars ex fluxione infestante phlegmone rursus tentetur, & fistula aperiatur. Et verò inueteratis vlcerebus, & dysepulosis hoc est cicatricem agrè ducētibz, quæ & chironia nominant, non solum pharmacum impermixtum imponimus, sed et liquefactū

D oleo veteri, vel ricinino, ac linamento exceptum: etiam si puris vel minimum non dum in vlcere antea fuerit, concoquit ipsum, & generat, & crassum efficit. Ceterum vlcus triduo solues, si nihil prohibet. Quod si stomomatis squama fuerit, præstat: sin minus eam habeas, nec nigram, cyprij æris squama iniicietur. Confeci aliquando hoc emplastrum, phrygiæ quoque lapidis vncia admista, interdum etiam chrysocollæ vncia, sicut & amborum nō nunquam: glutinat & magna vulnera.

¶ Aliud ad Teneros & ex iisdem Vlcerebus nimis grauitè confluentes. Cere pondo, rosacei pondo, cerussæ pondo vncias octo, salis ammoniaci pondo vncias quatuor, squamæ cypriæ pondo vncias duas, thuris pondo vnciam, calcis viuæ pondo vnciam, aluminis scissilis pondo vnciam, æruginis pondo vnciam, malicorij pōdo vnciam. Vfus prædictis idem est. Nouem in præsentia sunt pharmaca citra rosaceum composita, decimum enim illud. Ex nouem quinque sunt pari pondere, calx viua, malicorium, thus, alumen scissile, & erugo. Squamæ duplo maius pondus est, & hæc sal ammoniacus duplo exuperat, hunc cerussa, huius sescupla rursus cera in libram vnā reducta, quam & rosaceum habet.

GALENI DE COMPOSITIONE MEDICA- MENTORVM PER GENERA LIBER QVINTVS

ARGVMENTVM LIBRI

Continet Multiplicis vsus Emplastra, Pastillos, & Arida.

De Medicamentis Vsu Multiplici accommodatis.

CAP. 1.



De medicamentis Polychrestis futura hîc est disputatio, vocant autem Græci polychresta, quæ multis affectibus conueniunt. Sunt q̃ non nulla ipsorum non modò specie, sed etiam genere diuersa, omnia verò ex contrarijs constant medicaminibus, etiam iuxta secundas qualitates ac vires, non tantum primas. Patere arbitror cuius primas me appellare caliditatem, frigiditatem, siccitatem, & humiditatem, atq; ex harum cōiugatione quauis compositas: Secundas verò, quæ ipsas sequuntur, vt in quinto libro de Simplicibus medicamentis vberius percensui, ostendens non nulla non solum composita medicamina, sed simplicia quoque, vt nascuntur, emollire, quædam indurare: quemadmodum alia obstruere, alia referare: alia sordes gignere, alia abstergere: alia attenuare, alia crassitiem admoliri: alia densare, alia rarefacere: alia carnem inducere, alia repurgare: alia cicatricem ducere, alia exulcerare: alia trahere, alia repellere: alias q̃ similes eorum differentias. Porro dictum mihi est & superioribus commentarijs, quæ contrariorum facultate medicaminum necessaria esset mixtura, cuius etiam nunc paulo post mentionem facturum sum. Melius enim mihi videtur duo quædam tria ue medicamenta celebria, quæ multiplicem vsum exhibeant, præscribere, deinde compositionis ipsorum rationem interpretari. Exordiar autem ab ijs, quæ nemo non nouit, quippe in Heræ libro, cui titulus est Nartex id est promptuarium medicaminum, prodita, tum apud alios qui libros de medicamentis condiderunt. At quia superiori libro de virtutibus, quæ vlcerum dysepulota hoc est vix cicatricem ducentia, curant, verba fecerim, animus est nunc quoq; emplastra illa multiplicis vsus primum exponere, quæ causâ malignorum (non nulli chironia nominant) composuimus. Alia verò vsus dicta multiplicis, q̃ multis quidem affectibus alijs conferant, non tamen etiam chironijs, ea rursus seriatim referre proposuimus.

Quæ scripserit Heras.

CAP. 2.

Itaq; cū opere medicamentorum Heras Cappadox emplastrum quoddâ ad huiusmodi vlce-
ra mirifice faciens tradiderit, inde sumâ exordium, verba ipsius adscribens, quæ in hunc modum sonant. *Boni coloris, Cruentis idoneum, Cicatricem ducens. Conglutinat, perfectè implet, atque Cicatricem ducit solum cum cerato, magis q̃ adhuc circa cicatricem inducendam efficax est. Valet etiam ad Chironia vlcerum, alia q̃ similia summo opere. Nam Callos consumit, deinde genuinam carnem generat, valde album. Cerae pondo libras duas, frictæ pondo libras tres, æruginis rassa pondo uncias sex, mannae pondo uncias tres olei heminas quinque, aceti sextarium. Liquabilia siccis admiscuntur. Vfus est emplastri ad vulnera, cum rosaceo temperatum pus generat, cerato solum ad cicatricis generationem repurgat. Quidam tamen resina frictæ libras duas, & terebinthinæ tantundum, ingesserunt: atq; sic præparatum erugine rassa ipsum exceperunt, vt collyrij tenorem haberet: atq; hoc imposuerunt, vbi callos consumere studerent: promptè enim hæc facit, vt etiam ossa separet. Merito igitur & emplastrum hoc Heras commendat ceu ex æruginis, & aceti copia, efficax, si quid in superiore libro dictorum meminimus. Laudat item Panacea ab eo vocatam, quam deinceps verbis illius appono. *Panacea Heræ à non nullis Sanitas nominata. Ad omnem Passionem, & malignitatem. Sistit autem Nomias, neque crustas facit, neque circumpositis partibus duritiem conciliat. Rumpit ac tabefacit omne corruptum, vt nihil à liquidâ Staphide differat. Cohibet Sanguinis eruptionem tum aliam, tum quæ per hæmorrhoidas fieri solet, myrteo dilutum. Item Hæmorrhoidas ipsas tabefacit, & consumit. Insuper Fistulis medetur, & Carbunculis. Sanat Aegylomas, & Chironia, vt vocant. In summa Vix Sanabilium, & diuturnorum genus latentibus quidem locis, veluti Vtero, Vnguento cyprino liquatum: Exterioribus autem præstat, vt alia singula, sic apponere. At omni Vlceri impositum, quamuis agresti, mitius statim id efficiet, dolores minuet, & vigilas. Hæc eius virtus est. Chamaepityos denariû pondo quatuor, symphyti denariû pondo quatuor, chamaeleontis denariû pondo quatuor: marrubij denariû pondo quatuor, apud alios sex: polij denariû pondo sex, centaurij tenuis denariû pondo sex, helenij denariû pondo quatuor, aristolochie denariû pondo quatuor, thuris denariû pondo duodecim & semissis, myrrhæ denariû pondo trium, aloes denariû pondo sex: chalbanij denariû pondo sex, oboli vnus & semissis: olei denariû pondo ceterum octoginta, mellis triginta, propolis denariû pondo duodecim s. aluminis fissi denariû pondo sex, oboli vnus & semissis: terebinthinæ denariû pondo sex, oboli vnus & semissis: chalcitidis denariû pondo sex, oboli vnus & semissis: bituminis denariû pondo quinquaginta, terræ ampelitidis denariû pondo quinquaginta, argenti spumæ denariû pondo quinquaginta, gallæ denariû pondo**

* Al. bonum.

* Liquida idest ὑγρὰ, fortassis ἀγρία leg. i. agria uel syluestri.

† Al. ex antiq̃uis clarior in latentes quide locos, veluti utrum, insunditur Vnguento cyprino li-
quatum &c.

* *Al. duode-*
cim.

Multiplicis

Multiplicis usus est medicamentum, quod Isidem appellant, ab omnibus commendatum. Ego E vero apponam modo, quæ Heras de illo memoriæ prodidit. Hæc illius verba sunt. *Medicamentum à non nullis Epigoni dictum, ab alijs Isis. Facit ad omne Vultus, & ad Vultus capitis cum ossium præcisione, sanat citra reparationem. Valet ad Punctus, item Paxillos infixos, & Hominum catque anum morsus. Venenum trahit iuperæ, scorpij, draconis marini, pastinacæ. Curat Fracturas artuum cum vulnere, callum enim obducit citius tutiusq; . Fistulas omnes recentes, ueteres Foveas seu dehiscencia ulcera, Sinus, Phymata, Parotidas, Abscessus in mammis, & alis futuros, aut factos, sanat. Aduersus Fluxionem nobis uenientibus, Strummas adhuc aufert cum tunicis, celerrime pus educens. Sistit Oculorum fluxiones fronti impositum, tollit Liuorem. Gangrenas non patitur latius serpere. Putredinem purgat. In summa ad quoduis bonum est. Hæc recipit. Cerae denariorum pondo centum: terebinthinæ denariorum pondo ducentorum, secundum alios centum: squamæ aris rubri denariorum pondo octo, æruginis rasæ denariorum pondo octo, aristolochiæ rotundæ denariorum pondo octo, thuris denariorum pondo octo, salis ammoniaci denariorum pondo octo, guttæ ammoniaci denariorum pondo octo, aluminis combusti denariorum pondo sex, eris vsti denariorum pondo octo, myrrhæ denariorum pondo duodecim, aloes denariorum pondo duodecim, chalbanî denariorum pondo duodecim, olei veteris heminam, aceti acris heminas duas. Quæ liquari possunt, siccis in mortarium superfunduntur. Sic quidem F Heras Isim scripsit, non etiam particularem omnem usum ei apponens, ut in alijs consueuerat. Insuper quod ad Epigonum illud refert, à plerisque dissentit, quos exactius de Epigono scripsisse arbitror, cum alia, tum illud quoque, nempe quod in carcere conclusus cum quendam admodum potentem curasset, eius rei gratia fuit dimissus. Adieciisse vero ipsum aiunt præscripto medicamini, dracunculi radicem: atque ego semper ita usus sum, quoniam & præceptorum meorum vnus vsurpabat, apponens in prædictam symmetriam Hæc, dracunculi denarios octo, insuper & olei cyathi dimidium, aceti heminam: ad hæc colophoniam resinam, non, ut Heras, terebinthinam. Sed & in emplastri confectione ab illo dissentiebat, chalbanum aceto cum alijs in pila elaborans, atque ita admiscens ea, quemadmodum & Heras inquit, liquabilibus: deinde medicamentum manibus plurimum emolliebat, attingens acetum quam acerrimum: postea in vase creto reponebat, et perfusum longo tempore seruabat: atque ita excipiens utebatur. Appellauit ipsum, velut alij quidam, Hermonis sacri scribæ: alibi scriptum inuenias ex adytis templi Vulcani in Ægypto hoc quoque esse, quemadmodum & illud, quod ex dictamno constat. Symmetriam vero simplicium medicamentorum quæ id constituunt, omnes propemodum equalem scripserunt, proinde titulus licet diuersus exisat, non opineris aliud esse, atq; aliud, & quod ex adytis sacrum dicitur, G & Hermonis sacri scribæ, & Epigoni: nam omnes has appellationes habet. Liquatum autem cum cerato liquido purgat, & vlcera cicatrice obducit. Quidam ex cerato triplicato dilui ipsum tradiderunt, non nulli duplicato, utriq; symmetriam indiffinitè distinguentes. In quibus etenim vlcus purum satis efficitur, si tribus cerati partibus temperatum fuerit, non oportet duplicatum adijcere: in quibus autem minus purgatur, ibi ceratum duplo maius assumendum. Nouimus enim efficacius omne id genus medicamentum esse, quod non multo cerato miscetur: imbecillius, quod multo. Nihil mali est autem de dracunculo quoque eatenus dicere, quod per æstatem caule exiccato, & herba tota, radicem amputare oportet: deinde in domo sicca Solem non habente repositam, paulo post dies sex vel septem in orbiculos diuidere, eos q; filo traiectiones in sicca domo & à Sole remota rursum suspendere: ac sic ubi medicamentum præparare voles, radicem contundere: quæ ipsa quoque seorsum tusa & læuigata probè, ut puluis fiat, malignis vlcerebus medetur.*

Emplastrum ex Dictamno. Item quod ex dictamno emplastrum conficitur, sacrum appellant, dicentes & hanc scripturam in Vulcani templo iuxta Memphim inuentam esse: omnes ipsius huiusmodi symmetrijs meminerunt, vel parum adeo ab his differentibus. Sufficiet autem verba Heræ & de ipso adscripsisse, quæ in hunc modum habent. *Sacrum ex Vulcani templo in Memphi. Facit ad recentia Cruentia, fluentia, ad Nervorum præcisiones, Vetera Vlcera, suppascentia, Contusa, Putredines, Carbunculos, Nigritias, Vlcera fluentia, Cicatricem ægrè admittentia, Parotidas, Perniones, Abscessus, Strummas, Furunculos, Duritias. Tela educit, aculeos, ossa ex capite. Sanat ferarum Ictus, scorpionum Morsus, phalangiorum, muris aranei, hominum. Valet ad omnem colli Dolorem, humeri, articulorum, vice malagmatum. Sistit Oculorum fluores, non modo recentes, sed etiam Veteres. Tollit Capitis dolorem inunctum, rosaceo dilutum. Et Vteri dolorem sedat tum illitu, tum suffitu. Necat insuper Feras suffitu. Hæc recipit. Olei veteris heminas duas, argenti spumæ denarium pondo centum, æruginis rasæ denarium pondo octo, squamæ denarium pondo sex: colophonix liquidæ, alij pineæ, denarium pondo quinquaginta: manne denarium pondo duodecim, guttæ ammoniaci denarium pondo sedecim, aris combusti denarium pondo octo, diphrygis denarium pondo sex, gentianæ denarium pondo sex, aloes denarium pondo octo, chalbanî denarium pondo duodecim, propolis denarium pondo octo, cere denarium pondo viginti quinque, aristolochiæ denarium pondo decem, dictamni cretici denarium pondo decem. Argenti spumam & oleum in olla magna supra prunam incoquito, ut omnino aut ferè non inquinaet: deinde cacabum deponens eruginem indito squamam q; & coquito, ne prorsus inficiat. Postea rursus auferens, resinam, ammoniaci guttâ, iniice cribrata, mouens donec feruere desinat: mox cum re-*

*Al. rotundi

*Al. heminæ.

*Al. xxvi.

*Al. viginti.

A posueris paululum q̄ dimiseris, tollito, atq; æs diphryges q̄ inspergito, rursus coquens, quoad nō inquinet, interdum enim his iniectis remittitur: postea deponens, ceram addito, iterum coquito, vsq; dum non polluat, quod celeriter accidit. Dein cum deposueris, propolim immittes, ac reprensens denuo, paulisper lines: cum depones, addes aloen, mannam, dictamnū, aristolochiam, gentianam: his abunde refrigeratis singula laeuissima insperges mouens: si non inficiat, tolles, sin minus, leni igne coques. Hæc quidem Heras de emplastro scripsit. Composuimus autem id nos interdum & sine combusto ære, & diphryge: vnde quæ in alto laiebant, magis attrahebant, emollebat q̄ magis, discutiebat q̄: non tamen vlceribus ægrè cicatricem ducentibus idoneum. Quia etiam ipsum citra dictamnū confecimus, rursus alijs apponentes chrysocolle denarium pondo sex, vt maligna vlcera felicius sanaret. **I**cesum nigrum. Medicamen titulo Icesum, vsus multiplex: quidam gignendicasu scripserunt, Icelij. Heras itaque de ipso hæc tradit. *Icesum ad Vulnera & Canum morsus, Duritias diffundens, ad Parotidas, Condylomata, & Maligna. Item est Attrahens, & glutinatorium. Valet insuper ad Aquam inter cutem.* Argenti spumæ denariū pondo centum, bituminis Iudaici denariū pondo centum, terre ampelididis denariū pondo cētum: manne, propolis, singulorum pondo denariū viginti quinque: chalbanī denariū pondo duodecim, scissilis denariū

B pondo duodecim & s, terebinthine denariū pondo duodecim s, iridis denariū pondo sex, olei immaturi heminas sex, mellis heminam vnam, chalcitidis denariū pondo septem s, gallic omphacitidis denariū pondo sex, myrrhe denariū pondo sex. Argenti spuma, bitumen, ampelitis cū oleo incoquantur: vbi semicocta fuerint, propolis, resina, & chalbanū ex melle separatim cocta miscent: postq̄ constiterint, reliqua adijciuntur: mouentur autem spatha ex tædæ ligno confecta. Huius emplastri misturæ pondus non idem oēs, vt in sequentibus ostendetur, tradiderunt.

Nigrum ex duabus Aristolochijs. Celebre quoq; emplastrum vsus multiplex est id, quod ex duabus aristolochijs conficitur, quod ipse Heras quoque his verbis descripsit. *Nigrum ex duplici Aristolochia. Facit ad Antiqua Callosa, ægrè Cicatricem inducentia, Depascentia. Est etiam Enemum cephalicū m, Ossa reducit, & est Glutinatorium.* Facit ad Articulus solutos. Fluori obnoxia repurgat, implet immissum. Picis pōdo libram, ceræ pondo librā, bituminis pondo libram, terebinthinæ pondo librā: manne pondo felibram, vel vncias septē: æruginis rasæ pondo felibram, cerulle pondo felibrā, chalcanti pondo vncias quatuor, aristolochiæ longæ pondo vncias quatuor, illyricæ pondo vncias quatuor, malicorij pondo vncias duas, gallic immaturæ pondo vncias duas, æris cōbusti pondo vncias duas, spinæ pōdo vncias quatuor, aristolochiæ rotundæ pondo vncias quatuor, acetī heminā, ricinini vel olei ve-

Cteris heminā. Quæ liquefieri poterunt, simul liquato: deinde cerussam, æruginem, & chalcanthū cū aceto lauiā facta inspergito: mox supra ignē, vsq; dum coiuerint, arida infriato igne subtrahito: dehinc defusa subigito. Hæc tū Heras, tum alijs, de ipso scriptum reliquerunt: Ratio autē eius quī id cōposuit, non obscura est, recordantibus, quæ hic & in prioribus cōmentarijs dicta sunt. Cōstat enim ex contrarijs facultatibus, attractricibus, & repultricibus, quæ commune habent, vt exiccēt. Superat autē in eo repellentium virtus, quæ adest adstringentibus, chalcantho, malicorio, gallæ, ericōbusto, & spinæ: ob hoc etiam ad solutos id est laxatos articulos conuenire ipsum affirmat. Aristolochiam autē & iridem adstrictorijs admiscuit, vtpote rarefaciendi & digerendi potestate prædita. Vt autē emplastrum fieret, nec siccum, sed vt superinduci posset, medicamentum, oleum & cera mista sunt: cera quidem ceu materies solum, sicut & oleum, si cōmune fuerit hoc, nec ricinini vel vetustum: quippe didicimus hæc calefacere & digerere. Terebinthina verò resina præterquam quod emplastri consistentiam medicamento conciliet, cum cera hoc sola facere non possit, etiam emolliens quid & digerens detergens q̄ obtinet. At cum thus eadem præstet, manna adstringendi vim totā & qualitatem assumpsit: uocant enim sic thuris micas cōcussu elisas, corticis parum item participes. Iam & bitumen abunde siccatur, ad emplastri confectiōem idoneum medicamen.

D Atq; hæc de illius compositione sufficiunt. Porro emplastri huius author, cum vellet medicamenta valenti virtute prædita miscere, æruginem & acetum ipsis adiecit, quæ siccare, exedere, & vsque in profundum corporis penetrare, atque alia deducere possunt. Miscetur autem hæc cum digerentibus, vt humores crassos particulis, quas curamus, infixos attenuent. Restat igitur & de cerussa quippiam dicere, quam ceu ad emplastrum conficiendum aptam, non vt aliquid cooperaturam admiscuisse illum est perspicuum. Ego verò argenti spumam potius adiecissem, quæ & emplastris conuenit, & refrigerat: cerussa verò alijs quibuidam utilis, ad propositi emplastri vires nihil præstidij affert.

Emplastrum Azanite. Emplastrū Azanite varijs vsus, & nobile, de quo Heras ita scribit. *Emplastrum Azanite.* Picis aridæ pondo vnciam, cere pondo vncias tres, adipis suilli pondo vncias trēs, seui taurini pondo vncias tres, cœsypī pondo vncias tres, resinæ pineæ pondo vncias quinque. Facit ad maligna omnia, gangrenas, fistulas, recentia vulnera, ambusta igne: perfrigeratis prodest vt acopon: item pessulus est emolliens. Cōuenit autem & ad vteri vlcera, phymata, & parotidas. Cum vlcera caua fuerint, copiosiore vtitur medicamento: vbi ad cicatricem inclinare videtur, parcio. Porro medicaminis proprietas est concretum humorem sordidū per summa gignere. Benefacit lippietibus, palpebris suprapositum. Oleum medicaminis affectui opponitur quare obseruato ne infundas. Cum autē præparas, picē, cerā, seui taurinum iniijcito: vbi fuerint liquata, adipem

* Al. coiglas
7.

* Al. ὀλίγη, i.
paucam.

* Al. Azanite.

* Aliter vi.

adipem suillum, mox resinam: postremo œsypum, vbi refrigeraueris: totum aut igne non flamma liquefacito. Maximè valet in quibus nerui, vel muscoli perculsi sunt, item ad maligna.

¶ *Emplastrum Haliei seu Piscatoris, ex Sinopide.* Haliei celebre, & multiplicis usus emplastrū nihil minus quàm priora; Heras ita tradidit. *Haliei ad Vetera, & quæ Cicatricem agrè ducunt. Item Digerit, præsertim in māmills Duritias. Vtitur eo tanquam optimo ad plurima.* Cerae pondo minam, argenti spumæ pondo minam, mannæ pondo denariorum octo, terebinthinæ denariorum pondo octo, chalbani denariorum pondo octo, sinopidis denariorum pondo octo, olei veteris heminas duas. Oleum & argenti spuma dum non inquinant, incoquantur, deinde cera resina q̄z: liquefactis ipsis, sublatis q̄z ab igne sinopidem immittito, & chalbanum, postea mannam. Idem facit ad marinarum icūs summè. Vfus quādoq; eo sum in quodam à pastinaca percussio, summo que dolore vexato, & mirificè profecit: similiter & in ijs, qui à scorpione morli erant. Hactenus Heras. Deinceps verò Critonis emplastra inspiciamus.

Quæ scripserit Crito.

C. AP. 3.

Heras quidem librum vnum de medicamentorum compositione fecit, cui titulus est *Nartex* id est medicaminum promptuarium. Quinq; verò tales Critonis præter illos de exornatione seruantur. In quarto horum quinq; emplastra prædictis similia specie commemorat: quædam **F** vt Heras in totum simili modo confectia: non nulla insuper, quorum Heras non commemorat, quæ ego mox ordine apponam, non etiam si cuiusdam aliter quàm ab Hera descripti mentionē facit, omittens, quemadmodum in Iclesij emplastro factitalle apparet: alia nanq; pondera & mensuras huius emplastri Crito scripsit, sicut alij quidam, non vt Heras posuit. Incipiam igitur à primo Iclesij, in cuius simplicium medicamentorum pondere inter oēs non conuenit. ¶ *Emplastrū Iclesij.* De Iclesij medicamento hæc ad verbum scripsit Crito. *Iclesij ad omne Vlnus recens, vetus, Coniussa, Luxata, Fracturas, Phlegmonas, & omnem Dolorem, quem protinus sedat. Facit ad Abscessus, Phymata, Strumas, Carbunculos, Parotidas, Phlegthra, Condylomata, Impetigines, Clauos, Nigritias, Hemorrhoidas phlegmone tentatas, Fistulas, Ambusta igne. Dilutum myrteo vel rosacco, valet ad Vlcera, Aculeos, Tela, Canum hominū q̄z morsus, Ferarum icūs. Item ad Sanguinem cohibendum vtilior, & loco Malagmati ad omnia. Oleum verò non adhibendum est. Iam Lippientibus in linteolo collyrium adhibetur: sint autem splenia semper maiora. Iuuat quoque Hydropicos.* Terræ ampelitis, bituminis, argenti spumæ, singulorum pondo minas duas: ceræ, thuris, terebinthinæ, propolis, singulorum pondo minas sex: chalbani, scissilis, singulorum pondo minæ dimidiū: myrrhæ, gallæ, iridis, singulorum denariū pondo duodecim: chalcitidis denariū pondo sex, mellis heminas duas: olei omphacini congios duos, quidam heminas duas. **G** Ampelitis, bitumen, argenti spuma cum oleo coquantur, humore prius expresso, vt fiant læuia: incoquantur autem igne non acri: spatha ex tædarum ligno assidue mouentur, ne sublidant, nā citissime comburuntur. Quæ liquari possunt, in alio vase liquefacito, melle prius seorsum cocto, vt coeat, ac in cacabo pulchrè confertis misceto, rursus. n. resoluitur his præmissis: deinde arida insperguntur aliquatenus refrigerata, postremo thus. Ac vbi in unitatem coierint, vtilior. Hanc scripturam ab Herodoto accepi. Hæc sanè Crito de Iclesio scripta reliquit. Videtur autem in simplicium medicamentorum, vnde totum componitur, symmetria ab Hera dissentire: ac partim hæc discordia manifesta est, partim dijudicari vix potest. Etenim Heras recte faciens omniū pharmacorum pondus in denarios redegit: Crito autem ampelitidem terram, bitumen, argenti spumam, non pro denariorum pondere scripsit, sed duas singulorum minas iniiciendas censuit. At ab his dissensit qui de ponderibus & mensuris scripserunt, quantum videlicet minæ pondus existat: non nulli enim sedecim vnciarum esse dicunt, quidam viginti: alij etiam distinctionem faciunt, Alexandrinam ponentes viginti vncias pendere, aliam sedecim: atq; hoc quidem adhuc leuius est. Verum ex ijs qui minam in denarios redigunt, alij centum, alij plurimum, denariorum esse confirmant: quia & vnciam pleriq; septem denarios & semissem valere malunt, alij septem duntaxat, reliqui octo. Hæc igitur cū ita se habeant, quot denariorum minā à Critone positā æstimare oporteat, inuenire operosum est. Apparet aut in alijs quoq; cētum denariorum minam esse velle: ac si ita res habet, duplicatā Iclesij compositionē ab eo scribi putabimus, cū Heras trium horū medicaminum priorum terræ ampelitis, bituminis, & argenti spumæ, singulorū denarios centū posuerit, Critone pondus in ducētos redigente. Videamus igitur an sequētia duplicato cōsentiant, quædā nanq; apparent, quædā non item. Meminit ergo post tria prima, ceræ, thuris, terebinthinæ, propolis, singulorū minæ dimidiū, hoc est denarios quinquaginta, immittendū præcipiens: etenim proposuimus tanq̄ mina centum denarijs valeat, symmetriā esse scriptā. Quod si est, in thure, pro manna videlicet posito, Crito cū Hera conueniet, pari mō in propoli: non tñ terebinthina, quippe vigintiquinq; denarios Critonē scripsisse oportebat, cū Heras duodecim & semissem statuerit. Porro in cera maximè viri controuerfant discordant q̄z, quippe cū Heras cerā omnino nō iniiciat: didicimus enim illius vim esse, mediocriter emollire. Cæterū apud Critonē deinceps scriptū est, chalbani, scissilis, singulorū quarta minæ portio. Atq; in hoc vir Heræ suffragat. Nā quarta pars minæ, quæ cētum pendet denarios, vigintiquinq; denarios efficiet, qui duplū sunt duodecim & semis ab Hera scriptorū. Iam verò à minæ vocabulo digressus in sequētib; Crito myrrhæ,

* Aliter v.

† AP minæ dimidiū, & ita legitur, ut in ferius patet.
* Quarta portio, legendum est, ut infra apparet.

Arthæ, gallæ, iridis, singulorum denarios duodecim cum prædictis miscendos iubet, in hoc Heræ consentiens: siquidem ille sex cuiusq; adiiciendos præcepit. Inde rursus Crito chalcitidis denarios sex tradidit, hic non parum ab Hera discordans. Nam cum omnia duplicata sint, conueniebat & chalcitidem non sex verum quindecim denarios habere, vbi Heras septem & s scripsit. In melle quidem viri concordēs sunt, cum Heras heminā vnam, Crito duas posuerit. Restat autem de oleo quæstio magna, non solum inter duos illos, sed alios quoque, qui medicamentum hoc scripserunt, sicut procedente sermone dicemus. Hi igitur inter se hæcenus differunt, etenim Heras olei immaturi heminas sex scripsit: melius enim sic quàm, ut alij quidam dixerunt, cyathos sex. Quippe in coctione argenti spuma, bitumen, terra ampelitis, vbi semicocta fuerint, tum alia singula Heras immittenda existimat: atqui semicocta fieri non possunt, cyathis sex immixtis: scimus enim plerosq; ex iis qui pharmaca componunt, subinde centum argenti spumæ denarijs, duas heminas indere. Atq; hoc iam etiam totum antea in primo huius operis volumine comprehensum est, nempe metallicorum quoq; vncias nouem, heminam esse licere, sicut quidam putarunt. Quin & duodecim iniicere possumus, ut alij præcipiunt, probè docti, si medicamen diutius coctum fuerit (licebit autem hoc ipsum copiosiore oleo impolito) maiorem siccandi vim acquirere: quod si

Babigne statim sublatum fuerit, minus propter olei paucitatem exiccaturum, emolliturum autem magis, & mitigaturum. Quare sex cyathi omnino repudiandi sunt: sex autem heminæ, quæ singulæ vncias nouem faciunt, iniiciendæ. At si largius medicamentum viles incoquere, quò siccet cui dentius, nihil obstat, etiam duodecim vnciarum heminas infundere. Itaq; Hera sex heminas scribente, liquet Critonem duodecim heminas immittere oportuisse, ut simul in hoc, sicut in alijs, duplicata mensura existat. Verum scripti sunt ab eo, olei omphacini congi duo. Iterum hic quoq; damnandi sunt, qui heminas duas posuerunt. Ergo si congium sex heminarum esse statuamus, virorum consensus manebit: si verò non heminas sex, verum sextarios sex, ponamus, non parua dissensio orietur: multa nanque erit copia, ut ad portionem aliorum, si olei sextarios duodecim infundas. Hæc quidē in præsentia de Heræ & Critonis in proposito pharmaco discordia. Cum verò ad Andromachum venerimus, dicetur itidem non nihil de illius cum utroque, partim consensu, partim controuersia.

C *Isis viridis.* Illidem hic quoque scripsit, quemadmodum alij prope omnes. At quia diligentius tum vsum ipsius vniuersum, tum præparationem tradidit, ac simul non nihil ab Hera discessit, visum mihi est etiam ab hoc scripta ad verbum subiungere. *Isis* quam non nulli Epigoni vocant. Per se ad Squamarum abscissus facit. Item crassa Ossium fragmenta innatantia in Cuiat, linamento vel splenij modo imposita. Valet ad Aculeos, omnium quæ Ferarum ictus, & morsus. Sanat omnes Punctos, & Vulnera ferro facta in bello, & aliter. Curat etiam Fistulas imposita, & ut collyrium indita. Discutit Callos, & conglutinat. Alteri temperata ad omne Vultus linamento, & splenij instar, adhibita valet. Prodest ad Maligna & diutina, ac ab alijs corrupta: in quibus derafis prius, medicamento diluto vitior. Mirifice facit & ad Sinus conglutinandos, dum magni fuerint: nam exiccandis illis coniungendis quæ conuenit: linamento quoque imposita, tum per se, tum alteri mista, in quibus Adenes aliquos, vel insitas membranas eliquare volumus. Vitior etiam ad Fracturas cum vulnere & sine hoc: callum enim ducit celerrimè, & partes affectas adstringit. Insuper in quibus aliud malagma non proficit, ipsa exactè prodest: & Ungues ex offendiculo vacillantes, vel confirmat, vel extrudit: & Dentes ex ictu motos stabilis. Summatim infinita sunt, quibus differenter adhibita, conducit. Est autem & diluta hæc: Intemperata pars vna sumitur, cerati partes due non nunquam, atq; adhuc magis diluitur. Sed vsus & exercitatio in hoc requiritur: fit nanque ceratum interim & per resinam pyrami. Compositio autem talis est. Gutta ammoniaci, æruginis rassa, salis ammoniaci, squamæ aris, aris vsu, singulorum denarios octo: aluminis rotundi denarios sex: aristolochiæ, thuris, singulorum pondo denarium octo: myrræ, aloes, chalbanis, singulorum denarium pondo duodecim: ceræ pondo denarium octo: resinæ colophonix pondo denarium sex, non nulli terebinthinæ tantundem: olei veteris heminas duas, aceti heminas duas. Epigonus verò & dracunculi radices succi denarium pondo duodecim, & marubij succi tantundem, & sereos succi denarium pondo octo. Omnia diligenter contusa ac cribrata mortario iniiciuntur, ac paulatim acetum in Sole affunditur, donec teredo totum acetum consumatur: vbi læue factum fuerit, liquefacta & refrigerata rassa q; diligenter, ijs quæ in mortario sunt, admiscuntur, ac subacta excipiuntur. Hæc scripsit Crito. Ego verò sine liquore sereos ipsam præparauim, & non nunquam de alumine ademim, vsus q; sum in neruorum vulneribus hoc medicamento simili modo, quo medicamento quod ex metallicis confectum est, quod in sermone neruorum vulneratorum scriptum est: nam valentius efficitur: aceto acerrimo vndique circumfusum, reponitur, & diebus circiter quindecim emollitur.

C *Medicamentum Machæionis.* Celebre simul & multi vsus est. Conuenit affectibus vlcærum, de quibus totus hic liber scribitur. Sic autem Crito ipsum protulit ad verbum.

C *Machæionis.* Ad omnia recentia Vultus: conglutinat, & phlegmonem arcet præsertim vbi contusio fuerit. Rabiosi canis morsum summè curat, ampliori loco impositum ac mutatum frequentissime. Pilulæ quoque modo sumptum fabæ magnitudinis diebus triginta ad omnem Passionem facit, maxime phagedenicam: item ad aurium, naturalium quæ vlcera. In Ossibus denudatis carnem producit, Narium vlcera sanat. Est etiam viride, diluitur rosaceo vel omphacino. Hæc recipit. Aristolochiæ rotundæ pondo vnciam, chalbanis pondo vnciam, opopanacis pondo vnciam, æruginis rassa pondo

pondo vñcia n, iridis illyricæ pondo vñciam, guttæ ammoniaci pondo vñciam, myrrhæ pondo E vñciam, terebinthinæ pondo vñcias septem & semissem, ceræ vñcias sexaginta & semissem, olei omphacini pondo vñcias septem & semissem. Dimidium olei cum ærugine ad leuorem teritur, re liquum cū cera & terebinthina coquitur. ¶ *Dysrachitis Damocratis ad verbum.* Et hoc ex celebriū late q̄ vſu patentium pharmacorum numero exiſtit, ſcribit de eo Crito hunc in modum. *Dysrachitis.* Mirum in modum facit ad Sinus callo vñdique circundatos, et Fiſtulas, impoſitum: ſi oriſcium ſit, quod lin teolum medicamento illitum queat excipere, imposito, ac citius proficiet. Vñtitor eius virtute in Humeſtis, Fluentibus, & Diutinis diſpoſitionibus, tertio quoque die vñ plurimum ipſum mutans. Podagricos quoque iuuat miſſicē in acceſſionis principio illitum ac in latum circumpoſitum, qui & ad conſuetas ambulationes, & vitæ vñſus dimit rantur. Citra balneum ad triduum, diesque aliquot, permancant: non enim materia dat acceſſum vñ affectus incre ſcat. Conuenit que omni Vñlceri ad ſex partes cerato admiſtum: inueteraſcens melius euadit. Aluminis rotundi denariūm pondo octo, ſquamæ denariūm pondo duodecim, æris combuſti denariūm pondo qua tuor, ariſtolochiæ denariūm pondo nouem, chalbanī denariūm pondo decem: guttæ ammoniaci denariūm pondo duodecim, aliſj decem: thuris denariūm pondo nouem, myrrhæ denariūm pon do nouem, ſtyracis denariūm pondo quindecim, miſyos denariūm pondo trium, chalcitidis dena riūm pondo trium, ſcyllæ medullæ denariūm pondo octo, picis liquidæ denariūm pondo qua F tuor: iridis illyricæ denariūm pondo nouem, ſecundum alios quatuor: terebinthinæ denariūm pondo decem, aliſj ſeptem: pityinæ denariūm pondo decem, aliſj ſex: ceræ denariūm pondo ſeptua gintaquinque, olei pondo libram & ſemissem, quidam etiam medullæ cerui denariū pondo octo adijciunt. Squamam, æs, miſy, chalcitidem, ſcyllam, ex aceto prius quā acerrimo in Sole terito, vt læuiā fiant: maximē læuigatis ariſtolochiā, & iridem adijcito. Hæc prius contuſa, tenui q̄ cri bro diſcreta, rurfus aceto circumfuſa terātur: atq; hoc tam diu facito, q̄ aſpredinem ſentias, nō par cens aceto ſumptitando. Poſtq̄ læuiā fuerint, alumen addito, facito q̄ hæc, donec & illud in pulue rem redigatur: deinde myrrham, mox thus, ab hoc ammoniacum, poſtea ſtyracem, poſtremo pi cem indito. Hæc in calido Sole vruntur, quō ſtyrax elaboretur. Vbi iam leuitatē & ſordium craſſi tudinem naſcia fuerint omnia, ceram, reſinas, & oleum liquefacito: et paululum decocti chalbano ſuperfundito, id q̄ congregatum in pila terito, ac quæ liqueſiunt modicē refrigerata indito: tunc chalbanum demittens diſſoluens q̄, in vas fictile percolato: ac vbi deraſeris, cum iſs, quæ in pila ſunt, permisceto.

* Al. xx.

Emplaſtrum ex Salicibus.

Q VOD ex Salicibus conſtat, præclarum & in multos vñſus idoneum ſimiliter prædictis, Crito G hiſce verbis recensuit. ¶ *Emplaſtrum ex Salicibus.* Prodeſt cruentis Vñlceribus impoſitum, Articulis ſolutis, Fiſtulis inditum, Flaccidis carnibus humidis que, præſertim quæ in extremis partibus extant. Valet item ad Eryſipelata, Alios que plurimos affectus ſine vñſuris. Myſios, chalcitidis, æruginis, ceruſ ſe, gallæ, aluminis ſciſſi, & rotundi, cretæ ſutoriæ ſeu melanteriæ, ſingulorum pondo vñcias ſex: ceræ, reſinæ pityinæ, picis, bituminis, ſalicis foliorum, ſingulorum pondo vñcias duas: olei hemi nas quatuor, vñcias quatuor: chalcanti pondo vñcias ſex, malicorij pondo vñcias ſex, aceti ſexta rios ſex. Salices ex aceto incoquantur, donec relicti fuerint ſextarij duo: deinde erugini, ceruſſæ, & cretæ ſutoriæ, prius tritis folia immittito, ſimul q̄ ad leuorē terito, deinde ſicca læuigata, rurfus q̄ exprimito, poſtea liquefacta ſuperfundito. Hoc Aſclepiades ſine chalcātho & malicorio præpa rat, ſicut in ſecūdo huius operis cōmentario docuimus. Aliud poſt hoc ex ſalicibus Crito in iſtā ſententiam edidit. ¶ *Ex Salicibus Lite, vt Herodotus.* Cretæ ſutoriæ melanteriæ ue, gallæ omphaci tidis, aluminis ſciſſi, rotundi, ſingulorum pondo, vñcias ſex: ceræ, bituminis, picis aride, ſalicis fo liorum, pityinæ, ſingulorum pondo libras duas: olei pondo libram, aceti ſextarij dimidium.

* Al. duas.

Quæ tradiderit Aſclepiades eiſdem generis Emplaſtra.

CAP. 4. H

H Is annumerantur ex ſupraſcriptis, tum quod ad Halieum refertur ab omnibus cognitum, tū quod ex dictamno conſtat: ſed quia Aſclepiades manifeſtō de iſplis ſcripſit, ob id etiam nunc eorundem mentionem faciam. Porro commodum ex eo, quod bis vel ter ſcribitur, aliud inſuper accedit, puta vt cognoscamus, in quibus ſimplicibus miſcendis, ac iſſorum pollicitis, ſcriptores il lorum inter ſe conueniant, in quibus item diſcordēt. ¶ *Haliei Giluum.* Ad cruenta Vñlnera, & Ner uos præciſos valet. Item Vñlceribus vetuſtis cicatricem ægrē ducentibus & fluentibus conducit. Quin & emollit optimē, præſertim in mammis ortas Duritias. Medetur Canum hominum que morſibus. Inſigniter valet & ad Pa ſtinacæ, & Draconis, Aliorum que ſæuorum piſcium icſtus. In ſumma virtutem habet miſiricam. Argenti ſpumæ, ceræ, cuiusq; denariūm pondo centum: terebinthinæ, mannæ thuris, chalbanī, miniſj ſino pici, cuiusque denariūm pondo octo: olei ſextarium: præparato, ſicut prædiximus. ¶ *Haliei Gil uum quomodo conficeret Galenus.* Argenti ſpumæ, ceræ, cuiusque denariūm pondo centum: tere binthinæ, myrrhæ ſinopidis, æruginis raſæ, ſquamæ, ſingulorum denariūm pondo octo: ariſtolo chiæ denariūm pondo octo, thuris denariūm pondo viginti quinque, diphrygis denariūm pon do ſex, chalbanī denariū pondo duodecim, guttæ ammoniaci denariū pōdo duodecim, olei hemi nas duas: cōficito quæadmodū ſupiora ¶ *Emplaſtrū Venatorū, pharmacū cōſectū.* Facit ad Quadrupedū icſtus,

Aictus, morsusq; & ad reliqua venenata. Argenti spumæ pondo minam: olei veteris, squamæ æris rubri, ceræ, resinæ frictæ, singulorum pondo: guttæ ammoniaci pondo trientem: chalbanî, minij ty nopici, singulorū pondo vncias duas. Argenti spumam, squamam, & oleum, ad spissitudinē vsq; incoquito, deinde ceram ac resinam iniicito: cum liquata fuerint, ab igne tollito, & ammoniacum dilatum immittito: vbi refrixerint, chalbanum, & ammoniacum indito, sinopicum inspergens: ac in mortarium defulsis mollitisq; vti-
 † Aliter, nouē

tor. **E**mplastrum Chalcidei, Conglutinat, Inflammationem arceat
 Dimisiones cum contusione iuuat, Sinus coniungit, resiccat, & Abscessus prohibet, Ossa corrupta educit. Maxime autem & in partibus extremis valet. In vniuersum mirabilis ei virtus est. Argenti spumæ, squamæ æris, resinæ pityinæ, ceræ, singulorum denariū pōdo centū: guttæ ammoniaci, chalbanî, cuiusq; de nariū pondo sedecim: diphrygis denariū pondo duodecim: aristolochiæ læuissimæ denariū pondo quadraginta, olei veteris sextarios tres. Argenti spuma, squamaq; ex oleo coquuntur: ac vbi colorem mutauerint, diphryges immittitur, deinde cera, resina pityina, vel pinea: liquatum vt non inquinat, ab igne tollitur, ac ammoniacum elotum iniicitur: postquam liquefeceris, aristolochia pharmaco iam refrigerato inspergatur, & continue moueatur: deinde in mortarium im-
 † Al. additur, & viginti.

mittito, ac subigito, excipiensq; vti-
 † Al. aristolochiæ, singulorū denariū pondo sex.
 † Nec hoc loco, aristolochiæ pondere eodē scribitur.

tor. **E**x Dictamno Sacrum, Virtute mirandum. Benefacit Ner-
 Buis Musculus q; præcis & contusis, vetustis & sanatu difficilibus. Ossa corrupta elicit. Aculeos, & telorum cuspi des, quæ infixæ sunt corpori, eximit, nec minus digerit. Iuuat Capitis dolores & Oculorum fluxiones. Est etiam Ma-
 lagma Pleuriticis & Hepaticis idoneum. Efficax est & ad cuiuslibet Virulentī ietus. Argenti spumæ dena-
 riū pondo centum, colophonix denariū pondo quinquaginta, ceræ denariū pondo vi-
 ginti quinque: guttæ ammoniaci, aristolochiæ singulorum denariū pondo sedecim: man-
 næ, chalbanî, vniuscuiusq; denariū pondo duodecim: æruginis, dictamni, æris vsti, aloes,
 propolis, singulorum denariū pondo octo: diphrygis, æris squamæ gentianæ radices, singulorū
 denariū pondo sex: olei veteris hyeme heminas duas, per æstatem vnam ac semillem. Præpara-
 tur quo dixi modo. Huius scriptura ab Hera in horum pondere variat. Nam Asclepiades dictā-
 ni denarios octo, Heras decem, iniicere præcipit: & vero etiā aristolochiæ, & guttæ ammoniaci,
 hic cuiusq; denarios sedecim, Heras sex quidem † guttæ ammoniaci, aristolochiæ vero decem. Cæ-
 terum Heras oleum indistinctē scripsit, solum heminas duas eius iubens infundere: Asclepiades
 autem hyeme tm̄, æstate verō vnam & semillem. **E** Diophanti Chirurghi, quo vsus est Phylacus. Argē-
 ti spumæ denariū pondo centum quinquaginta: cerullæ, picis, squamæ æris, ceræ, singulorum de-
 nariū pondo octodecim: eruginis, resinæ pityinæ siccæ, † mannæ, thuris, propolis, singulorum
 denariū pondo xij, chalbanî, aristolochiæ, cyperi singulorum denariū pondo sex: dictam-
 ni, trifolij, guttæ ammoniaci, singulorum denariū pondo trium: illyricæ, artemisiæ, polij, marru-
 bij, singulorum denariū pōdo duū: olei veteris heminas duas. Ad dictum modum præparatur.

Descriptis ab Andromacho eiusdem generis Emplastris.

CAP. 5.

Emplastra varij vsus, simul & cicatricem ægrè ducentibus idonea, hoc in libro per censere sta-
 tui, ex quorum grege sunt & decem illa longe optima inter ea, quæ scripsit Andromachus.

E Viride Euangei. Resinæ terebinthinæ, secundum alios siccæ, denariū pondo quinquaginta,
 alij vero centum: ceræ denariū pondo xxv: thuris, squamæ, chalbanî, aloes, myrrhæ, singulorum
 denariū pōdo triū: salis ammoniaci, opopanacis, æruginis rasæ, æris vsti, aristolochiæ, guttæ am-
 moniaci, scissilis, secundū alios rotundi, singulorū denariū pondo duū: ichthyocollæ denariū
 pondo iij, aceti heminas iij: olei quartam heminæ partem, secundum alios octauam. Vti-
 tor, ver-
 miculari ærugine non imposita. **E** Strigmentosum Emplastrum, quo vtor. Ichthyocollæ pōdo vnc.
 iij, sarcocollæ pondo vnc. iij, † erethriæ pondo sēlibram, terræ samix pondo vnc. iij, myrrhæ pon-
 do vnc. iij, thuris pondo vnc. vj, squamæ æris pondo vnc. viij, salis ammoniaci pondo vnc. iij,
 eruginis rasæ pondo vnc. vj, aluminis scissilis pondo vnc. ij, aloes indicæ pondo vnc. iij, chalbanî
 pondo vnc. iij, ceræ pōdo libras ij, terebinthinæ pōdo libras ij, olei pondo † libras iij, aceti quod
 ichthyocollæ irrigandæ sufficit. Sicca læuigata liquidis insperguntur. **E** Aliud Viride. Resinæ pi-
 tyinæ denariū pondo ducentorum, guttæ ammoniaci denariū pondo quinquaginta, opopa-
 nacis denariū pondo octo, ceræ denariū pondo centū, propolis denariū pondo octo, chal-
 banî denariū pondo viij, squamæ æris denariū pondo xij, æruginis denariū pondo xij, alu-
 minis rotundi denariū pondo viij, misyos denariū pondo vij, salis ammoniaci denariū pondo
 viij, chalcitidis denariū pondo v, sulfuris ignem non experti denariū pondo viij, thuris dena-
 riū pondo duodecim, fellis taurini sicci denariū pondo sex, vel humidi denariū pondo xij:
 cyprini heminas sex, alij quatuor: aceti quod satis est. **E** Viride Epicuri multa promittens. Ceræ de-
 nariū pondo ducentorum, colophonix denariū pondo trecentorum, squamæ denariū pondo
 pondo sedecim, æris vsti denariū pondo sedecim, eruginis denariū pondo sedecim, aristolochiæ
 tenuis denariū pondo sedecim, aloes denariū pondo xxiiij, aluminis rotundi denariū pon-
 do xij, myrrhæ denariū pondo xxiiij, chalbanî denariū pondo xxiiij, salis ammoniaci de-
 nariū pondo sedecim, aceti heminas iij, olei heminas ij, interim pauciores. **E** Viride multa
 promittēs Alcimonis vel Nicomachi, ad Fistulas, Nigritias, vel Nomas. Glutinat Ossa, & reducit, Strumas discu-
 tit. Chalbanî denariū pondo sedecim, æris vsti denariū pondo viij, squamæ denariū pondo

† Additur lapi-
dis asij pondo
vncias iij.

† Al. vncias.
iij.

* Al. quique.

* Aliter duode-
cim s.

*Aliter l.

pondo vigintiquatuor, ceræ denariū pōdo quinquaginta, seui caprini vel vitulini denariū pōdo triginta: thuris, resinæ sicca, guttæ ammoniaci, terebinthinæ, nitri, aristolochiæ, singulorū denariū pondo xxv: bryoniæ denariū pondo xij, orcheos herbæ denariū pondo xij, iridis aridæ denariū pondo iij, aloes indicæ denariū pondo xij, scissilis denariū pōdo viij, fellis taurini denariū pondo viij, acetū heminā, olei heminā. Cū inficit, rosaceo. *Viride ad Herpetas, item ad Chironia* & *Difficulter ad cicatricem Venientia Vlcera, vt Andromachus.* Hordei cōbusti denariū pondo x, æruginis denariū pōdo octo, ceræ denariū pondo lxxx, cyprini heminam. Hoc medicamen ærugine multam cōtinet, pro ceræ & cyprini symmetria: nā hordeum cōbustum si per se inspergitur, chironia vlcera iuuat, neq; intēdit ceræ & cyprini vires, neq; æruginis resoluit. Ablato ipso, simile pharmacū redditur multis, quæ superiore libro ad huiusmodi vlcera curationē scripta sunt. Nō tñ multum cyprini assumetur, præsertim si cera pinguis existat, sed quantū ad ceram ærugini admistam emolliendā capere necessariū est. Superiora omnia emplastra hoc nomine vano vsui seruiūt, q̃ medicamenta emollientia, trahentia, digestoria, cōcoctoria, insuper citra mordicationē sic cantia, assumpserint, plurima ipso et valide adstringentia, quorū virtus est humores affectū partī influētes repellere. Porro dictorū medicaminū potestatis materias nominatim in operis de Simplicibus medicamētis sexto, septimo, octauo, nono, decimo, & vndecimo libro exprellas habetis. F Multorum aut hoc cōmentario nominatim meminī, ac iterum meminero. Quin etiā hoc pharma cū in præsentia apposui, eorū quæ nuper dixi mentionē facere desiderans: quia id quoq; superiore libro commemoratis genere simile est, ac proprium magis videbatur illis ipsum appendere.

*Al. viginti.

Icesium nigrum Andromachi. Hoc emplastum Andromachus non vbi viridia tractat: sed superioris propē initium, in symmetria multū euarians, vt prius Critonē & Herā prodidisse indicaui, scribitur hoc pacto. Bituminis denariorum pondo trecentū, terræ ampelitis denariorum pondo ducentorum, argenti spumæ denariorum pondo lx, chalbanī denariorum pondo xxxvj, terebinthinæ denariū pondo xxxvj, scissilis denariū pōdo xxxvj, propolis denariū pondo septuaginta duū, mannæ denariū pondo quinquaginta, myrrhæ denariū pondo xij, iridis denariū pōdo xij, chalcitidis denariū pondo sex, gallæ denariū pondo x, olei cōgium vnum & dimidium, mellis heminæ dimidium. Recte fecit, qui de mina ambiguitate relicta, omnia per denarios conscripserit, vt de solo congio quæstionem instituamus. In hoc enim melius egerunt, qui sex heminas posuere, à triplicato autem bitumine proportionē illius, quod Heras immiscuit, scripturam exorli sunt. Etenim Heras cētum denarios, hic trecentes posuit, etsi in quibusdam exemplaribus non fide dignis, ducentos inuenerim. Terra sanè ampelitis duplo eam, quam Heras scripsit, plangnè exuperat. Argentī autem spuma, quam & ipsam ampelitidi pondere æqualem esse conueniebat, multo minus ab eo iniecta est: nam denarios sexaginta huius miscet. Chalbanī vero triginta sex denarios immittens, proportionem cum Hera & Critone non seruat, quemadmodum in alumine scissili: paululum enim hic ab exacta proportionē declinat, quæ ad triginta septem & s peruenit. In terebinthina sanè parū ab Hera diffidet tātum scilicet, quantum in chalbano & scissili: à Critone verò plurimū, qui minā s inijcere iubeat, quod aliarū ipsius misturā, pportione, ad quinquaginta denarios excedit. Iam verò in propoli non nihil discordat, quantum ad duplicatam proportionem spectat. Item in manna à Critone & Hera recedit, quippe centū denarios, ceu ad illorum proportionem, iniectos esse oportebat. In chalcitide etiam multum admodum à proportionē subtrahit. In alijs parua controuersia est, nisi in melle, cuius heminas tres tanquam ad illorum proportionem immisisse ipsum cōueniebat, at is heminæ dimidium adiicit. Ita quoq; in oleo, tres congios miscuisse debebat, si non à Critone discrepare voluisset: si verò cum Hera cōuenire, octo decim heminas: verum ipse cōgium & dimidium conscripsit.

*Al. lxxvj.

Vt Tarentinus Heraclides Icesii Nigrum Emplastrum tradiderit.

CAP. 6.

A Domne V ulnus, maximè quæ in extremis partibus sunt, dolore vindicat & conglutinat. Item Canum morsus, & Furunculos sanat. Duritias discutit, præsertim mammillas obsidentes. Ani Condylomatis succurrit.

† Al. hemine dimidium.

Argentī spumæ denariū pondo centum, bituminis tantundem, terræ ampelitis idem pondus, mannæ denariū pondo viginti quinque, propolis totidem, chalbanī denariū pondo duodecim & semissis: aluminis scissi, resinæ terebinthinæ, pares mensuras: iridis denariū pondo sex, chalcitidis denariū pondo septem & semissis, gallæ denariū pondo octo, myrrhæ tantundē, mellis heminam vnam, olei immaturi † heminas sex. Argentī spuma, bitumen, & terra, cū oleo coquuntur, & spatha ex tedarum ligno mouentur: cum constiterint, propolis, resina, & chalbani adduntur: hæc autem prius melle incoquuntur: quibus mistis, olla statim ab igne tollitur, & sicca insperguntur. Hæc cum Heraclides tradiderit in libris ad Antiochidem, demiror quomodo non nulli post eum scripturam ipsius non obseruauerint. Heras sanè vbique Heraclidem imitatus esse videtur, præterquam in myrrha & galla. Nam dum Heraclides vtriusque horū denariū pondo octo miscet, Heras vtriusq; sex iniecit. Insuper Asclepiades in secundo libro de Exterioribus, omnia proportionē quadruplo maiore quàm Heras tradidit. Adde quod olei omphacini heminas duodecim, Crito cōgios duos, cōscripserit, & si omnia duplicata compositio ipsius habeat. Quare nō nulli mihi videntur adscripsisse, heminas duas. Quod ipsum rursus tum veritati,

A tati, tum Hera & Tarentini scripturæ, magis aduersatur. Siquidem Heras centum octoginta denarios posuit, in pondus non mensuram oleum reducens, tanquā hemina denarios sexaginta pendente. Nam Attica nouem Italicas vncias conficit: pendunt enim nouem Italicæ vnciæ, quas in cornibus infectis metiuntur, septem vncias ponderales & semissem, quæ sexaginta denarii fiunt, singulis vncijs octo denarios recipientibus. Quare etiam hic cum Heraclide Heram consentire videas, cum tres heminas iniiciat, † Asclepiades duodecim, quoniam omnia in ipsius compositione quadrupla sunt. Heras autem, quoniam pharmaci in Tarentini scriptura magna moles fieret, videtur mihi quartam omnium portionem posuisse. Nam in myrrha, vt dixi, & galla paululum mutare videtur. Ac cum alij quoq; hoc Icelij emplastrū tradiderint, qui exactius, in eo cuius præparationem ex coctione coniecimus, Tarentino concordēs facti sunt: qui autem negligentius, vel in vno solum, vel in pluribus simplicibus, dissonasse ab Heraclide videntur. Proinde superfluum fuerit de ijs mentionem facere: præparandum enim medicamentum est, vt Heraclides iussit, vel vt Heras, qui parum adeo inter se differunt. ¶ Heraclides Liten Icesion hanc esse dicit. Bituminis denariū pondo quinquaginta, argenti spumę denariū pondo quinquaginta, olei heminas decem: coquito: vbi coierint, ceræ denariū pondo quinque inijecto: chalbani, myrrhæ, singulorum denariū pondo quinq;

† Al. Heraclides.

Cyzicenum Hera.

CAP. 7.

Hoc quoq; inter celebria emplastra refertur, ab omnibus probè conscriptum, magno in simpliciū medicamentorum symmetria consensu. Non nulli tamen discordāt, vt innotescet, cum subiungemus, quomodo quisq; componendum censeat. Heras igitur de præsentī emplastro ita ad verbum scribit. ¶ Cyzicenum. Facit ad recentia Vulnera, & Vetera depascentia. Duritias præsertim in manibus discutit, extrahit, repurgat, implet, glutinat, cicatricem ducit. Tollit Cancrosas durities, Male curata reficit. Et in quibus scalpello vti non licet, vt in ceruice, collis, loco vitor. Abscessus furentes mitigat, Chymata discutit, Ganglia & contractiones siue coitus dissoluit abruptis q; Tela, ossa, lignorum fragmenta educit, Crustas citra dolorem deijcit. In depascentibus, magnis splenis vti oportet. Insuper Strumas dissipat, Hæmorrhoidas cohibet, & Vesicæ morbus summè prodest. Hæc autem recipit. Thuris, myrrhæ, croci, iridis illyricæ, bdellij, singulorum denarios quatuor, squamæ denariū pondo duodecim: chalcanti, aluminis scissi, rotundi, guttæ ammoniaci, misyos, putaminum mali granati dulcis, singulorum denariū pondo quatuor: aristolochiæ, gallæ omphacitidis, vtriusque denariū pondo octo: chalcitidis denariū pondo quatuor: † visci quercini, opopanacis, æruginis rasæ, acaciæ, floris rosarum, singulorum denariū pondo octo: terebinthinæ pondo minam, alij denariū pondo quinquaginta: liquoris papaueris denariū pondo sex: ceræ minas duas, secundum alios denariū pondo quatuor: seui vitulini curati minam, alij denariū pondo centum quinquaginta: aceti communis heminas viginti: vini, quod sufficit, in sicca immittitur. Hec de Cyziceno cum Heras scripserit atque Andromachus, videbitur quibusdam maxima esse dissensio, cum Heras thuris, croci, myrrhæ, & eius, quod deinceps ab eo positum est, denariū pondo quatuor immiserit, Andromachus octo. Verum quod iam prius obseruandum nobis esse dicebam, id etiam nūc dicturus sum. Si omnia simplicia pharmaca licet duplicata horum, quæ alij scripserunt, misceas, eadem fiet symmetria, quemadmodum si & triplicata omnia iniicias: ac nūc Andromachus omnia ferè duplicata miscuit, cum Heras simplicia ipsa indiderit. Ac etiam hic discrepant, quod ille aloen addat, Hera secus faciente. Quin etiam in panacis radice differentia est, cum Heras opopanacem tantum scripserit, Andromachus non hoc solum, sed etiam panacem: solent autem sic vocare radicem herbæ, quam panacem appellant. Adiecit autem Andromachus papaueris liquorem, doloris euitandi gratia: acaciam verò & rosarum florem, tanquā adstringentia. Porro coctionem pro more suo Heras adiunxit, Andromachus omittit, quippe qui ipse etiam raro illam soleat apponere. Cæterum ex eo, quod in calce aceti communis heminas duas & vinum siccis infundit, planè innuit se arida ex vino vel aceto lauigari velle, deinde liquefacta his superfundi: Heras autem neque omnino aceti aut vini meminit, & ad calcem coctionis ita adscripsit: Cæterum arida & opopanacem in cacabum conficito: & vbi vnita fuerint, defundito, mollito q;, irino vnguine manus inquinās. Ego ipsum Andromachi more conficio, opopanacem cum siccis in mortario terens: si valentius, & quod magis digerat, medicamentum facere desiderem, acetum inter lauigandū admiscēs: si magis adstringens repellens q;, vinum: quemadmodum rursus & id nūc austerum, nunc gilui, nunc vetus, nunc ætate mediū assumens: Nam quod austerum est nec vetus, magis adstringit: quod vetus nec austerum, valentius digerit.

* Hæc dictio in aliquibus exemplaribus non inuenitur.

Al. xvi.

† Al. additur Ammoniaci gutta drachmas quatuor.

Aliter v.

* Aliter cviii.

* Aliter ii.

Cyzicenum, vt Asclepiades.

CAP. 8.

Scriptum est hoc emplastrum iam & in quarto, vbi omnia ordine, quæ ad malignitatem phar-
Smaca habere consuluit, commemorauimus. Et verò nunc, quia ipse pariter ab Hera & Andromacho euariat, satius mihi esse videtur ipsius verbis in tertio libro de Exteriorum pharmacis tradita subiungere. ¶ Cyzicenum. Facit ad Diutinos affectus, & Nervos præcisos. Thuris quàm optimi, ceræ, myrrhæ, aristolochiæ, chalcitidis, illyricæ, chalbani, singulorum denariū pondo quatuor: terebinthinæ, argenti spumæ, singulorum denariū pondo octo: olei heminam. Omnia in

Quinta Classis.

iiii ij vas

vas æreum coniecta, supra leuem prunam coquuntur mouentur q̄, donec in aqua frigida demer E
sum, mellis spissitudinē habeat: postea mouēdo tollitur. Hoc illitum pelliculę imponitur: hyeme
post septimū diem, æstate post quintum, soluitur. *¶ Aliud ex ijs, quę ad Philoxenum referuntur.*

Thuris, myrrhæ, croci, illyricę, bdellij, squamæ æris, chalcanthi, chalcitidis, aluminis rotundi &
scissilis, misyos peregrini, guttæ ammoniaci, propolis, visci quercini, opopanacis, malicorij præclu
si, singulorum denariū pondo iiij: aristolochiæ denariū pondo octo: cerę, seui taurini, singulorū
denariū pondo centū, quod minā inscribit: resinæ terebinthinæ denariū pondo quīdecim, quod
tres quartas appellat. Resina in ollam fictilem coniecta, donec odorem amittat, cōcoquitur: dein
de seuum & cera derafa inijciuntur, & liquefiunt: arida contunduntur, & cribro tenuissimo in
cernuntur. Postea liquida ab igne tolluntur, quibus aliquatenus refrigeratis arida insperguntur,
& curiosē mouentur. Habere autem oportet ex aceto trita, myrrham, thus, bdellium, opopanacē,
quibus quę in olla sunt, adijciuntur, teruntur q̄, ne grumi cerę modo fiant. Vbi autem rectē ha
buerint, in lignea pyxide irino vnguento prius illita reponuntur.

Emplastrum ex duabus Aristolochijs vt Andromachus.

CAP. 9.

DE hoc in eam sententiam scribit Andromachus ad verbum. *¶ Emplastrum ex duabus Ari
stolochijs.* Resinę frictę pondo libram, cerę pondo libram, picis pondo libram, ciceos vel olei F
veteris heminā vnam & cyathos duos, cerussæ pondo vnc. vj, eruginis pondo vnc. vj, chalcanthi
pondo vnc. iiij, mannæ pondo vncias sex, aristolochiæ longæ pondo vnc. iiij, rotundæ pōdo vnc.
iiij, erethricę pondo vnc. sex, illyricę pondo vnc. iiij, gallę vncias duas, aceti heminam: ego amplius
malicorij pondo vncias duas. Sicca ex aceto teruntur, deinde liquabilia.

Emplastrum ex Dictamno Damocratis.

CAP. 10.

Diximus frequenter metricas scriptiones non solū ad memoriā, sed etiā ad misturas exactē
cōmensurandas, prosa oratione conscriptis esse cōmodiores. Cuius gratia etiā nunc me
dicamentum ex dictamno perfectam in Damocratis scriptis symmetriam perferuans apposui.

Emplastrorum vnum insignium numero adscribitur,

Solum q̄, quod recipit dictamnū creticū

Dictū. Medetur prosperē serpentium

Percussibus venenatis, ac moribus

Quadrupedum cunctorum, et si rabies quędam agat.

Iuuat vlcera callos, & neruos perditos,

Et musculos, & alto chartilagines

Corpore putrescentes, quę incumbunt ossibus.

Colli, mammillarum, dorli quoq; vlcera,

Per sanat, & diu si iam durauerint.

Ac omnia simul, quę facere paulo antea

Dixi, emplastrum nomine scilicet Ægyptium.

Hoc admodum cū sit bonum, quidam omnibus

Vnum boni s reputant vsu præst antius,

Haudquaquam nempe experti multa pharmaca.

Concinnatur misturis his. Lithargyri

Drachmas habet ducentas: istis additur

Olei vetusti libræ quarta portio,

Alij magis quartam volunt partem heminæ.

Et quinquaginta cerę drachmas ponticę,

Colophonię probæ q̄ plus cera duplo:

Alij malunt terebinthinę parem modum.

Æruginis quoq; aloes nec non indicę,

Item combusti æris, & diphrygis boni,

Cuiusq; sedecim, semissem q̄ ponito.

Quaternas & vigenas drachmas chalbanī,

Mannæ pares, thuris q̄ bis duodecim,

Ammoniaci viginti bis q̄ & quinq; bis,

Et sedecim iungantur propolis atticæ,

Aristolochię longæ bis drachmæ decem,

Æris cyprij squamę drachmæ duodecim,

Et gentianæ radicis siccissimę

Æquale, cunctis herbę his dictamni quoq;

Siccę, sed habentis florem, drachmas bis decem,

Læuis. Lithargyrum at cum oleo demittito

Ollæ recentī, cui patulum os figulus dedit.

Pruna leni coques, mouens rudicula,

Quousq;

A Quousq; spissitudo mellis attici
 Fiat. † Paribus at squamæ immixtis partibus, †
 Rursus magis coquas: ac postquam pharmacum
 Giluum fuerit, æs misceas & diphryges:
 Crassum q; reddens pharmacum, vt non polluat,
 Ceram, resinam q; vnà dictis addito.
 Quibus liquatis, vbi probè coierit
 Emplastrum, ab igne tolles: cum q; adieceris
 Propolim q; mannam q; aloen, atq; chalbanum,
 Ammoniacum q;, tunc vbi refrixerit,
 Feruor q; ignitus pharmaci sublederit,
 Aristolochiam perquam leuissimam,
 Et gentianam dictamnum q; inspergito,
 Spatha atq; medicamentum agitando sedulo,
 Manibus tibi magdalias ipse effingens habe,
 B Ea q; mala, ad quæcuncq; est prædictum, vti tor.

† De Pastillis Asclepiadis. †

CAP. 11.

Quemadmodum emplastra à colore, non à facultatis professione, nominant quidam medici melina, candida, fusca, & gilua: ita pastillos græcè trochiscus, ab efformationis figura vocant, non ad vnum affectum sed ad admodum multos conferentes. Nos quoq; igitur ipsos imitati, deinceps omnes præclaros siue pastillos, siue orbiculos (vtroq; enim nomine appellantur) describemus. Recitè autem illi singulis, quid possent efficere, præposuerunt, præsertim Asclepiades, cuius etiam primæ pharmaca, quæ in tertio de Exterioribus libro prodidit, apponam.

† Al. hoc totum expurgatur, ac inferius apponitur.

* **Pastillus Asclepiadis.** Aristarchi Tharsei pastillus ad plura vitis. Facit ad recentia Vulnera & Vetera. Prodest Teredimibus, & Fauis. Curat Fistulas, Aures suppurantes, Ossa corrupta, Nomas. Reprimit omnem Carum excrescentiam, tollit Pterygia, valet ad Vteri affectus. sanat Ozenas, Phagedenas, Condylomata. Iuuat Inueterata & quæ difficilem curationem habent. Vitis est principio Phthisicis, Lienosis, Cæliaci, Dysentericis, tribus obolis in potu familiari datus. Succurrit Synanchicis, Gingiuarum nomis. In summa Exterioribus & Interioribus vitis auxiliatur. Myrrhæ denariū pondo sex, croci denariū pondo trium, crocomagmatis denariū pondo trium, cytinorum denariū pondo sex, chalcanthi denariū pondo sex, aluminis scissilis denariū pondo sex, aloes denariū pondo sex: vino falerno excipiuntur, fiunt que orbiculi seu pastilli, & in vmbra desiccantur. Vbi vsus necessitas est, humido congruenti diluuntur ad commemoratos affectus. **Pastillus Neapolitani.** Myrrhæ, thuris, singulorum denariū pondo sex: galleg, lycij, aluminis, crocomagmatis, aloes, singulorum pondo denariorum octo: cytinorum denariorum pondo duodecim, æris denariū pondo octo: vino falerno excipiuntur.

* Al. de Pastillis Asclepiadis.

Andronius inscriptus. Cytinorum denariorum pondo decem, scissilis denariorum pondo quatuor, chalcanthi denariū pondo duodecim, myrrhæ denariū pondo quatuor: thuris, aristolochie, gallæ immature, singulorum denariū pondo octo: passi heminas duas. Apud Heraclidem verò ita habet. Malicorij denariū pondo decem, aristolochiæ denariū pondo octo, gallarum denariū pondo octo: salis ammoniaci, thuris, scissilis, denariū pondo quatuor: chalcanthi denariū pondo duorum, myrrhæ denariū pondo quatuor, hæc passo excipiuntur. **Polyide Sphragis.** Malicorij denariū pondo sex, myrrhæ denariū pondo octo, aluminis scissilis denariū pondo v, thuris denariū pondo quatuor, aloes denariū pondo octo, chalcanthi denariū pondo iij, fellis taurini denariū pondo sex: vino dulci excipiuntur. **Coracine Sphragis.** Facit ad Tonsillarum phlegmonas, & Vnas laxatas. Gingiuas madentes resiccat, Nomas curat, & Sedis affectus. Fistulas Callum extern.

D Aristolochiæ creticæ rotundæ, cytinorum, chalcitidis tostæ, thuris, myrrhæ, chalcanthi, crocomagmatis, aloes indicæ, fellis taurini, singulorum pondo denariū octo: passi quantum satis est.

Pastillus ad Nomas. Brathyos denariū pondo quinquaginta, myrrhæ denariū pondo triū: foreos, cypèri, chalcanthi, thuris, singulorū denariū pondo duū: vino excipiuntur. Aliæ scripturæ habent, oleæ foliorum denariū pondo duū: myrti liccæ, orcheos herbæ, vtriusq; denariū pondo quatuor: arsenici, quod auripigmentum vocant, denarij pondo vnus: myrrhæ denariū pondo iij. **Ex scriptis Herachidis.** Orcheos denariū pondo duū, arsenici denariū pondo iij, galleg denariū pondo octo, squamæ denariū pondo sex, foreos denariū pondo octo, myrrhæ denariū pondo duū, thuris denariū pondo duū, acaciæ succi denariū pondo duū: vino excipiuntur. **Pastillus ex Plantis seu Stirpibus inscriptus.** Malicorij, myrti foliorum, nucis putaminum liccorum, spinæ fructus, singulorum denariū pondo octo: galleg denariū pondo iij, salis fossicij denariū pondo octo. Oia cōminuuntur, friabilia in aceto macerant, ac in vas fictile coniunguntur: deinde torrenē, & cū aceto leuigantur. Vbi bene habuerint, myrrhæ denarios iij, thuris denarios ij, inijcito, & pastillos fingito: vsus eius est cum aceto. **Pastillus, qui à Terentio inscribitur Stypticus hoc est adstringens.** Facit ad quamlibet Nomen, & Ani affectus. Sandarachæ, misyos, chalcanthi, aluminis scissilis, singulorum pondo denariū duū: myrrhæ, squamæ æris, aloes, chalcitidis, singulorū pondo denariū trium:

* Aliter iij.

* In aliquibus hæc ductio non est.

* Aliter ii.

* Aliter ii.

* Al. & tra scilicet postea.

Quinta Classis.

iiii iij cytinorum

cytinorum mali punicea, rosarum floris, galle, singulorum pondo denarium iij: acacie succi pondo denarium octo, mali granati putaminum pondo denarium octo: excipiuntur myrtorum decocto ad dimidias coctorum. *¶ Pastillus ad Serpentia, Arei ad Herpetas.* Terrae cimolie pondo denarium octo, misyos torridi denarium pondo sedecim, minij sinopici pondo denarium trium. Singula cum aqua seorsum terito: deinde simul miscens in pastillos digerito: vsus est ex aceto. *¶ Alius ex Origano.* Origani, oleae foliorum, acacie, chalcanti, salis hispani, singulorum denarium pondo duum: aceto excipiuntur. *¶ Ex collectaneis Largi Medicamentum confectum.* Argenti spumae, vel cerussae, pondo denarium triginta octo: aluminis fissi pondo denarium xij, acacie pondo denarium octo, croci, thuris, diphrygis, opij, singulorum pondo *†* denarium duum: ex aqua terito, ac formato pastillos: vsus est ex aqua. *¶ Aliud valde generosum.* Aluminis rotundi, chalcitidis, cretae sutoriae seu melanteriae vel foreos, singulorum denarium pondo duum: misyos, malicorij, vtriusque denarium pondo iij: chalcis viuæ denarium pondo sedecim, aceti sextarium. Mali cortex in aceto decoquitur, ac cum dissolutus fuerit, teritur cum acacia, postea ceteris adijciuntur: & vbi bene habent, fiunt pastilli: cum opus est, diluuntur aqua. *¶ Pastillus Threpti ad serpentia Vlcera, & vbi Pastionem oportet si stere.* Facit etiam ad Oris vitia, ad Aures suppuratas. Item Curis vitia, quæ ex æthematâ vocant, tollit. Carnis Excrescentiam reprimat. Narium Vlcera, & Sedus affectus sanat. Corticis malorum puniceorum pondo denarium x, galle omphacitidis pondo denarium octo, aristolochie tantundem, aloes pondo denarium iij, myrrhe pondo denarium viij, fissi pondo denarium duum, thuris pondo denarium quatuor, chalcanti pondo denarium iij: passo excipiuntur. *¶ Pastillus Gilui Hieracis Thebani ex Halicaccabis i. vesicariis.* Facit ad Capitis Vlcera, Epiphythidas, & Narium Vlcera, quæ Græci Phyracis nominant. Iuuat Rhagadas, & quæcunque citra dolorem ad cicatricem voles ducere. Cerussae pondo libram, spumæ argenti pondo libras x: aluminis fissi, halicaccabi hoc est vesicariæ corticis, chalcanti, sinopidis, singulorum pondo selibram: aceto excipiuntur. *¶ Lucij Præceptoris pharmacum confectum.* Aluminis, æruginis corinthiæ, minij synopici, singulorum mensuram heminae æqualem: aceto diluuntur. *¶ Ex libris Arei ad Psoras depascentes, Serpentia, Carnem excrescentem, Pterygia, Aures suppurantes, Vlcera curatu difficilia. Sanat Rhagadas & Condylomata.* Scissilis, minij sinopici, æruginis rasæ, gummi, galle, cytinorum, singulorum pares portiones, aceto diluuntur. *¶ Magni Philadelphi ad prædictas dispositiones.* Aluminis fissi, æruginis corinthiæ, calcithidis, minij sinopici, gummi, singulorum pares mensuræ partes: aceto subiguntur. *¶ Pastillus ad Erysipelata.* Croci pondo denarij vnus, opij tantundem, cerussae pondo denarium duum: passo diluuntur. Alia lectio habet, glaucij pondo denarium octo. *¶ Andromachi Crocosus.* Argenti spumæ pondo denarium quatuor, hoc est vncie dimidium: cerussæ vncias iij, sulfuris ignem non experti pondo vnciam: croci, opij, singulorum pondo vnciam vnâ: succo solani excipiuntur. Cum opus est, passo diluuntur. *¶ Cai Neapolitani.* Cerussæ, acacie, glaucij, opij, cuiusque parem mensuram: passo subigito, & continuè perungito. *¶ Aliud.* Cerussæ, acacie, singulorum pondo denariorum octo: guttae ammoniaci pondo denarium iij, croci pondo denariorum duum, opij pondo denariorum duum: succi polygoni, vel sereos, vel solani, vel cynoglossi. *¶ Ex libris Agathini.* Cerussae pondo denariorum sex: mannæ, thuris, singulorum denarij pondo vnus: crocomagmatis, sulfuris ignem non experti, singulorum pondo denarium duum: ex ouis assatis vitellorum pondo denariorum sex: passo excipito. *¶ Ad Rhagadas & Condylomata.* Curat etiam Ani Rhagadas et Nomas, Menes thei pharmacum. Aloes pondo vncias sex, croci pondo vncias tres, aluminis fissi pondo vncias tres: vino diluuntur, & fiunt pastilli: in vsu liquor dispositioni respondeat. *¶ Apollophanus, ad Rhagadas & Condylomata.* Stimmeos denarium pondo viij, acacie denarium pondo sex, æruginis denarij pondo vnus, opij denarium pondo duum, thuris denarij pondo vnus, myrrhe denarium pondo duum, gummi denarium pondo iij: vino maris experte pastillos fingito. *¶ Vt Nicolaus.* Stimmeos pondo denarium viij, acacie tantundem, æruginis pondo denarij vnus, opij pondo denariorum trium, myrrhe pondo denarium iij, gummi tantundem: vino excipito. *¶ Magni ad Rhagadas, & Condylomata, sistit Nomas.* Aloes pondo denarium octo, acacie pondo denarium iij, galle pondo denariorum duum, croci pondo denariorum duum, thuris pondo denarij vnus, myrrhe pondo denarij vnus: vino subiguntur. *¶ Pastillus Dia chylon id est ex succis, inscriptus, ad Nomas & Scabiosos affectus.* Licij indici, aloes indici, myrrhe, eris, aluminis scissi, chalcanti, cytinorum, thuris, singulorum pondo denarium iij: succi myrtorum hemine dimidiu: componito, & in pastillos digerito. *¶ Petronij pastillus, qui Virtus appellatur, medicamentum ad Rhagadas, & Condylomata, in magnis Doloribus accommodatum, & cito liberat.* Stimmeos, acacie, plumbi combusti & eloti, singulorum pondo denarium sedecim: cineris cyprij, erice fructus, aluminis fissi, thuris, chalcanti, myrrhe, opij, singulorum pondo denarium viij: vino excipiuntur, & fiunt pastilli. Cum vtendum erit, passo diluuntur.

Pastilli ab Andromacho conscripti libro de Exterioribus.

CAP. 12.

Pastillus Darij, qui per anum immittitur. Stimmeos pondo denarium sedecim: acacie tantundem, alij octo: æruginis pondo denarium quadraginta: succi papaueris pondo denarium trium, quidam duum: gummi pondo denariorum iij, myrrhe pondo denarij vnus: thuris pondo denariorum triu, alij vnus: vino, vel vt alij aqua, diluuntur. *¶ Pastillus Multiplicis vsus, & Pus educens, & relaxans.* Corticis thuris pondo denariorum duum, eris squame pondo denariorum iij: cum vi-

no factos

* Al. sex.

† Al. vnc. ii.

* Al. xlviii. hoc est vnc. sex.

* Al. denarij pondo xx.

Al. duorum.

A no factos ex melle diluito. *C Musæ Remedium.* Aluminis scissi, aloes, myrrhæ, chalcanthi, singulorum pondo denarium sex: croci, crocomagmatis, singulorum pondo denarium triū: cytinorū pondo denariū iij: mulso ex falerno factio excipiuntur. *C Ad Erysipelata ex Agathole.* Cerussæ pōdo denariū octo: aluminis rotundi, crocomagmatis, sulfuris ignem non experti, singulorū pondo denariū duū. Tritis solani succus superfunditur: & pastilli, dum vsus postulat, vino austero formantur. *C Isidori ad Nomas.* Lanæ succidæ pondo denariū xl: scobis plūbi, squamæ, bituminis, singulorum pondo denariū x: aluminis fissi, rotūdi, mali punici corticis, gallæ, misyos, chalcitidis, thuris, singulorum pondo denariū v: myrrhæ pondo denariū duū: amurcæ heminas octo, vel siccæ quinç. *C Pastillus Niger, quo vitor.* Malicorij denariū pōdo x: aristolochiæ, gallæ, singulorum pondo denariū octo: aluminis fissi, aloes, singulorum pondo denariū iij: myrrhæ, chalcanthi, pondo denariū duū: thuris pondo denariū iij: vino excipiuntur. Et cum res exigit, vino dulci diluuntur. *C Pastillus ex Vesicarijs.* Argenti spumæ pondo denariū v: gintiquatuor: cerussæ pondo denariū xij, vel vigintiquatuor: halicaccabi radicis pondo denariū octo: chalcanthi, aluminis scissi, singulorum pondo denariū iij: minij quantum ad colorē accipiendū satis est: ex aqua subigunt. *C Pastillus ex Origano.* Oleæ foliorum viridiū pondo denariū octo, mali punici corticis pondo denariū sex, origani pondo denariū iij, acaciæ pondo denariū xij: chalcitidis, aluminis scissi, misyos, singulorum pondo denariū iij: vino austero diluuntur.

* Aliter iij.

* Al. viginti.

B octo, mali punici corticis pondo denariū sex, origani pondo denariū iij, acaciæ pondo denariū xij: chalcitidis, aluminis scissi, misyos, singulorum pondo denariū iij: vino austero diluuntur.

C Pastillus ex Rhu. Gallæ pondo denariū triū, acaciæ pondo denariū iij: chalcanthi pondo denariū v, chalcitidis † denarij dimidium, } aluminis fissi pondo denariū octo, rotundi pondo denariū iij, misyos pondo denariū triū, malicorij pondo denariū v, squamæ pondo denariū iij: myrrhæ: aloes, aristolochiæ, singulorum pondo denariū duū: thuris corticis pondo denariū iij, taurocollæ pondo denariū triū: rhu excoarj chœneis quartam partem, alij dimidiū: aceti heminam vnam & s, ex quo rhus madefiet ac teretur. *C Polydæ Sphragis.* Aluminis fissi pondo denariū triū, thuris pondo denariū iij, myrrhæ tantundem † vel pondo denariū octo, } chalcanthi pondo denariū duū, cytinorū pōdo denariū xij, fellis taurini pondo denariū sex, aloes pōdo denariū octo: vino austero excipiuntur. *C Pastillus Andronius.* Cytinorū pōdo denariū x, gallæ pondo denariū octo: myrrhæ pondo denariū iij, secundum alios octodecim: aristolochiæ pondo denariū iij, chalcanthi pōdo denariū duū: aluminis fissi tantundem, alij pōdo denariū iij: misyos cyprij pondo denariū duū: passo diluuntur. Vtere ad multa polychresto pharmaco. *C Pastillus Achille.* Spumæ, misyos, aloes, singulorum pondo denariū duū: aristolochiæ pondo denariū octo, aluminis fissi pondo denariū quatuor, myrrhæ pondo denariū duū, thuris pondo denariū quatuor, gallæ pondo denariū octo, chalcanthi pōdo denariū † duū, corticis mali punici pōdo denariorum octo, fellis taurini pondo denariorum duū: aceto subiguntur. *C Pastillus ad Nomas Isidori celebris.* Manne, thuris, singulorum pōdo denariū xxx: cytinorum, aluminis fissi, gallæ, cuiusq; pōdo denariorum octo: chalcanthi, aristolochiæ, myrrhæ, misyos cyprij, calcis viuæ, singulorum pondo denariorum x: acaciæ pondo denariorum octo: excipiuntur vino, vel aceto: & lauigata vsui sunt. *C Pastillus alius ad Multa.* Gallæ pondo denariorum octo, cytinorum pondo denariorum xij, æris combusti pondo denariorum octo, æruginis pondo denariorum sex, aluminis fissi pondo denariorum octo: chalcanthi, acaciæ, fellis taurini, thuris, aloes, lycij, myrrhæ, aliās & misyos, singulorū pondo denariorum octo. Sub canis æstu, multo aceto teruntur. *C Pastillus Apollonij Archistratoris Smilinis, vt Alcimion, in vsu multiplicem.* Cerussæ pondo denariū decem, argenti spumæ pondo denariorū v, aloes pondo denariorum quinquāgin ta, aluminis fissi pondo denariorum iij, thuris pondo denariorum quatuor, myrrhæ pondo denariū iij, cimoliæ pondo denariorum xxv: vino excipiuntur, interim cum vino & rosaceo vitor.

* Al. denarium pōdo dimidiū.

† In quibusdā cod. hæc nō habentur.

* Al. xviij.

C Pastillus Achille. Spumæ, misyos, aloes, singulorum pondo denariū duū: aristolochiæ pondo denariū octo, aluminis fissi pondo denariū quatuor, myrrhæ pondo denariū duū, thuris pondo denariū quatuor, gallæ pondo denariū octo, chalcanthi pōdo denariū † duū, corticis mali punici pōdo denariorum octo, fellis taurini pondo denariorum duū: aceto subiguntur. *C Pastillus ad Nomas Isidori celebris.* Manne, thuris, singulorum pōdo denariū xxx: cytinorum, aluminis fissi, gallæ, cuiusq; pōdo denariorum octo: chalcanthi, aristolochiæ, myrrhæ, misyos cyprij, calcis viuæ, singulorum pondo denariorum x: acaciæ pondo denariorum octo: excipiuntur vino, vel aceto: & lauigata vsui sunt. *C Pastillus alius ad Multa.* Gallæ pondo denariorum octo, cytinorum pondo denariorum xij, æris combusti pondo denariorum octo, æruginis pondo denariorum sex, aluminis fissi pondo denariorum octo: chalcanthi, acaciæ, fellis taurini, thuris, aloes, lycij, myrrhæ, aliās & misyos, singulorū pondo denariorum octo. Sub canis æstu, multo aceto teruntur. *C Pastillus Apollonij Archistratoris Smilinis, vt Alcimion, in vsu multiplicem.* Cerussæ pondo denariū decem, argenti spumæ pondo denariorū v, aloes pondo denariorum quinquāgin ta, aluminis fissi pondo denariorum iij, thuris pondo denariorum quatuor, myrrhæ pondo denariū iij, cimoliæ pondo denariorum xxv: vino excipiuntur, interim cum vino & rosaceo vitor.

* Aliter viij.

C Ad Erysipelata, quo vitor. Argenti spumæ pondo libras septem, cerussæ pondo denarij vnus: Dopi, † sulfuris ignem non experti, } croci, singulorū pondo vncias tres: passo excipiuntur. Cum vsus est, passo diluuntur. *C Glaucy ad Multa faciens.* Aluminis liquidi pondo denariorū c, myrrhæ pondo denariorum octo, croci pondo denariorū octo: passo diluuntur. *C Ad Erysipelata bonus.* Acaciæ pondo denariorum octo, misyos pondo denariorum iij, opij pondo denariorū duū, thuris pondo denariorum iij: cum aceto excipiuntur. Facit etiam ad Herpetas. *C Alius ad Eadem.* Opij pondo denariorum quatuor, acaciæ pondo denariorū quatuor, diphrygis pondo denariorum quatuor, aluminis fissi pondo denariorum quatuor: ex aqua diluuntur. Cum aceto vitor.

* Al. Melinus.

* Aliter iij.

* Al. duorum.

C Alius ad Erysipelata. Cerussæ pondo denariorū octo, sulfuris ignem non experti pondo denariorum quatuor, papaueris pondo denariorum duū, rutæ foliorum pondo denariorum duū, aluminis fissi pondo denariū iij, cimoliæ pondo denariū duū, amyli pōdo denariorum duū: melle & aceto diluuntur. *C Ad Herpetas Tybery Cæsaris.* Diphrygis, meconij, aluminis fissi, acaciæ, singulorum pondo vncias tres: aceto vel aqua diluens vitor. *C Cerantis vsus multiplicis.* Arsenici denariorum pondo trigintaduū: aristolochiæ denariū pondo trigintaduū, alij octo: iridis denariorum pondo trigintaduū: gallæ pondo denariorum sedecim, alij octo: aluminis rotundi denariorum pondo sex, chalcitidis denariorum pondo sex, squamæ æris denariorum pondo sedecim, chalcanthi denariorum pondo octo, resinæ siccæ denariorum pondo octo, aceti con-

† In aliquibus non sunt hæc verba.

glos quatuor, caniculæ sub æstu æreo mortario & cochleario læuigantur. Quod si æreū mortariū E non habeas, squamæ minā iniicito, quæ valet denarijs centum. *¶ Pastillus cognomento Buhynus in Sicilia confectus, ad Nomas, Fistulas, Pterygia, cum duplici cerato, ad Herpetas, Erysipelata, & alia.* Mali punici corticis denariū pondo vj, gallæ denariū pondo vj, iridis illyricæ denariū pondo iij, aristolochiæ denariū pondo vj, chalcanti denariū pondo iij, aluminis fissi denariū pondo sex, chalcitidis denariū pondo vj, misyos denariū pondo iij, nitri denariū pondo ij, thuris denariū pondo duū, cadmiæ denariū pondo vj, æris squamæ denariū pondo iij, chrysocollæ denariū pondo f duū. Ex aceto sub caniculæ æstu præparato. *¶ Pastillus ad Condylomata, & An inflammationes, & Pterygia.* Thuris, acaciæ, stimmeos, singulorū denariū pondo f ij: æruginis, myrrhæ, opij papaueris, gūmi, nardi celticæ, singulorū denariorū pondo f ij: ex vino aultero trita inunguntur.

Arida variæ speciei seu generis, à prænominais authoribus indicata, quibus singula conueniant.

¶ Quæ scripsit Andromachus in calce operis de Exterioribus.

CAP. 13.

† Al. unius.

† Al. xxx.

† Al. vnus.

* Aliter I.

Aridum exedens sine morsu. Sandarachæ denariorum pondo duorum, arsenici denariorum pondo ij, chalcis viuæ denariorum pondo iij, manne denariorum pondo quatuor: tritis vtitor.

¶ Facultas Sanguinem comprimens, qua vtor. Chalcitidis, misyos, mannæ, singulorum denariorum pondo iij, alij ij: tritis vtitor. *¶ Flaua, qua vtor.* Chalcitidis pondo denariorum c: atramenti sutorij, Græci vocant chalcanthon, denariorum pondo l: misyos torrefacti denariorum pondo xxv, æris combusti denariorum pondo xij & s: læuigatis vtitor. *¶ Sanguinem suppressens, magna.* Misyos cypr. j denariorū pondo vij, atramenti sutorij totidem, corticis picæ denariorum pondo iij, mannæ thuris denariorum pondo iij, squamæ æris denariorum pondo iij, æris vsti denariorum pondo xv, chalcitidis denariorum pondo xv: calcis viuæ denariorum pondo octo, alij denariorum pondo xl: gypsi torrefacti denariorum pondo iij, alij v: tritis vtitor. *¶ Sanguinem cohibens*

* Aliter ii.

Aphrōde. Chalcitidis denariorū pondo sex, mannæ thuris denariorum pondo ij: resinæ terebinthinæ, friciæ, singularum denariorum pondo iij: vtere tritis ad hæmorrhoidas. *¶ Aliud vt Harpocras.* Sandarachæ denariorum pondo ij, arsenici denariorum pondo iij, calcis viuæ denariorū pondo octo. Pastillos fingito ex aqua diebus xxxx, terens, & sic inungito. *¶ Aliud ad Hæmorrhoidas, quo vtor.* Arsenici denariorum pondo viij, sandarachæ denariorum pondo viij, elaterij denariū pondo quatuor, thapsiæ denariorum pondo ij, chrysocollæ denariū pondo quatuor, calcis viuæ denariorum pondo iij: tritis vtitor. *¶ Aridum Galli, vray vsus, ad Pterygia.* Argenti spumæ denariorum pondo viij, eruginis denariorum pondo x: læuigatis vtitor: commendatur. *¶ Ad Pterygia bonum.* Chalcitidis, caricarum combustarum, malicorij, squamæ æris, singulorū pares portiones. Cum opus est, mel coctum misceto: emplastri modo imposito: alternis diebus soluito, expurgans, non madefaciens, nec respergens. *¶ Anthera idest florida, qua vtor.* Sandarachæ denariorum pondo trigintaduū, alij sedecim: aluminis fissi, myrrhæ, fæcis croci, singulorum denario

* Al. 700 dr.

i. vehementer.

* Aliter lxiii.

* Al. xiiii.

rum pondo sedecim: iridis totidem, cyperi denariorum pondo sexaginta sex. *¶ Florida Magni.* Calix denariorum pondo xxiiij: aluminis fissi, gallæ, foreos, misyos, singulorum denariorū pondo iij: sandarachæ denariorum pondo viij, malicorij denarij pondo j, myrrhæ obolos iij, cinnamomi obolos iij, croci denariorum pondo ij, myrice fructus denariorum pondo duū. Tritis vtitor. *¶ Aridum Cephalicum idest capiti accommodum.* Iridis denariorum pondo iij: thuris, panacis, aristolochiæ, singulorum denariū pondo ij: tritis vtitor, etiam ad nomas. *¶ Aridum Cicatricem inducens.* Ostreorum combustorum denariorum pondo ij, mannæ denarij pondo vnus, cadmiæ obolos iij: contritis vtitor, & ad nomas. *¶ Aliud Aridum Cicatricem inducens.* Picæ corticis denariorum pondo vj, mannæ denariorum pondo sex, aristolochiæ denariorum pondo sex: pumicis, resinæ, singulorum denariorum pondo iij: iridis illyricæ denariorum pondo xij: læuigatis vtitor. *¶ Aliud Cicatricem ducens, & ad Cacoethe.* Picæ corticis denariorum pondo vj, cornu ceruini combusti denariorum pondo iij, cadmiæ denariorum pondo xij: cerussæ, manne, singulorū H denariorum pondo iij: eruginis rase denariorum pondo ij: contritis vtitor. *¶ Aliud.* Gallæ denariorum pondo iij, cerussæ denariorum pondo octo, myrrhæ pondo denariorum iij, argenti spumæ denariorum pondo octo, retrimenti plumbi denariorum pondo quatuor: trita vsurpantur.

* Aliter xii.

¶ Matæ siue obstetricis, generosum ad Condylomata & Rhagadas. Gallæ, molybdænæ, singulorum denariū pondo viij: myrrhæ, cerussæ, singulorum denariorū pondo iij: tritis vtitor. *¶ Auxilium ad Omnia.* Iridis loco molybdænæ, argenti spumæ duas partes iniicito, reliquorum cuiusq; vnam. *¶ Aridum exedens, Lecanij Arei.* Arsenici pondo libram, calcis viuæ denarium pondo ij. In aqua terito diebus triginta, mutans quotidie bis aquā in Sole: deinde reliccatis vtitor. *¶ Encathisma quasi in seßio, idest quod in seßu curat Hæmorrhoidas, Phaniij.* Atramenti sutorij, aluminis fissi, chalcitidis, misyos crudi, sandarachæ, singulorum denariū pondo iij. Trita omnia habeto vbi vsus: venerit, veterem vrinā salitam viri vnus, f sextariorum duorum } mēsurā in fictilem peluim iniicito: me dicamenti verò denariū pondo xij superfundito vrinæ, vt semper duo sextarij feruentur. Hoc vtitor insidens diebus vij, nam in his actionem promouet: vbi fordūm in fundo substitit, anū circūlinito. *¶ Aridum carnes Cicatrice obducens citra erosionē, Harpocras.* Sandarachæ, chrysocolle, arsenici, pares singulorū portiones. Itē ad cacoethe facit. *¶ Pastillus ad Nomas, dictus Asclepius.* Chalcitidis

* Al. sextarii vnus.

Aciditidis, arsenici, pares portiones: calcis viuae duplum. Habet etiam sandarachæ æqualem reliquis portionem. *Ad Am Vitia.* Alumine liquido nucis magnitudine cū mellis cyathis duobus cocto vtitor. *Siccum ad Nomas quo vtor.* Squamæ, arsenici, chartæ cōbustæ, plūbi vlti, singulorū denariū pondo iij: sulfuris ignē non experti denariū pondo quinque: læuigatis vtitor. *Aliter.* Squamæ, arsenici, sulfuris, plumbi cōbusti, æris, singulorum denariū pondo iiii: sandarachæ denariū pondo quatuor, æruginis denarij pondo vnus, chartæ cōbustæ denariū pōdo iiii: vtitor cum rhodino vel melle. *Crispi odoriferū ad Nomas.* Squamæ, arsenici, sandarachæ, singulorum denariū pōdo ij: gallæ denariū pondo iiii, myrrhæ denarij pondo vnus, thuris tantundem, atramenti futorii denarium pōdo ii, chartæ cōbustæ denariū pondo iiii: læuigatis vtitor. *Antipatri ad Nomas.* Chrysocollæ pondo 3 vi, arsenici pōdo 3 vi: arido vtitor, & cum rhodino. *Aliud vt Alcimion.* Arsenici denariū pondo: 7 iij, squamæ denariū pōdo iii, chrysocollæ denarij pondo j. Sicco & cum rhodino vtitor: aqua dilutum cicatricem ducit cum cerato rhodino. *Aliud Publij ad Nomas.* Calcis viuae denariū pondo iiii: arsenici, squamæ, chalcitidis, sandarachæ, singulorum denarij pondo vnus: tritis vtitor: non nulli sandarachæ 7 denarij pondo vnus. *Medicamen ex Plantis, ad Nomas probum.* Mali punici corticis, chrysocollæ, aloes, singulorum denariū pondo iij: arsenici, sandarachæ, singulorum denariū pondo ij: aluminis filii denariū pondo iij, chalcitidis denariū pōdo iij, myrrhæ siccæ denariū pōdo vij, oleæ siccæ foliorum tantundem: tritis vtitor. *Aliud Alcimionis.* Myrti sylvestris denariū pōdo viij: malicorij, oleæ foliorum, myrti nigrae, & corticum, singulorum denariū pondo xij: spinarum cineris denarium pōdo viij, ficuum cineris denariū pondo 7 xj, orcheos herbæ denariū pōdo viij: arido cū melle vtitor. *Aureum, quo vtor.* Malicorij denariū pōdo xxv, aluminis filii denariū pondo x: atramenti futorii, misyos, singulorū denariū pōdo viij: squamæ denariū pōdo xvi, gallæ denariū pōdo xv, melāterix ex clauis cōfectæ denariū pōdo 7 v: chalcitidis, æris cōbusti, singulorū denariū pōdo viij: læuigatis plurimū ex aceto vtitor. *Aliud recens efficacius ad Nomas, Philini.* Inalterat, & Pius educit. Aphronitri pondo libras 7 ij, mellis tantundem. Aphronitrum melle subactū vrito; deinde læuigato: admisceto iridis illyricæ pondo 3 vj: trito vtitor, & cum melle. *Aridum Erodens.* Arsenici, sandarachæ, singulorum denariū pondo ij: calcis viuae denariū pondo iij, alij trium: læuigatis vtitor. *Aliud.* Calcis viuae, arsenici, atramenti futorii, singulorum pōdo denariū iij: ex aqua calida plurimum terito. Relicatis ac tritis vtitor. *Aridum Erodens Melitonis.* Auripigmenti, sandarachæ, calcis viuae, pumicis, singulorum denariū pondo iij: In aqua xxx diebus cōte-

Crito, sed quotidie illa mutata: vbi inaruerit tritis vtitor. *Aridum insigne ad Hæmorrhoidas præclari Apollonij Tarpei.* Chalcitis vltæ, squamæ, arsenici cōbusti, atramenti futorii, singulorū denariū pōdo iij: diphyrgis denariū pōdo duū, foreos combusti obolos iij, argenti spumæ combustæ obolos quatuor, aluminis filii denariorum pondo quatuor, æris vlti tantundem: læuibus factis vtitor.

Quæ Asclepiades in librorum quinto de Exterioribus, quos Marcellas inscribit, arida conscripserit.

C. A. P. 14.

Andromachus arida, quæ affectui cōueniunt, iis quæ affectis profunt, admiscuit: Verū Asclepiades in quinto seorsum quæ ad affectum conducunt, seorsum item, quæ parti affectæ vtilia sunt, exposuit: nam parte omiſsa, tradidit cicatricem ducentia, crustas inferentia, ad nomas conuenientia & carbunculos, tum quæ vocant à sanguine continendo, ischæma: Cum loco autem affecto, quæ ad polypodem, ozēnas, & sanguinis profluvia ex naribus, ad oris nomas, gingiuas humidas, in genis duras excreſcētias, ad paronychā, pterygiā, anī rhagadas, & hæmorrhoidas. Quædam etiam à parte affecta denominationem sortiuntur, conueniunt tamen & alijs partibus, cuiusmodi quoq; cephalica id est capiti succurrentia, à medicis dicta, quæ eximiè ossibus cōducunt, quam & totius corporis exulcerationes carne replere possunt: non. n. capiti quatenus caput est, D prodesse sunt nata. Nimirum etiam, nisi os denudatum sit, vsum ipſorum non requirimus: sed in nudatis, quoniam pingua pharmaca vitamus, siccis solis vtimur, fugiētes emmota à medicis Græcè appellata, q̄ linamentis inunctis offerantur. Quemadmodum autem ossibus in capite denudatis vsus ipſorum aptissimus est, ita etiam in alijs omnibus denudatis ossibus, siue brachij, siue cubiti, siue radij, siue femoris, siue tibiæ. Quare nos etiam arida ab Asclepiade scripta deinceps prodituri, cū ipsum primā omniū cephalica scripsisse inueniamus, primā ponemus, quod non solum ossibus in capite denudatis, verū & alijs omnibus simili modo affectis, ipsa sint accommoda. Deinde quæ cicatricem ducunt, percensebimus, omnia his interiecta prætergressi, quæ affectum locum attingunt. Postea quæ prædicto iam mihi ordine sequuntur, omnia aggrediar. Non nulla sanè ex siccis medicamentis duplicem vsum obtinent, vt & siccis ipsis vti possimus, & cum alijs quibusdā mistis, sicut idem Asclepiades quoq; indicat.

Arida Cephalica.

Ad Aridum Cephalicum, quo vsus est Lucius præceptor, tollit Squamas, ossa corrupta educit, Caua implet. Medicamentum pingui caret. Iridis illyricæ, panacis, singulorum denariū pondo iij: aristolochiæ denariorum pondo ij, mannæ tantundem: alij sine aristolochia. Omnia contunduntur, & cribrantur. Vt licet per se & cum melle. *Medicamentum ex Silphio Callosa consumit, & Sordida purgat, &*

gat, & Cava replet. Vlcera relietas tuniculus exedit. Resinæ pityinæ siccae denariū pondo duodecim: Etorcos torrefacti vino restincti, iridis illyricæ, aristolochiæ, singulorum denariū pondo octo: filphij denariū pondo quinquaginta, æris squamæ denariū pondo duum, thuris denariū pondo quatuor: arido, & cum melle vititor. *¶ Medicamentum ex Eruiis, Xenocratis.* Eruorum rufforum farinæ denariū pondo viij, illyricæ denariū pondo decem, mannæ denariū pondo quinq, aristolochiæ denariū pondo quinq, squamæ tantundem: tritis, & cum melle vititor. Aliæ lectiones habent, bryoniæ radicis denariū pondo octo: mannæ, squamæ, iridis, singulorum pondo denariū duodecim: erui denariū pondo decem, aristolochiæ longæ denariū pondo quindecim. *¶ Medicamentum quod ex Serapiade inscribitur.* Squamas tollit, Carnem facit, ex ijs quæ valde resiccant. Serapiadis, orcheos, iridis illyricæ, marrubij sicci, singulorum denariū pondo octo: erui farinæ pondo denariū decem, aristolochiæ denariū pondo quinquaginta: sicco, & cum melle vitimur. *¶ Triphonis Cephalicon, aufert Squamas.* Piceæ corticis, squamæ eris, pumicis combusti, singulorum denariū pondo sex: mannæ thuris, aristolochiæ, iridis illyricæ, resinæ pityinæ, singulorum denariū pondo quatuor: myrrhæ, aloes, singulorum denariū pondo duorū: sicci, & cum melle vsus est. In Atheni scripturis line piceæ cortice medicamentum est. Habet aut & gallæ pares mannæ portiones.

Arida Cicatricem inducentia.

De omnibus vlcibus recentibus, & vetustis curatu facilibus, & difficilibus, in medicatorie methodi libris, tertio, quarto, & quinto disseruimus. Quin etiam in huius operis prioribus, cautorum vlcum sine omni casu pharmaca carne repletia, virtutem terrosiam sine villo morsu obtinere docui: quæ autem cicatricem inducunt, cum eo, quod citra mordacitatem adstringunt, magis exicare: quæ verò supercrefcentem carnem tollunt, calida esse & acria. Quin etiam quæ optima esse inter ea, quæ cicatricem ducunt existimem, tum in commentario de morbis curandis prædixi, vbi omnium affectuum curationis methodi ostense sunt: tum prius in hoc presenti opere cum de ijs, quæ vlcibus conueniunt, ageretur. Asclepiades autem pharmaca, sicut & Andromachus, cicatricem inducentia conscripsit, non distinguens, vtrum nullo alioqui malo conflantia vlcera, an quæ propriè egrè ad cicatricem venientia dicuntur: quæ permultum inuicem differre ostendimus, cum singula proprium curationis scopum habeant. In quibusdam tamen adscripserunt, quæ & ad cacoethe faciant, vel rursus ad condylomata & rhagadas. At quanquam Asclepiades magis Andromacho distinguere soleat, tamen in ijs, quæ cicatricem ducunt, distinctionem nullam posuit. Verum quæ ego recensui, tum in medendi methodo, tum in hoc opere, indicabunt, si mentem adhibeas, quo modo singulis descriptis vtendum sit. *¶ Aridum Cicatricem inducens Asclepiadis, Cimeritium, quod cineris speciem referat, nominatum, ex Magni medicamentis.* Calcis viuæ denariū pondo sex: mannæ thuris, squamæ, singulorum denariū pondo quatuor. *Aliter.* Calcis viuæ denariū pondo duodecim: squamæ, mannæ, singulorum denariū pondo quatuor, sed vt Archibius vult, squamæ denariū pondo octo: mannæ denariū pondo octo, vel quatuor: in alijs scripturis calcis viuæ denariū pondo octo. *Vt Heliodorus.* Calcis viuæ, mannæ thuris, singulorum denariū pondo octo: squamæ denariū pondo quatuor. *¶ Rufum Cicatricem ducens.* Misys torrefacti denariū pondo octo, squamæ eris denariū pondo decem, mannæ denariū pondo sex: tritis vititor. *¶ Magni, Cicatricem ducens.* Diphrygis, squamæ, singulorum denariū pondo quatuor: illyridis, mannæ, singulorum denariū pondo duum: contritis vititor. *¶ Medicamentum ex Pumice.* Pumicis torrefacti vino restincti denariū pondo octo: squamæ, mannæ, singulorum denariū pondo quatuor: iridis, resinæ pityinæ sicce, singulorum denariū pondo quatuor: tritis vititor. *¶ Aliud Ptolemæi celebris. Facit & ad Curatu difficilia.* Piceæ corticis denariū pondo sex, cadmiæ tostæ denariū pondo octo: squamæ, cornu ceruini combusti, mannæ, singulorum denariū pondo quatuor: tritis vititor. In alijs exemplaribus habet, plumbi combusti & eloti denariū pondo iij, molybdænæ denariū pondo octo. *¶ Arida Crustas inducens.* Diximus quoque hæc acris & adurentis esse potentia. *H* Quare etiam vsus ipsorum est, tum in his, quæ propter nimiam humiditatem ac intemperiem partibus affectæ, tum propter putredines partibus quibusdā innatas, proueniunt. *Crustas obducentia, Asclepiadis.* Melimon Lucij præceptoris, quod Crustas inducit, Callos excindit inspersum & compressum summo specillo. *Compescit autem, & difficilibus Curatu Cicatricem inducit, si quis in tenui pharmaco vitatur.* Qui ergo dictū puluerem vsurpat, Chalcitidis crudæ denariū pondo viij, cadmiæ denariū pondo iij, ieiunus cum salua excipito tm, vt solum ipsum pharmacum humectet: deinde collige, & operculo claudens, sine melinum fieri: vbi in vmbra desiccaueris, leuiter circumferens pistillum, trita excipito, sicut prædictum est. Apud alios vocatur medicamentum fuscum. Excipitur aceto acerrimo, & siccaturlauigatur q. In alijs scripturis sicut Eunomus Asclepiades vsus est. Habet autem sic, Chalcitidis denarios xij, cadmiæ denarios vi, sandarachæ tantundem: aceto excipiuntur. *Alud.* Chalcitidis, chalcantæ, cadmiæ, singulorum tostorum paria pondera ieiunus excipito salua. *¶ Quod inscribitur Eutonon i. robustum.* Chalcitidis tostæ, chalcantæ, sandarachæ, cadmiæ, singulorum pondo denariū octo: sicca inspergito. *¶ Dia tessaron, i. quod ex quatuor constat.* Chalcitidis tostæ, misys, diphrygis, singulorum pondo denariū iij, chalcantæ vitæ denariū pondo iij. *¶ Crustā inducens valde generosum.* Aluminis fissi, atramenti sutorij, gallarū, misys cyprij, singulorum denariū pondo xvi:

* Al. pumicis.

* Al. viij.

* Al. denarios quinque.

*

A do xvi, for eos denariū pondo iij: cōtritis vtitor. **C** Confectum, vt Eunomus. Misyos peregrini denariū pondo xvi, foreos denariū pondo xij, æris cōbusti denariū pondo iij, lapidis filii cōbusti denariū pondo viij: atramēti sutorij, sandarachæ, aluminis filii, singulorū denariū pōdo iij: tritis vtitor inspergens, & spicillo comprimens. **C** Ad Nomas. Putrida vlcera cū ambientes partes depascunt, nomas propriè appellant: ac constat tales affectus vehementissimis medicamentis indigere, nam in ipsis sæpe etiā cauterijs vtimur. **C** Ad Nomas, Asclepiadis Pharmacum Lucy præceptoris ad Nomas. Sulfuris viui, auripigmenti, squamæ, singulorū denariū pondo iij: æris cōbusti, quantum color exigit: arido, & cum melle vtitor. **C** Publy præceptoris. Auripigmenti denariū pondo iij, squamæ denariū pondo duū, elaterij denarij pondo vnius, chartæ quantum ad colorem satis est. **C** Vt autem Eunomus vsus est. Arsenici, squamæ, singulorū denariorū pondo iij: sulfuris viui, elaterij, singulorum denariorum pondo duorū: chartæ combustæ quantū ad colorem sufficit. In alijs scripturis est, sandarachæ denariorū pōdo iij, squamæ denariorū pondo vi, arsenici denariorum pondo iij, elaterij denariorū pondo duorum, chartæ combustæ denariorum pondo iij. **C** Medicamentum Arei ad Nomas, quod etiam Sordida purgat citra mordicationem rosaceo dilutum. Facit etiam ad Vulus exesum. Dedit Theotropus. Arsenici, chartæ combustæ, plumbi vsti & eloti, B squamæ æris, singulorum denariorum pondo iij: singula per se teruntur, postea simul miscentur. Vtitor ad prædictos affectus. **C** Ptolemæus autem ita vsus est: Plumbi combusti, arsenici, squamæ, chartæ combustæ, singulorum denariorum pondo iij: sulfuris viui denariorum pōdo duorum: tritis vtitor. **C** Vt autem Apelles. Medicamentum confectum, quod Dia charta id est ex charta, inscribitur, Nomas non solum sistit, sed etiam incipientes prohibet. Facit & ad Dysentericos, infusum rosaceo. Cū autem ait instillatum dysentericis, suspensionem subesse de nome indicatur. Compositio ita habet. Chartæ combustæ, plumbi combusti, æris combusti & eloti, arsenici, squamæ stomomatis, singulorū æquas portiones: sulfuris viui dimidium: tritis vtitor vel cum melle, vel rhodino. **C** Moschionis ad Nomas. Elaterij, chartæ combustæ, squamæ æris, singulorum denariorum pondo duorum: auripigmenti denariorum pondo iij: æruginis scoleciæ, salis ammoniaci, singulorū denarij pōdo vnius: tritis vtitor, & cum rhodino. **C** Odoriferum Lucy præceptoris. Squamæ, gallæ, vtriufque denariorū pondo iij: sandarachæ, arsenici, singulorum denariorum pondo duorum: myrrhæ, atramenti sutorij, vtriufque denarij pondo vnius: thuris denariorum pondo duorum: elaterij denarij pondo vnius: chartæ combustæ, quantum colorem efficit. **C** Nos autem sic. Squamæ, gallæ, myrrhæ, singulorum denariorū pondo viij: sandarachæ, arsenici, elaterij, singulorum denariorū pondo iij: C thuris denariorū pondo iij, atramenti sutorij tantūdem, chartæ quo colorem acquirat. **C** Vt Pafion. Arsenici, squamæ, singulorum denariorum pondo duorum: chalcanti denarij pondo vnius, sandarachæ denariorū pondo duorum: myrrhæ, thuris, gallæ, singulorum denarij pōdo vnius: chartæ denariorum pondo quatuor: tritis & cum rosaceo vtitor. **C** Heraclides hanc scripturam habebat. Gallæ denariorum pondo vi: arsenici, sandarachæ, squamæ, singulorum denariorum pondo quatuor: thuris denariorum pondo triū, calcanthi tantūdem, myrrhæ minæ denariorum pondo duorum, chartæ denariorum pondo octo. **C** Vt Cleobulus. Squamæ, sandarachæ, arsenici, singulorum denariorum pondo duorum: myrrhæ, thuris, atramenti sutorij, gallæ singulorum denarij pondo vnius: chartæ, vt colorem accipiat.

Ad Carbunculos.

CAP. 15.

C Carbunculus vlcus est crustam citò cum inflāmatione totius partis circumdata valida faciens, vt & febres vehementes, & extrema pericula inferat. Quare ipsi crustæ valens medicamentum imponere oportet, & ex ijs, quæ ad nomas conducere dictum est: circumpositas autem partes cataplasmatibus fouere, quæ æqualem vim habeant, vt repellant, & mediocriter refrigerent, & digerant. Verum de cataplasmatibus in proprio libro dictum est. Nunc ab Asclepiade scripta percensebimus. **C** Ad Carbunculos medicamenta ab Asclepiade prodita. Medicamentum Massiliotæ. † Hoc propter vires exposuit, q carbunculos ad superficiem perducatur, & multos auferat. † Chrysocollæ, nitri tosti, lapidis alij, arsenici, sandarachæ, misyos tosti, chalcitidis, aluminis filii, diphrygis, singulorum denariū pondo quatuor: trita omnia singillatim simul qz in vas æreum cyprium reponimus. Dum vsus poscit, imponimus, apprimētes spicilli latitudine, donec carbunculus nigrescat. Dein de supraponimus infrascriptū viride, quod ita habet. Thuris, æruginis rasæ, squamæ æris, singulorum denarij pōdo vnius: aluminis filii obolos iij, salis ammoniaci obolos iij, ceræ denariū pōdo vij obolos iij, resinæ pityinæ aridæ denariū pōdo xv, olei veteris heminam vnam. Arida in Sole cū a ceto teruntur: quæ liquefieri pnt, liquantur, & immittuntur: vbi rursus cōtuderis, assumens vtitor. Apud Demosthenē Massiliotā, q pharmacū cōposuit, olei habet duas heminas. **C** Apionis ad Carbunculos. Nitri rubri, arsenici, sandarachæ, chalcitidis, atramēti sutorij, diphrygis, singulorū parē mēsurā: aceto lauigentur: & exiccatis, rursus qz tritis, vtitor. **C** Apollonij Organici. Chrysocollæ, aluminis scissilis, & rotūdi, sandarachæ, ochræ, misyos crudi, atramēti sutorij, singulorū denarij pōdo i: tritis vtitor. **C** Florida Magni ad Putredines, Nomas, Carbunculos, Pterygia, Aures suppurantes. Valet etiā ad Oris Nomas. Aluminis filii denariū pōdo viij, chalcitidis denariū pōdo vi, sandarachæ denariū pōdo iij, mali punici corticis siccæ denariū pōdo ij, atramenti sutori denarij pōdo i vnius, misyos

† Al. denariū pondo iij.

† In antiquis Codicibus legitur. τάντων ἐξείληκε τῶν πόνων τὴν δύναμιν, διὰ τὸ τοὺς ἀνθρώπους ἐπιπολεῖν, καὶ πολλοὺς ἀσθενεῖν, i. hoc medicamentum ciuitati dedit, quod carbunculi abutere, ac multos perderent.

† Aliter denarium duorum.

mifyos denariū pondo duū: nitri, omphacini sicci, singulorum denariū pondo duū. Sicco, & E cum melle vtitor. *¶ Aliud Diodori.* Gallæ omphacinæ denariū pōdo quatuor: mifyos, chalcitidis, auripigmenti, sandarachæ, singulorum denariū pondo duū: aluminis fissi, atramenti futorij, lapidis alij, diphrygis, nitri rubri, singulorum pondo denarij vnus: tritis inspergito, comprimēs scalpelli summo. *¶ Sanguinem sistens Asclepiadis, Lucij præceptoris medicamentū confectum.* Chalcitidis denariū pondo xvi, mannæ denariū pondo xij, terebinthinæ aceto subactæ. Siccis conspergelocōs, vnde sanguis profluit. In alijs duabus scripturis inuenimus, Chalcitidis denariū pondo viij, mannæ denariū pondo xvi, terebinthinæ frictæ † tantundem. *¶ Dioscorides Tharsens tradidit Areo Asclepiadeo pharmacum mirificè Sanguinis profluvia comprimens.* Chalcitidis denariū pōdo viij, mannæ denariū pondo xvi, resinæ liccæ denariū pondo viij, gypli tantundem. Alia contunduntur, cribrantur, miscentur, in area pyxide reponuntur. Vbi vsus postulat, pares portiones medicamenti cum gypso miscentur. *¶ Ex libris Heraclidis, medicamentum ad Hæmorrhoidas. Hoc vsus est ad Sanguinis ex naribus profluvia, lanam intingens & conuoluens, tanquam ellychnium.* Acidi mali punici corticis pondo 3 iij, aluminis ægyptij pondo 3 iij, chalcitidis pōdo vnciam: tritis vtitor: naribus verò lanam medicamento repletā imponito. *¶ Hercules cognomento, ad Sanguinis eruptiones; hoc loco cantery vsus est. Crustam autē inducit. Facit etiam ad Pterygia, reprimit omnē Excrescentiam, Ossā reducit, remouet Squamas. F. Soreos, atramenti futorij, chalcitidis vsq; rhu coriarij, singulorum denariū pōdo iij: tritis vtitor.* *¶ Sanguinem sistens compositum.* Mifyos peregrini denariū pondo sex, atramenti futorij totidem: piceæ corticis, chalcitidis, singulorum denariū pondo quatuor: mannæ denariū pondo viginti, gypli denariū pondo quatuor: tritis vtitor. *¶ Aliud.* Thuris pondo vnciam, mifyos peregrini pōdo denariū quatuor, gallæ omphacinæ denariū pondo quatuor, chalcitidis denariū pondo quatuor, suberis combusti denariū pondo octo, rhu coriariæ denariū pōdo quatuor: tritis vtitor.

† Al. xx.

* Al. quatuor.

GALENI DE COMPOSITIONE MEDICAMENTORVM PER GENERA LIBER SEXTVS

ARGVMENTVM LIBRI

Hic quoque Multiplicis vsus Emplastra declarantur, maximè vero quæ ad Nomas faciunt, Quæ item attrahunt, digerunt, & discutunt.

Quid Differant Vlcera Aegre curabilia à Nomis: & de Vsu methodi componendorum medicamentorum.

CAP. I.



Vperiore commentario emplastra dicta Græcè polychresta, q̄ multis conueniant affectibus, distinguentes, ea collegimus, quæ præterquam alijs, etiā vlceribus ægre ad sanitatem perueniētibus, mederi pollicentur. In præsentia verò ad aliud emplastrorum genus multiplici vsui accommodatum digrediar: quæ singula tum ad alia multa faciunt, tum ad particulas putrescentes, aliter affectas, quàm vlcera quæ propriè dyſtherapeuta i. curatu difficilia nuncupātur. Etenim has putrilago depascitur, eo q̄ turba medicorum hos affectus nomas i. depaſtiones, appellat: illa verò vno loco sine putrilagine circumscripta sunt, vt & phagedenæ dictæ vicina quidem depascunt, non tamen ea putrefaciunt febres q̄ inferunt, quod ijs, quæ depaſtionem cū putrilagine ſuſtinent, accidere conſuevit. Summa curationis erat in prædicto vlcere egrè curabilium genere (chironia quoq; vocant) medicamenta inuenire, quatenus licet mordacitatis expertia, validè autem exiccantia. At hæc quæ nunc ſcribentur, omnia mordacia ſunt, ſi quis iſſis ſolis non cerato temperatis vtatur. Quæ autem cerato miſcentur, purgare quidē vlcus ſordidum & carne replere poſſunt, atq; et duritiem quādam & tensionem diſcutere, non autē difficilia curatu ſanare. Indicant iſſorum virtutem affectus, quibus bene adhiberi credita ſunt. Quod iā ſuperius admonui, & nunc dicturus ſum, meminiffe videlicet oportere illorū, quæ in opere de Simplicibus medicamētis prodita ſunt. In cuius primis quinq; libris methodum ſeu rōnem expoſui, qua medicaminum facultates inueniānt, ſimul quoq; in pluribus exēplis eius exercitatione ppoſita: in ſequentibus verò ſingulorum nominatim mentionē feci. Nā illorum memor, ex facili rōnem eorum qui hæc pharmaca à nobis modo propoſita cōpoſuerunt, aſſequeris: & videlicet ipſe quoq; alia cōficiēs, quocunq; tpe prius expertorū inopia laboraueris: multa ſiquidē hmōi nō paucis contingunt in itinere, cū alio, tum maximè nauali. Qñquidē etiā in patria quidā manentes, pharmacorum apparatū, vnde egros curabant, amiſerunt, vt prætriſtitia iſſi tabefacti, perierint. Optimū igitur medicamenta iā explorata ſecundum dictam methodum uſurpare: ſin aut, vt dixi, non nunq̄ hæc deſideremus, habitum talem nos habere, quo ſimilia

Amilias iam abunde expertis possumus componere: quemadmodum & me sæpe agentem in itinere & alibi vidistis. Non nulla igitur, quæ proprio Marte in huiusmodi temporum occasionibus cōdidi, postquā experientia probassem, nihilo peiora vel celebratissimis apparuerūt. Nam primā ipsorū compositionem ex coniectura artificiali molimur: postea verò cum non nulla per experimētum probatissima visa fuerint, non nulla à scopo absint, secunda rursus correctio fit, & tertia nō nūquā qua ad perfectionem eius quod præstare volumus, ipsa redigimus. At sine methodo & in prioribus & in therapeutices libris exposita, ut prædictis recte nemo pōt, tñ abest ut similia ipsis conficiat. Iam igitur huiusmodi emplastra exordiar. Emplastrum Dia Botanō i. ex herbis, appellatum, propē oēs, qui insignia emplastra in vno libro vel pluribus collegerunt, tradidere, non multum in mixturæ simplicium pharmacorū symmetria discrepantes. Incipiam ergo & hic à Critone, emplastra prius illa cōmemorans, quæ in quarto de simplicibus medicamētis, ita ad verbum literis mādauit.

Emplastrum Dia Botanō i. ex herbis, Critonis.

CAP. 2.

Emplastrum ex Herbis quo vtor. Facit ad Carcinomata, Putredines, Strumas ad suppurationem perducit, & exprimit. Lepras amouet, Furunculos soluit, Podagricis prodest, Callosas durities emollit. Item Cephaleum, sine foratione Squamas tollit, Ossa educit, aliquatenus tamen ossa abradit. Idem ad Nervorum vulnera, & ad Nemas, linamento exceptum valet, repurgat, implet cum rosacco cerato, vna ipsius parte ad duas cerati, interdum tres vel quatuor, adiecta. Cum myrto cerato duabus partibus vel tribus Cicatricem ducit. Herbarum ex siccis locis maritimis, anagallidis quæ cœruleum florem habet, papaueris ceratidis, marrubij, alterci foliorum tenerorum, singulorum denarium pondo quinquaginta sex. Hæc in pilam seu mortarium coniecta teruntur, quousque contusa sint ac dissoluta duntaxat, ne eorum succus absumatur: postea iniecta in mortarium terantur. In alio autem mortario habentur squamæ cris rubri denarij vigintifex, manne denarij octo, relinæ pityinæ sicce denarij sedecim, aloes totidem, filii aluminis denarij quatuor, rotundi totidem. Hæc in Sole leuigantur, ut sordium crassitudinem cum aceto habeant. Deinde herbarum mixtæ, donec probe coeant, teruntur. Postea ceratum facito † ex chie cere denarijs centum. ‡ secundum alios mina: olei veteris heminis duabus: radito & misceto. Heras ita. Quiddam vero duas anagallidas immittit: aliqui & chrysocolle, & terre crethriadis, & salis ammoniaci, & auripigmenti, & scissilis, singulorum denarios quatuor. Porro quæ Asclepiades de hoc emplastro præceperit, tum quia in præcedenti libro indicata, tum quia his ferè similia sunt, superuacuum mihi videtur denuo de ipsis scribere, cōem oibus sermonē nunc aggressuro. Primū sanè qui medicamentum hoc composuit, herbis acris vñus est, ut humores prauos afflictis partibus infixos vehementer digereret. Atque ideo ex siccis & maritimis locis esse iubet. Cōtrarias autem ipsis alias frigida virtutis usurpauit, ad acrium vehemētiam leniendam mitigandam quæ. Quales sunt alterci, & papauer: habent. n. quippiam est doloris mitigatorium, puta stupidam refrigerationem propinquis partibus inferēs. ¶ Stupor. n. mediocris dolorem soluit, ait Hippocrates. Apposuit autem ex metallis quoque aris squamam, & alumen scissile: de quibus prius diximus, quod sane vtrunque medicamen vlcibus malignis conuenit. Aloen verò miscuit ex his, quæ adstringunt, & sine morfu exiccant, medicamentis: Item mannam ex his, quæ concoquunt, leniunt, & ad suppurationem perducunt: Pityinam seu materiam emplastro conficiendo idoneam, sicut & ceram & oleum. At simul cum hoc acrium medicaminum vehemētiam ipsa mitigant: pityina tamē est siccare potest, & quo siccior, hoc magis, qualem iniungere præcipit. Non nullos ait miscuisse pharmaco chrysocolam & terram crethriadem, ambo curatu difficilium vlcium remedia. E contrario sal ammoniacus & quod auripigmentum vocatur, propter acrimoniam vlcera natura apta sunt iritare: atque etiam putridis conueniunt. Proinde non admodū vtile est propositum nobis in sermone pharmacum ad vlcera chironia. In quibus verò putredo aliqua subest, hanc comprimere idoneum est, saniem quæ illam facit, discutiens. Eadem medicaminis potentia & stirumis medetur. Verū quia Deterforia quædam continet, ideo quoque lepras purgat: etenim consilium in hoc affectu est, cutis induratum summam partē, veluti deglubere: id quod ea efficiunt, quæ præterquā quæ supra modū siccant, et detergēt. Nam si cutis vitium in naturalem habitum redire possit, nemo exiccata supra modū siccaret: quoniam verò quod leprosum iam est, curationem nullam habet, proximum fuerit (qui in omnibus insanabilibus scopis cōis est) incurabilem partem ex corpore excindere. Excinduntur autem non nunquam ferro, interdum igni, non nunquam medicamento, vel adurentibus, vel digerentibus simul & detergentibus, quale est modo commemoratum. Quemadmodum igitur hic sermo omnis lepre cōis est, sic & ille qui de carnis repletionē tractat. Nam quia carne explentia dicta medicamenta (sicut in tertio libro de morbis curandis ostensum est) virtutē habent deterforiam citra mordacitatem: quæ vero huius sunt materiae, in hoc præsens pharmacum nobis propositum absterforium quidem est, mordicationis autē non est expertus: ideo humidum ceratum ex cera resina quæ in oleo liquefactus confectum ipsis miscemus. Siquidem cera & oleum, ut acrimoniam obtundunt, ita sunt emplastica, eo quæ sordes producunt. Resina vero morsus expertus, emplasticam virtutem non habet, sed deterforiā, vlcibus quidē iam mordacē, nō vlceratis blandā & sine morfu. Ceterū mixturæ symmetriā coniectura quidem ante experientiam, verum scientificè post experientiam, deprehendemus, noscemus quæ simul purū vlcus deterforiam vim sine morsu requirere:

* Alter xx.

† Alter lxxv. ex 3. n. De li- quorum vñ circa siem.

‡ Aphor. 25. ex 3. n. De li- quorum vñ circa siem.

fu requirere: sordidū validius, quippe cuius propugnaculum est sordities: purum autē nudū con- E
tingenti occurrit. Quin etiam ex corporibus ipsis, non nulla sensibilem magis substantiā habent,
quādam minus: alia molliorem, alia duriorem: quæ ratio est, cur Crito in proposito medicamen-
to ad vnam partem ipsius, non nunq̃ duas cerati, aliqñ tres, vel quatuor, misceri iubeat: Non tñ di-
stinctē pronūciavit, quādo duas, quādo plures, adijcere oporteat, tāquā qui pharmaco utetur, ver-
fatus iā in arte sit, & quæ à me nunc dicuntur secum æstimare queat. Rosaceo quidē preparari ce-
ratum præstat, nō tamē insignis excessus in huiusmodi vlcibus est, ēt si oleo liquefiat: attamē in
ijs, quæ phlegmones quippiam habent, rosaceum oleo potius est. Porro carne implēda omnino
à phlegmone tuta sunt. Pulchrē autē Crito adscripsit in vlcibus, quæ ad cicatricem duci postu-
lant, myrteo oportere ceratum preparari, adstrictione. n. illis opus est. Hæc in præsentiarū dixisse
satis sit tum de medicamentis carnem gignentibus, tum de ijs, quæ cicatricē inducunt. Etenim
vſus, & compositionis ipsorum methodus, in medendi Methodi libris expolita est: in particulari
bus autem materijs exercitatio, cum huius sit operis, hoc ipso libro exponetur.

Emplastrum Διά Σκύλλης, i. ex Scilla.

Aliud deinde eiusdē generalis potentiaē emplastrū, his verbis Crito cōscripsit. **¶ { Scyllæ, }**
aristolochiæ rotundæ, { singulorum } denariū pondo xxx, alij xv: iridis denariū pondo xxx, alij F
xv: pitynæ sicca denariū pondo xxx, alij xv: ammoniaci, myrrhæ, styracis, squamæ aris rubri,
singulorum pondo denariū xv: scyllæ tostæ denariū pondo centum & octo. Aceto acerrimo die-
bus xl terito, qñ caniculæ sidus oritur: squama primū, & styra, paulatim ex vtroque, deinde
gutta ammoniaci, & æs, & scylla, inijciuntur, vt elaborentur, paulo post resina, inde myrrha: cum
læuia facta fuerint: reliqua sicca miscentur. Expletis autē diebus, eiusmodi ceratū facito: Cera pon-
do v, alij denariū pondo ducentorum quadraginta: terebinthinæ pondo librā, alij denariū pon-
do xxx: olei sextarios duos & s, alij heminas vj: chalbani denariū pondo xxx, picis liquidæ tan-
tundem, prostremo chalbani indito: deinde vbi refrigeraueris curiosē excipito. Hæc quidem
medicamenti compositio. De vſu autē eius hæc ad verbum Crito scribit: Syncero medicamine vti
tor, in capitis fracturis, fistulis, nomis, & excrecentijs: item ad ora venarū adaperita, & hypopho-
ram id est vlcus dehiscens. Sin voles diluere, quod carni generandæ idoneum fiat, & cicatricem in-
ducat, parti vni medicamenti duodecim cerati rosacei adijcito: in ambustis vni parti octo immit-
tito. Hæc sanē de vſu pharmaci Crito rectē tradidit, tanquam acri ipso & aperienti & digerenti,
ideoq; & exiccanti, vſus in fistulis, supercrecentia carnis, putredine hoc est nome, & osculorum
adapertionibus, quemadmodū sunt in sinibus & angustis orificijs: In capitis autem fracturis, cū G
sine foratione curationem molimur: sunt autem tales, quæ adusq; membranas cerebri non per-
ueniunt: Verūm carnis producendæ gratia, rosacei cerati partes quatuordecim miscēs, donec ad
cicatricem peruenerint: Melius autem est dicere, donec vlcus concuuitas repleta fuerit: ne-
cessariō enim depascentia vlcera, quod dixi idem esse in putrilaginoso, à validis medicamentis cu-
rantur, quale est & modō propositum. Primū quidem putrescentes particulae auelluntur, atq;
hinc caua redduntur. Vbi verō putredo cessauerit, purgationem repletionem q; requirunt: ac
posteaquam repleta fuerint, tunc etiam cicatricem inducentia desiderant. Ipsum autem pharma-
cum, cum cerato non dum mistum fuerit, quia acre est, non solum carnem generare non potest,
sed etiam supercrecentia aufert, quemadmodum ipse Crito dixit. Atque huius meminisse maxi-
mē oportet, quod dictum est & in superiori emplastro, quod ex herbis appellauit, multa videlicet
ex calfacientibus & abstergentibus composita, licet admodum acra, si cum cerato temperentur,
carnem progignere. Non nulli desperant de ipsis, cum vel duplo copiosiore cerato misto mor-
dere adhuc conspiciant, adeo vt carnem producere non possint, quemadmodum in hoc empla-
stro habet. Nam cum multo acrius, magis q; mordax sit, eo quod ex herbis inscribitur, ad carnem
creandam, inutile est, quamuis quadruplo mistum cerato fuerit. Prudentis igitur est, & in huius- H
modi medicamentis vsurpandis versati, initio quidem statim intelligere, quot partes cerato mi-
sceri oporteat: si autem post vsum primum medicamentum acrius adhuc apparuerit, quā vt car-
nem generare queat, coniungere quantum adhuc ex cerato adijciendum veniat: sicut Crito in pro-
posito factitauit. Neque enim existimes eum prima statim coniectura inuenisse duodecim cera-
ti partes misceri oportere, sed sciuit copiosius quā quod emplastro ex herbis immittitur, misce-
ri: quanto vero copiosius, post primam coniecturam reperijt. Sin anque octo partibus mistis
mordax etiamnum apparebat, decem admisit: quemadmodum si etiam decem, ad duodecim
peruenit. Quoniam verō, vt dixi, pro sordium copia, & vlcis humiditate, tum eorum quæ
simul afficiuntur sentiendi acumine, & hebetudine, item mollicie & duritie corporis habitus,
cerati quantitatem immutare conuenit, quod sæpe dictum est, considerare nos expedit, recordan-
tes quantitatem vſus in huiusmodi omnibus describi, quum vtroque facilis illinc via ad alia vsq;
ad summa fiat: summa dico omnium eiusdem generis scoporum completiones. De quibus si
vnum exemplum nunc proposuero, vos semper ipsius meminisse oportet, neque sæpius de eo
velle audire. Dico igitur scopos congeneres esse (hoc est simili genere comprehensos) pluri-
mi quidem cerati miscēdi vlcus purum & siccum esse, corpus eius qui curatur facili sensu & mol-
le: paucissimi

Non est in an-
tiquis.

* Aliter xx.

* Quidam co-
dices habēt lo-
co æris, chalci-
tim, cū tñ neu-
trum horū in
enumeratione
simpliciū me-
dicamentorum
huius empla-
stri habeatur.
Quia ergo bis
mentio sit scyl-
læ, fortē loco
scyllæ semelle
gendum chal-
citis.

* Aliter xx.

* Aliter xij.

Ale: paucissimi verò adijciendi, humiditatem multam in vlcere ac fordiciem, corpus ægri durum parum q̄s sentiens. Bene tamen omnibus quæ id componūt digerentibus, chalbanī squama admista est, medicamentum exiccans, sed quod non parum adstringat. Non solū autem in hoc emplastro cognoscendū vobis est propter cerati copiosam misturam carne explens, & vlcibus malignis cicatrici obducendæ idoneum, euadere, sed etiam in alijs omnibus, quæ eiusdem virtutis sunt. His subiungit Crito medicamentum dia Acones i. ex cote, quo se vti affirmat, ita componendum præcipiens. *¶ Dia Acones i. ex cote, pharmacum, quod nobis in vsu est. Facit ad omnia Diuturna, & peculiariter ad Capitis dolorem, fronti impositum. Valet ad Laterum dolores longos. Iuuat Podagricos, Ischiadicos. Scapularum dolores, Dentium cruciatus, attritis partibus impositum. Educt etiam & extrahit Menses pectini suprapositum. Auxiliatur Stomacho laborantibus, tum ijs, qui Fluxu vexantur, & Cibum vel alimenta non retinent. Est etiam prorsus vtile sine adustione, & ijs quæ acre medicamentum non sustinent. Conuenit etiam ad Duriem Iocinoris, & Lienis, nec non ad Strumas, & Ischiadicos. Proprie iam vsus in ipsis fiat diebus septem: si molles sunt, quinque. Aquam pars vel oleum non attingat, donec vlcuscula, quæ psudracia dicuntur, fecerit, & saniem crassam attraxerit. Deinde albo cerato soluens ex aqua vtitor: sin efficacius voles, medicamento acone, quod ex pipere constat. Ceræ, chalbanī, terebinthinæ, pityinæ frictæ, olei laurini, olei veteris, singulorum pon-*

Bdo libram: squamæ æris pondo libram † & semissem, æruginis pondo vncias sex, guttæ ammoniaci pondo vnciam: sināpis, adarcæ, sulfuris, singulorum pondo vnciam: abrotoni, centaurij, atramenti futorij, salis ammoniaci, thuris, salis communis, aluminis rotundi, argenti spumæ, propolis, cocci cnidij, singulorum pondo 3 iij. Omnia simul contunduntur, & cribrata adstringentibus cum oleis excipiuntur. Hæc sanè propositi emplastri compositio est, non parum superiori præstans caliditate: sinapi enim habet, & adarcen, sulfur, & coccum cnidium, tanto calore prædita, vt vlcus faciant quibus diutius adheferint. Iam & laurinum ex ijs est, quæ abunde calfaciunt, deinde atramentum futorium, & sal: didicistis autem hæc adstrictionis quoq; non esse expertia, salem pauca, sed atramentum futorium multæ. Verum de adstringentium medicaminum mistura cum digerentibus, antea in emplastris vsus multiplicis, expolitum est. Omnino enim quippiam varijs vtile esse non potest, nisi contrariæ quoq; virtutis participet: si enim digerens virtus simpliciter sola esset, ad vnā speciē affectuum conduceret, quam digerere conueniret: si vero adstringens ad aliam vnā, vbi quod influit, reprimendum est. Quare incipientibus ex humorum influxu generari affectibus adstringentia conueniunt: Digerentia verò sine adstringentium mistura, vbi nihil propter euacuationem prius factam influere potest: nam si superfluitas quædam humorum existat, non solūm digeritur humor in affectis partibus contentus, sed etiam ad ipsas accedit: cum digerentia ad se trahere nata sint, sicut contentos & contiguos humores, ita etiam in corporis profundo repositos. Miscentur ergo digerentibus sistentia & reprimentia, meritò, cum qui ad ipsorum compositionem descendit, ratione hac vsus sit, experientia verò attestante rationi. Quare non iniuria, licet consilium scopum q̄s habeat in proposito calefacere, & exiccare, eo q̄s etiā vlcera concitare, mistum est & adstringentium quiddam. Sed non sufficiunt ad multa vehementer calefacientia pharmaca, duo hæc, atramentum futorium, & sal. Quin etiam æris squama pariratione mista est, & alumen, quod à vehementer adstringendo Græce stypteria appellatum est.

Aliud emplastrum celeberrimū scripsit Crito, quod Melianum appellat, diuersum materiæ genus habens à superiore, & illo, quod mox à me ordine suo describetur. Vocat hoc Crito ipse Anicetum idest Inuictum, ex acris pluribus medicamentis compositum, cum melianum tale non sit, vt postea suo tempore demonstrabitur. Quin etiam cephalica alia nominans, quorum generalis virtus paulo post explicabitur, post melianum tradita, inuictum ab ipso appellatum subiungit, eiusdem virtutis cum præscripto, quod dia acones i. ex cote, vocitabat. Verba Critonis in hūc modum sonant. *¶ Aniceton, quasi dicas Insuperabile. Facit ad plurima. Extrahit, rumpit, purgat, glutinat exco-*

Dlat † splenij modo, & cum canalibus impositum, ac dilutum ex oleo & aceto, constringit vndiq; Discutit autē Durtias. Et Nervorum contractiones iuuat sine perfusione impositum, ne refrigerentur. Et vnguenti vice dilutum facit vt Acopon, hoc est medicamentum lassitudinibus accommodatum: sistit enim morborum principijs Lassitudines, & eas quæ † sine causa manifesta † proueniunt. Est etiam Malagma extremarum corporis partium in magnis splenij impositum. Item Cruenta glutinat, suturis vel fibulis iuncta, si plicatum linteam ex solo aceto splenio imponas, æstate quidem frigidum, hyeme autem calidum. Facit ad Plantæ pedis vitia, ad Contusiones, Putredines, & Digitorum affectus, item Fracturas cum vulneribus. Licet neq; carnem generante, neq; quod cicatricem inducat, alio vti, sed soli credere. Valet ad Hominū, canū, et ferarū morsus. Maximū hoc est quod pollicetur, nempe Abscessus latentes in colo & peritonæo, prohibere ne fiant, antequā in vomitum exierint, aut factos extenuare, & in intestina conijcere. Imponendū autem est splenij loco, & desuper centunculum ex aceto et oleo calente, fouendum q; bis quotidie. Non soluetur autem nisi triduo vel quatruiduo. Deinde post fomenta, madorem rursus imposito. Vocatum autem est insuperabile, propter miranda & multa ipsius opera. Squamæ æris denariū pondo quinquaginta octo: pyrethri, staphidis agriæ, cocci cnidij, synapis seminis, cachryos, columbinī stercoreis, aristolochiæ tenuis, æruginis, cyperi, erucæ seminis, cumini, singulorum denariū pondo sedecim: nitri, salis ammoniaci, singulorum denariū pondo trigintaduū: lauri baccarū, mannæ,

iridis

† Cod. manu-
scriptus habet
libram vnā.

* Al. vnā.

* Al. sinapis pō
do vnciā 8.

*

† Per splenium
& per canaliū
idest solenō ap-
positionē. qd
autem sit sple-
nium & solen,
abūde ab Hip-
po. in libro de
fracturis habe-
tur.

† Al. ἄλλης
αἰτίας, i. ex
alia causa.

iridis, singulorum denariū pondo cētum viginti: aceti acris sextarios sedecim, decocti caricarum Ecyathos quatuor & semillem. Tunsa cribrata q̄z omnia simul, cum aceto ad leuiorem teruntur sub aëstu canticulæ. Vbi siccum & viride euaserit, ficum decoctum adijcitur, & simul emollia tolluntur, & in olla eris rubri reponuntur. Decoctum autem caricarum ita habet. Caricarum pinguiū pondo libras quinque, aquæ sextarios sex: coquuntur, donec sextarij duo reliqui fuerint. Vius est, vna pars medicamenti aceto diluti, vt sordes repræsentet, ad sex partes resinoceri idest resinæ cum cera iunctæ. Est autem syncerum Resinocerum, ceræ pars vna, resinæ frictæ tres, cū oleo pauco liquefacto: medium, ceræ pars vna, resinæ duæ: dilutum verò, & abūde temperatum, ceræ pars vna, resinæ tantundem: dissolutum, ceræ partes duæ, resinæ vna: quod supra quā dilutum, ceræ partes tres, resinæ vna. Scribitur etiam agresti licheni i. impetigini, conuenisse, purum iniectum. Hæc Crito ad verbum prodidit. Ego à fine eorum, quæ dixit, sermonis principium statuam. Agrestes impetigines nominant, cum à medicamentis imbecilliter siccantibus nihil iuuari vident, à validis autem iritari. Opus igitur in ipsis est medicamento efficaci abunde, non tamē vehementer mordaci: quod, vt dixi, ex artificiali coniectura compolitum experientia probatur. Constat propositum pharmacum ex multis acris tenuiorum partium & digerentibus: habet autem & quædam citra mordicationem detergentia, & non nulla parum adstringentia. Itaq; acria ex ijs, quæ cōtinet, **F** sunt pyrethrum, sinapi, coccus cnidius, columbinum stercus, ærugo, bacca lauri, nitrum, sal ammoniacus, item acetum acre, tale nanque iniiciendum censet. Detergētium summē quidem lenia immordacia q̄z sunt iris & aristolochia: atq; his adhuc magis, vt ex genere cōcoquentium iam sit, māna: generosius autem cachrys & staphis agria: his adhuc præcellit cuminum, & cruce semen. Cyperum sine morfu quidem exiccat, sed non nihil etiā adstringit: quemadmodum & æris squama, validum & ipsum medicamē. Oportebat enim, vt prius demonstratum est, medicamētum hoc adstringentis virtutis vtcūq; esse particeps, eo q̄z squama copiose admista est. Si verò & māna vera manna sit, & non thus, ipsa quoque aliquantulum adstringit. Iniecta est autem & hæc multo copiosior, q̄ squama meritò, vt acrium pharmacorum vehementiam leniat, simul q̄z humores in afflicta parte cōtentos coquat. Porro caricarum decoctio mitigatissima est, & maximē coquit, simul q̄z quodammodo digerit. Hæc igitur omnia mista multi vñs medicamentū iurē effecerūt. Acetū verò efficaciam eorū plurimū iuuat, in quo pharmaca æstiuo Sole conteri præcipit: omnia enim sic præparata tenuem substantiam acquirūt, eo q̄z in corporis altum virtus ipsorū penetrat.

Quæ Heras eiusdem generis Emplastra tradiderit.

CAP. 3.

EMplastrum ex herbis quo modo Crito præparet prius posui: & ipse Heras similiter conficit, **G** sicut Crito eius meminit. Differt tamen in confectione emplastri ex scilla cōfecti nam ammoniaci, myrrhæ, resinæ pityinæ, styracis, squamæ, & scillæ tantū cū alijs Crito miscet, quantū Heras: sed in aristolochia & iride discordat: quippe Heras scripsit aristolochiæ rotundæ denariū pōdo triginta, iridis siccæ tantūdem, alijs quindecim: Crito autem sic protulit, aristolochiæ, iridis, singulorum denariū pōdo quatuor. Rursus quoq; post hæc Heras iuxta cōfectionis finem tradit, **†** Expletis diebus ceratum huiusmodi facito: Ceræ pondo libras quinque, alijs denariū pondo ducetorū quadraginta: terebinthinæ pondo libram, alijs denariū pondo triginta: olei veteris sextarios duos & s, alijs heminas sex. } Mihi verò non placet pro quinque libris ceræ denariū pondo ducentorum quadraginta, medicamento miscere. Interim nanq; loco libræ, centum denarios ipsi scribunt, interdum loco minæ: atqui nullus vnquam libram tam exiguam posuit, vt denarios quadraginta octo penderet. Hoc enim accidit, dum pro quinque libris denarij ducenti quadraginta immittuntur, sic neq; pro libra terebinthinæ denarij triginta.

Emplastrum Serapionis.

CAP. 4.

ET hoc Crito in opere medicamentario in hæc verba conscripsit. **¶** Emplastrum Serapionis, quod non nulli Aegyptium, alijs Vnerem vocant. Facit ad omne Vlnus, cui innitendum est omni desperatione abiecta. Valer ad Punctus, Aculeos, Parotidas, Perforationem, Phymata, excolando Conglutinat. Tollit omnem Duritiem, iuuat Epimictidas, Articulorum epiphoram, Aurium contusiones. Sanat & Vlcera senilia, Chironia, & quæ crassas oras obtinent. Olei veteris heminas tres, argenti spumæ denariorū pondo ducentorū, guttæ ammoniaci denariū pondo centum sexaginta octo: resinæ colophonix, pityinæ, denariū pondo sexaginta octo: ceræ denariū pondo centum sexaginta octo, chalbanī denariū pondo viginti: æruginis denariū pondo quinquaginta, alijs viginti: myrrhæ denariū pondo quatuor, alijs octo. Argenti spuma coquitur ex oleo, donec mediocriter coiuisse visa fuerint. Deinde olla ab igne deposita gutta ammoniaci immittit, postea resina, postremo cera. Vbi singula curiose liquata fuerint, ne adurantur, olla ab igne rursus sublata chalbanum aspergitur & ærugo: iterum super ignem ponitur, coquitur q̄z donec melinum fiat, & iustam crassitiem nascatur: Postremo sublato myrrha adijcitur, ac vbi moueris defundito, pelle q̄z excipiens reponito.

Vt Andromachus prædicta Emplastra conscripserit.

CAP. 5.

TRes huius emplastri confectiones tradidit Andromachus, primam à præscripta Critonis nō nihil dissentientem: deinde alias duas magis euariantes. Titulum aut medicamenti & præparationem

* Af. xl. cum tñ
superius in cōf-
fectione empla-
stri legatur
xxx, alijs xv.

† Eadē tñ legū-
tur superius in
Critonis p. con-
fectione, p. 255 f

* Alias cen-
tum triginta.

A rationē rectē prius Crito conscripsit: Andromachus in hanc sententiā de ea precepit. *Emplastrum ex Herbis.* Anagallidis cœruleum florem habentis, marrubij, papaueris agrestis, alterci viridis, singulorum denariū pondo quinquaginta sex: squamę denariū pōdo xxv, thuris denariū pondo octo, resinę siccę denariū pondo sedecim, aloes tantundem, aluminis fissilis denariū pondo iij, cerę pondo minam, olei veteris heminas duas, aceti * . Multi quidem vtriusq; anagallidis: Theocritus autem & terrę erethrię, & chrysocolle, & salis ammoniaci, & auripigmenti, singulorum denariū pondo iij, in emplastrum ex herbis coniecit.

Alia Emplastra ex eodem genere, de quibus scripsit Andromachus.

CAP. 6.

AD Gangrenas, Putredines, Nomas veteres & cacoethes, Isidori Antiochei. Argenti spumę denariū pondo quatuor, æruginis rasę denariū pōdo viij: olei cyathos sex, Talus cyathos xij: & æruginis scolecę * . Argenti spuma & ærugo in cacabum læuigata mittitur, olei tres cyathi superfunduntur, coquitur pruna non acri, mouetur q; spatha lignea, donec viride fiat. Postea ab igne sublata, ac mortario superfusa contunditur, dum calidū est, diutius: deinde rursus tres olei cyathos in ollam fundito, moueto q; ne aduratur: quousq; melinum fiat, incoquito. Ac rursus eximens terito, vt collyria: iterum q; excipiens in ollam coquito mouendo, quousq; rubrum colorē accipiat. Quin etiam tertio ex cacabo in mortarium defusa diutius terito: atque iterum quarto in olla coquito, vt in vnum coeant. Rursus q; dum calet, defusa trita q; excipito, & in rubra pyxide deponito, ad prædicta q; vtitor. Post commemoratum emplastrum alterius deinceps his verbis Andromachus meminit. *Humidum Emplastrum ad Nomas, quo vtor, & ad Alia multa.* Cere, resinę terebinthinę, singulorū denariū pondo viij: adipis taurini curati denariū pondo iij, chalcitidis denariū pondo duū, squamę aris denariū pondo tritū, mānę thuris denariū pondo duū, gallę immaturę denariū pondo iij, olei myrtei heminas quinq;. Arida cum aceto & melle sumuntur, deinde sic liquabilia superfunduntur.

Ad Artis opera Methodo & Exercitatione opus esse.

CAP. 7.

QUOD auxiliorum quædam ratio sola inuenit: quædam experientia, quæ & ipsa rationē non requirit: non nulla vtriusq; opem postulant: subinde vobis demonstratum est. Ad hæc etiā q; quæ ratione & experientia comperta sunt, coniecturali via ad eorum, quæ inquiruntur, inuentionē vtuntur: quæ verō per rationē sperata sunt, experientia cōfirmantur: Quin etiā spei cōiecturalis non mediocrem, quemadmodum & in vniuersa vita, maioris minoris q; esse differentiam: non enim pluuiam hyemali solstitio, & caniculæ ortu, futuram similiter speramus, quæ hyemali frequenter, sub caniculæ æstu raro accidit. Porro cum omnia artium opera frequenti firmentur exercitio, non satis est generalia ipsarum addiscere duntaxat, sed etiam in particularibus exerceri subinde oportet: † nam actionum vsus seu exercitatio, ad perfectorum possessionem via est. Quare ego quoq; in omnibus cōmentarijs, quos vobis amici petentibus cōposui, non solis communibus theorematibus contentus fui, sed exēpla multa etiā exercēdi gratia adieci, quibus ipsorum cognitionē vobis euidentiorē, magis q; firmam, fore sperabam. Quemadmodum igitur in alijs omnibus medicinę partibus, ita & in neruorum vulnerum curatione scripsi, primum vobis rationalem viam ostendens, qua ad præsidiorum inuentionem perueniatis: Deinde materias, quibus vires à ratione inuentas contineri didicistis, siquidem in cōmentarijs, qui vndecim numero sunt de Simplicium medicamentorum facultate, particularium materiarum vires vniuersas, vel plurimas, eas q; vtilissimas exposui. Nam vt præsidij nunquā destitueremini, hoc esse necessarium demonstrauimus, nō solum vt vos ipsi quoq; in preparatorum ab alijs medicaminum inopia, auxiliorum copiam haberetis (sicut olim Erasistratus, quum stomaticum medicamen in illo profectio- nis loco ad manū non esset, interdum herbarū succos, quibus abundabat, vsurpauit) sed etiam vt si illorum authorum scriptiones perierint, ipsi queamus similia perditis cōficere. Insuper vt ab alijs diuuentis rectē vtamur, exercitatio ex proposito opere accedens profuerit. Quid opus est, vt dicā illam quoq; adiumento esse, vt quæ compositis medicamentis superfluo iniecta sint, & cōtra quæ primi illorum authores omiserint, discernere possimus: sicut in tertio libro ostendimus, sermonē de medicamentis ad neruorum vulnera idoneis facientes. Ita vero & nunc indicabimus, exercen- tes vos in ijs, quæ me seniores medici inuenerunt. Vniuersalis etenim methodus neque cum distinctionibus exactē, neque sine ijs imperfectē à quoquam priorum tradita est: immo nec medicamentum, quod curare promittat neruos ab acuto aliquo punctos, cuiusmodi sunt acus, & puerorum styli, quisquā memorię prodidit, quod ipsum hoc solum facere optimē possit: at ego certē eorum innumerabilem copiam prædicto libro percensui. Quidam tamen ipsorū nimirū diligentiores, cum multi vsus pharmaca notatu digna scripsissent, præter alia, quæ facere ipsa pollicentur, adiunxere interdum quidem & neruorum vulneribus esse accommoda, interim neruorum & musculorum præcisionibus, aliqñ etiam puncturis ipsorum vel contusionibus auxiliari. Vobis autē ex ijs, quæ didicistis licet cognoscere ante experientiam, possibilia ne quis, an impossibilia, de quibus scripsit polliceatur. Præterea & ea sine quibus descripta medicamenta agere nata sunt, vobis intelligere integrum est, in quibus ipsis est vtendum. Vt igitur ceu exēpli gratia exordiar emplastrum quoddam, pharmacum multiplicis vsus, quod Andromachus in libro de medicamentis

* Al. xiiij.

† Ex antiquis ita legendū, nā quæ p imperfectas actiones sūt exercitatio, ad perfectarū &c.

DE COMPOS. MEDIC.

extrinsecus corpori adhibitis, ordine secundum posuit, haud indicans ad quæ maximè ipso vtendum sit. Exerceri rursus vobis licet, quomodo ex cōmemoratis simplicibus medicamentis compositi vires sint cognoscendæ.

Fusca Aegyptia Andromachi.

CAP. S.

▪ Al. exliiij.

▪ Al. quatuor.

▪ Al. viij.

Andromachus enim ita ad verbū prodidit. **¶ Fusca Aegyptia.** Argēti spumæ denariū pondo quadragintaquatuor, ricini heminas sex, ceræ denariū pōdo cxxxiiij, guttæ ammoniaci denariū pondo lxxij, terebinthinæ denariū pondo xxxvj, lanarū cōbustarū denariū pondo xviij: squamæ stomomatis, squamæ æris, aristolochiæ, thuris, singulorū denariū pondo viij. Non nulli myrrhæ denariū pondo iij, opopanacis denariū pondo ij, marinæ aquæ denariorum pondo quinquāginta ad ceram conspergendam. Hæc quidem scriptura pharmaci boni & re vera vsus multiplicis est: verum ipse dicendum omisit, in quibus eo vtendum erit. Si igitur cuiusq; simplicis medicamētī virtute ante expōita, quemadmodum nos in vndecim libris factitauimus, & methodo quāpiam vniuersali compositionis medicaminum scripta, sicut à nobis quoq; præcedente libro factum est, viuentibus amicis huiusmodi scriptiōnes exercitiij gratia protulisset, vt ad quos affectus vtile esse compositum medicamentum posset, decernerent, nimirum hominis institutum laudassemus: quoniam verò nihil horum egit, quis non ipsum omnino accusatione dignum censeat? Vnde medicamētarij ipsius libri, qui complurium optimorum medicaminum compositiones habent, merito à medicis neglecti sunt: nam inter sexcentos vix vnus artis absolutionem habere videtur: alij idiotarum modo satis habent, si medicamentis manifesto scriptis rectè vtī queāt. At quid oportet dicere de huiusmodi medicis? Cum etiā empiricorum nō nulli, vt vocant, quāuis celebres ex artis operibus conspiciantur, tamen ignorare se fateantur, quānam ratione vnumquodque compositorum pharmacorum inuētum fuerit. Atqui quid ego dico ratione? protinus enim ne vllum ex eiusmodi medicamentis inuentum esse ratione pronunciant. Inutilis igitur ipsis est fusci huius emplastri scriptura, quæ colorem tantum in titulo docet, vires non item, quas ante colorem scriptas esse præstiterat. Quoniam itaque Andromachus virtutem ipsius dicere neglexit, nos ex mistorum specie & facultate inuenire conemur. Argēti spumam medijs temperamenti calfaciendo & refrigerando, paulum ad siccitatem inclinare didicistis: Præterea vsum eius in emplastris esse duplicem, nempe si non liqueat, ceu materiæ duntaxat momentum adferre: si liquata fuerit, etiam siccare posse, id q; magis, si diutius cocta fuerit. Nunc tamen quæstio est, quatenus incoqui debeat, cum Andromachus sex heminas ricini, quod est olei ricinini, miscendas esse tradiderit. Quot enim vnciarum Romanæ libræ, heminam esse velit, non explicuit: & si melius erat hominem, qui Romæ degerat, librarum, sextariorum, & vnciarum meminisse, relinquere autem coryles id est heminæ, vocabulum Græcis ciuitatibus extra Italiam vsitatum. Si ergo in omnibus ipsis idem nomen heminæ esset, nulla vtiq; foret quæstio: nunc vero cum permagna quantitatis inter eas sit differentia, cōueniebat ipsum monere, se vel atticam, vel alexandreoticā, vel ephesiam, vel aliam quāpiam heminam dicere. Nam permulti, qui de mensuris & ponderibus scripserunt, nouem vncijs Romanæ libræ heminam medicos in pharmacorū libris estimasse produnt: alij duodecim vncijs ab eis reputari affirmant, sicut Romæ olei libram ex more appellant. Iam vero quendam audiui, qui heminam à medicis in pharmacorum commētarijs traditam sedecim vncias Romanas pendere diceret. At non parum refert ad medicamētī virtutē, vel magnas vel paruas heminas iniicere. Ego sanè olei libram Romæ vocatam, quam per incisuris distincta cornua metiuntur, ponderaui quandoq; discere cupiens quantum grauitatis pondus contineret, inueni duodecim olei mensurales, decem vncijs pōderum æquales. Quare medicos in libris de medicamentis accuratius scribere oportebat, quales videlicet vncias, vel libras, medicaminum liquidorū immitti vellent, mensurales ne, an ponderum: perspicuum enim est, liquidorum horum corporū, sicut etiā solidorum, alia grauiora, alia leuiora esse. Ac singulorum liquidorum, quæ in pharmacā mittuntur, pondus alio libro declarauimus, sed in præsentia id quod propositum est repetamus. Etenim si nouem vnciarum mensuralium singulas heminas esse statueris, ex tribus septem & viginti vncias produces: si in octo denarios quāq; vnciam diuidas, denarios ducentos & sedecim habebis: si duodecim vncijs singulas heminas æstimes, fient nimirum sex & triginta vnciæ, denarij vero ducentioctoginta octo, singulis vncijs in octo denarios diuisis. Expertus sum ego plerunq; cum argenti spumam ex oleo coxissem, commoderatam ipsius misturam libræ quidem argenti spumæ ponderali, mensurali vero olei parem fieri: q; si copiosius oleum iniicias, & coctā videlicet diutius, maiorem vim siccandi assumere. In candidis emplastris coloris gratia cerussam quoque argenti spumæ miscemus, omnino æqualem pondere. Immittitur autem hemina nouem vnciarum iuxta ponderalem argenti spumæ libræ, colorem seruare volentibus, eo q; diuturnior coctio nigriorē argenti spumam efficiat: sed oleo pauco indito medicamētum glutinans euadit. Proinde quidam vel terebinthinam resinam, vel quam vocant colophoniam quantum licet pelluentem, miscuerunt, conantes neq; colorem offendere neque medicamentī virtutem, adiicere q; resinæ mistura tenacitatem, quo non facile decidat: quippe medicamentum, si tanto oleo tantum argēti spumæ & cerussæ coquatur, arenidum ac friabile redditur. Non nulli eadem ratione cocto medicamini

A medicamini albam ceram indiderunt. Spumæ tñ argenti duplum olei habenti si nihil etiam resinum vel cerosum immittas, ex coctione glutinans erit, & multo magis, si cum argenti spuma olei triplum misceas, hoc est si tres olei mensurales vncias cū tribus argenti spumæ ponderalibus committas. Consentaneum igitur est Andromachum nouem vncijs mēsuralibus oleum ricini immitti iubere, vt sex hemina vncias quinquagintaquatuor expediant mensurales, quod idem est, ac si dicas, mensuræ Romanæ libras iij & s. At clarum est ricini inopia interim vetus oleum eius loco assumendū esse. Ego subinde & sicyonium inieci emplastris digerentibus: & cū illud non adesset, aliud mea ipsius industria simile illis effeci, radicibus cucumeris agrestis bryoniæ & althææ in eo decoctis. Quod verò propositum medicamē digerens emolliens q; Andromachus esse cupiat, ricinini olei, & copiosa guttæ ammoniaci mistura, palam indicat: nam argenti spumæ ceram pondere parem, ammoniacum dimidium, esse præcipit: et si in multis nobilibus emplastris non dimidium, sed quarta pars, vel quinta, crebrò septima, & octaua, non nunq; decima, pondere ad argenti spumæ proportionem medicamenti huius immittatur. De cera didicimus, q in huiusmodi pharmacorum compositionibus materiæ locum obtinet, non virtutis efficaciam adiuuat. Adest verò & ei vis quadā emolliendi exigua, sed non illius ergo medicamini præsentī admīsta

B est, quemadmodum nec terebinthina resina, quanq; multo viribus, q; cera, præstātor: etenim magis mollit, q; illa, item calfacit & digerit, ex quibus cera ne alterum quidem efficit. Verū gutta ammoniaci sola imposita squalidum aridum q; reddet medicamentum. Quantum verò ad emplāstri confectionem, hoc est emplāstropœiam (neq; enim ita appellasse nocet) attinet, vtilis est tum cera, tum resina: quippe mollit digerit q; medicamen vel solius ammoniaci beneficio, quod quidem inter emollientia principatum occupat, in digerentibus verò concertat. Porro si, quæ in libro quinto de Simplicium medicaminum facultate dicta sunt, in memoriam reuocaueritis ad intelligendum quale nam huiusmodi medicamenti temperamentum esse oporteat, nihil adhuc recentiori disciplina indigebitis. Nam Primæ facultates effectūq; medicamenti sunt, in calore, frigiditate, humiditate, & siccitate: Secundæ mollientes, digerentes, repersorix, attractrices, coctrices, deterforix, & exedentes: Quemadmodum & Tertiæ dicuntur quæ glutinant vulnera, cicatricem inducunt, & carnem generant. Cōpositū igitur ex oleo ricinino & gutta ammoniaci medicamentum abunde potest digerere, emollire, & nimirum etiam siccare, vbi materiā idoneam assumpserit, cerā, resinam, & diutius coctam argenti spumā. Ad hæc verò iubet inijcere lanas combustas, aristolochiam, medicamenta, quæ plurimū digerunt & exiccant. Præterea meminit phar

Cmaci quod concoquit & digerit, nempe thuris. Quod si myrrhæ nō nihil & opopanacis adijcit, (quosdam enim ait & ex ijs aliquid miscere medicamento) illam sanè scimus non ignauiter calefacere & exicare: opopanacem verò & generosius adhuc hæc vtrq; efficere, insuper attenuādi digerendi q; facultate præstare: sed huius quidem paucillum inditur, timente, opinor, eo qui ipsum apponit, medicamenti acrimoniam, & volente non solum digerens emolliens q; emplāstrum, sed vulneribus quoq; idoneum, efficere. Propterea igitur & squamam æris & stomomatis cum ea miscuit, quæ præterq; q; valide siccant, adstringendi etiam vim sortita sunt. Ergo propter horū misturam propositum nobis in sermone emplāstrum Ægyptium cruentis vulneribus, vlcibus q; alijs non paucis, bonum medicamen redditur. Quin etiam ad abscessus, & omnia quæ discuti possunt, subinde audiuitis medicamenta, quæ simul cū digerentibus et adstringentium aliquod capiunt, tutiora fieri: quæ verò sine adstringentibus digerunt, efficaciora quidem, sed non perinde tuta. Sæpe enim fluxiones attrahunt, dum corpus, quod curatur, plethoricum est, vel prauo succo obnoxium: sin autem vacuum corpus est, ac superfluitatibus liberum, promptius medicamēta, quæ magis discutiunt, sola, sine adstringentibus assumpta, ad finem perueniunt: at cū pauca id genus corpora, quibus medicamenta alteruntur, reperias, iccirco securius esse visum est miscere

D etiam non nulla repellentia. Ita sanè & emplāstro digerenti, quod ex sale conficitur, quidam adiecerunt chalcanthi paululum, quanuis & sal ipse adstringens quippiam possideat. Igitur propositum medicamen fortiter digerere compertum est, vt etiam pus iam non admodum copiosum si ne cutis perforatione discutere queat, emollire callosa & quomodocunq; indurata: item magna vulnera conglutinare, quemadmodum & vlcibus iam ad malignitatem declinantibus cicatricem obducere, alijs q; omnibus affectibus qui digerendi simul & repellēdi virtutem desiderant: in quibus sunt & quæ fronti, dum oculi fluxione laborant, imponuntur, vocata à medicis anacolle mata. Idem hoc pharmacū conueniet & neruis denudatis, et si in parte sua ipsorū quapiā abscessi fuerint: etenim p̄cisi, periculo, quod ex cōsensu oritur, carētes, adhuc etiam subiectis sibi partibus, in quæ inieruntur, sensum adimunt: indigent sanè & hi quoq; tali pharmaco, nā quæ humectāt, facile eos putrefaciunt. Ob quod & pastilli siccantes, et si abunde adstringant, tñ denudatis neruis conueniunt, qui non dum ad phlegmones vigorem peruenerunt: hi nanq; indignantur irritantur q; ab huiusmodi pharmacis. Sed de his postea. Quæ de proposito emplāstro dicenda restāt, apponamus. Quoniam plerunq; medici ex inscitia id genus emplāstra dura imponunt, cū liquata linamentis excipere præstaret, vel etiam in confectione statim molliuscula reddere: postea cum in magnis diuisionibus, vbi nerui denudati sunt, experimentum de ipsis fecere, sperant in pun-

sturis multo vtiliora fore, ignorantes & hic maximam quandam speculationem, de qua differui E modo, vos docens, quæ ratione inueni, inde per experientiam confirmari cognoui: propterea etiā nunc admoneo. Multo nanq; calidiora, & quæ digerant magis, pharmaca, punctus neruorum requirunt, q̃ cum omnino denudati fuerint vulnere insigni facto: quippe nudi acia calida q̃ admodum medicamenta propter erosionem mortum q̃ non ferunt, verum relaxantia digerentia q̃ adstringentibus mediocriter mista postulant. At quoniā etiam melius est ambientes vulneris particulas acribus & tenuibus, multum q̃ digerentibus, quale est ex Euphorbio confectum, cōregere, nos sanē propositū emplastrū satis potest, quæ prædixi, efficere coniecrauimus: ei q̃ præparato experientia testimoniū accessit. Postea interim in Asclepiadis & Critonis libros medicatorios incidens, deprehendi ipsos non vt Andromachus quoq; indistinctē, sed cum manifesta distinctione, virtutem ipsius scriptitasse. Igitur tum huius gratia, tum q̃ in confectiōe in quibusdam ab Andromacho dissentiant, satius visum est mihi etiā eorundem verba subiungere, deinde ita & de ipsorum discordia in medicamenti compositione non nihil dicere.

Quæ Asclepiades & Crito de proposito Aegyptio Emplastro conscripserint. CAP. 9.

DE emplastro Aegyptio ab Andromacho tradito Asclepiades in hūc modū differit. *Andromachi Aegyptium, Cruentis vulneribus accommodatum. Facit ad Neruorum, Musculorum q̃ præcissiones, Punctus, Contusiones. Iuuat Attritus, Artuum fracturas. Est & Lippientibus collyrium. Confert Capite dolentibus. Summam ad Multos affectus vtile est pharmacum.* Argenti spumæ, ceræ, singulorum denariū pondo cxxxiiij, guttæ ammoniaci denariū pondo lxxij, terebinthinæ denarium pondo xxxvj, lanæ succidæ combustæ denariū pondo x & viij: squamæ aris, squamæ stomomatis, thuris, aristolochiæ rotundæ, singulorum denariū pondo viij: ricini heminas tres. Hæc præfatus Asclepiades deinceps coquendi modum tradit, Andromacho neq; hanc partem compositionis in emplastris obseruante, liquidem in omnibus ferē omisit. Verum de coctiōe dicta sunt non pauca in libro quarto, & nunc paulo post dicetur. At quum autem est inspicere controuersiam, quā Asclepiades in simplicium medicaminum quantitate cum Andromacho suscepit: non enim sex heminas ricini vt Andromachus, sed tres iniicere præcepit. Caterū in aristolochiā nullam Andromachus distinctionē fecit, ipse rotundam adiecit: sicut & in lana cōbusta, succidam addidit, quanq̃ idem pondus quod Andromachus immittat. Hæc igitur ipsius verba sunt: Lanæ succidæ cōbusta denariū pondo duodeuiginti, aristolochiæ rotundæ denariū pondo viij. Quæ vero ad calcem posuit Andromachus, neq; omnino Asclepiades meminit, neq; de myrrha, neq; de opopana ce quicq; locutus, multo minus de marina, quæ manifesto Andromachus præposuit, Marinā, in- *G*

Al. primo.

† Al. vicius octo.

* Aliter octo.

* Al. iij.

Coctiōnem emplastri Asclepiades his verbis docet: Argenti spumam, & ricinum incoquito, donec in vnum coeāt, deinde squamas: vbi color bonus apparet, reliqua immittito. Apud Critonē hoc modo traditur: Argenti spuma cū ricino coquitur, dum mellis spissitudinē habeat: hoc facto squamæ insperguntur, abunde q̃ incoquuntur, quousq; digitos nō inquinent: postea terebinthina & cera: vbi in vnum coierint, ammoniacum, prius apud ignem digitis emollitum: cum iam ab igne deponitur, lanæ succidæ puluis inspergitur, postremo thus: deinde ita tollitur. Porro & ad quæ medicamentum valeat, accuratius Crito his verbis exposuit: Aegyptia omnem diuisionem contusionem q̃ a phlegmone præseruat. Valet ad quoslibet ferarum morsus, iuuat phlegmonas sine vlceribus factas. Benefacit etiam neruorū & musculorum doloribus sine causa † abortis.

† Additur in quibusdā cod. *cauepās, idest manifesta.*

Alia Andromachi Fusca.

CAP. 10.

Scripsit alia quoq; fusca Andromachus superiori quodammodo genere similia: vocat alterū Athenam hoc est Mineruam, alterū Nygmaticum, idest puncturis accommodatum. Miner- *H* ua quidem ad plures affectus, q̃ Nygmaticum, conuenit, præsertim cū vlceribus consistentes: qm̃ magis varia est, magis q̃ adstringentibus insuper pharmacis participat: Nygmaticum verò magis hac laxat, & doloris mitigantius est. Itaque de priore medicamento ita ad verbum scriptum reliquit. *Fuscum, Minerua.* Argenti spumæ denariū pondo c, terebinthinæ denariū pondo triginta sex, ceræ denariū pondo xxv, minij sinopici denariū pōdo xxiiij, guttæ ammoniaci denariū pondo xxxvj, chalbanī denariū pondo xij, aloes denariū pondo viij, diphrygis tantundem: aris cōbusti, mastiches, singulorum denariū pondo sex: aristolochiæ denariū pondo v, propolis tantundem, manna denariū pondo sex, squamæ eris denariū pondo sex, lapidis alij denariū pondo triū, trifolij seminis denariū pondo ij, symphyti radicis denarij pondo vnus obol. iij, olei heminas iij. De altero fusco sic ad verbum Andromachus scripsit. *Fuscum, Nygmaticum.* Guttæ ammoniaci, ceræ recentis, singulorum denariū pondo viij: terebinthinæ denariū pondo triū, aris cōbusti denariū pondo viij, picis aridæ denariū pondo xxx. Vt Zeno vult, minæ dimidiū, & quartam portionem: argenti spumæ denariū pondo iij: aloes indicæ, aristolochiæ, chalbanī, denariū pondo ij: æruginis denarij pondo j, alij duū: thuris denariū pondo ij: olei per hyemem † heminas quatuor, per æstatem octauam partem: ammoniacum ex tribus aceti cyathis diluitur.

* Al. viij.

† Al. quartū hemina partē

Ad diluatur. Iam verò & alia multa cum his emplastra prodidit Andromachus, nihil aliud ipsis apponens quàm coloris nomen: quæ constant quidem ex contrarijs facultate medicamentis, sed alia ipsorum laxandi & doloris tollendi vim maiorem obtinent, quædam digerendi & detergendi, non nulla adstringendi. Quare nos et ipsos omnibus fidentes commodè uti convenit ad ulcera, quæ vix cicatricem recipiunt, & cacoethe, fortius adstringentibus: ubi lenire & laxare proposueris, magis relaxantibus: ubi trahere & discutere conaris, ipsæ quæ calefaciendi virtutem præpollentem habent, quæ quæ prauos humores in profundo ad sese trahunt. Quibusdam & hoc adiectum est, Fuscum Lite quo utor. Tria. n. deinceps talia non variæ mixturæ describit, quorum ipsorum etiam confessionem ipsiusmet verbis allegare melius esse videtur. *¶ Fuscum Lite, quo utor.* Argenti spumæ denarij pondo xxiiij, ricini heminam vnam: aris combusti, mannæ, resinæ, singulorum denarij pondo iij: colophonæ denarij pondo viij. *¶ Aliud Iridori ad Dolorem sedandum.* Argenti spumæ, ceræ, singulorum denarij pondo xxxvj: olei heminam vnam & s, resinæ colophonæ denarij pondo xv, squamæ aris denarij pondo ix, mannæ denarij pondo quinquaginta: incoquito.

* Al. trahendi.

* Al. triu. al. xv.

¶ Aliud, quo utor. Argenti spumæ, resinæ siccæ, singulorum denarij pondo cxliij: squamæ denarij pondo xxiiij, olei heminas ij. Quemadmodum autem his commemoratis tribus ad-
Biunxit, alij quæ ipse utatur, alij quæ dolori leniendo sit, ita de alijs testimoniū perhibuit, theriacas ipsa nominans. Tertiū igitur ab initio his verbis traditum est: *Theriaca, qua utor.* Hanc sequitur alia rursus, cui præscriptum sic est: *Eupatorios Theriaca.* Verum de Theriacis postea dicemus, nunc autem de fuscis adhuc, quæ prodidit Andromachus, dicere cogito: quorum quæ vires ille & confecturas neglexit, accusandus est. *¶ Aliud Fuscum.* Statim igitur primo omnium scripto amicus quidam medicus usus est, permulta facienti. Etenim ulcera, quæ cicatricem ægrè ducunt, præsertim ubi callosa & dura labra vlcus amplectantur, claudit. Prodest et putredini, titulis, sinus iungit, & magna vulnere. Summatim multiplicis usus est. Componentiū ipsam pharmacorū symmetria hunc in modum scripta est. Argenti spumæ denarij pondo cxliij, olei heminas v: calcis viuæ, thuris, aris combusti, terebinthinæ, aristolochiæ, singulorum denarij pondo xlvij: picis, ceræ, ammoniaci, singulorum denarij pondo xvj. Ita quidem Andromachus scripsit. Licet tibi et minori mixtura ipsum præparare, singulorum quæ numeravimus quartam partem miscendo, fiet enim compositio talis: Argenti spumæ denarij pondo xxxvj: calcis viuæ, aris combusti, thuris, terebinthinæ, aristolochiæ, singulorum tertiam argenti spumæ partem, hoc est denarij pondo xij: deinde picis, ceræ, guttæ ammoniaci, singulorum duplo maius pondus, quæ in dictis quinque medicamentis erit, aristolochia dico, terebinthina, thure, ære combusto, & calce, quam viuam & recētem esse oportet. Ita pharmacum etiam ad putrida utile fiet. Cum autem Andromachus omnia medicamenta per denarios scripserit, melius egisset, si & olei secundum eandem symmetriam meminisset, ut quod inijceretur, totidem denarios penderet: aut si non hoc, certe cōveniebat ipsum Romanorum libræ mentionem facere: nunc autem heminam scribit, consuetam de hac mensura ambiguitatem nobis relinquens, novem ne videlicet mensurales uncias, an duodecim, esse heminam velit. Mea quidem sententia perfecta symmetria sex uncias ponderis capiet, quia Romanorum libra xij uncias pendet. Si ex quarta parte componis, nota est proportio, nec latere arbitror, vel si denarios quis dicat ad absolutam symmetriam quadringentos octoginta assumi, eo quod ponderalis uncia octo denarijs valeat. Insuper aliud quoddam inter fusca ab Andromacho positum est, quod & ipsum calcem viuam recipit, eiusdem cum superiore generis. Præponit autem ei.

¶ Fuscum Ebuli. Et secundum hanc symmetriam præparat. Argenti spumæ pondo libram, ceræ pondo minam: aris combusti, æruginis, terebinthinæ, singulorum denarij pondo xj: resinæ siccæ denarij pondo xvj, guttæ ammoniaci denarij pondo viij, thuris denarij pondo xij, opopanax denarij pondo viij, olei heminas iij, aceti totidem: in quibusdam exemplaribus scriptum est heminæ dimidium. Et nimirum dupliciter conficere ipsum licet, scienti copiosius acetū valētissimū medicamē efficere. Quin etiam aliud fuscum, cui hoc ipsum præponit. *¶ Aliud Fuscum.*

Refert Andromachus singulorum cōnexum, hoc est pharmacū, ex marina præparatū, similibus vitijs, quibus præscripta, accommodū. Compositio eius talis est. Argenti spumæ, ceræ, singulorum minæ dimidiū: chalcitidis quartam minæ portionē, squamæ aris denarij pondo xvj, thuris denarij pondo viij: terebinthinæ quartā partem & octauam, minæ videlicet: guttæ ammoniaci quartam partem: marinæ aque heminam, alij heminæ dimidiū: ricini heminas tres: ammoniacum marina diluitur. Hec sanè Andromachus retulit, eatenus cōfectionis mentionē faciens, ut diceret ammoniacum cū marina prius videlicet diluendū. De chalcitide verò & squama nihil posuit, quanquā & hæc ex marina læuigari queant, sicut et coqui cum argenti spuma, cera, & terebinthina. Ut igitur nullū aliud fuscū à quouis alio queratis, adijciā alia duo eiusdem authoris. Vocat alterum ipsorum.

* Aliter octo.

¶ Phtherophagi. Quod hæc recipere dicit. Argenti spumæ denarij pondo c, resinæ denarij pondo l, guttæ ammoniaci denarij pondo xxx, ceræ denarij pondo l, æruginis rasæ denarij pondo xij, squamæ aris denarij pondo dūū, aristolochiæ denarij pondo viij, centaurij radices tantundem, olei heminas ij. Irionis autem medicamentum ex his cōstare ait. *¶ Argenti spumæ, picis siccæ, vtriusque* pondo denarij cxlvij: *† terebinthinæ, guttæ ammoniaci, singulorum* denarij pondo

† Al. terebinthina drach. lxxj, guttæ ammoniaci drach. xj.

Quinta Classis.

k k k k k iij do

† Al. manna
thuris, singulo
rum denario-
rum pondo se-
ptuagintaduū:
sed, an bene, &
inferius ēt capi-
te 14, alij iudi-
cant.

do septuagintaduū: } † mānē thuris denariūm pondo centumduū, seu vitulini denariūm pō. E
do centumquadragintaduū, ceræ denariūm pondo xxxvj: aristolochiæ, grisei combusti, æruginis ra-
sæ, chalbanī, opopanacis, singulorum denariūm pondo nouem: aceti hemine dimidiū: olei, rici-
ni, vtriusq; heminam vnam & s. Perspicuum est terebinthine, guttæ, & thuris, partes, duplo pon-
dere ab argenti spuma, pice, seu vitulino, superari velle: ceræ quadruplo: aristolochiæ, æris vsti,
æruginis, chalbanī, opopanacis sexcuplo decuplo. Atq; hoc pharmacum abunde in vsum venit
multiplicem, quemadmodum & alia præcedentia, quibus omnibus audacter vtendū est. *Hel-
lespontia vt Andromachus.* Celebre & hoc emplastrum inter fusca retulit Andromachus hac sym-
metria. Argenti spumæ denariūm pondo centum, picis denariūm pondo quinquaginta, ladani
denariūm pondo xxv, æruginis rasæ denariūm pōdo viij, grisei combusti tantundem, squamæ dena-
riūm pondo duū, olei veteris denariorum pondo ducentorum.

Hellespontia Hera.

CAP. 11.

Quoniam verò Andromachus ab Hera in pharmaci compositione differt, visum mihi est
& Heræ prodita adiungere, quæ ad verbum ita sonant. *Hellespontia perspiratu digerens,
Phlegmonē propulsans. Valet ad Strumas, Panos, Parotidas. Imposuim spemum attrahit, pus maturat,
rumpit, conglutinat. In summa omnibus igne Combustus benefacit. Mitigat etiam Podagricos.* Olei veteris dena-
riūm pondo centum, picis siccæ denariūm pondo quinquaginta, ladani denariūm pondo xxv, ar-
genti spumæ denariūm pondo centum, æruginis rasæ denariūm pondo octio, chalbanī denariūm
pondo quatuor. Argenti spuma ex oleo trita coquitur: cum autem coeunt, pix & ærugo immit-
tuntur, deinde ladanum chalbanum q; atq; sic in mortarium transfusa molliuntur, & vsui sunt.
Quidam vt boni coloris sit & fuscum, miscent etiam squamæ denariūm pondo octio, nam alio-
qui fit nigerrimum. Hoc in podagris etiam non semel vsus sum, & cessit felicissimè. Oportet au-
tem tædas lignorum loco vsurpare. Manifestum est autem viros inter se dissentire in alijs paulu-
lum, in olei verò symmetria plurimum: nam duplo copiosius, q; Heras, Andromachus immittit.
Potest item præparari aliter, cum sciamus, si plus olei iniectum fuerit, diuturniorem fore coctio-
nem innuere, ipsum q; medicamen magis exiccans futurum: sin minus, remorari coctionem fu-
turam, & pharmacum inualidius exiccaturum.

Quæ scripsit Damocrates Vsus multiplicis Medicamenta.

Tyrium Emplastrum.

CAP. 12.

Post hæc referam emplastrorum adherescentium,
Sine fasciis, quis vsus & confectio.

G

Ad diuisiones faciunt non magnas bene,
Et carnis ipsius ampliora vulnera.
Medicantur à quadrupede & morsos corpore
Summo: recentes discutiunt furunculos,
Quibus q; iam pus est, vapore digerunt.
Item auferendo crustas, ijs celerrimè
Cicatricem inducunt opera nulla manus.
In fronte posita fluxus quàm promptissimè
Lippientum cohibent, sola quamuis ceperis.
Huius generis, præstantius primum efferam
Emplastrum facile inuentu, cui color bonus
Atq; efficacia, Tyriam nos dicimus,
Tyriam colore referat id q; purpuram,
Si quo decet, modo fiat. Sic præpara.

Sit libra iniecta quinquies lithargyri
Boni, semel ceræ capiatur, insuper
Ter pityinæ pinguis lignosæ ac neutiq;
Æruginis præstantis grisei, chalbanī,
Æris q; combusti, pariter squamæ bonæ,
Cuius q; misceto quaternas vncias.
Pinguis olei † sex & decem } pondo addito.

At curiosè emplastrum coquito in hunc modum.
Lithargyrum mitte ex oleo leuissimam,
Fictilem in ollam nouam, sed hanc maiusculam.
Vbi conteres manibus, mouebis ac spatha,
Deinde flamma acri atq; continua coques.
Cum mellis accipit iam spissitudinem,
Ærugo & squama misceantur, incoqui
Permunito satis, dehinc æs adiungito.
Rursum coqui paruo relinquens tempore,

H

Paulum

* Aliter iii & s.

* Aliter j.

* In antiquis
non habetur
dictio *µη* id
est non.

* *πύρι. pus.*
al. *ὑπόρρι. hu-*
mor.

* Aliter libræ ii.

* Al. quinque
& s.

- A Paulum defundens ex olla medicaminis,
Refrigeratum manibus, & digitis teras.
Bonī coloris atq; durum ubi conspicis,
Sic pityinam ceram q; reliquis indito.
Deinde cunctis ritē vnitis paululum,
Stillato rursus: & colorem si bonum
Et temperamentum vides, mox tollito
Ab igne fictilem, & subactum chalbanum
Apponito. Si pharmacum sit durius
Multo, resolues oleo, faciens sic bonam
Temperiem. In aliud inde vas transfundito:
Frigidum, & subactum manibus ita reponito.

Aliud Eiusdem cum superiore Generis subijciam.

Medetur, antē quos citauī, affectibus:

- Nec est, quod vlceribus malis, diutinis,
B Callo q; pressis, applicet foelicius
Cicatricem: etiam q; ore natas pustulas
Persanat absq; rosione, rhagadas
Ani, nodosas durities: callos demit.
Sic prępara. Lithargyri minam boni,
(Sed mina libra est, eius & pars tertia)
Minę semis probatę cerę ponticę, &
Æruginis minę quadrantem rasilis:
Atri chamęleontis octauam probi
Partem, radix bona est regione Cretica
Nascens primū, Cilicia deinde: pręter hęc
Olei vetusti plus q; mina paululo.
Quod si non fuerit, vsurpato vel recens.

Lithargyron leuem, simul q; oleum, noua

- Totum figlina conditum, rudicula
C Mouens coquito. Vbi constiterit, & melinon
Fuerit, adijcito æruginem, ceram dein:
Qua iam liquente ab igne tollens ollulam,
Chamęleontis paululum conspergito.
Vnita cūm, frigerata q; quod fatis,
Transfundito in pilam: post sic reponito.

Ægyptium.

Ægyptium perferuans absq; phlegmone
Diuisa quælibet, contusa q; omnia,
Quadrupedum morsus cunctorum, et serpentium,
Item subortas absq; vlceribus phlegmonas,
Nervos dolentes † citra causam, & musculos.
Laudans hoc Andromachus dabat sodalibus
Suis, in pharmacis peritus maxime.

Aiebat esse ter quadraginta quidem

- D Denarios lithargyri & duodecim
Bis alteros, cerę quoq; albę ponticę
Totidem, ammoniaci ter viginti lucidi
Et duodecim alios, thuris & bis quatuor.
Squame verò æris, & squamę stomomatīs,
Cuiusq; rursus misturę bis quatuor.
Purę terebinthinę ter addas duodecim,
Octodecim heminas olei q; ciceos,
Combustę totidem sordidę lanę heminas.
Docebat ipsam isto modo comburere:
Ollę recentī, quę sit ore latior,
Impone lanam copiose succidam,
Operculum gypso prius vel glutino
Vel terra figulari, cui sit commista aqua,
Illinito: sed largo igne mox comburito:
Contusa, facile quando cribro incernere

Classis Quinta.

† In antiquis
legitur διχ' αι
τίας, care-
ntes, i. citra
causam mani-
festam.

* Aliter ii.

* Al. uel calce.

kkkkk iij Fuerit

Fuerit, habere rectè tunc videbitur.
 In clibanis quoq; ipsa & in fornacibus
 Ignitis, nuntum similiter exurere.
 Ita capiebat tritorum, quem est par, modum.
 Coquere lithargyron iubet laeuissimam,
 Torum q; ricinum: temperatis inuicem,
 Mellis q; facta tandem spissitudine,
 Squamam aspergere: concoquere & quantum sufficit,
 Usque adeo, dum non inquinet, & tunc addere
 Terebinthinam & ceram: dein cum coierint,
 Ammoniacum confectum digitis mollius.
 Posturus ab igne ollam, thus tritum inspergito.
 Penultimum ac lanæ immundæ puluisculum,
 Sed antè thus, pauxillulo aut post tempore.
 Quidam volentes istud proprio pharmacum
 Dicit titulo, cum depositus est caccabus,
 Squamæ vnus bis octo indunt denarios.
 Squama autem vtuntur æris, non stomomatís.

Aliud.

Nihil priore peius agit Ægyptio,
 Eadem at melius & quandoq; si confecerit
 Crassum accuratè medicamentum quispiam,
 Vtetur ad eadem ipso non improspere.
 Olei libras & ricini quinq; continet,
 Chrysitidis q; argenti spumæ quatuor,
 Squamæ gris ter que sedecim denarios,
 Terebinthinæ præstantis ter duodecim,
 Mannæ que thuris tantundem, pondo duo
 Ammoniaci sinceri, cere ponticæ
 Albæ duas libras semissem & insuper.
 Coquito oleum, squamam, nec non lithargyron,
 Donec coierint, & color sit optimus,
 Fiat que satis emplastrum durum: deinde sic
 Terebinthinam pones ceram que, hinc mollius
 Ammoniacum digitis confectum: postea
 Feruente ab igne caccabo deposito
 Mannam iniicies iam frigerato pharmaco.
 Frequenter hoc feci citra lithargyron,
 Molybdanæ bonæ pari sumpto modo,
 Vfus q; sum, ad quæ dixi, iam suauissimè.
 Probatoris q; id coloris condidi.

Emplastrum ad Digerendum & Extrahendum.

CAP. 13.

Qui compositorum medicaminum virtutes descripserunt, emplastra quædam ab extrahendo epispastica, sicut alia à discutiendo diaphoretica, noiarunt: alijs vtrinq; extrahendi & digerendi facultatem adesse testati sunt, etenim vicinè sibi virtutes sunt eorū, quæ in alto latent, attractrix, & attractorum digestrix. Nam quæ trahunt, etiā non nihil omnino discutunt: H & quæ discutunt, pariter trahunt: verū in digerentibus medicamentis discussoria virtus, in trahentibus attractrix, ppollet. Constant itaq; attractrices simplicibus pharmacis, quæ humorum superfluitates ex profundo in cutē extimam possunt extrahere. Discussorie ex ijs constantur, quæ attractum possunt suapte natura digerere. Vt autē emplastrum fiat, quemadmodū supra dictum est, huic argenti spuma, illi resina, alij cera, alij oleū, reliquo pix admiscetur: quæ nec insignē digerēdi potentiam, nec extrahendi continēt, sicut vel ppolis, vel calx, vel medulla, vel chalanū, vel aliæ petræ flos, vel spuma nitri, vel aphronitrū, vel acetum, vel lixiua stactæ, piper, sinapi & struthium: sales que, tū qui edī possunt, tū ammoniaci: ad hæc pleraq; alia, de quorū facultate in cōmētario Simplicii pharmacorū dictum est. Nunc autē emplastra, quæ iam experimento satis probata sunt, exequar, tū adhuc iplis adijciens, q nō nulli etiā adstringentia pharmaca extrahentibus miscuerunt, veriti, quod accidit, vbi humorū superfluitas fuerit: Trahunt siquidē plus interim, quā conuenit, vt non solū ex particula quæ curatur, attractionē in alto, sed etiā ex omnibus vicinis, moliantur. Comprehensum est & antea, cum de carnem generantibus facultatibus ageremus, extrahentia & digerentia, velut omnia, quæ magis quā oportet detergunt, carnis explentia fieri cerati mixtura: in quibus virtus quidē valida est, copiosioris: in quibus imbecilla, paucioris. Quod si cōpositum

A positum extrahendi vel digerendi præditum potestate medicamentum, adstringens quoque ali-
quid habeat, tali pharmaco ad carnem generandam, propter vim adstrictoriam utendum nõ est:
quæ ad vulnera glutinanda, & sinus, tum ad vlcera cicatricem ducendam utilis est, ad carnis pro-
ductionem non ita. Dicitum mihi est abunde iam de hoc.

Andromachi Emplastrum ad Digerendum & Extrahendum.

¶ *Halicon, i. Salsum, ad multa.*

CAP. 14.

S Alis cõis pondo libras iij, squamæ eris pondo 3 iij, magmatidis pondo selibram, mannæ pon-
do libram, ceræ pondo lib. xiiij, olei cyprini pondo libras xvi, acetum adijcitur. ¶ *Aliud Theu-
de Sarcophagi ad Cacoethe, Fistulas, Terebines, & Strumas.* Resinæ terebinthinæ, thuris, ceræ, singulorũ
pondo 3 iij: argenti spumæ pondo vnciam, quidam auripigmenti æquale pōdus pro argenti spu-
ma ponunt: squamæ rubræ pondo 3 iij, eruginis rasæ pondo 3 viij, salis ammoniaci pondo 3 vi,
aceti heminam. Ego amplius capio, nempe olei heminam, vini heminam, aceti scillitici tātundē.

¶ *Aliud ad Digerendum Candidi, quo vtor.* Terebinthinæ pondo libras tres, ceræ pondo libras quin-
quaginta: chalbanī, nitri, alij, singulorum pondo 3 ij: thuris pondo libras iij, medullæ ceruinæ
pondo 3 iij, guttæ ammoniaci pondo selibram, propolis pondo vncias tres, olei laurini pondo 3
vi, seui taurini pondo selibram. Quæ sicca sunt, liquidis admiscuntur. ¶ *Aliud ad Strumas authore*

Nymphodoto. Alij lapidis denariũ pondo viij, aphronitri tantundem: seui vitulini, calcis viuæ,
singulorum pondo denariũ xvi: ceræ denariũ pondo xxiiij, terebinthinæ denariũ pondo

xxxij. ¶ *Aliud ad Discutiendam Bronchocelen, hoc est Gutturis tumorem, quo Clemens Sertorius curauit est,
& ad Duritias.* Argenti spumæ denariũ pondo quinquaginta, resinæ pitynæ denariũ pondo
quadraginta, olei veteris heminas x: chalbanī denariũ pondo iij, {in alio 3 i:} æris combusti
denariũ pondo xx, guttæ ammoniaci denariũ pondo quadraginta, aluminis fusti denariũ

pondo iij, † mannæ thuris} tantundem, ceræ denariũ pondo quinquaginta: postremo chalba-
num & mannā inijcito. ¶ *Aliud ex Aspidibus, ad Discutiendam Strumas, item ad Podagras.* Terebin-
thinæ, lapidis alij, bituminis, singulorum denariũ pondo trecentorum sexaginta: aphronitri, vi-
tulini, ceræ, baccarum lauri, guttæ ammoniaci, singulorum denariũ pondo trecentorũ quadra-
ginta: lapidis pyrites denariũ pondo octoginta, calcis viuæ denariũ pondo † centum octo, †

† alpidum cineris pondo denariũ centũ quadraginta, olei veteris heminas duas: postremo cinis
pharmaco refrigerato inspergitur, sin minus, perit. ¶ *Aliud ad Extrahendum, Sarceuthitæ.* Tere-
binthinæ pondo minam, ceræ tantundem, nitri pondo † minas ij, † bdellij denariũ pondo tri-
† Aliter, mānē,
thuris, singulo-
rum.

† Aliter cx.
Al. olei hēmi-
nas xii.

† Aliter tres.

¶ *Aliud ex Sale, ad Extrahendum.* Salis communis denariũ pondo octoginta, ce-
russæ tantundem, olei veteris heminas quadraginta, atramenti futorij denariũ pondo xxiiij, ace-
ti cyathos iij. ¶ *Aliud ex Sale aliter.* Cerussæ, salis communis, singulorum denariũ pondo quin-
quaginta: olei veteris heminas † viij, aristolochiæ denariũ pondo octo, propolis denariũ

pondo x. Hoc Silo commendabat. ¶ *Aliud ex Terra pelagia ad Digerendum.* Argenti spumæ pōdo
minas iij: terræ pelagiæ, salis ammoniaci, cerussæ, ceræ, singulorum quartam minæ portionem:
aceti heminam, olei heminas iij. ¶ *Aliud Cyri ad Attrahendum.* Iridis illyricæ, mannæ, terebin-
thinæ, aphronitri, pumicis, singulorũ denariũ pondo quinquaginta: guttæ ammoniaci dena-
riũ pondo xxv, chalbanī denariũ pondo † xvj, canchryos denariũ pondo xij s: ceræ dena-
riũ pondo centum, alij octo: olei heminam. ¶ *Aliud Dia daphnædoni ex baccis lauri.* Resinæ,
nitri rufi, ceræ recentis, baccarũ lauri, colophonis, seui vitulini, guttæ ammoniaci, singulorũ dena-
riũ pondo septuaginta: cyprij decimam sextam hemine partē: non nulli autem visci denariorũ

† Aliter ij

† Aliter vj

D pondo quinquaginta. ¶ *Aliud Attrahens, Harpali.* Guttæ ammoniaci denariũ pondo viij: ceræ,
iridis, manne, piperis, sulfuris viui, pumicis, singulorum denariũ pondo iij: terebinthinæ dena-
riũ pondo viij, olei parum. ¶ *Aliud Attrahens Harpali.* Terebinthinæ pondo minas octo, pumicis
denariũ pondo xv, nitri denariũ pondo xvi, guttæ ammoniaci tantundem, ceræ denariorum
pondo quatuor, minij quod possit ea colorare: arida cum aceto subiguntur. ¶ *Aliud.* Sinapeos de
nariorum pondo iij, nitri tantundem, ceræ denariorum pondo viij, terebinthinæ denariorũ pon-
do trigintā: baccarum lauri, calcis viue, singulorum denariorum pondo iij: olei decimam sextam
hemine portionem, cyprij denariorum pondo viij. ¶ *Aliud ad Pus discutiendum.* Ceræ, terebin-
thinæ resinæ, picis sicce, seui vitulini, nitri rufi, baccarum lauri, calcis viuæ, pumicis, guttæ ammo-
niaci, singulorum, æquale pondus, ¶ *Aliud Nicomedis Regis.* Ceræ, nitri rufi, resinæ frictæ, singu-
lorum denariũ pondo centum: guttæ ammoniaci, propolis, singulorum denariorum pondo
xxv: visci quercini denariũ pōdo † duodecim s, olei sextariũ, lixiuæ stactæ tātundē. ¶ *Aliud Di-*

† Aliter xii.

† Aliter viii.

† Aliter unam.

¶ *discutiens Meliceridis.* Olei veteris denariũ pondo centum, argenti spumæ denariũ pondo nonagin-
ta vnus: guttæ ammoniaci, chalbanī, vtriusque denariorum pondo nouendecim. ¶ *Aliud.* Ar-
genti spumæ denariorum pondo centum, salis communis denariorum pondo sexaginta, olei ve-
teris heminas † sex. ¶ *Aliud Attrahens & Digerens, Ad multa vtile.* Argenti spumæ, cerussæ, chal-
banī,

† Al. iij.

† Al. librā vnā.

† Aliter s.

† Alite s.

† Aliter s.

† Aliter s.

† Aliter vel.

* Aliter i.

† Al. sextariū.

† Aliter ii.

† Al. Procliani
authoris.

* Al. quinquaginta.

banī, singulorum pōdo libram: salis fossitij, æruginis rasæ, singulorum selibrā: olei sextarios tres, E atramenti sutorij pondo 5 † ij. *¶ Aliud ad Digerendum è Struthio.* Argenti spumæ pōdo libras † ij, olei pondo libras iij: cerussæ, picis, terebinthinæ, singulorum pondo 3 iij: ceræ pondo 3 ij, man- næ pondo 3 iij, aristolochiæ pondo 3 ij, struthij tantundem, gallæ pondo 3 iij, vini boni heminas tres: vinum vltimum infundito. *¶ Aliud ad Digerendum, Vt Scribonius.* Argenti spumæ pondo quinq; olei pondo quinq; pityinæ siccæ pondo quinq; propolis pondo viij, visci de quercu le cti pondo quadrantem. *¶ Aliud Trahens & Digerens.* Ceræ nouæ, resinæ pityinæ siccæ, nitri, sin- gulorum denariū pondo centum: olei heminas tres: non nulli thuris denariū pondo centum, lixiuæ stactæ heminas iij. Ad duritias, guttæ ammoniaci denariū pondo xij misceto, chalbanī tan- tundem: æruginis rasæ, propoleos, visci de quercu lecti, paria pondera. *¶ Aliud ad Strumas Minu- tiani, quo vtor subinde.* Terebinthinæ pōdo vnū, ceræ pōdo † viij, propolis pōdo vnum, chalbanī pō- do † viij, visci de quercu lecti pondo † viij. His liquefactis, facis combustæ 3 duas inspergito, aphronitri pondo † viij. Deinde vbi carbonibus imposueris, olei heminas tres iniicito: postea sublatis, cucumeris agrestis radicis vnciam inspergito, gladioli radicis 3 iij, alij floris tantundem. *¶ Aliud Antipatri.* Nitri, terebinthinæ, olei veteris, singulorū pondo libram: aquæ sextarium, & amplius: vbi cocta non ebullierit, immittito guttæ ammoniaci pondo 3, duas, chalbanī pondo vn F ciam, bdellij pondo 3 i, thuris pondo 3 ij, sandarachæ pondo 3 ij, lapidis alij pondo 3 duas. Alius & sandaracha ex oleo paucō laeuigantur: liquabilia raduntur, & aridis miscentur. *¶ Aliud ad Di- gerendum Antipatri.* Molybdænæ pondo denariū trecentorum, ceræ denariū centum quinqu- ginta, terebinthinæ denariū pondo xxx, chalcitidis denariū pondo vi, chalbanī denariū pon- po viij, myrrhæ denariū pondo viij, mannæ denariū pōdo viij: olei per hyemem heminas iij, per æstatem tres. *¶ Aliud Xenocratus, Dolorem sedans, ad Digerendum, Vt Castus. Medicamen Polyptomi ad Podagram.* Cerussæ denariū pondo centum quinquaginta, ceræ pōdo tria, terebinthinæ denariū pondo xxx, aphronitrum denariū pondo xxx, olei veteris heminas tres. *¶ Aliud ad Digerendum Meliceridas, Alexandri.* Salis hispani, argenti spumæ, cerussæ, singulorum pondo libram: ceræ pon- do vnciam, terebinthinæ tantundem, chalbanī & opopanacis pondo vncias duas, sinapeos pon- do 3 vi, olei veteris pondo tria, aceti † sextarios viij. *¶ Aliud Sanitas, Digerens, & Extrahens, ad Mā- millas ex Visco.* Argenti spumæ pondo libras duas, olei pondo libras duas, visci quercini pōdo triē- tem, gallæ tantundem. *¶ Aliud Pius Vacuans sine ruptura, Vt Asclepiades.* Resinæ pōdo libras duas, ceræ pondo libras ij, nitri pondo libras † viij, butyri pondo libram, adipis leonini pondo libras sex, olei veteris pondo libram: simul liquefacito. Quotidie emplastri modo imponens medica- G mētum, vtor. *¶ Aliud Exipoticū i. expressoriū, Humores & Abscessus, maxime in genu, & articulamen- tis, sine incisione extrahens, à Phlegmone præseruat, Vulneribus vtiliter admouetur.* Plumbi stercoris, terebin- thinæ, singulorum denariū pōdo centum: olei veteris heminas duas, postremo resinā. *¶ Aliud Digerens, Cutem rumpens. Cicatricem ducit, † humores euocat, } quo vtor.* Visci quercini denariū pondo sexaginta, picis denariū pondo quinquaginta, guttæ ammoniaci denariū pondo centum, ce- ræ denariū pondo quinquaginta, resinæ trictæ denariū pondo xv, lapidis pyritis denariū pōdo x, chalbanī denariū pondo viij: mannæ, iridis illyricæ, cachryos, stercoris columbini, singulorū denariū pondo iij: alibi & mellis heminas iij. { In alijs quibusdam, & propoleos denarium pō- do xx: liquefactis quæ liquabilia sunt, sicca insperge. }

Quæ scripserit Asclepiades Attrahentia.

CAP. 15.

A Libū Attrahēs. Facit ad Strumas, & Parotidas, & particulares Abscessus. Curat Fistulas, & Aegylomas, Vt sine incisione liberet. Valet ad Rheumatica, & curatu difficilia. Benefacit Hydropicis. Argenti spu- mæ, cerussæ, salis, singulorum denariū pondo octoginta: olei veteris sextarium. Sal, cerussa, ar- genti spuma, ex oleo ipsis adiecto teruntur: deinde curiosè mista, & in vas fictile coniecta, coquū- tur: mouentur q; assidue, donec non inquinēt: dehinc in mortarium transfusa, rursus q; tunfa, ex H cipiuntur, & vsui sunt. Aliud. Argenti spumæ denariorum pondo centum, { cerussæ dena- riorum pondo decem, } salis denariorum pondo quinquaginta, olei heminas tres, ceræ denariorū pondo quinquaginta, terebinthinæ denariorum pondo duodecim: præparato ad modum præ- dictum. Aliud. Mannæ denariorum pondo sedecim, aluminis scissi denariorum pondo octo, olei veteris heminas duas. Aliud. Argenti spumæ pondo libram, cerussæ pondo libram, salis fossitij pondo libram, ceræ denariorum pondo quinquaginta, terebinthinæ denariorum pondo viginti quinque, mannæ denariorū pōdo sedecim, aluminis fissi denariorū pondo viij, olei veteris heminas duas & semissem. *¶ Aliud Lucij ad Prædictas dispositiones Medicamen compositum. Facit ad Vlcera rheumatica, diuturna, & vix sanabilia.* Argenti spumæ, cerussæ, salis ammoniaci, atramenti sutorij, pityinæ, singulorum pondo denariorum centum: olei veteris sextarios tres, aceti sexta- rium vnum, ceræ pondo denariorum quinquaginta: præparato ad modum prædictū. *¶ Aliud Salubre, pharmacum ad Prædictos affectus compositum.* Argenti spumæ, cerussæ, salis, aluminis li- quidi, singulorum denariorum pondo centum: olei veteris sextarios decem, aceti sextarium vnum, ceræ pondo selibrā, resinæ terebinthinæ pondo selibrā: conficito ad modum præ- dictum. *¶ Aliud Nigrum Attrahens. Valet ad Strumas, Parotidas & particulares Abscessus, dis-* soluit

A soluit omnem Duritiem. Præstat item Malagmatis boni Vicem, sicut vsus est Antonius Herbarius. Item facit ad Articulorum Vitia. Salis fossilis pondo libram, argenti spumæ pondo libram, strigmenti purissimi pondo libras quatuor, chalbanî denariûm pondo quinquaginta. Salem & argenti spumam conterito, deinde strigmento adiecto studiosè rursus tundito: in vas fictile coniecta, igni q̄ supra posita coquito, mouens sine requie: & cum non amplius inquinat, ab igne depolito chalbanum ligneo pistillo tunsam addito: vbi soluta fuerint, in pilam transfundito, ibi q̄ contulis vtitor. **C.** Aliud, quo vsus est Andromachus. Facit ad Strumas, Parotidas, Mammarum duritias, particulares Abscessus. Contentum Humorem extrahit, Sinus iungit, iuuat Fistulas, Aegyplos. Facit ad fluentia Vlcera, Vetera, & vix sanabilia. Cerussæ, salis fossilij, singulorum denariûm pondo octoginta: atramenti sutorij dnariû pondo duodecim, olei veteris heminas tres, aceti heminas quatuor. Salem in tenuissimum puluerem redactum cerussam q̄ ex oleo coquito: ac dum non inquinat, moueto. Vbi bene habuerint, depositis ab igne atramentum sutorium aceto tritum immittito: & exiguum continuè inspergens caue, ne effluat: deinde in mortarium transfusa, rursus q̄ tunsam excipito, & vtitor.

Quæ scripsit Asclepiades Discutientia, ex illius verbis.

CAP. 16.

T V moribus dissolutis, & in humorem digestis, infra scriptæ compositiones conueniunt. Cerine Ctesiphontis. **B** V alet ad Strumas, Ganglia, Parotidas, Mammarum abscessus. Vt nullum aliud pharmacum, Tumores resoluat, & quicquid humidi continetur, rarefaciendo elicit. Sinus glutinat, iuuat Fistulas, & Aegyplos, vt citra incisionem liberet. Est etiam Malagma vtile Ischiadicis & leu coxarum, id est coxæ morbo laborantibus. Podagricis, arthriticis, post accessiones impositum toto affectu leuat. Hæc recipit. Cere, terebinthine, nitri, olei veteris, singulorum pondo libram: aque heminam. Nitrum & aquam terito, vt ex toto soluantur: & in vas fictile coniecta, igni imposito: vase cooperto coquito, ex interuallis moueto. Cum autem strepere adeo desierit, liquabilia iniicito, mouens assidue, donec non inquinat: in mortarium transfusa rursus tundito, inde excipiens vtitor. Vel hac ratione preparatur: Quæ liquari possunt, prius liquefacimus: & cum dissoluta fuerint, nitrum ex aqua læuigatum adiciemus, id q̄ paulatim mouentes assidue, cauētes q̄ ne effluat. **C.** Aliud, quo vsus est Menecrates, præcipue in Strumis, & Mammarum duritie, quippe perforat eas, & contentum humorem excernit. Sinus iungit, & ad cicatricem perducit.

Ceræ, resinæ terebinthinæ, resinæ lignosæ, chalbanî, olei veteris, aphronitri, singulorum pondo libram, myrrhæ cineris sextarium, qui pendit uncias tres. Resinas in vas ærcum aut fictile iniicias, igni q̄ impositas, liquefacito. Vbi percolaueris quantum satis est chalbano emolliendo, postea liquabilia simul mista, quousq̄ non inquinat, coquito: deinde ab igne repolita refrigerari sinito: & his aphronitrum adiungito, mouens continuè: & confusa cineribus leuissimis iniicito: postquam permiscueris excipito, & vtitor: quinto quoq̄ die soluito, deinde tertio, donec tumores forati fuerint: postea quotidie inter curandum soluito. **C.** Aliud ex Aphronitro, à quibusdam Dionysia dicta, Pharmacum ad Prædictos affectus compositum, quo vsus est Largus. Cere, terebinthine, manna, aphronitri, singulorum pondo libram: olei sextarium, aquæ lutulentæ sextarium, misyos crudi pondo uncias duas: composito, sicut dixi. **C.** Aliud ex Asio, Medicamentum, ad Prædicta Vicia compositum. Ceræ terebinthine, nitri, singulorum pondo libram: thuris selibram: lapidis asij floris, olei cyprini, vtriusq̄ selibram: aque lutificæ quod satis est. Arida cum aqua lutifica dissoluantur, vt sordium crassitudinem habeant, & studiosè læuigantur: quæ liquari possunt, liquefiunt, & refrigerantur, tritis immittuntur: vbi contuderimus, excipientes vtimur. **C.** Aliud Asianum Neapolitæ, facit ad Eadem. Cere pondo libram vnam & semissem, nitri rubri pondo libram, lapidis asij floris pondo libram & semissem, manne pondo selibram, myrrhæ pondo 3 iij, olei veteris pondo libram, aque lutificæ heminam: preparatur superiore modo. **C.** Aliud ad Easdem affectiones. Cere, terebinthine, singulorum pondo denariûm centum: nitri spumæ, olei veteris, manna thuris, singulorum pondo libram: lapidis asij floris pondo selibram: chalbanî, propolis, guttæ ammoniaci,

† Al. ouxiuvs
résas, i. ficul
aci cineris.

D singulorum denariû pondo xij: aque lutificæ quod sufficit. **C.** Aliud Giliuum ex libris Damocratis, Eadem efficiens. Argenti spumæ, cerussæ, salis fossilij, singulorum pondo libram: minij sinopici pondo selibram, cere pondo 3 iij, terebinthinæ totidem, olei veteris heminas tres, aceti quantum sinopico soluendo sufficit: conficito vt superiora. **C.** Aliud ad Eadem. Argenti spumæ, cerussæ, salis fossilij, singulorum pondo libram: minij sinopici pondo selibram, cere pondo 3 quatuor, chalbanî pondo uncias duas, resinæ terebinthinæ tantundem, olei veteris heminas tres, aceti quo rubrica dissoluatur: conficito, vt dixi. **C.** Aliud ex Mastiche ad Eadem. Cere pondo libram: mastiches, manne thuris, sinopidis, aphronitri, singulorum pondo selibram: olei myrtei pondo uncias tres, marine aquæ uncias tres. **C.** Aliud Neapolitæ ad Eadem. Argenti spumæ, cerussæ, salis fossilij, singulorum pondo libram: minij sinopici, ceræ pitynæ, singulorum pondo selibram: chalbanî pondo uncias duas, olei heminas tres, aceti quantum satis est.

* Al. libram
vna & dimi-
diam

† Al. quatuor,
Galbanî vnc.
duas, resinæ
terebinthina
& cer.

Discussoria scripta à Damocrate.

CAP. 17.

A D digerendum Melinum Emplastrum efficax Infantum strumas non veteres, insuper Et duritias musculorum, item & cutis, Et phlegmonas, quæ durant multo tempore,

Carnem

Carnem replet, ducit cicatricem probè,
 Sic conficitur. Excellentis lithargyri
 Plerunq; libram, item corussæ selibram,
 Ad hæc recepta pondo libram quoq; noui
 Pinguis olei. Immissa ast ollæ lithargyrus
 Ex oleo coquitur: vbi iam spissitudinem
 Habet sordis, lauem cerussam tum capit.
 Cum non inficiens, temperie & bona admodum,
 Paulo q; durius videris, immittitur
 Cera, & pityina: quibus liquatis ollula
 Ab igne feruens tollitur: tunc protinus
 Ammoniacum, tum cera manibus, vt solet,
 Atq; digitis subacta iuxta ignem, inditur.
 Postea mouetur pharmacum rudicula,
 Rursus q; mollitur manibus: sic conditur.

Aliud.

Aliud ad omnia hæc. Strumas ipsas verò
 Magis resoluit, & laborantes iuuat,
 Præcordia ne abscessus, quibus est cautio,
 Tumore quopiam atq; metu exerceat.
 Hanc obtinet confecturam, nigrum quia est
 Picis † humidæ, sicca, } pondo libras duas,
 Densi q; vitrei duas bituminis,
 Fricæ pityinæ quatuor, ceræ capit
 Tres, thuris vnam libram & partem tertiam,
 Squamæ æris vncias pariter bis quatuor,
 Recentis olei communis quinq; vncias.

† Al. perlucidè
 siccissimè.

Thus, squama teritur, quibus aceti apponitur
 Mensura iuxta. Vt curiosè trita sunt,
 Et crassitudinem mellis tenent, coques
 Ceram reliqua q; tum simul oleo nouo:
 Et sic laugatis calida supra fundito,
 Vbi diligenter manibus omnia robore
 Commiscueris, contactum pelle condito.
 Nam exasperatur, crustula atq; obducitur.

Damocratis Compositiones ex Sale, Discussoriæ.

Hoc preparato simul, vt præstans pharmacum,
 Bonæ cerussæ, & argenti spumæ bonæ,
 Cuiusq; pondo, denas q; salis vncias.
 (Omnis vero est sal albus multum pharmaco
 Futuro utilis: atqui longè præstantior
 Ammoniacus, confectus & purus mari)
 Et tres vetusti libras olei pondere.
 Oleum coquito, reliqua & trita simili modo,
 Quò duriora adus q; sint malagmate:
 Nam seposita multo remollescunt magis.

Aliud.

Aliud melius, nam duritias discutit
 Cunctis valentius inueteratas nimis.
 Et bronchoelas, & magnas meliceridas,
 Et contumaces strumas, nec non ancylas.
 Sic conficitur. Libram salis læuissimi
 Tenuis, duas cerussæ, tot at chalbanis,
 Fac vncias, totidem puræ propoleos,
 Aristolochiæ binas pariter vncias,
 Præstantis olei libras annosi duas.
 Crassissimum si fuerit, addes alteram.
 Coquito similiter, temperatum q; probè
 Ab igne tollito: laugatam tunc quoq;
 Aristolochiam insperges, inieceris vbi
 Mollita, propolim scilicet atq; chalbanum.

Aliud

- A. *Aliud ad Digrendum Damocratis ex Calce viua.*
 Valde bonum, strumas soluit per halitum,
 Omnem tumorem reprimit: nec non hepatis
 Vel splenis affectus aquosos curat, &
 Excretionem vrinæ valde promouet,
 Et inueteratos dissoluit coxendices.
 Nempè Vlpianus hoc iuuenis industrius
 Vtens auxiliabatur agris plurimis.
 Sed continet libram cere vnam ponticæ,
 Vnam q̄z frictæ, præterea vnam pityinæ,
 Calcis recentis viue quoq̄ pondo vnciam,
 * Aluminis fissi similiter vnciam,
 Æquale pondus arsenici q̄z pontici.
 His suaueolentis paulum aceti affundito.
 Maiore tere in mortario, quoad sit satis.
- B. Cera q̄z resinæ q̄z miscens paululum
 Olei, liquato flamma ignis quàm acerrimæ.
 Ac temperans omnia, faciens malagmata,
 Nec pharmaci inquinantis crassitudinem
 Reponito. Vtens excipe nouo splenio.
- Aiebat optimus medicamentî pater
 Morbis diuturnis præsidium suscipi
 Istud bonum: quibus item longa visceris
 Cuiuslibet inflammatio præcordia
 Indurauerit, auxiliari vel maximè.
 Quippè id sudores excitat, præcordijs
 Duritiem tollit, morbos soluit protinus.
 Retenta naturalia diu menstrua,
 Paucis diebus adeo impositum prouocat.
 Nos calce dempta, duplum alumen indimus,
- G. Et melius pharmacum erat, haud faciens pustulas.


GALENI DE COMPOSITIONE MEDICA-
 MENTORVM PER GENERA
 LIBER SEPTIMVS

ARGVMENTVM LIBRI

Agit de Emollientibus, Relaxantibus, & Laborem tollentibus, Emplastris, quæ
 Malagmata, Chalastica, & Acopa dicuntur.

*Quæ sint Medicamenta Emollientia, de Ratione vsus ipsorum, de Indurescen-
 tibus partibus, ac de scyrrho.*

CAP. I.

- D.  Alagmata vocant medici, quæ partes præter naturam induratas emolliunt, ca-
 lida omnia temperamento mediocri prædita, nō tñ exiccātia, quemadmodū
 nec humectātia manifesto. Nā cū m exactè molliētia mediū quodāmodo
 ordinem inter humectantia siccantia q̄z sortiātur, indurescentiū substantiæ ve-
 luti fusionē quādā molliuntur. Nominātur aut malactica. i. molliētia, licet in
 alijs paululū ad siccandi humectādī q̄z virtutem inclinēt, si modo subiectā
 partiū, quas cōtingunt, substantiā queant diffundere, quod nimirū propter
 moderatum in eis calorem accidit. Ac quod vbi durities diffusa fuerit, di-
 geretiū medicamentorū vsus veniat, in quinto de Simpliciu facultate medicaminū, & in xiiij the-
 rapeutices Methodi libro cōprehensum est. Indurescētia igitur quæ ex recta medēdi methodo nō
 curata scirrhu contrahūt, optimè curabūtur, si medicus spectet, quātū agri corporis substantia à me-
 diocri humiditate ac siccitate recesserit: quēadmodū ēt si affectus cōstitutionē, quatenus sit aucta,
 inspiciat: præterea cōsideret inter ipsa pharmaca quæ magis, quæ minus, emolliant. Huc nāq̄ spe-
 ctatū primus vsus emolliētis medicaminis, cōiēcturalis quidē erit, sed cū artificio. At post vnū aut
 alterū diē nū intendere medicamētī virtutē, an remittere cōueniat, intelliges, vt in prioribus, & me-
 dēdi Methodo dictū ē. Quappter medici emolliētia & digeretiā pharmaca cōposuerūt, ceu seo-
 pos

pos ambos sibi proponentes, tum vt partis duritiem, quę iam in scirrhu degenerat, diffunderent: Et tū vt per halitum digererent: non vicissim utroque vtentes, quemadmodum me frequenter facere conspiciatis, verum semper duo ipsa composito medicamine moliētes. Notum porro est omnibus, in mistura vel emollientia vel digerentia esse copiosiora, tum maioris minoris q̄ rationem in ipsis esse nō exiguā. Cōstat quoq; subinde paria facultatibus misceri: ac necesse est, sicut in alijs medicamentis, ita in his ēt, si probē mederi cupias, plura eiusdem generis pharmaca vel certē duo parata habeas, validissimū puta totius generis, & moderatissimū, vt ex varia ipsorū mistura cōuenienti facta, multa, quę intra summa cōtineantur, medicamina efficias. Non enim adeps eandem virtutem obtinet, quam bdellium, styrax, & gutta ammoniaci: queadmodum nec inter ipsos adipēs anserinus, & gallinaceus, vel pardi, vel leonis, vel hyenę, vel alterius cuiuspiam animalis: nam secundum animalis temperamentum ēt adeps est, nempe calidiorum magis exalfacit, sicciorum vero euidentius siccit. At vulgus medicorum nouit leoninum adipem in utroq; calfaciendo, dico, & digerendo, longē esse valentissimum. Proximum locum habet pardi adeps, adeo vt parū emolliat. Minore autē in calfaciēdo ac digerēdo pręditus virtute est anserinus, habet q̄ plus quiddam in molliendo: pari spatio ab hoc recedit adeps gallinaceus. Hi igitur oēs tenuiorum partiū substantiā inter quadrupeda animantia obtinent. At differentia rursus permagna in illis est, cum suillus quidem mollissimus, ac humidissimus, eo q̄ aliorum imbecillimus sit, vt teneris corporibus conueniat, cuiusmodi habent mulieres, pueri, eunuchi, & viri delicatiores, in vmbra, ocio, & frequentibus potabilis aquę balneis, effoeminati. Caprarum vero & boum pingue, quanto suillo est validius, tātō magis corporibus natura durioribus: & inter duriora scirrhosioribus conuenit: taurorum hircorum q̄ in validioribus tum corporibus tum affectibus proficit. Eadem verō & aliis in minoris maioris q̄ ratione inter se est differentia. Porro ab imbecillioribus auspicabor, si prius de duritie ac scirrhi affectu quādam pręlibauero. Nam cum phlegmone laborantibus & indurescentibus commune sit accidens, digitis prementibus reniti, distinguuntur affectus, doloris sensu & indolētia: hoc enim non amplius vtriusq; commune est. Quemadmodum verō in alijs omnibus, quę suapte natura recidere in se mutuo possunt, inest confinium vtriusque aliquatenus particeps, ita quoq; vlcērum phlegmonosorum, cum scirrhis absq; phlegmone, quales induratis accidunt, media quādam est dispositio, doloris quidem expers, si non digitos imprimas, dolens autē si id facias: quam clarioris breuioris q̄ disciplinę gratia, vel phlegmonen scirrhosam, vel scirrhū phlegmonosum dicemus, non hic tumoris magnitudinē animum attendentes. Nam phlegmone & scirrhū nomina sunt formę affectuum, non quantitatis in altero ipsorum: cum phlegmone vel propter partis inflammate magnitudinem, vel ob tumorem pręter naturam, magna euadat: parua autē, cum aut paruum locum possederit, aut exiguū tumorē habuerit. Dicitur nūc mihi parua phlegmones scirrhi q̄ parui curatio, sicut & magnę magni q̄ pro affectuum specie: hinc enim, & aliorum quę magna & parua dicuntur, curationis notio intelligitur. Itaque magna phlegmone cataplasmatibus ac humidis quibusdam medicamentis sanatur: parua, quum scirrhosa durities mista fuerit, itidem cataplasmatibus, interim vero medicamentis cerati modo confectis & liquidis, insuper & emollientibus emplastris. Talibus autē & parua durities tollitur, sed in hac quidem simplex scopus, quemadmodum & phlegmone cōsistente est: quum vero durities phlegmonosum quippiam habuerit, compositus quoq; scopus efficitur.

De Medicamento, quod, quia liquidum est, Parygron Gręci appellant.

CAP. 2.

AC ideo quoq; medicamen quodāmodo compositū est, veluti & hoc, quod Parygron nomināt, omnibus cognitum: magnificē vero cum ab alijs quibusdā, tum Hera, commendatum. Medetur enim id particulę parua adhuc phlegmone conflanti, non multo post confectionem tpe, sed protinus impositum: vbi vero duritiē a dolore alienam pars affecta acquisierit, vel paulo recentī vetustius vtile est: quemadmodū ēt, si phlegmonoso affectu omnino sit libera, melius H in ea vetustius medicamentum proficit. Enimvero medicamenti tps pro duritie intētionē videlicet æqualiter augere conuenit, & si partem valde induratā ne vetus quidem pharmacum emollierit. Quippē varia hoc parygrum dictum medicamentum & promittit & pōt, quoniā materiā mistam quoq; seu variā obtinet. Siquidem adeps suillus & cera molliētium sunt imbecillima: argēti spuma verō & cerussa nihil habēt, quod emollire possint, quemadmodū antea didicimus.

Porro Heras, qui pharmaū choc omnium maximē laudauit, ex hisce ipsum conficit his verbis. **C** Adipis suilli recentis curati pondo 3 xliiij, cerę pondo 3 xxiiij, cerussę pondo 3 vi, argēti spumę tantundem. Quę liquari possunt, siccis superfunduntur: temporis autem spatio medicamentum consistit, spissatur q̄. Sicut cerā & adipē suillum imbecillæ molliendi virtutis esse dixi, ita quoq; si oleo paxillum cerę misceas, id quod a medicis Cerelæon dicitur efficias. Oleum autem videlicet esse conuenit, nec quod vocant omphacinum & omotribes, quasi dicas immaturum & crudum, nec quod oleę furculos in confectione assumplit.

Generalis Mollientium pharmacorum Differentia ac facultas.

CAP. 3.

ITaq; tā imbecillia mollientia ēt paruis medicantur inflammationibus: his autē fortiora breuē duritiē sine phlegmone p̄sanant: his adhuc validiora maiores: quemadmodū & q̄ duritiē in scirrhū

* ἔλκων ἔτι μ
πρῆστι, in anti-
quistῶ ὀγκων
i. tumorum

Arhum propè degenerantem curant, efficacissima sunt, cuiusmodi est medullarū genus, in maioris minoris q̄ ratione inter se differentium, vt deinceps explicabo: item bdellium vtrunq̄, arabicum & scythicum: insuper styraces, siquidem & horum efficacissimus est colore pallidus, qui etiā optimus in Paphilia nascitur, qui verò hoc magis fuscus est, vbiq̄ puenit, potētia multo pallidior inferior, at t̄pis processu & ipse aureum colorem acquirit. Hoc itaq̄ (priore inquam) in antidotis propter caritatem vtimur, ac tu propterea Principi quodcunq̄ ex styrace præparans, semp hoc vteris. Item si familiarū quis in pharmacorum sumptibus magnificus existat, illi quoq̄ ex hmōi styrace medicamentum compones, in alijs optimum ex fusco genere deliges, & odore potissimū & colore iudicium eius sumens, nam niger deterior est. Caterum his, quæ indurescentia validè emolliūt, gutta Ammoniaci adscribitur, ea q̄ magis pinguis & noua. His minus, sed tñ & ipsa efficacia sunt, caprarū, boum q̄ Pinguia: inter ea ipsa, hircorum, ac taurorum validiora sunt: boum verò & caprarum his quidem imbecilliora sunt, non tamē & ipsa actionis expertia: hœdorum autem & vitulorū his ipsis adhuc imbecilliora sunt, porcillo tñ efficaciora: At leonis, pardi, hyænæ, & anseris euidentius his digerunt, non magis emolliunt, quanto ēt subtiliorem substantiā caprino & bubulo seuo habent. Caterum gallinaceum mediam inter anserinum & suillum sedem occupat. Quemadmodum & Medullarum optima est vitulina. Ac Resinæ, quæ nō acrè odorē habent, si dictorum cuiuspiam miscentur, tenacitatem medicamenti cōpositis præbēt, emolliendi virtutem non auferūt. Aptissima est, quæ chia vocatur & larix, post has pinea, inde abietina: strobilina verò vehementer acris est: pityina seu picea, quā propriè physema nomināt, pinguitudinis expers admodum exiccat. Has igitur fugere, chia verò & abietina vtī, oportet, nō ipsis per se, verum cum cera & quopiam alio, quod affectui conducere videatur. Et verò Pix brutia facultatem eandem obtinet, vt quæ glutinans quiddam ac pingue habeat. Caterum pix alia nō miscēda est, sicut nec bitumen, vtpote iusto sicciora: enimvero ea quæ exiccant, mollientibus esse contraria didicimus. Qm̄ verò pineam & frictam resinam & colophoniam appellare consueuerunt, sciendum venit & aliam quandam esse colophoniam chiæ mastiche per similem, molliens aliquid habentem, quemadmodum illa & thus: insuper Ægyptia mastiche non nihil emollit, sed maior virtutis ipsius portio concoquit, digerit q̄. Item & Thus quandam molliendi vim obtinet, verum hoc quidē coctum ex vsu est, veluti & fœnigraci semen: etenim & hoc probè coctū emollit, ac magis adhuc pingui permistum. At quæ citra coctionem ob consistentiæ siccitatem dilui, liquari, mēgi q̄ desiderant, oleoso quopiam indigent: cuiusmodi sunt oleum ipsum, cum nihil adstrictiōis habet, Citem balneorum strigmenta, præterea quod vocatur susinum, ad hæc multo etiam magis comage num. Huius quoq̄ ordinis est butyrum, tum althææ & fœnigraci decoctū. Porro inter tā mollia & validissima, quod genus sunt bdellium & styrax, gutta ammoniaci idē potest, quod & propolis: atqui hoc in bdellio distinguendum est, q̄ scythicum altero arabico multo ad hæc sit præstātius, præcipuè nouum & molle, quod ēt pingue nominant. Cōsuetudo siquidē hæc est inter recētiores medicos in huiusmodi pharmacis, quod emolliētius est, pinguius appellasse: hoc autē videlicet humidius quoq̄ est. Caterum chalbanum & qui opopanax dicitur, præterquā quod digerūt, ēt qd molliens habent: opopanax autē digerendo, chalbanum molliendo coquendo q̄, præcellit. Talis sanè mollientiū pharmacorum facultas est. Tu verò cum vel scriptū aliquod in libris medicamentarijs discusseris, & examinaueris, vel ipse cōposueris, auditis nuper pharmacorum secundum maioris minoris q̄ rationem differentijs, intellectis item corporum affectuum q̄ diuersitatibus, valida validis, imbecillia imbecillius, adhibebis. At vbi post primam medicamenti impositionē aliud applicas, oleo simplici pinguia partem affectam fouere conuenit. Porro ex ijs, quæ ἐχέολλα i. tenacia, nominantur, nullum auferendum est prius, quā sua sponte abscedant: immo etiam si laueris, permittenda sunt. Vitanda autem medicamentosa aquarū lauacra, præsertim quæ chalcanthosa, aluminosa, & sulfurosa sunt. Hæc quidē sufficiunt viris cordatis ac prudentibus, qui q̄ in medicina operibus exercitati peritiam aliquam sunt adepti.

Specialis Mollientium pharmacorum Differentia ac Facultas.

CAP. 4

QVoniā verò oēs eiusmodi nō sunt, & proposuimus hoc cōmentario, nō vt in opere de morbis curandis methodum solā exponere: verum simul cum particulariū vno atq̄ altero exemplo, pharmaca vsu cōperta subiungere oportet, quæ maiores nostri in pharmaceutica i. medicamentaria artis parte celebres literis mandauerunt: ad speciales mollientiū pharmacorū differentias perueniemus, à mollissimis, quæ & paruis inflamationibus medētū exorſi. Ex cōpositis emollientibus alia quidē (vt ita dicā) imbecilliora primo ordine statuuntur: quædam nō multo his validiora, secundo: & quædā alia, tertio: ad hæc non nulla, quarto. Caterum primi ordinis mollientibus ad exiguas durities & in mollibus seu teneris corporibus vtī, sicut prædictū est, exedit: ad fortiora his corpora & affectus, secundi: quemadmodū & tertij, & quartj, pro illorū ratione. Subscribā autē & eorū cuiuslibet propria. **C** Emollientia Medicamenta Primi ordinis. Butyrū, resina colophoniam, & cera cādida nō vetusta, singula tria pōdere æqualia, inuicē liquata, primi ordinis mollientia sunt. Et liquidū medicamen, quod parygrū appellatur, eorū numero adscribitur, cū recens fuerit: veterascens autē maiorē digerēdi vim acquirit. At emolliētū imbecillimum est, cera

cum

Al. λείον
i. solui.

cum butyro liquefacta, aut ex fusino, aut commageno: atq; his imbecillius est quod dicitur Cere-
laum, quasi ex cera oleo q; confectum, cum in libram olei laxantis nulla adstringenti virtute p̄di-
ti, cera vnciæ xij vel xvi, inieciæ fuerint. Iam ex ouis cerata facta exiguam quandam relaxandi po-
testatem possident. Valentiora his, verum imbecilla adhuc & ipsa, cerata ex cœsypo, resina, &
cera, pari pondere liquefactis: sin aut̄ vetustiora quodammodo ipsa fuerint, olei cuiusdam laxan-
tis, vel fusini, vel commageni, vel adipis suilli, vel gallinacei, vel anserini misturam requirunt.

Emollientia Medicamenta Secundi ordinis. Quemadmodum in simplicibus medicamentis quatuor
congenerum ordines fecimus, qui maioris in se minoris q; rationem distinguunt: aliquorū autem
ambiguam esse virtutem diximus, vtrum ad primi ordinis finem, an in secūdi initio, locanda sint:
ita de secundo, tertio, & reliquis deinceps. In quibusdam vero audacter pronuncians, alia in prin-
cipio huius, alia in termino huius ordinis, consistere dixi: sicut non nulla citra appositionem, vel
primi, vel secundi, vel tertij, vel quarti ordinis esse retuli. Multum vero experientiæ particularis
in varijs & corporibus & vitijs seu affectibus huiusmodi pronunciata desiderant. Quare si quis
post me æquē studiosus & veritatis vehemens amator extiterit, ne temere ac subito, vbi bis ter ve
vsus expertus q; sit, ferat sententiam: frequenter. n. ei ex longa experientia, quēadmodum & mi-
hi vsu venit, in secundo ordine dicta, in tertium incipientem transponi oportere videbuntur, vel
in principium tertij absolute. Cum enim corpora quibus medicamēta adhibētur, ipsi q; affectus,
non exiguum differentiaē excessum in maioris minoris q; ratione obtineant, difficillimum est de
omnibus eadem pronunciare. Accedit huc, q; ipsa simplicia medicamenta non paruo diuariant
discrimine. At ego quum in præstatiſſimis virtutem pro vnaquaq; specie ac genere ostenderim,
si quis in deterrimo per experientiam examinationem molietur, examinabit quidem falso, non
autem facultatis ipsorum ordines distinxerit. Itaq; tutissimum est medicaminum ipsorum inter
se differentiam secundum maioris minoris q; rationem accurate scribere, quemadmodum & in
alijs feci, & nunc facturus sum.

*Varia nasci Differentias secundum maioris minoris que rationem, in Emollienti emplastro Mnasei,
Pro varia simplicium tum quantitate, tum etate, tum coctione.* C. AP. 5

SANē quidē emplastrum Mnaseo auctore cōpositū rectissimē secūdo molliētū ordinī adscri-
pseris, omnibus certē, qui eius meminerunt, conuenientibus ex oleo veteri, argenti spuma, &
adipe suillo cōponi: in quātitate vero horum singulorum discrepantibus, atq; eo, q; nō nulli ex re-
centi adipe, quidā ex veteri, quem iam oēs vocare solent axungia, componant. In his quidē imbe-
cillimum fiet ex argenti spuma, suillo adipe, & oleo, neutro veteri: validius, oleo quidem ex ijs ve-
teri, altero aut̄ recenti addito: his validius, ex ambobus vetustis. Ex eo igit̄ q; recēs aut vetus oleū
adeps q; immittitur, quatuor differētiæ prodibunt, aliās quidē ambobus recentibus, aliās vetustis:
nō nunqua oleo quidē veteri, adipe vero recētī: vel cōtra, oleo quidē recenti, vetusto aut̄ adipe in-
dito. At ex trium ipsorum simplicium medicamentorum mutua symmetria alię plures differen-
tiæ emanabunt, vel. n. pari pondere & mensura hæc tria miscentur, ac multi affirmāt, ab ipso Mna-
seo confectum tribus paribus cōstare: vel duobus quidē paribus, tertio nō pari, sed minori, aut co-
pioſiori: vel tribus mistis imparibus: vnde clarū euadit multas fore differentias. Copiosa siquidē
* argenti spuma inieciā medicamen potestate mollius fiet: pauciore, validius. Ac magis emolliet, si
plus adipis immittamus: digeret fortius, si oleum augeamus. Præterea aliud quidā accedit copio-
siore oleo imposito, quod magnam vim ad medicamen, vt magis digerat, efficiendum obtinet: est
aut̄ hoc, sicut primo libro diximus, si magis incoquas. Si igitur solā argenti spumā in oleo copio-
siore coquas, medicamentum euidentius exiccabit: † in vberiore verō coques, vbi plus olei indide-
ris, si emplastri spissitudinē habiturum sit: q; si id nō cures, sed equali tpe tum id, quod minus olei
cōtinet, tum quod plus habet, incoquas, liquet potestate emollientius futurum, cui oleum vberius
* mistum fuerit, quemadmodū si & cruda argēti spuma oleo cōmista acopo vtī velis. Quare quod H
iā sæpe dixi, semper ipsius meminisse volo, nō sicut quidā sententias absolute de pharmacis ferūt,
sic & nos facere, absolute dicentes hanc medicamenti cōpositionē illa esse potiore: nam vtraq;
ad diuersos specie affectus rectē cōposita esse pōt, interim ad eundē diuersis tēporibus. Hæc igit̄
omnia modo à me relata qui prius audiuit, nō diligēs mō vel memor, sed natura ēt prudēs, vtiliter
& cū fructu leget ea, quæ distinctē & scripsi & scripturus sum. Ac in propolis medicamētis di-
stinctiones ibi exponā triū quatuor ue syllabarum appositione cōprehenſas: qualem, in quā appo-
sitionē in pharmaco præſenti libro pposito Mnasei, Andromachus appēdisse videtur. Nā in me-
linorū emplastrorū catalogo vndecimū ordine cum id scripſisset, nō simpliciter dicere conten-
tus fuit, vt in prioribus cōmemoratis, Aliud, atq; Aliud, ipsis præponēs, sed Tenerū adiecit. Itaq;
hoc volebam ipsum in omnibus fecisse, & in ipsis melinis à tenerimo incepisse: inde verō digres-
sum ad paulo fortius innuisse adscribendo paxillo quodā secūdu hoc, quā illud, esse valentius,
hoc rursus tertium esse fortius, deinde hoc quartum: Veluti rursus si aliqua æqualem putarit ha-
bere potentiā, id ipsum admonuisse: vel si periculū timeret in eiusmodi pronūciatis, certē simpli-
cia emollientia pharmaca prædiceret, maioris ac minoris ratione in ipsis definita, vt qui molliētia
emplastra multa deinceps ab ipso scripta legit, validius quidē esse intelligat, quod ex styrace, am-
moniaco,

† Forte, diutius
vero coques.

A moniaco, bdellio, propoli, chalbano, seuo taurino, hircino q̄, & medullis confectum est: imbecillum, quod nullum ex his continet, sed vel omnia inualida virtute, vel hisce quidem ipsis valentiora: media verò temperaturis, viribus q̄, q̄ vel vnum aliquod validum vel duo, imbecillibus mista sint. Constat enim interpositam maioris minoris q̄ latitudinem omnibus medicamentis non exiguum inesse, in communi vniuersis ipsis virtute generatim æstimatis: iuxta quam pharmaca congenera & conformia græcè *ὁμογενῆ* & *ὁμοειδῆ* id est eiusdem generis ac eiusdem speciei, dicuntur, quemadmodum & alia generis vel speciei differentiis euariantia. Cum igitur hæc mihi prædicta sint, quibus instructus, non magno negotio & valentiore virtute & imbecilliore prædita queas dignoscere, narrationē ipsorum aggrediar: deinde conscripta ab expertissimis medicamentorū viris, siue emplastra siue malagmata voles appellare, percēlebo. Auspicabor autem à medicaminibus ab Asclepiade in quarto libro Exteriorum, quibus titulum indidit Marcellas, æditis.

Asclepiadis Malagmata.

CAP. 6.

A Myrhaonis Malagma ad Præcordiorum tensiones. Solut omnem Duritiem. Facit etiam ad difficiles Articulorum motus. Guttæ ammoniaci pondo vncias trigintasex, ceræ tantūdem, terebinthinæ pondo vncias octo, bdellij pondo vncias octo: thuris, myrrhæ, vtriusque pondo vncias quatuor: chalbani pondo vncias octo, cyprini heminas quatuor. Myrrha, thus, bdellium, vino madefiunt: ammoniacum aceto diluitur: omnia contunduntur pistillo cyprino inuncto, quousque perfecte dissoluantur. Hoc medicamentum vetus celebre q̄ est, sicut & quod Asclepiades post hoc in istū modum tradidit. *¶ Diasmyrnon Apolophonton, id est Medicamentum ex myrrha, mortem differens, confectum, ad Præcordiorum tensiones. Solut omnem Duritiem. Beneficit Hepaticis, Splenicis, Nephriticis. Valet ad omnem Nervorum sympathiam. Articulorū dolores, detentiones q̄ lenat.* Ceræ, terebinthinæ, guttæ ammoniaci, bdellij, myrrhæ, propolis, iridis, styracis, singulorum pondo vncias sedecim: irini vnguenti faculæ, quantum sufficit: vini odorati, quod satis est. Preparato, sicut prædiximus. Quod succedit huic, ab Asclepiade scriptum dignius quidem ac celebrius suprà scriptis existit, verum ad induratum solutionem illis inferius. *¶ Aliud Dioscoridis Medicamentum confectum, ad difficiles Articulorum motus, & Ligationem, hoc est obstrictos articulos, Græci vocant Ancylas. Tollit omnem Duritiem. Facit ad Interaneorum effectus, Abscessus q̄ profundos.* Ceræ pondo minam: resinæ frictæ, chalbani, iridis illyricæ, singulorum minæ dimidium: irini faculæ, quod satis est: vini, quantum sufficiat. Medicamentum est, conficitur sicut priora. Pharmacum antedicto succedens ab Asclepiade scriptum idem est ei, quod Heras ad calcem medicamentarij sui libri conscripsit: paululum verò quiddam in sym-

* Al. iij.

metria quatuor simplicium pharmacorū euariat, uti innotescet cum ambo scribemus. Prius autem ab Asclepiade proditi mentionem faciemus, quod ad verbum ita habet. *¶ Lucij præceptoris ad Articulis: recenti cicatrice contractos, quas Ancylas nominant, inscriptum. Facit ad Abscessus in alto corporis obortos, item ad Nervorum contractiones, & Articulorum ligationes quas Ancylas vocamus. Succurrit Opisthotonicis, id est cum ceruix in posteriorem partem reflexa est, nec prorsum retrahi potest. Valet ad omnem Nervorum dolorem ex consensu. Est etiam Acopon bonum irino, vel cyprino, vel laurino solutum. Emollit & veteratas contumaces q̄ Duritias.* Bdeilij, seui vitulini, guttæ ammoniaci, iridis illyricæ, singulorum pondo denariorum sedecim: opopanax, chalbani, cachryos, styracis, thuris, singulorum pondo denariorum octo: piperis grana numero centum sexaginta: irini faculæ, quod satis sit: ceræ, terebinthinæ, singulorum pondo selibram: vini quod satis est. Tusile est medicamen, superiorū modo conficitur.

Vbi igitur Heras ab Asclepiade in simplicium symmetria dissenferit, quod pollicitus sum, iam indicabo. Primum omnium scripsit Asclepiades medicamentum, Bdellij denariū pondo sedecim: Heras autem non bdellij, sed bdellij pondo denariū octoginta, qui quinquies sedecim adæquant. Deinceps Seui vitulini denarios sedecim scribēte Asclepiade, Heras quinquies totidem posuit, sicut & bdellij: nam octoginta denarij, quinquies sedecim cōprehendunt. Tertium ab his medicamentum Asclepiades subiunxit, Guttam ammoniaci, & huius sedecim denarios iniiciendos censuit. Itaque iuxta priorum proportionem Heram quoq̄ octoginta denarios scripsisse conueniebat: posuit autem non octoginta sed centum, quare viginti plures illo indidit. Aliud post cōmemorata pharmaca protulit Asclepiades hisce verbis, Iridis illyricæ denarios sedecim: Heras huius proportionem seruauit, octoginta scribens. Quintum post prædicta medicamenta Opopanax denarios octo Asclepiades scripsit: Heras autem hīc quoq̄ proportionem seruauit, quadraginta ponens. Chalbani denarios octo Asclepiades iniecit: Heras etiam in eo proportionem re-presentat, quintuplam censens immittēdam: quippe quadraginta denarij, quinquies octonos absolunt. Septimum medicamen Asclepiades ita exposuit, Cachryos denarios octo. Oportuit igitur & Heram, si proportionem obseruabat, quadraginta indere: nunc autem non sic, verum duplices, puta sedecim, ipse cōscripsit. Octauī, Styracis Asclepiades meminī, denarios octo iniiciēs: Heras proportionem huius, quintuplo immisso obseruauit. Nonum pharmacum posuit Asclepiades, Thuris denarios octo miscens: Heras nō quintuplum, sed duplum sumere præcipit. Decimī, Piperis meminī Asclepiades centum sexaginta granis immittis: cui Heras rursus consentiens octingentos iniecit. In quibusdam exemplarijs haud noui, quomodo viginti scripta sint, quemadmodum in alijs centum & octo. Vndecimū tradidit Ceram Asclepiades, sicut & Duo-

* Al. viginti

decimum Resinam terebinthinam, vtriusque selibram immittendum existimās. Ratio igitur exi-
gebat & Heram, si proportionem volebat referre, quintuplum vtriusq; indere, quod erat singu-
lorum libras duas, insuper libræ dimidium: ille verò non ita, sed libras tres, & vncias quatuor mi-
scere iubet. Vnde clarum euadit Heram cachryos duplum ad proportionem imponere, sicut &
thuris. Ammoniacy verò guttam quadruplo copiosorem adiecit, quemadmodum & terebinthi-
næ ceræ q; triplo: etenim in his tertia parte exuperauit: atq; hac re totam medicamenti compo-
sitionē, Asclepiadis consecuturæ similem effecit. Exuperans enim in symmetria cachryos emolliens
nihil habentis, sed digerens duntaxat, adauxit ei & emollientia, thus puta, ceram, & terebinthinā.

Hoc igitur medicamentum Lucij quidem præceptoris nominat Asclepiades: vbi vero distulerat ab
Hera, percensui. Caterum extremi mollientium ordinis est, vt quo nullum indurescentia magis
emollire comperias. Porro medicamenti author huc etiam animi intentionem direxit, vt quod in
scirrhus induratis continetur, digerat, discutiat q;. Reliqua pharmaca præcedentia, parum iam di-
cta superant. Habent enim in se ipsis amplius incrassatorum viscosorum q; humorum incisoria,
quæ sæpe tumoribus scirrhosis ex usu sunt, cum viscoli humores illos produxerint. Itaque opo-
panax modicè attenuat, vocant autem sic radicem panacis, cuius caulis liquore expresso opopana-
cem faciunt: est enim deterforiæ nō incisoriæ virtutis. Acetum autem cum stercore caprino secat, F
deterget, digerit q; vehementer non modo humores incrassatos ac lentos, verum solidas etiā par-
tes ipsas. Quædam apposita sunt medicamini ordine propositum sequenti, quod Alcimionis ti-
tulum habere dixit. Scribit ergo de priore hunc in modum. *¶ Aliud malagma Marci Tulentij Ascle-
piadis, valde generosum, ad idem. Præcipue vero valet ad Vteri inflationes. Inscriptur Asclepiadeum medicamen-
tum, eo quod ad Asclepiadem Euthynum autorem refertur.* Myrrhæ † denariū pondo trium, † opopa-
nacis pondo selibram, ceræ pondo libram s, chalbanī pondo vncias tres, mannæ pondo selibram,
guttæ ammoniaci pondo selibram, resinæ frictæ pondo libram s, aceti heminam. Utendum est eo
etiam ad omnem neruorū ex consensu dolorem. *¶ Aliud, Alcimionis Titulo inscriptum.* Cere pō-
do libram & s, resinæ colophonix pondo libram & s, guttæ ammoniaci pondo libram s, chalbanī
pondo vncias tres, myrrhæ pondo vncias tres, opopanax pondo libram s, propolis pōdo vncias
tres, aceti sextarios duos, stercoreis caprini pondo vncias tres. Ammoniacum teritur, aceti sextario
iniecto: deinde his myrrha, thus, opopanax adduntur, rursus q; læuigantur: propolis post chal-
banum contunditur: cera, resina q; coquitur, olei heminis duabus affusis: vbi confluerint, propo-
lim & chalbanum adiecto, mouens continuè: postquam dissolueris, ab igne sublata refrigerari li-
nito, & derafa læuigatis indito: cum vnā miscueris, excipito, ac vitior. Post nominatum malag-
ma, aliud in Asclepiadis libro scriptum est, quod quidem molliendi facultatis parum, calfactoriæ
verò plus obtinet: habet autem non gentianæ succum modo, sed peucedani & sagapeni etiam li-
quores, calida admodum pharmaca. Ceterum mistum ei est & aphronitrum, & lapidis alij flos, at-
tenuantis incidentis q; potestatis medicamina. Iam sulphur viuū calcfacere omnes norunt, quē-
admodum & vinum picatum. Subiungam & hoc medicamentum ipsius Asclepiadis verbis.

*¶ Malagma Pharmianum ad Prædictos affectus inscriptum. Summe facit Pleuritidis, quippe dolores subito in
ipsis accessionibus soluit impositum. Oportet autem, vbi ipsum imposueris, ruborem in parte affecta excitato splenum
auferre, ac rursus intervallo temporis imponere. Item Diuturna vitia dissoluit.* Ceræ pondo, † libras quinq; †
guttæ ammoniaci libras tres, frictæ tantūdem, terebinthinæ pondo librā, thuris pondo libram s,
myrrhæ pondo vncias sex, aloes totidem: œsypī, gentianæ succi, peucedani liquoris, singulorum
pondo vncias tres: sagapeni pōdo vncias iij, aphronitri pondo vncias sex, lapidis alij floris pon-
do vncias sex, opopanax tantūdem, propolis pondo vncias tres, sulfuris viui pondo vnc. iij, vi-
ni picati sextarios v. Picatum & gentianæ succum incoquito: quæ liquari possunt, vbi liquefecer-
is, refrigerari linito: guttam ammoniaci, thus, myrrham, & aloen conterito: in pilam coniectis
liquidum affundito, soluta studiose cōterito: arida vero tunsa, cribrata q;, leuigatis indito: ac rur-
sus diligenter tunsis liquida feruefacta adiungito, absq; grumis, qui encerides dicuntur: cum mi-
scueris, excipito, ac vitior. Post prædictum aliud deinceps malagma persimile Asclepiades hi-
sce verbis conscripsit. *¶ Aliud Neapolitanū, præparatum est Aquilæ Secundillæ.* Vini picati sextarios
sex, ceræ pondo libras sex, guttæ ammoniaci pondo libras tres, frictæ tantūdem, terebinthinæ pon-
do libram s, thuris pondo libræ semissem: myrrhæ, aloes, aphronitri, lapidis alij floris, gentianæ ra-
dicis succi, singulorum pondo vncias vj: sagapeni pondo vncias iij, sulphuris viui pondo vncias
iij, propolis pondo vncias iij, panacis radicis pondo vnc. iij, sampsuchi pondo vnc. iij, piperis albi
pondo vncias tres. Præparato, ac vitior, vt prædictum est.

Andromachi Malagmata.

CAP. 7.

Malagma durum & aridum. Picis pondo libras tres, ceræ pondo libras duas, resinæ pondo li-
bram, chalbanī pondo vncias duas, guttæ ammoniaci tantūdem, mannæ pondo vncias
quatuor, aceti sextarios tres. *Aliter.* { Mannæ libram vnā, } picis pōdo libras quatuor, cere pon-
do libras duas, resinæ pondo libram, guttæ ammoniaci pondo libram, { succi radicis peucedani vn-
cias sex, œsypī vnc. iij: } chalbanī pondo vncias vj, alij pondo librā: aceti sextarios tres. *¶ Aliud
Aristoclis.* Picis pondo libras iij, ceræ pondo libras viij, resinæ frictæ pōdo libras quatuor, terebin-
thinæ

† Al. vnc. iij.

In hac descrip-
tione dicitur thus,
cuius tñ mox
meminit in cō-
fectura.

† Al. librā vnā.

* Al. vnc. iij.

* Al. viij.

Athinæ pondo libras iiii: guttæ ammoniaci pondo libras duas, vncias octo: chalbanî pondo librâ, vncias iiii. *¶ Aliud ad Artium ligationem, quas Augulus Graecus vocat.* Bdellij denarium pondo sedecim, thuris denarium pondo sedecim, guttæ ammoniaci denarium pondo octo, opopanacis denariorum pondo octo, chalbanî denarium pondo octo, seui vitulini denarium pondo sedecim, piperis grana centum sexaginta, lityracis denariû pondo octo, cactuyos denarium pondo sedecim, iridis illyricæ pondo sedecim, terebinthinæ minæ dimidium, ceræ minæ dimidium, cyprini heminas iiii, vini, quod satis est.

¶ Malagma ex Meliloto. Nardi celticæ denariorum pondo decem, cyperi denariorum pondo octo, cardamomi denarium pondo octo, iridis illyricæ denariorum pondo octo, myrrhæ denariorum pondo octo, croci denariorû pondo iiii, meliloti denarium pondo xxv, guttæ ammoniaci denariorum pondo octo, terebinthinæ denariorum pondo quinquaginta, ceræ nouæ denariorû pondo centum, cyprini hemina dimidiû, acetî quod satis est: quidam guttæ ammoniaci denariorum pondo centum. *Ad interiora omnia.* *¶ Diaspermaton, i. ex Seminibus.* Guttæ ammoniaci denariorû pondo quinquaginta, ceræ denariorum pondo quinquaginta, terebinthinæ denariorum pondo quinquaginta, fœnigræci denarium pondo xxv, seui taurini curati denariorum pondo xxv, iris illyricæ denariorum pondo xxv, nitri denariorum pondo xxv, mellis hemi-

* Al. xx.

* Al. hemis.

nas sex, acetî heminâ, panacis denariorum pondo xxv, cyprini parum. *¶ Et autem Phlegmas.*

Fœnigræci feminis, anili feminis, lityracis, bdellij sordidi, manna, thuris, cardamomi, cyperi noui, panacis radicis, iridis illyricæ, aphronitri, singulorû denariorum pondo xxv: guttæ ammoniaci terebinthinæ, singulorum denariorum pondo quinquaginta: seui taurini denariorum pondo sexaginta, meliloti denariorum pondo sexaginta, ceræ denariorum pondo centum, mellis hemina dimidium, vini heminam vnam.

* Al. centum.

¶ Aliud, et Harpocras. Fœnigræci, nitri, panacis, iridis, singulorum denariorum pondo octo: terebinthinæ, guttæ ammoniaci, ceræ, singulorum denariorum pondo centum: seui taurini denarium pondo centum, mellis pondo libram, acetî sextarios duos: aprij feminis, cumini, fœniculi, singulorum denariorum pondo quinquaginta: meliloti denarium pondo quinquaginta, alij xxv: samplici denariorû pondo quinquaginta: cardamomi, ameos, singulorum denariorum pondo quinquaginta: cyprino excipitur. *¶ Malagma ex Sarcocolla ad multa.* Ceræ nouæ, baccarum lauri, fœnigræci læuis, samplici, singulorum denariorum pondo centum: terebinthinæ librâs centum quinquaginta, nitri denariorum pondo trigintaduûm: piperis denariorum pondo trigintaduûm, alij sedecim: cyperi denariorum pondo sedecim, cyprini heminas duas, vel lityracini.

* Al. quinquaginta.

* Al. drachmas

¶ Malagma ex Baccis lauri. Ceræ denariorum pondo septuagintaquinque, picis brutiæ denariorum pondo septuagintaquinque, baccarum lauri denariorum pondo septuagintaquinque, nitri denariorum pondo septuagintaquinque, resinæ frictæ denariorum pondo septuagintaquinque, chalbanî denariorum pondo duodecim, piperis albi denariorû pondo sedecim, cyprini denariorum pondo sex. *¶ Aliud Malagma boni coloris, ad Multa accommodandum.* Ceræ pondo libram, resinæ frictæ pondo libram, guttæ ammoniaci pondo vncias sex, aluminis liquidi pondo vncias sex, salis floris pondo vncias sex, quidâ visci pondo vncias sex.

* Al. heminas sex

¶ Malagma Asclepiadum. Ceræ denarium pondo octoginta, guttæ ammoniaci denarium pondo octoginta, bdellij denarium pondo octoginta, iridis illyricæ denarium pondo octoginta, resinæ terebinthinæ denarium pondo xxx, manna thuris denariorum pondo xxx: irino contunduntur. *¶ Malagma ex Alumine, aliter.* Ceræ denariorum pondo centum, picis denarium pondo quinquaginta, aluminis liquidi denariorum pondo xxv, ego autem quinquaginta: visci denariorum pondo quinquaginta.

¶ Ad Ischiadicis vnum. Rutæ agrestis feminis, sulphurij, baccarum lauri, aphronitri, abrotani, colocyntidis, cardamomi, ameos, singulorum denariorum pondo quatuor: rutæ viridis, picis, terebinthinæ, guttæ ammoniaci, ceræ, seui, singulorum pondo selibram: chalbanî denarium pondo sex, opopanacis denariorum pondo quatuor, sulphuris ignem non experti denarium pondo iiii. *¶ Ad Lienosos.* Ceræ pondo minam, resinæ pondo minam, guttæ ammoniaci minæ dimidium, aluminis liquidi denarium pondo quinquaginta, strigimenti heminâ, capparis radicis denarium pondo quinquaginta, calaminthæ radicis denarium pondo quinquaginta: myrobalani fecis, quod magma vocant, denariorum pondo quinquaginta: aceto aridis, oleo liquabilibus adiecto, vitior.

* Aliter maza
maza pondo
sex denarij,
capparis
radicis pondo
xx.

¶ Malagma Polychreston, i. vltus multiplex. Sinapios denarium pondo iiii, manna denarium pondo ij, rutæ denarium pondo iiii, aphronitri denarium pondo iiii, capparis radicis denarium pondo sex, guttæ ammoniaci denarium pondo iiii, myrobalani denariorû pondo xxv, & corticum denarium pondo quatuor, lapidis alij floris denarium pondo iiii, fœnigræci denarium pondo iiii, cardamomi denarium pondo quatuor, ceræ denarium pondo septuagintaquinque, resinæ denarium pondo centum, mellis heminas sex, irini sedimenti heminam: acetum ammoniaco duabus heminis superfunditur.

* Al. denarij.

* Al. heminas.

¶ Polyarchon ex epibola. Cyperi, cardamomi, manna, ceræ, singulorum pondo minam: terebinthinæ frictæ pondo minam, liquidæ pondo minas tres, cyprini quod satis est: ego bdellij pondo minam. *¶ Altera scriptura.* Cyperi, cardamomi, bdellij, thuris, balsami, singulorum pondo minam: ceræ pondo minam s, resinæ frictæ pondo minas iiii, cyprini heminas sex, vini odorati heminam vnam s. *¶ Vt ego vtor.* Cyperi, cardamomi, amomi, bdellij, singulorû pondo minam: ceræ pondo minam s: resinæ frictæ, terebinthinæ, pondo minas quatuor: cyprini heminâ: calic, cinnamomi

DE COMPOS. MEDIC.

momī, guttæ ammoniaci, nardi indicæ, croci, myrrhæ, singulorum quartam minæ portionem: vi- E
ni odorati quantum sufficit. *Malagma ad Multa vtile, Apollony.* Cerae, picis, resinæ frictæ, singu-
lorum denarium pondo centumviginti quinque: nitri, thuris, singulorum denarium pōdo quinquaginta: seui vitulini & taurini, butyri, singulorum denarium pondo septuaginta quinque: celsypī dena-
rium pōdo quindecim, aquæ cyathos sex. *Malagma ad Hepaticos bonum.* Guttæ ammoniaci de-
narium pondo centūquadragintaquatuor, alij centumduū: bdellij denarium pondo centumqua-
dragintaquatuor, croci denarium pondo xij, myrrhæ denarium pondo xij: ceræ denarium pondo
centūquadragintaquatuor, alij centum: aceti quartam partē heminæ, cyprini heminam: ego autē
pono heminas x. *Malagma ad Rheumatismum Stomachi & Intestinorum.* Oenanthes pōdo vnciā,
omphacij pondo vncias iij, phœnicobalani carnis pondo vncias duas, acaciæ pondo vnciam, ro-
sarum pondo vnciam, omphacij pondo vncias quatuor, aloes pondo vncias iij, gallæ pondo vn-
cias quatuor, aluminis rotundi pondo vncias iij, picis pondo vncias quatuor, ceræ pondo vncias
tres: alij thuris, myrtei, pondo vncias tres: vinū aridis affunditur. *Ad Hydroticos & Flatuosos.*

* Al. vnam.

* Aliter s.

* Aliter s.

* Al. lxxv.

Picis liquidæ pondo librā, ceræ pondo libram, nitri pondo vncias sex, sulfuris viui vncias sex, alu-
minis filij pondo vncias sex. *Aliud Malagma ad Ischiadicis, Alia q; multa.* Cerae denarium pon-
do septuaginta duum, terebinthinæ denarium pōdo quadraginta octo, guttæ ammoniaci denariū F
pondo triginta duum, propolis denariorum pondo quadraginta trium, chalbanī denariorum pon-
do triginta sex, bdellij denarium pondo viginti quinque, croci denariū pondo quinque, opopanacis
denarium pondo duodecim, nitri spumæ denariū pondo triginta. Irino vngvine tundens vitor.

* Al. xx.

* Al. viginti.

Aliud Malagma Andreae, Polychreston i. multis vtile. Pyrethri denarium pondo octo, croci gnidij
denariū pondo octo, salis ammoniaci denariū pondo octo, cucumeris agrestis radicis denariū pō-
do octo, resinæ pineæ denarium pondo octo, terebinthinæ denarium pondo octo, ceræ denarium
pondo triginta: liquoris sycamini denarium pondo xij, alij decem: aphronitri denarium pondo
viginti, thuris denarium pondo sexaginta quinque, bdellij denarium pondo decem: guttæ ammo-
niaci denarium pondo decem, alij viginti: myrrhæ denarium pondo x: aristolochiæ denariū pon-
do decem, alij viginti: piperis albi denarium pondo decem, & longi denarium pondo x, xylobal-
fami denarium pondo decem, cardamomi denarium pondo decem, celsypī denarium pondo xv,
hebfici radicis denariorum pondo decem, gladioli radicis denariorum pondo decē, styracis dena-
riorum pondo decem, capparis radicis denariorum pondo decem, iridis illyricæ denariorum pon-
do decem, aloes indicæ denarium pondo decem, chalbanī denarium pondo decē: visci de quercu
lecti denariorum pondo decem, alij duodecim: adipis anserini denariorum pondo octo, resinæ sic- G
cæ denarium pondo duodecim: sedimenti iridis, quod satis est. *Aliud Amythaonis ad Thoracis,
Præcordiorum, & Stomachi dolores: item ad Articulorum impeditiores, quas Ancylas Græci, ligationē Latini vo-
cant. Insuper valet ad Abscessus, & Duritias emollit.* Guttæ ammoniaci denariorū pōdo quinquaginta,
ceræ denariorum pondo viginti, bdellij denariorum pondo quinquaginta, resinæ terebinthinæ
denariorum pondo viginti, iridis illyricæ denariorum pondo decem, chalbanī denariorum pon-
do quinque. Bdellium & ammoniacū vino perfunduntur, deinde etiam liquata miscentur, & irino
adiecō simul læuigantur. *Malagma Antipatri ad Colicos Omnia q; interiora.* Silphij denariorum
pondo duum, eleliphaci denariorum pondo quatuor, casia denariorum pondo quatuor, melan-
thij denariorum pondo quatuor, staphidis agriæ denariorum pōdo quatuor, chalbanī denarium
pondo quatuor, siruthij denariorum pondo quatuor, sulfuris viui denariorum pondo quatuor,
panacis denariorum pondo septem, propolis denariorum pondo septem, pyrethri denariorum
pondo septem, guttæ ammoniaci denariorum pondo septem, nitri denariorum pōdo septem, alij
floris denariorum pondo viginti quinque, ceræ denariorum pondo centumquinquaginta, resi-
næ denariorum pondo centumquinquaginta, olei heminam. *Aliud Malagma Callimici ex colle-
taneis Paccij, ad Omnia.* Cerae nouæ denariorum pondo centum: guttæ ammoniaci, terebinthinæ, H
bdellij pellucētis, singulorum denarium pondo quinquaginta: alterci seminis denarium pōdo
triginta, liquoris papaueris denarium pondo viginti: meliloti, myrrhæ, aristolochiæ, piperis, gen-
tianæ, styracis, singulorum denarium pondo quindecim: thuris denarium pōdo octo, croci dena-
riorum pondo octo, olei heminam, papaueris albi seminis denarium pōdo quadraginta octo, nu-
cleorum pineorum denarium pondo viginti. *Aliud Malagma Leucopyron.* Terebinthinæ pon-
do libras iij, ceræ pondo libras tres, guttæ ammoniaci pondo vncias sex, chalbanī pondo vnc. ij,
opopanacis pondo vncias duas, mānæ pondo vncias duas, seui taurini pondo vncias duas, cyprī-
ni parum. *Aliud Emplastrum, Malagma generosum Crispi.* Myrrhæ, opopanacis, chalbanī, singulo-
rum pondo vncias sex: panacis radicis, mannae, thuris, guttæ ammoniaci, singulorū pondo libras
duas: ceræ, resinæ frictæ, singulorum pondo libras tres: aceti † heminas duas. *Aliud ad Coxen-
dicum, Capitis, omnes q; Diuturnos dolores.* Cerae denariorum pondo viginti quatuor, guttæ ammonia-
ci denariorum pondo septem, terebinthinæ denariorum pondo septem, thapsiæ succi denario-
rum pondo octo, olei heminam. *Aliud ad Aquam inter cutem Cleophrantis.* Cerae, resinæ pineæ,
aphronitri, singulorum denariorum pondo centum: chalbanī denarium pondo duodecim, pro-
polis denariorum pondo duodecim, guttæ ammoniaci denariorum pondo duodecim s, cyprī-
ni heminas

* Al. vnam.

† Al. sextarios
duos

Ani heminas duas, acetī heminas duas. *¶ Aliud Dolorem sedans, Nicoftrati ad Podagram.* Cere pondo libram, guttæ ammoniaci pondo vncias sex, opopanacis pondo vncias iij s, meconia pōdo vnc. tres, cyprinum ad contusionem illorum adhibetur. *¶ Aliud ad Apellas, quos Græci Lipodermus vocant, authore Epidaurō.* Thapliæ radice pondo denariū trium, piperis nigri denarij pondo vnius, seui vitulini denariū pondo xij, thuris denariū pondo iij, xylobalsami denariū pondo duū, resina denariū pondo sedecim, ceræ denariū pondo viij: liquata siccis superfundito. *¶ Aliud Malagma apud Asclepiadem Dolorem, summouendo, tensionem subito tollens.* Ceræ tyrrhenicæ pondo minām: seui taurini, adipis anserini, medullæ ceruinæ, terebinthinæ, singulorum pondo minam: chalbani minæ dimidium, cespī pondo vncias iij, rosacei heminas iij, vnguenti telini idest ex fœtore græco cōfecti heminam, olei boni tantundem. Hæc igne non acri liquefacito, mouēs sedulo: Sint autem leuia in pila contusa, iridis illyrica denariū pondo tercentum sexaginta, aristolochiæ denariū pondo centum octoginta, hypocistidis leuigatæ denariū pondo nonaginta, gallæ leuigatæ denariū pondo trecentorum sexaginta: mannæ, bdellij, singulorum denariū pondo centum octoginta: cinnamomi, croci cilicij, myrrhæ, casia, nardi indicæ, iunci floris, calami aromatici, amomi, piperis, rhū succi, testudinis marinæ sanguinis, androsami herbæ, pyrethri, singulorum denariū pondo

* Aliter iij.

* Al. longi.

* ἄτανον est i
impressus, ma
nuscriptis aut
ἀπρονον, idest
dolorem.

* Al. minas ii.

* Al. vitulini.

B trigintaquinque: acetī veteris heminam, in quo omnia medicamenta iniecta emolliūtur, tunduntur q3, quousq; lentum ac elaboratum sit medicamentum: deinde reponitur. Valet etiam ad thoracis ac pulmonis rheumatismos. Item sincipitio dolentes confestim liberat. Vocatur autem medicamentum, Æsculapius. *¶ Aliud ad Coxendicum dolores optimum ab Hera Cappadoce acceptum.* Picis liquidæ heminas tres vel duas, ceræ pondo libram, pityinæ pondo libram, sulfuris viui pondo libram, nitri pondo libram semis, staphidis agrie sextarium, pyrethri pondo libram, facis combustæ pondo libras duas, cardamomi sextarium, chalbani pondo selibram: liquida siccis commiscuntur.

* Al rhei.

¶ Aliud Malagma Bacchi, quo Cæsar vsus est. Adipis suillæ pondo minas duas, ceræ pondo minas duas: helenij, calami aromatici, panacis radice, salis fossitij vel ammoniaci, singulorum denariū pondo quinquaginta: bdellij pellucis, guttæ ammoniaci, singulorum pondo minas duas: iunci floris, iridis, singulorum pondo minam: thuris, piperis, chalbani, singulorum denariū pōdo viginti quinque: coquito vt Cardameleum. *¶ Aliud Malagma Aureum ad Arthriticos hoc est articuli morbo laborantes.* Resinæ strobilinæ pondo libras duas: axungia, chalbani, singulorum denariorū pondo duodecim: ceræ denariorū pondo viginti quatuor, baccarum lauri denariorū pondo duodecim: incoquito vt nouisti. *¶ Aliud Malagma ad Laterum dolorem.* Cyperi, cardamomi, man-
Cnæ, guttæ ammoniaci, terebinthinæ, ceræ, irini, singulorū pondo libram. Ammoniacum seorsum coquito, liquabilia leuigato, ac cum irini cyatho liquefactis ammoniacum aspergito: deinde arida misceto, irino manus inquinans. *¶ Aliud Malagma Cloniaci boni coloris.* Auripigmenti pondo vncias tres, aluminis filsi pondo vnc. iij, calcis viuæ pondo vnc. iij, resinæ frictæ pōdo libras tres, ceræ totidem: acetum aridis, oleum liquidis additur: vtitor itidem in lienosis.

* al. Cluiani

* Aliter j.

Damocratis Malagma.

CAP. 8.

Quoniam metris conscripta & memoriæ facile commendantur, & medicamentorum symmetrias exacte conseruant, ideo Damocratis quoq; pharmaca apponere cōsueui: inter quæ & hoc infra adscriptum numeratur:

At vsus omnino & malagmatis boni

Subinde veniet medicinae cultoribus,

Ad musculos conuulsos, articulos quoque

Ruptos, & artuum fracturas: insuper

Ad crassitiem neruorum, nec non musculos

Cum phlegmone induratos. Ad morsus ad hæc.

D Est efficax, lichenas & lepras demit

Vt plurimum decem diebus additum.

Mutatur altero die vel tertio.

Picis nitidæ siccissimæ libras duas,

Vnam pityinæ pone, vnam & ceræ bonæ,

Ammoniaci rursus, liquidi atq; aluminis,

Fac singulorum vnam, duos acerrimi

Sextarios acetī. Rarò chalbani

Quidam vncias duas miscent, diutinas

Citius durities emollire qui expetunt.

Sic præparato. Partem acetī tertiam

Ammoniaci atq; alumini superaddito:

Ac leuia reddens in magno mortario,

Mellis recentis liquidi crassitudinem

Fingito: picem cum ceteris in fictili

Nouo incoque, vt perfrictu quin siccaueris

Quinta Classis.

IIII iij

Totum,

Totum, planè ablit minimum, atq; superfundito
 Sic leuibus in mortario factis probè:
 Et rursus ipsa tundito, donec receperint
 Flauum colorem, perquam similem melino.
 At si statuis prorsus miscere chalbanum,
 † Post ceram immittes, & resinam ptyinam,
 Ab igne postquam caccabum posueris.
 Quidam inijciunt contra mannae parem modum,
 Alumen auferentes ex medicamine.

Vtuntur ad id vitij genus, & glutinant
 Diuisiones his recentes viribus.
 Tu hoc vitior vel à primo statim die,
 Ad quos affectus rettuli, cum prenderint:
 Ad pustulas, nec non has consequentia:
 Sed splenio madentem aceto spongiam
 Desuper inijcito, vinculo coarctans molliter.
 Sic & lienolis ipsum perutile est.
 Vbi suspicaris scirrhum cuiquam visceri
 Futurum, intrepidus vitior malagmate.

Post hoc pharmacum Damocrates scripsit, quod ex sale cōfectum dicitur, hunc in modū exorsus,
 Si in horum aliquo maneat diebus plusculis,
 Et hoc parato medicamentum quā optimum.

Deinde aliud quoq; ex Sale post hoc commemorat: rursus q; post ambo aliud strumas discutere
 promittens, & iocinoris lienisq; aquosos affectus. Mihi verò satius visum est, hæc medicamenta
 inter emplastra digerentia referre.

De Relaxantibus Medicamentis.

CAP. 9.

Vocantur medicamēta quædam relaxantia, græcè chalaistica familiari omnibus propè recen-
 tioribus medicis vocabulo, inde nimirū, sicut & nomen ipsum indicat, q; tenas laxant par-
 ticulas: quippe relaxari ac intendi contraria inter se dicuntur. Hippocrates itaq; hunc in modum
 quodā in loco scriptū reliquit: || Cuti duræ emollitio, intensæ relaxatio, cōuenit. Si igitur propriè
 quis dictionibus uti velit, nō nulla medicamina induratorū corporum malactica i. emolliētia, esse
 dicet: ea nimirum quæ ipsorū soluunt duritiem, quemadmodū & relaxantia quæ tensioni meden-
 tur. Porro in phlegmonis cutē tendi contingit, interim à subiecto tumore symptoma hoc capien-
 tem: interim & ipsammet simul inflammatione laborātem: non tñ phlegmones substantia partis
 inflāmatę durities est, sed ē conuerso planè, sicut in libris de ipsa ostendimus, humiditas. Atqui in
 ijs, quæ scirrho conflantur, nō præpollens in affecta parte humiditas est, verū durities. Atta-
 men vtriusq; affectus similis genere quodammodo generatio est, & curatio: nascitur enim ex cō-
 fluxu humorum: curatur iisdem euacuat, quanq̃ euacuationis modus in vtriusq; idem nō est, sed
 uti in therapeutices Methodi cōmentario declaratum est, in quo etiā aliorum omnium affectuum
 sanandi rationē explicuimus. Inflammatis quidē particulis tum repulsoria medicamentorū qua-
 litas morbi initio, tum discussoria, semper ex vsu est: scirrhis autem sola discussoria sine repellēte.
 Itaq; summè indurata scirrho, summè insanabilia sunt. Porro dignoscere ea oportet, eo nempe si-
 gno, q; nullus affectus partibus sensus superlit. At in quibus sensus quidem est, sed obscurus, hæc
 curantur pharmacis humorē inraflatum videlicet digerentibus, non tñ validè ac vniuersim hoc
 agentibus, sicut digerētia medicamina faciunt, cuiusmodi vocant Græci epispastica & exipotica i. H
 attrahentia & excolantia. Mirari verò non oportet mutationē in duritiem ex inflāmatō accidere,
 cū simul & confluens humor crassior est & viscidus, & curatio medicamentis valde exiccantibus
 administratur. Quemadmodū enim & in exterioribus permulta corpora quæ ipsum ignē contin-
 gunt, torrentur, ex aqua verò rursus emolliuntur: ita etiā in inflāmatō affectū loci humiditas à ca-
 lescentibus & exiccantibus validius pharmacis relietū aliquod viscosum crassum q; retinet, tenui
 discusso. Et hac ratione in morbis articularibus calli proueniūt, & in renum vitio calculi. Quod
 si verò fluxio quæ phlegmonem committit, consistentia sit tenuis, & curatio eius siccantibus & ca-
 lescentibus pharmacis adhibeatur, nihil scirrhum relinquitur: immo refrigerantia vehemen-
 ter adstringentia q; scirrhos procreare solent, ac multos ex erysipelatis immodicè refrigeratis scir-
 rhosos tumores habere conspiciamus medicorū, qui eos sanandos susceperunt, inscitia. Prima er-
 go medicaminum, quæ phlegmonis, & quæ scirrhis medentur, differentia est ea, quam diximus.
 Altera, quæ propter dolorem inflāmatō coniunctum, non sustinet valens medicamentū affectū
 particulæ offerri. Quippe hæc cum dolore actionem edunt inflāmatō ob affectū statim dolen-
 tibus, eo q; mollissima remedia desiderantibus: at vehementia, præterq; q; dolores non soluunt
 vel mitigant, adhuc etiā exacuentia maiores phlegmonas concitant. Itaq; primus vsus in dolenti-
 bus

Lib. de liquido
 rum vsu a prin-
 cipio.

Abus phlegmonis est, qui medicamentis abundè humidis simul & modicè calidis administratur: Alter paulo crassioribus, siccantioribus q̄3 constar: Tertius relaxantibus nominatis, quæ non nulli malagmatis adscribunt. Sunt autem inter ea maximè emollientia sanè, quæ cerati speciem consistentia referunt, cum ex butyro, cera, adipibus, oleo q̄3 relaxante componuntur. Miscei iplis ælypi, resina, & picis parum, sicut & thus, & chalbanum: præterea non nihil iris illyrica. Porro inuenit Menecrates, ut ipse ait, & alij quidam ei attestatur, medicamentum *Dia chylon* i. ex succis, appellatum, phlegmonis non dū vehementer dolentibus esse remedio. Inscriptus est liber, quo phar macum tradidit, Autocrator hologrammatos. Certè Autocrator, quasi dicas Imperator, qm̄ huic dicatus est: hologramatos, quia sine notis, integris syllabis expressus est duo, tria, quatuor, quinque alius q̄3 quilibet numerus, vel resina, vel picis, vel alterius cuiuspiā medicaminis. Hoc autem fecit Menecrates, q̄ sæpe non modò nolentibus errorem cōmittere in scripturis contingit, sed etiam p inuidiam quibusdam volentibus, dum o literam θ faciunt, per mediam rotundam lineam alia per transversum ducta, verò literæ alia similiter transuersim apposita: sicut etiam vna linea ex γ & ρ derafa, literæ i characterem relinqui contingit. Pari modo ex multis literis, alijs appositione, alijs compositione, alijs ablatione, mutari notas seu characteres illos indicantes accidit. At nihilo plus

B Menecrates posteritati consuluit, cū ij, qui eius librum scribunt, appellationes numerorū non integris literis, sed characteribus eas significantibus, notent. Iurè igitur Damocratis libri medicamentorum metris descripti in pretio habiti sunt. Et, si omnia hunc in modum tradita forent, optimum nimirum esset. Quoniam verò non pauca probatorum medicaminū reliqua sunt, ideo alijs quoq̄ medicamentarijs libris indigemus, quibus variorum medicaminū compositiones nō nulli cōscripserunt. At verò medicamentum ex Succis à Menecrate inuentū, trimetris hīsce versibus Damocrates cum alijs quibusdam duobus similibus ei præpositis prodidit.

Dia Chylon Damocratis ex Menecrate.

C. A. P. 10.

Prafati igitur, quo tandem pacto vulnera

A phlegmone secura rectè glutines,
Posthac agemus, quomodo, cum phlegmone
Obsedit ipsa, curare queas commodè.

Cum musculo laeso, vel neruo quopiam,
Vel & propinqua quando ossi membranula
Puncta, diem post quartum continuus dolor,

C Et phlegmonæ, febres q̄3 cum symptomatis,
Multa vigilia fit delirio, & siti,
Ac siccitate linguæ, crescunt q̄3 omnia
Quotidie, & magis mala in peius ruunt.
Et faculenta sanies, tenuis, vulnera &
Rubra: insuper habent omnia hæc quum corpora,
Distensiones, phlegmonas, oedemata,
Turgores, varijs tum abstine cataplasmatīs
Quod mos iuuenibus est facere, quò phlegmonum
Status effugientes non dent calumnijs
Occasionem. At arti qui fidit suæ,
Hunc deuenire cum languentibus in metus
Oportet haud, expectantem, dum vicerit
Natura, vel fortuna quædam iuuerit.

D Ergo pares, quibus consului affectibus,
Quod & podagricis medicamentum conuenit,
Ægris in omni tempore impositum manens.
Promptam agilitatem nam intermissionibus
Id gignit corpori, citò nec permiserit
Callis, nec facile crebris angi insultibus.
Morbos initio prohibet increfcere,
Cogit autem vigentes mox decrefcere,
Nisi ad alia descendas facile medicamina.

Hunc pharmaci in modum fit compositio.

Lithargyri læuissimi chrysidis
Libras duas miscens, quatuor axungia
Valdè vetusta, fannosa, atq̄ crassissima,
Et non olentis, non nigra, non aspera:
Sic nanq̄ sumet pharmacum efficaciam.
Liquata diligenter olla axungia,
Membranulas salem q̄3 mox sustollito,

Quinta Classis.

† Ex antiquis
ita legendū. li-
bram autē vnā
ac vnc. iiii, olei
annosi crassis-
simi, & nō olē-
tis, non nigri,
non asperi.

IIII iij In vas

In vas aliud ipsam percolans amplius,
 Adiecto q̄z oleo, rursus cura, ferueat.
 Non omne pones oleum, sed partes duas:
 Tertia manebit in expedito condita,
 Si sit necessum iungere, ne absit longius.
 Vteris omnino per hyemem, cum inditum
 Medicamini crassum oleum longo tempore
 Euaserit: lithargyrum & feruentibus
 Inspergito, leui igne & assiduo coquas,
 Spatha mouens, præstiterit quam esse pineam.
 Cum ceperit mediocri coctum tempore
 Medicamen hoc emplastri spissitudinem,
 Nec non foetorem simili pacto pharmaci,
 Confestim ab igne caccabum deponito,
 Faciens per æstatem pauxillo durius,
 Sed hyeme mollius, non inquinans tamen.
 Moueto, adusque, quo modicè ita refrixerit,
 Sic deinde rursus manibus durioribus,
 Totum subactum ex olla transferri iube.
 Cum poscet vsus, iterum validè mollies,
 Molli q̄z diligenter pelliculæ illinens,
 Permagna super accommodabis splenia.
 Emplastrum verò hoc, si quando efficacius
 Desideres ad neruos crassos, musculos,
 Duras q̄z mammas, atq̄z articulos in super
 Tumentes fieri, pondo radicum indito
 Agrestis maluæ purarum ac recentium,
 Sectarum in partes digiti crassitudine
 Ac longitudine. In olla feruentibus
 At cum madorem totum, & vires pharmacum
 Ex igne deposuerit, colo traice
 Maluæ radículas: leuem & lithargyron
 Inspersum coque tum, vt prædixi: & reponito
 Simili modo rursus, eodem q̄z ipso vtitor.
 Ambas eodem tenere id virtutes ait
 Primus Menecrates inuentor pharmaco,
 Vir qui fuit habitu medicam erga artem optimo.
 Etenim recentia seruat citra phlegmonen
 Vulnera, eadem nec non diuisa glutino
 Iungere, quæ sunt & phlegmone obsessa vlcera
 Nimis: medicari & vulneratos musculos
 Sualit, sine quopiam alio, quæ succurrere
 Possunt cataplasmatibus, fomentibus, spongijs.
 Ad omnia, quæ facere confirmaui prius
 Medicamen ex lithargyro & axungia,
 Facit. Optimum verò pessum diutinis
 Recentibus q̄z vteri inflammationibus,
 Implere caua dilutum rosaceo
 Vel myrteo bono, & cicatricem addere.
 Summatim omne cataplasma, nec non pharmacum
 Extrinsecus quod ipsis superiniicitur,
 Superfluum esse dicit isto vtentibus.
 Profecto dignum scriptione est pharmacum,
 Cuius fides iam vel recepta est inuidis.
 Hunc in modum ipsum preparari dicitur.
 Septem olei libras æstiuis temporibus
 Indes (aliàs eius dimidium repperi)
 Pinguis, recentis pariter atq̄z axungie:
 Sed hyemæ, sicut tradit, inieceris nouem.
 At sex leuissimi modo lithargyri,
 Fœnigræci addit dimidium sextarij

Et seminis

- A** Et feminis tantundem combusti lini.
 Maluę q̄ agrestis pondo statuebat tria
 Radicis, etiamnum cui succus sit recens.
 Quaternis bis coquere ex aquę sextarijs,
 Ollę orificio amplo recenti fictili.
 Maluę radix purgata, concisa iridem
 Et tenuis & contusa, vt fuerit indita,
 Mox addito scenigraci elutum probę
 Lini q̄ semen. At cum succum emiserint
 Coctura, spissitudinem q̄ acceperint,
 Habeto succum, expresseris quem linteo.
 Trutina at quaternas quando expenderis libras
 Olei, commiscens, totum coque carbonibus.
 Cum vero tenues bullulę ex maioribus
 Crebrę, contentis cacabo prodiuerint,
B Lithargyrum læuē protinus aspergito,
 Igni q̄ non acri, sed assiduo coque,
 Frictus sit dum vsq̄ succus cum pinguedine.
 Erit ipsum medicamentum emplastrum melinum,
 Boni coloris, non inficiens, nec nimis
 Durum. Vetus hoc qui inuenit pharmacis,
 Vocabat ipsum iurę succi pharmacum.

Aliud.

- Et hoc eodem prodit genere pharmacum,
 Alijs licet misturis ipsum præparent.
 Affectus ad quos rettuli, prorsus facit.
 Summarim omnibus, & crudis, & quę concoqui,
 Facile mutari nequeuntq̄. Ingentia
 Et musculorum & membranarum vulnera
 Persanat, ipsorum nam facile subuenit
C Punctibus. Arthriticis iniectum item omnibus,
 Infestatos iam mitigabit diutino
 Dolore. Picis assumit quā siccissimę
 Libras duas, cerę q̄ totidem ponticę:
 Purę terebinthinę & liquidę libras duas,
 Manne q̄ thuris veri vnam pondo libram:
 At selibram, vel hac pauxillulo minus,
 Albi recentis butyri pinguiissimi,
 Reliqua diu liquentur, & quidem igne acri,
 Assiduę cernens, amplius ne pharmacum
 Colore inficiat digitis contritum tuis.
 Quibus peractis sublata ab igne ollula
 Mannam liquatis inde sic aspergito,
 Mouens medicamentum diu rudicula.
 Sic frigeratum, & mollium reponito.
D Huic copiosum q̄ & recens rosaceum
 Contemperans, caua atq̄ ad carnis indiga
 Adeo vlcera vtē, tendonum q̄ phlegmonas,
 Tum quę non facilię in pus mutantur candidum.

De Acopis, hoc est Lassitudinem tollentibus.

CAP. II.

Q Vid Acopa medicamenta promittant etiā nomen ipsorum ostendit. At *κόποις* id est lassitudines, Græci homines vocant affectus ex multo vehementi ve motu corporibus vel totis, vel particulis quę amplius laborarūt, oborientes. Porro molestę sunt dispositiones hæ, potissimum ijs qui agitantur, mouentur q̄: vehementiores autem, iā & conquiescentibus negocium facellunt. Caterum postea medicis in vsu fuit, & si non ad lassitudines medicamen ab ipsis sit compositum, sed vel ad dolorem diuturnum in alto corporis latentem, vel motum difficilē, vel sensum difficilē, vel particulę duritiā, vel tensionem, vel tumorem scirrholū, appellare si militer acopa & id genus omnia, modo humidam consistentiam acopis similem habeant: quę liquidis ceratis, cuiusmodi & in luxatis fracturis q̄ vtimur, est propinqua. Quippe talis consistentiæ humidissimum est, quod à iunioribus medicis Cerelæon appellatur: deinde illius acopi: post hos liquidorum ceratum, crassiore substantia præditum: mox ceratum tenerorum & molliū, vt

vocant:

^a Al. κεκαρ-
 μένου, i. mūda
 u.

vocat: postremo amolynta hoc est non inquinantia, similia his quæ propriè Epithemata dicuntur. E His succedit emplastrorum consistentiâ, quæ & ipsa in maioris minoris quæ ratione haud mediocrè obtinent differentiam. Quare nonnulli medicorum quædam nomine à sola consistentiâ ita desumpto, Ceratomalagmata nuncuparunt: medicamenta in quâ inter ea, quæ corpori imponuntur, non est quidem humida, duritiem verò tantam nec dum cōsecuta, quantâ emplastra possidēt. Cū igitur oēs citatæ differentiæ non medicamentorum viriū, sed consistentiæ formæ, sint indices, Acoporū appellatio quondam sanè medicaminum facultatem, postea consistentiâ significauit: huius quæ rei causa cum distinctionibus ea nominare coacti sunt, hoc quidem Acopon relaxās, illud emolliens, vel calefaciens, vel à dolore tollēdo anodynum, vel metasyneriticum appellātes: sicut est ad hunc quendam affectum conferre, verbi gratiā paralylin, coxarum laterum quæ dolorem, vel cōmuniter ad vniuersos dolores. Natium igitur est medicamen simplex omnium lassitudinum præsidium, oleum videlicet, quod & citra adiectionē nominatur, quoniā vetustis tēporibus solū quoque erat: posteri cicinum apud nos ei apposuerunt, in Ægypto. n. & hoc vetustum erat: & rursum post cicinum raphaninum, sinapinum, & sesaminum, alia quæ eius generis, quemadmodum etiam apud nos crininum id est ex lilio, mastichinum, & lentiscinum: quæ quæ his magis varia sunt, vel vsque ad vnguentra. Itaque neminem latere arbitror medicamēta Acopa apud veteres dicta, omnia liquidè consistentiæ esse necessario, quippe oleum solum lassitudines externis partibus ingruētes curat: in alto affligentes vehementiores quæ, cum iniectione aliquo laxante pharmaco mediocriter calefaciente, veluti chalbano, resina terebinthina, ad hanc colophoniam quadam nominata & fricta: quibus calidiores sunt abietina & strobilina: terebinthina vero larix paulo calore præcellit. Caterum id genus omnia relaxantibus oleis miscentur, quale est sabinum, iniectione interdum & cera. Iam vero acopon vnguen est in ijs, qui iam est in corpore alto dolent, & Medicamen ex semine abietis, chamæmeli, anethi, & floris populi nigra, quorum mox dicemus confecturam. Præterea fusinum, & gleucinum, & comagenū, ex acoporū vnguinū grege est, & quæ ex pinguedine & adipe cōponitur, suillo quidē moderatissimè relaxanti, gallinaceo autē his vehementius, & hoc adhuc magis anserino: at adeps leoninus & pardi validior est, ut iam vehementer calefaciat, eo quæ insigniter discutiat: in medio horū consistunt bubulus, caprinus, vulpis, & hyenæ. Hæc sanè vniuersa in genere sunt eorum, quæ propriè Acopa dicuntur, hoc inuicē discrimine variantia, quæ alia magis, alia minus, calefaciant. Quapropter non nulla genere toto acoporū vnguinum excidisse videbuntur, si in mollibus ea corporibus examines: et si durioribus, cuiusmodi agrestium sunt, vtilissima appareant: nam subinde etiam diximus dura corpora valentiora pharmaca sustinere, mollia verò & humida, veluti puerorum, mulierum, & eunuchorum, cuiusmodi medicaminum potentiā ferendo non esse. Insuper cuius notum est, & quæ vocantur Myracopa, ex acoporū cū vnguentis tēperatura fieri nihilo ceteris præstātiora, nili odoris suauitate. Quemadmodū igitur à vetustioribus longo vsu explorata scribere consueui, ita nunc quoque faciā ab Asclepiadis scriptis sumpto exordio.

Quæ Asclepiades in quarto Exteriorum Acopa & Myracopa conscripserit.

CAP. 12.

Acopon ad Lassitudinum molestias, benefacit Nervis condollescentibus. Hoc Themiso utebatur. Medicamen est vehementer bonum. Sampsuchi sextarium vnum, rorismarini sextarium vnum, fœnigraci sextarium vnum, cardamomi sextarii dimidium, brathyos sextarii dimidium, vini dulcis sextarios tres, olei venefrani trepondo, ceræ pondo duo. Arida in vino triduū macerari finito: quarto die oleū adijcere oportebit, atque ubi sedulo agitaueris, ac super prunā posueris, mouendo coquere: quā continuè efferbuerit, liquorē exprimere, cerā derasam huic adijcere, & rursus supra ignē coquere: ubi cera liquata fuerit, ab igne tolles, sines quæ refrigerari. Postea vitreo vase vel stāneo repones, ac vteris nūc solo, nūc vno vnguentorū admulto. *Aliud.* Sāpsuchi sextariū vnū, rorismarini sextarium vnum, fœnigraci sextarium vnū, lauri surculorū pondo vi, iunci floris pōdo 3 iij, vini veteris sextarios iij, olei dulcis sextarios iij: & radicis cucumeris agrestis, nardi celticæ, singulorū lib. s: ce-
Hræ libras iij. Præparato, ac vtitur, licet prædictum est. *Aliud medicamen confectum.* Benefacit Solutis, ac Tremulis. Item valet ad omnem Nervorum ex cōsensu dolorem. Vsus est Menius Rufus. Succurrit Podagricis, Arthriticis, Ischiadicis quæ, ut toto liberet affectu. Vsus eius est in internallis: at in accessionibus diluto medicamine vtimur. Sāpsuchi sextarios duos, fœnigraci sextariū vnū, rorismarini sextariū vnū & semissē, meliloti sextariū vnū, illyricæ pōdo vnū, cyperi pondo vnū, brathyos pōdo vnum, cachryos pondo vnū, cardamomi selibrā, iunci floris selibrā, calicæ selibrā, abrotoni selibrā, myrti fructus selibrā, lauri fructus selibrā. Omnibus contusis, ac in vas duplex vnguentariū confectus, vini tmolitis sextarios octo affundito: triduo madefieri finito: deinde olei sabini pōdo xvj, irini pōdo vnū, lentiscini pondo vnū, syriaci pondo vnū, gleucini pondo vnū, myrtei pōdo vnum, laurini pondo vnum immittito: igni superposita incoquito: deinde liquorē ex coctis expressum in vas aliud trāsfundito: rursus quæ vine decoctis incoquito, ceræ selibra adiecta, resinæ laricis lib. i, myrrhæ stactæ lib. vna. His liquatis vtitur, sicut prædictū est. *Aliud.* Sampsuchi pōdo ij, fœnigraci sextarios ij, rorismarini sextarios ii: brathyos pōdo ij, sextarios ii: meliloti pōdo ij, cyperi pōdo vnū, iridis macedonicæ pōdo vnū, cachryos pōdo vnū, cardamomi pōdo vnū, calami aromatici selibrā, iūci floris selibrā: calicæ fistulæ, costi, elelisphaci, singulorū selibrā: baccarū lauri selibrā, cucumeris agrestis radicis selibrā.

† In quibusdā
cod. græcis ma
nuscriptis hæc
verba non ad
sunt.

* *Al. amara-*
cini. *U. 2000*
nno *U. 2000*
legen lam.

† κατα τὴν
ταρταρὴν
συνέσταται, ἔστι
in impregnis,
ve transfulit
interpres. in
antiquis, με-
τα τὴν τ. i.
post medica-
menti confectio-
nem.

*Al. Aphrodite.

*Alışeri xxviii

• Aliter iii.

'Alter vi.

¹Aliter vi.

* Aliter i.

Al. rec. III.

nariorum

nariorum pondo duorum: guttæ ammoniaci, thuris, nitri, eruginis, singulorum denariorum pon E
do quatuor: vnguenti melini sextarii dimidium, cyprini pondo vncias tres, irini pondo vncias iij,
olei veteris sextarios tres, opopanacis pondo vncias tres, chalbanī pondo vncias quatuor, aceti
quod sufficit: preparatur, vt dictum est. *¶ Aliud ad Diuturnos affectus Valde generosum.* Cerae pōdo
minam vnam, olei veteris sextarios quatuor, terebinthinæ pondo libram vnam, myrrhæ pondo
vncias quatuor, thuris pondo vncias quatuor, opopanacis pōdo vncias quatuor: cucumeris agre
stis radicis, æruginis, nitri, singulorum pondo vncias quatuor: piperis albi pōdo vncias duas, chal
bani pondo vncias quatuor, medullæ ceruinæ pondo vncias quatuor, vnguenti cyprini pondo
vncias quatuor, irini vnguenti pondo vncias quatuor, vnguenti melini pondo vncias quatuor,
rutæ viridis furculorum pondo vncias tres, aceti quod satis est. Cucumeris agrestis radices, & ru
tam cum aceto incoquito, deinde liquorem expressum aridis iniecitō, leuigata accurate liquatis
excipito: ac interdum pharmaco syncero, interdum diluto vti tor. Hoc aut pro ratione subiectōrū
affectuum fiet. *¶ Aliud Balsi Pharmacum confectum.* Hoc ipso vsus, cum Nervorum resolutione prius tenta
retur, seruatus est. Olei myrtei pondo vncias quatuor, cyprini pōdo vncias quatuor, olei veteris pō
do libram s, attramenti futorj pondo libram s, cere pondo libram, terebinthinæ pondo libram s,
chalbanī pondo vncias tres, mannæ pōdo vncias quatuor, opopanacis pondo vncias duas, bryo
niæ radicis pōdo vncias quatuor, æruginis pondo vncias quatuor, aphronitri pondo vncias iij,
piperis pondo vncias duas, pyrethri pōdo vncias quatuor, adipis hædini pondo vncias sex, eu
phorbij pondo vncias quatuor, aceti quantum satis est. Bryoniam, pyrethrum, cum aceto inco
quito: deinde liquorem expressum, aridis q; probè leuigatis adiectū, liquatis excipito: vsus osten
tus est. *¶ Aliud ex Castorio, Solutis, & omni Diuturno malo auxiliatur.* Oculi pondo vncias tres, me
dullæ ceruinæ pōdo vncias quatuor, terebinthinæ pondo vncias tres, guttæ ammoniaci pondo
vncias duas, chalbanī pondo vncias duas, castorij pondo vncias duas, piperis albi pondo vncias
duas, euphorbij pondo vncias duas, adarces pondo vncias duas, nitri spumæ pondo vncias duas,
opopanacis pondo vncias duas, olei styracini pondo vnciam vnam, olei irini pondo vncias duas,
olei veteris heminam vnā, cere pondo libram s: componitur aliorum modo. *¶ Aliud, cuius vsu
Bajus longo tempore Paralyti infestatus, etiam de hoc morbo conualuit.* Olei myrtei, melini, cyprini, singu
lorum vncias quatuor: olei veteris selibram, cere pondo vnū, terebinthinæ selibram, chalbanī
vncias quinque, thuris vncias quatuor, opopanacis vncias duas, eruginis vncias duas, bryoniæ
radicis vncias quatuor, aphronitri vncias quatuor, piperis vncias duas, pyrethri vncias duas, adi
pis hædi vncias sex, euphorbij vnciam vnam, aceti quantum satis est. Cōpositio huiusmodi me G
dicaminum cōmunis est. *¶ Alia Collitio Podagricorum, ac Articulari morbo laborantium ex Sale con
fecta: toto affectu liberat.* Vsus eius est quotidie. Salis inquinati, hoc est ipsius terre pōdo, aluminis fissi
pondo, fecis vini Italici sextarium, lapidis alij floris vncias iij. Arida studiosè conterito, & fæce
addita accuratè leuigato: quibus olei veteris sextarium affundito, rursus q; condito, ac excepto vti
tor. In alijs scripturis melle attico excipitur. *¶ Aliud.* Salis inquinati pondo vncias tres, alumi
nis fissi pondo vncias tres, lapidis alij floris pondo vncias tres, thuris pondo semunciam, myrrhæ
pondo semunciam, fecis vini Italici sextarii dimidium: preparato vti prædiximus. *¶ Alia
Illitio Patrocli Cæsaris liberti composita: leniat toto affectu.* Vt edum est quotidie & manè ante balneū, & post
ipsum: ad hæc vesperti. Sumētes ex pharmaco, quod satis est, soluētes q; oportet pedes inungere, & citra cōtusionem
inspicare. Thuris denariorum pondo decem, piperis albi denariorum pondo decem, aphronitri de
nariorum pondo viij, myrrhæ denariorum pondo quatuor, guttæ ammoniaci denariorum pon
do sex, aceti quantum sufficit, olei cyprini heminam vnam s. Sicca contunduntur, cribro q; te
nuissimo incernuntur: reliqua aceto dissoluuntur, leuigantur q; deinde omnia simul miscentur,
& tritis cyprinum inditur: exceptis autem vtimur. *¶ Aliud.* Thuris denariorum pondo viij, myr
rhæ denariorum pondo viij guttæ ammoniaci denariorum pondo viij: aluminis fissilis, piperis H
albi, singulorum denariorum pōdo viij, nitri denariorum pōdo viij, aceti quod satis est, olei cypri
ni heminas duas, cere pondo selibram. Quæ liquari possunt, liquefiunt, & tritis adiciuntur.
¶ Aliud Neapolitæ Medicamentum, Ischiadicis, Arthriticis & Podagricis cōfectū: toto affectu liberat. Thu
ris, piperis albi, guttæ ammoniaci, myrrhæ, lapidis alij floris, aluminis fissi, nitri, centaurii succi, lin
gulum pōdo vncias duas: fecis vini Italici sextarium vnum: olei cyprini, laurini, myrtei, styraci
ni, cre, singulorum pondo libram vnam: terebinthinæ pōdo selibram, chalbanī pōdo vnciam, opo
panacis pōdo semunciam: liquata tritis miscentur. *¶ Aliud Domitio Nigrino compositum quod toto affe
ctu liberat.* Myrrhæ stactæ pōdo vncias duas, thuris pondo vncias duas, guttæ ammoniaci pondo
vnciam vnam: nitri rubri, vel salis inquinati, pōdo vncias duas: aluminis fissi, lapidis alij floris, co
locynthidis partis interioris, mandragoræ succi, mellis, euphorbij, singulorū pōdo vnc. ii: vnguē
ti crocini, melini, styracini, malabathrini, laurini, gleucini, hedychroi, amaracini, adipis vituli ma
rini, singulorum pondo vncias sex: huius penuria vtendum est medulla cerui vetustissima: cere
pōdo libram, chalbanī pōdo vnciam, terebinthinæ pōdo selibram, opopanacis pondo semunciam,
fecis vini Italici sextarium: preparato, quemadmodum suprā dictum est. Hac confectura vtemur
post podarcem, cui titulus est Pōpei pretiosa, Sabernio Valenti compositam, *¶ Medicamentum
ex Populo,*

* Aliters.

* Al'vncias vi.

* Al. vncias vi.

* Al. podagri
cam.* Infra pagin.
271. d. scriptū
est Aburnio.

A ex Populo. Benefacit Iſchiadicis, Arthriticis, Solutis, Tremulis. V aler item ad v ſum quotid vnum. Populi nigre ſurculorum pondo minam, cucumeris agreſtis radicis pondo libras quatuor, calic filitule pondo li bras duas, vnguenti crocini pondo libras duas, croci pondo vncias tres, vini odori ſextarios xij, olei ſabini ſextarios decem, ſampſuchi pondo libras quatuor, cere pondo libras quatuor. Sureau los populi diligenter contuſos in vaſe duplici vnguentario contineto: ac his ſampſuchū cucume ris q; radices in craſſiora fruſta conciſas adijcito, his vinum ſuperfundito. Omnia diebus nouem macerari ſinito: ſequenti die oleum adijciatur: & rursus accuratē tunſa igne non acri incoquito. Poſtea liquori expreſſo, ceram deraſam & medullam læuem factam indito, igni impoſita coqui to. Vbi liquata fuerint, ab igne tollens, crocinum adiungito, moueto q; cōtinuē. Crocinum vero læue factum, terreſtris teſtudinis ſanguine excipito, vt olei veteris craſſitudinem habeat. Porro iu gulatur teſtudo, iuxta clauiculam arundine vtrinq; tranſfixa. Liquata croco iniecta rursus tundi to, exceptis q; vtitor. Medicamentum toto affectu leuat. Multo aut preſtantius euadit, ſi teſtudi nis ſanguinē copioſum recipiat. **C** Aliud. V aler ad Moleſtias ex poſtfrictione, & Contuſiones ex ictibus. Populi nigre ſurculorum pondo minam, cucumeris agreſtis radicis pondo minas quatuor, calice filitule pondo libras duas, medullæ ceruinæ pondo libras duas, croci pondo libras tres, vini odo rati ſextarios duodecim, olei libras decem, ſampſuchi pōdo libras quatuor, ceræ libras quatuor: ſanguinis terreſtris teſtudinis quantumcunq; indideris, medicamētum nihil offeſdes, ſed potius iuuabis: præparatur modo prædictorum. **C** Aliud Acopon Dia Phrynon id eſt ex rubetis ranis. Hæc vſus vir Xyſticus id eſt iaculator, & Acopo & Malagmate, a toto affectu cōualuit. Cōſectio ita habet. Olei veteris ſabini pondo libras tres, cucumeris agreſtis radicis pondo libras tres, cere pōdo libras tres, apochymatis pondo libras tres, adipis ſuille veteris pondo libras tres: ranas rubetas magnas numero tres, vel ſi hæ non ſint paruas quinq;: medullæ ceruinæ pondo vncias tres, aphroni tri pondo vncias tres, ſulſuris viui pondo vncias tres, olei laurini pondo vncias tres, olei irini pō do vncias tres, vnguenti malabathrini pondo libram, ſampſuchi pondo libram. Radices in cra ſſiora fruſta ſectas, ac in oleum ſimul cum ſampſucho coniectas, ſupra prunas incoquito. Vbi radi ces inartuerint, humorem exprimito, radices quidem & ſampſuchum abijcito: ranas in ſportulam textam imponens, huius q; oras conſuens, & oleo expreſſo committens, rursus vaſ coopertū igni ſupraſonito: vbi iam ſatis magnum temporis ſpatium interceſſerit, vt rang illiquatæ fuerint, ſpor tula depoſita humore expreſſo abijciatur: reliquo oleo liquata indito, mouēs ſine requie: poſtre mo medullam & chalbanum adiungito: poſtquā ſoluta fuerint, ab igne tollito: ac modicē refrige rari permittens, arida tunſa, ac tenuiſſimo cribro ſecreta inſpergito, mouens aſſiduē: in mortariū demiffis, iterū q; tunſis, malabathrini vnguenti pondo & ſemiſſem adiungito, & rursus tundito: excepta vaſe plumbeo, vndiq; obturato, vt nihil perſpiret, ſeruato. Vteris medicamento interim vt malagmate, facta morbi inclinatione, interim vt enchriſmate. i. illinitione. Nam pharmaci, quod ſatis eſt, capientes, ſoluentes q; vnguento, vt cerati humidi ſpiſſitudinem habeat, vtimur. **C** Aliud Haliei conſectum Pharmacum, in quo Verſans Halieus, cum affectu adeo inſeſtaretur, vt corpore diſtorto eſſet, vſurpabat: & toto malo liberatus eſt. Data eſt conſectio Valerio Paulino. Habet aut in hūc modū. Olei ſabini libras iij: populi nigre ſurculorum libram, qui cū non adſint, ſampſucho vti oportet, duas ipſius partes adijcientes. Habet aut & ſampſuchi. cyprini, irini, maſtiches, ſingulorū libram: myr i hæ ſtactē ſelibrā, ceræ trientem, apochymatis libras iij, adipis ſuille pinguis libras iij, ſulſuris viui vnc. iij, nitrī ſpumę 3 iij, chalbani lib. iij, medullæ ceruinę 3 iij: teſtudinum terreſtrium x ſanguis immittendus eſt medicamini præparato, & iam trito. Porro conficiendum eſt, vt diximus. In vſu, medicamenti libram i. auferentes, opoballami 3 iij, vnguenti malabathrini 3 i, condimenti gratia illi indere cōuenit. Hoc in quotidianos vſus ita præparat. **C** Aliud id iſſum Haliei, a Valerio Pauli no aliter conſectum. Cere pondo libras iij, cucumeris agreſtis radicis pondo libras tres, apochymatis pondo libras tres, adipis ſuille pinguis pondo libras iij, olei ſabini pondo tria, cyprini pondo, ſuli ni pondo, crocini pondo, ſtactæ pondo ſelibrā, medullę ceruinę pondo & ſemiſſem, chalbani pondo & ſemiſſem, rubetas quinque: ſampſuchi, vel populi nigre ſurculorum, pondo tria: ſulſu ris ignem non experti pondo vnc. iij, aphronitri pondo 3 iij, teſtudinum plurium ſanguinem: cō ficito, quemadmodum prædixi. **C** Aliud Flauij Clementis conſectum pharmacum. Huius vſu nouimus ho mines toto corpore diſtortos a Podagra Chiragra q;, adeo conualuiſſe, vt citra noxam obambularent. Olei ſabini pondo xij, cucumeris agreſtis radicis pondo xii, cere pondo, terebinthine pondo, medullę ceruinę pondo, chalbani pondo, ranas numero ſex. Oleum diuidimus, & ſeorſum in eo ranas, ſeorſum item radices, incoquimus: deinde liquore percolato ad pharmaci conſectionem vtimur. Pharma cum autem acopi vſum præſtat, Valerio Paulino ſcripturæ hunc in modum adijciete: Sampsu chi pondo vnum & ſemis, vnguenti crocini pondo, malabathrini pondo, opoballami pōdo 3 iij, teſtudinum x ſanguinem, medullę ceruinæ pondo duo, chalbani pondo duo, adipis ſuille veteris pondo tria, apochymatis pondo, ceræ pondo tria ſemis, ſulſuris viui pondo vnciam, aphronitri pondo vnc. iij, rubetas tres, teſtudinum xv ſanguinem: & loco crocini ſyriaci pondo, ſampſuchi pondo ſemis ponitur: ſuperiorum modo præparatur. **C** Aliud Pompeij Sabini. Polyteles i. pretioſum, inſcribitur. Ab vno Valenti præparatū fuit. Vt eſt Iſchiadicis, Arthriticis, Podagricis, Tremulis, & ad omnem

† Adhuc in
atque, maſt
ches libram
vnum.

* Super 24.
2-3. ſcriptū
eſt Saccum.

Neruiorum

DE COMPOS. MEDIC.

† *Al. libram* *Nervorum dispositionem.* Compositio talis est. Sampsuchi pondo duo, scenigraci † pondo duo, me E
nam. liloti pondo, rorismarini pondo, brathyos pondo semis, cachryos pondo, cyperi pondo, abrotoni
Al. pondo s pondo, cardamomi pondo selibram baccarum lauri pōdo selibram, vini odorati sextarios xxiiij,
vnguēti irini pondo xv, cyprini pondo ij, styraci pondo ij, ceræ pondo duo, terebinthinæ pon-
do, chalbanī pondo vncias duas, opopanacis pondo vncias tres, guttæ ammoniaci purgatæ pon-
do vncias quatuor: piperis longi, nitri rubri, lapidis alij floris, colocynthidis partis interioris, alu-
minis filis. singulorum pondo 3 iij: thuris pondo 3 iij, centaurij pondo 3 iij: mandrogore suc-
ci, myrrhæ stactæ, mellis cocti, singulorum pondo 3 iij: rubetas ranas magnas numero vi, tellu-
dinum terrestrium x sanguinem. Medicamentum variè componitur. Aromatica sicca q3 crassius
contusa, vali q3 duplici vnguētario iniecta, vino superfuso, triduum macerari permitimus. Quar-
to die vino, quantū satis est, ablato guttam ammoniaci, thus, chalbanū, & opopanacē imbuimus,
& reliquos succos: hæc dissoluta læuigamus: quibus factis læuibus tunsa cribrata q3 alumen, ni-
trum rubrum, colocynthidem, lapidis alij florem, piper, & reliqua arida immicamus, simul q3 teri-
mus: his myrrham, stacten, & mel adijcimus. Sic iam preparatis, omnia liquida his, quæ in vino
macerant, affundito: igni superposita coquito, mouens continuè. Vbi bona vini pars cōsumpta
fuerit, humorem exprimito: cui ranas imponens, sicut supradictum est, incoquas, & tunc liquida E
adicias. Hæc liquata ab igne deponens, leuigatis indes, ac rursus tūdes: exceptus vitior. *Aliud*
Acopon Metasyneriticū. Auxiliatur Ischiadicis, Arthriticis, Solutis, & Tremulis. Vtebatur Iulius Secundus Diu-
tornos affectus demolitur, Capite dolentes aliuat. Adarces pondo 3 ij, myrrhæ stactæ pondo 3 ij, aphro-
nitri pondo 3 ij: euphorbij, opobalsami, singulorum pondo 3 ij: styracini vnguēti pondo. Ari-
da tunduntur, cribantur q3: his myrrha, stactæ, & opobalsamum adijciuntur: denuo tunsa styraci-
no excipiuntur. Ac interim per se, interim alteri milium vsui est medicamen. Cōctionem quoque
adiuuat. *Aliud Orphuro compositum, cuius vsu Thoracis affectu molesto, & iam Inueterato liberatus est.*
† *Al. pondo vn* Adarces pondo 3 ij, myrrhæ stactæ pondo 3 ij, aphronitri pondo 3 ij, euphorbij † pondo vnciæ
cias vi. dimidium, malabathrinū vnguēti pondo, foliati Romanis dicti pondo selibram, ceræ pondo 3
ij, opobalsami pondo 3 ij. Preparatur in modum prædictum. *Aliud Neapolitæ, quod Agrippa*
† *Aliter vi.* *compositum fuit.* Adarces ablatis arundinibus pondo 3 ij, euphorbij pondo 3 ij, aphronitri pon-
do 3 ij, stactæ pondo 3 ij, opobalsami pondo 3 ij, vnguēti malabathrini primi pondo, foliati pō-
do ac selibram, hedychoi pondo selibram, crocini pondo selibram, nardi asianæ consecratoriæ
primæ pondo selibram, ceræ pondo vncias tres: conficito vt priora. *Aliud Myracopon, hoc est ex*
Acopis & Vnguētis constans, Regum ad inueteratos affectus. Item cōctionem adiuuat. Calami aromatici, G
carpobalsami, amomi, cardamomi, iunci floris, calicæ rosæ spirātis, meliloti, sampsuchi, brathyos,
scenigraci, cyperi, nardi, piperis albi, singulorum pondo 3 ij: myrrhæ troglodyticæ pondo seli-
bram, euphorbij pondo selibram, † vini salerni sextarios xvi, vnguēti malabathrini primæ confe-
† *Additur in* ctionis pondo ij, nardi primæ compositionis pondo, foliati primi pondo, opobalsami pondo, cro-
atiquis. Adar cini pondo, styracini primi pondo, amygdalini pondo, comageni pondo, gleucini pōdo, irini pō-
ces selibra, m- do, hedychoi pondo ij, amaracini primi pondo ij. Coquitur vnguēti modo. Nimis quā bonū
† *tri selibram.* medicamentum est. Celeri Primipilario compositum est. Benefacit ischiadicis, arthriticis, solutis,
tremulis. Valet ad conuulsā, rupta q3: item ad scirrhosos viscerum affectus. Et cōcoctiones iuuat
ventriculi orificio & dorso illitum. *Aliud compositum Aquilæ Secundillæ.* Euphorbij, opobalsa-
mi, myrrhæ stactæ, singulorum pondo 3 ij: nitri spumæ pondo 3 iij, ceræ tantundem, vnguēti ma-
labathrini pondo, foliati pondo selibram, crocini pondo selibram, nardi vnguēti pōdo selibram,
hedychoi pondo selibrā, amaracini pōdo selibrā. Cōficitur, quo dixi modo. Hæc quidē sufficie-
bant. Etenim Asclepiades cōfecturas ipsorum & vsus accurate tradidit: Andromachus aut, vt so-
let, negligentius, neq3 ad quid eorum singula valeant, indicans, sed nobis conijciendum relinqēs:
nam ceu ad artis peritos scripturas semper conscripsit. Verum qm̄ nō nulla acopa inuicem sibi si- H
milis, in symmetris discrepant, ideo hæc quoq3 apposui, q̄ lectores ex ijs, quæ Asclepiades docuit,
de ijs simul ratiocinari queant, cuiusmodi acopa, quibus vitijs potissimum conducant. Dicemus
autem & nos, vbi vniuersales quosdam sermones de ipsis retulerimus, vnde accuratiore via ac ra-
tione ad eorundem vsus, qui mentem dicendis adhibebunt, peruenient.

Quæ Andromachus Acopa scripserit.

CAP 13.

A Copum viride Haliei. Ceræ, terebinthinæ, olei veteris, singulorum pondo & s: aphronitri
pondo 3 iij, chalbanī pondo 3 ij, æruginis rasæ pondo 3 ij, opopanacis pondo 3 vi, guttæ
ammoniaci pondo 3 iij, mannæ pondo vnc. iij, acetī pondo 3 ii, melini pondo 3 ii, cyprini pondo
vnc. ii, irini pondo vnc. ij, seui caprini pondo vnciam. *Aliud Acopum bonum.* Ceræ pōdo xvi,
aphronitri pondo 3 viij, baccas lauri numero viij, piperis albi denarij pondo vnus, crocomag-
matis quantū sufficit, medullæ ceruinæ denariūm pondo duūm, myrrhæ denarij pondo vnus, ce-
ræ denarij pondo vnus, vini rhodiaci denariūm, acetī parum aridis adijcitur. *Aliud Bassi Stoi-*
ci. Cucumeris agreitis radice pondo, & castorij pondo 3 ij, medullæ ceruinæ pondo 3 vi, olei ve-
teris pondo ij, ceræ pondo vnum, } aphronitri pondo 3 iij, baccarum lauri sextarios duos, ru-
tæ viridis fasciculum manipulem, rorismarini tantundem, olei sabini veteris pondo decem.

Radices

A Radices & herbe oleo incoquantur, deinde exprimuntur, postea liquata superfunduntur.

Aliud. Opopanacis pondo vnciam, resine pondo vnciam, resinae pitynæ pondo ij, ceræ pondo, gutta ammoniaci pondo vnc. vi, æsypii pondo 3 ij olei veteris sextarium vnum semis, salis floris pondo vncias duas. *Aliud.* Ceræ pondo, medullæ ceruinæ pondo 3 ij, vnguenti babylonij pondo, hedychroi pondo, stactæ pondo, malabathri pondo vnciam, nardi pondo vnciam, opobalsami pondo vnc. vi. In marina vel muria medullam liquato, liquabilia curata simul cōmittito, postremo opobalsamum: at si liquidum sit acopon, plus ceræ indito. *Aliud Acopon Quadrati.* Irini vnguenti vnciam, cyprini vnciam, laurini vnciam, olei veteris 3 iij, terebinthinæ vnciam, medullæ ceruinæ vnciam, 3 ceræ vnciam, 3 æsypii vnciam, piperis vnciam, nitri denarium pondo iij, sulfuris ignem non experti denarium pondo iij, pyrethri denarium pondo iij, mellis vnciam. Liquata sic miscentur. *Aliud Acopon fœtidum.* Terebinthinæ denarium pondo lvi, ceræ denarium pondo xxvij, æsypii, mellis, medullæ ceruinæ, guttæ ammoniaci, chalbani, aphronitri, interdū opopanacis, baccarum lauri, singulorum denarium pondo vi: olei veteris sextarium, vini heminas ij: quidam castorij denarium pondo trium addunt. *Aliud ex Sampsuchi.* Ceræ pondo, olei omphacini sextarios iij, sampsuchi sextarium, tœnigraci sextarium, vini veteris sextarios quatuor.

maluræ fasciculum: herbe mercurialis, quam Graci linozostin vocant, fasciculū: cucumeris agrellis radices. *Aliud, ut Antimachus.* Sampsuchi noui, rorismarini, aspalathi, brathyos id est herbe sabinae, fœnigraci, singulorum sextarios duos: ceræ pondo, vini veteris sextarios iij, gleucini sextarios iij. *Aliud a Philocle acceptum.* Olei decocti permultum, radicū cucumeris agrellis sextarios iij, ceræ minam, terebinthinæ minam, medullæ ceruinæ denarium pondo xxv, adipis anserini denarium pondo xxv, chalbani denarium pondo xij s, sampsuchi sextarium, rorismarini sextarium. Hæc postrema cum vino odorato tum læuigantur, tum miscentur: fit autem & malagma cera copiosiore iniecia. *Aliud Acopon confectum, ut Apuleius.* Aphronitri denarium pondo trium, piperis grana quadraginta, & longi totidem, thuris denarium pondo xvi. His tritis vini odori chij vel rhodij heminam superfundito, mellis denarios ix: deinde in patella liquato ceræ tyrrenicæ denarium pondo xij, seui taurini denarium pondo xlij. *Aliud, quod erat Aijchaliarte.* Crocomagmatis denarium pondo quatuor, medullæ ceruinæ denarium pondo xij, æsypii denarium pondo vi, adipis anserini vel suilli denarium pondo xij, terebinthinæ denarium pondo xij, irini denarios xvij: cyprini, gleucini, singulorum denarios xvij. Mel liquatur, deinde liccis admiscetur: ac ubi simul cum his quæ in mortario sunt, læuigaueris, in vsus condes. *Aliud Acopon Barbaricum, ex Euphorbio, ad Ischiadicis, alia q; multa.* Opopanacis pondo vnciam, tyrrenicæ pondo vnciam, terebinthinæ pondo 3 ij, chalbani pondo vnciam, guttæ ammoniaci pondo 3 ii, euphorbij pondo 3 ij, castorij pondo vnc. ij, piperis albi pondo 3 ij, medullæ ceruinæ pondo 3 iij, æsypii pondo 3 iij, limnestridis pondo vnciæ dimidium: styracini, laurini, amaracini, singulorum vncias tres: olei veteris sextarios ii, hedychroi vnc. vi: preparato vititor. Valet ad desperatos neruorum affectus, item propriè ad ischiadicis.

Aliud Acopon, quo Aruntius Aquila curatus est. Benefacit Coxendicum dolori, omni q; Neruorum distensionem. Opopanacis pondo 3 ij, 3 chalbani pondo vnc. i, terebinthinæ pondo 3 ij: piperis albi, castorij, vtriusq; pondo 3 ii: 3 æsypii pondo 3 iij, calicæ pondo vnc. iij, medullæ ceruinæ pondo vnc. iij, ceræ pondo, styracini pondo 3 vi, irini pondo vnc. vi, laurini pondo vnc. vi, olei veteris pondo, euphorbij pondo 3 ij, guttæ ammoniaci pondo 3 ij. Euphorbium cum paucō melle misceto. *Aliud Ghyt, ut Philoxenus grammaticus.* Ceræ pondo libras duas, guttæ ammoniaci pondo libram, chalbani pondo libram s, styracis pondo libram, bdellij pondo libram, myrrhæ pondo vnc. ij, thuris pondo 3 ix, æsypii attici pondo libram, propolis pondo libram, resine terebinthinæ pondo libram, olei veteris pondo ii: cyprini, irini vnguenti, amygdalini, singulorum pondo ij: syriaci pondo iij, opopanacis pondo: prepara. *Aliud Acopon Viride, ut Clemens Serapionus,*

De quo Mor. Æruginis rasæ pondo 3 vi, resine frictæ pondo vnc. quatuor, olei myrtei pondo, lentiscini pondo, olei veteris pondo, laurini pondo ij, syriaci pondo, gleucini pondo tria, adipis agnini vncias tres, ceræ pōtice libras iij, chalbani pondo libram: myrtei tenerorum foliorum, rutæ foliorum viridum, rorismarini viridis, lauri foliorum tenerorum, singulorum 3 vi: herbe saluæ scilicet libram. Viridia tunduntur, & oleis per noctem & diem macerantur, deinde cum liquabilibus incoquantur: cum ab igne deposueris, erugo inditur, percolata reponuntur. Facit ad omnem neruorum laborem. *Aliud Acopon calefaciens, ut Castus, ad Diuturnos affectus, & Convulsiones.* Pyllæci sextarium, syriaci vnguenti tantundem, iridis illyricæ parem modum, terebinthinæ pondo libram, axungie pondo libram, rasuræ naualis pondo vnciam. Incoquito, ruta viridi mouens. *Aliud Acopon Omnis Pexoris bonum.* Ceræ pondo libras vi, propolis pondo libras v, iridis illyricæ pondo libras quatuor, terebinthinæ pondo libras iij, opopanacis pondo libras ij olei veteris pondo iij, chalbani pondo libras duas, olei lentiscini pondo iij, myrtei pondo iij, guttæ ammoniaci pondo libram, medullæ ceruinæ pondo libras iij, æsypii pondo libras vi, baccarum lauri pondo libram, styracini pondo tria, amygdalini pondo tria, seui vitulini pondo libras iij, & leonini pondo libram semis, opobalsami pondo libram semis. Preparato diligenter. *Aliud Myracopon bonum.* Malabathri, hedychroi, nardi crocini, babylonij, singulorum scilicet: stactæ, opobalsami, ceræ, comageni, singulorum

* Aliter i.

* Aliter vj.

* Al. pondo ii.

* Aliter i.

* Al. pondo i s.

* Al. vi. m.

rum 3 vi: aloes 3 ij, mellis 3 ij: conficito. *¶ Aliud Myracopon, quo utor.* Cera candida pondo 3 ij, E
adipis anserini odoramentis conditi vnciam, seu i taurini odoramentis conditi vnciam, adipis leo-
nini odoramentis conditi 3 ij crocodili odoramentis conditi vnciam, medullae ceruinæ vnciam,
salis ammoniaci 3 ij, piperis albi 3 ij, thuris vnciam, cinnamomi 3 ij, aphronitri vnciam, iridis illy-
ricæ sextarios ij, nardi vnguenti sextarium, malabathri alexandrini sextarios ij, stactæ libras ij, syria
ci crocini libras ij, mellis libras iij, opoballami sextarium, comageni libras ij. Parato, uti nouisti.
¶ Aliud Myracopon. Cera tyrrhenicæ 3 vi, ammoniaci 3 iij, euphorbij libras iij, piperis albi 3 iij,
limnistridis 3 iij, magmatiss malabathri 3 vi, opobalsami pondo, malabathri pondo, stactes vnc.
vi, foliati vnc. vi, nardi pondo tria.

Gleucini, Mustei Vnguenti confectioes.

CAP. 14.

Gleucini confectio iuxta Andromachum. Post prædicta acopa Andromachus Gleucini confectio
nem descripsit, non male ipsa acopis vnguibus adiungens: quippe ad dolorem lassitudi-
nemq; tollendam longè est accommodatissimum. Traditur autem ab eo sic ad verbum. *¶ Gleu-
cini confectio, qua utor.* Myrrhæ pōdo libras ij, nardi Indicæ pōdo libras ij, costi pōdo libras ij, styra-
cis pōdo libram: bdellij, sampfuchi, xylobalsami, lentisci, cardamomi, spathæ, iridis illyricæ, my-
sios, asari, singulorum pōdo libras ij: meliloti pōdo libram, nardi gallicæ pōdo libram: aspal-
athi, calami, singulorum pōdo felibram: aristolochiæ longæ pōdo libram s, rorismarini seminis
sextarios ij, thuris pōdo libras iij, calicæ pōdo libras iij, scenigræci 1 sextarios ij, sphagni pōdo li-
bras ij, amomi pōdo 1 libras ij, corticis thuris pōdo libram, rosarum siccarum pōdo libras ij,
brathyos pōdo vncias vi, sceniculi pōdo libras ij, balsami fructus pōdo libras ij, croci pōdo
vncias tres, baccarum lauri pōdo libram, piperis albi pōdo libram, opobalsami vascula tria, ma-
labathri foliorum pōdo libras duas, nucleos pineos virides ij, rutæ viridis pōdo vncias ij, salis
ammoniaci denarium pōdo quatuor, nitri denarium pōdo quatuor, vini veteris sextarios ij,
musti boni ficulnia ij s, olei veteris libras v. Preparato diebus quadraginta. Hæc præfatus Andro-
machus non adhuc confectiois modum, sicut Crito, adiecit. Insuper quot libris Italicis ficule aut
sextarijs æstimet, silentio præterijt. *¶ Gleucini confectio Critonis in secundo de Ornatu.* Crito ad libri
calcem, Gleucini confecturam his verbis tradidit. *Gleucinum vim habet calefactoriam ac remitten-
tem. Vulnæ & Nervus presidium est.* Huius confectioes multæ sunt, quæ verò simplex dicitur, hunc
in modum habet. Musti recentis vuæ maroneæ metretam in vas stanneum coniectam, supra pru-
nas incoquito: ac ubi ter quater ve efferbuerit, metretam in ficule demissam, Soli exponito: olei
omphacini congios sex addito: lentisci minas sex, alij minæ dimidium: nardi, calami, aspalathi, lin-
gularum tantundem: palmæ elatæ minam, cyperi minam, cardamomi octauam minæ partem,
amomi tantundem, meliloti vncias v: sint autem omnia læuia. Deinde diebus viij commouens,
mustum q; repurgans vtitor. *¶ Gleucini confectio secundum Dioscoridem libro Primo de materia.* Scripsit
autem ille in hanc sententiam. Gleucinum simplex componitur ex oleo omphacino, lentisco, calamo,
nardo gallica, spatha, aspalatho, fertula campana, costo, & musto: vinaceis vasi, quod aromata vinū
& oleum continet, circumdatis xxx diebus: singulis bis mouetur: postea expressum vnguentum
reponitur. Vis eius est calefacere, emollire, & remittere. Benefacit rigoribus, neruorum vulnæ q;
affectibus: omni acopo efficacius est, ut quod emolliat. *¶ Gleucini confectio ut Heras.* Quoniam
Heras Gleucini confectioem luculentius ipsis iuxta finem operis medicamentarij edocuit, illius
quoque scripturam ad verbum ita subiuncturus sum. *¶ Olei Gleucini compositio ad Perfrictiones, &
Nervorum vitia potissimum.* Iunat Opisthoronicos, id est quibus ceruix reflexa est in posteriorem partem, nec in an-
teriolem inclinari potest, 1 oleo iriguo locis affectis iniecto: Olei venesrani pōdo ducenta octo, vini salerni
sextarios xxx, musti aminci sextarios centum octo, helenij pōdo duodecim, spathæ pōdo v, as-
palathi pōdo v, hedydari pōdo ij semis, artemisiæ maternæ pōdo ij semis, 1 cyperi pōdo ii: 1
myrrhæ pōdo tria, alij pōdo: piperis albi pōdo ij semis, splachni seu musci pōdo ij semis, xy-
lobalsami pōdo ij semis, aristolochiæ longæ pōdo vnum vncias tres, myrti sicæ foliorū 1 pon-
do vnc. i, rorismarini sicci vnc. v, foliorū lauri sicæ 1 vnc. 1 xij, bdellij pōdo ij semis, iridis illyricæ
pōdo ij semis, styracis pōdo vnum vncias tres, casia sicæ pōdo vnum vncias tres, ladani pon-
do vnum vncias tres, cardamomi pōdo vnum vncias tres, croci pōdo vnum vncias tres semis,
balsami fructus pōdo ij semis, thuris pōdo v, crocomagmatiss pōdo v, panacis pōdo vnum
vncias tres, calami aromatici pōdo v, asari pōdo ij semis, casia nigra pōdo ij semis, amomi vuæ
pōdo vnū vncias tres, iunci floris pōdo v, costi pōdo quinque vncias tres, nardi gallici pōdo
v: fertulæ campanæ, quæ melilotos dicitur, pōdo vnum 3 ij: sampfuchi pōdo vnum 3 iij, rosarū
siccarum pōdo vnum 3 iij, scenigræci 1 libra dimidium, opobalsami vascula v, malabathri vn-
guenti pōdo. Arida tunduntur, & rariore cribro incernuntur, vino q; macerantur: bdellium,
etsi aridum non fuerit, & ipsum contunditur: sin pingue extiterit, vino ipsum in pila contunden-
do soluitur. Hæc in vas exiguum vnguentarium stanneum q; coniecta, sed ita ut nihil expiret
opertum, diebus duodecim & toridem noctibus sinuntur: mustum verò cum his permaneat,
vuæ purè expressa ut nihil roris Contineat. Porro mustum in magnum ahenum condito, ut etiā
feruori ipsius locus sit: omnia in vino macerata adiiciuntur. Oleum vinum q; bis die spatha
vnguentaria

* Al. sextarios
duos.

† Al. sextariū
vnum.

† Al. libram
vnum.

* Aliter vi.

*

† Al. lana ir-
rigua.

* Aliter ccl.

† vliter x.

* Aliter vnum.

† Al. libras ii s

A vnguentaria ad horam agitantur: spatha vero accurate detergatur, ne id quod acidum factum ei adharet, medicamentum offendant, dum rursus immittitur. Præparetur autem vas operculo, & desuper per plusculis centonibus accurate circumdetur: vali sublit restis. Cum iam dies quindecim præterierint, ammoniacum, & ipsum amonium inditur, crassius cōtūsum. At triginta dies duplici vase supra prunas duas vel tres feruere vnguentum permittendū est, opobalsamo adiecto. Vase autē deposito ac modice refrigerato vnguentum defundere, reliqua sportulis, vt sunt calida, exprimere oportet: primū manibus, deinde prælo molientes aliquid vnguenti gratia, in ipsam malabathrū conijcere, si vnguentum in calente aqua fūsum immittamus: item spatha permouere, vt misceantur. Postea diem vnum linentes, vitreis valis aut testaceis gummi illitis reponemus.

*Quæ scripserit Heras
Acopa.*

CAP. 15.

A Copon ad Paralyticos, summatim ad omnem Dolorem. Rutæ viridis pondo, pulegij sicci pondo, cyperi pondo, nitri denarium pondo quinquaginta, scenigræci pondo, linozostis siccae pondo, marrubij pondo, rosmarini pondo, aristolochiæ pondo, amygdalarū amararum desquamatarum modij dimidium, iridis pōdo duo, terebinthine pondo duo, baccarū lauri pōdo duo, cucumeris agrestis radices pondo duo, guttæ ammoniaci pondo duo, brathyos libras duas, veratri albi libras sex, myrti viridis libras tres, lauri foliorū siccorū libras tres, ceræ pondo quatuor, bdellij pondo quatuor, vini heminas duas, albi vini congios duodecim, olei congios quatuor. Contulis crassius ijs, quæ tundi debent, aquam affundito: ac rursus tunsis vinum oleum q̄ adiūgito, & noctem sic esse finito. Sequenti die incoquito, dum hæc innatantia decocta fuerint, & oleum à coctis qualitate accepit. Hæc omnia fiunt pedetentim. Dein sublati, expressi q̄ recrementis, ceram, resinam, & bdellium adiūcito. *Aliud Viride Acopon ad Ischiadas, & Nervorum resolutionem. Hoc vsus sum in Phorte.* Resinæ terebinthinæ pondo, māne vncias quatuor, chalbanī vncias quatuor, aphronitri vncias quatuor, guttæ ammoniaci vncias quatuor, opopanacis vncias quatuor, seui caprini vncias sex, æruginis vncias quinq̄, cyprini heminam, irini heminam & semillem, melini 3 iij, syriaci vncias tres: piperis vncias tres, quidā vero vncias quatuor: olei veteris sesquiseptarium, adarces vnciam, aceti quod abunde sufficiat. Ærugine, opopanacem, & aphronitrū cum aceto terito, reliqua liquefacta superfundito. *Aliud Acopon ad Coxendicum dolores diutinos, Articulorum ligationem, & Paralytim, admodum est efficax.* Olei veteris & irini pondo sex, laurini pondo sex, pyracini pondo sex, ceræ pondo sex, terebinthine vncias duas, piperis vncias duas, euphorbij vncias duas, guttæ ammoniaci vncias tres, castorij vncias duas, } opopanacis vncias duas, chalbanī vncias duas, medullæ ceruinæ vnc. duas. Liquabilia vbi liquefeceris, siccis affūdito, ac vnitis vtitor. *Aliud Acopon ad Coxarum dolores, & in vniuersum ad Omnia.* Myrrhæ partem vnam, pyrethri partem ac dimidiam: læuigatis gleucinum affunditur, vt medicamentum strigmenti spissitudinem accipiat. Vbi opportunitas accidit, rhodino admisto vtitor.

* Al. Frontino.

Damocratis Acoporum compositiones.

CAP. 16.

Plurima medicina cum studiosi dicunt
Acoporum de vsu myracoporum q̄ omnium,
Hæc, quæ sient, dicam, & quo conferant modo,
Quæ ue ratione facias quodq̄ pharmacum.
Ergo & dolores nervorum hæc omnia leuant,
Carnis q̄ totius & musculū, quibus
Molestia lassitudo est, aut perfrictio,
D Aut his dolores similes sine patentibus
Causis oborientes. Quin lassitudini
Obnoxios, & frigori, haud faciles parant,
Siqui vsi prius ita prodeant ad munia
Vitæ necessaria obeunda. Corporis
Et carne partes pabulo indigas suo
Expleant, perunctis assumpto a cibo locis.
Qui conualescunt ægre, hos, & senes iuuant,
Ipsis per hyemem ad vesperam linentibus.
Quæ porro acopa faciunt, alio vobis loco
Exponam: & horum scripta subiungam ordine,
In quem vel vsu quoq̄ veniant, mox transigam.
Nunc referam, quo primum liceat facere modo.
Nanq̄ ammoniaci bis quinas quidem vncias,
Sine vncias mauult quis, seu pondus aliud,
Idem q̄ thuris, at quaternas chalbanī,

Quinta Classis.

m m m m m

Cerui

Cerui medullæ tantundem: parem modum E
 Simul attici q̄ deinde mittunt cœsypī,
 Terebinthinæ perlucidæ centum & bis duas,
 Mellis recentis optimi rursus decem,
 Æqualem tribuunt ponticæ ceræ modum,
 Adipis recentis anseris mollis decem,
 Vini falerni quinq; plures' ue heminas
 Aut pauciores paulo coniiciunt quoque,
 Iridem olei veteris bis viginti boni.
 Id autem graecolens haudquaquam commiseris,
 Sic nanq; fiet, gratum vt sit hoc vtentibus.
 Paratur sic. Maiusculo in mortario
 Simulatq; thus in grumulos confregeris
 Et ammoniacum, vinum affundens protinus,
 Atque hæc dimittens macerari mediocriter, F
 Terecochleari: in mellis spissitudinem
 Cogantur: addito mel vnā, atque cœsypum,
 Cerui medullam, quæ in pila cœnues.
 Ac deinde cera in ollula liquefcito,
 Oleum q̄ totum iuncta & adipe & chalbano:
 Terebinthinam q̄ colliquefacies, simul
 Superfundens cocuntibus in mortario:
 Sed spatula parua, vt refrigerant, permoue.
 Tum subigito tantisper hæc omnia manu,
 Vnita bene dum appareant, & humidi
 Mellis boni q̄ crassitudinem habuerint.
 In stanneum vas condito, vel buxeum,
 Hoc sedulo vsus optimo ceu pharmaco.
 Est commodissimum & mulieribus quoque,
 Quis est oborta phlegmone intus: vteri
 Duritiam abigit inde, simul & scirrhi metum, G
 Vbi pessulo vsurpare pharmacum iubet
 Litum vtero, quod indere hoc solent modo.
 Benefacit hoc idem ad dolores aurium
 Expertum vlc̄eris, sine q̄ fluxu graues.
 Sergetici autem mittis irini vnguinis
 Aut portionem quartam, aut trinam pharmaco,
 Calido q̄ lanam intinctam addis foraminī.
Alui.
 Et Viridacopon hoc efficax supra modum,
 Vnde & laborum exordijs facit magis
 Arthriticis, podagricis quoque efficax.
 Hoc ante balneas medicamento litis
 Et pedibus & neruis incrassatis simul,
 Plures fuisse sanatos conspeximus.
 Habet boni thuris pondo libram vnīcam, H
 Ammoniāci guttæ pondo libras duas,
 Aphronitri quā albissimi solum libram,
 Tantundem puriusculi attici cœsypī,
 Myrrhæ q̄ lectæ, & non lignosi chalbani,
 Opopanacis q̄ puri, singulūm omnium
 Octo vncias exacte perpendens libra:
 Quatuor euphorbiæ recentis vncias.
 His asperi pares dato limnesij,
 Hoc nominant adarcen vnguentarij
 In Italia institores, qui ue coeunt:
 Ceræ admodum bonæ duo pondo ponticæ:
 Terebinthinæ tot puræ, semissem insuper:
 Olei laurini, cyprini q̄, & gleucini,
 Sergetici, irini q̄ singulam libram:
 Olei veteris, recentis quoque lentiscini,

Cuiusq;

- A Cuiusq; rursum horum immittes pondo duo:
 Aceti modicum, quo misturas simplices
 Siccas abunde contritas contemperes
 Liquidis vnguibus, & ceræ, terebinthinæ,
 Ac chalbano, liquori panacis, & alijs.
 Vbi calida atq; adhuc feruentia in pilam
 Conieceris, cochleari & manibus contere
 Valenter. Vnita omnia sic reponito
 In pyxidem, qualem paulo prius.
 Audaciter inueteratis q; omnibus vtitor.

Aliud.

Et hoc parabile passim Acopon, item bonum.
 Potissimum per hyemem, si est profectio
 Vsqum, malo opportunis facile subuenit.

Quod puri recipit chalbani tres vncias,

- B Sed vnam opopanacis recentis vnciam,
 Floris salis tres, & quaternas cœsypî,
 Ammoniâci guttæ bonæ pondo libras
 Octo, atq; ceræ vnam, pityinæ torridæ
 Non foetidæ quaternas bis pone vncias,
 Olei sabini bis quaternas & libras,
 Plus hyeme ceu libram oportebit indere,
 Vini falerni nigri denis vncijs.

Sic præparato. Ammoniacum in mortario
 Contundito, atq; deinde vinum affundito,
 Paulisper macera, curiose conterens
 Florem salis: tunc etiam adijcias cœsypum,
 Terens tum, ac faciens mellis spissitudinem.
 Liquatis colliquantis, inde chalbanum,
 Tum opopanacem adiunctum, rursus liquefacito.

- C Leuigatis q; prius in pila, vnitis probe
 Super q; fundito, & manibus miscens ita
 Pharmacum adhuc feruens vitreo vase condito.

Aliud Myracopon.

Et hoc Myracopon optimorum inest gregi.
 Nam suauitatis plenum est. Iuuat insigniter
 Quos nominaui paulo affectus antea.

Stactæ bonæ receptat ternas vncias,
 Opobalsami tres, & mellis tres attici,
 Ceræ q; puræ ponticæ tres, vnguinis
 Crocini syriaci quoque quaternas vncias:
 Ammoniâci quàm albissimi, & leuis salis,
 Sextantem: candidæ & puræ terebinthinæ
 Vnam vnciam, atq; partem ipsius vnicam:

- * Et cinnamomi, nec non malabathri quoque,
 D Libram adde, & partem libræ tertiam insuper.
 Sin absit autem malabathrum forsan tibi,
 Adiunge nardi tantundem gangitidis:
 Istud bonis mediocriter vnguentum additur,
 Abunde medicamento sum vt nullum inuenis
 Aliud: vel irini tantum fergetici
 Vel cyziceni pondo, idem amaracini.
 His vteris, vbi non adsit quod diximus
 Malabathrum: arbitror moderatum myracopon
 Nihil minus sanè auxiliari vtentibus.

Sic confit. Accurate mel factum leue
 Adiunge, & stacten tritam modice misceas,
 Opobalsamum q;, ac rursum exacte contere.
 Cera, crocino, terebinthina pura duplo
 Iniectis vasi, prædicta liquefiant aqua
 In alia olla: liquefactis inde malabathrum.

Quinta Classis.

mmmm ij Et

Et cunctis vnitis modice, vt non ferueat,
 Duplex depone vas protinus ex caccabo.
 Exacte frigerato, & raso pharmaco,
 Et addito ijs, quæ iam prius recensui,
 Mortario læuigato rursus, dum probe
 Totum vniatur, fiat q̄ vnum phararmacum.
Voles at si ipsum reddere efficacius
 Ad vitia neruorum, simul ad diutina,
 Affectiones longas, tenfos musculos,
 Euphorbij recensitis etiamnum & boni
 Toti vncias duas admisceas ponderi,
 Cum sale q̄, melle q̄, insuper opobalsamo
 Eleuigatum ante, quo satis erit tempore.
 Ita q̄ omnia dicta in vnum cum redegeris,
 In pyxidem, vel vas vitreum, reponito.
 A balneis in vsum potius ducito.
 Cum Regi facies Principi ve myracopon,
 Perfacile vel para ignis sine commercio,
 Opobalsami collectis ternis vncijs,
 Et optimi malabathri quindecim vncias,
 Et cinnamomi tantundem boni cape,
 Ceræ q̄ non olentis candidissimæ
 Denarios decem. Sic ipsum præpara.
Partem malabathri tertiam, & ceram quoque
 Concisam multa in frusta minutissime,
 Argentea in tenui reconde phiala.
 Aqua calente plurimum, vt liquaueris,
 Ipsum refrigerato, deinde radito.
 Tum leuia iungens rursus in opobalsamo
 Et cinnamomo totum contere vniens,
 Quod restat iplis suprafundens malabathrum.
 Terens adunito manibus, sic condito
 Argenteum in vas aut vitreum, sed crassius:
 Sic nanq̄ tuto habebis semper phararmacum.
At si trientem libræ addas gangitidis
 Nardi, medicamen reddes longe suauius
 Præstantius q̄ ad vitia adhuc recentia
 Synchrisma, cinnamomon tibi ni suppetat,
 Minimo quidem peius habebis, vere at bonum,
 Alio omni & multo myracopo præstantius,
At si proponis id facere efficacius
 Ad quos retuli modo affectus, atlantici
 Euphorbij iunges quaternas vncias.
 Nam sic erit suaue, nec inefficax,
 Misturis licet confectum paucioribus.
 Cognouimus quosdam vti multis pinguibus,
 Medulla multa, & non nullis aromatis,
 Liqueoribus, vnguentis, & oleis aliquibus,
 Quibus contra vsus, cognoui esse talia
 Expertum boni, qui non probauerint
 Misturas, neq̄ naturas horum simplices.

Galeno

E

F

G

H



GALENO FALSO ASCRIPTVS LIBER DE PONDERIBVS ET MENSVRIS

Augustino Gadaldino Mutinensi interprete

ARGVMENTVM LIBRI

Ponderum ac Mensurarum doctrina ex varijs auctoribus
collecta traditur.

Quas res Pondere, quas Mensura metiamur.

CAP. I.



Ondus grauitate mensum iudicatur: mensura vasculi concauitate: vasculum quãtãtatis siccae vel humidæ est mensura: Ita vt tres eius, quam metimur, quantitatis differentia sint: vna ponderis: altera substantia siccae, quæ in cumulum possit aggregari: tertia humidæ. Cum vero q̃plura ac penè infinita sint tum pondera tum mensuræ pro regionibus ac consuetudinibus vtentium, nos sanè de eis, quæ maxime familiaria apud omnes sunt, sermonem habebimus.

De Notis Ponderum ac Mensurarum.

CAP. 2.

Sed quoniam non nulli non integris literis, sed per notas seu characteres, hæc ipsa pondera ac mensuras significant, satius vtique fuerit nos

vetères sectando, primum ipsas notas declarare.

Primum igitur χ littera, vbi superadditum α elementum habuerit, Chalcum idest areum (græce $\chi\alpha\lambda\kappa\omicron\upsilon\nu$) vt vides, significat, χ . Si vero suprapositum σ habuerit, Choa (græce $\chi\omicron\alpha$) significat, χ .

Si \dagger σ , Choenicen (græce $\chi\omicron\iota\nu\iota\kappa\alpha$) \dagger χ . Si η , Chemen (græce $\chi\eta\mu\epsilon\nu$) χ .

\dagger Aliter, ν .

κ vero litera, si quidem ϵ elementum sibi suprapositum habeat, lineam q̃ rectam, quæ per obliquum inferius cornu ipsius secet, Ceratium idest siliquam (græce $\kappa\epsilon\rho\acute{\alpha}\tau\iota\omicron\nu$) significat, κ . Si vero υ , Cyathum (græce $\kappa\upsilon\alpha\theta\omicron\nu$) κ . Si vero σ , Corylan idest heminam (græce $\kappa\omicron\tau\acute{\upsilon}\lambda\eta\nu$) κ .

\dagger Aliter, χ .

\dagger Linea vero aperistictos (idest quã nihil aliud circūsignat) recta, oblique omnino posita, Obolū (græce $\omicron\beta\omicron\lambda\omicron\nu$) significat \sim . Duæ vero aperistictæ, duos obolos \sim , qui Gramma idest scrupulum seu scriptulum (græce $\gamma\rho\acute{\alpha}\mu\mu\alpha$) faciunt: quod quidem à Γ cui prope sit ρ à linea quadam recta sectum indicatur, ρ .

\dagger Alio mō hic locus vertitur. Linea vero circūflexa, quam nihil aliud circūsignat, & quæ oīno per obliquum ponit, obolum significat \sim . Duæ vero circumflexæ & cxt ρ . Tu tamē cōfer cū græcis codicibus, in quib⁹ verba, vt nos vertim⁹, iacēt, quauis aliqui b⁹ hoc mō ρ & characteres notentur.

Duæ autem lineæ, quæ se in altera extremitate contingant, ita vt angulum ad similitudinem duorum cornuum ipsius κ ad rectam seu perpendicularem lineam spectantium faciant, Drachmā, quæ & Holca etiam cognominatur, significant, $<$. Proprie tamen Holca (græce $\omicron\lambda\kappa\eta$) ab antiquis per λ , quod in medio habeat σ , notabatur, λ .

Nam si id ipsum λ \dagger in medio habeat ι , Libram (græce $\lambda\iota\tau\rho\alpha\nu$) significat, λ . } Quidam etiā alij alteram ipsius λ lineam per obliquum altera linea secantes, Libram indicant, λ .

Γ vero intra suum ipsius angulum σ habens, Vnciam (græce $\omicron\upsilon\gamma\gamma\iota\alpha\nu$) significat, σ .

μ vero, si in medio habeat ν , Minā (græce $\mu\nu\alpha\nu$) significat, μ . Si υ , Mylitrū (græce $\mu\acute{\iota}\varsigma\rho\nu$) μ .

Si ϵ , Medimnum (græce $\mu\acute{\epsilon}\delta\iota\mu\nu\omicron\nu$) μ . Si σ , Modium (græce $\mu\acute{o}\delta\iota\omicron\nu$) μ .

τ autem, quod post se habeat ρ , ei q̃ incumbens υ , Tryblion (græce $\tau\rho\acute{\upsilon}\beta\lambda\iota\omicron\nu$) denotat, $\tau\rho$.

ξ autem si supra se ϵ habuerit, Xesten idest sextarium (græce $\xi\acute{\epsilon}\varsigma\tau\eta\nu$) significat, ξ . Si σ , Oxybaphum, idest Acetabulum (græce $\omicron\chi\acute{\upsilon}\beta\alpha\phi\omicron\nu$) ξ . Quidam vero per ξ à linea recta sectum, Xesten notant, ξ .

η vero suprapositum μ habens, Heminam (græce $\eta\mu\iota\nu\alpha\nu$) significat, η .

κ autem & ρ quibus μ incumbat, Ceramium idest amphoram (græce $\kappa\epsilon\rho\acute{\alpha}\mu\iota\omicron\nu$) significat, $\kappa\rho$.

De Ponderibus.

CAP. 3.

Mina Attica & Ægyptia habet vncias 16. Mina Romana vncias 20.

Libra vncias 12.

Quinta Classis.

mmmm iii

Vncia

DE PONDERIBVS

Vncia drachmas 8, quæ & Holcæ dicuntur.

Drachma habet siliquas 18. Alij vero dicunt scrupulos 3.

Scrupulus habet obolos 2.

Obolus siliquas 3.

Siliqua habet sitaria idest granula 4. Alij vero dicunt æreos 2, duas q̄ tertias alterius partes.

Nam obolus æreos 8 habet.

De Mensuris Humidorum.

CAP. 4.

Amphora Italica habet choas 8.

Chus idest congius, sextarios 6.

* A.P. Cotylas. Sextarius cochlearia 2: Quæ & Tryblia dicuntur. Alij dicunt Sextarium habere pondus libræ 1 & semissis.

Tryblium habet vncias 9.

Cochlearium idem pondus habet.

Cotyla siue Tryblium (nam idem sunt) habet mystra magna 3, acetabula 4.

Nam magnum Mystrum habet acetabulum 1 & tertiam ipsius partem.

Acetabulum habet sesquicyathum.

Cyathus habet chemas paruas, vel mystra parua 2.

Si vero etiam pondus mensurarum humidorum scire velis, permulta sanè sunt substantiarum humidarum iuxta inclinationem differentiae, vt in olei & vini & mellis exemplo dicemus. Mel igitur vino grauius est quarta parte amplius q̄ etiam decima: quod in vniuersum, proximum est tertia: habet enim eadem mellis ad vinum quantitas seu moles, totum vini pondus ac tertiam insuper ipsius partem. Oleo mel dimidia parte grauius est: habet enim totum olei p̄odus, ac dimidiam insuper ipsius partem. Vinum oleo nona parte excedit: nam totum olei p̄odus, & nonam insuper ipsius partem, continet. Maioris autem declarationis causa, in tabula, mensurarum pondera singillatim subiiciemus, cum pro comperto constitutum sit Oleum Vinum & Mel de omnibus sibi ordine subiectis enunciari.

	Olei	Vini	Mellis
Amphora Italica habet	Libras 72.	Libras 80.	Libras 108.
Chus habet	Libras 9.	Libras 10.	Libras 13. et semissē.
Sextarius habet	Vncias 18.	Vncias 20.	Vncias 27.
Cotyla habet	Vncias 9.	Vncias 10.	Vncias 13. et semissē. G
Mystrū magnū habet	Vncias 3.	Vncias 3 scrup. 8.	Vncias 4. et semissē.
Mystrū paruum habet	Drachmas 6.	Drach. 6 scrup. 2.	Drach. 9.
Acetabulum habet	Drachmas 18.	Vncias 2. scrup. 12.	Vncias 3. scrup. 9.
Cyathus habet	Drachmas 12.	Drach. 12. scrup. 4.	Vncias 2. drach. 2.

ORIBASIVS vero ex Adamantij sententia ait Sextariū Italicū Vini quidē mēsurā vncias 24, pondere libram 1 ac vncias 8 habere: Mellis vero mēsurā libras duas & dimidiam pendere.

De Mensuris Aridorum.

CAP. 5.

† A.P. 3. Artaba Ægyptia habet modios † 5.

Modius Ægyptius & Italicus habet Choénicas 8.

Choénix sextarios 2.

Sextarius semisextarios 2, quas & Heminas appellant.

* A.P. Mina. Hēmina habet cyathos 8.

Medimnus Atticus continet hemiecta idest semisexta 12.

Semisextum habet choénicas 4. Ita vt Medimnus pendat modios 6, choénicas 48, sextarios 96.

Harum mensurarum pondus exponere haud facile est, q̄ infinitæ ferè iuxta inclinationē sint materiarum diuersitates secundum artis medicæ doctrinam: quēadmodum ante nos, præsantes medici præceptores q̄ mirum in modum declararunt.

DE SIGNIS ET NOTIS PONDERVM ET MENSVRARVM CAP. 1.

Signorum ac notarum doctrina cum maxime necessaria sit, haud obiter sanè describenda est: Vt siqua in medicamentorum confectiōibus symbolice posita inuenerimus, pondus ab ipsis significatum statim cognoscamus.

μ igitur elementum, cui ν supra ponatur, μν̄αν idest Minam significat, μ̄.

* A.P. adiacens. λ subiectum habens ι, λῖτραν idest Libram denotat, *λ.

* Aliiter. λι. Γ subiectum ο habens, ονγγίαν idest Vnciam, significat, Γο.

Apud aliquos autem inueni ν supra se habens ο Vnciam significare, *ν.

μ supra positum habens ε, μέρος idest Partem significat, μ̄.

λ transuersè collocatum, si cornua ad dexteram vergentia habeat, Drachmam significat, < : si ad sinistram, Drachmæ dimidium, >.

S Romanum apud non nullos quidem Triobolum: apud nos vero cuiusq̄ ponderis dimidium significat,

A significat, S: Trāfuerse vero positū, si vniciū sit, Obolū significat, σ: si duo sint, duos obolos σ.
 C. græcum elementum intus conuersum, Semiobolum denotat, Ϟ.
 ξ suprapositum ε habens, ξενν, idest Sextarium, significat, ξ.
 κ suprapositum habens υ, Cyathum (græce κύαθον) significat, κ.
 λ ipso suprapositum, Holcam (græce ὀλκήν) quæ & drachma ē cognominatur, significat, λ.

De Ponderibus & Mensuris.

CAP. 2.

Mina Italica habet drachmas 144. Mina attica drachmas 122. Vt Mina Italica sit libra & semis: Atticis libra 1, vncia 3, drachmæ 4.

Vncia apud Atticos continet drachmas 7: apud Italos drachmas 8.

Drachma habet scrupulos 3.

Vncia autem continet scrupulos 24.

Libra continet vncias 12, † holcas 2. Holcam verò etiam Drachmam cognominant.

Scrupulus habet obolum 1, æreos 4.

Obolus habet æreos 6.

Æreus autem & Siliqua omnium ponderum sunt minima, ad æquandam trutinam impolita.

B Medimnus habet semisexta 12.

Semisextum habet choas 2, choenicas 4.

Chus habet choenicas 2, sextarios 8.

Vt Medimnus contineat choenicas 48, sextarios 192.

Choenix habet cotylas 8, sextarios 4.

Sextarius cotylas 2, cyathos 12.

Et hoc modo Græcorum plurimi res metiuntur.

Apud Italos autē Chus inuenitur, qui mēsurā quidē sextarios 6, cotylas 12 habeat: pondere vero aquæ pluuialis, quæ minime fallax est, drachmas 72. Choenix item Italica habet sextarios 3, cotylas 6. Et hoc pondus Atticis Tryblium nominatur.

Acetabulum est quarta pars cotylæ.

Habet autem sextarius pondere drachmas 120.

Proprie vero Græca Cotyla olei pendet libram 1. Sextarius librās 2. Cotyla Italica pendit olei vncias 8, vini vncias 9.

Scire autem oportet mensuras iuxta pondus pro materiæ diuersitate haud mediocriter variari.

C

EX LIBRIS CLEOPATRAE DE MVNDICIIS

De ponderibus & Mensuris.

Mina ponderis est nomen: habet autem vncias 16, drachmas 128, scrupulos 384, obolos 768, thermos, id est lupinos 1152, siliquas 2304, æreos 6144. Attica mina habet vncias 12 & semisē, drachmas 100, scrupulos 300, obolos 600, lupinos 900, siliquas 1800, æreos 4800. Prolemaica mina habet vncias 18, drachmas 144, scrupulos 432, obolos 864, lupinos 1296, siliquas 2592, æreos 6912.

Libra habet vncias 12, drachmas 96, scrupulos 288, obolos 576, lupinos 864, siliquas 1728, æreos 4608.

Vncia habet drachmas 8, scrupulos 24, obolos 48, lupinos 72, siliquas 144, æreos 384. Vocatur etiam alio nomine Tetrastaron Italicon, id est Quatruffis Italicus.

Drachma habet scrupulos 3, obolos 6, lupinos 9, siliquas 18, æreos 48.

Denarius Italicus habet drachmam 1.

Drachma etiam alia æquiuoce vocatur ipsa Ægyptiaca, quæ est sexta pars drachmæ Atticæ, obolū 1 pendens.

D Scrupulus habet obolos 2, lupinos 3, siliquas 6, æreos 16.

Obolus habet lupinum & semissem, siliquas 3, æreos 8.

Semiobolus habet siliquam & semissem, æreos 4.

Lupinus habet siliquas 2, æreos 5 & tertiam alterius partem.

Semiobolus vero Atticus alterius semioboli quatuor quintas habet.

Siliqua habet atticos æreos 2, & duas tertias partes alterius ærei.

Æreus habet semioboli quartam partem. {Ita vt semiobolus 4 æreos pendat.}

Stater pendit drachmas 4. Appellant q̄ ipsum Tetradrachmon.

Dupondium etiam similiter pendit drachmas 4.

Nux etiam regia pendit drachmas 4.

Cheme magna habet drachmas 3. Parua drachmas 2.

Assarium id est As, habet drachmas 2.

Cochlearium habet drachmam 1.

Cyathus habet drachmas 10, siue vnciam 1 & quartam eius partem, scrupulos 30, obolos 60, lupinos 90, siliquas 180, æreos 480. Est autem Cyathus sexta pars cotyles.

Cotyle, mensura quidem habet cyathos 6: pondere vero drachmas 60, vncias 7 & semissem, scrupulos

* Vel hic legendū 124, vel inferiorius drach. 2, vbi drach. 4 legitur.

† Al. legitur, Di drachma habet holcas, id ē drachmas 2.

DE PONDERIBVS

scrupulos 180, obolos 360, lupinos 540, filiquas 1080, æreos 2880. E
 Tryblion eandem capitum mensuram quā cotyle, nā mensura capit cyathos 6, pondere drachmas 60.
 Sextarius mensura habet cotylē 8, pondere drachmas 120. Vocatur autem sextarius apud Ægyptios laion.
 Acetabulum mensura habet cotyles quartam partem, cyathum 1 & semis: pondere drachmas 15.
 Concha magna eandem seruat mensuram, quam Acetabulum: nam mensura habet sesquicyathū, pondere drachmas 15. Concha minor, mensura habet semicyathum, pondere drachmas 5.
 Mystrum magnum habet sextadecimam cotyles partem, quæ sunt drachmæ 3 cum dimidia & quarta. Mystrum minus habet cotyles vigesimam secundam partem: quæ sunt drachmæ 2, scrupuli 2, & filiqua 1, & vndecima fere ipsius pars.
 Chus hēt mensura quidem cotylas atticas 12, sextarios 6, chœnicas 4: pondere drach. 720.
 Choenix habet mensura quidem cotylas 3 pondere vero drachmas 180.
 In Georgicis inueni Cotylam trium esse quartarum sextertij.
 Choa vero sextariorum 9, cotylarum 12.
 Amphorea sextariorum 36, cotylarum 48.
 Metreten sextariorum 72, cotylarum 96. F
 Medimnum sextariorum 108, cotylarum 144.
 Metretes vero apud Syros habet sextarios † 6, apud Italos vero 120.
 Tryblion & Acetabulum similiter habent cotyles quartam partem.
 Cyathus cotyles sextam partem.

ALITER DE EISDEM

Mina Attica habet vncias 12. Alia mina habet vncias 15. Ptolemaica vncias 18.
 Libra habet vncias 12.
 Vncia habet drachmas 8.
 Drachma habet scrupulos 3.
 Scrupulus habet obolos 2.
 Obolus habet lupinum 1 & semissem.
 Lupinus habet filiquas 2 æreos † 5.
 Semiobolus Atticus alterius semioboli quatuor quintas habet.
 Siliqua habet æreos atticos 2 & duas alterius quintas.
 Æreus habet semioboli quartam partem. Vt 4 obolos pendat semiobolus.
 Stater pendit drachmas 4. Vocant autem & ipsum Tetradrachmon. G
 Dupondium habet drachmas 4.
 Nux regia similiter pendit drachmas 4.
 Cheme magna habet drachmas 3. Cheme parua drachmas 2.
 As habet drachmas 2.
 Cochlearium habet drachmam 1.

DE MENSURIS ET PONDERIBVS VETERINARIORVM

Vncia habet drachmas † 8.
 Drachma habet scrupulos 3, obolos 6.
 Cotyle habet vncias 12, acetabula 2.
 Acetabulum facit vncias 6.
 Acetabulum habet cyathos 3.
 Cyathus habet mystra 4.
 Mystrum facit vnciam dimidium.
 Mystrum habet cochlearia 2. H
 Cochlearium est mystri dimidium.
 Cochlearium facit scrupulos 6.
 Scrupulus facit obolum.
 Sicilium (i. Sicilicus) † vnciam dimidium.
 {Cyathus mystra 4. Vt sit mystrum vnciam dimidium.}
 {Mystrum facit cochlearia 2. Vt cochlearium sit vnciam quarta pars.}
 Mina habet vncias 15, holcas 112 & semissem.
 Libra habet holcas 90.
 Denarius habet scrupulos 4.

De Mensuris Humidorum.

Amphora Italica habet choas 8.
 Chus habet sextarios 6.
 Sextarius habet cotylas 2, quæ & Trybliā dicuntur.
 Cotyle eandem mensuram continet, quam tryblion.
 Tryblium habet mystra magna 3, acetabula vero 4.

Mystrum

† Alias 90.

† Si hic quicquid legēdū, iterius paulo post, duos & semis, legere oportebit: si ibi, duos & duas quintas, hic quatuor, & quatuor quartas alterius, ē legendum. Forte tñ, si superiora considerentur, hic legendum esset, quinque & tertiā alterius, inferius vero duos & duas alterius tertias.
 † Al. 7 & semis.

† Al. vncia i. & semissem.

† Al. Tribana

A Mystrum magnum habet acetabulum 1, & tertiam partem.

Acetabulum habet sesquicyathum.

Cyathus habet chemas paruas vel mystra parua 2.

	<i>Olei</i>	<i>Vini</i>	<i>Mellis</i>
Amphora Italica habet	Libr. 72.	Libr. 80.	Libr. 108.
Chus.	Libr. 9.	Libr. 10.	Libr. 13. & semissem.
Sextarius	Vnc. 18.	Vnc. 20.	Vnc. 27.
Cotyle	Vnc. 9.	Vnc. 10.	Vnc. 13. & semissem.
Mystrum magnum	Vnc. 3.	Vnc. 3. scrup. 8.	Vnc. 4. & semissem.
Mystrum paruum	Drach. 6.	Drach. 6. scrup. 2.	Drach. 9.
Acetabulum	Drach. 18.	Drach. 20.	Vnc. 3. drach. 3.
Cyathus	Vnc. 1. & semissem.	Drach. 13. scrup. 1.	Drach. 18.

DIOSCORIDAE DE MENSVRIS ET PONDERIBVS.

E Go charissime de ponderibus & mēsuris ita perscrutatus sum, quippe à minimis initium sum
pli, & ad Minam vsq; multiplicando ascendi.

B

De Ponderibus.

CAP. 1.

Siliqua idem pondus habet, quod Æreus.

Obolus habet æreos 3. Vnde semiobolus habet pondere siliquam & semissem.

Scrupulus pendit obolos 2, id est æreos 6.

Drachma, & quæ Holce dicitur, pendit scrupulos 3, id est obolos 6.

Vnciam habet drachmas 8, scrupulos 24.

Libra habet vncias 12, drachmas 96.

Mina secundum medendi vsum pendit vncias 16, id est holcas 128. Mina Italica pendit vncias 18, id est sesquilibram, drachmas autem 144. Mina Alexandrina pendit vncias 20, id est holcas 160.

De Mensuris Humidorum.

Vini.

CAP. 2.

1 Amphora habet libras 80.

2 Vrna libras 40.

3 Chus id est congius libras 10.

4 Semicongius libras 5.

5 Sextarius habet libram 1, vncias 8.

6 Hemina, id est cotyla, vncias 10.

7 Quartarius habet vncias 5.

8 Acetabulum, id est quarta pars cotyles, æquat vncias 2 & semissem.

9 Cyathus, id est sexta pars cotyles, æquat vnciam 1 & semissem, & scrupulos 4.

10 Cheme est cyathi quarta pars, æquat drachmas 3, scrupulum 1.

Aquæ.

Idem est pondus aquæ & acetii.

Idem est pondus aquæ & acetii.

Aliunt autem, si aqua pluuiæ vas repleatur, minime fal-

lax, sed iustissimum pondus esse.

1 Amphora habet libras 72.

2 Vrna habet libras 36.

3 Congius habet libras 9.

4 Semicongius habet libras 4 & semissem.

5 Sextarius habet vncias 18.

6 Hemina, quæ & cotyle est, habet vncias 9.

7 Quartarius habet vncias 4 & semissem.

8 Acetabulum, quod est cotyles quarta pars, habet vncias 2 & drachmas 2.

9 Cyathus, qui est sexta pars cotyles, habet vnciam 1 & semissem.

10 Cheme, cyathi quarta pars, habet drachmas 3.

Mellis.

1 Amphora habet libras † 108.

2 Vrna habet libras † 54.

3 Congius habet libras † 13 & semissem. }

4 Semicongius habet libras † 6 & vncias 9.

5 Sextarius habet libras 2 & † vncias 3.

6 Hemina habet libram 1 & vnciam 1 & semissem.

7 Quartarius habet vncias 6 & drachmas 6.

8 Acetabulum habet vncias 3 drachmas q; † 3.

9 Cyathus habet vncias 2 & drachmas † 2.

10 Cheme, quæ est cyathi quarta pars, habet † drachmas 4 & obolos 3. }

† Aliter 120.

† Aliter 60.

† Aliter 15.

† Al. 7 & semissem.

† Al. semissem.

† Aliter 2.

† Al. semissem.

† Aliter drac. 5.

De Mensuris.

DE PONDERIB. ET MENSVRIS.

DE MENSVRIS, ET PONDERIBVS

E

Medimnus habet semifexta 12.
 Semifextum habet choas 2.
 Chus habet chœnicas 4.
 Chœnix habet cotylas atticæ 3: pondere autem, holcas 180.
 Chus mensura quidem est cotylarum atticarum 12: pondere vero pendit drachmas 720.
 Sextarius mensura quidem est cotylarum 2: pondere vero drachmas 120 pendit.
 Cotyle habet cyathos 6: pondere vero drachmas 6. Cotylam Atticæ etiam Trybliū appellant.
 Acetabulum, mensura est cotyles quarta pars, quod est sesquicyathus: pondere vero hēt drach. 15.
 Cyathus est drachmarum 10.
 Cheme est cyathi quarta pars, drachmæ 2 & semis.
 Mystrum magnum est cotyles decima octaua pars: pendit drachmas 3 & scrupulum 1. Mystrum paruum est cotyles vigesima quarta pars: pendit drachmas 2 & semissem. Mystrum iustissimum habet scrupulos 3.
 Cochlearium habet scrupulos 3.
 Nucis basilicæ seu regiæ magnitudo pendit drachmas 7.
 Nucis ponticæ magnitudo pendit drachmam 1.
 Balani idest glandis magnitudo pendit drachmæ dimidium.
 Fabæ ægyptiæ magnitudo pendit obolum & semissem.
 Orobi magnitudo pendit areos 2.

F

DE SIGNIS PONDERVM AC MENSVRARVM

Cum expositio signorum pondera ac mensuras indicantium necessaria sit, eam hic descripsi, ut si quando ea ipsa signa in medicamentis notata inueneris, haudquaquam errare possis.
 ν itaq; quod supra μ sit positum, μνᾶν, idest minam, significat, μ.
 λ quando subiectum habeat 1, λίτραν id est libram, significat, λ.
 Γ quod o supra vel infra se habeat, ογγίαν id est vnciam, significat, Γ. Γ.
 Apud non nullos autem inueni ν, quod supra se o habeat, vnciam significare, ν.
 μ quod supra se habeat ε, μέρος, id est partem, significat, μ.
 λ obliquum, si ad dexteram cornua vergentia habeat, drachmam significat < : si ad sinistram, drachmæ dimidium, >.
 S Romanum, apud aliquos quidem triobolum: apud nos vero cuiusq; ponderis dimidium si-
 gnificat, S. Si autem transuerse ponatur, obolum 1 significat, S.

FINIS QVINTAE CLASSIS


AAAAA BBBBB CCCCC DDDDD EEEEE FFFFF GGGGG HHHHH IIIII
 KKKKK LLLLL MMMMM NNNNN OOOOO PPPPP QQQQQ RRRRR
 SSSS S TTTTT VVVVV XXXXX YYYYY ZZZZZ

aaaaa bbbbb ccccc ddddd eeeee fffff ggggg hhhhh iiiii kkkkk lllll mmmmm

Omnes sunt quaterniones præter mmmmm ternionem.



VENETIIS APVD HAEREDES
 LVCAE ANTONI IVNCTAE.



OPATRIS INSO MNIVM



GALENI DOCTORES



HEPATICI COGNITIO

GALENI

LIBRORVM

SEXTA CLASSIS

DE CVCVRBITVLIS, SCARIFICATIO-
nibus, Hirudinibus, & Phlebotomia
přecipuo artis remedio tradit.

QVARTA HAC NOSTRA EDITIONE,

*non parum ornatior prodiens, pluribus casti-
gationibus ad antiquorum exemplarium
Græcorum fidem locupletata.*

*Locis etiam Hippocratis nunc primum
in margine signatis.*

Librorum index versa pagina continetur.

Ὅργανα εἰς κλινικὴν.



VENETIIS APVD IVNTAS M D LXV.



CRISIS PRÆCOGNITIO



AMANTIS DIGNOTIO



PALESTRIÆ CVRATIO



DISCEPTATIO CVM ALEXANDRO HABITA

QVÆ SEXTA CLASSE HABENTVR

- GALENI De Hirudinibus, Reuulsione, Cucurbitula, cutis Conci-
sione siue Scarificatione, Ferdinando Balamio Siculo interprete. 2
- ORIBASII De Cucurbitulis, Scarificatione, Hirudinibus, Deriuatione,
& Reuulsione sermo ex septimo & octauo Medicinalium collectionū
ad Iulianum Imperatorem libro. Augustino Gadaldino Mutinensi in-
terprete. 3
- De Venæ sectione aduersus Erasistratum liber, Iosepho Teſtandro Craco-
uiensi interprete. 5
- De Venæ sectione aduersus Erasistratæos, qui Romæ degebant, eodem Io-
sepho Teſtandro interprete. 9
- De Curandi ratione per sanguinis missionem liber, Theodorico Gauda-
no interprete. 19

Hos libros omnes multis in locis emendauit Augustinus Gadaldinus ad vetustis-
simorum exemplarium græcorum veritatem.



GALENI

DE HIRVDINIBVS REVVLSIONE CUCURBITVLA CVTIS CONCISSIONE SIVE SCARIFICATIONE

Ferdinando Balamio Siculo interprete.

De Hirudinibus.

CAP. 1.



C

Non nulli capras hīrudines includunt, easq; ad multiplicem vsum accommodant. Vbi enim, mitescunt, carni facile admouentur. Quæ vero modo captæ fuerint, per diem adseruandæ, exiguoq; sanguine alēdæ sunt: atq; ita fit, vt quicquid virulentum in se continent, exprimatur. Quando autem ijs vti opus est, ea pars, cui hīrudines admouendæ sunt, nitro prius fricanda, inungendaq; vnguibus, ue ipsi scalpēda est, hoc enim pacto auidius adhærescūt. Oportet etiam eas ipsas in tepidam aquam, quæ vase lato & mundo contineatur, infundere, mox spongia cōprehensas mucore & sordibus manu purgare, atq; ita admouere. Vbi vero admotæ fuerint, ne ea pars, cui inhæserint, frigescat, oleum tepidum superinfundes. Si autem manibus aut pedibus affigendæ sunt, in aquam, in quam hīrudines iniectæ sint, manus aut pedes immergantur. Si vero non firmiter hæserint, earum caudæ forcipe incidendæ sunt: nanque ita, vbi sanguis effluxerit, ab attrahendo non desistunt, donec cinere aut sale os earum aspergatur. Postquam autem exciderint, quod relinqui ab eis venenosum solet, cucurbitula exhauriendum est: vel si id minime fiet, fotu per spongiā adhibito vtendum est. Quod si inde cruentæ lachrymulæ adhuc effluxerint, farinam cyminumq; admoueto, lanamq; subinde modo dico madentem oleo alligato. Cæterum si manare sanguis non desinat, linteolum aceto madefactum, gallam, ue combustam, vel spongiā in liquidam antea picem immissam mox crematam, imponito. Illud quoque compertum habere oportet, hīrudines ipsas sanguinem illum attrahere, qui carni adiunctus est, non qui in imo corpore continetur. Earum vero vsus pro cucurbitulis esse solet. Præterea remouendæ tunc sunt, cum dimidiam sanguinis partem extraxerint. Quin etiā prohibendum, nec permittendum est, vt sanguis eousq; effluat, quousq; sit satis: siquidem pars ipsa frigescit, tum ob ipsas hīrudines, quæ natura frigide sunt, tum etiam ob acrem ambientem.

De Reuulsione.

CAP. 2.

Vehementes humorum fluxiones reuulsione cohibendæ sunt, ne nimium confertæ alioquin prorumpant. Sunt autem remedia, quæ per reuulsionem adhibentur, huiusmodi. In pectus videlicet, aut ventrem, siquid defluxerit, ad manus retrahendum est: vomitus vero ad partes inferiores: veluti quæ ex acribus clysteribus fluxiones proueniunt, vomitus contra præsidio auertuntur. His vero ambabus fluxionibus, cum superior atque vnà inferior venter vrgetur, eas ad vrinam si doremq; reuocabimus: vrinæ autem fluxum ad sudorem aluiq; deiectiones. Est quoque auxilium quod ex diuersis contrarijsq; partibus reuellit cucurbitula, si mammis proxima apponatur. Item adiumento est, si vbi nimium sanguinis fluit e naribus, aut per loca muliebria immodici effluxus labuntur, præcordijs (hypochondria Græci dicunt) affigatur. Acris quoq; medicamenta linib; admota, eas fluxiones retrahunt, quibus caput aut viscera vexant. Atq; vt summa rem cōplectar, ita reuulsio efficit: In humoribus videlicet partes superiores petentibus ad inferiores: & contra, si inferiores petant partes, ad superiores: & contra, ad dexteram similiter partem aut læuam, item in anteriorem aut posteriorem, siquid defluxerit, ad oppositas partes reuulsio facienda est.

Sexta Classis.

aaaaa ij De

* καλποισ. i. s. n. i. b. s. sed i. g. e. d. u. est καλποισ. i. ar. n. i. b. s.

DE CUCURB. ET SCARIF.

De Cucurbitula.

CAP. 3. E

Cucurbitula purgatis prius corporibus vtilis quidem, sed in repletis (quæ plethorica Græci vocant) pratermittenda sunt. Idemq; initio phlegmones si vel cerebrum ea, vel cerebri membranas, vel alias corporis partes occupauerit, seruandum est, eisq; abstinentum: sed cum nihil amplius adfluxerit, totumq; exinanierimus corpus, & vsus rei inflammatis vel mouenda vel amolenda, vel extrorsum abstrahenda tulerit, illas adhibebimus. In his quoq; affectionibus dum gignuntur, non quidem membris ipsis quæ cœperint laborare, sed eis quæ laborantibus coniuncta fuerint, reuulsionis gratia cucurbitula sunt imponenda. Initio vero quæ repercutiendi vim habeant, sunt adhibenda. Cucurbitula exhaurire materiam, dolores soluere, phlegmonem minuere, inflationes discutere, appetitiam cibi excitare, imbecillo vetriculo vires restituere, animi deliquia leuare, si quæ profundas partes fluxiones infestent eas transferre & siccare, sanguinis eruptiones prohibere, & quicquid mensrua vitauerit attrahere, hisq; alluciationem prestare potest.

De Scarificatione, seu Cntis Concisione.

CAP. 4.

Corporis partes scarificandæ sunt, quæ phlegmone vel duritie vrgentur, quæ vel tēsa fuerint, vel dolore aliquo affliguntur: quæq; fluxionibus vexantur, vbi ex ipsa fluxiones delierint: aut cum acrem materiam subelle viderimus, seu vis aliqua venenosa extrinsecus illata fuerit: praterea si ab altera ad alteram partem deducere materiam volumus, sicuti scarificatis cruribus, affectio capiti medetur: Siq; exuberans materia in corpore minuenda est, atq; ob id potissimū exuberantia illa oriatur, q̃ materia ipsa quæ emitti solet supprimatur, scarificatione vitur: quemadmodum sanguinis profusionibus suppressis (quas hæmorrhoidas Græci appellant) crura ipsa loca quædem prius, vel spongia calido fomento adhibito, scarificantur. Eodem nanque anno venam frequenter incidere, minime quidem rationi contentaneum arbitramur: quando quidem cum larga sanguinis copia vitalis quoque spiritus emittitur: quo sanè absumpto, crebrius quidem moles vniuersa frigeat, tum animales functiones omnes deteriores redduntur. Quamobrem ab ignobilioribus membris vtpote a cruribus sanguis educendus est. Vtilis quoque oculis scarificatio est, quos diutina fluxiones infestant: tum capitis vitis: item particulis quæ pectori dorso ue adiunctæ sunt. Prodest praterea compactæ materiæ, anginaq;.

Post hæc quatuor capita, Oribasium de eisdem rebus ex Galeno et alijs præstantissimis medicis tractantem impresimus, ut plenior in primis de hac re cognitionem habeas: postea ut consideres, an supra scripta capita priuatim scripserit Galenus an magis ab aliquo ex Galeni & aliorum libris, vel ex ipso potius Oribasio excerpta sint.

Oribasii

ORIBASII

DE CUCURBITVLIS SCARIFICATIONE

*Hirudinibus, Deriuatione, & Reuulsione sermo, in septimo & octauo
Medicinalium collectionum ad Iulianum
Imperatorem libro.*

Augustino Gadaldino Mutinensi interprete.

EX LIBRO SEPTIMO

De Cucurbitula ex libris Galeni.

CAP. 15.



lentibus est vtendum.

Vcurbitulæ euacuatis prius corporibus vtilis sunt: nam vbi ea plethorica sunt, cucurbitulis nō vtimur. Eadem etiā ratione vbi cerebrum eiusq; membranæ phlegmone vexantur, cucurbitulis in affectuū principijs non vtimur, quemadmodū sanē nec in vlla alia particula phlegmone laborante: sed vbi tum nihil amplius influxerit, tum totum corpus ante vacuauerimus, vsusq; postularit, vt aliquid eorum quæ in parte phlegmone laborante continentur, moueamus, eruiamusq;, vel ad exteriora extrahamus. Dum vero affectus etiamnum fiunt, cucurbitula minime membris laborare incipientibus, sed ijs quæ his continuata sunt, reuulsione causa imponenda est: in principio vero repel-

De Cucurbitula ex libris Antylli, ex Secundo sermone de Euacuantibus remedijs.

CAP. 16.

CIN mediocri dolore & in similibus, leuibus vtimur cucurbitulis, quæ scilicet sine incisione aptantur. At in quibus roborare volumus, vehementibus est vtendum. In oppletis vero particulis, quemadmodum & in ijs quæ à corrupta vexantur materia, cum incisione admouemus. Oportet autem, antequam eas adhibeamus, ventrem iam emollitum fuisse: aut omnino nullam instantium excrementorum adesse suspicionem: ac prius comedissem omnino, vel aquam prius bibissem à leui nutrimento & iam subducto. Maxime vero oportet, si sanguinem detrahare volumus, vt primo pars parum fricetur: Postea si ruborem sufficientem tumoremq; à cucurbitula acquisierit, scarificetur: sin minus, tertio cucurbitula affigi debet, quousq; pars tum tumefacta tum rubefacta fuerit. Quod si ne tunc quidem tumor nec rubor effectus fuerit, spongijs partes fouendæ sunt, quousque coloris euadant phoeniceæ, & ita deinceps scarificandæ. At si quis præcognouerit corpora non rubefactū iri, veluti in ijs qui pingue habent abdomen, vel in refrigeratis, & in mulieribus quæ pepererint: ante cucurbitularum applicationem cataplasma illis partibus imponendum est. Aliquando vero tumor validus à leuibus cucurbitulis fit, & colore liuidior: ac postquam scarificatus fuerit, parum vel nihil effluit: cum sanguis crassior existat, & quod antestat, sit carnosius. Itaq; in his, spongijs præcipue fouendus est locus, ac tenuis beneq; fluxilis reddendus est sanguis. Cauendum porro est ne prope mammæ cucurbitulæ ponantur: incidentes enim interdum in ipsas mammæ, & admodum tumescentes, difficilem reddunt auulsionem. Sanè applicandæ sunt cucurbitulæ cum modico igne: nam si vehementes apponantur, vapore inflammantes contendentesq; corpora, nihil efflatu dignum attrahunt. Notum autem est ita figurandas esse partes, vt sanguis in ipsis nō immoretur, crassescensq; impedimento sit effluxioni: sed vt pronus ad inferiora effluat. Post ablationem vero cucurbitularum, si quod extractum fuerit, satis sit, partes postea curabimus: si non satis, cucurbitulas denuo apponemus. In capite cum multo igne haud sunt infingendæ: vehementer enim attrahunt, difficulterq; auelluntur: Quæ vero cum mediocri igne affiguntur, id quod opus est, perficiunt. Quæ autem non possunt nisi difficulter auelli, spongijs ex calida eas circumplecti oportet: sic enim remittuntur: quod si ne ita quoque remittantur, perforare ipsas oportet.

De Cucurbitularum Differentia à Materia & à Figura sumpta.

CVcurbitularum differentia à materia sumptæ tres sunt, Vitreæ, Corneæ, Æneæ. Nam Argenteas, quia vehementius igniuntur, reijcimus. Ænearum frequentior est vsus. Vti etiam vitreis possemus, in quibus sanguinis vacuationem considerare opus est. Corneis item in capite vti

Sexta Classis.

aaaaa iij possemus,

possemus, vbi æneas difficulter atulsum iri existimaremus: & in timidis quoq; qui ob flammam E perterrefcunt. Quod ad figuram spectat, differentia præcipue in æneis est. Sane elatiores, humilibus magis attrahunt. Humiliores in capite magis accommodantur: propterea quod haud vehementer trahunt. Quæ plana habent labra, corporibus latitudinem habentibus: quæ refinita, cūruis & gracilibus commodius affiguntur. Quæ acutum os habent, illis competunt, in quibus scarificatione quidem non utimur, sed per leuium cucurbitularum applicationem vehementer attrahere volumus, labrorum acuitate ad attractionis violentiam conferente. Quæ obtusa habent labra, tum in alijs membris tum præcipue in capite vtiliter applicantur. Ænearum cucurbitularum tractus, quemadmodum etiam vitrearum, per ignem fit: Cornearum, sine igne: quippe in extremo sunt perforata, cumq; aptantur, vehementer per foramen exuctæ, attrahunt: statim vero foramen digito cerâue clauditur.

De Cucurbitulis ex libris Herodoti, ex Sermonibus de Euacuantibus remedijs.

CAP. 17.

Cucurbitula vero potest capitis materiam vacuare, dolorem soluere, phlegmonem minuere, Inflationes discutere, appetētiā reuocare, imbecillum exolutumq; stomachum roborare, animi defectiones remouere, quæ in profundo sunt ad superficiem transferre, fluxiones exiccare, sanguinis eruptiones cohibere, mensium circuitus suggerere, φθοροποιούς δυνάμεις id est facultates corruptionem inducentes (seu medicamenta mortifera) attrahere, rigoribus finem imponere, circuitus soluere, à cataphora id est inclinatione in somnum excitare, somnos conciliare, grauitates alleuare. Hæ & his similes sunt cucurbitularum facultates.

De Scarificatione ex Antyllo, ex Sermonibus de Euacuantibus remedijs.

CAP. 18.

Scarificamus partes corporis aut phlegmone laborantes, aut induratas, aut distentas, aut dolore affectas, aut fluxionibus vexatas nimirum vbi iam fluxio cōstitit, aut acri materia imbutas, aut vbi virulenta facultas extrinsecus inciderit: aut cum ex alijs partibus in aliam, traducere materiam studemus, sicuti crura affecto capite scarificamus: aut vbi materiam in corpore redundantem minuere volumus, præcipueq; cum redundantia fiat ob materiæ, quæ de more expelli sit solita, suppreSSIONem, sicuti suppreSSis hæmorrhoidibus, crura scarificamus. Sane pars quæ scarificari debet, prius, si fieri potest, lauanda est: sin minus, aqua tepida quousq; rubefiat, est perfundenda, aut spongijs fouenda, aut Soli igni ue exponenda, ac postea scarificanda. Infigendæ vero sunt incisiones, **G** in cruribus quidem & abdomine, κατ' ἐυθυωρίαν { id est per rectitudinem seu longitudinem: } in thorace item & dorso ac ceruice, eodem modo: in capite vero secundum capillorum positionem: in fronte autem per transversum. Magnitudine porro inter sese sint æquales incisiones: & quæ inter eas sunt interualla, inter sese æqualia sint: Scarificationisq; initium ab infernis partibus sumatur: ita enim sanguis ad superficiarias partes decurrens, eam quæ scarificari deinceps debet, non obscurabit. Incisionum situs per æquales inter se ordines fiat. Scarificatio autem non κατὰ πλὴν id est per percussione, sed κατὰ συρμόν id est per tractum, est faciendā: hoc enim pacto citra dolorem fiet.

De Scarificatione ex Libris Apollonii.

CAP. 19.

Cum ad corroborationem & ad quācunque corporis conseruationem, plurimam etiam haberi vtilitatem ex sanguine compererim, qui sæpissime quidem quantitate abundat, aliquando vero secundum qualitatem in deterius vertitur: opinatus sum, vbi ipse abundat, imminutionem: vbi corruptus est, alterationem conuenire. Ac venas quidem sæpius eodem anno secare, non esse idoneum arbitratus sum: considerans quod vnā cum sanguine multus etiam spiritus vitalis excernitur: dum autem hic absumitur frequentius, vniuersa corporis moles refrigeratur, & omnia naturalia opera deteriora euadunt. Iudicaui ergo ab ignobilissimis particulis, sicuti à cruribus, sanguinis extractionem per scarificationē fieri debere: quantitate habitu hominis vsuq; mensurata: Optimum vero præsidium est tum ad conseruationem sanitatis, tum ad eiusdem recuperationem, vbi ipsa ab aliquibus eiusmodi causis euersa fuerit. Nemo tamen me phlebotomiam explodere suspicetur. Ego enim illam in maximis periculosisq; affectibus non omitto: in quibus sanè abunde affatimq; sanguinem effundere est opus: nā proinde ut affectus sunt vehementes, ita quoque affatim vacuationes faciendæ sunt. Plethoram autem commodatam, quæ aliquid mali factura sit, ac iam euerſionem in morbosum statum attingat, tibia quæ scarificationibus vexata fuerit, innoxiamq; totam quam volumus sanguinis illigationem reddiderit, citra validam totius molis commotionem, soluit: sæpius enim plus quam par sit, congregatur. Quare tardandum non est, ut, quotiescunque plenitudinis signa inciderint, ipsam eo quo ostendimus pacto, tollamus. Præstat enim tum viscera, tum quæ in toto corpore sunt vasa, intemperate non repleti, neque distendi, sed potius in terminata quadam relaxatione esse, ut naturalis spiritus expedite permeare possit.

Scarifi-

A Scarificationem Mulieribus quæ probe non purgantur, Alijsq; multis Affectibus prodesse. *CAP. 20.*

Mulieribus, quibus purgatio prospere non succedit, scarificatio mire auxiliatur: nam quod illic ad debitam purgationem deerat, id hac via vacuatur. Statutum autem purgationis tempus expectare oportet: tuncq; cum nihil vel parum sponte fluxerit, eatenus detrahente hoc auxilio uti debemus, quatenus vltus postularit. Quibusdã et mulieribus, ut de more mensuræ purgationes iterum redirent, hoc auxilium maxime contulit: nam continua in inferiores partes sanguinis educio, inclinationem viamq; ipsi prebet. Ego sanè etiam valde ætate prouectas, quibus iam pridem nihil menstrui ferebatur, ubi aliqua corporea molestia conflictarentur, hac curatione subleuo. Hac enim mulierum propria est, multumq; habet efficaciæ: quippe quæ naturalis excretionis modum imitetur. Porro vacuare interdum soleo scalpello, idest smilio: interdum autem per hirudinum applicationem. Oculos etiam cum quidam ex longo tempore ab incessabili fluxione infectos haberet, hoc p̄sidio sanatus est: cum nos alijs etiam localibus circa oculos auxilijs vti fuissēmus, totiusq; corporis curam gessimus. Senex etiã quidam, cum prius quidem longis, postea vero brevioribus interiectis intervallis, à strangulosa circa pulmonem angustia vexaretur, simili modo curatus est. Ea autem quãtitas, quæ conueniens esse videbitur, vacuanda est, refrigeratioq; est vitanda: ac nutrimentum deinceps commodatum, tribus quatuorue diebus est exhibendum. Et sanè dum pestilentia vehemens Asiam deprehendisset, multosq; perdidisset, meq; etiã morbus attigisset: secunda morbi die, remissione feb̄ris facta, crus scarificaui, duasq; ferè sanguinis libras detraxi: hacq; de causa periculum vitavi. Pleriq; igitur etiam alijs hoc p̄sidio vti, superstitēs evasere, erant enim plenitudinis signa. Illiq; p̄cipue seruabantur, qui sanguinem copiosum exhauriebant. Igitur capitis etiam dolores moderatos, tonsillarum phlegmonas, ac dolores circa latera recentes tollit: nam diuturniora eiusmodi symptomata localibus scarificationibus dissolvimus. Quin & qui à morbo resumuntur, difficulterq; in naturalem sibi ipsis habitudinem redeunt, nihil æque sanè ad conuenientem bonamq; renutritionem ducit, ut sanguinis per scarificationem exhaustio.

De Hirudinibus ex libris Antilli, ex Sermonibus de Evasuantibus remedijs. CAP. 21.

Quidam captas hirudines diu includunt, eisq; ad multa utuntur. Ipsæ. n. si mitescunt, carnem facile apprehendunt: cum aliæ non nunquã peregrine sese gerant. Oportet autem has quidem, cum primum eas experti fuerimus, applicare: quæ vero nuper captæ sunt, per dies servare, exiguum sanguinis pro nutrimento iniicientes: ita enim earum virulentia exprimitur. **C** Sanè cum eis uti volumus, locus cui hirudines applicandæ sunt, nitro prius fricandus, ac sanguine alicuius animalis, vel argilla liquida inungendus, vel fouendus, vel vnguibus scalpendus: promptius enim apprehendent. Oportet autem ipsas in aquam tepidam & purã, in vase lato magniq; contentã, iniicere, ut commotæ virus abijciant: mox ubi eas spongia comprehenderimus, ac mucorem lentoremq; purgauerimus, manu admovebimus. Atq; ubi omnes inhæserint, oleum tepidum particulæ, ne refrigescat, infundemus. At si manibus pedibusve affigendæ sunt, pars ipsa in aquam, ubi hirudines sunt, iniicienda est. Quod si etiã eis ubi repletæ fuerint, uti oportuerit, vel quia paucæ hirudines p̄sto adfuerint, vel quia paucæ apprehēderint, earũ caudas forpice incidere oportet: nam effluente sanguine trahere nunq̄ desinunt, quousq; nos salem vel nitrum vel cinerem, earum osculis inspergamus. Vbi vero exciderint, si locus cucurbitulam capere potuerit, per eius appositionem, virus extrahere debemus: valide nimirum ipsam apponentes, celeriterq; auellentes: si vero cucurbitulæ capax non fuerit, spongijs fouendus is est. Ceterũ si corpora vel oscula sublachryment, mannam, vel cuminum, vel farinam inspergito, ac postea lanam paucò madentem oleo conuoluito: sin sanguis etiam inde erumpat, linteola, vel araneorum telas ex aceto iniicito: aut gallam vltam, aut spongiã nouã pice liquida intinctã, ac vltam, imposito: deinde charitula aceto irrigata imponenda ac illiganda est. Hæc autem in partibus quæ in medio corpore habentur, sunt peragenda. Nam in artubus (quæ græce *μῆλα*. i. membra longa hoc est brachia & crura appellantur) solum etiam vinculum pro cohibendo sanguine satis est: quod postero die solvendum est: siq; sanguis constitit, abijciendum: si vero nõ constitit, eisdem utendum est. Scire autem oportet hirudines non ex profundo sanguinem trahere, sed eum qui carnibus adiacet, exugere. Eas autem in illis vsurpamus hominibus, qui scarificationum incisiones pertimescunt: vel in illis partibus, in quibus cucurbitula ob earum paruitatem, vel gibbositatem & inæqualitatem, aptari non potest. Hirudines auellimus, quando eius sanguinis quem arbitramur exhauriri oportere, dimidiam partem attractam fuisse coniecerimus: & postea tãdiu effluere permittimus, quoad qui satis sit, excretus fuerit. Cum vero particula tum ab hirudinibus, quæ natura frigide sunt, tum ab aere refrigeratur: fouenda ipsa est, ac recalfacienda: sanguinisq; fluxus non per refrigeratã, sed per asringentia & emplatrica, ut diximus, est cohibendus.

De Hirudinibus ex Menemacho.

CAP. 22.

Hirudines locis affectis applicantur, vel eis qui proximi nõ pinguibus sunt: nã oleũ earum appetentia subvertit. Porro in angustã finitū calami ab utraq; parte haud perforati, vel operculum parui calami, vel quidpiã simile, cū aptandæ sunt, demitti debent. Earũ numerus à duabus magnitudinibus

ORIB. DE CVCVR. SCAR. ETC.

gnitudinibus loci nimirum & affectionis, sumendus est. Auferantur, oleo calido earum labijs infuso. Mordacitas autem satis in partibus ulceratis exoluenda est. Quod post earum ablationem effluit, & citus impositus cohibet. Excretionis quantitas ab hirudinum erectione conspicitur: sed euidentius ea etiam apparet, si congregata fuerit, quando hirudines à corporibus diuulſe sanguinem euomuerint. Sane si hirudines ægre adherescant, loci, quibus aptanda sunt, superficietenus sunt scarificandi: vbi enim illæ sanguinem gustauerint, auidius ipsum appetunt.

EX LIBRO OCTAVO

De Deriuatione ex libris Galeni.

CAP. 18.

Deriuatio (græce παροχeteυσις) eiusdem est generis cum euacuatione facta per particulam, quæ fluxionem suscipit. Fit autem per aliquam vicinarum partium: exempli causa: Quando per gurgulionem vel palatum fertur fluxio, per nares certe ipsius deriuatio congruenter fiet, irritatione à nobis facta vel prouocatione per acria medicamenta. Quando vero ad oculos vel aures succi vergunt, deriuare ipsos non in nares tantum, sed & in ipsum etiam os debemus, medicamentum id quod ex origano & sapa confectum est, idque etiam quod ex sinapi constat, diluenda gar F garizandaque exhibentes. Scimus etiam quod staphisagria, idest pedicularis herba, commaducata, pyrethrum, omniaque id genus acria, succorum abundantiam, quæ in oculos vel aures ex capite fertur, ad os traducunt. Deriuatio etiam fit si id quod per asperam arteriam in pulmonem defluit, ad stomachum diuertamus, hoc enim magis eligendum: Nec secus etiam si mulieri per sedis venas sanguis irrumpat, eum quoque ad vteri venas traducamus. Riutare igitur (græce ὀχετεύειν) est per riuos ducere: Deriuare vero (id est παροχεύειν) est à riuis ad latera diuertere.

De Reuulsione ex libris Galeni.

CAP. 19.

Vehementissimos succorum influxus reuulsorijs præsidijs confertim ingruere prohibemus. Reuulsoria autem præsidia sunt, vincula quidem artuum, vbi succi in thoracem & ventrem inclinant: Vomitus autem, vbi ad inferiora declinat: Quemadmodum etiam acres clysteres, vbi ad vomitum vergunt. Has vero ambas succorum inclinationes, eam inquam, quæ per superiorem, & eam quæ per inferiorem ventrem fit, ad vrinas ac sudores retrahes. Quin & vrinas quoque tum ad sudores, tum ad alui quoque deiectiones, reuelles. Reuulsorium etiam præsidium est, quæ iuxta mammas apponitur cucurbitula. Quæ vero hypochondrijs affiguntur, sæpenumero sanguinis ad nares impetum potenter reuulsisse conspexistis: quemadmodum etiam sanè immodicas per vterum irruptiones. Acria etiam medicamenta artubus imposita, succos ad caput visceraque vergentes, reuelunt. In summa, reuulsio facienda est, deorsum quidem, vbi succi ad superiora: sursum, vbi ad inferiora vergunt: Et vbi introrsum, ad exteriora: vbi extrorsum, ad interiora: Ita quoque si dextrorsum inclinat, in sinistra: si sinistrorsum, ad dextram reuulsio facienda est: Sic sanè fluxiones quæ retro inclinant, in priora reuellendæ: quæ in priora, in posteriorem regionem abducendæ sunt.



GALENI DE VENAE SECTIONE ADVERSVS ERASISTRATVM LIBER

Iosepho Teetandro Cracouiensi interprete

Denuo ab Augustino Gadaldino ad Græcorum exemplarium fidem emendatus

ARGVMENTVM LIBRI

Increpat Erasistratum, qui posthabito Venæ sectionis auxilio, Neque
efficacibus, Neq; tutis Remedijis vteretur.

*Adversus Erasistratum, qui cum in Minimis pleriq; Curiosus esset, Semel tantum
idq; obiter, de Venæ sectione mentionem fecit.*

CAP. 1.

*vide de hac re
lib. 5. methodi
cap. 15.*



Ihi equidē illud inquisitione nō parua dignum vī, cur nam Erasistratus, cum cætera quæ ad artē spectant, abunde satis pertractaret, ac circa minima quæq; tâtopere curiosus esset, vt & quorundā holerum cataplasmaturq; decoquendi rōnem cōscripserit († quorū facultates vsuq; li vnquam aliquis alius declarasset, non iniuriā eorundē conficiēdi rationē omittere potuisset, † qñquidē id nullius pretij sit, taleq; quod à quouis ex vulgaribus inueniri possit) de venę sectione interim, tā potenti ac magno auxilio, quodq; vel veterū snia non minus efficacissimis remedijis extolleretur, ipse nullā mentionē fecerit. In illius. n. operibus ferme ne nomen quidem vnquā venæ sectionis, præterq; semel,

*† clarius. in
quibus, satis si-
bi eē debebat,
ubi ad quid cō-
ferret tantū di-
xisset, alteri cō-
sectionis modū
relinquere.*

reperiri pōt: vbi ipsemet, quemadmodū vnicuiq; considerare facile est, obiter potius præterq; institutū, quā studio insigni, de sanguinis reiectione agēs, illius meminit: id qđ ex suis scriptis intelliges, quę sic habēt: Deligaturę vero, quæ circa alas & inguina fiūt, non sunt faciēde more quorundam, qui vulgatam curandi rōnem imitātes, nihil aliud consequunt, qđ q sanguinē vīculis abunde exprimant. Quod. n. in deligatis corporis partibus sanguis plurimus recipiatur, ex venarum tentione, earūq; sectione coniectandum est: ex incisa siquidē corporis parte, cum ea deligata fuerit, copiosior is effluit. Dū vero sanguinis reiectione cōtingit ex deligatura in tibjīs ac brachijs facta, plurimū eius ibidē recipiē. Postq; etenim q circa thoracis partes adest, diminutus fuerit sanguis, tū ipsa quoq; reiectione multo minor pauciorq; fiet. Hoc autē ipsum facere volunt ij, qui sanguinem de reiciētibus venā secāt. Sed in hac re Chrysippus multo consultius agit, quippe qui non solū præsentia inspiciat, sed et iminentis periculi curā gerat. † Huic. n. periculo quod in reiectione accidit, aliud ex inflammatione adharet, in quo quidē offerre aliquid perquā difficile est: rursū autē ei qui a venę sectione famē longo tpe tolerare debeat, ne dissoluatur verēdum est. Ceterum Crypsippus simulatq; nutrimentū in corpore tā elaboratū in loca soluta difficilia transtulerit, qđ eo tpe quo dissolutionis periculū imminet, hoc pacto cibū diffierre possit, in prōptu est. Et hac quidē ille medēdi rōne vsus nunq; offerre coactus est, ob idq; summa quæq; ingenio supauit, ac qđ tibi ipsi vnde quaq; constet, frequētissimas meruit laudes. Quod autē nullius momēti hæc sint & indigna oībus modis, quę vel ad Erasistrati solertiā, quam ille tibi in hac arte vēdicat, vel ad auxiliij vires referant, cuilibet constat. Qñquidē si neq; apud Hippocratē, & neq; apud Dioclē, & neq; apud Euriphon tē, neq; penitus apud quēquā alium qui ætatē Erasistrati præcellerūt, tale genus auxiliij in scriptis reperiret, forte suspicari quis posset illū, tanq; de eo cuius vsus non dū fuisset inuētus, aut apud celebres medicos approbatus, iure optimo verba nō fecisse: Verum cū permulti alij fuerint, quibus non in vno tm eodemq; leui affectu, sed et in plurimis acutissimisq; frequens huius auxiliij vsus iam constiterat: ac eo pacto tum Hippocrates omnium bonorum artis medicæ author, tum vetustissimi quicq; illo vfi esse animaduertuntur: qua quæso re Erasistratus commotus id adeo spreuit,

*† clarius. Hic
enī periculo
quod ex reie-
ctione ē, pericu-
lū inflammatio-
nis proximū ē:
in quo offerre
quidē nō facie-
le: ei vero qui
post venæ sectio-
nē lōgo tēpore
sine cibo per-
maneret, peri-
culū ē ne exolu-
natur. 14. a. lo-
cū inferius de-
clarat Gal. pa.
13. 4*

vt ne

DE VENÆ SECTIONE

ut ne rationem quidem ullam illius in enarrando habuerit? Etenim & quòd illud non improba-
uerit ad certos affectus reliquorum præsidiòrũ more, ipsum referendo indicare, & causam ob quã
id probauerit præscribere eum oportebat. Atqui hic in huius præsidiij viribus enarrandis tanto-
pere inops fuit, ut neq; significauerit recipiendus ne sit an posthabendus vsus illius, neq; vnquam
quid de illo sentiret proferre ausus fuerit, nisi in vno tantum, ut superius dictum est, affectu. Quã-
quam vel ex ijs quę ipse reticeret, opinionis suę summam manifestam facere videtur: nequaquam
enim, si vsus illius probasset, silentio præterisset. Neq; etiam cum minima quæuis quæ ad leuan-
dos affectus accommoda erant, describenda putaret, hæc utpote tam magna, aliquem etiam si ab
eo non didicisset, propria opera consequi posse persuasum habebat.

Quibus Rationibus Erasistrati Sectatores dogma de Non Secunda Vena tuerentur. CAP. 2.

CAusa vero, ob quam venæ sectione ipse non sit vsus, fortassis diuinatione opus habere cui-
quam videbitur. Qui enim quis rescire possit q̃ ea ipsa Erasistratus cognita habuerit, quo-
rum nullam diffusa oratione ille mentionem fecerit? Nihilo minus fuere nō nulli qui in explican-
da illius sententiã quæuis vaticinari conati sunt: verum hi dum inter se ipsos, discrepant, in ma-
ximis erroribus versari, manifeste sunt deprehensi. Nam nemini ex illis eadem stat sententiã: &
quod multo grauissimum est, neque ab ipsis Erasistrati commilitonibus, discipulisq; Chrylippi F
Cruidij, quo primum auctore de explodēdo venę sectionis vsu dogma suscitatum est, de illius sen-
tentiã quicquam certi constitutum est. Hæc autem quę Apœmantēs Stratoq; protulerunt planē
ridicula sunt: vterq; enim dicit perdifficile esse venam secare, vel ob internotionē valis, vel ob ar-
terię incisionem: nocumentum quippe illico ingens imminere, si quando loco venę arteria diui-
datur. His addunt q̃ quādoq; aliquis præ timore mortuus sit: & alter etiam ante valis sectionem,
alter vero eo iam secto referri nunq̃ potuerit: tum q̃ quidam irreparabili sanguinis fluxu defece-
rit. Sed prætereo illa quoq; quę à reliquis dicuntur, nam alij quidem eorum allerunt vacuationis
mēsuram coniectura assequi multo esse difficillimum, ideoq; necesse esse, ut aut diminute euacuan-
ti nihil plus contingat: aut mediocritatem excedenti maxima impendeat noxa: quid enim (aiunt
illi) venæ sectio modum exuperans, à cæde differt? Alij vero dicunt, q̃ cum transfusus spirituum
(græce paremptosis) ex arterijs in venas fiat, necessario inanitionem sanguinis per osculorum re-
ferationem ipse spiritus sequatur. Sunt & alij qui affirmant venarum euacuationem inflamma-
tionis affectũ in arterijs iam constituto, planē superuacaneam esse. Atqui vniuersa talia quanquã
credibilia alicui appareant, sunt tamen re vera falsa, indignaq; quibus adhiberi fides debeat: quę
his omnibus longe facilius habenda fuisset, si hæc in medium protulissent, quę dicta fuerant à cæ
G
teris quibusdam, qui ex succorum natura disputandi initium deprompserunt. Et quanquam vel
aduersus hos longiore sermone alicui conueniret instare, huius tamen rei impresentiarũ ea pro-
pter nulla est occasio, quia orationem sic in immensam prolixitatem excrescere oporteret: præte-
rea nihil obstat quo minus ea quę tum ab Erasistrato, tum à quouis alio ex Chrylippi discipulis di-
cta sunt, reprehendere aggrediamur.

Quæ fuerit Erasistrati Opinio de Ortu Febris & Inflammationis, ac de ipsarum Medela. CAP. 3.

Commodissime igitur sermonē mihi instruxisse videbor, si prætermisissis alijs ab ipsius Eras-
trati placitis initium fecero, orationemq; ipsam quantũ eius fieri potest breuissime absoluero.
Caterum ille arteriam spūs, venam aut sanguinis, receptaculũ esse asserit: Deinde vero vbi gran-
diora receptacula diuisa fuerint, magnitudine quidē illa diminui, numero aut effici plura: ac cum
nullus locus detur vbi circa terminum vnus, vas aliud non existat, illa vnde quaq; per corpus de-
lata in tam minutos fines desinere, ut contentus in illis sanguis præ extremorũ osculorum conui-
uentia intus retineat: ob idq; etsi oscula venarum arteriarumq; inter se vicina sint, sanguinem tñ
proprijs terminis circũseptum, ac nullibi in vasa spiritalia insilientem permanere: & eousq; sanē
animal legibus nature dirigi: Simulatq; vero cā quędam violenta irruerit, tum sanguinē ipsum in H
arterias transferri, & animal iam necessario ægrotare: Causas item huius rei aliquas, præcipuamq;
illarum sanguinis multitudinē esse, à quo & venę tunicā distendi, referariq; fines q̃ prius clausi fue-
rāt, trāsfundi et in arterias sanguinē: qui postea spūm à corde delatum perturbās, eiq; motũ suum
alterati resistens, si quidē ē directo atq; ppe principē partē cōstitit, iã id febrim esse: si aut ab ipso
retro repellat ac in finibus arteriarũ condenset, inflammationem tum existere. Et talibus ille rōni-
bus inflammationem ex plenitudine adstruit. Verum quæ ex vulneribus contingit, eam quoque
sanguinis ex venis in arterias transfusu causari ait, cuius rursus transfusus causam illam quæ ad
euacuationem fit, successionem esse putat: Cum enim scissis arterijs, post inflitum vulnus spiri-
tus vniuersus ex læsa parte effusus fuerit, & periculum instet ne vacuus fiat locus, sanguinem illo
tempore, spiritus euacuat, quiq; locum illum prius replebat, gressum per osculorum referatio-
nes consequi solere: Si ergo spiritus foras emissus fuerit, hūc quoque effundi: occluso autem illo
atq; obserato, etiam hunc vi spiritus à corde demandati impulsus, in locis vulneri vicinis cunctũ
coaceruari, & ea ratione inflammationem efficere. Sed concedamus age ipsi quæcunq; hoc tem-
pore de febribus & inflammationibus dixit, vera omnia esse: nam alibi demonstrauimus ea nihil
in se verũ continere: Doceat igitur ipse nos iam medicaminum seriem. Ait enim cum in multis
alijs

« A alijs locis, tum in primis in tertio de febribus tractatu sic verbatim: Circa ægritudinum igitur ini-
 « tia ac inflammationum generationes omnem forbitionum oblationem auferre oportet: inflamma-
 « tiones enim, quæ febres faciunt, vt plurimum ex repletionem fiunt. Si itaque hoc ipso tempore obla-
 « tiones concelle fuerint, & concoctione distributione q̄ suas actiones perficientibus, vasa alimento
 « repleta fuerint, inflammationes multo vehementiores persæpe fieri contingit. Hæc quidem ille de
 « inflammationibus protulit, quæ circa vulnus ex plenitudine eueniunt. De illis vero, quæ ex vul-
 « nere suboriuntur, in primo de febribus libro denuo in hanc sententiam recenset: Illius autem subse-
 « quuntur medendi rationes, quo vulnera omnia ab inflammatione libera efficiant. Medicamenta
 « enim, cum sanis partibus illinuntur, claudendo atq; obturando prohibent, ne sanguis desuper fu-
 « sus in loca dissecta irruat: quandoquidem in illa, quæ affectu carent, eo quod multæ arteriæ illic ve-
 « næ q̄ recludantur, sanguis, qui in arterias transilierat, facile in venas quoque transumetur. Quam-
 « obrem consequens rursus est, vt vulneratis nihil prorsus inflammationis tempore offeratur: ve-
 « næ nanque, cum alimento vacuæ existunt, longe facilius sanguinem qui in arterias insilierit, susci-
 « pient: quod vbi contigerit, inflammationes minus contingent. Proinde, quod multitudo euacuan-
 « da sit, quod q̄ venæ distentæ ac repletæ, in seipsas iterato sanguinem recipere non possint, assentire
 B ipsi Erasistrato nos fatemur: verū, quo nam pacto hæ euacuandæ sint, in dubium à nobis vocatur.

*Præstantiorem ex venæ sectione, quàm ex inedia fore vacationem, quodq; Erasistratus negligens fue-
 rit in imitanda natura, ac scriptis Hippocratis legendis.*

CAP. 4.

Postquam itaque euacuationem faciendam esse confessum iam semel sit, ego eam omnium fa-
 cillimā atq; expeditissimam, venæ sectione perfici arbitror, vtpote per quā ipsas etiam inflam-
 mationes solas celerrime euacuare possimus: cum è diuerso inedia, præterquam q̄ longū tempus
 requirant, etiam vniuersum habitum æqualiter euacuant. Atqui illud nequaquam conuenit, cur
 enim quis id euacuet, quod euacuatione opus nō habet? Aut cur eliquet carnes, cum sanguinem
 subtrahere liceat? Vt interim noxas reticeam, quæ ex longis inedijs necessario euenire solent, ac
 virtutem defatigatam, & succos biliosiores amarulentiores q̄ redditos, frequentes item cordis mor-
 sus atque inquietudinem, tum deiectionum alui retentionē, & omnia denique excrementa acio-
 ra maligniora q̄ effecta. Quorum Erasistratus nihil animaduertens, cæcorum more, qui amplam
 compendiosam que & planam viam in propinquo habentes, sæpenumero angustam ac asperam
 prolixam q̄ errabundi incunt, & ipse tam propinquam satis que expeditam & amœnam semitam
 C spernens, ad impeditam illam ac longam sese contulit: quippe qui hoc tantum considerauerit,
 num, quod ipse contendit, via eò vergat, non autem an compendiose, & sine noxa ducat. Nam,
 quod vel inedia ad plenitudinis euacuationem conferat, ego quoque consentio, verum longo
 tempore, magno que cum nocumento eam efficere id dico. Attamen sapientem Erasistratum,
 qui quorundam iudicio Hippocrati par esse videtur, non puduit, quod neglecto tam insigni præ-
 sidio, nihil credibile aut rationi consentaneum attulerit, quin potius, velut de re abiectissima pe-
 nitus, que nullius precij, verba fecerit. At Hippocrates ille medicus te, o Erasistrate, nulla ex par-
 te inferior, non sic de venæ sectione pronunciauit, sed, quæ tu verbis saltem admiraris, ea ille ope-
 re palam est executus. Admiraris tu siquidem naturam ipsam, vt artificiosam simul que prou-
 dam animalis gubernatricem, nullibi tamen eam imitaris. Aut, cum illam plurimis morbis san-
 guinis euacuatione medentem frequenter animaduertis, cur ne in vno quidem vnquam hoc
 « idem tu ipse fecisti? Cur etiam naturæ, quam laudas, opera silentio suppressis? Cur præterea, quā
 « do apud Hippocratem reperisti multa huiusmodi scripta: || Mulieri sanguinem vomenti men-
 « struis erumpentibus solutio: &, || Ab atra bile habitis similem effectum hæmorrhoides præstant.
 Sanguinis item fluxus copiosi, per nares soluuntur: apud te nihil tale, sed vnico solum verbo lau-
 D data natura, opus autem illius nullibi scriptum reperitur. Porro mihi sufficiebat, vt opera illius
 antea ad perfectum addiscerem, à quibus postea initio sumpto ad inuestigandum reperirendum q̄
 id, quod æquum putabam, idoneus euasi. Liceat ergo mihi venia eorum, qui te admirantur, dicere,
 quod in conspicuo est, quod scilicet mihi aut modis omnibus demens, aut in naturæ operibus quā
 minime versatus esse videaris. Alteri enim ex his duobus, vel quia illa nunquam cognouisti, vel
 quia cognita iamdudum non sis imitatus, obnoxius existis. Aut fortassis in cubiculo aliquo per-
 petuo delitescens, neque aliquando ægrotum aliquem contemplatus, hæc scribebas: hinc q̄ adeo
 non iniuria naturæ opera ignoras, quæ alioqui pro extrema dementia tua semper es præpositere
 admiratus & imitatus: nec non, postq̄ scribendi prouinciam inijsisti, legem scribendo es transgres-
 sus. Oportebat enim primū te opera naturæ mihi describere, deinde declarare: & quæ illa integre
 ac perfecte proprijs conatibus incitata, & quæ morborum causis præpedita diminute agat: nam hu-
 iusmodi ratio viam ad inuenienda medicamina nobis suppeditat. Cum etenim didicero, quæ pro-
 be ab illa perficiuntur, superaddito eo, in quo illa deficit, facile ei adiumento esse potero: rursum,
 si ipsa nihil penitus mouet, id quod quandoq; morbosarum causarum vehementia superata pati-
 tur, tum ego illud omne suggerere enitar. Tu vero nihil horum indicans, domi q̄ te continens, vt
 qui forte ægrotorum visitationē, vt fertur, paruipendas, quod tibi videbatur, scripsisti. Ceterum
 si tu ipse

5. Aph. 31. Ext.
or. 40 d

6. Aph. 21. Ext.
or. 43 d

DE VENÆ SECTIONE

si tu ipse non perspexeras, Hippocratis monumenta relegenti tibi addiscere integrum erat, & quæ E
perfecte, integre quæ, ac ut ille loqui consuevit, ἀπρίως, i. absolute natura mouente iudicetur, & qua
ratione illam quis iudicium non aggredientem, pulcherrime imitari possit: quo etiam pacto ag-
gredientem quidem eam, verum debiliter mouentem adiuuare oporteat. Si enim in his exercita-
tus fuisses, talia te consulente audirem, qualia apud Hippocratem quoque inaudio: || Quæ iudican-
tur, & iudicata sunt, ἀπρίως, i. integre, neque mouere, neque nouare, siue medicamentis, siue alijs irri-
tationibus, sed sinere. Illud quidem habes proprium naturæ integre mouentis præceptum. Quod
vero huic succedit, naturæ, & ipsum, verum diminute ad iudicium mouenti congruit, eam quæ ob re
illi auxilio esse iubens, dicit. || Quæ ducere oportet, hæc, quod maxime natura vergit, per loca conse-
rentia ducenda. Natura siquidem tunc temporis expellere conatur id, quod eam infestat: cum au-
tem præ imbecillitate finem operi imponere non possit, nostris auxilijs indiget. Propterea etiam
lateris inflammatione laborantes curas, iuxta humorum vergentiā inanire eos consuevit. Quid
enim ait? || Cum ergo dolor ad iugulum extenditur, aut grauitas in brachio, vel circa mammam,
aut supra præcordia existit, interna cubiti vena secanda est. Neque dubites copiosum detrahere san-
guinem, donec rubicundior multo, aut pro puro, rubido quæ liuidus effluxerit, vtrunque enim contin-
git. At, si dolor sub septo transuerso fuerit, neque ad iugulum ascenderit, tum aluius, vel nigro vera-
tro, vel peplio subducenda est. Rursus vero in quopiam renalium affectionum cōcurso præfatus:
|| Et in rene dolor grauis b † per ilia usque ad coxas tendens è directo infert poplitem secare, hoc
est, venam, quæ in poplite est, incidere.

1. Apho. 20. Ex.
ord. 9. g

1. Aph. 21. Ext.
ord. 10. a

de Vi& rat. in
mor. acu. cōm.
2. L10. & 11. 7^a.

A || 6. Epid. cō.
1. t. 6. 3^a. 155. g

B † Legen-
dum est grace.
βάπτι μιν πρὸ τῆς
κατ' ἑξῆς ἵδ' id
est stupor femo-
ris è directo po-
sit. vide. 6. Epi-
de. sect. 1. 2. t. 6.

C || 2. Epide.
sect 4.

D † ad co-
xam, & crur.

† puerperij.

De vsu sectionis venæ in frigidis, ac reliquis ex multitudine affectibus medicorum rationalium,
Empiricorum, ipsius quæ naturæ testimonio.

CAP. 5.

Illud vero quo modo dictum est? Ex Margei famula ne sanguis quidem prodijt, nam, c || ut fi-
liolâ hæc peperit, ilico os d † ad vertebra coxarum detortum est. Porro dolor ex vena prope talum
secta cessauit, quâuis tremores corpus iam occupassent. Atqui nunc ad occasionem ipsam, eius quæ
fomittem transeundum est. Hippocrates siquidem te, & occasionem morbi, & generationem occasio-
nis perpendere iubet, id quod tu mea quidem sententia multitudine sanguinis præsertim mole-
stiam inferere, non de alio quoquâ, præterquam de venæ sectione dictum affirmare possis. Ergo præ-
fata mulieri, licet iam tremore correpta esset, ille secare venam non distulit, cum è diuerso nemo alter
in tremoribus æque, atque hydropili, alio uel frigido affectu villo, sanguinem detrahere vni ausus fuit.
In talibus. n. ex calidi succi euacuatione adhuc multo magis corpus necessario refrigeratur, & in-
natus calor, qui per affectum antea quoque frigidatus fuerat, extinguit. Hippocrates vero, ut ipsemet
fatetur, multitudinem sanguinis ante ipsum affectum accumulata considerauit: muliercula. n. à purga-
mentis, quas secundas vocat non fuerat expurgata. Fomes autem, seu nutrimentum occasionis, hoc
est generatio, prima quæ causa, ob quam non sit probe expurgata, est ipsa contorsio vteri, qui ad co-
xam contortus fuerat. Proinde, cum retentio euacuationem, litus vero vteri locum, per quem euacua-
tio instituenda est, illi indicaret, venâ talo proximam incidit: talem quæ Hippocrates sese in cunctis
præstitit. Sed ne laudibus virum hunc extollentes Erasistrataeos tristitia afficiamus, ut, qui ipsi,
ante eos quæ Erasistratus, aduersus illum inimico animo esse mihi visi sunt, missa faciamus nunc Hip-
pocratis monumēta: alio enim tempore totam illius de euacuatione artem declarare constituimus:
quin potius transferamus nos ad illos, quorum aliqui empiricam, rationalem quæ sectâ vnâ sunt am-
plexi, quandoquidem ex his à venæ sectione abstinere inuenio neminem. Nam inter dogmaticos,
Dioclem, ac Plistonium, Dieuchen quæ, & Praxagoram, vnâ cum Philotimo, atque Herophilo, &
Asclepiade, venæ sectione vsos fuisse compertum habeo: quanquam Asclepiades contentions adeo
studiosus fuit, ut omnia ferme priora dogmata lacerasset, neque alicui prioris seculi homini, immo ne
Hippocrati quidem pepercerit, hinc quæ adeo veterum medicorum rationem, mortis meditationem nomina-
re non sit veritus. Atqui neque hic eo impudentiæ venerat, ut venæ sectionem è medicinalium auxi-
liorum numero explodere auderet. Quin etiam, neque inter recentiores, aut vetustiores aliquis, non
Athenæus, non Archigenes, neque Agathinus, tum denique, neque ex empiricorum coetu quisquam:
hi enim cum nihil eorum obseruent, quæ rationi consentanea sunt, omnia quæ experientia sola de-
cernant, tamen ex his neminem mihi proferre poteris. Quando autem isti in omnibus alijs rebus ferè
dissentientes, in hac sola conueniant, mihi planè concordia suspicione vacante nihil magis fide di-
gnum esse videtur. Sed, ne præ testium multitudine opera naturæ, quâ tu, si laudas, obscuriora red-
damus, mittamus hos, si lubet. Nonne ipsa mulieres cunctas singulo mense euacuat, sanguine su-
perfluo foras effuso? Muliebre enim genus, ut quod domi ageret, neque vehementibus laboribus
exerceretur, aut sub claro sole viueret, ac ob vtraque hæc multitudinem humorum coaceruaret, ip-
sam euacuationem plenitudinis, tanquam remedium naturale, obtinere opus habebat. Et vnâ quidem
istud naturæ opus est: alterum vero purgatio post partum contingens existit: licet & foetura ipsa,
species sit euacuationis. Nam ex sanguine vteri conceptus nutriri solet. Tum vero, postquam editus
est foetus, generatio lactis in mammillis, vacuatio hæc quoque est quantitate sua non parua: vnâ siquidem,
& lactis, & menstruorum substantia est, amborum quæ, ut quisque dixerit, riuorum fontes communes,
venæ sunt. Quamobrem, quibuscumque per ætatem menses fluere cessarunt, his neque in mammillis lac
amplius

Amplius colligitur: quæcunq; etiam purgandi tēpora adhuc habent, ac interea lactant hę nō purgantur. Præterea cum mulieri lactanti sanguis per locos eruperit, illico lac huic euanesceat. Ad hęc quęcunq; animantia vtero non gerunt, his neq; lac vnq; adest: rursus quibus id suppetit, illa etiam ad concipiendum à natura idonea sunt. At si iam addidicisti quot commoda ex huiusmodi euacuatione muliebri genus maneat, quotq; nocumenta iisdem suppressis sequantur, haud video qui sufferas, quo minus sanguinem superabundantē modis omnibus euacuare acceleres. || Mulier enim, Hippocrate teste, podagra non laborat, nisi menstrua defecerint. Sed cur ego contra hominem
 « Hippocrati inimicum, verbis Hippocratis vtor? Velim itaq; audias iā veritatē ipsam me præcone
 « tibi denunciantem, q̄ mulier si probe expurgetur, neq; podagris, neq; articularum doloribus, neque lateris inflammationibus, neq; peripneumonijs capiatur: sed neq; epilepsiæ, neq; apoplexiæ obnoxia sit, aut spirationis vel vocis ablatione rite purgata vllō tēpore infestetur. Num vero menstruis fluentibus, aut phrenitide, aut lethargis, aut conuulsionibus, vel tremoribus, rigoribusue mulier aliquā correpta est? Num etiam vel melancholia laborantem, aut mania vexatam, aut quæ ex thorace spueret, vel vomeret ex ventre sanguinem, aut capite laborantem, aut synanche præfo-
 catam, aut aliquibus id genus magnis & vehementibus affectibus impetitā, cui menses recte ex-
 B cernerentur, qñq; conspexisti? Verum his retentis eam cuilibet malo implicari facile est, huicq; rursus euacuationes incedunt. Sed posthabitis mulieribus te ad mares iā confer, vt discas. s. quod quibuscunq; pro consuetudine, superflua per hæmorrhoides euacuantur, hi omnes vitā morbis minime impeditā agunt: quibus itē inanitiones supprimunt, hi in perniciosissima quæq; labunt. Verum igitur neq; horum, vbi vel synachen vel peripneumoniā incurrerint, sanguinem euacuabis, aut potius ne desciscere videaris ab ijs quę perperā didicisti, tot hoīum interitum paruipēdes? Tu fortassis hoc facies: ego autem nō hac solum, sed etiam spasmodum hydropemq; sanguinis euacuatione sæpius sum medicatus: in hunc. n. modum erudiuit me tum longa experientia, tum ratio ipsa, quæ mihi suggessit vt occasionem ipsam, eiusq; momētum sic inuestigarem. Quod autē experientia quoq; istud me docuerit, si empiricorum commentaria legeris scire poteris.

Communi Hominum Naturæ, ac Brutorum quoq; animalium Consensui, Erasistratum, ac omnes, qui Venæ sectionem paruipendunt, aduersari.

CAP. 6.

Ne igitur in posterum cum Hippocrate solo (q̄ euacuationem sanguinis laudauerit, cum vel in tremorem, vel in hydropem, vel in alium quemuis frigidum affectum, mas quidē ob hæmorrhoidum, mulier vero ob mensium retentionem inciderit) tibi controuersiam futuram rere,
 C sed & cum vniuersis medicis qui experientiam sectantur, vel potius cum vniuersa hominum vita. Videris. n. tu communem oīum subuertere sententiā, præsertimq; si neges quod à natura cuiq; insitum sit, vt considerare possit sanguinem ob nimiam multitudinem euacuandū esse. || Quis enim contraria contrariorum esse remedia ignorat, vt q̄ sententiā hac non Hippocratis tm̄, sed omnium hominum communis sit? Tu vero præ odio quod aduersus Hippocratem cōcepisti, mea quidem sententiā etiam alijs multo es dementior, idq; cum habeas naturam te ad hac ipsa quotidie manu ducētem: nam hæc in ediam adiectione, ac repletiones euacuationibus, & frigus calefactionibus, caloresq; refrigerationibus curat. Quid enim aliud est offerre cibum, q̄ plenitudinem suppeditare? quid rursus excernere fæces, q̄ intestina repleta exinanire? quid item meiere, q̄ repletioni vesicæ mederi? Pleraq; enim animantia frigore laceffita, latebras ac calidos specus in penetralibus terræ sibi inuestigant. Aliqua etiam æstatis tempore calore anhela, sese in aquam frigidam coniiciunt, & in vmbrosis locis ventoq; peruijs immorantur. Ego præterea frequenter vidi canem vomitum sibimet studiose prouocantem: auem quoq; ægyptiam clystere imitatam: quæ omnia ab hominibus, vt qui ratione compotes sint, multo faciliore conatu perficiuntur. Accerse ergo hominem quempiam rei medicæ expertem, ad ægrotum, qui bona sit habitudine, iuuenis, multo
 D abundans sanguine, quiq; præ synanche aut peripneumoniā suffocetur, postea hominem interroga siquid cognoscat quod huic affectui succurrere possit. Quis adeo demens est, vt sanguinis euacuationem non pronunciet? Caterum Erasistratus ob contentiōem quam aduersus Hippocratem præ se fert, ne id quidem, quod communi oīum hoīum suffragio receptum est, probare videtur, & ea propter reperitur vel gruibus iplis insipientior: has siquidē æque atq; aquilas, prælongo vsq; ad vltimos terrarum terminos volatu, partim frigus, partimq; æstum euitantes, quod contraria contrarijs semper propulsent, videre licet. Atqui, vt & antea dictum est, perspectum habere q̄ ijs euacuandus sit sanguis, quibus ex eius multitudine periculum imminet, id præstantiam artis Hippocraticæ non dum æquat: ego enim tum qua ratione, tum quo tpe, quā ue quātitate euacuatio instituenda sit, mihi declarari mallet. Scire nanq; qñ vel venam quæ in fronte est, vel illas quæ in hircis oculorum, seu sub lingua existunt, vel quæ humeraria vocatur, vel subalarem, vel quæ per popliteum penetrat, quæ ue prope talum adest, incidere oporteat (prout de his omnibus Hippocrates docuit) hoc ipsum ego rationationem medicorum arbitror esse. Verum quod contraria contrarijs medicanda sint, quodq; euacuatio repletioni opponatur, tm̄ abest vt admirer, vt etiam huiusmodi cogitatione bruta animantia participare dicam. Si autē auribus apertis aut animo potius, ac deposita erga Hippocratem similitate, veram rationem amplecti volueris, aliquid iam

6^a. Aph. 19. Ex ord. 49. b

* Cephalæa.

In libro de Flatibus paulo post principium.

DE VENÆ SECTIONE

quod illius arte dignum esset, dicere tibi possem. Eousq; n. Diocles Plistonicusq; ac Herophilus, E et Praxagoras atq; Philotimus, nec non alij medici permulti inter se cōsentiunt, q̄ ipsi quidem nō per se, verum diuinum Hippocratem secuti reppererint, quo tpe quelibet veng, quas supra cōme morant, incidendae essent. Caterum q̄ ab atra bile habitis similiter hæmorrhoides conferāt, etiam in illud Hippocrates perspicue docuerit, non tamē omnes sciunt, sed quicumq; sincere in illius scri ptis versati sunt: hi soli. n. quomodo hæmorrhoides dysenteria ac varices fiant, ab ipso perdidice runt. Item q̄ non semper horum vnumquodq; si existat, prohibendum est, sed q̄ quādoq; coad iuuandum: vel natura quiescente (q̄ sic confert) ei totum committendum: adeo ignorant illi qui dysenteriam varicesq; & hæmorrhoides immature præpropereq; medicari discunt, vt & ea mo liantur quæ facere nequaq; debebant. Porro ego quoq; vidi non paucos ob huiusmodi euacuatio nes, quæ medicorum imperitia cohibita fuerant, aut atra bile, aut insanā vexatos: ipsorum quoq; aliqui tum intercostali inflammatione, tum renali morbo correpti sunt: non nulli vero ex ventri culo sanguinem vomebant, aut eundem tussiendo ex thorace spuebant, aut {attonito morbo} aqua ue intercutanea interibant. Hæc illa sunt, quæ mea quidem sententia medicus vnā cum præ clara euacuationis arte cognoscere debet.

** paraplegia.*

*Sanguinis Missionem Non modo non Prohiberi, quia Vacuandi Sanguinis Quantitas ignoretur, sed
Ceteris Vacuationibus omnibus Certiorem Mensuram, ac Tutius Auxilium præbere. CAP. 7.* F

Quantum autem de sanguine exuperante euacuandum, idq; cum non sit magni momenti, cur Erasistratus tanq̄ ex magnis quoddam contemplit? Aut cur homines illi aduersus om nes obstrepere paratissimi nugantur, cū illū incusent, dicantq; euacuationis perinde atq; aliorum auxiliorum rationem ignorasse? Aut cuius nam, per deos immortales, illū adeo exquisi te tenere mensuram arbitrantur, vt neq; excedat in quantitate, neq; deficiat vnquam? num clyste ris, aut purgantium medicamentorum alicuius, aut vrinam cientium, vel cibi vllius potus ue? Tē pus itaq; eliet iplis, vipote oīa suspicione infesta reddētib; quiescere omnino. Aut cur ergo Era stratus purgantibus medicamentis vtitur: ac vinum aqua frigida dilutum, tum alijs quibusdam, tum maxime cholericis exhibet: Chrylippumq; præceptorem suum, vt qui inuenerit prælidium nulli veterum cognitum, quodq; & solum cholicos iā morti proximos restituere possit, his ver bis satis inuidiose laudat? Non etenim quouis tempore id prebet, sed vsum auxiliij huius ad occa sionem vehementer præcipitem traduxit. Ego vero hac in re ipsum non accuso, præsertim cum tam absolute oīa quæ ad occasionem spectant, disqu. rat. Illud tñ in eo quis demirari possit, quod si quando Chrylippicum quicq; doceat, tum, vt ex verbis eius colligere licet, vehemēter sit audax, G nihilq; ipsum prorsus neq; momentum occasionis, neq; mēsurę difficilis coniectura, neq; affectus periculum perterrefacit: sed putet adeo exquilitē simul clareq; illum & mensuræ & occasionis ra tionem docuisse, vt decreta sua non medicis solum, verum & popularibus vsui futura arbitretur: at rursum cum ex veteribus medicis aliquem ob rerum inuenta laudare opus habeat, illic vnde quaq; tergiverſetur. Age ergo declaremus illis, q̄ mensura in venę sectione multo facilius depre hendatur q̄ in ceteris quibusvis auxilijs. Nam & coloris mutationem sepenumero dispicere licet, hocq; duobus modis fieri potest, interdum quidem sanguinem ipsum fluentem, interdum autem ægrotum considerando. Ad hæc animi quoq; defectio in plurimis affectibus vacuationis termi num obtinet: Sanguinis item fluentis vigor labescens, & pulsus mutati. Adde q̄ & medicus huius solius euacuationis liberam habeat facultatem listendi quādoq; illi placuerit, aliorum autem nullius. Nam vbi dandum sit aliquod medicamentum siue deiectorium, seu vomitorium, seu vri narum euacuatium, aut thoracis vel capitis purgatorium, horum scilicet omnium prima exhi bitio in tua potestate sita est, cetera autem fortuna administratrice obtingunt. Ingens præterea in propinationibus pharmacorum purgantium periculum est, cum vel non commouetur purgatio: vel quod in aluum attractum est, nō facile excernitur: vel cum dolore, morſibus, torminibus, refri- H geratione, pulsuū euanescentia, ac animi defectu exprimitur, vel cum corpus vehementer pertur batur, interimq; paululum admodum euacuatur: aut euacuatio modum excedit, hoc enim ipsum tanq̄ oīum maiorum extremum in hac parte frequenter contingere solet: neq; n. vt venæ incisæ fluxum, quem superimposito digito mox sistes, sic profluuiū alui tibi sistere licebit. Veruntamen nemo ex medicis superuenientium symptomatum metu percussus à propinatione pharmacorū abſtinet, sed postq̄ errorem commiserit tum demum cauēdum sibi ab illorum vsu proponit. Sed quid ego purgatoria refero, ac in enarrationē fortium medicamentorum tempus tero, cum & cibi cuiusq; in mēiura erratū maxima attulerat nocumēta? quorum magnitudinem in extenuatis & im becillibus hoībus, quicq; celeri nutritione egent, cōsiderare facile possumus. In his enim siquid mi nus æquo nutriat, virtutem tabidam reddet: contra vbi quid modum exuperans naturæ oneri po tius q̄ nutrimento fuerit, illam penitus suffocabit, extinguetq;. An igitur à cibi exhibitione abſti nebis, eo quod mensuram illius nō sine negotio assequi possis? Atqui ea quoq; ratione à meden di provincia penitus abſtinebis, nihil. n. in medica arte reperias, quod nisi certa mensura vsurpatū prodelle possit. Caterum in sola venæ sectione ne hoc quidem culpæ queas. Proinde errata, quæ vtrinq; circa mediocritatem contingunt, non parua noxæ sequūtur, maximeq; quia excessus perni-

Aperniciosisimos esse nemo neget: verum in quo minus periculum est, in eo excedere modum non fuerit necesse. Sit. n. si ita fors ferat, mediocris detractio trium heminarum: vbi si quatuor detraxeris, noxam maximam inferes: duas rursus si euacuaueris, comodabit quidē id satis, lationis vero nihil afferet: licebit namq; tibi vnam illā heminam vel clysteribus, vel inedia, vel frictionibus, vel sudoribus exhaustire, preterquam q̄ & denuo detrachere si voles, non vetaberis. Sed qua ratio ne ego tam multa in medium afferō, contendere cupiens cum hoibus infullis, qui ad hoc q̄ nihil rationi consonum loquantur, etiam ea ipsa non agnoscunt, quæ ipsimet laudibus efferre solent? Admirantur. n. dicta Erasistrati, ac nomen sibi ab illo vendicant, Erasistrataeos sese appellantes: verum documentorum illius adeo ignari sunt, vt quiduis potius q̄ sententiam illorum enodare valeant. De venæ ergo sectione tam proluxa tamq; absurda nugantur, vt iure optimo quis non solū imperitiam illorum, verum etiam impudentiam detestari possit: quippe cum Erasistratus in libro de sanguinis reiectione, in quo solo venæ sectionis meminit, aperte dixerit, q̄ Chrylippus ob id non vtatur detractioe sanguinis, quō æger qui propter inflammationes necessario in inedijs continetur, perdurare possit: ipsi tñ nihil minus q̄ hoc dicunt. Aut vis ne ea gratia vt homines hos Erasistrato obtrecentes in posterum quoq; audiamus, idq; cum verba Erasistrati in promptu nobis adlint? atqui hoc nequaquā æquum est. Audiamus ergo dicta ipsius, vbi ait: Multo consultius agebat Chrylippus, non solum q̄ præsens erat inspiciens, sed & impendentis periculi curā agēs.

† Hæret enim illi, quod in reiectione coniungit, ex inflammatione periculum, in quo offerre non facile est: Ei vero qui post venæ incisionem longo tempore sine cibo permanserit, periculum est ne dissoluatur. Aperte enim illum a periculo, quod ex inedia accidit, cauere dicit, illudq; necessario secuturum putat, quia æger ob inflammationem fame longo tempore sit excruciat.

† Vide supra pag. 5. d. quomodo locus hic legatur.

Perperam Erasistratum in Euacuatione, ac Reuulsione, quæ Inflammationibus medentur,

Inediam Venæ sectioni prætulisse.

CAP. 8.

Hic quoq; nihil moror Erasistrataeos blatterantes cur ille hominibus inflammatione laborantibus nihil offerre iusserit: verum ipsum Erasistratum per verba: quorum antea mentionem feci, semet interpretantem habeo, ex tertio nimirum de febribus, vbi de inflammationibus quæ ex plenitudine fiunt, dixerit, & ex primo de vulneribus. In vtriusq; n. cōmentarijs non semel, sed sæpe, venas quæ inedijs exinanitæ sunt, vt sanguinem affluentem denuo recipiant, aptiores fieri dicit. Quid. n. ait? His vero consequens est, vt vulneratis inflammationis tempore nihil offeramus: venæ. n. cum a nutrimento exinanitæ fuerint, sanguinem qui in arterias trāsiliit, facilius suscipiēt.

Inedia ergo tanq̄ euacuatorium auxilium quoddam inflammationes discutit, eamq; neq; alia de causa inflammatione laborantibus iniūgi dicit, q̄ q̄ venæ euacuatæ sanguinem in arterias infiliētem sic facilius suscipiant. Deinceps vero cum venas euacuare velit, possitq; id (ita me dii ament) sine molestia vlla celeriterq; perficere, longos ille infumit labores. Verum ego non video quo pacto se ipsum quis implicando magis prodere possit. Non secabo, inquit, venam, vt æger ad sustinendas inedias sufficiat. Porro cuius rei gratia inflammatione correptos fame excrucias? vt, inquit, venas exinaniam. Cur ergo eas a principio non euacuasti? Proinde pudet me iam hominis qui in tam graui errata inciderit, qui præter hæc, quibus tum perspicuis ipsius artis decretis tum suis proprijs rationibus repugnat, etiam hoc ipsum ignorare deprehensus sit, qua de causa inedia suscipiatur: quanq̄ de vsu illarum multo antea Praxagoras satis copiose clareq; scripserit: tū Hippocrates & Diodes, quantum ad hoc spectat, nihil prætermiserint. Hic vero ita rudis est, vt inedias solas ad venarum euacuationem assumendas, eaq; sola ratione laborantibus succurrēdum putet: deinde, per louem, euacuatorio remedio opus habens, neglectis efficacibus illis, quæ ue quocunq; quis velit, celerrime ducere possint, ad oīum leuissimum transcat. Verum age concedatur tibi & hoc, quod inflammationes ex vulneribus medicari eodem modo possint, quo & ille quæ ex

Multitudine pendent, quid tādē faciemus cū multitudine ipsa, quæ in venis etiānum manēs eas extendit: aut etiam cum eadem in arterijs impac̄ta fuerit, quo nam pacto illi succurrendū erit? Ego sanē in huiusmodi oībus venę inanitionem summe idoneam esse arbitror. Incumbat ergo in thoracem tanta multitudo, vt periculum sit, ne aliquod vas in eo rumpatur, nūm vel sic venam nō incidemus, aut membra potius laneis vinculis excipiemus? Illi quidē istud mediū hdius suffecerit, qñquidē cum his loco reuulsiui præsidij vtendum censeret, non intellexit venæ sectionē in reuellendo multo esse efficaciorē: plurimis enim irrefringibili sanguinis profluuio laborantibus, vena sec̄ta fluxum sistimus. At Erasistratum hoc quoq; ignorasse existimo, nam non cuiusvis hominis est scire quæ venę, cum ex aliqua corporis parte sanguis profluit, incidendę sint. Postquam igitur venæ sec̄tio efficere quāmaxime ea omnia potest, quibus hoc tempore indigemus, illum sanē euacuationem vnā cum reuulsione prætermisisse certum est. Quid ergo tu amplius cessas, tempusq; inaniter infumis, & hominem conficis, cum possis illum vindicare & a vasorum ruptura, & quæ illam insequitur inflammatione, & a famis cruciatibus, qui inter remedia inflammationis a te insutuntur? Si. n. multitudo rupturā efficit, tu illa euacuata id quod futurum erat prohibebis: quod quidem si feceris, etiam ex ruptura inflammationem de medio tolles: hac rursus sublata non amplius inediārū vsus nobis erit amplexandus. Tu autē eo quod inediam cuiq; cōsulere cupis, vi-

DE VENÆ SECTIONE

deris mihi ipsemet affectuum qui famis cruciatibus opus habeat author existere. Quid graue erat, E
re quæ lædebat euacuata, nihil negocij deinceps præstolari?

*Inter Remedia quæ Multitudinem emendant; Nihil Venæ sectione præstantius: Quæ omissa Erasistratum
neq; Inedia neq; Reliquis euacuatorijs præsidijs vti potuisse.* CAP. 9.

Sed frustra ego forte tantum laboris infumo, quod præsentem hunc sermonem tibi in memo-
riam redigam. Sanè enim tu ipse nos docuisti in primo de salutaribus libro, vbi de multitudi-
nis generatione quæ in venis consistit præfatus, illius quoque remedia ordine scribis, euacuationem
scopum quidè omnium ipsorum statuens: aliud vero illius genus, alij affectui conferre inquires.
Præterea quæ exinaniant plethoran. i. repletionem (sic enim alimenti multitudinē in venis coge-
ram appellandam censes) tum exercitia, tum lauacra copiosa, tum ipsam tenuē victus rationē esse
iubes. Neque idem euacuatorium auxilium cunctis conferre dicis, vt quod neque omnes omnium il-
lorum vsui simul assuefacti sint: sed alij lauacra, alij rursus exercitia, non nulli item vomitiones
à cibo magis vsurpent. Ad hæc quod non ipsi dem morbis omnes obnoxij sint: verum hic epilepsia,
ille sanguinis sputo, alter etiam vel hepatis vel lienis affectibus, facile corripì possit. Nullo igitur
pactio epilepticum quenq; balneis euacuare attentabimus, id quod tu quoque cauendum recte pu-
tas. Etiam vero neque licui de vasis in thorace ruptura timor instet, huic exercitia iniungemus: pe-
riculum enim est ne illorum vehementia, etiam si non adsit multitudo, ob virium tamen imbecil-
litatem ipsius exercentis vena aliqua circa thoracem rumpatur. Quæ ergo ratione illi succurrere de-
beamus, quæso nos edoce: siquidem quod euacuandum sit vel tu ipse fateris, hincque adeo euacua-
toria illa præsidia, hoc est exercitia, lauacraque frequentia, & tenuem victus rationem abs te habemus.
Cæterum exercitijs ne tu ipse quidem vti putaueris: Quod autem ad lauacra attinet, vtendum ne
his in rebus sic affectis, an nequaquam vtendum sit, tu planè nihil pronunciaisti. Ego vero illud
quod euidenter apparet experientia corroboratum, aperte dicam: tum si de te quoque vaticinari
mihi licuerit, quod tibi forte visum fuit, aperiam. Tu enim ipse in tractatu de sanguinis reiectio-
ne, deligationibus, inedijsque vteris, tanq; quibus solis plenitudinem reuellere, non autem balneis
euacuare, oporteat. Arbitror nanque te vbi vena iam rupta sit, lauacra inhibiturum, cum interim
reticueris si, vbi futura rupturæ suspicio adsit, vti illo velis. Porro vt tu aliter sentias, mihi nihilo
minus euidentis illud satisfacit, quod vniuersis sanguinis fluxionibus ex balneo maxima noxa con-
tingat: & causa huius perspicua est: Sanguis siquidem calido lauacro in vapores resoluitur, ac in
spiritus redigitur, proptereaque ad motum incitatur & in tumorem attollitur: ad hæc corpora calidis
lotionibus, mollia debiliaque efficiuntur. Quis igitur fieri posset, vt cum ipsa iam molliora effecta
sint, isque qui ea rupit, motum simul tumoremque nactus sit, non facile afficeretur? Proinde haud-
quaquam per balnea illos euacuare conabimur, quibus ne propter multitudinē sanguinis venæ rum-
patur, periculum impedit. Reliquum itaque est, vt ad tertium euacuatiuum auxiliorum genus,
puta tenuem dietam, confugiamus. Age sanè postquam hanc quoque tribus modis operatus fue-
ris, nempe tennes paucosue aut nihil nutriendos cibos offerens, vel nequaquam offerens, vel à cœna
vomitus iniungens, videamus in primis quomodo tenuiter cibabimus: nunquid sumpta cœna
vomitus prouocantes? Atqui si modo quadantenus ipsis vomitionibus intrepide vti volumus,
sic exercitiorum vehementia nos euitare oportebit: hoc enim neque plebeium quenquam la-
tet. Superest ergo vt vel inediā præcipiamus, aut pauca nutritionisque expertia alimenta exhibea-
mus. Verum hæc quamuis non insigniter, nutriunt tamen & ipsa: nos vero non addere aliquid, sed
auferre potius cupimus. Vltimo igitur laboriosam illam ac re vera perniciosam, æque atque sacram
aliquam anchoram, quæque oibus affectibus opitulari possit, famem accersimus, ac deinceps & Apol-
lonium & Dexippum ea gratia maledictis incessamus? At hinc te recordari percuperem illorum
quæ ipse de hac re docueris: nam tu ipse de inedia sic videris sentire, tanq; ea ex numero euacuatiuo-
rum auxiliorum nequaquam sit. Verum simulac prius quod volo demonstraui, tum et testimonio-
rum quæ adducis, faciā mentionem. Nam inedia inter res existentes nullū obtinet locū, nihiloque ma-
gis subsistit quàm vel cæcitas vel surditas, quæ oia rerum existentium priuationes sunt. Ipsa. n. ciborum
adiectio ex rebus consistentibus est, vnde & hanc opusque eius, corporis nutritionem esse inuenies:
rursus subtractio eorundem, non eadem cum rebus existentibus est. Neque etiam proferre poteris ali-
quod opus illius, qualis. scilicet illa est quæ in sudoribus venarumque sectione ac clysteribus contingit eua-
cuatio, nec non in edulij nutritione. Media igitur amborum, hoc est euacuationis & nutritionis, inedia
est, vt quæ neque nutriat, neque euacuet. Quæobrem ergo ille multos ob inopiā ciborum famis tem-
pore interisse dixit? Non mehercule ob inopiam ciborum respondebimus, nam eadē quoque ra-
tione animantia in latebris degentia sine ciborum copia perdurare nequaquam possent. Perdurant vero
hæc, idque ipsemet Erasistrato asserente, qui & causam huius rei asserit: Vniuersa namque animalia per ex-
teriorem cutis superficiem, secundum quod magis vel minus de raritate participant, transpirare ait:
quod autem vel magis vel minus rara superficies contingat, tum multas alias causas esse, tum illas
non minimas, quæ secundum caliditatem & frigiditatem, ac quietem motumque, corporum permutatio-
nes fiunt. Si enim qui nos ambit aer calidus existit, & animal exercitijs vacauerit, plurimum tunc ex
eo defluere contingit: At in contrario rerum statu, vbi videlicet ambiens nos frigidus, in superque
animal

Animal sine motu degat, dēfari illico exteriorem superficiē, defluereq; nihil prorsus aut vndequa; parum: & ob id fere quęcunq; latibula incolunt, alimentis opus nō habent. Cum. n. hę sub hybernum frigus. quo tempore in cauernis cōmorantur, toto corpore frigida seque. q; ac dēfari ob quietem reddita: unt, & exterior superficies iam adstricta fuerit, nihil tunc defluere par est, neq; etiam quod euacuatum est, repletionē indigere: alioqui nutrimento opus haberent: ad quod inuestigandum capropter incitatur, quo defectui, quem ex inanitione perceperunt, opem ferant. Pater ergo hinc q; & euacuatio, quę in tota superficie contingit, defectus sit causa: & indigētia ciborum ideo incumbat, quia quod inanitum est, repleri denuo delideret. Atqui posteaq; causa defecerit, ob quā solam animalia cibis indigebant, necessarium omnino est, vt & indigentia ipsa vna deficiat: atq; ea de causa animalia latebras incolētia sine cibis degere possunt, siquidē neq; adiectione indigent. Manifeste itaq; didicimus, q; non inedia, sed potius raritas cutis euacuet, quā si frigore atq; quiete densaueris, quid cōmodi amplius ex famis cruciatu expectabis? Præterea cui de sanguinis spūto periculum imminet, necessario tum exercitia, tum oēs supercalfactiones euitandæ erunt: ex vehementia etenim horum venæ rumpi plerūq; possunt. Supercalfactiones item iisdem modis quibus & lauacra obsunt. Corpus ergo citra vllam calfactionē euacuabis: si. n. id vel lauacris, vel exercitijs calfeceris, ipsas venas adruptionem dudum inclinatas maiorem in modum lēdes. Quę ergo sic affectus consulendi ratio nobis superest? Inediæ nāq; nisi hominem exercitari aut quouis modo caltieri contingerit, euacuare nō possunt: venæ vero sectionē veluti & alia fortiter purgātia medicamenta, quemadmodum manifeste apparet, summe arbitror fugimus. Hęc est illa admirabilis sanē euacuantium presidiorum opulētia, qua abundant hi qui ad inediā confugerunt, quāq; sola si vtemur, iā nobis nihil reliqui fecimus, vt quod sola euacuare nullo modo possit: rursum quibus adiuncta euacuat, ea ipsa maiores longe noxas q; commoda ex euacuatione habent. *



GALENI DE VENAE SECTIONE ADVERSVS ERASISTRATÆOS QVI ROMÆ DEGEbant LIBER

Iosepho Teſtandro Cracouiensi interprete.

*Ab Augustino Gadaldino ad vetustissimorum exemplarium Græcorum
fidem diligenti cura emendatus*

ARGVMENTVM LIBRI


Oſtendit Nunq̃ vsum fuisse Erasistratum Venæ sectione: & q; Cum id non intellexissent eius Sectatores, Tum inuicem sunt aduersati, Tum in grauissimos errores inciderunt.

Quibus de Causis Galenus Erasistratæos Romæ coacti sunt redarguere.

CAP. I.

*De hac re vide
5. meth. ca. 15.*

D



Vm Romam initio venissem, incidi in medicos quosdam, qui a venæ sectione tantopere abhorrebant, vt cum aliquñ æger quispiam propter plenitudinem iā præfocaretur, ne tum quidem hoc auxilio vti vellent. Præterea mulierculam quandā, quæ viginti vnusq; annorum ætatē agebat, ac ex menstruæ purgationis retentione faciem rubicūdā obtinebat, tussiebatq; paululum, & difficulter spirabat, illi curare adorti, primum quidē membra illius laneis vinculis leniter excipiebant, & in inedia exigere iubebant, venam autē secare volebant, nosq; id facere volentes prohibebant. Quia vero domesticis ipsius mulieris familiariter utebantur, & ætate me erat multo superiores, facile ipsis est habita fides.

Ego quidem illis venę sectionē tum tps suadere non conatus sum, sed interrogavi num mihi per eos liceret sanguinē ad vias vteri, remedijs quæ hoc efficere possent, prouocare: quod cū illi propte concessissent, adñ familiarē ipsius egrorē obstetricē, quā & exhortatus, vt vsum illorum experiretur. Verum illa remedijs huius, tpe quo faciū id oportebat, vsum fuisse se affirmabat, quando. s. menstrua purgatio futura in expectatione erat: recitabatq; remedia ordine, quæ mulieri obtulisset: & hæc quidem commoda alioqui erant, eamq; ob rem quo minus efficacia fuissent, nequaquā

Sexta Classis.

bbbbbb ij illorum

DE VENÆ SECTIONE

illorum imbecillitate factū esse videbat. Postq̃ igitur ego ista percepissem, simulq̃ à retētiōe san- E
guinis quartum iam mensem præterisse animaduertē, denuo cum medicis illis cōgressus, vt ad
venę sectionē sese conuerterent persuadere eis conabar. Cum aut̃ id facere noluisent, illorum ani-
mum demirabar, maximeq̃ si eniterentur, vt omni conatu apertis circa vterū venis q̃ plurimis san-
guinem superflū illinc euacuarent: si vero alia quæpiam vena secare, noxiam ex eo euacuatio-
nem euenturā arbitrarent. At ijs respondentibus, q̃ vel absq̃ tālis auxiliij præsentia sanguis exu-
perans sola inedia euacuari posset, taciturnus discedebam, nihil bonæ spei de muliere propter tussim ac spirandi difficultatē concipiens. Aut. n. rupto vase ipsam ex thorace pulmone ue sanguinē
sputo ciecturam, aut synanche, vel laterali inflāmatione, vel peripneumonia, correptā iri præmedi-
tabar: optabamq̃ votis omnibus, veluti in delectu malorum fieri contingit, vt mulier laterali saltē
inflāmatione corriperetur. Incutiebat quippe mihi terrorem tū acuitas periculi, quod ex synanche
peripneumoniāq̃ subitura esset: tū ex ruptione vasis in pulmone lethale nocumentū, id quod po-
stea re ipsa est sublecutum. Dum. n. illa vehementius tussiret, sanguis ēt vnā extrorsum ferebatur.
Atqui tā vel vulgo nō pauci medicos obiurgabāt, q̃ illi mulierculæ venā incidere vetuissent: spe-
rabantq̃ oīno futurū, vt ēt si id prius non fecerint, hoc tñ tempore verecundia ducti, vsum præfati
auxilij concederent. Ceterum cum hi neq̃ tum quicq̃ cōmouerent, sed potius vincula membrorū F
fortius adstringerent: iuberētq̃ vterum remedijs iritare, ac mulierem inedias sustinere, ego et ob
etatem & celebre nomē virorū, nihil me amplius profecturū credens, illinc discessi. Mulier quoq̃
ipsa non ita multo tpe interiecto, insanabili spirationis difficultate coercita interiit. Synanchici
præterea nō nulli vbi eis à venæ sectione interdictū esset, istorū opera perierunt q̃ celerrime. Fuit
& alter quispiā, qui veris tpe, cum per totā hyemem magnopere repletus sine exercitijs degeret,
ac totam faciē vnā cum ipsis oculis adeo rubicundā haberet, quemadmodū si quis pronus capite
in terram defixo, cruribusq̃ in altum protensis sub hmōi figura perseveret, quinto tandem die re-
pēte præ anhclitus difficultate suffocatus est. Hos ēt insculta est mulier, numero quarta, quā illi
venæ sectionis hostes, retentione menstruæ purgationis non pauco tpe grauata, eodē pacto ad
interitum ferē pertraxerant. Nam primis tribus diebus ipsam in inedia conseruabāt, febrī. n. conti-
nua laborabat. Quarta vero luce pauxillum quid sobitionis exhibentes, quintam sine cibis transi-
gere iusserunt: in qua illa grauissime exacerbata desipiēs proliēbat, & clamore iam extra fores ab
illa sublato, vix tandē ab ijs qui eō confluerant retineri potuit. Verum hanc natura copioso san-
guine ex naribus effuso seruauit: & dabat occasio qua non sine admiratione discere poteramus,
quātam habeat facultatem ad hmōi affectuū medelam ipsa sanguinis subtrahio: mox. n. post san- G
guinis ē naribus prorupcionem mulier ab oībus symptomatis libera euasit. Ego vero, quanq̃ an-
tea sermonē cum medicis instituere veritus fueram, q̃ ea considerāre quę illi pro non admittendo
venæ sectionis vsu diciuri fuissent: cum tñ oēs aiaduertēt mulierem manifeste ex sanguinis eua-
cuatione seruata esse: saltē mortuos illos ad memoriā eis reuocandos duxi, quibus siquis venam
secuisset, forte fuissent & ipsi seruati: afferebāntq̃ ad hæc rationes quasdam. Hi vero verba vltro ci-
troq̃ inuoluentes se ipsos impl. cabant, nihilq̃ prorsus certi statuebant, ac postremo ad Erasistratū
confugiebant, quem vtpote primo de reiectione sanguinis libro dicebant declarasse, q̃ vin-
cire ipsa membra, q̃ venam secare longe præstaret. Aiebant præterea illum in opere quod de fe-
bribus inieplis, venæ sectionis neq̃ a principio meminisse, † cum alioqui ea oīa recensuerit quæ
de sanguinis reiectione indicauerat. Ridendus. n. modis omnibus esset, si venę sectione in eo affe-
ctu qui ea maxime indigere videbatur omīssa, de alijs verba facere non destitisset. Afferebāt quo-
que q̃ Erasistratus ipse nō solum in opere de febribus, verum & in reliquis tractatibus omnibus,
venæ sectionem retinuerit: neq̃ etenim vel in quo de affectibus alui tractat, vel in quo de resolu-
tionibus, vel vbi de podagricis morbis differit, aut cum de salutaribus agit, venæ sectionis auxilio
vltus est vnquam, idq̃ cum ille in de salutaribus tractatu multitudinem sanguinis præcipuā mor- H
borum causam esse arbitratus sit. Porro ego ea quę dicebāt iterum demiratus, illos de hac saltem
re interrogabam, num prorsus venę sectione non vtendum censerent, vel cum quis pulmonis vl-
cēratiōe laboraret, vel synanches more præfocaretur, vel vbi menstrua purgatione, hæmorrhoi-
dibus ue suppressis, sanguis redundans ad partes thoracis propelleretur. Illi autem ad hæc respon-
debant, ægrotos qui ab Erasistrato in commentarijs de diuisionibus descripti fuerāt nobis in me-
dium adducentes: inter quos in primis Critonem quendam, ac puellam ex Chio oriundam, pro-
ferebant. Et q̃ illum quidem à principio synanchicis cruciatibus correptum, atq̃ vehementer re-
pletum, hanc vero mensuris retentis sanguinisq̃ multitudine versus pulmonem impetu delato,
Erasistratus (quemadmodum ipsemet in scriptis testatur) per venę sectionem nunquam curasset.

Cæterum cum illi hæc adhuc loquerentur, superueniens Teuthras quispiam ciuis & commilito
meus, vt erat moribus planē ingenuis, Non flectes istos vnquam, inquit, vt qui eousque stolidita-
tis processerint, vt & illos in memoriā reuocent, qui Erasistrati opera interiire. Quid enim, in-
quit, aliud in causa esse potuit, q̃ illi, quos nobis isti proponunt, perierint, nisi quod in eis præter-
missum sit venæ sectionis auxilium? Cur item alij permulti interiierunt, qui per tempus euacua-
ri ab his prohibiti sunt? Et eos deinceps omnes vnā cum ipsis affectibus, quos perpeffis fuerant,
quo-

* *Al. tanti*

* *afferebamq̃*

† *vt qui esset
eorum oīum me-
mor, q̃ in libro
de sanguinis
c. c.*

* *inflāmatione*

A quorumq; ego non multo antea meminī, nominatim ordinēq; recensuit: ibiq; in cachinnum effusus manu me comprehendit, attrahensq; inuitum à medicis abduxit. Quin etiam in sequenti die Erasistrati de diuisionibus commentaria in publicum producta coram vniuerse philosophorum cœtu relegebat, partim vt indicaret Erasistrati culpa & Critonem & puellulam illam Chiensem perisse, partim vero vt medicos natu grandiores ad colloquium prouocaret: Verum illi quia decertare cum adolescente infra dignitatem illorū putabant, tum non comparuerunt: mos enim illo tempore erat, vt aliquis quotidie palam ad publicas quæstiones responsa daret. Quæsitum ergo à quopiam fuerat, nū Erasistratus recte fecerit qd venæ sectione nunq; sit vsus. Hoc problema quando ita visum erat ijs qui eò audiendi causa conuenerant, ego explicauī: proptereaq; Teuthras hortabatur me, vt ea quæ illic locutus fuissē, puero quem se ad me missurum receperat, dictare non grauarer: quia breui in Ioniam abnauigaturus erat, ardentiorēq; animo velle se ea prorsus habere dicebat. Ego itaq; amici consilijs acquiescens, sermonem illum scriptis mandauī. Porro accidit vt liber per illum passim diuulgatus per multorum manus præter sententiam meam vagaret. Atqui oratio ^a† familiari doctrinæ magis, q̃ ^b† publico cuiq; operi quadrans, contexta erat: amicus, n. ille, vt præfatus sum, eā dictari tm̃ cupiebat. Quanc̃q; autē liber ^c† tam humili stylo cōscriptus esset, multisq; defectibus respectu perfectæ orationis scateret, tm̃ eo ipso ille multo maiora effecisse videbatur, q̃ sperare quis potuisset. Omnes etenim ij, qui sese hoc tempore Erasistratæos vocant, contrariam priori rationem ineuntes, iam inde venam secare consulunt, non solum cunctis ijs quos paulo antea commemorauī, verum etiam quauis febre correptis. Quapropter iuxta Stesichori dictum arbitror me apud illos palinodiam aliquā emeruisse, in qua eos cum primis admonendos cēseo, vt in sermonum commercio quātūcūq; velint contentiose se gerant, depolita tm̃ in vtranque partem propensionis temeritate ægrotis parcere discant. Neq; enim venæ sectio inhiēda est per omnia, neq; rursus illos, quibus Erasistratus inedia iniungit, omnes (id quod huius tēporis Erasistratæi vniuersi asserunt) venæ sectione egere arbitrandum est. Huc accedit qd non facile cognitu sit quibus omnibus huius auxiliij vsus conferat: tum vel mensura, vel vena quæ secari debet, vel sectionis tempus, non sine negotio reperiatur: proptereaq; illam in quouis morbo Erasistratū puto adeo neglexisse, vt & in illis qui eā magnopere requirere videbant, ille ipsa vti vetuerit. Et hinc sanē per inflammationis tempus in inedia, vt aiunt, ægrotos degere iubens, hæc ad verbum scribit: Venæ enim posteaquam euacuata fuerint, sanguinem qui in arterias insiliit facile suscipient: quod vbi contigerit, inflammationes minus accident. Si ergo inedia, inquiunt illi, velut euacuatorium auxilium præcipit, multo sanē commodius ad venæ sectionem sese contulisset. Et qd quidē ipse, vbi celeriter euacuare cupit, multo commodius ad venæ sectionem transiisset, probe illi dicunt: nihilo minus tamen hoc loco scopos qui illius vsus aliquando impediunt, prætermiserunt: quos ego processu sermonis recensere conabor.

Quam Dissentiant Erasistratæi in ipsa Erasistrati de Venæ sectione sententia percipiēda. CAP. 2.

Quæritur vero nunquid absolute factū præstantius sit, verū an Erasistratus præsidium hoc aliquā vfurpasse reperiatur. Hoc autē cum ego Romam primum appulissē, omnes qui ex Erasistrati discipulis erant, antea negabant: nunc vero probatissimi quos ego noui, ab his tãquam in re minima discrepare manifeste animaduertuntur. Vt enim cæteros prætereā, Stratonem ipsum tibi in memoriam redigā, qui Erasistrato erat summa necessitudine iunctus, ac eam ob rem cum in patriam scriberet, & seruiuisse se illi hæcenus diceret, inter alia hæc subiungit: Erasistratus iure optimo laudibus extollendus est, præcipueq; qd ea omnia quæ veteres per venæ sectionē cure conati sunt, ille citra illius vsus medicatus est: ^a Quāquam vel Strato ipse, curandi rationes ^b se absq; venæ sectione instituisse in commentarijs suis aperte ^c faretur. Neque vero mirum est qd Erasistratus Chrylippū Cnidiū in omnibus sequat, quippe qui statuerit se venæ sectione (id quod & ille fecit) non vsurū. Idem quoq; & Aristogenes & Medius cæteri q; oēs, qui Chrylippi sententiæ subscribunt, fecisse videntur. Quantū ergo ad ægotantium salutē attinet, multo melius est si credamus qd Erasistratus vsus sit venæ sectione: quantū autē ad huius seculi Erasistratæos, id non credere longe præstiterit. Extreme enim dementia esset, si quis Erasistratum eapropter in affectibus paulo ante enumeratis venæ sectionem silentio præterisse putaret, quia ille alioqui venas euacuādas palam censeat, hūc q; totius curationis scopum statuisse alicui videatur, eò qd illum in quibusdā affectibus famem consulere animaduertit: nāq; aperte constat istud euenire ijs qui venæ sectionis auxilium, parem ipsis inedijs facultatē obtinere dicunt. Quod si tantundē non valeat, & quædam distinctiones necessario postulet: quas inuestigare poterit is qui exacte perdidicerit, quando ipsam euacuationem vel per venæ sectionem, vel per inedia solam, vel per vtraque, commodius facere liceat: iam euidenter ratio eos conuincit. Scripsisset etenim Erasistratus distinctiones has, si mō, vt isti volunt, venæ sectioni tribuendū quicquā putasset. Eoq; pacto oratio istorum in vtranq; partē inclinando se ipsam prodit. Si nanque hæc eādem facultate pollet, Erasistratus & in tractatu de febribus, & in alijs plerisq; quorum superius cōmemini, de venæ sectione aliquid scribere non temere posithabit. Si vero venæ sectionis præsidium eandem cum inedia dignitatem non obtinet, non recte illi sentiunt, qui nos ex ijs quæ de inedia scripta sunt, de venæ sectione quoque coniecturam

A † ἀκουστική.

B † συγγραμμάτι.

C † τοιοῦτος ὧν.

* nūc nō quid

A * Et sane
nel c.

B * semper

C * uiatur

DE VENÆ SECTIONE

A i Grecis i
preſis tēp-
tēpē legi-
mō. i. antiquis
dē tēpē tēpē,
i. dē tēpē.
B^o reſectio.
C^o tēpē an-
tiquis. qēntē
aut ſuerant et
fēbriē. hūc ip-
ſis dē tēpē.
D^o tēpē an-
tiquis. qēntē
aut ſuerant et
fēbriē. hūc ip-
ſis dē tēpē.
E^o tēpē an-
tiquis. qēntē
aut ſuerant et
fēbriē. hūc ip-
ſis dē tēpē.
F^o tēpē an-
tiquis. qēntē
aut ſuerant et
fēbriē. hūc ip-
ſis dē tēpē.
G^o tēpē an-
tiquis. qēntē
aut ſuerant et
fēbriē. hūc ip-
ſis dē tēpē.
H^o tēpē an-
tiquis. qēntē
aut ſuerant et
fēbriē. hūc ip-
ſis dē tēpē.
I^o tēpē an-
tiquis. qēntē
aut ſuerant et
fēbriē. hūc ip-
ſis dē tēpē.
K^o tēpē an-
tiquis. qēntē
aut ſuerant et
fēbriē. hūc ip-
ſis dē tēpē.
L^o tēpē an-
tiquis. qēntē
aut ſuerant et
fēbriē. hūc ip-
ſis dē tēpē.
M^o tēpē an-
tiquis. qēntē
aut ſuerant et
fēbriē. hūc ip-
ſis dē tēpē.
N^o tēpē an-
tiquis. qēntē
aut ſuerant et
fēbriē. hūc ip-
ſis dē tēpē.
O^o tēpē an-
tiquis. qēntē
aut ſuerant et
fēbriē. hūc ip-
ſis dē tēpē.
P^o tēpē an-
tiquis. qēntē
aut ſuerant et
fēbriē. hūc ip-
ſis dē tēpē.
Q^o tēpē an-
tiquis. qēntē
aut ſuerant et
fēbriē. hūc ip-
ſis dē tēpē.
R^o tēpē an-
tiquis. qēntē
aut ſuerant et
fēbriē. hūc ip-
ſis dē tēpē.
S^o tēpē an-
tiquis. qēntē
aut ſuerant et
fēbriē. hūc ip-
ſis dē tēpē.
T^o tēpē an-
tiquis. qēntē
aut ſuerant et
fēbriē. hūc ip-
ſis dē tēpē.
U^o tēpē an-
tiquis. qēntē
aut ſuerant et
fēbriē. hūc ip-
ſis dē tēpē.
V^o tēpē an-
tiquis. qēntē
aut ſuerant et
fēbriē. hūc ip-
ſis dē tēpē.
W^o tēpē an-
tiquis. qēntē
aut ſuerant et
fēbriē. hūc ip-
ſis dē tēpē.
X^o tēpē an-
tiquis. qēntē
aut ſuerant et
fēbriē. hūc ip-
ſis dē tēpē.
Y^o tēpē an-
tiquis. qēntē
aut ſuerant et
fēbriē. hūc ip-
ſis dē tēpē.
Z^o tēpē an-
tiquis. qēntē
aut ſuerant et
fēbriē. hūc ip-
ſis dē tēpē.

ie iuram facere debere aiunt. Quamq; & in hac parte sermo ipsorum inedia inutilem esse indicās, E se ipsum denuo implicat. Nam si ob id in medias probamus, q; venis per eas euacuatis affectus mi- nui cōtingat, multo hercle cōmodius fuerit, vt euacuatione semel adhibita ab inedijs abstineamus, vt quæ & ægrotos ingenti molestia afficere soleant, & vigilias ac inquietudinem, orificijq; vētris afflictionem, tum succorum corruptionē, nec non alui atq; interdū vrinæ suppressionē inferant.

Neq; in Pacis Chionis, neq; in Critonis historia Venæ sectionis ab Erasistrato habitam fuisse mentio- nem, sed Vtroq; quod ea omni sit interijse.

CAP. 3.

QUOD aut Erasistratus re ipsa venæ sectione nunquā sit vsus, ex ægrotis quos in commenta- rijs de diuisionibus recensuit, manifeste colligere licet: in ijs. n. cum omnia ea explicet quæ inter medicandum vnq; gelibet, venæ sectionē nullibi reperiri cōmemorasse. Caterum cum proferat sit omnes per illum recitatos ægrotos nunc proferre, sufficit eorum tm recordari, qui vel i grandioribus natu medicis, vt antea declaratum est, adhuc in memoria habentur, præci- pueq; cum vnus ex illis in priore, alter item in posteriore diuisionum libro, descriptus sit. Præterea cōmoda occasio est, vt in præsentiarum verba ipsa adscribamus, quibus Erasistratus cuncta quæ cir- ca ægrotos acta sunt ordine enumerat, in hunc modum in libro priore scribēs: Puellulę Chienti- ea acciderunt. Primum quidem illi purgationes longo tempore suppressæ fuerant. Deinde subse- cuto sunt tussicula, vna cū reiectione pituitæ. Procellu vero temporis & sanguinis vomitus su- peruenit. Tum quod ad circuitum purgationum attinet, interdum illæ in quatuor, interdum duo- bus mensibus, redibant. Eūā iisdem ferimē diebus quibus purgationes fiebāt, ipsa reiectione accide- re solebat, diebusq; tribus aut quatuor perdurabat. Quapropter inde perspicuū erat illā id genus excretiones loco purgationū sortitā fuisse: q; nā & febricula ijs iplis diebus insecuta fuerat: quæ posthac emēdabatur. Hæc Erasistratus præfatus, deinceps de remedijs hoc pacto scribit: Primis autem temporibus ipsa potionibus q; cæterisq; calfactorijs, deinde etiam per extrorsum applica- ta, reliquamq; adeo quæ ad hoc quadrabat victus rationem medicari ocepta est. Erat enim cir- ca vteri os non intensa durities. Verum cum remedia nihil omnino promouerent, ac vno perpe- tuo circuitu grauitas in lumbos incumberet, humiditasq; nulla compareret, illico febres cōtinuæ intensioresq; prioribus exorta sunt, quas & tusses vehementes, postq; corpus iam mollius factum cilet, insecuta sunt. Altera igitur die periculosum arbitrati duratibus adhuc febribus purgatio- nes facere, a medicamentis penitus abstinuimus: reliquis vero remedijs vli sumus: quemadmodū & in huiusmodi & in alijs affectibus consueuimus. Præterea ad medendi rationem ipso purgatio- num circuitu obseruato, cibaria subtrahebamus. Ea q; ratione reiectione sanguinis nō amplius q; se- mel eademq; pauxilla superuenit. His ille nihil aliud superaddidit, nisi, Quin etiam purulentæ reiectiones profluebant. Atqui hic de venę sectione mentio nulla est, cū tamen, prout omnes ope- rum ipsius artis periti norunt, principium auxiliorum ab illa fecisse oporteret. Sed fortasse quis ex illorum numero, qui ad omnia non grauanti prompte respondere, defensusus Erasistratum di- cet, quod remedia huiusmodi per illum administrata non sint, verum potius ab eo ea gratia nūc prodita esse, quod nos nihil eorum latere possit, quæ acta essent. At opinionem istorum redarguit id quod inferitur, dum hæc ait: Altera igitur die periculosum arbitrati durantibus adhuc febribus purgationes facere, a medicamentis penitus abstinuimus: reliquis vero remedijs vli sumus: quemadmodum & in huiusmodi & in alijs affectibus consueuimus. Præterea ad medendi ratio- nem ipso purgationum circuitu obseruato, cibaria subtrahebamus. In his enim Erasistratus aper- te indicat se non aliorum medendi rationem recitare, sed suam ipsius enumerare, atque omnia quæ circa ægrotam fecisset perscribere. Nam & abstinuimus, & arbitrati, nec non vli sumus, ac obser- uato, & subtrahebamus cibaria, alterum ex duobus manifeste declarat, aut quod Erasistratus pro- pria remedia recitauerit, aut ea quibus alij vli sunt, ipse fuerit amplexus. Porro si ea amplexus est, quorum alij authores fuerunt, iam nobis euidenti coniectura colligere licebit, quid ille de venæ se- ctione senserit. Per ipsam enim ciborum subtractionem rursus nobis alterum duorum insinua- tur, aut quod illa in totum subtrahi, aut diminui debeant: id quod Erasistratus se in muliercula hac ægrotā, quo tempore purgationis circuitus aduentabat, fecisse fatetur. Conueniunt ergo hæc in hac re cum omnibus scriptis illius, quod ille solam inedia ægrotis seruādam consuluerit, venæq; sectione nullo in loco sit vsus. Nisi rursus hic aliqui dicant, mulieri illi venam quidem secā fuisse, verum id auxilium in enarratione omissum esse, eo quod nos ipsi id adhibitum esse autumare possimus, quamuis per illum non sit declaratum. Cur ergo de inedia quoq; nō reticuit, cum de il- la vel eadem ratione nobis suspicari liceret? Eadem autem ratio est, tum de potionibus, tū de supercalfactione, deq; ijs quæ foris applicata sunt. Si. n. neq; de his penitus Erasistratus quicquā scripserit, tamen omnino q; ea a medicis peracta fuissent, cogitare poteramus: quippe qui animo conceperimus vniuersis auxilijs illud commune esse, quod illa administrata fuerint, quamuis de eis nihil præscribatur. At Erasistratus exquisitæ perspicuitatis gratia omnia simul enarrare consti- tuit, ne si nacta inde occasione aliquis hæc quidem, tanquam ægrotæ adhibita fuissent, adijcere pos- set: illa vero veluti iam prætermissa, subtraheret. Præterea quoque hæc Erasistrati enarratio, opi- nioni istorum euidenter repugnat. Si enim muliercula venæ sectionem subiit, inedia frustra est vsurpata:

A vsurpata: quin potius si veritas fatenda est, non frustra solum, verū etiam non sine noxa. Sed istud paulo post indicabimus: Nunc vero illam frustra accersitam esse, vt explicemus, oratio ipsa postulat. Postq̃ enim per tempus purgationis, quæ circuitu quodam fieri solebat, sanguine ad superna perlato periculū immineret; ne mulier q̃nq; sanguinem expueret, Erasistratus plenitudinem minuere cupiens, ad inediā se contulit: atqui hæc superuacanea planè est, si modo venæ sectio qua momento temporis sanguinem superfluum euacuare facillimū fuerat, accersatur. Proinde illi qui Romæ mulieres medebantur, rei quæ contigerat experientia maxime commoti, tēpore quo eruptio menstruorum futura expectabatur, venæ sectionē vsurpabant. Neq; vero quietē illis imperabant, neq; ieiunium, sed melicratū offerebant, victuq; humectante ac lauacris assiatim vtri concedebant. Ab his enim si vel mediocri quātitate sanguis fuerit subtrahitur, purgationes confestim exoriri solent, præsertimq; si infra poplitem aut prope talum venæ sectio fiat. Sed ē diuerso si quis venæ secta inediā sustinere imperauerit, non solum menses prius fluētes cohibebit, verū etiam purgationes quæ iam inculpate euacuabantur, reprimet. Sanguis namq; ciborum inopia arefit, & densior se ipso redditur, eamq; ob rem ad fluendum ineptus euadit. Quæ igitur tum lotæ fuerint, melicratumq; & cibos idoneos assumpserint, ac vinum neq; austerū neq; crassum biberint, his purgationes proculdubio contingent. Ob idq; ego inedias post venæ sectionem non frustra tantum, verum etiam non sine noxa assumi dicebam. Ceterum venæ sectionem puellæ illi Chienfi non adhibitam fuisse ēt ex ijs quæ superuenerant, patet. Sanguinis enim aliquantum expuebat, quem nequaquā expuisset si euacuationem experta fuisset: demum cum præspirandi difficultate mortua sit, ne hoc quidem sic perpessa fuisset. Maximū præterea experimentum Romæ nostra tempestate à venæ sectione est sumptum. Contigit enim cum vulgo mulieres aquā frigidissimā ex niue potarent, vt aut nullo pacto, aut prorsus diminue purgarentur: has tñ medici venæ sectione adeo incolumes conseruarunt, vt neq; sanguinem spuerent, neque laterali inflammatione aut pulmonis, aut synanche caperentur. Non ergo puellam illam Chiensem ab Erasistrato per venæ sectionem curatā fuisse suspicentur: neq; enim ipse cū alia quauis enarraret, auxiliū venæ sectionis, tanquam rem parui momenti prætermisisset. Neq; ēt ob inediā ille, hæc aut multitudinem sanguinis præfocata interisisset. Sed de hac impræsentiarū ista dixisse sufficiat. Trās lato vero ad Critonē sermone,

orationi huic verba Erasistrati adscribemus, quæ de illius affectibus fecit: sic enim habent: Critoni quidem repletio, initium ægritudinis fuit. Accessit ad hæc q̃ in plenitudinem synāchicā iam inciderat, quæ sanè nihil aliud est q̃ paristhmiorum ligulæq; inflāmatio. Plerunq; ergo contingit, vt qui in eam inciderint, suffocentur, ac nisi celerrime illis succurratur, breui intereāt. Cum autem Crito quoq; in horum numero esset, prima quidem die illum more consueto spongijs calfaciētes medicati sumus, eoq; tempore cataplasmata illi applicata reliquimus, vt in curatione perpetuo essent. Exhibita ēt ei sunt catapotia ex castoreo ad aluum ciendam, quæ his cōmode subducta est.

A† permutationem fecisset. et sic ubiq; inferius.

Neminem nō animaduertere arbitror diligentia narrationis omnium eorum quæ circa Critonē acta sunt. Nam & calfactionem per spongiās factam, & vsum cataplasmatum & catapotiorum retulit, adeoque quod per spongiās calfactus sit manifeste declarauit, ac reliqua vt ordine gesta erāt studiose enumerauit: de venæ autem sectione ex composito siluit, nempe q̃ auxiliū istud ceteris vilius putauerit. At tenuia illa quæ in his enarrationibus continentur, commemorare mihi nūc integrum non est: quanquam Erasistratus ipse rursus paulo post ait, Apparebat itaque nobis q̃ affectus ipsi ad pulmonem heparq; ^a† permutari inceperant, ^b† & synanche iam illuc deflueret, eoq; febris augerentur. Hoc loco affectuum permutationem ^c† sinē hypochondriorum tensionē factam esse arbitratus est: vbi quā diligentissime animaduertendum censeo, considerandūq; quale illud sit, quod tibi in dictione hac occurrat, qua affectus permutari inceperant ait: num. scid ad partes quæ inflammantur permutatas pertineat, an ad sanguinis qui inflammationem concitauit

B† Al. ex antiquis. & synanche quidē illi allentaretur - febris autē au, gerentur.

C† in antiquis quæda τῶ καὶ ὑποχόνδριον διατάσσεται. simul cū hypochondriis tensione.

D transtulit. Mihi siquidem primum ex prædictis ne cogitari quidem posse videtur: alterum aut illorum verum esse constat: nam & ego multitudinem in aliquā partem decumbentē sæpius cohibui, quā illa propria virtute deinceps in aliam quauis repellendo trāspōnit. Istud ergo Critoni cōtigisse apparet, veruntamen neq; tum temporis Erasistratus venæ sectionis vnq; meminuit. ^d† Sed cur se totum thoracem vnā cum hypochondrijs ipsis, cataplasmatibus fouisse ait? Quemadmodum autem ex partibus quæ circa ligulam & tonsillas sunt, sanguinis exuperantis permutatio ad loca inferiora fiebat, ita quoque illo ex inferioribus ad caput sursum perlato, cōtingebat partim febris excitari, partim aggenerari symptoma, quo principium neruorum affectum esse indicabatur. Audi itaque & hanc Erasistrati sententiam: Cum autem ab ægritudinis principio iam decimus dies adesset, ac ab instantia sextus, quo tum febris vehemēti insultu redijt, tum obuersio cēruicis accidit, & vna hora transacta tanta insensibilitas hominem inuasit, vt & lotium per lectum emitteret: non multo quoque postea instantia febris aderat. Deinceps inferens ait: Videbatur itaque nobis quod affectus rursus versus caput permutari inceperant, ac circa hanc permutationem febris redijt, quæ postea cum iam partes capiti vicinæ afficerentur, intensā permanebat. Atqui vel nos aduersus hominem sequenti sermone inuegamus. Rectissime tu quidem Erasistrato dicis, affectuum permutationem ad caput factam esse inquiens: multo vero melius fuerat, ^e† si nō quorumuis affectuū, verum eorum qui à plenitudine causabantur, dixisses: vt enim corporis affectus

D† sed quid ait? se totum thoracem vnā cum hypochondrijs ipsis, cataplasmatibus fouisse.

E† Al. ex antiquis. si non affectum dixisset, sed ipsius affectum causasse, hoc est plenitudinis.

partes

partes permutari incepisse nemo dicere possit, ita neque ipsos affectus. Arbitror enim quod, multo consultius diceret, quieuisse quidem priores affectus, alios vero cā permutata exortos esse, ^a† q̄

A† *Fortele gēdum in græcis codicibus, ἡ τῆς ἡγίας, ὡς εὐπρόσ ἐν ὁρί, χῆ τῆς ὁλῆς διηγέσσεως ἐ-
ου, τληθώρα. i. q̄ sanē erat (ut ipse in principio totius narrationis dicebat) repletio.*

B† *Hūc locū clarior ita uertē. Hūc igitur si euacuasset, id quod ad ligulam fluxerat, nequaquam ad infernas partes permuta-
tione fecisset, nec rursus illic ad caput ascē-
di set. Scias ut ubi in ipseis legitur ἐκείνο ἰ antiquis esse ἐκείθεν.*

C† *clarior. Quid. n. ait hūc uidetur cā i teritus fuisse ea q̄ i pulmone irruerunt.*

D* *Al. ἔπραξεν ὡς ἰ. exicantia.*

E* *τὸ πρῶτον. i. modū. sed forte legendum τὸ πρῶτον. i. locū, ut ipse et inferius manifestum declarabit.*

F† *Antiqui codi. græci habent οὐδὲν γούν ἐπὶ πῶν ἰα τρὸς, ἀνθρώπου οὗτος τραφίτο, χαρίζεται &c. ut sic uertat. Nullus igitur medicus, qui dixerit, hō hic nutriatur, rē gratam facit, qui occasione et non addat, qua nutriendū esse hab. orantem iubet: neq. cibum ipsum præfiniat, neq. quantitātē, neq. parandi modum, uel ipsum utendi ordinem.*

G† *clarior ex antiquis. Proinde et omnes in auxilijs quæ administrari iubent, omnia hæc ex ordine in libris scribunt.*

in principio totius narrationis eadē rōne qua & repletio ipsa, aderat: ^b† quā si ipse euacuasset, neq. vnquā morbus earū rerū quæ circa ligulā impactæ erant, permutationem ad infernas partes molitus fuisset, neq. ē diuerso illæ deinceps versus caput ferri potuissent. Quapropter Critonē hunc eodē pacto, quo & ancillula Chienlis interierat, quia illi vena secta non fuisset, inortuū esse cōstat. Sed istud quoque Erasistratus ipse persensisse animaduertit: ^c† neq. n. aliā ob cām ait, q̄ huic interitus cā fuerint ea q̄ ad pulmonem delabebant: & q̄ statim ab initio hominē plethorico affectu implicitū esse cognouisset, tñ maximo ductus errore hæc euacuare non præuenit. Si igit adstruere quisquā velit, Erasistratū, q̄ & peritissimus medicus esset: & affectus illos tñ Critoni ex repletionē, tum puellæ Chienli ob menstruorum retentionē, contigisse compertū haberet: subtractionem sanguinis nequaquā prætermisisse, quin potius utriusque sanguinē subduxisse, verū id in enarratione consulto præterijisse: quid verat & me dicere, qualecunque illud ex euacuatorijs remedijs sit, applicatū quidem ægrotis id esse, in enarratione nihilo minus non esse recitatum? Ecquis. n. sanæ mentis medicus ferre me non posset, si dicerē symptomata illa, quæ vsq. ad mortē apparebant, propter plenitudinem illis accidisse, interitū aut ipsū non alia de cā insecutum, nisi q̄ plenitudo euacuata non fuisset? Quis et ferret istos qui dicunt, q̄ ex ijs q̄ Erasistratus egisset, minuta tñ perscripserit: at de venæ sectione, eaq. quæ per elleborū scāmōniā uē sit purgatione, quia hæc auxilia p se clara sint, nullā mentionem fecerit? Atqui si quis sola cōi snia, qua repletionē euacuandam esse indicatur, venæ sectionem significari asserat, ut quæ et inter euacuatoria remedia annumeretur, quid in hinc eadem lege, alia cuncta euacuatoria præsidia intelligi? Ne ergo amplius ab Erasistrato solam venæ sectionem ægrotis adhibitam esse dicant, verum reliqua quoque cuncta, puta clysteres, vomitiones, purgationes, lauacra, exercitia, frictiones, gestationes, inunctiones, ^d calēfactoria cataplasmata, ceteraq. id genus, quibus omnibus ille aliquando uti potuerat. Si vero non hoc solū sufficit, q̄ euacuandus æger sit, neq. istorum auxiliorum is finis existit: sed in primis ^e modum euacuationis adijcere, posteaq. quibus rebus hæc adamussim indagetur declarare, ac his occasionē & mēsuram & utendi rationem addere opus sit: sequitur sanē q̄ qui saltem de scopo auxiliorum cōmuni verba fecerit, is nō dum vlla ex parte particularium meminisse potuerit. Si enim cōmune quid protulisse suffecerit, frustra ille cataplasmatum, inedia, calēfactionisq. per spongas factæ, mentionem habuit. Siquidem neq. cataplasmata, neq. inediam, nisi ab eo didicerimus, nostra opera inuenire possumus, venæ autem sectio, Erasistrato quoque tacente, vnicuique manifesta est.

Ex ijs quæ in Sanguinis detractione Considerari solent, cum ab Erasistrato in minimis alioquin curioso omijsa sint, Conuinci illum ab ea prorsus Abstinnisse.

CAP. 4.

Sed quis illis istud quis concesserit, absurdū cum sit, tñ ei qui auxilio hoc commodē vsurus est, multæ etiā, cēdemq. pergrandes considerationes supererūt. Inter has aut Prima est, an, quē admodū aliqui sentiunt, q̄libet venā semper secare nihil differat, aut propriē venæ in singulis affectis partibus contineant, quæ ipsarū plenitudinē q̄ celerrime euacuare possint. Secūda vero, utrū semel aut sæpius subtrahere conueniat. Tertia item, qua rōne in his intentiones inuestigandæ sint, quas ubi quis exquisitē cōsiderauerit, mensurā euacuationis cōiectura atlequi possit. Quarta, i qua de occasione, ad quā in primis venæ sectio fienda est, num. sc. ea eligibilis sit, per demonstrationē docetur. Qui igitur a venæ sectione prorsus abstinet, apud hunc harū rerum omnium consideratio perit, ē mediocq. tollitur: eam autem adhibenti, ut omnia ista sequantur necesse est. Quanquā & in reliquis omnibus prælijs eadem est ratio, veluti veratri, scammonij, vini, lauacrorū, cibiq. Si. n. in ægrotis curandis aliquo dictorum nobis uti nequaquā conceditur, tñ neq. occasio amplius, neque quantitas, neq. utendi modus, neq. quicquam aliud ad inuestigandum reliquū fiet: At ille qui vsum istorum probat, hæc omnia discutere necesse habet, idq. non solum in efficacibus auxilijs, in quibus si vel parui momenti quid prætermittatur, confestim maxima noxa ægrotis imminet, verum etiam in minimis quibusq. sanēq. ita quotidie euenire videmus. ^f† Proinde si quis medicus hominē ægroto gratificaturus auxilium aliquod describit, is neq. omittit occasionem qua nutrire ipsum iubet, neque cibum facultatesq. ipsius non determinat: neq. vel quantitātē, vel parandi modum, vel utendi ordinem reticet: quin potius vnumquodque horum illis qui tum ibi adsunt, quo pacto id fieri debeat, singulatim explicat. ^g† Quin etiā pleriq. in libris passim describunt, qua ope quibus uē auxilijs omnia hæc administrari soleant: quorū non nulli quibus alioqui prolixitas sermonum cordi non est, in huiusmodi enarratione orationem protrahunt, idq. genus disciplinæ nō multiloquium, verum diligentem solertiam, esse putant. Hippocrates et cum in plurimis suis operibus breuitati summopere studeret, tamen quod ad venæ sectionem attinet, non est grauatus scribere, tum partem corporis in qua vas secari oporteat, tum euacuationis mensuram, vñ cum occasione ipsa. Erasistratus aut, quem affectu nunc sui venæ sectione vsum fuisse prædicant, multiloquus fuerit licet, tamen, ut ego paulo post indicauero, principio venæ sectionis nomen alijs præsidijs

A fidijs ne adscribere quidem dignatus est: deinde etiam omnia quæ iam recitata sunt utpote tēpus, mensuram, vasis litum, utendiq; rationem prætermisit. E contra vero quæ ratione & omnia in-
 fa, & cataplasmata ægroto offerenda sint, perscribere non est veritus: immo neque olerū decoquē-
 di modum silentio prætereundum putauit. Audi itaque quæ ille in opere de alui curatione scri-
 bat: Prima quidē adiectione farina crassiuscula, tosta ac probe quassata, offerēda est. Cum aut illā
 offerre volueris, in vasculo aliquo frigido infusam, ac aquæ commistā exhibeto, non vna vice vni-
 uersum id quod daturus es, verum bis aut ter commiscens, ne ossa arida effecta ac solutioni inepta,
 multum humiditatis suscipiat: nullum enim horum confert. Ad edendum vero danda sunt affla-
 tim cichoria in aceto non acri infusa, ac inter cibos consumenda, solidaq; ea decoquenda, duas ol-
 las preparando: & in prima quidem iniecta illa decoquere oportet: postquam autem probe admo-
 dum cocta fuerint, ac in altera olla aqua iam bullierit, transponere ipsa in eam conuenit. Verum ci-
 choria reuincta sint, ut facile quouis transferri possint. At ubi ad perfectum cocta erunt, tū aqua
 effusa, sale oleoq; condienda sunt, exhibendaq; ut offerantur. Nū ergo putas quicquā adhuc scri-
 bi posset curiosius, ab hoc præsertim qui adeo tenuia considerauit, ut & admonere operæpretium
 duxerit, q̄ cichoria, quod facilius hinc inde transferri possint, vincire oporteat? Patet enim cuique
 B q̄ ea quæ soluta sunt, non facile transferri quouis possint, ob idq; non solum nos qui medicam ar-
 tem profitemur, verum & coquos olera elixantes curæ habens, ipsos quo paxio illa liganda sint,
 edocuit. Eodemq; animo est præditus, sicubi vel cataplasmatibus alicuius conficiendi modum tradit,
 vel tot istadia inambulare, vel toties perficari, aut aliud aliquid huiusmodi iubet. Ob quæ omnia
 plerique illius superfluam curiositatem non solum non laudant, sed verū & vituperijs incellunt,
 tanquā qui modum terminosq; constituerit, quantitate in infinitum sese extendentes. Quis ergo
 credat hunc, qui tantopere alioqui curiosus sit, ut alijs auxilijs, sic & venæ sectione vsum fuisse,
 cum de illa non alibi, nisi semel, ubi de sanguinis resectione agit, mentionē fecerit? Atqui ille ne-
 que tū ea usus est, sed omnino econtra, Chrysippū, eo q̄ venæ sectionē neutiquā videri pauerit, sum-
 mopere laudauit, in superq; demonstrationes quasdam attulit, quibus Chrysippi de venæ sectione
 dogma modis oībus asserere conatur. Nā hic illā magis sanguinē spuētibus, q̄ ips quibus
 aliqua corporis pars inflammationi obnoxia est, quadrare dicit. Caterum de hac quoque re alio loco
 dicitur: Nunc vero quod antea eloqui exorsus erā, repetēdū est, q̄ Erasistratus. I. quasi alioqui vni-
 uersos suos sermones in immensum extrahere non consueuisset, & bis terq; interdum in diuersis
 operibus eādem sententiā replicasset, illis tamen vel semel quinque syllabas adscribere cōtempnit,
 C quibus interpositum ceteris auxilijs phlebotomia. i. venæ sectionis nomen enunciare sibi inte-
 grum erat. Taceo hic, q̄ & quantitatem illius, ut in alijs fecit & tempus, reliquaq; eiusmodi, prout
 superius significatum est, indicare omnino debuerit. Proinde non nulli medici fuere, qui quātita-
 tem euacuationis, signis quibūsdam definierunt, veluti si vel color, vel tenor, vel sanguinis fluxio
 mutetur, aut pulsus tempore subtractionis ex debilitate collabantur ac sudores prorumpant, aut
 ea quæ aliqui labores vocant, aut denique vomitus vehementiores, exuperantes ue alui defec-
 tiones appareant. Alij etiam vsq; ad animi defecionē, euacuationem producendam putant, præser-
 timq; liquid in illa pro euacuationis portione cōtingat. Nā & ob id bilem pituitam ue, cum ea in
 os ventris influxerint, persæpe animi defecionem manifeste fieri videmus. Aliqui item tum co-
 loris in toto corpore permutatione, tum pulsum alteratione, commodatam subtractionem con-
 iecātur: eamq; ob rem modis omnibus illos improbāt, qui arbitrātur multo consultius esse, ut cō-
 siderata ex certis indicijs noxijs humoris natura, denuo redeatur ad illius euacuationem, q̄ si eadē
 semel copiosa fiat. Nec defuerunt quidā, qui et constitutā quandā mensurā illius proponere aude-
 rent, perinde quasi duabus heminis atticis, aut paulo plus minus ue moderata subtractio circūscri-
 beretur: quippe cum ex commodata proportione, adhibitis ad id & ætate hominum & natura,
 D & tempore anni & regione, nos ipsi maius minus ue cuiq; quadrās inuenire possimus. Quare &
 Erasistratus certum nobis numerum friccionis tradit: quo et si ab exquisita illa mediocritate aber-
 rauerimus, nullā tamen notabilem noxam incurramus. Mensuram autem de venæ sectione nullā
 planē protulit: nam, sat scio, de venis quæ incidi solent, non pauca scripsisset, maximeq; cū & Hip-
 pocrates tum eius, quæ infra poplitem propeq; talos est: tum illius, quæ vel in fronte recta est: vel
 earum, quæ sub lingua existunt, frequenter meminerit. Præterea hoc loco referre non est opus,
 quātum ad venas circa cubitum attinet, quod neq; Erasistratus reticisset, num illæ omnes in om-
 nibus morbis secandæ sint, an quemadmodum Hippocrati placet, aliæ in alijs. Eius enim, qui tam
 diligenter omnia scriberet, proprium officium fuerat, si liquid in hoc præsidio a germana mensu-
 ra discreparet, ad certos terminos redigere, ac quam sententiā in venis explicandis haberet, id
 quod & alij medici fecerunt, adscribere. Quidam enim nihil interesse dicebant quancumque ve-
 nam quis incidere vellet, ut quod ex vnaquaque æqualis totius euacuatio fieret. Rursum alij ingē-
 tem vel in hac re diuersitatem contingere censebant: nam aliquas ipsarum celerius, aliquas autem
 longa temporis mora affectam partem euacuare asserebāt. Cum igitur ille nihil tale scripserit, nec
 venæ sectionis scopos declarauerit, clare vnicuique patet cum vniuersas has rationes ideo inter-
 misisse, quia præsidio hoc nunquam sit usus. Perinde enim ut qui nunquam in ægroto aliquo

* τόνον

† Erasistratus
 .i. de alui curatione
 lib. 1. cap. 1.
 nus et mem-
 n. 1. 6. 1. 1.

* non multum.

† Al. dicitur
 .i. de alui curatione
 lib. 1. cap. 1.
 nus et mem-
 n. 1. 6. 1. 1.

† Al. ex anti-
 quis. i. in super
 demouit. actio,
 quæ Chrysippi
 de venæ sectione
 ne dogma asse-
 rere videtur,
 nō magis eorū
 qui sanguinē
 spuēt, est
 cois, quam a-
 lioquin, qui
 bus aliqua cor-
 poris pars pule-
 rima labora-
 tur. Certe
 riu. c. 1. vide
 et superius pa-
 gi. 5. c. d. & i
 tra pag. 13. ab

DE VENÆ SECTIONE

cataplasmata expertus est, is & differentias ipsorum & conficiendi modum, & occasionem rationemque vtendi describere nequaquam potest (solum enim ipsi, qui illa quicquid more Erasistrati administrauerunt, necessario incumbit de horum singulis disserere) eodem pacto quicumque venæ sectione penitus non sunt vsi, occasionem illius, modumque vtendi, & mensuræ scopos, tradere nequeunt. Verum qui illa vtuntur, eos in primis & de his omnibus, & multo magis de venarum differentia distinctum tractare operæpretium est, ac ad illa vt si nihil aliud, hoc tamen commune facere, quod nihil differat si hæc vel illa secetur, quia cunctæ inflammatas partes ex æquo euacuare possint.

Erasistratum Hac etiam ratione à Venæ sectione Abstulisse, quod in febrim, ac inflammationum curatione, in quibus conuenit maxime, mentionem de ipsa non fecerit.

CAP. 5.

Verum eiusmodi rerum nihil scribere, ac vsum omnem auxilij de medio tollere, in eo præsertim affectu, qui illud omnium consensu præcipue requirebat, quis id manifesto argumento esse non diceret, quod Erasistratus auxilio ipso nunquam sit vsus? Quid enim difficultatis fuerat cum in tractatu de febribus hæc verba faceret: Igitur circa ægritudinum principia ac inflammationum generationes omnis sorbitionum ciborumque adiectio prorsus subtrahenda est. si illic adscripsisset, Vtendum vero venæ sectione. quo totius orationis series talis esset: Circa initia ægritudinum ac inflammationum generationes, omnis sorbitionum ciborumque oblatio auferenda est, vtendum vero venæ sectione. Inflammationes enim quæ febres faciunt, vt plurimum ex repletionem fiunt. Si ergo in huiusmodi temporibus adiectiones offerantur, easque concoctio ac distributio pro suarum actionum facultate vicissim reddant, & vasa nutrimento impleantur, adhuc multo maiores ac vehementiores inflammationes fieri tunc continget. Commodius itaque fuerit cibaria non excludere, illicoque venæ sectione vtī. Et talis quidem dictio esset, si ille vt in edijs, ita & venæ sectione, vtī voluisset: verum cum id non adscripserit, quomodo quis virum crediderit eius remedium vsum laudasse? Cum vero neque in alio quopiam opere medicinali hoc fecisse illum constet, aliquid etiam multo firmitus de illius sententia pronunciare audebit. Quis enim arbitrari posset, quod Erasistratus, cum alioqui loquacitate quam prolixissima gaudeat, grauatus fuerit vel semel suis commentarijs quæ cōscripsit, quatuor aut quinque syllabas addere? Ego itaque et si nulla Erasistrati monumenta iam superessent, omniaque perisissent, id quod & Chrylippi libris ferè imminet, tamen discipulis illius sententiam sui magistri profitentibus credere magis adduceret, quam his qui Erasistratum ne paliquando viderunt, neque ullos illius discipulos, aliosue qui ad illos discendi gratia proficiscebantur, aut qui ipsi rursus familiariter vterentur, conspicati sunt: sed potius ea temere post tot annorum sæcula asserunt, quæ neque ipsi cognouerunt, neque ab aliquo qui cognouerit, audiuerunt, neque Erasistratum quatuor saltem vel quinque syllabas de hac re scripsisse animaduertuerunt. Nam *τέμνειν φλέβα*, hoc est venam secare, quatuor syllabis exprimitur: *φλεβοτομία* vero quinque syllabas vsurpat: proinde id quod superius verbis Erasistrati per me adscriptum est, puta, vtendum vero venæ sectione, nouem syllabis græce effertur. Quiescant ergo illi iam, qui tum studiosis, tum egrotis ipsis artis commoda eripere conantur, dicentes Erasistratum quidem vsum venæ sectione esse, verum eius mentionem ob id non fecisse, quia illa, quam cataplasmatum olerumque decoquendi ratio, multo euidentior esset. Si enim artis studiosi eam ob rem venas secare in animum inducent, quia quemadmodum venæ per inedia euacuata inflammationes discutiant, ita & venæ sectio, omnes sanè deinceps illos quos Erasistratus in ediam sustinere iubet, venæ sectione curabunt. Atqui vel hoc vile etiamnum, abiectumque est.

Errare etiam quàm maxime Erasistrat. eos, ac ipsi Erasistrato Aduersari cum Venæ sectionem suscipiunt.

CAP. 6.

Cæterum si adolescentes, qui neque de venæ sectionis mensura, neque de venarum secundarum ratione, quicquam audiuerint, ad præsidium hoc sese accingant, id statim, vt dictum antea est, ab ipso quoque initio maximum afferret nocumentum. Præstiterit igitur illos neque penitus venæ sectionem aggredi, quàm citra respectum dictorum, auxilio manus admoovere. Plures enim hac ratione perierunt, quàm quibus non fuerat vena secta. Nam medici natu grandiores venas tunc temporis nunquam secantes, alijs euacuatorijs auxilijs utebantur, quæ idem quod & venæ sectio verum longiore tempore efficere poterant: nisi si ob affectæ partis dominium vel plenitudinis excessum, mors ægrotum præoccuparet. Sed qui nostra tempestate febres cunctas in principio venæ sectione indigere putant, non mediocri hercle noxa ægrotos afficiunt. Sic enim libimet de huiusmodi auxilio persuaserunt, tanquam si ab Erasistrato ita scriptum esset, vt ego non multo antea additis ipsi orationi nouem syllabis significauī, quod sententia talis fieret, nam eius denuo meminisse consultius fuerit: Igitur circa ægritudinum principia & inflammationum generationes ab omni prorsus sorbitionum ciborumque adiectione abstinentum est: vtendum vero venæ sectione. Talem enim Erasistrati sententiam nostri temporis medici ægrotis minime consulentes esse volunt, cum alia quidem tempora scopique ipsius inedia, alia item venæ sectionis habeantur: quæ ego omnia in præsentī commentario ordine idoneo explicabo. Nunc siquidem veluti cum illi à senioribus persuasi nouam auspicabantur palinodiam, sic mihi quoque propositum meum omnino immutandum est, eaque ratione inhibendum censeo illis, qui hæcenus venas temere secarunt,

A carunt, ne eas in posterum penitus secent. Vt enim Plato ait, Minus aberrare eos consentaneum est, qui ea non aggrediuntur quæ non norunt, quàm qui illa trahant quæ nunquam didicerunt: nam hoc idem & isti faciunt, sibi ipsis persuadentes, quòd & quibus venam secare expedit & cætera id genus quæ à me recitata sunt, inuentu facilia existant: hincq; adeo in cuiusque morbi initio inedia cum venæ sectione ex æquo vsurpant: ac hoc ipso, si vera fateri licet, Erasistrati sententiam modis omnibus inuertunt. Nam & venas secant, & extemplo à venæ sectione nutriunt, cum ille contra venas secare inhibeat, lineq; nutrimento degere studiose consulat. Quia vero isti
 «^a† veritatem multo magis quàm Erasistratum in honore habēt, ostendere eis operæpretium est, quòd sermo ille quem de sanguinis reiectione conscripsit, non proprie ad illum solum affectum pertinet, vt qui vnicuiq; phlegmoni sit communis. Verba autem sic habent:^b† Adhæret enim ijs
 « tempore reiectionis ex inflammatione periculum, in quo offerre nō facile est. A venæ vero sectio
 « ne inedia longo tempore tolerāti, ne virtus eius exoluatur, periculum imminet.^c† Sic ille de ijs qui sanguinem vomunt, verba facit, & ea de causa eis venam secare prohibet. Cæterum quòd ipse inflammationem subsequi suspicatus sit dum ait: /offerre non facile est, hoc est, dare cibaria: & à venæ sectione inedia longo tempore toleranti, ne virtus eius exoluatur, periculū imminet/ vni
 B cuique in conspicuo est. Neque enim illic ad sanguinis reiectionem quicquā proprie spectat, quo quis à venæ sectione absterri possit: verum vtraque hæc, hoc est, neque propter inflammationes cibos dare, atq; id^d† tempore venæ sectionis} facilitantibus periculum de resolutione virium imminere, cum febribus quoque communia sunt. Porro si diligentius animum aduerteris, reperies Erasistrati sermonem hunc venæ sectionem in febricitantibus multo magis quàm sanguinē spuē tibus detrectare: à principio enim dum sanguis reijcitur haudquaquam vas ruptum inflammatione corripitur: at febrium initia vel Erasistrato teste, necessario inflammationis principium habent. Proinde si ad corroborandam rerum incertarum fidem ijs quæ manifeste apparent vtēdum est, vidī ego plurima vulnera, quæ priusquam agris vena secaretur, coalescebant. Fieri ergo nihilo secius potest, quòd vas ruptum nullo pacto inflammetur, dummodo nos cætera rite administruerimus, sanguinisq; ^e† quantum nobis visum fuerit in tempore euacuauerimus. Præterea si Erasistratus dicit, quòd necessarium sit tempore quo affectæ partes inflammatione corripiuntur, inedias sustinere: ideoq; virtutem venæ sectione antea dissolvere veretur: multo magis ab ipsa in febricitantibus, quàm in sanguinem reijcientibus, nobis cauēdum est. His etenim, venam ruptam priusquam inflammetur coalescere possibile est, & multo magis si euacuati fuerint: febricitantibus autem partem aliquam iam inflammari necesse est. Cæterum quòd possibile sit vas sine inflammatione conglutinari, id alicui etiam ex reliquis vulneribus credibile apparebit. Frequenter enim vidimus, cum quibusdam singulari certamine pugnantibus integrum crus brachium ue abscisum esset, coaluisse tamen vulnus antequam inflammatio oboriretur: quod quidem multo magis continget, si, vt Hippocrates ait, sanguis copiosus illico fluxerit. Sæpius etiā foramen in cauas thoracis partes illatum, in tribus diebus conglutinatum conspeximus. Quin etiam nuper in palæstra aliquis insigni plaga accepta, extemplo vehementer tussiendo, duas ferme sanguinis cotylas reiecit: sed ille, quia ei statim vena secta esset, aliāq; quibus opus habebat, facta fuissent, neque omnino deinceps tussiuī, & nunc quoq; sanus incolumisq; degit. Ex his itaque dispicere licet, qd si quis vel adhuc Erasistrato obtemperare velit, abstinere magis à venæ sectione in ijs debeat quæ iam inflammari inceperint, quàm quæ non dum inflammatione sunt correpta.

Ex eisdem Erasistrati verbis, quæ ab eius Sectatoribus adducuntur, Conuinci quòd ipse Venæ sectione non sit vsus.

CAP. 7.

P Raterea ne illud quidem minus clarum est, qd Erasistratus venæ sectionem neq; cum inedia neq; ante ipsas inedias, vnq; vsurpauit. Veruntamen non nulli eò contentionis dementiæq; peruenerunt, vt cum sermones hos audiuerint, discutiendorum eorum nullam sanè rōnem inueniant: tanq; vero nihil illis obiectum esset, propriam sermonum farraginem auspicantur, vnam illam sententiam in ore habentes, quam Erasistratus his verbis asserit: Consequens etiā est qd circa inflammationis tempora vulneratis nihil sit offerendum: venæ enim euacuata, sanguinem qui in arterias insilierit, facilius suscipient: quod vbi contigerit, inflammationes minus euenient. Et sic ille persuasi qd ipse venæ sectione vsus sit, hinc aperte colligi posse aiunt. Quo. n. loco ipsam inedia veluti euacuatorium præsidium ille accersit, multo sanè magis, inquit, ad venæ sectionē se accinget. Aduersus quos si quis dicat, quòd per ea quæ allegant, Erasistratum quidem venæ sectione ante inedia vsum esse non demonstrat: sed potius consequens esse ostendant, quòd ipse postea illam vsurpauerit: isti hunc ridentes, Tu tandem, aiunt, quid consequens sit cognoscis, Erasistratus autem non cognouit? quali vero ille ingenio exercitato non fuerit præditus, tuq; illo multo sis promptior, ac rationibus magis polleas. Si itaque volueris, illi vt te discendi causa frequentet, consulemus, quòd scilicet quid ad quamque rem vel consequens, vel pugnans sit, cognoscere assuescat. Atque his verbis habitis illinc discedunt: in posterum vero, vt collocutoribus aliquam contumeliam inurant, adiungunt sibi hominum perfidiæ frontis cæteruam adeo copio-

Sexta Classis.

cccccc

sam,

A† Al. non veritatem, sed Erasistratum.

B† Vide supra pag. 5 d. quo locus hic illic legatur.

C† Al. ex antiquis. sic sermo, non quia spumant sanguine, nec propter prohibet vena laborantibus secari, sed quia ipse in inflammationem incipit sit subsequens esse, in qua ait, offerre quid de, hoc est dare cibaria, nō est facile: ei vero qui post venæ sectionē longo tempore sine cibo permanserit, periculum est ne vires exoluantur. Neque hoc loco ad sanguinem et c. D† post sectionem vena. E† qui phlegmonē facit, vna erat, quantum nobis & c.

DE VENÆ SECTIONE

fam, vt præ illorum clamoribus nemo loqui quicquam possit, eiusmodiq; finem congressuum statuunt. Sed nos impræsentiarum eum non quarimus qui conuicia spargenti vices referat, verum in primis quidem num Erasistratus venæ sectione aliquando sit vsus: Secundo autem, quas nam hoc auxilium vires habeat, indagamus. Atqui horum vtriusque proprie habentur demonstrationes. Quod enim Erasistratus venæ sectione non sit vsus, testantur & monumenta illius, & discipuli fide dignissimi, Chrylippiq; vniuersum auditorium: Ceterum de auxilij huius facultatibus non eadem est ratio: nam de his enunciata quædam quàm uerissima, nec non & conclusiones selectæ afferuntur. Præterea si quis istis quoque posthabitis, solum rerum ordinem sequi voluerit, vel sic scripta Erasistrati, quia nihil tale in his proditum sit, modis omnibus periclitabuntur. Reputa igitur hæc in animo, præsertim exordio illinc sumpto, vbi ille in de reiectione sanguinis Chrylippum laudibus extollens, quod loco venæ sectionis membra vinculis excipere consueuisset, hæc ad verbum scripsit: Hoc ipsum autem facere volunt ij, qui sanguinem reiicientibus venam secant. At Chrylippus multo consultius agit, vt qui non solum id quod instat præ oculis habeat, verum & impendentis periculi curam gerat: † adhæret enim his tempore reiectionis ex inflammatione periculum, in quo offerre non facile est: à venæ autem sectione inedia longo tempore toleranti, ne virtus illius exoluatur, periculum imminet. Atqui hic causam non adiecit, ob quam tempore inflammationis inedia iniungat, vtpote quæ ab illo declarata est, cum in hanc sententiam scriberet: Consequens est quod vulneratis circa inflammationis tempora nihil sit offerendum: venæ enim euacuata, sanguinem qui in arterias insilierit, facilius suscipient: quod vbi contigerit, inflammationes minus contingent. Quapropter ille inedias tempore inflammationis ea causa laudat, quia illæ venas euacuent: verum si ambas has sententias in vnū redegeris, sermo integer talis erit: Chrylippus sanè recte fecit, qui non secuerit venam ijs qui sanguinem reiiciebant, eo quod illi paulo post euacuatorio auxilio, puta inedia, indigebant. Præterea idem iste sermo si compendiosius quoque dicatur, eiusmodi erit: Sanguinem reiicientes nequaquam sunt euacuandi, quia paulo post inflammatione ingruente euacuatione opus habebunt. Etiam vero clarius is hoc pacto explicaretur: Ante inflammationis tempus venas euacuare non licet, ipsis quippe euacuatis inflammationes cessant. At sermo iste euidenter sibi ipsi repugnat, nisi si quis suppetias illi laturus, duo hæc temere adijciat, quod videlicet satius sit vt corpus per inflammationis tempus euacuetur, non ante: quodq; inedia sit magis quàm ipsa venæ sectio vsurpanda. Sed si hæc dicat, nos hunc neque quod propositum fuerat demonstrasse, neque sibimet consentanea dixisse, respondebimus: in hocq; has partes discrepare dicemus, quod ordinem sermonum non obseruent. Omnibus enim hominibus, qui præsertim tantum mentis possident, vt consideratione etiam paucillum quid consequi possint, perspicuum est, quod huic qui sanguinem in arterias transilientem per euacuationem venarum ad proprium locum reducere velit, id primo quoque tempore sit faciendum. Manifestum etiam est, quod euacuatorio auxilio quàm celerrime vtendum sit, vt quo & breuissimo temporis spatio, & sine vlla corporis perturbatione, euacuationem quamuis perficere possimus. Quantum enim inedia persæpe lædant, superius demonstratum est. Proinde in hunc modum alicui dicere integrum erit: Arbitror equidem ridendos esse eos qui Erasistratum quandoque sanguinem reiicientibus venam se cuiisse putant, quandoquidem vbi inediam tanquam euacuatorium præsidium laudat, multo hercle magis ipsam venæ sectionem laudaturus fuerit: vbi quoque inflammationis tempore euacuatione opus esse arbitratur, sub illius initium magis quàm cum futura est, ipsam laudaturum fuisse in confesso est. Neque etenim Erasistratus rerum adeo imperitus erat, vt non multo citius sanguinem ex arterijs in venas reduci putaret, cum neque circa insultus initium ille vehementer esset densatus, neque à calore febrili tantopere eliquatus, vt ob id crassiusculus efficeretur. Nam qui hoc ipsum assereret, semet potius deridendum quàm illos quos accusat exhiberet: quandoquidem cum Erasistratus ipse scribat venæ sectionis vsum ea causa non esse vsurpandum, quia inflammationis tempore longe melius sit vt assumptionem euitemus.

Desiderantur hoc loco non pauca.

Aduersus quendam Erasistratæum, quod cum Erasistratus multis locis Repletionem curarit, de Venæ tamen sectione non fecerit mentionem.

CAP. 8.

Continere immedicabile, aut profectò non facile sanabile, qualia ipsis quoque hæmorrhoidibus accidunt. Porro cum nos membrorum deligaturas, diceremus multitudinem absque venæ sectione attrahere ad se posse, ille hoc ait impossibile in plethoris esse, ob quas Erasistratus brachia manusq; ac tibias aduri dixit, fieriq; id, quia vasa propter sanguinis multitudinem intenderentur. Qua ratione ergo in illa id quod in profundo est delabi amplius poterit, cum & sine illo ne ipsa rumpantur periclitari iam videntur? Atqui iam declarauimus quod Erasistratus Chrylippum laudauerit non apposita, vt ego nunc scribendo faciam, aliqua sermonis distinctione, verum absolute sententiam suam prodens. Oratio nanque sic habet: Deligationes vero lancis vinculis circa alas ipsas ac inguina faciendæ. Deligationes enim inquit,

† Vide supra pag. 5. d. et p. 13. a. qño hic locus legitur.

* Exnctus

* παρατηρη-
ται, quæ de
Elione hic et in
fra interpret
uerit aduri.
ceteri aut im-
pleri uertunt.

A inquit, faciendæ, neq; interim vtrum hoc auxilium plethoricis solis nihil commodi afferat, alijsq;
 " è diuerso emolumento sit futurum, sermoni addidit, sed simpliciter pronunciauit, quò de omni-
 bus dictum istud intelligamus. Atqui, aiebat ille, si de omnibus id intelligendum esset, ipsemet
 istud declarasset in hunc modum scribens: Deligationes in omnibus faciendæ. verum simplici-
 ter protulit, Deligationes lancis vinculis circa alas inguinaq; faciendæ. eò quòd nos ipsi suspicari
 possemus orationem hanc de illis tantum habitam esse, in quibus ad membra sanguinem transfer-
 ri possibile est: nam in quibus id fieri nequit, ne vincula quidem eorum membris sunt adijcienda.
 Cur ergo, aiebamus nos, hoc quòd nunc dicis, Erasistratus non scripsit? an quia ijs qui adeo reple-
 ti sunt, vt eis brachia, tibiaeq; ac cubiti adurantur, sanguinem subtrahere necessarium sit, cæteris
 vero sola membrorum deligatio sufficiat? Quoniam, inquit, non hominibus vulgaribus scripsit,
 verum ijs qui ea quæ res ipsas necessario consequuntur, cognoscere atque operari possint, impos-
 sibiliq; nequaquam aggredi in animum inducant. Non ne ergo, inquiebamus, si aliquando ple-
 thorica dispositio corpus occupauerit, etiam si Erasistratus istud nō scripserit, venæ sectione opus
 esse dices? In confesso enim est, quòd hoc omnibus cognitum sit, ideoq; ab Erasistrato non est
 descriptum: cæteros nanque affectus quicunque sine repletione fiunt, Erasistratus seorsim mede-
 B ri iussit. Verum cum ille ad hæc obstreperet, primum quidem hortatus eum sum, vt sententiā
 ex tertio de febribus descriptam audiret: deinde vero & eam quæ in priore de salutaribus commē-
 " tario habetur. Nam quæ in tertio de febribus reperitur, hæc est: Igitur circa ægritudinum princi-
 " pia, ac inflammationum generationes, omnis ciborum sorbitionumq; oblatio subtrahenda est, ple-
 " runque enim inflammationes, quæ febres suscitant, ex repletione fiunt. Si ergo in huiusmodi tē-
 " poribus oblationes dentur, & eas cōcoctio distributioq; pro suarum actionum facultate vicissim
 " distribuunt, venæq; alimento impleantur, adhuc longe maiores ac vehementiores inflammatio-
 " nes sæpenumero fieri accidit. His verbis Erasistratus nomen plethoræ, i. repletionis aperte descri-
 psit, modumq; illius curandi tradens inediæ commemorat, venæ vero sectionē silentio planè præ-
 teriit. Quapropter ad Erasistratæum illum me conuertens, quater, inquam, o amicissime mētutus
 es, quandoquidem Erasistratum repletionis medicandæ rationem separatim scripsisse patet. Idem
 nanque vel in priore salutarium libro, ipsaq; illius præfatione recitat, quòd cuique cognitū esse pos-
 sit, illum cum repletionis remedia ordine scriberet, quiduis potius quàm venæ sectionis memi-
 " nisse. Dictio autem sic habet: Summā in quibusdam sanitatis curam rationemq; habere oportet,
 " ideoq; qua via quis eum qui in repletionem fieri consuevit affectum cognoscere atque obserua-
 " re possit, in primis colligendum est. Incipiente enim ea, a dissoluentibus abstinendum quàm ma-
 " xime est: si autem illa non dum adsit, antequam ægritudinis initium fiat, illis vitior. Atqui plures
 " modi extant, quibus huiusmodi affectus dissolui potest, neq; iidem cunctis quadrant. Sed de his
 " iam ordine dicere cōstituiimus. Qui ergo corpus laboribus exercere consueuerunt, his multo præ-
 " stantissimum fuerit, vt illos paulo plures quàm pro consuetudine ineant, ipsisq; affectum hunc
 " dissoluere tentent: ab exercitijs vero sudores in balneo proritent. Porro siquid supercalēfactio-
 " ne exiccatum est, tum pluribus lauacris vti, hisq; omnibus peraetis in multa quiete longo tempo-
 " re nullas oblationes assumentem degere, consuetum est. Illo enim tempore repletio summo opere su-
 " stollitur, præsertimq; si post exercitia & lauacra quis longo temporis spatio nulla oblatione vta-
 " tur, quiescatq; postea aliquandiu. Prandium vero subtrahendum est, sed & cœna minor solito as-
 " sumenda. Tum qui offeruntur cibi nutrimento ferè careant, veluti sunt olera pleraque, tam cruda
 " quàm cocta, cucurbitaq; ac cucumeres, peponesq; teneri, & ficus recentes: legumina item cum
 " oleribus cocta. Panis quoque omni vitio careat. Nam sic vniuersa talia partim aluum lubricā red-
 " dent, partim nutrimenta quæ ex illis fiunt, neque copiosa neque fortia efficient. Verum a carni-
 " bus piscibusq; ac omnibus rebus cum lacte chondroq; & amylo elixatis, & cæteris id genus ali-
 " D mentis dicto tempore abstinendum, vel prorsus paucis vtendum. Huic autem victus rationi dili-
 " genter ob id insistendum, quòd repletio iam consistens, secure sustollatur. Cæterum qui corpus la-
 " boribus exercere non sunt assueti, his plura exercitia commodum nō est iniungere ^a†: ^b quanquā
 " hæc alioqui, prout plurima alia, euacuationes tutas faciant. Præterea vero quicunque ad vomendū
 " propensi sunt, vt a cœna vomitiones instituant, omnibus communiter vtile est. Ne autem ad ali-
 " quid aliud minus idonei fiant, vomitus ab oblatione non multum temporis intercedat, sic enim
 " cibi adhuc in superioribus partibus existentes facilius euomentur: proindeq; alimenta quæ ex ip-
 " sis cibis generantur, non multo ante vomitionem distributa sint. Ad hæc postero die ^c† lauacra, su-
 " doresq; prouocare oportet. Quin etiam euacuato iā corpore, atq; repletionem ^d restauratiōem na-
 " cta, paulo post ad consueta redeūdum. His ergo verbis Erasistratus clare per omnia indicauit, q
 " ad repletionis affectum medicandum alijs omnibus auxilijs vsus sit, venæ autem sectionem nun-
 " quam adhibuerit: istudq; & in sequente operis parte innuit, dum in hūc modum loquitur: Hæc
 " vero animo reuoluenda sunt, q non omnes homines ad quosuis affectus æqualiter propensi sunt,
 " sed vbi aliquando idem symptoma, veluti repletio est, intra plurimos contingat, ^e† in omnibus
 " ad quæ consuevit loca, impetu fertur, & in alijs quidem ad hepar, alijs rursus ad aluum: nec

Sexta Classis.

cccccc ij desunt

A† Hæc ad
 denda ex anti-
 quis exemplari-
 bus græcis. ne
 si quando, las-
 situdo præexi-
 stenti affectio-
 ni superuene-
 rit, ægritudi-
 nis principium
 fiat. sed aqua
 potiones, & la-
 uacra & ine-
 dias oportet in-
 iungere.

B† hæc enim,
 pro ut pluri-
 ma alia, euac-
 uationes tu-
 tas faciunt.

C† tum pran-
 dere, tum sudo-
 res et lauacra
 facere oportet.

D† ἀποκατά-
 σταιν.

E† Al. ex an-
 tiq; clariss.
 nō omnibus ad
 eadē loca ipe-
 tus ferri cōue-
 nit, sed alijs
 quidem &c.

DE VENÆ SECTIONE

defunt quibus illa vel epilepticos affectus, vel articulorum dolores conciliet. Opus est ergo, vt E vnusquisque ea quæ illi contingere consueuerunt considerans, curam affectibus prouenientibus idoneam instituat. Non enim eadem ratione ad epilepsiam inclinatio, qua sanguinem spuenti cura exequenda: verum illi perpetuo labore defatigari, huic autē à laboriosis exercitijs cauere operapretium est: verendum namq; est ne ex defatigatione initium ruptionis suboriat. Sed & qui epileptici affectibus obnoxii sunt, in labore continuo ac inedia & cibi paucitate se cōtineat, frequentia autem lauacra, quæ ue vehementem permutationem afferunt, modis omnibus euitet. Quos vero renales affectus plerunque infestant, his cibi concocti faciles offerendi, ac lauacra assidua iniungenda: potus autem constringendi facultate careat, ne lotium acius redditum loca per quæ excretio ipsa fertur, arrodatur: ad hæc exercitijs diu insistere, huiusmodi hominibus noxiū est. Quibus autem vel ad splenem vel iecur fluxio ferri cōsueuit, his à laboribus nimis frigidaq; ablutione abstinendū, inedijsq; & paucitate potationū, ac lauacris curatio, in vniuersum procuranda.

Erasistratus Perperam docuisse Repletionis Curationem phlebotomiam omittendo: ac de Noxa quæ ex Inedia euenire solet: Argumentum præterea Libri de Curandi ratione per Phlebotomiam. CAP. 9.

** πάλιν ἐστὶν ἰμπερὶς, sed in antiquis legitur πάλιν. i. omnibus.*

** πάλιν ἐστὶν ἰμπερὶς, sed in antiquis legitur πάλιν. i. laetudina-
rys.*

IN his rursum Erasistratus suam sententiam clare ostendit. Nam eos, quibus ex repletionem vel sanguinis sputum, vel epilepticus morbus imminet, neq; fortiter purgantibus medicamentis euacuare vnquam, neq; frequenti frictione vti voluit: quæ ipsa etli debiliior sit, quàm quæ huiusmodi morbis ad amissim opitulari possit, præstantior tamen non paulo vna inedia existit. Frequēti enim frictione non paucos istorum euacuauimus, cum aliàs præ animi ignauia neq; purgantis medicamentum assumere auderent, neq; venæ sectionem sufferrent. Siq; auxilium hoc in omnibus sufficeret, forte quis ipso venæ sectionis loco semper vtī posset. Constat autem quod interdum multo minus debiliusq; reperiatur, quàm quale corporis repletio exigat, maximeq; quia illi qui frictionibus non assueuerunt, si plus a quo perfrecti fuerint, dolorosis affectionibus illico corripiantur. Non nulli econtra densam duramq; cutim cum habeant, etiam si plurimam subiciunt frictionem, nihilo minus quàm paucissimam euacuationem experiuntur. At, si quis medicus in artis operibus diligenter versabitur, ipsa experientia edoctus, quantopere stomachi inanitio ad accersendum paroxysmum epilepticum faciat, sine negotio cognoscet. Dispiciet etiam illos qui ob solam stomachi læsam actionem epilepsia corripiantur, ex inedia vehementer lædi, velut & Dioscoro grammatico vsu venit. Is enim si quando in quodam ludo literario existens famem diutius sustineret, illico epilepsia correptus conuelleretur. Huic itaque præsentaneo remedio succurrebamus, iubentes vt circa tertiam aut quartam diei horam, panem ex vino temperato assumeret: hocq; præsidio vsus annis permultis sanus degebat, quippe qui huius solius rei curam gerebat, vt cibos in cœna assumptos quàm optime concoqueret. Aliquando autem cum propter ciuilia quedam negocia in foro ad meridiem vsque sine cibo perdurare cogeretur, humi prostratus denovo conuulsus est. Ille igitur, veluti indicaui, propter stomachi vitium epilepsia vexabatur. Manifestum etiam est, quod stomachus læsus, si modo ad hoc idoneus fuerit, alias partes non paucas vnâ secum exacerbet, ac ad consensum trahat. Hoc loco autem aduertendum est, quod in huiusmodi affectibus, os ventris, stomachus à medicis appelletur. Cæterum vel multi ante nos fuerunt qui hos affectus iam pernouerant, ideoq; de his plenius tractare alibi præstiterit: impræsentiarum vero hucusque dictum de ipsis sit, quod obiter declarem multos epilepticos ex solo stomacho longioribus inedijs perturbato, in exacerbationem incidere. Proponatur ergo homo aliquis, qui adeo repletus sit, vt brachia & cubitos, coxas tibiasq; sibi extūri sentiat, tempus vero anni ver incipiens: neque enim hoc ipsum exemplum perraro contingit, immo nos per id temporis homines sapissime hoc pacto affici conspeximus: Huic accedat, quod is exercitiorum ac frictionum sit penitus expertus, facileque ab inedijs lædatur: Nobis porro inuestigandum fuerit, qua ratione hunc euacuare debeamus. Nunquid ergo euacuationem instituemus lauacris frequentibus, aut exercitijs, aut inedijs, vomitionibusue à cœna factis? nam præter hæc apud Erasistratum nulla alia repletionis remedia reperiuntur. Atqui ipse exercitijs vtī ijs, qui id non consueuerunt, nequaquam concedit: à lauacris etiam illos, quia epilepticis affectibus obnoxii sunt, arceat: arcebit item, mea quidem sententia, eosdem à vomitionibus, vt quæ caput euidenter replere soleant. Cæterum inedia inter ea quæ caput replent adeo eminet, vt ex illa tensio vehemens circa brachia, manusq; oriatur: neque tamen ea quoque ad euacuandum satis virium obtinet, quin potius si qui stomachum affici aptum habuerint, ijs insignem læsionem infert. Quomodo igitur ipsam euacuationem adornabimus? num frictionibus solis? Verum earum Erasistratus prorsus non meminit: præterea fieri non potest, vt illæ in insuetis tot tantæq; fiant, quæ sufficienter euacuent. Aut postremo illum laneis vinculis excipiemus? At Erasistratus huius rei nullam hoc loco mentionem fecit, id remedium ad solam sanguinis reiectionem cohibendam referens. Concipiatur autem in animo, quod etiam de hoc ipso consideratio satis luculenta sit facta: veruntamen illis qui eò repletionis venerunt, vt & membra exteriora sibi aduri putent, auxilium

Auxilium hoc quàm molestissimum ac nullius momenti esse antea dictum est. Neque etiam credibile illud est, ab Erasistrato in libro de sanguinis reiectione recitatum,† quòd scilicet reiectionis tempore ex inflammatione periculum immineat: in quo ille capropter ægros sine cibis degere iubet, quoniam eorum quos curandos suscepimus, virtutem venæ sectione prius dissolvere non liceat. Haudquaquam enim necesse est ut inflammatio repletionem insequatur, dum illam euacuare præoccupauerimus. Et quanquam id quoque, si quis eminus consideret, in rebus salubribus persuasibile magis quàm verum videatur, Erasistratus tamen plenitudinem, quæ aut epilepsiam aut reiectionem sanguinis effectura est, euacuare per venæ sectionem nunquam est ausus. Sic etenim in obseruandis Chrysippi placitis pertinax est, ut neque venæ sectione, neque fortiter purgantibus medicamentis vnquam vti in animum induxerit. Atqui tum venæ sectione, tum purgatione aliqua plenitudinem commodissime euacuare poterat. Tamen ille de his nihil scripsit ibidē, quemadmodum neque cum de paralyfi vel de podagra ageret: illic enim etiam in repletionem causam reijcit, ac deinceps neque venæ sectione, neque aliquo efficacium illorum & purgantium medicamentorum vtitur. Præterea opinionem suam in libro de sanguinis reiectione longe clarius prodidit, idque in illa operis parte, vbi homines quosdam ex consuetudine excretionis retentione, sanguinis reiectionis periculo subesse asserit. Cum nanque inter alia retentionum genera, hæmorrhoidum quoque cohibitionem annumeraret, non simpliciter has euacuatione indigere ait: verum prout in cæteris operibus consuevit, sic & ibi omnes quas ipse compertas habuerat, medelarum species, sola venæ sectione excepta recensuit. Dicitio autem sic habet: Præsentibus igitur ijs, quibus sanguinis exuperantia frequenter fieri consuevit, sudorum & lotij excretiones quadrarent. Conueniret etiam subtractio eorum quæ offeruntur, ac deambulationes in locis planis, non celeriter peractæ. Verum in his rursus plenitudinem, & sudoribus, & lotio, & inedijs, in ambulationibusque euacuandam censens, vsum venæ sectionis non adhibuit. Præterea si neque prius quàm inflammatio fieret, neque cum facta iam esset, neque cum futuram suspicaremur, venæ sectionem vsurpandam in hoc libro indicauit, superuacaneum sanè fuerat illum in alijs operibus de eadem mentionem facere, præcipueque postquam curationem inflammationis aut iam factæ, veluti primo de febribus: aut futuræ, aut de qua suspicio esset, aut incipientis, ut ex alijs patet: longe antea descripsisset. Verum tamen hoc quidam ex Erasistratæis non animaduertentes, dicere contendunt illum euacuatorio auxilio, puta venæ sectione, vsum fuisse, cum tamen ipsemet Erasistratus manifeste contrarium asserat. Nam simulatque circa inflammationis tempus offerre cibos perdifficile esse dixisset, ea de causa futura iam inflammatione venæ sectionis vsum explosisse se indicauit. Ista ergo oratione palam declaratur, quod quibus in ediam consulturi sumus, eisdem à venæ sectione modis omnibus interdici re debeamus. Non ergo consentaneum est, ut quis circa vnum eundemque ægrotum, vtraque auxilia, nempe in ediam & venæ sectionem vsurpet. Hinc quoque perspicue patet Erasistratum, siquidem in ediam ægrotis iniungit, eo tempore venæ sectione non esse vsum, ac propterea illius in alijs operibus, ut & superius significatum est, nullam mentionem fecisse. In omnibus enim illis, veluti declarauimus, in ediam suadens, venæ sectionem (perperam quidem istud ille faciens) è medio sanè tollit, ut à nobis alio quoque prius in opere demonstratum est: minus tamen peccat quàm illi, qui omnes illos qui in ediam vtuntur, statim & venæ sectione opus habere existimant. Ego enim sequenti commentario ostendere aperte conabor, quod non solum omnes illi venæ sectione non indigeant, verum ne plethorici quidem ipsi, nisi prius qualem illa plenitudo naturam obtineat, discernatur: huicque accesserit de habitudine ætatisque ægrotantis, ac de tempore, & regione, atque constitutione consideratio: tum quæcunque antecesserunt, quæ uel ipsum ægrotum etiamnum molestant symptomata. Ob singula enim hæc permultos venæ sectionem non nunquam citra noxam experiri non posse ostendam. Præterea & alios plerosque tibi ob oculos ponā, qui absque repletionem cum sint, venæ sectione nihilo minus opus habent. Posteaquam autem de his singillatim disseruero, tum & occasionem & mensuram venæ sectionis ordine explicabo. Addam etiam istis eam quæ in secandis venis differentia est. Declarabitur quoque, semel ne an pluries sit subtrahendum. Ad hæc vero non minore opera disquiretur, quibus nam, cum adhuc comoda valetudine fruuntur, veris tempore, vel purgationem, vel venæ sectionem, vsurpare conferat.

† vide supra
pag. 5. d. et pa.
13. d. & e. quò
hic locus ita a-



GALENI DE CVRANDI RATIONE PER SANGVINIS MISSIONEM LIBER

Theodorico Gaudano interprete.

*Denuo ad Græcorum exemplarium fidem ab Augustino Gadaldino
diligentius recognitus.*

ARGVMENTVM LIBRI

Explicatur vniuersa Methodus Secandarum Venarum, Affectus scilicet, Scopi, Men-
sura, Locus, Tempus, & Reliqua quæ ad venas & arterias cum ra-
tione secandas intelligere necesse est.

De Quæstionibus, quibus omne Venarum probe Secandarum Negocium continetur. CAP. 1.



* παρὶ μέρος.
i. de parte.

Qui de sanguinis emissionem speculant, vnū sibi primumq; proponunt, nēpe, vt q̄ corporis affectiones euacuatione indigeant, cōsiderent: Ac G
deinde alterū, quæ nā ea q̄ sanguinis sit detractio: nā multi sunt affe-
ctus, qui alia quapiā euacuatione quidē indigeāt, sed nō sanguinis mis-
sione. Tertio post hæc vt dijudicent qui innoxie hanc ferre euacuatio-
nem possint: quippe cū sæpe fiat vt affectio venæ sectionem desideret,
cæterū laborans eā ferre nequeat, siue pp ætatem, siue pp anni tps, siue
pp regionis naturā, siue ob os ventriculi vitiatum, quod persæpe per
abusum stomachum appellant: ac nos sanē ēt, compendij nimirū cā,
hac appellatiōe toto hoc vtetur libro. Sed & sunt qui tametsi vel ma-
xime, quod ad morbū pertineat, sectione venæ indigeant, ob totius tñ corporis habitum ferre ne-
queant. Quæ si quis ēt definire aggrediaī, particularis excipiet contemplatio, sicuti in alio quouis
auxilio: Mox aut de venis quæ veniunt secandæ: nā de istis quæsitum est multum, nihil ne referat
quam quis secare venam velit, oēs. n. omnibus æque affectibus prodesse: an, sicuti Hippocrati, ac
propē medicorum clarissimo cuiq; visum est, multum intersit, hanc an illam incideris. Porro hac
quoq; speculatione absoluta, succedit de scopis siue intētionibus oratio, quibus videlicet quis ani-
mum attendens, vacuationis mensuram coniectura queat assequi. Ad hæc omnia, in quibus semel H
auferre præstet, in quibus vero repetitam facere ablationem, quam ἐπαφαίρεσις nominant, expe-
diat: Tum in quibus inanire ad animi conueniat deliquium, in quibus autem id tñquam summū
malum vitandum. Hæc igitur prospiciat necesse est, qui probe hoc vtī remedio volet.

*Quibus libris Chrysippo, Erasistratoq; ac horum Sectatoribus occurratur, qui Venæ secandæ Vsum,
vel sustulerunt prorsus, vel perperam intellexerunt. CAP. 2.*

Sanē de oibus istis in medendi methodo tractauimus, sicut & seorsum aduersus Erasistratū, q̄
perperam ab hoc abstinuit remedio. Deinde aliū etiam librum conscripsimus ad eos Eras-
istratos qui vsum esse hoc auxilio virū asserunt. Itaq; odio sanē dignissima est scelestorū sophista-
rum tum versutia, qui cū mentiri se sciant, astu tñ contraria prænouarū rerū studio adstruant: tum
sapientiæ vanæ aucupii, qui rerū vtilissimarum ignari, contraria tñ verbis asseuerant. Horum alte-
rum Chrysippo Cnidio accidit, qui venæ incisionem ex omni medicinalium præsidiorū numero
tollendam censuit. Secuti hunc sunt sui discipuli, & ipsi apud Græcos clari, Medius, & Aristoge-
nes. His ēt magis Erasistratus, ad summos euectus honores, Chrysippi seruauit sententiam. Post
quem ipsius discipuli, principio quidem præceptoris decreto insistebant, sed tps successu eorū ex
numero quidam ab ijs defecerunt, pudore affecti impudētissimo. Nam quid aliud in illos dicam,
qui

A qui afferere sustinent phlebotomiæ auxiliū recipere Erasistratū: tametsi nusq̃ in cōmentarijs villo in morbo hoc consulere cōspiciatur. Immo consentaneū est, inquit, qui inediā tanq̃ euacuatoriū auxiliū adhibeat, multo magis phlebotomiā admittere. At qui hæc afferūt, oēs ad ea tūndēdam esse venam aiunt, ad quæ Erasistratus cibo abstinentiū præcepit. Cū ergo ille in opere de febribus scribat adhibendā morborū principijs inediā, sequit̃ utiq; oībus detrahendū esse sanguinē, id quod sanē isti ē arbitrant̃, illo utiq; in tpe. Verum maximū id malū fuerit, si ita faciendū adolescentibus artem discētibus persuadeat: multoq; ē perniciosius, si non alia quoq; quæ discernere conuenit, respiciant. Quocirca alio libro ea exponere necesse habui, quō videlicet adolescentibus cōmonstrarem & Erasistratum venę sectione haudquaq̃ vsū (id. n. præstat eos credere, q̃ oībus vno ordine venam incidere, quibus ille ciborū vsu interdicit) & maximū laborantibus inde prouenire cōmodum, si quis recte vtatur. Itaq; aliud mihi denuo, mea quidem snia, de phlebotomia scribendū non fuit, cum nimirum remedijs huius vsus quidem in medēdi sit methodo expositus, simulq; in opere de tuēda valetudine: in duobus aut libellis, quorum alter ad ipsū Erasistratū inscribitur, alter ad Romæ agentes Erasistrataeos, prauas illius opīones indicarim. Cum tñ precibus me suis obtundere non cessarent cōplures amicorum, quos piget, vt mihi vī, curandi librum perlegere, coactus tandem sum ad hæc scribenda descendere, ne. s. inuidere illis videar: mox vero serie conuenienti oīa quæ de hoc auxilio proferri possint, enarrare. Atq; adeo iam tempus est orationem ordiri.

Quid Affectus, Affectio ne: & Quibus ex libris Petenda principia, quæ ad Secunda Venę Viam ac rationem maxime faciunt. CAP. 3.

Affectiōis vocabulum, velut alibi diximus, ab afficiendo dictum, æque atq; illud, de multis effertur rebus. Sed nunc recessus in statum præter naturam, qualescunq; ij fuerint, affectiōnes siue affectus toto hoc libro nominabimus. Quæremus autem omnium primum quot, qualesq; ea sint vacuationem poscentes: deinde quæ nam ex ijs venam incidi postulent. Qñ autem omnia quæ in quæstionem veniunt, duo inuentionis organa obtinēt, nempe rōnem & experientiam: idq; cum in artibus omnibus, tum per omnem propē vitam: necesse esse arbitror, & nunc quoq; me aut ratione sola, aut sola experientia, aut iunctis ambobus, quæ proposita sunt scrutari. Porro qñ ratio ipsa partim ex communibus tantum notionibus progrediens inuenit & demonstrat: partim vero etiam quæ ex istis inuenta sunt, ad demonstratiōem adhibet: vtraq; ratione omnes vti artes demonstrauimus: ac nos quoq; in præsentia, vtra earum vtilis reperietur, eam rebus nostris accommodabimus. Sanē priori ratione omnes per totam vitam homines vti assolent: alia cetera vero nō oēs, nam propriē ad artifices attinet. Etenim geometra primum aris suæ theorema per solam priorem rōnem demonstrat: deinde in secundo non sola ea vtitur, sed ad^a eius demonstratiōem quod^b ex prima probatum est, vnā adhibet. Quātum vero deinceps à primo recedit theoremate, tantum ēt à prima ratione abscedit. Deniq; vero & paucissimis vtitur, per ea quæ demonstrata sunt, alia demonstrans, & per illa rursus alia, & iterum per illa alia, vt tandem demonstratio ad ea quæ plebi incredibilia sunt, procedat, nempe ad Solis, Lunæ, & terræ, non solum magnitudinum, sed & distantiarum cognitiōē. Ex quibus tādē inuentis horologia construunt & clepsydras, qui hac videlicet viā incedunt, Lunęq; ac Solis deliquia prædicunt. Sic igitur & nostra artificialis ratio, multis vtiatur quæ in alijs operibus sunt demonstrata. puta q̃ cōplures sunt facultates quæ aīalia gubernāt, quarū alias naturales, alias aīales appellamus. Generationis aut principia in rebus oībus pro materia quatuor habent elementa, quæ per sese mutuo tota misceri inq; inuicē agere sunt nata. Quapropter nulla hoc libro Asclepiadis hiet mentio, vt cuius elemēta falsa ostendimus & in decimotertio de demonstratiōe cōmētario, & in opere de Asclepiadis placitis, in quo quintus & sextus, elementorū eius confutatiōē continent. Demonstratum est ēt & in cōmentario de elementis ex Hippocratis sententiā conscripto, de qualitibus effectricibus, quarum dnoīa sunt, Caliditas, Frigiditas, Humiditas, & Siccitas, et de humorum tum differētia, tum generatione. Porro de medicamentis humorē vnumquēq; purgātibus paucula quædam in libro de Elementis, sed separatim in alio libro tractauimus. Vtilis quoq; in rē præsentem tractatio de temperamenti est, elemētorum sequens tractatiōem: verum oīum maxime liber de plenitudine, in quo ostensa est & vt ad vires plenitudo, & vt ad capacitatem in qua continetur. Atq; hæc plenitudo à medicis κατὰ τὸ ἐγγύμα nūcupatur. Optimū ergo fuerit, vt qui scienter volet expēdere quæ hoc volumine dicenda veniunt, de Plenitudine librum prius perlegat: quæ vero & ille ante perlecta requireret, ipse indicabit. Nec vero mirum cuiquam videri debet, si tantis sit opus vt probe de venâ secunda contemplari liceat: non. n. ad huius tantum auxiliij inuentionem, sed & aliorum oīum, necessaria est eorum, quæ modo recitauimus, cognitiō. Nam si citra illorum notitiā recte curare possemus, ^a† haud esset cur ea tanti faceremus. Sed hæc præfari necesse fuit. Tempus autem nūc est orationem ordiri, considerando quot sint affectiōnes vacuatione indigentes. Ergo si quis eas experientia collectas exponat, sola opus est ad explicatiōem memoria: At si via rationali, communē & generale^b† inueniat necesse est: ex illius deinde in species differētiāsq; sectione vique ad species vltimas, affectiūum numerus vacuationem indicantiū, inuestigandus est. Sic enim constare vniuersa, quæ per rationalem viā inuentionem sortiuntur, monstrabimus.

A^a in antiquis
ἀπὸ τοῦ ἰ. ἢ ἴπ. ἴπ. ἴπ.
s. secunda theore-
matis.

B^a si τὸν
πρῶτον ἢ. per
primū. s. theo-
remā.

A^a† δὲ καὶ ἀπὸ
στῶν ἀπὸ τοῦ
ἀπὸ τοῦ, ἢ ἐστὶ
haud vti, et
borauit omnes,
seu cōpōnūt,
sensu q̃.

B^a†. Ad hanc
ἰ. ἢ ἴπ. ἴπ. ἴπ.
totū. primo.

Quæ

DE CVRANDI RATIONE

Quæ Corporum Affectiones Vacuatione indigeant.

CAP. 4. E

* παρατίμ-
πραγται.

Igitur cum artis medicæ officium sit omnes partium corporis functiones, ubi corrumpuntur quidem, recuperare: tueri aut, ubi saluæ fuerint: hæcque ad constitutionem sequantur naturalem: necesse est hanc, dum præsens est, seruare, intereuntem vero recuperare. Cum ergo primarias actiones à similaribus corporibus perfici ostensum sit, ab instrumentarijs vero secundarias, videndum est tibi, qui in corpore continentur humores, quam aut utilitatem aut noxam partibus eius afferant. Posteaquam igitur in libro de plenitudine demonstratum est bifariam & fieri & dici plenitudinem, nempe vno significato ut ad vires: altero ut ad continentium humores vasorum laxitatē, quod quidam vocant *κατὰ τὸ ἑγχευμα*, vtrique vacuatione est opus: siue in homine valetudinario, siue valente euenerit. Sanè quemadmodum qui onus gestat, non protinus ubi grauatur ac fatigatur, iam cecidit & victus ab eo est: ad eundem modum ubi virtus à plenitudine grauatur, fieri potest ut non dum homo egrotet. Siquidem non nulli qui consueta etiamnum munia obeunt, sentire sese graues, pigros, segnes, atque ægre mobiles referunt, atque ea est ut ad virtutem plenitudo: Velut ubi post exercitia tendi videantur (quemadmodum Erasistratus dixit, Implentur brachia & cubitus) non exigua est ea alterius plenitudinis nota: quam *κατὰ τὸ ἑγχευμα* vocari à quibusdā proposui, quandoquidem *κατὰ τὰς ἐγκεχυράτους*, id est in infusis per vasa humoribus, consistit & intelligitur. F. Dicitum autem est in libris de sanitate tuenda, ubi in toto corpore sensus prouenit vlcerosus, ac potissimum dum mouemur, talem affectum mali succi esse sobolem. Attamen id non paucis consuetas etiam dum res agentibus vsu venire conspicitur. Quandoque autem & in partibus quibusdam corporis, non in tota mole, indicia existunt affectionum illis in partibus consistentium similium ijs quas in toto corpore consistere dictum nunc est. Nam caput aliquando solum grauari sentimus, aut vlcerosam quandam affectionem habere, aut musculos temporis quos *κροταφίτας* nuncupant, intendi, idque aut simpliciter, aut cum maiore quadam caliditate. Sic & in iecinore, liene, ventre, costis, septo transuerso, grauitatem sæpenumero percipimus. Similiter in ore ventriculi aut grauitatem, aut morsum, aut nauseam, aut ciborum fastidium, aut absurdum appetitum, quandoque sentiscimus. Ad hæc autem fixi in parte quapiam dolores, idque aut ob humorum copiam confertim ingruentium, aut propter spiritum flatuosum, vacuationem indicant, sicut qui ab acri humore partem exedente rodenteque proueniunt. Sunt autem qui ab intemperie nascantur, atque inter eos ipsos quidam ab ea sola citra humores, alij vero cum humoribus. In omnibus itaque istis modo propositis, instantium tum humorum tum vaporum euacuationes à pathematis, id est passionibus, hominem liberant. Non tamen vena secta prorsum est opus, sed sufficit purgatio, frictio, balneum, & inun- G. ctio cum digerente medicamine. Ergo qui vena incisa iuuentur affectus, deinceps dicamus.

Quo pacto Cor & Reliquæ corporis Partes ab Humoribus alterentur.

CAP. 5.

Al. qualitate

Non solum nutrimentum animantis partibus ex sanguine est, sed calor quoque naturalis perseuerantia ex sanguine obtinet: quemadmodum ex lignis comburi idoneis qui in foco est ignis, à quo ædes totas calefcere conspiciamus. Itaque quemadmodum ignis hic offenditur, interim quidē congestis in cum confertim lignis, interim vero tamen non multis tamen admodum madentibus, non nunquam aut omnino non impositis, aut valde exiguis: Sic qui in corde est calor, interdum se ipso minor efficitur aut propter sanguinis copiam, aut propter ingentem inopiam, aut propter qualitatem frigidam: interim vero maior aut propter calidam sanguinis qualitatem, aut propter pauculam inopiam. Quicquid autem cor in caliditate frigiditateque perpetitur, eius protinus & alia corporis partes participes sunt. Euenit autem & vna in parte persepe præter naturam tum caliditas, tum frigiditas, sicuti sæpenumero in alijs commetarijs demonstrauimus: Idque duplici ratione prouenit, interim ob humores calidos aut frigidos, interim vero ob solam intemperiem. Cæterum quæ membratim accidunt caliditates aut frigiditates, eas quæ parti quidē affecte vicinæ sunt, vnâ alterant, at in totum extendi corpus priusquam cor mutant, nequeunt. Eundem in modum & cor- H. dis corpus duplici modo alterari ostensum est, aut per intemperiem, aut propter humores calidos vel frigidos, aut ob alicuius horum inopiam. Porro humores calidos frigidosque fieri demonstraui- mus pro cibi potusque modo, & ob pleniorē corporis animique tum motum tum quietem. Cæterum quemadmodum in ventre frequenter prauæ fiunt coctiones, ijs quæ assumpta sunt, in pituitam aut bilem conuersis, aliam ue præter naturam corruptionem perpeffis, aut crudis & alterationis expertibus plurimo tempore manentibus, & in flatum versis: Ita ubi sanguinis fraudamur generatione, humorum in arterijs venisque affectiones proportionē respondebunt ijs, quæ à frustrata in ventre concoctione proueniebant. Quoniam autem calida simul humidaque omnia celerrime putrescere apparent, & præcipue si in locis calidis sint, consequitur necessario, quod ex ventre distribuitur nutrimentum, quando à natura non superatur, inque sanguinis boni generationem non conuertitur, alia's aliam perpeti putredinem. Atqui cum quæ ex materia calida putrescunt calidiora et euadant, calidior quoque erit proinde sanguis putrescens. Hic autem ubi calidior fuerit, calidior quoque sensibilibiter pars in qua putrescit, euadet. Porro autem, quoniam à notabiliter calidis vnâ quæ vicina sunt, incallescunt, vnâ quoque cum sic affectis partibus, quæ circūquaque vltius sunt, incalescunt, idque calore acri ac mordaci: eiusmodi enim est qui à putredine phiscitur. Ergo si pars quæ

A quæ hoc pacto incaluit, insignis sit, & calorem suum in cor protendere valeat, siue q̄ vicina ipsi sit, siue q̄ ex principalibus, siue q̄ calida, vna et ipsum accendet, vt quod natura calidissimū sit. Quod si semel illud accēsum fuerit, facile totum ipsius iam corpus simul exalhet, quemadmodum ab ingenti in foco flāma quæ illam continet domus. Vocāt autem id pathema Græci quidem πυρετον, {Latini vero febrem.} Sed & non nūquam priusquam putrescere incipiat sanguinis multitudo, in partem aliquam confertim decumbēs, aut prorsum eam extinxit, vt actio interiret, aut certe nō contemnendam noxam infligit. Nam hoc pacto apoplexiæ proueniūt, multo nimirum sanguine in principium animantis confertim incumbente. Nam vbi in aliā partem præceps ruit, tumorem inibi præter naturam efficit: ex hoc genere est phlegmone. At vbi crassior est, melancholiq̄; magis naturam refert qui decubuit sanguis, scirrhusus tumor efficitur: sicut si pituitosior sit fluxio, laxus: sin biliosa, erysipelas existit. Discriminata hæc ad vnguem habes in ijs quæ modo recensuimus operibus. Nunc aut, vt dixi, quæ sunt demonstrata, hypothesium loco, hoc in sermone assumens, consequentem illis esse sermonem de venę sectione demonstro. Igitur cū plenitudo duplex sit (optimum. n. fuerit hinc auspicari) & ea, quæ ad vires refertur, facile in putredinē perueniat, atq; etiam iterdum in partes quasdam ingruēs, inibi tumores præter naturam excitet: & altera quoq; quæ κατὰ τὸ ἑγγύμα appellatur, sæpe in partes decumbat, ac tumores creet, immo & apoplexias & ruptiones venarum moliat: eam celeriter euacuare tentandū, priusquam magnū aliquod malum in homine admittat. Porro fulsissime expolitum est in tuende valetudinis volumine, quo pacto vtrinq; affectionē & agnoscere & sanare oporteat: sicut vbi febris aut sanguinis reiectio præ plenitudine inuasit, aut apoplecticarum infirmitatum aliqua, quomodo & illas curare oporteat, in curandi methodo diximus. Quare de his nūc cōscribere superuacaneum censeo. Nam si perinde vt in illis tractatibus scripsi, ita & hic scribam, bis eadem de re verba facere cogar, ac propterea in longum etiam sermonem extendere. Sin in compendium sermonem hunc contrahā, duorum alterum subibo periculum, aut vt ob breuitatē obicurus fiam, aut disfunctionem aliquam vtilē preteream. Verum quoniam haud mea voluntate hunc aggressus sum sermonem, si quod dictorum peccatum eueniat, ipsi culpam ferent, qui auctores fuerunt vt hoc onus susceperem: sicut si recte atq; ex sententia accidat, vtilisq; appareat, laudem illis omnem cedo.

Qui scopi in mente habendi, Quibus ue indicijs discernendi, vt Sanguinem mittamus. CAP. 6.

Rursus ergo orationi sumatur principium. Qui res consuetas adhuc faciunt, sed princeps illis pars aliqua aut totum corpus grauat, tenditur ue, ijs necessaria est euacuatio. Porro si tate nec puerili sint, nec senili, de secunda vena consilium inito, præ oculis habens principales hosce scopos, nempe plenitudinis tum quantitatem tum qualitem, & virium robur atq; infirmitatem: deinde naturalem totius corporis habitum, tempusq; & regionem, vitāq; anteciam: tum an cibi potusq; copia, & præcipue astatim nutrientium, qui hic affectus est, sit vsus: ad hæc consuetudinem, & res præter consuetudinem actas, quosq; motus exercuerit, quas excretiones habuerit, aut præter solitum compescuerit: ad omnia autem hæc num gracilior aut crassior euaserit. Sanè vtriusq; plenitudinis quantitas ex propriorum signorum magnitudine definietur. Quanto enim grauior tibi homo videtur, tantum & plenitudinem quo ad vires creuisse constat. Ad eūdem modum quantum auctus fuerit tensionis sensus, tantum & alteram inauctam plenitudinem, quam à quibusdam κατὰ τὸ ἑγγύμα, vocari diximus. At vtriusq; plenitudinis qualitatē partim ex coloribus agnosces (memor colorem humorum esse, si quidem modice à calore frigoreq; externo affectum totum corpus fuerit) partim ex ijs quæ humorum naturæ coniuncta sunt. Etenim calidiores, calidior totius corporis sensus sequitur, frigidiores vero frigidior: Tū eos qui in venis quidē aceruātur humores, tumor, vasorumq; distensio: qui vero in carne, sensus in ea aut grauitatis, aut tensionis, sicut certe & caliditatis^a †. Porro dispensantium nos facultatum infirmitatem ac robur proprijs indicari functionibus ostendimus: arbitrarijs quidem, ea quæ in nervis, & horum principio cerebro: pulsatiuis aut, ea quæ in arterijs & corde: at à functione quæ in bona editur nutritione, aut nutritione abolita, tum colore bono aut malo, tertia facultas, nempe nutrix, quam à iecore proficisci demonstrauius, agnitionem sortita est. Vbi ergo extantibus plenitudinis signis valentes facultates fuerint, venam incides, videlicet si tensiua quidem sit affectio,^b † nullo discrimine, magisq; etiam in phlegmonode: Sin infesta sit degrauians plenitudo, haud semper sanguinis molienda detractio est: fieri enim potest, vt crudus per corpus collectus sit succus. In quo aduertendum diligenter est, quantum valeat robustaq; sit virtus, & quantum^c humor ipse sit refrigeratus: nam exoluta ab id genus affectibus virtus, adhibita sanguinis missione, in extremum malum recidere solet, vt nequaquam postea restitui possit. Quod vbi euenit, periculum non leue consequitur, potissimum si febris accedat situ æstiuo, stomachoq; male affecto, aut toto adeo corpore natura molli, & tēperie humido: eiusmodi enim hominibus multa accidit per halitum digestio, repentinaq; syncopa, etiam si febris haud magna inuadat. Si vero horum nihil sit, cæterum hyems fuerit, regio ue natura frigida, tū natura quoq; hominis frigidior, ijs per sanguinis missionem & totum corpus grauius refrigeratur, & accidunt non nulla quæ ad grauem sequuntur refrigerationem, symptomata. Quocirca qui sic affectu sunt, eos sanguinis missione vacuare nō conuenit, sed

A† Addit in oribus libro septio collectio num medicina lū, vel frigida tatis.

B† In libro septio collectio num medicina lū, vel frigida tatis.

C† Calidiorum et ipsius sit genitum.

DE CVRANDI RATIONE

sed frictionibus, mediocriterq; excalfacientibus vñctionibus, tum potionibus humorum crassitu E
dinem incidentibus, ac modice calfacientibus: Nam quæ valenter calfaciunt, nimis subito vires
deiciunt, vt in reliquam curationem non sufficiant: sæpe etiam febrem auxere: itaq; & inde viri-
bus noxa obuēit. Quapropter humorum incidentes crassitudinem tum cibi tum potus medio-
cris sunt in excalfaciendo facultatis.

*Quibus Morbis Præcauendis Veris tempore vel Venæ sectio vel Purgatio
conueniat.*

CAP. 7.

Porro qui sanguine ex pectore reiecto in præsens quidem curati: cæterū eam sortiti sunt cor-
poris structuram in thoracis pulmonisq; partibus, vt vel pauculo plus collecto sanguine p-
tinus aut valis alicuius osculum referetur, aut ipsum rumpatur: ijs etiam si nullum in corpore etiā
dum symptoma extiterit, ineunte tamen vere sanguinem mittere oportet. Similiter qui prom-
pte morbum comitalem, aut apoplexiam incurrunt. Ad eūdem modum, si aliorum morborum
cuiuspiam obnoxium esse hominem cognorimus, puta peripneumoniæ, pleuritidi, angine, cōmit-
tendum non est, vt expectemus dum aliquod euidentis plenitudinis symptoma appareat, sed ante-
uertere sanguinis detractio præstat. Eodem modo quibus hæmorrhoides retentæ sunt, potissi-
mum si natura sint atrabilaria. Quiq; quotannis æstate plethoricis morbis corripi assolent, & hos F
quoque veris initio vacuare expedit. Eadem ratione & qui ipso etiam vere illiusmodi malis ve-
xantur. Sūt autem quidam oculis imbecillioribus, aut scotomaticis quas vocāt hoc est vertigino-
sis obnoxij passionibus, qui & ipsi principio veris inaniri poscunt. Sed illud prius videndū, quid
sit quod in illis aceruetur. Siquidem non nullis amaræ bilis succus plus cæteris colligitur: quibus-
dam bilis atra, aut pituitæ: alijs ex æquo omnes, in quibus sanguis abundare dicitur. Hos ergo om-
nes vacuabis, Sicuti etiam podagricos et arthriticos veris principio, exhibito videlicet aut medica-
mento purgante, aut sanguinis diminutione. Equidem complures ipse sanauī, qui tribus qua-
tuorue annis per interualla pedum laborassent doloribus, exundante humore veris initio expur-
gato, aut sanguine diminuto. Cæterum id neminem latere puto, illos in omni deinceps victus vi-
taq; ratione agere moderatos. Nam intemperantes, vinososq; ac ventri gulæq; deditos, neq; pur-
gatione, neq; sanguinis missione magnopere adiuueris, nam per vitæ intemperantiam, crudo-
rum humorum copiam ocysime colligunt: verum his ne manum quidem ad mouere tentādum
est. Eis vero qui præceptis salutaribus obsequuntur, summopere profueris, si principio veris pri-
mum quidem euacuaris: deinde autem ad exercitia, victusq; rationem salubrem deinceps perdu-
xeris. Quæ de istis dixi, hæc tibi dicta putato & de omnibus, qui morbis ijs quos modo dicebam G
capi sunt apti, nempe aut comitali, aut apoplexia, aut vertigine, aut sanguinis reiectione, aut
melancholicis.

*Non nunquam Absq; Plenitudinis indicis Sanguinem mitti oportere: ac de Ortu eorum
Affectuum qui Rheumatici vocantur.*

CAP. 8.

Porro non solum vbi adest plenitudo, siue ea vt ad vires sit, siue vt κατὰ τὸ ἔγχεμα, mirifice
prodest venæ sectio, verum etiam citra plenitudinem initio phlegmones, quæ aut propter
icūm, aut propter dolorem, aut partium debilitatem prouenit: quippe cum dolor sanguinem ad
se trahat, & sæpe partium debilitas phlegmonē, absq; vt in corpore plenitudo sit, procreet. Oten-
sum est enim in virtutum naturalium commentarijs, infirmam natura partem prompte grauari,
si vel paulo plus aceruetur aliqñ in ea excrementi: quinetiam q̄ pars quælibet vim possideat si-
cut familiarium attractricem, ita quoq; alienorum excretricem: tum quod duplex sit alienum, alte-
rum quantitate, alterum qualitate: Itaq; partem quamuis, quæ licet ab humoribus in se contentis
non grauetur, tamen excrementa quædam habeat in qualitate præter naturam, ad eorum excretio-
nem per venas inibi sitas tanquam per canales insurgere. Porro si quod propellitur, prauus sit san-
guis, siue alius quiuis succus, ad propinquam primum veniat partē necesse est: Vbi rursum duo- H
rum alterum eueniet, aut enim cōcoctus aut corruptus in aliam tertiam haud trāsfluet: aut, si neu-
trum assequatur, denuo ex parte secunda in aliam labetur, atque iterum ex illa in aliam: neq; cessa-
bit quoad in talem quampiam illabatur, quæ amplius ex se propellere quod in ipsa redundat, ne-
queat. Accidit autem id illis partibus, quæ vim excretricem vicinis omnibus imbecilliores obti-
nent: siquidem haud etiam in illas quæ præ virium robore non admittant, repellere quod mole-
stum est valent. Nam & hoc quoq; nobis in illis monstratum est commentarijs, quod non solum
pars quælibet recrementum in vicinam protrudat, verum q̄ & recipiat quidem, sed contra sæpe
remittat, & contra repellat, in sese haud admittēs: quo in certamine victoria potiū validior. Qua-
propter partes infirmiores omnium primæ excrementitijs morbis corripiunt. Huiusmodi qua-
piam ratione rheumaticos vocatos affectus prouenire scito, toto videlicet corpore infirmo, quæ
vna est mali habitus species: principibus vero illius partibus, paulū licet insit ipsis sanguinis, gra-
uari tamen solitis, eumq; ad carnosas cutis partes protrudentibus, potissimūq; ad adenas excipien-
dis recrementis idoneos tum ob substantiæ laxitatem, tum quia omnium partium minime robu-
stas habeant naturales virtutes, sicut & pinguedo. Nam cum quatuor eæ sint, vt ostensum est,
prima attractrix, secunda retentrix, tertia excretrix, & quarta alteratrix, alias quidem tres imbe-
cillimas,

* In græ. ipref-
sis legitur dia-
chasma ut
uerit interis
hic in antiquis
aut diachon-
asma habet-
tur. i. digestus
per habitū. et
ita uidetur le-
gisse Calaber.

Acillimas, adenes carnesq; obtinent: at vnam alteratricem haud ita multo cæteris partibus minorē. Post adenes sequitur pulmo, fluxioni recipiendæ promptissimus. Nam & hic tres facultates infirmas possidet, & corpus ipsum laxum. Deinde est lien. Porro cerebrum aut perinde vt illi, aut et plus, excipiendo fluxui est habile: cæterum hoc illis potius est, q; constructionem habeat eiiciendis ijs quæ accepit promptissimam: habet enim ingentes ventriculos, qui pronis meatibus euacuantur. Quibus ergo carnofo genere pulmo, lien, ac cerebrum, naturā robustiora sunt, in ijs ad adenas & carnes fluxiones perueniunt, vbi totus nimirum habitus infirmus fuerit, velut in rheumaticis affectibus accidere solet. Merito ergo his curandis scopus est, non euacuatio, sed corporis totius roboratio: quanquam tamen curationis initium illis à misso oriatur sanguine: tac si excrementa prauam etiam qualitatem habuerint, vnā adhibeatur purgatio: In quibus maxime corporibus neutrius proprium expectandum plenitudinis symptoma est, puta grauitas quidem eius, quæ vt ad vires est, tenlio vero eius quæ vt κατὰ τὸ ἔγχυμα. Eadem ratione in ijs quibus pars quæpiam grauiter icta est, aut vtcunq; aliter incipientem habet phlegmonem, eam si magnam fore suspicamur, curationem ab inanitione auspicamur, aut purgatorio medicaminē exhibito, aut vena incisa, prout nimirum alterum altero magis conuenire iudicamus.

† Aliqui uer-
tunt. Si vero ex-
crementa quæ
litate praua
fuerint, purga-
tionem adhibe-
mus.

B Inter Scopos Sanguinis detrahendi qui nam ipsam Detractionem, qui ipsius Quan-
titatem dicantur indicare.

CAP. 9.

de Viſt. rōne
mor acut. cō l.
t. 19. 7^a. 136. c.

Recte ergo admonemur in ijs quæ adiecta sunt libro de victus ratione acutorum, sanguinē mittere, si magnus sit morbus, & ager florenti sit ætate, roburq; adsit. Perperamq; Menodus in sola syndrome plethorica seruari venæ sectionem inquit. Contra. n. prorsum sanguinis mittendi scopi, primum in se plenitudinem non comprehendunt, sed fientis, {vt sic dicam.} passionis suspicionem. Nam si eam magnam fore apparet, oīno sanguinem mittemus, etiam si nulla existat plenitudinis nota, tantum inspecta ætate, viribus, & regione, quæ sola in ijs quæ adiecta sunt libro de ratione victus recenseri conspiciuntur. Vigentes enim ætate, propter pueros & senes in distinctionem assumpsit. Cæterum primi principesq; mittendi sanguinis scopi sunt, morbi magnitudo, & laborantis robur: & hanc esse primam dicendum est syndromen, nō plethoricā, in qua seruata sit sanguinis missio: in illa enim & hæc comprehenditur, vt quæ morbi magnitudinē adaugeat. Quippe non solum vbi iam adsit morbus grauis, sanguinis detrahendi tempus est, sed vbi futurū suspicamur. Anteuertit. n. Hippocratis doctrina, qua nos docet quæcunq; morbis iā præsentibus recte perageremus, melius esse vt ipsa morbis incipientibus, aut imminētibus, anteuertendo faciamus. Quare & propositos scopos ad sanos trāsferre liceat. Siquidem & his sanguinē mittere expedit, vbi nimirum magni alicuius morbi metus imminet, rōne habita & ætatis, & virium. Nam si quis vt magnū incurrat morbū sit habilis, licet nullum et in corpore symptoma acciderit, venam tamen secandam censemus: Satis est enim ætatem & vires inspexisse. Itaq; tria sunt q; agnitionem cōtinent, morbi magnitudo aut præsens, aut imminens: ætas florens: & viriū robur. Forte vero negligentius in ijs quæ adiecta sunt libro de victus ratione acutorum, expolita videri possit vna ætatis particula. Nec. n. florentem duntaxat dixisse recte habet, sed addenda est & quæ illā præcedit, & quæ sequitur, vt videlicet duæ tantum distinctioni eximant, nempe puerorū, & senū. Verum senum ætas in viriū verbo comprehendere potest: nulli enim qui ea ætate est, robur inest. Quibusdam vero medicis ne pueris quidem robur inesse visum est, sed perperam rē intelligentibus, sicut alibi nos ostendimus. Itaq; si magnum fore morbum expectamus, aut iam præsentē inspicimus aut incipientem, venam tundemus, viriū habita ratione, tantumq; ex oratione exemptis pueris: dicemusq; minus perfecte politam ætatis dignotionem ab eo, qui conscripsit ea quæ adiecta sunt libro de victus ratione acutorum: Satis. n. sunt ad incidendam venā hi duntaxat scopi. Neq; enim vbi tanta crudorum humorum copia accumulata est, vt secādam venam prohibeat, ratio redarguitur: nam istis viriū robur nō adest. Estq; hoc indicium eos haud posse sanguinis missionem perferre, quando vnā cum dolore corporis totius, qui exciderit ab indicando sanguinem abundare, pulsus adest in vehementia & magnitudine inæqualis, exuperantibus per ipsius inæqualitatem, imbecillibus & paruis. Definitis itaque tribus mittendi sanguinis scopis, nempe morbi magnitudine aut præsentē, aut imminente, aut incipiente: ætate florente: viriū robore, extra puerorum ætatem: ad alia antedicta mittendi sanguinis indicia, quæ non pauci medici adiicienda censuerunt, nunc accedamus. Coindicant autem hæc detractionis quātitatem, non ipsam sanguinis detractionem. Itaq; ex morbo, ætate, & viribus, minuendus esse sanguis cognoscitur: At vacuationis quantitas non ex istis modo, sed ex alijs deprehenditur. Ea sunt, plethorica vocata syndrome: aeris nos ambientis temperies, in tempus & locum diuisa: eaq; quæ in antea facta acciderunt vita circa comestorum tum quantitatē, tum qualitatem: excretionēq; ac motiones, aut factas, aut non factas. Sed quæ nam sit in his diuersitas, paulo post viderimus.

De Ratione Vacuandi eos, qui Cum plenitudinis indicijs Sanas obeunt Actiones.

CAP. 10.

In præsentī autem de vtriusque plenitudinis notis contemplabimur, an vbi ex in homine solita negotia obeunte apparuerint, mittendus illi omnino sanguis sit: an id necessarium non sit, vbi nulla magni affuerit morbi expectatio. Porro quid hac de re sentiam, neminem velstrum ambigere

DE CVRANDI RATIONE

gere arbitror, vt qui ſæpe affueritis ſanguinis miſſionem ſuadenti, tum podagricis, tum arthriti-
cis, tum epilepticis, ad hæc melancholicis, quiq; ſanguinem antea expulſent, aut in thorace ſtru-
cturam ſortiti eſſent ad id malum idoneam, præterea vertiginolis, quiq; aſſidue corripī ſolent an-
gina, peripneumonia, pleuritidibus, hepatidibus, ophthalmijs vehementibus, aut, vt in ſumma di-
cam, magno quopiam morbo. Nam in illiuſmodi omnibus neceſſarium eſſe remedium minutio-
nem ſanguinis arbitror conſeſtim adhibita poſt habitam virium atq; ætatis rōnem. Hæc enim ſi
forte aliquando nō dicantur, ſubintelligere oportet. At qui nihil euſiſmodi vnquā antea perpeſſi
fuerint, omniumq; corporis partium inculpatam ſortiti conſtructionem, geminam me vacuatio-
nis viam proponere noſtis, per veng ſectionem quidem, ſi in victu ſint intemperantes: citra hanc,
ſi temperantes. Licet. n. fricūonibus multis, balneisq; & ambulationibus, alijsq; motionibus, ad
hæc vñctionibus digerentibus, celeriter plenitudinem exhaurire, ſi vtiq; videbitur non eſſe craſſi
ſanguinis abundantia. Talis eſt vt plurimum maxime melācholica, raro vero crudorum quos vo-
cant humorum. Cæterum in redundantia humoris melancholici ſanguinem mittere præſtat, aut
certe omnino medicamento vti atram bilem expurgante. At vbi crudi ſucci exuperāt, ante quā
morbus inuaſerit, caute vacuabis: ſed vbi iam febris corripuerit, vti ante monui, nequaquam. Ha-
bebis vero eorum indicium tum colorem veluti plumbeum, aut ex pallido album, oīaq; potius q̃
rubrum, tum pulſum inæqualitatem. Si vero etiam admodum creuerit talis plenitudo, tum &
corporis illis grauitas ineſt, atq; ad motus pigritia, tum mētis tarditas, & ſenſus hebetudo. Cōtra
vero ſi quibus ex compreſſis hæmorrhoidibus cumulatius in corpore ſanguis extiterit, audaçter
venam incidet, etiam ſi antea grauem experti morbum non fuerint. Fieri enim poteſt, vt apti qui-
dem ad euſiſmodi aliquem fuerint, cæterum ob inanitionem quæ ex hæmorrhoidibus fit, nō dum
perpeſſi. Porro ſi quæ illis partes prauam ſortitæ ſtructuram appareant, ac potiſſimum in thora-
ce, omnino eis ocyllane ſanguinem detrahes.

De Ratione Euacuandarum Mulierum, quibus Menſtrua ſuppreſſa ſunt, ac quòd Sanguinis

miſſio Reuelliendi gratia inanitus etiam corporibus adhibetur.

CAP. 11.

Idem me ſentire nouiſtis & de mulieribus, quibus mēſtrua reſtitit purgatio. Neq; enim profe-
cto proroganda in his euacuatio eſt, non tñ neceſſe eſt illis venam ſcindere: quippe cum mal-
leolorum ſcarificationes ſuperfluitati quandoq; euacuandæ ſatis eſſe queāt: quæ & alioqui hoc eſt
habent, q̃ menſium vacuationem ciere poſſunt, ſicut etiam in malleolis ac poplitibus incide veng.
Nam plenitudines à ſuppreſſis menſibus ortas, omnino per crura euacuabis, ſiue venam ſecare
oporteat, ſiue ſcarificare. Sectæ enim in cubito venæ mulierum reuellere purgationem aſſolent. **G**
Porro quæ ex mulieribus albidiores ſunt, ſanguinem aceruare tenuem ſolent: quocirca adhibitis
malleolorum ſcarificationibus maxime iuuantur: At quæ nigriores ſunt, ſecta vena curato: craſ-
ſiorem enim ſanguinem, ac magis melancholicum colligunt, magis vero etiam ſi magnas habe-
re venas appareant, quod illis accidit quæ graciliores ſunt ac nigriores. Carnolis vero & candidis
paruæ inſunt venæ, quibus malleolos ſcarificare, q̃ venam ſecare præſtiterit, quippe cum hæc par-
uas in cruribus venas habeant: itaq; etiam ſi probe ſecentur, quod iuſtum tamen ſit, non profluat.

Cæterum non contemnenda venæ ſectio eſt, tanquam non ſit auxilium reuulſorium cum me ſe-
penumero conſpexeritis in valida ſanguinis e naribus eruptione eo vſum repente fluxionem ſe-
daſſe. Expediit autem, vti vidistiis, non eo vſq; ſanguinem educere, dum ad extremum vires ducan-
tur, ſed quoad quod ſymmetrum moderatumq; ſit, educitum videatur, prorumpentisq; ſanguinis
impetus nō dum flacceſcat, ſed validus permaneat: ſecare in cubito venam, ſi ex dextra nare pro-
rumpat ſanguis, in brachio dextro: ſin ex altera, in ſiniſtro. Simul autē cum hoc agis, artubus vin-
cula inijcito aut ex lana, aut ex canabe: tum hypochondrio directe ſuppoſito cucurbitam admitti-
to. Nam hæc nos faciendo, vt ſcitis, ſemper erumpentem ex naribus ſanguinem compelſcuimus,
cum antea experiundo quæ ſcribunt in nares inferenda medicamenta, atq; in frontem illinenda, **H**
inſirma omnia compererim. Itaq; ad ea quæ ſupra de ſanguinis miſſione dicta ſunt, & hoc quoq;
Menodoti opinionem conuincit, qui putarit plethoricam vocatam ſyndromē remediij nos admo-
nere. Nam quæ dicta eſt affectio, plethoricæ planè contraria eſt. Adhibemus autem ad eam ſan-
guinis miſſionem, non vt euacuatorium, ſed vt reuulſorium remedium.

Quando Melius ſuccedat Partita Sanguinis Detraçtio: quando Semel conſeſtim, vel ad

Animi deliquium vſq; Vacuandum.

CAP. 12.

Nihil æque artem medicam in agendo coniecturalem efficit, vti cuiuſque remediij quantitas.
Etenim cum frequenter compertum habeamus tempus inſtare exhibendi aut cibi, aut po-
tus, euſq; aut calidi, aut frigidi: quantum tamen dādum ſit, certo haud nouimus. Idem vſuuenit
in purgantibus medicinis. Nam quòd laboranti præbendum ſit medicamen, aut bilem tum fla-
uam tum atram, aut pituitam, aut ſeroſum excrementum euacuans, exacte nouimus: cæterum
quātum præberi debeat, nēſcimus. Atqui talis exhibitio corrigi poſtea nequit. Nam quod ſemel
in ventrem deuoratum eſt medicamentum, quo minus omne deuoratum ſit, fieri nō poteſt: neq;
poſſibile eſt, vbi plus quā conueniat, iam purgetur homo, partem oblati auferre. At in ſanguis-
nis miſſione ſummum id bonum eſt, euacuationem dum voles poſſe ſiſtere, ac rurfum quo videat
tempore,

* Al. & π-
α, μεθα & & α
ω. i. nō ſcimus
firmiter.

A tempore, fluere sinere, quoadusq; recte habere appareat. Quapropter præstat, nisi quid urgeat, priori missione minus detrachere, iterum q; eā repetere, immo si lubet, & tertio. Vbi ergo multa euacuatione est opus, verū vires sunt imbecilliores, in his euacuationem partiri expedit, uti nimirum & me fecisse vidistis in ijs, quibus crudiorum inerat humorum copia. Nā pauculo sanguine detractio, protinus melicratum exhibeo probe coctum cū incidentium medicaminum quopiam, velut hyssopo, origano, & interim etiā nepita, aut pulegio, aut certe cū melicrato oxymel, aut oxglycy: ac sic rursum sanguinem minuo, vel ipso eodem non nunq; die: interdū die postero, in quo rursum exhibito propolitorum medicamentorum quopiam, iterum de sanguine quid aufero: ac rursum tertio die similiter bis. Caterum vbi feruescentis inest sanguinis plenitudo, acutissimam accēdens febrem, subito ac simul euacuare expedit: eam q; inanire tentandum, vel ad animi deliquium vsq; virium modo inspecto robore. Itaq; memini quibusdam sex detractas protinus cotylas aut postridie, aut tertio quarto 'ue: quibusdam primo etiam die, cū febris principio noctis cœpisset, aut medio, ac quæ pridie comederant, probe fuissent concoctæ. Non nullis autē pridie inæqualitatem, aut sudorem, aut dolorem capitis alterius 'ue alicuius partis se sentire quærentibus, ac proinde parce esitantibus, vbi febris præcedente inualisset nocte, primo etiam die me sanguinem detraxisse memini. Nam in quibus tibi sanguinis feruentis copia apparet, quā ocyssime eum vacuare conator, priusq; in principem aliquā partem ingruat. Quamobrem nec per noctem sanguinem aliquando mittere verearis. Siquidem ridiculum est, quod quidam faciunt, à secūda diei horā ad quintam aut sextam solummodo sanguinem mittentes, haud alio quouis tempore: quos si non clysteres, cibum, aliā q; exhibere remedia quocunq; tempore noctis vidistis, grauiter profecto in illos inueheret: Quoniam vero omnia agunt haud præfinito vno horarum numero omnibus morbis communi, sed ut affectus moneat, in sola autem missione sanguinis dictum modo tempus semper obseruant, tolerabilis est illorum error. Sic itaq; affectis ægrotis, ut diximus, expedit & ad vsq; animi defectum sanguinē educere. Noui enim ex ijs quosdam necessario ex animi deliquio refrigeratos, ac toto corpore affluentibus madoribus & aluo rupta, celerrime morbo liberatos. Vtile est autem pulsuum diminutionibus animum aduertere, tangendo eos sanguine etiamnum fluente, sicut in alijs omnibus dum sanguis mittitur, facere consueui, ne videlicet nobis nec opinantibus, pro animi deliquio mors occupet: quod sanè tribus euenisse medicis noui. Venam secabat eorum vnus mulieri febricitanti, aliorum vter q; viro, sed ad tantum animi duxere deliquium, ut vires recuperari non possent. Proinde satius est tam copiosis vacuationibus abstinere, nisi magna incumbat necessitas. Quin & reuulsionem, non leue & ipsam auxiliū, quod q; sæpe secta adhibetur vena, quanto maiorem in numerum particulares auxeris detractiōes, tanto efficaciorē effeceris. Hæc itaq; prænouisse præstabat.

** Al. grauitatem. & ita est legit Oribasilus.*

Quæ Præuidenda ante Venæ sectionem, ut Tuto Sanguinem mittamus.

C A P. 13.

Rursum autem à principio ad propositam reuerſi speculationem, exponamus quæ summe necessaria esse compertum habemus ijs, qui innoxie venæ sectiones obire semper volent. Primum omnium scire conuenit, dum propositi scopi huius præsidij augentur, maiorem indicari euacuationem: dum vero exoluuntur, tantum detrahendum de sanguinis missione, quanto illi minores euaserint. Morbi itaq; magnitudo cum virium robore primi erant mittendi sanguinis scopi, ille quidem quæ facienda sunt indicans, hic tanquam illum haud prohibens, id quod contraindicare iuniorum medicorum quidam appellant. Non nunquam enim affectio mittendum sanguinem commonet, caterum virium contra robur prohibet. Quibus ambobus scopis presentibus, constat, ut ante diximus, nullam esse crudorum humorum tantam talem q; plenitudinē, quæ hoc inhibere auxilium possit. Deinde considerandum quæ sit naturalis hominis temperies. Nā quibus amplæ sunt venæ, qui q; modice graciles sunt, nec candidi, neque tenera carne præditi, copiosius euacuabis: contrarios autem parcius, quippe qui exiguum habeant sanguinis, carnem que facile transpirabilem. Hac ratione nec pueris venam tundes vsque ad quartumdecimum ætatis annum: post quem si multus congestus sanguis appareat, tempus que anni vernum fuerit, regio que natura temperata, & pueri natura bene sanguinea, sanguinem minues: multo que magis si aut peripneumoniæ, aut angina, aut pleuritidis, aut alterius acuti grauisq; morbi, periculum incumbat. Detrahes autem primum, ut summum, ad cotylam vsq;. Quod si postea perpēdenti vires, permanere validæ videantur, dimidium eius adicies, reiterata missione. Didicisti autem vehementi pulsui cum æquabilitate, tanquam minime fallaci virium robustarum signo, fidem semper habendam esse, ex abundanti autem & magno. Itaq; & septuagenarijs, modo dicti adsint pulsus, si affectus iubeat, venam secabis. Sunt enim quidam & in hac ætate multi sanguinis, vires q; habent robustas: sicut alij sicci, & pauci sanguinis, & facile areſcentes quauis percussa parte. Itaq; nō numero annorum solummodo animum aduerteres, quod quidam faciunt, sed & corporis habitui. Nam sunt qui sexagesimo ætatis anno venæ sectionem non ferant, cum quidam qui septuaginta nati sunt annos, perferant. Verū tamen minus his utiq; detrahes, etiam si eandem habere affectionem, quam florens corpus, appareant.

** al. nigrescentes. & ita Oribasilus.*

Sexta Classis.

ddddd

Quibus

Quibus Indicijs Vacuandi Sanguinis Mensuram discernamus.

CAP. 14. E

de viſt. Acu. cō.
2. lio. 7^a. 117. b

† oribus
legit δ το γάρ
ἐστὶ ταῦτα
διὰ μὲν ἰσθμῶ
ἀνθρώπου το
πρόσθεν αἱ. Duo
enim hæc sūt,
ob quæ maxi
me ignoratur
quantitas eu
acuatiōis i hoc
auxilio, labo
rantis natura,
cū qualis ip
sa sit ad am
plius cognoscere
nequeamus, et
ambicis & c.
Quamquam nō
vident hæc duæ
scripturæ ad
modum inter
se differre.

* πρὸς ἐστὶ
in codicib. græ
cis, oribus
aut legit πρὸ
δὲ 1. passio.

Optimum autem fuerit, priusquam aperiatur vena, hæc omnia considerare, & maxime hemor
rhoidibus suppressis, aut muliebri purgatione. Vbi vero incisa vena sanguis effluit, muta
tioni eius et maxime cum adest iam phlegmone, labascens quæ fluxionis robori, potissimum autem
pulsuum mutationi tanquam indicio haudquaquam mendaci, animus diligenter attendendus est:
continuo quæ quiescendum pulsu alterascente aut in magnitudine, aut in quavis inequabilitate. Nā
de mutatione in imbecillitatem, quid attinet dicere? didicisti enim in hac qualitate certam fieri di
scretionem firmarum, infirmarum quæ virium. In quibus autem iuxta sectam venam phlegmone
est ingens, optimum est sanguinis & in colore & in consistentia mutationem expectare, sicut indi
cauit Hippocrates in libro de acutorum vitio, quando de pleuritide verba facit: alius enim est qui
in phlegmone est sanguis, ab eo qui secundum naturam, ut pote plus excalfactus. Nā si antea cru
dior erat, rubrior modo & flauior efficitur: si eiusmodi prius fuerat, ad atredinem vergit adustio
ne. Proinde Hippocrates de pleuriticis hunc in modum scripsit: || Secunda vero in cubito vena
interna: nec verearis multum detrahere, donec rubrior flauior quæ multo fluat, aut pro puro & ru
bro liuidus, utrumque enim euenit. Siquidem signum constituit assumpti alicuius in sectam venam
ex phlegmone sanguinis, mutationem in eo apparere. Non tamen omni ex parte hæc expectanda
est: sed est quando antequam fiat mutatio, cessare conueniat, id quæ duplici nomine, ob infirmas vi
delicet vires, aut phlegmones malignitatem: interdum enim nihil ab ea emittitur, sed inibi fortiter
constrictus est. Si tamen vires excludi euacuatione non dum videantur (id quod ex pulsu scies,
& si cui sanguis mittitur, atate sit florenti) expectanda est mutatio, potissimum si ambiens sit tem
peratus. † Duo enim hæc sunt, ob quæ maxime coniecturalis efficitur euacuationis in hoc auxi
lio quantitas, laborantis natura qualis sit, quam utique ad amissum nouisse non liceat: & ambientis
temperies qualis sit à missio sanguine futura. Nam cū febrilis calor multum sanguinis digerit, atque
abstinenter laborans vitiat, necellario breui illum nutrimentum ex sanguine destituit, interim quæ
virtus exoluitur. Absumitur autem ob laborantis quidem temperiem si calida humida que sit, cur
iusmodi est puerorum: ob ambientem vero si regio sit calida, & tempus aestiuum. Proinde minus
detrahimus, quæ plenitudo commonet quod ad aetates quidem attinet, in pueris: quod ad corporis
habitus, in candidis, & quibus mollis tenera quæ est caro, quales Galli sunt: quod ad tempus, sub Ca
ne: similiter etiam in regionibus & constitutionibus. Alia vero ratione, ut & ante propositum est,
in contrarijs, hoc est in frigidis tum teporibus, tum locis, largam euacuationem fugimus, pro
pter insequentem nimirum refrigerationem. Quapropter vnum definire in quoque dictorum va
cuationis modum scripto non licet. Memini enim quibusdam ad sex vsque libras sanguinem detra
cium fuisse, ita ut febris protinus exstingueretur, nec vlla sequeretur virium afflictio: quibusdam
vero sesquilibram haud citra leue saltem virium detrimentum: quibus si quis duras vacuasset, ex
treme latisset. Quapropter vtiliter quibusdam vnam quoque detraxi aliquando, immo vero non
nunquam hac quoque minus, id quæ ex vena aut cubiti, aut poplitis, aut tali. Nam ex venis quæ
ad magnos oculorum angulos conspiciuntur, aut sub lingua, quod certe mentione dignum sit, ef
fluere non solet: sicut nec liquis summa in manu aut pede venam secet, quemadmodum putant,
qui lienem curari aiunt à venæ quæ ad secundum paruum digitum sita est, sectione, de qua fusius
deinceps differetur.

Quod Natura Euacuatione è Directo soleat Affectus omnes persanare.

CAP. 15.

Quæcumque igitur de hoc scemate siue speculatione, à medicis dicta sunt, ea si scribere aggre
diar, opus erit libro ijs singillatim dicato, eo quæ ingenti. Caterum quemadmodum in alijs,
quæ hæcenus definita sunt, effeci, ut si & mentem meam vobis exponerem, qui cam à re
bus ipsis probari vidistis, idem nunc quoque faciam, sumpto initio ab ijs quæ quotidie in laboranti
bus videntur: quæ quidem Hippocrates diligenter obseruata, memoriæ prodidit. Est vero eorū
vnum primum quæ caput, hoc scilicet: Quibus scilicet κατ' ἔξω eruptio sanguinis accidit, summum
id commodum laborantibus affert: hoc autem κατ' ἔξω quod in rectum intelligatur, omnibus
confessum est, cū clarissime sæpenumero hac voce κατ' ἔξω in hoc vtatur significato: Quibus ve
ro contra euenit, nihil iuuat, aut etiam interdum nocet, quæ vires scilicet citra morbi leuamen deij
ciat atque exoluat. Non enim in liene turgente ex dextra nare erumpens sanguis, nec in iecore ex si
nistra, vllam fert vtilitatem: sed reuulsio quibus in directum adhibetur, euidentem vtilitatem cele
riter ostendit: quibus contra, haud etiam. Dextra igitur nare sanguis erumpens, ad dextrum hypo
chondrium fixa cucurbitula, clare celeriter quæ sistitur: sicut ad sinistram, ex sinistra erumpens. Por
ro reuulsionis causa, si venam secet, in directæ quidem oppositis sanguinis eruptionibus, citissime
conspiciam videbis vtilitatem: at si contra secet, nihil profuerit.

Venæ Sectionem è Directo patientis Partis fieri oportere: Ac de Venis quæ in Cubito secantur.

CAP. 16.

* in græcis cod.
non habetur
hæc particula
negatiua.

Si affectio liene haud æque adiuerit circa anularem digitum sinistrae manus incisa vena, at
que si internā cubiti secueris: multum enim iuuat afflictum lienem sanguinis ex sinistro bra
chio detractio. Præstat autem non semel quantum conueniat extraxisse, sed in duos dies id partiri
satius est. Inuenire tamē nequeo, quam ob rem medici lienosis sanguinem detrahere neglexerint:
siquidem

A siquidem ego ingentem perpetuo vilitatem prouenire conspexi, si vel libra duntaxat vna detracta foret. Vacuationis tamen mensura ex dictis scopis conijcienda est. Quin & pleuritis, quæ è directo laborantis lateris adhibita fuit sanguinis missio, clarissimam sæpe vilitatem attulit: quæ vero ex brachio opposito, aut omnino obscuram, aut certe post temporis interuallum. Ad hæc, oculorum persæpe dolores grauissimos è directo venæ, quam humeralem nominant, sectio intra horæ vnus spatium compescuit. Conari autem in omnibus affectibus præstat, post modicâ sanguinis missionem iterato mittere: interim eodem die, si ita expedire videatur: interim posttridie: nisi quando, vt ante dictum est, ad animi deliquium euacuationem ducere conueniat. Itaque dolentibus oculis humeralis vocata vena, quæ q̃ ex ea deriuata est, in cubito incisa, luculentum celeriter commodum asserunt: Affectio vero latere, aut pulmone, aut septo transuerso, aut liene, aut iecore, aut ventriculo, ea quæ per alas ad cubiti iuncturam pertingit. Hoc autem casu maxime interior secanda venit: quod si non, certe ea quæ ab ipsa diducta in iuncturâ apparet flexura. Nouissis sanè paulo ante ab humerali vena prædictam diduci, ipsam connectentem. Nam hi tres sunt loci mittendi ex cubito sanguinis, interior, exterior, medius. Igitur interior vtilis est in ijs, quibus inferiores collo partes patiuntur: Exterior vero in ijs, quibus quæ his superiores sunt, vt facies, aut caput. Medius locus interdum vtrasque habet diductas venas in vltiorem brachij partem tendentes, ac deinde hic coeunt: interim vero celeriter in vnum mutuo congregientes, in ipso videlicet iuncturæ flexu: ac non nunquam obscuram earum alteram, claram vero alteram. Itaque vbi vena quæ parti affectæ propria est, obscurior fuerit, & ad mediarum aliquam accedas, conare, quæ à propria diducitur, potius incidere. Est vero vbi & quæ inferiores sunt cubiti iunctura, eas quæ in vna existunt scilicet, nihil secare prohibeat, vbi nimirum quæ in cubito sunt, non appareant, sed eas certe quæ in rectum sunt affectis. Porro tam perspicuum sæpe celere q̃ remedium, quæ è directo affectis partibus venæ secantur asserunt, vt & qui patiuntur, & familiares ipsorum, sæpenumero obstupefiant.

Historia Oeconomi Romani diuitis, Qui fuit ab Oculorum inflammatione, ac cæcitatæ periculo, per Sanguinis missionem è Directo, liberatus.

CAP. 17.

I Taq̃ ego olim rogatus sum à diuite quopiam in suburbij Romanæ vrbis, vt rerum suarum Oeconomum inuiserem, cui cæcitatæ imminerebat periculum, nam ita ille dicebat: certe magno dolore vexabatur, id q̃ diebus iam viginti. Diuitis autem illius familiæ præfectus erat medicus sectæ Erasistratæ, anxie semper venæ sectionem refugiens. Vbi ergo laborante inspecto, iuuenem cum multi sanguinis cognouissem: ac oculos quidem non dum vlcerosos habere, cæterum phlegmonem maximam fluxionem q̃, tum in ambabus palpebris densitatem, atque in altera quasdam etiam asperitates: à quibus oborta caligine ægrotus magis magis q̃ dolebat, ac phlegmone fluxioq̃ acerbabantur: his inquam conspectis, cognita que omni ratione curationis, qua medicus ille vsus fuerat: me quidem assidue in suburbium venire posse negabam, cæterum ex vsu esse vt triiduum vt minimum hominem paruis temporum interuallis inspicerem. Permite igitur illum inquam mihi, si videtur, tres hosce dies. Immo vero, inquit, vt facias obsecro, gratiam que habebo: quin iam hominem tecum ad ædes tuas in urbem abduc. Venit autem circiter horam quintam: ac prima protinus detractio tres sanguinis libras exhausi, deinde hora nona aliam. À quibus mirifice resectus, inunctus est postero die mollium collyriorum quopiam, cui admistū erat quod vinum habet, sicuti in eiusmodi facere consueuimus, illitu sub palpebris facto, specilli cuspide in summo medicamen impositum ferente. Id primum quidem mane faciebam, deinde ad horam tertiam, postea ad nonam. Post quas inunctiones sub occasum Solis in balneum ductus est. Postero deinde die, palpebris extra versis bis inunctus est, maiore copia collyrij illius quod vinum recipit, D molli illi collyrio admista: dein ad vesperam lotus est. Posttridie vero mane obuius diuiti illi egressus, eò loci vbi ex vehiculis descendere solent, salutauit illum oculis apertis, phlegmone q̃ ac fluxione planè liberis, qui ante biduum illos ne aperire quidem præ fluxione atque dolore potuerat. Itaq̃ res incantationi similis visa est, adeo vt & ipse ille curationis celeritatem admiratus, exclamaret, vna q̃ qui cum eo erant omnes in clamorem prorumperent: cum nos interim haud magnum quippiam fecissemus, nisi tantum ex medici illius comparatione, qui summum malum attulerat venæ sectionis metu. Porro ex palpebris restabant extergendæ laboranti tum densitates ille, tum asperitates, cæterum id fieri non poterat citra medicamentum mordax. Atqui ferre illud neutiq̃ potuisset, nisi prius vacuatus foret: dictum enim sæpe à nobis demonstratū que est, Acrida omnia medicamenta parti cuius admota, nisi vacuum corpus omne fuerit, atq̃ ad amissim excrementi expers, fluxionem attrahere, phlegmonem que efficere. Percontatus itaq̃ tunc diues, quæ nam ea fuisset incantatio, re que omni intellecta, exinde Erasistratæum illum medicum αἰμοδιόζον, quasi dicas sanguifugum, nominabat. Hæc itaq̃ narratio vtriusq̃ indicationem continet, tum quod in affectionibus eiusmodi venam secare oporteat, quod in præsentis oratione propositū nobis haud erat: tum quod è directo laborantium partium: præterea humerales venas secandas, vbi superiores pectore partes laborant.

Sexta Classis.

dddddd ij Quo

DE CVRANDI RATIONE

Quæ venæ Quibus affectibus secunda: Ac de Ratione Euocandorum menstruorum. CAP. 18. E

Porro quemadmodum prædictæ oēs partes in cubito secunda vena iuuantur, vti dictum est: sic quæ his inferiores sunt, illis quæ per poplites & malleolos decurrunt. Sunt autem dictis inferiores coxendix, vterus, velica. At renes cui parti adscribi debeant, ambigunt: siquidem inferiores sunt ijs, quas prius recensuimus: superiores vero quæ ex quo secundo loco. Itaque nullo ex cubito sanguini interdum auscultant, vbi videlicet recens fuerit phlegmone, copia quæ sanguinis affuerit: Quibus vero affectior inest, quam proprie nephritin noiant, eam quæ in poplite est secare expedit, aut certe quæ in malleolis sunt. Porro vteri inflammationes magis etiam quæ renum, à venis in crure secus iuuantur. Nam quæ ex cubito fiunt euacuationes, aliud etiam habent adiunctum malum, nempe quod purgationes menstruas comprimant, sanguinem ad superiores corporis partes retrahendo: Quæ vero fiunt ex cruribus, tantum abest ut retrahant, ut etiam menses promoueat: Ac vbi id facere volueris, tempus consueti mulieri circuitus tribus quatuorue diebus antequeris, aut vena incisa, aut scarificatis malleolis cruris vnus, pauculum euacuato: deinde postero die similiter facito in crure altero: ut tamen et illis diebus in quibus vacuas, & ante eos quatuor aut quinque, extenuantem victum procures. Conscripserunt autem à nobis seorsum liber de Victu extenuante. Sed mulieribus sine huiusmodi victus ratione menses abunde prouocant & nepita, & pulegiū. Exhibebis ea in melicrato cocta, sed antea contusa, arida, cribro quæ subtili discreta, ac rursus trita vique dum pollinem tenuitate referant: ita denique melicrato insperge. Porro convenientissimum potui tempus est à balneo, inuolutis adhuc linteis. Atque hæc quidem medicamenta mitia sunt. Valentiora sunt, saturna, & distamnium, cæterum vsus ante dictis similis. Datur autem & hoc tempore medicamentum, quod proprie Amarum appellatur, centum habens drachmas aloes misis aliorum medicaminum cuiusque sex. Optimum est, vbi cinnamomum acceperit. Sed hæc obiter sunt dicta, quanquam non à re ipsa aliena, quandoquidem sanguinis ex vtero fluxui auxiliantur, cum euacuatione ex cruribus, quæ fiat aut malleolis scarificatis, aut incisa in talo aut poplite vena. Memini me ischiadas huc coxendices, vno die facta ex crure euacuatione curasse, nimirum vbi non ex frigore, sed impletis sanguine quæ in coxa sunt venis, prouenissent. Quare secunda in poplite vena commodior ita affectu, est quàm in malleolo: scarificatio autem nihil perspicuo illis prodest.

*† fluxus fluxus
ad coxendices,
et coxendices
et coxendices.*

De Ratione Vacuandi per Sectionem Venarum In mitijs ac finibus fluxionum: Ac eo quoque tempore cum Preseruare ab imminentibus morbis voluerimus. CAP. 19.

Porro, ut summam dicam, incipientes phlegmonas reuulsu euacuare oportet: quæ vero inueterate iam sunt, ex ipsis, si fieri potest, affectus partibus: quod si nequeat, saltem ex vicinis. Etenim in incipientibus, auertere quod influit expedit: in inueteratis autem, ipsum tantum quod affectæ parti infixum est, euacuare. Euacuabitur porro id optime per venas coniunctas cum ijs quæ in partibus ipsis sunt litæ. Huc rationi experientia quoque subscribit. Quocirca quæ in gutture & arteria, graui torquentur inflammatione, in principio quidem secunda in cubito vena, post principium autem sub ipsa lingua, magnifice prodest, incilis videlicet venis quæ sub ea sunt ambabus. Sic indurata phlegmonarum in oculis reliquæ, secunda quæ ad magnum decurrit angulum vena, mirifice iuuantur: Sicut capitis grauitates, & inueteratos in eo ex plenitudine dolores leuare manifeste solet tusa in fronte vena: At incipientes, aut etiam vigentes, per cucurbitam in ceruice procurata retractio, interim quidem solam, interim cum scarificatione. Cæterum præuacuum esse corpus vniuersum oportet. Eadem ratione incipientes in occipitio dolores, aut etiam vigentes, incisa frontis vena iuuat. Quippe reuulsiones cum euacuatione adhiberi magis debent in fluxionibus incipientibus: quæ vero sunt ex ipsis partibus affectis, aut illis vicinis, in phlegmonis quæ velut scirrhi naturam referunt. In quibus autem corporibus nulla dum particula affecta est, cæteris vacuationem vere ineunte antequerimus, in ijs si quidem talis sit homo qui quotannis æstiuo tempore febrilibus morbis obnoxius esse affolet, atque eorum suppeditationem euacuare studemus, æque pars quæuis in sanguinis detractionem accommodata est: sicut sanè est si arthriticus sit, omnibus articulis laborans: Quibus autem eximie pars quæpiam, vbi prius euacuati non fuerint, infestetur, haud equè liceat ex quauis parte euacuationem moliri, verum sicut in ijs qui patiti iam occipiunt. Quamobrem podagricos ex cubito euacuato: comitialibus vero morbis vertiginibus quæ obnoxios, potius ex cruribus. Cæterum si retentæ hæmorrhoides mittendi sanguinis occasio sint, si quidē cohibere eas voles, quæ in brachio sunt: sin prouocare, quæ in cruribus sunt, venas secare conuenit: At in ijs quibus repressi sunt menses, semper in cruribus. Nō enim, ut in hæmorrhoidibus quidam eiusmodi liberari euacuatione volunt, quidam habere etiam gaudent, ita quoque se res habet in mensium purgatione. Quippe cum hæmorrhoidum euacuationem verreamur, ne in tantam euadārimmoderationem, ut hominem vel protinus interimat, vel hydropicum, aut cachecticum hoc est habitus mali, reddat: At vteri purgationibus, ut quæ secundum naturam sunt, tale nihil euenit. Accidit tamen aliquando, ut ex vtero per erosionem sanguis erumpat, in quibus non idem est curationis scopus: siquidem haud effluere sanguinem volumus uti ex mensibus, sed planè sistere consilium est. Communis ergo in his omnibus, ijs qui vere ineunte ad sanguinis missionem accedunt, hæc ratio est, Si quidem insigniter infirmam partē aliquā habeant

A beant, in quam quæ colligitur plenitudo decumbat, per reuulsionem euacuare: At si tale nihil sit, qua cuiq; magis placebit, excepta tamen aut hæmorrhoidis, aut mensium retentione, vt paulo ante definiuimus.

Aduersus eos qui Primis tantum Morbi diebus Sanguinem mittebant.

CAP. 20.

DE hoc sanè potestate & supra dictum est: veruntamen satius fuerit & hic quoq; omnia percurrere, omnibus quæ ante dicta sunt, in vnum collectis, & liqua non distincta sunt, vna discretis. Igitur vniuersum hoc sciendum, in sanguinis missione dierum numero primum haud esse attendendum, sicut quidam scripsere: Ac non nulli, admodum ridicule, post tertie diei paroxysmum, quando videlicet, vt aiunt, dignotio quædam habetur, qualis sit in forma & moribus arque adeo tota natura sua morbus. Alij extremum terminum mittendi sanguinis denuntiant diem quartum: intra quem missionem sanguinis concedunt in paroxysmorum interuallis adhibendam, electo quo libeat die. Alij detrahere festinant, quibus sanguinis detractionem ex vsu esse statuerint, transfluente etiamnum eo, ac vbi nec dum firmiter in parte aliqua superfluitatem recipiente inheret, vnum modo considerantes, num corruptio aliqua cibi in ventre concoquendi sit facta, aut tarda concoctio, aut etiam cibi in eo contineantur. Ergo q̄ maturandum sit, in quibus vacuatio ex vsu est, nisi prius concoqui aut cibos, aut in primis venis contentos semicoctos succos, oporteat, rectissime præcipiunt, habenda q̄ fides. Verum quoniam quintum sæpe diem, aut sextum ab initio expectant, priusquam nos ad curandum accersant, expedit nihilo secius quoq; sanguinem detrahere, etiam si huius auxilij primum tempus sit omissum. Quocunq; enim die mittendi sanguinis scopos in laborante inueneris, in eo auxilium illud adhibeto, etiam si vel vigelimus is ab initio extiterit. At qui nam fuerint hi scopi? Morbus ingens, Robur q̄ virium, excepta ætate puerili; et ære nos ambiente valde calido. Porro autem qm̄ prius exoluitur tēporis tractu in pleniq; morbis virtus, idcirco & mittendi sanguinis occasio dierum numero deperditur: non tanq; primario id dies efficiant, sed re aliqua intercedente, nempe virium dissolutione. Itaq; si quando vel secundo à principio die vires exolui videantur, à vena secanda abstinēbimus.

De Hora in Detractione Sanguinis eligenda.

CAP. 21.

SEd enim quod in ipso rursum die in quo sanguinem mittimus, obseruanda sit febris declinatio, clarere satis arbitror: quanquam quibusdam id non satis sit notum, qui manè tantum tundendam esse venam, aut ad summum in horam vsq; quintam aut sextam, existimant. Verum si quis memoria teneat quæ toto supra libro sunt dicta, nihil tale committere, sanguinem mittens quauis diei noctis q̄ hora, modo respiciat. In febrientibus quidem particularium paroxysmorum declinationem: In quibus aut aut ob oculos lippitudinē, aut aliud simile, citra febrē, hoc opus est auxilio, non declinationem omnino, cum oīno febris non adsit, sed magnitudinē aut doloris, aut phlegmones, aut totius affectus, in quo secta opus est vena, inspicere conuenit. Cum autem nihil eiusmodi aut vrgeat, aut prohibeat, præstat mane venam incidere, haud protinus ex somno excitis, verū circiter horam vnā iam antea vigilantibus. Dictum est autem, quod & lauacro vti quibusdam expedit: quod si verum est, & præeunte quoq; ambulatione non nullis. Caterum in quibus vere ineunte venam incidere aggredimur, aut propter febris metum, aut alterius cuiuspiam affectus, scio me sanguinem misisse quibusdam etiam, posteaquam rerum solitarum quippiam obiissent, siue in ludo literario, siue in officinis, siue in foro, siue in ædibus. Iterata tamen detractionis tempus, in quibus simpliciter quidem vacuare conamur, eodem die esto: At in quibus reuellere, si vel duobus deinceps diebus fiat, melius fuerit. Porro intento semper animo in omnibus id genus in laborantis vires esto, manu iugiter arteriis illius admotā: sunt enim quidam tam ad patiendum apti, vt confertam inanitionem non ferant: quo casu, refectio primo die egroto, iterare secundo detractionem expedit.

D*De Affectibus, qui Arterijs in Capite disiectis inuadunt.*

CAP. 22.

QUod autem arterias antiqui venas appellabant, & à nobis alibi demonstratum est, & ante nos aliis confessum extitit. Ob id ipsum ergo, ac præterea ob disciplinarum affinitatem, compendii gratia satius mihi visum est, haud alium conscribere librum de arteria secanda, sed orationi de secanda vena annexere, atq; id ipsum in hac parte, in qua consideramus quas venas ob quas partes affectas secare oporteat. Sicut enim alias venas ob alias affectas partes eitenimus secandas, sic quoque & quæ in temporibus sunt arterias, & quæ post aures, incidere medicis mos est: In temporibus quidem, infestantibus oculos fluxionibus tum calidis, tum spirituosis: Post aures vero, in vertiginosis maxime, & ijs qui diuturnis doloribus capitis calidis ac spirituosis affliguntur. Iam vero & ob alios quoque affectus in capite consistentes diutinos, sunt qui arteriarum post aures vtuntur sectione. Non tñ in vlla alia particula patiente eam adhibuerunt, tametsi multæ sint, quibus hoc potius auxilio, quam venæ sectione, sit opus: Vbi enim calidus spirituosus q̄ infestus est sanguis in arteriis accuatus, illic communibus parti affectæ secus arteriis est opus: verum propter difficilem eruptionis sanguinis compressionem, arterias medici incidere metuunt: quippe cum, si quis in secanda forte vena arteriam vulnerarit, ægre statim sanguinis eruptionem compe-scat: ac vbi res optime cadat ad catricem perducta diuisione, tamen aneurisma fiat.

DE CVRAN. RAT. PER SANG. MISS.

De Periculo impendente ijs, quibus Non recte Dissecta sunt Arteria: et Quo pacto Galenus

E

Somnijs monitu Eas atq; est dissecare.

CAP. 23.

Quin & interijlle quoddam noui ab arteria interiori in cubito venæ subiecta, nō nullos quidem protinus ob vinculum circumpositum, volentibus medicis sistere sanguinis eruptionem, in gangranam incidentes: alios postea in aneurismate manu curando defunctos, necesse enim hic est laqueo vasculum constringere. Itaq; maiusculas proinde arterias medici refugiant, paruas autem tanquam haud ita multum profuturas: quanquam & ipsæ quoq; non nunq; haud paruum attulisse commodum visæ sunt, cum hoc q; & citra aneurisima cicatrice claudantur. Quin & si maior sit arteria, & ipsa quoq; citra aneurisima cicatrice includi potest, tota nimirum dissecata: id q; ipsum sæpenuero imminens ex sanguinis profluuiō discrimē sustulit: clare enim apparet, cum tota transuerlim per se totam discinditur, reuullis vtrinq; partibus ambabus, vnam sursum, alteram deorsum concedere. Atq; id quidem & venis verum moderate vsuuenit, sed arterijs semper plus q; venis. Sanè vero quæ mihi occasio extiterit secandæ arteriæ, nunc iam tibi edisseram. Monitus per quædam insomniā, quorum duo perspicuo mihi visæ sunt, accessi ad dextræ manus arteriam, inter indicem & pollicem sitam: siui q; fluere, donec sponte sanguis resisteret, nā ita somnium præceperat: effluxit autem non tota libra. Subito itaq; diuturnus extinctus dolor est in illa maxime parte fixus, qua iecur septo transuerso committitur. Mihi quidem hoc ætate iuuenili euenit. At minister dei Pergami, diutino lateris cruciatu laborans, liberatus est arteria in summa manu incisa, aggressus & ipse illud insomnij monitu. Porro alteri cui ex vulnere in malleolo inflicto dissecta arteria fuerat, sanguinis quidem cursus haud quieuit, donec ego vocatus totam disse cui: ac medicamento ex aloe et manna & ouorum albumine, pilis leporum molliusculis impolito, vsus fui: citra que aneurisima curatum est vulnus, obducta videlicet arteriæ osculo carne. Vir autem ille quartum iam annum haud exiguis temporum interuallis coxæ dolore vexatus, exinde prorsum sanus extitit. Hæc itaq; mihi persuaserunt, vt subinde in summis artubus, immo & in capite, arterias secarem in omnibus doloribus, qui à calida spirituosa q; substantia nasci videbantur, et maxime in mēbranis: quarum dolor punctiōi similis est, ac sensim expanditur, pungente quidem sensu vna in parte, tanquam in affectu loci centro, infixo: tensionis vero sensum percipiente omni circumcirca ad centrum particula.


SEXTÆ CLASSIS FINIS

aaaaaa bbbbbb cccccc dddddd

Omnes sunt terniones, præter dddddd duernionem.



VENETIIS APVD HAEREDES
LVCAE ANTONII IVNCTAE.



GALENI
LIBRORVM
SEPTIMA CLASSIS
CVRATIVAM METHODVM
tum diffuse tum breuiter descriptam, victus rationem
in morbis acutis, singulorum morborum facile
paranda remedia, priuatā quorundam mor-
borum curationem, chirurgię constitutio-
nem, fracturarum ac luxationum sana-
tionem, fasciarum deniq; & laqueo-
rum & machinamentorum
tractatum continet.

QVARTA HAC NOSTRA EDITIONE,
*non minimum splendoris consequuta, quàm plurimis locis ad
Græcorum codicum antiquorum veritatem restitutis.*


Loci etiam Hippocratis nunc primum in margine notatis.

Librorum index sequenti folio continetur.

Τὸ Θεραπευτικόν.




VENETIIS APVD IVNTAS M D LXX.



LIBRI SEPTIMÆ CLASSIS.

- GALENI De Medendi Methodo libri xiii, Thoma Linacro interprete,
denuo ab Augustino Gadaldino non nullis in locis ad græcorum exempla-
rium fidem nuper emendati. fol. 2
- De Arte Curatiua ad Glauconem libri duo, Nicolao Leoniceno interprete: ab
Augustino Gadaldino ad fidem antiquorum græcorum codicum aliquot
in locis castigati.
- Post hunc librum collocari debuerat libellus, cui titulus est, Quos, & Quando, & Quibus medi-
camentis purgare conueniat. qui est in Quinta Classe, pagina lxxxviii. qui liber est
cap. xxij. libri septimi Oribasij ad Iulianum Imperatorem.
- In libr. Hippocratis de Victus ratione in morbis acutis commentarij quatuor,
Ioanne Vasseo Meldensi interprete, ab Augustino Gadaldino pleriq; in lo-
cis ad græcam veritatem emendari. 108
- DE DIÆTA Hippocratis in morbis acutis, nunc primum ab Augustino
Gadaldino translatus. Hic liber in tribus, quos habuimus codicibus græcis
manuscriptis, (neq; enim adhuc impressus græce est) admodum corruptus
legitur: ita vt quandoq; vel nullo modo, vel vix sensus elici possit. Eius autē
mentio fit (si tamen is ille est) à Galeno in libro de proprijs libris quarto &
sexto capite. cliij
- De Remedijs paratu facilibus liber, ab Huberto Barládo Philiatrino olim trans-
latus, & multis in locis postea emendatus. 153
- De Remedijs paratu facilibus ad Solonem, Spurius, à Iun. Paulo Crasso con-
uersus, & nuperrime ab eodem recognitus. 161
- Liber tertius de Remedijs paratu facilibus, Spurius, Iun. Crasso interprete, re-
cognitus. 169
- Documentū de Puero Epileptico, Nicolao Leonico Thomæo interprete. 175
- In Librum secundū de Natura humana, Victore Trincauellio interprete. 181
- De Incantatione, Adiuratione, & Suspensione liber, Galeno falso ascriptus. græ-
ce non habetur. 181
- De Oculis, Spurius, Demetrio Græco interprete, à varijs mendis expurgatus.
græcum exemplar desideratur. 182
- De Renum affectuum dignotione atque medela, Christophoro Heyl inter-
prete, Spurius, recognitus. 191
- In librum Hippocratis, de Officina medici, seu de ijs, quæ in medicatrina fiūt,
commentarij tres, Vido Vidio Florentino interprete. 197
- In librum Hippocratis de Fracturis commentarij tres, eodem interprete. 223
- In librum Hippocratis de Articulis cōmentarij quatuor, eodem interprete. 251
- De Fascijs, eodem interprete. 293
- Oribasius de Laqueis ex Heracle, eodem interprete. 306
- Oribasius ex Heliodoro de Machinamentis, eodem interprete. 309

Hos sex libros quos Vidijs olim conuerterat, nunc idem etiam diligenter recognouit.



GALENI

METHODI MEDENDI ID EST

DE MORBIS CVRANDIS

LIBRI QVATVORDECIM

Thoma Linacro Anglo interprete.


Denuo ad Græcorum codicum fidem ab Auguſtino Gadaldino aliquot in locis emendati.

ARGVMENTVM PRIMI LIBRI

Theſſalum ac reliquos Methodicos reprehendit, qui in Sanitate ac Morbo dignoſcendo plurimum aberrarunt: docet que Principia methodi, qua Morbus tum dignoſci, tum curari, debet.

Retardatam ea de cauſa fuiſſe horum librorum editiōe n, quòd ignauiffimi ad bonas artes excolendas, maiorum que ſtudia amplexanda, Galeni tempore homines extiterint.

CAP. 1.



Q Vanquam & tu ſepe aliàs, chariſſime Hiero, & alij quidam amici me nunc hortantur, vt ſibi medendi methodum cōſcribam: & ego ſanè, tum vobis in primis gratificari, tum vero poſteros pro viribus iuuare cupio: ſemper tñ ſum cunctatus, ac diſtuli, id q; multis de cauſis: quas nūc quoq; ſatius (opinor) fuerit prius, q̃ opus ipſum aggrediar, exponere, ſunt enim ad ea, quæ poſt dicentur, ſanè nō inutiles. Earum igitur omnium illa præcipua fuit, quòd fruſtra me ſcripturum timebam, cū nemo propè dixerim, hac noſtra ætate veritatis inqueſitiōi ſit deditus, ſed pecuniā, & ciuilem potentiā, & inexplebiles voluptatum delicias, omnes eoſq; ſuſpiciāt, vt, ſiquis ſapiētię quoduis ſtudium ſectetur, pro inſano hunc habeant: quippe qui primam ipſam & vere ſapiētiā, quæ diuinarum humanarum q; rerum eſt ſcientia, ne eſſe quidem oīno exiſtiment: Medicinam vero, Rhetoricē, Geometriā, Arithmetice, Muſicen, ac reliquas id genus artes eſſe quidem autumēt, cæterum finem earū ſtudioſe perſequendum minime cenſeant. Me vero ex iis, qui me vnice diligere ſunt viſi, non nulli ſæpe increpant, quòd plus iuſto veritatis ſtudio ſim addiētus, quaſi nec nūi ipſi vſui nec ipſis in tota vita ſim futurus, niſi & ab hoc tanto veritatis indagandæ ſtudio deſiſtam, & mane ſalutando circumeam, & veſperi apud potentes cœnem: His enim artibus tum amari, tum amicitias cōciliari, tñ vero pro artificibus haberi: nequaquā ꝑ ex iis, quę in propria profeſſione ſint cōſequuti: Neq; enim eſſe, qui de ea iudicent, vbi omnes totum diem diuerſis ſtudiis tranſigant, mane quidem omnes ſimul ſalutationibus occupati, poſt autem diſtraeti, ad forum quidem & lites non exigua turba: ad ſaltationes autē & aurigas alia maior: iam vel aleæ, vel amoribus, vel balneis, vel ebrietati, vel comeſſationi, vel demū alicui corporis voluptati deditus ſanè non exiguus numerus: veſperi vero ruſſum omnes ad ſympoſia ſimul collecti: vbi poſt, quā {vino} ſe imple uere, non lyra citharā ue, aut aliud muſicum inſtrumentum in orbem circumfertur, (quod ſicut olim in eiufmodi cōgreſſu tetigſſe honeſtum, ſic contra non tetigſſe admodum erat turpe) ſed nec ſermones vlli habentur, quales in ſympoſiis agitari ſolere veteres prodiderūt, nec aliud honeſtum quicquam: immo inuicem ſibi propinant, & de magnitudine poculorum certant, vtpote inter quos optimus cenſetur, non qui plurimis inſtrumentis muſicis, aut etiam ſermone philoſophico vti nouit, ſed qui multos, eos q; maximos calices exicauit, adeo, vt mihi mane etiamnum ebrj ex his pleriq; videantur: non nulli vero etiam euidenter adeo vinum olere, quā ſi modo hauſſent. Eo q; iure fit, vt, cum egrotare cœperint, medicos aduocent, nō quidem optimos, vtpote quos per ſanitatem noſcere nunquam ſtuduerunt, ſed eos, quos maxime familiares habent,

Septima Claſſis.

aaaaaa ij

qui q;

† EX TIT. 1. 6
ES TIT. 1. 6
SUNT

METHODI MEDENDI

qui q̄ ipsi maxime adulantur: qui & frigidam dabunt, si hanc poposcerint, & lauabunt, cum ius E
ferint, & niuem vinum q̄ porrigēt: postremo quicquid iubebitur, mancipiorū ritu facient, con-
tra, q̄ veteres illi medici ab Aesculapio oriūdi, qui, tanquā Duces militibus, & Reges subditis, im-
perare egris voluerūt, nequaquam vero Getarum, & Tibiorum, & Phrygum, & Thracū empti-
riorum ritu parere, atq; obsequi. Itaque, non qui melius artem callet, sed qui adulari aptius nouit,
apud istos magis in pretio est: huic q̄ omnia plana peruia q̄ sunt: huic ēdiū fores patēt: hic breui
efficitur diues, plurimū q̄ potest: huic discipuli multī à cubiculis, vbi iam fuerint exoleti, tradun-
tur. Quod Theilalus ille intelligens, non solum cetera Romæ diuitibus assentabatur, sed etiam
artem sex mensibus traditurū se professus, quā plurimos discipulos facile comparauit. Si enim
neq; Geometria, neq; Astronomia, neq; Dialectices, neq; Mulices, nec ullius deniq; bonarū di-
sciplinarum indigēt, qui medici sunt futuri, quemadmodum Theilalus iste generosissimus pro-
mittebat: nec etiam longam experientiam, & operum artis vsum desiderāt: cui non promptum
sit artem aggredi, ceu facile medico futuro? Atq; hinc adeo fit, vt nūc etiam futores, & tinctores,
& fabri tum materiarij tum ferrarij, proprio magisterio relicto, in medicinæ artis opera insiliant.
Nam, qui pictoribus & vnguētariis mixturas suas præparant, etiam de primo loco certant. Atq;
ob hæc ipse medendi methodum scribere sum cunctatus: quam utiq; & viri veteres inceperunt, F
& polierī eorum perficere sunt conati. Atq; olim quidem nō parua lis erat eorum, qui in Co atq;
Cnido habitabant, vtri videlicet inuentorum multitudine reliquos superarēt: quippe geminum
hoc genus Asclepiadarum adhuc in Asia supererat, deficiente nimirum, quod in Rhodo vique-
rat. Certabant autē cum his honestum illud certamen, quod Hesiodus prædicabat, etiam medici,
qui Italiani incolebant, Philistion, Empedocles, Pausanias, & horum sectatores: erant q̄ tres hæ
certatium inter se nobilium medicorum scholæ. Plurimos quidem atq; optimos discipulos Coæ
fortuna contulit: ab hoc Cnidiæ: nec tamen in paruo habenda pretio erat, & quæ in Italia nosce-
batur, At horum nemo nec mane potentium fores ipsos salutaturus, nec vespere cœnaturus, fre-
quentabat, sed sicut Hesiodus cecinit,

Nanque alium ditem cernens, cui deest, quod agatur,

Ipse solum vertit tauris, & semina ponit.

Ita & illi inter se perpetuo certabant, non utiq; de aranda ferenda'ue terra, (quippe quæ, vt Ascle-
piadarum genere interiora, sic Ascræo poetæ erant non indecora) sed de Apollinis Aesculapij q̄
arte tum exercenda, tum vero semper augenda, ac pro viribus perficienda. Nunc vero honestum
illud certamen intercidit, aut certe minimum eius inter homines adhuc superest: regnat autem G
inhonestum, nec est, qui hoc auertat, aut malo medeatur, vt Hesiodus,

Lis ne te inducat mala deuitare laborem,

Dulce malum alterius cui sit.

Hæc enī lis, vt Hesiodo etiam diuinior poeta cecinit,

Armatur primum tenuis, mox improba cœlo

Inscrit alta caput, terris vestigia figens.

*In Theilalum summæ arrogantia atque insensitæ hominem, qui se Hippocratem, à quo Academici Peri-
patetici ac Stoici ratiocinationes de natura mutuati sunt, gloriatuſ est superasse. CAP. 2.*

Huius litis stimulis agitatus ille Theilalus Hippocratem ac reliquos Asclepiadas maledictis
incessit, ac totius terrarum orbis theatrū in suis ipsius libris constituens, inibi iudicatur, vin-
cit q̄, & contra omnē antiquitatem coronatur, ipse q̄ à se victor declaratur. Hæc facit tum in eo
libro, quē de Communitatibus scripsit, tum in Syncriticis: quin in reliquis quoq; oibus cōtume-
liosus esse non desistit, veluti in epistola, quam ad Neronē mittit, his ipsis inter initia verbis vsus:
Cum nouam sectā condiderim, & quæ sola vera sit, propterea, q̄, qui ante me medici fuerunt, oēs
nihil vtile prodiderunt vel ad sanitatem tuendam, vel morbos propulsandos. Pergens autem in H
epistola, Hippocrates, inquit, noxia præcepta tradidit. Ausus est & Aphorismis eius cū summo
dedecore contradicere. Et, cum ostendat se in Hippocratica disciplina nec à quoquam institutū,
nec eius opera sub præceptore legisse, tamen non veretur etiam, talis cum sit, palmam sibi ipsi tri-
buere. Quo magis aliqua esse meæ partes videntur (quanq̄ aliàs parum assueui improbos acerbè
taxare) aliquid contra hunc ob veterum contumeliā dicere. Quid improbe, quæ bona sunt, ca-
lumniari tentas, vt multitudinē placeas, cum liceret tibi in veritatis contēplatione excellere, si dili-
gens esses, ac veritatis amator? Quid ita ruditatis auditorū patrociniū abuteris ad veterum blas-
phemiam? Num paternæ artis socios, impudentissime Theilale, iudices medicorū statues? Istis
scilicet iudicibus vinctus proculdubio, siue contra Hippocratem, siue contra Dioclem, siue contra
Praxagoram, siue contra reliquos oēs veteres dixeris. Quin potius viros antiquos, Dialecticos,
scientes, qui verum falsum q̄ discernere sunt periti, qui cōsequens ac repugnans distinguere, qui
demonstrandi methodum a pueris sunt meditati, hos, inquam, iudices in cōfessum introducito.
His sedentibus aude quippiā Hippocratem accusare. His pronunciaturis aggredere scelesti illa
tua barbara q̄ voce cōtra Hippocratem, primum illud disserere, Non oportere de hominis natu-
ra curiosum esse: deinde, si quis hoc donet, male illū de ea inquisiuisse, ac falsò omnia præcepisse.
Ergo

A Ergo quis iudex erit? num Plato? quando huic saltem iniurius esse minime es ausus. Ego vero ne discipulos quidem eius refugiam, non Speculippum, non Xenocratem. Aristotelis vero, vel rogem, iudicium subeas, & cum eo Theophrastu. Optem utique & Zenonem, & Chrysippum, & eorum, qui hos sectantur, quemlibet iudicem eligas. Horum nemo, vir audacissime, Hippocratis de natura hominis scita damnauit: quæ tu mihi nec legisse vnquã videris: nec, si legisti, intellexisse: & si intellexisti, iudicare certe de iis minime gentium potuisti, ut qui sub patre male lanas carpente, in gynacio sis altus. Nec enim putes nos, vel egregium genus tuum, vel claram doctrinã, latere: nec te Hippocrati & reliquis veteribus in surdo theatro maledicere: sed, qui sis, & vnde venias, quo genere ortus, qua educatione vsus, qua disciplina imbutus, prius ostende, atq; ita demum dicito, illud ipsum prius vir audacissime monitus, non esse cuius in vlla bene instituta ciuitate concessum, publice dicere: sed, si quis vir clarus est, qui genus possit, & educationem, tum vero eruditionem concionatore dignam ostendere, huic dicere permittunt leges. Tu, cum nihil horum ostendere habeas, audes tamẽ, homo generosissime, Hippocratem accusare: facis q̃ in nugacibus libellis tuis Græcos federe iudices: fers autem ipse sententiam, nec illorum expectas: et palmam tibi ipsi das modo de omnibus medicis, modo de omnibus in vniuersum Græcis. Hæc enim insignis audacia sapientissimi scilicet Thessali est, omnes se medicos vicisse, sed se ipso litigatore, se ipso agnotheta, se ipso iudice: post hos etiam reliquos Græcos in certamen prouocasse, Rhetoras, Geometras, Grammaticos, Astronomos, Philosophos: inter quos constitutum, ac lanificis elocutione vsus, censere se omnium primum esse: quippe medicinam reliquas omnes artes præcellere, se vero medicos omnes superasse: quod vnũ forte fortuna recte collegit. Si enim medicina est omnium artium præstantissima, in ea vero Thessalus primas partes obtinet, utiq; omnium hominum ita sit primus, ac Socratem & Lycurgum præcellat, ceteros q̃ omnes, quos Pythius vel ut viros bonos, vel ut sapientes, vel ut musarum ministros, vel ut louis famulos, vel deniq; ut alio quolibet munere diis gratos laudauit. Agedũ igitur Thessalo hymnos de cetero omnes cantent, scribãt q̃ victoriæ carmina: & publicum orbis theatrum constituatur: accedito q̃ aliquis, qui canat eũ, qui in traxina sit altus, vicisse Demosthenem, Lysiam, & reliquos Rhetoras: superasse Platonem, Socratem, & ceteros Philosophos: palmã eripuisse Lycurgo, Soloni, & aliis legislatoribus: victorẽ denique totius hominum generis coronatum esse, Rhetorum, Philosophorum, Legislatorum. Nam, si Geometras, etiam & Grammaticos, ac Musicos nominatim post tantos titulos commemorem, contumeliosus in hominem videar: ubi enim Lycurgus, Solon, Plato, Socrates, & Pythagoras dant manus, num pulchrum etiam sit Hipparchi, Archimedis, Aristoxeni, Aristarchi & aliorum quorundam id genus meminisse, hominum (ut Thessalus dicat) nullius precij? Sed quis tam magniloquus poeta nobis existet, qui hæc canat? Quis nũc dabitur Homerus, qui hexametro tono hanc Thessali victoriã celebret: aut quis Lyricus, qui veluti Pindarus alte in dithyrambis canat, qui que, sicut olim Bacchi, ita nunc Thessali præconium efferat? An horum potius nullum requirimus, sed eorum, qui iambos scribunt, Archilochum aliquem, aut Hipponactem, aut ex Tragica scena quempiam, qui sic hominem compellet?

“ Quiesce dum miserrime in stratis tuis,

“ Nanque haud vides, quæ te putas nosse probe.

Orestis mihi somnium narras Thessale. Quale nã id theatrum est, in quo tu vinctes Hippocratem? Qui iudices erunt? Qui nam præmia proponent? Vis ne, primũ Platonis suffragium legamus?

“ fortasse enim hunc iudicẽ non reiciies. Atqui ille hæc ad verbum ait: Animæ igitur naturã apte

“ putas intelligi posse, nõ cognita totius naturæ? Immo, siquidem Hippocrati vni ex Asclepiadarũ

“ genere fides est habenda, ne corporis quidẽ naturam absq; hac methodo. Recte ais amice: oportet tamen cum Hippocrate sermonẽ conferres, num cum eo cõcordet, estimemus. Sanẽ quidẽ.

“ Dlgitur de natura considerare, quid est, quod Hippocrates recta q̃ ratio dicat: Num ad hunc modũ

“ de cuiusq; rei natura primum illud perpẽdi oportet, sit ne, de quo volumus vel ipsi scientes esse,

“ vel alios facere scientes posse, simplex, an varias species habeat? Mox, si simplex sit, facultas eius

“ tota estimãda est, quã videlicet ad quid agendũ obtineat, aut quã ad patiendũ ab alio sit sortitum.

“ Sin plures habeat species, his enumeratis, quod in vna feceris, id in vnaquaq; exigere oportebit:

“ nempe quid illa facere per suam naturam sit apta, vel quid ab alio pati. Audistin vir bone Platonem simili methodo animæ naturam inueniendam esse censere, qua corporis naturam Hippocrates?

“ An adhuc vis, multas hominis dictiones ex multis librorum eius locis deligam, in quibus ille Hippocratem omnium, qui ante se fuerunt, maxime admiratur? An potius, cum id alibi fecerim

(nempe in eo opere, in quo de Hippocratis & Platonis placitis disserui) illuc, qui id scire volet, remittã,

“ ubi, ut arbitror, clarissime ostendimus, in plurimis maximis q̃ rebus horum hominum inter se consensum: atq; alio me conferens, alium tibi iam aduocẽ in testem, cœtum nempe Peripateticum, qui & ipse Hippocratis physiologiæ principia confirmat? Quin de hoc quoq; proditum à me in aliis cõmentariis est: quorum vnus de elementis secundum Hippocratem inscribitur: post hunc alij tres de temperamẽtis: mox alij duo, alter de inæquali intemperie, qui etiam ad tractationẽ

“ de temperamẽtis pertinet, alter de optima corporis cõstitutione: deinde etiã tres de naturalibus fa-

METHODI MEDENDI

cultatibus: hos igitur si quis leget, clare perspiciet rationum Hippocratis de natura Aristotelem E interpretē esse. Quin etiā de morborū discrimine, quot hi, qui q̄ sint, ac de symptomatis pario do, præterea de horum vtrorūq; causis, primus omnium, quos nouimus, Hippocrates recte prin cipia dedisse videtur: post eum vero Aristoteles fulissime ea est interpretatus. Hæc ita esse intelli get, qui commentarios nostros, quos de singulis horum scripsimus, legere non grauabitur. Qua re, si Peripatetici iudicium exercebunt, Hippocrates (arbitror) vincet: Thessalus, vt impudens et nequam, eiicietur. Sin Stoicis philosophis in cōfessum admissis iudicium permittetur, ex iis pla citis, quæ ipsimet statuunt, Hippocrati palmam dabunt: quippe || calidum, frigidum, siccū, & hu midum primus Hippocrates inuexit: post eum Aristoteles demonstratione asseruit. Eadē Chry sippi sectatores parata cum accepissent, minime sunt obluſati, sed omnia ex horū mistura consta re cōfirmāt, atq; hæc inter se mutuo agere ac pati, artificem q̄ naturā esse. Omnia deniq; alia Hip pocratis dogmata de natura recipiunt, nisi q̄ in re tenui est illis cum Aristotele dissensio: quippe cū recte Hippocrates affirmet totum || corpus esse (vt græce dicitur) *σύνπλεον καὶ σύρρεον*, quali cō spirabile & conflatile dicas, omnes q̄ animalis particulas mutuo à se affici, recipiūt quidem hoc vtriq; dissident tamen in eo, q̄ Aristoteles qualitates tantum in se mutuo transire, omnino q̄ mi sceri: Stoici non has modo, sed etiam substantias ipsas existimēt. Quod autē hoc definire medico F superuacuum sit: quod q̄ ad medicinæ opus abunde sit, si tantum concedantur ea, quæ ab vtriusq; sunt demonstrata, item q̄ qualitates virtutes q̄ in mistis totæ sint totis permiste: hæc & ante à me sunt demonstrata, & si res poscet, nunc demonstrabuntur. Quare & Platonis, & Peripateticorū, & Stoicorū iudicio, Hippocratis physiologiæ victoriā dabitur. Immo vero ex physiologia om nes ante dicti sapientiæ professores ostendunt neminem posse morbos commode curare, qui cor poris vniuersi naturam non perspexerit. Nunquid igitur, si de palma sub horum sapientiæ pro fessorum iudicio certasset Thessalus, vicisset, qui omnis suæ physiologiæ Hippocratem auctore habent? Quid autem, si Geometris, Astronomis, Musicis, aut Rhetoribus iudicium cōcedet, pu temus ne hos Hippocrate prætermisso alij vlli palmam duros? Ego sanē nec alium quēuis pri mas esse laturum arbitror, omnium q̄ minime impudētissimum Thessalum, vt quo nemo Geo metriam, Astronomiam, Musicen, ac Rhetoricē magis dehonestarit. Itaq; hac saltē ratione apud hos in parum amico theatro certauerit. Verū hos fortassis in theatrum minime inducet, vtpote quos ipse prior inimicos reddiderit, sed iis sapientiæ professoribus dūtaxat, qui in Dialectice sunt periti, vt qui verē falsæ q̄ orationis iudicandæ facultatem exercuerint, iudicium partes concedet. Atqui, si Platonem, Aristotelem, & Chrysippum, ceu parum in hac facultate exercitatos transibi mus, quos nam, quæso, alios inueniemus? Quare si nec aliarum artium professores iudices admit tet: nec, qui in Dialectice ceteris omnibus sapientiæ professoribus præstiterunt, illi suffragabun tur: qui tandem erunt, qui eum vicisse iudicabunt? Qui illi frequens theatrum constituent? Qui victorem renuntiabunt? Qui deniq; coronabūt? Ipse videlicet se ipsum: id quod in illis egregijs libris suis fecit, in quibus se ipsum iudicauit, coronauit, victorem que declarauit.

Aduersus Thessalum, qui nulla methodo duos in totum morbos, Fluxum scilicet & Clausum assenerauit.

CAP. 3.

AT fortassis illud sibi gloriæ memoriæ q̄ inter homines occasionē fore est arbitratus, si opti mis viris laceſsitis, nos sibi respōdere cogeret. Verum ita & Zoilus celebris clarus q̄ sit, qui Homeri statuam flagellauit: & Salmoneus, qui louem est imitatus: reliqua q̄ flagitiosorū homi num non exigua turba, qui vel meliores non sunt reueriti, vel in deos ipsos fuerunt cōtumeiiosi. Verū hi non bonam de se opinionem reliquerunt: nec æmulatur quisquā, qui compos sit mētis, nec Homeromastiga Zoilum, nec dementē Salmoneum, quāuis maledicis Zoilus in admiratio ne sit, & Salmoneus sacrilegis. Sed quid hos memoro? cum & qui oculos præcidūt, similia per ditorum studia, & proditores proditorum suspiciāt: nec est prorsus quispiam, qui proprium cœ H tum, in quo palman mereatur, nō delideret. Adeo si Thessalus inter coquos, tinſtores, lanificos; futores, textores, ac fullones, de victoriā certans scripsisset, vtiq; & retulisset de Hippocrate victo riam, & nemo nostrū ei repugnasset. Nunc, cum omnes homines iudices facit: ex horum autem numero sunt & Plato, & Aristoteles, & Theophrastus, & Chrysippus: nequaquā omne punctum solus feret, sed alicui fortassis prouocare ad aliū iudicē licebit. Quanq̄ enim Hippocrates certare cum Thessalo, vtpote indigno se, nolet, at forte Erasistratus non negliget, multo q̄ minus Hero philus, atque his etiam minus Asclepiades: alij q̄ multū iuniorum medicorum, quibus est ad con tentionem natura propensior, minime impune abire contumeliam linent, qua pariter omnes Græcos Thessalus aspergit, sed producto in mediū homine omnes eius libros crassissima igno rantia refertos Græcis ostendent: Qui tot ac tantis libris scriptis, & tot nugacissimorum versuum millibus effusis, nusquam in vlllo operum suorum demonstrationem vllam afferre tentauit, sed tyranni ritu duos tantum esse in omni victus ratione morbos iubet, nempe fluxum, & clausum, non intelligens se differentiam quandam morborum dixisse, quam vtiq; prisce (vt ostendemus) probe norunt. Ceterum nemo tam rudis fuit, vt differentias morborum ipsos esse morbos puta ret: ac remedium indicationem ab iis sumeret substantia ipsa prætermissa. Atqui hic Thessali paruus

A parvus scilicet error, quem vel puer in liberalibus disciplinis altus statim aduertisset: hic, inquam, parvus error eo insolentiae hominem euexit, ut magnum & praeclarum aliquid inuenisse se putaret: perinde ac si quis, cum omne animal rationale esse, aut irrationale dixerit, non animalium differentias, sed aliud quippiam dixisse se putet, cum, si huic illud quoque similiter sit dictum. Omne animal mortale est, vel immortale. Quippe oppositio, quae in singulis differentiis notatur, coniuncta de omnibus speciebus dicitur. Omne enim animal, aut mansuetum est, aut ferum. Omne animal, aut pedatum est, aut apes. Omne animal, aut cornutum est, aut cornuum expers. Nec est inter differentias inuenire oppositionem ullam, quae sit altera praestantior, aut potior, nec quae magis omnibus in sit particularibus. Verum non conuenit, cum de animalium numero quaeritur, unam differentiarum oppositionem respondere. Hoc enim pacto duo erunt animalia vniuersa, nec ullum magis rationale vel irrationale, quam mortale vel immortale, aut ferum vel mansuetum, aut reliquarum oppositionum quaelibet. Quod si quis differentiis omissis (sicut plane ratio exigit) equum, bouem, canem, hominem, aquilam, apim, formicam, leonem, & ouem respondeat, reliqua quoque omnia per species animalia connumeret, constat hunc querenti, quot sint in totum animalia, recte respondisse. Quin, si multa quidem sermone animalia memoret, testetur autem enumerare se omnia non posse, sic quoque

B commodissime responderit. Similis agitata questio de morborum numero, & omnibus antiquis medicis est, alii septem eos in totum esse affirmantibus: alii plures his pauciores uel dicentibus: omnibus tamen ad species, quae in substantia, non quae in differentia essent, respectum habentibus. Nemo enim ita erat indoctus, aut Logicae speculationis rudis, ut differentias specierum pro substantia loquendo usurparet: quemadmodum Theisalus iste, qui e gynaeceo exiliens, tantis viris maledixit, ipse nec genus habens, quod referat, nec educationem, nec eruditionem, qualem illorum quisque: quorum alius Aristotelis, alius Platonis, alius Theophrasti, aut denique alterius cuiusquam eorum, qui in Logica contemplatione fuere exercitati, familiaris fuit. Veluti igitur rogatus quippiam, quot sint in vniuersum vocis elementa, si duo ea esse responderit, quippe aut vocalem omnino, aut consonantem esse, quicquid vocis sit elementum, is verum quidem dixerit, ceterum ad quaestionem non responderit: Ad eundem modum, arbitror, si quis omnium morborum numerum comprehendere studens, speciem quidem ullam morborum, veluti phlegmonem, scirrhum, vel oedema, referre non curet, solas autem differentias memoret, siue clausum & fluidum, siue rarum & densum, siue durum & molle, siue tensum & laxum, verum hic quoque dixerit, minime tamen ad quaestionem responderit. Primum namque in eo error est, quod non omnis differentia generi addita, ad speciei constitutionem

C aliquid conducit, sed quae ex generis propria diuisione nascitur: quippe haec demum differentiae sunt, quae species constituent: reliquae omnes, alienae. Etenim animalis propriae differentiae sunt, mortale et immortale, rationale & irrationale, mansuetum & ferum, alia quoque id genus. Molle vero ac durum, graue & leue, rarum & densum, magnum & paruum, animalis differentiae non sunt, sed substantiae. Itaque, etiam si cum animali, vel molle vel durum, vel densum vel rarum, vel magnum vel paruum componas, ad speciem constituendam nihil sane plus contulerint: sin vel rationale & immortale, vel rationale & mortale animali adieceris, efficitur iam illic Deus, hic homo. Ita vero, & si rationali animali duas illas differentias peculiare addideris, quae sunt gressile & bipes, sic quoque speciem quampiam efficeris, nempe hominem. Vnde fieri non potest, ut ullius rei specificas differentias inueniat, qui eam in definitione, siue substantiae ipsius oratione, ad vnguem non circumscripserit. Alius deinde error incidere solet iis, quibus parum exercitata ratio est, quod cum unam aliquam differentiarum oppositionem inuenerint, speciem aliquam propositi generis se putent inuenisse: ceu paulo ante de vocis elementis est dictum. Siquidem, qui vocalem & consonantem dixit, non dum omnia humane vocis elementa dixit, sed duas tantum primas & generales differentias. Quod si vocales rursus in longas, breues, ancipites quoque diducat: tum consonantes in semiuocales, & mutas: item quoque tum longas, tum breues

D vocales bitariam, ancipites vero trifariam: sed et mutas primum in aspiratas, tenues, ac medias: dein rursus tripartito harum singulas: mox semiuocales propria (ne frustra multis morer) sectione secet, ita quatuor & viginti elementa vocis, quae Graeci vtuntur, inueniat: quippe id tamen dixisse, quod elementorum vocis quaedam vocales sint, quaedam consonantes, non dum omnium elementorum artificem, aut plane scientem auditorem reddidit: sed, si quis, ubi in longas, breues, & ancipites diduxerit, adiciat duas esse breues, nempe *e* & *o*, duas praeterea longas *η* & *ω*, tres vero ancipites *α* *ι* *υ*, sic sane artificem auditorem de omnibus vocalibus effecerit: item quoque de consonis ad eundem modum. Iidem, si quis tradere de morborum numero instituat, quot hi in vniuersum sint, non debet, arbitror, is in prima statim differentia subsistere, sed diuisa ea procedere, donec ad aliquam infimarum specierum, & quae amplius in aliam distrahi non possit, perueniat. Id vero, quam haud cuique sit promptum, sed ei duntaxat, qui in diuidendi methodo magnopere sit exercitatus, intelligere quique poterit, primum si omnia legerit, quae de eo genere methodi in principio Philebi a Platone sunt prodita, dein si Sophistam etiam & Politicum legerit. Iam vero difficilior adhuc res videbitur, si quis primum Aristotelis librum de partibus animalium legerit. Conatur enim in eo libro omnes animalium differentias enumerare: at, ubi multas dubitationes mouit, vix tandem suspecte ac timide pronuciare quippiam audet. Et, cum Aristoteles & Plato tantam tamque difficilem rem esse cen-

† In dictione
est. h. vel. dicitur
fieri, ad hunc
in dictione con
uenit.

† In cod. quae
as graecorum
in hac dictione
non habetur, et
cetera videntur
abundare, cum non
sentiantur sub
stantia, id est, ut
quod definitio.

METHODI MEDENDI

fuerint genera in proprias differentias exacte diuidere, ac post hos Theophrastus, & alij philosophi rationem absolute tentauerint, utpote ne apud illos quidem satis adhuc constantē, homo audacissimus Thessalus absolute, citra quā vllam rationem adhibitam pronuncians, credendū sibi censet duos in totum esse in victus ratione morbos, & eos quidem simplices, ac primos, & veluti clemētares: nam tertium ab his ratione gignit, ex ambobus cōpositum. At si vlla methodo hæc, sicut iactas, inuestigasti, cur hanc nobis non dixisti? Sed contra planē, quā pro grauitate nominis, quod tibi arrogas homo temerarie, atque a methodo alienissime, rem pronunciaſti: quī ne principium quidē ipsum vnq̄ attigeris, a quo cōpille necesse sit eum, quī recte cuiuslibet rei species, & differentias peculiares sit inuenturus. De re enim qualibet, o puer, vnum principium optimum, nosse id oportet, de quo proposita quæstio est, aut prorsus est aberrandum, Plato quodam loco ait, non ad diuidendum modo quiduis, ab ipsa quælitæ rei essentia nobis esse inchoandum censens, sed etiam in omni disquirenda re eiusmodi semper principio vtendum. Ergo hic quoque (arbitror) par erat, vbi, quid morbus sit, quid symptoma, & quid passio, diligenter prius dixisses: ac dein quā conueniant, differant quæ ipsorum singula, definiuisses: sic demum tentare in proprias ea differentias diducere, secundum eam, quam sapientiæ professores tradiderunt, methodum: aut, siquam potiorē ea, quæ ab iis prodita est, explorasses, hanc ipsam prius astruere: tum illud ostendere, ac Græcos docere, hunc, qui in tetrina sit altius, superatle Aristotelem & Platonem in methodis logicis, humo asilixisse Theophrastum & Stoicos in Dialectice, clarissime ostendisse oēs eorum sectatores, ne primos quidem morbos, qui essent, vnq̄ nouisse: dico & Herophilum illū Dialecticum, & cōdiscipulum eius Philotimum, & præceptorē eius Praxagoram, qui ab Æsculapio originem traxit, & qui cum his & ante hos fuerunt, Erasistratum, Dioclem, Mnesitheum, Dicuchem, Philistionem, Plistonicum, ipsum denique Hippocratē. Porro simplici verbo dicere oēs in victu morbos esse duos, non methodo, non demonstratione, non ratione vlla probabili, non lenimento aliquo, non alia re prorsus orationi adhibita, præterquā eiusmodi in veteres blasphemia, id facere, imperātis hominis est, non docētis. Esto vero taceas, quā logica methodo insistent, hæc inueneris: ac certe, vnde saltem de veritate sermonis iudicasti, adhibitum aliquid oportuit. Nam inueniendi eius, quod queritur, logicæ methodi facultatem præstant: At, quæ fidem iis faciant, quæ recte sunt inuenta, duo sunt apud oēs homines instrumenta, nempe ratio, & experientia. Quippe ad eum, qui interrogauerit, Cur huic febricitanti frigida bibenda potestatem feceris, duplex responsio est: Altera, quæ ortum naturam quæ febris docet, ac de morborum temporibus dislerit, tum ad eundē modum aquæ frigida naturā explanat: vbi hæc proposuit, conatur docere in hoc morbo, atque hoc tempore aquā frigidam congruū remediū esse: Altera de nullius horum natura sollicita, ad experientiam confugit, nempe quod in tali morbo atque tempore sepe frigida protexisse vidit. Debebat igitur (opinor) & Thessalus vel experimentū, vel rationem assertioni suæ probationem adhibuisse, nō, sicuti tyrannus, imperare, ac sibi citra demonstrationem credendum exigere. At quam (inquiunt) audire demonstrationem postulas? ita enim contra nos interrogat eius sectatores: neque id iniuria, ut qui nec eō vnq̄ peruenerint, ut notionem demonstrationis tenerent, cum nec Geometriam, nec Arithmetice, nec Dialecticē, nec Resolutoriam, nec denique logicam vllam speculationem attigerint. Quocirca respondendum his ita est: Nimis serō, quid demonstratio sit, discere postulatis: nec fieri potest, ut breui tempore speculationem, quæ subtilitatē mentis deliderat, assequamini, præsertim qui nec subtiles rationes audire sitis assueti, & peruersi in diuturno errore versati. Sed istos mittamus, ut qui ne intelligere quidem, quæ veræ disciplinæ sint, valeant nedum ipsas discere, aut recte iudicare.

† Additur in antiquis, μὴν εἰδέναι ἀκούειν, id est neque sciunt audire.

Quæ sit vera Methodus inueniendæ in vnaquaque facultate veritatis: & quā ab ea Thessalij, & plerique Veterum medicorum aberrarint.

CAP. 4.

NOs vero vnā cum iis, qui exercitati sunt, & demonstrationem intelligunt, & natura sunt sagaces, (neque enim Thessalios alinos docere profitemur) ad id, quod propositum nobis ab initio est, accingamur: ac statim vnā cū ipsa medendi methodo tradenda, etiā causas ipsas, vnde errarint medicorū plurimi, qui tradere eā sunt conati, exponamus: quippe ad firmiorē veritatis fidē id quoque non parum conducere videtur. Ac primum quidē illud caueamus, ne simul de ambobus tum methodo, quæ ratione nititur, tum experientia, quæ ratione nō vtitur, agamus. Non enim de omni remediorum inuentione nunc loqui statuimus, sed tū de ea, quæ hæc methodo explorat, ita utique, ut de Empirice ipsa & a nobis in alio opere est proditum, & ab ipsis Empiricis medicis, quos vocant, plurimū elaboratum. Atque vtinam Rationales oēs medici propositū ita premerent, nec experientiam & rationem miscerent, atque in vnum confunderent, sed quam utraqque vim habeat, quantum quæ ad propositum artis finem conducatur, seorsum tractarent, atque perpenderent. Ergo methodo quippiā inquirere inuenire quæ, ex aduerso opponitur ei, quod est fortuito temere reperire. Est autem id cum via quadam & ordine ita, ut in disquisitione aliquid primum sit, aliquid secundum, & tertium, & quartum, atque ita de reliquis omnibus deinceps, quoad demum ad ipsum, quod ab initio est propositum, sit peruentum. Ac Empirici quidē rationabiliter fatentur nec inueniendi, nec docendi, apud ipsos esse necessarium ordinem: nam nec arte vlla ratione ue

A tione ue experientiam niti: immo vnus fortunę fauorem ad ea, quę quęrit, inuenienda require-
 re. Qui vero rationem inuentionis suę auctorem statuerunt, ac ordinem: vnā q; viam, quę ad
 finem ducat, proposuerūt: ijs fuerat quidem necessarium à primo aliquo auspicijs, de quo inter
 omnes homines cōueniret, sic trāire ad reliqua. Ceterum hanc rationem non sequitur pleraq;
 medicorum pars, immo principia quoq; ipsa controuersa sumit, nec illa demonstratione confir-
 mat: tum ad reliqua simili modo transit, legislatorum ritu sanciens verius, q̃ demonstrans. Quę
 omnia inde adeo his accidunt, q̃ nihil prius de demonstratione sunt meditati: sed simul & inqui-
 sitis insistant, & ad eorum fidem demonstratiōe vti audent, simile profecto quiddam ijs molien-
 tes, qui sphaeram, aut cubum, aut conum, aut cylindrum, aliud ue id genus metiri aggrediuntur,
 cum tñ omnis Geometricę ac Logisticę rationis sint ignari, imo vero nec cubiti palmi ue, aut pe-
 dis mensuram pręparatam habeant: ac deinde ijs, qui vel demonstratiōē ab ipsis exigunt, vel ta-
 cere censent, irascuntur. Veluti enim in illo ridiculus erit is, qui rectanguli trigoni, cuius alterum
 (exempli causa) latus circa rectum angulum quinque sit pedum, alterum duodecim, dicat aream
 non esse triginta pedum, sed quadraginta, nec eius rei demonstratiōem vllā afferat: ita hic quoq;
 ridiculus est, qui quicquam affirmat, quod demonstrare non possit. Ergo, sicuti in demonstratio-
 ne de triangulo (neq; enim recedendum nobis ab exemplo est, qui indoctos istos methodicos à
 disputatione nostra iam abegimus) ipsum, quod propositum est, ex duabus his propositionibus
 colligebatur, vna, quę spatium id, quod lateribus pedum quinque & pedum duodecim contine-
 tur, sexaginta pedū effici dicit: altera, quę triangulum dimidiū eius esse spatij proponit, atq; osten-
 dit: harum vtraq; rursus vt demonstratiōis fidem reciperet, alijs propositionibus egebat: mox il-
 le alijs, quoad peruentum ad primas esset: hæ vero nec ex alijs, nec per demonstratiōem, sed ex se
 fidem faciūt: sic arbitror et in ijs oībus, quę in medicina demonstrant, ad primas & indemonstra-
 biles propositiones, & quę ex se fidem faciant, omnia esse perducenda. Ac, si omnes de medēdi
 methodo sic dicere aliquid instituisent, prorsus, sicuti inter Arithmeticos, Geometras, & Logi-
 sticos, ita inter ipsos quoq; conueniret: quippe apud quos discere ab ipso statim initio licet, quid
 quoq; nomine, quo vsuri sunt, significetur: quas præterea propositiones indemonstrabiles (quę
 axiomata vocāt) ad dilectationem sint sumpturi: veluti lineam esse longitudinem citra latitudi-
 nem: superficiem, quę longitudinem latitudinem q; tantum habeat: et triangulum esse hoc, qua-
 drangulum illud: ac reliqua ad eundē modum. Ab his, vbi axiomata huiusmodi vsurpāda sibi ef-
 se prædixerint, quod scilicet, quę eidem sunt equalia, inter se etiam esse æqualia: & si æqualibus
 C equalia sint adiecta, tota fore equalia: postea demonstrare theoremata iam tentant, nihil extra ea,
 quę à principio præsumpserunt, adijciantes. Pleriq; tamen medicorum, sicut ipse scis Hiero cha-
 rissime, interrogati, vnde nam principium inuentionis suę sumpserint, tantum abest, vt indemo-
 strabilia principia, & quę oībus hominibus in cōseio sint, proferant, vt nec, quod tibi ipsis conso-
 na respondeant, inueniāt: sed sursum ac deorsum Euripi more agantur, contraria quilibet in pro-
 gressu sermonis ijs, quę ab initio statuerūt, afferentes. Siquidem sapiētissimus iste Thessalus, cū
 apparentes esse cōmunitates dixisset, paulo post non solum non alium quenquam priorum medi-
 corū vidisse eas asseuerat, sed nec ipsum, qui primus eas peperit, Themisonem. Huius nāq; vnus
 esse monstrosas illas cōmunitates fatetur, ceu patris legitimos filios. Post hos vero, qui secuti sunt
 oēs, & inter se, & ab ipso Thessalo dissentiant, nec eandem communitates tradentes, nec omnino
 inter se vel in vno concordantes. Id quod sapenūmero tibi, ipsis etiam Methodicis presentibus,
 ostendi: fortasse q; aliquñ maius ocium nātus, de inconstātia eorum scribam. At nunc tñ saltem
 ad rem propositā sumi expedit, oportuit eos, præsertim sectę auctores, exposuisse prius, de qua
 re singula nomina dici vellent: sicut Empirici faciunt, qui apparere ea dicunt, quę sub sensum ca-
 dunt: nosci vero, quę memoria tenentur: apparere simul & nosci, quę & ante aliquando sub sen-
 D sum venerunt, & nunc simili modo veniunt. Num igitur ita ipsi quoq; apparere communitates
 dicunt, ceu sensu cognitæ: an, & quę ratione comprehendimus, apparentia nominant: Em-
 pirici nāq; non admodum concedunt quicquam ex ijs, quę sola ratione nosci videntur, appa-
 rens dici. Rursus veteres philosophi duplex esse genus apparētium decernunt, Vnum, quod ip-
 si Empirici comprobant, nempe eorum, quę sensu aliquo noscuntur, veluti albi nigri, duri mol-
 lis, calidi frigidi, & similia: Alterum indemonstrabile, eorum nimirum, quę intelligentiæ pri-
 mo occurru patent: veluti, quę eidem sunt æqualia, ea etiam inter se esse æqualia: & si æqualibus
 equalia addantur, tota etiam equalia fieri: & si ab æqualibus equalia demas, quę restant, eūā equa-
 lia fore. Huius esse generis aiunt, & q̃ nihil citra causam fiat, & q̃ omnia ex ente quopiam, & q̃
 ex eo, quod omnino non sit, nihil fiat: simili modo, nihil corrumpi in id, quod ante penitus non
 sit: item, quod affirmare vel negare de quoq; sit necesse: alia q; id genus non pauca, de quibus in
 logicis tractatibus agitur, & ipse in commentarijs de demonstratiōe, quā potui, dixi clarissi-
 me. De his inter eiusmodi principia, huiusmodi logica nūcupamus, quidam Philosophorum cō-
 tendunt, atq; ambigunt: hi tamen hætenus saltem sunt modesti, q̃ omni demonstratiōi fidem
 suam abrogant, intelligentes (arbitror) tamen id non dicant, illud saltem se certo scire nihil om-
 nino demonstrari posse, si logicis principijs fides non sit adhibita. At, qui eousque rudes amen-
 tes q;

METHODI MEDENDI

tes' q3 sunt, vt ne id quidem intelligere queant, hi demonstrare quidem conantur, cæterum quæ, E
qualia' ve, { & quor3 } demonstrationis principia sint, nec noscere, nec querere volunt, nec aliū do-
centem audire sultinent: sed absolute pronunciant, & verba loquuntur, quæ nec quid significant,
ipsi clare explicare valeant. Merito igitur eorum æmulis centum voluminum opera scribuntur,
partim inuestigantibus, de quo quodq3 dici nomē Theſſalus voluerit, partim nihil tale inuenien-
tibus, cui omnia ab eo particulatim dicta consentiant. Nam, quæ demum apparentes illæ cōmunī
tates sint, aut quo modo apparentes, dicere non possunt, ne si iterum atq3 iterum totidem libros
scripserint: quippe quod apparet, aut sub sensum omnino cadat, oportet, aut sub intelligentiam,
vno semel occurſu vtrunq3 sine vlla demonstrationis ope: quod vero intellectu se vno occurſu
non exhibet, protinus id controuersum est, ac demonstratione eget, nec artem vllam à tali princi-
pio incepisse conuenit. Hæc si in logicis methodis exercuissent, & ipsi ea intelligerēt, & tempus
nostrum frustra non contererent. Nunc, qm̄ in exercitati rudes q3, per amentiam audent demon-
stratione vti prius, quàm, quid ea sit, didicerint, necesse est cum similibus sui, oēs aberrant, prorsus
q3 nugētur: ac eos, qui recte demonstrant, minime intelligant, sed tempus inaniter consumāt.
Ergo cum his nequaquam, vt cum rationalibus animalibus, vel disputandum amplius est, vel ipsi
dem impense contradicendū prius, quàm didicisse, quæ nam res demonstratio sit, velint: & qua- F
tenus exercitatum esse oportet, qui ea probe sit vsurus.

De descriptione Nominis Morbi, ac de Methodo Nominum recte imponendorum.

CAP. 5.

TECUM vero omnem deinceps sermonem conferam, ipsis vsus methodis, quas in commenta-
rijs de demonstratione tradidi. Quippe non solū principia omnis demonstrationis esse ea,
quæ tum sensui, tum intelligentiæ manifeste se exhibent, sed etiam in omni re quærenda nomen
ipsum assumi in disputationem oportere, in illis docuimus. Nunc neutrum præcipere statui, nec
quemadmodum inuenire, nec quæadmodum demonstrare conueniat: sed ijs, qui iam didicerūt,
& exercitati sunt, simul aliquem laboris opportunum fructum reddere, inuenta nimirum nō te-
nuī re, quam nunc instituimus: simul, liqui sunt, quibus artū maxima cordi est, quæ circa animū
hominis versatur, ipsos quoq3 in minoribus prius exercitare conuenit. Quippe id tenaciter ser-
uare in omni methodo oportet, vt in ea te multis sæpe leuioribus problematis prius exerceas, q̄
maioribus manum admoueas. Hoc igitur nobis veræ disciplinæ principium esto: quod vtiq3 ita-
tim inter initia facturi fueramus, tum artem ipsi inquirentes, tum alijs præeuntes, qui adhuc per-
uersi non essent. Quoniā omnis morbi curationem inuenire propositum est, necesse est morbo-
rum numerum prius sciri. At, qm̄ fieri nequit, vt aut differentias generis vllius, aut species inue- G
nias, ipso, quod diuiditur, non planè explorato, oportet profecto nunc etiā, quid morbus sit, nar-
remus, quò sic diuisionē eius rite adeamus. Qua igitur ratione id methedo inueniamus? Quā nā
alia, nisi ea, quam in libris de demonstratione præcepimus: nempe vt de notione ipsa prius con-
ueniat, cum sine hac, propositæ rei substantiam inuenire non liceat. Ipsam vero notionem, quæ
omnibus in confesso sit, sumendam diximus, vt quæ aliàs principium iure non dicatur. Quæ igi-
tur est de egrotando omnibus hominibus confessa notio, & de qua maxime subiecta re verbum
hoc egrotare enunciant? Nunquid, vbi citra offensam oīum corporis partium actiones obeunt,
& valere se tunc dicunt, & minime medicis egere putant: vbi vero naturaliū corporis actionum
senſerint quāpiam vel male geri, vel prorsus nō geri, & egrotare se illa parte corporis existimant,
cuius actionem læsam vident, & medicum de remedio consulunt? Ego sanè omnes homines ita
video tum morbi, tum sanitatis, nomen vsurpare. Quin etiam eam, quam dixi, notionem oēs ob-
seruant, non in his modo nominibus, sed etiam nihilo minus in omnibus, quæ cum his coniuga-
ta sunt, tum nominibus, tum verbis. Quippe cū & valere illum existimēt, cui nullius partis actio
sit vitiosa: & agrotare, cui sit vitiosa: & valentem eum nominent, cuius omnes corporis partes
actiones suas secundum naturam edant: & egrotantem, cui male affecta pars aliqua sit. Nec quis- H
quam omnino Græcorum aut alijs nominibus vtitur, aut de alia re enunciat iam dictorum nomi-
num quoduis: id quod diffuse in medicinalium nominum interpretatione ostendimus. Atque
hoc saltem mihi per omnem disceptationem memoria teneri maxime velim, nominum quidem
interpretationem ex Græcorum me consuetudine facturum (sicut in commentarijs de demon-
stratione dixi) ipsius autem rerum essentia tum inuentionem, tum inquisitionem, tum demon-
strationem, nō ex ijs, quæ multitudini videntur, immo ex sumptionibus scientificis, quæ lemmata
græce vocant: de quorū inueniendū ratione in illis est proditum. Ergo accepto eo, quod omnes
confitentur, principio, nempe illud in medendi methodo propositum esse, vt ægrotata corpora in
sanitatem vindices: id vero est, vt naturales partium actiones, siquæ vitiosa sint, corrigas: iā, quod
deinceps est, inquiramus, quot numero in totum res sint, quæ loco inter se sibi sunt propinquæ:
nec ubi aliqua, procedente sermone, vel pro morbis accipiamus, cum sint his similia: vel p̄ sanita-
te, cum ad huius naturā prope accedāt. Proponamus aut claritatis causa particulas aliquas, in qui-
bus confirmetur, quod dicimus, ac primum quidē ante ceteras oculum. De hoc igitur oībus ho-
minibus non medicis modo, sed etiam alijs quibuslibet conuenit, eius opus esse, vt videat. Seu
vero opus, seu actionē inter loquendum dicam, in præsentia saltem non refert. Ad eundem mo-
dum,

A dum, nec, si quis aspiciere, oculorum esse opus dixerit: nec, si quis aspectum, aut visum, aut visionem, aut quomodocumque aliter nominet, quicquam refert: quando etiam, si quis sollicitum committens nominet, ad rei ipsius scientiam nihil id afferat incommodi, modo, de qua re nomen pronunciet, clare explicet, in hoc enim præcipua doctrinæ vis est. Nominetur igitur oculus pars corporis: neque hic referat, partem ne, an particulam quis dixerit. Quicquid enim totum complet atque integrat, id totius videlicet corporis, quod complet, particula siue pars nominatur. Est enim pars ex ijs, quæ ad aliquid dicuntur, quippe pars totius integri quæ pars dicitur: æque profectio, ut totum & integrum per relationem ad partes & particulas proprias nominatur: est quæ sicuti dextrum ad sinistrum, & sinistrum ad dextrum, ita & totum ad partem, & pars se habens ad totum. Ergo, si quis hac seruata notione malit partem dicere, quam particulam: aut si quis contra, particulam potius, quam partem: is mihi ad rerum inuentionem impedimento non lit, cæterum imperitum se linguæ latinæ prodit: quemadmodum certe, si quis integrum à toto secernat, is quoque linguæ latinæ est ignarus. Dictum vero alibi (ut scis) diffuse de nominum usu est. Ac nunc, quantum satis ad rem sit propositam, adiiciam, illud duntaxat indicans, non oportere nominibus seduci, nec, qui in ijs dissentiunt, hos statim in rebus quoque ipsis dissentire putare. In quo genere omnes (ut vno verbo dicam) non medicos modo nostræ tempestatis, sed etiam philosophorum plerisque parum exercitatos vides: ut quorum paucissimi nominum diuersitatem à rerum diuersitate distinguere norint. Verum huius quoque rei methodum in Logicis speculationibus tradidimus: cuius opportunitas, si quando aliàs, utique nunc quoque ad usum venit. Quæ nam igitur fuit ea methodus? Nempe ut à rerum incipias differentia, non autem nominum: tum ostendas quatuor, exempli gratia, esse res, quæ in vicino sunt posite: post deinde, ut demonstratione confirmes neque plura esse, neque pauciora, quæ in proposita disceptatione contineantur: postremo ut accommodato rerum cuique suo nomine sic reliquum sermonem absolvas, nec mutas dehinc, nec transferens nomen vllum, sed, cui rei ipse ab initio imposueris, de eadem perpetuo vsurpans. Quippe ita & dilucida doctrina efficitur, atque à cauillationibus, quas homonymia parit, libera: & quod frustra est additum, facile deprehenditur, & quod deficit, cito inuenitur: & quæ consonant dissonantque, maxime in eiusmodi explicationibus, exacte discernuntur.

Quid nam Actio & Passio exemplo visus, & oculi: quid Latio, & Alteratio, Pars, & Instrumentum.

CAP. 6.

ERgo illud repetamus denuo. Visus, oculorum actio est: locutio, linguæ: incessus, crurū. Ipsa rursum actio, motus est actiuius. Iam horū ipsorū motus, prioris habitus est imutatio: Actiuius, qui à se editur: Passiuius, qui ab alio quopiam extrinsecus posito excitatur: veluti volatio, actio est aialis volatilis: & incessus, aialis gressilis: quod autem ab alio sic agitur, ut locū mutet, id utique non agit, sed patitur. Egit namque, qui ex Piræo Suniū cōmeauit, quippe motus actiue est, id est ex se ipso, & propria natura: contra, passus est, qui ex Piræo Suniū nauigauit, utpote qui naui vectus est. At, quā motum prioris esse habitus mutationem diximus: ea vero immutatio dupliciter fit, nempe aut in qualitate, aut loco: utique mutatio, quæ in loco agitur, latio dicitur, quæ in qualitate, alteratio, ita videlicet ut latio sit immutatio, vel demutatio, vel mutatio prioris loci (de industria. n. multis sum vsus noibus, maxime. s. insinuare studens, quod licet vnius rei multas definitiones efficere, quæ vocibus tamen, non est notionibus differant) alteratio vero, vel mutatio in qualitate, vel demutatio eius, quæ prius fuit, qualitatis, vel immutatio in qualitate, vel transmutatio qualitatis, vel quocumque aliter auditori, quod dicitur, clarum fore speraueris, quippe huc tibi varietas interpretationis sit utilis. Ergo visio (nam redeundū ad oculū est) actio partis est: oculus vero ipse aialis est particula, nam particulam, an partem dicas (ut prædiximus) nihil refert. Instrumētum vero appello animalis partē, quæ perfectā edere actionē possit: veluti oculus visionē, & lingua loquelā, & crura itionem. Ad eundem modū & arteria, & vena, & nervus, tū infra, tum partes aialis sunt. Pro hoc namque noium usu non à nobis modo, sed etiam veteribus definitio, oculus quidem & pars aialis, & particula, & instrumentum vocabitur: cornea vero tunica, particula quidem, & pars, non autem instrumentum. Simili modo & quæ rhagoedes, & quæ arachnoedes, & quæ amphiblestroedes græce dicuntur, quippe quarum singulæ primū quidē ac maxime oculi particule sunt: & quia is est faciei pars est, itidem & illæ faciei sunt partes, sed secunda quadā ratione: ita vero & totius corporis partes sunt propterea, quod facies ipsa totius corporis est particula. Homœomeres vero, id est similis pars, est, sicut ipsum clare indicat nomē, quæ vndique in similes diuiditur particulas: veluti in oculo vitreus humor, & crystallinus, & tunicarū propria cuiusque substantia. Porro hæc latius indicata sunt in dissectionū cōmētarijs. Hic vero ea tamen dixisse sat est, quorum ad id, quod instat, meminisse est opus. Est autem opus ostendere in singulis particulis plura inesse, quæ inter se dissideant, nec tamen à medicis sint percepta: hoc autem utile esse prædiximus ad nomina nobis recte vtenda, utique cuius causa nunc id tractandum suscepimus: indicabitur autem & ad ipsam nobis propositam methodū maxime necessarium. Est enim instrumentum oculus, actio vero visio: vna ex particulis eius similis, ac primum visionis instrumētum, crystallinus humor: sicuti in libris, ubi de ijs egimus, monstratum est: id namque est, quod alterari debet ab aliquo extrinsecus occurrentium colorum, ut animal

METHODI MEDENDI

mal videat: alterari vero nō potuit, nisi purum omnino perspicuumq; esset. At purum ita perlu- E
cidum q; esse nō posset sine eo, quod nunc obtinet, temperamento: quippe ostensum est vnam-
quāq; rerū talem esse, qualis est, pp calidi, frigidi, humidi, & sicci temperamētum. Ideo q; liquid
horum magnopere immutatū sit, aut planē non videbit, aut male videbit aīal. Verum hoc nobis
parum adhuc constat, modo artē querere oris: nec oportet aliquid ex ijs, quæ post sunt inquirē-
da, velut scitū præsumere: nec ipse huius gratia, eorū, quæ de crystallino alibi demōstrauī, mētio-
nem feci, sed claritatis causa eorum, quæ nunc sunt dicenda. Vidētes. n. oculum probe munus suū
obire, ac rursus nequaquā videre atq; illud sanitatem eius, hoc morbū, vel vitium, vel quicquid li-
bet, vocātes, nihil. n. ad rem propolitā refert: querimus deinceps, quæ demū sit eius noxæ causa.

Aduersus Thessalum, Iulianum, Olympicum, & reliquos Methodicos, de Sanitatis

ac Morbi definitione.

CAP. 7.

VNde, inquires, ad hoc moti? Certe ex indemonstrabili axioma, de quo tñ inter oēs conue-
nit propterea, q; intelligentiē euidens est. Quod ergo est id axioma? Nihil absq; causa fieri.
quippe hoc non concessio, non datur aut læsæ vilionis, aut prorsus amissæ, causam requirere. Sed,
qm id ex ijs est, quæ intelligentiæ sunt manifesta, præsumentes iam aliquam subesse læsionis cau-
sam, ad eius inquisitionē venimus. Ergo hāc causam seu affectū aliquē corporis, seu corpus cer- E
to modo affectum, appellare velis, nihil sanē ad rem propositam interest. Illud oīno fateberis, aut
morbū ipsum hāc esse: aut, si quidē morbus est ipsa actionis læsio, affectū, qui huic officit, mor-
bi causam esse. Existit q; hoc loco rursus de noīe controuersia, ipsum ne oculorū affectū, à quo vi-
sus læditur, morbū vocemus, an ipsum actionis vitium. Verum, siue quis actionem vitiatā mor-
bū dici velit, utiq; multo prius statuatur, necesse est, sanitatē esse naturaliter se habentē actionem:
siue affectum, qui actioni incommodat, multo quoq; ante, qui fm naturam est, siue hunc affectū,
siue constitutionē dici velit, sanitatis vocabulo appellet. Quippe committere, vt cum in actioni-
bus posueris sanitatē, in affectibus existimes statuendū morbū: aut cōtra, cū in partiū cōstitutioē
sanitatē, in actionis vitio morbū: tū reliquis methodicis, tū vero principe huius infanī Thessalo
digna sententiā est. Etenim oēs ferē, qui sunt indocti huius infanī q; dogmatis sectatores, sanitatē
esse naturalīū actionū firmitatē ac robur aiunt: morbū vero nequaquā actionis læsionē & infirmita-
tem, sed alij corporis quendā affectū, alij corpus certo modo affectū. Qua quæ nam, obsecro, ma-
ior dementia sit? Hoc. n. vel quīvis deprehēdat, nō oportere in altero sanitatē, in altero morbum,
sed in eodē omnino genere ambo constitui: liquidem contraria sunt, quæ in eodem genere pluri-
mum inter se dissident, velut candidū, et nigrum: etenim vnum est horum genus, colōr. Ideo q; G
si contraria inter se sunt sanitas, & morbus, in quocunq; genere eorum, quæ naturaliter se habēt,
statuetur sanitas, in eodē, cum præter naturā se habet, ponetur morbus. Quare, si sanitas actio est,
quæ fm naturam se habeat, oīno morbus præter naturam actio fuerit. Sin aut affectio quæpiam,
aut constitutio naturaliter se habens, sanitas est, & morbus affectio cōstitutio ve præter naturam
necessario fuerit. Ac Thessalus quidē finire morbum ne aggressus quidem vsquā est: quin potius
hariolandum nobis reliquit, de qua re vocabulum id enunciet. Quod enim nihil interesse cēseat
inter morbum & pathos, iam tibi ex ipsius hominis commentarijs ostēdimus, in quibus trāslati-
tīe ambo ponit, transfert q; vtrūq; in alterius locum, ceu nihil intersit, hoc an illo modo loquaris.
Eius vero sectatores vniuersi sursum deorsum q; aguntur, ratiocinantes, ac se regentes, omnia q;
facientes, vt vel obscure loquantur, vel oīno nihil, vt Thessalus ipse atq; ante hunc Themiso, qui
fundamentū illis huius infanīa iecit. Quod si tibi ea, quæ Proclus, & Rheginus, & Antipater, ad
hæc quæ Eudemus, Mnaseus, Philo, & Dionysius in hoc genere prodiderūt, dicere velim, utiq;
à proposita tractatione, quæ & scientifica est, & ipsum, quod vtile sit, docere conatur, imprudens
excidam. Verum de horum dissidentia licebit aliquando, fortasse etiam in sequentibus, mentio-
nem facere: vna q; cum his Menemachi, qui oēs eorum res astutius turbauit, atq; confudit: & nu H
gacis Olympici, cum q; hoc etiam Apollonidē: & Sorani, & qui adhuc viuūt, Iuliani, quem utiq;
& nos conuenimus, vt viua videlicet hominis voce meras nugas condiscerem: sed nec is explica-
re potuit, qd pathos & morbus esset. Cuius rei vel maximū signum est, q; cum viginti plus anni
iam sint, ex quo illū Alexandria cōuenimus, scripserit q; iterum atq; iterum institutiones, (nam
has assidue transponit, transformat q; nunq; ijs, quas scripsit, contētus) nusquam tñ earum est au-
sus, quid morbus sit, prodere, tamen si certe adeo ea, quæ nihil ad rem pertinent, in ijs agit, vt etiā
illud inquirat, Si ne pictura medicis ex vsu. Et tñ, tam multa talia q; cum scribat, nec dissimula-
re queat, (sicut nec Menemachus) quin methodicæ sectæ absurditatem clare norit, ne in hodie-
num quidem diē in institutionibus suis vsquam scripsit, quid morbum pathos ve nominet. Mi-
hi certe ipsum interroganti, adeo multa obscura q; respondit, vt nihil eorum, quæ dixit, planē in-
telligerem, cogere que illud tantum homini dicere, q; mihi desciscere ab Olimpico videretur,
quanquam is auus doctrinæ ipsius fuerat. Nam Iulianus hic Appollonidæ Cyprij, ille Olympi-
ci discipulus fuerat. Ergo Olympicus (vt dixi) sanitatem morbum que finire ausus, illam esse af-
fectum dixit, qui absentia sit morbi: Rursus morbum mutationem à naturali in id, quod præ-
ter naturam sit, stabilem. Quorum sanē vtrique permulta insunt à ratione aliena, quæ & tunc Iu-
liano

* pathos que.

* pathos.

Aliano exposui, & nunc summam dicā. Quod. n. (inquam) confusionē facit, id est, q̄ Olympicus non illud tm̄ absolute dicit, sanitatē affectum esse positum extra morbum, sed ē illud definitioni adiicit, quem affectum definimus naturalium actionum cōstantiam, et firmitudinem: haud enim conijcere valeo, in sola ne actionum constantia, an in corporis affectu, an in ambobus, sanitatem statuat: sed forte, vt utiq; cum reliquis methodicis assolet confuse aliene q̄ abuti Gregorum vocibus, ita nunc quoq; affectum non ad corpus, sed ad actiones refert: vt nimirum ad hunc modum definitionē intelligas: Sanitas affectio est actionis in absentia morbi. Porro iustum, arbitror, fuerat alterum duorum definitioni adiecit, aut actionum, aut corporis, vt videlicet aut ita se haberet finitio: Sanitas est affectus actionū in absentia morbi: aut certe talis: Sanitas est affectio corporis in absentia morbi. Quin etiam, si ambo iungere voluisset, ita quoq; licuisset vt dilucide, sic breuiter dicere: Sanitas est affectio tū actionū, tum corporis in absentia morbi. Quid aut, cum subiicit, Quē affectum definimus constantiam, ac robur actionum naturam suam tuentium, vtrum ne pars hac putanda est eius, quod prādictū est, iungenda q̄ tota definitio est ad hunc modū? Sanitas est affectus corporis in absentia morbi, & constantia actionum, quę fm naturam se habent, ac robur: an ista ipsa per se ipsam perfectā definitio est, ac, quid sanitas sit, de cēs, put sanē nō nullis me

Bthodicorum placuit, qui sanitatē esse dixerunt constantiam fm naturam se habentium actionum? Verū, si hæc absoluta est, haud scio, quid doceat ea, quæ ante dicta est, quę affectum esse sanitatem precipit. Quippe illud, quod dixit, in absentia morbi, eiusmodi planē est, quod vel puer rideat: cū, si ita definire permitteret, manifestū sit & morbum fore affectū corporis in absentia sanitatis: ita videlicet, vt vtrāq; definitio, non quid sit id, quod queritur, sed quid non sit, doceat. Sed mittamus (inquam) si placet & hæc, cum sint ad rem non admodū necessaria. Illud certe præterire dissimulare q̄ non licet, q̄ in sanitatis explicatione oīa actionibus tribuantur, vel solis, vel ēt confundēdo inuoluendo q̄, ac obscure quodā modo miscendo ipsum affectionis vocabulum, quemadmodū

* pathos.

* pathos.

fecit Olympicus: in ipsius vero mōrbi definitione, nulla sit actionū mētio: nā illud dicere satis habuit, mōrbum esse mutationē corporis à naturali statu ad eū, qui præter naturā sit, constantē & stabilē. At debuerat, inquā, aut in actionibus, aut in affectibus, vtrūq; cōstituere. Quid vero mihi responderit, & sæpe tibi iā mi Hiero narraui, & nūc repetere non erit alienum. Nihil (inquit) miri est in actionū quidem constantia cū robore sanitatē poni: in affectu aut corporis præter naturam, morbum. Neq; n. contraria sunt, vt tu reris, inquit: est. n. eorum aliquid medium, quod nec sanitas sit, nec morbus. Quo ego sermone audito, abij stupefactus simul ac dolens: fatēdum enim est,

Cquod accidit. Antea. n. neminem vnquam eorum, qui in ea opinione prorsus sunt stupidi, conueniē: tum aut primū conueniens merito obstupui, nō q̄ is solus adeo sine sensu esset, sed q̄ multo se etiam agrestiores tot haberet discipulos, qui, cum statim in initio doctrinæ suæ methodicos ita errare viderent, tm̄ à secta non desciscerent: aut, si oīno non viderent, prorsus essent attoniti. Nam quid, quæso, ad rem, morbum sanitati nō esse contrariū propterea, q̄ aliquid eorum sit medium? Patet enim hac sratione non fore album nigro contrarium propterea, q̄ eorum sint media flauū, & fuscum, & rubrum, & pallidū, & reliquorū colorum singuli: nec calidum frigidum, quippe horum quoq; sunt media, tepidum, & temperatum. Ac sapiētes istos methodicos, cum nec leui nec spernendo lapsu sic sint inter initia statim lapsi, speremus ne veritatē vllam eorum, quæ sequant, posse intelligere? minime profecto: gippe, q̄ in arte medica spectant, oīa ex his pendere docebimus, id q̄ merito: siqdē in ijs artibus, q̄ methodo aliqua tradunt, earū cōstituēdarū principiū est finis ipsius notio. Ac in huius qdē notitia, alijs quoq; p̄ multis varie est erratū, alijs medicinæ finē esse affirmātibus, vt plurimū sanare: alijs, ea facere, quę sint ad sanitatem cōducibilia: alijs, morborum causas adimere: alijs, pro se quenq; oīa peragere: alijs, prout cuiq; succurrit: ac de his definire seorsum cōueniet. Nemo tm̄ adeo fuit stupidus, vt in alio genere poneret sanitatē, in alio morbū:

Dsed vel actionibus naturaliter se habentibus tribuit, vel partium cōstitutionibus, quos aliqui affectus vocant. Siue autē in actionibus naturaliter editis sit sanitas, in ijs, quæ præter naturam sunt, erit morbus: siue in constitutionibus naturaliter se habentibus, in ijsdem præter naturā se habentibus erit morbus: siue in affectibus, in his ipsis erit & inualetudo. Neq; enim profunda vlla spectatione ad hoc est opus: tm̄ sufficit non esse peruersum. Nam quis, obsecro, dubitet, si videre sanitas sit, morbum esse vel cecutire, vel oīno non videre? Quis non intellegit, si audire sanitas sit, esse morbū vel ægre audire, vel prorsus non audire? Pari modo, si cōcoquere, bona valetudo est, male cōcoquere, vel planē nō cōcoquere inualetudo est. Et si suo aliquē arbitrio moueri sanitas est, vtiq; morbus fuerit & conuulsio, & palpitatio quem palmon vocant, & neruorū resolutio, & tremor: et deniq; quicquid voluntariū motū vel penitus destruit, vel ēt certo mō impedit. Ad hæc, si naturaliter sentire sanitatis opus sit, insensibilitas, et difficilis sensus, & stupor, & dolor egritudines erūt. Rursus, si ordinate respirare sanitas est, vtiq; spirādi defectus, vel difficultas, morbus est. Atqui, si hi morbi sunt, dubiū non est particularū affectus, ex qbus hæc ædunt, morborū esse causas, nec oportere aut phlegmonen, aut scirrhum, aut erysipelas, aut abscessum, aut vlcus, aut oedema morbos dicere. Quod si hæc ægritudines sunt, manifestū est nullū illorū esse morbū. Quippe duorum genera sunt nusq̄ inter se similiū, sed omnifariam dissidentū, & tota natura differentium:

alterum

METHODI MEDENDI

alterum horum generum corpus vocant, alterum actionem. Ergo oculus, & lingua, & auris, & Ecrus, atq; id genus singula, corpora sunt certo modo affecta: visus, auditus, sermo, incessus, actiones predictorum sunt corporum. Si itaq; in certo quodam corporum habitu egritudo constituitur, certe in certo quodam actionum habitu non statuetur: qñ, si in hoc morbus cōsistat, planum rursus est in corporū affectu non esse. Verū, q; affectus ipse causa sit, actio vero id, quod ab affectu corporis efficitur, id vero est, quod oīum maxime & fatendum medico sit, & tenendum. Adeo, quisquis hoc ignorat, is in re labitur, quę planē est ex necessarijs. At, qui vel actionis lesionem vel corporis affectum, morbum, vel quoquo nomine appellat, quanq̃ parum cōuenienter nominat, potest tñ de rebus iplis rectam habere sententiam. Contingit aut non ex noīum, sed rerum recta opinione, recta morborum curatio. Iam hoc ipsum multos medicorum ignorantes inuenias, putantes q; in rebus dissidere eos, qui corporum affectus morbos esse censent, ab ijs, qui in actionis vitio eodem cōstituunt. Atq; horum omnium errorum (quod & sepe iam dictum est, & post dictetur) vnica causa est, q; qui inuenire quiduis logice sunt aggressi, non fuere in logica methodo exercitati: sed simul, veluti ratione cogitatione q; exercitati fuissent, ab experientia descuerūt: simul, cum in illis inexercitati fuissent, magnopere sunt lapsi, siquidem millies eos de noībus tanq̃ de rebus litigantes inuenio. Rursus, vbi rem quāpiam maximam ignorarint, nomē se ignorare putantes, veluti in eo, quod nunc est propositum, discernere nequeunt corporis quidem statum causa rationem sustinere: actionem eius, quod ab eo pericitur: sed nec, quod sanatur, id esse corporis affectum. Quippe comitatur necessario hūc naturaliter se habētem naturalis actio: contra, si a natura recesserit, actio statim præter naturā se habeat, necesse est. Porro in hoc totum vertitur: est q; hoc principium ac veluti primum quoddam elementum omnis methodi, quæ de medēdo instituitur. Cæterum, an hoc ipsum appellare morbum oporteat, an actionis vitium, id est de nomine dubitare. Dicemus autem aliquid & de noīum vsu, sicut in alijs prius iam fecimus. Verum nunc de iplis non dum distinguo, quod videlicet hoc ipsum, rerum fide magis comprobem: osten dam q; quod nam sit huius de medendo methodi principium & radix. In quo cum alij multi ex ijs, qui rationales se dogmaticosq; appellāt, tum vero probi isti methodici, sunt solli. Atq; illud q; dem ijs, qui prudentes sunt, iam quodam modo apparet, nihil esse aliud, quod a medicis curetur, q; corporum affectum, veluti proximo libro monstrabitur.

De Causarum, Affectuum, Actionum, ac Symptomatum generibus, ex quibus vniuersa dignoscendorum ac curandorum morborum methodus pendet.

CAP. 8.

Nunc illud nobis propositum erat, vt ignorātiā eorum corrigeremus, qui, quot in vniuer sum res sint, quæ in præsentī disputatione proximę inter se habeantur, ignorāt. Videtur, n. vnum genus esse ipsorum corporum, alterum actionum. Ac corporum quidem genus præcedere actiones, eas q; gignere: has vero sequi, id q; si corpora naturaliter se habeant, inculpabiles ac naturales: sin præter naturam sint affecta, aut nullas prorsus, aut omnino certe impeditas. Tertium præter hæc genus est causarum, quæ hos affectus creāt. Nam, quam rationem habet affectus ad actionem, hanc alterum quippiam ad ipsum affectum omnino habeat, oportet, illo duntaxat euarians, q; affectus cum actione vnā consistit, nec potest vsquam aut proba actio esse sine corporis naturali affectu: aut vitiosa, nisi cum corpus sit vitio affectum. Eius aut affectus, qui actionem impedit, causæ possunt quidem non etiam esse: possunt aut & adhuc nunc manere. Ergo diuerse omnino ab affectibus causæ sunt. Ac tertium hoc iam inuentum genus diuersum est, & ab actione, & eo, qui hāc gignit, affectu. Ab hoc quartū aliud genus est {affectus} eorum, q; cum corporibus & naturaliter & præ naturā se habentibus insint, actioni nec cōmodant, nec incōmodant: sicut, exēpli causa, color corporis ex diuturna in Sole mora niger ex candido factus: aut cōtra, vbi versatus in vmbra quis sit, ex nigro candidus: aut ruber, lotis: aut pallidus, expauesfactis. Quippe hæc nec actiones sunt, nec corporis affectus, qui sint actionis causæ: multo q; minus ipsæ causæ, H quæ affectus, qui præter naturam sunt, creant: sed sunt symptomata, quæ diuersas corporum alterationes necessario sequuntur, siue hæ secundum naturam, siue præter naturam, se habeant. Ergo, cum quatuor definita genera iam sint, ex quibus vel noscendis, vel non noscendis, probe secus ue incipiendam esse medendi artem monstrabimus, liceat de cætero cuius, prout volet, ijs nomina imponere: veluti affectum corporum præter naturam se habētem, cum actionem aliquam vitiat, morbum, si placet, appellato: ipsum vero functionis vitium, insigne quoddam morbi symptoma. Quæ alia ratione accidunt, ceu colores, ea quoq; si volet, appellato symptomata, cæterum ea distinguat a functionum vitio: & si illa insignia, morbi symptomata vocet, hæc, familiaria propria q; nominet. Quædam etiam præter hæc, si volet, nec familiaria, nec propria, sed forte quadam incidentia. Quartum vero ab ijs genus statuito, quod sit insalubrium, siue (vt ita dicam) morbificarum causarum. Atq; harum, quæ quidem in ipso animalis corpore consistunt, internas nominet: quæ extrinsecus, extēnas: {nisi malit (vt nunc vulgus medicorum infueuit) illas antecedentes, has primitiuas vocare.} Positis autem pro arbitrio vel hoc vel alio modo nominibus, dummodo clare, et ex vsu legentium, nec mutet postea, nec transponat eorum vsu, sed perpetuo per omnem disputationem obseruet, quod, & quæ dicat, facile intelligamus, & refutationes redargutiones q;

* προηγούμενα
* προκατάρχοντα.

Ationes quæ omnes ad aliquid clarum distinctum quæ referamus. Qualiter, inquis, & ad quæ modum? (nam id ipsum quoque indicandum adhuc arbitror propter stupidos istos methodicos) nempe esto, dicat aliquis, phlegmionem affectum esse præter naturam: ipsam vero lesam phlegmone laborantis particulæ functionem morbi insigne symptoma, veluti pedum quidem {lesum} ingressum, oculorum visum, aurium auditum: ruborem autem, tensionem, & renixum, & tumorem, qui præter naturam sit, ac phlegmonis succedat, diuersum quoddam genus siue symptomatum, siue accidentium, siue quo alio nomine appellare malit: illud modo sciat, clare quæ definiat, non esse idem genus cum vitio actionis. Rursus sanguinis redundantiam (si forte hæc fuit) internam phlegmones causam: externam vero, & quæ hanc præcessit, ciborum abundantiam. Ergo, sicuti ipse exempla sermonis habendi clara posui, & quatuor genera distinxī, ac notiones eorum dixi, ita & Thessalo, arbitror faciendum fuit, præsertim post tot & tantos viros, quos se vicisse prædicauit, nouam sectam condituro. Nunc vero nec ipse apertum quicquam attulit, nec sectatorum eius quisquam.

* Al. causas.

Refelluntur, quæ Olympicus, ac Thessalus de ea, quæ est inter pathos & symptoma, differentia prodiderunt.

CAP. 9.

Olympicus enim, cum ausus sit definire, quid pathos sit, non eius, sed symptomatis retulit notionem. In summa igitur, nec quid pathos sit, nec quatenus à morbo differat, intelligunt. Verum hoc nos in sequentibus docebimus, simul enim omnia dici non possunt. Verum concessio iis idem esse morbum, ac pathos, inspiciamus ea, quæ dicit Olympicus. Pathos (inquit) est conuersio corporis à naturali habitu in eum, qui præter naturam est, permanens. Post paululum progressus ait, Sciendum est differre à symptomate pathos, quod pathos, ut paulo ante dixi, affectus corporis est præter naturam permanens: symptoma, quod huic accidit, quod quæ in iis, quæ præter naturam sunt, specialem, ac magis etiam particularem figurationem habet. Hæc est egregia interpretatio sapientis Olympici, qui pathos ac symptoma finire est ausus. Quæ sanè tot vitiiis scatet, ut mihi in mentem veniat illud stulti ad cribrum, negantis inuenire se, quid eius obturet, aut non obturet. Quid enim primum ex ipsis dicas, aut quid omittas? quippe omnia refutare, quæ perperam sunt dicta, longum sit. Num omnis mutatio ab eo, quod secundum naturam se habet, ad id, quod præter naturam est, morbum censetis, si modo permanentia illi adsit? At vos tum coloris vitium, tum atrophiam, id est affectum, in quo corpus non nutrit, symptomatis, nequaquam morbis annueratis. Quid autem cacochymia, id est vitio sus succus: quid cachexia, id est malus corporis habitus: quid succi defectus? quid vero ipsa redundantia non ne præter naturam sunt? Si ergo permanentia his accedat, inter morbos numerabuntur.

At qui nec ipsi id vultis, & merito sanè. Etenim supra id, quod præter naturam sit affectus, adici oportet etiam aliquam ab eo lesam actionem: nam, quoad ille hæc omnes seruantur, etiā si millies corpus sit alteratum mutatum quæ, nullus tamen eorum affectuum adhuc morbus est. Quod enim curationem desiderat, aliud planè non est, quam affectus, qui vitiat actionem. Siquidem quod primum maxime quæ oium desideramus, id naturalis est actio: propter hanc, & naturalem siue affectum, siue constitutionem nominare velis. Videre namque, & audire, & loqui, & ingredi indigemus, non autem oculis, auribus, lingua, aut cruribus: nam, si videre alia particula liceret, quis oculorum esset usus? Et, si alio quouis instrumento audire liceret, quæ aurium esset utilitas? Pari modo & lingua, & cruribus minime profecto esset opus, si loqui atque ingredi sine his possemus. Ac videre quidem, nostra ipsorum causa indigemus: oculis non nostra, sed ideo, ut videamus. Iam linguam, aures, crura non propterea requirimus, ut instrumentis & multis affluamus partibus, sed loquelæ gratia, & auditus, & incessus.

Dnis gratia desideramus. Sicuti enim supra diximus, causæ vicem ad actionem constitutio præstat. Quæ vero constitutionem, unde actio nascitur, necessario sequuntur, sanis quidem nobis accidentia, ægrotantibus symptomata nuncupant. Atque hæc quatuor genera sunt oium, quæ in corpore nostro habentur, seu secundum naturam nos, seu præter naturam habeamus, actiones, constitutiones, quæ has præcedunt, quæ sequuntur: his dehinc nomina, qui volet, imposito, singulis seorsum: &, si Dionem, aut Theonem appellare velit eorum quodlibet, mea nihil refert: illud modo intelligat seruet quæ ubique, quatuor in vniuersum res esse, quæ sitæ inter se proxime sint. Et, quoniam huc sermonis veni, videor mihi hoc iuste exigere, ut sicuti nos illis permittimus, quæ velint, nomina indere, ita illi inuicem nos vilitatis & antiquis vti sinant. Alioqui sanè grave atque adeo iniurium sit, si illis solæcismum committere tyrannorum ritu licebit, nobis vel græce, {vel latine} loqui non concedetur. Vocanto, si placet, sanitatem, ipsarum functionum constantiam: quam ostensum à nobis est affectum constitutionem quæ partium, cuius ope functiones secundum naturam edimus, hygien, id est sanitatem ab omnibus Græcis appellari. Atque, id cum statuerint sanitatem, morbum tamen censento non actionis vitium, sed qui præter naturam sit affectus. Tanquam ergo nos illos nec græce {latine} ve nec dialectice nominantes, non impedimus, ita illi nobis permittant & græce {latine} uc & dialectice non omnem, qui præter naturam sit, affectum, sed qui actioni incommodat,

* Al. oculos.

incommodat, morbum nominare: qui præter naturam sit, nec tamen actionem obturbet, non E morbum, sed morbi symptoma. Rursus, sicut illi permanentiam adiiciunt, nec indicant, quot horas eiusmodi affectus moratus, morbus sit censendus, ita illi nobis concedant illud permanentiæ nomen subtrahere. Nam, si quis siue tribus horis, siue quatuor, siue horæ tantum dimidio, toto corpore vehementer sit arreptus sit, ut neq; sentiat, neq; moueatur, hunc nos apoplecton, siue attonitum dicimus. Æque, si quis conuulsus toto corpore sit, hunc etiam comitiali morbo laborare, nulla nec horarum, nec dierum ratione habita: quippe nomina id genus, naturæ rei, non temporis modi sunt indicia: non aliter q̃ album, & nigrum, & calidum, & frigidum: alioqui mirum mehercule sit, si aqua calida, calida non sit, nisi perpetuum diem talis perduret: aut qui sex horis febricitauit, non febricitauerit: oportuisse enim ut febricitauerit, durasse malum: quanq̃, quod tempus id sit, quod durationem illam, iusta ne fuerit, an secus, determinet, nemo eorū tradidit: vtrum ne dierum aliquis numerus sit, {an mensium,} an horarum: aut cur durabile dicat, cum licuerit diuturnum dicere: aut cur hoc quidem mutantes non nulli eorū, difficile solubile dicant. At certe hoc non generaliter morbi, sed longi morbi proprium est: perinde ac facile solubile, breuis. Verum existimare referre, ægre solubilem, an durabilem, an diuturnum dixeris, non ne extremæ est ruditatis? Iam illud profecto magis mirum, q̃ ipsi veluti à graui somno experrecti, distinguere pathos à F symptomate aggrediuntur: cum auctor stupiditatis eorum in secundo de methodo, sic scribat: Eadem nanq; cum præcedunt, pathe dicuntur: cū succedunt, symptomata. Quauis etiam longe mirabilius hoc ipsum sit, q̃ ea, quæ ab illis dicuntur, utiq; iecinoris phlegmonem, si primo statim die irruat, pathos esse concedere: sin alteri cuiuspiam secundo, aut tertio die succedat, abire in symptoma: quanq̃ quid diem secundam memoro, cum melius sit horam secundam à morbi inuasionem dicere? An enim in secundo die phlegmone iecinoris in symptoma migrabit, in secunda ab initio hora non migrabit, nec symptoma erit: cum illud saltem, quod est, alicui, quod præcessit, superuenire illi omnino competet. At, quod tam celeriter, inquit, superuenit, ab eo, quod vnà irruit, non distat. Rursum igitur dictum ab illo clare oportuit, quot horis determinet, distinguat q̃, quod superuenit, ab eo, quod vnà inuadit. Ac Thessalus quidem eiusmodi est. Olympicus vero, ceu in arcem ipsam sapientiæ euectus, non ita pathos à symptomate discernit, sed pathos id esse, quod dictum est, symptoma vero, quod huic accidit, mirifice videlicet, ac dilucide essentiam eius interpretatus: quippe, quid ipsum symptoma, quod pathos comitatur, sit, adicere (ut arbitror) ac definire oportuit, num corporis aliquis affectus, num lesio quæpiam actionis, num pariter vtrunque esset. At ille quidem minime id dicit, sed nobis videlicet diuinare est opus. Illud vero, quod defini- G tioni apposuit, nempe specialem, atq; etiam magis particularem in iis, quæ præter naturam sunt, figurationem habens, quā non excellentiam claritatis habet, atq; etiam nominum græcam, perlepidam q̃ interpretationem? Si magis specialem quandam figurationem, in iis, quæ præter naturam sunt, symptoma habet, quid ergo est, quod magis generalem notā habet? non enim dixit, an sine collatione ad generale, magis speciale liceat inuenire. Sin ad nihil omnino referēs, magis speciale pronunciat, oppido q̃ diligenter, clare q̃ interpretatur: quanq̃ & paucis, & dilucidis verbis dicere ei licebat omnia, quæ circa corpus animalis præter naturam sunt: vel morbum esse, vel causam, vel symptoma. Quibus omnibus cum illud præter naturam sit commune, morbus actioni officit, causa ipsum præcedit, symptoma eum sequitur, ipsum videlicet natura duplex, alterum actionis lesio: alterum affectio quædam morbum sequens. Verum (ut dixi) si quis omnes eorum errores excutere velit, finem dicendi non inueniat: ipse que mi Hiero optime scis eorum nos ne millesimam quidem ipsorum partem refutare conatos. Ergo, si illud tantum adiecero, primum hunc librum hoc loco claudam: nempe q̃ in ipso statim methodi principio non pauci medicorum falluntur, utiq; qui Thessali, ac Themisonis sunt æmuli, qui q̃ methodicos se appellant, insignibus, ac maximis erroribus: cum his vero non pauci eorum, qui se analogisticos, dogmaticos, ac logicos H nomināt. Siquidem, nisi quis omnes affectus, à quibus actio leditur, inuenerit, numerum ipsum morborum, quantus, qualis q̃ sit, ad vnguem definire non potest. Id cum quidam eorum facere nunquam vel tentauerint, tyrannorum more, quæ ipsis videntur, citra demonstrationem pronunciant. Alij non modo ipsi non demonstrant, sed nec à demonstrantibus discunt. Ac plurima (ut scis) medicorum pars, qui nunc sunt in pretio, eiusmodi est: nec id fortasse mirum. Nam, ubi philosophorum plerique citra demonstrationem credendum sibi postulant, quid de medicis mirere, quibus nec vacat veritatis inquisitioni vacare? ut qui mane in salutationibus (ita enim appellāt) sint occupati, vespere cibo distenti, ac ebrij. Verum ego veteris tibicinis exemplo, mi Hiero, vel cum musis ipsis certauero: cum alioqui turpe putem, tibicinem, qui præsertim haud magnā rem prospere moliebatur, adeo repertum fuisse laudis cupidum: me autem, qui medendi methodum ab antiquis inquisitam, non tamen hætenus exacte proditam, inuestigare, absolueret q̃ valeam, propter eam, quæ hac tempestate regnat, ignauiam, grauari, atq; cunctari, ac differre. Quare contra nunc affectus, q̃ ante, mihi videor. † Non enim proprium vobis, qui me ad medendi artem totam ordine perscribendam hortati estis, hoc munus dedico.} Ac primus liber hic mihi finiatur: totius, quod sequitur, operis secundus ad hunc modum deinceps incipitor.

† Al. ex ant.
cod. Vobis enim,
qui me ad me
dendi artem to-
tam ordine per-
scribendam hor-
tati estis, qui-
bus et dedico,
gratias habeo.

Galenus

GALENI METHODI MEDENDI
ID EST DE MORBIS CVRANDIS
LIBER SECVNDVS

ARGVMENTVM LIBRI

Quid sit Morbus, ac quæ prima ipsius genera: & quo pacto statuendæ sint Indicationes,
quibus vniuersa morborum curandorum methodus,
tanquam fundamentis subsistit.

*Affectum, à quo immediate actio leditur, proprie dici Morbum, quando & ad ipsum
remouendum vniuersa curatio dirigitur.*

CAP. I.

B



Væ corporibus nostris à naturæ suæ modo egressis, Hiero optime, accidūt, eorū quatuor traditæ differētiæ sunt: Vna ipsius functionis vitiatæ: Altera eius, qui hanc peperit, affectus: Tertia causarū, quæ ipsum præcellerunt affectum: Quarta symptomatum, quæ hunc necessario cōsequuntur. Quod itaque vel cūcta hæc esse morbum oporteat, vel horū quædam, vel certe ex his vnū, id promptum colligere cuius est. Cum. n. egrotantibus præter hæc nihil insit, vtiq; præter hæc morbus non fuerit. Quod ergo reliquum est, aut oia hæc collecta morbus erit, aut horum quædā, aut vnum saltem oīno. Sed

enim oīum esse collectionē, præter id, quod neminem vsquā habuit authorem, et dici nō potest. Nam quæ, quæso, morbi causa, aut quod morbi symptoma erit, si oīum pariter collectio morbus censēbitur? Neutrum profectō erit. Ergo duo præter morbos genera relinqui necessum est: alterū causarum, quæ hos creant: alterum eorū, quæ necessario sequuntur, non tñ homini officiunt. Verum, si hæc abstuleris, reliquū est, vt in altero duorū statuatur morbus, aut ipsis functionibus afflictis: aut, qui has edunt, affectibus. Fuit q; & antiqua sanē de hoc controuersia, & hodie dissident inter se oēs, nō modo medici, sed et philosophi, alij ipsius actionis vitia, alij affectus vnde actio prodit, morbos noīantes. Et dissidere viros in rebus tam obscuris minime est mirum: non intelligere tñ eos, quod de noīe contendāt, sanē taxatione est dignum. Quippe, si inter oēs conuenit, ad affectum, qui functioni obest, curationis consilia dirigi, quid ad artis officia conferat definiuisse, affectus ne an læsa functio morbus sit appellandus? Vtrouis enim modo appellantibus eger sanitati restituet, modo quis affectui commodis præsidij occurrat: hic nanq; est, quem alterare mutare q; & prorsus submouere oportet, non vitium functionis. Nemo enim ipsam claudicationē sanat, (id enim esset ridiculū) sed affectum, qui hanc efficit, veluti phlegmonem, si huius vitio claudicatur: atque hanc & perfundit, & cataplasma superimponit, & scarificat, & per halitū digerit, & omni ratione discutere tentat, vtpote cū hac abolita, reddatur rectus incessus: nec hac submota claudicationē corrigere prorsus sit opus, cum nec remaneat quicquam prauæ functionis, si, qui huic obfuit, prorsus sit amotus affectus: quoad vero huius quicq; relinquit, necessum est ad portionem eius, actionem vitiose edi. Hūc itaq; affectum, seu morbum appellasse, seu pathos, {vitium ve,} seu morbi causam, seu pathos {vitij ve} causam quis velit, id nihil ad curationem nec profit, nec oblit. Sed, neq; si Theonem aut Dionem hunc vocet quis, modo rite sanet, nec hic quidē egrotanti officiat. Quinimmo, si quis prorsus innominato eo, tamē quæ ex vsu ægrotantis sunt, adhibeat remedia, non solum hic nihil offendet, sed etiam bellissime curabit. Verum, qui alterum docere volet, quæ Dipse tenet, huic prorsus nominibus propter res vti est opus. In quorū vsu claritas quasi meta spectanda erit. Nam, qui sic nominare quæq; studet, vt qui discit, clarissime intelligat, is optimus præceptor fuerit. Quoniam igitur & nos iam docendi munus ingredimur, necesse est alicubi rebus nomina imponamus: an vero dilucide, id vos æstimetis, licet. Ergo affectus, qui actionem vitiat, Morbus appelletur: hunc siquid sequitur, Symptoma: quod illum excitat, Causa.

*Qua ratione Veteres medici Nomina Morbis imposuerint, & quibus ex libris Morborum
ac Symptomatum numerus & Cause declarentur.*

CAP. 2.

His ita distinctis, inspicienda diligenter est nominum diuersitas, quæ agnitudinibus imposuerunt ipsorum primi authores. Subinde enim à læsa particula sunt indita, vt Græcis Pleuritis, id est laterum compunctio: Peripneumonia, id est pulmonum phlegmone: Ischias, id est coxædicum morbus: Podagra, id est pedum vitium: Nephritis, id est renum vitium: Arthritis, id est articulorum vitium: Ophthalmia, id est oculorum phlegmone: & Cephalalgia, id est capitis dolor: & Dysenteria, id est intestinorum tormina. Subinde ab ipso symptomate, vt Eileos, id est tenuioris intestini morbus: Tinesmos, id est desidendi assidua cupiditas: Spasmos, id est cōuulsio: Palmos, id est palpitatio: & Tromos, id est tremor: Paralysis, id est nervorum resolutio: & Apepsia, id est cruditas: Dyspnœa, id est difficultas spirandi, vel inordinata spiratio: Apnœa, id est

Septima Classis.

bbbbbb

defectus

METHODI MEDENDI

defectus spiradi: & Agrypnia, id est vigilia: & Paraphrosyne, id est delirium: & Coma, id est sopor. **E**

*AP. ix. ἀλίγῃ
i. non pauca.

Sepe ab ambobus simul, ut Cephalalgia: & Otagia, id est aurium dolor: & Cardialgia, id est cordis dolor: Odontalgia, id est dentium dolor: Hysteralgia, id est uteri dolor. Sepenumero à causa putata, ut Melancholia, ab omnibus Cholera, ipsi qui sunt à Cnido medicis. Hinc etiam fortassis & Leucophlegmatias hyderos, quæ aque intercutis est species, nomen accepit. Non nūquam à similitudine ad aliquid extra positum, ut Elephas, siue Elephantiasis, Cácer, Polypus: Staphyle, id est vna: Leuce, id est vitiligo alba: Myrmecia, id est Formica, siue sessilis verruca: Atheroma, id est tuber, cui pulicula simile quid inest, quæ Greci Atheran dicunt: Steatoma, quod seuo simile quid continet: Staphyloma, id est oculi morbus, cum in summa tunica quiddam acino simile eminet: Meliceris: Anthrax, id est carbo: Alopecia, id est areæ in capite: Ophiasis, id est vitium serpentis formam representans: Sycofis, id est ficus: Satyriasis, & Priapismus, pudendi præter naturam erectiones. Ipsorum vero morborum, quæ nec locum affectum nomine representent, nec causam, quæ eos effecit, perpauca sunt nomina, Phlegmone, Gangræna: Scirrhus, id est durities vix sentiens: Erysipelas: Apostema, id est abscessus: Oedema, qui tumor est laxus citra dolorem: Empyema, id est collectum in thorace pus: Vlcus: Exarthrema, id est luxatio: Catagma, id est ossis fractura: Spasma, id est conuulsio: Rhegmia, id est ruptum: Coloboma, id est mutilum, siue curtum: **F** Dothien, id est furunculus: Ionthos, id est varus: Phyma, id est laxarum partium phlegmone. Quam horum quoque non nulla partim locum corporis siue particulam afflictam subindicare videntur, partim à pregrauante symptomate nominari. Quod siquid citra huiusmodi insinuationem est nominatum, at certe differentias suas multiformes habet: veluti vlcus tametsi ipso nomine, unitatis solutionem in carnosâ parte non indicet, atque ita afflictam partem unâ insinuet, at particulares eius differentie varie sunt nominate, Chironium, Telephium, Cancer, Herpes, Phagedæna, omnia quæ id genus, partim ab ipsis, qui primum ea sanarunt, ut Chironium: partim ab ipsis, qui ipsæ sunt affecti, ut Telephium: Cancer autem à similitudine ad animantem: Phagedæna à symptomate, similiter Herpes. Verum Phagedæna vlcus omnino est, id quæ depascens, siue exedens, siue quomodo-cumque appellasse libet: Herpes non semper vlcus est, quoties quæ cum exulceratione est, non utique seruata veteri sede, vicinas partes depascit, sed, sicuti nomen ipsum indicat, ritu serpentis bestie, relicto priore loco transit ad alterum. Cauum vero vlcus, & sordidum, & purum, & equale, & quod hyperfarcion grece dicitur, id est cuius supercreuit caro, hæc magis proprias sortita sunt appellationes, non tamen similiter omnes, sed equabile à propria nimirum differentia, sicuti & cauum, & supercrescens. At cruentum, & purum, & sordidum, non à proprijs differentijs, sed ab externis symptomatibus sunt appellata. Ergo, cum tam impar noium impositio veteribus fuerit, multo quæ et magis cum Epinyctida, & Acrochordona, id est pensilem verucam, & Nyctalopa dicant: primum, quod nocturnum est enatum: alterum, quod summam occupat cutem: tertium, quod nocturnum visum auferit: alia quæ eiusmodi multa faciant, nam si omnia numerem, (quod ipse fugere iussi) superuacua persequi videar: Id omni modo agendum est ei, quem veritatis studium tenet, ut ab ea, quæ nomina imaginationem faciunt, recedens, ad ipsam rerum substantiam se conferat, atque hanc inspiciat: tum, quot in vniuersum sint & morbi, & symptomata, & proximæ siue interne horum cause, requirat. Nos igitur id alijs commetarijs fecimus, quorum vnus de egritudinum numero est, inscriptus autem est de Morborum differentia: alter de Symptomatum est differentia. Adeo vero in eo opere causas horum vtriusque seorsum explorare studuimus (dico tum morbi, tum symptomatis cuiusque) ut ad præsentem disputationem nihil amplius delideretur, sed preparata omnia iam sint. Itaque ne legenda quidam, quæ hic dicemus, vlli suaserim, prius, quam in illis sit exercitatus. Quippe, si quis illis tam numerosis theorematibus neglectis huc se contulerit, nec ipse fructum percipiet, & quæ recte sunt tradita, temere inculabit.

Quid differat Morbus & Pathos, & quod omnis Morbi dignotio ex ipsis pendeat, quæ corpori secundum naturam insunt.

C.A.P. 3. **H**

AC in illis quidem particulatim omnia, tum morbos, tum symptomata, tum causas inquirō. Hic duobus adhuc additis, quæ necessaria erunt ipsis, qui medendi artem exercebunt, tum me ad vltimum inuentorum prodendum conferam. Quæ nam sunt, inquires, duo illa, quæ dicere paro? Certe vnum, quid inter morbum, & quod Greci pathos vocant, intersit, indicabit: Alterum, quod line corporis elementis, & quibus primum consistit, noscendis, non possint morbi inueniri, ostendet. Hæc igitur nos accuratissime tradere studebimus. Qui ea legent, oro, ne prius ad ipsam methodum medendi se conferant, quam & ipsi, quot in totum morbi sint, per se inquisierint: & quæ prodita à nobis sunt, curiose inspexerint. Ergo ceu hæc fecerint, incipiam, quæ promisi. Tres esse in corpore affectus præter naturam ostensum iam est, Causas, morbos, symptomata. Causas, veluti redundantiâ vel corruptelâ: Morbos, ut phlegmonem, vlcus: Symptomata, ut malum colorem, & gracilitatem. Diuersa ab his sunt, quæ immodice à corpore excernuntur, aut quæ præter naturam retinentur, & functionum vitia, omnia scilicet cōi nomine symptomata dicta, ceterum non vni generi subiecta. Quippe affectus quidam corporis est vitiosus color: quod excernitur aut retinetur, affectus non est, sed affectum sequitur. Similiter actio vel lesa, vel integra, affectus sanè non est: particulæ autem, vnde editur, affectum necessario comitatur. Ac oedema quidem & phlegmone ex ipsis

A ex ijs sunt, quæ absolute esse dicuntur: Eodẽ modo & redundantia (si ea sit) sanguinis, & corporis pallor. Actio vero ex eorum numero non est, quæ esse absolute dicuntur, aut certe non similiter, sicut iam comprehensa: liquidem nullo temporis spatio manent eius partes, sicuti profectò nec sermonis, nec etiã motus vllius, sed horum quilibet in ipso (vt sic dicam) fieri esse suum obtinet. Cum vero duplex sit motus genus, vnum in loco, aliud in qualitate, prius latio, secundum alterationem dicitur. Ac omnis quidem actio, motus est actiuus: Omnis alteratio, eius, quod alteratur, motus est passiuus: patitur nanq; quod alteratur. Ergo affectus, dum alteratur, mouentur: cum à motu cessauerint, iam alterati sunt, non autem amplius alterantur. Quicquid enim quocunq; modo se habet, aliquo omnino affectu est præditum: quod autem in constanti agere q; auferibili affectu est, id habitu iam quodam affectu est. Sanè alteratur is, qui nigrescit: alteratus est, qui iam obnigrui, siue (vt sic dicam) nigrefactus est. Itaq; alteratio generatio est qualitatis, aut affectus, aut quomodocunq; appellare velis. Nec, si alterationem esse depositionem, vel mutationem eius, quod prius fuit, dicas, id pugnet cum eo, quod dixi, alterationem generationem esse qualitatis: cum ambo in idem recidant, nam, & quæ prior in corpore qualitas fuit, mutatur, & nunc noua gignitur. Quippe eius, qui in Sole versatur, candor mutatur, nigritia gignitur: † rursus eius, qui

† In quibusdã codi. hæc non habentur.

B igni se calefacit, † frigus mutatur, calor fit. Quoties vero cuiuspiam, quod substantia non sit, generationem esse dicimus, non idẽ eo sermone significamus, sicut cum absolute generationem proferimus. Nam, quæ absolute generatio nominatur, via est in substantiam: quæ vero huius, vel illius generatio dicitur, via est in illius (vt sic loquar) entiam, siue subsistentiam. Verum hoc, veluti extra rem, sit dictum. Quod vero propositum nobis in disputatione maxime fuit fermè iam definitum est, nempe aliqua, in generatione, & mutatione, & alteratione, & vt semel dicam, in motu, ipsam essentiam habere: aliqua in ipsius substantiæ constantia. Ac sanitas quidem, & morbus, & quæcunq; symptomatum causarum q; affectus vel habitus sunt, ex permanentium constantium q; numero sunt: actiones oēs alterationes q;, in quacunq; re fuerint, in ipso fieri essentiam suam possident: & corpus, secundum quodcunq; mouetur, secundum idem patitur, motus q; eius pathos, siue passio est. Sanè præsci motus oēs, etiam qui naturaliter se habent, nisi actui sint, pathe græce, id est passionēs, nominant: sicuti etiam ipsos actiuos motus, actiones. Eo pacto & Plato sensuum alterationes, pathe, id est passionēs appellat: cum iunioribus aliter (nescio quomodo) sit visum, vt videlicet de solo eo, qui præter naturam sit, motu id nomẽ vsurpent. Ac à veteribus quidem pathos priuatim de omni extrinsecus motu dicebatur: nunc per abusum etiã affectus, qui ex

C passione iam prouenire, nec amplius in motu sunt, pathe, id est passionēs, appellat, † non tamen diuturniores, aut agrius auferibiles. Sed eiusmodi nomenclaturæ à iunioribus sunt inuectæ. Diximus autem alibi diffusius de medicinalium nominum vsu: nec illud nobis ad considerationem propositum nunc est, sed tantum, quæadmodum ipsi vtemur, claritatis gratia distinguere necessarium est visum. Nam contrariũ sanitati affectum, à quo ledi actionem dicimus, morbum tantum appellamus, siue diuturnus hic, siue brevis sit, siue momento duret. Ex reliquis affectibus, qui præter naturam sunt, eos, qui hunc præcedunt, causæ q; rationẽ obtinẽt, causas tñ dicimus, nō pathe: Qui illum sequuntur, si actionum offensa sunt, & symptomata, & pathe: eodem modo & immo dicas vel inanitiones, vel retentiones. Qui vero affectus sunt, veluti vitiosus color, supra passionis & symptomatis appellationem, etiam affectus vel affectiones vocamus, ita nimirum, vt sunt. Omnium igitur horum cōmune id est, q; præter naturam sunt, & causæ, & morbi, & symptomatis. Proprium aut morbi quidem est actioni incommodare: symptomatis hunc sequi: causæ præcedere. Ergo nec is, qui morbum esse motum præter naturam dixit, intellexit, quid diceret: quæadmodum in proximo libro docuimus methodicorum non nullos definiuisse, adiecta ex superabundanti, constantia: nec is, qui mutationem esse ab eo, quod fm naturam, ad id, quod præter

† Antiqui cod. quos vidi etim pressi, legunt, ἀμὴν χρόνῳ τερὸν γὰρ οὐδὲ δυσλυσάτερον ἢ διαίτης: τῆς ἐξέως, ὥστε ὁ δὲ ἀπὸ σίαι, i. non tam diuturnior aut agrius auferibilis est affectio, q; habitus: quæadmodum nec imbecillitas. Linac. tñ meliorem lectionem videtur habuisse.

D naturam, voluit: quippe quæ non magis morbi, q; causæ & symptomatis definitio est, quando omnia ea affectus sunt præter naturam. Verum, si brevis spatij sunt, cōstat acuta esse: sin egre aueluntur, diuturna. Noson autem, an Nosema dicas, nihil interest: quemadmodum etiam nō interest, Pathos, an Pathema dicas. Atqui pathus, id est passionis, appellationem de morbo dixisse veteres, quemadmodum & Arrhostian, id est infirmitatem, & Asthenian, id est imbecillitatem, ostensum nobis est in ijs, quæ de medicinalibus vocabulis scripsimus. In quibus illud quoq; traditum est, nihil referre, dicere † valetudinem infirmā, an infirmitatẽ valetudinis: † nam & ipsos, qui egrotant, appellant non solum Nosuntas, id est ægre habentes, sed & Asthenuntas, id est parum valentes, & Camnontas, id est laborantes. Reliquum nunc fuerit, vt, cuius causa hæc oia diximus, in medium adducto, ad aliquid eorũ, quæ proxime tractanda sunt, deinceps transeamus. Id quid sit, rogas? Certe non aliud, q; quod sæpius iam ante dictũ est, Primum ac maxime id medicos studere, id q; ferè proprium eorum munus esse, vt morbos adimant: quippe simul cum hoc non modo actionis vitium statim euanesceat, sed etiam reliqua omnia symptomata tolluntur. Si quidem primum ac maxime actionis ipsius, quæ secundum naturam edatur, omnes egemus, propter illam vero & sanitatis: sed & functionis incommodum amoliri omnes cupimus, ob id vero etiam morbum ipsum. Ceterum non functionis vitio, sed morbo ipsi, id est affectui præter

† Arrhostiā an Arrhostema.

METHODI MEDENDI

naturam, qui actioni incommodat, applicamus remedia. Quisquis igitur ex ijs, quæ particulis naturaliter insunt, & quæ temere accidunt, & quæ actionis sunt causæ, distinguere non potest, quomodo credibile est, ut ipse affectum, ex quo primum actio leditur, inuenire possit? Nam, quæ temere corporibus accidunt, etiã si millies sint alterata, nocere profecto actioni non possunt, quandiu, à quibus fiebat, omnia naturam suam tuentur. Horum vero si vel vnumquodlibet sit alteratum, actionem quoque ipsam statim lædi intantum est necesse, inquantum ab eo, cum secundum naturam se haberet, est adiuta.

Tribus Exemplis ostenditur Dignotionem Morbi ac curationem, ex intellectu Affectus, qui secundum naturam mensi, pendere.

CAP. 4.

AC mihi quid res tota explicata iam est, clare quæ ostensum, ijs præsertim, qui intelligere vera possunt, fieri non posse, ut omnium morborum numerum methodo quis comprehendat, nisi idem omnium causarum actionis numerum, corpore secundum naturam se habente, norit. Nihil tamen ex iam dictis intelligere adhuc possunt, quicumque vel rudiores sunt, & ingenio crassiore, vel methodicæ sectæ nugis innutriti. Denuo igitur, quod nunc generatim dictum intelligētibz est, illis quoque speciatim exponamus, vnum aliquod atque alterum veluti exemplum sermoni proponentes. Cur lingua sapores percipit, nec vlla pars alia? Num propter colorem, aut situm, aut magnitudinem, aut figuram? Quippe ea affecta, nec commode sapores sentiente, aut colorem eius ad naturam suam reducemus, si videlicet huic actionem debet: aut iam dictorum quoduis, si ab illo agendi vim accipit. Quod si propter aliud ab his quippiam, constat, si illo tamen tenus ad naturalem habitum sit restituta, nullo etiam reliquorum fore opus. Nam esto, exempli gratia, densitas corporum causa sit, cur succi saporem diiudicet: nunquid horum symmetriam, quæ in sanitate visitur, tuebimur: rursus quæ ametriam, id est à iusto modo recessum, quoties laborat, corrigemus? Esto (si placet) mediocris calor causa sit, cur saporem intelligat: num hic quoque manifestum est ceteris neglectis vnam adhibendam curam, ut illud seruemus, à quo agendi facultatem accepit? Iam, si propterea, quod ita in sicco humido quæ attemperata sit, idcirco sentiat, quis non reliquis posthabitis huc tantum intendat, ut neque iusto siccior sit, nec etiam humidior? Quis rursus, si hoc verum est, non facile prompte quæ colligat duos esse vniuersos linguæ morbos, alterum siccum, alterum humidum? Veluti rursus, si per moderatum calorem & frigus habet, quod sentiat, quis non hic quoque duos esse morbos eius intelligat, caloris frigoris quæ à modo recessum? Non aliter quoque, si propter tenuium meatuum competētiā sensum est nata, promptum profecto hic quoque colligere est, omnino eam ex horum contrario habitu esse vitandam: duplexque vitium fore, densitudinem eiusmodi meatuum, & raritudinem. Sed num etiam plura dicam, quod stupidos istos inducā, ut, si nihil aliud, illud saltem intelligant, non posse quenquam nec inuenire, nec demonstratione asserere, morborum numerum, qui non ex ijs, quæ particulis insunt, tum quæ causæ actionis sint, tum quæ temere accidunt, norit? Num etiam alterum adhuc tertium quæ exemplum adijciam? Sæpe namque multitudine exemplorum, stupidorum animi veluti à somno excitatur. Age igitur ita homines interrogemus: Idcirco ne corpus calida, frigida, dura, mollia, lenia, & aspera, omnia denique tagibilia sentit, quod candidum colore est, aut nigrum, aut rufum, aut vno verbo, quod talis coloris est? an propter horum nihil, sed aliud quippiam? Neminem enim arbitror latere, quin, si quid probe sentiendi munere utetur, id tantum illi tuendum custodiendum quæ sit, ex quo vno probe sentiendi facultatem accepit. Nam, si ex eo quod candidum fuit, id dotis obtinuit, eius nimirum tuendi maxima erat habenda cura, sicut nigri fugiendi. Sin contra ex eo, quod nigrum fuit, sentiendi vim habuit, omnes, arbitror, alios colores fugere formidare quæ oportebat. Ad eundem modum, & si inde adeo sentit, quod flauum, vel rufum est, fugiendi, arbitror, alij colores sunt, ceu sensum vel penitus abolētes, vel vitiantes. Præterea, si eo, quod durum sit, sensu est præditum, si molle fiat, deterius sentiet: Æque ut, si eo, quod densum sit, si ad raritudinem mutetur. Iam, si tenuium meatuum symmetriam acceptam sentiendi vim refert, ubi ab hac recesserit, vitabitur. Et generaliter, ut sentiat, id tantum ipsum adlit, oportet, unde sensum obtinuit: atque id tantum corrigatur, unde sensus est læsus, cum à natura recessit. Num igitur tertio exemplo est opus? an hæc abunde satisfaciunt? Sanè prudentibus vel hæc superuacua puto, ut qui vniuersale intelligere sine exemplis possint: rudibus autem, & auersis, & contentiolis, ne si tertium quidem addam exemplum, quicquam fortasse profecero. Veruntamen, quando duo iam dicta sunt, & inaniter tempus nostrum semper terunt, non fuerit alienum, vnum etiam ijs exemplum adijcere. Proponatur itaque iam, quemadmodum ventriculus male concoquens nobis sit corrigendus. Verba autem faciemus, non solum contra methodicos, sed etiam contra eos rationalium, qui non cognita ipsius actionis prima causa, quam continentem etiam nominare sunt soliti, methodo quadam ac ratione constitui posse artem putant. Esto igitur, quispiam dicat (ab ijs enim, quæ obuiam promptam quæ absurditatem exhibent, coepisse præstat, quod eos, si fieri potest, ad ea, quæ confusa magis sunt intelligenda sensim perducamus,) esto, inquā, aliquis dicat hunc quempiam, qui nunc cruditate laborat, quod multos deinceps dies solo lacte est altus, ventris colorem mutasse, album quæ ex rubro reddidisse, idcirco quæ ventris sui functionem vitiasse. Fortasse iam rides, & iure profecto rides. Verū, si scias, quā sit simile & huic de coloribus citra vllam

* ex αὐτοῖς.

* ex αὐτοῖς.

A vllam demonstrationem adhibitam quiduis pronunciare, et tibi de exiguorum meatuum (verbi gratia) symmetria, aut alio quolibet affectu, non, arbitror, iure ridebis: nam aut in tere rium ver-
tes, aut non in hunc. Nam esto impudens sit, qui causam minus probe concoquendi colori impu-
tet, dicat q; q; q; q; ex naturali colore ventriculus ruber est, nunc vero redditus est planè albus, id-
circo cruditate laboret, est necesse. Libens sanè audiam, quid tu contra hunc obijcias. Ego enim
aliam rationem non inuenio, q; vt iubeam, qui ita dicit, prius ostendat, an omnino propter colo-
rem, iustam ac naturalem actionem ventriculus edat. Tu si quam aliam habes, libes audiam. Sed
nec habes, nec habere aliam contradicendi rationem potes contra eum, qui colorem crudita-
tis ventriculi causam esse dicit, q; exigere, vt doceat, quo modo ex naturali colore conlectus sit,
vt concoqueret ventriculus. An igitur huic, qui colori cruditatis causam imputat, fides non adhi-
bebitur ante, quàm doceat etiam hoc nomine agere ventriculum: tu, cum vel tenuium meatuum
symmetria vitio, vel alij cuiuspiam hanc ascribas, credi tibi postulabis prius, q; doceas, quo pacto ex
symmetria in illo genere agat? At non hoc aio, inquit, nec aliud quicq; esse concoctionis cōtinen-
tem causam, sed prorsus id ignorare me fateor. Atqui, si ei, qui colori actionis causam tribuit, ne-
cesse est etiam, eidem lesionem actionis imputet: qui vero tenuium meatuum symmetriam actio-
nis causam dicit, etiam horum ipsorum à iusto modo recessum, eandem vitare fateatur: tum, qui
temperamento quatuor qualitatum, caloris, frigoris, humoris, et siccitatis, actionis causam assignat,
etiam eorundem ipsorum intemperiei offensionem eius ascribat: utique & tibi necesse erit eo, quod
secundum naturam est, prius presumpto, ita, quod præter naturam est, inquirere: aut, si ipsum, quod
secundum naturam est, non nosti, nec, quod egressum à natura est, nosti. Etenim vos etiam ipsos
audio contra Empiricos dicere, fieri non posse, vt, qui id, quod secundum naturam sit, non norit,
dignoscere id, quod præter naturam sit, possit. At nosco, inquit, quod secundum naturam se habet.
Quæro, totum ne, an partem eius aliquam? atq; pars ipsa, quam nosti, est ne actionis ipsius causa,
an vetriculo inest ociose? Nam quid demum eius nosti? situm videlicet, & magnitudinē, & con-
textum, & figuram? At nihil horum actionis est causa. Sed nec Empiricos horum quicquā later:
quippe qui & se partium dissectione, cum occasio hanc offert, vt fatentur, & ex illa se hæc intelli-
gere, non tñ actiones vsus q; particularum. At noui, inquit, & actionem: est enim circumplexus
& attritio. At, nili causam eius noueris, nec morbum intellexeris. Nam, si quatuor qualitatum me-
diocris temperies, actionis sit causa, earum intemperies oīno vitij causa erit. Tu vero reris phleg-
monen, & scirrhum, & ædema, & abscessum, alia q; quæ oculis vsurpari possunt, solos esse ventri-
culi morbos, quamuis ne hæc ipsa quidem, veluti Empirici, solis oculis, manibus, & reliquis sen-
sibus apprehendas: sed ad ipsam essentiam eorum tentas ascendere, atq; hanc diligenter disquire-
re, videlicet non contentus ijs symptomatis, quæ sensui apparent. Quæ tñ symptomata Empiri-
cis definiunt, ac circumscribunt suā syndromen: sic enim ipsi appelladam censent symptomatum
congeriem, quæ in affecto sunt loco. Sed nec curationis indicationē ex apparentibus symptoma-
tis accipis. Non enim, an tumor præter naturam: nec, an renitens: nec, an cū dolore: nec, an ruber:
sed, an sit in finibus arteriarum impactio ex coincidentia, consideras: ac curationem (vt ipse fate-
ris) ad hoc referens exploras. An non ea est Erasistrati docendi ratio, vbi de febribus agit: sicuti
rursus alia Dioclis, alia Praxagoræ, alia Asclepiadis? Itaq; non à symptomatis, quæ in phlegmo-
nes apparent loco, indicatio præsidij his sumitur, sed ab ipsa substantia. Neq; enim, an tumor à na-
tura egressus: neq; an renitentia: neq; an dolor pulsatilis: sed, an & coincidentia et impactio in fi-
nibus pulsatiliū, aut obstructio in exitu venarum, aut putredo aliqua succorum, aut corpuscu-
lorum ratione contēplabiliū, in laxitatibus eque ratione speculabilibus intentio sit, æstimarit.
Quare hi omnes ab affectu phlegmone laborantis partis, non à symptomatis, quæ hanc sequun-
tur, præsidiorum indicationem sumunt. Adeundē arbitror, modum, & si quis calidum, frigidum,
humidum, & siccum causatur. Verum hic, etiam si ventriculus citra phlegmonen, aut vlcus, aut
abscessum, aut alia id genus, eo tantum, q; frigidior euaserit, non recte cōcoquat, tamen remedijs
non destituitur. At, qui phlegmonas, scirrhus, alia q; quæ oculis videre licet, tantum esse morbos
putant, ridicule planè cruditates, quæ sine ijs fiunt, ex imbecillitate vetriculi incidere dicunt, cū
affectum aliquem priuatum seiunctum q; imbecillitatem esse velint, non autem, velut in suppu-
rantibus, aut scirrho grauatis, aut phlegmone affectis, aut alia quauis ratione laborantibus, inesse.
Quippe omnia hæc vitia, siue in ventriculo, siue in iecinore, siue in pectore, siue in alio quouis
accidant, illico partem, in qua sunt, ad propriam functionem edendam imbecilliores reddunt.
Sed id nō satis illis erat ad indicanda remedia: alioqui frustra ingruunt affectus, frustra q; ad ipsam
morbi essentiam subeunt, tanquam non aliter detur idonei compotes esse remedijs. Non igitur,
qui imbecillitatem vitium esse dicunt, vbi nullo ex ijs, quæ ipsi morbos denuntiant, affecto ven-
triculo animal cruditate laborat, ij, dum à nobis refellant, expectant: sed ipsi se ipsos redarguunt,
cum nō proprium aliquod, sed commune omnium dicant, quod q; nec illis ipsis iudicijs, reme-
diorum inuentionem indicare facile possit. Quippe illud, roborare imbecillitatem, nomen nu-
dum, ac veluti meta potius est, quod curans dirigit, non curatio: nam quid faciendo ijs, qui inuali-
di ad actionem sunt, robur vindices, non dicunt. At in hoc curatio consistebat, & nili ventriculi

*arteriarum.

*ad h.

*ad h.

METHODI MEDENDI

affectu inuento, vt remediorum sis compos, fieri non potest. Quippe, si refrigit, calfaciendus est: si humentior est effectus, siccandus est: pari modo, si immodice incaluit, refrigerandus est: si siccatus, humectandus est. Atq; hæc quatuor simplices curationis rationes sunt. Alteræ quatuor compolitæ sunt. Si frigidior ac siccior temperamento redditus ventriculus est, calfaciendus simul humectandus q; est. Sin humidior & calidior iusto eualit, siccandus ac refrigerandus est. Pari modo, si calidior ac siccior est effectus, tum refrigerandus, tum humectandus est. Sin humidior ac frigidior, q; pro natura est, siccandus ac calfaciendus est. † Quare octo tum ventriculi ipsius affectus sunt, quas illi imbecillitates dicunt: } tum octo medendi rationes.

† In antiquis legitur, vt Linaccer vertit. Ex impressis tamē ita verti pōt. quare & octo sunt ipsius ventriculi affectus, qui sunt causæ ipsius (vt ipsi dicunt) imbecillitatus.

Aduersus eos medicos, qui Naturalis Actionis causam negarunt inquirendam, vt Methodus Dignoscendi & curandi morbi constitueretur.

CAP. 5.

NEc, sicut Empiricis, sic vlli dogmatizantiū dicere licet, sint hæc, an non sint, nihil esse opus intelligere. Funditus nanq; logicam sectam subuertent, si ignorato affectu, curationis tñ facultatem abunde sibi superesse dicant. Etenim ab vsu ipso omnes, quomodo curandum sit, intelligent, si ab ipsius rei natura indicationem non sument. Ac Empirici quidem, & q; inuenire posse non putent quicquam eorum, quæ abstrusa sunt: & q; id etiam, si inuentum sit, non desiderent, quippe obseruatas à se esse curationes in apparentibus concursibus: merito nec scire se, an octo affectus sint, quibus ventriculus imbecillus sit, aiunt, & citra eiusmodi superuacua morositatem remedijs se abundare. Qui vero & rationem se habere profitentur, cuius ope etiam abstrusa inquirent, & ipsorum inuentionem prælidiorum præstare indicationem dicunt, hos quomodo nō pudeat dicere, aut nō nosse se, an octo affectus sint, aut eos ad medendum se non requirere? Neque enim id tantum dicere satis est, non nosse se, sed refellere par est eos, qui se scire affirmāt, ceu parum vera professos. Quoad vero nec ipsi id faciunt, alij q; non pauci demonstrationis fide confirmant omne corpus pro certo quatuor qualitatum temperamento opus suum edere, rationabilius est illis accedere: nisi forte, qui nuda afferunt verba, plus sibi credi postulabunt, q; qui cum demonstrationum fide loquuntur. Atqui illi, si non aliud, saltem suadere ac docere auditorem student, non cogere iubere q;: hi totum contra, tyrannorum ritu iubent, ne queramus actionis causam. Verum nos hoc nomine Dionysium, Phalarim, cæteros q; tyrannos odio prosequimur, q; iubent imperāt q; non suadent, ac docent, sicut Solon, Draco, & Lycurgus. At, inquit, ego intra limites artis maneo: vos & ab ijs exceditis, & ad naturalis philosophiæ principia nos reducere conamini. An igitur homo lepidissime, ne hoc quidem ipsum demonstrabis, qui nam videlicet medicinæ artis sint limites: quæ q; nouisse expediat ei, qui ratione, remediorum inuentionem molietur: sed terrifico vultu tuo nos reddere attonitos putas? Audio quidem et te illud dicere, nō oportere actionis inquire causam. Audio & Empiricos dicere, nec actiones ipsas esse considerandas. Audio non minus illum, qui dicit, non tantum has esse æstimandas, sed etiam causas, vnde nascentur, quærendas. Num igitur ex eo esse me iniquorū iudicum numero iubes, qui prius, q; omnes, qui inter se dissideant, audierint, vni statim ferunt suffragium? An primum, quæ vestrum quisq; dicat, seorsum audire vis, dein conferre, atq; perpendere, quis tum sibi, tum apparentibus consentiat: quis rursus nec secum, nec cum ijs, quæ apparēt? Atqui, si ita faciam, Empiricos audiam, et si, quæ dicunt, stabiliter non demonstrent, saltem ea lenire conātes. Vos ne id quidem facitis. Nam sanè libenter audierim, quis vestrum vel lenimen aliquod, vel demonstrationem aliquam afferre sit conatus, cur actionis causam inquire nō expediat. Quæ enim à me methodus supra est posita, inquirendam esse demonstrauit: Vos, q; inquirenda non sit, nec demonstrationem vllam, nec rationem vllā probabilē afferre conamini, sed tm elato supercilio tetricè nos obiurgatis, abscedere à summa physiologia iubentes, nec sic querere hois naturam intelligere, vt philosophi faciunt, qui ad prima vsq; elementa ratione ascendunt. Illud quoq; vobis vel dixisse tantum satis videtur, nempe arteriam, & venam, & neruū, principia continentia, & veluti elementa eius physiologiæ, quæ de homine instituitur, ponēda esse. In quo quidam Herophilum laudauit, q; ita ad verbum dixerit: Esto hæc prima esse, tametsi prima non sint. Sed, qui ad demonstrationē prouocat: ac hypothesis istorum, qui sic opinātur, pugnare secum ostēdit: hunc auersamini ac fugitis, prorsus q; non auditis, & contemnere simulatis, ibi q; rationem fastiditis, iidem scilicet, qui contra Empiricos rationem demonstrationem q; extollitis. Nam, q; secum dissideāt rationes omnium, qui vel ex dimidio dogmatizant, etiam ijs, qui tenuiter in demonstrandi methodo sunt exercitati, facile perspicere licet. Cum enim phlegmone ventriculus laborat, atq; inde adeo concoquere nō valet, quæ nam phlegmones causa sit, querendum censent, atq; inde prælidiorum copiam coniectant spreta Empiricorum inuentione. Cum vero citra phlegmonem, aliud ue id genus vitium, solius intemperantiæ culpa cōcoquere non valet, hic rursus auxiliorum facultatem ab experientia petunt. Atqui hæc secum non conueniunt, cum Empiricorum opinio sibi constet: præterea demonstrat efficiat q; quod volunt, ex ijs, quæ vos ipsi non inficiamini, lēmat. Quippe, si fieri vllō modo potest, vt ex ijs, quæ apparent, symptomatis curandi ratio coniectetur ignorato affectu, utiq; non hic possibile in alio fuerit parum possibile, sed æque in omnibus possibile erit. Ergo ne hoc quidem loco rationem vllam afferre poteritis, quo minus, vbi affectum explorare nequitis, experientia

Aperientia ipsa satis sit ad remediorum inuentionem. Omnia igitur tyrānorum ritu imperatis: uti vero demonstratione nec ipsi vultis, (prestat enim ita fortasse dicere, q̄ non posse vos) nec ijs, qui uti tum volunt, tum possunt, acceditis. Itaq; quid aliud sunt disceptationes vestrae, quam lites, & contentio, & prouocatio ad conuitia, et pugnas: cuiusmodi preceptorum vestrorum quida perpetuo exercuit, aut irridens, si quis calidi vel frigidi mentionem faceret, tanquam balneatoribus magis q̄ medicis ea nomina conuenirent. aut vehementer increpans quali longissime a medendi arte digressum: aut Erasistrati grauem illam authoritatem obijciens. Verum hæc, ut primo auditu oblectabant, ita, cum secundo & tertio audiui, molesta sanè fuerunt, ceu scurris, q̄ medicis, magis congrua. Si enim semel authoritas eorum, qui vltra non esse procedendum iubent, legitimus testis esse ad demonstrationem putabitur, omnia iam mere nugæ erunt, nec finis in disputatione ullus, nisi, qui nunc visitur, inimicitia, pugna, conuitium. Quippe, qui à logicis demonstrationibus digressi credi quippiam censent propterea, q̄ Herophilus, aut Erasistratus ita iussit, hos necesse est omnis generis conuitia pugnas q̄ sequi, admiranda scilicet disputationum, quæ nunc habentur, præmia. Fingamus enim, alius dicat, huic, qui cōmode non cōcoquat, ventriculum frigidam & liccam intemperiem contraxisse, proinde q̄ humectandū ac calfaciendum esse: Alius, B q̄ naturalis eius habitus mutatus ad frigidius et humidius sit, calidum siccum q̄ victum adhibendum suadeat: Tertius autem quispiam accedens, q̄, quæ comprehensa sunt, non recte sint dicta, id ne tentet quidem ostendere, sed tantum eos, qui dixerint, obiurget, quali superflua scrutentur, & testes adhibeat Erasistratum, vel Herophilum: non ne (ut dixi) dissidij hinc mutui q̄ conuitij initium excitabitur: Quippe illos contra necesse est Athenæum, & Mnesitheum, & Dioclem, et Plistonium, & Hippocratem, & Philistionem, & sexcentos alios tales opponere testes. Si enim testibus decidenda lis erit, non modico hi vincent. Nam, q̄ tum insalūbris intemperamēti plures sint species, tum cuius q̄ earum diuersa curatio, vbi nō Hippocratis modo, & plurimorum aliorum medicorum, sed etiā Platonis, Aristotelis, Theophrasti, Zenonis, Chrylippi, & omnium illustrium philosophorum testimonio comprobarint, utiq; & q̄ citra naturā corporis exacte inuentam fieri nequeat, ut vel de morborum differentia quicquam inuenias, vel auxiliorum conuenientium copię lis compos, iisdem ipsis tum philosophis, tum medicis confirmabunt, his q̄ non tyrannorum ritu, sicut isti, iubentibus, sed euidenti ratione probātibus. Contra hæc igitur, qui calidum, & frigidum, balneatorum, non medicorum dicunt esse vocabula, dicētijs videlicet vtentur, & risus mouebunt, moriones, phrygas, aut scholasticos narrātes. Quippe consēti sibi sunt nō C modo nihil demonstratione confirmatū scire, sed nec, quid demum demonstratio sit intelligere. Ergo ex his dicētijs necesse est, oriatur dissidij initium. Ut enim primum omnium memorem, quæ nugantes sine demonstratione dicere non dubitant, cōsidera, quo pacto necesse sit ex eo pugnam subsequi. Nam, vbi contra dicta eorum nuda, & demonstrationis expertia, ac contra testes ipsos, quibus credendum censent, alij tum celebriores, tum longe plures testes opponunt, necesse est vel cedere, vinci q̄; utroq; nomine, † & q̄ demonstrare recusarūt, ‡ & q̄ numero testium sint im- pares: vel perfricta fronte Erasistratum omnibus illis testibus dicere maioris esse fidei. Siquidem hic necessum est alterum negare esse maioris fidei aut Hippocrate & Mnesithæo medicis, aut Aristotele & Platone Philosophis: alterum esse maioris fidei iniuriare: deinde varie vltro citro tam immodesta contentiosa q̄ contradictione iactata alterum eorum impelli, ut dicat † non esse, alterum bene sanè, si tu Erasistratum in ordinem redigas. ‡ Hæc enim quotidie fieri in medicorū disputationibus, o Hiero, vides. Ea vero semel data porta, omnia iam muliercularum verba ingeruntur: & cum mutuis se maledictis asperferint, inutiliter amisso tempore discedunt. Atq; hanc turpitudinem, non est, q̄ dicat aliquis non esse ab ijs, qui demonstrationem fugiunt, inceptam. Fugiunt autem multifariam, ut scis, alij cum grauitate tantum increpantes: alij scurrile aliquid com- D mēti: alij in risum sannas q̄ disceptatione abrepta. Quod si quis sermoni stare, demonstrationes q̄ audire audeat, primum quidem omnino non intelligit: neq; enim potest, qui demonstratiua methodi sit imperitus, eos, qui ipsa vtuntur, intelligere. Quod si aliquatenus intelligit, at, q̄ dogma suum, in quo est innutritus, propugnare omnino decreuit, contra tendere aggressus, dein deprehensus, quæ nec rite cludent, nec colligant, sed vana nugacia q̄ sint, dicere, irascitur, & deuouet Dialecticos, ceu malorum authores, q̄ videlicet pituitam à naribus ipsorum detergēt, ipsis q̄ mederi conantur adhibitis scilicet non melle & placentis, sed allijs & capis, quæ etiam pituita tentos gallinaceos sanare solent. Quippe milles affuisti ijs, cū à diuerse cludentibus argumentis non aliter, q̄ ab ipso allio & capis cogerentur lachrymari. Nec te profectō latet multos sepe nobis priuatim falsos, sentire iam se suam sectam, q̄ sit absurda, nec tñ hanc posse publice mutare, cum alioqui nec alia nossent, vnde haberentur in pretio, & iam vulgo propter hæc & noti & in pretio forent. Itaq; ob hæc ipse quoq; sæpius distuli commentarios de medendi methodo scribere, pro cō- pecto planè habens paucissimos huius tempestatis ab ijs adiutum iri. Etenim, nisi magna quæpiā mirā q̄ mutatio humanarum rerum fiat, actum de bonis studijs est, utpote confusis ac corruptis nemine veritatē ipsam, sed tñ scientiæ famā quærente. Optime. n. profectō scis ne quinq; quidē vsq; inuenisse nos, qui esse potius, q̄ videri docti cuperent. Atqui, nisi quis sapientiā ipsam, ppter

* νοσώδους
morβου, ut
se alias vertit

† εν τε τοῦ υἱοῦ
συμμετρεῖται
σαε προς τιν
ἀποδείξει.

‡ Αἱ. non tibi fa-
neta bñ erit,
si Erasistratū
negligas.

* ἡ δ' αἰμορρία.

METHODI MEDENDI

** ἀσυχλίαν.* se ipsam expetat, ne tempus quidem vllum inueniet, quo se in logica methodo exercent, immo E diuitijs, & famæ, & potentie ciuili inhians, in horum ambitu vitam omnem consumet.

Aduersus eos, qui Morbos à sola plerunq; Intemperie fieri negarunt: & quot sint Prima Morborum Genera, quæ in Similaribus, & Instrumentalibus partibus oriuntur. CAP. 6.

** Al. inuentionis.* ERgo dimissis his, rursus ad propolitum redeamus. Est autem ab initio propositum illud, qui omnem morborum numerum methodo non inuenierit, hunc maxime in ipsis medendi methodi foribus lapsurum: cum constet totidem esse medendi rationes, quot sint morborum ideæ. Ergo sic in enumerandis morbis egisse, vt neq; priuatis proprietatibus attentus infinitos statuatur, nec in primis statim generibus sublistat, id in promptu cuiq; non est, sed ei tantum, sicut antea dictum est, qui in diuidendi methodis sit exercitatus. Principium vero diuisionis eorum est, vt etiam aliubi diximus, vt essentie ratio rei diuidendæ constituatur. Igitur illud monstratum nobis est, morbum omnino vnum ex ijs esse, quæ præter naturam sint. Hæc aut quatuor cum sint, actio offensa: affectus, vnde actio prouenit: affectus ipsius causa: & quæ hunc subsequitur symptoma ta: siue functionem ipsam vitiatam, siue, vnde hæc prouenit, affectum, morbum nominare velis, nihil id medendi methodum immutare ostensum est, modo vnum illud intelligatur, primam ipsam curationem, quam etiam non nulli continentem appellant, affectus esse, qui actioni incommodat. Porro ostensum à nobis diximus, rationabilius hunc morbum appellari: non tamen vetare nos, quin, sicut id cordi sit, actionis noxam morbum nominet: affectum, q hanc creet, morbi causam. Præsumpto igitur, q morbus vocetur affectus is præter naturam, qui functioni officiat, inquisiuimus deinceps, quot in vniuersum morbi essent. Vbi clarum obiter fecimus, si quis via ordine q processurus sit, nec (sicut vulgus medicorum facit) tyranni ritu imperaturus, huic primum inueniendum esse affectum illum, qui functionis effectrix sit causa. Huc sanè nos eucralian diximus esse calidi, frigidi, humidi, ac sicci. Proinde q; primum morbum in similaribus esse ex horum intemperie ostendimus. Alius quispiam corpusculorum, & meatuum symmetriam statuet, propterea q; ex indebito meatuum ipsorum modo egrotare animantes. Cæterum, si quis nec ipse actionis causam, in quo nam entium sit genere, audebit statuere: nec ijs, q statuunt, contradicet, ac nihilo secius tamen ratione methodo q; se procedere arbitrabitur: hunc egregie improbum esse diximus, vt qui nec tutum se ab Empiricorum accusatione facere possit, & secum planè pugnet: quippe eiusmodi homines ex dimidio logicos esse, qui, qua ratione phlegmone, scirrhus, oedema, & alia id genus fiant, multo labore disquirunt, lædi autem etiã citra hæc omnia ex sola intemperie actionem non intelligunt, sed empirice talia curant. Quisquis igitur, quantum hi aberrent, scire volet: tum quot G morbos transiliet, quanto q; plures ignorent, q norint: librum de morborum differentiis perlegat. Intelliget enim Hippocratem primum omnium recta instituisse via: quæ cum à posteris absolueda fuerat, non modo nemo eorum absoluit, sed pleriq; etiam, quæ probe fuere inuenta, corrumperunt. Proxime autem, vt viam, quæ inchoata est ab eo, perficeret absoluerent q; Aristoteles & Theophrastus accesserunt: & si fateri verum oportet, potestare absoluerunt, cum constituerint aliud esse in corporibus similaribus morbi genus, aliud in ijs, quæ instrumentalia dicantur: Quippe à similaribus functiones edi, eo q; esse cuiusq; instrumenti vnam tantum similarē: reliquas vero, quæ cum hac quoduis instrumentum perficiunt, eas vsus alicuius gratia, illius, quæ prima erat actionis causa, factas esse: sed & horum tamen rursus cuiusq; esse per se actionem, veluti in oculis. Satiùs enim fortassis sit, quæ in alijs diffuse ostendimus, strictim hic commemoremus. Ipsum visus instrumentum est crystallinus humor: reliquæ oculi partes, eius causa sunt factæ: quarum omnium vsus narrauimus in decimo operis de partium utilitate libro. Cæterum, quanquam crystallini maxime causa omnes sunt factæ, singulæ tamē earum aliquam seorsum actionem sunt nactæ: ac vena quidem, & arteria, & neruus toti animanti communem: membranulæ oculi omnes, cum sint nutrimenti participes, omnino naturalibus facultatibus sunt præditæ, ac perinde etiam functionibus, H quæ ab his proficiuntur. Quoties igitur crystallinus humor ex intemperie laborat, omnino læditur oculorum functio: cæterum non est eorum, vt organa sunt, morbus: at, quod hypochyma vocant, nullius similariū est morbus, sed oculi totius, vt instrumenti. Ad eundem modum, si in finibus venarum, quæ in cauo iecinoris habentur, obstructio ex lentis, aut crassis succis subhæsit, digestio quidem in corpus per has morabitur, ægritudo tamen totius iecinoris, seu instrumenti censetur nulla similariū eius partium ægotante: quod si intemperies venas eius infestauerit, ipsarum quidem illarum morbus primum erit, ex accidente vero etiam iecinoris. Ac Erasistratus quidem in phlegmone substantia tradenda est lapsus, cum nec in particulis, quæ phlegmone laborant, in finibus pulsatiliū impactio necessario cernatur: nec arteriæ spiritum tantum, cum in naturali habitu sunt, contineant: veluti in tractatione de his ostendimus. Si igitur phlegmone eius generis morbus sit, cuius autumat: & scirrhus eius generis, cuius ille opinatur: & reliquorum singuli, sicut ipse obscure, et multi sequaces eius clarius explicare conantur: utiq; solidas ipsas partes liberarum propemodum à morbis relinquit, nisi quatenus vlcerari, collidi, incidi q; valeant, atq; id genus aliud quidpiam pati. Laborare vero eas se totis eiusmodi morbis, quales nos octo intemperantias ostendimus, id nusquam dicit. Atqui corpora vniuersa, etiam quæ difficillime afficiuntur,

** arteriarum.*

Atur, velut ias, lapis, ferrum, saltem calferi, frigefieri, siccari, humescere q̄ cernuntur, vt vtiq̄e mī-
rum sit, si tantum arteria, & vena, & nervus, nihil eiusmodi sentiēt. Atq̄ hoc etiam magis mirū,
si patientur quidem, functionem tamē legitimam edent: Veluti si ita fors tulit in corde facultas
quēdam est, (vt ipse quoq̄ Erasistratus confirmat) qua laxatur, & contrahitur: hanc autem lædi
profecto oportet, si viuēti animali cor sit exemptum, quemadmodum sæpe factum in sacrificiis
videmus: quippe, si non læditur, perpetuo mouebitur, nec tantum ad tempus aliquod, vt nunc
cernitur. Manifestum est igitur læsam esse, proinde q̄ mouere desinere. Illud igitur consideratu
non inutile erat, cum potest saltem facultas ea lædi, etiam ante, quā cor sit exemptum, quæ nam
sit eius læsio: quæ nam alia, præter intemperiem: nam neq̄ figura eius mutata apparet, nec caui-
tas, nec ligamentum, nec osculum, nec alia vlla pars perditā, sed tantum naturalis temperies muta-
ta. Ergo omnes hi similarium partium morbi omnino, vt dictū est, ab illo sunt omīssi. Siquidem,
vbi sanguis in finibus arteriarum impactus actionem vitiat, id arterias ipsas, quatenus instrumen-
ta sunt, male habet: vt vero similes particulæ sunt, octo quidem secūdum nudas qualitates in-
temperies habent, octo q̄ rursus cum fluxione. Oportet igitur, quisq̄is horum cum certa sciētia
demonstrationes cœpisse velit, à libro de elementis incipiat: post deinde reliquos singillatim (vt
B dictum est) legat. Sunt vero proximi huic commentarij de temperamentis. Ab iis proximus est,
qui de inæquali intemperie inscribitur: mox, qui de naturalibus facultatibus: alij q̄, qui de ani-
mæ affectibus sunt proditi, id q̄ de vnoquoq̄ deinceps, & seorsum. Hos excipiūt, qui de particu-
larum vsu sunt inscripti: quos sequuntur, qui de morborum, symptomatum q̄ differentiis titulū
habent. Plerique vero medicorum, nec tantum experientie applicantes animum (cum tamen li-
ceret ex Empiricorū institutione bonis esse medicis) & perfectioris rationis cupidi, cum aut iis,
quæ citra demonstrationem sunt enunciata, credant, aut vitiosis demonstrationibus fallantur,
non solum nihil excogitant boni, sed etiam, quæ per experientiam sunt cognita, corrumpunt. Si
quidem ratio non leue momentum obtinet ad experientiam vel ornandam, vel corrumpendam:
sed, quantum recta ratio ornando adiicit, tantum, vel etiam amplius, vitiosa detrahit. Atque hæc
me sæpe medicorum vulgo prædicantem audis, qui prius, quā in methodis logicis se exercue-
runt, vel, cum demonstrare aliquid tentant, se ipsos fallunt: vel, cum diuidere quiduis in species ac
differentias, hic quoque imperitorum coquorum ritu non per membra incidunt, sed conterunt,
collidunt, ac dilaniant, veluti in eo, quod nūc est propositum. Consulo igitur (vt scis) talibus om-
nibus, experientie animum intendant: cum non leue instet periculum iis, qui supra vires aliquid
C moluntur, ne & id non consequantur, & quæ intelligere, aliàs possent, omnino amittant. Ergo
cum iis, qui tum recto sunt ingenio, tum discere parati, ipsi rursus sermonem conferamus, illud
tantum ex iis, quæ inter initia diximus, commonentes, non esse committendum, vt vtraq̄ simul
confundantur misceantur q̄, & quæ per experientiam sunt inuenta, & quæ sola ratione sunt in-
uestigata: sed cum vtrunq̄ seorsum sit tractatū, post ambo coniungantur. Ergo, cum ipsi de ex-
perimentalī inuentione alibi egerimus, de logica in his commentariis differere proposuimus. At
mili videor iis præsertim, qui cōmentarios nostros de morborum symptomatum q̄ differentiis
perlegerunt, cum quibus scilicet mihi deinceps sermo erit, iam clare ostēdisse maxime in ipsis sta-
tim foribus lapsum Thessalum esse. Lapsus enim non leui lapsu & Asclepiades erat, vbi inter ini-
tia de elementis corporis male sensit: Caterum multo & maiore & grauiore Thessalus, quippe
qui omnes in victus ratione morbos in duos, similiter illi, cōtulit affectus: multos vero medicina-
lium scoporum ademit, quibus ille est vsus. Pessimum autem grauissimū q̄ illud admisit, quod
nec ipsas actionum noxas, nec affectus, qui carū causæ sunt, morbos censet, sed solis vacuationi-
bus, vel statis vel præcipitatis intentos esse vult, cum nec, quid sit plus iusto listi præcipitari ue va-
cuationem, clare nos doceat. Quippe vel ad vires, vel ad causam, uel ad affectum, uel ad id, quod
D per sanitatem semper est obseruatum, referri iudicium oportet. Ex quo factum arbitror, ut pu-
gna inter eius sequaces non parua sit orta, ut qui tum de reliquis omnibus inter se dissideāt, tum
de eorum, quæ pathe uocant, & notione, & subsistentia. Verum, si nunc de pugna eorum histo-
riam moueam, deflectam ad inutilia sermonem. Omnem igitur deinceps sermonem faciam, ceu
cum illis agam, qui commentarios de morborum ac symptomatum differentiis, præterea de cau-
sis eorum legerint: ad hæc, qui ea omnia, quorum paulo ante memini, reuoluerint. Atq̄ hinc or-
diar. Quoniā actiones omnes à similaribus corporibus proficisci ostēdimus, reliquas uero om-
nes singulorum instrumentorum particulas usum quempiam ipsis præbere, duplex sanè morbo-
rum genus erit, alterum in partibus similaribus, alterum in totis organis. In similaribus intempe-
rantia: in totis organis unum in figura spectatur, aliud in particularum numero, aliud in cuiusq̄
quantitate obseruatur, quartum in positura. Vtrunque uero partium, id est similarium instru-
mentalium q̄, communis est ipsa unitatis diuisio. Ergo sex in uniuersum morborū sunt genera.
Vnum ipsorum similarium proprium, nempe intemperies: quatuor, ut modo dictum est, instru-
mentorum cuiusq̄: & cum his sextum quod tum similaribus tum instrumentalibus est commu-
ne, ipsius unitatis solutio. Horum cuiusque differentia ad ultimas usque species in libro de mor-
borum differentia sunt tradita.

* Al. fecit.

Quid

METHODI MEDENDI

Quid sit Indicatio, & quo pacto ex intellectione eorum, quæ multitudine differunt, ac specie vnum sunt, Methodus communis indicationis oriatur de affectibus passionibus quæ ac symptomatus amouendus.

CAP. 7.

E

† τὴν γὰρ οἶον
ἐκαστὴν τῆς
ἀνοουθίας.

His sic se habentibus, iā de medendi indicationibus est dicendū, sed hoc ipso indicationis vocabulo prius exposito. † Quippe ipsam sequentis siue agēdi insinuationem, indicationē dicimus. Nam inuenitur quidē & ab ipsa experientia id, quod consequens faciendū uel sit, ceterū nō ita quali in præcedēti aliquo designatum: proinde q̄ nemo Empiricorū dicit id isto indicari: quanq̄ certe hoc sequi illud dicunt, & hoc præcedere illud, & consistere hoc cū illo. Deniq; omnē artem horum obseruationem memoriā q̄ esse dicunt, nempe quid cum quo, & quid à quo, & quid post quid identidē sit visum. Ergo ex ipsa rei natura ordiri, atq; ab ipsa, quod sequēs sit, citra experientiam inuenire, id est indicatione inuenire. Definito iam hoc quoq; ac rursus, quod ante diximus, ad memoriā reuocato, omnem medendi methodum seiunctam ab experientia procedere: nec recte facere eos, qui ambas doctrinas Empiricam Logicam q̄ in vnum cogunt, atq; cōfundūt: quæ reliqua sunt, prosequamur. Fuerit autem omniū, quæ reliqua sunt, ordine primū, quod & proposita iam proxime sequitur. Sequitur autē primum, ac maxime illud, q̄ omnis medendi methodus, per indicationem fit: quippe, quicquid ab experientia seiunctum est, id totum F indicatio nominatur. Quare, quisquis condere medendi methodum ad vnguem parat, huic à primis est indicationibus auspicādum: atq; hinc ad eas, quæ deinceps sunt, trāseundum, rursus q̄ ab his ad proximas: ita q̄ pergenti, nō prius desistendum, quā ipsius compos sit finis. Porro finis propositæ nunc nobis tractationis est, inuenire cuiusque morbi remedia. Quod nam igitur viæ, quæ huc perducit, statuetur principium? Nempe morbi ipsius cognitio, qualis scilicet is natura sit, vt prius est ostensum: quippe, si id, quod curatur, is est, ratio profectō est ab ipso quoq; indicationes esse incipiēdas. Ergo primum, quæ generalis communis q̄ morborum omnium indicatio sit, inuestigandum est: ab hac deinde ad alias speciatim descēdendum. Quippe necesse est omnes morbos vnius eiusdem q̄ participatione morbos appellari, veluti, arbitror, & hominē, & bouē, & canem, & reliquorū singula. Vnum nanq; idem q̄ in omnibus hominibus habetur, cuius gratia omnes eandem appellationē hominis sortimur. Pari modo canibus vnum idem q̄ omnibus inest, cui cogitatione innitimur, cum canem intelligere volumus. Similiter q̄ in omnibus equis vnum idem q̄ inest, propter quod omnes equi dicūtur. In homonymis autem hoc clarius perspicere licet. Nam omnibus quadrupedibus animalibus, quæ latrāt, vnum idem q̄ inest, vtiq; quod & quadrupedia sunt, & latrabilia. At marinis illis rapacibus belluis, quas ipsas quoq; canes appel G lamus, vnum rursus idem q̄ inest, quod terrestribus non est, ita, vt his cum illis in canum natura nullant, nisi tantum nominis, conuenientia. At hominis cum homine, veluti Socratis cum Alcibiade, non nominis modo, verū etiam eorum, quæ iis insunt, societas est: nam & animalia, & bipedes, & pedestres, & rationales, & mortales sunt: deniq; nihil vlli singulariū hominum, quā homo est, inesse deprehendas, quod non & reliquis hominibus insit. Ceterum terrestribus canibus, ab iis, qui sunt marini, multa insunt diuersa, seu corporis spectes formam, seu animi mores. Quippe ille cicur est hominis q̄ amans, hic insidiator & ferus: ille terrestris, hic marinus: ille quadrupes, hic nō: rursus, ille latrabilis, hic ad latrandum minime habilis. At non terrestrium canum hic latrabilis est, ille non: nec rursus hic quadrupes, alter nō quadrupes, sed omnibus iplis vna forma inest, qua canes nominantur. Nec vero substantiis modo id inesse videtur, verum etiam iplis accidētibus, vel vt affectus sunt, vel vt actiones, vel vt passionēs. Verbi gratia, homo inambulans ab homine inambulāte nihil differt secundum ipsam inambulationem, sed nec vstus ab vsto, nec cæsus à cæso, nec albus ab albo, nec niger à nigro: verum in maioris minoris q̄ ratione singuli horum non paruam obtinent differentiam, veluti magis minus uel albus: verum quatenus albus, vnū idem q̄ cum altero albo possidet, ita nimirum, vt, qua homo est, vnū idē que cum alio quoli H bet est hoīe. Et in singulis deniq; significatorū vnū idem oībus inest. Ita igit & ipsum ægrotare, & valere se habēt: illud enim ægrotantibus oībus inest, hoc valentibus, vtiq; vnū idem q̄ vtrūq;. Et, veluti nomine hominis vnū, ita etiā nomine sanitatis vnum significatur. Declarat aut et quotidianus inter nos sermo, q̄, in quibus homonymia non est, in his vnum est, quod significatur. Si enim dicat quispiā vulneratum sibi esse lapide caput, nemini, qui audiat, sermo est obscurus, aut ambiguus, sicut est, cum dicitur deuoratum esse à cane Coriscum. Siquidem à quo cane, statim rogabit auditor, propterea videlicet, q̄ duo sunt canum genera, terrestre alterum, alterū marinum. At non, quo lapide, aut quod caput, rogabit: cum & omnis lapidis, qua lapis est, vna species sit, et omnis capitis, qua caput: canis vero, vt canis, sanē non vna, sicut nec lingue, qua lingua, quando & tibie, & calceamenti, & animantis pars lingua est. Ac, si quem audias ministro iubentē, vt linguam afferat, incertū est, quam linguam dicat: sin ventrem, aut velicam, aut iecur afferre iubeat, non item. Ergo singulis significatis vna certa subiecta res est, non tamen cuiq; vocī vna res subiicitur: interdum enim tantummodo significatur per vocem, nec quicquam subiicitur. Verum de his, quæ ita dicūtur, differere, præsentis propositi nō est. Quibus autem non tantum significatur aliquid, sed etiā res aliqua subiecta est, his quotquot significata fuerint, totidem sunt & rerū idææ.

Ac

* ἀποὺν est in antiquis. i. sine pedibus.

A Ac vocis quidem vnum significantis vna necessario erit & rei species: numero tamen plures has esse licet, sicuti *a*. Eo quod septem esse vocales dicimus: elementa Græcorum idiomate quatuor & viginti, ad communem videlicet omnium speciem, quæ vna est, referentes, non ad particulares, quæ chartis, lignis, membranis, & lapidibus sunt scriptæ: quarum maximus numerus est, nec potius numerari, pene quod in infinitum extensus: nam possunt in toto temporis spatio infinita scribi tum *a*, tum *β*, tum *γ*: eodem modo & reliquarum literarum singulæ. Verum ea in vniuersum quatuor esse & viginti numero dicimus, non particulares intelligentes, sed tantum species, quibus (ut arbitror) ipsa nomina indimus. Quippe non hoc, quod in charta scribitur, *a* dicit: illud, quod in ligno pingitur, non *a* dicitur: immo tum hoc, tum illud: id quod siue describas in terra, siue in lapide: siue scalpas, siue coloribus pingas. Sed nec pueros docet quispiam multa *a*, & *β*, & *γ*, & reliquorum singula, immo quodque horum vnum, simul autem omnia vigintiquatuor. Simili genere, si equum vnum puero indices, aut camelum, ubi alium rursus equum, aut camelum aspexit, non rogat, quod animal id sit, sed illum equum, hunc camelum nominat, atque illum, quem prius, cum hoc, quem nunc cernit, eundem esse dicit, quauis fortassis alter mortuus iam sit, alter (hic videlicet quem cernit) super sit. Iam vinum homines heri hodie quod idem bibisse se dicunt, nempe specie idem: interim tria se vina hodie bibisse narrant, aut etiam vnum, ad speciem ubique respicientes: Præterea quindenae fores vno sigillo obsignatas, ad speciem scilicet in omnibus his sermonem referentes. Adeo quod est euident, ac omnibus natura insitum tum hominibus, tum brutis, ut aliud quid ceu in substantia subiectum, aliud ceu specie vnum intelligant, ut vel asinorum (qui tamen omnium brutorum stupidiissimi videntur) aliud esse specie vnum, aliud numero, notitiam non fugiat. Conspecta namque camelo, asinus se retrahit, & fugit, ac timet, si nunquam antea camelum contempserat. Sin autem videre iam assuevit, quauis aliam aliam quod illi demonstres, tamen propter consuetudinem non amplius timet, sed veluti vnam speciem intuetur & illam, cui insuevit, & hanc, quæ nunc primum apparet. Ad eundem modum nec homines timet propter consuetudinem, sed hos quoque velut vnam speciem videt. Verum, si curatorem inspexit, non solum ut hominem, sed etiam ut hunc hominem agnoscit, & micat auribus, & caudam quatit, & rudis, & lasciuir, cum eum aspexit, utique indicans se familiarem agnoscere. Hunc itaque tum ut hominem, tum ut familiarem nescit: eum autem, quæ primum iam videt, ut hominem similiter, ut familiarem non similiter. Quare non nos modo, verum asini quoque iam aliud ut numero idem tum vident, tum etiam nesciunt, ac meminerunt: aliud ut specie. Ac Dionem curatorem (esto enim ita vocetur) aliter ut hominem, aliter planè, ut curatorem suum agnoscunt vernaculi asini, utique communem eius cum aliis hominibus speciem, ut hominis, capientes: priuatam vero ac secretam, ut Dionis tantum. Ergo tantum abest, ut veteres philosophos laudem, tanquam amplum aliquid magnæque subtilitatis inuenerint, quod idem ac diuersum, vnum ac non vnum, non solum numero, sed etiam specie, sit inaudiedum, ut etiam ipsis asinis hoc inesse natura dicam. Sanè adiciunt veteres philosophi non tantum numero ac specie aliquid idem dici, verum etiam genere. Verum id iam ad rem propositam non desidero. Mihi enim vnicum illud satisfacit, quod ipsis asinis stupidiores ostendi, qui non concedunt aliud specie vnum, aliud numero dici: magis quod his etiam, qui vnum esse phreniticum, & vnum Empiricum dicunt, vnum tamen esse hominem non concedunt: aut qui non intelligunt specie quidè vnum esse hominem, numero non vnum, nec Socratem vnum esse, tum specie, tum numero: phreniticum autem specie esse vnum, multitudine non vnum: cum fieri non possit ut Dion, Socrates, Theon, & Coriscus, pariter, si ita fors tulit, phreniti laborantes, cum quatuor sint, vnus multitudine sint, sed specie vnus, multitudine non vnus. Absurdus autem multo est, quod Empirici dicunt, cum vnum esse Empiricum dicunt, deinde rogati, quomodo vnum dicant eum, qui viuit, cum eo, qui mortuus est, & eum, qui est in Græcia, cum eo, qui est in Ægypto, mirificum responsum afferunt:

D Quatenus, inquiunt, Empiricus est, hætenus etiam vnus est. Hoc enim extremæ stupiditatis est, si adiectis illis /quatenus & hætenus/ nec quæ ipsimet loquuntur, intelligunt. Si enim hætenus Serapion & Menodotus vnus sunt, quæ Empirici sunt, profectò in aliis vnus non erunt: quædo, si omnifariam vnus essent, superuacue, arbitror, ac frustra addita essent illa /quatenus & hætenus/ cum promptum esset simpliciter dicere vnum esse Serapionem & Menodotum: ita nimirum, ut, si de ipso tantum Menodoto loquens, adiectione non egeres, sed absoluto sermone diceres, Menodotus est vnus. Ergo, si vnus absoluto sermone est Menodotus, Serapion autem & Menodotus non absoluto sermone vnus, sed quatenus Empirici, omnino profectò ipsis alia quæpiam inerunt, quibus duo sunt, & non vnus ambo. Efficatur quod hoc illud, quod antiqui philosophi dixerunt, aliud numero & idem & vnum esse, aliud specie: Nec esse mirum, si Menodotus Serapioni in aliquo idè sit atque vnus, in aliquo non idè, neque vnus: quatenus enim Empiricus, idem: quatenus autem hic relimus, ille naso adunco, aut candidus, aut niger, aut magnus, aut paruus, non idem. Nunquid igitur sic est vterque eorum homo, ut vel naso est adunco, vel relimus, an sic, ut Empiricus est: An hoc quoque puer intelligat, quod quæ homo, vnus sunt: quæ hic relimus, ille grypus, non vnus: Num igitur extremi stuporis est, aut pertinaciæ, aut nescio, quo nomine merito appellè, fateri vnum esse phreniticum, quæ phreniticus, simili modo lethargicum, & pleuriticum, hominem vero, quæ homo est,

non

METHODI MEDENDI

non vnum? Præterea Empiricum vnum dicere, quæ est Empiricus: equum vero, ut equus est, non E
vnum? Cum audire liceat Aristotelem, & Theophrastum affirmantes, specie quidem posse alte
rum alteri idem esse, numero vero non idem: atque etiam ante hos illum, qui ipsos huiusmodi si
gnificatorum distinctionem docuit, audire dicentem nihil esse miri vnum esse multa, & multa
vnum. Quippe adeo dilucide omnem hanc disceptationem Plato in principio Philebi absoluit,
ut mihi vel ipsis stupidis videatur esse dilucidus. Asini nanque norunt tum hominem, tum came
lum, tum bouem: præterea hunc hominem quendam, hunc camelum, hunc bouem. Eodem mo
do viam norunt, non tantum absolute ut viam, sed etiam ut hanc aliquam viam. Nam in ingressu
viæ, quam non novit, asinum statue, attende quæ, ut illam perambulet, ac totam peragat, in neutram
partem declinans, nisi sicubi in diuersa scinditur, utique declarans se speciem ipsam viæ meminisse,
& clare agnoscere. Quippe in ambulat eam, quæ trita est: quatenus autem ignorat, fallitur: ne
que enim ex recordatione eius, quæ insectilis, una quæ numero est, hanc, quam non novit, peragere
potest. Manifestum vero est cum hanc viam, qua nunc primum insistit, quatenus via est, ut spe
cie noscentem in ambulare: quatenus vero numero una est, eatenus ignorare, propterea, quod &
nusquam ad non tritam diuertat: & quæ in duas scinditur, nesciat, utra sit eundum. Quod tamen
omnino non ignoraret, si secundo, aut tertio, nunc per hanc ingrederetur. Nam, quoniam alterum F
novit, alterum non novit, propterea videlicet, quod commune viæ speciem cognoscit, propriam
autem huius vel illius ignorat, utique, quatenus novit, non fallitur, quippe qui trita insistit: qua
tenus ignorat, fallitur subinde in triuiis, nescius, quam eligat. Duplicem ergo cognitionem habent
& asini, communium specierum alteram, priuatarum alteram. † In summa, } siue vnam speciem
appellare commune illud velis, siue genus, siue communitatem, si illius hanc, quam ipse nunc in
terpreto, notionem custodias, de nominibus contendes, rem tamen mutare non poteris. Et de no
minum quidem impolitione alius fortasse quispiam tecum contendet, utique qui æque in rerum
contemplatione, ut tu, parum est exercitatus. Ceterum nos saltem non contendemus. Illud po
tius te monebimus meminisse, quod Plato ait: Multa enim vnum esse, & vnum multa. Mirificum
sanè dictum. Nec facile est contendere cum eo, qui horum vtrumlibet statuat: etenim, si hoc ob
serues, non erit, quod contendas, ut nunc contendis, partim ignorantia, partim adductus pertinacia.
Sed, siue quis vnum esse phreniticum dicat, vnum esse consentientes: siue multa, ita quoque con
sentientes: simili modo & Empiricum, & Dogmaticum, & Methodicum: non aliter sanè & medi
cum vnum esse, ac multos dices, vnum quidem, quæ medicum, non vnum vero particulari multi
tudo. Non enim de Empirico loquens, illud / quatenus / adhibebis, de medico loquens id tolles. G
Neque rursus de medico loquens adicies, de homine loquens auferes. Nec phreniticum vnum esse
dices, quæ phreniticus, ægrotantem vero non vnum: siquidem hic quoque, quæ ægrotans est, vnus
est. Dedisse igitur tandem nugæ illas, quibus in aliis libris captiose vtens censes ostendi tibi ipsum
hominem solum, & seorsum à particularibus hominibus: tanquam ipse ostendere possis Empi
ricum citra Menodotum, & Serapionem, & alios particulares Empiricos: aut etiam phreniticum
seorsum à particularibus phreniticis. Vbi igitur est error, unde quæ hæc mutatio, ut asinis adeo ipsis
sint stolidiores? nempe unde in aliis quoque infinitis falluntur. Quippe ubi à notionibus ad re
rum substantias transire tentant, deinde per logicæ contemplationis imperitiam falluntur, utique
subvertentes cum rerum addubitatione etiam ipsas notiones. Siquidem excipit eos hic quæstio
de generibus, & speciebus, quæ non modo homines, qui in logicis methodis non sunt exercitati,
sed etiam, nisi acriter intendant, aliquos ex iis, qui sunt exercitati, potest fallere. Ceterum non oportet
propterea, quod de rerum substantia dubitant, à manifestis recedere notionibus: nec putare consultum
aliquid inuenisse utrosuis, vel Empiricos si vnū dicant, non adiecto, quo significato vnū sit: vel
Methodicos, si pro genere, vel specie, vel comuni, communitatem usurpent. Mihi enim melius vi
sum est notionem ipsam clare iam definita (nempe qua phrenitici sunt, hæc esse omnes vnum: qua ve
H
ro hic iuuenis, ille senex, aut gracilis, aut obesus, aut vir, aut mulier, hæc multos) veteri elocutione
de cetero uti, ac cum Aristotele, Theophrasto, & Platone loquendo periclitari, qui omnia id genus
specie esse vnum dicunt, multitudinem vero non vnum, non phreniticum modo, aut lethargicum,
aut Empiricum, sed etiam Dogmaticum, & Methodicum, & hominem, & equum, & virum, & mulierem,
& reliquorum singula. Quod si ad particularia descenderis, veluti hanc mulierem, quæ indicari digito
potest, hanc sanè non possis specie quidem vnam dicere, multitudinem vero multas. Quippe hæc mu
lier, quæ indicari digito potest, una est utroque modo, & specie, & multitudinem, quod etiam aliter
numero dicere solemus. Hi vero ita non faciunt, sed alij communitates nominant, ceu vero non
magis dubitari de iis, quam generibus & speciebus possit. Alij, quatenus hoc quippiam est, vnū
esse dicunt: quatenus autem non vnum, nequaquam explicant. Etenim par erat hos quoque, quem
admodum ostendunt, quod Menodotus, & Serapio, & Theodas, & Glaucias, & Apollonius, &
Callicles, & Diodorus, & Heraclides, & Lycus, vnus omnes sunt, quæ Empirici: ita rursus,
quemadmodum non vnus omnes, sed multi sunt, exponere. Siquidem in his exponendis alicu
bi planè deprehendissent idem tum vnum, tum multa, non modo esse, sed etiam dici posse. Me
nodotus nanque & Serapio, quæ Empirici sunt, vnus sunt, immo vero & quæ medici, & quæ ho
mines.

† λοιπόν

A mines. Quid vero qua animalia? Nam id quæri ab his operæ precium est. Num hæcenus quoque Menodotus & Serapio vnus sunt? Nam, si id negent, nec nos concedemus, quatenus Empirici sunt, eatenus duos homines esse vnum. Sin concedant hac quoque duos esse vnum, nempe quatenus ambo sunt animalia, protinus illud subiiciemus: Recte igitur ab antiquis philosophis dictum est aliud numero, aliud specie, aliud genere esse, quod tum idem, tum vnum est. Dehinc rursus interrogabimus: Phreniticus Menodotus, phreniticus Serapio, idem ne est, an diuersus? Si respondent eatenus vnum phreniticum esse, vnum quæ & eundem ambo, qua phrenitici rursus percontabimur: Quid autem, qua egrotantes? num hac quoque ambo vnus sunt? Si negent, neque nos illis concedemus, qua phrenitici. Sin annuent, utique rem aliquam ponemus, cuius vna sit species, de qua omnes homines morbi nomen enunciant. Non enim phrenitis res aliqua fuerit, cui vna sit idea, atque eatenus omnes, qui ea sunt affecti, vnum efficiens: morbus autem similiter vnum non faciet eos, quos occupauerit. At nulla est, inquit, ita distincta species, aut animalis, aut morbi, sicut hominis, & phrenitidis. Quid ais improber? An nihil tibi significare videtur hæc voces, animal, & morbus, sed similiter efferri, ut blitry, & scindapsus? An significat quidem, verum nulla res substantat, quæ vocibus respondeat, veluti in Scylla, & Centaurus? an etiam significant, atque id, quod

† Al. vnum & eundem ambo esse.

B significatur, vnum est? Quippe, si nulla sit res, quæ his vocibus animal & morbus indicetur, non recte dicis hominem esse animal, aut phrenitim morbum. Sin est res aliqua, & vere dicis, tum hunc, qui aduenit, animal esse: tum hunc, qui decumbit, egrotare: est utique omnino aliquid eorum, quæ ipsis insunt, de quo vocem utranque enuncias. Verum ad hæc intelligenda, parum es exercitatus, tamen ea ex primis sint, quæ in logicis institutionibus tradantur. Caterum quid hoc ad ipsam veritatem? Non enim profecto ex iis, quæ tu non intelligis, iudicanda veritas est, sed ex iis, quæ quispiam intelligit, qui & natura prudens sit, & ea didicerit, ac exercuerit, nec idem contentiosus sit, sed veritatem amet: quorum nullum in te est, quanquam medius fidius haud scio, an ista, natura prudentem desiderent. Quis enim nescit non idem significare Socratem, ac relimum, sed Socratem totius esse subiectæ substantiæ nomen, reliquorum autem nominum nullum de tota corporis substantia dici, non simum, non ventrosum, non caluum, sed horum aliud figuræ nasi esse nomen, aliud defectus capillorum in capite, aliud magnitudinis esse ventris? Atque hæc sunt, quæ respectu partium dicuntur. At, si candidum aut nigrum Socratem dicam, de omnibus, arbitror, corporis partibus nomina pronunciam, cæterum non totam substantiam, sed vnum ex iis, quæ illi accidunt, indicem, nempe colorem. Quin etiam, si obesum dicam aut gracilem, durum aut mollem, hircum aut glabrum, aut cætera id genus, quæ Socrati accidunt, ne sic quidem de omni eius substantia appellationes affero: sed vnum aliquid eorum, quæ ipsi accidunt, ostendo. Ad eundem modum & sedere ipsum, & inambulare & moveri, & dormire & vigilare, & singula id genus nomina de nulla profecto substantia dicimus: sed aliquid eorum, quæ Socrati insunt, his significamus: quæ nimirum in superioribus vel actiones esse, vel passionem, vel affectum quosdam diximus.

Satius ergo fuerit, nunc quoque sub hac te formula exerceam, quemadmodum etiam in superioribus ostendimus, non à nominibus, sed à rebus orsum. Incipe vero à te ipso primum, aestima quæ simplex ne res sis, an composita: utrum ne pes sis, an nasus, an oculus, an caput. Constat enim nullum te horum esse, sed nec sine his: verum & ex his & ex reliquis partibus vniuersis, quarum singula debitam habeant posituram, totus es compositus. Esto igitur nomen Themiso. At, cum Themisona claudum esse aio, eo, quod dico claudum, pedum affectum significo: Themiso vero totius est nomen. Quin etiam simus cæcus: quæ à parte dicitur Themiso: rufus vero & crassus non à parte, sed ab affectibus, qui toti insunt, non aliter, quam inambulans, sedens, disputans, & viuens. Num igitur intelligis non esse hæc totius substantiæ tuæ signa, sed alia à parte quapiam esse nominata, alia ab vno affectu? Cum vero bonum te iustum, ut quispiam dicit, num etiā propius hanc esse affectuum nomina, qui in animo tuo consistunt? Atqui, si noris, quod hæc ad portionem se habent cum albo & nigro (quippe sicuti ista corporis, ita illa animi affectionum sunt nomina) intelliges, arbitror, & artificem & inertem, {vel si quod nomen artificis est contrarium,} ab animi affectibus esse imposita. Iam, si artifex vnde nomen accepit, scias, scies, arbitror, medicus quoque vnde sit appellatus. At, hunc si, vnde dictus sit, cognor, non est, quod magnopere labores, ut inuenias, cui demum inditum sit nomen Empirici. Sane ipsum, quod à vobis exigo, nec adeo difficile, nec magnum est. Quippe ipsa prædicamenta diuidere logicæ speculationis est initium: cuius esse vos omnino expertes facile declarant ea, quæ temere nugamini. Vel nunc igitur relapscentes, posthac incipite, quæ corpori accidunt, nominare, veluti quod hic albus est & niger, aut certe vehementer calidus adeo, ut ægre ferre calorem possit. Deinde calorem ipsum, qui adeo auctus sit, ut occasione eius corpus laboret, nec probe perfungi actione possit, permittite volenti appellare febrem: siquidem omnes homines eum, qui ita sit calidus, febricitare dicunt. Nec sanè rem magnam facietis nomen mutantes, nisi quod tempus vestrum perdetis. Illud potius vir bone facito: Cum Themisonem febricitare dices, & Dionem febricitare, & multos deinceps ad eum modum febricitantes nominabis, perpende diligenter, nunquid in iis omnibus vnum idem quæ sit ipsum (ut sic dicam) febricitare, an diuersum: inuenies enim vnum esse idem quæ species: multitudi-

ne autem

ne aut, quod est numero dicimus, non vñ. Cum aliter tibi, nec ut respōdeas, fas sit, nec intelligas. **E**rgo, q febricitat, is, quā febricitat, vnus planē est: qñ, & qui delirat, quatenus delirat, ēt est vnus. Quid vero & qui simul febricitat & delirat: nunquid & is vnus est, quā simul & febricitat & delirat? Sanē id neminem latere arbitror. Ponatur igitur ambobus iis vñ nomen, febricitāti, dico, ac delirātī: vocetur q; phreneticus, qui ita laborat. Quod si nō intelligis, quemadmodum ambobus vñ nomen sit positum, admonebo te fortasse nominum, quā ipse vñ usurpas. Quippe equum aliquid appellas, nempe animal (ut ita dicam) hinnibile, siue quod ad hinnitū sit habile: an igitur interesse censes, equum dicas, an animal, quod ad hinniendum sit habile? Ego sanē non cenleo. Atqui, si id ita est, ambobus illis nominibus, & animali, & hinnibili, quō vñq; breuior eēt sermo, equum indidisti. Ad hunc etiam modum, si, quod pedestre & bipes animal sit, pro tribus nominibus vno interpretari velis, hominē vocabis. Et sanē solutio cuiusq; nominis in suā orationem, ad eum modum absoluitur. Quin etiam, ut conicias componas q; orationem in vñ nomen, non aliter, quā iam dicto fit modo: cum videlicet & simplicium cuiusq; notionē secūdam ipsius nomen tenes, & simul ex duobus simplicibus rursus alteram notionem efficere compositam potes: mox illi nomen imponere: subinde rursus ipsi cōpositā alio simplici adiecto, vbi ex tribus iam simplicibus vñam notionem feceris, huic quoq; nomen aliquod imponere. Quomodo, in- **F**quies, & qua ratione id? siquidem non grauabor exercendo eos, qui relipiscere a diuturna ista ignorātia non recusant, longius progredi. Calor, simplicis rei nomen est. Præterea actionis lesio, simplex quædam res est. At tantus calor, quantus iam actioni officiat, non etiam simplex res est. Quod si etiā totum vexet corpus, multo profectō minus iam simplex est. Ergo, quō minus multis vtantur homines, ad compendium alioqui natura procliuēs, eiusmodi calorem febrem vocant. Quippe expeditius dictū est febricitare Dionem, q; tantū in toto corpore caloris habere, ut multas functiones corrumpat. Ergo, cū affectum ipsum significare volunt, febrem: cum vero cū, qui affectu laborat, ab affectu ipso nomen declinant, vocant q; febricitantem, ad eum modum, quo a candore cādidum, & a nigrore nigrum. Itaq; cōpositā rei nomen febris est, atq; hoc etiam magis febricitans. Simplex autem est delirium: verum, si simplex hoc cum cōposito copules, homo ipse phreneticus, affectus phrenitis nominatur: Quēadmodū & homo ipse, ne animal rationale mortale dicamus, breuitatis causa homo est nominatus, ipso hominis vocabulo orationis vim quandam comprehendente. Atq; id est, quod veteres philosophi orationem nominis dicere appellāt. Ceterū non ducunt in infinitū, sed vsq; ad simplicia subeunt. Nam, cum hominem in animal & rationale & mortale solueris, postea ipsum animal solues in substantiam sentilem: at non ipsam **G** substantiam amplius soluere poteris, nec etiam sentile: quippe simplex primum que est horum vtrunq;. Quo fit, ut mihi mirari subeat de iis, qui phreniticum & hominem esse concedunt: morbum vero & animal esse non concedunt: quippe quod perinde est, ac si cōposita esse des, de simplicibus dubites, quasi non priora cōpositis natura simplicia sint. At non vidi (inquit) ipsum per se animal. Sed nec hominē infulse vidisti, & tamen te ipsum ais hominem esse. An illud fateberis, animal autem esse te non fateberis? Nusquam (inquit) vidi per se morbum. Sed nec phrenitimi vnquam solam vidisti, sed in Theone, aut Dione, aut alio quopiā homine. Quare hoc planē puerile est, eo, quod nusquam morbum ipsum per se solum videris, idcirco putare morbum nō esse: quippe ita nec febrem, nec phrenitimi, nec aliud quippiā id genus esse dabis, ut quorum nullum vsquam ipsum per se solum videris. Sanē expediebat potius non ita, sed, ut dictum supra est, a rebus ipsis coepisse, cogitatione q; ipsa spectasse, quot essent in totum simplicia: mox proprio nomine cuiq; imposito, ex ipsis iam composita necere. Ergo subiecto corpori vñ hoc primū insit, quod sentit. Num, cui id inest, animal nō appellabis? Non, inquires. Atqui de nomine hoc pacto hēsitabis. Sed nec sentile corpus esse cōcedes: iam ita de rebus ipsis falsō opinaberis. At, si & corpus aliquid sentile esse, & nomen hoc animal de eiusmodi corpore dici concedes, audebis postea **H** dicere animal nihil esse? Ergo nec album aliquid erit, nec inambulans, nec currens: quippe ab iis, quā ipsi accidunt, dicitur corpus album, inambulans, & currens: ipsorum vero accidentium hoc albedo, illud inambulatio, tertium cursus dicitur. Eodem modo sensus, vñ quid est ex iis, quā corporibus accidunt: sentiēs vero ipsum est corpus: hoc vero etiam animal nominatur. Quis igitur, vbi sentiēs corpus aspexit, omisso hoc nomine, animal, aliud quærat, quod de eo dicat? Num corpus duntaxat intelligitur, tanquā Centaurus, an res quoq; aliqua huic appellationi est subiecta? Patet proculdubio esse subiectā aliquam. Age quid sensus? intelligitur ne tantū, an aliquid est eorum, quā corpori insunt? Mihi vero etiam id clarum esse videtur, nempe sensum vñ esse ex iis, quā corpori insunt. Atqui, si neq; corpus tantummodo intelligitur, sed etiam subsistit: nec etiam sensus, immo is quoq; subsistit: qui fiet, ut ambo coniuncta compositum efficiant nō ens? Nam id iam perridiculum sit, corpus quidem esse ac sensum, nihil tamen esse sentiē corpus: sicut illud magis ridiculum, sentiē quidē corpus esse, animal autem nihil esse, ceu aliud quiddam animal sit, & non hoc: aut quicquam intersit, oratione, an nomine indicare aliquid velis. Æque absurdum sit & morbum negare aliquid esse. Quippe, si affectus nihil sit, morbus quoque nihil erit: sin affectus aliquid esse detur, vñq; & morbus aliquid fuerit. Quicumque enim affectus fun- **ctioni**

A ctioni officit, is est morbus. At non potes (inquiunt) ostēdere mihi, ipsum per se morbum. Immo nec phrenitum vir bone, nec febrem: quæ tamen & ipsa esse fateris, sicuti multa alia. Nam micrologiam nominum, quam philosophi quidam scite sunt commenti, sed quæ omnem in vita loquendi consuetudinem subuertit sic, ut ne ipsi quidem in suis ipsorum operibus ea uti possint, impresentiarum omitto, ut qui & alibi de ipsis distulius egerim: & in opere de elementis, quæcūq; sunt necessaria dixerim. Intelligo autem micrologiā, qua diuidunt in genera, græca illa τὸ ἐν, τὸ ὑπάρχον, & τὸ ὑπερσῆς, & latine ens, & subliisēs, siue subltās dixeris, } quippe, quæ translatiue nobis tū hic, tum in sequentibus, & latine } ponentur. Vt autem omnes in omnibus refutem, fieri omnino non potest. Sed enim, quod nō modo propria morbi notio sit, sed etiam res aliqua subiecta, quæ hanc appellationē sit sortita, satisfaciant ad præsens, quæ hæcenus sunt dicta: clarius autē idem ipsum in progreſſu sermonis intelligetur, ubi de primis indicationibus absoluta disputatio erit. Quæcūq; vero nunc dicta de morbo sunt, ea mihi & de symptomate & passione esse dicta censeo: præterea sanitate, & pāritate, & robore, & potentia, omnibus q; aliis, quorum nomina & notationes de rebus quibusdam subiectis sunt dicta. Omnia nanq; hæc corporibus insunt, partim ut affectus, partim ut actiones, partim ut passionēs: præterea quædā ceu naturaliter insunt, quædam B ceu præter naturam. Indicatio quoque ex singulis eorum seorsum præbetur, à plurimis tamen medicorum prætermiſſa.

* ἀδυσκίτως.
in nullo autēq;

* ἀπρίστως

GALENI METHODI MEDENDI ID EST DE MORBIS CVRANDIS LIBER TERTIVS

ARGVMENTVM LIBRI

Docet, qua via, ac ratione Vlcera curanda sint, quæcunque maligna non sunt.

Prima fundamenta methodi, qua Vnitatis solutio curanda est.

CAP. I.



Igitur Hiero, indicatio, quæ ab ipsa rei natura primū oritur, quod agendū sit, inuenit, necesse est remediōrū inueniendōrū initium ex morborū ipsorum natura sumi: siquidē absurdum sit aliud esse, quod curandi rationē præscribat, aliud, quod curet: etenim indicare de se quidque magis potest, q̄ de alio. Hoc autē clarius fiet in sequentibus. Verum, qm̄ omnibus in confesso est primas indicationes ex affectibus esse sumendas, certe laborandū pluribus frustra nō est, ut hinc esse incipiendū doceā. Illud potius monstrare tentemus, neq; totū hoc esse, nec prorsus magnā aliquam partē, veluti Methodi putant, sed minimā, & tantū initiū.

* ἀποχρεδίζω.
var. l. verrucas
peniles.

Igitur iidem ipsi aiunt calculum, qui in vesica sit, propterea, quod toto genere præter naturā sit, ablationē sui indicare. Ad eundē modū verrucas, & myrmecias, & atheromata, & steatomata, & meliceridas, & alia id genus. At intestinū, quod iā in scrotum decidit, omnia q; quæ luxata sunt, q̄ videlicet loco ipso præter naturā se habent, reponēda se in suum locū docent. Atqui tantū abest, ut horum quippiam artificij cuiusquā sit, ut etiam priuatorū cuiq; patere possit: quippe qui membrum, quod luxatū sentiunt, reduci in artus iubent: præterea verrucam tolli, & vlcus ad cicatricem duci, & aluum fluentē lisi. Verum, quibus hæc rationibus fiant, id sanē nesciunt: atq; id est, quod adici a medico debet. Itaq; indicatio, quæ a morbis sumitur, principiū tantū est, & (ut sic dicam) carcer, unde medendi ratio promouet, nulla prorsus D ipsius medicinæ artis adhuc portio, aut certe nec magna nec propria, sed quæ etiam plebi sit communis. Ergo, cui facultas est illa inueniēdi, ex quibus perfici possit, quod a prima indicatione suggeritur, is merito morborum est curator. Qui si per experientiam inuenit, obseruator & empiricus est nominandus: sin ratione quadam & methodo, logicus, & methodicus, & dogmaticus. Ergo plebeius quidem (altius enim idem repetendum est) medicum adit, reponi sibi membrum iubens: aut os, quod forte fractum est, formari atq; componi: aut melicerida sibi tolli: verum, quo pacto horum quodq; peragatur, id sanē inuenire medicæ artis est munus. Ac Empirici quidem per experientia inueniri omnia contendunt: Nos partim experientia, partim ratione, cum neq; illa inuenire omnia queat, neque sola ratio. Veruntamen confusam mistam que tradendam esse doctrinam non censemus, sed seorsum empiricam, & seorsum logicam, quò facile appareat, quā habeat vtraq; vim. Nunc vero de ea, quæ ratione paritur, inuentione dicere statuimus. Num igitur est nobis methodus aliqua, qua vsus inuenire prædictorum singula liceat: dico, quod superuacaneum genere sit, adimere: & quod motū loco sit, id proprio loco reddere: & quod vnitatis solutum sit, ut sit: an empiricē ad hæc requiremus? Ego sanē methodum esse aliquam, qua quæſta inueniatur planē mihi persuasi: eius q; principium esse id, quod singuli morbi faciendum dicunt. Vnitatis nanq; solutio vnitionem postulat. Ea in osse fractura dicitur, græce Catagma: in carnosafate

METHODI MEDENDI

sa parte vlcus: sicuti etiam vulnus, & ruptio, quod Rhegma: & conuulsio, quod Spasma dicitur: E. Vulnus quidem solutio quedam ex vulnerando in carnosâ parte relicta: Ruptio, & conuulsio ci- tra vulnerationem facta. Prior enim carnosâ partis diuisio est, posterior nervosa. His omnibus vnio molienda indicatur. Quâ an præstari vbiq; possit, an in multis non possit, hoc vtiq; inter- noscere primum iam artificis est. Quippe nemo plebeius nouit nec nervosam transuerli septi par- tem, nec intestina tenuia non posse, quem indicat, finem recipere. Sed & de preputio, & de tenui buccarum parte, quod similiter se habet, idem ignorat. Præterea an caries in osse, quæ Terebon- græce dicitur, sanari queat, sicut erosio in carne, compertum nō habet. Iam, an coalescere fractura possit, veluti vulnus, præterea an callo agglutinari possit, non intelligit. Pari modo in capitis fra- cturis vulgus omnino non nouit, sit ne expectanda calli generatio, an aliter curandū. Porro mul- to adhuc magis ignorat, an corde vulnerato, aut pulmone, aut ventriculo, aut iecinore, fiducia sa- nationis sit. Nec in summa quicquam vltra primam indicationem vulgaris quisquā nouit. Itaq; hoc ipsum primum artis est opus, vt intelligas, sperare ne t id, quod tendis } debeas, an secus. Eius rei duplex cognitio est, nec potest addi tertia, Altera per experiētiā, cui longo vsu est opus. Altera per ipsius rei naturam: siquidem hæc tum cuiusq; particulæ substantiam æstimabit, tum actionem, tum vsum, situm q; . A quibus procedens, non solum, quod sanari non potest, præuide- bit, sed etiam de inueniendis ei remediis deliberabit, quod recipere sanitatem potest.

* σκοπὸν, & vbiq; disto- ne hanc aut ri- sco notat vide- ris, scopos gre- ce legatur.

† τὸ τέλος.

De inuentione Remediorum, quæ Cauum Vlcus carne implent.

CAP. 2.

Constat autem, quoddā à simplicissimis incipiet. Porro nihil est simplicius vlcere, quod in sum- ma carnosâ parte sit. Huius ergo, si quidem vlcus tantum sit, curationis scopus vnio est. Sin etiam cum cauitate sit, duplex eius propositus est finis, sicuti etiam duplex est affectus, nem- pe vlcus, quod est vnitis solutio: & cauitas, quæ ex amissa aliqua animalis propria substantia est contracta. In quo genere sæpe fieri non potest, vt alterius propositorum finium sis compos: ve- luti si non modo caro ipsa, sed etiam subditum illi os perierit: quippe impleri ad vnguem caui- tas eiusmodi non potest, cicatrice induci certe potest: sed hæc vlcus sanatio est, cauitas autem in- sanabilis remanebit. Hoc igitur ipsum aut per experientiam, aut rationis ope, dignosci omnino oportebit. At Thessalus nec his vitur, nec tertium quicquam adiecit: & tamen nugari non eru- bescit. Sed id mittamus. Illud potius doceat imitator Thessali medicus, quo pacto cauum in car- niosa parte vlcus nullo ex iis, quæ subsunt, leso sanabimus. Sarcotico (inquit) medicamento, id est quod carne impleat, imposito. Bene sanè, magna facilitas: fortasse autem stupiditas potius erat di- cendum, si, cum sarcotico dixit, satisfacisse se quæstioni putat: quippe, si sarcotico iam scimus, Quid amplius requirimus? Dic nobis, quod illud sarcotico sit, quo es vsurus? Thus, reor, in- quies, aut irim, aut aristolochiam, aut erui farinam, aut panacem: nam de siccis medicamentis principio mentionem faciam. Age igitur, hæc medicamenta quo pacto inuenisti? Experientia, inquis. Quid igitur est, quod per te amplius est adiectum? Siquidem, quod cauum implendum sit, id quidem vel priuatus nouit: at, ex quibus id, & per quæ medicamenta fiat, experientia do- cuit. Thessalus vero nec vt empiricus, nec vt logicus, medicamentum illud nouit: vt empiricus, quia videlicet non vult: vt logicus, quia non potest: nam ego eum vt empiricum id scire planè noui. Cum enim duo sint omnis inuentionis instrumenta, nempe experiētia & ratio, qui, quod inuentum est, nouit, sed tamen rationem eius dicere {in promptu} non habet, is prodit se per experientiam id inuenisse. Vt igitur, quantum erret, intelligat, aurum nobis operam paulisper accommodet. Volo enim paucis cum solius experientie professore agere. Etenim hunc quoque dicere par est, quo pacto siccum hoc, quod carnem producat, medicamentum inuenierit: quod utique Cephalicon nominant. Porro componitur id ex iride, & aristolochia, & eruo, & thure, & manna, {id est purgamento thuris.} Est autem & aliud, quod præter iam dicta corticem pana- cis recipit: sicuti etiam aliud, cui elota cadmia admiscetur. Dicit itaq; mihi, hæc quomodo sint in-

A† Addendum ex codicib; gre- cis impressis & manuscriptis, in cōgressu ve- ro (id est κατὰ σύμβασιν, sic enim ipsi hoc verbo vocāt, in- reum quidē ex insonnis & c.

B* ἐπιτογισ- κος.

C ἐπιτογισ- μόν.

D† In aliquibus artibus hæc nō leguntur.

E† οὐ κακὸς in nō male, ē in aliquid, quib; dā.

uentia. Et quid (inquit) attinet de inuentione eorum quærere, ac non recte potius inuentis vti? Atque hæc quidē initio statim respondent: *† post vero interim ex somnijs inuenta esse potuis- se talia dicūt: } interim forte quapiā aliud fuisse in aliud effusum: mox aliquem vti misto ausum, cæterum audacie eius spem non dicunt. Hæc igitur manifestæ sunt nugæ. Tertius his inuenien- di modus planè est^b rationalis. Siquidem simplicium illorum priuatim quispiam vnumquodq; vt sarcotico expertus, mox carnem aliquando non facere cernens, ratione deprehendit non omni naturæ eorum quodq; competere. Si enim, cui aristolochia vlcus carne non impleuit, huic thus contulit: cui autem thus non profuit, huic iris admota, fuit utilis: rationabile erat (arbitror) non omnes ab omnibus similiter affici. Hoc vbi semel in^c ratiōcinationem venit, optimū factū est visum quā plurima eiusdem speciei in idē miscere, quo nulli corporis naturæ deesset, quod conueniat. ^d† Atqui amice in commistis speciebus non seruatur actio suæ cuiusq; substantiæ, sic, vt in vnaquaque corporis specie adlit, quod morbo curando conueniat. } Nam, si aut corpo- ris naturam inuenire possent, aut adhibiti medicamenti vim, non esset fortasse iis tali varietate opus, vt quibus vnum illud medicamentum, quod vni corpori conueniret, inuenire in promptu semper esset. Nunc, cū ignorant vtrumq;, *† parū recte } omnia miscant: vnum scilicet, quod om- nibus

A nibus naturis quadret, moliri medicamentum studentes. Hanc ego componendorum medicamentorum rationem primis illis medicis excogitatā arbitror, atq; vt antiquū inuentum recipio. Ceterum tñ eam à vera medicinali methodo abelle reor, quanto certe rationabilior est trā fulis in se mutuo cribris. Quippe nisi illud primum cogitet, solius se compositionis, quę ex similibus specie medicamentis conflatur, non eius, quę ex contrarijs initur, methodū dixisse: mox in eius miscellæ multitudine vnum fortasse esse medicamentum, quod laboranti sit vtile, fortasse vero nec vnum: contra septem octo'ue, quę ex vsu nō sint, ita vt pluribus numeris oblit eiufmodi medicamentum, q̄; prolit: hæc, inquā, nisi reputet, plus cum ignorare de re ipsa, q̄; nouille dixerim. Oleum nanq; cauo vñlneri infusum, aduersissimum omnium medicamentum est, cum si ita mēderi velis, vsu ipso intelliges sordidum ac male olens vlcus fieri. Quod si tempus quoq; anni calidius sit, ac vitio mali succi homo labore, aut fluxionibus obnoxius natura sit, aut etiam in victus ratione delinquat, timor est, ne illi pars ea computrescat, in qua vlcus est factum. Timor vero est, & si cera, siue sola, siue in oleo soluta vtare. Atq; hæc quidem putreficere vlcus facient. At, si æruginem ad leuorem tunfam insperges, ea quidem nullo modo putrefaciet: dolorem tñ ac mordicationem inferet non paruam: præterea exedet, ac phlegmonem excitabit: quod si largius vtare,

* Αἰετὸν κενεῖν, ἰνυεῖν.

* vlceri.

li. 4. f. 4. r. 3. B conuulsionem quoq; accerset. Quoniam igitur neq; oleum, neq; ærugo, neq; cera cauum vlcus implere carne potest, constat, q̄; ex iis, qui experientiam profitentur, nemo vñquam ea miscebit. At ego sanè hæc miscebo, immo debita mensura non hæc modo, verum etiam alia mille pharmaca ex iis, quę cauo vlceri sunt inimica. Quippe si non iisdem facultatibus lædunt, sed quodā modo contrariis, imparia quidem immodica q̄; profectō fuerint, vt ad cauum vlcus implendum. Verū, quemadmodum ex duobus temperamentis immodicis vnum efficiatur modicum, id in medicamentorum componendorum rationibus docuimus. Non est igitur difficile ex oleo, cera, & æruginē medicamentum, quod carnem producat, conficere. Si enim noris eiufmodi vlcus mediocriter siccandum esse, nō siccare autem nec ceram nec oleum, vtiq; intelliges nec alterum seorsum, nec ambo simul cauum vlcus implere posse: immo vero nec æruginem solam, vt quę immodice siccet. Ergo, si omnia miscueris, modice siccum efficere medicamentū poteris. Quis vero cuiusq; esse modus debeat, id mihi in libris, qui de medicamentorum compositione sunt inscripti, iam traditum est: nunc quoq; si res postulet, indicabitur in sermonis progressu. Nam primum omnium abigendus mihi à sequentibus libris amethodus iste Thessalus est, sed indicato prius illi, quantum à recto aberret. Nam prudenti, vel quę nunc dicta sunt, satis ostenderint, qualis esse debeat mēdendi methodus. Verum non est cum talibus sermo. Itaq; etiam necesse est, cum istis adhuc disputemus, hinc sumpto initio. Omnis, quę præter naturam est, cautitas impleri postulat: quare & quę in carnosa etiam accidit parte. Ipsa vero impletio, inueniendorum remediorum finis, quod tenditur, est. Vt vero, quę impleat, inuenias, & multa ratione opus est, & multiplici particulatim indicatione, & methodo rationali exacta. Etenim sæpe vidisti difficilia sanatu vlcera curare nequiuisse nec eos, qui experientiam profitentur, istos inquā, qui remediis scatent: nec etiam eos, qui rationem sibi vindicant, omnes. Quippe Thessalij isti, quos Methodicos nominant, sunt autē re; vera à methodo alieni, tanquā asini ad lyram, ne ad audiendam quidem eiufmodi speculationem sunt idonei, nedum, quod rectum est, ratione inueniant. Vidisti autem subinde in eiufmodi vlceribus Empiricos quidem aliās se ad aliud medicamentum transferre, cum nulla profectō ratio transitum ipsum monstraret: verū, quoniā multa sunt experti, quę cauum vlcus impleant, ipsam vero, vt iidem vocāt, idiosyncrasiam, id est, corporum proprietatem, in qua singula eorum pollere sunt visa, nec dignoscere nec meminisse possunt, ideo nunc quoq; ad quod transferant, non intelligentes, sed sperantes in multis particularibus experiendis, obiter, quod conueniat, omnino inuentum iri, aliās ad aliud transiliunt, fortunæ potius, quā rationi eius, quod conducatur,

* μέτρον.

* ἀναλογισμὸν.

* λογισμὸν.

* λογισμὸν.

Dinuentione permiffa. Similes his sunt, tamen id nolunt, & qui ex Dogmaticis ad naturalia corporum principia subire ratione non valuerunt. Quippe hi (vt ante ostēdimus) ex dimidio Dogmatici sunt †. De istis vero amethodis Thessaliis, quid etiam loquar? Soli igitur ij, qui vera methodo curant, tum singulis id genus vlceribus idonea medicamenta & victum aptum inueniūt, tum liquidissime rebus ipsis ostendunt, quantum perere conducatur, quantum quę ad medendum lumen præstet ipsa de natura tractatio. Etenim prætermitti negligi q̄; aliquādo, quod vtile sit, is, qui ab alio pharmaco ad aliud assidue transeunt, non semel tibi ostendi, vno aliquo ex medicamentis, quibus illi fuerant vsi, eiufmodi vlceribus sanatis. Spreta vero eiufmodi medicamenti facultas ab iis merito est, quod uidelicet & propter intempestiuum usum nō solum non prodelle, sed etiā obesse est visum, & quod in primo usu nihil aliquando, quod esset euident, effecit. Vidisti porro non minus oculorum nos grauissimos dolores sanare aut balneo, aut vini potione, aut fomentis, aut sanguinis missione, aut purgatione, quibus nihil aliud adhibet medicorum vulgus, q̄; medicamenta hæc, quę ex opio & mandragora & hyoscyamo fiunt, maximam planè oculorum perniciem: utpote quā nulla re alia sublata ad præfens doloris speciem præstant, quā q̄; ipsum sensum enecant. Multos q; nosti ab eiufmodi medicamentorum usu, cum liberalius fuissent admodum, nunquam postea naturalem statum recepisse, sed ex his principio quidem obscure atque ægre

† Impressi codices græci hæc addunt: qui ne prima quidem elementa potuerūt assequi, quę tñ in antiquo habentur, & superflua eē videtur.

* Αἰετὸν κενεῖν, ἰνυεῖν, id est oblitescere.

Septima Classis.

cccccc

uidille,

METHODI MEDENDI

6 Aph. 31. Ex.
ord. 49. c.

† τῶν καλῶν.

vidisse, tempore vero suffusione, quam hypochysin vocant: vel pupillę nimia dilatatione, quam E mydriasin appellant: vel tabe: vel corrugatione, quam rhetidolin vocant, occupatos. Noliti pro-
fecto non minus & illud, cum ab ephebis vsq; mecum sis versatus, nec sub vilo me vsquam præ-
ceptore vidisse eiusmodi opus, sed id per me ratione excogitasse, & q̃ longo tēpore aphorismum
illum, || Dolores oculorum meri potio, vel balneum, vel fomentum, vel vena incisa, vel purgatio
tollit, considerauerim: quam q̃ ex reliqua Hippocratis diligentia sperarim ne in hoc quidem vel
falsum quippiam, vel quod fieri non possit, præcipi: id q̃ fuisse, quod me ad inquisitionem incita-
uit, quoad ipsa Hippocratis insistentis via inueni, quo pacto discernerem, quando, quomodo q̃ di-
ctorum quoq; sit vtendum. Qua ratione multis, qui talia viderūt, manifestum feci, quanta medi-
cinalis methodi vis sit: quanti q̃ mali occasio fuerint, qui non seruata veteri medicina, nouas se-
ctas condiderint. Itaq; & vos præterea me, quanq̃ a principio recusantem, orando tamen impu-
listis, vt omne hoc opus tractandum susceperem: quod, Deos precor, aliis quoq; hominibus alicui
sit vsui. Certe minimā spem habeo propter eum, qui nunc regnat, ἰβοναρῦ artium } contemptū,
diuitiarum vero, exiltimationis, & ciuilibus potētiae admirationem: ad quæ quisquis se conuertit,
is nulla in re veritatē inuenire poterit. Verum hæc, prout Deo placebit, ita finientur. At nos me-
dendi methodum, quæ veteribus quidem exculta est, nunc vero neglecta iacet, pro virili restitue-
mus, repetita nimirum, quam de cauo vlcere inchoauimus, disputatione. Ac de prima quidē in-
uentione eorum, quæ eiusmodi vlcus carne impleant, satisfaciant, quæ paulo ante diximus: con-
cedamus q̃, si libet, Empiricis, quæ dicunt omnia. At de inuentorum vsu & sæpe tibi in ipsis re-
bus ostendi, & nunc nihilo minus ratione demonstrare conabor, quemadmodum Empirici, vbi
solenne cuiq; medicamentum nihil profecit, apte ad aliud, certa q̃ ratione transire nesciant. Atq;
id iure accidit: siquidem, cum causam improperi successus prioris medicamēti ignorēt, nec, quod
eam in secundo declinent, habent. Quippe, cum causam ignorent, cur munere suo medicina fun-
gatur, nec, cur fallat, intelligere valent. Hoc vero ignorato, neque ad aliud transire rationabiliter
possunt, quando nec in illo vitare eandem causam possunt.

Qua Methodo Vlcus Cauum curari debeat.

CAP. 3.

• λογισμοῖς.

Agedum igitur ipsi iam Hippocraticam veram q̃ caui vlceris sanandi methodū tradamus.
Porro hanc ab ipsa rei substantia ordiri oportet. Itaq; quoniam in cauo vlcere id nobis pro-
ponitur, ut caro, quæ periit, restituatur, scire licet generandæ carnis materiam, sanguinem bonū
esse: opificem (vt ita dicam) authorem q̃, naturā. Verum non satis est naturā simpliciter dixisse,
nisi etiam, quorum natura, sit adiectum, & vbi. Constat autē, q̃ subiectorum corporum, quibus G
superinduci caro debet, natura ipsa gignēde carnis opifex est. Porro cuiusq; corporis natura mon-
strata est ex calidi, frigidi, humidi, ac ticcī temperatura consistere. Quare manifestum est iustum
horum temperamentum in subiectis particulis, quibus restitutori deficientem carnem sumus,
opificis habere rationem. Ac primum quidem in omni cauo ulcere duo illa consideranda no-
bis sunt, Et quod subiectum est, iusta ne temperie sit, id est an secundum naturam se habeat: quip-
pe monstratum est sanitatem in similibus corporibus, ipsarum quatuor qualitatum esse iustam
temperiem: Et præterea sanguis, qui affluit, bonus ne, ac mediocris sit. Si igitur horum alteru-
trum vitiosum sit, multi sanē affectus præter naturam existunt. Nobis tamen una cavitās in car-
nosa parte proponitur. Fingamus igitur & sanam esse partem, & sanguinis confluxum circa ul-
lum vel in qualitate vel quantitate vitium. Porro his ita se habentibus, nihil est præterea, quod
obstet, quod minus prima carnis generatio prospere contingat, id q̃ nullius externi medicamēti
ope. Quippe causis ambabus, unde nascit, præsentibus, nullo q̃ extrinsecus, quod impediāt, ob-
stante, non potest prohiberi carnis generatio. Verum in ipsa primæ carnis generatione duplex
prouenire excrementū necesse est, veluti etiam in commentarijs de natura docuimus, q̃ omnem
qualitatis alimenti mutationem alterum crassius, alterum tenuius, excrementum sequitur. His H
excrementis etiam per uniuersum corpus semper prouenientibus, quod tenuius est, ipsa inuisi-
bilis est perspiratio. Quæ etiam subinde fit uisibilis, quoties uel naturalis calor languet: uel nutri-
mento utitur, q̃ iustū sit, ampliore: uel motus quispiam uehementior animali contingit. Alterū
est sordes, quæ in summo corpore nostro colligitur. Quin etiam in ulceribus tenuius excremen-
tum sanies, (græce ichor) appellatur: quod crassum est, sordes. Ac ex tenui quidem excremento
ulcus humidum redditur, ex crasso sordidum: eo q̃ duplicibus medicamētis eget, utiq; ut humi-
dum est, siccantibus: ut sordidum, quæ ipsum expurgent. Ergo, cum nullo unq̃ tempore natura
cesset, certe nec tempus ullum erit, in quo non ambo hæc in cauo ulcere colligentur. Quare nec
tempus ullum erit, in quo non utrunq; medicamentorum genus desiderabit, utique & quod sic-
cet, & quod expurget. Ac, cuiusmodi quidem genere esse medicamentū debeat, inuentum iam
est. Verum non est id satis. Siquidem specie aliqua inuenta est opus, quæ sit ulceri admouenda.
Hæc igitur quomodo & qua methodo inuenietur? Nempe ea, quæ in libris de simplicium medi-
camentorum uiribus est tradita. Ostendimus nanque in iis quædam medicamenta siccare, quæ-
dam humectare, quædam refrigerare, quædam calfacere: non nulla per coniugationem vel cal-
facere & siccare, uel frigefacere & humectare, uel calfacere & humectare, uel refrigerare & sic-
care:

A. lib. 4. f. 1.
C. I. 471. 2

Acare: esse q̄ in singulis eorum maioris minoris q̄ rationem multitudine sanè infinitam, cæterum ad vsum medicinale limitibus, qui facile comprehendantur, circumscriptionem, primo quodam in his, & secundo, & tertio, & quarto statuto ordine gradu ue. Cuius igitur ordinis erit medicamentum, quod carni producendæ sit aptum: quod q̄ modice tum siccare debere, tum detergere proposuimus: Certe primi ordinis. Quippe, quod super hunc fuerit ita, vt non modo humoris, qui influit, redundantiam consumat, sed etiam affluentem sanguinem ipsum populetur, id reici carnem, ceu materiam eius absumens, prohibebit. Porro talia esse ostensum est thus & hordeaceam, & fabaceam, & erui farinam, & irim, & aristolochiam, & cadmiā, & panacem, & pompholygē. Omnia vero hæc tum maioris minoris q̄ discrimine inter se dissidere, tum alia eorum simplices qualitates vincentes habere, alia cōpositas, monstratum est. Siquidem aristolochia & panax tum cæteris plus siccant, tum natura magis calent. Hordeacea fabarum q̄ farina multo his minus siccant, nec vllum calorem obtinent. Thus vero moderate calet, minus tamen illis siccant, adeo, vt quasdam corporum naturas omnino non siccet. Erui farina, & iris, horum atque aristolochiæ & panacis medium locum tenent. Verum, quod sermo noster vtiliter attigit, denuo repetamus. Quippe thus in humida corporis natura carnem producere potest, in sicca nō potest. Scire nanq̄

* δύσμεν. i.
facultates.

B licet duas esse primarum indicationum differentias, quod secundum naturam se habet, custodiā sui indicante, & propterea, quæ similia sui sint, postulante: quod præter naturam est, sublationem sui, eo q̄ contraria, requirente. Perit enim quidq̄ in contrariū, & à contrario. Atq̄ vlcus quidem quod est humidius, eo sanè medicamēto, quod magis siccet, indiget. Corporis vero natura quanto est humidior, tanto quod minus siccet, medicamētum postulat. Quare, si qua sunt vlcera, quibus par est humiditas, quod in sicciore corporis temperamento consistit, vtq̄ magis siccari postulat: quod in humidior, hoc sanè minus, quod natura naturæ interest: siquidem productam carnem ei, quæ ante erat, similem esse oportet. Vbi igitur pristina sicciior fuit, nouellam quoq̄ sicciorem fieri conueniet: quare vberius hæc siccari, quanto q̄ magis sicca fuerit, tanto, quod admouetur medicamentum, magis siccam facultatem habere debet. At in humidior natura tanto rursus iis, quæ minus siccant, medicamentis est opus, quanto caro ipsa minus est sicca. Thus igitur, vt ad humani corporis naturam, eiusmodi obtinet temperamentum, quod cum temperatis & mediis naturis consentit, humidiores autē paulo liberalius siccant: sicuti rursus iis, quæ ad summum sunt sicce, paulo est humidius. Merito itaq̄ thus in quibusdam tum vlceribus, tum naturis pus quidē mouet, carnem non producit: in quibusdam etiam carnem producit. Itaq̄ si obseruaueris, ratio-

C ni respondere euenta deprehendes. In humidior nanq̄ natura producere carnē potest, in sicciore nō potest. Præterea in modice humidis vlceribus carnem efficere potest: in iis, quæ præhumida sunt, prorsus non potest. Vides ne igitur clarissime, qui recta methodo curare vlcus velit, quot huic theorematibus sit opus: Nam, postquam inuētum est humorem omnino huic vitio inesse, vtq̄ siccans parandum medicamētum indicauit. At, quoniam ipsorum siccantium quædā magis siccant, quædam minus, partim ex vlcerum diuersitate, partim ex agri natura, quod expedit, est desumptum. Itaq̄ nō modo de corporis natura meditatus sit, oportet, quisquis commo de sanare vlcus debet, verum etiam diligenter speculationem omnem de medicamentis didicisse, tum sicci humidī q̄ corporum temperamenti notas callere. Contemplare igitur, quanta sit Methodicorum istorum pronunciandi temeritas, qui vnum id sibi ad cauum vlcus sanandum satisfacere putant, si sciant, q̄ carne est implendum. Non enim in hoc curandi ratio consistit, immo in eo inueniēdo, quod carne sit impleturum. At, quod implebit, iam (inquit) experientia est inuentum. Dic proinde, & quod sanabit, inuentum experientia esse: nec frustra gloriare, nec methodū extolle. Quanquam apud ipsos quoq̄ Empiricos experientia, quæ sine certa limitatione sit, damnatur. Scribunt nanq̄ in commentariis de medicamentis ad hunc modum: Emplastrum ad eos,

D qui molli sunt corpore, & pueros, & mulieres. Norunt q̄ thus in naturis eiusmodi carnem in cauis vlceribus (modo aliud nullū symptoma sit) producere, eadē q̄ implere: vtrum tñ eiusmodi corpora humida sint, atq̄ idcirco modice siccantia deliderent, an alia euentus causa sit, sanè non norunt. Rursus enim ad senilia corpora aliud scriptum medicamentum inuenies, aliud q̄ ad ea vlcera, quæ ægre ad cicatricem veniunt, oras q̄ prætumidas habent, quæ ochthode Græci vocāt: multas q̄ alias discretiones in omnibus suis medendi commētariis scribunt, quibus, quoad licet, ad curandæ naturæ proprietatem appositum pharmacum inueniunt. Quippe discretiones in quaq̄ arte proprium à communi secernere conantur: quanto q̄ plura quis discreuerit limitauerit q̄, eo propius ad proprietatem accedit. Ipsum vero ad vnguem proprium nec scribi omnino potest, nec dici. Eo q̄ tum Empirici ij, qui in arte fuere diligentissimi, tum Dogmatici ferè omnes, fatentur nullam scribi posse curationem ad vnguem exactam. Sed id, quod ad coniecturam de laborantis natura desideratur, alij ex proprio cuiusq̄ medentium vfu, alij ex artificiose ratiocinando, adiiciendum esse affirmant. Nemo tamen eorum adeo fuit præceps, vt omni vlceri cauo vnam se habere medicinam, quæ carnem restituerit, profiteretur. Non enim apud vllum inuenies eiusmodi pharmacum, quod omne vlcus cauum sanet, immo pro modo humoris sordis q̄ atq̄ ipso laborantis tēperamento immutadum medicamentum esse. Missa ergo hic Methodico-

METHODI MEDENDI

rum impudētia, age videamus, quid Empirici dicant, qui ex proprio cuiusque usu exercitatione que E
adiiciendum aliquid censent ad propria laboranti inuenienda remedia. Siquidem (ut saepe dixi-
mus) nulla est in arte medica nec res nec medela, quae specie dicibilis non sit: sed, quod nec dici,
nec scribi, nec omnino praecipere potest, id quantitas in quoque est. Nam in vlceribus humor & for-
des dici possunt, quantitas in neutro dici potest: quam hic quoque accedere propius ad indican-
dam eam studemus, exigua copiosam que sordē dicentes, praeterea tenuem & crassam, & prorsus
multam & admodum paucam, & mediocrem & competentem, aliter que ad hunc modum varie
nominantes, quod videlicet, quam proxime licet, ad quantitatem indicandam accedamus. Diligen-
ter igitur attendas nunc, velim, ut intelligas, quantum praestet methodo quidvis, que sola experien-
tia, facere. Esto nanque notum sit hoc vel illud pharmacum ad cauum vlcus implendum facultate
habere in iis, qui, ut nos loquimur, humidiores sunt temperamento: ut autem obliuor & Empi-
ricus, iis, qui molli sunt carne, ac mulieribus & pueris: deinde nunc tali admotum nihil pro-
fit. Nos igitur, cuius causa nihil profuit, inuestigabimus, atque hanc in duo estimanda reducemus. Nam aut
parcius siccauit medicamentum, aut nimium: horumque notas habebimus sordem, et saniem. Nam,
si plusculum sordis sit, totumque vlcus humidius, intra modum siccauit: si purum, & absque humo-
re cernitur, ultra. Statim igitur mensuram quoque excessus defectusque ex ipso notarum modo intelli-
gemus: tantoque pharmaco, quod deinceps applicabitur, vel siccius, vel non tale admovebimus.
Empiricus autem, si admotum cuiusquam medicamentum carnem non restituit, id quidem videt,
ceterum ignarus, parciusne, an nimium siccando id euenerit, transire ad alterum non potest. Ad
eundem plane modum & Erasistratus Herophilusque ex dimidio (ut dictum est) Dogmatici, male
vlcus sanabunt: quippe qui ea tantum vitia curare ratione tentant, quae instrumentalium partium
sunt propria: vlcus vero (ut iam dictum est) commune simularum instrumentaliumque est: ideoque id,
quatenus in similibus provenit, eatenus empirice curabunt. Quin etiam, si ea curare tentent,
quorum substantia omnino perit, aut etiam manca curtaque est, in his quoque necesse est, a logice
curando multifariam aberrare. Si enim, quod perit, substantia quaeque simularis sit, necesse est
eum, qui regnanda huic consulet, totius esse naturae peritum. Ac de his quidem post dicitur.
Illud interim clarissime ostensum arbitror, non esse cuiusque probe vlcus curare, primamque omnium
indicationem, quae vel plebeis patet, minimam esse curationis partem. Nam & calorem, frigus,
humiditatem, ac siccitatem, actiua qualitates esse, demonstratione accepisse necesse est: & dein-
de, quae nobis tum de temperamentis seorsum dicato volumine sunt scripta, tum quae huc perti-
nent in aliis voluminibus, omnia nouisse. Atque hactenus quidem de vlcere cauo sermo est habi-
tus, ipsam tantum cauitatem curantibus nobis: liquidem, quae vlcis propria curatio sit, non dum
traditum est. Perficitur autem ea quoque iuxta eandem methodum: quippe quae tum a laborantis
partis temperamento, tum a medicamentorum facultate, accipitur. Porro ambo haec a tractatione
de elementis pendent. Etenim, nisi illud in methodo concessum sit, quatuor qualitates geniturae
& corruptelae causas esse, nec methodum inchoasse, nec prouexisse, nec absoluisse fas est. At vero, ut
illas agentes mutuo patientesque ostendas, id ad speculationem de elementis pertinet. Quod igitur
in praecedentibus ostendimus, id nunc praesenti sermone confirmatur. Nempe nihil posse me-
dicum de vlla simularum partium agitare sine naturali, quam vocant, speculatione. Verum illic
de similibus duntaxat id est ostensum: hic iam sermo noster quodam modo insinuat ne in ipsis
quidem instrumentalibus cuiquam integram inuenire curationem licere, qui illam non attigerit.
Porro idem in toto opere etiam euidentius monstrabitur.

De Ratione curandi Simplex Vlcus, & planum.

CAP. 4.

Verum ad ipsam vlcis, quod solum consistit, curationem transire nunc tempestiuum videtur.
Fuerit autem solum, si nec affectus vllus simul adsit nec symptoma. Esto igitur, quae exulce-
rata est particula, nec fluxione vexata, nec malo succo vitiosa, nec omnino extra naturalem tem-
periem: sed nec vlla ei cauitas adsit, nec vlla cutis amissio. Nam id quoque bona pars medicorum
praeterit, non intelligens post, que cauum vlcus carne iam impletum ac planum effectum, nihilo minus
tamen hiat, duplicem adhuc particulae affectum superesse, alterum substantiae cutis amissionem,
alterum continui solutionem. Ergo, quoties vnum id habetur, nempe continui solutio, siue ea
summa est cuticulae, (quam epidermida vocant) siue cutis totius, siue etiam pariter subiectae car-
nis, vitium quod vlcus dicitur, ita existit, postulatque tantum agglutinari. Quippe, si commissae simul
sint cutis orae, nihil erit in medio cutis generis diuersi, quemadmodum in eo, quod iam repletum
est, planumque redditum: in hoc enim orae vlcis se non contingunt, sed totius vlcis partis cutis
perit: quam utique restituere oportet. At in eo, quod acuto aliquo est diuisum, vna agglutinatio
requiritur, non etiam cutis generatio. Quoties ergo vlcis simplicis propositum sit inuenire cu-
rationem, praesumendum in sermone est diuisam esse carnosam particulam citra vllius portionis
amissionem. Nam latum, quod cicatrice induci postulat, omnino cuticulam, quam epidermida
graece vocauimus, desiderat. Hanc igitur tum gignere, tum sibi vnire oportet: duoque tibi hoc lo-
co existunt, ad quae, sicuti in cauo vlcere, consilium diriges, propterea, quod affectus ipse geminus
in ambobus est. Quo igitur (ipsorum inquit forte aliquis) planum vlcus a cauo discernitur, si &
geminus

A. li. 4. f. 4. 1
C. 3. 47. 2. g

A geminus utrobique est affectus, & geminus curanti propositus finis: nempe multitudine amissarum partium. Quippe in cauo ulcere non ipsa modo perit cuticula, verum etiam reliqua cutis natura vniuersa, & subiecta carnis portio aliquando non exigua: in repleto ulcere caro non deest, exterius tamen cooperimentum desideratur. Ac, quæ eius generis ulcerum curatio sit, post dicemus. Nunc eius, quod vlcus tantum sit, nec alium vllum affectum adiunctum habet, quæ nam debita curatio sit, præcipiamus. Ergo, quoniam hic sola diuisio proponitur, diuisorum oras vnâ coniunctas esse oportet. An non id solum, verum etiam coniunctas manere? Porro bisariam simul manent, quæ commissa sunt, cum alia per se, alia ope aliorum maneant: per se quidem, quæcunque secum concresecunt ac coalescunt: aliorum ope, & quæ colligantur, & quæ glutino aliquo tenentur. Ac, quæ cōcrescant, omnino mollia naturaliter sunt, oportet: talis sanè est tum caro ipsa, tum quæcunque ex carne cōsistunt. Quæcunque vero dura sicca quæ sunt, eorum diuisæ partes coire simul nequeunt, sed glutinum aliquod vinculum ue, quo commissa maneant, requirunt. Et talium quidem corporum sanatio in sequentibus præcipietur. Nunc de iis, quæ vniri possunt, inceptum sermonem peragamus, hic quoque ipsam coitionis coalescētiæ quæ causam inuestigātes. Est vero, sicuti in cauis ulceribus ut caro producat, ita in simplici ulcere ut oræ ipsæ secum coalescant, na-

B tura certe causa adeo, ut, si, quæ dissident, in idem ad amissim componas, citra omnem reliquam extrinsecus molitionē coalescant. Oritur quæ tibi iam alius attendendus finis, nempe orarum adductio: à quo orsus, quibus id efficias, inuestigabis. Quippe aut vinculo ex duobus initis circumdato, aut sutura, aut fibulis (quas græce ancēras vocāt) impositis, aut horum quibusdam, aut oībus, quæ diducta sunt, in idem adduces. Expedit autem, quod circumiicitur, neque molle nimium sit, & algæ ritu fragile (bryōdes græce vocant,) quod videlicet tutō cōtineat: neque rursus ita durū, ut premendo offendar. Tum vero ipsa circumductio nec ita laxa sit, ut nihil efficiat: nec ita vehemēs, ut premendo dolorē excitet. Hæc "si feceris, fuerit quæ vlcus solum citra vitiosum succum, aut fluxionem, aut intemperiem, aut phlegmonē, aut aliud quodlibet vitium, proculdubio coibit. At, si vel præ eius magnitudine fieri nequeat, ut dissociatæ ipsæ partes exacte ad imum vsque sibi cōiungantur, videlicet nec sutura, nec fibulis, nec deligatura pertingere ad eas valente, vel etiam sanies iam illic sit collecta, vel dolor quispiam adiunctus, eiusmodi vlcus ex sola partium commissione agglutinari omnino non potest: Quando, quod dolet, plus aliquid affluere facit: atque etiam, si, quod affluit, pro iusto naturæ modo se habeat, attamen vires ipsæ partium, quæ tum propter dolorē tum etiam ex vulnere sunt imbecillæ, nec, quod iustum est, ferent, sed veluti ab iniusto grauabuntur.

C Atque hinc omnino superuacua sanies proueniet: mirum etiam, nisi & phlegmone. Iam vero, si etiam citra dolorem sanies in medio adductorum labrorum ulceris interuenerit: aut etiam locus quisquam medius interfuerit, qui sanie quidem sit vacuus, sed aere plenus: non potest eiusmodi vlcus sola dissidentium partium cōiunctione glutinari: quādo & sanies iam vnionem dispescit, & quæ coniungendis interueniunt loca vacua, interiorum laterum frontes prohibent se continere. Quare illæ saltem ulceris partes, ut coeant, etiam carne prius impleri naturæ opera postulat. Porro hæc adeo planè sunt exiguæ, si modo diuisæ ulceris partes rite sint coniunctæ, ut vnus diei spatium desiderent, aut ad summum bidui. Hoc igitur tempore medicamento opus est, quod particulam siccet, ut, & si qua sanies iam sublit, hanc consumat: & si qua in vacua loca influxura est, hanc prohibeat. Nunc igitur medicamentum, quod carnem producat, & mediocriter siccet, rursus mihi ad memoriam reuocabis, ut intelligamus, siccius ne eo esse glutinatorium debeat, an secus. Sanè, quod carnem producit, si totum, qui confluit, sanguinem consumeret, ipsam materiam creandæ carnis sic adimeret: at glutinatorium aut omnino carnis generatione non eget, aut planè exigua: quare plus siccet, oportet, quàm quod carnem producit. Ergo tum hac ratione tenui quadam differentia inter se dissident: tum vero altera non parua, quatenus scilicet, quod carnem

D producit, statim etiam detergendi vim obtineat, oportet, quod non modo redundantiam humoris siccet, sed etiam sordem auferat: glutinatorium vero nec detergeat, nec expurget, sed cōtra prorsus substantiam omnem in idem cogat. Cuiusmodi facultatem habent medicamenta ea, quæ austera & adstringentia vocantur: hæc nanque in idem cogēdi, ac stipandī, non detergendi, neque purgandi facultatem habent. Quo fit, ut, ubi carni producendæ studemus, maxime cauendū sit à medicamento, quod adstringat, utpote quod sordem ulceribus arctius affigat, quæ ut facile possit absolui. Vinum igitur omnis ulceris, quæ vlcus est, optimum est medicamentum. Quod si nec illud /qua vlcus/ sermoni sit adiectum, idem tamen, arbitror, intelliges: quippe recordationis tantum causa est additum, (ne quis obaudiat) non sicut necessarium aliquid definiens. Adeo, si memorem te eorum omnium, quæ in proximo libro sunt tradita de rebus singulis tum nominandis, tum vero subiectis præstiteris, nihil est, quod talia tibi de cætero definiam. Illud tantum abunde mihi erit, si per singula eorum simplices affectus à compositis secernam. De quibus mihi non nihil prius est dictum, ac nunc nihilominus est dicendum, non adeo mehercle rei ipsius causa, quàm quod plerique medicorum dictione ipsa decepti, cauum & aquabile, recens & inueteratum, sordidum & purum, liberum phlegmone & phlegmone impeditum, putant differentias esse ulcerum. Necesse igitur est distinguere, quæ propriæ ulcerum differentia sint, & quæ aliorum affectuum comple-

METHODI MEDENDI

xiones. Verum hoc posterius paulo. Sanè solennis veteribus doctrina (quæ utinam nunc esset in E
usu) maxime naturalis est. Quippe ij simplicis cuiusq; affectus propriam curationem dicunt, præ-
cipue q; omnium Hippocrates. Medendi nãq; methodus ad hunc modum bellissime procedet,
si de singulis simplicibus seorsum præceperimus: post deinde de compositis omnibus alteram ali-
quam methodum indicauerimus. Veluti enim, si duo vere essent in victus ratione morbi, clausus
& fluens, & id est, qui in retentione, & fluore spectarentur, } cum seorsum vtriusq; curationem di-
xissimus, de coniunctione amborum esset agendum, sicut Thessalus ipse censet: eodem, arbitror,
modo, quoniã vlcera, quæ vlcera sunt, vna omnino est species: tum phlegmonarum, quæ phleg-
monæ sunt, altera itẽ species vna est: oportet, vbi seorsum vlcera, seorsum rursus phlegmones, cu-
rationem tradideris, post deinde ambas in idem coniungere. Id igitur si fecerimus, omne profe-
cto vlcus tum siccari debere, tum etiam adstringi, pro dicta iam methodo inueniemus, non tamẽ
detergeri: contra, cavitatem in carne siccari quidem postulare & abstergeri, minime autem ad-
stringi. Quin etiam ad eundem modum, quem prius diximus in cauis vlcibus, nunc ad por-
tionem naturam corporis æstimabimus, mollis ne ac laxa sit, an dura sicca & compacta. Siqui-
dem prior, quanto est humidior, tanto medicamentis minus siccantibus eget: Posterior, quatenus
est siccior, eatenus rursus, quæ vehementius siccant, magis q; adstringant, desiderat. Empiricus F
enim, arbitror, hic quoque pueros, & fœminas, & qui tenero sunt corpore, memorabit, iuvenes,
agricolas, & nautas his opponens. Ceterum, cum non intelligit, q; in pueris & fœminis propter
humiditatem temperamenti eiusmodi medicamenta visa sunt conducere, rursus altera melloribus
ac nautis propter siccitatem conuenire, nec cuiusq; corporis curationẽ exacte coniiciet, nec erro-
ris causam deprehendet. Quo fit, vt nec intelligat, quemadmodum se ad potius transferet, vbi pa-
rum cessit iis, quæ per experientiam prius nouit. Hæc igitur summatim de glutinatoriis medica-
mentis diximus. Hinc vero altera quædam methodus succedit ad eorum præparationem compo-
sitionem q; pertinens. Siquidem cauo vlcera, quicquid volumus, statim applicamus, siue siccũ
id, siue humidum medicamentum sit: licet enim omni parti vlcera ea tum inspergere, tum illini-
re: at in vulneribus, quorum maior est profunditas, id non licet: quippe, vbi semel oras coniunxe-
ris, contingere, quæ in imo sunt diuisa, non possis. Considerandum igitur est nõ modo, an siccũ
adstringens q; modice medicamentum sit, verũ etiam an peruenire ad imum valeat. Nam & ce-
russa & lithargyrus siccant, adstringunt q; modice, sed, si ea cineris ritu circa vulnus inspergas, ni-
hil proficies, neq; enim ad fundum peruenit medicamenti vis, quod ita sit siccum: humiditatem
igitur quandam desiderat, quò simile emplastici sit, vel etiam humidioris cuiusquam medicamĩ- G
nis. Verum hæc operis eius, quod de medicamentorum compositione præcipit, propria specula-
tio est, non eius, quod de medendi ratione instituitur. Quod siquid ea ad rem propositam indige-
bimus, id procedente opere attingemus.

Quid differant Glutinatoria medicamenta ab iis, quæ Cicatricem inducunt.

CAP. 5.

NVnc ad vlcus, quod cicatrice induci postulat, reuertar: de quo paulo ante dixi eius quoque
primum, quò tenditur, finẽ ex eodem esse genere, cuius est & caui. Quippe regnare ali-
quid opus est, quod perit, non tantum vnire, quæ dissident: ceterum diuersa ratione hic gignere,
quod defit, quàm in cauo: quando illic sanguis, hic caro pro materia sit. Siquidem, quod cauum
est, impletur ex gignenda carne, quæ ex sanguine ortum habet: at ad cicatricem perducitur, quod
iam est impletum, ex gignenda cute, quæ ex subiecta creatur carne. Ceterum caro eadem specie
cum ea, quæ perit, gigni in cauo vlcere potest: cutis talis omnino, qualis erat, quæ perit, prorsus
restitui non potest, sed simile quiddam cuti, & quod eius officium suppleat, potest, non tamẽ
planẽ cutis. Ac causa quidem, cur sicuti caro adeps que regnuntur, ita cutis, quæ prorsus pe-
rierit, regni nequeat, ex naturalibus problematis est petenda: quemadmodum autem tum na- H
turam, tum vsum cutis imitemur, hinc accipiẽdum: eius q; rei methodum iam tradamus. Quo-
niam tegere carnem naturali aliquo tegumento propositum est (quippe id est ducere ad cicatri-
cem vlcus) aut cutis nobis generanda est, aut summa caro cuti similis efficienda. Verum, vt cutis
regeneretur, fieri omnino nequit: quod superest igitur, efficere est tentandum. At quæ igitur
huius efficiendi est ratio? Nempe alteratio: quippe, vt carnis pars quæpiam non amplius caro
permaneant, sed veluti cutis euadat, postulamus. Quo pacto igitur (inquies) alterabitur? Profecto
alicuius alterantium qualitatum ope. Incidit enim rursus hoc loco, vel nolentibus nobis, de ele-
mentis sermo: sine quo nec, quod cicatricẽ inducat, inuenire medicamentum licet, nedum quod
carnis producẽdæ, aut agglutinandi facultatem habeat. Ergo, quoniam cutis carne ipsa tum sic-
cior est, tum etiam denior, si carnem siccabimus & adstringemus, cuti etiam persimilem redde-
mus. Habes medicamentũ, quod cicatricem inducit, summam. Verum ea non satisfacit: nam &
glutinatoria tum siccabant, tum etiam adstringebant. Ergo, quo hæc ab illis distent, id, si ipsam re-
rum substantiam inspicias, inuenies. Nam, quoniam in glutinatione vlcera siccanda, quod
affluit, est, quò videlicet affecta pars superuacuis vacet: in cicatrice ducenda non modo, quod
affluit, verũ etiam humor, qui in ipsa carne continetur, est consumendus: multo profecto siccus,
quod

A. l. i. f. 4. c. 1
83. c

A. l. i. f. 4. c. 1
83. a

A quod cicatricem inducat quàm quod agglutinet, esse conueniet: quando glutinaturò vnũ id positum est, vt eius, quod secundum naturam est, redundantiam consumat: qui cicatricem inducet, non hoc modo, verum etiã vt ei †, quod secundum naturam se habet, aliquid deradat. Galla igitur immatura hoc loco, & mali corium, † & Ægyptiæ spinę fructus, modice siccãtia pharmaca sunt: Chalcitis, & as vstum, & aris squama, & misy, & fillum alumen, multo his sunt valentiora, misy quidem & chalcitis præcipue, mitior autem aris squama, atq; etiã hoc mitius as vstum: quod etiã si lauabis, vtique † minus mordens. medicamentũ habebis. Porro hoc quoque ad speculationẽ de componendis medicamentis pertinet, quæ sanẽ medendi methodum ordine sequit. Nam medicamentorum facultates nosse, id quidem medendi methodum præcedit, tractatũ que de his alibi est: compositio vero medicamentorum, medendi methodum sequitur. Quippe, vbi hæc vniuersale præcepit, dico autem siccandum, aut humectandum, aut calfaciendum, aut refrigerandum esse: tum vel modice id faciendum esse, vel valenter, vel leuiter: intelleximus, que cuiusq; simplicium medicamentorum facultatem, hanc que per se & seorsum perpensam: tum profecto, quo pacto quis ea commode ad vsum miscuerit, considerare conueniet. Existit igitur eo pacto duplex de medicamentis peritiã, altera de eorum viribus: altera de compositione ac præpara-

† humido, additur in anti- quis.

† Antiquis addit, & balau- stia.

† ἀδυνάτω- τον, est in anti- quis, i. mini- me mordens.

B tione. Verum ad id, quod superest methodi de vlceribus, redeundum est.

De Methodo Vlcenum Curandorum, quibus caro supercrefcit.

CAP. 6.

li. 4. f. 4. r. 3.
12475 B

Superest autem (vt arbitror) de supercrefcente carne dicere, quam hyperfarcosin Græce vocat pleraq; medicorum pars. Est porro is quoq; morbus ex eo genere, quod in quantitate magnitudine ue partium spectatur: licet enim, pro arbitrio voces. Ex eodem genere & cauitas erat, de qua iam egimus. Ergo, veluti, quod vlcus cauum vocant, non vnum est vitium, sed pariter & cauitas, & vlcus: ita vlcus, quod supercrefcentem carnem habet, non vnus est morbus, sed simul caro supercrefcens, & vlcus. Indicat autem magnitudo, quæ præter naturam est, primam indicationem, (quam etiã veluti metam inueniendorum remediorum diximus,) ipsius scilicet exuperantis ablationem. At hæc sola medicamentorum ope perficitur, non opera naturæ: videlicet contra, quàm in carne restituenda aut glutinatione se habuit. Hæc enim naturę ipsius sunt opera pharmacis tantũ, quæ actioni eius obstant, submouentibus: at supercrefcentis carnis detractio, nullum quidem naturæ opus est, sed medicamentis perficitur, quæ vehementer siccant. Porro proxima sunt eiusmodi medicamenta tum iis, quæ valenter detergẽt, tum iis, quæ cicatricem inducunt, sic, vt non pauci interim per errorem medicamentum, quod carnem minuit, vel pro eo

li. 4. f. 4. r. 3.
1472 B

C quod sordem deterget, vel pro eo quod cicatricem inducit, accipiant: vt (ne ab exemplo nostro recedamus,) misy & chalcitini, si humidæ naturæ applicabis, potius carnẽ demere, quàm cicatricem inducere, deprehendes. Vnde, si quando iis vtĩ ad cicatricem inducendam in aliorum penuria cogimur, parcissime ipsis vtetur, summum tãtum specillum in ea ad exactissimum leuiorem tunfa demittentes, ac post velut tenuissimum quendam pollinem partibus, quæ cicatrice induci postulant, imponentes: quod si minuere, quæ supercreuere, studemus, liberalius imponemus. Sanẽ ærugo magis etiã, quàm hæc, minuere carnem potest, ita, vt genus eorum, quæ cicatricẽ inducant, omnino sit egressa. At, si illa etiã aduras, vt minus acria, sic ad cicatricem inducendam reddes magis apta: si vero etiã laues, adhuc fient mitiora. Meministi vero, arbitror, & tu eius, qui celebri illo viridi medicamento sordidum vlcus citra rationem curabat, mel quidem ei admiscẽs, multis autem deinceps diebus æque sordidum reperiens: deinde inops consilij, nec habens, quod se verteret, (accidebat enim, vt non modo non purgaretur sordes, sed etiã vt de subiecta quoq; carne non nihil vnã detraheretur & colliquaretur propterea, quod medicamentum valentius, quàm pro laborantis natura, erat,) plus deinde (vt erat egregius medicus) mellis assidue medicamento adiciebat, quod videlicet adhuc valentius purgaret, ceu non satis id medicamentum prius adhibitum fecisset. Eueniebat autem planẽ contra: quippe, quantum ille intendeat medicamenti acrimoniam, tantum caro subiecta colliquabatur. Quod vero in vlcere ex liquata carne sordis apparuit, id medico, ceu medicamentum nihil efficeret, imposuit. Atque huius quidem ignorantia etiã in discernendi peritiã erat, non solum in medendi methodo. Etenim, si quàm maxime similiter sordidum { & humidum } ex utroq; medicamento vlcus deprehenditur, at certe cauitas maior ex valenti, &, quod colliquat, medicamẽto efficitur: quin etiã labijs præaltis, rubrum que, & phlegmone quodam modo affectum, vlcus cernitur. Aliquando vero mordicationem quoque manifestam ex huiusmodi medicamento æger sentit, Quod vero minus, quàm par est, siccet, nec mordet, nec quicquam efficit eorum, quæ retuli. Patere autẽ & in his arbitror Empiricum, etiã si experientia quàm maxime distincta discreta que vtatur, trãlire tamen, vbi quid nõ cessit, ad id, quod expedit, artificiose non posse, immo vnĩ illi id licere, qui vera methodo (quã ipse nunc instituo) medetur.

Quid Differat ratione recta curare à curatione Methodicorum, ac Empiricorum.

CAP. 7.

Quippe, quam Theissalij isti amethodi methodum profitentur, nomen duntaxat esse nudum intelligis, omnis effectus vacuum. Qui, cum tanta, tam que multiplex saltem methodus sit in vlcere sanando, neque Empiricorum discrimine ad inuenienda remedia sunt

Septima Classis.

ccccccc iiii vfi,

METHODI MEDENDI

† Codices græci legunt, mundū cicatrice induci, recēs agglutinari.

† Ita legūt antiqui cod. ut Li nacer, s. εἶναι τε τὴν ἰσχὺν αὐτῶν γινώσκῃν τινα &c. Ἰππεῖς αὐτὴν ἰσά. εἶναι τὴν γινώσκῃν αὐτῶν τὴν ἰσά. id est ἰπποτοῦ, notitiā, autē quādā ec.

vsi, neq; sicut Dogmatici, ab ipsa rerum natura indicationem agendorum sumpserunt: sed solum E id, quod nec vulgares lateat, proponentes, nempe cauum vlcus carne impleri postulare, plenum cicatrice induci: quod carne supercrecente luxuriat minui, sordidum expurgari, † mundum vel cicatrice induci vel agglutinari: } vlcerum curationis methodum quandam explicasse se putant: tantum scilicet absunt, vt intelligant humidioribus naturis minus siccantes medicinas conducere, siccioribus, quæ magis siccant. Ergo, quod in tota disputatione nostra manifeste apparuit, id denuo resumendum est, vt & nos illi quàm maxime simus attentī: & reliqui omnes, qui veterem methodum corrumpunt, quantum aberrēt, clarius intelligāt. Incipiam vero ab eo vlcere, quod carne impleri postulat, vnum id pro exemplo proponens, quando etiam proxime de eo sermonē feci. Ab hoc, de omni simul in vnūuersum curatione loquar. Ergo illud non ratione modo, verum etiam experientia considerantibus apparuit, non omnem naturam eadem medicamenta requirere, sed infirmiores molliores q; mitiora, validiores sicciores q; valētiora. Ita vero tum in iis, quibus cicatrix inducebatur, se habebat: tum etiā, quæ glutinatione egebant. Omnino enim nullum vehementium pharmacorum ferunt molles nature. In cuiusmodi vero sermonis nostri decursu perspicuum planē sit, tum agrī naturam esse considerandam: tum cuiusque hominis propriā esse curationem: tum supra hæc illud tertium, nempe, quoniam cuiusq; naturæ proprietates ineffabilis est, nec exactissima sciētia comprehensibilis, hunc esse optimum cuiusque particularis agritudinis medicum, qui iam methodum quandam comparauit, ex qua & dignoscere naturas possit, & coniectura consequi, quæ sint cuiusque propria remedia. Porro existimare communem quandam esse omnium hominum curationem, licuti stupidissimi methodici putant, extremæ est demeritiæ. Atqui illi ob id stata esse putant omnia medicinæ artis theoremata, hoc est eiusmodi esse, quæ scientes homines faciant, firmam q; sui notitiā præstent: † ipsorum q; artem, notitiā quandam esse } communitatū, non proprietatū, tanquam communem & generalem hominem, non particulares curarēt. Ergo, licuti in alijs omnibus statim inter initia sunt lapsi, sic in hoc quoque. Siquidem curatur non homo communis & generalis, sed nostrum quisque, alius videlicet aliud temperamētum naturam q; obtinens. Hi vero vnam esse omnium hominum curationem existimant. Ego contra, si cuiusque priuatim naturam explorare ad vnguem scirem, vtique, qualem fuisse Æsculapium mente cōcipio, talem me esse putarem: sed, quoniam id fieri non potest, certe vt, quoad homini licet, quàm proxime accedam, tum ipse me exercere decreui, tum alios, vt idem faciant, adhortor. Ac conantur quidem, quantum possunt & Empirici, vt à communibus secedere, ita propius ad ea, quæ propria sunt, accedere: verum, quantum hi quoque ab eius rei perfectione absint, supra est dictum. Non enim hæc in pueris, vel mulieribus, vel senibus, vel mollem carnem albam q; habētibus, alia q; id genus, pro certis discretionibus (sicuti illis placet) sunt ponenda, immo, quemadmodum in humore & siccitate corpus se habeat. Ac Empiricos quidem medicos, tum ob alia multa, tum ob id probare maxime conuenit, quod accedere, quantum licet, ad egrī proprietatem conantur. Post enim reliquas discretionēs omnes, quas adhibent, etiam, quæ à consuetudine sumitur, adiiciunt, tanquam hinc remediōrum, quæ ægro magis sint propria, compotes futuri. Dicitur autem à nobis in sequentibus de cōsuetudine fufius, vbi pro cognoscenda proprietate laborantis naturæ, etiam discrimen à consuetudine priscis inuentum esse probabimus. Hanc itaque cum reliquis Empirici recipiunt: & præter hanc, ipsum etiam medicum, qui sepe egrum inuilit, quàm eum, qui non viderit, commodius curaturū aiunt. Postea tamen, cum hæc omnia adiecerint, stabilem se atque scientificam habere notitiā propriæ curationis egrī adhuc non dicunt. At vero impudentissimus Theffalus illud modo vnum intelligens, q; cauum vlcus sit implendum, cōstantia tamen & firma dicit esse medicinæ theoremata: quanquam hoc saltem omnes (vt ante iam dictum est) homines sciunt, non ij modo, qui nunc sunt, postquam Theffalus iste, alter videlicet Æsculapius, in lucem hominum venit, sed etiam, arbitror, qui ante Deucalionem, & Phoroneum fuerunt, si modo hi rationales erant. Immo vero præter hoc, quod carne esse implendum cauum vlcus nouerunt, etiam illud non ignorarunt, qui medicamenta nosset, quæ tale vlcus carne implerent, hunc medicum esse. Atq; hæc si per experientiam sunt inuenta, constat empirice nobis esse curandum: sin ratione inuenta sunt, logice: non enim profectō aliud inuenit, alio autem nunc commodè vtetur. Verum de eo nobis cum Empiricis lis est. Quod autem dicere cœperam, vera ipsa medicina de laborantis natura coniecturam fecit. Nominat, arbitror, id vulgus medicorum græce Idiosyncrasian: omnes q; id incōprehensibile fatentur, ideo q; ipsam veram medicinæ artem Æsculapio Apollini q; concedunt. Pendet porro omnis hæc ratio ex duplici principio, Empiricis obseruatoribus q; ab iis, quæ manifeste apparent: Logicis autē ab ipsis elementis. Nam, q; aliq; aliud medicamentum profit, etiam pueri iam fermè sciunt: & ratio pariter, quæ ab elementis ducitur, id confirmat. Si nanq; quindécim differētias in hominum temperamentis ex minoris in iis maioris q; ratione, id q; in humida tantū natura statuas, necesse profectō est, medicamentorum etiam, quibus sis vsurus, quindécim differentias noueris: quarum aliæ magis, aliæ minus siccant, quod nimirum, quod cuiq; naturæ cōgruat, inuenias. Quod si etiam in sicciore natura aliis quindécim positis, ad has quoque pari modo alia

Ad alia quindecim medicamenta requiras, habebis in totum triginta medicamenta, quæ triginta naturis conveniunt: quibus uti is demum solus commode poterit, qui in corporum temperamentis diligenter se exercuerit. Nunquid igitur, si totum corpus temperamento sit siccior, ab ijs, quæ magis siccant, medicinis iuvabitur: si vero pars quæpiam eius, cæteris partibus natura sit siccior, quæ minus siccant, requirerit? An liquido patet hic quoque, quæ pars siccior temperamentum obtinuit, hanc etiam, quæ magis siccant, postulare: quæ humidius sit sortita, minus siccantia? Atque hoc totum prætermittunt amethodi isti Thessalij, qui unam omni particulæ congruere medicinam putant. Empirici autem, quantum in hoc Thessalios istos Methodicos superant, tantum à veris Methodicis Logicis quæ superantur. Habent enim profecto illi quoque, ab ipso scilicet usu edocti, aliud medicamentum ad ea ulcera, quæ in oculis accidunt: aliud ad ea, quæ in auribus, aut articulis, aut carnibus, aut sola cute. Ceterum, quod nec in ijs se transferre ad aliud possint, ex ijs, quæ supra diximus, facile patet.

Quo pacto in curandis Ulceribus, Corporum temperiei Aeris quæ, ac Partium naturæ, ratio sit habenda. CAP. 8.

Quoniam autem & de his satis iam dictum est, rursus ad disputationis initium revertamur: misceamus quæ ulceri omnes, qui simul cum ipso incidunt, affectus, ab intemperie primum oriri. Si enim exulcerata caro, vel prius etiam ex quavis occasione, vel ipso ulcerationis tempore, iusto calidior frigidiorve est effecta, utique medelam exigit, quæ non modo moderate siccet, sed etiam intantum calfaciat, refrigeretve, in quantum subiecta caro à naturali suo habitu recessit: cum fieri non possit, ut in ulcere, vel carnis productio, vel sinus impletio, vel agglutinatio, vel cicatricis inductio recte unquam cedat, nisi subiecta caro pro naturali modo se habeat: nec frustra dictum supra est hæc omnia naturæ esse opera: purgari tamen sordida, minui quæ supercrescentia etiam carne naturalem statum non servante possunt propterea, quod tamen hæc medicamentorum sunt opera. Quocirca legitimi ulceratarum partium temperamenti, quoties eas vel carne implere, vel glutinare, vel cicatrice inducere studes, maior tibi sollicitudo erit. Servari namque debent naturæ motus, quos comprehensorum singula comitantur. At alias non servabuntur, nisi prorsus se pro naturæ suæ ratione pars habeat. Veluti igitur, si phlegmone cum ulcere una esset, prius, quam hæc discussa sit, nemo id vel carne implere, vel glutinare, vel cicatrice inducere tentavit: ad eundem, arbitror, modum etiam, si sine phlegmone sola subsit intemperies, nullum horum fore prius sperabimus, quam illa sit sanata. Rursus igitur hinc indicatio quædam ad medicamentorum, quæ superius comprehensa sunt, inventionem oritur: quippe omnia ea siccantia erant, sed dissidebant inter se pro intensioris remissionis quoque modo. Ceterum definitum antea non est, quatenus in calefaciendo frigefaciendoque se haberent: sed methodus hoc quoque investigare quodammodo cogit.

l. 4. f. 4. r. 3.
fol. 47. a.

Non enim tantum, an siccet, sed an et non valde calefaciat, aut refrigeret, expendi oportet. Ergo altercum, & mandragoram, & mæconium, seu supra modum refrigerantia, fugies, tametsi siccant ea quoque, quantum sit ulceri ex usu. Resina vero, & pix, & asphaltus, quanquam modice siccant, tamen immodice sunt calida: ideo quæ eis nemo utitur, nec aliter, nisi cum leuiter refrigerantibus admistis unum ex omnibus medicamentum fecerit, quod sit temperatum. Si igitur hæc ita se habent, sicuti profecto habent, inspicere etiam conveniet & circumdantis nos aeris temperiem. Siquidem, veluti medicamentum quoddam, is quoque corporibus nostris forinsecus incidens, ubi immodicus calore vel frigore est, sanationem moratur. Danda igitur opera est, ut medicamenta eius excessui occurrant. Ideo quæ Hippocrates in calidioribus anni temporibus, ijs, quibus frigidior facultas sit, medicamentis utitur, calidioribus autem per frigidiora. Non ignoras profecto hic quoque ex stupidis Methodicis quendam fateri, quo pacto in calore, & frigore se habeat, qui agrum continet, aerem se inspicere, non tamen anni tempora inspicere permittere: quasi nomina ipsa temporum anni prosint obsintve, non eorum temperamenti ratio: aut non huius causa veteres medici ad ea respexerint. Verum, quod, qui certa methodo curare ulcus debet, huic necesse sit, tum ad prima elementa vel maxime venire, tum anni tempora, & corporum temperamenta non in toto modo verum etiam in singulis partibus considerare, abunde monstratum reor.

Rursus vero repetendum hoc etiam loco est, quod prius diximus in indicatione, quæ à sicco humido quoque sumitur. Nam, sicuti in illis humidior natura humidiora, siccior sicciora medicamenta exigebat: ita nunc calidior calidiora, frigidior frigidiora requirerit, contrariam scilicet semper ijs, quæ præter naturam, et ijs, quæ secundum naturam sunt, indicationem præstabit: quippe, quæ secundum naturam sunt, similium sibi indicativa sunt: quæ præter naturam, contrariorum, si modo illa servari, hæc submoveri necesse est.

De curando Ulcere cur indicationes contrariæ invicem extiterint, ac de Triplici fonte

Indicationum curativarum.

CAP. 9.

AC, quod tum corporum temperies, tum anni tempora, tum partium naturæ, considerata illi sint, qui probe ulcus sit sanaturus, clare me docuisse existimo: ad hæc, quæ prima quidem medicationis indicatio à solo sumatur affectu, remedia tamen inde inveniri non posse, nisi prius ad corporum elementa sit ascensum, & ægri temperamentum perpersum, non corporis modo uniuersum, sed etiam afflicte particulæ, cum hoc quoque ambiētis temperie aestimata: quæ utique cum ad præ-

* Antiqui cod. legunt *μυκον* *υπερ* *καυτηριον* *ι, ε, α, α* tam.

* *επιδημιου*

fentes

METHODI MEDENDI

sententes status, tum vero regiones extenditur. Quod autem contrariæ subinde in vna curatione E indicationes sint, atq; has quemadmodum tractare conueniat, latius quidem dicitur in sequentibus: non tamen alienum sit nunc quoq; paucis de ipsis egisse. Etenim, quod ægri temperamentum sit humidius, particula ipsa, quæ laborat, sicciior: aut contra, quod hæc sit humidior, totius temperamentum siccius, mirandum non arbitror: pari modo in calore, & frigore, quod cōtrario temperamento sit pars cum toto. Veluti igitur, si totum corpus medio temperamento esset, (quod esse optimum docuimus) nihil planè, quantum ad laborantis naturam attineret, in medicamētis nouaremus: ita, vbi vel siccius, vel humidius, vel calidius, vel frigidius iusto cernitur, eatenus intendere vires medicamentorum oportet, quatenus corpus ad naturalem intemperiem est versum. Non enim, arbitror, excidit nobis, quæ naturalis intemperies sit, & quæ præter naturam: dictum enim de ipsis est in alijs, ac præcipue in libro, qui de inæquali intemperamento est inscriptus. Pone igitur totum laborantis corporis temperamētum humidius esse, eo q; medicamenta deliderare, quæ minus siccant: ipsam vero ægram particulam ex earum numero esse, quæ sicciores sint, (qualia esse diximus, quæ minus sunt carnosæ, cuius generis sunt, quæ circa digitos, & articulos habentur: præterea quæ circa aures, & nasum, & oculos, & dentes, sunt: ac, vt semel dicam, vbi crebræ chartilagines, & membranulæ, & ligamenta, & ossa, & nerui sunt, adeps vero, & caro, vel omnino nulla est, vel perquam exigua,) diuersa in his est ea, quæ à patiente particula accipitur indicatio, ab ea, quæ ex ægri sumitur natura. Quare, si, quanto ægri temperamentum iusto est humidius, tanto particula iusto sit sicciior, nec adijciendum, nec detrahendum pharmaco quicquam est, sed tale adhibendum, quale, si vlcus in medijs temperamenti particula corporis medio-criter temperati consisteret, adhiberemus: Sin sicciior debito particula magis fuerit, quàm corporis temperamentum iusto est humidius, vtique in tantum intendi siccitatem medicamenti conueniet, quantum particulæ temperamentum totius temperamentum excedit: veluti, si quatuor numeris sit exulcerata pars medio temperamento sicciior, ægri natura gradibus tribus humidior, manifestum est particulam, quæ nunc exulcerata est, siccius vno gradu desideraturam medicamentum, quàm quæ pars sit temperata. Quod autem hæc omnia coniectura sint accipienda, tum quod optime conijcere poterit, qui in ratiocinando de his sit exercitatus, liquido patet. Ac in talibus quidem omnibus contrariæ subinde indicationes vno tempore fiunt: neq; enim est, quod de indicationibus, quæ à calido & frigido sumuntur, etiamnum dicam, vtpote, quæ ad portionem dictorum intelligi possunt: In alijs vero, etiam temporibus † quibus perficiendæ sunt, † indicationes separantur: oportet q; in principio præsertim curationis alteram cessare, alteram officio fungi: Sicut, exempli causa, cum vlcus cauum simul sit, & admodum sordidum: quippe affectus præter naturam in hoc triplex est, vlcus, cauitas, & sordes. Ordo vero sanationis à sorde expurganda ordietur, quod videlicet nec glutinari quicquam, nec carne impleri potest prius, quàm purum fuerit. Secundum locum exigit cauitatis sanatio. Si namq; vel glutinabimus, vel cicatricem inducemus, vel (vt summam dicam) curabimus vlcus, cauitatem implere nō poterimus. Pone ergo non solum tria hæc particulam obsidere, sed etiam phlegmonem, vel erysipelas, vel gangrænam, vel intemperiem aliquam simplicem compositam ue: num nam hic manifestum est, quod, nisi quis illam prius sanauerit, implere carne cauum vlcus non poterit: Quippe dictum supra est carnis generationem ex sana, quæ subiecta sit, ortum habere: ex ea vero, quam phlegmone premit, & intemperata, & vno verbo ægrota, caro gigni noua non potest. Ergo in oibus eiusmodi complexionibus triplex tibi propolitus finis erit, vnus veluti à causis sumptus eius, quod post futurum est: alter, vt quod rationem obtinet eius, sine quo non: tertius eius, quod veluti accelerantiū & vrgentium nominatur. Siquidem iusta subiectæ carnis temperies, causæ rationem habet, vt quæ concrefcere secum, quod vlceratum est, faciat, & cauitatem impleat: Puritas vlceris rationem eius, sine quo non: atque hanc sordes interpellans, curationem moratur. † Habet vero & ipsa cauitas ad vlcus rationem eius, sine quo non: quando, nisi cauitas prius impleta sit, induci cicatrice vlcus non possit. † Ergo, si ad hæc respexeris, ordinem sanationis inuenies, veluti, si phlegmone, & cauitas, & vlcus, & sordes, simul in eadem particula constiterint, primum phlegmonem, secundo loco sordem, tertio cauitatem esse sanandam, & quarto vlcus. Ac in iam dictis quidem, tum ordo, tum agendorum inuentio ex his sumitur. Vrgentis vero indicatio inter ista non habetur: in alijs autem habetur. Nam affectus, vnde primum maxime quæ imminet homini periculum, hic primus curari debet: Interim vero non primus modo, verum etiam solus, veluti si punctio musculi capite conuulsio, quæ nulla conuenientium medicamentorum vi remittatur, superueniat: quippe præciso per transfusum toto musculo conuulsionem quidem sanaueris, aliquem tamen ex particulæ motibus vitiaueris. Ad eundem modum, cum è vena, vel arteria sanguis immodice profluit, si totum vas per transfusum præcideris, vlcus quidem eius sanare postea non poteris, periculum tamen, quod ex profluitio sanguinis impēdebat, sustuleris. Iam neruum punctum sape cogimur transfusum præcidere, quoties vel conuulsiones, vel deliria, vel ambo, magna ægre q; sanabilia superuenire vulnerationi cernimus. Parī modo, vbi luxatio cum vlcere in aliquo maiorum articulorum incidit, vlcus sanamus, luxationem autem in sanatam relinquimus: quando

† AP. εὐθὺς, id est ita.

† AP. ex cod. im pressis græcis, veri pōt. Habet autem vlcus ad cauitatē rationē eius, sine quo non, qñ, si vlcus inductū cicatrice fuerit, nō amplius cauitas impleri car ne poterit.

A.1. 4.f. 3.
c.2. fo.4 b

A quando, si hanc quoque sanare conemur, conuulsiones omnino sequuntur. Tertius itaque propositus medendi finis is est, qui ad id, quod urget, dirigitur, diuersus nimirum à duobus illis modis dictis. Neque enim idem est, aliquid vel ut causam considerare: vel ut id, quod rationem obtinet eius, sine quo non: vel ut id, quod urget. Sed & quod urget, tum eiusmodi interdum esse, ut alium insanabilem affectum relinquat, dictum iam est: tum vero affectum ipsum non nunquam à nobis ipsis induci partim in nervo puncto, vel tēdone, vel vasorum cuiusque sanguinis profusione, partim in musculo, cuius caput est vulneratum. Nam, ubi luxatio cum ulcere una consistit, non ipsi affectum facimus, sed tantum eum, qui factus est, non sanamus. Dicitur vero de his accuratius insequentibus.

De proprijs Vlcera differentijs, ac quæ ex ipsis Indicationes præbeant.

CAP. 10.

IN præsentia nanque redire ad proprias vlcera differentias placet, ac propositum sermonem breuiter complecti, quod, siqua ex his etiam indicatio remediorum sit reliqua, eam non prætermittamus. Ergo phlegmone laborans, & putrescens ulcus, & quod exeditur, & quod gangrena, & quod erysipellate affligitur, & cancerosum, & dolens, & indolens, quæque alia id genus vultu ulcerum differentias loquuntur, siquis Empiricam curationem prodens, nec aliud cogitans, pertractet, non est cum eo contendendum, si ulcerum ea differentias nominat: millies enim dictum est non oportere de nominibus contendere: Sin tanquam artificiosum aliquid de indicationibus hinc dicturus, docendus est omnes iam dictos affectus compositos esse: alias vero esse differentias simplicis solus quod ulceris, et cui nullus alius adiunctus sit affectus. Nam, si ab acuto aliquo facta tantum diuisione, forma eius, quod uulnerauit, parti diuise impressa est, existent profectò sic multe ulcerum differentie, obliquorum, rectorum, pampini modo retortorum, hami ritu uncorum, aut aliter quocumque modo se habentium. Atque hæc quidem differentie omnes à figura sunt.

τὰς ας, i. aliter.

A magnitudine rursus pro maioris minoris quod ratione mille alia: nam & magnum & paruum, & maius & minus ulcus ulcere tum dicitur, tum uero est: quin etiam breue et longum, in summo residens, & in profundum penetrans. Atque in singulis horum, tum quod magis tale, minus que est, siue in spatij, siue magnitudinis, siue quantitatis, siue, quocumque modo appellasse libet, differentia. Quod si hæc ita se habent, omnino profectò & equale ulcus, & inæquale, penes diuisionis profunditatem, erit. Quippe diffilso, si ita fors tulit, per longitudinem femore potest superior diuisionis pars alte descendere, inferior in summo corpore herere: aut contra, in summo esse, quæ superior est, profunda, quæ inferior. Iam illa quoque, nempe diruptum aliqua ex parte aut ex toto fuisse: & incisum fuisse: & ubi, quod uulnerauit, oblique sub cutem se dedit, alteram ulceris partem in conspectu esse, alteram sub cute latere, id quod uel ex supernis partibus esse, uel infernis, uel lateralibus: omnia hæc ulceris differentie sunt. Ab ipso tempore rursus alie ulcerum differentie sumuntur, cruentum, recens: exigui temporis, & diuturnum. Atque in omnibus his ipsa maioris minoris que ratio numerosa est. Atque ab ipsa ulceris natura hæc differentie sumuntur, maxime quidem proprie, quæ à substantia rei capiuntur: nempe, quæ à figura ducuntur, & à diuisionis magnitudine, id quod uel in longitudine, uel in altitudine, uel in ambabus dimensionibus: præterea equalitate in his, & inæqualitate: Extrinsecus uero accedentes, & quæ scilicet rationem obtinent eius, sine quo non: tum à tempore, in quo factum ulcus est, ita enim aliud recens, aliud uetus uocatur: tum ex eo, quod totum pars uel conspectum fugit, uel conspiciendum se præbet: Iam uero & à generationis ratione, eo, quod totum sit incisum, uel totum diruptum: uel pars incisa, pars dirupta. Quod si, quæ à loco quoque, in quo est ulcus, differentias, censeas, ueluti si finis musculi, uel principium musculi, uel medium musculi, uel cutis sit, quod ulceratum est, uel iecur, uenter uel sit, in quo ulcus consistit: fuerint profectò & ipse ulcerum differentie, non utique à propria ipsorum natura, sed à locis, in quibus consistunt, delumptæ. At, cum phlegmone quis obsessum ulcus dicit, aut supercrescente carne prellum, aut cauum: deinde similes ulceris differentias dixisse se, quas modo retuli, putat: hunc necesse est in medendi methodo falli. Quippe græce φλεγμῶνος ἕλκος ex formula dictionis similem habet interpretationis figuram cum paruo ulcere: ceterum, quod significatur, simile non est. Siquidem profundum, aut summotenus factum, cum de ulcere dicimus, propriam eius differentiam ostendimus: φλεγμῶνος uero oīno ulceris differentia non est: cum possit phlegmone pars affici, etiam ubi ulcus non sit. Quo fieri arbitror, ut hic immutare dictionem liceat. Si enim accidisse alicui ulcus cum phlegmone dixeris, propius ad rei naturam, & clarius interpretatus sis: non autem si alij cum magnitudine, alij cum paruitate factum dicas: quippe cum & magis ex natura rei et clarius loquere, si huic magnū accidisse ulcus, illi paruum dixeris. Adeo, si fieri possit, ut mutata dictio & rei nature convenientior, & audituris clarior sit, committendum non est, quod minus id fiat. Quippe caput ad effugiendam in rebus deceptionem est, ut definita locutione utare. Quam nam igitur in talibus methodum statuamus: etenim tradenda quepiam præceptio est, ac ueluti scopus, quod semper intentis discernere statim liceat, differentiam ne alicuius affectus dixerit quis, an alterius affectus complexum. Esto igitur tibi discrimen hoc: Quod consistere seorsum, & per se potest, id nullius unquam alterius fuerit differentia. Ergo magnitudo, paruitas, equabilitas, inæquabilitas, tempus, & figura, ex eorum numero sunt, quæ alijs accidunt: ulcus uero, & phlegmone, gangrena, & putredo, singula seorsum, & per se

** δὲ τὰς ας, i. diuulsum.*

** Προφλεγμῶνος legendum, παλαιόν, i. uetus, ut paucis post lineis indicatur.*

METHODI MEDENDI

se consistere possunt. Sunt namque corporis nostri affectus quidam præter naturam, minime ea, quæ E affectibus necessario accidunt. Quippe omnibus his necessario accidit, ut vel parua sint, vel magna, vel æquabilia vel inæquabilia, vel recentia vel inueterata, vel euidenter appareant vel condantur nec videantur: phlegmone vero affici, ex ijs, quæ vlceri accidunt, non est, veluti nec putrefcere, nec gangræna tentari: sunt enim hæc omnia ex morborum genere, liquidem affectus præter naturam sunt, & actionem vitiant. Alio rursus modo vlcus crucians, & vlcus sordidum, ceu quædam vlceris differentia, dicuntur: cæterum compositum quippiam hic quoque indicatur, sed diuersa ratione, quæ ut phlegmone tentatum, aut putrescens vlcus dicebatur: quippe hic affectus sunt phlegmone, & putredo: illic dolor, & sordes ex symptomatum sunt genere. Pari modo, & cum dicitur cacochymum vlcus, id est vitioso succo obfessum, aut fluxione vexatum, aut arrosum, causa cum affectu copulatur. Manifestum quoque ex talibus est methodi eius, quæ de medendo instituitur, primos ac simplices, sine quibus vlla compositione morbos, veluti elementa quædam esse. Quo magis in commentarijs, qui de morborum differentijs sunt scripti, omnes eos enumerauimus. Sanè nihil referat, primos, an simplices dixeris: quando quod primum est, simplex est: & quod simplex, primum, ideo quoque etiam elementare. Indicatio vero curationis ex differentijs fit, sed non omnibus. Nam recens vetus, vel vlcus nihil indicat: quanquam indicare videtur non nullis: sed hi se ipsos fallunt non aliter, quam in ijs, quæ ad victus rationem spectant, cum aliam initij, aliam incrementi, aliam summi vigoris, aliam remissionis, indicationem esse dicunt. De quibus latius in sequentibus dicturus, non est, quod nunc sim verbosior: verum, quod tantum ad rem præsentem sit satis, id adijciam. Recens vlcus, cum omnino ab altero quolibet affectu est liberum, nec symptoma vllum habet adiunctum, aliam putant indicare curationem, quæ vetus. Id vero non ita se habet. Siquidem, quod vlcus tantum est, nec quicquam aliud, (est porro eiusmodi, cui nec cauitas adest, nec dolor, nec sordes, quod quoque & omni alio affectu est liberum) ipsam tantum vlceris sanationem desiderat: cuius utique propositus finis, vel vnitio, vel agglutinatio, vel coitio, vel continuatio est: quippe millies diximus licere, appelles, ut lubet, modo rei nihil mutes. Eiusmodi igitur vlcus, siue recens, siue antiquum sit, eadem semper curationem requirit, nihil planè proprium indicante discrimine eo, quod à tempore sumitur. At, si cauitatem alte reconditam sub cute habet, considerare oportet, utrum ea in superiore parte sit ita, ut sanies ex ea prona effluat: an in inferiore sic, ut illic listatur. Eius igitur, cui effluxus patet, eadem, quæ aliorum, curatio est: cui non est, huic ipsi moliamur effluxum quendam, oportet. Eius duplex ratio est, aliàs tota cauitate defecta, aliàs in fundo tantum aperta. Quando vero harum alterutra sit ineunda, docebit tum locorum ipsa natura, tum vero vlceris magnitudo. Si namque & loca ipsa periculosa sectionem faciant, & vlcus magnum fuerit, in fundo aperire magis expedit: sin contra se habeant, percindere præstat. Deligatio vero eius incipiat quidem superne, sed finiatur infra, vbi scilicet patet effluxus. Quod autem differentia ea ulcerum, quæ à uulneratis omnibus particulis sumitur, ad indicandam curationem sit maxime opportuna, id in superioribus est dictum: verum ea quidem ut similiarium, hæc autem, cuius nunc memini, ut instrumentalium est indicatio. Sanè dicitur de ea, quæ uel ut similiarium corporum, uel ut instrumentalium indicatio est, in sequentibus uberius. Nunc ad proprias ulcerum differentias est redeundum, ac de ipso, seu transuersum sit seu rectum, seu profundum seu in summo corpore, seu paruum seu magnum, definiendum. Transuersa namque ulcera, eo, quod labra eorum magis dissident absunt quoque à sese, coniungi diligentius postulant: ideo quoque tum futuris, tum fibulis in his est utendum. Quæ uero per longitudinem musculorum sunt facta, hæc si à duplici initio deliges, nec futuris nec fibulis egebis. Sin aliter deligare placebit, et uel fibulis uel futuris utere: sufficient autem paucissime omnino futuræ. Et magna quidem ulcera, si recte ea, quæ prius dicta sunt, meministi, ijs, quæ ualentius siccant, medicamentis curabis: parua uero, uel quæ moderate siccant, abunde sanauerint. Profunda uero ulcera, omnino etiam magna sunt, uolunt quoque tum à duobus initijs deligari, tum uero nec labra sua prepropere glutinari. At, quæ profunda multum longa quoque sunt, ut duplici ratione sunt magna, sic duplicem quoque indicationem præstant: itaque, & quæ ualenter siccant, postulant, & ne immature labra coniungas, & ut à duobus initijs deliges, & ut altis futuris consuas. Ad eundem modum, & si multæ simul differentia coierint, quarum sua cuique sit indicatio, si quidem inter se minime pugnent, omnibus uti maxime expedit: sin aliquatenus secum pugnent, quemadmodum distinguere de talibus oportebit, dictum quidem alicubi in præcedentibus est, locupletius tamen dicitur in sequentibus. Nunc enim finiendus hoc loco tertius hic liber uidetur. In quarto, qui sequetur, de ijs affectibus, qui ulcera comitari plurimum solent, disceptatio erit. Tradentur autem cum his etiam internarum causarum curationes.

† Multi codi. græci legunt, ut Linacer vertit. non nulli tamen sunt, qui habent ὥστε χειρώσθαι ἐνδεῖς ἰδέσθαι. i. quare & elementaris indicatio curatōis. Melior tamen uideatur Linacii lectio.

† In codice ueneto legitur ἄνιστον, ἢ ἀνίστηται ἀρκέσουσιν, ἢ ἐλάχιστα πᾶν ῥαφαί. i. aut fibula sufficient, aut minima omnino futura.

A. li. 4. Eq. c. 3. to. 463

23

GALENI METHODI MEDENDI
ID EST DE MORBIS CVRANDIS
LIBER QVARTVS

ARGVMENTVM LIBRI

Methodum tradit, qua Maligna vlcera, quæ græci Cacoethe dicunt, curentur.

Quot sint species solutæ & Vnitatis, ac quæ Differentiæ Vlcera ægre sanabilia. CAP. I.



Num esse morborum genus, ipsam quoq; continuitatem solutam diximus. Hæc in omnibus animalis partibus incidit: non tamen vnum nomē in omnibus fortitur. Quippe, quæ in carnosa parte, Vlcus: in osse, Fractura (Græcis Catagma) dicitur: in nervo, Conuulsio, Græci Spasma vocant. Eiusdem generis sunt, & quæ Græci Apospasma, & Rhegma, & Thlasma dicunt: illud in ligamentis: hæc in vasis musculis q; ex violento ictu, vel graui casu, vel alio quopiam valente motu excitata. Quæ vero Ecchymosis græce dicitur, plurimum vnâ cū contusione ruptione q; incidit. Fit autem aliquan-

do & ex oris vasorum apertione, quam Anastomosis vocant, & ex ea, quæ à non nullis Diapedesis dicitur, aliud vtiq; tunc solutæ continuitatis gēnus. Iam vero & ex erosione, quam Anabrosin græce vocant, soluitur interim in animalis partibus continuitas: verum is iam mistus affectus est, vt qui aliud quoddam morbi genus adsciscat, quod in quantitate partium consistit: veluti supra, cum de causis vlceribus egimus, est monstratum. Est enim horum ipsorum duplex ortus, aliàs ab excisione, sæpe ab erosione proueniens. Verum, excisio quo pacto eueniat, nō latet. Erosio, si intrinsecus ab ipso animali prouenit, vitiosi succi soboles est: si extrinsecus, aut à valentibus medicamentis fit, aut ab igni. Et sanè (vt dictum supra est) diligenter attendere oportet, & simplices affectus à compositis discernere: cū simplici morbo simplex adhibenda curatio sit, cōposito non simplex. At, quæ nam in compositis curandis tenēda methodus sit, supra est dictum. Caterum non tantum generalitatem eius didicisse, sed etiam in singulis eius partibus exercitatū Cesse oportet: cum in his quoq;, alijs non paucis methodis (vt ita dixerim) particularibus sit opus propterea, q; cuiq; morborum speciei sua sit methodi species. Ergo, quod reliquum est vlcera curationis, in hoc libro exequamur, hinc sumpto initio. Omne vlcus aut solum est, ipsum q; per se, nullo nec cum eo simul inuadente, nec ipsum precedente, aut sequente alio affectu: aut cū alio quopiam vno multis uel consistit: quorum alij non modo statim ab initio vlcus excitant, sed et nunc maius efficiunt: alij eius, sine quo non, vt ad curandi opus, rationem obtinent. Verum de his prius dictum est. At, quæ maius vlcus reddunt, de ijs hoc volumine agetur. Ac duplex in his curationis cōsiliū est, vt vel eiusmodi affectus è corpore prorsus eximas: vel incommodum, quod inferunt, vincas. Verum hoc, vbi exiguus planè affectus est, fieri licet: vbi magnus est, duci ad cicatricem vlcus prius non poterit, quàm illi affectui remedium attuleris. Ergo, qui nam & quot numero eiusmodi affectus sint, diligenter nobis considerandum est, inde nimirum sumpto initio, vnde supra est coeptum. Omne vlcus, siue solum sit, siue vnâ cum cauitate & subiectâ sibi carnem naturaliter habere postulat, & nequid inter oras conglutinandas intersit: quod tamen sæpe fit, ita, vt pilus, arena, sordes, oleum, aliud uel id genus glutinationem prohibeat. Ceterū hæc ceu symptomata quedam vlcera sunt, & quæ morari sanationem, si sint, possunt: efficere, si nō sint, non possunt. Subiectę vero carnis affectus causę rationem obtinet ad id, quod effici: quippe ex hac, & per hanc, tum, quæ dissident, glutinantur: tum, quæ caua sunt, carne implentur. Ea ergo planè pro natura sua se habeat, oportet, quò hæc vtrique commode perficiantur: atque ea recte quidem se habuerit, si, id quod reliquis etiam omnibus est commune, propriū temperamentum tueatur. Itaque temperatam esse subiectam carnem ad vlcera tum glutinanda, tum carne implenda, prorsus oportet. Nunquid igitur hoc tantum satis est: an etiam sanguinem, qui affluit, & bonum esse & mediocrem quantitate oportet? Mihi id quoque multo maxime verum esse videtur. Nam, & qui corruptus sanguis est, tantum abest, vt ad glutinandum & carne implendum sit utilis, vt etiam ipse non nunquam corpus erodat, atq; exulceret: & multus humor, cum in vlcera excrementa creet, sanationem (ceu prius diximus) moratur. Atque hi tres ægre sanabilia vlcera modi videntur: qui ex intemperie subiectę prouenit carnis: qui ex vitio affluentis fit sanguinis: & tertius, qui ex mensura confluentis nascitur. An non ita facienda diuisio est, sed sic potius? Nempe ægre sanabilia rebellia, quæ vlcera alia propter vlcerata carnis intemperiem, alia ob affluentem humorem, talia fieri: tum intemperiem rursus ipsam bifariam diduci, cum aliàs in qualitate sola nature modum egressa subdita caro sit: aliàs etiam cum accessorio quopiam tumore: iam ipsum confluxum bipartito etiam scindi, nempe in confluentis succi, tum qualita-

tem

* Al. ad os.

METHODI MEDENDI

tem, tum quantitatem: Interim vero misceri dictorum affectuum aut aliquos, aut etiam pariter E omnes. Porro tradenda est medendi methodus non omnium simul, sed cuiusq; seorsum.

De Methodo curandorum Vlcera, quæ vel carnis intemperie, vel succi affluentia Maligna sunt. C. AP. 2.

ACarnis quidem intemperies si squallens sicca que videtur, aqua temperata fouens humectans q; corriges. Quoties autem eo remedio vteris, esto tibi perfusionis humectationis q; meta, vt, cum primum rubescit attollitur q; particula moles, tum desinas: quippe si vltra perfundas, quod attraxisti, id euocabis: itaque nihil profeceris. Quin etiam medicamentorum humectandi facultas plenior esto, quam vt in sana carne præceptum est. Si vero humidior, quam pro naturali habitu, caro fuerit, contraria ratio ineunda est, ac medicamentorum facultas ad siccus transferenda, aqua vero nullatenus admouenda: immo, si lauandum vlcus videtur, vinum, aut posca, aut decoctum austera cuiusquam herbe præparandum. Eodem modo & calidiorem, quam par est, carnis habitum refrigerabis, & frigidiorē calefacies. Agnosces vero horum vtrunque partim colore, partim tactu, partim laborantis sensu. Quippe alias vstionem sentire se fatentur, alias manifestum frigus in particula: gaudet que vel frigidis medicamentis, vel calidis. Et alijs quidem rubor leuis insidet, alijs color magis albicat. Verum hæc distinguere propositi operis officium non est: quippe in quo non dignoscendi, sed medendi, methodum instituimus: sed consequentia quadam sermonis inuitate digressi in hanc sumus. Rursus igitur ad ea, quæ proposuimus, reuertamur. Partium, quæ cum aliquo præter naturam tumore exulceratae sunt, earum prius sanandus tumor est. Quæ vero omnis præter naturam tumoris curandi ratio sit, in sequentibus dicetur. Nunc, quantum eius rei coniunctum cum vlcera curatione est, tractabitur. Cum labra tantum vlcera decolorata dura ve plusculum fuerint, excidenda ea sunt ad sanam vsque carnem. Cum vero amplius progressus eiusmodi affectus est, deliberatio incidit, excidendum ne omne id sit, quod præter naturam visitur, an spatium potius curandum. Proculque dubio est agri animum hoc casu consulendum esse. Aliqui enim longiore tempore curari citra sectionem malunt: aliqui quidvis subire, dummodo citius sanentur, sunt parati. Aequè vero & mali succi, qui ad exulceratam partem confluit, vt vlcera quidem est, sanatio eius hic dicetur: vt malignus succus est, aut copia redundans, in proprijs ipsorum locis tractabitur. Cum ergo, qui exulceratis partibus influit succus, nec multo plus iusto, nec multo deterior sit, auerti hunc reperi q; conueniet, adstrictis scilicet refrigeratis q; ijs particulis, quæ ante exulceratam sunt. Inchoanda quoque deligatio est à laborante ipsa particula, deducenda q; versus sanam: veluti in fracturis ossium præcepit Hippocrates. Sed & quæ vlcera iplis admoventur pharmaca, siccant valentius, oportet, quam ea, quæ simplici G admouetur vlcera. Quod si sisti compesci que medicamentis influxus nequeat, causa eius inuestiganda est, atque hæc prius adimenda. Ac, si quidem ob partis, quæ fluxum recipit, imbecillitatem aliquam id fiat, huic nimirum medendum est: fuerit autem hæc vlcera quoque partis propria quædam curatio: Sin propter sanguinis copiam, vitiosum ve succum vel corporis totius, vel cuius suprapositarum partium, illa scilicet prius sunt corrigenda. Ac imbecillitas quidem partis, propter quam plus iusto succorum illi influit, omnino ab intemperie prouenit, non tamen ab omni. Eo q; fit, vt exulcerata caro non nunquam intemperata tantum sit, non autem imbecilla: non nunquam vtrunque, & intemperata & imbecilla: Quippe imbecillitatis affectæ partis valentior intemperies causa est. Hanc autem, sicut prius dictum est, curabis vtrique calidam refrigerando, siccam humectando, frigidam calfaciendo, humidam siccando. Quod si per coniugationem frigidior pariter humidior q; locus sit, calfaciendo pariter ac siccando: & in alijs ad eundem modum, vincentem videlicet qualitatem contraria semper oppugnans. Huius rei ratio hæc est: Quicquid rectum est non in animalibus modo platis ve, verum etiam alijs quibus q; id symmetron est, medium q; & omnis vitiosi excessus expers. Cui enim nec demere quicquam, nec adijcere non partem aliquam, non qualitatem possis, prorsus id recte se habet. Contra, quod demi sibi ali- H quid, adijci ve postulat, id iam ab optimo statu recessit. Ad quem vtrique redire aliter non est, nisi, & quod superuacuum est, tollatur: et quod deficient est, adiungatur. Ac de ijs quidem, quibus partes quæpiam abundant, deficient ue, alibi sermo erit. Vbi vero qualitas aliqua plus iusto inualluit, ibi & continuo vinci contrariam illi necesse, & continuo vitium corrigi ex ea, quæ victa ante est, restituenda. Quippe refrigerans, quod immodice incaluit, vna, & quod deficit, restitues: & quod superat, diminues. Quare, quæ per intemperiem aliquam à naturali habitu recesserunt, eorum sanationem per ea, quæ contraria viribus sunt, fieri omnino est necesse. Atque ad hunc modum caro, alia ue carnosa quæpiam pars, quæ fluxione humoris ob imbecillitatem affligitur, sanari debet. Vbi intemperiei affectum iam sanaueris, deinde etiam exulcerationis affectum sanabis, non aliter planè nunc curata intemperie, quam si citra vlcus incidisset. Quo manifestum sit non esse vlcera, sed intemperiei, propriam oem eiusmodi curationem. Ad eundem modum, si aut alterius cuiuslibet particule occasione: aut etiam totius corporis, cum in eo sanguis malus ve succi redundant: vitiosum aliquid exulceratis partibus influxerit, medendum prius est vel ei, quod fluxionis est causa, vel etiam toti corpori. Ita igitur & varices, qui sepe supra exulceratum locum sunt, prius sanabimus, vt deinde mox vlcus sanemus. Etiam qui ex liene, aut alia quauis notabili parte laborant,

Lib. de Fractu.
sect. L. 1. 23. 7.
227.8

A. li. 4. c. 2. fol. 47.

A laborant, ipsa prius parte percurata, mox ad vlcis curationem accedemus. Cæterum nulla harū curationum ipsius est vlcis, sed alterius cuiusquā affectus, qui vlcus vel gignit, vel certe auget.

Externam Causam ad Morbi quidem cognitionem necessariam, sed tamen nudam ex ipsa Indicationem curationis præberi.

CAP. 3.

* procatartica
rum.

NAm illud quoq; iā definitum tempeltuum vī, nullam extēnarū, & vel (vt nunc loquunt) pri-
mitiuarū} caularū curationis indicatricē esse, sed huius indicationē ab ipso affectu initium
habere: quæ vero particulatim sunt agēda, hæc tum ab eo, quod prima indicatio dicat, tū vero ab
ægre partis natura, tum ambiētis tēperie, quæ q; alia sunt his cognata, inueniri. Nā (vt breuiter di-
cam) à nullo eorū, quæ adhuc nō permanēt, indicatio sumi eius, quod ex vsu sit, pōt. Sed ppter ea,
q; ad eum affectum nōscēdum, qui oīno tum rōnem tum sensum lateat, sæpe cōgimur de exter-
na causa inquirere, opinatur vulgus hāc quoq; sanationis rōnem indicare. Quod planē secus est.
Apparet id liquido in ijs, qbus nōsci affectus exacte pōt. Siue. n. ecchymosis, siue vlcus, siue crys-
pelas, siue putredo, seu phlegmone in parte aliqua cōsistat, supuacuum est cām, q̄ horū quodlibet
effecit, inquirere, nisi iam ēt faciat. Sic. n. simul, quod iam factū est, curabimus: simul, quod adhuc
facit, facere inhibebimus. Si vero fecit illa quidē, cæterū iam abiit, utiq; quod factum est, curabi-
mus: quod adhuc non est, nec si velimus, submouere id possumus. Quippe rei præsentis est cu-
ratio: eius aut, quod futurū est, pudentia: quod vero nec nunc ledit, nec lesurū timei, id ab utroq;
artis munere, tum eo, quod curat, tum eo, qđ prouidet, excessit. Quare nec indicatio ab hoc ad cu-
rationē vlla, nec pudentiæ rō sumi: sed, uti dictū est, ad eos tm affectus, q nostrā notitiā fugiunt,
externæ causæ cognitio est utilis. Empiricis tm ceu pars totius syndromes, i. cōcursus, in quo cura-
tionē obseruarūt, externa causa interim sumitur: veluti in ijs, q a rabido cane, et oībus, q a veneno-
sis bestiis sunt lesi: Quin ēt ex Dogmaticorum quoq; numero ijs, qui sine rōnali indicatione, sola
experiētia curare se talia confirmant. Quippe his quoq; externa causa seu pars totius syndromes,
id est concursus, qritur: lis vero, qui ex priore vsu venenosarū aīantium vim norunt, atq; ab hac
indicationē curationis sumūt, nō sanē ad curationis indicationē conducit externa causa cognita,
sed ad p̄sentis affectus cognitionē. Nā pone, scīa scorpionis venenū frigida vi esse: sumā q; veluti
a frigido, remedij indicationē, nullo tm signo intelligā talē esse in hoc corpore affectū: manifestū
est, si scorpīū percussisse didicero, q calfacere tū corpus totū, tū punctā ab eo particulā conabor,
nulla amplius expectata experiētia, sed ab ipsa rei natura indicatione sumpta. Mōstratū. n. in ijs li-
bris est, q de medicamētis sunt inscripti, in qbus exercitatum esse censui, q quis ex his cōmētarijs
Cfructū percipiet, nullā eiusmodi facultatē sine experiētia inueniri. Ellet. n. p̄fectō fœlicitatis cu-
iusdā munus, si quis inspecto lithargyro, aut castoreo, aut cātharide, p̄tinus eorū vires intelligeret.
Verum, sicut in oībus peccata, tum ab ijs, qui modum excedunt, tum qui citra consistunt, cōmit-
tuntur, ita nimirum hic quoq; ac Dis dia pasōn (vt in proverbio Græco est) non semel, arbitror,
inter se discordant, & qui neq; in hodiernum vsq; diem affirmant sciri medicamentorum vires,
id q; post tantam experientiam: & qui ex vna experientia sciri eas censent. Nam & hoc præcipi-
tanter inconsulte q; dictum est, si utiq; inconsultum est, quod fieri oīno non potest: & illud homi-
num est, aut oīno attonitorum, aut planē litigiosorum. Verū de his plura expectare nūc nō opor-
tet, utpote de quibus dictum latius est tum in tertio de temperamentis, tum in ijs libris, quos de
medicamentis inscripsimus. Cæterum, (vt dixi) ad noscendos affectus aliquæ externarum causa-
rum conferunt: vbi vero p̄sentis affectus nihil latet, nulla iam externæ causæ est utilitas. Ac di-
ximus quidem in superioribus, non esse in idem coniungēdas vtrasq; doctrinas, sed seorsum em-
piricē, & seorsum tradendam rationalem. Memoria autem tenendum nunc quoq; est, q, quo-
niam propositum nobis in his cōmētarijs est solam rationalem tractare, quāquam ad quæpiam
horum, quæ dicimus, non apponitur, q absolute vera non sint, sed solis ijs, qui methodo curant,
D aliquis tamen eorum id per se ratiocinari vltro q; apponere debet. Nunc enim ipsi apposui-
mus nullam externarum causarum ad curationis indicationem conducere, sed ad affectus aliquando
agnitionem, fatentes videlicet externam causam ijs, qui empirice quiduis curant, vnam esse par-
tem totius concursus: id q; siue ij ratione reliqua curant, siue omnia empirice. In ijs autem, quæ
deinceps scribentur, non erit necesse hoc adscribere. Rursus igitur ad propositum redeamus, in-
dubitatum illud principium præsumentes, quo etiam in præcedentibus sumus vsi, vbi diximus
primum scopum, quō medicus tendat, affectum ipsum, qui curari desideret, indicare: ex hoc vero
& reliqua omnia sumi. Quod vero cum hoc scopo nulla externæ causæ societas sit, ex ipsis maxi-
me vlcibus, a quibus sermo est ortus, intelligas. Finge enim † ex eo, quod in partem aliquā pro-
cubuerit, } natum vlcus esse. Quod si sit, ex vitiosis provenire succis manifestum est. Ita enim in
morbis facere natura solet: cum corpus expurgat, omne excrementum ad cutim trudit: atq; hanc
quidem vlcari, totum vero corpus purgari accidit. Quæ nam igitur est eiusmodi vlcum sana-
tio? Nempe, quæ reliquorum omnium, quibus nullus affectus malignus, quem cacoethe græce
vocant, est adiunctus. Verum, si hoc sic se habet, manifestum est nullam esse ad curationē a causa,
quæ vlcus excitauit, indicationem. Atqui, si vitiosus succus remaneret, oīno aliqua ab hoc quoq;
indicatio sumeretur. Verum alioqui ēt absurdū esset, si curationē postularet, quod amplius nō sit:

aut

† id est a natura:
i. vbi sit vlcus
manifestum additur
in nō nullis au-
tibus codici-
bus.

† id est a natura:
i. vbi sit vlcus
manifestum additur
in nō nullis au-
tibus codici-
bus.

METHODI MEDENDI

*θεραπείκη.

CAP. 4.

* Galenus non
m̃lto post, h̃ac
dictionem de-
clarat.

* ἀγαθήκη-
σις.

*μετασυγκρί
νον.

A oportet, ex alio suggeri sanationis indicationem, ex alijs præberi affectus notitiã. Nam esto con-
ferat aliquid tẽpus ad agnitionem, certe indicatio curationis à tempore non sumitur. Quid enim
ad rem pertineat, si quod vlcus inueterauit, adimere, quẽ coitionem impedian, & nouare locum,
qui affligitur? Nam, si propter fluxionem malignam, quam cacoethe dicunt, vir inepte, vlceris la-
bra hoc vel illo modo sunt affecta, quid commodi erit, si ea excideris ante, quã fluxioni listende
consulueris? Videlicet vlcus latius efficies, veluti non nulli faciunt eorum, qui similiter, vt tu, vl-
cera curant. Siquidem causa, quã ea & dura & callosa prius reddidit, adhuc manẽte nihil aliud ex
his excidendis accedet, q̃ vlceris amplificatio: quippe illa ipsa, quẽ excideris, perinde & dura, &
callosa rursus erunt, atq; ea, quã prius. Quanq̃ ne id ipsum quidem adiecit prudens scilicet The-
salus, callosa, & dura, & decolorata exulcerata partis excidenda esse, sed absoluto sermone absci-
di, quã coitionem morantur, iubet, ac nouari. Ac, si quidem submouere causas, quẽ glutinationẽ
morantur, suaderet, & vetus ea ratio esset, nec ipse eum accusarem: præcipitur enim ab omnibus
ferẽ antiquis medicis, quicunq; ratione quadã, ac methodo de vlcerum curatione scripserunt, cau-
sas, quã illa creant, abscidendas esse, æque profectò, vt cæterorum oĩum morborum. Non enim,
arbitror, in vlceribus manente adhuc causa, quẽ ea excitauit, hanc prius tolli expedit, in alijs mor-

B bis non expedit: sed omnino in omnibus, in quibus effectrix causa adhuc manet, ab hac inchoan-
da curatio est. Quod si, quã coitionem impediunt, non dixit de omnibus causis, quã eã impedire
possunt, sed de labris tantum, veluti ex ijs, quẽ subiecit, ostendit, plus certe nescire, q̃ scire eorum,
quã ad vlceris curationem spectant, videtur. Quippe fieri aliquando potest, vt & hæc causa sola
sit, quò minus sanescat vlcus. Potest etiam (vt dictum est) causa esse, & quẽ citra tumorem præter
naturam sit in exulceratis partibus intemperies: & quã cum tumore quidẽ aliquo coniuncta sit,
non tamen, qui omnino sibi labra excidi desideret. Potest & varix superiacens, vel lienis auctior,
vel in iecinore vitium aliquod, præter q̃ hæc omnia imbecillitas partis ægrã, quẽ ipsa quoq; intẽ-
sa quẽdam est intemperies: quin etiam vitiosus in toto corpore succus (cacochymian vocat) ma-
xima scilicet causarum, quẽ incõmodare vlceribus possunt. Vexat sanẽ non minus vlcera, & suc-
corum æqualiter se habentium exuperantia, quã plethoran vocat. Horum quodq; si adimĩ The-
salus iubet, laudo hominem, ceu veteribus subscribentem: sin labra tantum, vnum nouit ex mul-
tis, sed quod nec opiliones lateat. Quippe, si opilio vlceris labra dura, & callosa, & liuida, & nigra,
& alio quopiam notabili coloris vitio videat, prorsus ea circũcidere non dubitabit. Est enim cir-
cũcidere res promptissima: maius vero quippiam, atq; artis egens, medicamẽtis sanare: Thessa-

* Antiqui scri-
bunt xip. 56, vt
Linacem, non
σχιπ. 57. vt illi
impressis.

C lus autem nec, quã labra molliri medicamẽtis possunt, vnquam nouit. Quippe fatentur eum pe-
nitus hanc artis partem declinasse, ita utiq; vt ipse quoq; indicat: nec omnino experiẽtiam ratio-
nalem uel scientiam de vllo medicamento visus est habere, quod ipsum quoq; ex libro eius de me-
dicamentis ostenditur. Verum de ijs, quẽ ibi non recte ab eo sunt prodita, in progressu operis di-
cemus. Nũc de diuturnorum vlcerum sanatione, quã in prius posita dictione tradidit, paramus
differere. Sanẽ melius fuerat nõ diuturna, sed cacoethe ea vocasse: tum naturam eorum narrasse,
& causas generationis eorum exposuisse: curationemq; cuiusq; primum quidem cõmunem om-
nium, quatenus vlcera sunt, qualem in tertio libro descripsi: deinde priuatã cuiusq; pro efficien-
tis causæ specie, veluti in hoc libro docui. Hic, cum nihil horum fecerit, & nouandum vlceratum
locum censet, & vbi initar recentis vulneris fecerit, vt cruenta sanandum. Hoc sanẽ quis in ope-
ribus artis exercitatus non euidentissime intelligat ab eo esse scriptum, qui nunquam vlcus cura-
uit? Sanare ne vlcus diuturnum, vt cruentum, quisquam potest, vbi id simile recenti vulnere fece-
rit? vtrum ne labris eius fibula adductis, an futura coniunctis, an potius horum nullo, sed medi-
camento, quod cruentis sit aptum, & cum hoc sola deligatura fretus? Quis est, qui non norit vl-
cus omne cacoethes statim etiam cauum esse, utpote ex rosione natum? Nunquid igitur in fuisse

D Thessale fieri potest, vt coalescat cauum vlcus prius, q̃ cauitas carne sit impleta? an non est hoc, vt
cruentũ, sanare? Ergo ipse tu frustra cauorum vlcerum curandorum indicationem non esse glu-
tinationem, sed impletionem scripsisti. Quod si etiam non esset ex se cauum omne vlcus contu-
max, certe dum (vt tu præcipis) excisis videlicet labris, vt cruentũ, efficitur, ex necessitate cauum
fit, maximam q̃ conquirat labrorum distantiam: adeo, vt non videam, quõ id glutines, & coire, vt
cruentum, facias. Nam, si adducere violenter labra, quã plurimum distant, tentabis, phlegmonen
necessario accersent, nec coalescent. Id, quod tantum intelligere mihi Thessalus videtur. Subdit
enim: Si non fuerint victa, vt phlegmonen mitiges. Satiùs vero fuerat scribere: Cum non vincen-
tur, vt phlegmonen mitiges. nam necesse est non esse vincenda. Verum, vt hoc quoq; Thessalo
donetur, atq; id transeamus, nec valde anxie examinemus, illud cuius apertum est, q̃ a commu-
nitate, quam ipsemet tradidit, prorsus recessit. Quippe si, quod obstat, auferemus, nihil amplius de
communitate diuturnorum vlcerum, qua diuturna sunt, sumemus. Sed detur hoc quoq;. Vide-
mus, quã sequuntur: scribit enim ad hunc modum: Quã ad cicatricem veniunt, & rursus se ape-
riunt, hæc in accessione & vlceratione similiter curabis ijs, quã recenter vexata phlegmone sunt.
Post hæc subdit: Malagmate, quod ex sinapis semine fit, circũpositis partibus ruborẽ excitandũ.
Quid ais insane, etiam si acre & calidum sit, quod influit, rubrefieri particulam ex sinapis semine

METHODI MEDENDI

oportet, vt, quod in multo tempore cōtrahere ex fluxione debebat, id statim ex tuo medicamen- E
to obtineat, tota videlicet vlcera, atq; erosa. Nam veteres eas partium imbecillitates, quæ vel ex
frigore, vel plurimo humore, citra manifestum calorem acciderant, rubefaciendo curabant. Tu ru
breificatione in omnibus deinceps vteris: primum nullo facto discrimine, propter ne partis imbe
cillitatem, an propter fluxionis malitiam, nō sanetur vlcus. Deinde ordinem inuertis. Nam, cum
linapi particulam vseris, nec quicq; profeceris, tum ad corporis totius curationem accedis: cum
contra, vt arbitror, tum ratione, tum experimēto de ijs sit statutum, vt toto prius corpore à super
uacuis liberato, tum calidum aliquod acre q; medicamentum parti admouere sit audēdum: quip
pe eiusmodi medicamēta oīa cucurbite ritu ad se trahere à toto corpore sunt habilia. Itaq; nisi id
prius vacuaueris, materiam fluxionis acri medicamento relinques. Hoc enim tum Empirici me
dici fatētur, tum Dogmatici: hoc philosophorum optimi senserunt, nam, cum eorum quoq; me
minerit Thessalus, non alienum sit eos citare testes: quod oculum recte sanare ante totum caput
non licet, neq; hoc ante totū corpus. Sic Aristoteles ac Plato de morborum curatione senserunt,
sanē & Hippocrates, & Diocles, & Praxagoras, & Plistonius, & veteres vniuerli. Thessalus ve
ro solus nō sic, sed primum ad medicamētum ex sinapi venit: post de toto corpore sollicitus est, ne
hic quidē prudenter quicq; docens. Nam, cum liceat corpore medicamēto, quod purget, semel va F
cuato, mox salubri victu ipsum reficere, hic vociferationum meminit, exercitationum q; & gesta
tionum, & victus certo ambitu mutati, tum vomitionis ex radícula: mox summam his imponit,
ipsum veratrū: idem scilicet, qui sine vltro magno negotio oīa sanare promisit. Ego vero ne intel
ligere quidem possum, quō quisquam aut deterius, aut maiore tps dispēdio, aut inani magis ope
ra, vlcus sanauerit. Age igitur, sicut vsu non nunq; vidimus, sic verbis quoq; hominē fingamus,
cui sanari vlcus contumax sit opus. Esto aliquis, qui cetera quidem sit sanus, sed ex scabenda de
repente quapiam particula, veluti brachio, pustulā statim excitarit: mox eadem ipsa particula ite
rum atq; iterū pruritu vexetur, pustula q; dirupta vlcus decolor inæqualiter erosum gignatur: at
que hæc in tribus quatuor ue diebus à principio inciderint: dicat mihi hoc loco quispiā ex medi
cis, q Thessalum imitantur, quō nam pacto sanare eiusmodi vlcus cōueniat. Ego nāq; cacoethes
oīno id dico: & ob id, qualis sit totius corporis affectus, statim considerabo. Inueniam nanq; tum
ex vlcere ipsius symptomatis, tum ex notis, quas totum corpus præse feret, cuius maxime gene
ris sit is, qui redundat succus: atq; hunc medicamēto protinus educam, nec protraham, dum to
tus hominis cultus affectum quendam contumacē rebellem q; curationi contrahat. At Thessa
li sectatores, ipsius videlicet præcepta seruantes, primum expectabūt, dum vlcus inueteratum sit, G
quod in mirificam illam inueteratorum vlcum communitatem recidat: quasi non longe melius
esset contumacium vlcum, nō aut inueteratorum communitatem, quæ curationem indicaret,
tradere. Mox duorum alterum, aut excident, & ceu recēs vulnus reddent, ac veluti ad glutinan
dum partes eius adducent: aut primum, quod ex sinapi conficitur, medicamēto vtētur. Quo non
proficiente, ad sublatas voces, & gestationes, & reliquas exercitationes, & victū per circuitum mu
tandum confugient: ab ijs vomitionem ex radícula mouebunt. Quod si his vlcus non sanabitur,
veratrum dabunt. Sin nec id profecerit, hominem in Libyam ablegabūt: nam id quoq; adijcere
debeuit Thessalus, post eximā illam contumacium vlcum curationem. Quippe in vociferatio
nibus, gestationibus, & alijs eiusmodi immoratur, quasi malū habitum corporis (quæ chachexian
Græci vncant) non vitium humorum (quam cacoehymiam dicunt) curent. Et quid miri, si tum
fatentur se vlcus cacoethes statim, vt est natū, non nosse: tum vero, dum sit inueteratum, ac sepe ci
catricem ducat, sepe se aperiat, manent † ante, q; quid facto opus sit, intelligant: vbi etiam eos, qui
quoquo modo febricitent, accessionem, quæ tertio die futura non futura ue est, transire censent?
Adeo videlicet ad vnguem contemplationem de crisi pernouerunt, aut summū morbi incremen
tum futurum prospicere possunt. Quid igitur sepe accidit? Nempe tabescere in lectulis horū cul H
pa homines, qui statim secūdo die explicari potuissent. Quippe non semel nos, aut bis ter ue, sed
sexcenties tum ipsi multos febricitantes simul, vt prima accessio desijt, lauimus: tum preceptores
nostros id ipsum facere vidimus: intrepide q; de cetero victitare permisimus, ceu post febricari
turos: quos sapiens s. Thessalus, qui primam diatriton, (id est tridui inedia) excogitauit, pror
sus arefecisset, totis (puto) tribus diebus fame confectos: mox dein, arbitror, modice s. in quarto
die nutriuisset: ab hoc paulatim reficiens, vix sexto aut septimo ad consueta munia, qui semel fe
bricitassent, dimisisset. Adeo semper homines in morbis tabefaciunt, à quibus vtique facile pos
sent liberari. Nam, cum paucissimis diebus sanari vlcus contumax incipiens posset, Thessalus id
in annum, aut etiam longius tempus incurrere finit. Manere nanq; dum id cicatricem sæpe indu
cat, sæpe etiam se resoluat, vt scias, an contumax sit: mox, vbi curationem inceperis, ne tunc quidē
corpus statim purgare, sed primum medicamento ex sinapi, dein gestatione, & vociferatione, &
certo victu, post radícula, ab his veratro vti: hæc quid aliud, q; annum expectantis, sunt? An per
Deum immortalem, cum sex diebus, aut plurimum septē, posset homo curari, multos menses tra
hemus, quod videlicet primum, an cacoethes vlcus sit, sciamus, dein curationem inchoabimus?
Et quæ demum necessitas erat propriam inueteratorum vlcum communitatem tradendi, præ
sertim

† Impresi cod.
& manuscripti
quidam legūt
vt Linacæ: alij
ἀπὸς τὸ γυνώ
σκω. i. vt intelli
gāt quid facto
&c.

A fertim cum nihil ad curationem conducat, licuerit q̄ non inueteratorum, sed contumacium, nec horum mehercle communitatē indicatricem, sed curationem scribere? Quippe accidit quibusdā tum vlceribus tum morbis, vt contumaces rebelles q̄ ad curandum sint: nec tamen inde curationis indicatio sumitur, sed affectus ipse primam curationis indicationem suggerit. Ex ea vero, & quæ sunt agenda, inueniuntur, ad eum modū, quem ipse tradidi. Quare hoc est methodo curare, quod nos facimus, veteres imitantes: si modo methodum esse oportet vnam quandam vniuersalem viam, quæ omnium particularium sit communis. Hic vero etiā in hoc fallitur, putat q̄, quicquid omnino in ijs habetur, qui methodo aliquid faciunt, ipsam methodum esse. Nam notitiam certe habeat, oportet, tum similis tum dissimilis, qui methodo quiduis molitur: non tamē ipsum hoc methodus est, similis scilicet dissimilisq̄ notitia: neq̄ hoc Aristoteles Plato' ue affirmat, quos falso Thessalus citare audet. Verum hæc ad presens refellere non attinet. Quare rursus ad medendi methodum reuertor, promitto q̄ ostēsurum me tum vnum esse eius in omnibus curationibus principium: tum viam, quæ ab eo principio ad finem vsq̄ ducit, in oibus particularibus similem esse. Quare, etsi in singulis morbis priuata quædam methodus sanandi videtur, commune tamen in omnibus genus vnum est. Auspicari nanq̄ perpetuo oportet ab indicatione, quæ ab affectu,

B cui mederi paramus, accipitur: *Æstimare* vero ac discernere, an causa, quæ affectū excitauit, iam delierit: an nūc quoq̄ ipsum tum augeat, tum faciat: dein, si delijt, ad eā, quæ in tertio huius operis libro traditur, methodum est veniendum: sin adhuc facit, ad eam, quæ hic docetur. Quippe eādem hac methodo tum phlegmones, tum febris, tum omnium vno verbo morborū, remedia inuenias, vtiq̄, si nihil etiam nūc sit, de præcedentibus causis non laborans, sed ab ipso tantum affectu ordiens: Sin nunc quoq̄ aliquid sit, duos tibi curationis fines præponens, tum alia deinceps, vt dictum est, faciens. Sed enim mirari stupiditatem eorum, qui Thessalum sequuntur, est operepretium: non vtiq̄ q̄ in talibus delinquunt, sed q̄ dyspathias, & metasyncrises, & imbecillitates, & firmitudines, & alia id genus nomina non pauca proferentes, quæ per ea significantur, ne nūc quidem, si interrogas, respondere possunt. Nam, quid sit, quod in omnibus diuturnis vlceribus græce dicunt *μετασυγκρίνειν τὴν ἔξιν*, nec similiter inter se omnes, nec clare nec prudenter respondent. Atqui, si vel antiquum nomen esset, vel ab vilo Græcorum vsurpatum, ex ijs fortassis, quæ illi scriberēt, intelligi posset, de quo id negotio dicerent: nunc, qm̄ stupiditatis ipsorum propriū est, vtiq̄ ex Asclepiadis hypothese natum, sicut & reliqua eorum placita, æquum profectō est ipsi sua somnia interpretentur: vnde scilicet, quod græce dicitur *συγκρίνειν τὰ σώματα καὶ διακρίνειν*, quasi misceri secerni q̄ corpora dicas, solis ijs, qui corpuscula & meatus, aut indiuidua & vacuum, aut deniq̄ impatibilia & inalterabilia, prima elementa statuunt, liceat vsurpare, sicut certe usurpant, & assidue ipsis nominibus utuntur. Quin etiam ipse Thessalus in canone, cū hæc principia confirmat, nouat quidem aliquid ibi quoq̄ præter ea, quæ à Themisone & Asclepiade sunt posita: cæterum, quod sentit, docet sanè non obscure. Non enim prorsus, sicut Asclepiades, cum in symmetria quadā, (id est competentia) exiguorum meatuum sanitatem: in ametria, (id est inconuenientia) morbum constitueret: reditum ad pristinam meatuum symmetriam, sanationem putauit: ita Thessalus quoq̄ est arbitratus, sed totum exiguorum meatuum statum censet immutandum. Atq̄ ex hac opinione processit metasyncrises nomen, idem planè indicans potestate, quod græce *μεταποροπœσεις*, id est exiguorum meatuum status mutatio. Cæterum non decebat ipsum, in quibus fugere ab incertis obscuris q̄ iubet & tantum ijs cōmunitatibus, quæ euidenter apparent, animum intendere, in ijs quoq̄ Dogmaticorum uti noībus. At noli (inquiunt sectatores eius) cū his utitur, dogmatice eū audire, sed *ἀπλῶς*, id est simpliciter. Nam ita ferre suppetias ex sectatoribus eius quidā solent, uidelicet ad aliud rursus nomen nos reuocantes, nempe *ἀφ' ἑλίας*, {quam nos simplicitatem uertimus:} quam ne ipsam quidem, quid significet, ipse

D sanè intelligere possum. Si enim, sicuti ipsi hoc quoq̄ rursus exponūt, ad aliud s. magis friuolum nomen nos remittētes, nempe græce *βιωτικῶς*, quod ipsum rursus exponentes significari per id dicunt idem, quod uulgo hominum similiter, vtiq̄ tantundem fuerit *ἀπλῶς* ei, quod non definite nec exacte, sed sine omni tum arte tum scientia. Siquidem loquuntur homines, qui magis sunt ad loquendum præcipientes, artium nomina sub sensibus quibusdam, qui nullo fundamento nitantur: rogati vero, quid significant, ostendere clare non possunt. Quod si hoc Thessali isti accidere sibi fatentur, loqui se quæpiam, nec intelligere se exacte, quæ loquantur, id ipsum profectō fatentur, quod nos illis obijcimus. Nam metasyncrises illa, si quidem de immutanda poropœia, id est exiguorum meatuum statu, dicatur, certe intellectus aliquid habuerit, significauerit q̄ rem aliquam, cæterum friuolam multis modis. Nam nec ex corpusculis & meatibus corpora nostra constant: nec, si hoc verum esset, posset tamē aliquis docere, qua ratione sinapi meatuum illorum statum immutaret. Nec, si id quoq̄ ostendere aliquis posset, consentiens eorum sectæ esset, qui se apparentibus cōmunitatibus contentos esse dicunt. Ne igitur vtantur hoc nomine, nec nobis negocia facestant: licet enim & sine metasyncrises nomine, diuturnorum vlcerum curationem alijs verbis dicere, sicut Empirici faciunt. Quod autem & in Atonias, id est imbecillitatis vocabulo, simili modo nugenī, monstratum prius est in secundo libro. Si enim, sicut Empirici, nomē

METHODI MEDENDI

vsurpant, aliud prorsus non significant, q̄ q̄ actio non seruatur. Sin autem facultates aliquas gu E bernare animal proponunt, quales tum nos asserimus, tum oēs ferē veteres, prater id, q̄ Asclepiadis dogmatis contradicunt, etiam incerta, & de quibus parū inter authores conueniat, attingunt, quāuis ea fugere iubeant. Sed dic nobis Thessale clare, quid sibi velit illud μετὰ τὴν κείνῃ. Si nan que exiguos meatus mutare, & falleris, & que incerta sunt, vsurpas: Si firmari sanam q̄ reddi corporis particulam, vel hoīem totum, nihil hic prater nomen plus, q̄ Empirici, doces. Quippe sciūt hi quoq̄ remedijs quibuldam ad motis reddi hoīem sanum: ceterum, qua ratione remedia id faciant, utiq̄ nesciunt. Neq̄ enim, an exiguos meatus mutet medicamenti facultas, neq̄ an symmetrian efficiat, neq̄ an totam patientis particulē qualitatem alteret, potest Empiricorum quispiam dicere. Atq̄ illi saltem sunt modesti, ut qui vnum se solum scire dicāt, huic scilicet morbo in hoc tempore si medicamentum ex sinapi adhibeatur, sepe notasse se vtilitatem secutam: non tamen methodos loquuntur, nec supercilium attollunt, nec talī sibi notitia placent, nec antiquis maledicunt, nec Hippocratem pro nihilo habent, immo vero ipsum laudant, fere q̄ oīa vere dixisse affirmant. Hic vero Thessalus, qui tum hunc, tum reliquos oēs medicos contemnit, Empirica contumacis vlcēis praecepta se scribere non intelligit: quanq̄, si vel hoc commode faceret, utiq̄ aliquid operapretium faceret: atqui ne id quidem fecisse videtur, cum ordinem remediorum inuērat, F & prius partis remedijs vtiatur, q̄ totum corpus preparauerit. Nā hoc insignis inscitie argumentum est: cum in vno eo ferē omnibus medicis cōueniat, quamuis in plurimis dissentiat, q̄ totum corpus vacuum purum q̄ ab excrementis ante sit reddendum, q̄ vlla pars valentibus remedijs sit subiicienda. Nam, siue experientia iudicare quis velit, siue etiā ratione (tertium enim, quo iudicet, neq̄ in alia quapiam arte, neq̄ in vlla vitae parte quisq̄ habet) maximum esse incōmodum deprehendit, cum, toto corpore suam curam requirente, prius, q̄ illi sit prospectum, afflictae parti acre aliquod & calidū medicamentum sit admotū. Trahit enim ad se, cucurbitae more, ex toto corpore superuacua, atq̄ ita in grauī parte affigit, ut aegre auelli possint. Quo magis operepretium est Thessalios istos percunctari, vnde nam Thessalo in mentem venerit de contumacium vlcēum curatione talia percutari, cū nec Empiricus quisq̄ ante, nec Rationalis ita scripserit: sed nec ipse Thessalus, nec eius sequacium quisq̄ eiusmodi remediorum ordinem aut cum experientia cōsentire, aut cum ratione, affirmare auit. Adde, q̄ nec docere possunt, quomodo tempus indicet, non aut affectus: Sed neq̄ (quod hoc maius est) quomodo Thessalus, qui estimādum censet, quid sit, quod cicatricem vlcēum moretur, atq̄ id tollendum, non prorsus sit stupidus, simul cum hoc tantum satis esse non videat, diuturnitatem autem vlcēum nihil esse ad rem: simul cū non in vlcēibus modo G do, verū etiam reliquis morbis omnibus, id esse faciendum, veluti veteres monent, non aduerit. Verum ad hanc nobis nihil respondent: sed semper non recte intelligere nos dictantes, tanquam videlicet ipsi vel Hippocratis, vel veterum cuiusquam sententiam ad vnguē intelligerent, recte Thessalum dixisse affirmāt, diuturnorum vlcēum vnam quandam cōmunitatem esse: Ita enim Hippocratem quoq̄ sensisse in libro de vlcēibus, cum ita scribat: ¶ Etiā ab inueteratis vlcēibus id agere, ut sanguis crebro effluat, cōducit, quomodocunq̄ videtur opportunum esse. Fortassis ergo ad rem pertineat, tamen non predixerim me de Hippocratis mente hoc loco disserturum, vel summam aliquid de ea perstringere. Fuerit vero, quod dicemus, non minus & priscorū sensus interpretatio. Hos nanq̄ viros, ceu nullius adhuc dogmatum sectae addictos, sed pura & simplici mente studentes vtile quippiam ad sanitatem inuenire, credibile sanē est quādam vsu, quādam inuenisse ratione: tum scripsisse, quae inuenerant, subinde nō adhibita inuentionis suae ratione, aliquā vero & adhibita: atq̄ id fecisse ipsius legētium vtilitatis causa. Quippe, vbi ad dextrum inuentorum vsū conducturum posteris sperabant, si rationem inuentionis nouissent, tum eam diligenter prodiderunt: vbi secus, & superuacua relatu putauerunt, & propterea omiserūt. Nam, q̄ sermonis compendium prisci in primis coluerunt, id oēs vel me tacente iā norunt: atq̄ ob hanc H maxime causam non Hippocrates modo, verū etiam reliqui priscorum, medio interim transgresso, primo tertium adnectunt. Si enim primum secundū sit signum, atq̄ hoc tertium ex necessitate sequitur, ita tertium primo subiiciunt, secundum pretereuntes. Ostēdi vero persepe tum reliquos antiquos, tum vero maxime oīum Hippocratem, talia scripsisse: debet q̄, qui callere priscorū interpretandi genus volet, in illis exercitari. Nunc vero ipsum, quod propositum est, tm exponam.

Quid sit Vlcus, quod graecis appellatur Cacoethes: ac de Methodo Vlcēum omnium curandorum ex Hippocrate.

CAP. 5.

NAm, quae vlcera omnibus rite decenter q̄ factis tamen non sanantur, ea medici graece cacoethe, nos maligna, contumacia, rebellia ue dicimus. Diuturna autem prorsus fiunt, cum duntaxat, ut vlcera sunt, curantur. Quae vero sit vlcēum, ut vlcera sunt, curatio, in libro, qui hunc praecedit, definitum est. Hac igitur vlcera & cacoethe, & inueterata, & diuturna vocant, indifferenter his nominibus in ipsis vtentes. Quin etiam ad noscendum, q̄ affectus ipse, cacoethes id est contumax ad sanandum, sit, vna cum alijs notis etiam id, q̄ peractis etiam, quae decent, omnibus diuturna fiant, aliquam portionem habet. Non tamen aut ipsa diuturnitas, aut q̄ diuturna & vocentur & sint, idoneam curationem indicat, sed ex hoc, q̄ male affecta sit ulcerata pars, licet colligere.

Nō lōge à principio. Non hnt tamē hae verba graeci codi. spresū, sed habuis se videtur Vidij cōtextus.

»
»

Agere. Hoc vero inuento, & curationis ratio constabit. Quo, inquires, modo? Nēpe, vbi tantum eg partes, quibus vlcus infidet, ita sunt affecte, si has sanaueris: vbi totum corpus vitioſo aliquo succo abundat, si hunc vacuaueris. Ac signum quidem vitioſi succi est ipsa vlceris diuturnitas: inuētio autem eius, quod expedit, nō ex diuturnitate, sed ex succi vitio suggeritur. Quare tria hæc deinceps se habent, signum, affectio, & curatio: signum quidem, ipsa diuturnitas: affectus, succi vitium: curatio, eius vacuatio. Atq; hac ratione subinde veteres inuenias medio prætermisso tertium

Ibidem.

statim primo subiicere: veluti Hippocrates fecit, cum dixit: ¶ Tum ab inueteratis vlceribus, confert, vt assidue sanguinem efiluerē facias, vtcunq; id opportunum videbit. non vtiq; curationem indicante verustate, sed sanguinis vitio: quippe ipse mox subiicit: Prohibet nanq; maxime quidē eiusmodi vlcera sanescere, post vero etiam reliqua oīa, putredo sanguinis, & siquid ex sanguinis transmutatione est ortum. Quin ēt post paulo, cum de vlceribus, quæ ad cicatricem non veniunt, differit: Nec si (inquit) quæ vlcus ambiunt, nigricent, sanguine putri, aut etiam varice fluxionem supeditante, id genus vlcera coire possunt, nili quæ vlcus ambiunt, sana reddas. Post etiā de vari cum sanatione scribit. Ad hæc etiam purgationis meminit totius corporis, tum in alijs quibusdā vulneribus, tum ijs qbus cariem, quam sphacelon vocant, instare est metus. Præterea herpetibus,

B & esthiomenis omnibus, (id est, quæ exeduntur,) ita enim græce nominare solet ea, quæ humor

Ibidem.

aliquis erodit. Iam vero in ijs, quæ mox sequuntur, rursus ad hunc modū subiungit: ¶ In quocunq; vlcere erysipelas superuenerit, purgatio totius corporis adhibenda est. Et in summa, si curiose librum de vlceribus reuoluas, inuenies semper eum ab affectu indicationem sumere: vti vero interrim & tpe, sed ad affectum noscendum. Quod vero hæc ita se habeant, ex ipso libri ingressu agnos-

Ibidem.

cas, qui talis est: ¶ Vlcerum madefacere, quæcunq; ea fuerint, nisi vino, non oportet. Tū causam adij-

Ibidem.

ciens, ait: Nam siccum sano vicinius est, humidum vero non sano. Et mox: Vlcus enim humidū est, sanum aut siccum. Ideo q; per totum librum cum totius vlcerum curationis finem siccationē statuatur, mox particularia inuenit, etiam finis ipsius subinde nos commonefaciens. Cum enim ita

Ibidem.

scribit: ¶ Quodcunq; vlcus acuto telo cæsim percussim'ue diuisum est, medicamentū, quod cruen-

tis statim imponitur, Enemon græci vocant, ac siccās, & quod suppurare vetet, admittit. Fit enim

effluente sanguine siccus. Et rursus: Quæcunq; probe & opportune purgata, semper ad siccus

promouentur, † ijs caro magna ex parte non supercrescit, ‡ nisi si contusa sint. Et rursus: Siquid

coire nequit, humecta caro in causa est: In his oībus primæ sanandorū vlcerum indicationis nos

admonet. Siquidem vlceris, qua vlcus est, sanatio, mediocris siccatio est: cuius rei demonstratio in

C libro, qui hunc præcedit, tradita est. Verum vlceris, quod cum alio affectu coniunctum est, cuius

videlicet præcedere curationem oportet, eius curatio, vt vlceris solius, non est, sed prior illius affe-

ctus, secunda vlceris. Nam, siue phlegmone quæpiam, siue nigritia, siue ecchymolis, siue erysi-

pelas, siue œdema, vlceratam carnem obsederit, primum eius molienda curatio est. At vero, q vlcus

interim non solum nō commode curatur, sed multo ēt maius redditur, id neminem lateat. Nam,

siue contusa fuerint circūposita vlceri loca, seu phlegmone alius'ue tumor in his constitit, pro-

pria eius affectus sanatio inuenienda nobis est, illud pro certo habentibus, fieri nō posse, vt vlcus

sanetur, nisi locus, in quo consistit, prius sit sanatus. Ac proinde Hippocrates ipse redigens nobis

in memoriam ea, quæ statim in libri initio tradiderat, tum quæ reliqua paulo ante sunt compre-

hensa, tum vero hæc adscripsit: Quodcunq; vlcus cæsim percussim'ue acuto telo est diuisum, me-

dicamentū enemon, & siccans, & quod suppurare vetet, admittit. Sin caro aliqua telo tum contu-

sa, tū cæsa sit, huic ita medendū est, ut q; celerrime suppuret: nam & minus phlegmone urgebit, &

neceſſe est carnes, q; cōtusæ cæſe q; sint, putrefactas & i pus uersas liquari: postea nouā carnē nasci.

Indicat enim hoc sermone manifeste solos eos ulceratarū partium affectus non esse siccandos, in

qbus gigni q; celerrime pus cupimus, utiq; q; cū aliqua putrescentia pus fiat, obiter docēs. Porro

D oīa, quæ putrefiunt, ex calido & humido sic afficiuntur. Ideo q; ¶ Et ea cataplasmata, quæ ex hordei

farina cōponuntur, ceu quæ calefaciant humectent q; oībus ijs affectibus, quibus moueri pus ex-

pedit, admouemus. Hordei nāque farina ex aqua & oleo, item q; panis ex aqua & oleo, præterea

fomentū multæ calidæ aquæ, & tetrapharmaci uis, oīa deniq; quæ calefaciunt & humectant, ce-

lerrime pus mouent. Ideo q; ¶ Et ijs partibus, quæ phlegmone infestantur, ubi uehementius iam pul-

sitant, sic, ut iam desperetur de horum citra pus curatione, ueteres oēs eiusmodi applicant medica-

menta: ante uero nequaq;. Atq; hoc Hippocrates ipse aperte nos docet in memoratis iam uerbis,

quibus iubet, quæ sine contusione uulneratæ partes sunt, quæ maxime siccare: q; cum contusione

quadā sunt læsæ, ijs q; primum pus mouere. Quin etiā, cum dixit: ¶ Quæcunq; ulcera nō probe &

ut conuenit, expurgata, semper prius pullulare incipiūt, ijs maxime caro supercrescit: quæ uero

probe & ut decet, expurgata, semper ad siccus promouent, ijs, nisi sint cōtusa, caro ut plurimum

non supercrescit. Quippe hic illud, nisi sint contusa, quod adijcit, redigit nobis in memoriam, qd

in superius proditis uerbis est dictū, nēpe oportere oīa siccari præter ea, quæ contusa sunt. Neq;

enim, sicubi cataplasmate, quod calfaciat humectet q; illinunt, q; phlegmone infestant, ex prima

rōne id fit, hoc est, ut remediū affectus, sed ut symptomatis mitigatio: liquidem ipsius phlegmo-

nes remedia sicciorū sunt uiriū. Audi nanq; loquentē Hippocratē: Cataplasmata œdematum, &

Septima Classis.

d d d d d d iij

phlegmones

† Hæc nō sunt in græco exem-
plari: nec eosē-
su, loco paulo
post sequens,
sunt ab Hippo-
crate posita.

* γαρεῖας
est in antiquis.

Ibidem.

A. 4. f. 4. r. 3.
c. fo. 471. a

ibid. c. 2 h

METHODI MEDENDI

phlegmones, quæ in circa positæ consistit, verbas cum coctum, & folia trifolij cruda, & epipetri fo-
lia cocta, & polium: quippe oia hæc siccandi vim habet, veluti in cōmentarijs de simplicibus me-
dicamentis docuimus. Et cōpendiaria obfessarum phlegmone partium curatio per id genus præ-
sidia obitur, quæ sanè vel affectum prorsus submouent: vel, siquid exiguum, quod suppuret, reli-
querint, alterum medicamentum acre, quod educere pus queat, requiritur: vel, si tenuis circūposita
cutis sit, velis q̄ celerius explicatum egrum, sectio petenda est. Ceterum curatio phlegmones per
hordei farinā dolorē lenire studentis est, non medentis & contra malum pugnantis. Verum de
talium differentia in sequentibus plenius doceat. Illa porro mihi demonstrata manifeste puto, Hip-
pocratē tum vlcerum quæq; siccanda esse iussisse, tum hunc esse curationis finē sanxisse, ipso scilicet
affectu indicationem præbete, non tpe. Quod si quis hoc magis etiam sibi persuasum cupit, librū
eius de vlceribus totum diligētius euoluat. Intellet enim illud ipsum perspicue, tum vnā esse vl-
cerum oīum generalem curationem, nempe quam nos proximo libro docuimus: tum vero non
minus illud, nullam esse à tēpore nec in vlceribus, nec in phlegmone, nec deniq; in alio quopiam
affectu indicationem. Qm̄ vero in hunc sermonis locum peruenimus, æquum est ostendere non
modo horum, quæ iam retulimus, fuisse inuentorem Hippocratē, sed et reliquorum omnium,
quæcunq; hunc scire, qui cōmode vlcus sit sanaturus, est opus. Videtur enim is nō solū vlcerum, **F**
quæ citra alium affectū consistunt, sanandorum rationem inuenisse, vt quæ in siccādo cōsistat, sed
etiam priuatim per species affectuū cuiusq;. Nam aut vitiosus succus ad partem, cui vlcus insedit,
amplius non fluit, aut et fluit. Ac si non amplius fluit, ipsi tm̄, quod laborat, succurrendū est, si qui-
dem vel liuidum, vel nigrum, uel rubrum conspicitur, scarificando, ac sanguinē emittendo: mox
(ut ipsius uerbis utar) spongiā statim sicciorē magis, q̄ humidiorē, superimponendo neq; enim,
arbitror, ignorabit quispiam particulam illā, q̄, negationis hoc loco vim habere, tanq̄ ita diceret,
sicciorē, non humidiorē: post hæc uero et siccantia remedia applicando: ab his, si res postu-
let, rursus sanguinem auferendo: ac mox iterum talia peragendo, donec parta omnino sanitas sit:
¶ quod si labra ulceris dura callosa q; appareant, etiam ea excidendo. Etenim de his quoq; ita ait:
Circulāia ulcerum, si subcaua sint, circulo præcidere, quæ abscesserunt, oportet, uel oia, uel ex di-
midio circuli fm̄ hominis longitudinem. Scripsit uero & de tumoribus, qui cōiuncti cum ulcere
sunt, uniuersis, quemadmodum curandi singuli sint: simili modo & de uariis, quādo horum
quoq; occasione contumax ad sanandum vlcus redditur, qm̄ aliqua ex his humiditas ad exulcera-
tas partes defluat. Ad eundem modū, & cum ex toto corpore humor confluit, totum purgare iu-
bet, nusquam uidelicet in his indicationem à tempore sumens. Nam & ridiculum planē sit adeo
multas ac uarias sæpe et contrarias indicationes ab una communitate fieri. Nam, si etiam demus
indicationem aliquam à tpe sumi, quæ tandem ea sit, dicere par est, ac summa quapiā una eā com-
plecti: ueluti in reliquis omnibus ipse quoq; Thessalus facit, nedū nos. Quippe unum illi perpe-
tuo indicat astricti corporis affectus, nempe ut remittatur ac relaxetur: unum rursus soluti, utiq;
ut adstringatur. Quin etiam in ipsis ulceribus, quod sordidum est, abstergeri postulat: quod caui
est, impleri: quod æquabile est, cicatrice induci: cui caro supercreuit, hanc sibi detrahi, etiā eo ipso
authore. Ergo, sicut in horum singulis, ita in diuturnis quoq; alterum aliquid ad portionē osten-
dat, quod unum sit: uerum non potest: nam & excidenda ea præcipit. At, quæ nam, quæso, sit ista
rationabilis à tempore indicatio: tum remedio ex sinapi uti, de quo uanum illud nomē metasy-
n criseos usurpat: ab hoc ex radícula uomitu: & postremo, cum nihil ultra inueniat, ueratro. Verū
hæc quidem (quemadmodum dixi) etiam in sequentibus plenius dicetur, ubi nihil usquam ullo
in morbo à tempore indicari, sed signum id non nunquam affectus esse docebimus.

*De Indicationibus Vnæ sectionis, & Humorū purgationis, quæ ab Vlceratarum partium
temperamento, & substantia sumuntur.*

CAP. 6.

Verum rursus ad Hippocratē reuortor: Quæ sanè diligētis noīe admiror cum in alijs oībus, H-
tum uero q̄ scopū, qui medico ad indicationē non in uno altero ue, sed prorsus omni mor-
bo, sit spectandus, nō omiserit. Est porro is, qui ab affectus magnitudine sumitur, quæ non modo
Methodici prætermiserunt, (non enim est id mirum) sed et rationalium plurimi, atq; etiā Empi-
rici (quanq̄ alio modo) oēs. Nam, ubi t̄ in redundantis sanguinis (ut illi loquunt) concursu, u-
acuationem à se obseruatā dicunt, manifeste fatent ob nullius alterius eorum, quæ in agro uiſunt,
respectum, se ad uacuationem accedere. Neq; hoc dico propterea, q̄ purgatio uacuatō sit, quam
redundantis sanguinis concursus non indicet, sed q̄ et, tametsi redundantis sanguinis concursus
nō ad sit, ad ipsam t̄ sanguinis missionē interdū sit confugiendum: qm̄, si ualens morbus sit cū ui-
rium robore, nemo est, q̄ sanguinē non mittat, q̄ utiq; in artis operibus sit exercitatus. Quippe ip-
sos Empiricos uidemus, cū lapsus ab alto quis sit, aut aliàs plaga aliqua cōtusa uehementē corporis
partes habuerit, ad sanguinis missionē confugere, quanquā idem homo paulo ante sanus fue-
rat, prorsus q̄ redundantis sanguinis expers. Ex quo patet nō hoc esse, quod mittendum sangui-
nem indicet, sed magnitudinem morbi, ac uirium robur, exceptis tamen à sermone pueris. Nā &
alia ratione, si quis etiamnum sanus, nec adhuc quicquā lēsus, in sanguinis redundantis concursu
sit positus, non statim huic mitti sanguinem est necesse: imo alijs satisfacit inedia, alijs cibi parcitas,
alij

Ibidem.

† ἐπὶ τῇ πλη-
θεινῇ καὶ
ἐν τῇ συνδρο-
μῇ

A. l. 4. f. 4.
c. 1. fo. 472

A. l. 4. f. 4.
c. 1. fo. 466

A alij soluta aluus, vel purgatio, vel frequentius balneū: alij sola exercitatio, vel multa frictio abunde fuit. Missio vero sanguinis ne ab ipsis quidem Empiricis, ijs, qui ita se habent, necessario adhibetur. Ad eundem modum nec purgatio in sola vitiosi succi abundantia cōuenienter suscipitur. Sed, sicut missio sanguinis vel propter ipsius abundantiam, vel propter morbi magnitudinem, ita purgatio & propter abundantiam alterius cuiusquam succi, & propter vim morbi adhibetur. Ac de sanguinis missione tum in alio libro egimus, tū vero in sequentibus agemus. De purgatione in hoc libro disseram: desiderant enim egri hanc, non modo ut quod noxium superuacuum, quo vrgētur, educat, sed etiam ut quod tum ad diuersum trahat, tum vacuet. Atq; ob eam rem Hippocrates tum in reliquis omnibus operibus, tum in eo, quod de vlcerebus prodidit, etiam morbi magnitudinem ad purgationis indicationem considerat.

Ibidem.

¶ Purgatio, inquit, per aluum plurimis vlcerebus prodest: præterea vulneribus, quæ in capite sunt accepta: item, quæ in ventre & articulis: ad hæc ijs, in quibus ossi caries impendit. Præterea, quæ fiunt, & quæ exeduntur, & herpetibus, & reliquis quæ vlcera diuturna reddunt, etiam quæcūq; deliganda sunt, per aluum purganda sunt. His verbis clare docuit vlcerebus omnibus & vulneribus, quoties præualida sunt, purgationem esse vtilem. Cum. n. trifariam non hæc modo vitia, verum etiam reliqua oīa graua magna q;

B reddantur, nempe vel propter afflictæ partis præstantiam, vel propter affectus magnitudinem, vel propterea q; sunt cacoethe, cuiusq; horum seorsum videtur Hippocrates mentionē fecisse, utiq; in capitis ventris q; vulneribus præstantiam læsæ indicans partis. Ventrē autem hoc loco non solum inferiorem intelligendum esse, sed et superiorem, patere cuius arbitror. Diuiso namq; quod inter collum & crura est trunco in duas capacitates maximas, prior sub thorace, secūda sub membrana, quæ abdomini subtenditur (Peritonæon Græci vocant) continetur. Et sanè vulnus, quod intra thoracem intra ue etiam peritonæon penetrauit, nō paruum periculum affert, potissimum siquid interiorum vnā sit vulneratum. Quin etiam cacoethe statim fieri, quæcūq; in articulis accepta vulnera sunt, id quoq; oēs ferē sciunt, Empirici quidē ex sola ipsa experientia, cui soli attendunt: qui vero corporis naturæ scientiam comparare studuerunt, ex ipsa vulneratarum partiū natura. Vbi enim tēdones, & nerui, & carne vacua, atq; ossæ loca sunt, hic doloris, vigiliatū, cōuulsionis, & delirij periculum instat. Tum hæc igitur vulnera, tum quæ fiunt, id est quæ adeo sunt magna, ut futuris indigeant, aut si non his, certe deligatura, alui purgationem desiderāt. At vero iam dictum in proximo libro est, quæ magna vlcera sunt, ea vel futuris vel deligaturis esse coniungenda. Quin et, quibus corrumpēdi ossis periculum impendit, ea utiq; cū magnitudine phleg-

C mones sunt. Iam, quæcūq; exeduntur, ea tum cacoethe sunt, tum malorum succorum soboles. Herpetes quoq; a bilioso excremento ortū habent: reliqua q; quæ inueterātur oīa, ex huiusmodi quapiam causa proueniūt. Quare in oībus his non sine ratione purgare per aluum iubet. In progressu vero hæc insuper adiicit: In omni vlcere, cui erysipelas superuenit, purgari corpus oportet, qua parte vlcere maxime cōducit, siue id per superna, siue per inferna sit. Cuius et ipsius rei discri-

Lib. de Humo.
a principio.

men in libro de succis nos edocuit, auertere ¶ nos iubēs ad contraria, deriuare vero ad latera: quin etiam, cum maxime influit, tum ad diuersa reuellere. Dictum vero & de hoc in eo libro est. Quare nunc quoq; si etiamnum fluxio valēter irruat, reuellere ad contraria studebimus, utiq; si in superioribus vlcus consistat, per inferna purgantes: sin aut in inferioribus sit, superiorem ventrem vacuantes. At, si iam fluxio restitit, atq; in membro inhælit, deriuare per vicina magis expedit: cum & in propinquiora translatio sit, & purgati medicamento promptior tū accessus, tum attractus è vicino detur. Hanc vero rōnem ad aliam quoq; artis partem spectare, nempe quæ de succorum medicatione præcipit, neminem latere arbitror. Proinde q; in sequentibus etiam repetere eā erit necesse, ac totam absolvere. Nunc illud docere volo, tum ipsam morbi siue vim, siue magnitudinem appellare velis, pro indicatrice quadam sanguinis detrahēdi, vel purgationis adhibendæ statuendam esse: tum vero Hippocratem hanc oīum, quos nouimus, primum indicationem adinuenisse. Ac de alijs quidem morbis in sequentibus libris id ostendā, de vlcerebus vero in hoc, qui in manibus est. Ac de purgationibus quidem mihi explicatum iam est. Nam, cum triplici genere morbus quisq; sit grauis, aut propter præcellentiam partis, aut propter affectus magnitudinem, aut propter ipsius cacoethean, omnium horum meminuit Hippocrates, vbi de purgatione egit. Quid igitur (dicet aliquis) nunquid etiā sanguinem detrahi interdum suadet propter has ipsas causas? Mihi vero id quoq; iubere videtur, uerum breuiter nec sine demonstratione: ueluti tum ipsi, tum reliquis mos fuit. Id ita esse intelliges, primū quidem, si hæc eius uerba relegeris: Omni recens facto uulnere, nisi in uentre sit, expedit ex ipso statim sanguinem plus minus ue effluere: quippe phlegmone minus tentabitur tum ulcus ipsum, tum quæ circūposita loca sunt. Post hæc autem, si uerba, quæ in libro de vlcerebus ab eo ¶ sunt scripta, tum quæ in alijs oībus libris sæpe proposuit, recorderis, debere scilicet imitorem esse medicum non tantum naturæ, sed etiam eorum, quæ, cum sua spōte ueniunt, conferunt, clare iā senis mentem intelliges de sanguine, cum magna sunt vulnera, detrahendo. Si nāq; expedit in talibus sanguinem effluere, non aut effluxit, quod deest, ipse adijcias, oportet: declarat id ea, quæ subiūgit, quippe hæc statim cum dictis uerbis copulat:

Non longe a
principio.

Et ab ijs, quæ inueterata sunt ulcera, ut sanguis crebro fluat efficere prodest, utcūq; opportunum

Septima Classis.

d d d d d iij

uidebitur,

METHODI MEDENDI

videbitur, tum ab ipsis vlceribus, tum à circūpositis vlceri partibus. Nam, qm̄ prædixerat omni E vlceri recens factō sanguinem emitti debere, cernens, nisi etiam de inueteratis mētionem faceret, fore vt ab aliquo putaretur de recentibus tm̄ ita pronunciaſſe, idcirco illud recte adiecit, & ab inueteratis vlceribus sanguinem mittendum eſſe. Ac, ſi perpetuum eſt, quod ab eo didicimus, incipientem fluxionem ad cōtraria trahēdam eſſe: fixam vero iam in laborante particula vacuandam eſſe vel ab ipſa particula, quæ affligitur, vel à maxime vicina: in promptu nobis et de sanguinis de tractione colligere nunc eſt, q̄ in principio hæc è longinquo, poſtea ab ipsis exulceratis partibus, ſit emolienda. Quin etiam, ſi ijs, quæ iam dixi, illud quoq; adiicias, nempe q̄ ipſum, qui redundat, ſuccum vacuandum eſſe Hippocrates ſuadet, aliàs sanguinis detractionem adhibebis, cum videlicet is vincit: aliàs pharmacum, quod ad bilem flauam, vel atram, vel pituitam educendam vim habet, dabis. Illius interim in oībus his non immemor, non eſſe vlceris, quæ vlcus eſt, vllam id genus curationē, ſed vel vitioſi, qui conūctus eſt, ſucci, vel redundantia, vel phlegmone, vel herpetis, vel eius generis alterius: Sed nec illius oblitus, q̄ aliquid interim ex ijs, quæ vlceribus accidunt, indicationem propriā ſuggerat, veluti & magnitudo. Dictum aut̄ & de ipsis vlceribus eſt in libro, qui hunc præcedit: vbi vlcerum differentias oēs, & quot, & quæ ſint, & quæ ſit vniuſcuiusq; indicationis, expoſuiſimus. Præberi tamen vacuandi indicationem ab ipſa ægritudinis vi, in eo libro non F dixi propterea, q̄ & longiorem demonstrationem requirebat, & totius corporis curam cum vlceribus in eo non coniunxi: hic vero exequutus ſum, quantum ad rem propoſitam erat vtile.

De reliquis Indicationibus V lcerum curandorum, maxime vero de ijs, quæ à Poſitu, &

Figura partium oriuntur.

CAP. 7.

παρὰ τὸν ὄντων.

NAm absolutus ſermo de hoc genere indicationis, quā à magnitudine morbi ſummi diximus, ēt in ſequentibus habendus reſtat: pari modo de indicatione, quæ ab ætate ſumitur: præterea de ea, quæ ab humoribus ſanandis accipitur. Ad eundem modum, & quæ ab afflictiſ partibus indicatio exhibetur, cōſummatius in ſequentibus libris tradetur. Nunc enim, quod ab earum natura, id eſt temperamento, & ſubſtantia ſummi ad curationem potuit, tm̄ diximus: quæ vero tum à poſitu, tm̄ à forma, item q̄ vſu, præterea ſenſus acumine hebetudine ue, indicatio ſuggeritur, hanc nō attigimus. Dicatur itaq; & de his, quātum ſit ad vlcerum curationem vtile. Igitur, quæ acuti ſenſus pars eſt, eam q̄ maxime citra dolorem curare tentandum: tradita vero ei uſuſmodi remediorum materia eſt in ijs libris, qui ſunt de ſimplicibus medicamentis inſcripti. Quæ parum acri ſenſu eſt, hæc, ſi affectus ita ſuadet, valentiora remedia recipit. Et principis quidem mēbri robur ſeruari oportet: veluti latius, vbi de phlegmone agemus, docebitur: Quod tale non eſt, licet, huic eā G medendī rationem tutō adhibeas, quæ relaxando remittendo q̄ mitiget, Chalacticen Græci vocant. Atq; hæc quidem in ſequentibus ſuſius tractabimus. In hoc libro indicationem, quæ & à poſitu, et à figura partium ſumitur, trademus, atq; ita quarto huic libro finē imponemus. Hinc igitur excogitatum eſt ei, cui exulceratus ventriculus ſit, medicamenta eſſe bibenda: Cui gula, non ſemel, nec tota ſimul aſſumenda, ſed paulatim & aſſidue: quando ex tranſitu & contactu vulneribus, quæ hic ſunt, vtilitas accedit, non ex continendo, & diutius adherendo, ſicut ijs, quæ in ventriculo ſunt. Quinimmo, & q̄ craſſiora hæc & magis lenta ſint adhibenda, id quoq; à poſitu figura q̄ eſt indicatum. Nam, qm̄ gula tranſitus quidam comeſtorum bibitorum q̄ eſt, idcirco remediorum eget, quæ adherere, & vndiq; quaſi concreſcere, & agglutinari poſſint: non autem quæ elui ac deſluere ſint prompta. Ac circa partes eius veluti concreſcunt, quæ craſſa ſunt: agglutinantur, quæ lenta ſunt. Quæ vero vlcera in craſſis ſunt in teſtiniſ, ijs, quæ per ſedē inſciunt, remedijs magis egent, quippe cui magis ſunt propinqua: Quæ in tenuibus habētur (qm̄ & longinquiora ſunt, & medio ſitu poſita) ambo requirunt, & quæ ſuperne ſumuntur, & quæ per ſedem in fundū tur. Sanē cōis oīum internarum partium indicatio eſt, vt ea eligantur, quæ animalis nature maxime ſint familiaria, ſiue ea cibi ſint, ſiue medicamenta: fugiant reſpuant q̄ huic contraria: quanq̄ H in ijs, quæ foris ſunt, vlceribus innoxius ēt talium medicamentorum eſt vſus, eruginis, eris q̄ vſti, & eris ſquame, & cadmię, & pompholygis, lithargyri, & ceruſſę. Hæc igitur, & ſimilia interioribus exhiberi non debebunt. Porro proditum de natura horum eſt tum in tertio de temperamētis volumine, tum in libris de ſimplicibus medicamētis. Eligenda vero alimēta ſunt, ſi quidem ad cicatricē perducere, aut glutinare vlcus ſtudemus, tum auſtera, tum glutinoſa, tm̄ quæ minime mordeant: Sin emundare, quæ modice abſtergeant: quod munus mel non coctū præter cetera præſtat. Auſtere vero potiones, & eiufdē rationis alimēta cuiq; ſunt nota. Voco auſterum id, qd̄ Styphō quoq; græce, id eſt adſtringens, dī: Acerbum vero, quod intēſum auſterum eſt, græce Stryphnon. Quæ vero medicamenta citra internarum partium moleſtiā ſumantur, ea tradita ſunt in ijs libris, qui de medicamētis ſunt ſcripti: dicetur tm̄ & nunc eorum formula. Ergo internis vlceribus opitulātur hypocyſtis, & balauſtium, & cytini puniceorum, & galla, & malicorium, & terra ſamīa, & lemnium ſigillū, & rhois roſarum q̄ ſuccus, & acacia, alia q̄ id genus, quæ vlceribus internis præſidium afferunt, nec vllam viſceribus noxā inferunt. Danda vero hæc ſunt ex aliquo adſtringentiū decocto, vel mali Otonei, vel lentici, vel ſummorū rubi vitis ue, vel myrtorū, vel deniq; ex vino aliquo auſtero. Non latet aut̄ & de vini vſu, quod cauēdum id eſt, vbi phlegmoneſ ſuſpicio a deſt,

** οὐκ ἔστιν ἀσκήσιον*

A. l. 4. f. 4. t
c. 2. fol. 472

A adest: aliàs dari nihil vetat. Nec illud obscurum est, eiusmodi medicamina præparanda, ac iam dictis humidis excipienda esse: tum vero tragacanthæ & gummi illis admiscenda, potissimum si quis ea iis, quæ in gula sunt, exhibebit. Sed & gargarizare quoque iubendum est ei, qui ad fauces & paristhmia his utetur. At ad vlceris, quod in aspera sit arteria, ut lupinus quàm diutissime in ore teneat, ac omnes, qui illic sunt, musculos relaxet remittatque, præcipiendū: influit enim sic sensim & paulatim de medicamento aliquid sensibilibiter & manifeste in ipsam arteriam: nam, & cum naturaliter se habet, scire licet potionis non nihil huc percolari. Sed, veluti in secūda valetudine, ita nimirum in aduersa cauendum est, ne largius influat, utpote quod tussim excitabit. Nam, quoad humor vndique iuxta tunicas arteriæ, ceu iuxta murum aqua, descendit, tussim utique non cit: liquid per mediā spiritus viam incidit, tussis statim excitat. Tum hæc igitur à situ & forma partium omnia sunt desumpta: tum vero non minus illud, quod omnibus medicamentis, quæ thoracis & pulmonum vlceribus sunt destinata, mel sit admiscendum: quando, si austera iis duntaxat medicamenta exhibebis, ea in ventriculo morabuntur. Ergo digestionis eorum in corpus, instrumentum mel erit, ac celeris transitus veluti vehiculum: cum eo, quod nec vlceri nocebit. Ad eundem modum, quoties in vesica & renibus vitium consistit, non solum mel ipsum, sed etiam eorum, quæ vrinas mouēt,

B quippiam, vlcerum medicamentis misceri oportebit. Illud quoque patere, vel me tacente, cuius arbitror, exulceratas partes tum ex earum substantia, tum functione, tum utilitate, tum positu, tum figura discerni. Monstratum autem id abunde est in libro de notis affectorum locorum. Verum non est de illis nunc locus. Rursus igitur ad medendi methodum reuertor. Aio igitur non hæc modo, sed etiam alia non pauca ex figura partium posituraque indicari: quippe quando nec deligare commodè agram particulam possis, nisi prius vel ex figura, vel positura, vel utrisque, indicationē sumptis: sed nec inmittere in sedem clysteris fistulam commodè queas absque eius generis indicatione. Iam per penem inicere medicamenta in vesicam sæpe necessum est. Illud de cathetere apponere opus non est, quod eo probe uti omnino nequeas, nisi & positum & figuram totius vesicæ planè perspectam habeas. In talibus ergo omnibus clare patet non parum ad totam curationem affectum ipsum locum indicare. In ruptis autem, (quæ Rhegmata Græci vocant,) plures indicationes in idem concurrunt: siquidem, & quæ à positura capitur, recte ad examen venit. Nam propterea, quod & in profundo corporis sunt, & latet, idcirco diuersam curationem ab iis, quæ apparent, postulabunt. Quoniam vero cum ecchymosi quidem omnino, aliquādo vero & cum contusione circum ipsam præruptā carnē consistunt, idcirco plures curationes indicabunt: semper enim

C pro affectuum numero, etiam medendi indicationes respondent. Ac docebitur quidem, vbi de phlegmone differemus, locupletius, quod valentiora medicamenta requirant, quæcunque in profundis partibus laborant, quàm quæ in summo corpore sunt affecta. Nunc id saltem arbitror patere, quod solui necessum est præsidiorum, quæ foris applicantur, vim, vbi, quod ab his iuuandum est, in profundo latet: quare intendere hanc eatenus oportebit, quatenus per transitum ad profundum est remittenda. Sanè ecchymosis omnis, vacuationem pro remedio curationis indicat: quare calfacientibus huic & modice siccantibus medicamentis est opus. Quippe, quæ vehementer siccant, digerunt illa quidem in principio euidentius, quàm quæ sunt imbecilla, cæterum non nihil ipsius vitij scirrhosum difficileque curatu relinquunt. Ac dicemus de his in sequentibus diligentius: sed & nunc, quantum ad rem pertinet, abunde est dictum. Quæ enim humectant calfaciuntque phar maca: præterea hæc, quæ omnes iam græce vocare Chalaistica, id est relaxantia, solent: atque ex his quæcunque ad liccius paulo vergunt, nec tamen adhuc clare manifesteque contrahentia sunt, quæ Syntactica vocant: hæc omnium sunt ecchymomatum remedia. Curandum vero est, ut vnà cum ruptis, quæ in profundo hærent corpore, hæc tum vires magis habeant intentas: tum ipsa magis acria magisque dissipantia sint: tum (ut semel dicam) tanto efficaciora, quāto magis à cute ad profunda ecchymosis recessit. In talibus sanè nec cucurbitæ usus sit inutilis: id etiam est instrumentum ad violentum attractum à medicis excogitatum. Cæterum, cum totum ecchymoma digestum per halitum est, siccare iam vehementius ruptum ipsum permittitur, ac deligatura coniungere, omniaque in summa facere, quæ, ut vlceris coalescat, efficiant. Ergo, si euocatum celeriter ecchymoma sit, facile coalescet rupta ipsa caro: sin longiore spatio, sordes multa subnascens medium inter vlceris labra spatium occupat ita, ut iam coire ruptio non possit. Atque inde adeo fit, ut qualibet leui de causa nos hæc sui admoneant: nam, siue quis obrigit, siue parum concoxit, siue febris laborauit, siue se vehementius fatigauit, eiusmodi particulis ilico dolet: non enim in id coiere ruptionis labra, sed tantum prope sunt admotæ: quo fit, ut leue momentum ea facile separet, & medium locum superuacuo humore repleat. Et quid, quæso, aliud, quàm assidue nouum ecchymoma his gignitur: & primo illi, cum videlicet primum caro est rupta, simile: nisi quod nunc ex tenui magis sanie constat, cum in principio è sanguine ecchymoma esset: ideoque facilius etiam nunc, quàm intra initia, digeritur.

Hæc itaque, quæ hæcenus diximus, disputationi de vlceribus satisficient. Finemque iam quarto huic

volumini impono.

Galen

* ΑΡ. ΞΗΡΑΝΤΙ-
ΚΑ. Ι. ΕΚΚΥΜΑΤΑ.

* ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΤΕ
ΡΑ. Ι. ΙΝΚΙΔΕΝΙΑ.

Pl. 4. f. 4. l. 2.
c. 467a

A. 3. f. 10. l. 3.
c. 274. f

GALENI METHODI MEDENDI ID EST DE MORBIS CVRANDIS LIBER QVINTVS

ARGVMENTVM LIBRI

Sanguinis Profluvia, quæcunque venis vel arteriis læsis contingunt,
sanantur, ac Vlcera in pene vel in sede,

Epilogus vniuersæ Vlcera curationis superioribus libris explicata.

CAP. I.



Vemadmodum quis vlcera curationem optime molitur, cum duobus ante hunc libris docuerimus, illud obiter ostendimus, reliquos oēs medicos, qui simpliciū in nobis particularū elementis minime inquisitis artē adeunt, non posse quicq̃ certa rōne sanare, minime q̃z omniū, qui Thessali dogma profitetur. Reliqui nanq̃ ea saltē vlcera, quæ in diuersis sint partibus, diuersis rōnibus sananda censent, ipsa nimirū experiētia docti. Qui vero Thessalum authorē sequuntur, propter excellentē scilicet sapientiam, omne vlcus, quacūq̃ in parte animalis sederit, similis egere curationis putant. Quippe, si cauum sit, impleri: si equale, cicatrice induci: si caro supcrescat, hanc detrahi: si cruentū, recēs q̃z sit, agglutinationē postulare aiunt: ceu vero, qui hæc norit, eū recte mederi sit necesse: nec sit hæc ratio et cuilibet ē plebe cōmunis, cum nemo sit, qui horum quicq̃ ignoret. Ceterū nec, quemadmodū carne implendus sinus sit: nec, quēadmodum ad cicatricem perducī, quod impletū est, debeat: aut cōprimi, quod suprauctum: aut coalescere, quod purum citra q̃z sinum est, intelligunt: sunt enim eiusmodi opera tantū medicorū, quæ vel ratione, vel experiētia, vel vtriusq̃ ope sunt inuenta. Rursus igitur repetētes, summam ea percurramus, quod dicendorū caput cum dicorū copuletur calce. Monstratū est omne vlcus siccantia medicamenta requirere: Ceterū, quod sinū habet, vt minus sanē, q̃z reliqua, sic ea, quæ, præterq̃ q̃ modice siccant, etiā abstergendi facultatem obtineant, deliderare: Quod vero cōiungi libi labra postulat (cuiusmodi scilicet sunt, quæ medicis latine Cruenta, græce Enama dicuntur) huic tum, quæ magis etiā siccant, tum vero, quæ citra G abstersionē leuiter adstringant, opus esse: Iam, quæ vlcera perducī ad cicatricē postulant, hæc non solū magis adhuc siccantibus, sed etiā strenue adstringentibus remediis egere: Quod si caro eorū præter naturæ modum intumuit, acria & demolientia (quæ eadem calida sicca q̃z necessario sunt) deliderare. Si quod vero aliud symptoma vlceri adiunctū erat, ab eius natura curationis indicatio sumebatur: atq̃ ex hac rursus remediorū facultas petebatur: Si nanq̃ sordes innascere, quæ hanc tollerent, opus esse: ea q̃z omnia abstergendi vim habere multo sanē maiore, q̃z ea, quæ carne implerent: Si vero copiosior in his humiditas cerneretur, etiā quod magis siccaret, medicamento opus esse, ceterū quod propriam speciem non egrederetur: Ac, si agglutinatū medicamentum esset, siccans adstringens q̃z id esse debere: si carne impleturū, siccans & abstergēs: atq̃ in singulis reliquorū, vt dictum est: Si vero intemperata subiecta caro esset, primū eius intemperantiæ succurrendum esse, vtq̃z, quæ siccior iusto esset, hanc humectantibus: quæ humidior, siccantibus: tū quæ calidior esset, refrigerantibus: quæ frigidior, hanc calefacientibus: & si gemina qualitate esset intemperata, pharmacum quoq̃ eligentibus, quod gemina esset qualitate cōtrarium: Quippe id oīum, quæ præter naturam sunt, cōe esse, non posse ad naturam suam redire quicq̃ sine iis, quæ ipsi facultatem haberent contrariam: Considerādas præterea & intemperantiæ causas hoc tempore H esse, siue hæ totius corporis essent cōes, siue quarundam partium propriæ, quæ videlicet per societatem (quā Sympathean vocant) exulceratum membrum infestaret: Medendum vero primū esse causæ, quæ intemperantiā adhuc foueret: post hanc vero ipsi, quæ iam facta esset, intemperantiæ: quippe hanc cōem indicātionem esse omniū, quæ ex causa quapiā oriantur. Ostendimus aut tum ab vlcera differētijs diuersas præberi indicationes: tum eas, quæ à laborantis corporis tēpe ramēto sumunt, diuersam ab his habere rationē. Siquidem illæ, cū ex iis, quæ præter naturā sunt, sumant, oēs contraria esse adhibenda dicant: hæ, cum ab ipsa natura capiant, similia. Nam, si quæ siccior pars est, ea magis sicari postulat: quæ minus talis est, ea minus est siccanda. Ad eundē certe modū & de calefaciendo refrigerando q̃z est præceptum. Nec illud omisimus, ex præcellentia membri, aut contrario statu, item q̃z ex sensu acri hebetē ue diuersum medicandi consilium peti.

De Vnitatis solutione in Vena, vel Arteria.

CAP. 2.

ERgo, quod reliquum est huius morborum generis curadi, id nunc apponamus. Nos genus id, lucidioris doctrinæ causa, vnitatis solutionē appellauimus: nec refert, si cōtinuitatis solutionē voces. Incidit hæc nō in similaribus modo, & simplicibus partibus, sed et in cōpositis, & instrumentalibus. At vero remediorū indicationes aliæ à similaribus sumunt, aliæ ab instrumentalibus.

A. li. 3. f. 10.
c. 18. 271. f.

Abus. Quarū ambas norunt, qui methodū Hippocratis consecrānt, propterea, q̄ vtrarūq; partiū naturam intelligunt: alteram autē duntaxat (nempe quæ ab instrumentalibus prebetur) qui Erasistratum, & Herophilum sequuntur. Quare in iis, qui sequuntur, sermonibus, quæcūq; a calido, frigido, humido, & sicco, corpore morbo ve indicationes sumuntur, nullius certe methodum hi habebunt: quæ vero à fornia, positu, præcellentiā, acri sensu, aut his cōtrariis prebentur, has nō ignorabūt. Illustrius erit, quod dicimus, si partes ipsas proposuerimus. Quoniam igitur de iis maxime vlceribus, quæ in carnosīs accidunt partibus, hæcenus abunde tractauimus, nunc tempestiuum videtur de iis agere, quæ in arteria, vena, & neruo cōtingunt: nec de iis absolute, sed vt in quouis sunt viscere, vel deniq; instrumēti animalis parte. Ergo, sicuti arteria vena'ue magna vulnerata est, & copiosum sanguinis profluuium cōtinuo superuenit, & glutinari id vulnus difficile quidē etiam in vena est: in arteria vero nō solum difficile, sed etiam quod fieri (sicut non nullis medicorum est visum) omnino fortasse non possit. Dicēdum ergo viciissim de vtriusq; est, ac prius de sanguinis profluuiō: secūdo loco de agglutinatione. Qm̄ autem, & per anastomosin, & per diapedesin, vt mox docebimus, profluuiā huiusmodi fiunt, non alienū sit propterea, q̄ curationem communem habent, etiā hoc loco de iis meminisse, tametsi ex alio esse morborum genere videantur.

B Sanē⁹ profluit ex vena, vel arteria sanguis, aut reserato earum ore, aut tunica earū diuisa, aut (vt sic dicam) trāscolatus, siue sudoris modo trāsmisus. Porro diuiditur ipsa tunica tum ex vulneratione, tum contusione, tum ruptione, tum erosione. Anastomosin accidit propter tum valis imbecillitatē: tum sanguinis, qui ad os eius impetu ruat, copiam: ad hæc, acrem quāpiam, quæ illi extrinsecus incidat, qualitatē. Diapedesis vero ex tunica quidem ipsa rarefacta, sanguine vero tenuato oritur: accidere præterea interim potest & ex gracilium vasorum ore adaperto. Dicendum igitur est de horum affectuum vnoquoq; seorsum: ac primū de diuisione, quam vel ex erosione, vel vulnere, vel contusione, vel ruptione diximus accidere. Quæ itaq; vulnerāt, ea sunt acuta, atq; ad secandum habilia: quæ cōtundendo soluunt, ea grauiā dura q̄ sunt: quæ rumpūt, omnia id tensionis interuētū faciunt: idem & intensior actionis vehementia facit, tū succi abundantia, non vtiq; virium respectu, sed cum à vase suo non continetur: etiā casus ab alto, tū graue quippiam durū q̄ incidens. Quippe eiusmodi aliquid cum vel valis vacuis, vel pusillam omnino rem cōtinētibus, in ea inciderit, si durum ex opposito obiectum habet, cōtusa reddit: At, si plenum vas sit, prius id rumpit, q̄ contundat: cū sit, quod tū accidit, per simile, ac si virem vesicani'ue impleas, atq; in hāc lapidem iactes: vel cōtra lapidē virem violenter illidas. Sanē huic per simile est, quod accidit in cabsibus ab alto: quam nanq; rationem vter habet ad lapidem, hāc homo habet ad solum. Quisquis vero ex maximo acutissimo' q̄ clamore, in pulmonibus vas perfregit, is violētia actionis acceptū malum referet. Similiter huic, & qui ex eo, q̄ prægrauē onus aut humeris imponere est conatus, aut aliās manibus attollere, vas fregit. Atq; hoc etiam magis, cui ex cōcitatissimo cursu, aut valentissimo saltu, aut aliter particula vlla violenter extensa id accidit: est enim id quoq; per simile, ac si funiculum, aut lorum quā maxime distendas. Porro perrumpi quoq; non pauca propterea, q̄ sanguinem, quem in se habent, non cōtinent, potissimum cum flatulentus is sit, indicio sunt tum dolia, quæ saepe multo rumpuntur: tum alia multa valentissimorum corporum.

Quibus remedijs Venarum & Arteriarum Vlcera agglutinari, & Fluxus sanguinis deriuari, ac reuelli queat.

CAP. 3.

AC, si ex vulnere, vel clamore, vel casu, vel contusione perruptū vas est, vtiq; in his causa ipsa desuit: Si vero ex abūdantia, fieri potest, vt vas ēt amplius rumpatur, effēctrice saltem adhuc manēte causa. Atq; in hoc quidē affectu vacuanda quā primū abundantia est: abhinc sanguis supprimendus: mox vlcus ipsum curandum. Vbi vero effēctrix causa iam desuit, primum sistere sanguinem expediet, post vlcus sanare. {Quomodo igitur sistemus sanguinē?} Obturato' quidē, D quod perruptū est: auerso autē atq; aliorum trāslato, quod per id ferebatur: qn̄, si id eo, quo inter initia, impetu cōfluat, osculū q̄ valis pari modo pateat, citius planē moriatur animās, quæ profluuiō laborat, q̄ sanguis cesset effluere. Porro vlcus ipsum claudetur vel labris eius, quæ dissidēt, in idem adductis: vel osculo eius obstruēto. Adducuntur in idem labra eius tum nostrarum manūū opera, vbi sic ad manum vlcus se exhibet: tum per deligaturam: tum vero per ea remediā, quæ refrigerent, & adstringant. Neq; enim suere fas est arteria'ue vulnus: veluti dixerint, qui nullā à vulnerata partis substātia natura' q̄ sumi indicationem aiunt. Obstruetur valis osculum & sanguine ipso concreto (qui Thrombos græce dicitur:) & iis, quæ foris illi imponūtur. Possunt autē superimponi tum carnosæ ipsæ, quæ circa vlcus sunt, partes: tum in non nullis vulneribus ipsa cutis: ad hæc quæcūq; ipsi comminiscimur. Ea sunt & linamenta, quos Motus græce vocant: & medicamenta ea, quæ idcirco, quod ex lenta crassa q̄ substantia cōsistant, meatus obstruunt, (Græci Emplastica uocāt:) præterea quæ crustam, quam Græci Escharan vocant, efficiūt: quippe hanc quoq; ceu septū quoddā huiusmodi vlceribus veteres excogitarunt. Efficiunt hanc tum ignis ipse, tum quedā medicamina quibus ignea vis inest. Atq; his quidē rebus obstruūt valis osculum. Auertitur autē sanguis, atq; ad alia mēbra cōuertit, tum {ad proxima} deriuatus: tū {ad cōtraria} reuulsus: Illud Parocheteulin: hoc Antispasin græci uocāt. Nā hæc quoq; Hippocratis iuēta sūt,

Lib. de Humo
nō a principio.

omnis

METHODI MEDENDI

§. Apho. 32.
Ex. ord. 4 d
§. Apho. 50.
Ex. ord. 42. a.
Et 2. Epid. sect.
6. circa mediū.

A. lib. 1. f. 4.
c. 23. f.

omnis scilicet immodicę vacuationis cōmunia remedia. Deriuatio ad vicina loca fit, cū id, quod E per palatum vacuatur, per nares deriuatur: reuulsio autem ad cōtraria, cum ad inferna reuclitur. Rursus, quod per sedem profluit, id per vuluam deriuamus: sursum vero reuellimus. Ita nanque & natura ipsa facere solet. ¶ Mulieri enim, inquit Hippocrates, sanguinem vomēti menses superuenientes remedio sunt. Hac igitur de causa, si ¶ vel menses cōfertim eruperint, vel sanguis ab vtero quoquo modo profluxerit, sursum reuelles, cucurbitā "maximam sub mammis dehigēs: nam & hoc Hippocratis inuētum est. Eandem ob causam, cum ē naribus sanguis erumpit, id retinent maximę in p̄cordiis defixę cucurbitę. Infingendę autem sunt, si ex dextra nare profluit, super iecinore: sin ex sinistra, super liene: si ab vtraq; nare, super vtroq; sunt imponendę viscere. Quod si resolutus adhuc æger non sit, etiam vena ex eo cubito incidenda est, qui profusioni ē directo respondet: ubi paulum detraxeris, mox vnam horā intermittens, rursus detrahes: post iterum atq; iterum, pro laborantis viribus. Ad hunc modum & reliquas omnes fluxiones (quippe communis ratio est) tū ad contraria reuocabis, tum per vicina deriuabis, vtiq; quę p̄ aluum fluunt, ea vel per vrinas, vel vterum transmittens: quę vero per vrinas, ea vel per vterum, vel per sedem transferens: pari modo, quę per vterum erumpunt, vel per vrinas, vel per aluum: quę vero in oculis, aure, vel palato fluxiones accidunt, eorum ad vicina deriuatio per nares est. Reuulsio vero in iis, quę supra sunt, omnibus, deorsum semp̄ agitur: sursum, in iis, quę sunt infra. Præterea à dextris ad sinistra, sicut ab his rursus ad illa: similiter ex iis, quę intus habentur, ad ea, quę foris sunt: contra q; ab his ad illa. Ergo frictio contrapositę partis, potissimum per ea medicamenta, quę calefaciant: præterea vincula valentius adducta: iis, quę ad contrarium reuocant, remediis sunt annumeranda. Non secus profectō & naturalium meatuum, qui positi ex aduerso sunt, reclusio. Quę vero id præstare medicamenta possint, tradita eorum materia à nobis est in libris, quos de medicamentis prodidimus: sed de omni fluxione in sequentibus etiam libris tractare necessum erit.

A. ibidem.

Nunc ad sanguinis profluuium est redeūdum. Quippe de genere "obturatiuum quodammodo est & vinculum ipsis profluentibus vasis iniectum: ipsi q; nostri digiti, dum ea committunt, stringunt q;. Est & alia huc pertinens ligatio, quam Græci Epidesin vocant: quāquam ipsum vas circulo non complectitur, sicuti vinculum: verum cum ex parte complexu suo committat quodammodo vulnerati membri dissidentia labra, & quę superimposita sunt, cōtineat, merito inter claudentia remedia numeratur. Præter omnia iam dicta, inter hæmorrhagię remedia censeatur & appositus vulneratę partis situs. Porro appositus fuerit, si ad geminum hunc finē sit directus, nempe vt & dolore pars careat, & sursum spectet: si vero vel prona spectet, vel doleat, nō solum profluuium non sistetur, sed etiam, si non sit, prouocabitur. Ergo, qui hæc norit, si quādo aliterit ei, cui ex vulnere sanguis profluit, (de his enim primum agam) ilico digitū super os vulneris vasis imponat, blande innitens, ac sine dolore comprimens: quippe simul tum sanguinem sistet, tum eum concrefcere in vulnere faciet. Quin immo si vas, vnde profluit, alte sit demissum, certius ipsius tum positum intelligat, tum etiam magnitudinē: præterea, venā ne sit, an arteria: post hæc iniecto vno attollat, ac modice intorqueat. Quod si ne tunc quidem sistitur sanguis, si vena fuerit, tentet citra vinculum sanguinem suppressere aliquo ex iis medicamentis, quę sanguinis supprimendi facultatem habeant. Sanē optima horū sunt emplastica ea, quę ex frīxa resina, & farinæ triticeę tenuissimo polline, & gypso, aliis q; id genus sunt confecta. Sin arteria sit, duorū alterū, aut vinculo amplectens, aut totum vas præcidēs, profluuiū sistes. Sanē vinculum magnis quoque venis iniicere interdum cogimur: atq; etiam interdum totas præcidere vtiq; trāsuerfas. Incidet autem huius necessitas in iis, quę ex profundissimo loco rectę assurgunt, præsertim q; per angustas, vel principes particulas. Quippe ita retrahitur ex vtraq; parte pars vtraq;, celatur que ac integritur à superiacentibus corporibus vulnus. Tutius tamen est vtrunq; facere, & vinculum vasis radici iniicere, & quod deinceps habetur præcidere. Radicem vasis uoco priorem eius partem, H quę uel iecinori propior est, uel etiam cordi: hæc in collo ab inferiore est parte: in brachijs & cruribus à superiore: in singulis que reliquarum partium, prout ex dissectione intelligere licet: quā nec ipsam amethodi isti Thesalijs admittunt.

Quo pacto Implenda carne sint Vlcerā, cum Sanguinis impetum fliterimus:

ac de Medicamentis, quę Crustam inducunt.

CAP. 4.

His pactis implendū carne vulnus q̄primū est prius, q̄ uinculū à uase decidat. Nisi enim pducta caro prius locū, qui circa præcisam arteriā est, impleuerit, sed locus aliquis uacuu supfuerit, utiq;, quod Græci Aneurisma dicunt, sequit̄. Quā ob rē eo potius gñe sanguinē sistentiū utendū suadeo, qđ sua lēticia meatus obstruat, (emplasticon uocat) qđ qđ crustā efficit, p̄p̄ea, qđ & citius & minore cū periculo post ipsum implet vulnus. Quippe periculū in altero est, ne, si defluat crusta, rursus sanguinis pfusio ex uase excitef. Optimū igit̄ oīum, qđ noui, medicamentorū, quo ēt ad cerebri mēbranarū hæmorrhagiās tutissime utemur, est, qđ nunc subiciā: Thuris pars una, aloes partis unius semissi miscef: mox cū utendi tēpus instat, tm̄ huius cum ouī candido subigif, quātū mellis reddat crassitudinem: hoc dehinc "leporis mollissimis pilis excipitur: deinde tum uasi ipsi, tū ulceri toti, liberaliter imponif. Alligandū aut̄ id forinsecus fascia ē ex tenui linteo: cuius fasciæ primi

A. li. 3. f. 17.
c. 9. 240. f.

A primi quatuor quinque uel amplexus ipsi profluenti vasi iniiciuntur: ab hinc vasis radicem versus ducentur, in quibus videlicet partibus radicem versus ducere licet: licet autem serè in omnibus præterq̃ cerebri mēbranis. His factis, ubi tertio die solueris, si tutò adhuc medicamen viceri adhæret, aliud rursus super impones: ac veluti linamentū id, quod ex pilis factum inhæsit, ma defaciēs deligabis ita, vt initio deligasti. Sin prius sua sponte linamentū deciderat, radicem vasis digito blande cōprimens, quatenus videlicet nihil confluat, hoc quidem suspensā manū adimes, atq; alterū impones. Ad hunc modū, quoad carne munietur, curare vas debebis, utiq; à principio ad finem vsq; particulam supinam seruans, custodito tamen in hac sitis figura, modo. Vitandum enim, ne dolor incidat, ac rursus profluuium excitet: cum nihil sit, quod profluuium magis, q̃ dolor, prorit, & phlegmonas augeat. Hoc medicamento multifariam vtor, aliàs (vt dictum est) duplū thuris aloē admiscens: aliàs parī modo ambobus vtens: aliàs paulo superante aloē thure, aut etiam plusculo, sed non dum duplo: etiam mannā pro thure aliquādo iniiciens. Est autem māna medicamentū, quod magis, q̃ thus, adstringat: thus vero, q̃ manna magis emplastīcū. Porro constat in duris corporibus plus aloes esse immiscendum, in mollibus plus thuris. Erit q; alterum eorum magis adstringens: alterū lentitū & crassitudine sua tenuibus spiramentis magis inherens: quod **B** emplastīcoteron vocant. Itaq; etiā, magis tenax, ac (vt sic dicam) resinosis deligas thus, oportet, ubi magis esse emplastīcum medicamentum studebis: id sanè tum mollius est, tum albidius, tum quod mansum ritu aloes & mānē non cōmīnuatur, sed partes suas sibi cohærentes defendit, veluti Chia mastiche. Verum hæc eius tractationis sunt propria, quæ de componēdis pharmacis præcipit: quam in hoc opere non alicubi attigisse omnino non licuit. Siquidem aut nusq̃ nobis particularis exēpli faciendā mentio fuit, sed ipsi tantum vniuersalibus contentos esse methodis oportuit: aut, si particularia poneremus, etiā præparatio eorum fuit attingenda. Verum (vt ante est dictum) eius generis remedium, quæ methodo sint inuēta, vno altero uel exemplo hic posito contentos esse conueniet. Id vero semper mihi teneri memoria velim. Sed reuertamur rursus ad id, quod dicendo, parum absoluimus. Mentionem enim iam dicti medicamenti idcirco pluribus feci, q̃ ceteris id omnibus præstare mihi persuasi: miror q; sicui melius inuenire cōtinget. Ideo q; tum in cerebri mēbranis semper: tum in colli vulneribus eo vtor: etiam ipsarum venarū iugularium, quas Sphagitidas vocant, vtpote cum harum quoque profluuiū citra vinculum sistat. Non est autem in his committendum, vt in opere properes, veluti quidā stolidi chirurgi faciunt: sed altera manu inferiorem vasis partem comprimēs, aut complexus tenebis: altera medicamentum vulneri impones, ac blande ei apprimēs, donec cōcretum adhæserit: mox deligabis superne deorsum, nō (vt in artubus) inferne sursum: siquidem radicem versus uasorum ducere deligationem oportet, ac, quod confluit, reprimere. Sunt porro & alia non pauca pharmaca, quæ citra omnem dolorem emplastīcam uim obtinent: uerum nullum ita carne implet. Expediit autem quāmaxime in eiusmodi casu, ut priore medicamine cadente, caro circū uas ipsum sit producta. At, quæ crustas generant, ubi crusta decidit, magis nudam partē, quā pro ipsius naturali habitu, derelinquunt. Est nanq; ipsius crustæ generatio ex subiectis circumpositis q; corporibus (ut sic dicam) semiustis, sic, ut cuiusmodi in hyemem extinctos hos carbones rem parant, eiusmodi ipsæ crustæ carnis exustæ sint reliquæ. Quare, quātum particulæ adustum ad crustam est, tantum profectò ipsi de naturali carne deperditur. Id itaq; omne particulæ decedit, cum crusta cadit: atq; ob eā rem nuda sine q; carne uisitur. Multis q; postea, q̃ crusta decidit, profusio sanguinis, quæ egre suppressi potuit, superuenit. Quare in his quoq; quisquis methodo administrare omnia uolet, is tum modos omnes, quibus sanguis supprimatur, longe ante cōsiderabit: tum cum eliget, qui minus sit cum periculo, utens non minus & reliquis omnibus, quoties necessitas urgebit. Maximā autem necessitatem, uel crustificis medicamentis uel ignitis ferramentis utendi animaduerti, ubi **D** ex erosione putrescētis alicuius, profluuium sanguinis concitatur. Quin etiam, ubi in tali affectu totum, quod computruit est sublatum, tutius est uel ipsius ueluti radicem adurere, uel certe crustificis medicamentis uti. Hac uero ratione tum in pudendis, tum sede, ad talem necessitatem sæpe deuenimus, q̃ uidelicet hæc partes tum propter naturalem humiditatem, tum q̃ excrementorum sunt canales, ex leui causa putrescant: id uero, quò pro incrustantium pharmacorum delectu consiliū diriges, erit non utiq; solus calor, sed cum quo adstringendi facultas sit coniuncta, qualis in chalcitide, & mysi, & atramento sutorio, siue ustis his siue inustis utare, uisitur. Quæ uero ex calce non extincta conficiuntur, ea utiq; ualentiora his sunt: ceterum calx adstringendi uim non habet. Excidunt igitur citius, quæ ab his fiunt crustæ: hærent autem corporibus diutius, quæ ab adstringentibus: quod utique longe est utilius, quando ita prius nascitur in imo earum caro, efficitur q; profluenti uasi uelut operculum quoddam. Vnde nec nosmet præcipientes esse (ueluti non nulli sunt) ad crustas, ubi hæmorrhagias periculum imminet, detrahendas oportet, nisi in illis tantum affectibus, in quibus propter putredinem candēs ferrum corpori hominis admouere coacti fuimus. Appellant, nescio quomodo, eū affectum oēs nunc medici Græci *νομήν* à uerbo, quod pascere significat, propterea, q̃ pergere pascendo id uitium ab egris particulis ad eas, quæ integre sint, soleat, atq; harū semper aliquid ægris adiciere: ita, ut nō à substantia indicatæ rei, sed ab accessorio

A. 4. f. 4. r. 2.
c. 7. 470. c

Abid. c. 18. h

A. 1. f. 4. c. 13.
83.

METHODI MEDENDI

forio appellationem indiderint. Copia materiæ medicamentorum omnium, quæ hac prædita facultate sunt, in propriis commentariis dicta est. Proprios intelligo, & qui de simplicibus medicamentis, & qui de compositione eorum sunt scripti.

Capita Methodi Sanguinis Profluvium sistendi, ac de eo Profluvio, quod de profundo corporis erumpit. CAP. 5.

Ergo recensitis huius methodi, quæ sanguinis profluvia, quæ ad manū sunt, cures, capitibus, mox ad eorum, quæ in alto sunt corpore, tractationem accingemur. Qui igitur est valis profluit sanguis, aut propterea, quod amplius non confluet, silietur: aut quod occlusa diuisio erit: aut etiā propter vtrunq; simul, id quod reor tutissimum. Porro confluere prohibetur & "propter animi deliquium, & cum ad contraria reuellitur, & cum ad vicina deriuatur, & per refrigerationem tum corporis totius, tum vero præcipue ipsius partis afflicte. Hac enim ratione etiā frigida pota sæpe hæmorrhagias suppressit. Idem facit & frigida foris in fotu affusa, sed & posca, & vinum acerbum, alia q; quæcūq; vel alstringendi, vel simpliciter refrigerandi vim habent. Clauditur ipsa diuisio, si vel contrahatur, cōiueat q; id, quod diuisum est, vel obstruatur. Sanè contrahitur tum adstrictione, tum refrigeratione, tum deligatura, tum vinculo exceptum. Obstruitur vel intrinsecus, vel extrinsecus: Et intrinsecus quidem, à sanguine concreto, Græci Thrombon vocant: Extrinsecus tum hoc ipso, tum vero linamentis, & spongiis, & crustis, & medicamentis iis, quæ lenititia crassitie q; sua meatus obserat, (Græci Emplastica vocant,) ad hæc corporibus iis, quæ circumiacent, propius admotis. Quorum singula quemadmodum perficiantur, dictum iam est. At, quæ de profundo sanguinis profluvia erumpunt, ea nec vinculo, nec deligatura sanes: veluti nec ignitis ferramentis: nec (vt semel dicam) iis, quæ diuisum ipsum corpus partem ue contingere machinamur: immo per reuulsionem, ac deriuationem ad vicina: præterea cibū potionem q;, qui & emplastica vim habeant & refrigerent, & medicamenta, quæ adstringant. Habes vero vberem talium materiem in propriis operibus. Quæ vero à partibus indicatio sumitur, ea cōmunibus, quæ iam dictæ sunt, curandi indicationibus, veluti auctarium in singulis affectibus accedit: siquidem instrumentis aliquādo vtimur pro partis ipsius proprietate, aliis ad vterum, aliis ad vesicam, alijs ad omnia intestina crassa. Quippe in hac, per clysterē: in vterum, per ea, quæ Metrenchytas Græci vocant, idoneorum aliquod medicamentorum immittimus: sic & in vesicam, per in directum foratas fistulas. Sanè rariora ex his profluvia sanguinis fiunt, sed tamen aliquando fiunt: & quamquam non profusione ipsa, periculosa, at certe ob diuturnitatem non sine periculo. Siquidē quaternis diebus vidimus ē vulua profluere sanguinē, nec potuisse vllō remedio sisti, quoad quarto die plantaginis succo vtentibus nobis prorsus constiterit. Est porro id medicamen & ad ea, quæ ex erosione excitantur, sanguinis profluvia vtilissimum: cui etiā valentius aliquod hoc casu medicamentum, aliās aliud ei miscere soleo, vtique ad totum respiciens affectū: id quod semper est faciendum, ac pro maximo documento in omnibus habendum. Nam in his ipsis, quæ ex vulua, vesica, & intestinis, profluvia citantur, æstimari debet ipsius profusionis quātitas, vt videlicet hæc iam vel vt primam, vel vt secundam, indicationem curationis habeamus, nec tamen obiter totius affectus non habentes rationem. Nam, si perruptum vas aliquod magnum est, aut vehementer reclusum hiat, vtique adstringentibus medicinis est opus, veluti balauftio, & hypocyrtide, & rhoe, & omphacio, & acacia, & gallis immaturis, & malicorio. Sin vel exiguum vas est, quod perruptū est, vel modice reclusum, sic, vt non multus sit, qui in eo profluit sanguis, etiam aloë, & manna, & pini cortex, & lemnium sigillum, & spinæ ægyptiæ fructus, & crocum, & lapis hæmatites, alia q; id genus ex vino nigro austero vtilia medicamenta sunt. Quod si nec genus id vini præsto sit, nec plantago, nec solanum, (quippe hæc quoq; sunt idonea) coquemus in aqua & rubi germina, & cynosbati id est canini rubi, & myrti, & lentisci, & hederæ, in summa omnium, quibus adstrictoria vis inest, siue radix sit, siue fructus, siue cortex, siue germen: ideo quæ etiā adstringentium malorum, maxime quæ cotoneorum, item quæ myrtorum, & mespilorum decoctum, idoneū ad hæc proposita præsidium est.

De Profluvio Sanguinis ex Erosione, vel Diapedesi.

CAP. 6.

AT, si ex erosione profluvium quoddam incidit, non est id magna ex parte profusius, sed exiguum & paulatim effluens: eo q; Passionis, vel Andronis, vel Polyædæ pastillis vtendū est: aut etiā (vt dictum est) nostro, qui genere eandem vim obtinet, ceterum magis potentē. Distunt enim hæc erosione, si tamen etiam toti corpori sit consultum, vt prius est dictum. Sin profusior hæmorrhagia sit, iis, quæ vehementissime adstringant, vtendum medicamentis est, quoad vehemens eius impetus frangatur: mox deinde admiscendi illis pastilli sunt: postea ad ipsos solos veniendum, cum aliquo ex ante dictis succis aut decoctis. At vero, quæ extrinsecus profluenti particule admouentur, tum adstringentia, tum citra adstrictionem frigida, hæc ipse (veluti pleriq; medicorū) non vbiq; probō: sed mihi contra oīno, q; fieri res postulat, ipsum sanguinē intrō cōpellere, ac venas quæ in alto sunt, implere videntur. Vidimus enim quosdā eorū, qui ex pulmonibus sanguinē reicerēt, ex thorace refrigerando manifeste lēsos: eque vt, qui sanguinē vomuerūt, non nullos, q; vter foris esset refrigeratus: eodē mō & eorū, quibus ex naribus sanguis, pfluxit, aliqui ex capitis refrigeratione deterius habuerunt. Ergo nec oīno, nec sine discrimine, nec oī tpe loca, quæ

* arnoglōsi.

* arnoglōsi.

† Impressi cod. & manuscripti quidā, ut Linacæ trāstulic, habent: sunt tñ q addāt, τὸ δὲ χάρτου. i. ex charta cōfecto

A. li. 4. f. 4. t. c. 17. 470. b

A. li. 4. f. 4. t. c. 16. 469. g

A. li. 3. f. 10. c. 6. 266. h

Aquæ circa particulam, vnde sanguis profluit, sunt posita, refrigeranda suaferim, immo postea, q̃ in alia prius auerteris: vt, exempli gratia, in naso, vbi sanguinis millione (vt diximus) sis vsus, vel artuum frictione deuinctio q̃, vel ad præcordia defixis cucurbitis. Quin ne sic quidem ad frontē & caput ilico refrigerantibus vtendū, sed prius est ad contraria reuellendū, vtiq; affixa † in summa ceruice} cucurbita. Quippe duplex est in sanguinis ex naribus profusione auersio, & quæ est ad totius corporis inferna: & quæ est ad capitis posteriora: propterea videlicet, q̃ ipse nares & in superiore & in anteriore parte sunt sitæ. Aduersatur aut̃ ei, quod supra est, id, quod infra: & ei, qd̃ post habetur, id quod ante. Verum de sanguinis profluuiō vel hætenus dictum abunde sit. Patet nanq; & diapedesin, quā vocant, refrigerantibus adstringentibus q̃ esse curandā: & si propter tenuitatem sanguinis aliquādo incidat, crassiore victu. Is vero cuiusmodi sit, dicitur in sequentibus: dictum q̃ iam ad quendam modum est in libro, qui de attenuate victu est scriptus. Iam vero ad memoratorum affectuum curationem est redeundum. Ergo, quod venæ insedit vlcer, vbi ad manum est, eandem desiderat curationem iis, quæ in carne accidunt: de quibus, duobus ante hoc voluminibus disputavi. Nam, siue ex recenti vulnere factum est, id agendum est, vt medicamentis iis, quæ Enema vocant, coeat: siue ex erosione, quæcunq; dicta de rebellium vlcerum curatione sunt, **B**ea prius ratione discernēda, mox, vt opere perficiantur, tentanda. Quin etiam, vbi vinculo vas sis complexus, aut medicamentis sanguinem supprimentibus, aut ferramentis ignitis vsus: illud q̃ tibi curationis propositum restet, vt, quæ circa vlceris labra sunt, carne impleas: iisdem omnino medicamentis vtere, quæ in methodo linuoforum vlcerum nobis sunt præcepta.

De Vlnerate Arteriae curatione.

CAP. 7.

Li. 5. l. 2.
1669. c

DE arteria autē vulnerata iam dictum est non nullis medicorū videri nō posse fieri, vt cocat. Atq; id asserunt aliqui quidē sola experientia se contentos professi: alij vero etiā ratione vti eiufmodi. Siquidem duram esse ac chartilagineā aiunt alteram arteriæ tunicam, talium vero nihil posse in vnum coire, cum sit mollium tñ corporum in vnum coeūdi habilitas: vt tum in externis videre licet, nullo nec lapide cum lapide, nec testa cum testa, vnquam coeunte: tum vero in nobis ipsis, qñ nec chartilago cum chartilagine, nec os cum osse coalescat. Non enim fracta ossa per vñtionē coherent: sed per callū eum, quē paron Græci vocant, seu glutino iunguntur. Igitur nos quoq; ab experientia nostra primum incipiamus, in medium q̃ proteramus ea, quæ ipsi vñtur pauimus. Vidimus enim in mulieribus & pueris tum cōglutinatas arterias, tum carne vñdique circūdatas, id q̃ in fronte, malleolo, & articulo brachij summe q̃ manus medio. Simile quiddam

Caliquando & agresti contigit iuueni, dum sanguinem sibi mittendum veris tpe curaret, quod nostratibus maxime est in vsu. Cum enim medicus, qui venam incisurus erat, brachium hominis deligasset, cōtigat attolli velut in gibbum arteria: itaq; hanc pro vena medicus diuisit. Exigua sanē incisio erat: sanguis autē flauus & tenuis & feruidus statim eiiculabatur, id q̃ cum quodā veluti saltu. Ac medicus quidē, vt erat admodum iuuenis, & operum artis parum peritus, venam se incidisse putabat. Ego vero cum quodam alio ex iis, qui aderant medicis, vtiq; seniore, vbi, quod accidit, aduerti, præparato ex emplastrorum genere, † quod sanguinem supprimit, medicamēto, † tum incisionem curiose coniunxi, tum super medicamen ilico imposui, ac spongiā mollissimam extrinsecus super hoc deligavi. Mirante vero, qui arteriā inciderat, † insolitam nostram in hoc casu prouidentia, † indicauimus homini rem factā, sed postea, q̃ incisi hoīs diuersioriū exiissemus: iussimus q̃, ne vel solueret nobis absentibus, vel ante quartū diē id aggredere, sed ita, vt erat, deligatū haberet, spongiam duntaxat desuper madefaciens. Postea vero, q̃ in quarto soluentes planē cōglutinatatam incisurā inuenimus, rursus idem medicamen imponere iussimus, tum simili modo deligare, nec multis postea diebus soluere. Atq; ita percurata est huius hominis incisa arteria, sola omnium, quas in cubito incisas vidi: nam reliquis omnibus aneurysma, aliis maius, aliis minus superuenit. Ac, quemadmodum quidē aneurysmata curare conueniat, in progressu dicitur suo loco, vtiq; cū reliquorum omnium præter naturam tumorum curatio tradetur. Nunc cœptā disputationem absoluamus. Siquidem arteriæ natura difficultatē quidem durioris tunicæ suæ cōglutinadæ prorsus indicat, non tñ eiufmodi, quæ euinci omnino nequeat: neq; enim ita est sicca dura q̃, vt os vel chartilago, imo longe his mollior, ac magis carnosa. Quo vtiq; minus de vñtionē sectione eius est desperandū, vbi tum ipsa sit parua, tum hominis corpus natura molle. Videat autē experientia quoq; ipsa rationi subscribere: cum & in pueris & in mulieribus propter corporum humiditatem & mollitiā, eam viderim glutinari: & in vno iuvene, cui (vt dictum est) exigue erat incisa. Cum vero sanatu difficilior sit arteria, q̃ vena, non tamen est medicamentorū admodum diuersus in vtraq; vsus, immo specie planē idem maioris minoris que ratione euarians: quippe tanto siccioribus medicamentis eget arteria, q̃ vena, quanto ipsa est suapte natura siccioris temperamenti, q̃ vena. Quod si carnem circa gigni est opus, eadem ambē requirunt: siquidē ad eundem modum prouenit carnis generatio in his circundandis, quo in cauis vlceribus prouenire est traditum. At, quæ in vtero, velica, vel intestinis venæ arteriæ que sunt, cum eadem genere medicamenta, vbi exulceratæ sunt, requirant, etiam instrumenta, quibus infundantur, metenchytas i. vterinos clysteres, & syphonem rectū, & clysterem desiderant. Ad ea vero, quæ in recto

* Hypochondria. quam ditionē Linaceter ferē semp præcordia transillit.

* Clarus graeciz iuvon, i. moccipite.

† εν αλω παρμακω.

† Quidā cod. legunt τὸν τοῦ πον τῆς ἀνθρώπου & c. i. modū insolite nobis in hoc casu prouidentia. Alij τὸν λόγον τῆς ἐπελθοῦσης & c. i. rationē seu modū prouidentia, q̃ nobis in hoc casu succurrit.

intestino

METHODI MEDENDI

intestino sunt vlcera, etiam per vesicam, cui sit fistula recta ad finem annexa, iniicere liquatū me-
dicamen tepidum licet. Variabitur itaque remediorum consistentia pro instrumentorum specie:
neq; enim fas est eiusmodi iustrumētis crassa medicamēta infundere, sed humidiora postulant,
atq; idcirco mediocriter plerunq; calida. Proinde sicca medicamēta, magis sunt idonea, quā ea,
quæ liquabilia vocantur, quoniam facile, vel plantāginis, vel alterius eius generis succo miscean-
tur. Eiusmodi medicamenta sunt & crocum, & pompholyx, & aloë, & quæ Cephalica græce di-
cuntur: in ipso autem primo producendæ carnis tempore, quod suppressionem sanguinis conti-
nenter excipit, etiam lemnia terra salutare auxiliū est.

* arnoglōssi.

De Vlcerebus Pulmonis, & Sanguine de Pectore erumpente.

CAP. 8.

AT, quæ in pulmone hæserunt vlcera, difficiliora ad curandum sunt. Quibusdam vero non
difficilis modo eorum curatio, verum etiā, quæ perfici omnino nequeat, videtur, id q; tum
ratione coniectantibus, tum experientia: Ratione, quoniam pulmo inter viscera propter anhel-
tum perpetuo sit in motu, cum utique quietem requirant ea, quæ sint sananda: Experientia, quod
neminem vnquā eorum, qui ita sunt affecti, sanatum viderint. Atq; de experientia quidem (nam
hinc cœpisse par est) dubitare fortasse licet propter agnitionem. Nos enim vidimus alium ex eo,
quod maxime vocem in clamore intendisset, alium, quod lab alto cecidisset, alium in palastra per-
cussus, non solū statim grauissime tussiuisse, sed etiam simul cum tussi alios vnam duas ue, alios
plures, heminas sanguinis spuisse. Qui vero ita erant affecti, aliqui omnino sine dolore erant, ali
in pectore dolebant. Quin etiam sanguis iis, qui doluerant, nec cōfertim reiectus est, nec multus,
minus q; tum ruber, tum calens, ceu ē longinquo veniens. At, quibus citra dolorem est reiectus,
iis & cōfertim, & plurimus, tum ruber feruens q; expuebatur, clare docens, q non procul veni-
ret. Porro aliam dubitationem facit, nec hanc leuē, ipsa sanguinis ex thorace in asperam arteriam
transumptio, propolitam videlicet à medicis, iis, qui transmitti eum per membranā, quæ pulmo-
nem inuoluit, posse non putarunt. Forte q; (nisi multis eorū, qui ita sunt affecti, tum statim ortus
dolor, tum vero quibusdam eorū phlegmone superueniens, quæ postea suppurauit, manifestum
indiciū præbuisent in pectore cōsistentis affectus,) pronunciasent sanguinem ex pectore per
fauces nunquam reici. Nunc vero his indicis confusi, à pectore quidem venire concedunt: cæ-
terum, dum aliam viam, quā per pulmonis membranulam, inquirūt, multa, ea q; absurda pro-
ferre coguntur: quāuis in iis, quos Empyus græce vocant, ipsum pus, quod medio spatio inter pe-
ctus & pulmonem contineri ipsi fatentur, videant, arbitror, apertissime ex pulmone expui. Nos
vero in iis, quibus erat in pectore tantus abscessus, vt etiam ossium aliquid carie corrumperetur, G
manifeste ipsis ostendimus mulsam, quæ iniecta in pectus fuerat, ex pulmone expui. Sanē noui-
mus in vrbe Roma, † loco profecto fluxionibus maxime obnoxio, † eiusmodi affectus in pecto-
re non raro conistisse, vt necesse fuerit ipsum os, quod affectum fuerat, excidere. In plurimis vero
etiam membrana, quæ costis intra subtenditur, vnā cum corrupta costa inuenitur putrefacta. So-
lemus ergo in curatione, mulla per vlcus infusa, iubere aliquando quidem, vt inclinati in laboran-
tem partem tussiant: sæpe vero molliter cōcutere: interim etiam organo, quod pus extrahit (Pyul-
con Græci vocāt) educere, quod intus ex mulla reliquum est. Hoc facto, vbi tum pus vniuersum,
tum etiam sanicm vlcis eluisse confidimus, mox medicamenta iniicimus. Ergo in eiusmodi af-
fectibus, si quem in medio pectoris ac pulmonis spatio humorem reliqueris, statim hunc tussi eie-
ctum contemplabere. Mirandi profecto sunt ij, qui de via per pulmonē hæsitent, quō pacto non
magis hæsitent, quemadmodum crassus sanguis in fracti ossis callo effundatur. Nam & ipse, qui
effunditur, non paulo naturali est crassior, & cutis substantia longe vtiq; crassior pulmonis inuo-
lucro est. Quod igitur diximus, cum vel casu, vel præualida acuta q; voce vas aliquod in pulmo-
ne rumpitur, citra q; dolorem cōfertim sanguis feruens floridus multus q; cū tussi expuitur, sci-
re licet in viscere vulnus esse. Aggredienda vero curatio est, prout nos sæpe sumus aggressi: qui-
bus vtiq; nō raro successit. Igitur laboranti ipsi iniungendum est, vt nec magno vtatur respiratu,
ac semper agat silentium: præterea vena cubiti interna protinus incidēda: à qua bis ter q; postea
sanguis est detrahendus, vtiq; eius auertendi causa: tum artus oēs fricandi vinciendi q; ita, vti ipsi
solemus: vbi hæc sunt facta, primum posca tum diluta, tum tepida, potui est offerenda, quo, si quis
in viscere thrombus. i. cruor concretus latitet, resolutus expuatur: atque hoc nihil vetat bis ter ue-
ternis horis facere. Ab his vero ēt aliquod eorum, quæ tum emplasticam vim habent, tum adstrin-
gunt, medicamentū exhibendū, id q; aut ex posca diluta primum, aut ex malorum myrtorū ue,
vel alicuius eiusmodi adstringentium decocto. Rursus q; vesperi medicamen hoc similiter dan-
dum, circunciso, si valentior sit, omni nutrimento: sin aliter, sorbitionis, quod satis est, exhibendū.
Maxime vero ad rem pertinebit, si ēt postero die, modo fortis cubans sit, parū sanguinis ab incisa
iā vena rursus detrahatur: tum victu medicamentis q; eodem modo in quartū vtiq; diem vtatur,
pectore interim, si æstas sit, vndiq; melino rosaceo ue madefacto: sin hyems, nardino vnguento.
Quod si emplastico aliquo vti medicamēto placet, habes à nobis optimū, quo etiā ad reliqua vul-
nera cum fiducia vtare: constat id ex bitumine & aceto, aliis q; quæ illis misceri medicamentis so-
lent, quæ enāma barbara à medicis dicunt. Quod si mulieri mederis puero ue, aut deniq; corpori,
quod

† Linacervile
gulle, τὸ πρῶτον
ἐκ τῆς γαλίας.
† codi-
ces in græci ha-
bent τὸ πρῶτον
ἐκ τῆς γαλίας, vti
τὸ πρῶτον ἐκ τῆς
γαλίας, vt sic
xrat: Sanē no-
uimus in vrbe
Roma eiusmodi
diasticti rheu-
matico modo
in pectore non
raro cōstisse,
& ita legit et ve-
tus interpres.

A quod mollis sit carnis, quod ex chalcitide fit, satis habile medicamentum fuerit: cuius vires in primo libro eorum, quæ de medicamentorum cōpositione inscripsi, explicauimus. Hac nos ratione multos, ad quos statim, vt malum senserūt, accessimus, percurauimus. Quippe hoc maximū est, cui q̄ te attentum esse magnopere oportet, an videlicet statim à ruptura valis facta curationē incipias, quò cruentū adhuc vulnus prius, q̄ phlegmonen excitet, glutines. Nam, si ea semel inuaserit, exigua spes est eius postea glutinādi: in longius tñ trahere potest tps. Quod vero eiusmodi vlcera vel difficulter, vel plane nunq̄, curari possint, hoc in causa est, q̄, cum phlegmone soluitur, eluenda pus vlceris & sanies sunt: atq̄ ex vtero quidē & velica tum sua sponte excernuntur, qm̄ videlicet pronis delabi licet, tum elui præterea à nobis possunt: in pulmone neutrum oīno fieri potest. Quare oībus, quæ huic loco herent, vlceribus vna reliqua expurgatio est ea, quæ per tusses fit. At, si recte his tum reliquā omnē quietē suauimus: tum vero, vt lenim respirarent, nec quicq̄ loqueretur, vt vulnus glutinaretur, iniunximus: quæ potest tussitibus esse sanationis spes. Non igit propterea, q̄ in perpetuo propter respirationē motu viscus id est, desperata curatio est, velut, qui ante nos fuere, senserūt, sed propter saniei & puris vacuationē. Ideo q̄, si statim q̄ sit aggressus, ac iam dicta ratione medeatur, coeūt: sin phlegmone prius occuparit, difficilem incertam q̄ curationē recipiunt, qm̄ pus & sanies prorsus tota q̄ ex spatii pulmonis non expelluntur, & tussis ægras partes valde lacerat. At, quæ ex pectore educūt, triplex cōpendiū præ iis, quæ ex pulmone vacuāt, habent: nam & vasa ipsa multo sunt minora, & sanies in spatiū interius effluit, & in summa magis carnosum pectus est q̄ pulmo. Nam asperæ arteriæ substantia, quæ admodum carnis expers sicca q̄ est, nulla alia aialis in parte inuenitur: quæ etiam ipsa in eiusmodi reiectionibus rumpi solet, cum, si qua reliqua vena vel arteria sit rupta, ipsis asperis illeis manentibus, per solas osculorum (vt sic dicam) coapertiones trāslatio sanguinis fit. Itaq̄ nec calidus in talibus, nec ruber, nec multus sanguis emittitur. Ac videtur quidē prima saltem frōte leuiore eiusmodi affectus, vt qui copia vacuationis minime terreant: sunt vero vel ob hoc ipsum grauiore: quippe cōcretus circa ruptū vas cruor, cui facilis trāsitus in asperas arterias nō est, glutinationē prohibet.

De Vulneribus Septi transversæ, ac earum partium, quæ intra Peritonæum continentur. CAP. 9.

Simili modo & transversæ septi vulnera, quæ foras non perueniunt, in carnis quidē partibus subinde coalescere sunt visa, eius motu non obstante: quæ in nervosis eius hærent, insanabilia sunt. Sanè difficilis curatio est etiam eorum, quæ in carnis sunt partibus, si has iam phlegmone occupauit: id quæ non ipsi modo diaphragmati, verum etiam omnibus, quæ intra peritonæon sunt contenta, q̄ in ea s. sanies defluat. Ceterum danda opera est, vt ea quacunque ratione siccemus, tum per ea præsidia, quæ extrinsecus imponuntur, tum per ea, quæ ex aqua vino ue tenui bibuntur. Porro horum maxime idonea sunt, & quæ propterea, q̄ ex seminibus sunt, Diapermaton græce dicuntur: & quod solenne nobis est, quo q̄ in pectore perforato semper vitimur, quod ex calia componitur. Ceterum tum hæc, tum hūmida quædam foris applicanda, quæ eiusmodi vulneribus sunt accommodata, ad tractationem de medicamentis pertinet. Hic methodos tantum tradimus, quæ præsidiorum indicent genus. Quare, si quando quædam à nobis particulatim pro exemplis adhibeantur, hæc addita claritatis causa fuisse existimandum.

Aduersus Methodicos, quod Medicamentorum genera e Partium Vlcera arum substantia immutentur.

CAP. 10.

Rursus igitur propositas methodos reperamus: monstremus q̄, quantum generalis omnium vlcerum curatio per singulas animalis partes speciatim immutetur. Hinc nanque discemus præcipue quidem id, quod in toto opere est propositum, nempe minime in curationibus errare: velut appēdicem vero, etiam eorum, qui se Methodicos vocarunt, audaciā. Qui (liquid mihi, qui nec ad gratiā quicq̄, nec ad odium loqui soleā, est credendum,) cū omnium ipsi medicorum maxime dā methodo sint alieni, damnāt (quatenus saltē scribunt,) non solū reliquos veteres, sed etiā ipsum omnium nobis methodorum authorē Hippocratem. Ac Empiricus quidem omnia, quæ nos per indicationem inueniri ostendimus, ea dicit per experientiam sibi cognita. Cum vero præter indicationem & experientiā nullum inuentionis organum tertium præterea sit, isti neutro vtentes, tamen appellandos se Methodicos censent. Ergo sequatur nos, & nunc saltem ostēdant vlceribus omnibus per singula membra curādis vnam esse sanationis rationem. Audiamus homines, quo pacto vlcus curent, aut quales indicationes ab eo sumant: num alias vllas, q̄ q̄ planum cicatrice sit inducendum: sinuosum carne implendum: cruentum glutinandum: At quo pacto inueniam, quod cicatricem inducat: & quod carne impleat: & quod coalescere faciat? Ne labora, inquit, sunt enim inuenta. At qui haud scio, an recte, aut non omnia. Fieri enim potest, vt vel ex deteriorū nota quædam inuenta sint, potiora inuenta non sint: vel vt, quæ inuenta esse videātur, etiam ipsa sint mala: Inde q̄ adeo accidere, vt quædam vlcera prorsus non sanentur, quædam longiore spatio, & cum dolore, & famis cruciatu minime necessario. Neq̄ enim audet quisquam nouam aggredi experientiam prius, quā sibi persuaserit priorem curandī rationem recte se damnassee: veluti in iis vlceribus, quæ in pulmone consistunt, quæ ne agnouisse quidem omnino fas est citra dūscutionum actionum q̄ notuam: quorū nimirum vtrunq̄ auersantur. Cæterum con-

Septima Classis.

eeeeee cedatur

* πτορετι est
i manu: p̄tis
aliquibus i m
pre dis m̄
si, i. c. q̄ h̄ m̄.

* i. p̄. x. u.

METHODI MEDENDI

cedatur ad præsens cognosci ab istis Thessali sectatoribus vlcus, quod pulmōni infederit. Nun- E
quid igitur, sicuti hoc illis cōcessimus, sic etiam, & q̄ sordidum sit, intelligant, an purū, an æquale,
an sinuosum, an saniei vel puris plenum, concedemus, videlicet vel ex diuino afflatu, vel per in-
somnia ea videntes? An hæc quoq; quomodo agnoscāt, percontabimur? An vero citra horū
agnitiones pharmacum quoduis exhibere concedemus? Ego nanq; existimo primum expur-
gandam esse immundorum vlcum sordem: implēda vero carne esse, quæ pura & sinuosa sint:
rursus pus saniei q̄ expurganda, quibus hæc circum hæreant: mox ita cicatricem inducendam.
Isti vero, haud scio, quō nam modo talia vlcera sanauerint: nam Thessalus de his prorsus non scri-
psit, ne videlicet vel ignorantiam suam vel inconstantiam proderet. Quippe vel rationi parum
consona & falsa de his dicēt: vel, si quis vera dixerit, eorum indicationem ex membri substantia,
præterea situ forma q̄ accipiat, necesse esse. Nam esto, vlcus in pulmone sordidum purum q̄, &
cum phlegmone & sine phlegmone, & sinuosum & planum, dignoscere norint: etiā illud scire
eos detur, quanq̄ ne eius quidem, tametsi minimi, inuentionem sibi vindicent, nempe q̄ tale vl-
cus viridi medicamento expurgetur, Macherionis (si liber) vel Ilidis, nihil enim refert: Respon-
deant igitur mihi, si vlcus in viscere heferit, quid facient? Num viridis medicamenti aliquid de-
uorandum dabunt? Omnino ridicula res est. † Sed dicant, vnde nam medicamen id in pulmōne F
deferēdum sciunt? Quod si id quoque sciant, illud certe intelligere non poterunt, an ipsam vim
suam, quam in extrinsecus politis vlcibus habuit, seruabit. At esto sciant hæc quoque, q̄ & can-
dem tuebitur vim, quam in externis vlcibus obtinuit, & q̄ sordes deterget: certe, an tussim mo-
uerit, intelligere non poterunt: cum tamen, nisi per tussim sordes expurgetur, nullus sit deter-
gentis medicamenti vsus. Ergo id quoq; istis detur. At illud saltem effugere non possunt, quin
diuersam curationem in vlcere femoris, & vlcere pulmōnis adhibeant: liquidem alterum aqua
perluunt, alterum tussibus expurgant. Pone vero rursus vlcus, quod in pulmone sedit, crasso esse
pure circūdatum: nunquid tum quoq; viride medicamen exhibebūt, an mel potius lingere iube-
bunt? At id dicant, vnde nam inuenerint. Non enim profectō id respondebunt, q̄ tenuiādi in-
cidendi q̄ vini quandam obtinet, cum ipsi a facultatibus eiusmodi disquirendis vltro diffugiāt.
Sed nec, q̄ Empiricis in eiusmodi notarum concursu inuentum est mel prodesse, propterea illis,
sicuti illis, eo vti fas est, primum, q̄ experientiam contemnunt: deinde, q̄ Empiricus in eiusmodi
concurſu, quæ nam sit in pulmone affectio, ignorare se fatetur, cæterum, quæ cōducant, se per ex-
perientiam obseruare. At Thessalo nō satis est curare, quod omnino non norit, sed ab affectuum
indicatione procedit. Sanē, si oīa illi scire donemus, sicuti prius, nō minus q̄ nos, at nunq̄ pfectō G
effugiet, quin in diuersis corporis partibus curationis species mutetur. Non enī eadem cura-
tionis species profectō est aut mulsam in vterum propter sordidum vlcus infundere, aut mel co-
medendum exhibere, aut spongia vlcus eluere. Cæterum hæc adhuc parua: illa planē maxima
sunt. Fingamus diuturnum vlcus citra phlegmonem in multis esse partibus, oculo, aure, naso, ore,
femore, ventre, vtero, sede, pudendis. Fingamus & illud, si placet, vlcus eiusmodi vel planum om-
nino esse, vel exiguo minus planum: respondeant que nobis isti sectatores Thessali, qui hæc nus-
quam discreuit, quomodo id cicatrice tegemus? Nempe eo medicamine, quod ex cadmia confi-
citur: id enim vlceri, quod in femore constitit, belle cicatricem inducere potest: sed num igitur
& ei, quod in audiendi meatu constitit? Dicam fortassis incredibile, cæterum diis ipsis notum.
Deprehendi aliquando quendam ex sapientissimis istis Thessali sectatoribus sic vlcus medican-
tem diuturnum: cum citius homini auris putruisset ac vermes creasset, q̄ medicamento, quod ex
cadmia componitur, inductum cicatrice fuisset: cæterum, permissio homine pluribus diebus me-
dicamento similiter vti, postea, q̄ in dies grauius auris oleret, & sanie impleretur, etiam incredibi-
lius quiddā, q̄ prius, ausum vidimus. Quippe ratus meatū ipsum in profundo contraxisse phleg-
monem, confugit ad tetrapharmacū: quod planē multo magis augere putredinem partis debuit, H
vtpote quod siccare vlcus prorsus non potest, maturare phlegmonem potest. Ergo, vbi hoc me-
dicamento ad affectum sanandum vno die † est vsus, vt facile videres id maxime esse contrarium,
& multiplicata statim saniei vis est, & fœtor intolerabilis obortus. Itaq; qui propinqui laboran-
tis erant, contingere amplius aurem Thessalium non sinebant. Ille vero præ impudentia stultū-
tia q̄ volebat non modo medicamenti tetrapharmacū aliquid iniicere, verū etiam extrinsecus ca-
taplasma relaxans imponere. At, cum eum propinqui hominis abigerent, timerent q̄, ne in ma-
gno periculo ager foret, nos vnum diem amplius permitti Thessalio asino curationem exora-
uimus. Erat autem profectō postridie tum sanies multo copiosior futura, tum odor grauissimus.
Quo die tentauī, an fieri posset, ut sententiam Thessalij afelli mutarem, ne omnes perderet agros,
immo aliquos iam, tametsi paucos, seruare aliquando posset, tam aliena scilicet ab omni vera me-
thodo deserta secta: ergo sic agere cum homine sum orsus. Nunquid (inquam) phlegmone tibi
esse videtur in intimo meatu, proinde relaxantibus vteris auxiliis? Ille tum ita esse magnopere
contendit, tum aliter esse non posse. An igitur (inquam) aliquādo vlcus, quod cum phlegmone
coniunctū esset, aceto acerrimo cum glaucio curatum vidisti? Minime gentium (inquit) immo,
siquis pastillis androniis ex aceto liquatis vtatur, etiam conuulsionem fortasse accersat. Ergo
(inquam)

† In antiquis-
simo cod. græco
hæc etiam ad-
dit. aleguntur.
Ἐπειδὴ γὰρ
ἐκ τῆς ἀνατο-
μῆς ἐγνωσται
ἡ τοῦ πνεύ-
ματος τῶν φαρ-
μάκων δίο-
δος, οἱ δ' ἀ-
πὸ τοῦ θεσπυ-
λοῦ τὴν ἀνα-
τομὴν διαπ-
τύουσι, πῶθεν
γινώσκονται
ὅπως εἰς τὸν
πνεύμονα τὸ
φάρμακον πο-
ρεῖται, id est
Quomodo enī ex
anatomie cogni-
tō ē medicame-
ntorū in pulmo-
nem trāsitus,
Thessali autē
sectatores ana-
tomē respiciunt,
vnde cognos-
cēt, quō in pul-
mone medica-
mentū meat?
Dicant igitur
vnde nū, & c.

† Additur in
antiquis, ἢ δύο,
id est aut duo-
bus.

A (inquam) si quis alio quopiam medicamento, quod sit androniis multo valentius, ex acerrimo aceto vteretur, id quod ad aurē, ita propinquam cerebro inuolucris quod eius particulam, nunquid plane te authore cōtusionem accerseret, si phlegmone præsertim aliqua sublit? Hæc tum ipsi, tum iis, qui adstrabāt, vniuersis recte dici sunt visa. Ergo, quantum (inquam) ad ipsarum partium habitū spectat, quæ ea, quæ ad summum siccet, deliderant, tamen nunc curatione tua sint veluti effœmi nata; iam tali medicamento vterer: nunc quoniam plures iam dies male ipsas alluesecisti, trāsferre eas ad contrariū vno impetu, & semel non licet: nam tibi ac Thessalo contemnere consuetudinem licet, non minus, quæ partium naturam: nobis autem non licet: sed primo die aceto vtar cum glaucio: secundo vtar andronio: tertio ad valentius aliquod, quod ipsum sit androniū, transibo. Atque hoc tribus quatuorue diebus vsus, si mihi vehementius etiam medicamentum requirere vlcus videbitur, eo etiam vti non dubitabo. Extrinsecus vero (inquam) imponam capiti ea parte, qua auris infestatur, non, mehercules, sicuti tu, cataplasma, quod relaxare potest, sed eorum medicamentorum aliquod, quæ vehementissime siccare possunt, cuiusmodi est, quod ex salice cōficitur: aut etiā ipsum androniū ex aceto illiniam: aut ex iis aliquid, quæ hoc magis liccent. Nam, quoniam particula cui medemur, siccissima est, necesse est, valētissime liccetur: indicat enim, veluti vitiū ipsum, ut curetur, sibi applicandum esse contrarium: sic particula ipsa, quod sit sibi simillimum. Itaque &, prout dixi, egi: sanavi quod hominem, nullo potentiore requisito remedio. Quibusdam vero, qui potentiora deliderabant, quibus vno alteroue anno vlcus aurē infestauerat, valentius omnibus iā dictis medicamentum adhibuimus: id fuit ferri scoria tunsa, cribrata quod tenuissimo cribro, mox in tenuissimū veluti pollinē leuigata, post cum acerrimo aceto ad mellis sordium quod crassitudinē cocta. Constat autē multiplex esse debere in mitione acētū. Verum (quod sepe iam dixi) materiæ medicamentorum copiam ex aliis commentariis petes. Nunc, quæ ad methodū spectant, absoluantur. Nam audiendi locus, quoniam est siccissimus, idcirco medicamentis eget, quæ vehementissime liccent. Quorum nullum reliquarū partium cuius applicasse expedit: sed oculo exulcerato collyriū fortasse, quod ex thure cōficitur: naribus vero, quod multo sanē magis siccet, quod ut oculis conueniat, minus vero, quod ut auri quadret. Itaque & prius cōprehensi omnes pastilli viles sunt, & medicamen quod ad Musam refertur, alia quod generis eiusdem. Vlcera vero, quæ in ore accidunt, quæcunque admodum sunt humida, ea medicamentis egent, quæ vehemēter liccent, veluti diphryge, tum ipso per se, tum ex melle, & vino, & mulso: præterea & quæ iris dicit, & quæ anthera, his quod vel siccis, vel ex melle, vel mulso, vel vino. Vtile vero ad talia est & Musæ medicamen: præterea rhois succus, & omphaciū, alia quod, quæcunque strenue siccant. Quid enim materias percensendo morer? At, quæ simpliciora oris vlcera sunt, hæc sanare commode possunt etiam medicamenta, quæ modice liccant, veluti hæc ipsa, quæ propterea, quod in assiduo sunt vsu, Stomatica græce sunt dicta. Ea sunt, quod ex moris cōficitur, & quod ex rubi fructu, & quod ex succo corucis iuglandiū viridis, atque etiam his magis quod ex musto & cupressi spherulis componitur. Quæ vero in ore admodum humida vlcera sunt proxime ossa, vnde carie tentari ossa periclitentur, hæc propter ossium naturam, quæ sicca est, vehementissimis medicamentis indigent. Itaque ego iam comprehensos pastillos semper leuigo, ac siccum ipsum medicamentum superimpono.

De Indicationibus, quæ à Substantia, ab Affectu, à Forma, atque à Situ partium sumuntur, exemplo Vlcus in pulmone.

CAP. II.

Porro dicta paulo ante sunt & ad vesicam, & vterum, & intestina, & pulmonem idonea medicamentorum genera, quibus sit in singulis vtendum, genere quidem medicamenti ab ipsa curandarum partium substantia desumpto, sed cum affectu prius etiā estimato: modo vero vtendi eius, tum à forma, tum etiam situ. Hinc namque excogitati sunt, & auricularij clysteres, quos Otenchytas vocant: & vteri clysteres, quos Metrenchytas: & recti typhones, quibus in velicā aliquid infunditur, quos Catheteras dicunt: & ipsi clysteres: Hinc rursus, quæ in ventriculo, pectore, & pulmone vlcera cōsistunt, per ea, quæ eduntur ac bibuntur, esse curanda: Quæ vero in intestinis, bifariā: nā, quæ vicina vētriculo sunt, his per comesta, & bibita succurrit: quæ vero inferius sunt sita, per ea, quæ inticiunt: quoniam neque ad ea, quæ vicina ventriculo sunt subire potest, quod per sedē infunditur: nec integris viribus ad inferiora ptingere, quod per os sit ingestum. Ideo quod etiā, quæ vlcera in thorace & pulmone cōsistunt, tum difficilius iis, quæ sunt in vētriculo, sanant, ut quorū situs longius absit, atque idcirco medicamentorum vis remittatur: tum propter hoc ipsum multo valētiora ea, quæ deuorētur, præsidia requirunt, quod si ipsis statim vlcerebus admouerent. Inde quod adeo excogitata medicis sunt, vbi expurgandū ex pectore & pulmone pus est, fortissima, quæ quod maxime discent, pharmaca, talia quod omnino, quæ, si vlcus in uentriculo esset, ipsum exacerbarēt. Quin etiā, quod hæc per rilles expurgent, non aliunde, quod ex forma particularū est desumptum: quod hæc nullum talē exitū habeant, qualē uterus, uelica, sedes, auris, nasus, & os. Hinc etiam fit, quod uentriculus utrinque expurgari possit, sursum per uomitū, deorsum secundū naturam. Quippe hoc genus indicationū ab instrumentalibus, quatenus instrumētalibus sunt, est sumptū: sicuti, quæ siccandum esse docent, ab ipsarū similariū substantia sumunt. Ab ipsis uero morbis rursus tales, ueluti ab ulceribus (quoniam de his disputatio erat) & quod siccanda sint, ut supra est comprehensum: & quod, qui ē uentriculo eluere

Septima Classis.

cccccc ij pus

METHODI MEDENDI

pus volunt, non sine periculo vomitum mouent, sicuti si aliter infixam illi pituitam per oxymeli E ac radículas detergerent: sed tutius deiectione vtuntur, cum vomenti periculum sit, ne &, quod exulceratū est, dilaceret, & succum quempiā inutilem ex vicinis attrahat. Quo nomine (vt dixi) & "vlcera, quæ pulmōni insident, difficillima sanata sunt, vt quæ nec citra tussim expurgare possis: & si tussim excites, laceraueris. Itaq; quasi per mutuas operas, malum iis in orbem redit: quippe cum, quæ lacerata sunt, rursus phlegmonen excitent: secundo rursus phlegmonen ipsam maturari & pus expurgari desiderant. Quare ex omnibus sanandi difficultas his exoritur, & quod ea, quæ idonea vlcēibus medicamenta sunt, contingere vlcus, sicut in ventriculo, non possunt: & q̄ per medium interuallum ferē vim suam amittunt: & præterea q̄ respirando mouentur, & tussiendo lacerantur. Itaq; cum in pulmōne ruptum vas est, scire aperte licet, nisi protinus ante, q̄ phlegmone excitetur, glutinatum sit, id postea insanabile fore.

De Vlcēibus, quæ in Aspera Arteria sunt, & in summa eius parte: ac de Lactis, quod apud Tabias habetur, perfectione.

CAP. 12.

Cæterum vlcera, quæ in asperæ arteriæ interiore sunt tunica, & potissimum, quæ summe eius parti (quam Larynga vocant) sunt vicina, aut etiam in ipsa, hæc & curationem recipiunt, & nos non paucos eorū, qui ita sunt afflicti, sanauimus. Sanè curationem eorum hinc maxime inuenimus. In grauis huius pestilentiae initio (quæ vtinam aliquñ cesset) iuueni cuidam, cū nouē iam dies agrotasset, totū corpus vlcēibus scatebat, † veluti oībus ferē, qui euaserant.} Eo die etiam tussiebat paululum. Postridie vero, vbi se lauerat, ilico & vehemētius tussiuit, & tussi expulit crustulam, quam græce Ephelcida vocāt. Erat q; homini sensus manifestus vlcēis in aspera, quæ in collo est, arteria prope iugulū natī. Quin aperto quoq; hominis ore fauces eius inspeximus, nunquid in iis alicubi vlcus esset: sed nec lic inspectantibus apparuit vitium: & planè laboranti sensus eius aliquis manifestus ex comestorum bibitorū que transitu fuisset, si illic vlcus fuisset. Quin etiam ex aceto & linapi, certioris notitiæ causa, quædam ei deuoranda dedimus. Sed nec horum quicquam eum momordit: & sensus doloris manifeste in collo erat: quo loco etiam adeo iritabatur, vt tussire impelleretur. Suasimus itaq; reniti quantū posset, nec tussire. Quod & fecit, eo certe facilius, q̄ exiguum erat, quod proritabat: & nos oībus modis operam dedimus, vt vlcus ad cicatricem perueniret, foris medicamentum aliquod, quod liccaret, imponentes: tum cubanti supino humidum aliquod ex iis medicamentis, quæ ad eiusmodi vlcus facerent, exhibentes: ac iubentes id in ore continere, paulatim q; permittē in asperam arteriam defluere. Sic igitur faciens sentire se manifeste aiebat adstringētis medicamēti circa vlcus vim, siue ea vis huc transmissa est, siue medicamen ipsum roris specie in arteriā ad vlcus defluxit, & tanq̄ percolatum est. Erat autē nec æger ipse medicinæ imperitus, sed ex iis quidam, qui ex vsu & exercitatione empirice medicabantur. Ergo sentire se aiebat tum medicamentū in arteriā defluere, tum tussim quoq; aliquñ mouere: obluctabatur tñ plurimū, ac tussim cohibuit. Igitur ipse quoq; sua spōte Romæ quidē, vbi † correptus fuerat} triduum etiam nū post nonum diem est moratus: post hoc cōscenso nauigio, primum per flumen ad mare nauigauit: quarto die post, naui peruenit ad Tabias: vsus q; est lacte, quod & mirificam planè vim habet, nec sine causa prædicatur. De cuius vsu aliquid dicere oblatū nunc tēpus videtur, nec de eo tñ, quod apud Tabias habetur, verum etiam de alio omni. Neq; enim iis modo, qui Italiā incolunt, est succurrendum, sed, quoad fieri potest, qui vbiuis habitant gentiū. Igitur ad lac, quod in Tabiis habetur, cōmendandum multa concurrūt, & locus ipse satis editus, & aer illi circumdatus siccus, & pascuū pecoribus salubre. Atq; hoc quidē alibi quoq; arte præparare licebit, siquis in colle modice edito herbas frutices que ferat, qui salubre simul adstringens q; lac reddant: quorum exēpla paulo post dicentur. Ceterū, vt ambientem aera similē reddas, fieri oīno nequit: eligere tñ simillimum ex ea, quæ datur, aerum copia licet. Simillimus aut is fuerit, cui eadem adsunt, quæ illi: altitudo collis mediocris: via à mari ad ipsum triginta stadia, amplius q; aliquid, sed non multo: locus autem ipse versus mare, nempe Tabiæ in imo maxime sinu est, qui inter Surrentum & Neapolim conspicitur, magis tñ in latere, quod ad Surrentū pertinet. Porro totum id latus collis est satis magnus, longitudine ad Tyrrhenū mare porrectus. Inflectitur aut leuiter collis hic ad occasum: nec in meridiē in totū planè procurrat. Ergo hic collis à vētis iis, qui ab ortu flant, Euro, Subsolano, & Borea, tutū defendit sinum. Coniungitur illi in imo sinu alter collis non paruus, quē & veteres Romani in historiis, & qui nunc diligentiores sunt, Vesuuium nominant. Celebre nunc nouum q; nomē Vesuuium est, oībus hominibus notum, propter ignē, qui in eo ex terra submittitur. Quæ res non parum mihi ad ambiētis aeris siccitatem conducere videtur: & alioqui præter ipsum ignē nec stagnum propinquum, nec palus, nec fluuius alicuius momēti vsquā in sinu habetur. Oībus vero ventis, qui ab Arcto ad æstiuum occasum perflant, Vesuuus collis obicitur: multus q; cinis ab eo ad mare vsq; peruenit, reliquæ videlicet materiæ, tum quæ in eo cōbusta est, tum quæ nunc etiam vritur. Omnia hæc aerem efficiunt siccum. Licet porro & alibi terrarum eligere collem simili modo siccum, scilicet nec longe à mari: nec adeo magnum, vt ventorum impetui sit expositus: nec adeo humilem, vt subiectorū camporū halitum prompte recipiat. Caueatur autē, ne ad Septentrionem sit versus: ita enim esset auersus

† Codices impressi & multi ex manuscrip-
tis legunt, vt
Linacē vertit,
καὶ ἀπὲρ καὶ
ἐν ἄλλοις χε-
ρσὶν ἀπαντες
οἱ σωθέντες.
& ita et vet^o in
terpres. Sunt ta-
men, q̄ nō hñt,
ἐν σωθέντες:
vt sic verū po-
stea deberet: ve-
luti aliis ferē
omnibus.

† ἐλοίμην.

* Ald. habet
βέσβιον. ma-
nuscripti ali-
qui λέσβιον.
aly τάβιον.

A.li. 3. Eto.
c. 18. 27. 1. a

A.li. 3. Eto.
c. 18. 27. 4. f

A. ibidem

Auerſus à Sole. Quòd ſi etiam in temperato orbis loco collis ſit, veluti iſ, qui ad Tabias conſpici-
tur, longe magis ad rem pertineat. Hoc in colle ſunt herbe quidem agrotis, & lotus, & polygo-
non, & meliſſophyllon: Frutices vero lētiſcus, & arbutus, & rubus, & hederā, & cytuſus, aliq̃ huius
ſimiles. Atq; ita tibi collis præparetur. Pecora vero, quæ in colle ad Tabias paſcuntur, boues ſunt.
Eſt q̃ eius animalis lac ſpiſſum ita, vt aſinorum tenue. Ego vero, ne quod lactis genus uſui deſit,
ex vaccis crallum, ex alinis tenue, ex capris medium, & boues, & alinos, & capras in paſcua de-
pulerim. Veteres vero etiam mulierem lactantem iis, qui phthoe conſumerentur, aditare volue-
runt: quorum ſentētiæ ipſe quoq; accedo, & q̃ familiare id ſit, & q̃ prius, q̃ ab ambiente refrige-
retur, id ſumi voluerint. Porro hoc tibi de lactis uſu pro maximo præcepto ſit, vt ij, quibus eo eſt
opus, omnino id aſtante animali ſtatim multum bibant, etiam melle inieſto, ſi cui cogi in ventri-
culo ſolet: q̃ ſi ipſum deſcendere ad aluum citius cupis, etiam ſale. Atque ille quidem adoleſcens,
cum vlcus in arteria ex peſtilenti morbo haberet, ſanatus eſt: ac poſt eum ſimiliter aliq̃. Alter vero
adoleſcēs annos natus circiter decem & octo, cum multis diebus ex deſtillatione laboraſſet, pri-
mum quidem ſanguinem floridum cum tuſſi expuit, non ſanè multum: poſtea vero etiam tuni-
cæ ipſius partem, quæ tegens intrinſecus totam arteriam, in fauces & os per ipſum arteriæ caput
B (Larynga vocant) aſcendit. Videbatur autem mihi, tum ex craſſitudine eius conieſtanti, tū agri
ſenſu, ipſius laryngis eſſe interna tūnica. Quin etiam læſa illi ex eo vox eſt. Atq; hinc quoq; longio-
re quidem tempore, ſed tamen ſanatus eſt. Cæterum, t̃qui ex peſtilentia hoc vitio laborarunt, }
propterea mihi facile ſanati videntur, q̃ præſiccatum iis præpurgatum que totum corpus fuerit:
quippe cum & vomuerint ex iis non nulli, & omnibus venter profluxerit. Atq; cum ita iam va-
cuati eſſent, qui euafuri erant, iis puſtulæ, quas exanthemata vocant, nigrae toto corpore cōfertim
multæ apparuerunt, vlcerofæ quidem plurimis, omnibus certe ſicce. Erat que intuenti perſpicuū
reliquias eas eſſe ſanguinis, qui in febris putruerat: quas, veluti cinerem quempiam, natura ad cu-
tim truſiſſet, ſicuti alia ex ſuperuacuis non nulla trudit. Verum medicamentis ad cuiusmodi exan-
themata opus non fuit, cum ſiderēt ſua ſponte, ad hunc modum: Alijs quidem, quibus videlicet
exulcerata ſumma pars fuit, decidit ipſa vlceris cruſtula, quam Ephelcida nominant: deinceps q̃,
quod reliquum fuit, propinquum ſanitati erat, ac poſt vnum duos ue dies ad cicatricē peruenit:
alijs, quibus ſcilicet vlcerata ſummitas non eſt, exanthema quidem ipſum, & aſperum & ſcabi-
oſum erat, decidit vero veluti ſquamma quædam: ac dehinc omnes fuere ſani. Nihil itaq; miri, ſi
etiam ij, quibus cuiusmodi exanthemata in pulmone ſunt orta, propter vlcerum ſiccitatem ſunt ſa-
Cnati. Quod nanq; in ceteris vlceribus vniuerſis ſupra monſtrauiſmus curationis eſſe propoſitum,
hoc iā iis, quæ ex peſtilentia ſunt orta, præſto fuit. Omnia nanq; ſicca, & aſpera fuere, plurima qui-
dem ſcabiei, quædam vero etiam lepræ ſimilia. Ergo, cum experientia rationi atteſtetur vlcerum
curationem hunc vnum habere finem, vt ſiccentur, poterit quiſpiam ex iis, qui ſanguinē ex pul-
mone reſciunt, ſeruare permultos ita, vt nos fecimus.

*De Curandis ſtatim iis, qui ob Deſtillationem, aut Membrorum ſpiritus
refrigerationem Sanguinem reſciunt.*

CAP. 13.

AC, quemadmodum quidem medendum iis ſit, qui notabile in pulmone vas fregerunt, inde
adeo, q̃ ab alto ſint lapſi, vel immodice clamarint, vel pondus ſupra vires ſuſtulerint, vel q̃
durum magnum q̃ aliquid extrinſecus ipſorum pectori inciderit, dictum prius eſt. Quemadmo-
dum vero, qui ex catarrho ſanguinem reſciunt, cōmodiſſime tractentur, nunc dicemus, propoſi-
ta claritatis cauſa curatione, quā Romæ in ſplendida muliere peregiſmus. † Hæc nanq; cum eiſ-
modi ſermones audiſſet, quales nunc de iis, qui ſanguinē ex pulmone reſciunt, habuiſmus, ſiue ex
catarrho id, ſiue vehemēti tuſſi paululū quiddā per noctē expuerat, ilico ad me miſit, ſe, quicquid
exigerem, præbituram promittens. Audiuerat vero ante id tēpus, niſi quis ilico præſidiū ſtrenue
Daſſeret prius, q̃ vlcus phlegmonen contraheret, eum operā amiſſurum: atq; hanc eſſe præcipuā
eorū, qui ſanguinē reſciunt, interitus cauſam. Ig̃itur incidere mulieri venam, quæ iā quatrīdium
propter catarrhum propemodū ſine cibo egilſet, non placuit: ſed iuſſi, vt acri vteretur clyſteri: tū
crura manus q̃ calfacienti pharmaco plurimū fricaret, & vinciret: mox caput raderet: cui deinde
medicamen, quod ex palumbiū ſtercore cōſtat, impoſui: interpolitis q̃ tribus horis in balneum
duxi, ac laui, nullo caput contingens pingui: dein caput idoneo pileo contexi, & pro eo, qui tum
erat, tēporis ſtatu, nutriuī ſola ſorbitione: poſt quā ſtatim fruſtū aliquē autumnaliū austerū dedi.
Deinde, cū dormitura eſſet, quod ex viperis conficitur, medicamentū dedi (theriacen vocāt) cir-
citer quatuor menſes ante confeſtū: habet enim id ætatis adhuc prævalentem papaueris ſuccum,
qui in antiquatis ignauus redditur: ideo q̃ & ſomniferū eſt, & fluxiones tum liccat, tum leuiter
craſſat. Finiſto vero prorsus catarrho, liquido apparebat tum ex reſpirandi ſpecie, tum ſonitu, ſe-
mel excitatæ tuſſis, pulmonē expurgatione egere. Ceterum exhibere hanc non placuit ſecūdo ſal-
tem die, ſed in omni taciturnitate & quiete muliere ſeruata, tum artubus eius p̃ſtratis vincētis q̃,
iuſſi reliquas quoq; oēs partes perfricari, excepto capite, quod adhuc ex medicamento incaleſce-
bat. Rurſus aut vesp̃eri dedi theriaces ceu fabæ noſtratis magnitudinē: erat vero, quod pridie ac-
ceperat, hoc longe amplius. Poſtea vero, q̃ hac quoq; nocte probe dormiuiſſet, tertio die mane

Septima Claſſis.

eeeeee iij mel

* σῶμα. i. cor-
pus.

† οὐκ ἐν λόγῳ

* Al. graue. que.

† clarius ex
græcis. Hæc
nāq; cum cuiſ-
modi ſermo-
nes audiſſet,
quales nūc de
iis habuiſmus,
qui ſanguinem
ex pulmone ſi-
ue ex catarrho
aliquo ſine ue-
hementi tuſſi
reſciunt, cum
paululū quid-
dam per noctē
expuiſſet, ilico
ad me miſit,
p̃bere ſe prom-
ptā aſſerēs ad
faciendū, quic-
quid ego vellē.

METHODI MEDENDI

mel coctum copiose exhibui, ac in quiete seruaui. Procedente vero die totū corpus similiter perfricui, ac ptisanę cremorē cum pane exiguo pro cibo sumere iussi. Mox quarto die mane quidem dedi medicamentū, quod ex viperis fit, sed quod iam in ætate vigoris esset, id q̄; cū copioso melle. Capiti vero mulieris eodem pharmaco, quod vehementer cum liccat, tum calefacit, imposito, ac deinde ipsa lota, nutrita q̄; modice, valētius iam pulmonē expurgare in quinto sum aggressus. Ac dehinc rursus, rursus q̄; ex interuallo, ad caput quidem consueto cerato, quod thapsia recipit, sum vsus. Totam vero corporis curam, in gestatione, frictione, ambitione, lauādi q̄; abstinentia, ac victu tum moderato tum vero boni succi, ad reficiendum direxi. Hęc itaq; mulier recte se se habuit, minime lactis opem requirens. Alteri vero adolescenti, cui nō ex destillatione, sed ex refrigeratis spiritus instrumentis, orta tussis fuerat, cum sanguinē & ipse ad dimidiā heminam reiecit, statim venam incidi, ac bis eodem die ex ea sanguinē detraxi: deinde rursus postridie bis: sed artuum frictione & vincitura priore die vsus, ad vesperam dedi pharmacū nostrum, quod dia spermaton dicitur. Secundo die post alteram detractionē imposui toti pectori ceratum, quod ex thapsia cōficitur, mox vesperti, ne supra modum calfaceret, id auferēs. Tertio die rursus ad tres horas imposito, hominem laui. Cibaui autem similiter tribus his diebus, prioribus quidē duobus, sorbitiunculis: tertio vero, ptisanę primum cremore, deinde pisce statim aliquo, qui & facilis concoctū esset & simplici ratione præparatus, adiecto. Dedi quoq; medicamentum dia spermaton, & secundo, & tertio die similiter ad vesperam: quippe quod & somnum conciliat, & sensum doloris eleuat, & siccandi vim habet. Tum vero, cum & spiritui delegatæ partes in naturali temperamento essent, & totum corpus vacuatum, ac nulla phlegmones suspicio circa ruptum vas superesset, expurgare cœpimus. Mox bibito medicamento, quod vīperas habet, ætatis iam vigentis, ad Tabias dimisi. Sic ego omnes, qui primo se die mihi curandos permiserunt, sanauī.

De Curando Pulmonis Vlcere, quod tribus quatuorve diebus insedit.

CAP. 14.

Qui vero post duos, aut tres, non oēs: sed aliquibus eorū insanabile vlcus fuit. Quotquot autē phlegmone sic occupauit, vt iam febricitarent, horum nullus est in totum perfanatus. Sed qui postea sic per omnia præsidia rite transierunt, vt siccaretur vlcus, ij tantum saltem lucriferunt, vt illud nec vltra progredere, nec maius fieret: sed siccatum, ac callo duratum, longiore vita frui hominem sineret. Ex iis vero, qui vlcus in pulmone habent, ij demum insanabiles mihi esse videntur, qui ex succi vitiosi erosionē id possident, quorum aliqui ceu falsilaginem spiritum suum sentire se aiunt: nam longo arbitror tempore oīno opus esse, vt succi corrigatur vitium. In tempore vero necesse est duorum alterum, aut siccando vlcus, ceu callum fieri, eo q̄; fore oīno insanabile: aut non siccando, tum ipsum putrescere, tum quę circa sunt depascere, atque ita spatio pulmones putrefacere. Porro multi ex iis, qui eiusmodi succum vitiosum cōgessissent, cum ex eo tussirent, non tñ etiamnum sanguinē reiecerent, huius nostrę prouidentię cōpotes facti, prorsus sunt perfanati. Oportet aut in principio nullius rei æque esse sollicitum, q̄; vt neq; tussiant, neq; ex capite aliquid in pulmonem defluat. Cauetur id triplici præsidio, purgatione primum: secundo, medicamine, quod dia spermaton dicitur: tertio, ipsi capiti prouidēdo. Quod purget, diuersas facultates habeat, oportet: cuius generis nostrę sunt pilule, quę ex aloe, scammonia, colocynthide, agarico, bdellio, & gummi arabico conficiuntur, ad plures videlicet excrementorum purgandas species. Sanē satisfaciant ad vsū, & quę sine gummi componuntur. Postea vero, si res postulabit, etiam iis, quę nigram bilem expurgent, vtare. Capiti prouidebitur cerati vsu, quod fit ex thapsia. Atq; hęc quidem in principio peragenda sunt. Post vero reficiendus æger salubriter est cibis boni succi, frictione, inambulatione, & balneo. Tradetur autem de his methodus in idoneo operis loco. Porro ij sunt, qui maxime lac requirūt: neglecto q̄; eo, omnium maxime sunt insanabiles. Cæterum de mittendo his sanguine sciri illud licet, Quicumq; parum habere sanguinis videntur, iis ad quendam succum probiorem (sicuti prædixi) reductis detrahere sanguinem poteris, tum rursus reficere: eosdem etiam rursus purgare, ac rursus reficere: denuo q̄; si res suadet, sanguinem mittere, potissimum, quibus veluti limus vitiosus & crassus, totus est sanguis. At, qui validi sunt, multi que sanguinis, iis statim a principio est detrahendus.

Quam perperam Erasistratus, ac Thessalus Sanguinis reiectionem curarint, ac de Vlcibus, quę in Sede, ac Pene consistunt.

CAP. 15.

^a ἀποτυχίας
^a χυμῶν est in
ip̄ressis, et mul-
tis etiam anti-
quis codicibus.
In antiquissi-
mo tamē quo-
dam exēplari
legitur, κακο-
χυμων.

Horum, quę retuli vel modo vel ante, siue ea inueni ipse, siue iuxta Hippocratis viā vsurpauī, nihil planē nō examinātū ac iudicio cōprobatū est, sed p̄ experientiā oīa iudicata: in quibus erroris pericula ipsi pertulimus. Fructū ex eorū vsu habituri sunt, quibuscūq; artis opera sunt curę: siquidē alij veri sunt, alij sophistarū sermones. Quanq̄ quid sophistas memoro? Cum etiā nō contēnendorū medicorū aliqui, et qui integra volumina de sanguinis reiectione prodiderūt, alia quidē multa & parua recte p̄scripserint, maximorū autē auxiliorū nullius meminērint, parū intelligētes p̄ multa illa & parua, quę recte admonent, longū ipsis ægrotis cōparandum interitū. Per hęc aut tria, q̄ planē deplorati nō sunt, oēs seruant, per sanguinis missionē, & purgationē, & ea quę caput roborāt. Sanē in sequētib; cū de succorū curatione præcipiemus, dicemus de sanguinis missione diligētius. Minime igit (sicuti medicorum nō nulli sentiunt) a paruis incipēdū auxilijs

A. li. 3. f. 10.
C. 5. 274. g.

A auxiliis est: Nec, sicut illi dicunt, sentiendum, ista scilicet prius esse tentanda: mox, si nihil profecerint, aggredienda maiora. Nam in morbis, in quibus periculum non impedit, vera ea opinio est: at, ubi moriendum agro prorsus est, si phthoe semel exceptus sit, alienissimum a ratione est a minoribus inchoasse. Nam, sicuti reliqua omnia ab Hippocrate tradita, ita illa quoque sententia recte est dicta. Nempe ad ultimos morbos ultima prorsus remedia maxime valere. Qua nam igitur inducitur opinione Erasistratus in talium affectuum principio segnis tardusque est: post diligens, cum perit occasio? Nam sanguinis missione, cum sanguis reicitur, nusquam prorsus vitur, vitiosissima ratione inductus: sed nec purgat quenquam, nec caput siccat. Quibus nimirum si quis phthoe occupari periclitantes fraudet, quamvis reliqua omnia probe peragat, nihilo plus, arbitror, agat. Nam sanguinem mittere recusat: ac solis artuum deuinctionibus ad eum auocandum vitur, quod (ut ipsemet ait) ad phlegmones tempora facit nobis sanguinis superstit, nec propter inopiam eius agrum nutrire cogamur. Sed heus tu Erasistrate, dicat arbitror aliquis, si post venam ruptam phlegmone iam pulmonem occuparit, non est, quod speres hominem sanandum propter ipsas, quas paulo ante comprehendit, rationes. Quare amplius opera tua non egebit, proditus videlicet per te inter initia. Quippe idem facis, quod gubernator, qui, ubi per eius incuriam euerfa nauis est, vectorum cuiuspiam aliterem

1. Apho. 6. Ex.
ord. 4. d

B in manu dat, inde quoque salutem comparare suadet. Sed Erasistratus fortasse existimabat phlegmonem esse ex iis, quae necessario vulnus comitentur. Verum, si ita sentiebat, in magna plane erat ignorantia: cum videre cuique liceat sexcentis eorum, qui quotidie singulari certamine decertant, maxima citra phlegmonem glutinata vulnera sic, ut secundo vel quarto die sint omnino in tuto. Nos vero etiam plurimos ex iis, qui vas in pulmone ex casu, clamore, plagaue rupissent, prius, quam phlegmone in vase rupto excitaretur, curauimus. Quod si horum quoque pulmones phlegmonem inuasisse asserit, ipse suis ipsius placitis repugnat, simul princeps viscus, quod maxime vicinum cordi sit, phlegmone laborare affirmas, simul hominem febre carere, item quoque rupta phlegmone nihil expulsi. Ergo a nobis quoque inuicem audiat nec fieri posse, ut glutinetur vlcus, si phlegmone pulmonem inuaserit: omnino quoque, si inuaserit, febricitaturum: ac purulenta deinde, cum phlegmone soluitur, tussi exputurum. Ergo, si quis nec febricitabit, nec tussiet, nec saniet aliquam ex ulcere & phlegmone spuet, quae ratio est, ut huius inesse pulmone phlegmonem dicas? Itaque tum hoc maximum certe praesidium non recte ab eo damnatum est, tum purgatio sine ulla mentione praetermittitur. Ac nec ullum pharmacon, quod efficax sit, contra ullum ex comprehensis generibus ab eo est positum. Quin, siue caput fluxionem mittat, eo statu seruetur: siue ex intemperie ipsorum spiritualium tussis incidat, etiam ipsa sic manebit. Ergo Erasistratus statuario illi assimilis videtur, qui reliquis omnibus partibus scite perfectis, statuam reliquit cecam. Nam quae, quae, reliqua pulchritudinis gratia, cum oculos desideres? Postea, si diis placet, cum tanti viri maxime aberrant, egregius vir Thessalus, qui artem ne nouit quidem, Methodicum se censet appellandum. Ac nunc termine omnes sectatores eius sanguinem mittere videmus, tum aliis agrorum non paucis, quibus non solum non utile, sed etiam noxium existimare id praesidium oportebat, praesertim si propriis ipsis hypothelibus starent: tum vero iis, qui sanguinem, siue hunc per vomitum, siue etiam cum tussi, reiciunt, modo ualentes vires habeant. Sed quomodo cohaerebunt haec secum, ut uenam, ubi sanguis reicitur, incidere iubeant, & in commentariis suis scribant remedium id adstrictis uitiis conuenire? Ergo ne se Methodicos amplius non inuent, sed Empiricos, si reiecta ratione, quam esse rectam putabant, experientia utuntur ad inuenienda praesidia. An igitur in iis quidem clare deprehenduntur nec methodo, nec oino ratione aliqua quicquam facere, ubi uero partes inutiles esse ad curationis inuentionem aiunt, non multo magis?

C Atqui, si quis ad memoriam reuocet ea, quae de auribus, naribus, oculis, ore, pectore, pulmone, praeterea utero, uelica, & uentriculo, diximus, errare eos tota uia uidebit. Talis igitur erat, qui ad phlegmonem, quae in pudendo erat, macedonico medicamento est usus, ac cum eo etiam cataplasmate, quod

D relaxandi uim habebat, nepe soleni hoc, quod ex pane, aqua, & oleo conficitur. Etiam alius quidam illi persimilis, qui ad sedem exulceratam isdem est usus. Verum de talibus, ubi de phlegmonis disputabitur, agemus. Caeterum ulcera, quae citra phlegmonem in pene sede uel consistunt, nullum cataplasma desiderant, sed medicamen, quod cicatricem inducat: non tamen, mehercle eius naturae, quae ulcera, quae in carne sunt, inducere cicatrice possit, immo quae tanto magis siccare possit, quanto haec partes sunt carne sicciores. Quin etiam, quod magis admirare, ipsorum, quae in pene sunt, ulcerum magis etiam siccare postulant, & quae in toto cole haeserunt, & quae extra hunc etiam finem eius, qui glans dicitur, infestant: minus uero, quae in preputio sunt: atque etiam his minus, quaecumque in reliqua sunt cute, quae totum colorem uestit. Cum igitur humidum in glande ulcus quidam ex amethodis istis medicis, istis inquam Thessaliis, sanare aliquando non posset medicamentis iis, quae epulotica uocantur, id est, quae cicatricem inducunt, adhibuit in consilium me. Vbi igitur ex me audiuit longe siccioris medicamento particulam egere propterea, quod siccioris naturae esset, primum non credidit: ut uero coactus necessitate est aliquo ex nostris medicamentis uti, tribus diebus sanatum ulcus est: perspicuum quoque erat medicum non tam fuisse de salute hominis laetatum, quam inde adeo tristatum, quod in mala disciplinae secta fuisset educatus. Siquidem medicamen, quod ex papyracea charta combusta fit, hoc scilicet nobis usitatum, id genus ulcerum sanat: sicuti etiam anethum ustum simili modo inspersum: item quoque cucurbita sicca

Septima Classis.

eeeeee iij atq;

METHODI MEDENDI

atq; vsta ad eundem modum: alia præterea multa ex iis, quæ vehementer, sicut illa, siccant. Siqua E vero eiusmodi vlcum sine madore sunt, ac recentia, iis sola aloë salutare medicamen est. Insuper-
gitur autem sicca, sed in tenuissimum ceu pollinē redacta. Hæc vero etiam, quæ in sede consistunt, sicca vlcera probe pcurat. Simillimā huic vim habet & cadmia vino elota, & sicca. Ab hac quoq; non longe abest argenti spuma, Lithargyros græce dicta. Deinceps vero molybdæna sequitur. Omnibus vero tum minus inferens doloris, tum nullo minus efficax, pompholyx est. Sin humi-
diora sunt, ipse per se pini cortex, item q; lapis hematites vocatus, idoneus est. Quod si profundi-
tas quæpiam ipsis adsit, ubi excitata fuerint, dictorum alicui tantulum mannæ admiscendum est, quantum sit ad carnē gignendā satis. Neq; igitur horum quicq; vel per somnium norunt, qui istius sunt alienæ à methodo sectæ, cū omne vlcus, in quacunque animantis sit parte, eandem postulare curationē opinentur: neq; etiam, quemadmodum fuere quædā vlcera oporteat, veluti ea, quæ in abdomine contingunt: de quibus in sequenti libro cum iis, quæ restant, vniuersis agetur.

At ibidem.

GALENI METHODI MEDENDI ID EST DE MORBIS CVRANDIS LIBER SEXTVS

ARGVMENTVM LIBRI

Nervorum, Tendinum, Ligamentorum, Partium quæ, quæ illorum natura participant, Ossium quoque curationem absoluit.

Prolixitatis librorum Excusatio, ac Quæ hætenus monstrata sunt.

CAP. 1.



On dubito fore non nullos, quibus esse prolixus videbor, qui vnum hæte-
nus morborum genus, quemadmodum methodo curetur, exponā. Par est
autē, non tam nihil longitudinem hanc imputent, q̄ iis, qui parum intelli-
gentes, quæ rectissime ab Hippocrate sint scripta, ea calūniari sunt conati:
quos, ne quemadmodum vlcus quidem recte curent, scire ostendi, nedum,
quod maius sit, quicquam. Atq; ipsum quidē morbi genus, cuius vna spe-
cies vlcus est, seu continuitatis seu vnionis solutionem voces, nihil referat. G

Illud monstratum est, methodum curandi eius, in quocunq; corporis mem-
bro sit, quæ quidem ab affectu ipso sumantur, indicationes seruare communes: quæ vero ex par-
tibus præbeantur, alias atq; alias habere. Cum enim in carnis particulis inciderit, nominat quid-
dem vlcus: habet vero curationis indicationē omnium quidem, quæ præter naturā sunt, commu-
nem, sui scilicet ademptionē: quam vero, ceu affectus, præstat, ut per contraria tollatur: quā, ut di-
uilio est, vnitionē, quippe generatio huius vitij in diuisione vnitatis cōsistit. Ideo q; in osse voca-
tur fractura, græce Catagma: in nervosis fibris Spasma: in musculis Vlcus & ruptio: quorū diffie-
rentia prius iam dicta est. Idem tñ morbus, cū in nervum & arteriam & venā inciderit, nullā pro-
priam appellationē est sortitus, mutuatur autē interdum vlcus, interdum vulneris vel ruptionis,
appellationē. Ceterū parum esse de nominibus sollicitū debere eum, cui rerū sciētiam inuenire sit
propositū, sepe iam diximus. Itaq; huc potius nobis neglectis, pperemus: qñ nō ex horū exqui-
sita impositione, sed ex appositis remediis, ægro salus paritur. Rursus igitur reuocandū ad memo-
riam est, quæadmodum audacissimus Thessalus, cū nullā curandi vlcus methodū tradiderit, oēs
tñ dixisse se arbitratur. Siquidē, q; sinuosum vlcus postulet impleri, & simplex glutinari, hæc nec
idiotis sunt ignota: quæadmodū tñ methodo quis pharmaca inueniat, quibus vel impleat quod H
sinuosum est, vel glutinet quod simplex est, hæc vulgus nō nouit: at id est, quod medicis confide-
randū proponitur, atq; in eo alius alio est pstantior. Quippe, veluti in præcedentibus ostēdimus,
& inueniet remedia, & inuentis recte vtetur, quisquis in medendi methodo est exercitatus.

Aduersus Thessalum de Nervi punctura, ac de Medicamentis, quibus curatur. CAP. 2.

VT enim iā aliquid persequamur, quod præcedentibus sit deinceps, fingamus quempiam ad
nos venire, cui tñ cutis acu sit puncta. Hunc hominem, si is sit, cui facile vlcera sanescant, etiā
si citra medicamentū nudo q; membro ad opera consueta dimittas, nihil sentiet mali: sin, cui diffi-
culter sanentur, primū quidē dolebit, post etiam tum pulsu particula infestabitur, tū phlegmone.
Ac Empiricus quidē examinando percontando q; hois naturā discet: Nos vero, tū ex eiusmodi
examinatione oibus his vsi, quæ per experiētiā inueniātur: tum nihilo minus ex iis notis, quas
de boni succi mali q; naturis habemus: præterea de iis, qui acris hebetis q; sunt sensus: tum pleni-
tudine grauatis, modice q; se in succis habētibus: nō ignari, q, qui vel plethoricus est, vel vitiosus
succis premittitur, vel acris est sensus, vel horum quibuscumque oibus ue premittitur, phlegmone tenta-
bitur: qui contra est affectus, nihil mali sentiet. Atq; hæc prospicientes, nō equidem medicamen,
quod glutinet, imponemus, cuiusmodi plurima sunt eorum, quæ Enæma vocant, (ea sunt, quæ
recentibus

A.1.1.4.1.
83.f

A recentibus statim applicantur vulneribus) immo molle & blandum, & quod dolorem mitiget: si quidem, vbi magna diuifio est, ibi studium impendi debet, vt magis siccantibus remedijs labra vlceris vniantur, atq; coalescant: vbi autem acu stilo' ue facta diuifio est, id duntaxat curandū est, ne phlegmone particula tentet. Atq; ex hoc manifestum est cruentorū vlcerū indicationem, quæ à Thessalo est prodita, nihil nos maius adhuc docere, q̃ sit cuiuslibet e plebe notum. Non enim scire, quid fieri oporteat, id magna res est, vt quod omnibus hominibus natura insit: sed, quibus rationibus illud efficias, id vero scire artificum est. Nam, si nauem quispiam sit edificaturus, scimus profectò oēs, etiam qui nauium fabri non sumus, quo loco poni gubernacula debeant, quo loco puppis, quo prora, ac reliquorum quiduis: ceterum nihil nobis hæc ad rem conferunt, vipote ne scientibus, quemadmodum ipsa struant. Æque, & qui edes molitur, vtiq; non ignorat, nec q̃ iacienda primum parietum fundamenta sint, neq; q̃ super his erecti minime q̃ inclinātes erigēdi sint parietes, nec q̃ super his strui tectū oporteat, nec q̃ ostia & fenestræ singule q̃ reliquarum domus partium proprijs collocandæ sint locis: verum hæc ad domum ædificandam quid conferāt, quoad ipse fabrilis artis ignarus ea fabricare nesciat. Vni igitur Thessalo omnium hominum sapientissimo, nosse, quid fieri oporteat, ad artificiosam notitiā satis esse videtur. Sed nos per su-

Bperius comprehensa monstrauius id esse operum, quæ ex artibus expectentur, veluti principiū quoddam, nō dum aliquam eorum propriam partem, sed quæ etiam sit cuius e plebe cōmunis: quippe primæ in omni arte indicationes oibus hominibus natura sunt præstò. Quare, si hæc satis sunt ad opifices faciendos, nihil vetat, quin & naues ipsi ædificemus, & materiā fabricemus: pròptum q̃ sit omnibus tum calceos facere, tum vestes, tum domos, sed & architectos esse, & cithara personare, & rhetoricari. Verum non ita se res habet: nec, qui vulnerata parti naturalem vnitio-

nem esse moliendam nouit, is medicus est, sed qui, quibus id rebus perficiat, intelligit: quanq̃ ne hoc quidem ipsum per se satis est, si quis etiā, quò pacto his sit vtendum, nesciat: sed, qui viam omnem curationis eousq; percalluit, vt ipsum cōsequi destinatum finem queat, is demum est, qui mereri nouit. Ergo istis amethodis Thessali emulis illud accidit, vt cū maiora viribus audeant, nec ad ea, quæ consequi alioqui possent, accedant. Quippe, cum dudū stilo quidā vulneratus in manu esset ita, vt tota diuifā cute aliquid neruorum, q̃ suberant, pūgeretur, sapiens scilicet Thessalius in principio emplastrū quoddā imposuit, quo sepe in maximis vulneribus vsus prospere fuerat. Putabat. n. (arbitror) omne vulnus eandē curationē requirere. Phlegmone vero oborta, ad cataplasma, quod ex farina tritici cōponitur se conferens, atq; interim hominem putrefaciens, intra septimū diē iugulauit. Nec sanē comprehendere numero est, quot, vbi in Pæonias istorum manus incidere, conuulsionem perierint: quò, si dijs placet, sanctio illa Thessalia seruetur, Omne cruentum vlcus similiter esse curandum, id q̃ partibus ijs, quæ laborent, nullam indicationem cōferentibus. Ceterum vera ipsa methodus non perinde, atq; hæc Thessali, est amethodos, immo pōt vel nunc etiam post tot tantos q̃ medicos non solum meliora medicamēta, q̃ prius fuere, sed etiam vniuersum curationis modū inuenire. Nemo enim statim ab initio ijs vsus, quæ nos inuenimus, ex nerui vulnere in cōuulsionem incidit. Aduerti' nanq; vbi punctus neruus esset, ei ex sentiēdi, quod obtinet, acumine necesse esse tum dolorem incidere, quā reliquis partibus, maiore, tum ex necessitate phlegmonē consequi, nisi quis & medelam dolori inueniret, & phlegmones generationem prohiberet. Rationabile igitur mihi est visum cutis quidem vulnus apertū inglutinatum q̃ custodire, quò per id ex neruo vulnerato sanies efflueret: totum vero corpus superuacuis humoribus liberare: ac, ne quis dolor vulneratam partem vrgeret, in primis sollicitudinem habere. Itaq; etiam medicamenta excogitauī non pauca, quæ vulnere imposita ad vtrumq; mire sunt comparata, tum vt dolorem mitigent, tum vt exitum saniei patefaciant. Tutius vero fuerit etiā, si quis cutem latius incidat, ac totum corpus sanguinis missione inaniet, vtiq; si fortis sit virtus. Si vero vi-

Dtiosis succis repletum corpus sit, protinus purget. Aqua vero calida, quanquam reliquas phlegmonas valde mitigat, vulneratis tamen neruis est inimicissima: cum præsertim eorum substantia ex refrigerata concreta que humidior materia sit condita: omnis enim eiusmodi constitutio per ea, quæ simul calefaciunt & humectant, resoluit ac putrescit. Itaq; ab aqua calida eos, qui ita vulnerati fuerant, omnino prohibui, vtilius iudicans oleo calente fouere propterea, q̃ demonstratum à me est, hoc quoq; si frigidum applicetur, tenues meatus obstruere: sin calidum, digerere. Porro fugi ex huius quoq; generibus & crudum, quod Omotribes græce dicit, & quod deniq; adstringendi vim haberet. Delegi aut tenuissimū, cuius generis Sabinum est: quod etiam vtilius fuerit, si bimū trimū ue sit, quippe id, q̃ recens, magis per halitum digerit: quò q̃ magis est antiquum, hoc semper magis digerere est potens, verum dolorē minus sedat. In pharmacis aut huc omne cōsiliū direxi, vt esset eorum facultas tū tenuis, tum modice excalfaciens, & quæ siccare citra dolorem posset: cum sola hæc trahere ex profundo saniem neq; contracta neq; demorsa particula possit. Vtus sum aut primū terebinthina resina, tū per se, tum et paulum euphorbij admiscēs: Et per se quidem in pueris, & mulieribus, & generaliter ijs, q̃ molli essent carne: cum euphorbio vero in ijs, qui dura. Non secus aut & propoli, non per se modo, verū etiam cū euphorbio ipsam molliens: q̃ si durior esset, cum tenui quopiam oleo. Quin & sagapeno in duris corporibus sum vsus, vtiq;

METHODI MEDENDI

^a φάρμακον ἐ-
πιπασσον, est
in manuscri-
ptis.

vtiq; cum oleo & terebinthina id miscens: sed & opopanace ad eundem modum, quo & sagape- E
no. Mihi vero & lachryma cyrenaica non inutilis fore videt, si quis emplastrum ex ea faciat, cuius
modi est, quod nos ex euphorbio cōposuimus: verum nō dum id experiētia, quēadmodum reli-
qua omnia, comprobaui. Quippe p̄cedere oportet eam, quē à vera methodo proficiscitur,
remediorum inuentionē, huic vero experiētia ad certiore[m] ēt h̄dem subscribere. Siquidem ex
tali methodo ēt sulfur, quod ignē expertum non sit, quod q̄ lapidosum non sit, sed oīno tenuium
partium, ei, cui neruus vulneratus esset, conducturū sperauimus, tantum eius tenui oleo miscētes,
dum, quod ex vtriusq; mistum erat, sordium haberet crassitudinem. In valētioribus vero duriori-
bus q̄ corporibus, ēt li ad mellis spissitudinem redigas, sic quoq; iuueris: nam id quoq; compro-
batum experientia est. Quin etiam lotam calcem similiter oleo admistam his applicandam exco-
gitauimus: quā ēt, si mari lauetur, magis proficiet. Lauatur optime per estatem in aestu caniculā.
Quod si bis ter ve eam laueris, vtilius medicamen efficies. Quo pacto aut talia p̄paranda sint,
ex cōmentarijs, quos de medicamentorū cōpositione edidimus, intelliges. Nunc mihi tm̄ dixisse
sufficit me tum hęc, tū alia multa medicamenta aduersus neruorum vulnera inuenisse, cum nec
sub aliquo magistro ea vsurpata viderim, nec in veterū alicuius aut medendi libris, aut quos de Fa-
cultatibus ex propria sapientia inscribūt, prodita: sed ex ipsa rerū natura indicationes sumpserim. F
Id quod propriū esse medici methodo vtentis existimo. Mirificus autē Theffalus, cum ne vnum
quidem medicamētum inuenerit, iam pridem materiā eorum notam esse affirmat. Atqui mul-
torum medicamentorum, quā nos excogitauimus, nō modo Theffalo, & qui ante eū medici fue-
runt, materia nota non est, sed nec ijs, qui post eum in hūc vsq; diem fuerunt. Siquidem ipse, cum
accerditus aliquando essem ad quendam, qui à Theffalijs istis amethodis medicis putris fuerat fa-
ctus: ac cernerē eum cataplasma, quod ex triticea farina fit, impositurum: vbi nullum ad p̄sens
mihi medicamētum erat, poposci ex figulo quodā, quē viderā, agri vicino aquā lixinam: tum co-
quens in ea farinam hordeaceam, non aut sicut illi in oleo & aqua triticeam, imposui. Postea vero
farinam erui simili modo coctā, iam phlegmone inflammato & putri ex bella horum curatione
neruo imponēs, vindicaui ab ea putrefactione hominem. Verum de ijs, quā cum phlegmone
putrescunt, alia disceptatio sequetur, ea q̄ diffusa in opportuno operis loco, De neruis vero vul-
neratis satisfaciāt, quę dicta iam sunt. Et sanē ex ijs, quā ipsi inuenimus, plurimi vno illo empla-
stro vtuntur, quod ex euphorbio, & cera, & fricta resina est compositum. Cui, nescio quomodo,
aliqui sinopidis aliquid postea miscuerunt, aliqui ochrę, quod videlicet fucatum, vnde componat,
lateret, † egre ferentes, si meum id esse videretur. † Verū non est à principio sic à me cōpositū. Mi G
scuerint fortassis ei non nulli & ē salis flore aliquid, aut aliud quippiā tale, quod colorem eius im-
mutet, nec vim eius minuat. Potest quis per ignorantiam etiā tale aliquid immiscere, quod facul-
tatem eius immutet. Verum nos illud ex cera, resina terebinthina, pice, & euphorbio composui-
mus, immiscētes ex cera partem vnā: ex terebinthina, & pice, vtriusque partis vnus dimidiū:
sic, vt quod ex vtriusq; conflaretur, cerę par esset. Licet autem interim, & plus sit, quod ex ambobus
confit, q̄ cera: licet rursus & alterum eorum tantum, cerę admiscere. Quin etiam in penuria te-
rebinthinę tum humidam pineam, tum etiam frictā, commode admisceas: non minus etiā his
& abietinam immittas. Strobilina vero duris tantum corporibus idonea est: ad mollia vero in-
miscenda non est. Si itaq; humidam resinā immiscebis, tum sum cribratum q̄ euphorbiū reliquis
immittes liquatis: esto vero pondus eius, cerę pars duodecima: etiam plus aliquando, vbi scilicet
valentius efficere est in animo: Sin siccam, sicuti quā fricta est, vtiq; olei pusillum desiderabit eu-
phorbium. Quare ego tum id cum oleo contundens, ac ad sordium spissitudinem redigens, mox
reliquis post liquationem refrigeratis tērens misceo. Sape etiam tantulum aque immiscui medi-
camento conficiendo, quantum in mistis ipsis liquandis tum absumi tum euanescere prorsus po-
tuit. Verum oīa huius generis ad tractationem de medicamentorum cōpositione magis attinēt. H
Nunc suffecerit, sicuti antea fecimus, indicato, quale esse debeat medicamēti genus, pauca parti-
culatim exēpli causa apponere. Vberem nāq; oīum materiā in opere de simplicibus medicamen-
tis inuenies: p̄parare aut debebis, vt in opere de eorū cōpositione est traditum. Nūc igitur satis
est hoc tm̄ dixisse, atq; ad alia transire. Vulnerati nerui curatio medicamenta postulat, quā &
tepidū calorē excitent, & valenter siccent: tum quę ex substantiā suā natura & trahendī vim ha-
beant, & tenuiū sint partium. Sanē non ad medicamētorū modo victus q̄ inuentionē ipsa medē-
di methodus proficit, sed ēt ad ipsum inuentorū vsum. Nam veluti in superioribus ostendimus,
quisquis citra methodū, quā vlceri apta medicamenta sunt, molitur, eum ne minimo quidē eorū
probe vti posse, ita & nunc ostendere licet. Siquidē intellexisse, quantopere affectum vel siccarit,
vel calefecerit, vel mitigarit, vel lacefferit medicamenti applicatio, is demum potis est, qui metho-
do quadā curat. Idem vero ipse solus ēt intendere ea, quibus inter initia est vsus, vel remittere no-
uit. Cum nanq; quod δὲ ἐυφορβίου propterea q̄ euphorbiū accipit, vocant, quidam vulnerato
neruo statim imposuisset: id q̄ subinde prius prospere fuerat expertus: tertio die indicauit mihi
vulneratam partem tum dolentem, tum phlegmone tentatam, miratus medicamen nihil contu-
lisse. Percontatus igitur laborantem sum, num primo die, cum impositum medicamentū esset, ca-
lorem

† in aliquibus
cod. græcis hæc
non habentur.

^a ἔσας.

A. 1. 4. f. 4.
c. 3. fo. 476

A. 1. 4. f. 4.
c. 2. fo. 47

Alorem quempiam veluti ex Sole suauem sensisset: is se quicquam eiusmodi sensisse negauit. Rur-
sus itaq; percontabar & medicum, quanto iam tempore preparatū apud se medicamentū habuif-
set, ac quos eo sanasset. Ille plus anno apud se habuisse: sanatos vero à se aiebat pueros duos, &
adoleſcentē vnū. Cum autē & de corporis habitu adoleſcentis rogāsem, albū eum, molli q; corpo-
re fuisse affirmabat. His ergo auditis cū intelligerē, vt ad propositi adoleſcentis temperiē, euphor-
biū deesse, postulans tum ipsum emplasticū medicamētum, tum ēt euphorbiū: sumēs q; ex his,
quantū ad ea inter se miscēda satis putauī: iussi manibus medicamētum subigere, ac euphorbiū
diligenter contundere. Postea, q; hęc facta sunt, miscere ea simul iussi: ipse vero oleum Sabinum
vtiq; subantiquum modice calefaciens, foui vulneratā partē. Reſecto q; leuiter puncturā, quod
conniuebat, foramine, imposui medicamen: iniunxi q; homini inediā. Medico vero præcepi,
vt vesp̄i rursus eū solueret, ac simili modo, quo me viderat, oleo vteretur. Atq; his peractis ap-
paruit postridie pars agra & sine dolore, & sine phlegmone: intellexerunt q;, qui huic operi ade-
rant, oēs verissimum esse (quod nos sæpe vsurpamus) non esse adeo magnum, quod medicamen
præstare possit, nisi naſtum sit, qui eo dextre vtatur. Est autem dexter vſus, qui tali planē metho-
do, qualem ipsi iam sæpe in commentarijs, qui ante hunc sunt, ostendimus, procedit, omnium
B medicamentorum vſu ad calidum, frigidum, humidum, & siccum, veluti ad normas, relato. Quā
nimirum methodum non solum amethodi Theſſali ſectatores probe tractare non valent, ſed nec
Eraſiſtratus nec alius medicorum quisquam, qui corporum elementa aut prorsus non inueſtiga-
runt, aut alia, q; quæ comprehenſa à nobis sunt, poſuerunt. Sed de his hæcenus.

De Curandis Nervis per longitudinem vel tranſuerſum vulneratis, ac contuſis.

CAP. 3.

Si autem non punctus, ſed planē caſim vulneratus neruus ſit, conſiderādum eſt, quo pacto fa-
cta vulneratio ſit, vtrum ne per tranſuerſum neruum, an p longitudinem eius: tū vero quan-
tum interuenientis diuiſum ſit cutis. Proponatur igitur primum, multum eſſe cutis adapertum
adeo, vt neruus nudus appareat, is q; per directum non per tranſuerſum diuiſus. Huic neruo nul-
lum iam memoratorum medicamentorum, quæ ex euphorbio ac ſimiliter acribus emplaſtri ſpe-
cie ſiunt, applicabis: nudatus nanq; non feret eorum vim ita, vt, cum interpoſita cutis erat, tulit.
Optime igitur eo caſu calce elota in multo oleo ſoluta vtere. Salutare vero eſt, & quod ex pom-
pholyge medicamentum ſit, ſi in largo roſaceo ſit liquatum: quod vtiq; melius fuerit, ſi tum roſa-
ceum ipſum, tum oleum, ſalis ſit expers: ſiquidem nudato neruo, omnis curationis conſiliū huc
tibi dirigendum eſt, vt minima cum mordicatione ſicces: poſſunt vero id præſtare planē pauciſſi-

Cma medicamēta. Eſto igitur hoc caſu calx ſalubri aqua eſtatis tempore ſepe elota. Eſto præterea
(vt dictum eſt) & pōpholyx elotus, ita uidelicet, ut elotus habetur in eo cōpoſito medicamento,
quo publice utimur, quod q; alia elota in ſe non pauca continet. Quippe, quæ ex metallis conſi-
ſtunt, ea elota eſſe omnia oportet, ſi modo citra morſum ullum ſint ſiccatura. Salubre uero medi-
camentum eſt, & quod ex melle ſub emplaſtri ſpecie cōponitur, utiq; cū ex optimo ſit melle. Sol-
ui uero & id roſaceo oportet, quod tum reliquis conditionibus ſit optimum, tū ſalis omnino ex-
pers. Quin etiam ceram, quæ eiusmodi medicamenti ſit miſcenda, elotā eſſe conuenit. Æque, &
ſiqd terebinthinæ reſinæ iniicies, hæc quoq; elota ſit, oportet: atq; hac magis, ſi alterius cuiuſquā
reſinæ quid immittes. Quippe medicamenti omnibus, quæ laueris, acris mordens q; ſanies elui-
tur, atq; abſtergitur. Si uero robuſtus ſit, qui uulnus accepit, & cui corpus ſit à ſuperuacuis humo-
ribus mundum, in hoc fas eſt etiam ualentioribus remedijs non nullis uti: Veluti ipſe aliquādo,
cum id genus uulneris in carpo accepiffet iuuenis quidam philoſophiæ ſtudioſus, alioqui corpo-
re bene habito, & tum in eſtuo Sole peruſto, ex Polyidæ paſtillis ſapa ſolutis, poſtea ſuper calida
aqua tepefaſtis, linamenta imbuta imposui. Nam id quoq; uel in primis ſemper habendum cure
eſt, nequid ex ijs, quæ uulnus contingent, frigidum ſit: quandoquidem ipſa laborans pars & ſen-
ſilis maxime eſt, & principum partium primatū continua, & temperamēto ſuo frigida: quorum
omnium occasione & ex facili à frigido offenditur, & ſuā offenſam impertit cerebro. Quod ſi ex
ijs fuerit, quæ in muſculos perueniant, etiam conuulſionem facile accerſit: ſiquidem moſtratum
eſt muſculos uoluntarij motus inſtrumenta eſſe. Idem fore & in tendonibus expectabis, iſdem
de cauſis. Ceterum cum memoratum remediū tum uulneri ipſi iuuenis imposuiſſem: tum ue-
ro partium, quæ ſupra erant, non parum eodem complexus fuiſſem: quæ circa axillas, collum, ca-
put q; eius erant, omnia calente oleo aſſidue madefeci. Detraxi uero illi & primo ſtatim die ſan-
guinem ſcarificata uena. In quarto igitur hic quoq; iuuenis recte habuit adeo, ut & rugoſum, &
paruū, & contractum ulcus iam cerneretur. Verūtamen conſultius uſum eſt uſq; ad ſeptimū
nihil nouare: poſt quem diem planē redditus eſt ſanus. Sanē oleo perfundere tale ulcus nō opor-
tet, præſertim cum, ut nunc comprehenſum eſt, curatur: nam oleum paſtilli huius uiribus eſt ad-
uerſum, ac ſordidum ulcus reddit. Neque enim parum intereſt, nudo ne neruo oleum, an per in-
terpoſitam cutem admoueas. Abluenda igitur à uulnere ſanies eſt molli lana ſpecillo circumuo-
luta. Madefacere uero lanam ſi placet, ne ſcilicet ſicco ulcus attingas, ſireum, id eſt ſapa, ſuffecerit,
quam & hepſema uulgo apud nos in Aſia uocant. In hac igitur lanā intingens, mox exprimens,
ulcus detergebis. Eſto uero hæc quoque ipſa tepida primis maxime diebus. Quod ſi omnia ex

ſententia

METHODI MEDENDI

sententia successerint, etiam vino dulci madefacere citra periculum licebit: verum dulce id omni E
mordete qualitate careat, cuiusmodi tum theriū est, tum scybelites, atq; ab his, quod caryinum
vocant: quæcūq; vero & dulcia pariter & fulua sunt, veluti falernum, inutilia sunt, quippe acria
sunt omnia talia, ac supra modum calida. Ulcere vero iam ad cicatricem veniente, quæ alba planè
sunt & tenuia, nec multam aquam tolerāt, nec odora sunt, ea dulcibus præstāt. Aquæ vero vsum
ad neruum vulneratum semper fugies, sicuti etiam relaxās cataplasma. Ad iam dicti vero pastilli
vsum prope etiam accedit & medicamenti vsum, quod Dia chalciteos vocamus, quo publice uti-
mur. Liquari vero etiam hoc debebit aestate rosaceo, hyeme sabino oleo. Descriptum autem est
medicamentum hoc à nobis in primo de medicamentorum compositione. Polyidæ vero pastil-
lus, vel trochiscus, vel quomodocunque appellasse libet, omnibus ferme notus est. Cuius si copia
non est, Andronis, vel Pasionis, pro eo est sumendus: vel noster, qui etiam omnibus illis est valen-
tior. Sanè iam dictum est robustis corporibus valentiora medicamenta, imbecillis mitiora esse
adhibenda. Ista & vera methodus inuenit, & experiētia confirmat. Thessalus vero cum suis vnà
sophistis in alto throno residēs, ἐν χειρομύχοις ἀνδραγάσων, i. apud pecuinos & brutos hoies (vt Cer-
cidas ait) in pretio erit, dum suis rationibus cōhrmat omnis vlceris recentis eandem esse curatio-
nem, neq; hanc, vllam ex partium natura indicationem sumere. Vnus tñ magni in eius sapientia F
nominis, admirandam vulneratorum neruorum curationem excogitauit: nam protinus eos to-
tos præcidit, ne admonito quidem, qui vulneratus fuerat: quanquam in hoc quoq; à secta sua de-
sciuit. Siquidem par erat vel & musculos vulneratos, & arterias, & venas, & aliud quiduis totum
præcideret: vel nec neruū. Alioqui sic, qđ fugiunt, id facere deprehendunt, vt diuersam pro discri-
mine partium indicationē accipiant. Verū hos iā mittamus, ac de transuerso nerui vulnere aga-
mus, in quo maior cōuulsionis metus impendet, phlegmone scilicet defectis fibris ad nō sectas cōmu-
nicata, ceterū cōuulsione ab ipsis non sectis excitata. Ac, qđ ad vlceris curationē attinet, his quoq;
sunt eadē: cæterū detrahare largius sanguinē, ac tenui magis, qđ in illis, vt victu, tñ in quiete oīno
ac lectulo molli hoīem continere oportet: tñ oleo calenti vbertim in axillis, collo, tēdonibus, liga-
mētis, & capite vri. Quod si vulneratus neruus ex ijs sit, qđ in crure habent, sicuti, cū in manu erat,
ale, ita in his bubones largo oleo imbuēdi: tñ per totam spinā ad collū, & caput ascēdendū. Con-
tuli vero nerui, vbi cū his vnà cutis quoq; cōtusa exulcerata qđ est, medicamēta postulat, qđ in sic-
cando qđem cōe nerui vlcera sanantiū consiliū seruent, cæterum quæ partes, quæ per contusionē
à se dissideāt, contrahere constringere qđ sint apta. Qui vero absq; cutis simili affectu sunt contu-
si, hos oleo calēte, cui euocandi facultas insit, sepiissime pfundere oportet, ac totius corporis similē G
curam habere. Semel hoc incidere vidi, sanauit qđ id mature, ipsa ex oleo perfusione. Verum vnà
cum cute neruos contusos sæpenumero vidi: & propter eius symptomatis frequentiam athletæ
ipso vlu edocti habent cataplasma, quod ex oxymelite & fabacea farina conficitur: quod planè sa-
lutare medicamētum est. At, si dolor vnà cū contusione vexat, et picem liquidam immiscere, ac
bene coquere, tñ calens medicamentū imponere oportet: vbi vero magis siccans efficere voles,
erui farinā iniicies. Quod si, vt amplius quoq; siccet, desiderabis, irim illyricam immittes. Totius
autē corporis cura his quoq; cōis est. At si totus præcisus neruus sit, metus præterea nullus instat:
debilis tamen particula manebit. Curatio vero eius cōmunis est cum ea, quæ aliorum est vlcerū,
quam qđ vnā Thessali imitatores norunt. Ergo de neruis hæc abūde sint dicta. Phlegmonē ve-
ro, quæ his superuenient, quemadmodum curandæ sint, vbi de phlegmonis agemus docebitur.

*De Vulneribus Ligamentorum, Intestinorum, Peritonæi, & Omenti, & quo pacto Sutura fieri debeant,
cum partes abdominis internæ vulneratæ sunt.*

CAP. 4.

Ligamenta vero, (quæ græci Syndesmus vocant,) cum simillimam habeant tendonibus spe-
ciem, valentissimorum remediū vim tolerant, quod nec ad cerebrum pertingant, & sen-
sus sint expertia: nam nerui, omnes alij ex ipso statim cerebrum ortum habent, alij spinali interue-
niente medulla. Tendones quoq;, quoniam compositam eorum esse substantiam ex neruo liga-
mento qđ ostendimus, quatenus nerui participes sunt, eatenus ex cerebro oriuntur, ceterum mi-
nus saltem, quā ipsi nerui, conuulsionem accersunt. Ligamēta vero, cum ex osse ortum habeāt,
quæcūq; rotunda sunt, ea neruis assimilia sunt, duritie tamen plurimum dissident: verum in eo,
quod alba sunt, & exanguia, & cavitare carentia, & in fibras diuiduntur, similitudo illis cum ner-
uis, & tendonibus constat. Ergo, vbi teretia ligamenta tendones qđ visuntur, qui dissectionū sunt
ignari, neruos eos imaginantur, potissimum, qui multo duriora ea neruis esse non intelligunt: at,
vbi lata sunt, ibi ea à neruis diuersa esse intelligunt, quāquam ne id quidem omnia: ceterum ipsa
à sese discernere non valent. Verum tu, qui præsertim cuiusq; trium partium naturam perspectā
habes, tum vero & formam, & quā in toto corpore posituram obtinent, in quocunq; mēbro vul-
nus fieri contigerit, statim intelliges, neruus ne sit, quod in eo vulneratū est, an ligamentum, ten-
do ve. Et de nerui quidē ac tendonis curatione iam dictum nobis est. Ligamentum vero vulne-
ratum si id est, quod ab osse ad os permeat, & maxime line periculo est, & quod oīno siccās qbus-
libet medicamentis, nihil hoīem offendes. Sin id, quod in musculum se inserit, quanto est neruo
& tēdone minus periculo opportunum, tātō vtiq;, nisi rite curetur, reliquis ligamētis magis ter-
rere

A. l. 4. f. 4
c. 5. fol. 47

A. l. 4. f. 46
c. 5. fol. 47

A rere debet Horū. nihil peragi methodo ab ijs medicis pōt, qui indicationē quē a particulis sumit, vtilem esse ad vlcera curationē negant: nec ab ijs, qui id quidem continent, sed cū cuiusq; particulæ naturam ignorant: quē nimirū (licet ostendimus) ex ipso elementorū cōstat temperamento. Verum ij. q̄q; nihil aliud, saltē, quæ ex instrumētaria partiū cōstitutione indicant, intelligunt: Thessalus vero, et qui sequaces eius sunt, et hęc ignorant: Veluti statim, si diuisum abdomen tam alte sit, vt intestinū ex eo procidat, nec quēadmodum id reponere conueniat: nec, si omentū exciderit, abscindendum ne id sit, an non: nec an vinculo id excipiedum, an secus: nec an suendū vulnus sit, nec ne: nec, si suendum sit, quā rōne suendum, quicquā intelligunt: vt quē ne nos quidem intelligeremus, nisi ex dissectionis rōne, oīum, quæ istic cōtinent, partium naturā didicissemus: quam et exponere necessum est, nō claritatis modo gratia eorū, quæ dicēda sunt, sed et probationis. Cutis extrinsecus oībus antestat: hęc vero in membranā finitur. A cute, medio circiter loco, neruea tenuitas musculorum (quā Aponeurolin Græci vocant) gemina rēditur membranarum ritu. Eas pleriq; anatomicorum duas esse minime norunt. cū & vnā cohæreant coalescant q̄q; sic, vt labor sit eas separasse, & summa præterea sint tenuitate. Post has deinceps habent duo musculi recti, & carnoli, qui a pectore ad ipsa pubis oīa perueniunt. Atq; hæc quidē memorata oīa

B & sibi coherent coalescunt q̄q; & quod cōflatum ex ipsis est, Græci, † qui, quēadmodum diuisum ventrē sui conueniat, prodiderunt, Epigastrium, id est abdomen, nominarunt. Quod vero hoc deinceps excipit, ab illis quidem vocat Peritonæon, putantibus videlicet vnum & simplex id esse corpus, minime q̄q; compositum, sed falso: cū id compositum ex duobus corporibus sit, quorū vtrunq; & exangue & neruosum sit. Verū alterum eorum neruosa tenuitas eorum musculorum est, qui per transuersum se agunt: alterum membrana prætenuis, velut aranea, quæ vtriq; vere est peritonæum. Ac tale quidem in medio sui est abdomen. Partes vero eius, quæ vtrinq; ad latus ad quatuor quasi digitos recedunt, hæc statim a cute obliquos musculos habent, priores quidem, q̄ a pectore demittunt: secundos, qui ab ilibus ascendunt: deinde post hos transuersum musculū, sub quo est peritonæon. Ergo & minus periculi in hoc loco, quā in medio est, cum tenuem eiusmodi membranā, qualem aponeurolin vocant, nullam habeat: & futura in medio difficulter administratur, quippe cum & procidant hac parte maxime intestina, & egre inibi cōtineri queant: qui enim constrinxerant contraxerant q̄q; ea, recti illi carnoli q̄q; musculi erant, quos ex pectore ad pubis oīa demissos diximus. Ergo, quoties horum aliquis est vulneratus, duplici de causā procedere intestinum est necessum, a partibus quidem, quæ sunt ad latus, propterea, q̄ musculis, qui istic

C sunt, constringitur: a medijs vero, q̄ nec musculum eum, qui cōtineret, habet etiamnum validum, & q̄ locus opportune ad procidentiam est comparatus. Quod si maius etiam vulnus fuerit, tum plura necesse est intestina excidere, tum difficilior denuo immitti. Porro alia ratione parua vulnera tractatu sunt difficilia. Nam, nisi, quod procidit, ilico in locum suum reponas, inflatur, surgit q̄q; in tumorem: quo euenit, vt per angustum foramen immitti nequeat. Minus igitur graue in eiusmodi vulnerationibus mediocre foramen est. Atq; hæc quidem præcisse oportet. Proximum est, vt, quemadmodum quis hoc genus vulnerum commodissime contrectet, consideremus. Nam Thessali præceptum, quo censet enemis ea præsidijs glutinanda esse, parum satisfacere manifestius puto, quā vt quenquam latere, qui compos sit mētis, possit. Quoniam igitur principio id agēdum est, vt intestina, quæ exciderunt, in suum locum recondantur: secundo loco, vt vlcus suatur: tertio, vt medicamen imponas: quarto, vt, nequa præstantior pars simul afficiatur, prospicias: age iam de primo horum agamus. Cum igitur triplex (vt dictum est) discriminē horum vulnerum in magnitudine sit, propriam a quoq; indicationem sumere tētemus. Esto autem principio vulnus adeo paruum, vt inflatum iam, quod excidit intestinum, remittere amplius non sit. Nunquid igitur hoc loco alterum ē duobus est necessum, aut flatum educere, aut vul-

D nus ampliare? Præstiterit autem (vt arbitror) prius, si modo id consequi liceat. At non alia potius ratione id consequare, quā si causam, vnde excitata inflatio est submoueris. Ea igitur quæ demum est: Certe ambientis aeris refrigeratio. Itaq; etiam sanatio ex calefaciendo petetur. Ergo spongia mollis, & ex calente aqua madenti, ac mox expressa, calfacere intestinum conueniet. Præparetur vero interea vinum austerum calidum: quippe id magis calfacit quā aqua, ac robur intestino acquirit. Quod si huic etiam præsidio intestini inflatio non cesserit, incidendum peritonæi tantulum est, quantum ei, quod excidit, reponendo sit satis. Apposita porro ad eiusmodi incisionem sunt ea, quæ Græci Syringotoma vocant, i. quæ ad fistulas incidendas sunt comparata. Scalpelli vero, quibus acies vtrinq; habetur, aut quibus cuspis acuta est, omnino fugiendi sunt. Situs vero laboranti appositus fuerit, cū in inferiore parte factum vulnus est, si sursum vergat: cum vero in superioribus, si deorsum. Vnum autem vtrobique cauetur, ne, quod exciderit, ab alijs quicquam intestinis degrauetur. Itaque ex hac ratione conueniet, vt, si in dextris vulnus sit, corpus in contrariam partem inclinetur: sin in sinistris sit, in dextram sic, vt quæ vulnerata pars est, semper altiore locū occupet. Atq; hoc tum in magnis, tum etiam in mediocribus vulneribus conducibile fuerit: quippe id omnibus cōe consilium est. Cæterū repositio intestinorū in suum locum, vbi ex magno exciderunt vulnere, planē minusurum postulat dextrum. Debet enim, vbi mani-

† Ad verbum. qui quēadmodum diuisas gas trographus i. ventris seu abdominis suturas fieri cōueniat.

* Al. immitti.

Idem f

Idem g

bus

METHODI MEDENDI

bus suis totum vulnus extrinsecus apprehenderit, intro reprimere, tum cōstringere, ac exiguum E
semper fuenti prænudare: quin etiā id ipsum, quod assutū est, modice cōprimere, quoad totū per
furatur. Iam vero, q̄ cōmoda ratio suendi abdominis in talibus vulneribus sit, deinceps doceamus.

Qm̄ coire coalescere q̄ cum peritoneo oportet abdomē, incipiendum quidem à cute est, atq; ab
externo introrsus acus injicienda. Vbi vero tum cutem, tum rectum musculum totum trāsierit, A. ibid. b
præterito, quod ei subest, peritoneo, p̄ reliquū peritonēum eam ab interno extrorsus injicies, atq;
inde per reliquum abdomen ab interno extra transmittes. Vbi hoc penitus transiit, rursus ab
externo introrsum idē abdomen est perforandum. Mox, vbi peritonæum, quod illi quoq; subhæ
ret, præterieris, atq; ad contrarium veneris, hoc quoq; ab interno extrorsus perpungendū, vna q̄
cum eo totum ipsi vicinum abdomen. Deinde ab hoc rursus incipiendum, atq; id cum contrario
peritonæo consuendum: ac rursus vicina quoq; cute trāsmissa, iterū ab ea parte acus introrsus est
injicienda, consuendum q̄ abdomen id cum contrario peritoneo, ēt inibi vicina cute trāsmissa.
Atq; hæc iterum iterum q̄ facienda, quoad totum vulnus similiter consuerimus. Interuallū vero
quod futuris interuenit, quod ad cōpescenda pertinet ea, quæ sub sunt, breuissimum esse postulat.
Quod vero ad firmitudinē ipsius cutis, quæ in interuallis futurarū est, necubi rumpatur, breuitas
parum tuta est. Quare vtriusque vitato excessu, eligenda mediocritas inter vtrunq; est. Iam hoc F
quoq; oīum vlcērum cōe quodāmodo est: sicuti ēt ipsius, quo suuntur, fili cōsistentia. Nā, quod
iusto durius est, cutē rumpat, necesse est: quod mollius, ipsum prius rūpitur. Æque vero, si p̄xime
summas oras acū transegeris, quod reliquū est cutis, qm̄ minimum est, dū violenter adducitur, co
gitur perrūpi: si plurimū ab ijs recesseris, multū cutis inglutinatum relinques. Hæc, tamen si oīum
sint vlcērum cōia, maxime tñ fugienda in abdomine suendo sunt. Ipsa vero abdominis futura aut
iam dicto modo administrabit, vtiq; si quis huc studiū dirigit, vt peritonæum abdomini coalesce
re faciat, vix. n. cū eo coalescit, vt pote neruosum: aut sicut nō nulli faciunt, qui, quæ cognatæ na
turæ sunt, ea cōmittunt, vtiq; peritoneo peritonēum, abdomini abdomē. Id fiet ad hūc modum.
Oportet à vicino nobis abdomine incipere, atque ab externo introrsum per id tñ acum transmitt
tere: post præteritis vtriusq; peritonēi labris, ex aduersa parte ab externo introrsus per vtrūque eius
labrum acum reuocare: deinde rursus hanc reuocare, atq; ab interno extrorsum per aduersum abd
domē trajcere. Hic modus à publico & exprompto, quo videlicet vno adactu per quatuor labra
acum transmittunt, hoc discriminis habet, q̄ totum peritonæon intra abdomen prorsus abscon
dit. Deinceps vero de medicamentis præcipiamus. Sanè hæc quoq; eiusdem esse materiæ debe
bunt, cuius sunt ea, quæ Enæma dicuntur: quæ q̄ aliarum quoque partium vnire vulnera in supe
rioribus commētarijs ostendimus. Deligatio vero extrinsecus, vel præcipue in his necessaria est.

Quarta uero curationis in his pars non paulo ab alijs dissidet: siquidē, quod inter bubones, &
axillas est, id totum molli lana ex oleo mediocriter calido imbuta circundare oportet. Satius item
fuerit, & si per clysterem intestinis aliud simile infundas. Quod siquid ipsorum intestinorum
sit uulneratum, quæ extrinsecus fieri debent, omnia similiter, ut diximus, sunt peragenda. Cate
rum, quod injicitur, uinum nigrum, austerum, & tepens erit, eo q̄ magis si totum perforatum us
que ad internum meatum sit. Ac crassa, quidem intestina facilia sanatu sunt: ē cōtrario difficilia,
quæ tenuia sunt. Ieiunum autem omnino incurabile est, tum propter magnitudinem multitu
dinem q̄ uasorum: tum q̄ tunica eius prætenuis neruosa q̄ est: adde, q̄ tum bilem synceram hoc
intestinum recipit uniuerſam, tum q̄ omnium iecinori maxime est uicinum. Vētriculi uero quæ
carnosæ partes infernæ sunt, curare cum fiducia tentabis. Nam fieri potest etiam, ut bene cedat,
non solum q̄ hæc crassiores sunt, sed etiam q̄ sanantia medicamenta facile hoc loco ipsius substi
stant: at, quæ in ore eius ac gula ulcerum sunt, duntaxat contactu medicamentorum in transitu
fruantur: quæ uero in ore eius sunt, ijs sensus quoq; acumen sanationi obstat. Verum, quæ nam
ratione vētriculi uulnerati, aliorum q̄ exitialium uulnerum, Hippocrates sanationem moliatur, H
ab ipso peti est satius. Ego nanque non eo cōsilio, ut nemo Hippocratis libros legat, ad hoc opus
scribendum accessi: verum qm̄ is mihi primus idonea usus esse uia uidetur, nec tamen eam totam
compleuisse, cum quedam minime limitata, quedam imperfecta obscura q̄ ab eo prodita inue
nire liceat: idcirco ipse tum omnia ea lucide explicare, tum, quæ parum discreta sunt, distingue
re, tum, quæ deficiunt, supplere studui. Vbi igitur aliquis se in his nostris primitus exercuerit, tñ
se ad libros Hippocratis legendos conferat: ac tum eius de ulceribus librum relegat, tum quæ de
uulneribus exitiosis scripsit. Porro simul maximum adiumentum ex his nostris libris habebit: si
mul certo intelliget neminem methodicę sectę, quę nomine specioso se uenditat, re autem maxi
me est à methodo aliena, commode ulcus sanare posse: sed nec reliquorum Rationalium quem
piā, quicumque parum cognitis similiarium partium elemētis artem aggredi censent: quippe ne
sciunt hi quoq; rationalē simplicium animalis partium curationem, ut qui ab instrumētalis tñ
indicationes sumant. Ceterum paucis etiānum cōtra Methodicos additis de istis, quæ in ventri
culo accidunt, uulneribus, aliò stilum conferemus. Vulnerato peritoneo excidit subinde omen
tum: quod primaria ne pars sit, an nō primaria, uel ex quibus condatur, uel quam habeat actionē
usum ue, hi cōpertū non habēt. Itaq; si iā liuet aut nigricat portio ea, quę excidit, ibi quid faciant,
audire

Audire est operæpretium: vtrum ne præcident, an intra peritonæon remittent. Oïno enim vel ab ipsa experientia, quid agendum sit, intelligent: vel ab ipsa particulæ natura indicationem sument. At qui refugiunt hæc utraq; eam quidem, quæ experientia suppeditat, cognitionem, dum venerandum s. hoc sectæ suæ nomen methodum extollunt: eam vero, quæ ex particulæ natura suggeritur, q̃ nec substantiam eius norūt, nec actionem, nec vsum, dum à dissectione ceu inutili abhorrent. Itaq; nesciunt, sit ne ex ijs, quæ necessariæ ad vitam sint, an quæ necessariæ quidem non sint, non tamen omnino infimæ notæ: sed nec an cum eius affectu simul afficienda pars aliqua primaria sit, an secus: adde, q̃ nec an vasorum, quæ in eo continētur, aliquod possit per sanguinis profusionem hominem interimere: nec si quis post nigrum eius abscisum, quod integrum est, vinculo cōplectatur, quò sanguinis profluuium declinet, an id ipsum periculo vlli sit futurū: nam leui saltem intuitu omentum nervosum videtur: proinde, nisi quis exacte naturam eius habeat cōperam, nunq̃ audebit vinculo vti, cōuulsionis s. metu. Horum cum nihil mirifici isti Methodici intelligant, vbi nigrum redditum omētum est, sanè dicere, quid agendum sit, non possunt. At nos (arbitror) possumus, qui, cū vsum eius non adeo esse animali magnum, substantiam q̃ eius ex mēbrana tenui ac arterijs venis q̃ compositam sciamus, horum tñ initia ex maximis orta tum arterijs tum venis intelligamus, sanguinis quidem profusionem cauebimus, coafficiendos vero nervos non timebimus: proinde id, quod supra nigricās positum est, vinculo excipiemus: quod post vinculum est, amputabimus: atq; vt in imo fine iam comprehensæ gastroraphiæ vinculi fines pendean, curabimus, quò nimirum facile eas, cum ex vulnere suppurante euomentur, recipiamus.

De ratione Fracturarum Ossium curandarum.

CAP. 5.

AC de reliquis quidem corporis partibus dictum abunde sit: nunc de ossibus agendum superest: quando his quoque, de quo nunc agitur, morbus accidit, quem vnitionis siue contumitatis solutionem appellamus. Huic, cum in hanc inciderit partem, proprium nomen inditum græce est Catagma, omnibus ferè hominibus, qui græce loqui norunt, tritum. Apagma nanque, medicorum appellatio propria est, plebi inutilitatum: solent aut ita noiare, quoties ossis finis, quaparte maxime cū alio cōmittitur, abruptus est. Sed & è fracturis ipsis, quæcunq; fracti ossis partes iam prorsus separarunt, eas Cauledon factas græce dicunt. Patet vero eiusmodi diuisionem pertransuersum esse factam: veluti alteram per longitudinem magis esse, in qua sanè nō omnino separantur à se partes sic affecti ossis, sed veluti per rectitudinem findūtur: quod genus Schidacedō fieri dicere solent. Non desunt ex medicis iunioribus, qui adeo ambitiose oēs fracturarum differentias proprijs interpretentur nominibus, vt èt aliquā Raphanedon, id est ad raphani speciem, fieri dicant, non contenti oratione os, quod varie sit fractum, explicasse. At non Hippocrates huius fuit sententiæ, sed, quoad fieri licuit, vltimatissimis vtens nominibus, oratione interpretari non est grauatus non has modo fracturarum differentias, verum èt earum, || quæ in capitis ossibus eveniūt. Ac si ad eum modum de omni vitio egisset, profectò brevis mihi proposita tractatio fuisset: nunc, cū plurimorum viam, qua sit insistentum, indicarit, sed, quæ particulatim sunt agenda, inchoata indefinita q̃ reliquerit, necessum est, in illis immoremur: nec tamē in ipsis plus iusto, sed, quæ tradita illi perfecte sunt, ea summam commemoremus: quibusdam etiam demonstrationē adijciamus, vtiq; ijs, quæ ab eo ratione parum sunt munita: eorum præterea, quæ parum sunt definita, quædam definiamus: & quæ inordinata sunt, ea in ordinē disponamus: postremo ex ijs, quæ ille parū lucida reliquit, quibusdam lucem addamus. Verum, si in singulis verba eius adscripsero, expositori cōmentarij longitudinem liber noster habebit. Nec deerit fortassis aliquis, qui immodicam longitudinē nostram hic merito accusabit, qui de hac in tertio & quarto volumine parum merito est questus. In ijs. n. necesse fuit mihi multa Hippocratis ex eo libro, qui de vulneribus inscribitur, loca apponere: quibus reliquis medicis ostēdere, cuiusmodi res sit methodo quadam **D**ulcerum curationem conscribere. In libro aut, quo de fracturis præcipit, quis adeo est stupidus, vt doctrinam eius oēm, ceu lucidam plane q̃ absolutissimam, nō suspiciat: Quod si quis èt vnus videlicet alter ue dicat parū se id opus mirari, his opportunissime respondeat illud poetæ: Hos vnū atq; alterum permitte tabescere. Quæ nam igitur sit fracturæ curandæ vera methodus, quam q̃ ipsa rei natura præscribat, iam tempestiuum dicere videtur, atq; hinc sumpto initio. Quoniam fracti ossis soluta partiū continuitas est, vtiq; finis, quò tendet is, qui eas curabit, saltem primus, vnitionio est: quod si is per affectarum partium siccitatem perfici posse nō videatur, restat alter, qui est, vt alterius cuiusdam interuentu glutinentur: qui si nec ipse comparabilis aduertitur, insanabile esse vitium dixeris. Quod igitur coalescere nequeat tam durū os, quàm id, quod in iuuenibus & adolecētibus, & viris, multo q̃ magis in senibus cernitur, id profectò vel cuius patere potest. Potest certe illud tantum vnitionem recipere, quod abunde molle est: cuiusmodi conspicitur in puerulis. Quod aut alia quapiam interueniente substantia ceu glutino quodam agglutinari colligari q̃ secum separata fracti ossis particulæ queant, hinc maxime speret quispiam. Mōstratum est omnem animalis particulam propriū ac simile sibi trahere alimentū. Id si verū est, ossium certe idoneum nutrimentū, & crassius, & magis terreum, q̃ aliud quoduis nutrimentum in toto animali, fuerit. Non est igitur nec à ratione alienum, nec quod fieri omnino non possit, vt, quod ex hoc

Lib. de Vuln.
cap. non longè
à principio.

* vlcerebus.

METHODI MEDENDI

hoc ipso proprio alimēto redundat, & in labris fracturę cōcreſcit, ſuo ipſius interuentu illa quoq; E
conglutinet. Quin etiā ita vſu euenire cōſpicitur. ſubſcribit q; ſpei, quā ratio ſuppeditat, ēt expe-
riētia ipſa. Itaq; cōſiderandū deinceps eſt, quā nā potiffimū ratione corpus hoc, quod fracturis in
nalcitur, quantū quale q; ſit, prouenire poſſit. Nā, q; nec quantūlibet, nec qualecūq; ſed quod me-
diocritatē in vtroq; ſeruet, requirimus, id planē eſt euident. Porro huius ſymmetrię tum qualita-
te, tum quātitate inuēta, deinceps eſt, vt, qua maxime quis vtrumq; allequatur, rōnem ipſam que-
rat. Sed nec tēpus, quo hęc effici conueniat, minus neceſſarium queſitū eſt, vtrum ne ſtatim ā fra-
ctura facta, veluti ſtatim in vulneribus moliebamur vnitionē: an id cōmodum tēpus non eſt, ſed
aptius aliud requirendū. Sanē inuenias hoc quoq; ſicuti & reliqua omnia ex ipſa rei natura edo-
ctus. Quæ nā igitur eſt ipſius rei natura? Nēpe os fractum ſub aliqua paulo ante cōprehenſarum
differentiarū. Age igitur videamus, nunquid ā ſingulis differentijs aliquid deſummi ad eius cura-
tionē poſſit, ab ea quā Cauledon, id eſt per tranſuerſum, fieri diximus, orſi. Diſſidēt ſic ā ſe in hac
fracti oſſis partes, vt ē directo non iaceant. Quare patet primum id eſſe agendum, vt in directum
agantur: tum eorū, quę deinceps ſunt, aliquid gerat. Sanē cum ſitum habuerint, ſiquis ea, quę ſic
diſſident, integrę partis exemplo vſus, in contrariū adducat: ā qua nimirum certiffima indicatio
tranſpoſitionis eorū erit. Fieri, n. poteſt, vt tum proſum, tū retrorū, tum in hanc partem, tū in F
illam, membri facta tranſlatio ſit. Quęcūq; igitur retrorū magis ſunt acta, ea proſum impelli
conueniet: nec minus alterā quoq; fracti oſſis partē modice ad contrariū retrudi. Contra, q; pro-
ſum ſunt emota, hęc rursus ipſa quidem retrorū, reliquam vero partem ſenſim duci proſum.
Eodem ēt modo, & eorū, quę ad dextrā ſunt detorta, medicatio eſt, ſi ad ſiniſtrā ducantur: con-
tra q; eorū, quę ad ſiniſtram, ſi mutent ad dextrā, ſemper ſ. altera parte modice in cōtrarium acta.
Ceterum in adducendis contrario motu paribus, ne quę frangantur earum exantia, nō leue pe-
riculum eſt: neq; n. (veluti in ſerra deſectis vilitur) læuis eſt vtriuſq; partis finis. Nam ſi illa fran-
gantur, non poterunt ad amuſſim ſecum coaptari fracti oſſis fines, duplici de cauſa. Nam ſiue ip-
ſa fragmenta inter partes coniungendas interciderint, nō ſinēt ea, quę adaptantur, ſe contingere:
ſiue quid forte oſſium extra ceciderit, ne ſic quidē eorum, quę effinxeris, exacta coniunctio erit
ſic, vt priſtinam vnionē imitent, quippe quę ſolum tum demū erit cum oſſis exantia in ſuas ca-
uitates fuerint recondite. Quod ſi ſemel comminute perierint, neceſſum eſt, inter applicata ſimul
oſſa vacans interueniat ſpatium, in quod ſanies collecta, atq; in tēpore putreſcens, totum pariter
membrum ſecū corrupet. Atq; ob hęc quidem, quę diſſident oſſa, ē directo adnota eſſe oportet:
quod commode certe fieri nequit, niſi retrorū prius ſint tracta: Antiaſin vocant. Oportet G
igitur aut manibus ipſis, vtiq; ſi parū ſit mēbrum: aut vinculis circūpoſitis: aut vnā cum ijs ēt in
ſtrumentis, cuiuſmodi nos || Hippocrates docuit, antiaſin oſſium facere. Poſtea vero, q; abūde re-
tracta fuerint, nec vllus ſuperſit metus, ne ſe in adducendo tangant, tum in directum opponere,
vincula q; remittere, ac muſculis ipſis diductorū in idem cōmiſſionem permittere: interim vero
te ipſum quoq; manibus ſubſeruare, ac, ſicubi aliquid paulū ſubſultet, corrigere, atq; formare. Ab
his ſecundū, quō diriges, fuerit, vt immotū proſus membrū cōliſtat, neq; eorum, quę effinxeris,
moueā: qm ita neceſſe eſt ea rursus diſſidere. Ac, ſi ipſi quidem ægotanti, vt "quietudini mem-
bri proſpiciat, permiferis, vigilans fortalliſ probe id curauerit, at dormiens omnino membrum
moueabit. Vt igitur non dormientis modo hominis, ſed ēt ad deſidendum, item q; cum cubile re-
ſternitur, ſurgentiſ, eorū, quę formata ſunt, poſitura ſeruet, tuta deligatura complecti fracturam
oportet, quę q; fracti oſſis partes ſecum coarctare ad amuſſim poſſit. At vero, cum laxior deliga-
tura oſſibus moueri permittat: arcior vero conſtringēdo, dolorem excitet: danda opera eſt, vt vi-
rato ambarū incōmodo, vtriuſq; fruamur commodo. Id fiet, ſi, quod nimium eſt, declinabimus.
Ergo nec adeo arcitare deligaturam debebimus, vt iam cōprimat: nec adeo remittere, vt laxa ſit.
Ac, ſi quidem equalis eſſet craſſitudinis mēbrum quodq; vtiq; latiffima "faſcia eſſet cōmodiſſi H A. li. c. 52.
ma, vt pote quę totum æqualiter continenter q; ex omni parte fractū os complectere: ſed, qm id c. 5. fo 41
nō eſt, pectori quidem latiffimā licet circūponas, artubus certe et iugulo non potes: ſed in talibus
vtilior eſt anguſta, vtpote quę nec rugas contrahet, & totius mēbri, cui circūdata eſt, cutem con-
tinget: verū, ſi paucis complexibus fracturam continet, parum tuta eſt. Quantum igitur ſecuri-
tatis ex anguſtia deficit, tm ei ex iniectionis numero, & verſus integrum deductione, eſt adijciē-
dum. Sed, qm deligationum, quęcunque citra dolorē carnem conſtipant coarctant q; id virium
habent, vt ex ijs partibus, quibus primum iniiciunt, ſuccos exprimant in eas, in quas ipſę ſunt fi-
nite, reponant atque figāt, non alienū ā ratione arbitror deligaturę principium ſuper ipſam fra-
cturam iniici, abhinc vero ad reliquū mēbrum diſpenſari: etenim, qui contra deligat, is ab inte-
gris ad egram partem ſanguinem cōpellit. Atqui, ſi ab egro loco incipiat, in integrum finiat, non
ſolum innoxia eiuiſmodi deligatura in ijs, quę diximus, erit, ſed ēt vtile quiddam cōtulerit: quip-
pe cum nullā circum fracturā ſinet excitari phlegmonen: cuius rei curā habere in primis oportet.
Timendum, n. eſt ne tū ex illa in diuerſum vullione, quā membrū in ſuam formā effingētes ad-
miniſtrauimus: tū vel magis ex eo, q; cauſę, quę fracturam faciūt, plerūque circūdatā oſſibus car-
nem cōſtipando contundendo q; prius ledūt: magnę ſubſequantur phlegmonę. Nec ſanē mirer,
ſi phlegmones

Li. de Fract. cō.
2. t. 3. 7^a. 232. b
Et. cō. 3. t. 39.
7^a. 246. h.

A. lib. 42.
28. fol. a

A. li. c. 52.
c. 5. fo 41

A si phlegmones quiddam simile etiam ipsis fractis ossibus ad portionem acciderit: quando etiā, quę parum probe sunt curata, magis humida, q̃ pro natura sua, manifeste cernantur, vbi videlicet vnā cum uulnere os perfractum sub aspectus notitiam venit. Quin immo nec ossi caries, quem spha celon vocant, ex alia occasione oboritur: quę ipsa totius ossium substantiæ corruptela quędam est. Non igitur negligendum, quin totum superuacuum humidū ex oībus, quę circa fracturā habentur, partibus exprimas. Incipies itaq; ab egra parte, ac, cum bis ter ue circundederis, inde sanū versus progredieris: siquidē, qui ita deligat, & ab integris ad laborantē partē sanguinis confluxū arcet: & quod iam collectū in ea est, exprimit. Cum vero duę partes sint, quę & recipere aliquid à laborante particula, & trāsmittere ad eam possint, vtiq; quę superiacent, tum propter multitudi nem, tum magnitudinē, ad ambo magis sunt habiles: Extreme vero, propter contrarias conditio nes, exiguum quidem aliquid vel recipere, vel transmittere possunt, multum vero nec agris par tibus subministrare, nec ab ipsis recipere. Quocirca, cum duas primas fecerit Hippocrates deliga turas, priore quidē tum quod in laborante particula continet, ad superposita expellit: tum quod ex his cōfluit, repellit: reliqua vero primis quidem cōplexibus, quos super ipsam fracturam facit, item q̃ fasciā ad inferna progressu, eō quędam extrudit, quędā, ne quid illinc confluat, prohibet:

B Reliquis deinceps oībus, quibus videlicet ab intimis partibus sursum recurrere deligaturā cēset, vt eodem videlicet loco cum priore finiatur, tum ad superiora repellit, tum confluxum ab ijs pro hibet. Muniunt igitur ac stabiliunt fracturam, nec phlegmonē oriri sinunt, prima duo lintea: nō tñ ea, quę dicta sunt, ad ambos hos vsus satisfaciunt, {presertim} sola. Vnde ad eorum quidē tu telam Hippocrates præsidium excogitauit, vt splenia vnā cum exterioribus fascijs adhiberentur, quę hac quoq; ipsa stabiliant. Ne autem phlegmone oriatur, medicamento quoque iam ex ijs, quę phlegmonem prohibet, vt iubet: quale nimirum est ceratum humidum. Hęc igitur oīa ratione, vt comprehensum est, dictāte, sunt inuēta: & præter hęc ipsa repositionis figura: Quę ipsa quoq; geminæ indicationi subijcitur, priori, quę ex solis cōmunibus notionibus pendet: alteri, quę ex curandorum organorum naturali cōstitutione præstatur. Prior igitur eam, quę maxime à dolore abest, eligendam figuram suadet, quō nec phlegmonem particula contrahat, & ager persistere in vna ea diutissime immotus possit. Secunda, quę ex curandorum sumitur natura, arterias, venas, nervos, & musculos, q̃ rectissimos poni præcipit. Sed & consentiunt inter se hæc indicationes, qñ & rectissima cuiusq; partis figura maxime est à dolore aliena: & quęcunq; magis, q̃ alia, est à

C dicitur: cruri vero, quę paulo minus porrecta est. Porro ad dolorem vitādum non modo natura lis habitus cuius instrumentū est utilis, verū etiam consuetudo quoq; conducere non nihil vide tur. Atq; hæc quidem figuræ, in qua custodire membrum conueniat, inueniendæ ratio est: eadem porro inueniendæ figuræ ratio est & in retractione partium à se, quam Antitālin vocant: & cum in naturalē situm aptant fracti ossis partes. Etenim expedit, vt in rectissima atq; à dolore alienissi ma forma membrum tum retrorsum retrahas, } tum in naturalem habitum coaptēs: multo q̃ et magis vt sub eadē figura tum deliges, tum ad quietē reponas. Siquidem sub alia deligare, in aliam vero mutare, nō dolorem modo incitare potest, verū etiam ossa intorquere: nam, nisi eorum, quę præcepta sunt in cōmētarijs, quos de musculorum motibus scripsimus, obliuio obrepit, necesse est, vbi figura mutatur, alios musculorum tendi ac velut contractos rotūdari, alios solui ac remitti. Ergo, vbi tendunt, tum premi eos à deligatura est necesse, tum ex cōpressionē ipsa dolere: vbi vero tensio remittitur, ea in parte deligaturam esse laxam, fracturam q̃ fulcimēto desitui. Horū igitur oīum causā tum extendere, tum effingere, tum deligare, tum reponere vna ea figura, quę doloris minimum habeat, præcipue est studendum. Atq; ad primum quidem opus, quod in fra cturis molimur, nullum iam relictum est præceptum. Soluere autem ex Hippocratis sentētia ter tio die debebis, quō in membro præter solitum cooperto nec dolor nec pruritus creetur: nec eius, quod iam infixum fracture est, perspiratio prohibeatur, cuius occasione non modo noxijs pru ritus quibusdam accidit, sed etiā cutem ex acrimonia saniei erosam exulcerari. Infundendum igitur tñ temperatæ aquæ est, quantū ad euocādā eiusmodi saniem est satis. Quod si rursus quoq; simili modo facies, vtiq; septimo id à primo die facere debebis. Apparuerint vero iam oīa, modo nihil impediāt, phlegmone libera, ac, q̃ pro naturali habitu, magis aliqñ gracilia. Tum igitur licebit & ferulas circūponere, & soluere ex maiore intervallo: nam antea, cū phlegmones scopus vince ret, tutum non erat ferulis premere: nunc cum ea delijt, ac stabilire fracturam est opus. sanē non incōmode his vtare. Sed & soluere ex maiore intervallo licet, videlicet non desiderantibus præ terea partibus saniem excernere. Quin etiam callus, quem Pwron Græci dicunt, feliciter ita pro uenerit: qñ ad hunc gignendum (sicut dictum est) cogi conrescere q̃ aliquid proprii ossium ali menti oportet. Non est igitur hoc à labris fracturæ eluendum, aut foras euocandum: quod certe assidua solutio faciet. At vero nec tanto intervallo intermittendum, vt nescias, quēadmodum fra ctura procedat. Vidimus enim non semel, cum valenter siccarētur ossa, agre prouenisse callum. Expedit igitur, istis tertio vel quarto die modice aquam calidam infundamus, hanc metam finie de perfusionis habentes, cum carnes in rubrum tumorem attolluntur. Atq; in his quidē prius, q̃

* Al. inuēta
tata. i. sum
liari. i. i. i.

* Al. Dicta. i.
extensionem.
tā. i. i. i. i. i.
extendas.

subsidiere incipiant, desistendum est. Contra, ubi digerit quid volumus, non prius est desistendum, E
 g, quod ex perfusione intumuit, sublidat. In quibus vero, quod minus callus in fractura proveniat,
 humiditas abundantior obstat, ibi hanc siccare (sicut prius est dictum) convenienti deligatura, &
 perfusione aque, quæ vel minima oino sit vel plurima, conabimur. Quippe minima, cum prius desi-
 fiat, quæ aliquid confluat, &, qui ad manum humores sunt, per spiritum digerit: &, qui in alto sunt, mo-
 dice liquat: expedit autem ita solui liquari quæ ea, quæ per deligaturam sunt expellenda. Plurima vero
 digerit plus, quæ attrahit. Sanè constat in ea quidem deligatura, quæ exprimet, minus esse arctandos
 fasciarum fines: in ea vero, quæ ad renutriendum est comparata, nec minus hos arctandos, & uniuersos
 circūductus laxiores faciendos. Quoniam autem non solum, quo tempore subueniendum cal-
 lo gignendo sit, sed etiā quo pacto, est inuentum, reliquum fuerit de uniuersa victus ratione præ-
 cipere. Ac, quod in principio quidem sit tenuissime cibandum, id, ubi de propria phlegmonarum cu-
 ratione agemus, dicitur. Porro monstrabitur, & quod venam incidere interdum oportet, & per ven-
 trem superuacua expellere. At, quo tempore callus gignitur, nutriendum corpus est cibis boni
 succi, & qui multum nutrant, ex quibus provenire succus soleat non solum bonus, sed et tenax:
 ex quali fieri callum maxime expedit, quippe cum ex serosa humiditate ac tenui gigni prorsus ne-
 queat: ex crassa vero, sed quæ fragilis sit, ac pinguetudinis expers, gigni quidem poterit non segni-
 ter, ceterum tempore siccescens, friabilior atque ita fractioni obnoxius reddetur. Magnitudo calli
 ea sit, quæ & ossibus tuto vinculo sit, nec musculos tamen comprimat. Nam, qui minor iusto est,
 hic ossa parum reddet tuta: qui maior est, dolorem musculis inuehet. Attendendum vero diligen-
 ter est, ut vel promoueatur, si minor iusto proveniat: vel inhibeatur, si immodice increseat. Sunt
 vero, quibus hæc efficias, et ipsius perfusionis tum quantitas tum vero qualitas: prætere-
 rum quæ cibo-
 rum quantitas, et ac medicaminum, quæ illi extrinsecus imponuntur, facultates. Ac de perfunden-
 do quidem & victus ratione supra est dictum. Ex medicamentis vero, quæcunque emplastica sub-
 stantiam habent, ac modice calfaciunt, ea callos tum promouent, tum vero augent: quæ vero di-
 gerendi vim obtinent, ea magnos iam callos diminuunt. Si vero nec augere callum, nec minuere
 itudes, sed eo, sicut ultro provenit, es contentus, medicamento aliquo eorum, quæ cruentis adhi-
 bentur vulnibus, utere: quæ, cum modice siccant, etiam coagulari ac concrecere mediocriter cal-
 lum faciunt. Ac de transversis quidem fracturis hæc satisfaciant. De longis vero reliqua omnia ad
 eundem se habent modum: ceterum comprimenda hæc magis in ipso fracturæ loco sunt: tum, quod
 recessit, retrudendum introrsus est. Quæ vero contra fracta multifariam sunt, potissimum cum vlce-
 re, quemadmodum fieri plurimum solet, ipsi splenia circundanda ascie ritu incurua Hippocrates G.
 præcepit, ea quæ vino imbuta tum austero, tum nigro, æstate potissimum. Quippe putrescunt, siue
 oleo quis utatur, siue cerato: cum postulent amplius, quæ reliqua, siccari, utpote vitio ipso reliquis
 maiore. Quin etiam medicamenta quoque omnia ex siccantium sint numero, sicuti ille præcepit, si-
 mul modum ipsum siccationis definiens: etenim ex enæmis eiusmodi esse pharmaca vult. Quod
 si protinus ab initio quis ipsis utatur, tale esse debere enæmon suadet, quod imbui sit aptum. Ac
 reliqua quidem omnia ex illius præceptis sunt peragenda, non in ipsis, quæ dicta sunt, modo, verum etiam
 siue nudatum os et defecari ferra postulet, siue fragmenta quæpiam vel te ipsum eximere, vel ex-
 pellenti naturæ subseruire oporteat. De ipsis vero, quæ cruribus supponunt, organis, quos Solenas
 greci vocant, quæcunque Hippocrates addubitavit, utenda ne sint, nec ne, & omnes norunt, & lau-
 dandas esse rationes censeo. Quod autem neotericis inuentum est glossocomon, quo maxime tem-
 pore gignendi calli utimur, laudandum id quidem, quantum aliam quamvis eiusmodi machinarum,
 ducimus. Verum non videtur id Hippocrates novisse, quanquam aliàs in organis, quæ vitui foret,
 excogitandis non indiligens. At vero, quod cruribus subijcitur instrumentum, et recte illis exco-
 gitatum est: quod per unicum axem, qui in fine machine ad infernâ eius partem est collocatus, con-
 trarium nixum toti membro gemina tensione efficit. Nominatur earum altera, quæ utique mem-
 brum tendit in directum, græce Euthyporos, id est in rectum procedens: quæ vero prius sursum,
 mox deorsum, ea Metaleptice græce dicitur, quali translativam dixeris. Obeuntur ambe per la-
 queorum circumplexum. Porro apertissimus in hunc usum laqueus est, et qui duas habeat appendices.
 Hic igitur, cum in partibus membri, quæ infra fracturam sunt, injectus est, priorem siue euthypo-
 ron efficit tensionem, et brachii si ipsius axi circumpositis. Cum vero in partibus, quæ supra fra-
 cturam sunt, idem laqueus imponitur, metalepticen tensionem efficit, abactis videlicet ipsius bra-
 chii prius sursum, mox deorsum: quippe hæc quoque circundanda axi sunt. Porro circumactum ac
 veluti flexum brachiorum laquei, qui a superioribus partibus ad inferiores agitur, per trochilia
 fieri oportet, quæ in lateribus glottocomi sint posita. Licebit, et Solena voces eiusmodi machinam,
 & cum adiectione sic, Solena mechanicum, aut Glottocomion mechanicum. Verum de instrumen-
 tis vberius precipiemus, quando et de luxatis agemus: ubi etiam de varietate deligaturarum, quæ
 superimponuntur, non minus dicitur. Nunc vero, postquam de mechanico Solene mentionem feci,
 qui plurimum cruri commodat, tum aliàs, cum reponitur: tum vel magis, cum eger cubile mutat,
 aut etiam e ventre aliquid excernit: non ab re fuerit, quo nihil tractatione de eo delideretur, multo
 magis illud glottocomion laudare, cuius alterum laterum item quæ tabellulam, in qua pedem col-
 locant,

† A. Exantiq.
 tū ipsius perfu-
 sionis quantitas,
 tū ciborum qua-
 ntitas ac quali-
 tas. habet enī,
 τό τε ποσόν
 τῆς αἰωνίσε-
 ως καὶ τό πο-
 σόν καὶ ποιόν τῶ
 ἰδισμάτων.

† Cod. anti. le-
 gunt ἀποπρί-
 σεως, ut etiam
 Linacer vertit.
 impressi ἀπο-
 τρήσεως, i. per
 foratione.

A † In anti-
 quis cod. legi-
 tur ῥῥῶς τοῖς
 μετ' αὐτὸν ἐ-
 ξέρπται, i. re-
 cedeys qui post
 ipsum fuere, ex-
 cogitatum est.

B † ὁ ἐκ δυν-
 διαντέων.

C * κελεύων.

† de luxatoiu
 curatione.

A. li. 4. f. 5.
 c. 18. fol. 4. 3

Alocant, quò nulli non quadret membri magnitudinì, mobilia faciunt. Ac de reliquis quidẽ fraturis hæc nosse, cum ijs, quæ Hippocrates præcepit, sat fuerit.

De curandis Fracturis Ossium, quæ in Capite consistunt.

CAP. 6.

DE ijs vero, quæ in capite accidunt, Hippocrates certe integrum volumen scripsit, ubi omnia præcipit, quæ in ijs sunt agenda: & nos, cum huic operi finẽ imposuerimus, enarranda eius opera aggrediemur. Ad præsens vero, qm̃ in his cõmentarijs, & quæ supra ea, quæ ille dixit, sunt inuẽta, adiicimus: & quæ indefinite dixit, definimus: necesse est primũ de cauis excisorijs scalp̃ris, quos græce Cycliscus vocant, mox de ijs quos à lenticulæ specie Phacotus vocant, post hos de angustis scalp̃ellis, demũ de medicamẽtorum vsu, aliquid agamus. Ergo de fracturis caluariæ quẽdam vsq; ad secundam laminam, quam græce Diploen vocat, perueniunt: quẽdam vsq; ad internam ossium faciem: quẽdam etiam simplices fracturæ: quẽdam contusiones: quẽdã ṽestigia eorum, quibus inflicta plaga est. Quæ igitur simplices fracturæ ad secundam vsq; laminam perueniunt, ijs, quos modo diximus, angustis scalp̃ellis indigent. Expediit aut̃ hos vt numero multos, ita magnitudine impares esse, necubi desit, quod operi sit commodissimum: postea vero nudato, prout fieri solet, vitiatò ossẽ, vtendum primo quidẽ latiore: secundo loco, eo, quod illo est angu-

Bstius: mox ita reliquis deinceps vsq; ad angustissimum. Hoc vero in ipsa diploe est vtẽdum. Post hæc tum protinus, tum ad finem vsq; siccic medicamentis est medendum: quæ ob id ipsum κεφαλικὰ græce, id est capitalia, sunt dicta. Ea cõponuntur ex iri illyrica, & erui farina, & manna, & aristolochia, & panacis radice cortice: in summa, oĩbus, quæ extergere citra morsum possunt. Ipsa nanq; generatio carnis, naturæ opus est: itaq; egro ad eã rē nihil opus est arte medica. Vt aut̃, quæ puenit caro, coalescat circũhereat q; omni ossis parti, id inde maxime cueniet, si neq; sordes super eo sit, nec oleosa quẽpiã pinguitudo. Id igitur est, quod eg̃ris medici ad carnis productionẽ præstant, vt totus locus siccus sit, tũ quælibet vitiatì ossis pars planẽ pura. Atq; hæc quidẽ oĩum fracturarum, cũ caro in his produci incipit, cõmunia sunt. Ex fracturis vero, quæ ad cerebrũ vsq; membranas peruenerũt, si simplex tũ fractura sit, iam dictis scalp̃ellis angustis vtendum: Sin cũ contusione aliqua, quod cõtusum est, excidi debet, id q; vel terebellis prius in circuitu perforatum, mox deinde scalp̃ris admotis, vel protinus ab initio cycliscis. Ac, quæ per terebellam quidẽ ratio fungitur, parum tuta est propterea, qd̃ dum audacius eam tractant, duram membranam, quæ ossi subternitur, nõ raro violant: Quod vero p cycliscos opus administratur, ne id quidẽ oĩno vitio caret, cum quatiat immodice caput, quod potius quietẽ postulat. Mihi igitur hic quoq; placet, si magnæ sint fracturæ: & ossa, quæ fracta sunt, vehementer mota: cycliscis vtĩ, quippe paucis excisionibus facies lenticulatis excisorijs locum. Sin firma plurimum ossa sint, foranda terebella sunt. Quidam aut̃, quò minus vsquam aberrant, eiusmodi terebellas excogitarunt, quæ mergi nõ possint, quas ab argumento Abaptistas dicunt: circũcurrit enim parum supra terebellæ acutam cuspidem circũlus quidam parum extans. Sanẽ expediit complures id genus præparatas habere, ad omnem caluariæ crassitudinem. Nam crassiori longior terebra conueniet, voco autem ita, cuius spatium, quod inter summam est cuspidem, et circulum qui extans circũcurrit, maius est: tenuiori breuior, est autem huic quoq; quod interest inter cuspidem, et quod circumcurrit, minus. Aliqui vero (siue illos his timidiore, siue tutiores appellem) etiam ijs, quas Choënicidas vocat, sunt vli. Tu vero, si neq; improvidus eorum, quæ fallere possunt, sis futurus, neq; plus, quàm satis est, timidus, cõmodissime cycliscis vtire: & primo quidẽ aggressu, latioribus: postea magis angustis, donec ad crassam membranam perueneris. Cæterum, quod excidi oportet, id totum circulo cycliscis nudandum nõ est, sed ex ea maxime parte, qua fractura est grauissima. Nam præter alia, etiam membrana ipsa ab ossibus, quæ vehementer sunt afflicta, celerime recedit, adeo, vt nullus sit metus eam, quæ iam seiuncta est, tetigisse. Si vero vnã semel nudaueris partem: ac scalp̃rum,

Dqui in cuspidẽ præfixam habet obtusam leuem q; lenticulæ speciem, aciem vero per longitudinẽ erectam, submiseris: vbi latam partem lenticulæ super membranam statueris, series malleolo, ac sic caluariam diuides. Euenient enim ita agẽtib; quæ requirimus, oĩa. Nam mēbrana, ne si dormitans quidẽ quis agat, lata tantũ lenticulæ parte occurrens vulnerari potest: quòd sicubi adhareat caluariæ, huius quoq; adhærentiã innoxie dirimit ipsa lenticulæ rotunditas: subsequit̃ vero præeuntem eam à tergo ipse scalper caluariam secās. Quare, nec qui minus cum periculo, nec qui celerius perficiatur, forandi modum alium inuenias. Maxime aut̃ hunc in vehementissimis fracturis laudabis: quas vtq; recentiorum nõ nulli medicorum græce Engesomata & Camaroseis nominat: Engesomata quidẽ, quæ in medio sui membranæ innituntur: Camaromata vero, quæ eandem ipsam partem, exaltatam habent, cæterum, qua primum ab integris fracturæ partibus deduci egra cœpit, intro magis recedunt, ac membranæ innituntur. Quippe celerime in talibus, quod egrum est, totum exciditur: vtpote cum promptius subintret lenticulati scalp̃ri finis in ijs, quæ plurimum à naturali habitu recesserunt. Quin etiam instrumento, quod Ostagran vocat, aliquibus ossium, quæ vehementer sunt comminuta, uel exaltatis, uel conuersis, ea potissimum parte, ut demittatur lenticulatũ scalp̃rum, preparabimus. Quo facto succedũt deinceps omnia, quibus est opus, cum securitate simul ac celeritate: ut fermẽ dixeris celebre illud dictum in quidẽ

Septima Classis.

ffffff ñ

reliquis

* ð pa.

† Cod. impressi ac antiqui etiã multi, hñt, vt Linacẽr uertit. Sunt tñ qui addant x. r. e. p. i. d. o. s. x. a. n. n. e. i. e. i. s. s. i. & l. i. q. u. a. m. a. r. i. s. , x. q. u. a. p. o. r. t. i. o. n. e.

* i. t. u. s. i. l. a. b. r. u. s. s. i. u. e. s. u. p. e. r. c. a. l. u. i. u.

A. l. 4. f. 5. r. 3. ol. 486. f

A. l. 4. f. 5. g

A. l. 4. f. 4. ca. 27. l. 826. g

METHODI MEDENDI

reliquis omnibus probe se habere: Dimidiū facti, qui bene cœpit, habet. hic vero non totius dimidium, sed vel totum, vel paulo minus totum habeas, vbi lenticulatū scalprum immiseris. Atq; hæc optima est fracturarum, quæ in caluaria sunt, manualis tractatio: quam Chæirurgian vocant.

Quātum vero excidere conueniat eius, quod affectum est, deinceps exponā. Quod vehemēter est confractum, id totum est auferendum. Si vero ab eo fragmenta quedam longius excurrant, (quemadmodum aliquñ cernitur accidere) hæc persequi ad finem nō expedit, illud persuasum habentibus, minime futurū, vt ex eo noxa sequatur vlla, modo reliqua omnia rite sint peracta. Nos enim non semel aut bis, sed planē persepe, lic faciētes voti compotes fuimus. Indicatio vero agendorum hic quoque ex natura ipsarum partium affectarum subministrata est. Nam deligaturam, quam in alijs fracturis, ceu maxime phlegmonas arcentē, ratio inuenit, capitū adaptare nō possis: itaq; nec, quod affluit reprimere, nec, quod in egris partibus continet, exprimere queas: sine quibus præliis nec reliquorum ossium vllum seruari sanum potest. Nā pone in brachio ad medullam vsq; fractum os esse, neminem q; postea pro fracture legibus id deligasse: Omnino necessum erit saniem, non solum, quæ foris sub cute & sub musculis est collecta, sed etiā, quæ in medulla continetur, tum ipsam primum ac maxime corrumpere, tum cum ipsa os vniuersum: quando etiam nunc quoq; omnibus rite peractis aliquādo talia contingunt. Quomodo ergo non vel magis in capite ea accidant, cum nec deligaturam, quæ fracturis debetur, admittat: & omnis sanies prona feratur sic, vt super membranam vniuersa coaceruetur? In alijs igitur fracturis deligatura cū rite adhibetur, tantum abest, vt superuacuum aliquam humiditatem colligi in læso osse patiatur, vt et gracilius, q; pro naturali habitu, membrum reddat: In capite vero ratio, quæ per deligaturā est excogitata, nec potest ita tum os ipsum confractū, tum, quæ illi circumstant, liccare, vt neq; phlegmonen contrahant, neq; penitus vllam efficiant saniem: nec medicamentum est vllum, quod vel in alijs quidem partibus citra deligaturam os fractum, quatenus nunc dictum est, siccum atq; ab superuacuis purū reddere valeat. Necessum igitur est nobis primum fracture aliquid nudare, quod videlicet detergere & abluere saniem à membrana liceat: post vero, cum phlegmones tēpus præterijt, omnia q; sicca ad vnguem sunt, carnem producere, ac cicatrice locum includere. Nō est hic sermo nudus, rerum q; vacuus, cuiusmodi est ille sophistarum, qui operū artis nescij quærunt, cur capitis fracture callum non ducāt. Ducunt enim, viri boni. Vos q; tam demētes estis, vt eorum, quæ non sunt, tanq; sint, causas assignetis. Nouimus enim aliquandoincipitis os fractum: quod aut os huic ossi protinus succedit, temporis os vocatur, in quo ipsas squamatim cōpactas cōmissuras esse accidit: in eo luculenta fractura longissime pertinebat: quam ipse equidem minime cōtingens, sed tantumincipitis os excindens, hominem sanaui lic, vt nūc quoq; multos iam annos viuat. Quod siincipitis quoq; os dimissem, putruisset citius, quæ illi suberat, cerebri mēbrana, q; callum fractura duxisset. Nam, si nulla ex læsis partibus sanies intrō cōflueret, superfluum esset os excindere. Ergo illi, prout solent, nugentur. Ego vero in alia similiter se habente fractura cogitaram supernum os dimittere, ac, quod à lateribus erat, quod sanies deflueret, eximere: mox, cum & crassitudinem eius & duritiam estimassem, vtilius fore iudicari supernū os potius eximere, q; ob defluxus sollicitudinem cerebrum valenter concutere. Cogitaui præterea accidere posse, vt, si à latere magnum fieret in ossibus foramen, promineret fortassis hac parte cerebrum. Est porro & in lateribus non vno in loco etiam neruorū, horum q; non leuis momēti, quidam exortus: cum in supernis capitis ne minimus quidem vsquam oriatur neruus. His admonitus abstinui ab eximēdo osse, quod in latere capitis esset. At callum semper duxit, modo rite curaretur. Ac iā, quod disquiramus, hoc ferē superest, quæ nam sit, postq; foratum os est, tum medicamentorum, tum vniuersæ diligentia nostræ præcipua oīum ratio: vtrum ne blandissima, & quæ maxime voluptati cubantis subscribat, veluti qua nunc pleriq; vtuntur: an quæ huic maxime est aduersa, nempe quæ per medicamenta, quæ vehementissime siccant, perficitur: cuiusmodi & Meges Sidonius laudat, H & ciuis quidam nolter semper est vsus sic, vt etiam emplastrum, quod Isin vocant, ilico nudatæ membranæ imponeret, & super hanc foris oxymeli. Sanē is senex erat satis exercitatus in hac artis parte: ceterum neq; alium quempiam his vsum vidi, nec ipse vti sum ausus. Tantum tamen testificari Eudemo possum (nam id seni nomen erat) magis fuisse seruatos, qui ab illo curabantur, q; qui ab ijs, qui blādis utebantur. Aggressus vero fuisset aliquando ipse quoq; experiri eiusmodi curationis rationem, si perpetuo in Asia mansissem: sed, cum Romę plurimum agerem, ciuitatis morem sum secutus, permitta ijs, quos Chæirurgos vocāt, maxima eiusmodi operum parte. Ceterum ipsam rei naturam estimans, talem quandam determinationem longa nostra experientia confirmatam concipio. Qui auditorius meatus dicitur, non solū vsq; ad cerebri duram membranam pertinet, sed etiam neruum contingit, qui in ipsum à cerebro descendit. Is autem, quāquam ita positus in vicino, tamen vehemētissima (sicut dictum prius est) medicamenta tolerat. Nihil igitur miri sit, si post forationes crassa cerebri membrana ante, q; notabiliter phlegmone occupetur, valentissimis gaudeat medicamentis, ceu siccā naturaliter substantiam habens.

Galenī

ἡ ἀρχὴ δὲ τῆς.

A. li. 1. f. 13.
c. 14. fo. 2. b

GALENI METHODI MEDENDI
ID EST DE MORBIS CVRANDIS
LIBER SEPTIMVS

ARGVMENTVM LIBRI

Ventriculi exemplo vniuersas Partium Intemperies curare docet, siue illæ quidem Simples, siue cum Succorum affluxu, consistent.

Galenum Veritatis ac scientiæ studio inflammatum ad Exercitationem tantum, ac ob Amicorum preces, hos, & reliquos omnes libros scripsisse.

CAP. I.



Medendi methodum, Eugeniane charissime, quā olim in Hieronis gratiā scribendam suscepērā, postea, q̄ illum subito longum iter ingredi coactū non multo post diē obijisse nunciatū, ipsi quoq; persequi destitimus. Tu. n. mihi cōscius es, neq; hoc me opus, neq; aliud vllū, popularis aurg studio fuisse aggressum, sed quōd vel amicis gratificarer, vel me ipsum simul vtilissima rōne ad rē propositam exercitarē, simul † ad obliuionem senij} (vt Plato inquit) cōmentarios mihi reponerē. Quippe multitudinis laus, cōmodum ad vsus non nullos instrumentū viuētibus aliqñ est: mortuis certe nihil prodest, si-

† τὸ τοῦ ἀνθρώπου
θνήσκειν.

cut neq; viuentiū quibusdam. Nā, qui viuere in tranquillo optarūt, ac fructum ex philosophiā ceperunt: & ijs, q̄ corpori curādo sufficiunt, sunt cōtenti: ijs vtiq; impedimento nō paruo est apud vulgū fama, vt q̄ eos à rebus pulcherrimis plus iusto trāuersos auferat: veluti me quoq; nō ignoras ab ijs, q̄ sunt molesta, sic non nunquā tedio affectū, vt bono interim spatio ne tangere quidē librū possim. Ego vero (haud scio qua rōne) ab ipsa vsq; adoleſcentia mirifice, siue inspiratus, siue furore percitus, siue quomocūq; dixisse libet, & vulgi famā contempnī, & veritatis scientiæ q̄ studio flagraui, nullam esse hoibus nec honestiorem nec diuiniorem possessionem ratus. Atque ideo nulli librorum meorum nomen meū p̄scripsi: immo vos (sicut ipse testis es) rogauī, ne me immodice (vt soletis) apud homines laudaretis: nec nomen meum operibus, quę proderē, inscriberetis. Ob hęc igitur oia et medendi methodus, quā inceperam, à me est depolita, cum capita inuentorum breuib; commentarijs mihi ipsi scripſissem, nec vllam pleniorē docendi rationem etiam num adiecissem. Nunc, qñ & tu, & alijs ex amicis non pauci exigitis, quæ subinde me opere in agris peragere vidistis, vt ea in cōmentarios redigam, adijciam huic operi, quod reliquum est.

* διεξοδικῶς.

Quid Superioribus libris est actum, quid Sequentibus agendum: & quōd Imbecillitatis affectum

Empirici & Dogmatici non recte intellexerunt.

CAP. 2.

ERgo in horum commētariorum tertio, quarto, quinto, & sexto, quemadmodum similarium instrumentaliū q̄ partium cōm morbum curari conueniat, scripseram, idcirco nimirum ab eo auspicatus, q̄ & conspectior reliquis esset, & euidenter oēs propemodum priores medicos, qui certa methodo artem tradere polliciti, amethodi in ipsis curationibus deprehenduntur, confutaret. Nam, cum ab Hippocrate discesseris, qui nobis oīum † salutariū p̄ceptorum} semina p̄buit, reliquorum certe nemo vel conatus est genus hoc morbi methodo curare. Postulant aut, & quæ Hippocrates ipse reliquit, non malos agricolas, qui ea tum seminant cōmode, tum augeant, tum perficiant. Id aut fecisse ante nos neminem, sed plerosq; etiā semina, quæ reliquit, corrupisse, ijs, qui animū aduerterunt, clare mōstratum arbitror. Itaq; hoc morbi genus vel cōtinuitatis solutionem, vel vnitionis, vel qualitercūq; est libitū, appellare cuiq; permisimus: qñ de noibus nec in hoc opere, nec in alio medicinaliū vllō laboramus, sed quo pacto artis maxime finē consequamur. Reuertamur aut nunc ad morbū eum, qui oīum est primus, nēpe, qui in similaribus nascit, quibus s. primum animantis functiones referuntur acceptæ. Siquidem monstratum in alijs operibus est, quēadmodum instrumentaliū quāq; partiū aliquid agere dicamus, veluti oculū videre, aut crus ambulare: Esse enim sicuti id, quod p̄cipuū est actionis crurū, non cruris totius, sed musculosi in eo generis: sic visionē non oculi totius, sed crystallini in ipso humoris: ac in reliquis quibusq; organjs ad portionem. Porro ostēsum in secundo horum voluminum est genus hoc morbi non solū cognitu esse maxime necessarium, sed etiam neminē ipsum ratione curare posse, qui prima corporis elementa non norit: Preterea nō intelligere ea, quę dicāt, non nullos eorū, qui rationales se noiant, quoties imbecillitatem esse dicunt vel ventriculi, vel intestinorum, vel iecinoris, vel oculorum, vel alterius cuiuslibet partis. Si nanq; ita noiant infirmitatem impotentiam q̄ ad naturale opus, nihil plus plebeio intelligunt: quippe quē dicere audias imbecillum sibi ventriculum esse, non enim concoquere eū vel minima leuissima q̄, quę sumpsit. Quōd si imbecillitatē quæ est in vētriculo, affectū quempiā esse aiunt, interpretent, quæso, nobis, quem nam demū hūc esse volunt, quēadmodum in phlegmone fecerūt: nam Empirico sat fuerit, si symptomata labo-

† τῶν καλῶν.

Septima Classis.

ffffff iij

rantis

METHODI MEDENDI

rantis particulæ exposuerit, nempe tumorem præter naturam, & renixum, & pulsatilem dolorē, E & tensionē, & ruborem, alia q̄ id genus: imponit q̄ non nunq̄ breuitatis docendi causa cunctis simul collectis vnum nomen, sicuti cōprehensissimū phlegmonen. Dogmatici vero nō itidem, sed ipsam morbi naturā inspiciunt, quā symptomatum illorū collectio necessario sequit̄. Siquidē Erasistrato videtur sanguis, qui in arterias incidit, vbi spiritu impellitur, in exitu earum impactus herere, id q̄ phlegmone esse. At par (arbitror) erat vel Erasistratum ipsum, vel aliquē ex sectatoribus eius simili modo, affectū, qui in imbecillitate cuiusq̄ partis subest, interpretari. Tanq̄ enim de phlegmone, in quid nā translatus naturalis partis habitus sit, explicuit, ita ratio exigebat, vt & translatio cuiusq̄ particulæ in imbecillitatē ab eo explicaret̄. Non enim, cū pro naturæ ratione est affecta, ad propriā actionem est imbecilla: sed accessit oīno aliqua præter naturā occasio, quæ eam dissoluit deiecit q̄, & mortuæ similē effecit: quā utiq̄ nec Erasistratus dixit, nec Herophilus, nec alius quispiam medicorum, qui de primorum corporū natura ausi aliquid pronūciare non sunt.

Communis Methodus Intemperiei Dignoscendæ & curandæ.

C. A. P. 3.

CÆterum immorandum in his diutius non est, cum præsertim abunde prius monstratum sit & genus hoc morbi vtilissimum esse, quod à medicis disquiratur: & qui commode id sit tractaturus, huic necesse prius esse de elementis considerasse. Itaq̄, qui nobis habendus sermo est, is totus ex prius demonstratis elementis absoluet̄: de quibus vnū (vt scis) volumen edidimus, quod de Elementis secundū Hippocratem inscripsimus. Sanè eadē opinio de corporis natura est tum Diocli, tum Mnesitheo, tum Dieuchi, tū Athenēo, tum probatissimis ferē quibusq̄ medicorū, itidem vt præstantissimis philosophorum: vt qui ex calido, frigido, humido, & sicco mista putent tum alia corpora vniuersa, tum vero animantium in primis. Cæterū ei, qui de his oībus primum pronunciauit, demonstrauit q̄, iustū est, arbitror, reddere, quod inuenit. Ideo q̄ te nos ea fm Hippocratē elementa vocamus: etiam si maxime Chrysippus, Aristoteles' ue, aut alius quispiam medicus, philosophus' ue, similiter de ijs sit opinatus. Ergo, qm̄ vnaqueq̄ animalis particula propriā actionē edit, quæ tm̄ ab aliarū actionibus differt, quantū ipsa particula ab alijs, q̄ illas edunt, est diuersa, (differt vero ab alijs particula quæque eo, q̄ calidior, vel frigidior, vel siccior, vel humidior sit: aut q̄ binis horū quibuslibet sit affecta,) qui tueri actionē vult, hic tēperamentū earum custodiat, oportet. Custodiet aut̄, si id, quod ad calidius est cōuersum, refrigerabit: quod ad frigidius inclinatum est, calfaciet: Pari modo, si, quod ad siccius est alteratū, humectabit: & quod ad humen- tius est versum, siccabit: Rursus quoq̄, si siccabit pariter ac calfaciet, quod humidū est redditum, & frigidum: siccabit pariter & refrigerabit, quod humidius simul et calidius euasit: & in reliquis duabus coniugationibus ad portionem. Semper enim pro eo, quod exuperat, inducendum eousq̄ contrariū est, quoad particulam in symmetriā, & naturalem habitum vindicaueris. Ac genere, quidem, oīs egritudinis, quæ in similaribus consistit, iā dicta mihi medēdi est methodus. Cū enim octo earum sint differentię, veluti in libris de morborum differentia est traditum, octo nimirum erunt & medēdi rationes, quarum vna (quod medentis consilia diriguntur) curationis meta cōis est, ipsius similis corporis alteratio: quādoquidem etiam morbus ipse ex intemperie & naturalis temperamenti alteratione est ortus. At, quæ membratim medicatio agitur, ex his duobus conficitur, nempe materię copia, & huius congruo vsu. Ac medicamentorū quidem copiam tum ex libro de simplicium medicamentorum viribus, tum ex ea, quæ de eorū compositione præcipit, methodo haurias, licebit: Eorum, quæ ad victus rationem pertinent, hinc sumimus. Sed &, quemadmodum cuiusq̄ morbi intemperiem agnoscere oporteat, ex tribus operibus intelligas, primo eo, quod de Temperamētis: secundo eo, quod de Partibus afflictis: deinde eo, quod Ars medica inscribitur. Non est igit̄ ad ea, quæ nunc ordimur, ijs, qui prudētes natura sunt, ac cogitationē in primis exercitarunt, multis p̄terea opus: cui neutrū horum adest, huic certe ad præsentem disputationem non parua re est opus. Quod si in prauæ doctrinę secta præterea sit altus, hic geminum tem-
pus requirit, alterum, in quo prauas opiniones dediscat: alterum, in quo melioribus se exerceat.

Quid Rationalis curatio Intemperiei, quæ in Ventriculo est, differat ab Empiricorum curatione.

C. A. P. 4.

SAnè te scimus & ex ijs, quæ in vniuersum dicta sunt, particularia p̄ te inuenire posse: & alioq̄ multos id genus morbos à nobis percuratos vidisse sic, vt vtraq̄ ratione particularium tractationem minus requiras. Sed, qm̄ (vt Plato ait) non possunt, quæ scripta sunt, non è manibus exci- dere, quod, siq̄ liber in alterius nō exercitatae rationis manus deuenierit, facilius hūc doceat, adijci particulariū quæpiam oportet: ex quibus ēt protinus clare id, quod proxime dixi, intelligetur fieri posse, vt p̄ te ipsum } particularia inuenias. Siquidem ipse ea per me ipsum oīa inuestigauī, rō- ne ipsa viam monstrante: qm̄, si præceptores secutus fuissē, ipse quoq̄ ventriculo imbecillis fu- issē, vt cibis adstringentibus & subamaris vterentur: vino quoq̄ similiter austero: præterea ab- sinthio, & quod ex mali cotonei conficitur succo, alijs q̄ eiusmodi, quæ deuorantur, medicamen- tis. At vero, quod ad ea pertinet, quæ extrinsecus applicantur, primum perfundi ventriculum ex absinthio & oleo crudo iussissem: mox hapsū lanæ tum ex ijsdem ipsis, tum vero ex vnguentis melino, & mastichino, & nardino imponi: ab ijs ceratū ex ijsdem cōpositum: post alia pharmaca,

vtiq̄

* μορίω, i. par-
ticulæ.

† Ant. habent
εαυτῶν, ut sic
postea uerta-
tur. ut ille al-
ter per se ipsū
particularia
inueniat.

* ἀποπτεῖς, i.
ex oluis ima-
turis expressi.

A vtq; ceratis valentiora, quæ à medicis vocantur epithemata. Ea tum ex dictis vnguentis, tum ex ijs, quæ similem vim obtinent, medicamentis componuntur: in quibus est aromatum quoq; multitudo non parua, spica nardi, & amomum, & calamus aromaticus, & iris, & ladanum, & malabathri folium, & styrax, & bdellium, & opobalsamum, & balsamum, & xylobalsamum, reliquus q; aromatum catalogus. Quod si horum nihil profecisset, commune oïum remedium, quibus imbecillitas nocet, in fine adhibuissim, nempe rubrificationem, (*ῥομυζωον* græce vocant,) quæ vel per rhapsiam, vel sinapi, vel tale aliquid excitatur: deinde ad vsum aquarum calidarum ablegassem. Quippe vltra hæc Empiricus nihil nouit, veluti cōmentarij eorum docent. Quintus vero ijs, qui de cruditate aut in appetentiâ quererentur, primum quidem exercitari suadebat: tum esse, quæ & concoctu q; facillima essent, & non multa: quibus hæc non contulissent, cogeatur ipse quoq; ad Empiricorum dogmata confugere. Nam quis nescit, quemadmodum calidum, frigidum, humidum, & siccum, mordere sit solitus, balneatorum esse nomina dicentis: sine quibus tñ methode curare partium imbecillitatem oïno non est. Quare per hos nihil obstitit, quo minus ipse quoq; eadem instituissem via in eiusmodi affectibus sanandis. Verum ratio me docuit octo imbecilli ventriculi curationes. Vidisti igitur & tu quosdā vno die, vel potius hora, frigidæ¹ potione leuatos:

* AP. carpobalsamum.

* *ἀντισπαστικόν*, i. sponte nascentium.

B quorum alijs non aquam modo dedi fontanam recentem, sed etiam, quæ niue esset refrigerata, veluti Romæ preparare solent, calfaciens scilicet prius, quam ipsi dicoctam appellant: cibos præterea ad eundem modum refrigeratos identidem me illis permittere vidisti: in quibus est, & quæ Melcam vocat, vnus is quoq; Romæ laudatorum ciborum, veluti etiā Aphrogala: sed & frigide facultatis fructus, similiter refrigerans iisdē dedi, & ptisanam probe coctam, pari ratione refrigeratā, alia q; id genus sexcēta. In quibus vnā rem mihi proposui, ipsam i. refrigerationem. Verui aut ablinthiū, & quicquid adstringeret, contingere: veluti alios rursus à refrigeratibus abstinui. Calseci autē omni ratione, vinū vetus ex eorum genere, quæ facultate valde calfaciunt, exhibens (cuius maxime generis sunt Falernū, & Surrentinū) tum nutrimentum, quod calfaciēdi vim haberet, cū largo pipere. In nō nullis omne consiliū curationis ad siccandū direxi: dabam q; ijs tum cibos, qui natura essent sicci, ac probe assati: tum prorsus exiguā potionē. Iniunxi autē & adstringentium oïum vsum: quē vnum, qui illis citra rōnem medentur, norunt. Aliū vero non pridem, qui iam adeo siccatus fuerat, vt simillimū habitum præferret ijs, qui marasmo marcescunt, sanauit contrarijs oïno exhibitis, ijs, quæ egregij isti medici suaserant. Quippe nō ex alia occasione eō periculi venerat, (cū inter initia exiguā intemperie ex siccitate, quæ madereri postulabat, habuisset) q; C q; ijs, qui eum curandū susceperunt, tum ablinthio potantes, tū amaros asparagos, & bulbos edendos dantes, item q; mala cotonea, & cestiana, & punica, post quoq; vbi venter nihil horum continebat, etiam rhois succum bibere cogentes, tum, quæ paulo supra dixi, extrinsecus imponentes, paulo minus, omnis madoris expertem reddiderunt: hunc nos sanauimus omni ratione humectantes, ipsi q; materiam inuenientes ex ea methode, quæ in opere de medicamentis est tradita.

Quæ Ventriculi intemperies Citius ac securius: quæ Longo tempore & cum Periculo sanentur. CAP. 5.

* *ἀντισπαστικόν*, est in impleis, sed i manu scriptis *ἐνσπαστικόν*, i. intuentione.

N Am, sicuti in libro de demonstratiua sectā dixi, numerosis medicorū inter se diffidijs undiq; confusus, vbi me ad iudicandum de his conuerti, intellexi prius in demonstratiua methode exercitandum me esse. Quod cum multis deinceps annis fecissem, singula ipsi dogmata subieci: atq; prout inuentorum indicatio me ducebat, ita curationes institui. Verum, qm̄ id non oēs saltē possunt, expediet ipsis scribi per octo curandi indicationes particularis materiæ comparandæ meditationes, à ventriculo rursus sumpto initio, qm̄ huius primum mētionem modo fecimus. Ac facillime² quidem ad curandum alterationes sunt, quæ ex calido & frigido consistunt, propterea, q; maxime actiuis qualitatibus corriguntur. Aegrius curantur, quæ in humido sicco q; habentur, q; imbecillis & (vt sic dicā) magis materialibus qualitatibus eorū curatio perficitur, potissimū q; D cum humectandum esse requiritur. Ac tempus quidem caloris frigoris q; reparandi, par quodam modo est, securitas tñ impar. Nisi enim cuncta, quæ ei, quod curatur, circūdata sunt corpora, valida planē sint, metus est, ne ab ijs, quæ refrigerent, noxam contrahant non leuem. In reliquis duabus qualitatibus securitas similis est. Tempus curationis in sicca intēperie multo amplius: quippe, quod senium in sanis est, id sicca intēperies est in egris. Itaq; etiam insanabilis est, si prorsus sit consummata. Est aut prorsus cōsummata, vbi solida limilariū partiū substantia reddita est siccior.

De Quadruplici corporum curanda Siccitate, ac de optimo Melle, & Lacte, cæteris quæ cibis, qui siccatis corporibus conueniunt, eligendis.

CAP. 6.

N Am³ est & altera siccitas, vtq; cum ea, quorum substantia ex humore concreto constat, sicut caro & adeps, sunt liquata. Etiam tertia, cum propria humiditas, vnde partes nutriuntur, omnino est absumpta. Continetur ea in omnibus animalis partibus, ceu ros quidam per eas sparsus: de qua dictum aliubi sæpe est. Hanc igitur inferere particulis sine nutrimento nō est. Ideo q; difficillima est omnium eiusmodi affectuum curatio. Diuersa ab ijs siccitas est, quæ in proprijs cuiq; particula ex libris arterijs venis q; cōsistit: prouenit & hæc ex sanguinis penuria. Omnibus itaq; his siccitatibus maxime contrarius est austerorum vsum, siue ea cibi sint, siue potiones, siue etiam medicamenta: quippe quæ, siquid in ijs superest naturalis humoris, id absumunt, partim

Septima Classis.

fffff iij

ebibentia,

A. 3. f. 13. l. 2. c. 293. d

A. 3. f. 13. l. 1. c. 294. c

A. 1. f. 1. d. 6. c. 1. 16. d

METHODI MEDENDI

ebibentia, partim in sinum ventris per exiguos meatus exprimentia, partim ad continentes partes trudentia. Curabis igitur ipsas, si meatus, qui contracti sunt, dilataueris: ac quod in vicinas particulas est compulsum, reuellas: preterea lingulas simularium partium propria humiditate, humectantis nutrimenti ope repleas, veluti nos, quem memorauimus a medicis siccatum, curauimus. Is in ea contrarietate, quæ in frigido & calido consistit, nullam euidenter vincentem habebat intemperiem, nec in vniuerso corpore, nec in ventriculo: siccus tamen & gracilis admodum est redditus propterea, quod ventriculus eius ex sicca intemperie imbecillus male concoxerat. Huic namque omne curationis consilium huc tendebat, ut humectaretur tum ventriculus ipse, tum reliquum omne corpus. Quibus autem singulatim agendis, quibusque maxime materiis sum usus, ut voti compositum essem, non sit ab re dicere. Domum ei parauimus maxime balneo vicinam, quales multas esse in diuitum domibus non ignoras. Ab hac statim in balneum super linteis mane intuli, utique ne, si ipse se moueret, tum siccaretur: tum ante, quam commodum esset, exoleretur: horum enim alterum contrarium affectui est, alterum moram in balneo minuit. Longissime namque in aqua versari hominem expedit: ideoque etiam natationes vtiliores sunt, quam parui aluei, quos Pyelus græce vocat: atque ex ipsis natationibus potissimum, quæ propinqua sunt foras egressui, quo scilicet illi ab aqua foras non longa sit via: nam aerem balnei in ipsis, qui ita sunt affecti, haud quaquam desideramus. Esto autem aqua ad vnguem temperata, cum, quæ frigidior est, latenter frigus corpori infirmo insinuet: calidior autem cogat constringatque tenues meatus, ac denset. At nos eos, cum coacti sunt, remitti, laxari, ac dilatarsi postulamur: quod temperatissime aquæ qualitas præstat, utpote quæ, iucundissima cum sit, naturam ad explicandam se, atque ad dulcedinem, quam præstat, quoquo versus extendendam prouocat, contraria videlicet ratione ipsis, quæ sunt iniucunda: ab ipsis enim recedit, fugitque ad profundum. Quo minus mirum est ex offendentium contactu superari, constringi, ac durari corpora, tenuesque eorum meatus cogi, ac densari: contraque, ipsis scilicet, quæ iucunda sunt, succedere contraria, utique fundi ac molliori corpora, dilatarsique meatus. Ab eiusmodi lauacro ita omni asininum exhibui lac, sed inducta in ipsam, qua iacebat, domum asina. Quippe sic mihi persuaseram maxime quidem celeriter hominem sanandum, si fieri posset, ut ipse alimam sugeret: in id grauaretur, expedire, ut quam minimo tempore in aere ambiente lac moraretur propterea, quod celeritate mutari sit aptum, utique genitalis seminis ritu, quod nec ipsum aliquandiu extra propria vasa, si modo suas vires seruabit, morari patitur, sed vel in ipsius maris partibus contineri, vel ipsius foeminae partibus situm esse postulat. Et sane vtilissimum lac est, cum ex ipsis mammillis quis hauserit, veluti Euryphon, & Herodotus, & Prodicus censent: qui tantum in eo ad corpora reficienda fiducia habuerunt, ut etiam, qui phthoe contabuerant, ex ipsa mulieris papilla lac sugere iuberent. Verum cum hoc plurimis non placeat, melius est calens adhuc ex mammillis id in egri ventriculum quam ocysime transferre. Ac optimum quidem, utpote cognatum, muliebre lac est. Sed, quam id exhiberi sibi ceu pueris plerique recusant, utique, ceu asinis, asininum ipsis, dari conueniet. Id enim reliquis omnibus ad propositum affectum est vtilius: quippe, cum tenuissimum sit, & minime coagulatur, & quoquo versus ocysime in corpus digeritur. Eget autem horum vtriusque, cui ventriculus laborat, utique ne coaguletur, communis commodi gratia, omnibus enim id est incommodum: ut quoquo versus digeratur, propterea, quod & celeriter nutriri est opus, & quod via, per quas alimentum transit, iam conuenient. Igitur tum lac ipsum per se est his dandum, tum etiam mellis tepidi pauxillum immiscendum. Maxima vero habenda cura est in eiusmodi affectibus de vtriusque bonitate. Quod igitur mel colore flauo sit, et odore suauis: tum purum adeo, ut totum pelluceat: ac gustanti parum acre iucundissimumque: preterea tam sibi coherens, ut, si digito attollatur, continuum sibi nec intercisum ad humum defluat: id omnium est optimum. Si vero abrupitur, nec demissum ad terram usque continuitatem seruat, id aut crassius iusto est, aut tenuius, aut anomoxomeres. Voco autem Anomoxomeres, (quod sane & nomen ipsum indicat,) quod ἄνομοτον μερῶν, hoc id est ex dissimilibus partibus, est compositum. Deprehendas autem id, si diligentius inspicias aut crassitudines aut humiditates habere innatantes, quæ nec inter se sint similes, nec etiam toti. Cerosum itaque magis mel est, quod & crassius est, & cui tales quæpiam crassitudines innatant. Excrementosius vero ac perfici concoqui que difficile, tum quod totum humidum est, tum in quo multe in partibus sparse apparerent humoris guttæ: porro, in quo vel ceræ qualitas aliqua, vel propolis, vel id genus alia gustu deprehenditur, adeo non est optimum, ut etiam malum sit: quippe nullam penitus alterius cuiusquam rei eminentem in se continere qualitatem debet. Quocirca, quod thymum planè redolet, non probo: est enim id parum consummatum, nec planè quodam modo mel. Quam non ignoro a quibusdam id laudari, eo quod fieri, ut non nulli venditores incisum thymum illi iniiciant, quo id redoleat, videaturque optimum. Ipse tamen, quod tam improbe thymum olet, non laudo: multoque minus, si cui iniectum thymum sit. Quod autem confusam quædam qualitatem odore gustuue præ se ferat, id non vitupero. Ad eundem modum & lac nullam externam qualitatem odore gustuue præ se ferat, sed esto quam dulcissimum, & sibi ipsi continuum, & prout lacti conuenit, splendens: super omnia, quoad eius fieri potest, similes habeto partes: namque hanc dotem, veluti mel optimum, ad perfectionem non recipit. Quod vero tale lac fiat, & idoneis nutrimentis alendum

Alendum animal est, & exercitationibus mediocribus admoendum, & pullus, si quem lactat, auferendus. Quod autē ætatis quoq; maxime florentis esse debeat, id neminē latet. Curandū item, vt quā optime concoquat, contemptis videlicet iis, qui, si alinis quoq; victus rationem præferimus, ridebunt. Si enim Veneti & Pralini studiosi sectatores, equorum stercora, quō intelligāt, quemadmodum alimenta concoxerint, odorantur, tanquam ex eo omnem eorum bonam habitudinem cognituri, multo profectō magis nostrum fuerit pro hominis salute nihil tale nō prospicere: atq; herbas animalī, quæ non admodum sint humidæ, fœnum q; & hordeum, quod sit mediocre, obiciere: sed nec illa omittere, vt alinæ corpus refrigeremus, & fricemus, & detergamus, & mūdemus. Porro si humidiora, & olentiora, & flatus plena excreuerit, planū profectō est non concoxisse probe. Quare aut detrahendum aliquid de alimento est, aut exercitationi aliquid adiciendū, aut qualitates immutādē, aut refrigerationis frictionis q; cura variāda. Sin duriora reddat animalis aluus, ad contraria est inspiciendum, atq; illorum aliquid immutādum. Nam, si ipse oīa, quæ consideranda circa animal sunt, cuius lacte vsuri sumus, deinceps persequar, totam tuendæ sanitatis artem commemorem, quam teneat, necesse est, quisquis idoneum lac præparabit: nunc vero dici opus non est, cum alibi de ea traditū sit absolutissime. Sed ad propositum reuertor. Ac

B mihi iam rursus memoria repetes hominem, qui & lautus est, & lac sumpsit. Hunc itaq; ad secundam vsq; lauationem quiescere permittemus: tum modice fricabimus, & pinguiter, vtique si lac, quod sumpsit, iam ad vnguem confecit, id quod tum ex ructu, tum ventriculi mole licebit conicere. Modicum vero temporis inter primam & secundam lauationem interuallum erit, si quatuor aut quinque equinoctialium horarum spatium intersit, scilicet si tertio adhuc lauare paras: sin aliter, plurimum. Sanē tertio lauabis, si multis lauationibus fuit assuetus: hi nanq; & delectantur, & iuuantur, si sæpe lauent. Quin etiam post quanq; lauationem hominem vngemus prius, quā se vestiat: quippe conducit ad renutritionem id quoque, sicut & frictio. Reddita vero de horum omnium facultate ratio est in libris, qui de sanitate tuenda sunt scripti: non tamen inutile fuerit nunc quoq; summam ea repetisse. Nam, siue cuilibet parti corporis temperatam infundas calidam aquam, siue frices, siue aliter quomodocunq; calfacias, idem fieri cernes, quod || Hippocrates de iis dixit, quibus aqua calida desuper infunditur. Nam primum attollitur, mox gracile efficitur. Ideo q; vbi carne implere quodlibet corpus studemus, id eatenus calfaciendum nobis est, dū intumescat. Vbi vero digerere, & vacuare cupimus, eatenus continuandum est, dum, quod prius intumuit, subsidat. Sanē, qui eiusmodi operibus præficitur, sollicitè attentus esse debet, potissimum q; vbi carne implere studetur: nam digerendi certe tempus adeo late patet, vt, etiam si velis, in eo non aberres. At carne implendi planē præceptum est occasio: siquidem, cum primum intumuerit, tum est delistendum. At intumescere hoc, singulis corporibus suum est. Non enim fieri potest, vt, qui nunc nobis propositus gracilis est, ita intumescat, vt illi, qui sani sunt: imo, postquā leuiter intumuit, protinus digeritur. Itaq; attendendum diligenter est, ne clam te elabatur propositus temporis articulus. Siue igitur hominem, qui extrema gracilitate est, perfrices, sufficiat tibi solus rubor: siue laues, satis esto mediocris calor: si quid ultra peragas, resolues hominem magis, quā nutries. Vngendum vero post lauationem oleo est, ne videlicet plus iusto digeratur, sed obstruantur exigua cutis spiramēta: idem protinus & siccitatis remedium fuerit: & aduersus incommodum, quod ab aere ambiente contingit, velut munimentum. Ac, si quidem delectatur lacte, post secundam quoq; lauationem id exhibebis: sin aliter, ptisanam diligenter coctam, aut aliam ptisanā ritu præparatam. Hinc, vbi rursus quieuerit, ad tertiam reducēdus lauationem est, aut ilico ad cœnam. Sit autem præparatus illi panis purus, & qui curiose in furno sit coctus, & tum fermenti, tum salis, quod satis est, habuerit. Obsonium quoque ex saxatilibus piscibus, aut ex albo iure asellus. Præterea alæ testes q; gallinacei, qui lacte sit altus, idonei sunt. Quorum si copia

Li. de Off. me.
com. 3. t. 16.
7^a. 215. b

Cum q; vbi carne implere studetur: nam digerendi certe tempus adeo late patet, vt, etiam si velis, in eo non aberres. At carne implendi planē præceptum est occasio: siquidem, cum primum intumuerit, tum est delistendum. At intumescere hoc, singulis corporibus suum est. Non enim fieri potest, vt, qui nunc nobis propositus gracilis est, ita intumescat, vt illi, qui sani sunt: imo, postquā leuiter intumuit, protinus digeritur. Itaq; attendendum diligenter est, ne clam te elabatur propositus temporis articulus. Siue igitur hominem, qui extrema gracilitate est, perfrices, sufficiat tibi solus rubor: siue laues, satis esto mediocris calor: si quid ultra peragas, resolues hominem magis, quā nutries. Vngendum vero post lauationem oleo est, ne videlicet plus iusto digeratur, sed obstruantur exigua cutis spiramēta: idem protinus & siccitatis remedium fuerit: & aduersus incommodum, quod ab aere ambiente contingit, velut munimentum. Ac, si quidem delectatur lacte, post secundam quoq; lauationem id exhibebis: sin aliter, ptisanam diligenter coctam, aut aliam ptisanā ritu præparatam. Hinc, vbi rursus quieuerit, ad tertiam reducēdus lauationem est, aut ilico ad cœnam. Sit autem præparatus illi panis purus, & qui curiose in furno sit coctus, & tum fermenti, tum salis, quod satis est, habuerit. Obsonium quoque ex saxatilibus piscibus, aut ex albo iure asellus. Præterea alæ testes q; gallinacei, qui lacte sit altus, idonei sunt. Quorum si copia

D non est, aliis vtendum. Ad eundem modum & perdicibus, & passerulis, qui mōtani sint & molli carnī, vescendum. Vitanda autem, & quæ palustria sunt, & quæ carne sunt dura. Et (vt paucis alimentis summam complectar) sit coctu facile, & nutriens, minime q; glutinosum, atq; excrementosum. Porro omnium, quos nouimus, ciborum maxime nutriens suilla caro est: verum nō æque, ac prædicta, cōcoctu facilis est: præterea glutinosum succū crassum q; generat. Alioquin nec alio esse habitu potest, quod in summo sit nutriens: quippe adherere id debet, & firmiter affigi, nō autem præ tenuitate diffuere. Non tamen ad propositum affectum vtī hac conuenit. Si enim nutrimentum ipsum se ipsum cōcoqueret, ac in partes digereret, præterea alendis partibus assimilaret, & quibus alimēto plurimo est opus, adhaeresceret, proculdubio maxime nutriēte cibo esset opus. Verum, quoniam non aliud est, quod nutrimentum desiderat, aliud quod ipsum conficit: sed, quod nutriendum est, ipsum sibi & nutrimentum attrahit, & mutat, & cōcoquit, & adiūgit, & assimilāt: ad duo nimirum nobis in opportuno cibo eligendo spectandum esse dicat, vnū ipsius cibi naturā, alterū vires suas proprias insitas q;. Itaq; ex his illud patet, nec planē, quod maxime nutriat, optimū esse iis corporibus, quæ refici magis egent, vtpote quibus cōcoquendi facilitas non est: nec ēt, quod facillimum concoctu est, cū scilicet ipsum nequeat maxime esse nutriens. Cum igitur hæ indicationes ex aduerso pugnent, committendum nō est, vt, dum talteri, nimium

* AE. ἀγρίοις,
i. agrestibus.

* σπουθῶν, i.
auiculis. Nam
σπουθῶν gen^o
est ad auiculas
oēs montanas.
† ἱστταὶ sunt
passeres: lib. 4.
& 5. historię
animalium.

† ἐτέρον τῆς
ἀχρότητος. i.
alteri^o excellui.

sis

METHODI MEDENDI

sis intentus, alterius omnino obliuiscaris, sed vtriusq; memor, quoad licet, vtrunq; misceas: quod E mihi præceptum ubiq; memoria teneri velim. Iam vini tum qualitatem, tum quantitatem, me moremus, utpote quod maximā ad talia vim habeat: qñ vno hoc in potu vtendum cenleo oibus, quibus refici corpus est opus, modo nō febricitent. Esto igitur vinum (quod exempli loco dicat) quale est Sabinū in Italia, Arsinium vero in Asia, ac (vt summa quadā ac generatim comprehendam,) quod aquosum quidē alioqui est, ceterū leuiter adstringit. Aquosum natura appello vinū, † quod tenue est, † & purū, & oligophoron, vt † Hippocrates græce nominauit. Est autē Oligophoron, quod, si diluatur, minimā sustinet aquæ mistionē. Id est sanē imbecillissimum, & vt in vinis, aquosissimū: nam, quod plurimū aquæ in mistura sustinet, id tum vehementissimū, tum validissimū est. Eiusmodi vinū † Hippocrates Oenodes, hoc est (vt verbi vim exprimā) vinosum, nominat. Verū ab hoc cauendum est, qñ imbecillas vires feriat. At, quod aquosum natura est, ceterum austerū, id percommodum est, q & ab aquæ imbecillitate recessit, & vini noxā non dum hēt. Ad hæc itaq; respiciens, tum etatē eius, tum tēperamentum inuenias. Quippe, quod nouellū est, id tum aquosius, tum vero imbecillius quodāmodo est, q̄ vt vino conueniat: adde ēt, q̄ ægrius concoquit, ac magis excrementosum est. Antiquius vero, vt vinosius est, ita vehementius est, q̄ vt propositis sit ex vlu. Quo circa citius sexto anno nobile Sabinum idoneum non est, q & diutissi F me in stomacho ac ventriculo innatet, & fluctuationes faciat. Nobile voco, quod austerū est, non Sabinum modo, verū etiam Adrianum, & Albanū, & Arsynium, & Titacazenum, omnia q̄ id genus: dictū nāq; silius de oibus vinis seorsum est. Ad has igitur, veluti metas, respiciens, ēt mīsturā eius cum aqua temperabis. Quin etiam exactius coniecturam de iā dictis facies, si vitiorum aquæ capita memoria tenueris. Porro pendent ea ex frigidityte eius omnia: cuius culpa & in præcordiis diutissime moratur, & fluctuationes excitat, & in flatum mutatur, & corrumpitur, & ita ventriculi resoluit robur, sic, vt deterius proinde concoquat: sed nec digerēdo per corpus alimen to aliquid magnopere cōducit. At vero memoratorum vinorum virtutes comprehēdis iā aquæ vitus aduersam quodammodo naturam habent, cum nec inflect præcordia, immo si inflata sint, subidere faciant: nec inibi morā trahant, propter caloris mediocritatem: adde, q, cum digestio nis vias aperiant, & pariter impellant, ac nutrimentum sursum agant, ad celeritatem deductionis in corpus conducunt. Sunt præterea boni succi, & ad miscenda concoquenda q̄ ea, quæ in ventri culo & venis sunt, idonea. Iam vires quoq; organorum adaugent, & expellendis excrementis viā faciunt. Eo q̄ sit, vt etiam talia vina præter cetera vrinas moueant: quando & ipsa totum corpus celeriter transeunt, & impetu cursus sui excrementa secum expellunt. Ac dictū quidem alibi dili G gentius est de vinorū facultate æque, ac ciborum. Conuenit q̄, vt, qui artem methodo* tradi sibi i studet, omnis materie vires prius p̄didicerit: nec expectet, vt eas in lingulis affectibus audiat: sed, simul ac curationis tantum speciem norit, debitam victus rationem inuenire possit. Ego vero iis consulens, qui veritatis discendæ sunt auidi, eiusmodi doctrinam attingere saltem nō grauabor: quod scilicet, qui minus exercitata cogitatione sunt, exemplis a generalibus ad particularia, veluti manu ducti, descendāt. Ergo, quod reliquum est, apponendum. Potionis is modus erit, vt nec in ventriculo innatet, nec fluctuationis vllius sensum inuehat. Ciborum vero, potissimū si fieri po test, vt ne grauent quidem ipsum. Quod cum difficile sit, vel fortasse eiusmodi, quod vitari in im becillo ventriculo omnino nequeat, proximum est, vt quā citissime grauis esse desinat. Ab hoc tensio inflatio q̄ præcordiorum vitāda iis sunt. Quod si tale quippiam primo die inciderit, pro magnitudine symptomatis ad portionem detrahendum postridie de cibo est: sin recte omnia ce dunt, paululum adiiciendum. Ad eundem modum & in tertio die vel demere vel adicere con ueniet cum precedente conferentibus. Atque ita semper omnia pro renutriendi reficiendi q̄ ra tione, frictiōnibus, gestationibus, inambulationibus, prout corporis incremētum procedit, admi nistrare, etiam reliqua oīa pro refectionis vocata ratione adiicientibus. Quæ sanē genere a proposi H ta ratione non differt, sed in eo, q̄ sub illa perinde totum corpus est affectum, sicuti sub hac ventri culus. Accidit autem sic affici corpus in diuturnis potissimum morbis, utiq; cum natia cuiusq; partis humiditas, ex qua prima nutritur, propemodum omnis exhausta iam est: nam, vt solidarū ipsarum siccitas corrigat, id fieri oīno nō potest, sicuti nec senium, ueluti in libro de Marasmo do cuimus: hanc uero humiditatem, ēt si oīno sit absumpta, regigni modo dicta uictus ratione licet. Atq; in aliis refectionibus uentriculus egregie præ ceteris non afficitur: in proposito aut affectu morbus est ipsius uētriculi, tempore uero totū corpus, utpote parum probe nutritum, macescit: quo rationabilius est exquisitiorem hos uictus rationem requirere, propter concoctionis imbe cillitatem. Ceterum, cum meliores sunt effecti, trāsferendi sensim sunt ad renutritoriam refectionem q̄ uocatam uictus rationem, Analepticen Græci uocāt. Id fiet, si pluribus, & frictiōnibus, & gestationibus, quā ante, utemur. Mutanda uero interea est & ciborum tum qualitas, tum quantitas sic, ut tum plures, tum ualentiores, quā prius, exhibeantur. Ac tempore procedente, cum ad sanitatis statum prope uentum iam est, seponēda sunt prisana, & lac: præterea sorbitio ex alica: ac ad consuetos cibos ueniendum: post etiam pisces detrahendi, nisi si in consuetudine fue runt, ac uolatilibus cibādum: tū suillas carnes esse a pedibus in ptisana elixis incipient: post uero etiam

* Al. Arsyenū.

† Antiqui legunt
τὸν λεπτόν,
καὶ λευκόν, καὶ
λαμπρόν, i. qd
tenue est & al-
bum & splen-
didum.

Li. de Rat. vic.

I ac. cō. 3. t. 20.

7^o. 128. g

Ibidē. cō. 3. t. 1.

7^o. 125. d

* Al. arsyenū.

* κατακρᾶσι
κοι, i. contem-
peranda.

* ἐπὶ ἀξέσθαι.

* κινῆσθαι, i.
motuonib⁹, est
in imprecis.

Al. 3. f. 13 r.
c. 29. fol. 2. d

A etiam imum crus recte sumat: ab hoc etiam reliquas partes: primū quidem iuuenis porcelli: qui, si hyems sit, etiam pridie iuguletur, nam hesternum, quā recens necatum, facilius cōcoquitur. Æstate sat fuerit, si mane immolatus porcellus sit, ac circa Solis occasum comeda: quippe, quod in superioribus suauis, cum valentius alimentum vespere exhibendum censuimus, id semper obseruare studebimus, utque non leue percepturis commodum iis, qui ita cibabuntur: quod sanē diligentius inspiciens agnosces: satius enim est à principio rem cōpisse. Quoniam, qui ita se habent, plurimo nutrimento indigent, nequeunt autem, vel quod mediocriter est, concoquere, paulatim hos & sepius cibare melius fuerit. Atque idcirco fieri nō potest, ut semel eos cibasse sit satis, sed nec bis, quoad scilicet sunt gracillimi: atque hac de causa ipse ter eos cibare sum solitus. Verum, quā iam manifeste meliores facti apparēt, etiam bis nutriuisse sit satis. Ergo tantam exhiberi primam cibationem est rationabile, quanta prius, quā secūda sumatur, tota prorsus erit concocta. Id contingere valentiori alimento non potest. Quare primo loco leue sumendum his est, quod videlicet cōcoquatur celerrime & excrementum eius discedat, & vacuus purus quod ventriculus secundum excipiat. At, quā non solum quies, & somnus, sed etiam longius tempus huius naturalē administrationem excipit, rationabile est, ut valentiores ciborum hoc maxime tempore offerantur. Itaque etiam athletæ omnes sic faciunt: qui eum vsum non solū aliqua ratione inuenerūt, sed etiam longa experientia cōprobarunt. Sed enim, & quod illi faciunt, nihil mali sit, si nō, qui cōualescentium victu vtuntur, etiam faciant, ut illico post cœnam non bibāt, videlicet ante, quā cibum fuerit cōcoctus: siquidem innatant cibi, si bibant, ita, ut eos ventriculi corpus propter interpositū humorem non contingat. Verum, si sitibundi fuerint, prohibere eos in totum ut graue est, ita nec expedire: sed tantillum indulgendū, quod & molestiam soletur, & sitim leuet. Postea vero, quā nutrimentum concoxerint, abunde bibere sunt sinendi: quippe celerrime, si ita faciant, per corpus digeritur. Mane vero post somnum, cum deiecerint, & paulum inambulauerint, modice sunt fricandi. Est autem modica his frictio, quæ eatenus administratur, dum corpus incalcat: mox gestationibus vtendum: dein rursus tum lauādi sunt, tum fricandi, id quod intra meridiem, aut planē circa ipsum meridiem: quod videlicet inde ad vespere abūde spatium interueniat. Quod autem & de domibus, in quibus conualescēs nutritur, habenda in primis cura sit, potissimum, ne frigidiores calidiores ue iusto sint, superuacuum dicere arbitrari: pari modo & de alijs eius generis, quæ inuenire sibi quisque sine nostra opera potest, doctus videlicet non solum ex his, quæ hic, sed etiam quæ in opere de sanitate tuenda sunt dicta. Est nanque conualescentium victus ratio media quædam.

C inter eam, quæ sanorum propria est, & quæ ægrotantium. Quare difficile non est ex iis, quæ de utraque sunt prodita, ut per se ipsum quis mediā inueniat. Nam, sicut nec aliarum rerum, ita nec victus vna omnibus species in consuetudine est: cum alijs semel esse, alijs bis: & alijs citius, alijs ad vespere incepisse cibum, moris sit. Iam cibum ipse alijs piscis plurimum est, aut denique aliquid ex mari: alijs olera magis, aut denique hortensia: alijs poma: alijs legumina: alijs nūces: alijs aliud quippiam: alij quadrupedum carnes, atque harum alijs alia: alijs autem, id quod alijs aliarum. Quin etiam caseo & lacte vtuntur non nulli plus, quā ceteris cibis, generaliter quidem caprarum, vel boum: sunt tamen, qui & aliorum animalium. Bibunt quoque alij calidum, alij frigidum: & vinum vel liberaliter, vel parcius, vel omnino nullū: vel hoc genus, vel illud. Ad ea igitur reducendus quisque est, quibus insuevit. Scriptum autem diligentius de consuetudine seorsum est. Nunc illud dixisse abunde sit, non modo in conualescentium victus ratione, sed etiam in morbis magnam partem ad totius victus medicamentorum quod inuentionē ex cōsuetudine sumi. Ratio enim totum genus indicare potest: materia cum ex alijs, quæ retuli, tū vero ex consuetudine non minime est sumenda. Sed & naturarum inspiciendæ sunt proprietates. Noui enim quosdam, qui, si quod vigilantium opus nocte obire fuissent coacti, dormire præterea non poterant. Talibus igitur, ut notabant, consulendum non est: ne videlicet ea occasione vigilare coacti, maximam inde noxā sentiāt: licet nanque totum corporis habitum vigilia, eo quod infestissima est iis, qui ex siccitate laborant. Sunt, & qui, si ptisanam gustent, protinus nauseant: eadem in quibusdam facile acescit. Esse vero aliquos, qui facile carnem bubulam concoquant, iam vnum ex publice iactatis est: præterea alios esse, qui ad alios cibos potus quod recte se aut non recte habeant. Non solum autem ex his materia, quæ ad victum pertinet, copia suggeritur, sed etiam ex regione & tempore. Scripta quod iam hæc sunt à multis, qui me præcesserunt: quo minus ipse istis inlusto: qui ideo tantum ea commemo, nequid videlicet sit omissum. Quod vero ab omnibus iunioribus medicis ē omissum, id persequar: nempe quemadmodum affectus corporum methodo curentur. Eam methodum veteres (ut ante dixi) probe inchoarunt, nemo tamen eorum ipsam absoluit. Verum rursus ad propositum redeundum. Sicca intemperies, ubi solida ipsa corpora contigerunt, si quidem in vna quapiam parte consistent, veluti nunc in ventriculo propositum est, nunquam ad perfectionem sanabuntur, nec in eum statum, qui ante morbum fuit, reuertentur. Sed, quod dici in consuetudine vulgo solet, re scilicet ipsa edocto, id talibus maxime intemperantibus accidit, morbum ventriculum afflixisse, & in reliquam uitā imbecillū reddidisse. Quippe senum nō ventriculum obtinet prius, quā cōsensuerint: quo fit, ut facile ex leuibus legantur causis, pinde ac senes, nec probe conco-

* ὁπώρα.

* ἀπρόσφρα.

† οἱς ὕλην τρο-
φὴν ἐκλεῖν,
ē in antiquis,
id est ad ele-
ctionem mate-
riae alimentis.

METHODI MEDENDI

quere possint: quo euenit, vt etiā totū his corpus deterius se habeat. Ad eundem modū, & si alia E quauis afficiant parte. Quod si ipso etiā corde sint affecti, celeriter arescunt: vocat q̄; ariditatē siue marasmū eiusmodi Philippus ex morbo senium. Is igit̄ marasmus breui mortē affert: proxime huic, qui ab iecinore est ince ptus: mox, qui à ventriculo: qui ab alijs particulis ortū habet, tanto sanē tardius, quanto quaelibet harum minoris est præstantiā, q̄; illā. Si vero leuiter cordis corpus siccatum sit, senescunt quidem celeriter, ceterū plures annos trahunt, q̄; qui vehementer sunt lesi. Ad eundem modum in iecinore et ventriculo, ceu dictum est: ac in reliquis oībus ad portionem. Cæterum victus ratio eadem genere est tum in hac siccitate, tum in illa, quæ solam eam humidita tem absumit, quæ solidas nutrit: præterea etiam in tertiā, quam supra memorauimus, siccitate. Fa cillima vero oīum sanatu quarta est, in qua venæ succo sunt inanite. Immo hic affectus, vt frigidi tas potius habitus, curatur, quā vt siccitas: vel (vt clarius loquar) frigiditatis respectus i hac siccita te exuperat, periculum q̄; in ea vertitur. Siccitas secundum locum obtinet, habet q̄; proinde sana tionem tum expromptā, tum celerrimam. Siquidem, si biduo quis victus rationem his caute exhi beat, modice calfaciens, & tutō nutriens, statim in tertio pleniorē victum citra noxam admittūt: multo q̄; id magis in quarto & quinto. Atq; hoc sanē erat, quod Hippocrates præcepit: ¶ Quæ lon go spatio extenuata corpora sunt, ea segniter reficere oportet, quæ breui, breuius.

1. Apho. 7. Ex. ord. 11. h

Ratio Curandi Frigidam & Siccam Intemperiem Ventriculi. CAP. 7.

SCire autē licet solidorū corporum siccitatibus, si perdurent, succedere necessario frigiditatem. Quippe permanere siccitas ipsa per se, non mutata oppositione, quæ ex calido & frigido con sultit, non potest. Celerrime enim ex nutriendi defectu refrigerantur partes, propterea scilicet, q̄; ex calido succo sanguinis nutriuntur. Sed, quod inter initia dictū est, nunc siccitatis curationē exo cuti sumus, & quæ ab initio sola est contracta, & quā nulla diutissime secuta est notabilis frigidi tas. Ergo proximum fuerit frigiditatē illi copulare, quæ euidentes quidem habeat notas, ceterum magna non sit. Est itaq; curationis consilium non simplex, vt prius, cum nō modo tibi, vt hume ctes, danda sit opera, sed ē vt calefacias. Quare intendendum acriter est ad præsidiorum materiā, necubi imprudentes, iis, quæ humectant, ea, quæ nimium calefaciāt, adiungamus: quippe his ve hementer siccandi vis subest. Iam vero quantitas noxæ in vtraq; intemperie ad materiæ inuētio nem potest viam ostendere: vt iamiam maxime quidem siccitatis sanationē modo perscripsimus. Modica vero adeo scrupulosa victus ratione non indigent, quandoquidem nec vires iplis fundi tus sunt collapsæ. Etenim nulla alia de causa difficilis reddit̄ validæ siccitatis in corpore cōmoda curatio, q̄; q̄; refici quidem corpus postulat: cibus vero per se coalescere cum eo non potest, sed G eius, quod nutritur, operam, qua præparetur, requirit, quod est imbecillum. Ergo, cum id modice siccum fuerit, propterea, q̄; vires nō penitus conciderunt, vberius cibare licet: nec metus est vllus, ne à modo aberrēs. Quo magis ipsi de difficillima intēperie disserere instituimus: ac in ea, veluti exemplo, studiosos exercuimus. Hinc nanq; orsi ipsimet, ad mediocres siccitates corrigendas ido neam materiā inuenient. Proponatur autem & nūc siccitas quidē similis priorī, copuletur q̄; ei frigiditas. Ergo calefacientis materiæ admiscendum iam dictis tantum erit, quantum particula ad frigus inclinauit. Proponamus igitur eam primum modice refrigeratam: Ergo iis, quæ paulo ante retulimus, in lactis quidē vsu mel vberius adicietur. Vinū vero, quod quidē ad genus spe ctat, idē, ceterū quod minus aquosum, q̄; prius, & plurimum annorum sit, dabimus. Quin etiā escu lenta oīa calidiora exhibebimus, id q̄; non naturalibus modo ipsorū temperamētis, verū etiam re centibus {ex igni} qualitibus. Nardino præterea vnguento vngendus assidue venter est sic, vt nunq̄ remaneat siccus. Sin id vnguētum non adsit, mastichinum satisfecerit: sed & opobalsamo eum perungas, tum ipso per se, tum vero cum iam dictis misto. Quod si corpori ea magis adhæ rere studebis, etiam ceræ aliquid admiscebis: Si vero etiam aer ambiens sit frigidus, lanam ex his imbutam impones. Quin etiam chīam mastichen in opobalsamo aut nardino vnguento liquās, H lanam inde madentem vētriculo impones. Sanē vtilius fuerit, si, quod madefacies, etiam optima sit purpura, qualis est Tyriā: ¶ quādo & adstringi ipsum modice, & cutis eius meatus obstrui exa pediri.} Siquidem, quæ rarum habitum faciunt, & relaxant, ea tum digerunt succos, tum particu las frigidis extrinsecus aduenientibus obnoxias reddunt: quæ vero valenter adstringunt, ea sic cant. Quo fit, vt medicamentum, quod eiusmodi corpora excalfaciat, id nec euocantem vim habe re expediat, nec adstrictoriā multam sibi immisitam. Memineris enim, velim, tum eorum, quæ in ægris es contemplatus, tum quæ in opere de medicamentis es edoctus, nempe acerbam qualita tem sua quidem ipsius virtute & refrigerare & siccare: quod sicui valide calfaciētium sit admista, quod ex ambobus cōpositum est, minus quidem in calfaciēdi munere efficere, q̄; alterum: siccan do vero non minus, q̄; vtrunq;. Maxime contraria faciunt iis, quæ præcepimus, nostri temporis medici, qui siccæ parti, & quæ nutrimento male fruitur, compositum sepe medicamentum ex ca lida & acerbā materia imponunt. Est aut̄ eorum, quæ *στυφνέ* græce dicuntur, {nos inopia cōmo dioris vocabuli acerbā diximus,} nullū profectō modice adstringēs, ideo q̄; nec modice siccās: quo videlicet magis prohibēda ea in iā dictis affectibus sunt. At vero, si cum siccitatis intemperie multa frigiditas sit, sic, vt fortius calfacere subigat, omniū primū intēperamēti genus ad memoriā reuocabis,

† codices græ ci ipse hnt, vt Linacur ver tit. q̄; antiqui ad Tyriā refe runt, ita, n. hnt. στυφει τε γάρ μετρίως αὐ τή, ἐμπλάτ τη τε τὸν δὲρ ματος τοὺς πόρους, id est ea enī modice adstringit, cu tis q̄; meat⁹ ob struit. vtraque tamē lectio bo na est.

* codices ipse si & pleriq; etiā manuscripti ha bēt, vt Linacur vertit. Sunt ta men, q̄; habeāt ψύχον, id est refrigerans.

A. li. 3. E. 11. c. 30. fol. 22

Areuocabis, quippe quod omnium grauissimum esse ostendimus. Quocirca ad corrigendum quoque esse difficillimum, multa quae sollicitudine egere, id minime est ignorandum. Incipere vero simili modo a comprehensis prius materiis tentabis, sperans scilicet fore, ut longiore tempore per tutiores sanetur affectus. Sunt porro tutiores haec, nam repetere ea, quae sunt tam necessaria, est satius. In nardino vnguento solues mastichen chiam quam pinguis simam, ac purpura excipiens vteris. Erit quae vtilius, modo copia eius sit, si opobalsamum adiceris. Dandum praeterea yberius cum lacte mel est, sed detracta prius spuma, quod & minus sit excrementosum, & magis nutriat. Quin etiam mel ipsum despumatum, per se optimum nutrimentum frigido ventriculo est, ita, ut calido aduersissimum. Atque haec ambo meminisse in primis oportet, utique plurimis medicis ignota. Ac neque aliquid in frigido corpore melle magis expetendum, neque in calido magis respuendum. Ergo plurimum huic affectui pro nutrimento mel opimum esto, sed quod prius super prunas ex quercu vite uel ad summum candentes, fuerit decoctum, ac curiose despumatum. Vinum autem eligendum semper est antiquum: eo quod antiquius, quo maior fuerit frigiditas. Tum, si res postulabit, totum genus immutandum: ac primo loco Adrianum, mox Tyburtinum, aliud uel similis generis eligendum: vetera quidem omnia, caeterum non adeo, ut amara iam sint: siccant enim quae amara sunt, immodice. Sanè optimum medicamentum talibus omnibus sit, quo picatores quotidie utuntur. Ergo illinire eo totum ventrem conveniet, ac post auelli prius, quam refrigeretur: atque hoc, si bis vno die deinceps feceris, abunde erit: sapientius autem non expedit, quam ita, per halitum digerere, non sanguine bono particulam impleas: at nos ex propinquis locis attrahere, non id, quod continetur, educere studemus. Idem omnibus particulis, quae ex nutrimento fructum non sentiunt, (atrophasias Graeci vocant) mirificum medicamen est, si quis eo moderate sciat uti. Sed & calfacere ventriculum ita, ut in qualitate calorem eius non intendas, sed quam maxime naturale eius temperamentum tuearis, ac substantiam inaugeas, id ex leuissimis in eiusmodi affectu consiliis non est. Efficit hoc in victu simul cum iis, quae iam dicta sunt, maxime vinum: ex iis vero, quae ventri extrinsecus applicantur, boni habitus puellus vna sic accubans, ut semper abdomen eius contingat. Sunt, qui catellos pingues in hunc usum habeant, neque id in aduersa modo valetudine, verum etiam in prospera: tales itaque iis, qui propter siccitatem quoque solam imbecillum ventriculum habent, sunt idonei. Seruandum quod ante omnia est, ne puellus humecta sit cute: qui enim noctu sudore perfunduntur, refrigerant potius, quam calefaciant. Nocent praeterea tali affectui & calida fomenta: quae quidem sicca sunt, eo, quod rorem simularium corporum depascunt: quae humida sunt, quod hunc digerunt, potissimum ubi largius his utimur: praeterea quod nimis rarum frigori quod opportuno corpus efficiunt. Ac de hac intemperantiarum coniugatione hactenus sit satis.

De curanda Ventriculi Siccitate, cui Caliditas iuncta sit.

CAP. 8.

AB hinc multae, ut propositum est, siccitati iuncta caliditas esto non admodum multa. In eiusmodi intemperie primum curationis modum seruabimus, sed vini vim, mellis quae copia diminuentes, non solum non augentes, ita, ut mel prorsus non degustetur, vinum vero exhibeatur, quod minime sit antiquum. Iam cibos apponemus sub lactis tepore: sed si aestas est, sub aquae fontanae frigore. Sed & ventriculum vngemus oleo tum crudo, tum melino. Ac multo sanè magis, si pluscula caliditas sit, ipsum vinum tum aquosius exhibemus, tum sub eo frigore, quod fontis aqua per medium ver exhibet, illud nobis persuadentes, eiusmodi affectum febris proportionem respondere: quippe, quod illa vel in toto animali vel in corde est, id propositus nunc affectus in ventriculo est. Atque ipse scio me vna cum praceptoribus primum omnium vidisse hominem quendam maturae aetatis non paucos iam menses vexatum: sed nec eorum quisquam affectum eius intellexit, nec etiam ipse: postea vero, cum iam medendi eius affectus methodum inuenissem, venit mihi in mentem hunc utique illum esse affectum, quem olim fueram contemplatus. Melius autem est, rem etiam exponam: quippe utilis omnino erit iis, qui audierint, non secus, ac fuit mihi. Homo erat quadraginta annos natus: medio, dum valebat, crassitudinis & gracilitatis habitu. Is siti vehementer affligebatur, ac calidam auersari se dicebat, cum illi frigidam nemo daret, tametsi hanc impense flagitabat: febricitare tamen medicis non videbatur: & ventriculus, quae sumpserat, tribus aut quatuor horis post euomebat simul cum potionem. Itaque gracilis iam effectus erat, ac periculo propinquus, minime videlicet adiutus ab austeris acerbis quae tum cibis, tum medicamentis. Sumebat vero & post cibum, austum vinum is homo, cum nec ultra sitim toleraret, ac (ut aiebat) mori mallet, quam in cruciatu vivere. Aquam frigidam simul multam super cibum hauriens, protinus sitire destitit, paulo vero post plurimum eius euomuit. Ab hinc horrorem in toto corpore sensit, plura quae operimenta poposcit, cum prius omnia abiiceret: tunc igitur reliquum totum diem, quo id fecit, noctem quae totam in quiete egit, cooperimentis se fouens. Venter vero circa mediam noctem semel excreuit, quae mediocriter erant coacta. Itaque nec siticulosus praeterea erat. Postero autem die tum coloratior multo, tum firmior est effectus. Ac deliberabant iam medici, an hominem lauare expediret, alij quidem suadentes, alij dissuadentes: vicit autem sententia eorum, qui lauare suaserunt. Itaque etiam lautus citra offensam est, ac modice cibatus: tum melius ei, quam pridie, venter concoxit. Questus autem est, quod difficulter transglutiret: visum quod omnibus est propter vomitum, qui praeter consuetudinem inciderat, vellicatam illi gulam fuisse, ac proinde male habere. Ceterum, ut etiam secutis diebus

* ἀπὸ πρὸς δαυ
est in aliquibus
cod. ut Linaceti
vertit. ἀπὸ πρὸς
δαυ. i. abluere
re in ipse
In aliquibus
cod. legit ἀπὸ
πρὸς δαυ. de
δαυ. τὰν
ἰχθυῶν
θεμελίον
ἢ σπυρνῶν
παρῶν. Abstinere vero simili
modo a vehementer calidis
& acerbis tentabis.

* ἀπὸ πρὸς δαυ

† tepētes, quos
medici γαλακ
τὰς δαυ. i. lacteos
vocare consue
uerunt.

† quos vocant
χρυσάυς, id est
fontanos.

* ὁμαλὴ· v. gr.
ce legitur.

bus

METHODI MEDENDI

bus symptoma permanfit, constabat nobis omnibus ventriculi imbecillitatem esse sanatam, gulā E autem esse perfrigeratam. Nec sanē mirandum erat, sicut potione illa, quod immodice calfactum erat, ad mediocritatem est reuersum, sic, quod mediocriter calebat, fuisse refrigeratum. Ceterum gulam eius nemo potuit sanare: sed vitio in vitium mutato, tandē mortuus est. Alium vero huic similem nō paucis annis post vidi, cum omnem ventriculi intemperiem discernere iam possem. Visum igitur est mihi statim maiore conatu refrigerandum esse prius, quā homo magis extenuatus simile quippiam priori ex refrigeratione pateretur. Tutius igitur visum est primum refrigerantia medicamenta, quae praecordius imponuntur, experiri. Quo facto, aestus sanē ventriculi est remissus, ceterum homo suspiranti similiter respirabat, tanquam aegre totum thoracem moueret. Quin ipse quoque interrogatus, talem quampiam sentire se offensam fatebatur. Aduerti itaque illi transuersum septum refrigeratum esse: proinde quae abiectis refrigeratoriis, fovi locum oleo calido. Cum autē respiratio statim naturalem motus sui ordinem recepisset, a fouendo destiti: statui autē hominē longiore spatio moderate refrigerare. Ergo, & quae extrinsecus refrigeratoria applicui, infra magis imposui a septo vmbilicum versus recedens: & cibum potionemque omnē (excepto lacte) sub fontana aquae frigiditate exhibui. Atque ita longiore spatio sanatus est, nusquam alibi offensus. Sciri tamen illud ante oīa debet, ubi valide in ambabus qualitibus immutata quauis F particula est, omnem eius actionem perire: nec facile, quod sic est affectum, ad suam naturam reuerti posse. Vbi verō altera tantum qualitas plusculum immutata est, veluti nunc siccitatem finximus: reliquarum aliqua mediocriter se habet: utique, qui ita affectus est, sanari potest.

De Caliditate Ventr. culi curanda, cui Humiditas vel Siccitas coniungantur.

CAP. 9.

Proponamus itaque rursus exuperare intemperiem calidā, huic autē adiunctam esse modo humiditatem, modo siccitatem, sed mediocriter vtranque, ac prius humiditatem. Hanc intemperiem minore metu aqua frigida curabimus: quā minime ex ea ledentur vicinae partes, quae mediocriter se habeant. Nā in siccis affectibus necesse est nō ea modo, quae proxima sunt, sed et totū corpus gracilius reddi: ventriculo autē ipso non dū siccato, ut nunc est propositū, nec totū attenuatū esse corpus potest: quare nec frigida potu ledi. Sicubi vero adeo vehemens caloris intemperies ventriculum occupet, ut usque ad cor ipsum perueniat, febricitare hominem necesse est. Quo minus mirū est, si eius modi intemperiem maius periculum insequitur, sanatio tamen genere eadem est: tradetur autē postea, ubi de febrili curatione differetur. Qui autē cum siccitate coniunctus calor est, eadē genere remedia poscit, ceterū non adeo securus est refrigerantium vsus propter eas, quas retuli, causas. Humida vero intemperies, siue sola consistat, siue cū calore frigoreue coniuncta sit, omnium facillime curatur. G Et, quā tres hae intemperies creberrime ventriculū affligunt, sunt quae curatu facillimae, harum curationē in memoria habent, quicūque absque methode, hoc est via & ratione, morbis medentur: ac ad alias eā intemperies (ut dictū est) transferunt, ignorantes videlicet plures esse. Sunt porro ipsius humida intemperantia, cū sola consistit, remedia, cibi, qui citra valentē calefactionē refrigerationemue siccent: praeterea consuetae potionis paritas. Eius autē, quae cum caliditate coniuncta est, adstringentium & ciborum & potionum vsus: sint autē & hi aulteri sine calefactione †. At eius, quae cū frigiditate est coniuncta, optima praesidia sunt, acria omnia: quibus admisceri debebunt, quae acerbata sed citra manifestū frigus sint. Optimum est & his praesidium exigua potio, atque ea vini cuiusque insigniter calentis: consistat autem id minime nouum esse. Ad portionem vero eorum, quae comesta & bibita sunt, etiam reliqua omnia, quae foris applicantur, adhiberi debebunt.

† quin & frigida potio eis est conueniens. additur in codicibus graecis.

Epilogus curationis Intemperierum Simplicium & Iunctarum.

CAP. 10.

ET, quoniam de his abunde tractatum est, repetito rursus sermonis initio capita eius colligamus. Calida ergo intemperies refrigeranda est, frigida vero calfacienda: similiter humida liccanda, & sicca humectanda. Quod si per copulationē aliquam duarum qualitatum intemperies consistat, miscenda amborum consilia sunt: ac, quae humida calida quae est, liccanda & refrigeranda: quae vero humida & frigida, liccanda ac calfacienda: ad eundem modum sicca & frigida, humectanda ac calfacienda: sicca vero & calida, humectanda & refrigeranda. Scire vero licet omnium harum pessimam esse inter simplices siccā: in compositis siccā simul & frigidā. Atque hoc loco finē habeant ventriculi intemperies, quas scilicet extrinsecus nullus alit superuacuos humor.

De curanda Ventr. culi Intemperie, cum Vitiosi humores vel in eius Cavitare,

vel in Tunicis continentur.

CAP. 11.

Deinceps ad eas, quae ex eiusmodi quapiā occasione fiunt, stilū conuertā. Saepē igitur in ipso sinu ventriculi contentus humor, qui aut calfaciendi, aut perfrigerandi, aut humectandi, aut liccandi, aut etiā horum aliqua per coniugationē efficiendi naturā obtinet, intemperiem creat: interim vero & in ipsas ventriculi tunicas (ut ita dicā) imbibitus siue impactus. Ergo prior affectus, si semel constituerit, per vomitum expurgatus, facile quiescit. Sin rursus ex alia quapiā vel aliis particulis humor confluit, diligenter discerni indiget. Curatio vero post effectricis causae cognitionē statim se exhibet. Dictū enim nobis est tū alibi, tū vero in iis, quae de differentiis febriliū scripsimus, confluere non nunquam ex aliis in alias particulas id, quod in his redundat: veluti ex capite ad oculos. Quo casu oportet curata ea parte, quae transmittit, duntaxat firmitati perspicere oculorum: quod videlicet eorum,

A eorū, quæ ad sese cōfluunt, minus prōpte quicq̃ admittāt. Ita igit̃ & in vētriculi affectu oportet, vbi id, quod sup̃uacuū transmittit, inueneris, oēm huc curam cōferre: de ventriculo aut̃ tantisper esse sollicitū, ne, quæ cōfluant, prōpte recipiat. Id quod duplici (vt arbitror) rōne fiet, vna oīum fluxionū cōi, quippe quæ ab adstringentibus repercutiunt̃: altera vero non minus ipsa quoq; omniū partium, quæ ad bonā habitudinē reducūtur cōi, nempe ex ipsarum temperiei mediocritate. Ergo primū inspiciendum totū corpus est, an excrementosum, an plethoricon, i. nimia æqualiū humorū copia redundans, fluxionē ventriculo inmittat. Secundo loco, si id non videat̃, singulæ partes expendendæ. Atq; in toto quidē corpore æstimando tum redundantia, tum excrementorum notas & ex opere de sanitate tuenda, & ex libro de plenitudine didicisti. Super has tamē illa quoq; æstimabis: primū quidē in mulieribus, an naturaliter nō purgentur: mox in viris an excretio aliqua cōsuetā his retenta sit. Plerisq; enim ora venarū, quæ in sede habentur, vacuare sup̃flua sunt sueta. Aliis profluēs ē naribus sanguis, aut vomitus, aut alio quopiā mōdo in certis periodis vas aliquod reclusum: noui enim tū in ore, tum in faucibus id multis cōtingere. Nō defunt, quibus & per ventriculū sanguinis expulsio certo tpe fiat, potissimū iis, qui cū vehementē exercitationē deposuerunt, à priore tñ victu nō destiterunt: aut ēt artuum toto aliquo sunt priuati, veluti

* τρόμος est i
αυγς, vt Lina
cer vertit. τρό
μος est in im
presu, loco.

B ēt Hippocrates indicauit. Sūt, quibus diarrhœ & cholera certis interuallis oēm corporis redundantiam educant. Ab his illud æstimandū, quā nam victus rōne sit vsus, vtrum ne frequenti cruditati aut satietati inciderit, id q̃ in ociosa vitā, ac p̃cipue præter consuetudinē, an cōtra. Illud dein de perpendendū, an aliud mēbrū corporis certo temporū circuitu vexari solitū, nunc non vexet̃. Aliis enim articulis morbus, aut coxendicus, aut podagra: aliis cephalga, aut ēt fluxio aliqua, q̃ in oculos vel aures procubuit, nunc migravit ad ventriculū. Non paucis vero catarrhi & coryzē, q̃ id est destillationes per guttur & nares, quæ assidue vexabant, cōuersæ certo tpe in ventriculi loca sunt. His igitur oībus consideratis, si quidē ex minus momētaneis translatio facta est, quod sup̃fluū est, rursum ad ea reuelles: Sin ex iis, quæ maioris sunt momenti, ambobus simul cōsules, eum semper submouēs affectū, qui fluxionē excitet. Fiet id, si oēs corporis partes ad bonā habitudinē reducamus, ac oēs naturales expulliones, fluxiles semp reddamus. Hæc quēadmodum efficere possis, in opere de sanitate tuenda est præceptum. Nec illud latet, si propter equalium in toto corpore succorū redundantia ventriculus fluxione tentat̃, totū corpus vacuandū esse: Simili mō si p̃p mali succi abundantia, eā purgandā esse, atq; hinc ad ventriculū veniendū. Prorsus enim cū plures iā dies delata in eū superuacua sint, aliquid vitij ex malitia eorū contraxit. Itaq; non intempestiue, qui ita laborat, absinthij potione vteat̃. Sed nec, quæ postea adhibēda prouidentia sit, quo ad ventriculo pristinū habitū recuperaris, latere arbitror. Quippe, si pro temperamento noxiæ fluxionis, intēperie aliqñ laboret, corrigi nimirum per cōtraria prælidia postulat. Facillimum vero est eiusmodi noxā corrigere, vbi paucos durauit dies. Nam, si dēsiderio eius, qui curasset, longiore spatio permanisset, aliqñ tunica eius malo succo implentur: aliqñ ipsa similis earum substantia intemperata non leuiter effecta, similis curæ indiget ei, quam prius de intemperatiis in hoc libro retulimus. Reliquum igitur est, vt exponamus, quēadmodū curari succus vitiosus debeat, qui in ventriculi tunicis est receptus. Sunt porro ad eiusmodi affectus idonea pharmaca genere quidē ea, quæ modice purgant sic, vt eorum vis super ventriculi & intestinorum loca non ascēdat: aut, si quid vltra, vasa tantū in mesenterio contingant. Speciatim vero, quæ ex aloë componunt̃, sunt aptissima. Etiam, si illa præstō non sint, aloë ipsa per se. Hæc itaq; nō elota valentius vacuat: elota purgat quidem minus, sed roborat ventriculum magis: expedit ergo paratam habere, quā oēs medici Picran, id est amarā, vocant: atq; hanc dupliciter confectam, vtq; ex aloë elota, & non elota. Admiscuntur autē huic cinnamomū, & xylobalsamū, & asarū, & spica nardi, & crocus, & chia mastiche. Sunto autē horū cuiusq; drachmæ sex, solius autē aloës drachmæ centū. Præstantis

* si dēstipian.

D simū hoc medicamentū est ad vitiosos succos, qui in tunicis ventriculi habentur: vtilius q̃ est eo sicco ex aqua vtī duum paruorū cochleariū mensura, vbi mediocriter ac medio quodā modo eo vtī studemus: nam maximus eius modus ac absolutissimus est duorum non vtq; paruorum, sed magnorum, potio in aquæ temperatæ cyathis tribus: minimus, vnius parui. Utendum vero hoc tempore & ptisanæ cremore est: qui primus à balneo sumetur. Nā medicamen ipsum solito purgantium medicamentorum tempore dabitur. Post id vero, vbi modice inambulauerit, & modice se mouerit, de reliqua victus ratione nihil est immutandum. Sunt, qui reponunt medicamentum, excipientes id despumato melle. Et fit quidem ita durabilius, cæterum non perinde ad propolitos hoc loco affectus vtile, cum & minus ventriculum roboret, & magis aluum deiciat. Verum quibus lenta pituita ventriculo est infixā, iis prius exhibenda sunt, quæcunq; hanc dissecant: post deinde purgandum. Quod si ad vomendum sunt idonei, non inutile sit per radículas ex oxyme lite vomere. Sin vero nec lentus humor sit, nec crassus, vtq; abunde sit a ptisanæ solius cremore vomuisse: item a mulla: quo casu sumendum vtriusuis plus est, quā vel nutrimenti vel etiam deiectionis causa sumeretur. Idoneū vero est, & si mulla, in qua incoctum absinthium sit, bibat̃: nam id quoq; tenues succos, quicunque videlicet in ipsius ventriculi ore continentur, commode deorsum impellit. Sanē cōmunis est totus hic sermo, qui de intēperie agit, cū sanitatis tuendæ

METHODI MEDENDI

dæ præceptis, ea scilicet sui parte, qua de parum firmis actionibus disputat: nō enim profecto ea, E qua de perditis, ac vitiose functionis agit. Quippe pars illa à sanitatis tuendæ cōtemplatione planē ie iuncta est. Imbecilla vero actio, prout magis minus ue talis est, aut ad sanitatis tuendæ, aut ad medendendi tractationē ptinet: leuiter qdē impedita ad priorē, grauius ad posteriorē. Discernit vtraq; ex eo, qd à consuetis actionibus obeūdis pp. noxæ magnitudinē vel delistatur, vel non delistatur.

De Ratione curandi, cum Intemperies, Humores q; in cauitate ac in Ventriculi tunicis contenti coniunguntur: ac de Indicationibus, quæ curandi initium sibi vendicant. CAP. 12.

Dictum autē & de his est in opere de sanitate tuenda: quo vtiq; celerius transeunda corū tractatio nunc est, præsertim omni methodo, qua ventris intemperies sint curandæ, iam perscripta, siue hæc firmius ei ex mora inhererint, siue leuius. Nec vero illud latere puto, esse aliquñ mistum ex tribus iam dictis simplicibus in ventriculo affectum ita, vt & ipsæ solidæ partes intemperie laborent: & mali succi ita ventriculo sint inhi, vt elui ex facili nequeant: & alij in interno eius sinu contineant. Potest nanq; interim fieri, vt primus cū secundo consistat: pōt & secundus vnā cū tertio: pōt & primus cū tertio: sepe ēt oēs simul. Pro quibus methodū, quam prius de vulneribus tradidimus, vbi oēs affectus simul coniunximus, ad memoriā reuocabis: quam nunc quoq; apponere non sit inutile. Primū nanq; in eiusmodi complexu æstimabis, à quo maxime discrimen egro **F** impendere videatur. Secundo loco, quid, quæ ue ex his causæ rōnem obtineāt, & quæ ab ipsis efficiant. Tertio, quæ sanari ante alia possint, & quæ nō possint: veluti de vlcerebus, quæ vnā cum phlegmonis cōstitere, ostendimus. Vbi nāq; à quoquā affectuū non leue periculum instat, ad id, quod vrget, dirigi primū curantis consiliū debet. Vbi aliud efficiens est, aliud, quod ab eo efficit, ipsa causa spectanda. At, vbi curari hoc ante illud nō licet, ad id, quod ordo dictat, est respiciendū. Atq; in eo quidem curationis cōsilio, quod ab virgente initur, affectus magnitudo perpendenda est. Ea triplex est, alia, quæ ex lēse actionis præstantia spectat: alia, quæ ex propria affectus essentia: & tertia præter has, quæ ex facultate, quæ læsum corpus gubernat, æstimatur. In eo vero consilio, quod ex causæ ratione initur, animaduertendū est, quid nā corū, quæ inter se cōiuncta sunt, augere aut gignere reliqua possit: quæ rursus ab eo vel gignant, vel incrementum accipiat: In eo vero, quod ordo præscribit, quid ante quod, vel quid cū quo, vel quid post quid, sanari possit. Fingat igitur in ventriculū deluere ex cerebro superflūū quendam humorē frigidum, atq; eius occasione intemperiem quandā in ventriculo contractā iam esse: adhuc vero ēt magis malū iam succū per totum eius corpus media oīa similariū particulariū spatia occupasse. In eiusmodi cōplicitis dignatione maior est intemperies, ppterca videlicet, qd & ipsa tēperies: propriæ vero essentię ratione, quodcūq; vtiq; tale fuerit, circa propositū in sermone ægrū. Ac ponat ad præsens maximus triū affectus esse succorū, qui in tunicis vētris continent. Esto (si libet) vt idem quoq; affectus morsus sensum faciat: atq; ex eo ipso animi defectū & sudores quosdam cū syncoptica dissolutione accersat, ita videlicet, vt, quatenus supra vires est, reliquis sit maior. Cōstat igitur primā esse adhibendā curā, vt ei, quod vires resoluit, occurratur. Deinde, qm̄ omniū maximū propriæ essentię ratione hoc finximus, vtiq; ad id primū te verteris, ac primum id sanes. Vbi id mediocriter se habuerit, ac neq; vires amplius labent, neq; plurimū vitiosi succi in vētriculo sit, tum nimirū ad causam accedes, illud pro cōperto habens, non posse ad perfectionē vllum affectū sanari, manente adhuc ipsa, vnde natus est, causa. Ordo aut curationis, modo cōtraria inter se remedia, sicut in phlegmone & vlcere, indicat, ostensum nanq; est, quæ phlegmonen sanant, ea maius reddere vlcus: modo alteri affectui nihil nocet, sicut in proposito nunc casu. Qui enim educit humorē, qui in sinu ventriculi continetur, is humorū, qui in tunicis continentur, alimentum adimit: æque & qui cerebrū ita sanat, nequam sensibilem redundantiam creet, is veluti fontem fluxionis in ventriculum desinuit. In his ergo ordo curationis cum ordine causarum cōsentit, quanq̄ in aliis dissentit. Ceterū, quod ex magnitudine spectatur, id distingui, prout dictum est, debet. Ac primū quidem id agēdum **H** est, vt ei, quod maximum est, propriam medicamentorum materiem accōmodes: deinde pro causarum ordine totum cures. Etenim, cum neq; copia notabilis excrementorum in ventriculo sit, nec eorum quæ in capacitate eius continentur, nec eorum quæ in tunicis, sed neque mordicatio quæ viribus officiat, tum omnium primū sanandum ipsum cerebrum est. Ab hoc sinus ipse vētriculi vacuandus extergendus q; est: postea ipsæ tunica expurgandæ: postremo intemperiei est medendum. Dicta vero prius sunt cuiusq; horū medicamenta. Itaq; nec prolixus habēdus adhuc sermo est, sed finis iam libro imponendus. Omnium enim reliquarum partium intemperies similiter iis, quas in ventriculo proposuimus, sanabūtur. Semper enim comparandum remedium est, quod sit affectui contrarium: ac illi remediorum indicatio, quæ à laborantis natura sumitur, adicienda: de qua dictum in superioribus iam est, dicetur tamen in sequentibus vberius. Necessum vero erit & nunc paucis de ea mentionem facere.

Methodus indicationum, quæ à Læse partis natura desumuntur.

CAP. 13.

Prima quidē indicatio à laborantis loci tēperie sumit, quæ calfaciēdi, refrigerādi, siccandi, vel humectandi, vel aliquid horū coniūcte cū alio faciēdi, mensuram præscribit. Secunda ex eo sumit, qd actio eius oibus animalis partibus sit cōis, aut qd cōem virtutem subministret. Tertia, ab ipsa

* κατὰ τὴν

* κατὰ τὸν

* vlcetibus.

* ὑπερπαισία.

A. I. fol. 8. c.

Galeni

† Alex antiqu.
ὕπερ τῆς ἀπο-
τῶν τόπων ἐν
δείξει, i. de
indicatione, q̄
a locis sumit.

GALENI METHODI MEDENDI ID EST DE MORBIS CVRANDIS LIBER OCTAVVS

A R G V M E N T V M L I B R I

Absoluit vniuersam Curandi rationem, quæ Diariis Febribus debet adhiberi.

De communibus Differentiis atque Indicationibus Februm curandarum. CAP. 1.



Vemadmodum vero febres quoque non secus, quam alij morbi, qui ex intemperie in nobis consistunt, quos quæ in præcedenti libro narraui, methodo curent, tempestiuum nunc dicere videtur. Quod igitur, Eugeniane charissime, simplicium ac primarum partium (quas Aristoteles similes vocat) natura ex calido, frigido, humido, & sicco, inter se mistis constet, vno volumine ostendimus, in quo de elementis secundum Hippocratem disputauimus. Quod vero ex eo, quod hæc calidior sit, illa frigidior, vel humidior, vel siccior, vel simul horum aliquibus copulatis affecta, simplices ac primæ particulæ inter se differant, id in libro de temperamentis est assertum. At in libro, quo de morborum differentiis agitur, duo in vniuersum esse morborum genera, quæ in simplicibus animalis particulis oriantur, docuimus: alterum, quod etiam secundis, & compositis, & instrumentalibus sit commune, vocauimus autem id vnitionis solutionem: alterum ipsarum peculiare, quod in calidi, frigidi, humidi, & sicci intemperie consistat: Et sic autem ex intemperantiis ipsis, quæ quidem in vna sunt contrarietate, simplices: quæ in ambabus, compositas: In ea itaque, quæ est inter calidum & frigidum, oppositione duas esse simplices intemperies: alteram, vbi quicquid tanto efficitur, quam ante erat, calidius, ut eius lædatur actio: alteram, vbi pari modo inualuit frigidum: In ea vero oppositione, quæ est inter humidum & siccum, alteras etiam geminas, nempe humidam, & siccam: Copulatis vero inuicem simplicibus, alias existere quatuor, humidam & frigidam, humidam & calidam, siccam & frigidam, siccam & calidam. Traditæ vero sunt & causæ, quæ has intemperies generent, in alio libro, in quo morborum causas reddidimus. Sanè vnus quispiam morborum est, qui per intemperiem fiunt, & febris, utique cum adeo immodice auctus calor est, ut & hominem G offendant, & actionem lædat: quoniam, si neutrum adhuc efficiat, quantum vis sit homo nunc, quam ante, calidior, non tamen febricitare eum monstrauimus. Quoniam autem, quicquid præter naturam in nobis oritur, siue speciale nomen sortitum sit, siue generale, id extra corpus non est, sed tum phlegmone, tum pleuritis, tum morbus, tria simul in vno consistunt corpore, verbi gratia, Dionis: indicat autem & horum quodque propriam indicationem æque profecto, ut eius, quod maxime omnium speciale est, ipse differentia: ob hæc vtilius visum est seorsum de febrium differentiis tractare, quod omnibus prius preparatis sermo nobis hoc loco citra omnem eorum, qui parum recte de iis scripserunt, refutationem absolueretur. Reuocemus igitur ad memoriam discriminis earum capita, quod propriam ex vnaquaque indicationem sumamus. Est igitur vna earum differentia illa, in qua causa adhuc adest febrem creans: aut febris excitata iam desinit. Altera vero, qua vel (ut Greci loquuntur) hecticæ febris est, quæ iam facta est: vel etiam (ut aliquis eorundem dixerit) schetica. Nam, quoniam eos affectus, qui facile discutiuntur, ἐν στήθει græce vocant: qui tales non sunt, ἐν ἑξέτι: concedendum est, dilucidioris doctrinæ causa, etiam febrium ipsarum eas, quæ ægre discutiuntur, hecticas: quæ facile, scheticas nominari. Dicendum quod febrium alias facile solubili affectu esse, perinde ut calfactum in Sole lignum: alias difficile solubili, veluti quod igni eatenus excalfactum est, ut iam accendatur, & fumum H edat. Hæ sunt primæ febrium differentia. Quas vbi cum summis primum indicationibus iunxerimus, mox ad magis illis speciales veniemus. Prima enim omnis febris indicatio, veluti à morbo, est, ablationem eius præscribens. Secunda vero ceu abs tali est morbo, quæ non absolute sublationem, ut prior, sed certam quandam sublationem indicat. Nam, cum febricitantes ex intemperie laborant, necesse est sanationem quoque eorum intemperantiæ depulsionem esse. Omnis autem excessus per contrarium excessum sanatur: etenim id quoque ante est ostensum. Quare febrilis quoque intemperantiæ excessus per contrarium excessum sanabitur. Est autem febrilis intemperantiæ excessus in caloris abundantia. Huic ergo ad temperamentum via erit per id, quod refrigeret. Itaque, si iam præsens febris est, sed causa, quæ eam excitauit, iam desinit, huc tantum sanandæ eius consiliū dirigetur, ut refrigeretur. Quare querenda nobis talis materia est, quæ cum redundante calore paria refrigerando faciat. At, si in generatione adhuc febris est, causa, quæ eam accendit, submouenda est. Sin pars eius iam genita est, pars in gignendo adhuc est, utrique consulendum est: primum quidem submouendo, quæ eam accendit, causam: deinde extinguendo, quæ ab hac accensa est, febre. Ergo, nisi quis ad unguem memoria teneat, & quæ causæ febres generent, & in quo cuiusque corporis affectu, is nunquam methodo febris prospiciet.

* eucrasian.
* γενομένης. i.
genita.

A De Ratione curandi Febrem Diariam ex Meatum constipatione in Calidis & Siccis naturis:
ac Aduersus eos, qui hac febre correptos Tridui media excruciant. CAP. 2.

Dictum nanq; est in iis corporibus meatum constipationem febrē excitare, in quibus, quod transpirat, halituosum nō est (Atmōdes Greci dicūt) cuiusmodi visitur in iis, qui boni sunt succi, sed mordax et acre, fumo fuliginī ue non ablimile. His igit corporibus saluberrima est ex aqua dulci & tēperata lauatio: tum frictio, quæ rarefaciat: & exercitationes mediocres: & victus, qui dulces efficiat succos: Aduersissima vero sunt lauatio frigida, et aluminosa, & lauationis abstinentia, & exercitatio acuta, & frictio vel planē nulla vel dura, & victus mali succi, & vigiliæ, & ira, & tristitia, & cura, vstio q; in Sole, & fatigatio. Verum de reliquis post dicam. De stipatione vero meatum, vnde digressus sermo est, liquido scire licet solam eam, si reliqua omnia desint, accendere febrem posse. Si itaq; eiusmodi naturas à conuenientibus sibi lauationibus prohibeas, protinus febricitant. Vidisti autem profecto, quo tempore Romæ nobiscum egisti, aliquos ita laborare. In quibus, qui mirificam diatriā transmittere eos in cibi inedia censent, ipsi difficillimās febres faciūt: qñ protinus in primæ accessionis inclinatione, in balneū eos ducere oportebat: ibi q; finire crebro, si vellent, nedum semel, aut bis, lauare. Ego nanq; reliquis omnibus omissis, eū tibi

* κακονθεσω
τους.

B in memoriam reuocabo, qui in aquis aluminosis (quæ Albula vocāt) lauerat, ac ex eo cute densata, post coeperat febricitare: quippe satisfaciēt is pro claritate sermonis nostri, veluti exemplum.

Sanē hominem inuisebant medici quidam nō incelebres, alter Erasistratius, alter Methodicus. Visum autē est ambobus hominem à cibo continere. Quod tñ nos, cum post illos digressus superuenimus, non permittimus: sed statim in balneū perductum, & tepētī oleo largissime perfusum, tum blandissime perfrictū, q; plurimū temporis in calidi solij aqua versari iussimus. Mox egresso, ac frigida ex consuetudine vso, tum sindone cooperto, considere paululum ad vires recreandas precepimus. Postea denuo in balneum perducto, ac rursus similiter tum vncto, tum perfricto, ac in calida morari iusso, dein rursus educito ac frigida merso deterfo q; exhibuimus cibum protinus quidem, vt egressus est atq; aquam bibit, ptisanā cremorem: dein paruo interuallo lactucam: ac post hanc ex simplici albo iure piscium aliquid eorum, qui molli sunt carne, cuiusmodi saxatiles sunt omnes, & aselli quos vocāt. Porro non alienū sit, quod nihil narrationi desit, omnia recensere. Tempus anni erat, quo hæc agebantur, paululum post caniculares, quos vocāt, dies. Homo ipse circiter quinq; & triginta annorū, colore nigello, & habitu corporis gracili, atq; hirtio: tum qui tangentibus, etiam cum valeret, manifeste calorem exhiberet mordentem. Vrinæ quoq; habebat abunde flauas, ac, si plusculum cibo abstineret, etiam mordentes. Aluus assidue sicca erat: tū, quæ excernebat, exigua acria q; & sicca. Mores animi ad iram & cogitationem propensi. Ipse pauci oīno somni, & qui perpetuo de vigiliis quereretur. Hic quodam loco, quod negociorū gratia concesserat, Albulis (quæ haud longe aberāt) est vsus septima (vt aiebat) diei hora, ac ter quater q; se lauit, salubriter sibi consuluisse ratus. Hinc quoq; vbi rursus in agrum se recepisset, ac cibum sumpisset, & paululum indormisset, venit ad urbē sero vespere: vbi destitutus idoneo balneo, nocte febricitauit. Cum autē tertia ferē diei hora contemplati eū medici essent, iusserunt non eum modo diem, verū etiam posterum totum per inediā transigere, quod tertiæ diei noctem obseruarent. Atq; his dictis abierunt. Nos tum lauato, tū, vt prædictū est, cibato, ministris precepimus, si medici vespere venirent, quiescere hominem dicerent: eos q; statim remitterent, ac postridie mane redire iuberent. Vt vero abierunt, rursus hominem simili modo lauātū, ac cibatum, iis ipsis, quæ egimus, dormire probe fecimus. Accedentes autē mane postridie medici, censuerunt etiam eo die cibo illi abstinentiū, etiam si q; maxime sine febre prorsus esset. Illo vero promittente se facturum, quod iuberēt, scis, quantus illis digressus risus sit excitatus: quem nos paulo post superuenientes deprehēdimus. Non fugit vero, nec quomodo cum laborante ipso sit actum. Nam, qm̄ (inquā)

Dcū valeres, bis lauare solebas, ac medici cibū tibi oīno circūcidunt, nec illis iure in totū obsequendum esse, & aliquid eorū, quibus per sanitatē es vsus, immutandū arbitror. Eo vero putante me sibi suadere, vt lauaret quidē, sed nō bis: tum paratū se affirmāte, quicquid iusserim, exequi: ergo (inquam) neq; inediā tolerabis, neq; lauabis bis: siquidem & laborasse mihi videris iā triduo, & calfactus vehemētius à Sole fuisse. Propter igitur laborem (inquā) & vstionem, vnā te adiciere lauationem ad duas oportet, ac ter mihi audientem lauari, qm̄ id mihi facturum te pollicitus es. Ille subridēs, dura (inquit) imperas: ceterum, qm̄ stare pactis est iustū, faciam, quæ iubes. Quæ vero medici post hæc egere, nosti planē, quāto erant digna risu. Bis iam lauatus fuerat, pransus q; dormierat, cū circa occasum Solis ministrorum quispiā adesse medicos nunciat. Hic vero febricitare se simulat: ac veste circūdatus inuolutus q; quo minus bibisse vinū ab ipsis deprehenderetur, amī

* εσωτι στρα-
φης.

Septima Classis.

ggggggg ij quisset,

METHODI MEDENDI

quisset, ob id ipsum (inquiunt) nunc te deseruit horror, est quod sudoris indicium, ac multa humiditas. E circa cutem: quæ haudquaquam euenissent, nisi in ediam tolerantes, & triduum transmisisses. Iussis igitur propinquis, siquæ guttulæ illi manarent, diligenter detergerent, ne frigore afficeretur, tū mane se redituros præfati discedunt, ne tum quidem post sudores iusso homine nutriri: visque nanque sunt illis noctes eo tempore breues, vtilius quod esse postridie mane nutrire. Digressis igitur ipsis, perfusus sudore iuuenis, ita, ut inuolutus velutibus fuerat, in balneum cucurrit, ac tertio lauit: & limi liter est cibus. Postridie prius, quam aduentarent medici, egressus domo dedita opera est, ne se deprehenderent. Itaque, cum paulo post venirent, & egressum intelligerent, mirati inter se sunt, quid tandem hominem egredi subegisset iam bidui passum in ediam. Ergo, si hoc vno male ab eiusmodi medicis egri afficerentur, quod pluribus diebus in cubilibus detinerentur, cum liceret sine interpestiua hac inedia multo citius ad consueta vitæ munia redire, esset profectio vel id pergrauæ: Verum longe grauius est, quod accidit. Cum enim memoratæ naturæ, ubi sub tali victu regunt, grauissimis occupentur febribus, qui hunc iniungunt medici, nihil mihi à carnificibus differre vident. Non enim veluti qui humidi, ac boni succi sunt, ubi in febris diaria transmittere mirificam diatriton coguntur, vnum id tamen patiuntur incommodum, quod frustra cruciantur, sic etiam naturæ iam comprehensæ: immo ex longiore inedia acerrimis acutissimis quod corripiuntur febribus: à quibus promptus est in heclicas transitus: atque ab his rursus in torridum marasum: aut, si os ventriculi facile iniuriis patet, in eum, qui Syncopæ, id est animi defectum, infert. Audisti enim subinde non nullis talium medicorum dicentem me, licere ipsis euidenter intelligere, quantum mali committant, dum eiusmodi naturas in inedia custodiunt, si velint, dum sani omnino sunt, biduum eos in ediam iubere tolerare. Cernent enim ilico febricitantes, id quod ob nullum profectio aliud, quam famem. Siquidem, cui nec suberat prius quicquam in corpore, quo grauaretur, nec quicquam illi interim accessit extrinsecus noui, is planè ex inedia febricitauit. Quando enim (ut dictum est) non vnus, alterue sic intemperatorum, sed planè omnes, ubi in ediam tolerarunt, & balnei solio abstinerunt, febris corripitur, ne vel leuis quidam amplius relinqui nobis suspicio potest, quasi ob aliud quippiam & non in ediam febricitarint. Quibus namque in corporis temperatura siccum præualet humido, & calidum frigidum, his corporis habitus gracilis, hirsutus, & nigrior est: ac reliquis tribus intemperamentis, quæ hoc sunt minus calida, tactu calidior aduertitur: plurima quoque his flaua est bilis, vrinæ quæ, ac deiectionis bili saturata, & pulsus magni, & somni leues & pauci, & tantissimi impetus vehementes. Ergo recte horum Hippocrates tum generalem victus formulam, cuiusmodi esse conueniat, tum, quot ac qualia symptomata in eiusmodi homines incidant, non solum ubi totum diem in cibi inedia transigerint, verum etiam ubi altero cibo, qui pro prandio datur, abstinerint, prodidit. Quippe in sexto de populatim grassantibus morbis ita inquit: In calida natura refrigeratio, aquæ potio, quies. In libro autem de acutorum victu, quem aliqui Gnidiis sententiis adscribunt, cum de iis disputat, qui solitum prandium dimittunt, etiam huius naturæ hominum meminit, Picrocholus eos græce, quasi amaræ bilis homines, ab redundante scilicet succo nominans. Habent vero eius verba se ad hunc modum: Sed &, qui bis die comedere consueuerunt, si non prandent, egrotant: tum imbecilli & infirmi fiunt, ac timidi ad quoduis opus: præterea cordis dolorem sentiunt. Siquidem suspensa illis viscera videntur, & calidum, pallidum quod mingunt, & deiectionis vratur. Sunt præterea, quibus os ventris amaricat, oculi cauantur, tempora saluunt, & extremæ partes frigent. Hæc ubi prædixit, mox alia quædam tum de cœna, tum de nocte, ad finem sermonis ait huiusmodi notæ homines (quos Picrocholus vocant) tum vnicum in die victum, tum in ediam, quam alios homines, difficilius ferre, vnam nimirum in eo libro exponens partem eorum, quæ in sexto Epidemion monuit in vniuersum, nempe quod ad victum spectat. Nam refrigeratio, quæ calidis naturis suauis, efficitur cum ex aliis quibusdam, tum non minime ex cibi exhibitione. Qui namque originalem temperaturam parum moderatam habent, horum insitum calorem, si squalens acer quod est, cibi mitiorem minus quod mordentem reddunt. Sanè illud non latet, & boni succi, & exquisita debere esse, quæ his exhibeantur, nutrimenta: non tamen ea, quæ boni succi propterea, quod exiguum huiusmodi substantiæ in se habent, nominentur, ac nutrire nequeant, immo quod vtile plurimum in se contineant. Sunt namque & maluæ, & brassicæ, & betæ, & lactucæ, & denique omnia olera, & fructus, nutrimenta, cum substantia in his habilis ad alendum contineatur. Verum, sicut in his exiguum est, quod nutrit, non exiguum, quod est inutile: ita in pane puro, & ouis, & carne, & alica, plurimum est, quod nutrit, minimum, quod est inutile. Quod si id inutile, quod admixtum vtili est, præterquam quod non nutrit, etiam acrem, aut acutam, aut acerbam, aut amaram, aut denique vitiosam quampiam qualitatem habet, non modo non proprie nutrimenta sunt, sed etiam medicamentosæ facultatis non parum in se habent. Expedi igitur tales homines illis nutrire cibis, quicunque nec medicamentosam ullam sensu perceptibilem vim habeant, sed nec ipsum, quod nutrit, plurimum: quando hoc quoque, si exuperat, vitio non caret. Principio namque nec, quæ in ventriculo eorum agitur, concoctio est exacta: nec, si ventriculus ea superet, quæ in venis obitur, est absoluta. Quod si hic quoque haud magnus sit error, saltem tertiam (quæ singulis partium propria est) difficile fuerit in omnibus illis rite perfici. Conueniet profectio huic, & ut frigidum humidum quod quodam modo

* AP. ξηροτάτοις, i. siccissimis.

† εἰς τὸν συγχοπῶν, i. in syncoposum. syncoposus aut marasmus non infert syncopam: imo fit, ubi, qui iam syncopa fuerat correpti, vehementer quod periculi euitant, relicto tamen ipsis fuerit aliquid syncopose affectionis.

A† Non est in antiquis.

B* θυμός.

C Sect. 4. t. 15. 3^a. 183. c

D Cō. 2. t. 24. 7^a. 119. h

E† πρόστας κνιδίας γνώμας ἐπιγράφουσι, i. aduersus Cnidiis sententias inscribunt.

F* nec in Græco est exēplari, nec forte addendum.

G* πάλλονται, i. palpitant.

H Ibidē. t. 29. 7^a. 120. c

I Com. 4. t. 15. 3^a. 183. c

* ὀπώρα.

* ὀξέων, id est acidam.

Aci nutrimentum exhibeas, ubi corpus tum calidius, tum siccius solito est redditum. Quare cōmo-
dissimus huic est ptisanæ cremor ad vnguem coctus, in quo nullum sit superfluum condimentū,
vtpote qui & refrigerare, & humectare, ac sine liti seruare hominem potest: cum eo, q̄ nec hali-
tuosum, nec humidū, nec siccum detinet excrementū. Voco halituosa, quæcunq; per cutim foris
effluere sunt apta: humida, quæ per velicam: sicca, quæ per aluum: quippe à vincenti in singulis
eorum substantia, noia ipsis imposui. Quod aut nullum horum retinebit ptisanæ cremor, manife-
stum est. Quæ enim per aluum excrementorū deiectiones sunt, eas adstringentia retinere solent:
quæ per vrinas, & vniuersam exeunt cutim, hæc detinent ea, quæ exiguis meatibus inhaerent,
Emplattomena vocāt: præterea, quæ valenter adstringūt, ea Stryphna Græci vocāt: Ptisana vero
nec exiguos cutis meatus obturādī, nec adstringendī, vim habet vllā. Ac, q̄ nō adstringat quidē,
vel gustus ipse docet, cuius vnus est proprium, quod adstringēdī, vim habeat, discernere. Quod
vero nec cutis meatibus {lēticia crassitudine ue sua} inhaereat, id ratiocinari ex aliis eius effecti-
bus est promptum. Nā, siue sordidum corpus extrinsecus ptisana defrices, vtiq; sicut aphronitrū,
& mel, deterget: siue ex ventriculo per vomitū educere mediocrem pituitam velis, nihilo minus
mulsa vtilem ptisanæ cremorem experieris. Additum tñ in dictione est /mediocrē/ qm̄, si multa

B & vehementer glutinosa & crassa pituita sit, hanc radícula ex oxymelite, non mulsa aut ptisana
detergere est habilis. Est sanē & mulsa ad omnes ante dictas expulsiōes idonea, verum nec sitim
restringit, vt ptisana, & in amara bili abundantibus naturis facile vertitur in bilem. Optimum
igitur (vt prædiximus) in eiusmodi temperamentis nutrimentum est ptisana: Proximū ab hoc
alica, cui paululum aceti † sit adiectum: Tertium, quæ sine aceto liquida est, nō crassa, qualem nō
nulli præparant al similem pultrī: iniecisse vero huic, dum coquitur, aliquid porri satius est: nam,
quod tum anethi, tum salis aliquid necessario habebit, neminē latet. Quin etiam in furno coctus
panis vtilis est cibus: Sicut etiam ē piscibus saxatiles oēs: Nec ipsis minus aselli, nili si prope lacū,
aut magnum flumen, quod in mare decidat, depasti, humidam magis glutinosam q̄ habeant car-
nem: Proxime asellos sunt solca & torpedo, item q̄ lupus, & mulus, post mugilē pelago. Omnis
aut piscis deterior est, qui prope lacum, qui mari coniungitur, aut magni fluminis ostium pascit.
Ex volatilibus aut optimi sunt perdices, ac montani oēs pāsseries: Ab his gallinacei, & phasiani,
& {iuuēnes} columbæ: sed nec hæc tñ intus claudendæ, cū excrementosa sint omnia, quæ exerci-
tatione carent. Excrementosa vero non minus sunt, tum lacustria, tū palustria omnia. Quo fit, vt
etiam ex ipsis suillis carnibus optima sit mōtana: Ab his deinceps hædi sunt. In oībus iam dictis

C fugienda, tum vetula, tum recens edita, sunt: illa nanq; duriora, concoctū q̄ difficiliora sunt: hæc
immodice humida, & excrementosa: ac potissimum quæcūq; ex animalū generibus sunt, quæ na-
turaliter humida sunt, vt oues, sues q̄. Verū de oīum ciborum facultate alibi præcepimus. Nunc
veluti alia in hoc opere, sic ista quoq; exēpli causa sint dicta. Siquidem propolitū nobis in hoc est
non, tanq̄ in iis, quæ de alimentis & medicamentis scripsimus, materias inuestigare, sed solas fa-
cultates generales. Nihil aut profectō referat, generales ne facultates, an vniuersales, ipsas appel-
les. Reuertamur ergo rursus ad propolitū. Quibus acre aliquid quotidie trāspirat, ij, si cutis ipsis
stipetur, prompte febrī corripuntur. Stipant vero hanc tum quæ adstringunt, oīa, veluti paulo
supra memorauimus de Albulis aquis: tum quæ {lēticia crassitudine ue sua} exiguis meatibus
inherent. Aliqñ autē ipsius cutis immoderatio siccatas exiguis ipsius meatus densat. Proinde,
qui cœnanthe in balneo utebatur, hunc nos vidisti, quo tpe inæqualitatē sentire se quereretur, vti
vetuisse: Simili modo, & qui largo vino cum oleo exiguo utebatur. Itē, qui lentiscino, tum, cum
densitudine sentiebat, hunc quoq; de cetero (vt scis) vti prohibuimus. Inhibuimus nō minus &
eū, qui quotidie insolabatur: & eū, qui puluere utebatur. Alteri vero, qui iam ad inæqualitatem fe-
brilē peruenerat, vehemētīā remittere frictionis iussimus. Iam aliū (vt scis) curauimus, mirantē,

D quo pacto vna lauatiōe ac debita frictiōe horridam eius multorum dierum inæqualitatem dis-
soluerimus. Utebatur aut & ille adstringente oleo, hoc, inquāsiure propter alios vsus celebri: Hi-
spanum vocāt. Hoc igitur mutant, ac Sabino tū pinguiter, tum molliter vberius perfricātes, ac
bis lauantes, ilico sanū reddidimus. Non solū igitur hæc oīa vitanda iis sunt, qui humidum & fuli-
ginosum ē corpore exhalant, sed etiā quæ glutinosum, & quæ crassum gignunt succum: qñ hæc
paruis meatibus inhaerentia transpirationē morantur. Retinent non minus (vt dictū est) transpi-
rationē, & quæ cutim immodice siccat. † Multos liquidē talium, cū Sole vterētur: alios vero, cū
vberiore nitro: alios, cū sale, aut exercitatione multa, aut frictiōe dura, præterea frictiōe sicca,
(Xerotribian vocāt,) {& calidis fomētis,} & puluere, & horū occasione quotānis ægrotarēt: ip-
se testis es, vt ab his prohibitos, multis iā annis sanos seruauerimus. Sunt autem merito eiusmodi
præcepta tum valentium adhuc, tum eorū, qui iā de valetudine querūtur, cōia. Non enim ei, quæ
iam facta est, febrī consulunt: sed ei, quæ nunc in generatione est, prospiciunt, tollendis s. iis, quæ
illas excitant, causis: quippe, quæ adhuc in generatione febris est, dū auferī causa, ipsa vnā interit.
Quare, quæ in libris de sanitate tuēda de eiusmodi tēperamētis sunt, pdita, ea oīa ad eos, q̄ febricitā-
re incipiūt, siue id sanationē appellasse oportet, siue pudentiā, sunt trāsferēda. Siquidē sanamus
id febris, quod iā inualit, ēt si exiguū est: prospicimus, neq; amplius pueniat, adimētes causam.

Septima Classis.

ggggggg iiij De

† Ita hñt anti-
qui codices, vt
Linace verat.
Impiellū tñ ad-
dūt & p̄p̄m dñm
Sicce s. s. i. dñ-
stributiōis gra-
tia. Vti p̄p̄m
hec & bā i mar-
gine codicis an-
tiquissimi re-
posita, vt glossa
ma ac de. dñ-
tio, cur accitum
adiiciatur.

* σπουδῶς i. aui-
culæ.

* In anagis nō
inuenitur.

† imp̄p̄i cod.
græci habent.
πολλὰς γὰρ
ἐν ἰνδῶ Ζωο-
μένους τοῖς
τοιοῦτοις,
id est Multos
siquidē cū in-
libus in Sole
vterentur.

METHODI MEDENDI

De curanda Febre Diaria ex Vstione, Ira, Refrigeratione, Vigiliis, Tristitia, Curis, ac Lassitudine. CAP. 3. E

Veluti vero iam dictarum maxime naturarum, & cum valent, & cum de se queruntur, illud cōmune consilium est, vt fluxile & trāspirabile vndiq; corpus reddatur: ita illud quodq; vt tum vigilias, tum iram, tum tristitiam, tum curam, tum vstionem, tum frigus, tum lassitudinē fugiant: cum promptissime post hæc, eiusmodi temperamēta febri capiantur. Sanare vero ea, quod tunc ex aliqua dictarum occasionum febricitarint, oportet, partim similiter iis, quos ex stipata cute laborare diximus, partim dissimiliter. Quippe in prima accessione inclinante ducendi in balneum omnes sunt: tum pinguius simul ac molliter fricādi, ij quidem, qui ex aliquo, quod cutim adstrinxit, laborant, sicut dictum est: qui vero ex siccitate, fricandi quidem & ipsi, sed parcius, lauandi aut vberius. Respiciendum vero semper ad virtutis modum est in omnibus eiusmodi auxiliis. Atq; ira quidē, & tristitia, & vigilia, ac curæ, nec frictionibus, nec lauationibus multis, indigent: sed omnibus, qui ex eiusmodi occasione febricitarint, oleum infundendum tepidum large est, cui minime adstringens vis inlit: tū paululum fricādi, atq; ex cōsuetudine lauandi. Vstio vero protinus ab initio refrigerationem deliderat, tum crebriorem lauationem: minime vero aut oleum largū, aut crebram frictionem. Sint autē, quæ refrigerent, & rosaceum, & omphacinum, quod etiam, arbitror, omotribes, id est crudum oleum nominant. Vtiliora vero ex his sunt, quæ nihil in se salis omnino habent. Efficies hæc magis frigida, si ita vas, in quo continentur, in puteo suspendas, vt aquam tangat. Præterea, si defluxus frigida aquæ valē se illidat, magis humorem refrigerat. Quod si largius refrigerata cupis, vas niue circundabis. Infundere autē incipiti, sublata in altum manu, per mediocrem lanæ modum oportet. Hæc vsq; ad inclinationem faciens, in balneum duces. Si vero, qui memorato est temperamēto, de quo omnis hic sermo est, ex frigore febricitet, etiam ducendus ad balneum in remissione is est. Si aut cum grauedine & destillatione febricitet, prius, q̃ hæc concocta sint, lauandus non est. At, qui ex vstione febricitant, ij, vel cum hæc adsint, lauari debebunt: veluti in libris de sanitate tuenda ostendimus. Post lauacrū vero iisdem, quibus ante, madefacienda amborum capita sunt: eorum quidem, qui ex vstione febricitarunt, refrigerantibus: qui ex frigore, calfacientibus. Sunt autē & hæc post balneū mediocria: cuiusmodi irinum est, & nardinum vnguentum. Verum de his immorandum pluribus non est, præsertim in libris de sanitate tuenda iam proditis. Sed suffecerit dixisse reliqua simili modo in febricitantibus esse facienda, quemadmodum in vstis & refrigeratis citra febrē, facienda præcepimus: Non tñ quouis tēpore lauandos febricitantes esse, sed in accessionis remissione: Præterea, qui ex vstione febricitant, iis intendendam, quæ ex refrigerantibus constat, curationem esse: iis vero, qui ex frigore, eā, quæ ex calfacientibus consistit, remittendam. Reliquum autem fuerit, vt cōmunitatē ac differentiam in victu omnium cōprehenfarum conditionum in proposito temperamēto, vbi febri diaria laborat, exponamus. Omniū igitur cōmunis victus species esto, quæ & boni sit succi, & concoctu facilis, & quæ nusquam exiguis cutis meatibus inhæreat: Sed iis, qui exusti sunt, cum eo, quod refrigeret & humectet: Pari modo iis, quos ira male habuit: iis vero, qui refrigerati fuerūt, cū eo, quod calfaciat modice: iis, qui per uigilio, & tristitia, & nimia cura sunt affecti, quod humectet ac somnum conciliet: Ad eundem modum iis, qui fatigati sunt, magis nutriēs: iis, qui refrigerati sunt, minus nutriēs: Reliquis, quod medium sit amborum. Vinum vero ipse concius es omnibus me eiusmodi {naturis} concedere, sed quod tum aspectu, tum viribus, sit aquosum: id enim ad omnia vtilius, q̃ aqua, est, utpote quod & concoctionem iuuat, & vrinas ac sudores prouocet. Constat autem & Hippocratem non in diariis modo febribus, verū etiam in acutis, ex iis, quæ de acutarum victu prodit, vinū dare. At in sexto Epidemion, siue ipse sit, siue Theisalus eius filius, vinum calidis temperamentis prohibet: id q̃ non modo cum febricitant, sed etiam per sanitatem: quippe in calida natura suadet tum refrigerationē, tum aquæ potionē, tum quietem. Nisi forte copiosius videndum esse aqua, q̃ vino, eiusmodi naturis suadere eum dixeris, quem H admodum nō nullis placet. Hoc igitur seorsum per se disquiratur. De potione vero frigida decidendum. Ego igitur censeo eius generis naturas, & dum valent, eiusmodi potione magnopere iuari: nec in diaria febri iis, quibus in usu fuit, eam circūcido. Siquis vero non assuevit, huic per febrem dare non inceperim, nisi pristina planē sanitate prius reddita. Quod si vel propter timiditatem, vel propter consuetudinem à pueris, vel falsam opinionē, frigidam timeat, tum opere homini persuadeam, obseruans in æstate cum æstuat, tum oratione post opus. Nam, vbi post vsum eiusmodi potionis liberatus statim ab vrendo æstūando q̃ est: visus q̃ firmiorem ex eo sto machum, q̃ ante, habere: tum ventriculus illi biliosum deiecit, & probe concoxit: ac corpus, cum ea iterum iterum q̃ vsum fuerit, reficitur: tum vero aliis quoque ei indicatis, quibus simili ratione contuli: exposuerim Primum quidem illud esse omnium longe verissimum, q̃ contraria contrariorum sunt remedia, proditum autem mihi de hoc prius est: Mox illud, q̃ temperamentū eius sanitatis symmetrian egressum morbo est propinquum: Tum q̃ sanitas eiusmodi corporum dubia est, ac potius in affectu, quam schelin vocāt, q̃ in habitu, quam hexin: Præterea q̃ si boni temperamenti esset, hoc illi omni studio tuerer: cum vero vitiosi sit temperamenti & naturæ, in melius immuto. Porro dictum & de his fusius est in libris de sanitate tuenda. Vnde nec immorandum

* Al. διαβήσεως, i. affectuōis.

3. de Rat. vic. f. ac. t. l. 7^a. 125. d. Sect. 4. t. 15. 3^a. 123. c.

* καὶ αλγὸν

A. li. 4. f. 1. c. 9. fol. 4 a

A. li. 4. f. 1. c. 9. fol. 4 b

Adum mihi hic multis est eos imitanti scriptores, qui, cum pauca prorsus sciant, ipsa in oībus libris inculcant. Id enim non multa est docere, sed multa scribere, & multas chartas consumere, cū liceat paucas: ac multum temporis nulla necessitate contere. Itaq; nec notas diariarum febrium hoc loco describo, utpote iam prędictas mihi in secundo de crisi propemodum vniuersas, si quę vero reliquę fuerunt, etiam in primo de febrium differentiis proditas. Quin etiam in libris de pullibus, quantū ex ipsis sit vtile, exposuimus, soli (vt scis) omniū, qui ante nos fuerunt: {id q; } adeo (arbitror) clare, vt nec puerum, quod tradidimus, lateat: cum Archigenes (vt ostēdimus) nō docuerit, sed deblaterarit plurima tum in opere de pullibus, tum in eo, quod de febriū significatione inscribit. Tanquam autem eum, qui in aluminosa aqua se lauit, medici vsq; in tertium diē cibo abstineri iusserunt, ad eundem scis modum neminem eorum, qui vel exusti fuerunt, † vel alia quam

† Addūt antiq.
cod. *ἡ δὲ καὶ τὰ
ἑνταῦθα, i. & q
saugati fuerūt.*

Bdie ad vesp̄eram eos, qui diaria febrī laborarunt, lauimus, tum vel magis in secundo, immo etiam in ipso tertio: ceu paulo ante diximus de eo, cui stipata cutis fuerat. Verum hanc causam rarerer vidi febrem accendere, itaq; etiam hanc maxime tractandam desumpsī: v̄sionem vero & lassitudinem, & ceterorum singula, planē s̄ape. Vidisti autem eos omnes quarto die mane ad solita redire munia: ac medicis, qui ipsos tertiu diem prorsus in cibi inedia exegisse fuerant opinati, occurrere. Itaq; etiam miranti tibi ac quęrenti, quid demum causę esset, cur vel nunc saltem eiusmodi medici ab iis, quę perperam opinantur, non recedant, conuenienter (vt arbitror) respondi, q̄ neq; veram speculationem noscerent, & nunc eam incipere discere crubescerent. Aliqui tamen (veluti confitentem aliquādo ex iis quendā, id q; cum lachrymis, veritatem nobis solis audiisti) nec vitę sibi necessaria aiunt affutura, si, qui eos scire aliquid existimant, discentes iā videant. Verum tu hoc semel audisti: deos aut omnes testor, multos id mihi s̄ape soli confēssos, id q; lachrymantes, ac infelicitatē suam deplorantes, q̄ sub malis pręceptoribus tēpus perdidissent. Iuro q; tibi rursus deos, illud quoq; mihi pers̄ape a cōdiscipulis dictum esse, cum essem adhuc ætate adolescens. Nam, cum mihi mōs esset, vbi aliquis me de secta aliqua, num sana esset, percontaretur, dicere, me respondere non posse, nisi reliquorū omniū dogmata didicissem: ac † methodum quam-

† Addūt antiq.
cod. *δὲ τὰ αὐτῶν
ἢ, i. facultatem
vel.*

Cpiam mihi comparassem, qua, quod potius esset, discernere, nō pauci ex cōdiscipulis, qui hęc audierant, mihi responderunt me & excellenti natura, & singulari propter patris mei liberalitatem esse eruditione, tum & ætatem ad discendum idoneam, & impensas, vnde disciplinis vacem, suppeditatas habere: secum nō ita agi, qui & rudes in primis disciplinis essent, nec acuto, vt ego, ingenio, nec, quod impēderent, habere: itaq; contentos esse oportere iis, quę nunc nossent, quahacunq; ea forent. Minime igitur mireris, cur plerisque medicorum nō pudeat diatriton in ore habere, etiam si sexcenties nos pręsagire in ægris viderunt, diariā ne febrī laborarent, an ea, quę tertio quarto uē die accessionem aliquam esset habitura. Illud potius æstima quod Hippocrates

“ monuit, homo aliās ingenio maxime philosophico: “ *¶ Cū † in acumine } morbus est, statim tū*
“ vltimos labores infert, tum “ tēnuī ad vltimum victu necesse est vti. Vbi vero non, sed licet libe-
“ ralius cibare, tantum est de vltimo remittēdum, quantū morbus vltimis est mitior. Labores nāq;
“ dicit omnia, quę hominē offendunt: vltimos vero, maximos: quales vtiq; in summe vigore fiūt.

A 1. Apho. 7.
Ex. ord. 4. d

B † peracutus.

C * Al. tenuis-
simo.

1. Apho. 8. Ex.
ord. 4. f

“ Iubet autem referuari in id temporis summam victus tenuitatem, nihil profectō docens diuer-
“ sum ab eo, quod alibi dixit: “ Cum in summo vigore morbus est, tum victu vti tenuissimo est ne-
“ cesse. Atqui fieri non potest, vt summam victus tenuitatē ad summi vigoris tempus differas, nisi

Dinter initia conieceris, circiter quotum diem in vigore morbus sit futurus. Sed & insanire Hippo-
cratē dicunt, qui hęc scripserit: & tamen si nos opere ea ostendimus, omnia potius putant, q̄ pos-
se quempiam in prima aliquando accessione certam notitiam affectus ipsius ægrotantis habere. Ego vero nec in omnibus ægrotantibus fateor exacte me scire in primo die affectum, nec vllam diariam me febrem posse fugere: at vero, vt nihil in victus ratione primis saltē diebus pecces, hoc satis est, si discernere diariam a reliquis queas. Ac propterea quarto die, in quo illi hominem, quē iam siccāunt, primum nutrire incipiunt, nos ad cōsuetā dimittimus: ac a diariis in acutas febres transitum fieri hac victus ratione prohibemus: cum, si quis aliter cibat, excipiāt necessario iam di-
ctas naturas ardentissimę febres. Sunt enim alię naturę, quibus aut nihil, aut nō magnopere, in-
commodet tot dierum inedia: sicut ē diuerso alię, quibus non modo innoxia, sed etiam vtilis est
trium dierum inedia. Verum de ceteris naturis post decernam. Propositum vero nunc nobis ab
initio temperamentum inedię in summum ducunt discrimen, in quacunque iniungantur febri,
non solum iis, quas modo commemorauī, diariis.

* *πρωταρχεῖς
ἑνταῦθα.*

Quo pacto Diaria Febris ex Obstructione curanda sit, vt Pręcaueamus, ne in putridā pertranscat. CAP. 4.

Etenim, si propter obstructionem aliquando (vt dictum est) morata trāspiratio est, si parua
Ea sit, qui recte deterferit, secundam fore accessionem vetabit: sin momentanea, non possis

Septima Classis.

ggggggg iij ita

METHODI MEDENDI

ita promittere. Quod si & multi, & crassi, & glutinosi impacti succi sint, quæ hos excipit febris, E fieri non potest, vt intra fines diariarum conlutat: quando ex necessitate huic in mali succi naturis ea, quæ ex putredine humorum accenditur, succedet. Nam in aliis saltem temperamentis, quæ in frequentibus exponam, excitari ex tali causa potest citra humorum putredinem aliqua continetis febris species. Porro capere eiusmodi sermones omnino non potest, qui prius in memoratis operibus non sit exercitatus: ac potissimum in eo, quod de febrium differentia inscribitur. Nam, vbi obstructio quæpiam mediocris est, ob quam febricitant, quibus vitiosus est succus, in primo die, atq; etiam secundi aliqua parte, nullum est in pulsu putredinis signum, eque vt nec cruditatis in vrinis. Protracta tamen inclinatione, nec amplius pro ratione, sicut post summum vigorem in ceperat, cedente, suspectus affectus est: veluti è diuerso, in quibus ad solutionem festinat, vel halitus aliqui † vel sudores exierunt, vel multa bona vrina, cū signis in pulsu bonis, in iis proculdubio diaria febris est. Sed, quæ ex parua oritur obstructione, ea (vt dictū est) saltē inter initia similis diariis est. Protracta tñ inclinatione, suspecta reddit, quæ putredinis indicia in pulsu adhuc nō apparent: quippe, nisi vitiosus succus penitus trāspiret, necesse est, putrefiat. Ergo, vt transpiret, maiore iam auxilio est opus. Ac, si quidē vel puer vel senex sit, sanguinē detrahare nō licet: inter has ætates, vbi robur ægro nō deest, secunda vena est, etiam si plenitudinis signa non adsunt. Præstat enim vitiosi succi maiore parte emissa ad detergēdas obstructiones accedere: cū alioqui metus sit, si obstructionibus liberādis prius, q̄ vacuaueris, itudeas, ne ipsas magis impingas. At soluūt qdē obstructiones, quæ deterforā facultatem obtinent, seu foris cuti sint admoda, seu intrō in corpus accepta. Periculum vero est etiā, ne, quæ foras trahūt, vnā cū iis, quæ obstruunt, etiam aliud quippiā attrahant: & quæ ab interno sursum ferunt, aliquid secū in iis, quæ in vasis continent, rapiant. Quod ipsum, si tenax sit et crassum, obstructionem planē geminabit: sin aliter, multitudine certe sua non parū oīno nocebit. Cernimus enim aliquñ, etiam quod multum est, cū simul totū cōfluit, obstruendo herere, infigi q̄ nō minus, q̄ ea, quæ glutinosa sunt & crassa: q̄ si p̄ meatus angustos est trāsitus, multo profectō magis retineri. Quod igit & his iter liberū, & iis, quæ foris admouent, attractio tuta sit, vtilissimū est corpus inanisse. Quin etiā fumosa fuliginosa q̄ succorū excrementa, quæ trāspirant, succis ipsis imminutis pauciora restabunt. Quare inde quoq; minor reddet febrilis calor, sic, vt foras trāspirare, si exigue obstructiones sint, queat. Ergo, cū suspicio erit cutim esse ex obstructione oclulam, (id quod tum ex eo coniicies, q̄ nō fuerit in primæ accessionis remissione vacuatio satis magna, tum q̄ similis sibi perdurauerit remissio) si homo ex nulla manifesta febricitauit causa, etiam certius argumentum obstructionis habes: sin ex euidenti aliqua causa, fieri potest, vt duæ simul coierint causæ: nam, si altera tñ causarum, nempe quā externa impref sit, subellet, imminuta remissio fuisset cū sensibili alicuius expulsiōe. Haudquaq; igitur differendum est sanguinem ita laborantium mittere, s. tum ad virtutis, tum ad obstructionis modi portionem. Discernetur autē obstructionis magnitudo ex ipsa magnitudine febris: vt quæ ex maiore obstructione maior, ex minore minor inciderit. Vbi vero modice vacuaueris, haud multo post aut nutrimentū aliquod, aut pharmacū ex iis, quæ detergeāt, exhibebis. Sunt porro nō multa, quæ in febribus id p̄stent. Sed, sicut dictū prius est, in alimētorū ratione sunt pitissima, & multa: in phar macorum, oxymeli, & quæcūq; incoquere in mulla licet, ceu calaminthā, & hyssopū, & origanū, & serpillū, & irim, & apiū. Verū hæc omnia iusto sunt calidiora, ideo q̄ febres accēdunt, ita vtiq; vt vinū. Oxymeli vero solū nec febres accēdit, & strenue deterget sic, vt ea, quæ glutinosa crassa q̄ sunt, dissoluat, & meatus obstructos liberet. Porro inter mullam & oxymeli mediū locum habet, quod Apomeli græce dicitur: cuius plurimus in Pelopōneso est vsus. Non immerito, arbitror, & saccharū inter hæc numerandū. Ex hoc victu seruabis, quātū de febrili calore minui. Etenim, si tertio die mane videris minimū esse, quod de febre relinquit: ac neq; putredinis humorū in pulsu nota subsit, neq; i vrina cruditatis: suspecta vero hora, qua primo die febris occupauit, extra meridiem sit: audacter hoīem, q̄ ocysime lauabis, longe ante sextam horā. Abunde tñ sit, si intra tertiam horam lauationē compleueris. Ad eundem modū, & si decimā horam suspectam habueris, vsq; ad septimā laues, licet: cum tres equinoctiales horas quatuor ue inter balneum accessionis q̄ tps interponi, abunde sit satis. Debet autē in balneo corpus prius vnctum ac moderatissime frictum, mox detergeri extrinsecus, ablui q̄. Sanē detergentium materiā expositā habes in cōmentariis iis, qui de medicamētis sunt cōscripti. Deligēda vero semper sunt, quæ ad rē propositā sint accōmoda: quippe distincta in his sunt, tum quæ magis, tum quæ minus, detergent. Sed & nunc exēpli causa pauca dicemus. Moderatissime deterget tum erui farina, tum hordei, tum fabarum: præterea mulla, quæ sit aquosa: magis vero, q̄ hæc, iris, & panacis radix, & aristolochia, & mulla, quæ mediocri est mistura: veluti etiam hac magis, quæ meracissima est. Fit hæc, vbi mista melli exigua est aqua sic, vt liquatū mel exiguos cutis meatus facile ingredi possit. Possunt aut vel hac magis detergere tum spuma nitri, tum nitrum ipsum, tum aphronitru. Sit aut nitrum, oportet, quod ex tenuibus partibus constet, cuiusmodi Berenicium est: si vero lapidosum sit, vri id lauigari q̄ diligenter debet: Mel autem purissimum, acerrimum q̄, cuiusmodi est Hymmetium. Est autē & lapo ex iis, quæ maxime detergere valeant. Atq; hæc satis multa detergentium materiæ exempla

† Antiqui codices addūt ἡ νόσος, id est vel maiores.

* In A. C. Græc. legit. ὡς πάλιν τούτοις, soluūt obstructione.

* AP. ἡ, i. vel.

A. li. 4. f. 1. c. 3. fol. 10

A. ibide 3

A pla sunt. Tempestiūm. n. est iam ad ea, quæ post balneū adhibentur, accedamus. Sunt autē ea minime multa. Nam præter aquam, quæ parū apij incoctum in se habuerit, nihil his est offerendum, licet, quod inter balneum & suspectas horas spatium erit, trium fore horarū conijciamus. Si vero circa vesperam, aut duabus horis citius, q̄ primo die, accessio inuadet, tū lauisse mane liceat, tum cibasse, sed tantū pullanæ cremore. Deinde, si suspectæ horæ nihil prorsus afferant, & lauare rursus, si velit, licet, & cibare, ad eas, quas diximus, considerationes intento. Sin aliquid eueniat, & cōferendum id est cū accessione, quæ primo die inciderat: & tum vrinæ considerandæ, tum pulsus sunt: quæ omnia profectō mediocria apparebunt, vbi exigua relinquitur obstructio. Quare ipsum & lauabis quarto die, & cibabis, ad iā dictas considerationes spectans: sperabis q̄ nihil quinto die superuenturum. At, si magna obstructio facta sit, ea febris ex diariarū genere nō erit. Quare in proximum differatur librum, cum in hoc de diarijs tantum agere statuerimus.

De Diarijs Febris, quæ Superueniunt Cruditatibus ciborum.

CAP. 5.

Quoniam igitur diariæ febres in propoliis corporum temperamentis sæpenumero etiam ciborum cruditatibus succedunt, proximum fuerit de ipsis differere. Ergo pessima quidem in eiusmodi temperamentis cruditas est, citissime q̄ febrē accendit, in qua cibi in

Bnidorulentam & fumosam qualitatem corrumpuntur: quando ea, quæ in acidam vertit, vt raro talibus naturis contingit, ita minus nocet. Dicemus autem de vtraque seorsum, incipientes ab ea, quæ sæpius his incidit, & magis lædit. Ea est (vt diximus) nidorosa quedam ac fumosa: quæ vtiq̄, si aluus lubrica est, minus est noxia: sin adstringitur, grauis est. Siquidem ex adstrictione eius vitiosæ naturæ in febres prompte incidunt, ac potissimū cum neglecto consilio in lectulo domi manendi, ad solita conuertuntur opera. Febricitant autem non nulli & ex ijs, quos diarrhœa ex cruditate male habet: quibus vtiq̄ non minime increscit febrilis affectio & ex desurgendi frequentia. Quod si etiā rosio, aut dolor, aut calor immodicus in ventriculo & intestinis sit, hinc vtiq̄ vel longe magis affectio febrilis increscit. Est autem eorum, quibus clausa aluus est, & quibus fluēs, non eadem sanatio. Itaq̄ ēt seorsum de vtrisque agetur. Apparebit. n. sic tractantibus non solum quatenus differunt, sed ēt quātum ambobus sit commune. Si igitur ea tātum, quæ corrupta fuerit, vacuata esse videntur, tum lauandum, tum nutriendum in remissione febris est, sed ijs, quæ circa vētriculum sunt, prius consulto. Sin ita multa inanitio aut prius facta sit, aut nunc etiam in homine duret, vt virtus iam defessa sit, satius est omīssa lauatione cibare, sed consulto prius ijs, quæ circa ventrem sunt. Consultetur ita laborantibus, si modo vacuatio amplius non duret, fomentis

Cex oleo & absinthio: expedit autem tingi absinthium, quo minus nidore offendar, feruenti aqua. Quod si quis morsus, aut doloris sensus, in vētriculo adhuc super sit, incingi illi peniculus post fomentum debet, q̄ vel liccus & calidus sit, vel ex oleo, in quo absinthium incoctum fuit, madēs, ac plurimum expressus. Satius autē fuerit, si nardini vnguenti, quod curiose sit factum, facultas sit, ex eo peniculum eodem modo imbutum ventri incingere. Iam multo etiam satius sit, si purpura marina is sit: atq̄ etiam longe optimum, si optima sit Tyria: quippe tenuiorem adstringēdi vini habet tum ea purpura, tum optima nardus, ita, vt vis earum siccando, calfaciendo, ac robur inferēdo, in corpora, quæ circa ventriculum habentur, alte penetrare possit. Quod si os vētriculi (quod stomachum appellare solemus, abutentes nimirū appellatione) imbecillius sit, ēt tanta portione chiæ mastiches in nardino tunsa, vnde sordium crassitudo existat, madefactam ex eo purpuram imponemus. Esto autem abunde calens talium quodq̄, cum primum imponitur: quippe, quæ tepida sunt, omnia ventriculi firmitudinem dissoluunt. Non autē te fugit solere me vnguenta calefacere in vase duplici, vtiq̄ coniecta prius in vas maius, aqua feruente: quando aliter calefactis vitatur eorum facultas. Cæterum fluente adhuc aluo, vtilius est optimo recente q̄ melino simili modo, quo nardino, vti. Vtile autē ad omnia talia est et mastichinū. Non in postremis accommoda-

Dta sunt eiusmodi ventriculi affectibus & vnguenta ea, quæ ad gratiā delicatarum mulierum fiūt: hæc, inquā, pretiosa, quæ Romanorū luxus videtur inuenisse, appellationes q̄ Romanas dedisse: noīantur. n. tum spicata, tum foliata. Si vero, qui affligitur, cinctum non patitur, siue ob consuetudinē siue delicias cingi recuset, licet, cerato idem efficias. Est autē in eiusmodi vsum optimū, quod ex cera sit Tyrrhenica in vnguento nardino liquata, † cui post, q̄ refrigeratum est, ‡ aloes ac mastiches mollissimus puluis est admixtus. Debet autē singulorum hic esse modus: Cere ac nardi partes pares: aloes pars octaua: sic ēt & mastiches, vel (si placet) huius paulo aliquid plus. Quod si cerato aliquid ē sumptuosius his vnguentis admisceas, præstantius medicamentū habebis. Si autē vētriculus intus vrīt ita, vt affectus quidā phlegmonē similis in eo consistere videat, vtilius est ceratum, quod ex melino conficit. Sunt porro alia medicamenta nō pauca, alia quidem ex cœnanthe, alia ex hypocistide, & balaustijs, & palmularū carne confecta, quæ vētriculo tum refrigerando, tū vero firmando, sint idonea. Horū ergo, quod ad rem præsentē sit cōmodissimum, id deliges, ijs, quas memorauimus, cōsiderationibus intētus. Cibādī vero deinceps his sunt: fluēte quidē etiā num ventre, polenta, & pane, quæ græce Oxylipe vocāt: qui vtiq̄ minimū aceti habeat, nō sicuti in dysenteria & diutina diarrhœa præparare solemus. Inspergere autem polentam debebis aliās aqua calida vbertim: aliās, vbi s. venter adhuc plus iusto excernit, vel malī punici, vel pirorū, vel

malorum

A. 14. f. 1. r. 1.
c. 3. ol. 414. h

* Al. rarissime

* καὶ χυμοῖς.

* ἐν σπορῇ.

A. 14. f. 1. r. 1.
c. 3. ol. 418. a

† In antiquis ira
legit *ψυχθεις*
ση *χ* *ε* *υ* *σ* *θ* *ει*
ση *α* *τ* *α* *κ* *ρ* *ω* *τ* *α*
i. cui post, q̄ re-
frigeratū est ac
derasim, & c.

METHODI MEDENDI

ωπρωτον.

* Græce hypochondria. Lina-
cer autem cum
Cello semp̄ ver-
tit præcordia.

* καθις ωντες,
est in impressis.
i manuscriptis
μεθις ωντες.

* ἀπορρέουσι.

malorum succo, potissimū cotoneorum. Quod si iucundius laborātī erit, etiā decocto ex piris, E
aut malis, aut myrtis, preparato polentam insperges. Sin venter non amplius excernit, suffecerit
tum alica similiter ptillanæ præparata, hoc est aceti habens pauxillum: tum ex ea sine aceto sorbi-
tio: tum gallinaceorum testiculū: & saxatiles ex albo iure pisces: præterea fructuum aliquis ex ijs,
qui adstringāt, vel solus, vel cum pane. Hos vero vel magis ēt vētre adhuc fluente dabis. Quod si
appetentia careant sic, vt cibos auerientur, (incidit nāq; id non paucis eorum, quos diarrhœa ex
cruditate male habet) etiā de medicamento, quod ex succo fit cotoneorum, vnum aut duo co-
chlearia danda his sunt: aut, si huius copia nō est, eius, quod ex carne eorum componitur. Tradi-
ta vero eius generis medicamentorū cōpositio est in libris de tuenda sanitate. Atq; ita quidem in
prima remissione, ijs, qui ex cruditate febricitant, ventre excernēte, mederi conuenit. Si vero om-
nino venter astringitur, pertractatis prius præcordijs, mox toto ventre considerabis diligenter,
num cibus in gracile intestinum, aut in colon descenderit. Deinde ægrum interrogabis, qua ma-
xime in parte vel morsum, vel grauitatem sentiat, quales ue habeat ructus. Vbi ex his cōpertum
habueris, in qua nam totius ventris parte nutrimentum consistat, si in superioribus partibus pen-
det, aliquid diatrion pepereon dabis, non medicamento illius, sed eius, quod in opere de sanita-
te tuenda, ceu & simplicissimum, & ijs, qui cruditate laborarēt, aptissimum laudauimus. Post de-
inde præcordia, oēm q; ventrem perfundes. Hoc vero, etiā si inferius descenderit, quæ vitiosa
sunt, facies, pluris minoris q; ratione id varians. Siquidem plus & temporis & perfusionis exigūt
ad præparationem eorum, quæ deinceps sunt agenda, qbus in superioribus vētris corruptum nu-
trimentum adhuc manet. Sin motū id notabiliter ad inferiora sit, adiuvandum aut glande subdi-
ta, aut leui per inferius infusione est, utiq; si morsus simul adlit, hanc mitigantibus: si flatus, hunc
cōprimētibus: sin neutrum fuerit, ex melle, aqua, & paululo olei id, quod subter infundetur, fa-
cientibus. Vbi vero vehementior morsus vrget, Sabinum oleū, in quo aliquid seui anserini sit li-
quatū, est vtilius: si vero eius copia nō est, gallinacei seui: sin nec huius facultas est, caprini: quod
si huius quoq; penuria est, inijciendum oleo parum cere est, potissimū elotæ. Flatus vero sanan-
di sunt oleo, in quo ruta & semina, quæ flatus discutiunt, fuere incocta: cuiusmodi sunt apij, & cu-
mini, & marathri, & sinonis, alia q; id genus. Vacuata vero aluo, nutriendū protinus in ceteris q-
dem ijs, quos memorauimus, similiter est, amotis tamē ijs, quæ adstringant. At, si quidem primo
die ad vesp̄eram hæc egeris, aut etiā noctis qualibet hora, etiā secundo die similem adhibebis
providentiam. In quo ēt, si planē desijt febris, lauari hoīem sines. Ac, vbi in sequenti nocte, quie-
tus citra offensam dormierit, sanum iā hominem prorsus existimabis. Si vero, qui cruditati succē-
sit, dies cum sequente nocte febrem attulerit, veluti in secundo die, ita tunc & accurandus & nu-
triendus homo est. Si vero & nox tertiæ diei febrile quiddam paululum afferat, ne lic quidem for-
midandum, sed hos quoq; postridie lauabis, nutries q; ac reliqua omnia in illis, vt ante definitum
est, ad portionem exequeris. Sanē mutationes crudi alimenti in acidam qualitatem nec incide-
re in eiusmodi naturis cernuntur, nisi admodum raro, id q; ex cibis, qui prompte acefcunt: nec fe-
brem accendere diariam, æque vt nec tarditas concoctionis: quando, sicubi propter talem crudi-
tatem febricitant, quibus amara bilis in temperamento abundat, obstructionis & humorū putre-
dinis suspicio est. De qua postea diligētius definiam, cum de putredine agam. Nunc huic de dia-
rijs febribus disputationi hoc adiecto, ad alia transibo. Fumidus vapor ex tarditate concoctionis,
aut cruditate, in qua ructus sentiuntur acidi, nunquā excitatur. Quippe frigidi halitus abs talibus
succis ascēdūt, hi q; omnino paucissimi, minime autem vapores multi fumidi q; ac fuliginosi:
cum nec in ijs, quæ extra sunt, aliter aut fumū edi aut fuliginem videas, q̄ fumum ex materijs (vt
ita dicam) semiustis, fuliginem ex immodice assis vltis q;: est nāq; fuligo vapor terrestris, fumus
mistio quædam ex terretri aquea q; substantia. Verum non est, quod hoc loco audire expectes,
aut quemadmodum ijs, qui tarde concoquunt, aut ijs, qui acidum ructant, sit prospiciendum: est
enim de his tractatio ad opus de tuenda sanitate pertinsens. Hic tantum earum cruditatum mētio-
nem faciemus, quas febris subsequitur. Quoniam igitur diaria febris cruditates, quæ cum acido
ructu sunt, non consequitur: quæ vero ex putredine humorum oritur, ea quandoq; sequitur: non
sine ratione in eam tractationē, quæ de illis instituitur, distuli de his cruditatibus præcipere, sed ne
tunc quidē eo modo, quo in sanitatis tuendæ libris. In illis. n. diximus, quæ nā per sanitatē agenda
sint illi, qui cruditate laborat: hic vero, quæ nam in ijs febribus, quæ cruditati superueniunt.

Quo pacto, qui Diaria ex Bubone correpti sunt, sibi ipsis Consulant, ac Diatritarios
vocos irrideant.

CAP. 6.

Dicta mihi fermē sunt de diarijs febribus vniuersa: qñ, qui ex bubone febricitant, medicos;
quid sibi sit agēdum, ne cōsulunt quidē, sed, vbi tum vlceri, quod bubonis occasio fuit, tum
postea buboni ipsi prospexerint, in remissione eius, quæ inciderit, accessionis lauātur. Ac, si quis
tum diatrion vel nominet, omnes irridēt, scholasticum q; appellant, natura (puto) ipsa intelligē-
tes id transmittendum non esse, quod omnino nō erit. Censent q; etiā in omnibus ijs, quæ sen-
sum fugiunt, tales debere esse medicos, quales ipsi sunt in ijs, quæ sensui apparent. Porro in oibus
tales esse, nihil est aliud, q̄ intelligere, quando sit in tertio accessio futura, & quādo futura non sit.

Quin etiam

A. lib. 4. tit.
c. 34. totus.

A Quin etiam, qui refrixerunt, aut vsti sunt, aut fatigati, aut tale quippiam passi, postea vero febricitarunt, hi, vbi in remissione talem itatus quietem, qualis erat per sanitatē, sentiunt, ne tunc quidē eos, qui diatriton nomen, ferre possunt. Quod. n. v'stare sepe soleo, quēlibet priuatum, qui secundum naturam se habeat, quouis sophista veriores opiniones habere, hoc etiam in diuinitissima istorum diatrito videre licet, vt quē ab omnibus, qui naturaliter se habent, sit irrita. Nuper. n. ē plebe quidam, q in splendida cœna prolixius sibi epulis potu q̄ indulgisset, venit domum errabundus, ac manu deductus. Cum autē ea, quibus grauabatur, in ventriculo eius fluitarent, omnia ea euomit: & per noctem quidem febricitauit. Dormiuit autem in magnam partē sequētis diei. Postea surgens, ac paululum inambulans, lauit, risit q̄ eum, qui sibi diatriton manēdam suaserat: illo nanq̄ autore etiam postero die inedia tolerare debuisset. Vt autem (res ipsa monebat, & ipse sua sponte faciebat) lotus & modice cibatus, post somno deditus, eo q̄ in offēse fruēs, mane surrexisset: ad consueta q̄ rediisset etiam in ipsa diatrito, in qua eum tolerare inedia oportuisset, si diatritarijs medicis paruisset, ita enim eos per iocum eleganter nominauit quidam: & quidem cū cœnatus iam ex consuetudine homo esset: accedens facetus ille risum excitauit, cōmemorans, quemadmodum eum, qui tertio ante vesperi vomuisset, oportuisset etiam biduo inedia siccum ^ⁱ Bac sordium plenum tolerare, ad horas q̄ spectantem pro diatritariorum iussu decumbere. Sunt enim, arbitror, vel plebi non obscura, quæ præter rerum euidētiā temere audentur. Atq̄ inde merito alios medicos, alios græce Logiatros, id est verbis tenus medicos esse dicunt. Quomodo enim non iure hac appellatione censeantur, qui ea nesciant, quę nemo ē vulgo ignorat? Quomodo non meritissime irridendi carpendi q̄, qui etiam, cū talia ignorēt, Hippocrati se preponunt? Verum illorum stupiditatem ne Mercurius quidem ipse cum Mulis sanauerit.

De Curanda Diaria in Calidis & Humidis naturis, ac in Habitibus, qui sunt Acquisiti. CAP. 7.

A Bsoluta vero in ijs naturis, quibus amara bilis redundat, (in quibus s. elementum frigidum vincitur à calido, & elementum humidum à sicco) de diarijs febribus disputatione, ad aliud corporum temperamentum transeamus, quod nihil minus, q̄ supra dictum, vitioso est succo, in quo s. calidum præualet frigido, & humidum sicco. Maxime. n. omnium putredinis morbis hæc intemperies ^ⁱ exposita est propterea, q̄ per ipsam sanitatem proxime putredinem accedit: veluti tum ex sudoribus conijcere est, qui grauiter his olent, tum vero ex vrinis, deiectione, atq̄ et ipsa respiratione. Etenim, qualis est hircorum, talis est & talium naturarum temperies. Ideo q̄ prompta est ex qualibet occasione tum alijs multis morbis, tum vero febribus, corripit. Nam, q̄ hac intemperie sunt, cum stipata cutis eorum est, effugere febrem non possunt: sed nec, cum valentem cruditatem contraxerunt, aut perusti {in Sole} fuerunt, aut tale quippiam aliud passi. Ac vitiosis quidem habitibus stipatio cutis plurimum esse incōmoda solet. Ideo q̄, quibus amara redundat bilis, non minus, q̄ qui ad putredinem sunt proni, (Sepedonwdes, id est putredinosos Græci vocant) febribus ijs, quę ex stipata oriuntur cute, patent. At ab nidorosis cruditatibus, quę humide & calidæ naturæ sunt, (quas modo putredinosas propterea vocauī, q̄ succi facillime in ijs putrescant) promptius læduntur. Nam de obstructione quid attinet dicere? quam idcirco maxime febres accendere diximus, q̄ putredinem in ijs, quę non transpirant, corporibus creet. Verum de eiusmodi febribus post agemus. Sanè diarię omnes promptissime in iam dictis temperamentis accendunt, id q̄ ex qualibet earum causarum, quas modo in amara bili vitiatīs naturis retuli: curationem q̄ per similem illis habent, ac in paucis omnino dissidentem. Nam, cum hæc humidiores naturæ sint, magis ferunt, q̄ illæ, famem sitim quę. Itaq̄ minus læduntur hæc, si quando fame per diatritarios crucientur, si modo libera ipsis trāsspiratio non desit. Atque idcirco balneum hi, ceu quod cutim eorum laxet, vel magis, vel certe non minus, q̄ qui amara bili abundant, requirunt: ceu, quod humectet, non requirunt. Quęcunq̄ vero de eiusmodi natura sunt dicta, eadem ^ⁱ De acquisito habitu dicta esse cēsendum. Aliqui enim, quibus boni sunt natura succi, coeuntibus aliquando eodem tempore pluribus siccantibus corpus calfacientibus q̄ causis, in amarę bilis vitiosum habitum mutantur. Da enim venisse hominem estatis tempore in regionem calidam & siccam: esse præterea eodem tempore statum cœli calidum ac siccum: tum vesci eum cibis calidis siccis q̄: cogitare quoq̄, ac trīstari, & vigilare, & irasci, & quā plurimū laborare: fieri autem potest, vt idem homo per id tempus venere sit vsus frequenti, & in Sole maiore ex parte versatus, & medicamenta, quę siccant calfaciant q̄, biberit, veluti aliqui Theriacen, non nulli Ambrosiā, alij Athanasiam, scimus enim profectō medicamenta à iunioribus medicis eiusmodi nominibus vocari: Cui ergo omnia iam dicta per estatem contigerunt, hunc, necesse est, calidum & siccum rediderint, ac propterea eo habitu, qui amara bili abundet, quamuis antea optimi succi fuerit. Itaq̄ etiam ex omnibus supra dictis causis facile febricitauit. Ad eūdem modum, & si quis naturaliter boni sit succi, ac locum temperatum incolat: si illinc se in alterum locum, qui calidus sit & humidus, veris tempore trāsferat, id q̄ statu cœli calido humido q̄: tum omni victus ratione calida humida q̄ vtatur: is quoq̄ similiter illis, qui natura sunt putredinosa, tum cæteris tentabitur morbis, quibus illi: tum febricitabit non solum alijs, sicut illi ex iisdem causis, febribus, sed etiam non minime diarijs, de quibus nunc instituimus.

METHODI MEDENDI

Quæ inter Diarias febres, in Acutas, aut Multorum dierum, promptius, ac facilius pertranscant. CAP. 8. F

† πολυμέρες

Cum vero octo intemperies in vniuersum sint, vt ostendimus, opportunissima ad febres est calida & siccatæ, nisi quis hanc, vt dictum est, cibet, ocissime in ea mutatur diaria febris in acutam. Propinqua huic est, præsertim quod ad febrem attinet, quâuis ad alia sit deterior, calida intemperies & humida. Tertia ab his intemperies est simplex illa, in qua oppositio altera recte se habet, vtq; quæ ex humido & sicco cõstat, in altera calidum exuperat. Quippe opportunior est hæc, q̃ ceteræ, quæ sequuntur, tum vt omnibus supradictis occationibus lædat, tum ex diarijs in plurimum dierum febres transeat: nihil.n. alienum fuerit eas sic appellare. Huic proxima est, quæ in calido & frigido debitum modum seruat, ceterum siccum elementum habet humido præualens. Ab hac deinceps media oïum est, s. quæ mediocritatē in vtraq; oppositione seruat. Quatuor, quæ reliquæ sunt intemperies, neq; facile febribus occasione iam dictarum causarum patent: neq; diaria tentatæ, si in ediam tolerant, in plurimum dierum febres transeunt: Immo aliquæ saltem earum, vbi redundantiam humorum citra corruptelam contraxerunt, (contrahunt aut eiusmodi intemperies assidue) vtilitatē ex inedia sentiunt: ac potissimum, quæ frigida est & humida: ab hac, quæ humida est: tertio loco, quæ frigida: quarto loco, quæ sicca est & frigida. Siquidem post diarias febres disculatas, vbi coactus quispiam nulla necessitate est mirificam diatriton transmittere, alia quidem nulla in frigidis temperamentis ex inedia febris excitabitur: ledetur tamen ipse siccus & frigidus corporis habitus q̃ maxime, vt, nisi longo tempore, redire ad naturam, qui ea sunt intemperie, nō possint. Caterum, si quod forte fortuna his adlit acquisititum humorum vitium, fieri potest, vbi in fame & illou per triduum custodiuntur, vt ex diarijs in plurimum dierum febres immigrēt. At, quæ sicca quidem corporis natura est, sed in altera contrarietate tēperata, ea in lōgioribus inedijs gracilescit magis, q̃ quæ sicca est & frigida: reicitur tñ facilius, cum idoneum nacta est vitium.

Quo pacto Curatio, ac Vicius ratio, instituenda sit, cum Dissidentes Indicationes in Diarijs febribus coerint.

CAP. 9.

Al. Ulceratis

1. de Rat. Vict. in ac. 20. & deinceps. 7^a. 119. a

1. Aph. 16. Ext. ord. 8. h

Enimvero eiusmodi oïbus vicius ratio alteranda est, multo profectò magis, q̃ ijs, de quibus primum omnium est dictum, nempe calido & sicco, item calido & humido. Quippe, qui frigidus & humidus natura est, qm̃ calido sicco q̃ in vtraq; intemperie contrariè est affectus, contrario nimirum vtetur victu. Melius tamen est non absoluto sermone /contrario/ dicere, sed ex solius temperamenti indicatione, quādo ex eo, q̃ eadem febris febricitant, non diuersam, sed omnino eandem sortientur indicationem. Dictum nanq; sæpe numero iam est id, quod secundum naturam est, similia semper postulare: quod præter naturam est, contraria. Siquidem, quod naturaliter se habet, custodire: quod præter naturam est, tollere oportet. Porro febris omnis præter naturam est: ideo q̃ vicius rationem humidam frigidam q̃ exigit. Temperamenta vero ipsa aliàs similia, aliàs postulant contraria. Quæ enim vitio carent, similia perpetuo, quippe quæ seruare expedit: quæ vitium habent (veluti in opere de sanitate tuenda est dictum) aliàs similia, aliàs cōtraria. Id q̃ merito accidit, cum nec ad vnguem naturaliter se habeant, quomodo enim essent vitiosi: nec prorsus præter naturam, qm̃, qui sic attemperati essent, perpetuo ægrotarent. Ergo similia desiderant, tum in alijs, de quibus mox dicetur, tum vero in vlceribus omnibus: monstratum.n. id sæpe numero iam in superioribus est: contraria vero in eo victu, qui per sanitatem adhibetur, veluti in libris de sanitate tuenda, docuimus: sed neq; hæc perpetuo, sed tum, cum corrigere intemperiem eorum studemus. Quippe duplex nobis in ijs, qui sani sunt, finis proponitur: nēpe vel corpus sanum in pristina eius temperie tueri: vel etiā hanc meliorem reddere. Sic igitur, arbitror, in ijs, qui diaria febris laborant, cibandis, vel vni febrili affectui contrarium, vel etiam ipsi laborantis intemperamēto, desumemus. In ea tamen natura, quæ haud dubie in medio temperamento est, ab ipsa febris cōtrariorum indicatione accepta, eatenus humidum frigidum q̃ victum adhibebimus, quatenus siccus calidus q̃, q̃ ante, iam redditum corpus apparet. Verum hoc tum perspicuum, tum indubitatum est. Reuertamur autem rursus ad intēperatas naturas. Nam, quoniam eas (sicut in libris de Sanitate tuenda est proditum) licet &, quales accepimus, seruare, licet & ad melius transferre, satius, arbitror, est, cum planè valent, non cum ægrotant, vel de se queruntur, vicius illis rationem mutare. Gaudet.n. naturæ consuetis semper, vt & Hippocrates || euidentissimis argumentis in libro de acutorum victu adstruxit: & in omnibus, qui se secundum naturam habent, manifeste apparet. Quod nāq; qui sibi iam displicet, extra cœtum eorum, qui secundum naturam habent, sint ponendi, id nemo, qui compos est mentis, dubitet: cæterum, ij an præter naturam se, an non naturaliter solum habeant, id vtq; quis estimandū duxerit. Atqui, si ex ipsa cōsuetudine indicationem aliquā sumi cōueniet, si quidem multo iam tempore intemperatas naturas contrario victu ei, quæ vici, intēperiei cibauimus, ita est, & cum parum ex sententia se habent, faciemus: sin minus, quæ similia temperamento suadet, indicationem preferemus. Ita vero & Hippocrates mihi sentire videt, vbi ait: || Humidus ois vicius febricitantibus est idoneus, potissimum aut pueris, & alijs, qui ita cibari sunt sueti. Febricitantibus.n. in quantum febricitant, ex ipsa contrariorum indicatione humidus vicius conducit: pueris, ex similibus. Eodem aut modo & eā, quæ a consuetudine præbet, quo eā, quæ ab ætate dat, accepit. Nā & ætas, cum ex ijs sit, quæ natura nobis insunt, similem

A 1. 4. f. 1. c. 2. fol. 4

” ”

A similem sibi victū postulat. Et, quæ à consuetudine indicatio sumitur, sic sumpta est, sicut ea, quæ ab ætate: quippe seruare quoq; hanc iubet, perinde ac proprium ætatis tēperamentum. Itaq; etiā nos tum ex oibus, quæ circa agrū spectant, eius, quod conducit, inuentionē moliri: tum, qñ indicationes oēs secum consentiant, & qñ inter se dissentiant, inspicere semp conueniet. Oibus. n. consentientibus, vnā prorsus victus speciem cōstituemus: dissidentibus vero inter se, quæ valentiores, ac plures sint, præferemus ita, vt victus species, quam hæ præscribant, præferat, sic tñ, vt ne cōtraria sit neglecta. Porro prælatio hæc alias vtriusq; in vnus auxiliij materiā mistis perficitur, aliàs seorsum sumptis. Ac cōis quidem hæc ratio est oium, quæ inter se cōplicate sunt, contrariarū indicationum. Quō aut hanc ad vsum conferre oporteat, cū aliqñ ipsi morbi coeuntes sint contrarij: aliqñ morbus vnus sit, sed qui contrariā indicationē subiiciat, aut naturali laborantis tēperamento, aut ei, quod nunc acquisierit: præterea ætati, & cōsuetudini, & regioni, & anni tēpori: in ipsa particulatim tractatione ostendā. Nunc ergo, cū propositū nobis hoc loco sit vnicuiq; memoratorum intēperiei generum idoneum inuenire victum, cōis, quem cœpimus methodi modus, veluti sub exemplo, examinet. Pone. n. correptos febris esse duos homines in regione natos educatos q; tēperata: nunc in ea non esse, immo alterū in calida & sicca, alterum in humida & frigida: **P** præterea eosdem diuerso esse tum tēperamento, tum natura, tum consuetudine, tum ætate: et sub diuerso (si placet) & anni tēpore, & statu cœli egrotare, sic, vt Alter calidus siccus q; natura sit, ac tali victus rationi in totum insueuerit: præterea iuuenis sit, & hieme agrotet, id q; in humida & frigida regione, ac statu cœli simili: Alter humidus & frigidus, simili victu assuetus, tū puer ætate, ac æstate, in calida sicca q; regione, ac simili cœli statu laboret: Quæ nam igitur in vtroq; horū sunt indicationes? Nempe, quæ à febricitando sumitur, cōis amborum est, ac, quæ refrigerent, & humectent, desiderans: reliquorū nulla est præterea cōis. Siquidem Priori & propter naturam, & propter ætatem, quæ simili sibi victu fuere assuetæ, siccioris calidioris q; temperamenti cibus idoneus est: idem q; propter & anni tempus, & statū cœli, & regionem cōuenit: non enim, quæ ab his suppeditatur, indicatio similia desiderat, sed contraria: Alteri ex ppositis, propter ætatem, & naturam, & consuetudinem, similia ipsis exhibenda indicantur: propter ætatem quidem humida, modice q; calida: propter naturam, & consuetudinem humida, & frigida: propter regionem, & anni tempus, & statum cœli, contraria: quæ & ipsa nimirum sunt tanto tēperatis frigidiora & humidiora, quanto regiones ipsæ sunt calidiores tēperatis & sicciores. A consuetudine. n. semp est indicatio similium, quoad s. agrotant homines. A tæte, natura, regione, anni tempore, & statu cœli, vbi temperata hæc sunt, similium semper præsidiorum est indicatio, siue valeat homines, siue egrotent. Contra ab intemperatis anni tempore, statu cœli, & regione, contrariorum est indicatio: ceterum ab ætate & natura non absolute, sed cum consuetudine. Porro nihil in contrarijs indicationibus tam conuenit expendi, q̃ magnitudinem t eorum, quæ ad indicationem coeunt. } Quā vtiq; in libris de sanitate tuenda duplicem esse ostendimus: alteram, quæ ex ipsorū, quæ indicant, dignitatibus censeatur: alteram, quæ ex ipsorum (vt sic dicam) proprijs substantijs spectetur: quas ex conferendo cum mediocri, & quod secundum naturam est, accipiendas esse testati sumus. Nisi enim ita quis indicationum potestates examinet, nequeat sanè mensuram victus inuenire. Cum enim refrigerandum humectandum q; esse febris perpetuo indicet, reliquorum vero quodq; prout dictum est, vbi concursus eorum indicatio est, nullum exhibetur negociū: vbi discors, pro pluribus ac potioribus formari victus ratio debebit. Siquidem in modo propositis, ex eo, quod febricitant, communis refrigerantium ac humectantium indicatio præstatur, non tamen ex cæteris. Sed cuius tum ætas, tum temperamentum vnā cum consuetudine, tum regio, tum anni tempus, & cœli status, humectantia refrigerantia q; exhibenda indicant, hunc haud dubium est non solum humectandum refrigerandum q; esse, sed etiam nec leuiter hæc, nec vtcunq; **D** facienda esse, immo planè magnopere ac vehementer, omnibus scilicet indicationibus idem dicantibus. Cuius vero reliqua omnia refrigerantem quidem humectantem q; victum, quemadmodum & febris, non indicant, sed contrarium ipsi, calfacientem scilicet & siccantem, vtiq; ambiguitas pugna q; indicationū inter se oritur: quo casu magnopere opus est, tum numerum indicationum, tum magnitudinē, simul conferas. Quippe, quæ à febris sumitur, ea reliquis, qñ omnes cōtrarium faciendum præscribunt, numero quidē inferior est: magnitudine tñ, quæ ex dignitate, aut potestate, aut quomodocunq; appellatæ libet, spectatur, vtiq; superior est, potissimum, si longe à natura recessit: quippe duplex tum magnitudo illi accedit, & quæ ex febris genere puenit, quæ omnibus est cōis: & quæ propria, sua q; ipsius est. Siquidem, & quia febris plus ceteris omnibus sollicitos nos habet: & quia, præterquam, q febris est, etiā magnitudo illi notabilis accessit: idcirco contrarias indicationes inducit, atq; obumbrat. Sin parua fuerit, fas est reliquas omnes vnā coniunctas cū ea conferri, atq; expēdi. Ac, si quidē pares videantur, neq; febris indicatio præferet sic, vt humectandum & refrigerandum sit: neq; etiam reliquorum sic, vt calfaciendum ac siccandum sit: immo media victus ratio, vbi ita se corpus habet, eligēda erit. Sin altera indicatio exuperet, tātum recessisse à temperato & medio victu par est, quantum ea, quæ pollent, sua cōtraria superant. Ergo tum exercitatum in his oibus, tum natura prudentem, esse medicū conueniet, quod cuiusq; indicationis

* Quidam cod
grati habent,
sombu d' taw
ut Linacur ac
tit. aly d' sa-
trua d' or xg
sombu d' taw,
i. uictus rōmū,
et præsidiorū.
aly d' sa-
trua solū, ut d'
Aldinu: que
melior lectio
uideretur.

† Ita legēdum
esse, vt Linacur
vertit, tū ex co-
dicibus grecis,
tū magis ex li-
bro tertio de si-
mitate tuenda
patet, vbi de
hoc diffuse tra-
ctatur. Neq; n.
legendum est
taw suppe-
pōtaw, i. eorū,
quæ cōferunt.

METHODI MEDENDI

* scopis.

indicationis potestate diligenter considerata, omnibus q̄ inter se collatis, vnā idonei victus sum-
mam, quę laboranti sit cōmoda, comparet. Ac diariarum quidem febrium indicationes ex his ge-
nēribus capiuntur, raro q̄ accidit, (si alicubi) à laborātis virium modo: cum febrīū, quę pluribus
diebus affligunt, indicationes, tum viriū respectum necessario adhibeant, (non enim leue in his
consilium est, quod à viribus petitur) tum causarum, quę ipsas excitant, exceptis tamen hecticis:
vtpote quas nulla accendit causa, quęadmodum nec corpus id, quod iam habitu calorem ignis in
se suscepit, siue id lapis, siue lignum sit. Illud nāq̄ cōe cum diarijs habent, q̄ videlicet nō amplius
fiant. Differunt autem in eo, q̄ diarię in leui (vt sic dicam) affectu (κατὰ χείρον Gręci vocant) ca-
lorem habent: hæcticę in habitu, qui ægre soluitur. Licet etiam, dicas eam quoq̄, quę à viribus
sumitur, indicationem tum in reliquis omnibus morbis, tum in diarijs febribus, semp adhiberi:
nobis tamen in præsentī disputatione opus ea non esse propterea, q̄ ex prima quidem ratione nō
indicet, ex accidenti vero indicet. De eo vero accidente in sequentibus differemus.

GALENI METHODI MEDENDI

ID EST DE MORBIS CVRANDIS

F,

LIBER NONVS

ARGVMENTVM LIBRI

Curandi ratio Febrium Continentium: ac Ordo, & dignitas Indicationum,
quibus curatio vniuersa continetur.

De Transitu Diariarum in alias febres, ac de ipsarum Perduratione.

CAP. I.

* τὴν τῆς θερα-
πείας μέθο-
δον.



Diariarum, o Eugeniane, curatiōnē in libro, q̄ hunc præcedit, exposui, totius p-
positi operis octauo. Est aut̄ huius febrīū generis vnica accessio, vno pluri-
mum die ex ipsius saltē natura circumscripta. Quippe, q̄cunq̄ vel per medi-
corum ignorantia, vel egrorum intemperatiam, vel ministratium errorem,
in eiusmodi febribus cōmissa in aliud ipsas genus transferūt, hæc suę nature
sponte nō incidunt. Non. n. est profectō mirū, si per ea, q̄ delinquantur, nō G
solum porrigat, aut in aliud genus trāseat, morbus quis, sed ēt, cum prius nō
esset, nunc exciteat. Nā cum ijs, q̄ integri sunt, delinquere non sit tutū, haud-
quaquā id egris sine discrimine cōtingat. Reliqua vero cū sint genera duo, (veluti in libro de fe-
brium differētijs est ostēsum) alterū ex humorū putredine nasci docuimus: alterū, quod iā solidas
aialis particulas occupauit, hecticū noiant. Transeunt sæpe aut̄ diarię febres, veluti superius osten-
dimus, in vtrūq̄ genus, nisi quis eas cōmode tractet. Veluti aut̄ in ceteris rebus oībus, quęcunq̄
vno genere cōprehensę societate in naturis habēt, ac propterea mutuo in se transire valent, tertia
quādā formula in transitu ipsarū existit, q̄ neutrius extremitatū formā planē exhibet: ita nimirū
& in diariarū febrīum transitu imaginēris, licet, alterū quoddā genus in trālitu exoriri, quod neu-
tri extremitatū sit idē. Ac primū quidē de hoc disserendū esse mihi videt: quod, sicuti reliqua, ēt ip-
sum tū protinus noscat, cū incidit: tū sic inhibeat in primo ortu, ne aut egre sanabile, aut insanabi-
le post, q̄ auctum est, euadat. Ceterum, mediū id cum inciderit, nec nosse ij possunt, nec sanare, qui
extremitatū, quarum est mediū, speciem ignorāt. At tibi, qui præsertim nō solum diariarum, sed
etiam reliquorum durū generum, notas intelligis, vbi vel diariarum notæ aliquatenus sunt alie-
natæ, vel reliquarum notæ simul apparent, haud difficile fuerit iam transitum suspicari. Ergo ex H
adustione, cruditate, lassitudine, vigilia, animi perturbatione, vel bubone, qui ex euidenti aliqua
sit causa, nunquam ad tertium vsq̄ diem progredietur febris accessio, nisi quid delictum circa la-
borantem sit. At, quibus stipatio febris occasio est, ijs etiā vltra hos porrigi accessio potest. Nam,
qm̄ stipatio vel obstructis exilibus meatibus, vel cōniuentibus, vel etiam corpore ipso immode-
ratius densato accidit, merito, arbitror, diximus ex frigore & balneis, quę vel contactu refrige-
rent, vel facultate: præterea pharmacis similis generis: pari modo ijs, quę cutim siccant, veluti so-
le feruente: nec minus ēt ijs, quę densent, veluti dura cum ijs, quę frige faciant, frictione: & deti-
neri intra corpus ceu fumida fuliginosa ue excrementa, & ab ijs febrē accendi: Verū ex his densa-
tionem quādam corporum ipsorum fieri, ac veluti exiguiorum meatuum cōniuentiam: obstru-
ctionem vero vel pp glutinosos, vel crassos, vel copiosos succos incidere: Quin etiam febres, quas
cunq̄ vel cōniuentia meatuum, vel recens corporum densatio excitant, has & delistere post pri-
mam accessionē, si quis recte eas tractet, & vere diarias tū esse, tum appellari: at, quę ex obstructio-
ne creant, si hæc pusilla sit, solui ipsas quoq̄ similiter, vt alias diarias, si quis eas legitime sanet: sin
valenter impacti humores sint sic, vt valētius aliquid, quod eos eximat, deliderent, eas febres por-
rigi vltra vnum diem necesse est, ac diariarum febrīum genus videri egressas. Quomodo. n. dici
vltra

A. lib. 4. fol. 16.

A. li. 4. fol. 16.

Altra diaria febris potest, quæ in tertium vsq; diem extenditur, quando ex ipsa nominis ratione in secundo eam deliterere par erat: Dictum enim supra est vigintiquatuor horas esse sic appellatæ diei spatium, utiq; ut cum nomine diei quoq; vnâ comprehendatur. Atqui, si neq; humor putrescens sublit, nec corpus ipsum febrilem calorem, ut habitū, susceperit, à duobus generibus diuersum sit. Aut ergo aliud præter tria iam dicta genus esse in prima febrium diuisione dicendum est: aut appellatione pro nihilo habita diarias ipsas nominare oportebit. Neq; enim profectio de substantia ipsa talium febrium est diariæ vocabulum: verum conuenienti nomine destituti, clarioris simul breuioris q; doctrinæ gratia, ab eo, quod sæpius eis accidit, nomen indidimus. Ac natura quidem eadem his est, quæ diarijs, nomen autem non idem.

Quæ sint Febres, quæ Synochi appellantur, & quæ ipsarum enumerentur inter diarias. CAP. 2.

Siquidem, in quibus vnâ accessio ab initio ad finem perpetuo manēs, in multos dies porrigit, eas febres synochos, id est continentes, appellat, non illi quidem græco nomine vsi, cæterum solœcismum committendum potius rati, q; formam ipsarum sine nomine linquendum. At non, sicuti idea vnâ eiusmodi febriū est, à qua synochos eas nominant, ita & natura simplex vnâ q; est. Quædam nāq; earum manifestam habent putredinis notam: quædam prorsus non habent, quas **B**nimirum ex diariarum febrium genere esse diximus. Cum. n. accessionis remissio ex feruentium humorum transpiratu contingere soleat, non trāspirant autem in vehementi stipatione, necesse est multorum dierum fieri accessionem. Igitur, vbi in tali febre nulla subest occasio, quæ alterius accessionis principium excitet, vltra hoc, q; multorum dierum febris est, nec inualionem alicuius febrium significationis facit, sed permanet ab initio ad finem vnâ febris, quæ nec quotidianæ, nec tertianæ, nec quartanæ notam præferat. Cæterum, cum me audis dicentem, vbi vehementer stipata corpora sunt, cohiberi intra corpus febrile calorem, non ita factam prorsus densitudinem putandum est, ut nullum ex ijs humoribus, qui tenuati admodum sint, effluere foras sinat: cum nec, si de ossibus ita dixeris, id verum sit, nedum carne & cute. Verū, cū à feruentibus humoribus vapor attollatur plurimus, effluat aut foras exiguus, hunc, qui relictus est, febrem seruare est necesse, neq; id modo propterea, q; ipse manet, sed etiam propterea, q; quæ proxima sunt, adurit.

Quo pacto Febris Contingens cum putredine, aut sine putredine oritur. CAP. 3.

Quoniam igitur ex duobus his seruari febris potest, & q; totus vapor non trāspiret, & q; idē vapor ea, quæ contingit, etiam excalfaciat, necesse est tres esse in synochis febribus differentias: nempe vel pari permāente magnitudine ea, quam in prima accessione summā habuit: vel adijciente semper exiguum aliquid, diminuentē: ut: atque hæc vel æqualiter faciente, vel inequaliter. Ac, si quidem, quod accenditur, ei, quod transpirat, par fuerit, nec augeri, nec minui febrilis calor cerneat, sed perinde sibi similis permanebit, ac si nihil illi prorsus adijceretur, aut demeretur. Quippe ad equalitatis custodiam, nihil interest, seruetur ne eadem assidue substantia: an ei, quæ vacuat, par sit ea, quæ adijciatur. Verum, si altera earū vicerit, utiq; si, quæ vacuatur, minui febrem necesse est: sin, quæ adijcitur, oīno incrementum. Sed nec illud sanē quēquam latet, q; cum ex febribus altera magis minus ve, q; altera, tum augetur, tum minuitur, id ob exuperantiē imparitatem necessario accidat. Nam, vbi aliās ampliote mensura, aliās minore, vel febrium generatio, vel transpiratio exuperat, nec ijs, quæ augētur, oībus par esse auctio: nec ijs, quæ minuuntur, demptio, oīno potest: immo plurimā esse tum excessus, tum defectus, differentiam est necesse. Atq; vnum quidem hoc (siue genus, siue speciem, seu quiduis aliud appellare libet) *συνόχων*, id est continētium febrium est, quod q; ex eadem cum diarijs natura constet. Alterum est, vbi in oībus va-
D& copiosum sit, & calidum: nec humorū putredo in oēs, quæ inter inguina & alas intersunt, venas æqualiter ac cito porrigi in frigido habitu potest. Debent enim {semper} quæ putrescūt, tum calida humida q; esse, tum vero difficilem transpirationem habere. Eo q; fit, ut nec in frigida ætate, nec in frigido corporis temperamēto, siue id ab initio cōstitit, siue modo frigidum sit tactum, continēs excitetur febris: Sed nec in gracilibus, vel qui raro sunt corporis habitu: Immo tū ætate, tum natura, tum acquisitio temperamēto, quæ calida sint, ac præcipue si & carnosus, & bono ac multo sanguine affluens, & denso corpore æger sit, aut etiam calidis excrementis repletus. Proinde fit, ut, qui ita febricitant, ijs & pulsus maximus sit & æqualis, & vehemens: quibus etiam arteriæ habitus, nec durior, q; pro natura, est, nec mollior, celeritatis tamen frequentia q; eō peruenit, quod febris ipsa magnitudinis. Atq; hæc quidem ambarum sunt cōmunia: alteri vero priuatim putredinis insunt notæ, id q; tum in lotio, tum pulsu, tum caloris ingrata qualitate.

Adolescens duorum Curatio, quorum alter Continente sine putredine, alter cum putredine, febricitabat. CAP. 4.

Ac tibi exēpli causa redigā in memoriā adolescentes duos, quos vnâ mecū vidisti. Erat alter eorum liber, & palæstræ peritus: alter seruus, haud inexercitatus ille quidē, cæterū in palæstra parū vehemēs, nec tū ad quotidiana, quæ seruū deceant, tum exercitia tū opera tractanda, non idoneus.

METHODI MEDENDI

idoneus. Porro liber contenti citra putredinem febris laborauit: seruus contenti cum putredi E
ne. Horum vtrique quæ nam sit adhibita curatio, non intempestiuum dictu nunc arbitror, quando
quidem in exemplis exercitari, quiduis discens maxime expedit: neque. n. satisfaciunt ad ex-
actam cognitionem vniuersales methodi. Sunt autem exemplorum ea pro potioribus habenda,
quæ ipsi oculis vsurpauimus: quando, si omnes, qui docere scribere' ue aliquid sunt aggressi, ea
prius, operibus ostendissent, prorsus paucula quædam falso dicerentur. Nunc vero plerique alios
docere tentant, quæ nec ipsi vnquam fecerunt, nec alijs ostenderunt. Ceteru vulgus medicorum,
nihil miri est, si contemptis bonis moribus, opinionî sapientiæ magis, quàm veritati, inhiat. Ve-
rum non sic fuit ratio nostra. Non enim heri, aut nudius tertius, sed itatum ab adolescentia, philo-
sophiæ studio capti, primum nos ad eam contulimus: Mox patris euidenti infomnio moniti ad
medicinæ studium excolendum venimus, ac per totam vitam operibus magis, q̃ verbis, vtrique
studio incubuimus. Quo minus mirum est, si, in quo tempore alij totam vrbē salutando lustrant,
& cum diuitibus cœnant, ac eosdem comitantur, hoc omni nos sedulo laborantes, primum qui-
dem omnia, quæ veteribus pulchre sunt inuēta, didicimus: mox eadem opere tum indicaui-
mus, tum exercuimus. Ergo, qui palæstræ peritus iuuenis erat, vbi febricitare hora prima noctis cœ-
pisset, postridie eum mane circiter horam diei tertiam vidimus. Cum autem inuenissem febrem F
admodum calidā, sed pulsus æquales, & maximos, & celeres, & frequentes, & vehementes: tum
caloris qualitatem, quæ tactum minime morderet: iam vero & vrinas tum crassitudine, tum colo-
re, à naturali habitu non multum alienas: audiens præterea hominem circiter triginta dies exerci-
tationis consuetudinem intermisisse, pridie tamen exercitasse se vehementius, cæterum non mul-
tum: sumpsisse autem solitos cibos, atq; eos concoxisse, quamuis tarde & ægre, vtpote cum febris
vespere occupasset: cum interim rubicundus plenus q̃ homo appareret, atq; etiam plenitudinis
sensum se percipere diceret: faciente interim quodam eorum, qui aderant, de vena secanda men-
tionem: visum nobis est eius auxiliij considerationem in aliud tempus remittere, simul vt certius
sciremus, cuius generis febris esset: simul necessario propter eam, quæ præcellerat, concoctionis
tarditatem. Cum autem vesperî similem vigorem tueri febris est visa, ceu nihil sensibilibiter remit-
tens, suspicio iam erat synochon esse, hanc q̃ ex obstructione, & sanguinis abundantia, & præ car-
nis copia stipatione. Ac, cum parem magnitudinem per totam noctem febris seruaret, postero
die visum est medicis omnibus, qui cum inuiserant, sanguinem esse mittendum. Discordia verò
orta de tempore: & vincētibus, qui id in sequentē diem differendum suaderent: febris per totum
eum diem euidenter visa est vigorem suum augere. Mox tertia sequente nocte, alia quidem ac- G
cessio minime incidit, quæ primæ ad portionem responderet: erat tamen æstus ipse laboranti in-
tolerabilis: vrgebat q̃ cum tensio totius corporis, vtpote repleti, tum capitis pulsatio: atq; ob hæc
grauis vigilia, iuvene in aliam aliàs se figuram iactante. Itaq; cum ultra ferre non posset, hora no-
ctis circiter octaua mittit ad me ministrum, rogat q̃, ad se ocyus veniam. Ipse annuo, atq; ab eo, in-
uenio q̃ febrem calidissimam, pulsum q̃, qualem prædixi. Quoniam autem nec in hoc, nec in lo-
tio, nec in ipsa caloris qualitate, indicium aliquod humorum putrescentiū apparuit, optimum fa-
ctu visum est venam incidere ante, q̃ putredo inciperet. Aufero itaq; ab homine eousq; de indu-
stria sanguinem, quoad animo linqueretur, maximum planè vbi valentes vires sunt, continentis
febris remedium: id quod tum ratione, tum experientia didici. Primum nanque in contrarium
statum agitur corpus, celerrime ex animi defectu refrigeratum. Hoc vero nemo inuenire potest,
neq; quod ipsis ægris, neq; quod nature, quæ animantes gubernat, iucundius vilius' ve sit. Post-
modum in eiusmodi corporibus necessario superuenit alui deiectio, non nunq̃ etiam bilis vom-
itio: quas res statim à toto corpore madores sudores' ue excipiunt. Quæ nimiru oia, cū huic quoq;
contigissent, protinus febrem extinxerunt sic, vt quidam ex ijs, qui aderāt, iugulasse me febrem per
iocū dicerēt: vnde oēs risimus. Verum, quò narrationem oēm absoluam, nihil mali erit paucula H
addidisse. Post duas nanq; à sanguinis missione horas paulo nutrimenti dato, ac iusso quiescere,
discessi. Quinta vero hora reuersus, tam profundo somno indormientem inueni, vt tangentem
me prorsus non sentiret. Cum vero & ministri adeo illi altum somnum fuisse dicerent, vt nec, cū
madores eius abstergerent, expergisceretur, suasi ita facerent: esse nanq; hominem iam prorsus à
febris liberū. Reuersus aut̃ & decima rursus hora, et tunc dormientem inueni. Egressus aut̃ iterū
ad alios visendos ægros, redeo hora prima noctis, non tamen, vt ante, tacēs, sed voce de industria
sublata, quò ægrum à somno excitarem. Quod cum ita accidisset, vbi solo ptisanæ cremore ipsum
nutriui, abij. Cuius modum postero die augens, tertio lauatum dimisi. Ac, quæ ad hunc pertine-
bant infirmum, ita sunt gesta. Quæ vero ad alterum, nunc dicam. Is, cum toto die multum labo-
rasset, deinde lauatus paucula comedisset, cœpit nocte febricitare, totum et̃ continuans sequentem
diem. Hunc nos post secundā noctē vidimus, in cæteris quidē oibus iā dicto iuueni similiter asse-
ctum, verū putrescentiū humorū euidentes præbentem notas. Itaq; vena quoq; huic protinus incisa
vsq; ad animi defectū vacuauimus. Post id, idoneo interposito spatio, cibauimus primū mulla:
deinde vna interposita hora, ptisanæ cremore. Atq; hæc oia intra quintā acta sunt horā. Cum aut̃
similis sibi perseveraret febris, synochon eā fore ex putredine expectauimus. Ita q̃ accidit. Quip-
pe cum

* εὐπντα est
impressis, ut
Linacur: εἰπ-
τα, i. dicta, est
in manuscript.

A. I. 4f 2c
44. fo. 4 d

Ape cum eam secunda noctis hora pari magnitudine cerneremus, tertiæ dici accessionē, futura ne esset, an secus, diligenter obseruare volebamus: cuius in septimam horā noctis suspicio erat. Itaq3, cum summo mane superuenissem, inueni, quod expectarā. Nam nec tertiana inciderat accessio: febris q3 remissior paululo, q̄ vesperi fuerat, apparuit. Vt autem rursus hoīem meridie vidī: eratq3 iam certissimū & febrē decreuisse, & synochon febrem esse, sed quæ {assidue} decresceret: satius visum est tum quoq3 hoīem similiter nutrire. Quarta vero exacta nocte, manifeste minor etiam quarto die erat. Quo rursus quoq3 ad eūdem modum homine cibato, aduertimus tum illo die toto, tum, quæ hunc secuta est, quinta nocte magnitudinē remittere sic, vt quinto die liquido planē appareret minor esse febris, q̄ ante. Ita q3 ad portionē minuentis se febris, vrinæ quoq3 concoctio processerat. Erat q3 haud obscurum septimo (id quod factum est) finiendā. Hanc igitur planē cōtinentem ex humorum putredine febrem, & quæ assidue decresceret, vidimus. Multas vero alias continentes conspeximus, † quarū aliæ crescentes: aliæ similem tenorē seruātes erant (illas Epacmasticas, has Acmaisticas vel Homotonus Græci vocant:) alię, ceu quam modo memorauimus, decrescentes, quas Paracmaisticas dicūt. Alię rursus in primo die putredinis notas habuerunt: alię in tertio, aut certe ad summum quarto, id q3 aliās medicorum ipsorum inscitia, qui sanguinem nō miserāt, aliās laborantiū ipsorum timiditate. Siquidē eorū, qui ex sola obstructione febricitarēt, nemo in putredinis febrem incidit, qui prius sanguinem miserat. Quem, vbi valida virtus subest, & etas permittit, vsq3 ad animi defectum mittere expedit: vbi horū alterū non satis respondet, tutius, est quantū satis visum fuerit, tñ principio detrahare: quod defuit, iteratiōe supplere. Etenim hoc p̄sidio omisso, qui ita febricitant, in summū discrimen veniunt, nisi si eos vel virium robur, vel largum sanguinis † profluuiū, vel sudor copiosus, ex manifesta perniciē eripiat. Et tñ non nulli ex medicis sunt, qui, tamēli manifestissime vident naturā sanguinis profluuiū non paucos eorum, qui sic periclitentur, seruare, tñ sanguinis missiōe fugiant, nullam nec experientiā, nec verā rationē secuti. Cæterū hos mittamus, disputato præsertim contra illos abunde vno integro libro, qui est de sanguinis missione contra Erasistratum scriptus: ipsi vero ad propositum reuertamur.

De Ratione curandi Continentes Febres per Venæ sectionem & Frigidæ exhibitionem. CAP. 5.

ERat vero in præsentī disputatione propositū de ijs febribus differere, quæ ex stipatis p̄ obstructionem meatibus oriunt. Quas, si sine putredine consistant, ex diariarum esse genere dixi: sin ijs putredo aliqua vel ab initio statim, vel postmodum superueniat, vbi in oībus venis, ac præcipue magnis ea constitit, continentes excitari febres: vbi in vnica animalis parte, febres, quæ certo ambitu accedant. Verum de his postea. Quod autē & bis, arbitror, & ter, & sæpius, iterum q3, dicendum est, qui ita laborant, si recte curabūtur, ijs sanguinis missio est adhibenda: qñ, quibus corpus ex succorum abundantia inhabile ad transpirationem iam redditum, tñ caloris congestit, vt inde iam febricitet, ijs tñ sanguinis est detrahendum, quantum vires tolerāt. Pro certo quoq3 habendum, nisi ijs, qui hoc per naturā sunt habitu, id adhibeatur p̄sidium, fore, vt vel suffocētur, vel certe syncope prehendi oīno periclitētur, nisi (vt dictum est) eos vel virium robur, vel plurimus sudor, vel largum sanguinis profluuiū, à morte vindicet. At illud vel me tacente constat, ijs præsertim, qui librū de plenitudine studiosē perlegerunt, quanq̄ & nunc quoq3 à me dicetur, nō esse nunc nobis de ea abundantia sermonem, quæ ad virtutē comparat, (quippe quæ nec sic obstruit venarū ora, vt refrigerationem prohibeat, nec tunicas earum distendit, nec ruborē nec tumorem inuehit, multo q3 minus vel carnis vel cutis transpirationem moratur) verum de ea, quæ cōtineri à vasīs ultra nō valet: quæ q3 ob id ipsum tum perrumpere vasa, tum recludere solet: reliquā q3 modo dicta symptomata inducit, obstructionem, distensionem, tumore, ruborem: de hac, inquā, mihi omnis sermo tum habitus est, tum vero nihilo minus habēdus. Siquidem copia hæc, dum bonitatem suam seruat, vt pariter augeri cum robore virium est nata, ita, siquādo has grauat, nec de cætero augebitur, & bonitatem naturæ amittet. At, si † naturalem semel bonitatem amiserit, fieri nequit, vt non putrescat: quandoquidē nec aliud vllum ex ijs, quæ foris sunt, humidū calidum q3 corpus manere imputrescibile cernimus. Ergo festinare ad sanguinem detrahendū oportet, quod venarum natura ex transpirando ventilādo q3 naturalem temperiem seruās, humoribus eo, quo inter initia, modo dominetur: qñ, si ad intemperie versā laborabit, metuendū est, ne hi putrescant. Excitatur autē intemperies in ea ex febris calore. Quem, siqñ rudis quispiam medicus auxit, non vacuata stipationis causa, in incerto reliquum omne remedium est. Vbi nanq3 emitti abundantia postulat, calor autē refrigerari, pugna discordia q3 inter ipsa sanandi oritur remedia, scilicet ijs, quæ refrigerent, quamuis temperiem naturæ concilient, saltem abundantiam intra corpus detinentibus: quæ vero rarefacienda cute hanc educant, oībus calfacientibus, sic, vt, si abundantia emittere velis, febrem augeas: si febrem refrigerare, abundantiam moreris. In hanc consilij inopiam deueniunt, qui statim à principio non vacuarunt, Erasistrati persuasionē inducēti: qui nec spontanea sanguinis profluvia potuit imitari. Optimum igitur factū est (id quod nos semper in re quaq3 facere viduim) statim non numero dierum, sed vni virium robori, in febribus eius generis attentum esse: quippe quod si seruatum est, non solum sexto septimo ue, sed etiam sequentibus diebus sanguis est mittendus. Quod si curare aliquando infirmum cogeris, cui non solū antea secandę venę

† τὸν μὲν
πακμαστικὴν
τὴν δὲ ὁμοτό-
νην ἢ ακμασι-
κόν, ἢ ὅπως
ἀντὶς ἐθέλοι
καλεῖν. ἐνίοις
δ' ὡς περὶ τῆς
τοσούτου προειρη-
μένου, πακμα-
στικῆς.

† τὸν ἐκ τῆς
φύσεως κόσ-
μον ἀπολέ-
σαι.
* τὸν ἀγγύων
i. vasorum.

remedium prætermiſſum eſt, ſed nunc quoq; vel per medicorum ignorantiã, vel ipſius laboran-
tis propinquorum ue eius timiditatem procedẽte tempore mittere ſanguinem prohiberis, ad fri-
gidam exhibendam accedes, ſed diligenter ante diſcernens, quantum ex ea nocumentum contin-
gere poſſit. Nam, ſi id aut exiguum erit, aut nullũ, offerẽda potui eſt, quæ proriſus ſit gelida, quan-
tum bibere ægro libet: quinimmo magis id audebis, ſi frigide potioni inſueuerit. Sin magnum ti-
metur incommodum, ab hac quidẽ abſtinendum, atq; alijs auxilijs, quibus obſtructio eximatur,
& abundantia vacuetur, & febris feruor deferbeat, vtendum. Porro incõmoda, quæ frigidam po-
tionem intempeſtiue immodicę quę exhibitam ſequuntur, in hiſ conſiſtunt, q̃ lentos craſſos q̃
humores, ſiue hi obſtructiones, ſiue putredinẽ, ſiue phlegmonen: ſiue, qualis eryſipelas, aut ſcir-
rhus, aut oedema eſt, affectum creauerint: attenuari digeri q̃ prohibet. Ergo, quoties ex hiſ febris
accenditur, atq; ad eos vacuandos frigida data non conducit, ad præſens quidem non paruum af-
fert leuamen propterea, q̃ iam accenſam febrem extinguit: verum, cum cauſa eius adhuc perſtet,
aliã denuo accendi eſt neceſſe, atq; ea, quæ præceſſit, non nunquam difficiliorem, propterea, q̃
denſatum ex frigida corpus eſt. Atq; hæc vna noxã ſpecies eſt minime contemnẽda. Altera talis
eſt. Multæ laborantis imbecillæ particulæ, ſiue ita ſe ex naturali intemperie habeant, ſiue ex vitio
adſcititio, à frigida lædunt. Alij nanq; gula adeo vehemẽter eſt affecta, vt vix deglutiret: Alij ven-
triculus ſic, vt vix concoqueret: Alij ipſum vetriculi os, aut iecur, aut colon, aut pulmo, aut ſeptũ
tranſuerſum, aut renes, aut veſica, aut tale quippiam aliud à frigida percuſſum, ad proprium opus
infirmum eſt redditum. Non nulli autem ex intempeſtiua immodica q̃ eius potione, non multo
interpoſito tempore, nec poſtmodum, ſed ilico, difficultate ſpirandi, & conuulſione, & tremore
corripuntur: ac toto (vt ſemel dicam) neruoſo genere læduntur. Nec ignoro, q̃ formidoloſum te
ad frigidam offerendam ex ijs, quæ memorauĩ, redderem, niſi ea me vltimũ ſubinde vidiffes, ſem-
per q̃ cum ſucceſſu, nec ægrum in vltimo manifeſte læſiſſe. Quibuſcũq; enim in principe particula
tumor aliquis eſt phlegmones, oedematos, aut ſcirri genere conſtitit, ijs frigidam offerre nõ opor-
tet: ſed nec ijs, quibus obſtructio putridus ue humor non concoctus incommodat. Quod ſi eu-
dentes percipis abſq; iam dictis tumoribus concoctionis notas, illud duntaxat æſtimabis, ſit ne
pars aliqua temperamento adeo frigido, vt in hanc noxã procumbat. Porro eryſipelas, quod ve-
rum eryſipelas ſit, non aliter ſanaueris: at, ſi miſtum cũ phlegmone ſit, in hoc concoctionis expe-
ctandæ ſunt notæ. Atq; hæc latius, q̃ pro re nunc propoſita, cum poſtmodum etiã forte neceſ-
ſum erit de frigida exhibenda mentionem facere. Nunc enim altera continentium febrium ex ſo-
la obſtructione eſt orta: altera vero etiã cum putredine per oẽs venas. Cum ergo concoctionis
humorum in ijs notas videris, de quibus dictum abunde in libris de Criſi eſt, audacter frigidam
dabis: quippe ſolidarũ animalis partium natura roborata prætenuatos iam humores aggreditur
ita, vt, qui vtilis ſint, atq; ad nutriendum habiles, hos quidem ad ſe trahat: inutiles vel per vetricem
vel per cutim eiciat. Quod ſi etiã frigida aſſuetus æger fuit, magna cum fiducia frigidam exhi-
bebis, ipſa ſcilicet experientia iam doctus omnia viſcera eius occuſum familiariter tolerare. Om-
nino nanq; ſiquod frigidum adeo eſſet, vt ab hac offenderetur, id per ſanitatis tempus euidenter
offenſam ſuam oſendiſſet: nulla vero per ſanitatem particula quicquam ab hac læſa, nec etiã
inter febricitandum quicq; lædatur. Vbi nanq; nõ nulli aquæ frigide potioni non aſſueti, tñ pro-
pter ardentẽ febrem eam bibere coacti, nullum incommodum ſenſerunt, multo profecto minus
eorum, qui aſſueuerunt, quiſquam lædi debet: cui etiã quali pro munimento maximo accedit ipſa
caloris copia. Hic nãq; cum in vaſorum ſinibus plurimus cõtineatur, vt pote tum aerea in hiſ ſub-
ſtantia, tum etiã ſuccis omnibus inflammatiſ, quantum ab frigido patitur refrigeratus, tñ rur-
ſus caſſaciendo in ipſum agit. Ideo q̃ minus tuta ijs, qui exiguum ſanguinem carnem q̃ obtinẽt,
frigida potio eſt: celeriter nãq; ad ſolidas animalis peruenit partes, nulli, quod eius vim frangat,
occurrẽs. Eo etiã ſit, vt hecũcũq; febres nec perinde eam, quæ proriſus ſit gelida, nec multam, de-
ſiderent: ceu quę extenuatis oĩno, exigui q̃ ſanguinis corporibus, incidãt. Verũ de illis poſt age-
tur. Maxima vero continentium febrium remedia hæc duo ſunt, detractio ſanguinis, & potio fri-
gida. Verum illa nullo non tempore, modo vires ſuſtineant: hæc, cum & in pulſu, & vrinis, cõco-
ctionis euidentes cernuntur notæ, febris autem eſt maxima. Attendenda vero cum venę ſecan-
dæ indicationibus ſunt, tum quæ eam præcedunt: tum vero, quę omnino excipient. Nam, ſi præ-
cedat ciborum cruditas, tanto tẽpore diſſerre venę ſectiõẽ iubebis, quantum ſatiſfacere tum ad
eorum concoctionem, tum vt excrementa deſcendant, videbitur. Sin ſequetur neceſſario vacuatio
quæpiam, tñ illi de eo, quod ſuperfluum eſt, relinquendum, quantum eſt p̃ eam vacuandum. Itaq;
ſi tempore mittendi ſanguinis menſes moueri contigerit, ſiue etiã hæmorrhoids ſit recluſa, ſi in-
ſpectus fluentis impetus ſatis fore videbitur, qui ſolus, quod requiris, vacuet, naturę rem omnem
permittes: ſin minus, tñ ipſe detrahes, quo ex cõtinctis ambobus perficiatur, quod poſtulas. Ve-
luti autem in hiſ ad ipſam naturalem vacuationem, quę ſenſu vſurpetur, non leuiter attẽtum eſſe
oportet, ita alibi vel ad naturam ipſam, vel etatẽ, vel cœli ſtatum. Sunt enim non nulli ad exhala-
dos digerendos q̃ corporis ſuccos natura propenſi: pueri certe propter ætatem perpetuo: cœli
vero ſtans, vbi calidus nimium eſt & ſiccus. Voco cœli ſtatum ipſam ambiẽtis nos aeris tempe-
riem:

† Linacẽr ver-
tit vt impreſſi
legunt, antiqui
addunt & πoλ
λός, i. & mul-
tos.

A.L.4 f. 16.
7. fol. 4.

A.L. 1. 1. 1.
645. 1411.

Ariem: sub qua & anni tempus, & regio comprehenditur: quando horū quoq; vtrunq; ex ambien-
tis temperie indicationem mutuatur. Propensi autē ad digerendos corporis succos sunt, quicunq;
natura sunt humidi: magis q̄ si accedat caliditas: Præterea, qui raro corporis sunt textu: Ad hæc,
quibus os ventris aut amara bili abundat, aut imbecillum est, aut supra modū senile. Atq; hæc qui
dem indicationes sunt, quæ sanguinem detrahendum dehortantur. Contra postulant vnā cū affe-
ctui, cuius causa primum requirebatur, habitus durus, dēsus q̄, & vno verbo, qui haud facile dige-
ritur: tum ambiēs humidus frigidus q̄. Sanē merito quædam sanguinem mittēdum adhortātur,
quædā dehortantur: siquidē id pro vacatione oīno suscipitur. At eorum, quæ cōprehenſa sunt,
quædā transpirationes morantur, quædam promouēt: & quædam ad vacuandum prompta sunt,
quædam secus. Sanē transpirationem corporum prohibēt tum meatuum stipatio, tum circūdan-
tis nos aeris humiditas & frigiditas: cōtra promouent ea, quæ his sunt cōtraria. Eorum autē, quæ
vacuant, quæ calida humida q̄ ac tenuia sunt, ea celerrime digerunt: cōtra, quæ crassa, glutinosa,
& frigida sunt, ægre transpirant. Atq; hæc quidem ad rem propositam de missione sanguinis, ac
frigide aquæ potione, non ignorasse expedit. Quarum vtranq; metuentes nō paucos medicos vi-
diti, utiq; imperitos. Quorum alteros Hæmophobus, id est sanguinis mittendi timidos: alteros
B Pſychrophobus, id est frigida exhibendæ formidantes, sic græce nominamus, sicut, qui à rabido
cane sunt morli, Hydrophobus: sunt enim proculdubio horū quoq; aliqui præ dogmatis sui stu-
dio, nō leui in rabie. Ergo relictis his, quod initio institutum nobis fuerat, prosequamur, ad me-
moriam reuocantes, quemadmodum sermo noster occasione cōmunium quorundā in ipsis acci-
dentium, à diarijs venit ad continentes. Qm̄ enim obstructionis affectus, cum & ipsa exilis est, &
rite curatur, diariam febrem efficit: cum vero vel propter magnitudinē, vel medici incitiam, con-
suetum diariarum tempus excessit, aut continentem, aut aliquam earum quæ certo ambitu repe-
tunt: merito nos de ea, quæ diarijs cognata est, continenti febre disputatio excepit: propter has ve-
ro protinus & de hac, quæ cum putredine humorū erat. Visum q̄ satius est vel claritatis, vel exer-
cendi legentis causa, vnius egroti in vtroq; febrium genere mentionem facere.

*Indicationes non à traditis tantum superiori libro scopis, sed à Causa morbi, ac egrotantis Viribus peten-
das esse: & illarum methodum exercitatione in particularibus comprobendam. CAP. 6.*

Igitur, qm̄ hæc nobis peracta sunt, ac per ea demonstratum euidenter est (id quod in precedenti
hunc libro ad calcem est dictum) oportere in alijs febribus, quæ amplius diariæ non sint, non
modo ab ijs rebus, quæ in illo libro præcipiantur, faciendorum indicationes peti, sed et ab ea cau-
Csa, quæ febrē excitet, ac laborātis viribus, ad vniuersalem denuo exercitationem reuertamur, pro
comperto habentes non licere vllius artis scientiā nancisci, nisi & methodum quandam habueris
per vniuersalia vocata theoremata, et in particularibus te exemplis exercueris. Cum neq; fieri pos-
sit, vt sine multiplici in egris singulatim exercitatione, quod ex vsu sit, facias: nec sine vniuersaliū
cognitione probe exercitatio procedat, quippe cū in vniuersalibus methodus, in particularibus
exercitatio, consistat. Tanq̄ igitur, qui iter aliquod ingredi studēt, vtroq; inuicē vtūtur crure: qui
altero claudus est vno dūtaxat vti, & longo spatio, & sepe errās, viā peragit: ita sanē, & qui finem
cuiuslibet artis consequi parat, duobus his veluti cruribus, vel instrumētis, vel quomodocūq; ap-
pellatis libet, vti debet: in vniuersalibus theorematis, methodo: in particularibus, exercitatione.

Aduersus eos, qui Curandi indicationem à Laborantis Viribus sumi negabant. CAP. 7.

Reuerſi igitur ad methodum, nunc age de egrotantis agamus viribus, conferant ne ad cura-
tionem hæc quippiam, an planē nihil, ceu non nullis est visum. Videtur tñ eorum, qui inuti-
lem virtutem esse ad curationē inueniendā dicunt, non propria operum artis disceptatio esse, sed
logica potius, ac sophistarum. Aiunt. n. ab eo, quem curamus, affectu faciendorum indicationem
prestari, haud quaquam à viribus. Ergo & anni tempus, & regionem, & statum cœli, & etatem,
D& consuetudinem, & corporum temperies inutiles esse, eadem scilicet ratione dicūt. Postea, cum
mutare curationem propter hæc coguntur, immemores eorum, quæ inter initia dixerant, quædā
eorum, contraria aliqñ indicare aiunt ijs, ad quæ curātis consilium dirigitur: quædam ad præsidio-
rum materias esse vtilia, quemadmodum & animalis partes. Etenim in illis quoq; eadem vtūtur
strophæ, in principio sermonis inutiles eas esse ad curationis inuentionem asserentes: post, vbi re-
darguuntur, ad curationis quidem indicationem inutiles dicētantes, ad materiæ tñ mutationem,
vel inuentionē, vel differentiam, vel qualitatem (nam nec nominant eodem oēs modo) necessa-
rias esse fatentes. Itaq; quod modo dixi, nūc quoq; repetam, nempe q̄ egressi ex eo, quod in arte
est vtile, in logicā disceptationem veniunt. Est nāq; artis utilitas, auxilia, quibus eger sanetur, in-
uenire: quo illi relicto, de noibus litigant, Endexeis & Antendexeis (quasi indicationes, & indi-
cationum cōtradictiones dicas) item cōmunitates, & scopos, & auxiliorū materias, alia q̄ similia
loquētes, si hac nominum diuersitate purgasse se pro ijs, quæ falso affirmauerant, arbitantes. Ego
vero minime veto noibus, quibus libitū sit, vti: meminisse tñ eos velim eorum, quæ ab initio pro-
posuerunt. Ea sunt auxiliorū inuentiones: ad quas quicquid conducere quomodolibet videbit,
id fatendum est ad curationē esse necessarium. Sic igit, & virtus necessaria ne consideratu in egris
à medico sit, an nō, indagemus. Ego. n. sepe maxime esse necessariam aio sic, vt, quæ circa egrum

Septima Classis.

h h h h h h ij

admi-

METHODI MEDENDI

administrantur, omnia ferme eius vnus causa fiant: aliquando mediocriter necessariam sic, vt ali- **E** quid ex hac quoq; ad ea, quæ facienda sunt, consilij petatur, non tñ præcipua faciendorum ratio huc omnis referatur. Possum rursus ostendere tibi virtutem adeo exiguum ad inuenienda remedia conferre, vt propter exilitatem etiã lateat: aliàs vero prætermitti, ac silentio præteriri, quasi prorsus ex vtiliter considerandis non sit. Verum, quod accidit in virtute, id in reliquis oibus, quæ aliquid faciendum indicat, vsu venit. Nam aliquando aliud eorum alio minus aut plus valet: aliquando adeo est valens, vt solum indicare videatur: aut ita imbecillum, vt omittatur.

Medendi Methodum primum ab Hippocrate Inuentam, deinde à Galeno Declaratam, ac absolutam fuisse.

CAP. 8.

HÆc igitur dum doceo, adsis aïo velim, illud habens in memoria, q nec in alijs vllis curatio, quæ per methodum agit, cõsistit: nec alius ante nos quisq; oia ea ordine definiuit, quanq; et, ab Hippocrate via est inueta. Hæc, n. ipsa, quæ ego nunc enarraturus sum, ille curationem indicare primus oïum scripsit: verũ, ceu primus inuentor, nec debitum oibus ordinẽ dedit, nec cuiusq; indicationis dignitatem ad vnguem finijit: & quasdã in ipsis discretionẽ omisit, obscure q; plurima pro antiqua dicẽdi breuitate est interpretatus. Præterea de complicatis affectibus paucissima omnino præcepit. Ac, vt breuiter dicam, oẽm ad medicationem viam aperuisse mihi videtur, sed **F** ita tñ, vt ea curam diligentia q; ad absolutionem desideret: veluti nunc quoq; videmus quasdã veterum in terris viarũ, quibus pars quæpiam est vel lutosã, vel lapidibus sentibus ue impedita, vel moleste ardua, vel periculose prona, vel feris obsessa, vel propter magnitudinem fluminum inuia, vel longa, vel aspera. Itaq; cũ sic se haberent oës in Italia viæ, eas Traianus ille refecit: quæ quidẽ earum humida ac lutosã partes erant, lapidibus sternens, aut editis aggestionibus exaltans: quæ senticosã & asperã erant, eas expurgans: ac flumina, quæ transiri non possent, pontibus iungẽs: vbi longior, q; opus erat, viã videbatur, aliã breuiorem excindens: sicubi vero p arduum collem difficilis erat, per mitiora loca deflectens: iam, si obsessa feris, vel deserta erat, ab illa transferens, ac per habitata ducens: tum asperas cõplanans. Itaq; mirari nemo debet, si, cum viã rationem q; medendi ab Hippocrate inuentã esse sim testis, ipse tñ hoc opus scribere sum aggressus. Neq; enim, ceu ea planẽ non esset inueta, sed veluti, quæ proxime diximus, desideret, ad hæc cõscribenda venimus, nemine priorũ, qui eam methodũ absoluerit, ante me inueto: qñ alij omnino eam nõ nouerant: alij, cum nolent, non potuerunt tñ, quod defuit, adicere: non deerant, qui incognitã esse umbra q; inductam, ac prorsus e medio sublatã uoluerunt, ij uero q fuerint, in sermonis progressu dicetur. Nunc, quod promisi, aggrediar: omnes q; deinceps medicandi indicationes exponã. **G**

In Diarijs Febris ab Affectus causa, atque Aegri viribus non præberi præcipuam

Indicationem.

CAP. 9.

VTile aut ad claritatem eorũ principium sumẽ ex reuocatis ad memoriã ijs, quæ in proximo libro differimus, cũ de diarijs agerẽ. Videbatur. n. in illis prima, ac (ut sic dicam) maxime præcipua faciendorũ indicatio esse, quæ affectũ egrotãtis amouendũ suadet, æque, ut in sanis prima esse, q statum eorũ seruandũ monet. Verum hic, sicut p similia seruat, ita p contraria perimĩt. Conferre præterea ad auxiliorum inuentionẽ diximus tum ipsam corporis temperiẽ unã cum consuetudine, tum regionẽ, tum anni tps, tum cœli statum: In qbus uero morbis egregius aliquis in una parte aïalis affectus subsisteret, ueluti ex adustione in capite, à parte quoq; ipsa aliquã faciendorum indicationem sumi. De uiribus tñ, uel causa quæ affectũ creet, in eo libro nihil est dictum propterea, q nec uires in diarijs febribus egregiam ullã prouidentiam requirãt, utpote quæ oïno ualida sint: nec affectus ullus in uera diaria sublit, qui eã uel gignat, uel augeat, nã utroq; modo loqui licet. Verũ nunc prius de uiribus præcipiã: deinde ad causas, quæ febrem excitãt, accedam.

Triplex genere in nobis esse Vires, ac quo pacto Illarum Ratio sit habenda, quando, quæ ab eis est indicatio, cum reliquis indicationibus pugnat.

CAP. 10.

Gubernant animal (ut in libris de Hippocratis & Platonis dogmatis est mōstratum) tres di- **H** guerſi inter se generis facultates, toti corpori ex suo quodã ueluti fonte quæq; distributa: eas Plato animas uocat, propriã cuiusq; substantiam inueniens. Est enim earum quædam ad nutriendum animal necessaria, ac cum stirpibus cõmunis, quæ iecur ueluti pro fonte habet: canales uero ab hoc in totum corpus sparsos, ipsas uenas: hanc seu appetitricẽ, seu a naturãlem, seu altricem uoces, nihil interest: ueluti nec, si aïam, aut facultatẽ. Altera est, quæ non modo ut stirpibus, aut uita præditis, sed et ut animalibus a anima est insita: hæc sedem in corde habet, ipso quoq; insiti caloris quodam ceu fonte: ab hoc fonte canales arteriẽ sunt: uocatur q; hæc multis sanẽ nominibus: nã & facultas siue uirtus uitalis, & facultas siue uirtus animosa, & anima uitalis, & aïa animosa dicitur. Tertia aïa, ratiocinatrix, in cerebro domiciliũ habet: ea uoluntarijs actionibus unã cũ sensibus p̄sidet: utitur & hæc particulis quibusdã, ceu canalibus, nẽpe ipsis neruis, sensum motum q; p hos in totum aïal transmittens. Ergo has facultates seruare, nihil planẽ est aliud, q uitã seruare: siquidẽ mōstratum est qualibet earũ amissa necesse esse reliquas quoq; unã perire. Ac propterea in opere de sanitate tuẽda huc omne cõsiliũ direximus. In hoc uero, quod est de methodo medendi, primũ propositum, & ei, quod in opere de sanitate tuẽda proponĩt, ad portionẽ respondẽs, morbi

A* φσιχὴν est in ἰμψσις, i. naturalẽ, in anti- quis φσιχὴν, i. vegetabilem.

B * nobis.

C* θυμοειδὴς.

A. li. r. d. 6.
c. 1. fo. h

A morbi est sublatio: qñ cuiusmodi in illo sanitatis est tuitio, eiusmodi i hoc est morbi sublatio. Quorum vtriq; vnum est cōe, ipsa scilicet vitæ custodia: quæ nimirum in illo de sanitate tuenda opere sanitatis custodiam sequebatur: quod enim secundæ valetudinis tuendæ gratia geritur, idem statim & vitam tuetur. At in hoc opere aliter se habet, propterea, q, quæ affectiones præter naturam in nobis discutiunt, ea non oīno vitam custodiant: quippe aliqua eiusmodi prædita sunt facultate, vt, si immoderate aut intempestiue vtare, vitam adimāt. Siquidem in sanguinis missione, quā vīq; ad animi defectum faciendam esse paulo ante diximus, quod flāma in continentibus ex meatuum clausura febribus extingueretur, non paruum merito subsequetur incommodum, nisi opportuno tēpore aut debita mensura fiat. Duos nāq; in ipsis medicorum manibus perire vidi, qui post, q; animo linquerentur, nunquā reuixerunt. Multi vero, et si non protinus, at postea propter virtutis infirmitatem perierunt: quos si quis citra eius resolutionem vacuasset, minime perissent. Quin etiam aliqui in morbos inciderūt lōgos, post, q; immodica inanitione resoluta naturalis vis fuit. Alijs, cum immodicæ vacuationis noxam sarcire non potuissent, in omne reliquum vitæ tps totius corporis tēperamentum redditum est frigidius. Ex qua refrigeratione facile ex quauis occasione læsi, alij decolorati, ac malo corporis habitu vixerunt: alij ex eo ipso in morbos deciderūt

B exitiales, aquam inter cutem, & orthopnoeam, & iecinoris ac vētriculi imbecillitatem, & apoplexiam, & deliria. Ergo, cum virtus tantopere necessaria sit: eam aut lædant oīa vacuantia remedia, si quis scilicet ijs parum moderate vtatur: vtiq; aduersæ inter se faciendorum indicationes in talibus corporibus sunt, in quibus affectus, quod expugnetur, notabilem vacuationē deliderat: virtus aut hanc ferre non valet. Verum, cū sepe ex vacuatione virtus nihil lædatur, hinc sumitur inconsideratis & temerarijs medicis occasio, vt eā prætermittant, ceu nusquā quicq; indicet. Falluntur aut (vt dictum est) propterea, q, non intelligunt alterius cuiusdam rei causa virtutem esse spectandam, nec quicq; ad affectum amouēdum indicare. Tanq; igitur in ijs, qui valent, semper ea comitatur, quæ sanitatis gratia administrantur: nec est quicq; inuenire, quod sanitatē tueatur, qd idem vires corrūpat: sic in ægrotantibus aliquñ ijs succedit, quæ veluti in perniciem eius administratur: aliquñ ab ipsis soluitur. Si nanq; abundantia paulo viribus superior fuerit, vtiq; ex moderata vacuatione adeo nullum accedit viribus incommodum, vt et maximum comparetur cōmodum, quod eas premebat, sublato. Sin, quod affectus sanet, multa vacuatione est opus, resoluatur aut ex tanta inanitione virtus, nō modo rursus homini nō proderit, sed etiā maximum illi periculum afferet. Porro in ijs continētibus febribus, quæ ex stipatione meatuū accendunt, qm̄ valida plerunq; virtus est, citra periculū vacuatio adhibetur: in alijs vero morbis maxime est periculosa, veluti si forte incidit in corruptela humorum. De qua tempestiuum est mentionem facere, quod oēs mittendi sanguinis indicationes in hoc libro decidamus. Ergo, quod corruptum est, id alienum à natura est: quod tale est, id se auferendum dicat. Si igitur cum viribus imbecillis corruptela incidit, vtiq; quod affectus remedium est, id cū virtutis custodia pugnat. Siquidem affectus vacuandum esse præcipit, id q; vel vena incisa, vel purgatione: harum autem neutram ferent imbecille vires. Qm̄ igitur in oībus eiusmodi repugnantijs incerta succurrendi ratio est, aliā insanabilis oīno affectus relinquetur: aliā spatio, & ægre, id q; si magnum nactus sit medicū, sanari poterit. Oportet nāq; vbi indicationes ita sibi aduersantur, & paulatim, quod vitiosum est, vacuare: & paulatim inuicē, quod salubre est, p eo reponere. Vocant medici eiusmodi vitiosi succi curationē græce Epicrasin.

Venæ sectionis exemplo Ostenditur, quando Virium indicatio consideranda, aut omittenda videatur.

CAP. 11.

Memineris vero mihi ad ea, quæ dicenda sunt, etiam quorum causa venæ sectio petitur. Nā, qm̄ hæc sanguinis vacuandi causa adhibetur, sanguis autem inūtilis nature est, vtiq; probe hanc administrari conueniet sic, vt, quod inutile nature sit, emittat. Fit aut sanguis nature inutilis **D** bifariam, vel cum propriam qualitatem ad vnguē non seruat, nec amplius nutrire, sicut prius, cū utilis esset, potest: vel ita multitudine creuit, vt aut vires premat aut tum venas tum arterias vel distendat vel findat vel obstruat. Ac in his quidē missio sanguinis vtilis est, ceu vacuantium præsidiorum vna: † in alijs, ceu quorum vehementiorem impetum ad diuersam partem reuocet, vel per propinqua deriuat. Postulat autem semper valentes vires, quæ modo vacuationis eius respondeant. Ad hæc igitur respiciētes sanguinem * detrahimus, aliā semel, aliā bis, vel ter, vel sepius: veluti in sequentibus patebit. In præsentia vero illud manifestum fecimus, virtutem vacuantia remedia aliquñ citra noxam ferre, vtpote nec adiutam ab his quicq; quod sit æstimandum, nec vero læsam: Sape vero magis minus ut, tum iuuari, tum lædi: Præterea, quoties notabilis illi ex vacuationibus auxilij noxa incidet, toties patere ipsam quoq; tunc utile aliquid ad considerandum indicare, æque utique, ut cum manifeste iuuabitur: Vbi uero ex ijs, quæ affectum submouent, nec commodum illi accedit ullum, nec incommodum, ibi uelut inutilis, prætermittitur.

Ex ijs, quæ indicant, quedam simplicem indicationem, quedam non simplicem præbere.

CAP. 12.

Porro una semper est, quæ ab hac præstatur, conferentis indicatio, veluti etiam reliquorum oīum. Nam, quicquid pro natura sua indicat, id unum semper indicabit, ceu quod unam habeat naturam. Atq; id unum, si, quod indicationem facit, simplex est, ipsum quoq; simplex erit:

Septima Classis.

h h h h h h h h

fin

* παραπληξιας seu παραπληξιας. quid autem sit paraplexia tū ex plenitudine Galeni locus, tum principue ex cōmposito et quattuor cōmentarijs de digitis in morbis acutis, patet.

† clarius, quod idē virtutē tollat: sic in ægrotantibus ipsa (virtus) ali-quando us succedit, quæ pro resolutione morbi administratur: aliquando ab ipsis tollitur.

* γυναικί, inutilis.

† Aduerbū. in alijs autem vt reuulsiuū, vel deriuatiuum, quando impetus humorum vehementiorem vel in contrarium reuellemus, vel deriuabimus i latera.

METHODI MEDENDI

fin illud est compositum, hoc quoque erit compositum. Sanè quædam sui custodiam indicat, quæ-
dam amotionem. Siue autem hanc indicent, siue illam, quod simplex est, simplicem quoque indica-
tionem habet: quod non simplex, etiam non simplicem. Idcirco in superioribus semper simplicem
intemperiem simplicem indicationem præbere diximus, veluti in frigidity caliditatem: non
simplicem vero, etiam indicationem suggerere non simplicem: calidam enim liccam quæ intem-
periem curationem sui per ea, quæ humectent, & refrigerent, moliendam indicare.

Quo pacto Indicatio, quæ est à Viribus, nunc reliquis prior, nunc posterior esse videatur. CAP. 13.

Ergo vires quoque vñ rem semper indicabunt, utique sui custodiam. Quibus ergo (roget quis)
rationibus seruabitur? Nempe potissima ratione ex eo, quod de substantia earum vel inani-
tum, vel alteratum est, corrigendo: Secundo loco ex prohibendis ijs, quæ ipsarum substantiam va-
cuare alterare uel possunt. Comprehensa vero inter ea, quæ alterant, breuitatis causa sint, & quæ
earum unitatem distrahunt. Hæc itaque cum vires perpetuo indicent, in valentibus (sicut dictum
est) consensus agendorum omnium ad ipsarum perennitatem est: in ægrotantibus autem non semper.
Quo tempore estimari debet, quod vel magnitudine, vel dignitate (ut prius est dictum) præua-
leat. Maxima igitur dignitas ipsarum est virium: quoniam viuere ipsum nobis ex harum custodia constat,
utpote cum vitam aut ipsas esse vires, aut earum actiones, sit necesse: at vita ipsa nihil esse prius in
animantis corpore potest propterea, quod nec sanos esse citra vitam licet. Virtus ergo omnium prima
custodienda hominibus est. Seruabitur autem, si nec eius substantia inaniatur: nec tanta alteratione al-
teretur, ut ea corruptioni sit propinqua. Atque huius custodiæ pars est, ubi vel temperiem ipsam præ-
sentem seruamus, vel absentem inducimus. A virium indicatione proxima est, quæ ab affectibus,
quos curare proponimus, datur: postea deinceps reliquæ. Quicquid igitur indicationi, quam vi-
res præbent, aduersatur, id secundi est loci, ac posterioris ijs, quæ illæ præcipiunt: quæ vero cum
ijs, quæ viribus conducunt, in idem competunt, hæc utrunque calculum referunt, & eorum, quæ pri-
mæ (ut ita dixerim) sint notæ, & eorum quæ secundæ. Itaque hæc citra controuersiam sunt faciendæ:
quæ vero aduersantur, aliquando administranda prorsus non sunt, aliquando paulatim. Quippe, si, quem
curare studeas affectum, is vacationem requirit, vires autem extrema imbecillitate laborant, toto
illo tempore, quo vires recidimus, eorum, quæ affectum sanent, nihil planè ægrotanti exhibebimus.
Vbi vero eò roboris peruenisse eas conijcimus, ut nihil aut parum ex vacuando sint ledendæ, tum
est ad affectus quoque curationem accedendum. Prima igitur omnium indicatio est, quæ à virtute
sumitur: verum non sic prima, ut quæ curationem doceat, cum ex numero curatrici indicationi-
um non sit, verum (ut ita dixerim) vitalium, siue quæ ad vitæ custodiam pertinent. Nam, neque
ut ualeamus, nec ut à morbis liberemur, ab ea quicquam primum desumimus, sed ut uiuamus.
Additum autem in sermone est illud, primum, quod ex accidente aliquando virtutis roboratio ad af-
fectus curationem conducit. Verum id in sequentibus docebimus.

*Curatius omnes Indicationes tribus hisce contineri, Affectu scilicet Naturali, affectu Præter
naturam, & Aere nos ambiente.*

CAP. 14.

Nunc ad pensum rursus redeamus, in paucas summas, compendij causa, rem omnem cogentes.
Medicatorie indicationes à morbo ipso sumuntur, à corporis temperamento, & tertio am-
biente nos aere. Quod si aliquæ quædam antea sunt posite, uel postea non hæc modo, uerum etiam aliæ
dicuntur, omnes tamen ex ijs in partes diductis natæ uidebuntur. Siquidem corporis temperies, quæ
illo tempore fuit, quo egrotare id coepit, quæ quæ ad inueniendæ remedia est utilis, ex natura, etate,
consuetudine, & ambiente nos aere ortum habet. Ambiens uero ipse eiusmodi est redditus pro-
pter tum regionem ipsam, tum anni tempus, tum cœli statum. Ergo, cum unum sit eorum utrumque,
ex pluribus tamen tale efficitur. Affectus uero haudquaquam in causas diduci est aptus, sed in differenti-
as: nam aut in similaribus consistit partibus, aut in instrumentarijs. Ac in similaribus quidem, uel
simplex est intemperies, uel composita: in instrumentarijs, circa simplicium partium uel posituram, uel
formam, uel numerum, uel magnitudinem, tum quæcunque horum singillatim tradite sunt differen-
tiæ, consistit. Hæc itaque tria illa prima sunt, quæ curationem indicant, nempe ambiens ipse cum ge-
minis corporis siue affectionibus, siue constitutionibus libitum est appellasse, una naturali: altera,
quæ præter naturam sit, quæ sanè morbus est. Non posse autem plura esse prima genera indicatio-
num, quæ ad medendum pertineant, quæ tria, quæ modo diximus, ex ipsa rerum substantia scire li-
cet. Nam morbus & sanitas, corporis sunt affectus, ille se tollendum, hæc se tuendam indicans: am-
biens uero is est, sine quo nec tolli morbus, nec teneri sanitas potest. Hic igitur causæ, sine qua non,
obtinere rationem. At uero cum id, quod agrotat, alteramus, nisi constet, quousque sit mutan-
dum, utique, quando sit ab alterando desistendum, non intelligemus. Generatim igitur in omni cu-
ratione agendorum indicationes in his ad summum tribus consistunt. Membratim uero (ut supra
est comprehensum) aliquæ simplicium particularum sunt propriæ, aliquæ compositarum. Eorum
ergo, quæ in simplices incidunt partes, unum est intemperies ea, quæ in calido consistit. Hæc, cum
in totum diffusa corpus est, febris nominatur: ideo quæ omnis febris, qua febris est, humectatio refri-
geratio quæ remedia sunt. Ac, si sola hæc sit, ad refrigerandum humectandum quæ omne medentis consi-
lium, ueluti ad finem, dirigetur ita, ut nihil sit, quod præterea ad curationem desideretur, nisi ut materię
inueniantur,

A. li. 4. f. 1.
c. 7. fol. 41

A inueniantur, quæ huic proposito sunt idoneæ: materia vero inuenta, vt opportunum tempus ex quatuor febris temporibus captes: quantitatem vero, ex conferendo cum naturali habitu morbum, quippe quantum is à naturali habitu recessit, tantum, opus est, agrum refrigeres & humectes. Sanè ambiens, si contraria morbo temperiem habet, è præsidiorum numero vnus est: sin similem, egritudinalium causarum est vnus. Quoniam autem reliquas materias tum deligere tum fugere licet: quam autem ambiens præstat, fugere non licet, immo necesse est præsentis cœli statu vti: idcirco huic quoque attenti esse cogimur: qui vtiq; sæpe cum ijs, quæ morbus faciēda suadet, (vt diximus) est concors: sæpe discors, & qui contra molitur. Habebit ergo (vt diximus) ambiens rationem modo materie sanantis: modo causæ morbum fouētis. Quippe, cū humectari refrigerariq; morbus postulat, si hæc præstat, sanantis materiæ rationem obtinet: sin calefaciat & siccet, morbificis causis est annumerandus. Vbi igitur cum medendi indicationibus consonat, pro gratia est habendum: sicubi aduersat, inhibenda eius noxa est, scilicet reliquorum auxiliorum humiditate ac frigore intensis aduēctisq;. Sedulo igitur agendum est, vt ambientem, quoad fieri potest, qualē esse expedit, præpares, s. humidiores frigidioresq; domos tum deligens, tum vero preparans: sicut è diuerso, si frigida sit humidaq; morbi species, quæ calferi siccariq; postulet, & eligendę & preparandę domus sunt, quæ calefaciant, & exsiccant. At deligendas quidem dico, quæ ex se ipsis eiusmodi sunt: præparandas vero, cū arte nostra molimur. Per eflatem subterraneas eas, & ad septentriones versas: ac pauimenta earum assidue humore aspergentes: tum vt ex euripo aliquo aura inspiret, machinantes: flores præterea, ac germina, quæ frigide, humideq; facultatis sint, per aream proicientes: Per hyemem vero contraria horum molientes, præsertim vbi morbus (vt prædictum est) suadet: vbi non suadet, excessus tantum vtriusq; temporis remittentes. De quo mihi aliquid necessario postea est dicendum. Nunc auxiliorum materias indicare non decreuimus, sed methodos docere.

Quo pacto Curatiue Indicationes modo in Plures diduci, modo in Pauciores cogi possint. CAP. 15.

Quare rursus ad has disputationem reuocemus: doceamusq;, quemadmodum & pauca & multę pro diuersa sectione curatorię indicatiōes sint: quādo et tres vniuersas (vt proxime docuimus) facias, licet, in pauca capita tota summa reducta: & qualibet earum rursus diuisa, ex ipsis multas efficere: id quod etiam iam monstratum est. Quin & ipsarum sectionum quamlibet rursus diducas in membra, licet, donec ad insectile venias. Iam primas quoque illas tres, quas memorauimus, fieri potest, vt redigas ad pauciores sic, vt duo eorum scoporum, qui curationem indicent, omnino capita sint, nempe præsens affectus, quem morbum nominamus: & qui prius fuit, quæ sanitatem & naturalem habitum diximus. Neq; enim aliud est ipsa sanatio, q̃ præsentis in corpore vitiosi affectus in naturalem habitum mutatio: cum autem contrarij hi affectus sint, necesse est, per contraria fiat eorum alterius in alterum translatio. Atq; ita rursus vna sola erit curationum maxime generalis indicatiō, nempe contrarietas. Ergo hinc rursus sumpto initio, age particulares indicatiōes disquiramus. Quoniam id, quod egrotat, ei, quod valet, est contrarium, vtiq; per contraria est ab illo in hoc via. At quomodo (inquies) in contrariis inuenietur modus? Non enim satis est calido affectui adiuuissse frigida, nisi id debita fiat mensura: cum alioqui metus sit, si intra modum id fiat, ne morbi reliquum quippiam relinquatur: sin modum excedas, contrarium genus morbi inducas: qui enim supra, q̃ par est, calidum morbum refrigerat, is sanitatis mediocritate transmissa alium excitabit morbum, qui sit frigidus. Quod quod minus accadat, naturam curandi corporis scias, oportet: quod, quantum morbus ab illius symmetria discesserit, intelligens, mensuram refrigeranti præsidio imponas. At fieri non potest, vt quantum à se inuicem distent, inuenias, nisi cōpertum habeas, q̃ esset corpus aut humidum, aut frigidum, aut calidum, aut siccum, cum valeret: quantumq; ex his excesserit post, quam egrotauit. Quippe, quod plurimum à naturali habitu recessit, id vehemētibus eget contrarijs: quod non plurimum, leuibus. Sanè plurimum recessit frigidus morbus à corpore natura calido, ita vt è diuerso calidus à frigido: minus recessit tum calidum à calido, tum frigidum à frigido. Quare ex vtriusq; indicatio curationis præstat. Verum, cum materie reliquorum præsidiorum omnium electio in nostra potestate sit: eius vero, quæ ambiens præstat, in nostra manu non sit: ratio est, ex hoc quoque propriam quādam indicationem sumamus. Ceterum, quoniam nosci ad vnguem oportet corporum temperamenta, id vero est planè difficile, vtiq; tentandum est tum ex ijs, quæ in libro de temperamentis sunt scripta, ea inuenire: tum vero ultra hæc, quod magis scientifica notitia sit, ex etate, & tota antea acta victa, quæ nimium in vitę exercitio, & victus ratione consistit: præterea in hac regione, & hoc anni tempore, & hoc statu cœli, conuersatione. Si namq; natura gracilis & tangenti calidus & biliosus, & propensus ad iram, & hirtus sit, calidus hic succusq; natura est. Non tamen necesse est nunc quoque, cum egrotare incepit, eundem planè habere affectum: fieri enim potest, ut in desidia uixerit, idq; cum frigidis humidisq; potione & cibis, ad hæc etiam cum balneis post cibos, & multo somno: præterea in regione humida & frigida, & hyeme in qua frigidus & humidus exuperabat cœli status. Rursus fieri potest, ut horum præcesserint contraria, id est calefacientia & siccantia, idq; per singula dictorum iam generum. Ergo, si quo ad præsens temperamentum noscendum deficimus, id ex præeuntibus ipsis supplebimus: ex illo uero inuento, administrandorum indicatio suppeditabitur.

METHODI MEDENDI

Vtilem esse ac minime contemnendam Indicationem, quæ à Consuetudine præbetur. CAP. 16. E

* μακρὸν ἐστὶν
ἰνὰ γράμματα, ἰ. lon-
gis.

Adictum quidem prius est, ubi de frigida exhibenda præcepimus, illud quoque ex ijs vnum esse, quæ consideranda tū essent, nunquid particula quæpiam, cui frigida natura esset, lædi magnopere ex eius potione posset. An igitur fas est in ægrotante homine cuiusque particulæ temperamentum inuenisse absque ijs notis, quas in libris de ipsis retulimus? Atque illi quidē nec inquirunt, nec norunt, sed iuxta prouerbum, vno calapodio omnes calceant. Nos certe (quibus inquirendi cura fuit) illud inuenimus, quod per plures ac cognitu difficiles notas cuiusque membri temperamentum coniectura potius, quam scientia, inueniatur. Si igitur notis multis & paruis aliqua certior apparuerit, non ne abiectis illis hanc pro omnibus arripiemus? nemo id, arbitror, quod mentis est compos, negabit. Atqui, si omnes temperamentorum notas in vnum colligas, hæc longissime absunt, ut parem ei, quā consuetudo præstat, fidem faciāt. Si enim antea per sanitatem quispiam frigidam perpetuo biberit, neutiquā nec in iecinore, nec vesica, nec vētriculo, nec alio quopiam talium offensus, planum est & valida illi esse hæc omnia, nec nūc à frigida lædenda. Non est igitur, quod paruum quiddam, atque ad spectandum leue, ad inuentionem remediorum consuetudinem existimemus: veluti nec ad sanitatem tuendam. Nemo enim adeo est stupidus, ut magnopere ex frigida potione læsus hanc in diutinum vsum duxisse velit, propterea, quod læsus interim, atque ab ea euidenter egrotans, omnino abstinebit. Ergo, sicut alia non pauca quidā medici præter communes sensus, ita illud quoque effuderunt, quod nulla nec salubris inueniendi victus, nec ægrotum curationis, ex consuetudine sumatur occasio: videtur enim, non sicut alia quedam, exiguam leuemque, sed maximam ac maxime principalem vim habere: ut quæ singulorum corporum naturam ostēdat. Sanè ipsi via rationeque ab ea procedentes fatemur nos partium affectū inuenire, dein ex illo rursus ad faciendorum indicationē venire. Empiricus vero præterire se naturę inquisitionē proficet, quippe, quod per eam consecutus fuisset, id iam se habere, intelligere scilicet, non lædi à frigida potione egrotantis corpus: id vero esse, quod nobis ab initio proponatur, non ut naturam noscamus. Post (arbitror) nos quidē, veluti ambages frustra secutos, merito taxet: eos vero, qui in totum inutilem esse consuetudinē dicunt, veluti à cōmuni sensu alienos, iuste accuset. Quid igitur, inquires eis respondimus nos, qui methodo artem condimus? Nempe quid aliud, quam quod vera dicunt de ijs consuetudinibus, quæ adeo euidentem vtilitatem offensamue ostēdunt? quippe quas nemo vel ante methodum non nouit. At reliquarum quasdam, quæ scilicet paulatim magnum contrahunt incommodum, non eque licet per experientiam inuenire: dictum autē fufius de eiusmodi consuetudinibus est in libris de sanitate tuenda. Vnde, si in frigide quoque exhibitione consuetudo citra methodum satisfacit, nec nos profectō experientiam fugimus: immo omnem, quam illi, vtilitatē ab ea capientes, etiam extrinsecus præter hanc adijcimus, qui saltem id possumus, eā, quæ à rerum natura suggeritur, indicationem. In hoc vero libro methodi rationem sequentes fatemur longiore via idem inuenire, quod breuius inuenire citra ratiōcinationem liceret. Siquidē, cum sepe iam viderimus non paucos ex ijs, qui febribus ardentibus premerentur, cum iam mediocriter cōcocti humores essent, statim ex frigida potione febre liberatos, quāuis ei potioni parū assueti fuissent, multo (arbitror) magis in ijs, qui allueuerunt, vtilitatem fore citra noxam vllam sperabimus. Habes itaque nunc et de consuetudine rationem, etsi ex incidenti oblatam, tamen satis definitam. Est enim ea quoque vnum quiddam eorum, quæ curationis rationem per morbi naturam intercedentem indicent, quemadmodum & ætas. Siquidem ipsa quoque temperamenti interuentu indicationem præstat, veluti puerorum: quæ, cum humidam & calidam temperiem habeat, facile digeritur.

* ἀναλογισμὸν.

* corporis.

De Indicatione ab Actate, ac Summa vniuersarum indicationum.

CAP. 17.

Adis enim animo, velim, ad ea, quæ de corporum diuersitate hoc loco dicam. Lapidum substantia constās stabilisque propter siccitatem & frigus est: ad eundem modum aris, & ferri, & auri, & vno verbo, omnium, quæ ex terra sunt, corporum. At quæ humida calidaque sunt, eorum substantia celerrime in ambientem dissipatur, aliās in halitum sensibilem soluta: aliās in perspirationes, quæ visum fugiant, sed ratione deprehendantur. Atque hæc corporum naturæ, veluti ex diametro, (ut Græci loquuntur) id est longissimo interuallo, à se distant. Reliquarum omnium illarum, quæ frigida ac sicca proxime accedunt, egre quidem per halitum digerī possunt, minus tamen ægre, quam ferrum, & lapis, & adamas. At, quæ calida & humida sunt vicina, hæc promptius quidem digeruntur, atque exhalant, cæterum minus hæc quoque, quam aqua calefacta. Nam citra calorem non potest in halitum digerī corpus vllū, substantia eius coacta densataque manente: sed nec per calorem omnē, immo quod habile est in halitum resolui: tale porro est, quod humidum est. Ergo puerorum substantia omnium facillime digeritur ac dissipatur, propterea, quod est omnium humidissima: nulla vero frigidior. Quo minus vacuantis præsidij eget, cum habeat ex se ipsa, vnde naturaliter vacuetur. Fit autem profectō & propter calidam siccāque regionē, & tēpus æstiuum, & statum cœli impēse calidum & siccum, notabilis per cutim vacuatio. Itaque etiam huius causa ijs, qui sanguinis detrahendi egent, aut prorsus venam non secabimus, aut parum detrahemus. Sanè erunt in hac quoque detractione multi scopi medico spectandi, natura ab initio, consuetudo, ætas, locus habitationis, anni tēpus, cœli status: ad hæc ægritudinalis, quæ curamus, affectus: aliaque ratione ante hunc laborantis vires,

Cum

A Cum vero affectus numerosi sint, cuiq; eorum sua est curationis indicatio. Quippe à calido indicatio est refrigerandi: à frigido calfaciendi: ac à reliquorum quolibet contrarium applicandi. Quare, cum octo intemperamenta sint, octo etiam erunt morborum, quibus simplicia corpora sunt obnoxia, particulares indicationes. Ultra que has vna eius affectus, qui etiam instrumentalium est communis, cuius nullum apud priores nomen fuit: sed nos, qui cum interpretari sumus coacti, continui solutionem appellauimus: ostendimus q; communem curationis indicationem hic quoq; esse vnitionem. At vero, quæ ex hoc rursum in partes diducto particulares consistant, hæc quatuor voluminibus sunt proditæ, nempe tertio, quarto, quinto, & sexto, huius operis. Ac nunc quidem institutum de intemperamentis sermonem etiam in sequentibus libris persequar. Hoc absoluto ad instrumentalium partium morbos conuertar: ostendam q; secundum eandem methodum in iis quoq; tum primas omnium curationis indicationes, quas vtiq; generalissimas appelles, licet: tum quæ ex harum sectione nascentur: deinde rursus, quæ ex illis oriuntur, donec ad eas, quæ ultra sectionem non admittant, peruenero: hanc etenim omnis constituendæ artis methodum Plato nos docuit. Verum de instrumentalibus postea (vt promissi) dicetur. Nunc (si prius, in qua parte propoliti operis sumus, admonuerimus) præsentis iam disputationi finem idoneum imponemus. Est igitur vnū morbigenus, quod similes & simplices aialis vexat partes, quam in temperiem vocant. Huius aliquas differentias ex corporibus nuda qualitate alteratis provenire docuimus: aliquas cum materia quapiam, quæ in ipsa confluit: rursus q; ambas incidere vel in vnica animalis particulam, vel plures, vel etiam totum corpus. Ergo, cum in operis huius libro septimo in temperies eas, quæ alteratis tantum qualitatibus in partibus proveniunt, pertractarim, in duobus deinceps libris ad eas, quæ in totum se animal extendunt, venientibus, primū agere de febribus placuit. At, quoniam harum ipsarum aliqua adhuc fiunt, manente scilicet in corpore causa, quæ eas excitauit: aliqua facta iam sunt, sed, quæ eas accendit, causa iam abiit: satius visum est de iis primum sermonem facere, vt pote simplicem primam curationis indicationem habentibus: deinde illas quoque stilo aggredi, quarum in corpore causa subsistit.

GALENI METHODI MEDENDI ID EST DE MORBIS CVRANDIS LIBER DECIMVS,

ARGVMENTVM LIBRI

Docet Præcauere, ne Diariz febres in Hecticas pertranseant;
ac ipsas Hecticas, cum inuaserint, curare.

De Ratione curandi, cum Indicationes ab Affectu, à Causa, & à Viribus in
idem coierint, vel inuicem pugnant.

CAP. 1.



Ergo in diariis febribus simplex quidam est in corpore præter naturam affectus, vt pote causis, quæ primū eas excitarunt, iam ademptis. In quibus vero causa, quæ eas accendit, adhuc manet, in iis nec affectus simplex, nec sanatio est: siquidē, quod febris iam receptū in corpore est, id ex propria ipsius curandi indicatione discutere oportet: quod adhuc est futurū, id propulsare, ac, ne fiat, vetare: vetabit autē, si, quæ id excitat causa, prorsus sit submota. Itaq; in diariis faciendorū indicationē ex ipsa febre maxime capiemus, sed cū illa naturā, & etatē, & consuetudinē, præterea anni tēpus, cœli statū, & regionē, † & vires, simul expēdentes. In reliquis, quæ accensionis suæ causam intus habēt, prima indicatio ab ipsa sumet causa. Itaq; si febrili, quæ multos dies continuant, recte ostendimus putredinē esse causam, hæc nimirū sananda est prima: sed nec interim extinguendę febris, quæ per eā iam accēsa est, ratio nō habenda. Ac, si quidē in idē consentiant, & quæ febrē extinguūt, et quæ causam oppugnant, quod ab vtriusq; indicat, cum vnū sit, sine cunctatione agendū est. Sin febris, quæ iam accēsa sit, sanatio, causam, quæ hanc excitauit, est auctura: aut, quæ causam submouent, febrē exasperabūt, diligens habenda consideratio est de remediorum specie. Sanē diligenter considerauerit, qui totam deliberationē in tria hæc estimanda diuiserit, febris ne sola curāda sit nō sollicito de causa: an causa oppugnanda, minime curanti de febre: an plurimum quidem remediorum ad alteram earum sit adhibendum, non tamen altera neglecta. At, quod primo quidē loco est dictum, probare non debemus: quando, si, quibus præsidis id febris, quod semper gignitur, oppugnamus, ea effectricem eius causam auxerint, planē nec generationē eius aliquando inhibebimus, nec magnitudinē minuemus: quippe & generatio eius, effectricis causę spēm imitabit: & magnitudo cum illa pariter inaugecet. Quod secundo loco diximus, si id distinguemus, poterit esse non incōmodum. Nam, si intolerabilis egro magnitudo febris sit, cōmittendū non est, vt per ea, quibus causam adimimus, febre

† Hæc vba in
pressi cod. græci
habent, antequam
qui nō habent.

METHODI MEDENDI

febrē augeamus: Simul enim arbitror utrūq; & febrim sustulerimus, & hominē. Sin ita mediocris sit febris, vt, quo tempore contra causam tantum pugnās, obruendæ interim vires ægrotantis non sint, utiq; contēendus is modus non est. Non contēendus autem nec tertius est, qui cōtra id, cuius maius momentum est, instare iubet, nec tamen alterius omnino negligentem esse. Sanē plerunq; causa maior est vis. Fieri tamē aliquando potest, vt ea sit febris magnitudo, quæ præsentem perniciē, nisi occurras, afferat: quo casu oportebit hac prius submota, deinde ad causam submouendā accedere. Atq; hæc, mi Eugeniāne, decidenda tibi inter initia statim de cōtrariis indicationibus sunt. Cum autē in iis examinādis non parū visa est ad hominis salutē momenti habere vis ipsa {naturalis,} utiq; de ea quoq; nō leuis ad agendorum inuentionē consideratio est habenda. Ita fit, vt tres primi scopi sint, qui in propositis iā ob putredinē febribus agendorum indicationē nobis præbeant: vna febris ipsa: altera effectrix eius causa: tertia vis ipsa {naturalis,} Ceterum priores duo scopi submouendi sunt: tertius est tuendus. Erit igitur rursus hic quoq; eadem tibi consideratio, quæ paulo supra, vt cū viribus tum febrem tum causam inuicem cōferas. Mox, si eadē ambo remedia requirant, ea prōpte exequaris: Sin indicationes pugnabunt, vnam præferas, vel quæ à viribus sumit, vel quæ à causa, vel quæ à febre: ac, quæ cæteris sit valentior, hanc magis sequaris, nec tñ ceteras negligas. Ex hac nanq; discretionē doceberis primā causam febremq; profligare, vbi videlicet conuicis harū remedia vires posse ferre: rursus primā roborandam virtutem esse, vbi hæc imbecillior est, q̄ vt causæ febrisq; præsidia sustineat. Quin etiam omnia pariter sub coniecturam agi licet, veluti paulo supra de febre & de causa est monstratum.

† ἐν τοῖς ὑποκειμένοις τῇ σκέσει πρὸς τοῖς, habet oēs græci codices quos viderim. quæ interpret vertit, in subiectis cōsiderationi febribus. Et ita verus interpret.

Quæ ex Diarum Febribus magis aptæ sint Perdurare, & in alias febres Transire: quæ quæ ratione id periculi declinemus.

CAP. 2.

ERgo, cum tria hæc sint, ad quæ attentum te esse in propositis febribus curandis oporteat, febris ipsa, huius efficiens causa, & ægrotantis vires: inuenti q; præterea sint generales indicationū modi, quos etiā generales vniuersales q; dicimus: transeundū, arbitror, nūc est ad præsidiorum differentias, quæ specialia particularia q; sunt, sed mentione de diariis repetita: qñquidem ab ipsis in eas, quæ plures dies continent, aliqui trāseunt. At vero, cum in has transeant vna quidē ratione maxime cōmuni, ipsa medicorum inscitia: duabus magis priuatis, q̄ ipsarum febrium vel causa effectrix iam abiit, vel etiānum manet: de vtriusq; seorsum est dicēdum. Porro abiit effectrix causa, quoties ab ira, dolore, vigilia, cura, æstiuo Sole, fatigatione, & bubone iam inclinato, excitata citra stipationem febris est. Manet, quoties vel ab externa causa, vel ab ipsa febre stipatio aliqua facta est. Nam & frigiditas, & adstringentium vsus, per mediā stipationem semper febrem exci-
tant. Vitio præterea non nunquam corporis habitum cōstipat. Iam ipsum febris principium, vbi cum horrore inualit, stipationem subinde fecit. Quin etiam glutinosi, & crassi, aut etiam copiosi succi, vbi mediocriter obstruxerunt, diariam aliquando febrem accendunt, vtrique cum idoneum sortiti sunt medicum, vt supra est indicatum. Sanē dicuntur idcirco id genus febres omnes diarig, quia solui, (quod utiq; ex ipsis est) vno die sunt aptæ, computata cum hoc vnā & nocte: quemadmodum cum dicimus mensem esse triginta dierum, & annum trecentorum sexaginta quinq; & hoc gestum esse ante tres dies, aut gerendum esse post quatuor. Cæterum, non est idem ipsarum omnium affectus, sed ab aliquibus inseparabilis stipatio est: ab aliquibus minime inseparabilis, sed vel vt plerunque simul adest, vel ambigua sorte, vel raro. Inseparabilis stipatio est iis, qui ex alumina aqua, vel chalcanthode, vel tali quapiam alia, aut ex frigore, aut leui obstructione, febricitant: Plurimum vero iis adest, qui ex vstione febricitant: Ambigua sorte, iis, qui ex fatigatione: Quicunq; vero ex ira, vel tristitia, vel vigiliis, vel pertinaci studio, vel cruditate, vel bubone febricitant, iis raro adiuncta stipatio est. Atq; harum oium febrium nulla, (quod utiq; ex ipsa sit) ad secundam vsq; accessionē perdurat, sed intra quatuor & viginti horas omnino desinit. Aut, si quæ earum aliqua (quod tamen rarius fit) longius trahunt, duæ iis accedunt causæ, quæ ipsas solui vel tant: earum Vna frigus est, quod vel ex ambiente aere, vel ex vnctione quapiam extrinsecus admota, proueniat: Altera egregia ista diatritos est, si qui videlicet hanc tranlire medicorum inscitia coguntur. Quod si & ambiens aer calidus sit: & nemo ex medicis, qui diatriton suspiciunt, ad egrotantē accedat: febris quidem post primam accessionē finietur, id q; cum sudore, vel madore, vel transpiratu, qui halituosus sit. Æger autem, ubi se liberatum à febre senserit, ad consueta munia redibit, lauans, vngens q; se: aut etiam, si agrestis quispiam monticola ue sit, his omiſſis, comedens. Ac uulguſ quidem, sicuti multa alia, utiq; ab ipsa rerum natura edoctum, melius, quā sophistæ, agit, ita & in diariis febribus omnia libi ipsi præstare sufficit, præsertim vbi citra ualentē stipationem consistere. Vbi uero cum eiusmodi stipatione inuaserunt, qui infortunati sunt, in medicum aliquem incidunt eorum, qui diatriton efferunt: qui fortunati, in eum, qui ipsos & lauat, & nutriet, cætera q; omnia præstabit, quibus stipatio soluitur. Sæpe nāq; (ceu dictū est) ex leui obstructione cum cutis latente densitudine, quæ uel ex uitiosa lauatione uel alio quopiam est cōtracta, diariis non nulli febribus sunt correpti: quo tēpore, nisi quis celeriter obstructionē submouerit, in pluriū dierū febres transeunt. Est nanq; eiusmodi febris (quantū ex ipsa est) earum, quæ plures dies infestant & quæ diariæ sunt, cōis, ceterū propter causæ paruitatem, unius diei efficitur: sicut etiam

* τοῦ πίπαι.

A. li. 4. fol. 126
c. 5. fol. 126

A etiam propter magnitudinem, multorum interim dierum: verum accessio eius ab initio ad exitum vsq; vna est, modo ne ipsam excipiat ea, quæ ex putredine humorum nascitur. Ergo, quoad nec in pulsu, nec in calore, nec lotio, putredinis adhuc aduertitur nota, atque ex sola obstructione ortum habet, utiq; ipsa obstructionis solutio eius est sanatio: quemadmodum q; hanc solvere conueniat, ante est dictum. Multæ igitur apparent diariarum esse febrium particulares differentię: Vna, quādo iam prorsus abiit effe-ctrix ipsarum causa, veluti vstio: Altera, quando hæc etiam ad-est, sicut stipatio: cuius duæ monstratæ sunt differentię, nempe exiguorum meatuum densitas, & de qua nunc agimus, obstructio. Sanè densitudo ipsa aliàs ex siccitate provenit, veluti post feruores, aut fatigationes, aut iras: aliàs ex frigore, eo q; vel simplici, vel cū adstrictoria vi: quæ quemadmodum inter se differant, in libro de medicamentis est præceptum. Iam vero obstructionum ipsarum alia est, quæ ex abundantia: alia quæ ex qualitate succorum, scilicet qui aut lenti, aut crassi sint, incidit. Præferetur autē inter remedia, in ea, quam copia facit, sanguinis missio: In ea, quæ ex humorum qualitate consistit, attenuantium vsus. Quod vero ex viribus consilij petatur, ut in diariis sanè est exiguum, ita in iis, quæ pluribus diebus vrgēt, satis magni est momenti: eo q; maioris, quo hæc sunt longiores. Enimvero, ubi naturaliter se vires habent, ne minimum quidem † in plu-
B rium dierum febribus } vacuantium auxiliorum vsus morantur: Vbi non naturaliter se habēt, (voco autem nō naturaliter, cum infirmiores quodammodo sunt) pro magnitudine imbecillitatis impeditur vacuantium auxiliorum vsus. Sanè rarius accidit, ut protinus in primo secundo uel die vires imbecillæ cernantur: accidit tamen interdum, vel propter ægrotantis malum corporis habitum, vel propter senium. Non nullis etiam fatigatio, ubi vstio, & tristitia, vigiliæ q; præcēse runt, & inedia per totum secuta est diem, dein febris prius, quàm homo cibaretur, circa vespere occupauit, & nox in somnis est acta, vires magnopere resoluit.

Quo pacto in Iuvene febricitante Diatriariorum errorem Galenus indicauerit, ac emendarit.

CAP. 3.

N Ecalienum sit, si tibi talem ægrotum describam, in quo primū ausus sum ratione ipsa mihi viam monstrante, & diatriā contemnere, & virium rationē habere: postea q; alios, quos in simili casu vidi, audacter eodem modo, quo illum, curare: siquidem primū periculum post, q; iis, quæ ab indicatione sunt inuenta, subscripsit, ad secundum vsus reddit magis animosos. Ergo iuuenis, qui febre est correptus, annos natus erat quinq; & viginti, gracili corpore & musculoso, veluti canis: tum sicco calido q; omnino temperamento. Iam idem exercitatione quodammodo C delectabatur, & alioqui cogitabundus & industrius erat. Is peregre agens, cum nunciū parum gratum accepisset, & tristatus est, & prope se accingens ad urbem festinauit. Ac priore quidem die & laborauit modice, & lotus cœnatus q; in quodam diuerforio quieuit, sed maxima ex parte sine somno. Postera die etiam magis festinauit: ac longa via, & sabulosa, & squaliente, tum sub feruente Sole confecta, hora propē septima & semisse peruenit in urbem. Ibi, cum ea, quorum causa maturasset, meliora audiret, in gymnasium lauaturus proficiscitur: dein vnctus, vnā cum quodā eorum, qui aderant iuvene, perfrictus est. A quo cū, ut paululum dimoueret, prouocaretur, orta inter eos cōtentione, (qualia sæpe incidunt iis, qui exercitationibus indulgēt) plus iusto est exercitatus: erat q; iam imodice siccus. Egressus vero gymnasium, inuenit amicorum quosdam pugnantes: quos dum dirimit, imprudens in aliam exercitationem non leuem incidit, dum alios eorum diuellit, alios impellit, alios cōplectitur medios, alios ut iniuriōs increpat, ac pro iis, qui iniuriis affecti essent, irascitur, adeo, ut domū se in summa siccitate reciperet, lassitudinem inæqualitatem q; sentiēs. Aquam igitur ex consuetudine bibens, ubi nihilo se leuatum, sed inæqualitatē sibi intēdi sentit, hanc quidē vomuit. Ratus autē vtilius adhuc cibo abstinerere, accubuit, ac quieti se dedit hora fermē diei vndecima: quod cū fecisset, ac nocte tota febre diuexatus vigilasset, postri D die quoq; quieuit vsq; ad meridiē, sperans se somni aliquid consecuturū. Quo tpe cum eū medici quidam diatriā colentes, inuiferent, tum quidem hominī satis magnā esse febrē aiebant, vespere autem se illum reuirsuros. Itaq; & vesperi cum redirent, ac febrem inclinatam cernerent, ne tum quidem nutriendum censuerunt, quāuis etiam id alius quidā medicus suaderet: immo strenue restiterunt, adiicientes, si quidem sine febre esset, fortasse cibum duros: febricitante adhuc minime id facturos. Quin etiam, cum tertio die mane redirent, etiam tertiæ diei accessionem transmittendam censuerunt: erat autem (ut prius dictum est) suspecta hora illius diei vndecima. Ergo digressis illis, ipse accessi, ac faciem iuuenis contemplatus vidi talem esse, qualem in prognosticis Hippocrates his verbis pingit: Nasus acutus, concaui oculi, ac reliqua, quæ deinceps ab eo dicta scimus. Itaq; cum omnino mihi persuaderem fore, ut tum in hecticam febrem, tum quam marasmode vocant, homo, nisi cibaretur, incideret, sorbitionem ex alicā quā primū paro, atq; exhibeo. Et tamen quamuis hac sumpta, cum accessio suo tēpore circa vndecimā inuaderet, sic extremis partibus perfrixit, ut cal fieri hæc vix possent, & pulius illi paruius rarus q; quā maxime fuit. Qua ex causa illi etiā quarto die tum mane, tum vesperi cibum dedi, quo f. & vires repararem, & corpus humectarē: erat nāq; cutis eius, ceu corium, arida. Vbi autē febris tenuis & similis perseuerauit, statui deinde quinto die non simplici sorbitione hominē cibare, ut ante, sed alicā ex aqua calida,

† ἐν τοῖς πολ-
λυμῶν ποῖς τυ-
πεῖς, legunt
tū impleti, tū
pleni; ex ma-
nuscriptis codi-
cibus, ut etiam
Linacervertit.
Sunt tū quidā
codi. q. addant
καὶ τοῖς δι-
γυμνασίοις, i. &
in iis, q. pauco-
rū sunt exerci.

* ἀδύνατος, i.
imbecillus.

METHODI MEDENDI

calida, citra q̄z condituram, iniectis in eam mali punici granis. Est namq̄ is optimus cibus bilioso E
stomacho: nam & roborat hunc malum punicum: & alica, cum diutissime in vētriculo citra cor-
ruptionem maneat, sensim concoquitur, nec accēscens, nec innatans: quæ vitia accedere sorbitio-
nibus aliquādo solent. Incidit vero & in ipso quinto principium accessiōis simile. Item q̄z, cum
▪ octauo. & sexto & septimo cum simili ratione cibassem, in nōno rursus simile principium præcedētibz
fuit. Vbi nimirum vel amentiam, vel pertinaciam, vel, haud scio, quid dicam, corū, qui in princi-
pio hominem transmittere tertiæ dici accessiōem sine cibo iusserant, prorsus intelligere licebat.
Nam, cum cunctis euidenter appareret nunquam peruenturum eum ad quartum suūle, si nutri-
tus ante accessiōem tertij non fuisset, illi & tum eum, & secutis etiam diebus non recte nutritū
aiebant. Ceterum committendum non erat, vt eorum redarguendi studio, ægrum quis non exhi-
bito in ipso accessiōis die cibo proderet. Igitur nono die similiter hominem nutriēs: cernens q̄z
in accessiōe pulsum eius redditum, quā prius erat, firmiorem, cæterum imbecillitatem illam
adhuc præferentem cum extremarum partium frigore: non potui sustinere medicorum illorum
meras nugas, sed vndecimo die præfatus prius ægrotantis amicis fore, vt ipso die intelligerēt ho-
minem hæcenus nostra opera fuisse seruatum, permilimus illi præterire accessiōis horas. Ergo,
cum & sine pulsu omnino in ipsis esset: & frigus eum vehemens totius corporis premeret sic, vt F
nec loqueretur amplius, & vix impellentem sentiret: cōuocati in vnum medici omnes, qui ab ini-
tio videramus, ab ægrotantis propinquis propemodum sumus discerpti, ego quidem, quod ob
pertinaciam vltro ægri salutem prodidissim: qui vero diatriton colebant, propter ignoratiam &
stupiditatem. Ac illi quidem pallidiores frigidiores q̄z, quā ipse æger, consilium quoddam fuge
captabant: quod ego prospiciens, aulæ ostium obserari iusseram, & simul amico cuidam clauem
seruare. Post medius eorum stans, iam, inquam, vobis cōstare planè arbitror, quis hæcenus homi-
nem seruauit. Seruabitur autem & nunc nostra opera. Neque enim, si periturum omnino in hac
accessiōe putassem, à cibatione destitissim: sed, quoniam ex præcedenti iam victu tantū illi ro-
boris superesse noueram, vt tolerare accessiōem posset, permisi accessiōis horas sine cibo trans-
mittere. Ac satius quidem fuisset multo ante hominem nutrire: uerum, quod & istos redarguam:
& quibusdam his auscultatium, qui confici à nobis iuuenem, quod illam occasionem omiserim,
dicunt, perfradeam: nunc illis ostendam vel in accessiōe ipsa ægrotantes quosdam nutriri debe-
re, nedum ante hanc. His dictis, ac diductus hominis maxillis, infundo ex angustis oris vasculo, cre-
moris ptillanæ tres cyathos: paulo autem post albi & tenuis vini, modice q̄z calida diluti, duos cya-
thos. Post quos & sustulit oculos, & tum audire, tum loqui, tum presentes nosse cœpit, cum ante, G
veluti lignū aridum, porrectus, sine voce ac sensu iaceret. Rursus itaq̄ dato ex vino, quo dixi mo-
do, diluto, pane ad comedendum exiguo, prorsus hominē reuocaui. Quem, vt rursus ad institu-
tam ab initio victus rationem reduxi, & tertijdecimi diei accessiōem facile tolerare vidi, in quar-
todecimo rursus mane cibauī: ac post circiter horam octauā laui: deinde rursus liberalius cibauī:
ac mox vinum bibendum exhibui. Idem vero & in duodecimo & tertiodécimo feceram. In quin-
to autem decimo rursus cibauī mane. Cum vero facilius tum quoq̄ accessiōem ferret, in sexto
decimo denuo laui: cetera q̄z circa hominem peregi, sicut in præcedentibus diebus. At, vbi in de-
cimeseptimo minime grauis parua q̄z accessio fuit, audacter hominem de cetero sub cōuale-
scitium victus ratione habui. Hic æger nō paucos feminalorum, ac non penitus alinorum, docuit
etiam ante accessiones ipsas non nunquam esse cibandum, vel si duarum horarum intercedat spa-
tium: ac multo magis ante accessiōem tertij. Ostendi autem tibi & in prima ipsa accessiōis in-
ualione eiusmodi homines esse nutriendos. Dico autem eiusmodi homines, in quibus corporis
intemperies ad liccum & calidum conuersa febres accendit.

Ratione atque Experimento monstratur, quā Vtilis non nunquam sit Ante

Accessiōem vel in ipsa accessiōe Cibatio.

CAP. 4. H

Porro hoc quoque plerisque medicorum fortasse sit incredibile. Sed, siue rationi ipsi fides est
adhibenda, siue operibus, nos fidem ambobus facimus: Operibus quidem, dum homines
ijs monstramus, qui, si biduo patiantur inedia, necesse est, febricitent, ita scilicet, vt non nulli,
vbi concitati ad iram sunt, vel mœrore vel vigiliis affecti: euidentissime enim tum in conuale-
scentibus ex diutino morbo talia fieri cernuntur, tum iis qui calido & sicco sunt temperamento.
Quam vero Ratio ipsa fidem huic rei facit, alibi iam dicta est: dicetur tamen & nunc eius rei sum-
mæ. Mordens halitus & succus, vbi per sensibilia corpora fertur, horrores & inæquales totius
corporis concussiones (πῖν græce dicunt) facit: ex quibus cute stipata, quæ prius transpira-
bant, iam retenta, quoties fuliginosa sunt, febres accendunt. Ergo eiusmodi halitus & succos,
tum multa & vehemens dimotio, tum vigiliæ, & ira, & dolor, & cura augent: tum proxime ab
istis vnum illud per se interdum augere eos sufficit, utique si cibum quis non sumpserit: effi-
citur enim corporis habitus in iis naturis, quæ facile amaram bilem generant, ex longa inedia bi-
liosus. Si igitur tum id incidat: tum æger motu quopiam valentiore, quā pro viribus, vsus
mordentium excrementorum impetum confertim foras excitari: necesse est (veluti in sympto-
matum causis ostendimus) vel concussione, quam modo dixi, vel horrorem subsequi. Ac con-
cussio

A cussio quidem ista succedet propter eorum, quæ feruntur, excrementorum tum multitudinem, tum acrimoniam, tum impetus celeritatem: tum laborantis virium infirmitatem. Nam, & quæ multa, paucis: & quæ qualitate sunt insigni, iis, quæ ita non sunt, mordet magis: pari modo, & quæ cum celeritate feruntur, iis, quæ tarde. Iam vires, ubi valentes sunt, omnia continent ac tolerant: ubi infirmæ sunt reddite, vel abs quouis offenduntur. Horror fiet, ubi & qualitas eorum, & impetus velocitas est remissa: tum copia minor: ac potissimum, cum vires tristanti obliuiscunt. Si vero ita dicta largius remittantur, ne horror quidem fiet, sed vel vlcerosus quidam sensus, vel tantum inæqualitas. Ergo coeuntibus omnibus iam dictis, † quod vehemensissimum est, oritur, utique supradicta totius corporis concussio: † rursus remissis omnibus, nullus ex transitu excrementorum fit sensus. Quod si quædam sint, quædam non sint: & quædam maiora sint, quædam minor: in eiusmodi mutationibus media latitudo omnis, † quæ inter id, quod maximum est, quod *εἰς* græce vocari diximus, & minimum, qui est nullus omnino excrementorum sensus, † efficitur. Itaque nihil mirum est, si dictarum causarum quælibet vel per se, vel cum aliis iuncta: alij inæqualitatem, alij vlcereis quæpiam sensum, aut horrorem, aut dictam concussionem, asferre videatur. Nam pone, vires imbecillæ sint, corpus ipsum admodum sensibile, quippe id quoque ostensum est non parum

B ad eiusmodi symptomatum generationem conferre: habitus autem corporis gracilis, & temperamentum biliosum, stomachus quoque similiter bili affectus: tum his omnibus accedant inedia cibi, & vigiliæ quæpiam, & tristitia, & sollicitudo: ad hæc progressus à domo, qui ex urgente quæpiam causa sit necessarius: postea his propositis (id quod aliquando fieri vidisti) det sedulo operam, ut plus itineris per urbem, re ita postulante, festinus peragat: nunquid huic ex eo, qui excitatus est, mordentium excrementorum motu, primum quidem inæqualitas quædam, mox vero etiam horror, prompte incidet: quod si motum quoque continuet, vel cibum sumere non antevertat, protinus etiam febris: Equidem ita febricitantes aliquos ostendi tibi, maxime ex iis, qui è longo morbo conualuerant. Quorum cum vni forte fortuna occurrissem, qui mox ante horrescere cepisset, ut rem exposuisset, dato ex vino diluto pane, continuo horrorem inhibui. Verum hunc (ut scis) per viam in officinam quandam perductum febricitare prohibui: alios vero, qui prius se domum suam recepissent, in ipso principio horrores, vel paulo posterius, cibauimus. Atque, ut semel dicam, quibus incipientis adhuc accessione aderant symptomata, iis omnibus panem ex vino dilato ac calente mature exhibes, & horrorem statim inhibui, & febrem prohibui. Quanto vero hos citius cibaueris, tanto scilicet magis febrem prohibueris. Quod si paululum aliquando morere, utique febris ne

C tum quidem, calor tamen multus, iis aduenit, simillime plane iis, qui per vehemens frigus facto itinere, reuerſi domum, calidis sunt nutriti. Quippe, si plusculum morere, maiorem calorem sentient, talem quoque ac tantum, ut dubites, an hunc febrem appelles. Sin duæ horæ ab initio inæqualitatis interpositæ sint, nutries tunc quoque, modo horror adhuc duret, prædicens tamen, quod hi febricitant, ceterum innoxia febre, & cui cutis mador succedet: quo facto, tum lauare, tum rursus nutrire debebis. Quod si horror præterierit, ac iam plane febricitent, cibandi id temporis non sunt, sed decreſcente iam accessione ilico sunt nutriendi integritate non expectata. In nullo nanque squalido affectu commode finitur accessio prius, quam illi vel ex lauacro, vel humido victu, humectatio accesserit. Hæc ego omnia cum operibus indicarem, qui me vel laudabant, vel æmulabantur, scilicet quod supra eorum opinionem erant, quæ agerem, *παράδοξον*, quod paradoxa facerem, (ut scis) vocabant. Cum vero ratione de iisdem differens docerem aliquos ante accessionem esse cibandos: aliquos in ipsa, id quoque vel inclinare iam incipiente, vel etiam in ipso summo vigore: tum *παράδοξολόγον* me, quod paradoxa dicere viderer, appellabant. Ergo quid facias his hominibus, quibus nec opere nec ratione persuaderi potest? At, inquit, fieri nequit, ut eiusmodi affectus quis agnoscat. Quomodo igitur nos eos agnouimus? Videtur ne cuiquam fieri non posse, ut calida

D da & licca intemperies agnoscat, vel quæ ab ortu usque fuerit, vel quæ in præſenti tempore talis sit reddita: Mihi sane tam videtur facile, quam has ipsas agnouisse literas. Quid illud vero, si huic non sit adhuc in succis putredo vlla, illi vero sit, non posse vobis videtur hoc discerni? Mihi posse videtur. Nam & ex pulsu, & vrina, & ex ipsa non nunquam, quæ in calore est, qualitate, cui denter id discernimus. Quod si propterea, quod nec ipsi quicquam discere volunt, nec se se exercitare, scientibus parum credunt, quid vetat, quod minus tum geometris ipsis, tum arithmeticis, tum reliquis artificibus omnibus nihil credant?

Calidas & Siccas naturas Inediam non tolerare: ac de Primis capitibus, quibus Ratio Cibandi continetur.

CAP. 5.

Misso igitur hoc genere hominum, rursus seriem sermonis nostri persequamur. Calidas ac siccas naturas aduersissima res inedia est, ac febrium paratissima causa. Voco naturas calidas & siccas non solum, quæ à primo ortu tales ex proprio temperamento sunt, sed et, quæ posterius ex calido sicco quoque victu, & plurima dimotione, & vigilia, & cura, & tristitia, & regione calida sicca quoque, & tempore æstiuo, & coeli statu calido sicco quoque, sunt acquisitæ. Sanè licet & citra temporis anni mentionem, in eiusmodi sermone statum coeli solum nominare. Verum, si altius repetam, id, quod dico, magis credes. Calida & sicca temperamēta, siue ea ex prima origine talia sint, siue ex victu,

et

METHODI MEDENDI

& immodico labore, & animi perturbationibus, & regione, & cœli statu, inedia vehementer ledit. **E** In hac dictione, ipsis saltē verbis, omisum est anni tempus: potestate tamen omisum non est, utpote quod in cœli statu comprehenditur, quādo calidus in summo siccus q̄ cœli status iam dictā temperaturam efficit. Hic autem status alio anni tempore, quā estate, planē incidere nō potest: quando nec in autumno, nec in vere, multo q̄ minus in hyeme, fieri potest, ut calidissimus simul siccissimus q̄ cœli status fiat: sicut nec humidissimus pariter frigidissimus q̄ in alio, q̄ hyeme. Ob hæc igitur ipse quoque aliquando prætermisso anni tempore, cœli statu sum contentus. Liceat tamen cuiq̄ nominibus, quibus velit, uti, modo à rerum natura nō discedat. Est porro rerum natura, qualem & modo diximus, & nihilo minus nunc dicemus: nam, quæ maxime sunt ad curationem necessaria, eadem q̄ maxime ignorata, nec Hippocrates ipse identidem repetere grauatur.

* παθεσι.

* διαβόλις est in i. ap̄t̄is, ut linacet venit. x̄p̄t̄is autē i. t̄ peraturas, ē in i. bulbūdam antiquis.

Igitur inedia siccis calidis q̄ corporibus, valētibus quidē noxia est: iis vero, qui in calida & siccitate febre laborant, quæ scilicet ex vltione, aut labore immodico, aut vigiliis, aut comprehensam animi mōtibus sit contracta, non simpliciter noxia est, sed, si quicquam aliud, planē perniciofa: quippe vel in febres ardentes ex ea incidunt, à quibus, nili prius mors occupet, in hec̄ticas migrant, atq̄ ab his in marasimū: vel protinus ab initio ardentibus præteritis, in hec̄ticas. Maxime tamē (ut dictum sepius est) siccis calidos q̄ affectus statim à principio hec̄tica corripit: Sicuti **F** mulieri accidit, quæ autumno ex tristitia & vigiliis febricitare cœpit: perseverauit autem ad plurimum hyemis. Hanc quarto die (ut scis) vidimus, deprehendimus q̄ statim hec̄ticam esse febrē, cum alia, quā humores excitant, coniunctam. Curatio autem vna tum fuerat, ut frigida tempestiue & moderate daretur, consueq̄ scilicet hanc per sanitatem bibere: verum aliis curatio huius erat commissa, quare nobis silere est visum. Alteri vero, qui eodem tēpore egrotarat, & se nobis commiserat, quoties nutritus est, fontanæ planē gelidæ dedimus interim binos cyathos, interim ternos: quando frigidam simul multam sibi dari, qui ita sunt affecti, citra noxam nō ferunt. Quo circa vtilissimum est, vbi febris ideam perspexeris, in prima statim accessione minore cum periculo, copiosiore frigida uti, corporibus ad validam siccitatem non dum perductis. Qui enim in feruoribus sub canicula ex ira febricitauit, (iuuenis autem hic erat siccus & calidus) vbi in prima accessione duas frigidæ heminas bibisset, statim quidem vomuit flauissimam bilem: non multo autem post etiā deorsum excreuit. Deinde, cum rursus post cibum aque circiter heminam similiter sumpisset, iam febricitare desiit. Non defuere tamen medici, qui, cum nullam à principio febris speciem agnoscerent, sed postea, cum iam præterisset occasio, intelligentes vel in hec̄ticam, vel etiam in marasmoden febrem ægotantem incidisse, frigidam bibendam, nos imitantes, præbue- **G** runt. Sed nemo metam attigit: nam magna sollicitudo habenda est in iis, qui ita se habent, de frigide potionis mensura. De qua paulo post dicemus, vbi propositæ disputationi finem imposuerimus. Quippe eger is, quem antedescrpsimus, exemplo omnibus est, quibus propter siccitatem à principio statim dari cibus debet, etiam si febricitare iam incipiant. Nam, cum acceditur in his febris propter mordentem acrimoniam excalfacti attenuati q̄ ex Sole & inedia & laboribus succi, maximum eius remedium est humidum nutrimentum: sicuti ē diuerso, vbi ob copiam, vel obstructionē, vel phlegmonen, vel (ut semel dicam) humoris alicuius putredinem, febris est orta, maximo malo est cibus. Atq̄ hos quidem nec in inclinatione febris citra noxā nutrias, nedum ipsa accessione inuadēte: illos vero omni certe tempore, sed potissimum per inclinationem. Me quoq̄ subinde vidisti eos, qui ex abundantia, & qui ex phlegmone laborarēt, sub longa inedia tenuisse sic, ut prorsus ante septimum diem non cibarem, sed sola mulsa contentus essem, viribus scilicet valentibus. Quosdam eorum, quibus videlicet vires valide non fuerant: aut stomachus biliosus, aut imbecillus, aut plus iusto sensibilis: solo prissanæ cremore vsq̄ ad septimū diem traxi, quo morbus † in summo esse incremento debuerat, aut etiam oīno per crisin discuti. Sunt igitur tibi à primo statim die in omni egro spectanda duo illa, quæ Hippocrates iussit, à quibus cibandi consilia petas, morbi summus vigor, & egrotantis vires. Postea, si transiri summum incrementum sine omni cibo potest, in cibi abstinētia hoīem seruabis: sin exiguum adminiculum requirat, abūde erit sola mulsa: quod si maius desiderat, q̄ sit ex mulsa, prissanæ cremor satis erit. At, si fas non est summū morbi incrementū, aut tenui victu, aut inedia trāsmitti, id agendū, ut homo statim in primæ accessionis inclinatione cibetur. Aliquos vero eorū (ut dictū est) & cū inuasura adhuc est, & cū incipit, cibabis. Sint porro hi sicco tēperamento ac calido, aut à primo ortu, aut certe illo tēpore, oportet: tū viribus necessario imbecillis: neq̄ enim fieri pōt, ut abūde siccū calidum q̄ corpus, cū febricitet, viribus sit valentibus. Si tū cum eiusmodi febrī ac corpore, momētanei membri phlegmone sit coniuncta, oīno æger moriet̄: nā id quoq̄ prædixisse me semp, nunq̄ vero falsum, ipse testis es.) Magis q̄ id certū est, si pulmonis, vel mēbranę quę costis subtendit̄, vel ventriculi, vel iecinoris phlegmone sit: etenim, quę has partes phlegmonē occuparunt, non modo iis, qui tam imbecillis sunt viribus, sed et iis, qui valentiores ipsis sunt, mortifere esse solent. Vnā q̄ salus tum pleuriticis, tum peripneumonicis, adde et synanchicis i. qui angina laborant, est ipsum virium robur: nō secus vero, & quibus vel iecur, vel ventriculū phlegmone obsidet. Nam, quod ad phlegmonen, quę in iis est partibus, spectat, minime planē est cibadum: quod ad virium infirmitatem,

vtiq̄

† AP. παραμαζωγῇ, i. uecti nare.

A. li. i. c. l. fol. 22

A vtique sæpe. Ita necessario aut vires resoluent, aut phlegmone augebit. Atque hæc mihi latius fortassis, quam pro re, proposita, sunt dicta: qui præsertim hoc libro statuerim de febribus, quæ absque phlegmone insistant, differere. Ceterum tractationis cōuenientia fecit, ut quatenus necessariū esset, digrederemur.

Quo pacto Precauendum sit, ne Febris in Squallente Habitu in Hecticam pertranseat:

ac de Duplici Putredine, quæ febres accendit.

CAP. 6.

DEnuo igitur redeamus ad febres, quæ iam comprehensis febribus sunt affines, quas noiare hecticas solemus. Nam, qui supra descriptus à me iuuenis est, hectica febris laborasset, si mirifica diatrioton transigere fuisset coactus: nisi tamen prius ab iis, qui absque methodo victus rationē ordinare consueuerunt, fuisset intereptus. Proponat igitur alius quispiam, cui cum supradicto cetera quidē oīa sint eadē, vires tamen tanto sint valentiores, ut tridui inedia tolerata duret: Necesse est hunc, si modo ita cibeſ, quæadmodū cibant, qui diatrioton extollunt, in hecticā incidere. Nā si primū in quarto ipsum cibarēt, post in sexto, mox in octauo, deinde in decimo: quippe talis est (ut sepe vidisti) eorū cibandi formula. Prima quidē cibatio post primā diatrioton: reliquæ alternis diebus. Protinus autem (arbitror) & ex artomelite, i. pane ac melle, siccaſſent eius præcordia: nā id quoque ex legibus eiusmodi medicorū est, siue phlegmone viscus aliquod laboret, siue secus. At, quæadmodū quidē eos cibare, qui ita laborent, inter initia cōueniat, supra est dictū: sed nihilo tamen secius nunc quoque summam repetetur. Quoties vel ex lassitudine, vel ira, vel pluribus curis, vel vigiliis, vel tristitia, vel longa inedia, vel vniuersis vnā (sicut in supra descripto iuvene) coeuntibus siccatū corpus est: ac febris inuasit, quæ & aridā reddat cutē, & igneū habeat calorē: vtique hunc talē timor est febris hectica correptū iri, potissimū in æstate, ac cœli statu calido siccoque. Oportet autem, quæ primū pitillanæ cremore, & sorbitione ex alica nutritū, paneque post oblato, aquæ frigida potione hominem cures: quippe protinus extinguit ac cessat oīno febris, modo (ut dictū est) nec phlegmone aliqua ei sit adiuncta, nec putredo humorū. Nam, si horum vtrumuis sit, attendere diligenter oportet, ac discernere, quo primum tpe aquam frigidā dare homini sit audendū. Ego enim taliū quoque non paucis dedi, tutius esse ratus phlegmonas in præsens augere, quam linere hominem hecticam febrem incurrere. Vbi que igitur (ut semper dicere soleo) curatio dignotionem prænotationēque consequitur. Siquidē, & dignoscatur, quod præsens est, & prænoscat, quod ex eo futurum est, oportet, qui volet notabilis efficaciarum remedio uti. Si tamen magnum fore incōmodum vel humorum putredinē, vel phlegmone, cōiciēs, à frigida quidē danda abſtinebis: refrigerantibus autem remediis, quæ foris applicantur, vteris, modo ea super os ventriculi aut tota præcordia, modo super pectus imponens, vbi scilicet plurimum subesse caloris maxime iudicabis. Sanē diximus iis, qui ita laborant, balnea quoque esse non incommoda: dico iis, qui siccatō plurimū corpore sunt, & ex aliqua earū, quæ dictæ sunt, causarū citra humorū putredinem febricitant. Monstratū vero nobis est in iis, quæ de febribus scripsimus, phlegmonas quoque per putredinem humorū, qui in ipsis habent, febres subsequi. Quocirca, siquidē dicā febribus, quæ ex putredine acceduntur, tale quippiam conducere vel non conducere, et eas, quæ à phlegmone excitantur, in cōi putredinis genere cōprehenſas intelliges. Sicubi vero deinceps vtrasque noiare videris, scias eas, quæ ex phlegmone, ab iis, quæ ex sola putredine ortum habent, tum discerni. Cuiusmodi autē sit phlegmones affectus, tum in libro de inæquali intemperie, tum vero in eo, qui de tumoribus præter naturam est inscriptus, docuimus: admonuisse tamen & nunc te non sit inutile.

Cum sanguis calidus copiosior in aliquā aialis partem procubuit, maiora eius vasa protinus distenduntur, utpote abundantiarum continendæ non sufficientia: ab his deinceps, quæ minora sunt. Mox, vbi nec in iis satis continet, exudat foras in ea ampla spatia, quæ inter vasa sunt, sic, ut et oīa, quæ in cōposita carne habentur, loca occupet. Atque hæc quidem est phlegmones affectio. Possunt vero & sine hac in ipsis vasis humores aliqui putrescere, idque aut in vna animalis particula in finibus ipsorum impacti: aut etiā in totis eorum capacitatibus, quæ inter bubones & alas sunt, comprehenduntur. Cum igitur (ceu diximus) citra putredinem squallenti corpori febricitare cōtingerit, caput totius curationis in iis remediis, quæ refrigerent & humectent, statuere oportet.

Sex esse Materia Differentias, quibus Frigus & Humiditas Hecticis Febribus conciliantur. CAP. 7.

Porro duplex genere est harum rerum prima materia: vna eorum, quæ foris admoventur: altera, quæ intro in corpus sumuntur, quæ sanē & prosperomena, id est sumenda, vocant. Extrinsecus corpori incidunt tum aer ipse, qui nos ambit: tum pharmaca, quæcunque humectandi refrigerandique vim obtinent: & tertium præter hæc, dulcis aquæ balneū. Intro in corpus sumunt, quæ eduntur ac bibuntur, & inspiratus aer. Ab his generibus tentandū est propositis hoc loco febribus tum humiditatem, tum refrigerationem comparare. Verum refrigeratio, quā per efficacissimam qualitatem inducitur, & parui temporis est, & periculosa: contra, siccitatis per ea, quæ humectent, curatio, ut longi temporis est opus, ita minus est, quam refrigeratio, periculo exposita. Igitur distas sex materia differentias deinceps iam examinemus, ab ambiente exorſi.

De Eligendo ac parando Aere, qui Hecticis Febribus conueniat.

CAP. 8.

Hic igitur si temperatus est, qualē se exhibet, vtique tali nobis est vtendus, nihil amplius de eo sollicitus. Sin admodū calidus est, vel admodū frigidus, pro calido inducendus arte cōtrarius est, subterraneis inuentis domibus, quæ & frigidissimæ sint, & maxime perflat, & ad septentrionem versa:

METHODI MEDENDI

* ἡ δ' εἶδος, id est
suaves.

* σπινθηρο-
δωρ. αἱ. συγ-
καταμένον, i.
eorum qui cō-
buruntur.

* ex

* ex pectore, &
melargo, & c.
* ex

† καθάπερ
ἐπεκπνέον-
τες, i. veluti su-
perexpirantes.

verse: tum auris quibusdam, quæ ipsis sint propriæ, opera nostra paratis, aliàs ex euripis, in quo se E
deiciant multi aquarū fontes: aliàs aqua frigida de valis in vasa trās fusa. Iam hoc statim etiā som-
niferum est. Præterea domo assidue aqua, quæ prorsus frigida sit, asperfa: ac rosas plurimis humi fu-
sis, aut vitium capreolis, aut ruborum summitatibus, aut lentisci ramis, aut deniq; reliquarū, quæ
refrigerent, stirpiū aliquibus. De quibus est prius est dictum. Turba quoq; hominū ingredi prohi-
bita: nam id quoq; domū calefacit. Atq; ita quidem calidissimum aerē refrigerare, qui si in æstate
calida & sicca accidit, est tentandum: quandoquidem in hyeme calidissimus esse nō potest, sicuti
nec frigidissimus in æstate. At, si quis modice frigidus est, hoc esse contentos oportet, nihil aut ma-
chinantes, aut de temperie eius alterantes. Qui vero frigidissimus est, utiq; quatenus respirando
attrahitur, admittendus est, ut qui calorem, qui est in corde, admodū refrigeret: non tamen quate-
nus extrinsecus ægrum cōtingit, quippe id densat cogit q; cutim, ac putredinosorum humorum
effluxum transpirare prohibet. Siquidem per pulmonem, quod rarum viscus est, difficile nō est,
ut tum qualitas ipsius, tum est substantia, ad cor facile perveniat: at, per cutim, fieri nequit, ut eius
vel qualitas, vel substantia, ad cor perveniat, utpote prius densatam. Nam, quod in libris de simpli-
cium medicamentorum facultate, de iis, quæ vehementer adstringunt, est dictum, id hic quoq; re-
uocari ad memoriam debet, ac sciri, qui nimium frigidus aer est, hunc cutim densando, semper F
sibi ipsi viam præcludere. Scire tamen licet maius fore ex frigida inspiratione cōmodum, q̃ ex cu-
te densanda incōmodum: præsertim cum operimentis hanc calfacere licet. Porro utēdum maxi-
me eiusmodi aere est in iis heceticis, quibus primū, quod afficitur, ipsum est cor: æque ut, si ventri-
culus primū esset afflictus, ipsi per comesta & bibita esset succurrendū: huic enim illa cū integris
adhuc viribus occurrūt, sicut cordi inspiratus aer. At iecinori ex inspirato aere nulla certe utilitas
accedit: à comestis vero & bibitis minor planē, q̃ ventriculo, cæterū aliqua non obscure aduenit.
Communis autē omnium sanatio est per ea, quæ extrinsecus applicata refrigerant & humectant.
Atq; in his quidem visceribus magna ex parte heceticas marasmodos q; febres accidere contem-
plati sumus. Superueniunt tamen aliqñ & pulmonum siccis calidis q; intemperamētis: attamen
opportunitatem eiusmodi febribus id viscus non est, utpote humidum laxum, quæ. Incidunt præte-
rea & pectori, & pingui membranæ, quod Mesaræon dicitur, & ieiuno, & colo: interim vero &
vtero, & renibus. In septo vero transverso marasmodum non vidi, heceticam sanē febrem vidi, &
hanc semel quidem planē absolutam, sæpe vero citius interimentem, q̃ planē esset cōpleta. Eius-
modi nanq; affectum & spirandi difficultas, & deliriū excipere solet: ex quibus magna ex parte
prius moriuntur, q̃ hecetica prorsus sit perfecta. Est autem eorum agnitio facillima, tum ex pulsus G
duritia: tum ex eo, q̃ præcordia plurimum trahuntur sursum: tum ex difficultate spirandi, quæ il-
lis est & inæqualis & varia: quippe aliàs quàm maxime paruum & frequēs spirant: rursus aliqñ
manifeste spiritum tardant: dein subito, quemadmodum gementes respirarunt: vel duplicem spi-
ritum intromissionem, quasi superinspirantes, vel duplicem foras missionē faciunt: † veluti respi-
ratio respirationem comprehendat.} Respirant vero hi sæpe & reliquo thorace toto, non sensibi-
liter modo, verū etiam notabiliter, tum operas scopulas, quas Homoplatas vocant, attollentes:
aliqñ admodum raram & magnam respirationē edunt, utiq; cū delirii malum præcipue domi-
natur. Verū præsentis instituti non est vel laborantium partium notas, vel earum causas referre.
Quare denuo ad curationes reuertamur: æstimemus q; quas vires propositæ iam materiæ aduer-
sus heceticas febres habeant. Sanē diximus iam nō nulla de aere tum calido, tum frigido: qui præ-
cipue quidē est utilis, cū, quod primum afficitur, ipsum est cor: quis cōfert & in reliquis febribus
nō parum, qñ quidem in his quoq; necesse est, cor similē intemperie recipiat: citra quā nec maras-
mus, nec hecetica, nec reliquarū vlla febrium, consistere potest. Quo facile apparet etiā pulmones,
vbi scilicet ij sunt, qui primum patiuntur, plus cæteris omnibus refrigerantem aerem requirere.

De parandis Medicamentis, quæ Extrinsecus Heceticis admoventur.

CAP. 9. H

SEquitur iā, ut de iis medicamentis agam, quæ extrinsecus admodum humectent, & refrigerent.
Porro horum quoq; ea deligenda esse, quæ citra vehementem adstrictionem refrigerent, ne-
minem latet. Talia enim, præterq̃ q̃ non humectant, etiam demittere frigiditatem suam alte non
valent propterea, q̃ cutim cogunt, ac coarctant. Optima vero sunt, quæ non modo citra adstri-
ctionem refrigerant, sed etiam corporis substantia sunt tenui. Ac, quæ quidem absolutissime te-
nuium partium sit, substantiam exacte frigidam inuenisse fortasse non est. Dixi, exacte, propter
acetum, quod cum omnium, (quæ nouimus) potestate refrigerantium planē tenuissimarum sit
partium, admistam sibi aliquam caliditatem habet. Præterea corpora, quæ cōtingit, siccant, quāvis
ad imaginationem sit humidum. Quo fit, ut ad eos affectus, quos humectari & refrigerari expe-
dit, solo eo nō utamur, sed tanto aquæ frigidæ admisto, ut possit bibi. Ceterum, quanquā corpus,
quod absolute tenuium partium sit & simul frigidum, inuenire non est, attamen deligi materias
oportet, quæ ad eiusmodi medicamēti compositionem maxime sint idoneæ. Ac dictum quidem
latius de his est in opere de medicamentis. Dicitur autē in exemplis non nihil & nunc, quod in
hoc quoq; genere membratim sis exercitatus. Incipiam autē ab eo medicamine, quod omnium,
quæ humectent ac refrigerent, est simplicissimum: quo etiam aduersus erysipelata vtor, & phle-
gmonas

A. I. 611.
C. 4. 411.

Agmonas in pudendis, vtiq; inter initia, prius, q̄ depascens aliqua subindictur putredo. Debebit autē ad id præparata esse cera quā optima, & elota. Sanē optima fuerit vel alba pontica, vel quæ ex atticis sit fauis. Esto autem & "rosaceum, quod ex oleo sit a non nullis vocato omphacino, ab aliis crudo, quod q̄ citra salem sit confectum. Maxime vero ad rem pertinebit, si & ipsum oleum tenuium prorsus sit partium: cuiusmodi sabinum est. Cum vti voles, ambo multa liquātor in vase duplici: facto q̄ humido cerato, (cuiusmodi serit, quod triplum aut quadruplum ad ceram rosaceum habet) post, quā ipsum fuerit refrigeratum, miscetor ei paulatim in mortario tñ aquæ, quantum in se, dum cum ea mollietur, accipere possit. Expedi aut & ceratum ipsum prius admodum esse refrigeratum: atq; etiā, quæ huic admiscebitur, aquam esse frigidissimā. Abunde aut ceratum refrigerabis, si, cum modice coiuit, totum vas, in quo continetur, in aquam frigidissimā dimittas. Quod si aceti quoq; admodū tenuis ac clari paululum adicere velis, vtiq; magis adhuc tum refrigerans tum humectans medicamentū efficies. Non debebit autem medicamentū hoc eo vsq; super agrum corpus manere, dum manifeste incaleat, sed assidue subinde mutari. Aliud medicamentū. Oxalidos, aut oxylapathi succus cum exigua tenui polēta mista excipiat duplicato peniculo detrito: afflatim q̄ frigidum & ipsum imponatur. Quod si eiusmodi peniculi occa-

* ξυσσίτην, id est deras, ē i antiquis cod. græcis.

Bsio non sit, tum linteum duplicatum, & madefactum refrigerandæ particulæ impones. Quin etiā portulacæ, & semperuiui, & vix immature succus, similiter polēta miscentur. Ad hæc lens palustris, & viridis tribuli, & polygoni, & lactucæ, & intybi succus, alia q̄, quæcunq; refrigerare est dictum, cum tenui polēta. Præterea sine polēta licet integris herbis tñtis vti. Iam vero, quod epithema ex pinguibus sit palmulis, quas πατητούς græce vocāt, salutare medicamen est. Porro coquere oportet harum carnē, omni membranoso exēpto, aliās ex solo claro aceto: aliās & aqua ipsi admista: atq; hac, vbi tenera satis reddita est, tñsa vti. Quod si parum molli crassitudine videbitur, præstiterit iam dicti aliquid admiscuisse cerati. Quod si rosacei quidpiam dictorum singulis aliquñ miscere volueris, nihilo inutilius pharmacum habebis: esto autem, quod admiscetur, tñ minimum, tum & simplex & perfrigidum, & quod factum ex oleo sit salis experti. Sanē, quoties simplex rosaceum, aut aliquid quiduis id genus dico, quod sine aromatis est confectum, intelligi volo. Est vero salutare ad talia medicamen & rosarū succus frigidus, vnā cum polēta. Salutares vero sunt & ipsæ rosæ tñsæ: præterea stirpiū, quæ moderate adstringunt, germina trita. Ad quē modum vti aliquando licet & herbis, quæ mediocriter adstringāt, veluti solano. Verum eiusmodi medicaminum materiā in alio opere reddidimus vniuersam: nunc abūde pro exemplis sunt, quæ iam dicta sunt. Porro vtendum his est, nō (sicut vulgus facit) toti impositis thoraci, aut toti ventri, immo illi maxime, quod primo est affectum. Neq; enim necellum est, vt aut cum eo, quod refrigerari valenter desiderat, etiā id refrigeres, quod prorsus non desiderat: aut ante iultū tempus refrigerare desistas, timens vicinam aliquam particulam lædi. Ego nanq; hominem scio, qui imposito præcordiis refrigerante medicamento, difficultate statim spirandi laborarit: alterum vero, qui protinus tussierit: atq; paulo post vtriq; finitum symptoma, vbi, quod refrigerauerat, est ablatum. Quod si adeo strenue refrigerare non studebis, habes, quæ id modice efficiant, adhærentium medicaminum, ac cerati speciem referentium magnam copiam. Quorum non materiæ

* αλσίτων. quā dictionem alij fatinā vertunt.

* ἐμπλαστῶν.

De Balneorum partibus, ipsorum quæ facultate: ac qua ratione Hæctica febre laborantes sint in Balneum ducendi.

CAP. 10.

Verum ego, cum iam sentiam mensuram præsentis instituti me excedere, ad ea, quæ tractationis series proxima exhibet, conuertar. Proxime vero se a iam dictis exhibet cōsideratio de balneo, tum ipsius rei causa, tum vel magis propter Philippū, qui † hæcticis, quas μαρασμώδεις vocant, ‡ ipsum noxium putat. Ipse igitur tum de omni balneorum vi, tum etiā quæ ad eos, **D**qui hæctica & marasmo laborant, vel (vt semel dicam) omnibus est accommodata, in hoc maxime libro, quid sentiam, explicabo. Memini nanq; me & supra in diariis febribus illa laudare: & in septimo huius operis libro, in iis, qui propter siccam ventriculi intemperiem cruditate laborabant atq; extenuati erant, saepe vtenda iubere. Caterum de vniuersa eorū vi nullo alio libro disserui, sed in hunc seruauī: vbi & de iis agitur, quibus efficacissimus eorū est vsus, & quibus Philippus ea interdicit. Atq; prius quidem, vbi de vlcerū curatione egimus, indicata causa est, cur propriæ cuiusque morbi indicationes sint ignoratæ: dicitur autē nihilo secius & nunc, vtpote tum ad ea, quæ nunc paramus, tum ad ea, quæ dicenda sunt, vtilis. Cum enim vnus in corpore affectus est, eius curationem inuenire, si non ratione, certe experientia, haud difficile est: vbi vero connexi duo tres ue sunt, præsertim qui maxime contraria inter se auxilia requirant, fieri nequit, vt experientia, quod agendū sit, inueniatur: immo nec facile ratione. Siquidem & substantiā cuiusq; affectus ad vnguem nouisse oportet: & propriā curationis indicationē a quoq; affectu cepisse: præterea quē primū omniū, aut magis: quē rursus minus, aut secundo tertio ue loco curare conueniat. Hæc igitur causa est, cur vulgo medicorum ignotum sit, & q̄ febriū omniū, quæ febres sunt, proprium remediū refrigeratio sit, siue ea talis actu sit, siue potestate: & q̄ alia multa ex accidenti refrigerantia, febriū sint remedia. De quibus & dictum non nihil in præcedentibus est, & in

† τοὺς μαρασμώδεις, i. e. iis, q̄ marcescunt.

Septima Classis.

iiiiiii sequētibz

METHODI MEDENDI

sequentibus dicitur. Quædam nanq; remedia complicatam quodam modo duplicem q; facultatem habet ita, vt & prima ratione proficiant, & ex accidente. Quod genus & balneum est. Nam frigida potio per se quidem proficit, vt pote actu refrigerans: succus autem vix immatura potestate refrigerans medicamentum est. Atque hæc quidem ambo refrigerant primum, id est per se ipsa, nec intercedente alio: at sanguinis missio (veluti prius indicauimus in febribus continentibus, quas synochos vocant) non primum, sed ex accidenti calidam aliquam intemperiem sanat. Ad eundem modum & clyster, & purgatio, & fomentum ex calido liquore, & cataplasma, quod digeratur, aut concoquat. Vtranq; vero facultatem in se comprehensam habet propositum nunc in sermone balneum, vt pote ex partibus varia facultate præditis compositum. Quippe ingredientiæ in aere versantur calido: postea in aquam calidam descendunt: mox ab hac egressi, in frigidam: postremo sudorem detergent. Potest autem prima eius pars materias per totum corpus tum calfacere, tum vero liquare: præterea, quæ inæqualia sunt, æquare: & cutem rarefacere, & multa, quæ sub hac ante detinebantur, vacuare. Secunda eius pars, vbi quis in sicco corporis affectu ea vititur, potest maiorem utilem solidis partibus immittere. Tertia balnei pars potest, vbi quis frigida vititur, & totum corpus refrigerare, & cutem densare, & vires firmare. Quarta vero corpus per sudores citra refrigerationis noxam vacuare. Ergo, cum hæc omnia circa hominis corpus efficere valeat dulcis aquæ temperatum balneum: & præter hæc etiam, si quis intempestiue lauatur, tum horrores, tum cutis densitatem: tentandum nobis est omnia deinceps distinguere, ac primum de illis sermonem facere, qui, cum in balneo se lauant, horrore tentantur. His enim vna (vt sic dicam) continens excitati symptomatis causa est: aliæ, quæ hanc præcedunt, multæ. Sanè horrores causam esse dico mordentium excrementorum confertim actum citatiorem motum. Proinde, quibus horum est abundantia, caro vero ac cutis densa, siue balneum sint ingressi, siue steterint in Sole, siue quoquo modo vel gestati, vel perfricti, vel exercitati, vehementius sint dimoti, utiq; iis horror incidit. Contra, quibus hæc pauca sunt: & corporis habitus, vt laxetur rarefiat q; à balnei calore, promptus: non modo non horrent, sed etiam meliores redduntur, vt pote excrementis per id vacuatis. Quo rationabilius nec in febrilis significationis principio, nec in incremento quisq; ægrotantem lauit: quippe densata est hoc tempore coarctata q; & cutis ipsa, & quæ sub hac habetur, carnea substantia. At in febris inclinatione vel incipiente, vel procedente, vel amplius progressa, & nos sæpe, & alij medici non nulli multos sæpe numero ægrotos lauantes non parum his contulimus. Porro, quando inclinatione incipiente, aut iam progressa, aut etiam in summo incremento (interdum enim id quoque accidit, tametsi raro) æger in balneum sit ducendus, in sequentibus definiemus. Nunc, cum de generali facultate singularum balnei partium differere institui, vnum omnium primum exponam. Dico q; multos eorum, qui cruditate laborant: plures vero eorum, in quibus mordentium excrementorum abundantia subest: omnes præterea, qui vel in febrili significatione, vel in ascensu: etiam omnes, qui in summo sunt incremento præter admodum paucos: siue hi sint in balneo ingressi, siue steterint in calido Sole, siue exercitationes frictiones gestationesue tentauerint, merito horrescere: singula nanque horum confertim & impetu agi excrementa subigunt. Cum igitur tam adhuc densa lauantis cutis sit, vt ad primum ambientis aeris occursum nequeat naturalem suum habitum recipere, sed maiore ad id spatium indigeat, excrementa vero foras versus ruant vniuersa, & retineri illic ea est necesse, & quæ sub cute sunt acervata, & quæ per carnes feruntur, mordere. Porro in libris de causis symptomatum indicauimus mordentia excrementa, vbi per sensibilia corpora feruntur, tum collisiones, quas *ρίγη* vocant, tum horrores excitare. Ergo, quamobrem horreant in balneis omnes, qui ante sunt comprehensi, iam causas inuenimus. Pari modo, & cur non horreant, quibus aut nullum est in corpore excrementum mordens, aut tantillum, vt facile vacuet. Ergo de his deinceps loquamur: propter quos etiam de iis, qui horrent, meminimus. Siquis enim balneum ingressus non inhorruit, sed laxata est illi rarefacta q; cutis, huic planè necessario prædicta succedent, excrementorum vacuatio, æqualis per totum corpus calor, exiguorum meatuum rarefactio, tensorum relaxatio, densatorum fusio. Ac vacuatio quidem excrementorum omni febre est utilissima: pari modo, & rarefactio, & relaxatio: fusio tamen & calor non item. Sed calor omni febre est inimicus: quoniam refrigerari, non cal fieri febrium affectus postulat. At fundi equaliter, id solidis quidem aialis partibus non est alienum: succis certe non perpetuo est utile, sed quoties in aiali vel phlegmone quæpiam, vel affectus phlegmonæ similis constitit, vel vtrius abundantia, siue ea quæ ad vires confertur, siue ea quæ ad vasorum capacitatem, omnium profectio inimicissimum. Ac phlegmone quidem, cum calefacti, & liquati succi ad ipsas confluunt, augentur. Tunica vero vasorum impares abundantia, quæ iam ex liquatione spiritu est impleta, distenduntur: ac vires hoc ipso male afficiuntur. Ergo calidis his siccis q; affectibus, de quibus agebamus, emissio mordentium est salubris: fusio enim eorum est citra periculum: calefactio tamen noxa non caret. Atq; hæc quidem ex prima balnei parte iis, qui ita laborant, provenire, modo tempestiue balneo utantur, memoria teneamus. Transeamus modo ad secundam eius partem, quæ erat id, quod maxime proprie lauacrum vocant. Ergo in hac, sicut ex humectatione iuuatur, sic ex calore nihil illis commodi accedit. Accedamus & ad tertiam, in qua & refrigerantur innoxie, quæ fuerant excalfacta, & vires firmantur.

Siqua

* *ἰπιβροχίη*.

† In codicibus grecis impressis, ac antiquis plevisque legitur, *θερμῖναι τε δι' ὅλου τοῦ σώματος, ἢ χέαι τὰς ὕλας*, i. tum totum corpus æqualiter calfacere, tum materias fundere. Linacer vero legisset, vt aliqui etiam codices legunt, *δι' ὅλου τοῦ σώματος*. priorem tamen lectionem meliorem esse indicabunt verba paulo inferius à Galeno scripta, hoc est, æqualis per totum corpus calor &c.

* Impressi cod. & multi ex antiquis legunt, *κατεχομένων*, vt Linacer vertit. sunt tamen, qui legunt *καταχομένων*, i. sua erant.

* *ἀποχρῆσις* θα

A Siqua vero & rarefacta, & iusto plus sunt laxata, ea in naturalē redeunt mediocritatem: id quod quarta balnei pars indicat. Quippe, quibus oīa rite sunt adhibita, in post frigida vsum adhuc sudat, & omnia ipsis excrementa vacuantur. Itaque ex oībus, quę de balneis retulimus, vna summa colligitur, quod vacuatur quidē quicquid in corpore vel fuliginosum, vel humidum fuit: conuulsunt autē in naturali symmetria, tum caro ipsa tum cutis: solidarum partium ariditas corrigitur: & calor nō modo is, qui ex lauacro accessit, verū etiam qui prius fuit, ex frigida vſu submouet. Maximo huius rei documento est status, qui ex eiusmodi balneo redditur post, quę in Sole feruente iter fecerimus. Quippe accedimus ad id ne loqui quidem præ lingua & faucium ariditate valentes, totū que corpus stipulæ ritu aridum habentes. At egressi ē frigida, ilico omnia pro naturæ habitu recipimus, nec febrili calore vexati, nec liccitate afflictī, promptē quę loquentes, ac plurima sitis parte leuati. An igitur euidentius adhuc balnei vires in sicco & calido corporis affectu cognoscere desideras? Ego sanē nō arbitror. Licet autē, cui placet, experiatur, quod incōmodū sequatur, vbi tali peracto iunere non lauerit. Aut enim statim febricitabit, aut multo plenus tēdio, grauato scapite, perseverabit, potissimum si frigida calorem nō dum extinxerit. Multi tñ iuuenes eiusmodi cōfectis itineribus, vbi ilico se in aquam frigidam proiecerint, iuuantur: ac potissimū, qui valentibus sunt viribus, & frigido solio assueti. Ita vero & ruri faciunt, vbi, quod balneę non sunt, in stagna vel flumina se ipsos coniciunt, nullo medici suasu, sed ipsa gubernante corpus natura ad id, quod cōducat, impulsi. Quæ eadem, etiam ratione carentibus aīalibus instinctum inserit ad eorū, quæ offendunt, contraria: siquidem ea quoque, vbi est vexantur, frigida se lauant: sicuti etiam, vbi frigore vrgentur, calida cubilia sibi inueniunt. Eodem cōtrarietatis studio etiam, cum esuriunt, comedunt: & cū sitiunt, bibunt: reliqua quę omnia naturæ impulsu obeunt. Ac si certam febricitantium naturæ notitiam haberemus, non, arbitror, dubitaremus eorū aliquos assidue in aquis frigidis citra balneum lauare. Nam, quod sint quidam, qui eam desiderant, vel ex iis, quos iuuat, constare potest: ut quibus frigida lauatio haudquaquē contulisset, nisi eo tempore recte ad eā dispositi fuissent. Verum, quā exacta nobis dispositionum notitia non est, ac maxima ex errore impendet noxa, utique eiusmodi præsidia recusamus: potissimum in febribus hecticis: quando per has, & pauci sanguinis, & nudum carne, & expers adipis redditum corpus est. Nullū enim hi solidarum partium munimen habent, quod frigida occursum sine noxa excipiat: sed protinus similaribus ipsis partibus occurrit, a quibus omnes animantium actiones obeuntur. Iuuenis vero, cui abunde sit carnis, estatis tempore, atque in febris summo vigore, modo nulla viscerum phlegmone sublit, si in frigidam se coniecerit, sudabit: quod si frigida lauationi sit assuetus, securus remedio utetur. Verū de eiusmodi corporibus post agetur. Qui autem ex calida & sicca intemperie, hectica febricitant, ac potissimum qui iam marasmodos fiunt, iis, vbi tale præsidium petunt, tutum non est in totam conici, æque, ut nec gracilibus & imbecillis, qui estate calida & sicca, longa via peracta, refrigeratione indigent: nam neque his tutus est frigidi solij vſus, nisi prius fuerint in balneo æqualiter excafacti. Quippe simile quiddam nobis accidere videtur, cum in frigidum solum post balneū ingredimur, ei, quod ferro accidit, cum tingitur: etenim tum refrigeramur, tum roboramur, quem admodum & illud, vbi candens iam redditum frigida mergitur. Atque huius rei causa ad imbecilla corpora inuenta sunt balneæ, quæ ea præcalfaciant, atque ad frigidum solum præparent. Non dissimile quiddam faciunt, & qui sine balneo frigida vtuntur, cū scilicet se ab exercitatione in eā saltu demittunt. Siquidem, cuiusmodi nobis est balneū, eiusmodi illis est exercitatio: ut quæ non tñ calfaciat, sed etiam insiti caloris motum a profundo corpore extrorsum concitet sic, ut & frigida impetui occurrat: & quod minus violēter in profundum ruens, viscerum aliquod feriat, aduerſetur atque prohibeat. Nam neque ipsam frigidam substantiam, neque eius qualitatem omnino integrā vsque ad viscera pertingere est salubre: immo & satius & tutius est solam eius qualitatem, † per ea, † τὴν αἰσθητικὴν δύναμιν ἀπολαύειν

D quę intercedunt (ut sic dicam) propagatam, ‡ citra substantiā ad profundum permeare. Iam, qui hectica febricitantes ad balneum accedunt, nisi in frigidam sint dimissi, nihil iuuantur. Qui enim aliter febricitant, eorum solide partes non dum difficile separabilem calorem obtinent. Itaque etiā ex sudoribus, vna cum insensibili transpiratu, abunde his remedij est: et sanē diariarum febrium ipsam propemodum substantiam vacuari per hæc contingit. In iis vero, qui ex liccitate & caliditate febribus hecticis vrgentur, solidarum partium affectus candēti ferro est similis. Quo vtrique minus eos in balneis callecisse dūtaxat humectāre quę contenti esse debemus, quippe cum sic alimentum, incrementum quę febris præbuerimus: immo melius erit, ut meris in frigidam extingamus calorem. At in hoc metus est, ne corpus in diuersa transferas, ac frigidum reddas. Quis hoc negat? Non tñ propterea vitio dandū est, quod prospere ex præsidio succedit: nec propterea, quod mensura eius deprehendi est difficilis, prorsus est deferendum. Siquidem, si aliter liceret tum ceteras hecticas febres, tum marasmodos sanare, cōsultius esset tutiore via insistere: nunc, quoniam totum curationis momentum in refrigerando humectando que consistit, omnibus vero refrigerantibus auxiliis propter corporis horum gracilitatem noxa imminet, necessariū arbitror Thucydides esse consiliū, Agentes aliquid vel periclitari. Quibus enim alia salutis ratio non est, & quæ vnica videtur, ea dubia est, necessum, arbitror, his est aduersos periculis ire. Sed nec error ipse aut

METHODI MEDENDI

mortiferus est, aut irremediabilis. Siquidem, quos in extinguenda febre aqua frigida in contrarium affectum transtulit, hos licet in toto, quod sequitur, tempore calfaciendo sanare. Iam nec periculum par est nec frigidi affectus, nec etiam ipsius remediorum. Indicauimus nanque tum prius in huius operis septimo, tum in libro de marasmo, tum ante hos in libris de tuenda sanitate, fieri non posse, ut solidarum partium siccitas consummate sanetur. Quod si fieri id posset, utique fieri posset, ut non senesceret, qui ea victus ratione vteretur. Si igitur insanabilis solidarum partium siccitas est, tum expeditissima in eam per heclicas febres via patet, melius est hominem in frigidam in temperiem transferre, ac, cui curationem deinde adhibeamus, habere. Quippe, qui id fecerit, is postea noxam oppugnaverit: qui vero mortiferam insistere viam sinet, is desperatam aegrotanti salutem fecerit. Quanto itaque satius est aliquid non nulla fiducia, vel cum periculo facere, quam spe adempta certo perire, tanto profecto satius est potentibus praesidiis pugnare, quam nihil agere. Ergo ilico eos, qui hectica febricitant, omni ratione refrigeremus ante, quam progressi in marasum peruenerint. Quem autem marasmus plane iam occupauit, hunc sanare ne tentaueris. Nam, et si calorem eius extinxeris, attamen siccitas, quae relinquitur, senectutis ritu hominem conficiet, tantisper nimirum victurum, quoad solidae eius partes reniti aduersus summam siccitatem valebunt. At qui maluerit fortasse propinquorum aegrotantis aliquis, atque etiam aegrotans ipse, aliquo spatio in senis habitu vivere, quam ilico mori. Itaque curare hos quoque cum praefatione expedit, ac in alterum transferre marasum, quem iam nominare senium ex morbo insueuimus: licebit enim his non tam plures dies, verum etiam menses vivere. Ego namque, cum iuuenem quendam, qui ita laborabat, sanassem, reficiens deinde, ac senilem eius imbecillitatem pro senum ratione tractans, non solum in menses, sed etiam annos viuum seruauit. Nec est, quod hic eiusmodi marasmi curationem audire desideres, utpote tum in huius operis septimo, dum siccitas & frigidas intemperies sanauimus, tradita potestate: tum operis de sanitate tuenda ea in parte, quae senibus alendis est delegata. Praesens autem liber non marasmodis, sed hecticarum febrium curationem docendam promissit. Ex quo genere sunt & quae marasmodis graece dicuntur: de quibus tum alia non pauca diximus, quae non modo rationis, sed etiam usus iudicio probauimus: tum illud scilicet non oportere balneum (ut Philippus facit) formidare: qui cautius fortassis eo utitur, ad eum modum, quo in caeteris solemus febribus, quas vel phlegmonae, vel putrescentes succi accenderunt. In his enim nihil offendes, etiam si in frigidam agrum non miseris, sed eum (ut mos est) perfundas primum tepida, postea quae veluti ex Sole tantum aestiuo tepet: mox hoc, etiam paulo, quam illa, frigidior. In hecticis vero febribus, id, quod remedium affert, calidae solium non est, sed frigidae: ad quam balnea aegrotantis praeparant corpus aequae, ut reliquorum omnium, qui per sanitatem lauantur. Porro non propter id modo videtur mihi Philippus ignorare, quam salubris res balneum sit in iis, qui marasmode hectica laborant, quod tam extenuatos in frigida solio tingere nemo audet, aut saltem vltimam aquam ipsis frigidam infundere, sed etiam quod saepe altera coniuncta febris est, quae vel ex humoris putrescentia vel phlegmone sit excitata: tum vero quod tali hectica laborantium mortiferum est vitium: ac propterea quidam non recte omnia, quae his exhibentur, culpant, cum non sit illis imputanda culpa, sed affectui. Ergo recensitis denuo, quae diximus, huic disputationi finem imponemus. Quicumque hectica febre laborant, atque ex his praecipue, qui iam marasmode hectica febricitant, modo his alia nulla febris vel ex sola putredine humorum, vel cum phlegmone, sit adiuncta, eos omnes audacter lauabis, sed prorsus citra omnem laborem, ne vires resoluas: quod ipsum cum noceat vehementer, occasio fit balnei culpandi. Quod citra laborem dixi, id ita intelligo. Volo, aeger in balneum super lectulo deportetur: et in cuius prima est tribus domo nudetur, ac transferatur in sindonem calentem prompte in id ipsum paratam. Sint autem quatuor, qui hanc teneant, a quoque fini vnus. Ac, si quidem prima domus satis calida sit, aeger in ea nudatus, in secundam portetur: si tibi frigidior videtur, non nudus, sed coopertus vel alia sindone minime frigida, vel tali aliquo inuolucro. Constat autem & si sindonem eam, qua portabitur, esse valentiorum oportere: aut, si imbecilla per se sit, duplicari eam erit satius. Esto autem media domus non tantum situ media, sed etiam temperie, tanto scilicet, prima calidior, quanto est tertia frigidior. In hac domo oleum tepidum esto, quo aeger super sindone illatus protinus perfundatur. Hoc facto tertiam ingrediantur domum, ducantque hominem, ubi solium est sic, ut per tres balnei domos distaxat transierint. Per quas nec celeri gradu transibunt, qui aegrum portant, sed tantisper in prioribus domibus morabuntur, dum in altera transferatur in lectulum: in media vero, dum perfundatur oleo. Esto autem & aer cuiusque domus nec summo calore, nec etiam frigens, sed admodum temperatus, & modice humidus: id fiet, si aqua temperata ex labro sit liberaliter proiecta sic, ut perfluat per omnes domos. In ipsa vero solij aqua mediocriter moretur, id quod in sindone sustentus, nulla infusione aquae, cuiusmodi in aliis uti solemus, adhibita. Immo nec capiti eius infundi quicquam velim, cum sit satis id quoque bis ter uel vna cum toto corpore in aqua mergi, demissa mediocriter deorsum sindone, ac rursum per quatuor iuuenes, qui eum portant, leuata. Mox hinceductus, in frigidam semel totus tingatur, ne vel breuissimo quidem spatio illic moratus. Porro, qui eum portant, tum reliqua omnia curiose esse edoctos conueniet: tum celeritatem tingendi, non documēti modo, verum etiam praeepti loco, praeter caetera habere.

Protinus

† Parataque, ad manum habeat calentem sindonem, super quam, in prima trium domorum balnei nudatus, transferatur.

A. li. 1. c. 6. § 33.

A Protinus vero alter paratam habens sindonem ipsi iniiciat, {ac deinde aliā.} Tum in lectulo collocatus, primum spongiis detergeatur, deinde mollibus linteis. Nec committent, qui cum detergebunt, vt violentius eum contrectent, sed, quoad fieri potest, blandissime. Post hec vnctum ac vestibus amictū, rursus super lectulo in domū, vbi cibat, reducent, ac nutrient. Sanē dictū supra est in horum commentariorum septimo, vbi siccam ventriculi intemperiem sanauimus, domum balneo debere coniungi. Ac de balneis quidem satis (quod ad rem propositā spectet) hactenus.

De Alimentis eorum, qui Hectica correpti sunt, ac de Curandis Hecticis, quæ

Marasmodos appellantur.

CAP. II.

S Equi prædicta videtur, vt de nutrimenti facultate præcipiam. Sanē frigidum esse, ac humidū, quod hecticis febribus sit conducturum, nemo nescit. Eiusmodi vero sunt tum puillanæ cremor, cum frigidus sumitur: tum alica similiter puillanæ cremori condita, id vero est ex aqua, & exiguos porri, & anetho, tum sale, oleo, & aceto. Commodus præterea iis, qui sic laborant, est & exiguus in aqua frigida panis. Ceterum nullius horum pura frigiditas esse debet, sicuti portionis. Quippe hec mature tum incalescit, tum per corpus digeritur: illa, cū plusculum temporis in ventriculo morētur, ipsum fortassis refrigerat, si fuerint imodice frigida. Vbi vero febris iā morā tra-

B xerit, dandū quoq; alininū lac est, sed diligenter obseruato, ne in ventriculo cogatur. Id vero interim ipse nos eger docebit, vtpote suæ ipsius naturæ peritus: interim id nobis inueniendū est, paulatim ad eius vsum accedentibus: ac expedita quidem ratio est ad symptoma declinandum, si mel illi admisceas, aut salis, quo vescimur, exiguū. Ceterum abstinēdum (quoad fieri potest) in hecticis febribus à melle est, atq; idcirco etiam à mullā: quippe protinus vertitur in bilem, & sicciores acrioris q̃ calor febres reddit. Dandum itaq; principio est alinini lactis non plus cyathō, veluti à me datū vidisti, sed inducra in ipsum cubiculum alina, quod nullum tps interponatur, sed eger id protinus bibat, contēplantibus diligenter nobis ac cōferentibus arteriæ motum, qui à sumpto lacte agitur, cum eo, qui ante id sumptum, fuit. Si enim corruptū sit, eiusmodi inuenies pulsus, cuiusmodi in oris ventriculi afflictione accidere nostri: sin autē corruptum non sit, & maiores & valentiores redditos inuenies. Itaq; etiā licebit, cū postea exhibebis, mensurā lactis dimidio cyathō adaugeas, ac deinde rursus aliū dimidium adicias, sic q̃ sensim vsq; ad mediocrem mensurā addas. Mensuræ vero non lactis tm̃, sed etiam reliquorum ciborū omniū mete, quibus attentus eris, in septimo huius operis, vbi ventriculi sanauimus intēperies, sunt traditæ. Nam, cum primum in eo libro frigidā eius intemperie hactenus inueteratā proposuerimus, vt totū iā corpus gracile

* 921. d. n.

* siccā.

C reddiderit, indicauimus, quo pacto quis simul ambo probe sit sanaturus, tum vētriculi intemperiem, tum corporis gracilitatem. Ideo q̃ fortasse sit satius, quod minus multa scribamus, ad illum te librū pro reliquis oib; cibis remittā: cum enim similes affectus sint, similia nimirū remedia postulant. Verum, quanto hecticarū febrium affectus est calidior, tanto vtiq; frigidiora requirit auxilia: & simul maiorē sollicitudinē, ne valentibus auxiliis vtentes quicq; ledamus. At, qui iam marasmo vrgētur, eos, sicut dictum est, lauabis: quos vero hectica premit, nō dum tm̃ marasmo tentant, eos, licet, etiā sine sindone subiecta laues, vtpote viribus adhuc valentes. Inferri tm̃ & hos in domum vel super lectulo, vel saltem alio quopiā idoneo conueniet: mox ipsos se ipsis ingredientes ad calidā duci, quod in ea morent. At, qui ex his minus sunt valētes, eos non tutū est permittere in frigidā natationē descendere, sed foris potius ipsos perfundere, primū tepida, secundo frigida. Esto autem tunc preparata in labro aqua frigida (quāta s. ex eo semel hausta perfundere simul totum iam lauatū possit) ea frigiditate, vt nullam euidentē qualitātē nec prorsus frigidarum nec tepidarū aquarū præferat, sed qualem ea, quæ fontana vocatur, quæ & frigoris quod ferit, & teporis qui resoluit, est in medio. Ac, si quidē omnia curiosè administrabunt, tum quæ ad balneum, tū quæ ad nutrimenta spectant, vtiq; sanādi iam eius, quæ marasmus consumit, spes est: sin error vel

* 909. d. n. id est vehiculo.

D in vno cōmittatur, is reliqua subuertit oia: quippe, cū exitialis horum affectus sit, ne leuissimum quidē errorē tolerat. Ac, si quis taliū est seruatus, huic carnosam portionem marasmus occupauerat: ipsis vero solidis siccatis heri nequit, vt homo prorsus persanet: sed oīno vel statim eū febris ipsa iugulauerit, vel post, q̃ in eum affectū est translata, quem senium ex morbo vocamus. Nam primū eiusmodi febris propriā partium humiditatem, ex qua nutriuntur, depascit: hinc vero ad carnosum genus transit, quod circa, tum fibrosas, tum membranosas partes solidorum corporum heret: ita deinde ipsas solidas populatur. Siquidem in singulis simplicium ac primarum, quas vocant, partium (vt in dissectionibus es contēplatus) alia portio substantiæ eorum est veluti fibrosa, alia mēbranosa, alia carnosā. Sicut, exēpli causā, cum vena vnā tunicā habeat, & eam tenuē, licet fibras in ea inuenire multas, quæ sint araneosis quibusdā interlitis contextæ: q̃bus vtriusq; ipsa propria venæ substantia adnascitur. Hec alia in aliis partibus habetur, nec vllum cōmune nomen est nacta: ceterum docendī causā nihil vetat, eam carnosam substantiam voces, vel certe huius particule quandam carnē, quæ in ventriculo quidem sit alia, in iecinore alia, similiter in arteria & musculo. Vocatur autē caro tm̃ ea, quæ in musculo est: reliquarum nullā homines carnem vocant, præterq̃ admodum pauci: sed, quæ in visceribus, seu iecinore, renibus, liene, & pulmone videntur, eas Parenchymata (quasi affusiones dixeris) græce vocant: quæ in intestinis, ventriculo, sto-

Septima Classis.

iiiiiii iij macho,

METHODI MEDENDI

macho, & vtero sunt, sine nomine relinquunt. Tu tñ de nominibus non laborabis. Illud potius intelliges, singularum particularū subitantiæ molem ex tali maxime completam esse naturā, quæ utiq; (vt i sinuosis vlcerebus videre licet) & perire, & regigni potest. At vero nec fibrosa, nec nervosa membranosa, ue natura eandē generationē habere cernitur: nec fas est eiusmodi singularū partium fibras à malignis febribus liquari, sicuti carnes: qñ animal ipsum prius, q̃ hæc prius sint siccata, interemerint. Sanè sunt, & quas marasmodos febres vocāt, vniuersæ ex earū genere, quæ colliquant: sed in eo differunt, q, quæ portio carnis in his colliquatur, ea semper vaporis vice digerit: in illis defluit in ventrē. Cernitur hoc etiā in carnibus, dum in craticulis torrent, euidenter fieri: liquidē ab aliquibus plurima liquatio defluit, decidit q; in prunas largiter: ab aliquibus nihil oīno, quod utiq; sentias, defluere videtur, etiam si par sit prunarū subdita copia. Quippe feris suis aut nihil oīno, aut planē minimū est, quod defluat, cicuribus vero plurimū: quanto q; magis vel adipe, vel carne, animal abundat, tātō profectō, quod ab ipsis carnibus, dum in craticulis torrentur, defluit, cernitur copiosius. Ad eundē itaq; modū in calidissimis febribus, si carnes humidæ ac molles cū adipis copia fuerint, eas sensu liquari deprehendas: sin sine adipe & sicca sint, in marasmodos febres trāseunt. Clarissimo huius rei argumēto sunt infirmi, qui per aluum, quod liquatur, excernūt: qui, nisi prius vel morbi violētia, vel medicorū inscitia moriantur, in marasmodos febres incidunt. Siquidē, quoad materiam vberem habēt, hanc colliquāt: vbi illis tum adeps, tum caro mollis defecit, duras & egre liquabiles carnes siccant, à quibus pp siccitatē nihil defluit: veluti nec ab iis, quæ sale sunt siccata, si quis has quoque torrere parans, parī cum aliis igni admoveat: nam & sicciore earū carnes reddentur, & corij ritu durabuntur: nec defluet ex his vlla sensibilis liquatio. Hæc igitur cum scias, etiam colliquatium febrium iisdem methodis curam ages, tum ad frigidam exhibendam quā primū properans, tum iis, quæ humectent & refrigerent, nutriendis. Mulsam vero inimicissimam censebis: qua tamen uti pleriq; medicorum in eiusmodi febribus vides. Verum de colliquantibus febribus differere in posterum licebit, æque, vt de iis hecicis febribus, quæ in pestilentis contingunt: cuiusmodi ea est, quæ nunc publice grassatur: dicetur nanq; & de hac inter pestilentes febres. Reliquarum vero tum hecticarum, tum quas marasmodos vocamus, abunde mihi sanationis methodum tradidisse videor.

GALENI METHODI MEDENDI ID EST DE MORBIS CVRANDIS LIBER VNDECIMVS

ARGVMENTVM LIBRI

Indicationes Omnes explicat, quæcunque in curandis Putridis Febribus æstimantur: ac pertractat de Cataplasmatibus, Perfusionibus, & Balneis, quæ pro ratione inflammatarum partium adhibentur.

Quid Actum superioribus libris, quid hoc agendum: ac de Primis, & communibus Fontibus curatiuarum Indicationum.

CAP. I.



Ebrium, quas putrescens accendit humor, primæ remediōrū indicatōnes dictæ prius sunt: quo loco, eas quæadmodum & duas & tres efficias, docui: etiam, si velis, vnā. Nunc vero, quod in aliis febribus fecimus, vt ex primis generibus diductis, ad vltimas vsq; species diuidendo perueniremus, idem & in proposita differentia facere tentemus, illud prius admonentes, quod H etiam in libris de pulsuum differentia ostendimus, siue primas differentias, siue prima genera, siue maxime generales ideas, siue quomodocunq; aliter appellare libeat, modo exactā rei notionem serues, nihil interfuturū. Ac febrium quidem ipsarū quemadmodum eas, quas diarias vocamus, cures, in horum commētariōrum octauo exposui: parī modo & quæadmodum continentes, in libro, qui illum sequitur: atq; etiā quemadmodum tertias, hecicas scilicet, in eo, qui illi succedit, qui totius operis est decimus. In quibus non propria modo cuiusq;, sed etiam cōmunium pleraq; explicauī. Nunc, quemadmodum, quæ ex putrescentibus humoribus excitentur, methodo sint sanandæ, aggredi statui. Quæ curationē indicānt, prout in duo diuiduntur, affectus quæ curamus, & partium ægrotantis tēperies sunt. Licet autē, ea (vt dictum est) & vna summa interpretemur, dicentes vnā esse omnium morborum cōmunem curationis indicatōnē, nempe cōtrarietate ipsam: qua rursus diuisa, duas existere, morbo scilicet iis, quæ sibi contraria sint, adhibenda remedia indicante: laborantis vero temperie, vnā cum ipso morbo, contrarietatis mensurā definiente. Porro dictum in illis est ambientē quoq; nos aerē vnā efficere indicatōnem posse: Et, cum primam sectionē in duo tñ facimus, ambientē vel ægritudinis causis, vel sanitatis, annumerandū esse. At vero cum sanitatis causæ sint omnia,

Aomnia, quæ sanitatem efficiunt, vna certe earum est, quod auxilium remedium'ue vocatur: quod pro variis notionibus & vltima & prima sanitatis causa recte dicitur. Quippe tempore vltima erit propterea, quod tempore natura & ars & fortuna priores eo sanitatis causæ sunt: prima vero est, quatenus id laborantis corpus tangit, alterat quæ eius affectum: ac propter alterationem, quæ id facit, cum ægra corpora ad sanitatem perducuntur, ars & artifex † sanitatis causæ fiunt, non quod hæc morbos primum submoucant, sed alia materia ad id commoda intercedente, quod auxilium appellatur. Siquidem sanguinis missio, quam phlebotomiam vocant, ipsa quidem per se hoc, quod iam dictum est, nomen possidet: at, cum homini malum affert, ex causis sit morbificis: contra, cum prodest, ex salubribus. Ac propterea, cum proficit, vocatur auxiliū: sicut profectio omnis materia, quæ quomodolibet corpus alterat, quo tempore iuuat, auxilium dicitur. Ad eundem modum & ambiētis proprium pro natura sua nomen est aer: relatus tamen ad nos, aliàs auxilium & sanitatis causarum vna efficiunt: aliàs iis contrariarum, nempe morbificarum. At, quoniam aeri tum ex præsentis cœli statu, tum anni tempore, tum regionis natura, suæ in humido sicco calido & frigido mutationes accedunt, ex illorum rursus vnoquoque alia particulares indicationes oriuntur. Ac fortuna quidem, & ars, & artifex, materialium interuentu agunt: natura vero per se ipsa. Ea ex tribus his partibus cõpletur, ex spiritus, & partium, quæ vere dicuntur solidæ, substantia, quas alibi ex semine genitali conditas esse monstrauimus: & tertia ab his carnosa, quæ cuique particulæ est sua. Singule autem iam dictarum trium propria pro natura sua tum qualitatem habent, tum quantitatem. Ac qualitas quidem earum ex congrua temperie humidi sicci calidi & frigidi consistit: quantitas vero solidarum partium par semper manet, sed iis, qui adhuc in augentur, numero duntaxat: qui vero absoluti iam sunt, etiam magnitudine. Carnosæ vero substantiæ magnitudo variat, etiam si præterea non augeatur animans. Pari modo & spiritus substantia, tantum non quolibet momento, tum minor, tum maior conspicitur. Ergo etiam supra ea, quæ indicationes præstare prius diximus, virtus vel sola iis tribus substantiis, quas modo comprehendimus, simul enumeratis additur: vel, si temperies seorsum sit discreta, in ipsa. Atque hæc ipsa rursus bifariam quoque, ut ostensum est, scinditur, & in originalē naturā, & in acquisitiuū affectū, sic nimirum, ut ex istis, & aliis, quæ prius dicta sunt, propria quedam cuiusque remediorum sit indicatio. Sepe autem adscititia temperies ad efficiētes causas reducta, illis indicationem cõcedit. Ad hunc itaque modum ex ætate, vitæ instituto, & cõsuetudine, indicationem remediorum suggeri diximus, cõsentire quæ inter omnes iam dictas indicationes: siquidem in iis, quæ magis sunt speciales, cõtineri semper, quæ magis sint generales: agi vero in vsum, quæ magis sint particulares s. ex magis generaliū sectione inuētas.

C De Indicationibus, quæ ab Affectu febris præstantur: ac quid differat Putridarum curatio à reliquarum febrium curatione.

CAP. 2.

Prima namque omnium curationis indicationum, quæ ex ipso, qui curatur, morbo accipitur, contrarietatem præscribit. At, quoniam morborum plura sunt genera, cuique eorum sua erit contrarietas. Verum cætera in præsens omittantur. Proponatur autem nobis ad præsentem disputationem duntaxat morbi, quæ curamus, genus in intemperie positum. Id igitur per contrariam ipsi intemperie sanabitur. At, quoniam vniuersi febrium generis intemperies est calor, nimirum per frigiditatem curabitur sic, ut omnes indicationes inter se cõcordent. Nam, siue dixerimus absoluto sermone febrē per ea, quæ contraria sunt, sanandam esse, siue adiecerimus, per ea, quæ contraria sunt temperamento, nulla pugnantia in sermone erit: similiter nec, si per frigida sanandam febrē esse dixerimus. Sed nec, si diuidentes id, dicamus aliquam, sanare nos febrē per ea quæ actu, aliquam & per ea quæ potestate, aliquando & per ea quæ ex accidenti refrigerant: aut etiam ista coniungentes: nulla pugnantia cum iis, quæ dicta sunt, in sermone erit: Pari modo nec, si quis dicat, quæ actu, vel potestate, vel ex accidenti calfaciant, ea febres deteriores reddere, quæ prius fuerant: contra, quæ actu, potestate, vel ex accidente refrigerent, ea febres sanare. Quippe indicatio, quæ ab affectu sumitur, in tot numero particulares indicationes est diducta. Hæc vero rursus ipsæ particulares indicationes materias inueniunt iuxta eas methodos, quæ in opere de medicamentis sunt traditæ: quoniam illarum principium id est, in quo finita est curandi affectus diuisio. Ac maxime quidem propria in soluendo morbo intelligitur curatio, sed per abusum nem etiam mistum genus tum ex vera curatione, tum prouisione, quæ Prophylacen appellant. Ac diariarum quidem febrium, quemadmodum & hecticarum, vera & propria curatio est. Earum vero, quæ ex putrescentibus excitantur humoribus, vocata curatio prophylacen quoque sibi adiunxit: cuius officium est causam, quæ morbum creat, adimere. Sanè nominatur hæc ipsa quoque artis pars, curatrix: quæ utique ab ea, quæ pure sincere quæ prophylactice dicitur, in eo distincta est, quod sub hac iam sensibilibiter ex ipsa causa morbus est genitus, in prophylactice vero est futurus. Atque nominibus quidem quisque, prout volet, utatur, (idenim semper monere oportet) sed remediorum indicationem, quæ à rebus singulis præstetur, seruet: quando, si vel vnam aliquam earum prætereat, ad portionem tum magnitudinis illius, tum facultatis, curatio claudicabit.

De Curationum modis, qui ex Indicationibus ab ægroti Viribus sumptis præstantur.

CAP. 3.

Porro, quemadmodum ab affectu ad materias præsidiorum peruenimus, eodem modo ab singulis reliquorum generum primorum descendendum ad eas est: veluti à virtute. Nam ea morbo ceu aduersatrix est opposita: propositumque medico est huic omni ratione opitulari ac

Septima Classis.

iiiiiii iiii

subuenire.

† vniuersi
id est & fortuna
na. addunt autem
tamen cod.

METHODI MEDENDI

subuenire. Ergo quis primus est à virtute scopus, aut quæ nam indicatio prima? nam hic quoque E loqui pro arbitrio possis, s. virtutem ipsam vnū scopum ac primū statuens: quod vero ab ea indicatur, alterum & secundū. Itaque, cum monstratū sit virtutem suā custodiā præscribere, sicuti morbum se tollendum, erit rursus in virtute secundus scopus, ipsius custodiā: sicut in morbis, ipsorum sublatio. At vero custodia similibus exhibitionem indicabit: sublatio contrariorū. Quoniam vero virium substantia tum ex spiritu, tum ex carnosa specie, tum solidis ipsis completur, ex iis, quæ similia sunt, moliri cuique suā Diamonen i. custodiā, conueniet: Spiritui ex respiratione ac transpiratione, & qui ex sanguine attollitur, vapore: liceat vero hic quoque volenti, vel græce Aerolin, quasi aerationem dicas, vel sanguinis attenuationem, vel in halitum solutionem, vel, utcumque libuerit, appellare: Solidorum vero generi, ex solido nutrimento: Quemadmodum carnosum generi, per eam naturā, quæ in medio humidorum ac solidorum corporum est. Porro cuiusque horū mensuram ex conseruandæ substantiæ quantitate inuenies: qualitatem vero ex ipsius temperie. Cum vero horū cuiusque vel optima temperies sit, vel aliquatenus vitiosa, quæ quidem optima est, semper seruari debet: Quæ vero oīno vitio nō caret, hæc in sanis quidē vel seruanda est, vel alteranda: in ægris vero seruanda est, ea ipsa ratione, Qua prius ostēdimus maximā esse à cōsuetudine indicationē, quippe vel temperamentū originale ipsam seruare, vel adscititium inducere: Præstari vero (vt prædictū F est) mensuræ auxiliorem indicationem ex eo temperamento, quod iam præsens sit, ita nimirum, sicut ex ætate, non quam æger prius habuerit, sed quam nunc habeat: Cum vero diuersitas non parua sit in partium animalis temperamento, propriam cuique mensurā fore eorum, quæ ipsi sint similia: nempe ei, quæ terrea magis est, eorū, quæ magis sint terrea: & ei, quæ humidior est, eorū, quæ sint humidiora: ad eundem modum & ei, quæ magis aerea est, eorum, quæ plus huius substantiæ in se habeant: sicuti calidiori, eorum, quæ magis substantiæ igneæ participant: Hinc vero iam materias particulares oēs in cibis, potione, aere, & oībus † peragi solitis, † inueniendas esse: Vbi vero secū pugnaverint indicationes aliquæ, superius cōprehensa methodo ad ea, quæ agenda sint, inuenienda vtendum esse, perpenlis scilicet indicantium scoporum tum magnitudine, tum dignitate. Ostendimus enim eligendas eas indicationes esse, quas scopi digniores maiores que præscribent: ac dignitatem eorum, vel vitæ, vel sanitatis respectu iudicandum: Magnitudinem vero duplicem esse, vel propriæ substantiæ ratione, vel declinationis à naturali habitu. Ergo ab his iam methodis age dum exercitemur in genere febrium, quod ex putredine nascitur.

■ χύσις est in antiquis id est fusioem.

† ἐπιτηδεύουσιν.

Indicationes, quæ ab Affectu ipso, qui putredo est, in Continentibus Putridis præbentur. CAP. 4.

Quoniam "putredo vel æqualiter in omnibus subsistit vasis: vel in maximis, maxime que G A. li. 4. c. 11. principalibus, ea porro sunt inter alas & inguina: vel vna quapiā particula, quæ vel phlegmonen in se habet: vel etiam citra phlegmonen, veluti in foco quodam, principium febris in se continet: in singulis his differentiis seorsum exercitari cōueniet. Ac primū eam tractandam proponemus, quæ vel in maximis vasis, vel simul oībus consistit. Quæ igitur ex tali affectu oritur febris, planè necessum est synochon, id est continentem, esse. Nec fieri potest, vt ea sanetur, nisi inhibita prius putredo sit. Porro ea inhiberi, causa manente, non potest. Quare submouenda ipsius causa est, si modo putredo ipsa prior, mox post ipsam febris, sanari debebit. Ergo quæ causa putredinis est, quæ se per omnia vasa æquabiliter diffundit? Sanè reuocare in memoriam prius conueniet, quæ nam aliàs putredinis indicata sit causa: ac deinde, cur pari modo in omnibus animalis partibus fiat, inquirere. Ergo ostensum est, vbi morborum causas reddidimus, illa tantum putrescere corpora, quæ, cum calida humida que natura sint, neque perflata neque ventilata, in calido humido que loco maneant. Quod si in motu sint, ventilentur que ac perflentur, posse ea non putria integra que seruari, potissimum quæcumque corpora sua ipsorum natura reguntur, vt animalium & stirpium: ea namque (sicut in opere de naturalibus facultatibus est proditum) ab initio congenitos secum motus habent, quibus superflua excernant. Ostensum nō minus & in aliis duobus libris H est, quanta sit tum respirationis tum pulsuum utilitas ad perflatum ventilationem que corporis, atque eius natium calorem tuendum. Itaque, siquid in eo manifeste putrescere debebit, dictas transpirationes impeditas esse oportet. At vero qui fieri potest, vt illæ per totum animal sistantur, nisi vel finibus vasorum stipatis, vel tota cute? Porro accidere in finibus vasorum stipatio potest vel ex vehementi extrinsecus refrigeratione: vel ex succorum, qui extrorsum in ipsis confertim ruerint, crassitudine, multitudine, vel lentitia. Accidit hoc illis & ex iis exercitationibus, quæ in palestra, vel aliàs obeuntur, & itinere laborioso, vel ambiētis statu, cum ex rigore in æstum subito est mutatus. Non nullis vero seruentes ex ira succi, ac foras simul impetu ruentes, dictas stipationes effecerunt. Quisquis igitur propositam sanaturus est febrem, hic simul causam eius adimar oportet: simul calorem, qui in animali excitatus ab ea est, refrigeret. Ac, quæadmodum quidē ille sit refrigerandus, prius est dictū. Causam vero adimi oportebit propria cuiusque naturæ inuenta contrarietate: vti que, si ex frigida causa stipatum densum que redditū corpus est, relaxato eo, omni que ratione rarefacto: sin ex obstructione ita est affectū, hac reclusa. Quod vero recludet, hic quoque ad contrarietatis indicationē attentus inuenies: vbi namque abundantia humorū est, hos vacuabis: vbi crassi sunt & glutinosi, tenues eos ac fluxiles efficies. Si plures causæ aliqui coibunt, omnibus per contraria

A. li. 4. c. 11. c. 1. fo. 64

A contraria occurrere: siquidem fieri potest, vt & coarctatum corpus sit, & exigui meatus densati, & multi simul ac lenti humores sublint. In eiusmodi autem caularum cōplexu, si recte, quę prius comprehensa sunt, meminimus, cōpisse à sanguinis missione conueniet: ac abundantia vacuata, tum ad extenuandos humores venire: ab hoc ad remittenda, quę sunt contricta, & rarefacienda quę sunt densata. Atq; hæc quidem à morbi affectu indicatiue sunt lumenda.

Indicationes à Viribus eorum, qui Continente Febre Putrida correpti sunt.

CAP. 5.

A Viribus autem (qm̄ has cibi, poriones, & spiritus certa mēsurā & apta qualitate exhibita seruabant, inuentus autē est quantitatis eorū mōdus ex viriū substantia: qualitatis vero à temperamento) nimirū estimari debet, quēadmodum vires, q̄ corpus regunt, in his se habeāt. Quippe, si valentes sint, audacter vacuantibus præsidijs vteris, hæc autē ab affectu morbi fuere accepta: sin infirmiores sint redditæ, vacuantia remedia cautiùs administrabis. Sed & nutrimenti mōdus hinc tibi est desumendus. Quippe, cū vires legitimū robur suū habent, & morbi summus vigor breui futurus expectat, tenuissimo victu licet vtī: cum sint infirmiores, non licet sine graui noxa: sed adijcere ad nutrimenta tm̄ oportet, quantū est de robore virium imminutum. Atq; ex his scopis accipiendus est nutrimenti mōdus: Qualitas vero ex morbi affectu, vnā cum solidorū corporum, quod tum est, naturali temperamento: ab affectu, si is obstructio est, quę extenuet: à naturali ipsorum temperie, vnā cum cōsuetudine, prout etiā prius est definitum. Tempus vero nutriendi, quod quidē ad reliquas spectat febres, quę ex putredine oriuntur, in progressu sermonis dicitur. Quę vero vnicam tātum à principio ad finem accessionē habent, (de his nanq; præsens est sermo) in his facilis toleratio & consuetudo spectari debebunt: qm̄ cibus illis eo tempore est offerendus, quo facilius, q̄ in cæteris, morbum tolerant: eo q; potissimum diei tempore, quo prius in sanitate cibari erant lueti: etenim facillime cibum ferent, si ex his considerationibus allument. Quod autē frigida quoq; ijs, qui ita laborant, sit exhibenda, cum si iam succi cōcoquantur, & crassitudo eorum prætenuata est, id ex ijs, quę prius sunt comprehensa, manifestum arbitror.

Quid Cōe habeant Continentes Febres cum Diarijs, & reliquis, quę ex putredine oriuntur.

CAP. 6.

Siquidem, cū eiusmodi febris cōia quādam cum ambabus habeat, tum ijs, quę ex humorū ortu putredine circuitibus quibusdam accessiones habent, tm̄ ijs, quas diarias vocamus, merito in vtroq; genere de ipsa mētionem facimus, cū vnicam accessionē habeat, vt diariæ, cæterū ex putredine orta multos duret dies. Itaq; vnū cum diarijs cōe habebit: duo cū ijs, q̄ ex putredine ortæ multos durant dies. Reliquū continentū febrium (quas synochos vocāt) genus duo habet cum diarijs cōia, nempe & q̄ sine putredine sit, & q̄ abiq; circuitu: tertium vero commune non est, cum subinde in quintum porrigatur diem. Atq; harum quidē cōtinentū febrium prodita prius curatio est. Continentium vero, quas putredo excitauit, curatio, cū vtriq; generi cōis esset, et nos in ambobus de ipsa differere coegit. Cæterū substantia earū tota q; natura ex eo est genere, quod nunc nobis proponitur. In vno autē eorum, quę ipsis accidunt, cum diarijs conueniebant. Id fuit, quod vna in totū totius morbi accessio erat. Ergo & curatio earū vnū hoc duntaxat cōe cum diarijs habeat, oportet: in reliquis autē oībus bifariam diducatur. Atque aliæ quidem curationis indicationes ex communi genere earum, quę ex putredine sint ortę, accipiantur: alię ex propria earum substantia. Ad eundem vero modum & ceteras natarum ex putredine febrium differentias sanari conueniet: nempe (sicut sæpe prius dictum est) indicatione tum à communi ipsarum genere, tum vero à cuiusque propria differentia desumpta.

Quot in Totum sint Primæ Febrium Putridarum Differentiæ, ex quibus Petenda est Curandi ratio.

CAP. 7.

Ergo denuo repetentes dicamus primum, quot sint febrium, quas humorum putredo accendit, in vniuersum differentiæ: deinde quę nam sit ipsius generis earum, cōmunis vtiliū auxiliiorum indicatio: mox quę sit singulatim cuiusq; propria. Par est enim profectō, & quod omnium earum commune est, communem habeat indicationem: & quod in singulis est proprium, quantum à reliquis eiusdem generis est diuersum, in tantum & diuersam ab illis sortiatur indicationem. Sunt igitur natarum ex humoris putredine eiusmodi differentię. Vna ex eo, quod causa ipsius putredinis adsunt, vel non adsunt. Secunda ex eo, quod per totum animal, aut eius partem aliquam diffusa putredo sit. Tertia, quatenus cum phlegmone est, aut citra hanc. Igitur considerandum nobis est, quid nam commune habeat indicatio, quę à causa sumitur adhuc manēte: quid nam ea, quam putredo ipsa præstat: ab his deinde quid indicatio putredinis, quę per totum diffunditur aīal, aut certe maxime principalia in eo vasa: quid eius, quę in vna cōsistit parte: mox deinde earum, quę in vna quadam parte sunt, æstimabimus differentias. Quippe aliam esse indicationem eius, quę cum phlegmone coniungitur, ratio est: aliam eius, quę sine hac consistit: Rursum in his etiam ipsis aliam esse præsentē adhuc effectrice causa: aliam vero hac submota: Postremo cuiusq; causæ adhuc manentis differentias, per omnia, quę in specierum diuisione sunt inuenta: siquidem hic iam delineant, necessum est, indicationes, quę ex curandis sumuntur affectibus. Post has vero eas nimirum, quę ab ipsis curandis suggeruntur particulis, pro iam dicta methodo sumemus. Quibus si eas, quę à viribus præbentur, adiecerimus, absoluta nobis methodus de febribus omnibus † sanandis erit.

* iacturæ, v. i. sanaturorum.

* diæspora.

† In grecis impressis adicitur ὅτι οὐδὲν, i. a putredine inēsis.

De

METHODI MEDENDI

De Putredine & eius Causa curanda.

CAP. 3. E

* αὐξάνεται.

* αἰωρίσας --
τες.

* αἰωρίσσει.

* κινίσει.

ERgo ordiamur ab eo, quod primum in diuisione indicans fuit, ea erat humorum putredo: ac consideremus, quibus maxime indicantibus, quibusque indicationibus vti, curatione eius inuenire possimus. Principium vero inuentionis, ipsa erit rei natura, qua de agitur: etenim id quoque in demonstrandis methodis didicimus. Quae nam igitur est putredinis natura? Nempe mutatio totius putrescentis corporis subtilitatis ad corruptelam, a calido externo. Non enim profectio a proprio calore corrumpitur quicquam, immo contra prorsus, quicquid in rebus subsistit, id gliscit, roboratur, sanum est, ac viuit, dum proprio calore regitur. Veluti nimirum ipsa aiantium corpora, tametsi plurimam substantiae suae portionem humidam & calidam sunt sortita, magnum tamen annorum numerum sine putredine, ac sana viuamque exigunt, si seruetur (ut monstratum est) eorum proprius calor, in cordis quidem corpore, per respirationem: in reliquis omnibus partibus, tum per communis, quam habent cum corde: tum per aliam quandam respirationis speciem, quae per totam agitur cutem, & transpiratio perspiratiove dicitur: his uero laetis, una est naturalis calor ledit. Alter vero quidam alienus, ac praeter naturam in corporibus excitatus, primum quidem ipsos succos propter humiditatem & putrefacit & corrumpit, spatio vero tum adipem inuadit, tum et carnem. Tanquam igitur in his corporibus, quae non viuunt, ac putrescunt, primum, quantum eorum iam computruit, separant, deinde ei, quod reliquum est, in frigidum aerem sublato perspirationem refrigerantem moliunt: ita utique & putredinem, quae in viuis est orta, sanabimus, id scilicet, quod iam corruptum est, omni ratione vacuantes: quod reliquum est, moderatis motibus, & refrigerante perspiratu, ad exactam symmetriam reducentes. Ac vacuationem quidem illius per urinam, deiectiones, vomitum, ac sudores, moliemur: post hanc dimotiones mediocres, una cum ambientis bona temperie, adhibebimus. Quemadmodum autem horum quodque recte administrandum sit, paulo post aestimabimus. Nunc ad secundum in diuisione transeamus, nempe quemadmodum quis causae, quae putredinem excitauit, adhuc manentis remedium facillime inueniat. Est autem neque in hoc difficultas vlla, quippe cum per contraria tollatur. Itaque, quoniam transpirationis prohibitio, putredinis occasio fuit, hanc, arbitror, submouere oportet. At ea cum varijs generibus est orta, & densatis exiguisque meatibus, & constrictis corporibus, & humoribus tum abundantia tum crassitudine tum lentitia sua obstruentibus, singula harum affectionum curandae per contraria sunt, densitas, per ea quae rarefaciunt: constrictio, per ea, quae fundunt: abundantia, per ea, quae vacuant: crassitudo, per ea, quae dissecant: & lentor, his, quae detergent. Ac, si quidem totum corpus dictorum iam singula occuparint, et toti corpori per contraria est succurrendum: si unam partem quampiam putredo inuaserit, illi adhibenda iam dicta sunt genera remedia. Sanè non easdem omnes partes vacuationes medicamentumque requirunt, cum & temperamentis, & posituris, & forma, & omni denique constitutione naturaque, inter se dissideant.

De curandis Putridis Febris per medicamenta Purgantia, Balnea, Inunctiones, & Potus. CAP. 9.

ERgo, quemadmodum singulis sit opitulandum, id postea pro conueniente sermonis ordine dilquiremus: cuius initium a putredine, quae totum corpus occupet, quae ipsa continentes quoque febres, quas synochos vocant, excitet, faciemus. Ergo a corporibus, quae sic afficiuntur, expellenda, quae putruerunt, per urinas & aluum & sudorem sunt: quod si ad os ventriculi aliquando sua sponte impetum capiant, etiam per vomitiones: aliter autem non est, quod ea praeter naturam irites. Aceorum quidem, quae iam dictas vacuationes promoueant, non parua materiae copia est: sed maior eorum portio, cum calida siccaque facultate sit, febrem auget. Itaque deligenda medico sunt ea, quae citra calfactionem siccationemque valentem supradictas vacuationes praestent: cuiusmodi sunt cremor ptissiae, & aqua mulsa, & oxymeli, & apomeli, & apij radix in aqua, quae potui datur, incocta. Haec autem ipsa ventri quoque sunt idonea: qui si nihil reddat, inijcienda per clysterem aqua mulsa cum oleo est. Sanè totum corpus prius, quam id vacuaris, rarefacere non expedit: ubi vacuatum est, utique licebit id medicamento aliquo, cui calor tepidus insit, rarefacias: cuiusmodi est, quod ex chamæmelo conficitur. In hoc tempore si vinum quoque aquosum bibatur, id omnes vacuationes promouerit: idem faciat & temperatum dulcis aquae lauarum. Quod si appositum aliquando in dictione vocabulum dulcis non sit, utique id subaudire debetis, certo sciens de eo nos in febricitantibus lauacro semper loqui, non bituminoso, aut sulfureo, aut aluminoso, aut chalcanthode, aut falso, aut ex marina ipsa. Cæterum, ubi magnitudo febris obstat, sicut in continentibus, nec vino est utendum, nec lauacro, nec his, quae habitum rarefaciant, vunctionibus: sed aqua frigida, sicut prius diximus, pota in his febribus est aptissima, nisi tamen aliquid eorum, quae praedicta sunt, hanc quoque prohibeat. Quippe ipsius febris frigida pota perpetuo est remedium, non tamen putrescentium humorum per aluum, urinas, vel sudorem vacuandorum. Quo magis exercitatum esse in his, quas nunc tradimus, methodis oportet: ac in egrotantibus considerare, & quae sint ipsius febris remedia: & quae ipsius, ubi per se sola subsistit, putredinis: quae rursus efficietis hanc causae: atque huius quoque, cum per se ipsam subsistit. Quippe non semper inter se consentiunt haec omnia, sed plerumque aduersantur. Quo casu memores eorum, quae didicimus, id, quod maximum omnium est, aggredi oportebit, atque ei vel soli, vel magis, quam ceteris, subuenire. Sanè scire licet difficile esse, acrique iudicio indigens, febrem, putredinem,

Al. d. l. l. l.
c. l. l. l. l. l.

Anem, & effectricem causam, vbi s. ipsa quoq; adest, inter se cōferre: difficilius tñ est, si vires, quoq; cum illis vnā conferre velis: qđ vtiq; sicut ante cōprehensum est, pp vitę ipsius respectū semp est necessariū: aliqñ vero & ex accidenti, sicut ad morborum sanationem. Hoc vero me ostēsurum promisi. Siquidem, quod putrescit, si vestis esset, aliud ve inanime corpus, vtiq; ex ijs duntaxat, q̄ prädicta sunt, indicationem caperemus. Nunc, cum in viuente corpore putredo concipit, quod tum alterare potest, tū concoquere, tum vtile reddere, quicquid putrescentium, veluti semiputrescens semimalum q̄ est, vtiq; facultatem eius, qua naturaliter concoquit, excitans firmans q̄, quæ putrescētia sunt, sanabis. Itaq; ēt tum maxime eos cum fiducia vel in balneo lauamus: vel ijs, quæ habitum rarefaciant, medicamentis vtimur: vel aquā frigidam, vel vinū bibendum damus, cum notas humorum concoctionis cernimus. Neq; n. pulsus duntaxat vires ad eiusmodi agenda firmas requirimus, veluti nec eius facultatis, q̄ voluntarium motum præstat, sed, sicut est dictum, ipsius potius cōcoctricis. Ergo, si & vires cunctæ valentes sunt, & febris ardentissima, & cōcoctionis notæ planè euidentēs, frigidam homini dare audacter debebis: constat nanque talem hoīem senem non esse, ex quo omnes illi virtutes valentes esse proposuimus. Quod si ēt bona corporis habitudine sit, quod *εὐσπαρον* Græci vocant, tum status cœli calidus ac siccus, ēt si in frigidam na-

Btationem hūc dimittas, haudquaquā lædetur. Eiusmodi nanq; temporis opportunitate vli, qui se in frigidam coniecerunt, & protinus oēs sudarunt, & non nullis eorum alius biliola reddidit.

At, si mediocris est febris, & vires non valide, sed cum notis concoctionis, ijs qui ita se habēt, balneum prodest, & vini potio: tum vero ex vnctionibus eā, q̄ rarefaciunt, id q̄ multo magis cū ambiens est frigidus. Neq; n. aut frigidam in balneo lotionem, aut frigidam potionem in eiusmodi cœli statu ferē expetunt, vtpote inspiratu ipso assidue refrigerati: cum, siqñ in frigido ambiēte vehementer vri agrotum contingat, exigua salutis eius habenda spes est. Si vero nec concoctionis habeat signa, nec vires validas, seruari is planè non potest: quo minus aut idē lauandus in balneo est, aut medicamentis ijs, quæ rarefaciāt, vngendus, aut vinū illi dandum, frigida ue offerenda. In quo enim desperato oīno salus est, imprudentis consilij fuerit, apud vulgum infamare præsidia, quę multis fuisse salutē. Ipse sigdem aliquos noui ex amethodis istis medicis, qui, cū ea, quæ nos gessimus, essent imitati: iisdem q̄ præsidijs in ijs, qui prorsus morituri erāt, vli: adeo nihil profecerūt, vt etiam tēpestiuum eorum vsum suspectum formidolosum q̄ reddiderint. Verum nos tēpora præsidia q̄ ijs, quos seruari spes est, scribimus, quando agris, qui insanabiles sunt, ijs nec tempus vllum opportunū, nec præsidium est. Atq; hoc mihi p oēm sermonem teneri memoria

Cvelim, quō minus præcipua illa prima q̄ omnium curationis indicatio conuelli aliqñ posse videatur. Quippe, cum dicat Hippocrates || Contraria esse contrariorum remedia, quid verat oibus febricitantibus frigidam vno ordine exhibere? Verum nec exhibenda est, nec subuertitur eo tpe generalis omnis curationis indicatio. Vnum enim ex ijs, quę actu refrigerant, aqua frigida est. Sed & alia plura sunt, quę partim potestate (vt dictum est) refrigerent, partim ex accidenti: quorum alijs pp concursum pugnantium inter se indicationum alias vtimur. Porro tradita iam methodus est eius, quod conducit, ante alia semper deligendi. Ostensum præterea est ipsius febris, put febris est, aquā frigidam semper esse remedium: quod vero ad alia spectat, nō semper: veluti cum ex obstructione glutinosorum & crassorum humorum putredo orit. Ponatur vero & cū his redundantiam in toto esse corpore, tum virtutem nō imbecillam. In eiusmodi nanq; complexionibus cum multa præter naturam in corpore sint, quædam eorum præcedentes causæ erunt, veluti redundantia cū glutinosis & crassis humoribus: horum n. vitio obstructio est orta, q̄ morbus instrumentalis est eorum, quæ obstructa sunt, corporum. Hanc symptoma secutum est, ipsa transpirationis retentio: quam rursus putredo humorum excepit, ipsa s. febris antecedens quædam causa.

Quæ Putredinis & Causæ ipsius Indicationes sint, & quæ Remedia præscribant. CAP. 10.

DErgo, qui febrem curare volet, necesse est, putredinem inhibeat. Ita duę indicationes se exhibent, altera à febris: altera à putredine. Atq; à febris rursus duę, scilicet vt portio febris, quę iā facta est, percuretur: quę vero in generatione est, inhibeatur. Alię quę duę rursus à putredine erunt indicationes, vt & quod putredinis iam factum est, sanes: & quod in generatione adhuc est, sistas. Porro, quod in generatione est, id adiapneustia id est perspiratio impedita, facit: nihil enim deterius fuerit clarioris doctrina gratia ita eam nominare. Ita ab hac quoq; alię duę indicationes nascentur, tum vt, quod retentum est, vacuetur: tum, quod retinendum est, prohibeatur. Sanè prohibebitur ijs præsidijs, quę obstructioni medentur. Cuius rursus ipsius, quod iam factum est, sanandum est: quod futurum est, inhibēdum. At curabitur quidem, quod obstructio nis iam factum est, per ea, quę obstructa liberant: inhibebitur, quod futurum est, si affluxum obstructuentium succorum compescas. Ergo, quod vltimum in ipsa resolutiua methodo est inuētum, id primum omnium in curatione est peragendum. Ostensum enim in prioribus libris est, si ijs auxilijs, quę obstructione eximant, vt non vacuata prius abundantia velimus, fore, vt non modo nihil proficiamus, sed etiam affectum maiorem reddamus, pugnantibus scilicet inter se indicationibus. At, si vacuata prius multitudine ad curādā obstructionem accedamus, medicamentis ijs, quę obstructiones expediant, erit opus. Verum, quoniā horum plurima calida sunt, metus est,

Lib. de Flat. &
principio 1. 1.
Aph. 2. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.
tuta habet. 1. 1.
7. 1. 1. 1.

METHODI MEDENDI

est, ne tū putredinē, tum febrē augeant. Itaq; ijs, q̄ citra calorē liberare obstructions valeant, vte-
mur: vbi aut, q̄ obstruūt, deterſa diſſecta q̄ sunt, p̄ aluum, vrinas, & ſudorē, ea vacuare tentādum.
Cum vero materig, q̄ hæc efficiāt, ēt calidæ ſint, necelle est interea tū putredinē augeri, tū febrem.
Quare, quoad licet, id agendū, vt, q̄ minus calfaciat, materia deligat: aut, ſiqua inueniri pōt, quæ
non calfaciat, quēadmodū in hoc caſu balneū, vtiq; ea eſt petenda. Hoc vero tpe ēt vires roborare,
quō putredinē ſuperātes, ſuccos cōcoquant, ſtudebimus. Quōd vero febris iplius iam factū eſt, id
refrigerabimus: in auxiliōrū. n. inueniendorū ordine vltima eſt, q̄ ab hac ſumit, indicatio, quāuis
alia ratione ſit prima: quippe cum à febrī cōperit inueniendorum præſidiorum methodus.

Ex Symptomatis ſuperuenientibus nunc Protrahi, nunc Peruerti februm curationem. C A P. 11.

AC, ſi nullū quidem interim vehemēs incidat ſymptoma, prohibeat q̄, quō minus auxilia ab
initio morbi ad finem ita pcedant, celerrime finiet febris: ſin tale quippiā incidat, quod to-
tā ad ſe curationē reuocet, necelle eſt, ſerius adueniat curationis finis. Siquidem, qđ ita interuenit,
oīno vel cōtrariū eſt remedijs, q̄ antedictū cauſarū, affectuū, et ſymptomatū ordinē ſanēt: vel oīno
nihil ſaltē confert. Enimvero, ſi eius, qđ interuenit, ſanatio antedictō p̄ſidiorū ordini ſit cōtraria,
necelle eſt interim cuncta deteriora reddi: ſin nihil originali affectui interuenientis obiter malī
correctio nec officit, nec prodeſt, totius curationis celeritati in mora erit: ſi autē nocet, necelle eſt **F**
aut vniuerſam medicationē in lōgius ſpatiū trahi, aut aliquod ſubſequi piculū, aut ēt fore vtrūq;.

Finge nāq; exempli gratia, afflictio interim ſtomacho ſyncopen incidit, cui ſuccurrere coacti ci-
bū intēpeſtiue dederimus, ac vinū cū frigida: Ex horū. n. vſu tū obſtructionē, tum corporis coar-
ctationē, tum putredinē, auctas eſſe necellum eſt: atq; ex harū auctu ipſam etiā febrē: Verū, vbi tū
virtus ſatis valens eſt, nec quicq; interuenit, cuiuſmodi, quā modo diximus ex vitio ſtomachi ortā
ſyncopen: ſed nec, quæ aliqñ accidere poſſunt, aut ſanguinis profluuiū, aut vigilia, aut dolor, aut
error aliquis vel iplius egrotātis, vel eius familiariū: vbi inquā nihil tale accidit, totus, q̄ proxime
dictus eſt, remediorū ordo hoīem proſectō ſanabit. Sed nec ipſe tñ quocunq; remedio oīa, q̄ præ-
ter naturā ſunt, ſanat. Nam aqua muſa, quod ad craſſos ſuccos extenuandos, & glutinoſos deter-
gendos, & excretionē promouendā attinet, optimū planē medicamen fuerit in ijs ſynochis, quos
habitus coarctator, & putredo excitauit: quatenus vero calorē febris adauget, eſt noxia: vnde,
ſi hic immodicus ſit, parcendū aquæ muſæ eſt, vtedum q̄ puſſanæ cremore: Quōd ſi difficiles ac
contumaces eſſe obſtructiones iudicaueris, ēt oxymelite. At hoc ipſum rursus, ſi immodice vta-
re, & intēſtina radit, & tuſſim excitat, & neruoſa lædit. Adeo ſ. difficile eſt cuiuſmodi aliquod auxi-
liū inueniſſe, quod citra vllā noxā magnifice proſit. Id accidit (vt dictū eſt) ex cōplexione ortorū **G**
in corpore præter naturam affectuū, vnā cū præcedentibus eos cauſis, et ſequētibus ſymptomatis.

*Præceptum hoc, Contraria contrariorum eſſe remedia, non in Affectibus modo, ſed
in Symptomatis Verificari. C A P. 12.*

NVnquam tñ propterea præceptum illud, quōd Contrariorum contraria ſint remedia, ali-
quando verum erit, aliqñ falſum: immo id perpetuo verum eſt: quando fieri non poteſt, vt
eorum, quæ præter naturam ſint, quicquam per aliam vllam remediorum ſpeciem curetur. Non
tñ ex vſu eſt ſemper oībus, quæ præter naturam ſint, mederi, ſed cum ſola per ſe ſubſiſtūt. Nam;
ſi cum alijs vnā incidāt, alijs ſæpe eſt ante illa medendū: ſicut in cauīs vlceribus, vbi ea ſimul cum
phlegmone ſunt coniuncta. Quippe verum in hijs quoq; manet, q̄ per ea, quæ carne implent, cu-
rantur: cæterum hijs vt prius, q̄ phlegmonen curaueris, non licet. At interim, dum hæc ſanatur,
vltus cauum adeo non melius, q̄ fuit, redditur, vt ēt fiat magis cauum. Quōd ſi ijs, quæ carne im-
pleant, medicaminibus vt velis, neq; ipſum impleueris, & phlegmonen auxeris. Quæ nanq; car-
ne implent, ea demum implere poſſunt, quæ phlegmone vacāt, non quæ phlegmone adhuc ſunt
oppreſſa. Hoc itaque, quod in dictione tam eſt breue, nempe Contraria contrariorum eſſe reme-
dia, poteſtate deprehenditur maximum. Quippe omnem medendi methodum confundet, quiſ- **H**
quis hanc indicationem neglexerit: cum omnia, quæ præter naturam ſunt ab ijs, quæ iplis ſint con-
traria, curentur. Cum autem eorum, quæ præter naturam ſunt, duplex prima differentia ſit, alijs
per ſe ſubſiſtentibus: alijs in ipſo (vt ſic dicam) fieri, eſſentiam ſuā habentibus, ac vmbre ritu affe-
ctus comitantibus, ſanatio quidem affectuum ipſorum eſt ſublatio: hanc vero ſymptomatū amo-
tio ſequitur. Quibus quanq; iplis nihil prima ratione adhibetur, attamen in ijs quoq; perpetuū
illud præceptum manet, q̄ Contraria contrariorum ſunt remedia: quippe, cum affectus, quos
ſymptomata ſequuntur, ſanamus, ſymptomata nimirum ipſa in contrarium ſtatum perducimus.
Quare, quæcunq; ſymptomata exiguorum meatuum denſitas inuexit, ea rarefactione tollentur.
Quōd ſi iplī quoq; ſymptomati, quod ex denſitate ſpiramentorū eſt natū, id eſt minori, q̄ iuſtum
ſit, excremēti effluxui, (qđ ſanē paulo ſupius adiapneuſtiā vocauimus) ſymptomatū genus aliud
contrariū opponere velis, ne ſic qđ t̄ delit, qđ dixeris: } ſunt nāq; plura iuſto deſluuiā, iuſto pau-
cioribus cōtraria. Adeo, ſicuti in ſymptomatis iplis libet Cōtraria cōtrariorū remedia dicere, in ijs
quoq; ſtat imotus primus oīum, q̄ p̄ter naturā ſunt, curationis indēx. Verū ſatius eſt (vt prædixi-
mus) eorū, quæ vere & primum curantur, id eſt affectuum, in corpore, qui vere ſunt ſubſiſtentes,
contraria eſſe remedia exiſtimes. Quippe actiones eorum, atq; ēt offenſas, vt eas in ipſo, vt ſic di-
cam,

A cam, fieri esse dixeris, ita absolute subsistere minime dixeris. Nā manū extēdere aut flectere, ex ijs, quę absolute sunt, dici non possunt, sed ex ijs, quę sunt: multo q; minus ipsius imobilitas, q̄ ipsa quoq; symptoma est eius, q̄ in musculis nervis ue subest, affectus: sed affectū, qui ex subtilitētiū numero est vnus, contraria postulare remedia dixeris: Hunc vero solutū, contrariū sequi statum, quę sanitas est: atq; hanc rursus, quandā naturā actionē, q̄ symptomati iā finito sit contraria. Sed nec nobis falli, (quę sepe alia forma pferuntur, q̄ vt contrarijs conueniat, sape vero planē non sunt,) sed ex ipsa rerū natura contrariū inuenire debes, habens s. quod pro illo discernēdo species, confessum illud, contraria esse, quę sub vno genere plurimū inter se dissent. Ergo, si intellexeris in illo genere, quod mediocre est, (id vero est, vt sepe monstrauius, quod inter extrema est medium) infinitā quandā cōtrariarū rerū multitudinem, q̄ maioris minoris q; ratione inter se distideant, ex eo inuenies. Verbi gratia, in affectibus, tenuiū spiramētorum symmetriā intelligens, ex vtraq; parte duo immodica, quę inter se sint contraria, inuenies: in actionibus vero, symmetriam vacuatorū considerans, ipsi quoq; ex vtraq; parte ametria respondet. Verū in paruis spiramentis nomina excessibus non desunt, nēpe densitas & raritas: in vacuatis posita nō sunt. Eo q; h, vt cogamur plures pauciores q; effluxus dicere, ita nimirū, vt si dēlitis raritatis q; nomina nō essent,

B spiramentorū ipsorū alibi plura iusto esse, alibi pauciora, dicere cogeremur. Ergo (sicut diximus) hoc maxime cauere debemus, simul etiam in eo nos exercitare, quod celerius cuiusq; sic dicti contrarium inueniamus. Non. n. in corporum modo qualitate, verū etiam in quātitate eiusmodi contrarietatem inuenias: quam vtiq; Aristoteles oppositionē vocat, non contrarietatem. Neq; enim magnum paruo vult esse contrarium, sed in eo, quod ad aliqd dicitur, oppositum: neq; multum paucio: sed nec rarum densio: neq; relaxatum contracto: neq; ipsi, quod secundum naturam est, id, quod pter naturam est. Verum Hippocrati omnia id genus contrariorum habēt appellationem, sicuti etiam Platoni, qui generationes ex contrarijs esse dicit. Oñsum quoq; a me in alijs est nec Aristotelem ipsum suam ipsius legem in nominibus seruasse, quo loco principia eorum, quę natura reguntur, materiam, spēciem, & priuationem statuit. Verum (quod diuinum Platonem secuti semper testamur) contemnere nomina oportet, minime autem scientiam rerum. Ea nanq; ad salutem hoīum pertinet, erroris q; in ea finis est pernicies: nominibus siue proprie, siue improprie vtare, ad ægrotos id parum attinet. Intelligas id clarius, si non contrariorum contraria, sed, quemadmodum illis placet, opposita sibi inuicem esse remedia dicas. Siquidem copiam sanat vacuatio: defectum nutrimenta: in summa, quod exuperat, ablatio: quod deficiens est, adie-

* formam.

C ctio. Itaq; etiā in alio opere recte arbitror a sene dictum: || Medicina appositio est & detractio: deficientium quidem appositio, redundantium detractio. Porro deficiunt redundant q; quędam in quantitate, quędam in qualitate: in quantitate, cum sanguis immodice est auctus, aut rursus minor redditus: in qualitate, cum vel calidus, vel frigidus, vel crassus, uel tenuis plus iusto minus ue est effectus. Siue igitur contrarietatem, siue oppositionem, nominare libet, eius indicationis mēdendi, q̄ ab omnibus, quę pter naturā sunt, præbetur, semper meminisse debebis, ei q; esse intentus: potissimum quidem, vt dictum prius est, in affectibus: sed tamē & in symptomatis: quamuis horum nec priuū curatio sit, nec proprie contrarietas, sed curatio quidē simul cum affectibus, ex accidenti: contrarietas vero, lucidioris s. breuioris q; doctrinæ causa loquentibus, abusiue.

Lib. de Flat. a principio

Indicationes Omnes tradit tum rerum Præter naturam, tum Secundum naturam, quibus uniuersa

Continentium putridarum Curatio continetur.

CAP. 13.

V Erum ad mēdēdi indicationes propositi nobis febrium generis reuertamur: repetamus q; singula genera, quę in nobis præter naturā sunt, nō causarum modo, verum etiam morborum & symptomatum. Et causarum quidē genera sunt multitudo, & crassitudo, & lentor humoris. Causa simul & symptoma est transpirabilis excrementi retentio. Simili modo causa pariter & affectus est ipsa putredo. Morbus vero tum obstructio, tum febris ipsa. Symptoma vero est ipsa transpirabilis excrementi retentio. Ergo indicabit (vt dictum est) præcedētiū causarū quęlibet proprium aliquid: multitudo ipsa, quę ex eorum est numero, quę sunt ad aliquid in prædicamento quantitatis, vacuationē: lentitia vero & crassitudo, quę sunt in qualitatis affectu, sanationem, q̄ per contraria perficiatur. Cum vero in plerisq; oppositionibus cōsuetā nomina nō sint, accidit, vt, qui in rerum scientia minus sunt exercitati, fallantur. Cum. n. vno nomine nequeūt, quod animo concipiunt, nominare, id, ceu prorsus nō sit, dimittunt, quēadmodum profectō in glutinosi & crassis succis faciūt. Quippe^o crassus succus ex aduerso oppositum habet tenuem: glutinosus vero (sicut ipse primū gręce nominaui) rhypticon, quasi deterfiuū dicas: sicuti uero aliquis dixerit, qui a solidis corporibus nominandi occasionem acciperet, friabile. Siquidem hoc pacto semper uidetur Aristoteles oppositionem facere, verum nō in succis, (vt dixi) sed in solidis ipsis corporibus. Quod si glutinosi humoris naturā sub ea ratione intelligas, q̄, quicquid tetigerit, huic ægre dissolubilis adheret, non immerito, arbitror, eum qui nec adheret, & ea quę adherent, deterget, contrarium ipsi statues. Et antecedentiū quidē causarū contrarietates abunde sunt dictæ. In instrumentali vero morbo, q̄ est obstructio, contrariū ei est gręce ecphraxis, quā reclusionē (puto) dixeris: symptomati vero, qd est transpirabiliū retētio, excretio ipsorū contrarium est. At vero in hu-

morum

* AP. πρὸς δὲ τὴν
i. antea.

METHODI MEDENDI

morum putredine & excretio, & refrigeratio, & ventilatio, & semiputridorū cōcoctio, ex aduer- E
fo respondent: ipsius vero febris, refrigeratio oppositio est. Porro, qbus methodis materiam, quæ
singula modo memoratorū perficiat, inuenias, iā diximus. Pugnantibus igit his (sicut diximus)
alias aliæ tū indicationes vincent, tū materiæ. Inde q; factū est, vt quidā, cū ignorassent vnā semp
dari ex re quaq; indicationem, ac, si præter naturā sit, quod indicet, cōtrariū id semper indicare: sin
fm naturā se habeat, nō contrariū, sed simile: nec medendi hi, nec sanitatis tuendæ, methodū con-
stituere potuerint. Siquidē, cū in primis ipsis indicatōibus sunt lapsi, multo profectō magis in
ijs, quæ secuturæ erāt, decipi debebant. Debent. n. (arbitror) edificijs fundamēta iaci firma, & sca-
plis poni idonea carina, siquid ædificandorū pangendorū q; in ijs futurū est firmū: vbi. n. prima
ipsa basis statim ab initio debilis fuit, q fieri pōt, vt, qd supstruxeris, futurū infirmū nō sit. Itaq;
qm in continentibus ex proposita stipatione febribus (neq; n. grauari debemus iterū, atq; iterum
sermonē repetere, quō nunc saltē medicorū vulgus verā methodū condiscat) qm, inquā, Septem
præter naturā posita sunt, à qbus indicationes sumunt, humorū multitudo, crassitudo, lentor, ob-
structio, trāspiratiōis retentio, putredo, & febris carens intermissione: atq; hæc cōtraria oīno esse
adhibenda docebant: Præter hæc vero ab ijs, q fm naturā se habebāt, posita indicationes sunt ex
tēperamento tū ipsius laborātis partis, tū reliquarū oīum q principes sunt, ex substantiæ ipsarum F
quātitate, & ex spiritus ipsius substantiæ tū q̄titate tū qualitate: horū vero indicationes non con-
trariorū erant, sed similiū: ad ista vero (sicut diximus) dignoscēda, tū ætas, tū consuetudo, tum oēs
quæ externæ morbo causæ fuere, contulerunt, utiq; ortus hinc quoq; indicationibus non paucis:
Oēs profectō inspicere simul medicū decet, quō s. intelligat, quō nā primum ac magis, quō nam
minus & secundo, quō nam adhuc & tertio, atq; deinceps quo post quod præsidio sit vtendum.

De Sanguinis mittendiratione in Proposita febre.

CAP. 14.

Q Vippe, si vires eius, qui ex putredine humorū (vt positū est) febricitat, valētes sint, mitten-
dus statim sanguis est, si cruditas ventris non sit, statim morbo incipiente. Sin vires infir-
mæ sint, aut ætas dissuadet, incidenda vena non est. Porro dictum supra est eiusmodi fe-
brē in virtutē imbecillā nō incidere: quippe synochos bene habiti corporis, ac calētis ætatis, pro-
pria est. At, si in puerū incidat, q quartūdecimū annum hætenus non attigit, mitti illi sanguis nō
debebit ppea, q tantilis, cū præfertim calidi ac humidi sint, plurimū corporis substantiæ quotidie
desluat, ac digerāt. Ita, qd ex incidenda vena moliendū nobis fuerat, id vltro nobis ex curati cor-
poris natura pstat. Quod si corpus quartūdecimū annū exceßerit, estimandū est, qualis nā eius
naturā sit, num gracilis, & spissa, & dura, & copiosi sanguinis, an contra: atq; ita in priori missio- G
nem sanguinis adhibebis: in secūda nequaquā. Quin etiā mōdus vacuādī sanguinis ex iisdē indi-
cātibus sumet. Si. n. cui sanguis mittitur, triginta annos natus sit, sed latus, & mollis, & pinguis,
et albus, ac gracilibus venis, huic aut planē sanguinē non mittes, aut parū detrahes. Et oīno quidē
non mittes in tpe æstatis, & regione estuosa, & cœli statu calido ac sicco: parum detrahes in reliqs
tum anni temporibus, tum regione, tum cœli statu. Etenim, si neq; obstructio subellet, nec putre-
do, sed sola succorū redundantia, ptinus à missione sanguinis, pro naturæ suæ ratione se haberet.
Itaq; tm succorū in omni tū corporis temperamento, tū regione, tum anni tēpore, tum statu cœli
detrahi par erat, quantū supra naturalē statum fuerat inauctum. Verum, qm nec obstructio, nec
putredo curari p sanguinis missionem potest, vt quæ alia remedia (ceu prius est monstratū) deside-
rent, reponi sanguinis aliquid ad curationis spatiū debebit, quō minus intempestiue nutrire ne-
cessitate vlla cogamur. Quantum nāq; ad eiusmodi pertinet febrē, prorsus nutriendū non est: si-
quidē ostensum prius est solū virtutis respectum esse, qui de nutrimento indicationem præbeat.
At vero, quantū ad id, quod inanitū corpus est, nutrire oportet. Ita necessum est duorum alterū,
aut febrē, si nutris, augere: aut vires, si non nutris, deijcere. Satius itaq; fuerit (vt dictum est) aligd
sanguinis, quod proprium partibus animalis nutrimentum sit, relinquo: ac ipse paucissimas for H
bitiones potiones q; exhibere sis contentus: qbus utiq; ceu medicamentis potius, q nutrimentis,
egemus. Nam id quoq; supra (quō minus multa de iisdem adhuc loquamur) est ostensum.

*Aduersus Methodicos, qui omiſſa Venæ ſeſſione Præcordia Cataplasmatibus
perfusionibus relaxabant.*

CAP. 15.

† Al. αὐθι-
δὲ θερπείας

Immo de cataplasmatibus ac præcordijs perfundendis est loquendum. Quippe pleraq; medicorū
turba vnum quiddam hoc quoq; ex † methodicorum istorum curandi } functionibus statuūt.
Oēs q; sicuti post tertium diem nutriunt, ita etiā oleo prius perfundunt. Inde vno die interpo-
sito rursus nutriunt, cataplasma prius imponentes: quōd sicui alius est adstricta, etiā hāc cly-
stere ducentes. Itaq; his saltem authoribus ordinandi victus artem, vna hora quis didicerit. Ve-
rum non ita se vera res habet: sed, cum ars ipsa tota sit magna, non leuissima eius pars est scientia
ordinandi victus. Quæ utiq; ex his maxime remedijs constituitur, cibo, potione, perfusione, ca-
taplasmatibus, & clysteribus. Quippe iisdem medici, cum sanguinis missionem in principio etiā
solam adhibuerint, reliquam omnem egri curationem victui mandant. Itaq; (vt dixi) vnus horū
est victus eorū disciplina: q si, qui discit, ingenio valeat, ne huius quidē integræ, sed minimæ eius
partis, in qua s. quæ nūc dicam, audisse licuerit. Qui febricitant, si valentes viribus sint, omnibus
sanguinem

A sanguinem ab initio mittes: perfusos q; oleo post tertiae accessionem, vel mulsam cum aliqua nutries vel sorbitione. Deinceps vero alternis cibabis diebus, sed cataplasma ex artomelite prius imponens. Sicubi vero aluius adstricta fuerit, clystere hanc duces. Atq; illorum quidem vniuersam ordinandi victus artem, in his verbis iam audisti, non utiq; in sex mensibus, sed sex versiculis. Veram autem dieteticen, id est victus ordinandi artem, nunc audies. Calfacere praecordia cataplasmatibus aut perfusionibus non est perpetuo tutum, sed in ijs tñ agris, quibus in toto corpore nullū errat superfluum: cæteris omnibus extrema est pernicies. Nam, siue redūdantia vtrius sit, vel quæ ad vires, vel quæ ad vasorum continentiam comparatur: siue et in vna parte pluribus ve vitiosa excrementa sint: omnia ad partem excalfactā trahuntur. Quoties.n. vidisti praecordia, cū planè phlegmone carerēt, intra quatuor dies, q̄ ea gregales isti medici pfundere cœpissent, phlegmonem contraxisse, cum ego et id ipsum tibi prädixissem, iussissem q; diligēter ad phlegmonem futuram attentus esses? In quibus id maxime intellexisti, quātum malum sit vsui, qui alienus à ratione sit, insuadescere. Quippe hi, cum ex ijs, quæ ipsimet faciunt, phlegmonas semper excitent, id non animaduertunt, sed iisdem semper erroribus implicantur: veluti Hippocrates ijs accidere dixit, qui hinc & inde ossiū fracturas cum vlcere deligabant. Etenim illi, cū phlegmonas in vlcere crearēt, non tñ destiterunt, rati id adeo non ex deligatura, sed alio quopiam errore incidisse. Et quomodo, quāso, ad aliam curationis rationem se transulissent, qui vsū sine ratione profitebantur ex ijs, quæ tum ipsi semper facere essent alii, tum praepceptores suos ante se facere contemplati? si quidem huius generis homines ne tentandum quidem censent, vt ex indicatione quicquam sumant: sed sola experientia sunt contenti. At Hippocrates ab ipsa rei natura idoneum curationis modum inuenit. Quo postea in vsū veniēte cognitum est, quantus esset in priori error. Quin, si quis in eiusmodi affectibus, cataplasmatibus & perfusione ex oleo relictis, velit ad curationē, quā ratio docet, accedere, ipse, quantopere aberrant, qui plethorica & quæ parum pura sunt corpora, sic curāt, haud magno negotio experientia ipsa iudicabit. Sanè accidit, vt in eiusmodi morbis diuites potius, q̄ pauperes perperam curentur. In his.n. propter ipsorum delitias duplex peccatum non raro cōmittitur, & q̄ sanguis non mittitur: & q̄ à medicis impensior scilicet adhibetur diligentia, vt quotidie aliquid circa agrotantis corpus fiat. Ac inter initia quidē sanguinis missionem maior eorum pars propter molliem non admittit, tametsi magis, quā pauperes, redundantiae sanguinis affectibus sunt obiecti, vt qui magis tum cibis se impleant, tum in ocio vivant: Medici vero, qui eos curant, vbi summum remedium est omissum, aliorum vsu farturos se, quod deficit, **C**putant. Huc accedit, q̄ ipsi quoq; agri, si quis victu cōtra morbum minore cum negotio instet, negligentiam rati: si quis rursus quiduis agat, diligentiam: cogunt eos praecordiis aliquid quotidie admouere, sed nec inuitis profectō ipsis medicis: vt qui facere semper aliquid videri velint, q̄ sic se maiorem mercedem accepturos sperant. Itaq; accidit, vt illo ipso tempore phlegmonae diuitibus incipiant, quo iam pauperibus morbus propemodum perductus est ad finē. Quippe missō in propolitis febribus inter initia sanguine, non pauperibus modo, verum etiam diuitum seruis, plurimis quidem quinto, aliquibus septimo, crisis contigit, nemini serius. At diuites, qui & sanguinis copiam, & excrementorum plus, q̄ pauperes & serui habent, cum sanguinis mittendi praetermisere remedium, ac quotidie tum calido oleo perfundantur, tum laxantibus cataplasmatibus vtantur, phlegmonem nimirum aliquam vel in iecinore, vel vtriculo, vel reliquorum istius viscerum aliquo contrahunt, alij in quarto, alij in quinto, omnes planè in sexto. Nec oblitus, arbitror, es eius, qui dum perfunderetur, difficultate spirandi laborauit, omni superuacuo † ad praecordia † caloris vi tracto. Ergo non hic modo perijt, sed alij quoq; infiniti quotidie pereunt, cataplasmate ipso cucurbitulae ritu corporis superuacua in viscera trahente. Non defuerunt profectō & qui cucurbitula quoq; ipsa sunt vsi, eo tantum consilio, vt circa agrotantem aliquid semper moliri viderentur. Saluberrimum igitur (vt prädiximus) est in febribus venam incidere, non continetibus modo, verum etiam alijs omnibus, quas putrescens humor concitat: vbi praesertim nec etas, nec vires prohibent. Leuata nanq; q̄ corpus nostrum regit, natura, exonerata q; eo, quo, velut sarcina, premitur, haud egre, quod reliquum est, vincet. Itaq; pprii muneris haud oblita & coquet, quod concoqui est habile: & excernet, quod potest excerni. Eorum.n. q̄ in medio sunt corpore, (vt isti vocant) prouidentia, vbi detractus sanguis non est, maximum planè est malum: vbi detractus est, non maximum. Quanquā sic quoq; noxia esse in synochis febribus pōt: quippe deusta immodico calore viscera etiā amplius deurentur ac torrentur. Ergo eiusmodi prouidentiam illi duntaxat requirent, qbus in vna particula putredo constitit: si tamen hi quoq; sanguinem prius miserint. Prouidebitur autem his, non sicut triuales isti medici prouident, qui statim inter initia relaxant, sed in plurimis prorsus contra. Relaxantia nāq; remedia, sicuti, quod in membris continetur, euocant: ita, si in principio sint admota, p eo plus attrahunt. Cum enim adhuc ad affectū locum fertur fluxio, reprimere remittere q; hāc expedit, nō ad ipsum attrahere. Quæ vero Apostolica i. reprimentia dicunt, quæ adstringendi certe vim obtinēt, in principiis idonea sunt duplici rōne, & q̄ robur affectus particulis inferunt, vnde minus prompte affluxum excrementorum in se recipiāt: & q̄ eorum, q̄ in ijs iam contenta sunt, tenuissimum extrorsum exprimant. Quod

* Al. καταχε
ρεται. relin
quunt.

3. de Fract. l. 8.
7. 243. 5

† τὴν ἐν τῷ
σπλάχνῳ

† ἐπὶ τῇ ἐν
τῇ ἀδελφῇ
ἐπὶ τῇ ἀδελφῇ
ἐπὶ τῇ ἀδελφῇ

si tum

METHODI MEDENDI

si tum fluxio humorū per ea remedia compescitur: tum densitas, quæ ex adstringendo in affecta **E** particula relicta est, crassiora detinet: iam tēpestiua relaxatio est, quò ea, quæ retenta sunt vacues. Præcipue autē adstringentibus est utendū, vbi in iecur aut ventriculū superuacūū profluūt: qñ & ē primoribus admodum hæ partes sunt: & munus suum obeant vel in iplis morbis, est necessum. Porro est non exiguū eorum munus, quale q̄ reliquarū partium, quibus illud modo negociū est, vt id, quo nutrant, conficiant: verū quod tantopere animalis interlit, vt, si neq; in ventriculo probe alimentum fuerit concoctū, nec in sanguinē in iecinore mutatū, vtiq; quod in fame nobis accidit, vt cibi penuria degere in abstinentia cogamur, idem tum omnibus animalis partibus accidat: non enim ex ijs, q̄ deuorari quis, sed ex ijs, quæ in iā dictis visceribus confecerit, alimentum toti corpori suppeditatur. Atq; ob hæc nimirū impensius, q̄ cetera mēbra, vētricus & iecur adstringentia desiderant. Ergo, cum ea, quæ iam infixa sunt, euocandi tempus est, tum quoq; modice adstringi postulant: quod. n. adstrictionis in principio largius, ijs, q̄ ceteris partibus, adhibet, id seruandū assidue est, nimirū manente, qui id indicet, vsu: vsus vero est (vt paulo ante testati sumus) nutrimenti confectio. Si igitur per imbecillitatē parum recte concoxerint, nō modo assumpti cibi nulla est utilitas, sed ēt ventriculo non raro ex eius corruptela lacessito expellit quoq; aliquid prioris. Ita fit, vt duplex iā noxa toti corpori accedat, cum nec ex cibo sumpto nutriatur, & **F** aliquid † ex eo, quod sibi reposuerat, amittat. Huc accedit, & q̄ ciborum concoctio siue ea in iecinore, siue in ventriculo sit improspira, febres intendit, ac succi vitio exacerbat. Quo magis in omni febre, ciborū concoctioni prospicere magnopere oportet: atq; eius rei causa roboris quoq; instrumentorum, quibus perficitur, nō leuis habenda est cura. Sanē aliqui sunt (vt Hippocrates ait) qui ex eo, quod ignorant, non parum lucrifaciunt. Arbitrantur. n. iecinoris se phlegmonen relaxantibus præliis curare, ex eo scilicet famam sibi comparantes, q̄ in agnitione falluntur: siquidem videntur non nunquam lineamēta musculi, qui à costis thoracis ad præcordia peruenit, persimilia iecinori. Mirum autem minime arbitror eos, qui nec aliud quicquam in arte probe didicerunt, nec in agnoscendis affectis partibus se exercuerunt, sic laudem aliquando consequi.

† τῆς οἰκίας
παρασυνδῆς.

* περιγραφή,
circumscripção.

Quaratione Cataplasmata parare oporteat, quæ Ventriculo, Iecinori, Lienī, & Reliquis inferioris Ventris partibus conducant.

C. A. P. 16.

Verum istos mittamus. Nos, vel si minima suspicio sit iecur ventriculum ue laborare, absinthium protinus oleo incoquemus, ac eas particulas perfundemus. Cum autē duplex in omni absinthio facultas & qualitas sit, veluti in libris de medicamentis est traditum, vtiq; in pontico adstringendi facultas non parua est: in reliquis omnibus amara quidem qualitas est vehementis. **G**rima, adstrictio vero (quam saltē gustu agnoscas) aut planē obscura aut prorsus nulla sentiū. Proinde ponticum ad iecinoris & ventris phlegmonas eligi præstat. Porro id est tum folio, tum flore longe, q̄ cetera absinthia, minore: odor quoq; huic non modo non insuauis, verū etiam aromaticum quid præferens, reliquis autem omnibus est fœdus: quare hæc fugere conueniet, vti autem semper pontico. Etiam reliquorū medicamentorū, in quibus mista cū amaritudine adstringendi vis est, aliquid in oleum conijcere, atq; ad eundem modum vti licet. Ostendimus nanq; in opere, quod de medicamentis inscribitur, amaram qualitatem præire, ac viam adstringenti facere. Quo fit, vt medicamentum id genus, omnibus, quæ tm adstringant, sit præstantius. Ac, siquidem intendere adstrictionem studes, etiam oleum ipsum adstringendi vim habeat, cuiusmodi est, & q̄ Hispanum vocant. & quæcunq; cum frondibus oleæ præparare solent: vel quale est crudū, quod græci omphacinon vocant. Sin leuiore vti adstrictione placet, aliud olei genus præparabis, præcipue quod tenuium sit partium: quod genus Sabinum est. Optimum tamen, vbi adstringere vehementius est opus, Histricum oleum est, vt quod ambas in se virtutes habeat, & amaram, & quæ adstringat. In penuria vero absinthij inter initia vel melinum, vel mastichinum, vel lentiscinū satisfecerit: q̄ si exigua febris sit, etiam vnguentum, quod ex nardo componitur. Esto autem optimum id quoq; neq; n. parum interest inter id, & quod vitiosum est: cum id, quod Neapoli in Italia conficiunt, nomine tm nardinum vnguentum sit, si cum eo, quod in Asia fit, conferatur. Id antea Laodiceæ tantum componebatur: nunc etiam in multis fit oppidis. Quod si inclinatio febris, in qua ista moliris, non admodum sit facilis, abstinebis à nardino: vteris autem hoc tempore rectius melino: aut, si id non est, lētiscino: ab hoc vero, mastichino. Omnibus nāq; his nardinum vnguentum valētius excalfacit: quare, si reliquorum copia non est, rosaceum illi admiscebis. Sanē myrtini adstrictio idonea non est, cum crassiorum sit partium, q̄ vt alte descēdere possit. Atq; hæc quidem exempli gratia protulimus: nam magnam eorum copiam deligere ex medicamentorum libris licet. Ad eundem vero modum & cataplasma compositam vim habeat ex ea, quæ tenuium sit partiū, ac relaxet, tum vero ex amara & adstringente. Superet autē in ijs, vbi scilicet tum reprimere, tum robur addere studemus, quod adstringat: vbi tenuare ac detergere, amarum: vbi euocare, quæ ex relaxantibus tenuium maxime sint partiū: siquidem, quæ crassæ substantiæ sunt, ea pus mouētibus mōstrauimus esse accōmoda. Cum autē definitū in opere de medicamentis sit, & quæ vel solā obtineant adstringendi qualitatem, vel amaritudinē: & quæ ambas possideāt qualitates: maxime deligēda sunt, quæ ambas habēt: vbi ea non adsunt, ipse amara ijs, quæ adstringant, miscebis,

* θαλλόν, libro
sequenti uertit,
germina.

A. 1. E. 1. Ch.
fol. b

A miscebis, ita nimirum, uti nos in iecinoris phlegmone, ex copijs presentibus componere cataplasma vidisti. Erat enim is, qui egrotabat, medicus: quem iam lucernis accensis inuimus: quo tempore ab ijs, qui talia venditāt, nihil emi potuit. Ergo, cum inclinatam notabiliter febrem inuenissem, utendum occasione quā primum censui, eo certe magis, quā suspectam horam, quē gallicinio futura erat, alterius accessionis initium allaturam verebamur. Incoxi in oleo quidem absinthium: in aqua vero malum cotoneum. Dum autem hæc coquebantur, myrobalani picesina, & iecos radicem, quæ intus inueneram, contudi cribraui quæ: dein olei & aquæ, quæ paraueram, portionē in lebetem immisi: ac, ubi modice coxeram, myrobalanū & irim vnā cū exigua cera inieci. Coquimus autem cotoneum non in aqua modo, verū etiam persæpe in austero vino: ac omnibus eiusmodi cataplasmatibus de ipsa quoque cotonei carne interdum admiscemus. Quippe, ubi, & quod cōfluit, copiosum est, & particula ipsa infirmior, adstringentē vim (sicut scis) inuicemus: ubi vero tum corpus totum purum est, nec membrum ipsum imbecillum, nec ultra quid cōfluit, ibi in ijs, quæ miscentur, materijs minimum quidem sit, quod adstringat: copiosius vero nō solum, quod relaxet, sed etiam & quod amarum est, & quod acre. Quod si exigua febris sit, ac phlegmone non adeo calens, tum æger ipse inædiam tolerare valeat, hoc casu digestoriam quidem curādī speciem

B intendes, adstringentem aut remittes. Neque enim amplius ipsi saltem phlegmonē conducere possunt, quæ adstringūt, ubi nec affluit quicquid, & crassus humor affecto loco tenaciter est infixus, sed (sicut prædictum est) trahendę potius curationis: ac, quæ adstringant, miscendi consilium probamus, quod robur membrorum tueamur. Vnde nec colo laborante, nec reliquorum intestinorum quouis, nec musculis: qui in præcordijs habent, aut ipso peritonæo, miscenda adstringentia sunt: sed nec, cum velica male habet, vterus ue, modo (ut dictum est) nihil ultra ad locū fluat, nec sanguinis redundantia nec excrementorum copia in toto sint corpore. Porro renes & pectus in media prædictorum conditione sunt, quantum scilicet ventriculi iecinoris quæ solitudine absunt, tantum reliquorum supergressa: siquidem in ventriculo ac iecinore exolui robur est perniciosissimum, in illis minime est periculosum. In his vero est quiddam periculosum, non tamen perinde, ut in illis: nisi si pus educere ex pectore, aut pulmone, aliquando sit opus. De liene prænunciare absolute non est, nec nisi prius definita tum corporis totius natura, tum vero affectu, qui curationis tempore occupauit. Nam, si vel æger ex ijs sit, qui tatra bilis excrementum naturaliter congerant, vel etiam eo tempore succus is in eo abundet, necesse est in liene curando adstringentia reliquis admisceas, quod visceris robur custodias. Ita enim & excrementa ad se trahet: & cum corpus expurgarit, ipse rur-

† melancholicū

C sus per ventriculum excernit: veluti in naturalibus cōmentarijs de his est proditum. Sin nullum omnino sit tatra bilis excrementum, aut oīno adstringendum non est, aut parcissime. Obseruandum vero diligenter est non in liene modo, verū etiam in oībus partibus, in quibus humor putrefcit, quod symptoma maxime sit vehemens, quod secundo loco, aut tertio: quod videlicet affectus ex ipsis planē inuento, idoneam ei curationem adhibeas. Alias namque in membro affecto calor superat: alias tumor, qui vel propter abundantiam humoris, vel propter crassitudinem sit durus. Si igitur calor præponderat, id agendum, ut sensim per ea, quæ tepentem calorem obtinent, digeratur: quod genus est tum lini semen, tum chamæmelum: quibus adijci vel hordei vel fabarum farina debet, quippe quorum neutrum excalfacit. Sæpe autem (uti non ignoras) quod medici artomeli vocant, pro cataplasmate eiusmodi phlegmones præparamus, atque aquæ aliquid miscemus: ad liem vero etiam aceti aliquando aliquid. Si vero laborantis phlegmone partis calor non multum à natura excesserit, sed magnitudo eius notabilis fuerit, digerere haud timide sine aqua debebis, et scœnigræci aliquid supradictis immiscēs. Si vero, veluti scirrhusa phlegmone sit propter humorum, quos continet, vel crassitudinem vel lentorem, tum aceti aliquid, tum amara medicamenta simul immiscenda curabis: potissimum in liene. Etenim viscus hoc propterea, quod ab iecinore crassum humorē trahit, eiusmodi humoris occasione plerumque laborat. Quo magis cataplasmata, quæ ex oxymelite & absinthio & cappari fiunt, illi sunt idonea. Hæc igitur cum medicorum vulgus ignoret, omnes oleo perfundunt: & cataplasmatibus relaxantibus curant prius, quæ corpus vacuetur, omnium quæ maxime diuites: quibus non solum in talibus obsequuntur, sed etiam eos lauare in balneo permittunt. Ego vero nec eorum, qui ex putredine humorum febricitant, lauem quēquam: nec relaxantibus cataplasmatibus prius, quæ superuacua purgarim, utar. His vacuatis non solum audacter lauem, sed etiam cataplasmatibus utar, in alijs quidem membris, ijs, quæ relaxent: in iecinore vero ac ventriculo, additis etiam, quæ mediocriter adstringant.

† melancholicū

Quæ Cataplasmata Cordi, & Pulmoni, & omnino Pectori conueniant.

CAP. 17.

P Arcius vero ad pectus, quæ ad ea, est adstringentibus utendum: quoniam talia humores, quæ phlegmonē excitant, in pulmones & cor non nunquam reprimunt. Accubis potius horū firmitudini est consulendum: neque enim, sicut in iecinore & ventriculo, ita hic quoque tenuissimo victu est utendum: In illis namque alimentum concoquitur, metus quæ est, ne ipsis phlegmone laborantibus nec nutrimentum rite concoquatur, & phlegmone augeat: in pectus vero tantum alimenti iam concocti peruenit quantum vni ipsi particule nutriendæ satisfaciāt. Ac longe quidem magis in pulmonis phlegmone abstinendum ab adstringentibus est: quoniam in eo ipsis quoque relaxantibus admiscendum aliquid acrium

Septima Classis.

k k k k k k

quodāmodo

METHODI MEDENDI

quodammodo & euidenter calfaciendum est: quippe foras trahere potius, q̄ reprimere, in eo debemus. Itaq; etiam cucurbitula vtiliter ijs, qui sic laborant, si prius sint vacuati, applicabitur: si vero abundantia succorum (quam vocant Plethoram) in his sit, non magis ex pulmone in pectus aliquid excrementi transferet, quam ex toto corpore attrahet in vtrunque.

Cataplasmata laboranti Cerebro & Capitis partibus accommodata.

CAP. 18.

EAdem ratione nec in cerebri & eius mēbranarum phlegmonis, cucurbitulis in morbi initio utemur, verū vbi nec influit adhuc quicq̄, & totum corpus prius est vacuatum. At reprimentibus in his quoq; inter initia vtēdum. Sed, cum ossibus cranij medium occupātibus in altum descendere reprimētium vim cupimus, eorum, quę preire ac deducere ea possunt, aliquid reprimentibus admiscebimus: ea sunt, quorum substantia ex tenuibus partibus constat. Sanē acetum non modo tenuium partium est, sed et non mediocrē reprimendi vim obtinet. Quo profectō rationalius in principijs affectuum ipso vtuntur, rosaceo admiscētes. Procedente vero tempore etiam spondylii & serpilli (quibus iam non modo partium tenuitas, sed etiam calor inest) aliquid admiscēt: quo s. tempore transire ad ea, quę concoquant ac digerant, conuenit: atq; hæc vtraq; valentiora, q̄ postulet ipsa pars phlegmone affecta, deligere, ceu viribus eorum per ea, quę interlunt, ossa remittendis. Sanē ad eum modum & castoreo vtimur, cum tñ eo in alijs phlegmonis minime vtamur, quamuis etiam in summa inclinatione sint: est enim calidius id, q̄ vt phlegmonis sit idoneum. At vero locis circa cerebrum, phlegmonis iplis iam inclinātibus, est viliſſimum, qm̄ non continuo his, sed ossibus interuenientibus occurrat. Inest aut̄ eiusmodi pharmaco & partium tenuitas, quod ipsum ijs, quorum per densum obicem transmitti vim oportet, est accommodum.

Quę Partes per quas Vias, & per quę Remedia vacuentur.

CAP. 19.

Illud te profectō nō fugit, nos lingularum particularum meatus, qui ijs ad superuacuorū emissionem sunt proprii, fluxiles reddere, Intestino, ventriculo, & mesenterio, & cōcauis iccinoris intestinum rectum: Renibus, velicæ, iccinoris gibbis, venæ cauæ, & arteriæ magnę, & omnibus quę in lumbis habentur, cum, qui vrinis est delegatus: Pulmonibus & pectori, ipsam asperā arteriam & fauces: Cerebro & eius inuolucris eum, qui per palatum & nares descendit. Paritur fluxibilitas ijs quidem, quę per sedē excerni habent, mulla, & cibus ijs, qui ventrem molliunt, & phar macis, quę modice proritare possunt: quę enim acriora sunt, vitare oportet, qm̄ phlegmonas exacerbent. Ad vētriculum vero, iecur, & lienem, siqñ phlegmone sint vexata, nec mulla ipsa est vtilis, qm̄ illico in bilem transeat, ac viscerum phlegmonas augeat. Excrementa vero, vt cum vrinis excernantur, ijs medicamentis, quę vrinas mouent, (Diuretica Græci vocant) promouebis. Nō Gsecus, quę in pectore & pulmone continentur, tussi (per ea scilicet, quę hanc moueant,) vacuabis. Porro in opere de medicamentis cuiusq; materiam didicisti, non eorum modo, quę iam comprehensa sunt, sed etiam, quę cerebri membranarum q̄ eius superflua per nares emittunt.

Quo Tempore & qua ratione Cataplasmata relaxantia, & Balneum egrotos iuuent.

CAP. 20.

ETenim horum quoq; omnium vberem materiæ supellectilem in illis commentarijs habes. Quare abunde sunt ad rem præsentem, quę hactenus de phlegmone laborantium partium differentia disputauimus. Dicturus enim plura de ijs sum in ea methode, quę oīum tumorū, qui præter naturam sunt, curationem comprehendet: neq; n. in præsentia dedita opera & studio hūc sermonem sum ingressus, sed præter pensum in eum, sequela quadam rerum inuitante, diuertī. Siquidem propolitum nobis in hoc libro nō fuit, vt te partis cuiusq; phlegmone obſessæ optimā curationem docerem, immo vt noxam eorum ostenderem, quibus cataplasmata in febribus non vacuato prius toto corpore imponūtur: potissimum vbi intra corpus aliquid phlegmone infestatur: quippe, si ambiens ita calet, vt materias valenter liquet, maior noxa eiusmodi cataplasmatibus succedit, q̄ lotioni in balneo. Quanquam autumant, qui quotidie præcordia perfundunt, & cataplasmatibus inducunt, non modo nullam ex ijs noxam, sed etiam magnam vtilitatem ægris comparari: contra ex lauando non modo nullam vtilitatem, sed etiam maximum incommodum, scilicet ignorantes, sicuti reliquorum oīum, quę circa ægrum administrant, ita & balneorum naturam.

Ego vero de vniuersa eorum vi in superioribus disputauī plenissime. Nūc tātum dixisse est satis quibusdam prorsus nihil nociturum balneum: quibusdā minus, q̄ cataplasmata. Quod enim in præcordijs relaxantia (quę isti vocant) præsidia faciunt, id balneum in toto efficit corpore. Eo q̄, cum in remissione febris adhibetur, corpore iam mediocriter transpirāte, nō exiguum affert commodum, oīa ex eo tum fuliginosa excrementa, tum fumida educens. Et, si quidem nullius visceris imbecillitas subſit, proficiet ægotanti: si tñ horror inter exhibendum non incidit. Tribus. n. his in balneo, quod in quacunq; febris adhibebis, intentus sis oportet: vni, q̄ citra horrorem sit administratum: secundo, q̄ nullum primę notæ viscus sit imbecillum: tertio, q̄ multitudo crudorum humorum in primis venis non contineatur. Horror nanq; (vt prius dictum est) nō solum intendere iam præsentem febrem potest, sed etiam, cum non fuit, eam interim excitare: partes vero imbecillæ liquatos iam humores magis recipiunt, q̄ ante, quā liquarentur: crudorum vero humorum copia in totum corpus digeritur. Horum si nihil obſtet, ex balneis duo hæc egro compendia accedant, & q̄ redundantie humorū aliquid vacuabitur: & q̄ multum febrilis caloris trāspirabit.

Quod

A Quod si, præter quod nulla princeps pars imbecilla sit, etiam inferioris notæ partium aliqua sit inualida, veluti podagricis pedes, & ijs, qui articulari vitio laborant (Arthriticos Græci vocant) vniuersi corporis articuli, maxima salutis pars ægro ex balneo comparabitur, iplis infirmis partibus quæ superuacua sunt, excipientibus. Assolent. n. non nunquam & citra balneum superuacanea in partes infirmas confluere: à balneo vero magis, utpote tum succis iplis per id liquatis, tum vijs, per quas meent, patefactis: ambo. n. hæc ex moderato calore proueniāt, necesse est, tum ut humores liquentur, tum viā dilatentur. Proinde fit, ut, cum iecur, ventriculus, pulmones, pectus, vel principum id genus partium aliquod imbecillū sit, maxime ledantur, quicūque se lauerint, si illis superuacua in corpore sint: iisdem quod ipsi cataplasmate vii, duplex incommodum sentiant, nullo comodo. Quippe balneum tum corpus totum vacuat, tum, quod humidum est ac fuliginosum, digerit: relaxantia cataplasmata, ac similis facultatis perfusiones, ut nihil horum bonorum afferūt, sic superuacuum omne ad imbecillius, quodcūque id circa mediū corpus sit, contrahunt, siue, iecur id, siue ventriculus, siue septum transversum, siue mesenterion, siue ieiunū, siue colon, renes ve sit. Quod si diligentiam ostentare volentes, etiam pectus vnā excalfaciant, vel in ipsum, vel etiam in cor, vel in pulmonem, superflua rapiunt. Voco imbecillam partem, vel quæ natura est intemperior (alijs

B nanque alia sic se habet) vel quæ ex præcedente aliquo morbo intemperiem contraxit: vel quæ in præsentis tpe in hanc sit perducta. Non enim partium oīum, quæ aut phlegmone laborant, aut putrescentes humores, aut obstructions continent, virtus statim infirma est: promptius tamen in ijs quoque superuacuum, qualecūque id sit, in egram partem propter calorem, quem affectus excitat, fertur: quippe particula, quā obstructio, aut putredo, aut phlegmone obsedit, febris ipsius veluti focus est. Ergo, cum huic propter calorem suum sponte trahenti alia quæpiam occasio extrinsecus ex ijs, quæ potestate excalfaciant, accessit, necesse est affectum intēdi. At vero, si quis, uti prædictum est, toto corpore prius vacuato, relaxantibus curet, ubi scilicet maxima febris non adest, utique prodelic aliquando potest. Tum vero, ceu dictum etiam est, lauare citra noxam licet. Cauendum tamen à frigido solio his est: quoniam & crudi & putrescentes succi, minus apti ad exhalandum redduntur, si quis in eo moretur. Sanè officit ijs etiā, si aqua admodum sit frigida: quoniam sic affectorum tum corpus, tum vel maxime afflictā particula, diffuari evaporarique postulat. Quo fit, ut vel perfundere illos aqua idonea soleamus: vel, si moderate, quæ in natatione est, frigeat, ingredi permisos celeriter exire iubere. In progressu tamen morbi, quo tempore & absumpta iam superuacua sunt, & tum cruda tum putrescentia concocta, & cataplasmatibus relaxantibus & balneis sine periculo vtare.

Quo pacto Ratio victus, æstimato initio ac febris vigore, statuenda sit.

CAP. 21.

Porro aptissimum in febribus, quæ intermittunt, { & repetunt } tempus est, cum, uti dictum est, exhalare iam cœperit febrilis calor. Statim enim corpus ad nutrimentū præparat, huius quoque opportuno tempore ex duplici coniectato respectu, nempe summo præcedentis accessionis vigore, & futuræ principio. Ad hæc nanque spectantes operam dabimus, ut quod longissime ab utroque nutriamus. Ergo, si spatium, quod inter summum prioris accessionis vigorem, & sequentis principium interuenit, satis sit amplum, facile est idoneum tēpus inuenire: sin exiguum id fuerit, alterum facias, necesse est, ut aut ægrum admodum adhuc calentem nutrias, aut sequentis accessionis inualione iam iam affutura. Quo magis præfagi medici eiusmodi febris indiget, qui primis statim diebus, quanto spatio duratura febris sit, conijciat: quippe, si continens fuerit, constat breui finiendam. Si itaque ultra septimum progressura non videbitur, prorsus continendus à cibo æger est: utique si virtutem non defecturam conijcimus. Sin ad nonum, aut vndecimum, aut quartumdecimum usque progressura videtur, aut etiam in septimo finienda, ceterum æger vires infirmiores habere, quod ut in tantum tempus iufficiat, necessum erit nutrire: ac deligere, sicut in re anticipi conuenit, quod minus sit noxiū, distinguendo id discernendo quod ab eo, quod magis sit nocidurum, id quod tum ex loco afflictio vnā cum affectu, tum accessionis & principij & summi est vigoris consuetudine. Siquidem, ubi vel iecur vel ventriculū phlegmoneprehendit, perniciosissimum est ante accessionem cibare: ubi hæc abest, quibus infirma est virtus, vtilissimum. Assolent enim eos, qui ita se habent, iecinore quidem afflictio, alui deiectiones vnā cum accessionibus inuadere: ore autem ventriculi vexato, syncope. In alijs vero animalis instrumentis, quod iam dictis portione respondeat, tum ex situs eorum ratione, tum dignitatis, æstimabis: agetur quod de iplis postmodum. At summi vigoris & accessionis principij morem sic cōsideres, censeo. In summo vigore notabis, an citra magnitudinem febrilis caloris siccus sit & squallens, an citra squallorem vrēs. Priorem namque humectante victu madefacere quod primum oportet: in secundo, dum plurimum caloris se remittat, expectare. In principij vero accessionis more æstimabis, an corporis extrema perfrigeret, & magnam sanguinis reuocationem ad interiora corporis faciat: an omnino corpus non premat. Quippe secundum hoc, ceu facile mansuetum ue, contemnes: in priore distinguas, oportet. Nam si absque visceris phlegmone, aut succorum redundantia, motus ad interiora in accessionibus pollet, nihil offendes paulo ante cibans: sin

vel phlegmone, vel redundantia sublit, cauenda est ante accessionem cibatio, ceu res maxime noxia.

Septima Classis.

kkkkkkk ij

Galen

† AP δύσπεπτον. i. minus apti ad concoctionem.

* συνεχής, i. continua, & in cod. græcis. συνεχής legit Linac.

* ἥθελ i. more. quæadmodum inferius uertit.

* Αλευτον.

GALENI METHODI MEDENDI ID EST DE MORBIS CVRANDIS LIBER DVODECIMVS

ARGVMENTVM LIBRI

Symptomata, quæcunque Insigniora sunt ad euertendas vires, ac cum febribus
inuadunt, curare docet.

*Quo pacto aduersus Symptomata pugnandum pro ratione noxæ, quam
viribus inferunt.*

CAP. I.



Non sunt, sicut non nulli autumant, ea, quæ cum symptomatis consistunt, febres, aut febrium genus vllū, aut species differentiæ ue: sed, veluti tum alius morbus alij morbo, tum symptoma symptomati, vno tempore, eodem in corpore copulatur, sic & cum febre incidunt quedam grauiora symptoma- F
ta, quibus prospici maiore medentis sollicitudine debet. Nam de leuioribus, quæ febrium generationi necessario succedunt, adeo omnino non memine-
runt, vt etiam, ceu prorsus non sint, innominata ea reliquerint: at, quæ vel
rarenter febricitantibus incidunt, vel cōmunem magnitudinem excedunt,
seorsum ab alijs tradenda censent. Sunt porro eorum primæ differentiæ tres. Aut enim in actio-
num offensa consistunt: aut in retentorum vacuatorum ue immodico excessu: aut corporum ip-
sorum affectu. Quartū enim genus numerandum inter symptomata non est, etiam si inter sym-
ptomata q̄ maxime non pauci id posuere, sicut erysipelata, ophthalmias, vlcera, parotidas, reli-
qua q̄ id genus. Ex prædictis vero tribus, actionum quidem offensa si contristant, sollicitudinem
medici ad se conuertunt, affectum q̄ deserere cogunt: idem faciunt & eorum, quæ retinentur vel
expelluntur, excessus. At genus symptomatum, quod in affectibus consistit, alterius quidem, quē
curare oportet, affectus est signum: ipsum tamen nullam seorsum curationem exigit, vtpote cum
affectu, vnde nascitur, vnā cellans. Vt enim in summa dicam, nullum symptoma, quā symptoma
est, nec curationis rationem indicat, nec primum immutat. Monstratum enim est ex morbis ipsis
curationis indicationem præstari, veluti ex causis ipsis prouidentie. Dictum præterea est & quō- G
modo prouisio ipsa cum medendo simul sit mista. Ex accidenti tñ symptomata quoq; curandi ra-
tionem aliquñ mutant, causæ scilicet locum eo tēpore habentia. Eorum oīum, cum, veluti causæ, cu-
rationem immutant, vnum caput est: dico id vnum læsionem, siue ea ipsius virtutis sit, siue affe-
ctionis: qñ, si nihil ijs officiant, curationem non interpellant. Lædunt autē vires vigilie, dolor, &
immodica vacuatio. Affectui vero eadem non vtiq; semper, cæterum magna ex parte nocent, ac
potissimum cum fuerint immodica. Ob hæc igitur sola, curadi ratione, quam ab initio instituera-
mus, ad præsens mutata, symptoma submouere primum cogimur. Ergo, si resoluatur vires, non
tñ vehementer sunt iam resolute, sed adhuc resistunt, ad symptoma tantū sumus attentī, atq; id q̄
primum submouere maturamus: sin iam resolutæ vehementer vires sunt, non modo symptoma
sedare, sed etiam illas firmare, properamus. Quod si vno remedio tum symptoma leniri, tum mor-
bus curari queat, id vtiq; non fuerit symptoma respicere, aut symptomatis causa remedia sumere:
sed oīs eiusmodi auxiliorum species planè morbi curatio est. Neq; enim, cum lateris dolorem in
pleuritide, misso sanguine, vel corpore purgato, sanamus: nec, cum abscessum distentum & cum
dolore pulsantem diuidimus, ac pus emittimus: eiusmodi curatio symptomatis est, sed cum, exē-
pli gratia, in dysentericorum deiectionibus, vbi vehementer rodunt, vel tragi succum, vel hirci- HA. f. 16. r.
num seuum, vel rosaceum ceratum, per inferius indimus: quibus vtiq; prædictis ipsa exulceratio C. L. 16. r.
intestinorum non sanatur, maxime si putredinosum aliquid habeant: sed vires interim conquie-
scunt: atq; id est contra symptoma instare, morbo ad id tempus neglecto. Quippe, vbi viriū ro-
boris fiducia est, adeo nūquam contra symptoma pugnamus, vt contra prorsus per ea non nunq̄
præsidia, quæ dolorem afferunt, morbos ipsos curemus: veluti profectō dysentericæ ipsi morden-
tibus maxime medicamentis tum potissimum medemur, cum vtiq; est grauissima. Quippe me-
dicus quidam quinquagenarius, cum iam septimam noctem ægrotaret, nec viribus admodum
valentibus esset, dolore illi capitis vehemēti in dextro potissimum tempore oborto, non expe-
ctans, dum amicorum quispiam ad se veniret, sibi ipsi nocte venam incidit. Itaq; dolor illi protin-
us conquieuit, ceterum longo tempore tum decolor, tum viribus imbecillis, tum exilis mansit:
ali q̄ corpus eius defijt (Atrophian Græci vocant) sic, vt vix pristinum habitum receperit. Est
porro hic quoq; duplex medicorum contra dolorē instātium ratio, altera, qua delicijs cubātium
subscribunt: altera ex artis ratione. Quippe, si licet ægrum doloribus obnitētem valētibus reme-
dijs vno die perfanari, qui tota neglecta curatione dolori tñ est intentus, non id ex artis ratione,
sed in egrotantis gratiam facit. At, si ex dolore vires resoluuntur, atq; ex eo periculum impendet,
& mitigari

A & mitigari dolor, & roborari vires debebunt: quò & morbo resistere, & curationis spatio suffice-
re valeant. Equidem noui quosdam tum medicos, tum egros, qui, dum animoli videri volebant,
ob id ipsum perierunt, q̄ fortiter ac viriliter contra dolorem semper sunt renixi, nec, quod eum le-
niret, quicq̄ ceperunt, sed in asperis & (vt ipsi interpretabantur, affectum destruentibus auxilijs
perseuerarunt. Quos sanè spatio longiore curatos esse satius fuisse, q̄ breui viriliter mori. Quidā
aut (vt sibi est vitus) generose dysentericos vehementissimo medicamento curans, multos vno
sanauit die, quosdam vero iugulauit. Erat nanq̄ eius medicandi ratio eiusmodi. Cepas id genus,
quod Græci Carton vocāt, vno die comedendas cum pane dabat, tum potum parum: postridie
mane muriam acerrimam per inferiora infundebat: secūdum hanc etiam pharmacum validum.
His igitur tolerandis quicunq̄ sufficere potuerunt, prorsus sunt sanati: aliqui vero conuulsione,
† aut aīg ex dolore defectu vñā cū madore cutis oborto, interiire. Est igitur terminus in ægro-
tantibus, quem non tranlibit is, q̄ ex arte generose contra morbum pugnat, vt tuto medicetur: ei
vero, qui dolorem mitigat, vt vires custodiat. Vbi ultra pergitur, crudelis hoīs officiū facit, qui vñā
cum morbo vitā quoq̄ homini aufert: qui vero cubātis delicijs subscribit, eius q̄ voluptatē non
sanitatem pro meta gerendorum habet, adulatoris. Cōmittunt medici eiusmodi excelsus cum in
B alijs quoq̄ remedium generibus non paucis, tum vel maxime in ijs vocatis anodynīs: quæ ex
papaueris succo, vel alterci semine, vel mandragoræ radice, vel ityrace, vel tali quopiam fiunt. Nā,
& qui egris gratificatur, in eorū medicamentorū vsu modum excedunt: & qui intempestiue im-
modice q̄ sunt animoli, dum prorsus horū vsu refugiunt, doloribus egros iugulāt. Ergo, velu-
ti in omni totius vitæ tum habitudine tū actione, ita hic quoq̄ consiliū illud sapiētis, qui. Nequid
nimis, dixit, cōplectemur, habentes pro fine, quò tendamus, cubātis vtilitatē. Quippe, si fas est ijs
remedijs, quæ morbū sanent, vtendo, quod optamus, efficere, abstinentium ab sopientibus medi-
camentis est, quæ vocant Anodyna. Sin ex vigilijs, & viribus resoluendis, ad mortis discrimen
æger tendat, tum profectō tēpestiue eiusmodi medicamentis vtare, scilicet non ignarus corporis
habitu non nihil ex his lædendum: lesionem tū, q̄ mortem, potius eligendā. Nam, si hæc admo-
dum magna nō sit, saltē postea spatio longiore eā sarcire licebit: sin ita est immodica, vt nec pro-
lixo spatio persanari queat, at certe hanc ipsam eligendā potius remur, q̄ vt homo pereat. Hac ni-
mirum persuasione ipse quoq̄, tamen oīum maxime ab vsu grauiter sopientū abhorrens, aliqn̄
tū ea & colicis exhibeo, & ijs, qui vel oculorū, vel auriū, vel aliarū partiū vehementissimo dolore
cruciantur. Interim vero, & cū eger ex tenui destillatione, vigilijs, & vehementi tussi vrget, pau-
C xillulum eiusmodi medicamenti offero, facile noxam eius, si quis semel est vsus, spatio emēdatum
irritatus. Porro dissident inter se ipsa medicamenta. Quippe quæ plurimū sopientū in se habent,
ea ad præsens quidem magis sunt efficacia, cæterum valentem, & remedijs rebellem in ægotātis
corpore frigiditatem relinquunt: quæ horum in se habent minus, calfacientium vero sibi admi-
storum plurimum, ea, quanto sunt ad præsens minus efficacia, tanto in futurū minus sunt noxia.
Omnia tū id genus magis sunt salubria, si post annum à compositione sumantur, veluti quod ad
Philonem referunt authorem: quod ad dolores sedandos sensum stupefaciendo nullo minus est
celebre. Sunt sanè & alia medicamenta non pauca ex seminibus confecta, græce Dia spermaton
& Trigona nominata, quæ, sicut ad torporem in præsens inducendū mitiora, ita in futurum sunt
tutiora: atq̄ hæc quoq̄ oīa vtilius annotina sumuntur. Philonis vero medicamen, ēt si duorum,
trium v̄e, aut quatuor annorum sit, multo sanè est melius, sed nec inutile tū sequentibus annis ad
decimum vsq̄. Quod enim ultra inueterauit, tanto quidē est minus noxium, quāto est vetustius:
cæterum languidis est uiribus, eo q̄ parum nauiter, cuius gratia paratum est, perficit. Ergo, sicuti
cauendus est, quoad fieri potest, eiusmodi medicamentorū usus, ita, si necessitas urget, nec admo-
dum noua sunt offerenda, q̄ frigida, quæ in his sunt, prævalentes vires adhuc habeāt, nec ita anti-
D qua, ut spem nostram frustrētur: sed, uti cōprehensum est, tandiu dimittēda sunt, quoad uolentia
refrigerantium, ab eorum, quæ calefaciunt, ui mitigetur. Et talium quidē medicamentorum usus,
eorum, qui aduersus symptoma pugnant, est proprius, potissimum ubi ex frigida causa dolor est
excitatus: obsunt enim talia plurimum toti affectui, ac curationi contumacem eum reddunt.

*Inter Remedia Quædam vnā cum affectu, cui adhibentur, Quædam seorsum Sym-
ptomata curare.*

CAP. 2.

AT sanguinis missio, quæ scilicet vires non deijcit, symptoma spectantis medici, opus non
est, sed eius, qui totum affectum adimere studet. Ad eūdem modum & balneum, & purga-
tio, & fomēta calida, & uini potio. Quorum omnium Hippocrates in aphorismis ubi de oculis
dolentibus loquitur, his uerbis meminit: Oculorum dolores meri potio, lauatio, fomentum cali-
dum, uenę sectio, uel purgatio soluit. Hæc nāq̄ oīa, dum affectus sanant, unā etiam cum ipsis do-
lores sedant. Eodem modo nutritum, (ut in superioribus est dictum) ubi in sicco & squallen-
te corpore, stomacho laborante exhibetur, dum affectum ipsum sanat, etiam syncope prehendi
prohibet. At non ea, quæ ex redundantia frigidorum humorum incidit, siue exolutio, siue stoma-
chi syncope est, alimētum ceu medicamen desiderat: quanquam etiam in eiusmodi affectibus nō
solum nutrimentum, sed etiam uini aliquid, non raro ægotanti dare cogimur, non utiq̄ quò affe-

Septima Classis.

kkkkkkk iij

ctum

† Aut Græco-
pa ex dolore.
* exau.

6. Apr 31. E. 11.
ord. 49.

* Al. reseruet
i. morbo.

METHODI MEDENDI

Et cum curemus, sed quod periculum in praesens depellamus. Quippe vacuatio potius, quam adiectio, est hoc genere laborantium curatio: licet quod quotidie videre sic egrotantium plurimos, medico- rum ignorantia perditos. De quibus agere nunc mihi tempus videtur.

De Curandis iis, qui ex summa Crudorum succorum copia Febricitantes, Syncope facillime corripuntur.

CAP. 3.

† ὁ δὲ αὐτὸς ἐ-
περ, i. aquosius.

* ἀμύνησθαι.

* Libro supe-
riore vertit ἱσ-
des.

* ἐκ διαδοχῆς

* ἀθλιπτός.

† Syncope exte-
plo deprehendi.
Inter syncopē
aūt & lepoply-
chian dīa est,
vt inferius pa-
tebit ca. 5.

ERgo febricitare incipiunt non nulli, ubi maximam crudorum succorum copiam vna cum oris ventriculi (quod sanè stomachum vocant,) offensione, vel ex cruditatibus, vel alia qua-
piam occasione congesserunt. His & praecordia inflata, & totum corpus ampliore mole, quam pro naturae modo, cernitur: tum color alius quidem ad albidius, quam pro naturali habitu, & inter cute aqua laborantium magis simile est mutatus: non nullis etiam ad nigrius, aut liuidius, quos qui-
dem medici plumbei coloris appellant. Omnibus pulsus minores sunt, quam pro caloris ratione: pre-
terea obsecuri omnino quod inaequales: sepe ea inaequalitate, quam Systematicen Graeci vocant: sem-
per vero ea, quae in vno est ictu. Nulli talium sanguis mitti sine maximo dispendio solet, cum ta-
men vacuationem desiderant: verum nec sanguinis missionem, nec purgationem sustinent, utpote
quos sine his syncope subito adortur. Quae nam igitur est ratio talibus medendi, qui, cum vacuari
postulent, vacuantia praesidia non ferunt? Sanè nullam aliam his idoneam vacuationem inueni, praeter
eam, quae ex frictione paratur. Incipere vero in principio statim morbi oportet, ac primū
a cruribus, superne deorsum, id quod linteis non admodum mollibus, sed aspredinis medioere quid
habentibus: debet enim radi ab his cutis, cum simul & calefieri per eam & digerī aegrotus postu-
let. Dehinc tota brachia, ab humeris usque, superne deorsum simili modo sunt fricanda. Vbi vero
artus omnes abunde calere videbuntur: & metus fuerit, ne quis ex multitudine frictionis contusa
iam carne, lassitudinis sensus ipsis superueniat: oleo relaxare uteris, quod genus est Sabinum: ab
adstringente vero abstinebis, cuiusmodi Hispanum est, Histricum quod, & quod vna cum germinibus
vel ex oliua adhuc immatura conficitur. Hyems vero si fuerit, nihilo deterius sit, si ad digerendum
aliquid transieris, cuiusmodi Sicyonium est, aut quod cum chamamelō componitur, {aut} quod
apud Aegyptios est in pretio. Quod si horum copia non sit, oportebit accepto relaxantium oleo-
rum aliquo, & in quo nulla sit adstringitio, potissimum quod quod est antiquius, immittere ipsi anethi,
quod valebitur satis. Mox, (ut ipsi solemus) ubi in vase duplici tantisper calfeceris, dum medio-
criter qualitatem herbae imbibit, ungere hoc artus, & fricare tunc quoque plurimum debebis:
postea oleum, quā tedium asserat, detergere: atque ad spinā dorsī transire, hanc quoque totam pariter frica-
re, primum sicca frictione, post oleo. Ab hac rursum ad crura te conferes, & ab his ad brachia, exin
denuo ad spinam, ita totum agens diem in domo purae lucis, nec madente: esto eius domus & ca-
lor media temperie. Sanè mulla, in qua coctum hyssopum fuit, his est aptissima. Seruandum quoque, ne
vel cibum, vel sorbitionem, vel aquam exhibeas, vel oīno liberaliter bibere sinas, nisi mulla tribus
primis diebus duntaxat uti, ipse, quas dixi, partes ordine fricas, eo quod solum tempore intermittēs,
quo somnus hominem occupauerit: ad quem etiam alliciendum, & frictio vberior facit: itaque vel
hoc nomine utile praesidium fuerit, nedum quod vacuet. At vero nec vberior somnus his est saluta-
ris, cum nec crudos succos digerī sinat, & viscera grauiora reddat: sed, si quis alius affectus est, qui
somnia & vigilias modicas desideret, hic profectō in his est. Quippe somnus concoquit, vigi-
liae digerunt: quorum utroque est opus iis, qui ex multitudine crudorum succorum aegrotant. Er-
go inuicem mediocriter adhibiti, iuuare se mutuo vtiliter poterunt. Atque, si pulsus his paruus ad-
modum infirmus quod sit, aut etiam supra hac vehementer inaequalis, scire licet extremum pericu-
lum esse: facienda tamen nobis, quae retuli sunt, nec aliud quicquam moliedum. Si pulsus robore medio-
cri sit ac magnitudine, praeterea minime intercisus, & aequalis, considera, quae ad aluum spectant:
ac, si sua sponte commode non deiciat, audacter per inferius aliquid infundes. Accidit namque post
aquam mullam, ut, quae in primis venis, quae scilicet circa iecur & mesenterium sunt, colligi superuacua
solent, hac commode deiciantur. Quod si maior iusto superfluum impetus ad aluum citetur,
principio quidem percoquere mullam amplius oportebit: ea namque, sicut minus aluum subducit,
ita magis nutrit: Contra cruda ut minus nutrit, sic magis subducit. Post haec, si superuacua largius
descendant, ne sic quidem sistenda, sed exhibendus pro aqua mulla ptisanæ cremor est. Si uero
fluere pergant, alique sorbitione nutries, pulsuum interim ratione obseruata: aliquando enim su-
bito ad imbecillitatem, uel inaequalitatem, uel paruitatem mutantur. Quo tempore panem ex ui-
no diluto exhibere conueniet, utique, si nec uenter, nec iecur, phlegmone laboret: quā, si hac in-
festentur iam corpore crudis succis referto, planè desperata salus egro est, pulsibus sic mutatis. Er-
go in eiusmodi egri casu te ipsum a culpa immunem praestabis, si morituum praedixeris, ac nullo
generosiore medicamento usus fueris. Quibus uero spes est salutis (est autem omnibus, qui ita ci-
tra phlegmonem aegrotant) maximum medico, qui utique ipsos in principio suscepit, uidetur mi-
hi dedecus esse, si in syncopen inciderint: quanquam per inscitiam medicorum quotidie id heri cerni-
tur. Verum non est, quod hos spectemus, aut cum his nosmet conferamus, sed cum eo, qui, cum re uera
peritus in arte sit, scedum putet egrum tantum extemplo linqui, & ipso nec symptoma predican-
te, nec ad id preparato, aut idem prohibente. Sanè dictum a me etiam in superioribus est, qui cata-
plasmatis

A. lib. 3. f. 11.
c. 8. fol. 11.

A. lib. 3. f. 11.
c. 8. fol. 11.

A. lib. 3. f. 11.
c. 8. fol. 11.

A. lib. 3. f. 11.
c. 8. fol. 11.

A plasmatis & perfusionibus assidue præcordia vexant, ipsos in eiusmodi affectibus phlegmonas accerere. Minime igitur est his utendū prius, q̃ superuacua magna ex parte partim vacua sunt, partim concocta: tum vero etiam his vtaris, licet, non tñ duntaxat relaxans, sed ex ablinthio mediocriter perfundens: si tñ febris non planè sit magna. Si vero medicanti tibi tres primos dies, vt dictum est, nihil occurrat incommodum, ipsædem ipsi vteris vsq; ad septimum, aqua dñtaxat mullsa, in qua incoctum hyssopum sit, cōtentus: siquidem longissimam, qui ita sunt affectu cibi abstinētiā ferunt, corpore scilicet ex crudis ipsis, quos continet, succis concoquendis alto. Quod si non modo crudi succi sint, sed etiam eò corruptionis peruenerint, vt concoqui ad perfectionem non queant, qui sic agrotant, eorum desperata est salus. Sed qui, si nullus præsertim committatur error, seruari possunt, n̄ aqua solum mullsa ad septimū vsq; sunt nutriendi: aut, si ubi id res exigat, vel aluo fluente, vel agro mullsam fastidiente, ad ptisanæ cremorem est transeundum. Sin hinc quoq; auerſetur, alica ad eūdem, quo ptisana, modum ei præparabitur: neq; enim ijs, qui ita sunt affecti, acetum incoctum est: immo, si ubi crudos assiatum succos esse animaduertis, oxymeli pro mullsa exhibere assidue debes. Quod si huius assidui vsus tædio esse cœperit, transire in uicem ad mullsam & ptisanā conueniet: dein rursus ad oxymeli reuerſi. Maxime vero, quibus tum

B paruus, tñ tardus ac rarus pulsus est, ijs frigidus subesse succos putandū. Iisdem protinus & color vitiatu in toto corpore manifeste cernitur: qualis nimirum prius est traditus. Sed heri fortasse, quod dictum est, non posse cuiuspiam videatur, cum nulli febricitantium aut tardior, aut rarior pulsus fiat. Cæterum duplici ratione verum esse, quod dictum est, comperietur: vna, q̃ euidenter in accessionibus appareat & tardiores & rariores, q̃ pro naturali ipsorum habitu, pulius fieri: altera, q̃ & reliquis præter accessionem temporibus, horum arteriæ tum rarius, tum tardius, q̃ aliorū quorumuis qualitercūq; febricitantium, pulsant. Ergo, si æstas sit, & æger frigide potioni assuetus, frigidum huic oxymeli dabis: sin hyems sit, oibus calidum; tum ijs qui calide, tum ijs qui frigide insueuerunt, offeres: æque vt, si immodicus æstatis tempore æstus sit, eū ijs, qui calidæ assueti sunt, frigidum, utiq; si nullum sit ijs viscus ad iniuriam opportunum. Sane propolis aduersissima sunt tum balneum, tum aer ambiens, quoties vel nimium calidus est, vel frigidus. Itaq; vt lauandi hi non sunt, sic & reclinandi in domo sunt, æstate quidem, quæ frigeat: hyeme, quæ caleat. Læduntur nanq; non parum ab utroq; excessu, videlicet in balneo, æstate, & omni caloris incremento, crudis humoribus liquatis, ac per omnes corporis partes fluentibus ita, vt metuendū sit, ne ad pulmones & cor ferantur: aliquando etiam ne ad cerebrum subeant: cum longe præſtet, vt

C circa iecur & primas venas adhuc ipsis subsistant. In domo vero immodice frigida, & hyeme, & deniq; ambiente frigidus, succi, qui crudi sunt, & inepti ad concoquendum manent: & iecinoris obstructions, si leues sunt, augent: si nullæ sunt, eas crassitudine sua hærentes impacti q̃ creant. Atq; hæc quidem agenda sunt, vbi à primo die ipse curationem susceperis. Si autem ad eos, quos syncope iam premit, sis accitus, si ea, quæ retuli, loca phlegmone vacent, panē exhibebis non multum, hunc q̃ ex vino aliquo, quod celerē in corpus digestionem adiuuet: statim q̃ ad frictions venies: quas etiam pro tradito iam modo administrabis. Ac, si quidē æstas sit, & regio naturaliter calens & æstuans, aut status cœli vehementer calidus, cum frigida vinum dabis: si nihil eiusmodi sit, cum calida. Quæ tamen secundo & tertio dabitur potio, omnino calidā exhibendam curabis. Quippe ad vniuersam eam curationem, cuius gratia frictions adhibuimus, calidum præſtat, vt pote crudorum succorum concoctionem adiuuans.

De curanda Syncope, quæ oritur ex Flaua bili: ac de natura Vinorum, quæ curandis

Syncopis conueniunt.

CAP. 4.

AT, quibus ex flaua bili, quæ os ventriculi infestet, syncope incidit, ijs frigida exhibenda potio est. Vinum tamen, quod & calidum natura sit, & deductionem in corpus promoueat, omnibus, quos syncope male habet, offerre conueniet: distribui nanq; per corpus nutrimentum, quod sumptum est, non in ventre manere volumus. Constat autem ex vinis ea deligenda esse, quæ & flauo sint colore, & substantia tenui, & ætate vetera: talia nimirum & boni odoris continuo fuerint. Quin etiam ipse, si paululum, ubi mista sint, gustes, senties calorem per totum corpus transmitti. Cæterum amara præ vetustate uina ne sunt, præsertim quæ ijs exhibebis, quorum stomachus flaua bili urgetur. Talia nanq; simul laudabilem ac nutrientem uini succum iam amiserunt: simul, iniucunda cum sint, hoc ipso stomachum offendunt. Cōmodissima igitur his uina sunt, quæ, cum naturaliter austera sint, sensilem iam adstringendi uim propter uetustatem non amplius exhibent, calorem tamen admodum euidentem habent. Omnia enim, quæ requirimus, in ijs, quorum stomachus amara bili uexatur, efficiunt, cum & iucunde sumantur: & tum ad concoctionem, tum ad digestionem in corpus, etiam faciunt: & succi uitium mitigent: & corporis habitum exalfaciant: & stomachum ipsum firmet. Huiusce generis uinorum optima sunt Surrentinum, Signinum, Sabinum, Tiburtinum, Marsum, omnia quidem Italica, & adstringentia, non tamen pari modo omnia. Nam Surrentinum, cum mediocriter adstringat, tum calidius cæteris, tum iucundius est. Ab hoc nobile Tiburtinum: est enim & aliud quoddam imbecillum Tiburtinum, quod etiam, sicut Sabinum, leuiter potest adstringere. Signinum uero austerius est: sicut

Septima Classis.

kkkkkkk inj

etiam

METHODI MEDENDI

etiam Signino multo magis Marsum. Hæc omnia vina stomacho, qui amara vexatur bilī, salu- **E**
bria sunt. Ideo q̄ illis v̄dum, quoties is vel ex ardentī febris offensus syncopen attulerit, vel aliās
multa in eum bilis fluxerit, vel multam imbiberit. Quibus tamen ex crudis humoribus syncopes
periculum imminet, sanē Falernum tanto iam memoratis præstat, quanto tum melioris est succi,
tum etiā calidius: vtpote quod & velocius illis per corpus digeretur, & crudis succis cōcoquen-
dis auxilio erit. Quæ cum dictorum singula, aliud magis, aliud minus, faciant omnia, tamē Faler-
na magis stomachum roborant. At, quoniam ipsorum Falernorum aliud dulce admodum est,
quod Faustianum vocāt: aliud, si cum hoc conferas, austerum: si cum Signino & Marso, dulce:
deligendum ad talia secundum est. Si vero cubans per sanitatem dulcibus vinis infucuit, huic ni-
hil prohibet dulcius Falernum exhibere. Verum in Asia, & Græcia, & nationibus, quæ his sunt
vicinæ, ubi copia iam dictorum vinorum aliquando non est, ex ijs, quæ illæ regiones suppeditāt,
aptissima ad digestionem in corpus sunt Ariulium & Lesbium: hoc quidem, veluti ex ipso no-
mine patet, in Lesbo natum: Ariulium locis quibusdam in Chio prouenit. Cum vero tria sint in
Lesbo oppida, minus certe tum odorum uan dulce in Mitylene gignitur: magis & odoratū &
dulce in Ereiso, dein in Methymna. Porro sumenda ex his, † quæ aparachyta sunt, ita enim nomi-
nant ea, ‡ quibus marina aqua admixta non est, ratis maximum futurum incōmodum ex ijs, qui- **F**
bus est admixta. Alioqui nec assolena in Lesbo nobilibus vinis, de quibus nunc agitur, marinam
aquam immittere: veluti nec Ariulio in Chio. Prouenit & in Hellepontī Mylia vinum Surren-
tino non absimile: Mylinū per eminentiam vocant. Hæc omnia vina flaua † & odora sunt, &
consistentia, quæ inter aquosa crassa q̄ sit media. Aquose porro consistentiæ sunt Adrianum, &
Sabinum, & Albanum, & Gaurianum, & Thuscum, & Neapolitanum Aminum, quod scilicet
in locis Neapoli vicinis gignitur, vnde etiā ita id nominant: in Asia vero & Tibecinum, & Ti-
tacazenum, & tertium ab ijs Arsyinum. Contra vero crassa sunt, veluti Sireon, id est sapa, quod
apud nos hepsēma nominant, & Scybellites, & Theræum, & Albates: in Asia vero Argates, &
Perperinum. Ergo, quibus ex abundantia crudorum humorum syncope incidit, ijs crassa vina ceu
noxia, aquosa ceu parum efficacia, sunt fugienda: deligenda vero eorum sunt media, quæ q̄, vt
prædictum est, flaua sint & calida. Neq̄ enim inuenias ex albo vinorū genere calidum vllum: q̄
etiā auitera, & mediocriter alba, cum inueterauerint, fuluīora quodammodo reddantur: quod
si aliter nominare fuluum colorem velis, licet, voces igneum pallens. Quotquot autē in ipsis cali-
dissima sunt, omnia certe flaua sunt: cuiusmodi in Italia est Cæcubum. Quod ē vnum quoddam
genus eiusmodi vinorum ab initio, sicut aliqui putant, nō est, verum ex vetustate eō peruenit, vt **G**
igneum colorem contrahat, vnde ipsi quoq̄ nomen est sortitum: non tñ eō omnia perueniunt,
cum prius crassentur, q̄ in perlucido flauore accipiant. Reliquorū vini generum, austerorū, quæ
mediocriter alba crassa q̄ sunt, certe nullum ad digestionē in corpus est idoneum: si tamen abun-
de inueterauerint, nec aliorum copia sit, vt illis licebit: sunt vero eiusmodi omnia, cum inuetera-
uerint, stomacho vtilia. Quod vero habeas horum quoq̄ exemplū, tum eius, quod ex Nicomedia
affertur, memineris, velim, quod omnibus hominibus est notum: tū Siculi Aminæ, quod in ma-
gnis reponitur fœtibus: quod enim in paruis seruatur lagunculis, maxime huic est contrarium,
cum & malum stomacho sit, & capitis dolorem excitet. Ac semper quidem est id agendū, vt opti-
mum eligas: si id non est, quod illi pro iam comprehēsis notis est q̄ simillimum. Aptissima nan-
que ad deductionem in corpus sunt Ariulium, & Lesbium: sed, si ea desint, simus q̄ in Asia, aut
Aphrodisiense petemus, aut austerum Tmoliten, aut aliquod his similiū, quod & colo re sit ful-
uum, & ilico, cum bibitur, manifeste excalfaciat. Considerandū vero ante omnia est, qualis nam
egrotantis natura sit. Nam, si imbecillum illi caput est, & quod facile calidis vinis impleatur, quæ
minus calida sint, potius sunt offerēda: sin firmo admodum capite est, & talibus vinis delectatur,
aut etiā citra noxam ea ferre est solitus, haud timide his vtetur. Porro vina, quæ odora fulua q̄ **H**
sunt, quantum ex ipsorum est natura, omnia caput grauunt: eo q̄ tum Falernum, tum Tmolites,
tum Lesbium, infirmo capiti noxia sunt. Qualis autem in Falernis tradita nobis differentia est, ta-
lis profectō et in Tmolitis habetur: alterum enim admodum est dulce: alterum austerum, si cum
illo conferatur: calida tamen admodum ambo sunt, eo q̄ caput grauantia. Austera vina ventricu-
lum roborant, caput q̄ inter oīa vina minime tentant: cæterum digestionem in corpus non pro-
mouent: quo magis fugienda tibi in syncope prehensis sunt non secus, q̄ aqua. Habile vero ad fa-
cilem in corpus deductionē, & Hippodamātium, cum inueterauit, est, ipsum quoq̄ ex ea specie,
cuius tum dulce Falernū est, tum vero Tmolites: inest huic & adstrictio manifesta, quæ tñ in neu-
tro illorum est, itaq̄ etiā salubrius stomacho est. In penuria vero vini, quod accōmodum vtriq̄
syncopæ sit, ei inquā, quæ ex multitudine crudi succi oritur, & ei, quæ ex bili incidit, coactus pror-
sus vino vtī, fugere (vt prædiximus) oportebit oīa tum austera, tū noua, item q̄ crassa: deligere ue-
ro aquosa, magis q̄ si sint antiqua: talia nanq̄, tametsi non ualenter excalfaciunt, tamen facile in
omne corpus deducuntur. Proinde, cum celeritas digestionis in corpus sit his cum fuluis commu-
nis, differentia rursus in his erit, q̄ concoctioni, quæ uel in uētriculo, uel uenis agitur, fulua magis
conducunt propterea, q̄ magis excalfaciunt: præterea mistibiliā sunt & nutrientia, eo q̄ ad suc-
ci bonitatē

† Hæcerant in
cod. græcis.

* Al. Mylium.

† Calida.

* ἀπὸ καπνῶν
ἢ ἄλλῃ. ἔνι
ἡ. ἀπὸ καπνῶν.

Aei bonitatem opportuna vtilia ue. Quorū omnium nihil in aquosis vinis est, minimum enim ex horum substantia in sanguinis mutatur speciē. Sed, cum fulua caput feriant, quæ aquoliora sunt, nusq̃ id contristant: vrinas aut̃ præter cætera vina mouēt. A quibus fm̃ locum obtinēt, quæcūq̃ fuluorum maxime sunt tenuia: quæ ēt ad syncopas potissimum sunt deligēda. Tardius his deducuntur in corpus, quæ fulua sunt, & crassa: quanq̃ ea quoq̃ austeris omnibus magis sunt penetra bilia. At vero nutriūt hæc magis, q̃ tenuia, ac vitiosos succos omnium vinorum celerrime, bono sanguine generando, corrigunt. Ergo institutum sermonem denuo repetamus.

De Affectionibus tum in Spiritu, tum in Partibus corporis, quibus Vires læduntur,

& syncope exoritur, remouendis.

CAP. 5.

Quod syncope præceptis virium lapsus sit, id ab aliis ante me dictum est. Sed, cum essentia vi rium, quibus regitur corpus, tum in spiritu, tum in solidorum corporū temperamento con sistat, hæc nobis, & vbi integra sunt, seruari: & vbi corrumpuntur, ad integrum reuocari omnino debent. Ac, quemadmodum tueri ea per sanitatem conueniat, in opere de tuenda sani tate est præceptum. Quemadmodum vero & in morbis, traditum iam aliquatenus & in præce dentibus cōmentariis est †. Non tamē adhuc res tota ad talem, qualem exigit, cōtemplationem

Best perducta: nec talem methodum habuit, qualem priora. Quod igitur deest, id nūc adiciamus.

Spiritus substantia vnā cum solidis corporibus sic nobis custodiēda in morbis sunt, vt tum qua litate, tum quātitate, quoad fieri licet, naturaliter se habeant. Ac, si quidem sic prospici his posset, vt nec substantiæ eorum quicq̃ aut vacuaretur, aut prorsus immutaretur, id esset optimum: sed, quoniam in cōmentariis de sanitate tuenda ostendimus fieri non posse, vt id generabili corpori vnquam contingat, id agendum est, vt, quæ substantiæ portio defluit, hanc apponendo sarciamus: quod alterascit, in debitam temperiem per cōtrariam alterationem vindicemus. Si igitur tum va cuatio, tum alteratio sensim paulatim q̃ fiant, etiam correctio vtriusque sensim administrabitur: quod munus ad artē sanitatis tuendæ spectare est monstratum. Sin confertim & semel ac magna aliquando vacuatio, vel etiam adiectio incidat, & morbus ita efficiatur, & medendi methodū ad eorum sanationem requiremus. Veluti enim mutationem in non naturalem habitum, quæ sen sim paulatim q̃ irrepit, corrigere, sanitatis tuendæ artis sunt partes, ita eam, quæ multa simul irruit, sarcire, ad medendi peritiā spectat. Ergo animalis spiritus cerebrum veluti fontem esse, clare ostendimus: qui partim ex inspirando, partim ex eo, quod reticularis plexus suppeditat, irrigatur atq̃ alitur. Vitalis spiritus non æque euidentis demonstratio erat: sed tamen in corde cum & arte riis cōtineri existimare, alienum a ratione non est: eundem q̃ nutritum maxime quidem ex respi ratione, sed tamen & ex sanguine. Quod si naturalis quoque aliquis spiritus est, vtrique is quoque in iecinore & venis continebitur. Sanē dictum fusissime de virium essentia est in libris, quos de Hippocratis & Platonis placitis scripsimus. Solidorum vero corporum substantia certa esse quan titate proculdubio desiderat: eo q̃ nutritiōna mortale genus tueretur. Sed nihilo secius & elemen ta, ex quibus componitur, mediocri esse temperie requirit: dictum que subinde est, quemadmo dum temperies ea sit tuenda. Cæterum, virium lapsus, de quo nunc agere institui, qui quidem solidorum corporum substantiæ digerendæ succedit, in longissimis morbis subinde incidit, ani mante ex frequenti atrophia, id est nutriendi defectu, extenuato: † præterea in iis febris acutis, ‡ quæ corpus liquant: Qui vero ex substantiæ temperie mutata, prouenit, cum vel immodice ipsa fuerint calefacta, vel frigefacta, vel madefacta, vel siccata, aut horum aliquibus copulatis affe cta. Alteratio vero in spiritu, tum ex vitiosis prouenit succis: tum ex ambientis aeris malitia, qui aliās alia de causa in hanc est mutatus: præterea venenatis facultatibus, aut animalium, quæ virus eiectant, venenis. Verum hæc a præsentī instituto seponātur. Iplius vero essentia spiritus corru ptio, & quæ futura timetur, & quæ iam adest, quæ tum ex affectu animi incidit, tum ingenti dolo

Dre, tum pluribus motibus, cuius generis & vigiliæ sunt, tum ex immodica eius tenuitate, & conti nentium cum corporum raritudine, tum vero ante hæc omnia ex ipso respiratu prohibito, & nu trimēti defectu, diligētius corrigi profectō postulat. Sunt porro affectus animi, timor subitus & vehemens, quem Ecplexin Græci vocant: præterea, quæ contraria huic timori est, voluptas ma xima, Græci Pericharean vocāt, quasi excessum gaudii dixeris. Scimus enim amborum occasio ne periisse quosdam. Iam reliqui quoq̃ magni timores omnes, & cū his maxime voluptates, etsi non iugulant, at certe facile resolubilem infirmum q̃ spiritū reddunt. Tristitia vero, & anxietates, & ira, & cura, eo genere sunt noxiæ, quo frequentes vigiliæ, quoniam vires resoluunt. Ac in iis quidem omnibus ipsa per se ipsam mouetur anima, in corporalibus autem actionibus ipsa cor pus mouet: resoluatur autem eius robur vtroque motuum suorum genere, si modum excedant. De laboribus vero quid attinet dicere, quo pacto & vehementius aucti quosdam iugularint, & omnes certe læserint, tametsi nō sustulerunt? In omnibus eiusmodi calibus manifeste videntur ægotantes, tum animo linqui, tum viribus resolui: non nulli vero (vt dictum est) etiam mori, sci licet aliās spiritu ipso deperdito, aliās alterato, aliquando ex parte digesto, non raro hæc vtraque perperlo. Tractatum autem fusius de his est cum in aliis libris, tum vero in iis, quos de Hippo cratis & Platonis dogmatis prodidimus. Ad rem vero propositam, modum, quo singula læde re sunt

† Adduntur quide hoc in lo co et in græcis cod. & in tra latione ueteri, dicitur uero et in præsent. ea tamē uerba Li nacer videtur consilio omi ssi.

* cū uero dicitur

† præterea in acutis, per fe bres colligati uas.

* practici, ē in plerisque cod. græcis, πυρι τας, i. dīalib* est in aliquib*.

METHODI MEDENDI

re sunt nata, disquirere necesse non est, immo, q̄ ledunt, ab ipsa euidētia accipere, ac eo ad vires E
tuendas in morbis salubriter vti. Pari modo, & si spirituum, qui nostrū corpus regunt, substantia
aliq̄n plus iusto extenuata fuerit, vtroq; profectō modo imbecilla fuerit, & tanq̄ temperie altera-
ta, & tanq̄ dissipabilis, vel exhalabilis, vel, quocunq; modo libet appellasse, reddita. Eādē nīmī-
rum ratione, & si totum corpus transmutatū in immodicam raritudinem sit, facile spirituum sub-
stantia digeretur: q̄ & ipsa tenuium partium sit, & corpus eā non contineat. Ergo nec rarefacien-
dum immodice agrotantis corpus est, si spiritū retineri in ipso studes: sed nec, quę in eo sunt, per
comesta & bibita valenter extenuanda. Iam vero, q̄ ipsorum quoq; ciborum ac potionum nō le-
uis habenda sit cura ad robur virium tuendum, vt videlicet tum quantitate modici, tum qualitate
exacti exquisiti q̄ sint, id neminem latere arbitror: Sicut illud profectō cuiq; perspicuum, q̄ etiā
substantiæ, quam inspiramus, habenda sit cura, vt scilicet tum optima temperie sit: tum ab omni
inquinamento purissima, nec aliquid ex metallis, aut caminis, aut barathris sibi admisceat: aut ali-
quid ex putredine leguminum, vel olerum, vel animalium, vel cuiuscunq; rei contrahat: aut halitus
ex stagnis, vel paludibus, vel fluuiis recipiat. His itaq; oibus p̄spiciat, oportet, qui vires illas tue-
ri volet. Ad hęc etiam ipsorum corporū solidorum, in quibus vtiq; vel maxime consistere virium
substantia videtur, non parua habenda prouidentia est, vt s. sano tēperamento sint: atq; hoc qui- F
dem omniū partium cōmune cōmodum est. Ad robur autem virtutis conseruandū, & ad synco-
palem accessionem, quō minus de repente incidat, cauendam, singulare præsidium est tempera-
menti custodia, ante oīa quidem trium principiorum: mox vero reliquarum partium, quęcunq;
in consortiū affectus, principia secum ex facili trahunt: cuiusmodi est ventriculi os, quod propter
exquilitum sensum tum alia symptomata non pauca, tū vero syncopas accerlit. Porro memora-
tus iam crudorū humorū affectus, si & copia sua hi vires premāt, & propter tū multitudinem tū
crassitudinem exiguos aīalis meatus obstruant, iam multis noībus exitialis est, ac syncope oppor-
tunos reddit: nempe & q̄ aīal sub eo non nutriatur: & suffocetur: & q̄ mediocritas tēperamenti
eius nō solum alterē, sed ē corrūpā. Quippe crudi succi nutrire prius, q̄ sint concocti, nequeūt:
īdem q̄, cū multi sunt, grauant: si vero spiramenta, quibus perspiratio agitur, obstruant, calorē
extingunt: quod si nec obstruant, nec onerent, syncopen ij certe nō inferunt, sed animi deliquia,
quas Leptopsychias Gręci vocant, siquidem resoluunt eiusmodi agrotantes, nisi frequētius nu-
triantur. Porro exhiberi his oportebit nō copiose semel, nec quę crassa frigida ue potestate nutri-
menta sint, sed, sicut dictum prius est, quę ex genere extenuantiū calfacientium q̄ sint. Ad eundē
modū & medicamenta, quęcunq; saltem medicamenta sumere febricitans homo pōt, extenuan- G
tia calefacientia q̄ sunt offerenda. His & aquosum vinum idoneum ab initio statim est, si tū vehe-
menter nō febricitent: quod haud sanē frequenter in hoc affectu fieri assolet: magis ē, si, qui labo-
rant, senes sint, p̄bendū iis post quāq; cibationē vinū est, magis q̄ ē, si interpolita quietis spatia
mediocritas sint. Sanē, qui ex eiusmodi succis laborant, hos quotidie accessiones exercēt, p̄cipue q̄
ad vesp̄eram, & noctū, non mane, nec vsq; ad meridiem. Atq; de his quidem hactenus abunde.

*De curanda Syncope in iis, qui tenuissimos succos, & qui facillime
exhalant, obriunt.*

CAP. 6.

* διαφορῶν
ἐσσι.

* ολεθρίως
ἐχει.

1. Prog. 3. 4.
191. c

AGe modo transeamus ad eos, qui contrario quidem huic laborant affectu, sed tamen synco-
pe similiter opprimuntur, nisi quis sedulo sit attentus. Hi sunt, qui prætenuēs succos habēt
sic, vt ocysime exhālent. Itaq; etiā diuersa à iam dictis ratione sunt curādī. Illos nanq; paulatim
& assidue vacuauimus propterea, q̄ multam simul vacationem ferre non poterāt: at, qui sic se
habent, hos paulatim & assidue nutriemus. Quod si à principio hos viribus adhuc valentibus, cu-
randos susceperimus, nec paulatim eos cibabimus: possunt nāq; ij, vel quod liberius semel datum
est, nutrimentum superare. Tanq̄ autem eos, qui ex crudi humoris multitudine syncope pericli-
tantur, prorsus p̄riclitari diximus, si vel iecur his vel ventriculum phlegmone obledit, īdem de H
quibus nunc agere instituimus, insanabiles sunt existimādi, si viribus iam languentibus aliquod
eorum viscus phlegmone infeltetur: quando nec assidue hos nutrire fas est, sed tantum in remis-
sionibus, nec seruare eos, si non nutriantur, licet. In eiusmodi affectibus mortifera illa species in fa-
cie celeriter apparet, || Nasus acutus, oculi caui, & reliqua, quę deinceps sunt adscripta. Nam, siue
multū excernant, siue vigilent, siue tristentur, siue non cito nutriantur, protinus eiusmodi faciem
habent. Porro, si alicuius horum, aut etiam plurium occasione tales esse videbuntur, minus esse
malum putabis, q̄ si absq; his essent emaciati: sin absq; his tales appareāt, perniciosum iudicabis:
atq; hoc amplius, si à principio morbi eam habeant speciem, neq; enī, dum concoquatur, suffi-
cient. Atq; ob id Hippocrates dixit, siquid eiusmodi cōsenferit, minus subesse periculi putandū.
In morbi nanq; principio (vt p̄dixi) etiam si cum aliquo dictorū in eo sint statu, haud quaquā
īd bonum est: ceterum minus id periculi minatur, quā si cum horū nullo, immo ex spiritu ipso
prompte digesto. Non solum autem extenuatis ad eum modum spiritu horum & sanguine, dige-
stio sape incidere assueuit, sed etiam expultrice vi per vniuersam corporis molem immoderatus
cōcitata. Id quod incidere maxime ex imbecillitate retentricis solet. Sanē nutrire, quicquid horū
inciderit, est necesse: sicut etiā corporis summa densare non secus, q̄ priorū rarefacere. Cum enim
maxime

A. li. 3. l. 1.
c. 1. fol. 4. d.

A. li. 3. l. 1.
c. 1. fol. 4. d.

”

A maxime ij affectus inter se dissideant, etiā præsidiōrum speciem diuersissimā requirunt. Ergo frigidum iis acrem adstringentē q̄ comparabimus: qui, quemadmodum fiat, prius est dictum. Vngendi præterea sunt adstrictioris vnguentis. Tum cibi iis dandi, qui non admodum prompte diffluant, nō aqua mulsa, nō puillanæ cremor, sed panis, & sorbitio ex alica: & fructus austeri, & qui nō facile corrumpant, tum ipsi per se, tum vero & cum pane: ēt alica, quæ in aqua sit cocta. Dabis vero^a aliquādo iis & oua, præcipue q̄ eorum vitellos, album enim eorum ægre concoquit: præterea gallinaccorum, qui lacte sint alti, testiculos: item q̄ suillum cerebrū, sed vel diligēter assum, (quando, si^b eruentum detur, summopere lēdit) vel in albo iure legitime elixum, porro & anetho iniectis. Deniq; omni ratione agendum, vt & succorū materiam crassiorem reddas, & cutim densas, & exhalationem inhibeas. Vinum vero iis aquosum necessarium^c inter initia est, sumptum post cibum. Quod si ex sententia nobis omnia responderint, etiam carni iis aliquid nutrimenti post alia dabimus, potissimum post quartum diem, succis, qui febrem excitauerūt, iam ad concoctionem venientibus. Tali affectu laborantis iuuenis, in decimo libro meminimus, quē (vt dixi) quotidie nutriui, id q̄ ante accessionē potissimum: tum, quemadmodum, semel dedita opera nō exhibito illi cibo, accessio cū syncope inuasit, memorauimus. Ergo in omnibus eiusmodi curationibus, si iam deprehensus syncope cubans est, omnis sollicitudo medentis ad symptoma vertitur: sin non dum ea premitur, vtriusq; curā habebit, & vt symptoma non incidat, & vt morbus paulatim discutiatur. Celerius autem hunc discuteremus, si nullus symptomatis subesset metus. Quippe, qui multitudine crudi succi grauatur, hunc, si modo iustā semel vacationē ferre posset, nec metus aliquis syncopes impēderet, semel, arbitror, vacuatum a morbo explicaremus: d⁺ cum vero, cuius spiritus & succi facile exhalant, si ante accessionem cibare non cogeremur, longiorē illi morbum certe non redderemus. Ac de iis quidem hæc mihi dixisse sit satis.

De reliquis Synopes Causis: ac primum de Affectibus, quibus Dolores succedunt.

CAP. 7.

Nunc reliquas occasiones, quibus syncope succedūt, deinceps referemus. Hæ sunt numero quatuor, dolor^a vehemens, vigiliæ, immodica vētris inanitio, ac in iis, qui aliena loquuntur, aliquando motus. Sed & quintam, si nō displicet, addas, nempe principiorum intemperiem: de qua in calce libri agemus, idcirco maxime, q̄ dupliciter puenit, vel quia in nudis qualitatibus particulæ alterant: vel quia vitiosus aliquis succus in has recipitur. Deinceps igitur de oibus, quæ memorauimus, est agendū, in iūo a doloribus sumpto. Ergo, si causam ipsam, vnde dolor excitatur, adimere possis, ita vtiq; contra symptoma non pugnaveris, sed ægritudinem curaueris: sed, si qua occasione prohibitu affectui submouendo intentum esse non licet, vehementiā doloris mitigabis. Verum, qm nec dolorū causas submouere, nec vehementiam eorum remittere, fas est, nisi intellexeris, cuius vitio is dolor in cubantis corpore excitetur, perpendendæ prius tū causæ dolorum sunt: tū vero signa, quibus hæc dignosci queant: nam, cū sensui plerūq; parū pateant, hoīem, qui in tali speculatione sit exercitatus, nimirū postulant. Itaq; cū nobis in aliis operibus non pauca de dolorū generatione sint præcepta, ipsorum q̄ omniū opportunū tempus iam venerit, necessum arbitror totā eorum rationē summam percurrere. Quoniam igitur in aialis corpore omnibus consentientibus sectis, non omnes partes sensiles sunt, manifestum est, quæ prorsus sunt insensiles, eas non dolituras. Igitur, cū sensilibus duntaxat dolor accidat, sequens est, vt estimemus, eiusmodi ne corpora perpetuo sint dolitura, an vno aliquo tempore, cū videlicet ortus in his crucians affectus sit. At, si ipsa euidētia nos docet multum esse temporis, quo nihil omnino doleamus, non obscurum est certo aliquo tempore, quo scilicet excitatur in singulis, quæ dolent, crucians affectus, necesse esse ea dolere. Ergo, si inuētum nobis fuerit, quæ nam affectio ea sit, quæ in sensilibus corporibus orta, facit, vt animal doleat, vtiq; & quod querimus, iā fuerit inuentū. Hic igitur ab iis naturalibus notionibus, quæ omnibus nobis sunt cōmunes, procedere methodo ad id, quod considerandum proponitur, conueniet. Porro naturalis notio nos docet vitium id corporis, ex quo sit doliturum, aut cōtinuitatis diuisionem oportere esse, aut alterationem aliquam. Ita etiam nō incommode dictum iis est, qui ex insectilibus, vel insensilibus, vel incompatilibus elementis corpus componunt, affectum, vnde dolor nascatur, prorsus inueniri non posse. Quippe, quæ tantummodo tangūt, eorum nihil videtur dolorificum: at talia corpora tantum se inuicem tangunt. Quod si non contingant modo, sed etiam se inuicem in concursu frangant, ad dolorem creandum nihilo plus conferunt, si quæ frangunt, insensilia statuuntur: nisi ēt lapides, cū diuiduntur, dolore affici dicemus. Verū de his latius tum alibi, tum in quinto de Asclepiadis placitis disseruimus. Nunc autē confessum hoc principium sumentes necesse esse, vt affectus, qui dolorem excitet, vel diuisio sit, vel alteratio, illud etiā memoria repetamus, ne alterationem quidem ipsam sensim irrepentē dolorem asserre animali posse: sed quæ dolore animal afficiet, eā mutationem tum confertim factam, tum vero violentā esse debere. Vident enim corpora non solū, cum in habitu contra naturam confertim aguntur, tristē mutationem sentire, sed etiā in ipso ad naturālē statū suum reditu, nisi eū paulatim accipiant, cruciari. Scimus enim, qui in vehemētī frigore iter secerunt, eos cum se se non sensim, sed semel calfacere properarēt, dolore circa vnguū radices adeo vehementi affectos, vt ferre non possent. Illud vero inquirere, an ipsum, quod vehementer

A in male. quid? cod. grecis manu, criptis hæc actio nē non inueni, est tamē in ali quibus, & in translatione vter.*

B ex alicui, i. cruciatum est in imptolis: ex alicui, qd suberit dū ab aliquib^o vertitur, est in manu scriptis quos viderim.*

C† si. cum

D† tū. d' ēv. d' iuz p'ntov.

In plurib^o cod. grecis antiquis hæc dictio, ventris, nō habet.

† d' opov ēvæ.

menter exalfacit, aut refrigerat, diuifionem aliquam continui efficiat, longiore fortaffe difputa- E
tione eger: et vtiq; hoc oftentum à nobis eft in commentariis de fimplicium medicamentorum
facultatibus. Verum quid agendo, quæ vehementer vel exalfaciant vel refrigerant, dolorem
inferant, quærere, ad rem propolitam minime eft neceffe: fiue enim vt fubftantiæ fenfibilium
continuitatem diuidentia, fiue vt eam femel & confertim alterantia, id ad eorum inuentionem,
quæ dolorem leuabūt, nihil refert, modo fciamus, quod violenter vel exalfacit vel refrigerat, id
fenfientia corpora dolore afficere. Ergo, fi ceppiffe ab euidentibus conueniet: euidenter autem vi
dentur, eorum, quæ corporibus noftris propinquant, hæc fola effe dolorifica, & quæ vehementer
vel exalfaciant vel refrigerent, & quæ fubftantiæ continuitatem diuidant, hæc autem funt, quæ
vel contundunt, vel incidunt, vel diftendunt: vtiq; curationis eorum inuentionem quæremus
via aliqua infiltentes, quæ à quærendorum natura fit accepta, quæ methodos appellatur. Rurfus
igitur fupra repetentes dicamus. Quoniam id quærimus, quemadmodum in morbis dolore af-
figamur, vbi nihil nobis extrinsecus trifte appropinquat, neceffum eft, aliquam talem caufam in
corpore quæramus, quæ fcilicet vehementer exalfaciens, vel refrigerans, vel diuidens fubftan-
tiam fenfibilis alicuius corporis, nos excruciet. Ac primū illud fpeculabimur, cuius nam effe natu-
ræ debeat, quod continuitatem diuidet. Neceffe igitur eft vel ruptionem, vel contufionem, vel F
erofionem, effe affectum eum, qui diuifionem continui faciat. At vero ruptio ex diftentione qua-
dam: contufio ex grauante: erofio ex mordente prouenit qualitate. Ergo, cum nihil extrinsecus
fit, quod vel diftendat, vel grauet, vel erodat, fed ex fe ipfo horum aliquod corpus fentiat, neminē
latere potest, diftentionem ab aliqua intrinsecus fubftantia, quæ multitudinem fua corpus fe conti-
nens diftendat, aut immodica ficcitate, prouenire: contufionem ex eo, quod aliquod corpus ab
externo supercecidit, quod vel durum, vel magnum, vel graue, vel fimul ambo fuit: erofionem
vero ex fucco aliquo, cui mordens natura infit. Igitur, vbi vehemens dolor vrget, fcrutandum no-
bis eft, an fuccus plurimus, an fpiritus cui non fit exitus, an grauis moles, an mordens humor, an
ficcus affectus fubfit: ad hæc, veluti inter initia eft definitum, an aliquid, quod valenter exalfaci-
at, vel refrigeret. Quorum ipforum quoq; rurfum caufæ vel in fpiritu, vel in humoribus, vel in
folidis ipsis funt ftatuendæ: quicquid enim eorum vehementer exalfactum refrigeratum ue fit,
quando, quod vicinum eft, tangit, dolorificum illi redditur. Igitur, quemadmodum fmgula, quæ
comprehendimus, agnofci poffint: tum vero quod non omnium habeamus manifefas notas:
quod quæ, fi aliud quicquam, etiam caufarum & affectuum, quæ fenfum fugiunt, agnitio ex mul-
ta exercitatione, & curiofa omnium perpenfione nobis tandem pariatur: alibi monftratum eft. G
Nunc vero id confiderare propofitū nobis non eft, immo folam ipfam medendi methodum per-
fequi. Ex qua fcienter perfpecta quantum auxilium compendium q; medicis nō ad prefidi-
um modo curationum q; facilitatem, fed etiam ad affectus aliquando agnitionem comparetur, fæpe
vobis in ipsis ægrotantibus manifefte oftendi: quorum iam duos tres ue, qui haud pridē funt fa-
nati, referam. Vnus enim, vt fcis, quadragenarius erat: qui cum colo laborare putaretur, nō mo-
do nihil eft à fomentis tum humidis tum ficcis leuatus, fed nec cataplafmatis, nec clyfteribus, qui
bus fcilicet publice vti in eiuſmodi affectibus folent, verum etiam à plurimis eorum exacerbatus.
Nam à rutaceo oleo per fedem infufo deterius habuit, item quæ à caſtoreo: quin etiā, vbi mel co-
ctum cum pipere affumpfit, extremis doloribus eft afflictus: iam, cum cremorē cocti fœni greci
vnā cum melle accepiffet, vehemēter eft iritatus. Ipfe igitur, vbi mordentes fuccos in tuni-
cisinorum immerfos conieci, qui fcilicet fecum vnā corrūperent tum ea, quæ per inferiora effent
infufa, tum ea, quæ per os fumebat, exhibui homini nutrimentum, quod non facile corrumpere.
Deinde, cum minus eum cruciatum intellexi, vitioſos humores purgandos iudicaui. Cum vero
aptiffimū ad eiuſmodi vitioſos humores effet medicamentum, quod ex aloë cōponitur, quod q; A.lib. III.
iam vulgo picran appellant, vtiq; ſemel hominem iuſte purgare non ſum auſus, q; doloribus & H.c. 2. fe 46c
inedia duobus menſibus confectus eſſet: verum ex quibufdam interuallis moderate id faciens,
quindecim circiter diebus hominē (vt ſcis) prorfus ſanaui, id q; nullo præterea adhibito præſidio.
Atq; hic quidem illo primum tempore ſic eſt vexatus, nunquam prius intefſtini dolorem exper-
tus. At alius iuuenis huic quidē etate propè par, ſed qui ſæpe antè colicis cruciatibus fuerat affe-
ctus, accepto ſcammonia fucco fuit purgatus. Cum autem bene largiter fuiſſet vacuatus, primo
quidem die vefperi in balneo lotus, mox piſſanæ cremorem fumens, poſt piſcem quoque come-
dens, nocte ea, quæ ceperat, euomuit. Secundo die itidem lauatus, comedit primū lactucam, mox
auium carnis aliquid in albo iure elixæ: ab hac alicam ex aqua ſumpſit vino aſtremo iniecto. Vbi
vero ab iis mediocriter ſe habere eſt viſus, etiam tertio die nutritus ſimiliter eſt. Reddidit tamen
per aluum plura, quàm pro ciborum portione, ea q; cum morſu. Deinde quarto die etiam magis
dolere ſibi ventrem ſenſit: & cum ſe in balneo alicubi frigus accepiffet imprudentem putaffet, ru-
taceum ſibi oleū per ſedem infundens, non ſolum vehementiffime eſt vexatus, ſed etiā liquidam
deiectionem copioſiſſimam excreuit: quod facile declarauit aliquid à toto corpore ad loca vètris
deferri. Poſt deinde p circuitus ſimilis redibat cruciatus. Audientes aut̃ eius ſymptomata, intel-
leximus noxā ex ſcammonia in illis maxime intefſtinis procubuiſſe, quæ prius etiā fuerant imbecil-
la ſic,

* *Evδoθev*, id ē
ab interno, ē in
aliquibus cod.
græcis. & ita vti
eſſe legendū.

* *ευποπία*.

A.lib. I. f. 21.
c. 1. fol. 2

A la sic, vt quasi fluxionis quidam exortus esset affectus. Ergo, quemadmodum hunc quoq; sanauimus, scis. Abicere enim iussi praelidia colica, alica q; calēte, quæ cocta in aqua esset, nutrire, immittis ei mali punici granis. Cum autem tota nocte citra dolorē dormiuiſſet, miratus proſectio eiſt remediꝝ nouitatē: rogauit q; quid esset bibendum. Dedimus itaq; bibendum dilutum rhois cremorem: quod uidelicet, siue aliqua esset in summo intestino facta vlcerosa affectio, eam adstringeret: siue etiam ex consuetudine aliquid ex superioribus locis in partem afflictam conflueret, id reprimeret: prandio q; eodem vti iuſſimus: deinde ad vesperam cenare pane puro madefacto in vino aliquo naturaliter quidē austero, sed veteri. Concessimus præterea, vt aulterum quemcunq; vellet, tructum sumeret, siue malum, siue pyrum, siue punicum. Simili ratione etiā tertio die cibatus, in quarto theriacen bibit, sanus q; omnino est redditus: ac de cætero ad cōſueta reuerſus, nullum ſenſit incōmodum. Simili genere & alteri cuidam in æſtate affecto, cum ſitibundus admodum esset, supra alia, quæ memorauimus, etiam frigida portione vti permiſi. Ergo, ne requiras in omni affectu eiusmodi notas, quales in pleuritide vel dysenteria apparent. Quippe ſcientifica eſt morborum id genus agnitio, certis videlicet definitis q; notis cōparata: cum eorum, qui proxime ſunt dicti, coniecturalis agnitio ſit, ac ſolis iis inueniri potis, qui exacte cuiusq; morbi propriam curationem norint. Quare, qm̄ de hac propoſita nunc diſputatio eſt, ipſam per ſe abſoluamus. Nec affectuum agnitiones attingamus: maxime quæ ex cōiecturalibus notis incipientes, cum eorū, quæ proſunt obſunt q; cognitiōe ſunt coniunctæ. Methodum enim in iis, atq; etiā exercitationem, in morborū agnitionibus ſeorſum per ſe fecimus: quod ſcilicet arte quis inſtructus, in omni agro tum locum, qui affligitur, tum ipſius affectum, ſicuti nos, inueniat.

Ratio Curandi Dolores.

C. AP. S.

Ergo reuertamur ad affectus, qui dolores excitant. Si ſanguinis abundantia ſit, quod diſtendat, veluti proſectio in phlegmone fieri ſolet, protinus, vbi vires ægri valentes ſunt, ſanguis mittendus eſt. Sed, ſi iſ vel ſanguinis miſſionem timeat, vel imbecillis viribus ſit, tum reuellendus {in diuerſum} ſanguis eſt: tum {per propinqua} deriuandus: dictum q; nobis prius eſt, quæadmodū hæc fieri conueniat. Quod ſi his peractis dolor etiā perſiſtat, patet proſectio in agrotatē particula impactum eſſe, quod cōtriſtat. Patet vero non minus, & q; curatio ipſa per digerentiā medicamenta ſit molienda. Pari ratione, & qui ex flatuoſo ſpiritu dolores ſunt, curabimus, ſed ſimul in his potius tum extenuantibus cibis, tum portione, tum per ſedem iniectionibus, tum cataplaſmatis, tum humidis ſiccis q; fomentis, auxiliantes. Sin moles aliqua grauando contundendo uel dolorem excitet, moli ipſi eſt medendum. Sin mordēs humor eſt, qui affligit, aduerſiſſima huic ſunt, quæ extenuant & calfaciūt. Poſtulat nanq; huius generis affectus, ſi modo curandus eſt, vt ea, quæ cōtriſtant, vacuentur: ſi id oīno fieri nequeat, vt per epicraſin ſaneſcit: ſin id quoq; fieri non poſſit, vt, quæ torporem inferant, medicamēta exhibeantur. Quæ quanq; ſunt reliquorum communia, minus tamen hos affectus, q̄ alios, ledunt. Quippe tenuis cōſiſtentię, & calidarum viriū, plurimi talium humorum ſunt: quæ autē ex papaueris ſucco, & alterco, & eo modo frigidis compoſita medicamēta ſunt, ſimul omnino & refrigerant & ſiccant: qua ratione non ſolum, vt ſenſui torporem inducentia, ſalutaria ſunt, ſed etiam vt humorum tenuitatem cogentia atq; craſſantia, præterea vehementem calorem refrigerantia. Vbi vero craſſi glutinoſi q; humores exuperant, alieniſſima ſunt, quæ torporem inducunt: cauendus q; magnopere in eiusmodi affectibus eorum uſus eſt. Sed nec alioqui comitatur eiusmodi ſuccos, modo ſoli ſint, dolor vehemens. Si vero ex accidenti aliquo coniunctus his halituoſus ſpiritus eſt, qui ex iis, quibus continetur, corporibus erumpere proſus non poteſt, grauiffimis omnino doloribus, qui ita ſe habent, cruciantur. Porro accidit id illis duplici ex cauſa, vel obſtructione, vel calore: nam & obſtructio ſpiritum cohibet, nec exire permittit: & craſſa glutinoſa q; cum caleſcunt, flatuoſum ſpiritum gignere ſolent. Eiuſmodi ſanē affectus iis, qui ſe cibis natura frigidis, & conſiſtentia craſſis ac glutinoſis referſerunt, qm̄ in ipſis inteſtinorū tunicis flatuoſus ſpiritus continetur, poiſſimum incidit. Nam, cum hæ duplices ſint, vbi medio earum ſpatio eiusmodi collectus humor eſt, in flatulentū mutatur ſpiritum. Sanē iſ & craſſus, & frigidus, & tardi motus eſt. Vbi igitur tum retinetur: tum tunicas diſtendit: tum ſuccus, vnde oritur, inteſtini partes, quas cōtingit, vehementer refrigerat: duplici occaſione affliguntur, qui ſic laborant. Ac ad tempus quidem, vbi torporem faciens medicamen biberunt, proſus indolentes redduntur, ceterum affectus his omnino ſit maior: nam & inteſtinorū tunica medicamentorum frigiditate denſiores, minus q; flatui transmittendo habiles redduntur: & humor ipſe tum craſſior, tum ad motū ineptior euadit. Itaq; & ſpatio longiore ad ægri curationē, & medico, qui egregie in arte ſit exercitatus, eſt opus. Niſi enim certa ratione poſtmodum curationem aggredietur, verendum erit, ne ſucci ſecundo in flatuoſum ſpiritum verſi, eundem dolorem renouent: vnde rursus ſtupeſacientium aliquid medicamentorum exhiberi ſit opus, eadē ſcilicet neceſſitate vrgente: ac pari modo tertio, & quarto, & ſæpe deinceps, quoad homo inſanabilis effectus, in malum totiūs corporis habitum perueniat, & poſt longa tandem tēdia pereat. Quo pacto igitur dolores eos, quos frigidus humor in medio inteſtinorū intercluſus excitauit, ſanare cōueniet: Sanē nō perſuſionibus & cataplaſmatis, quæ valenter excaſfaciāt: quippe lenti omnes

*Interpretis
Verba.*

lib. 16. c. 4.
2. 146. b. c.

lib. 4. c. 30.
2. 146. b. c.

METHODI MEDENDI

omnes crassi q̄ & frigidi humores ab iis, quæ calfaciunt, nisi etiam valenter digerant, liquantur, ac E in flatum mutantur. Conuenit igitur eos incidere simul & concoquere: quas res tenuantia medicamenta præstabunt: potissimum tamen, si calida vehementer non sint. Quod autem horum quoq̄ ipsorum ea maxime deligenda sint, quæ magis flatum discutiant, magis q̄ siccent, nemini potest dubium esse. Sæpe q̄ ex plebe non paucos audias minus sibi dolere colon affirmantes, cum nec ipsis cataplasma imponitur, nec oleo aliquo perfunduntur, nec per clysterem aliquid infunditur. Et sanè, qui generosi animi fortes q̄ sunt, si mediocri vtuntur victu, tutius longiore in tempore percurantur, quàm qui violenter (vt dictum est) calfacietibus vtuntur. A nullo enim in eiusmodi succis tam est metuendum quàm à calore, qui eos liquet, atq̄ in flatum vertat, sed digerere non valeat. Vidimus nanq̄ ex agrestibus operis quæpiam, qui, vbi coli dolorem sentit, protinus se cinxit, cum cingi ante non soleret: comedit autem cum pane allium, nullum dimittens consuetum opus: nec toto die quicquā bibit, sed vesperi meracius: ab his & tota nocte dormiuit, & mane ab omni dolore planè liber surrexit. Est enim profectò allium ex eorum ciborum genere, qui & flatum discutiant, & minime sitim inferat. Sunt, qui parum id experti existimēt maiorem, quàm cepas, sitim excitare, sed planè errore: cum non modo nō maiorem, quàm cepæ, sed nec omnino sitim faciat. Idem omnium planè eduliorum maxime flatum discutit. Itaq̄ ipse certe agrestium the F riacen id appello. Ac, si quis vel Thracas, vel Gallos, vel deniq̄ qui frigidam regionem incolunt, vesci aliis vetuerit, nō leuiter iis hominibus nocuerit. Ac, quos ex supradicta causa vehemēs intestinorum dolor citra febrem exercet, iis & allium esse licet: & theriacen bibere, quippe quæ eius modi affectibus magnopere subuenit. At, si cum febrī vnā talis dolor aliquando incidat, principio quidem, si id ferunt, fomentum siccum ex milio est adhibendum. Si ab hoc non quiescant, fermen aliquod, quod flatum dissipet, in oleo, quod tenuium sit partium, coquere: mox per linteū, quod purum sit, oleum colare: deinde anseris seuum in oleo liquare, & per sedem infundere oportebit. Si anseris seuum non sit, gallinaceo est vtendum: in primis q̄ curandum, vt sit expers salis, esto autem nec admodum vetus: licet vero & recenti vti, præsertim anserino. At, si neq̄ ex hoc remittuntur dolores, secundo rursus iniiciendum idem est, adiecta etiamnum castorei & papaueris succi, vtriusq̄ sabæ non amplius magnitudine: olei vero hemina modus esto. Excipitur & lanula ex hoc medicamento aliquid: debet q̄ appēsa forti filo, quàm penitissime in rectū intestinum dimitti, quod vtiq̄, & cum libet, id facile recipiatur, & euidentem cōferat vtilitatem. Ad eundem modum & oculorum & aurium dolores, qui ex huiusmodi humore aut spiritu flatulēto in febrī excitantur, sedare conueniet tum fomento ex milio, quoniam id omnium & leuissimum est, & G maxime siccans, quod q̄ ab eo defluit, innoxium expers q̄ morsus est: tum auribus medicamentum id, quod ex castoreo & papaueris succo conficitur, infundentibus: quo scilicet ad talia vti solemus. Liquor, quo hæc liquantur, sapa esto, quod apud nos vocant Hepsēma: pleriq̄ medicorum Siræon græce appellant. Quod si imponi cataplasma aliquando oportebit, papauerum capitibus in aqua coctis, ac sceni græci, vel hordei, vel lini seminis farina aquæ immixta, cataplasma cōficiēs. Scire autem licet medicamentum, quod castoreum recipit, non solum aurium sedare dolorem, sed etiam oculorum & dentium, si auribus instilletur. Iam vero collyria, quæ ex opio fiunt, vehemētissimos oculorum dolores remittere omnes norunt: Vtendum q̄ (vt prædiximus) his est, cum maxima necessitas vrget, illud minime ignorantibus particulas ipsas nō nihil ledendas, imbecilliores q̄ in reliquam vitam ex refrigeratione futuras, ceterum salutī hominis in præsens, ipsam futuram postea noxam posthabentibus. Siquidem non paucos eorum, qui his sunt vti, eō infirmitatis venisse, vt alij ferè nihil omnino viderent, alij propemodum surdi forent, id omnibus iam notum est. Itaq̄ nos, si quādo cogimur his vti, postmodum in sanitatis tempore particulas ipsas excalfacimus, nempe auribus oleū id, quod solum castoreum habet, infundentes: oculis vero collyria, quæ tantum excalfaciant: ad quod scilicet munus maxime id probamus, quod ex cinnamo-H mo cōficitur. Ac de doloribus quidem, qui ex crassis glutinosis ue aut frigidis succis, vel etiam flatuoso spiritu excitantur, hætenus abunde. Similis nanq̄ est eorum omnium curatio, vt quæ per comprehēsas iam materias perficiatur, nisi q̄ is, qui spiritum flatuosum comitatur, propriam quādam curationē est sortitus ex cucurbita cum flamma copiosa subinde admota. Videbitur q̄ tibi præsidium hoc in huiusmodi affectibus incantamenti cuiusquam simile quid efficere, siue hi in intestinis, siue in quauis corporis particula sunt excitati. Illico enim cucurbita admota, qui spiritus flatuoso cruciantur, tum à dolore liberi, tum omnino sani redduntur. Quos vero non spiritus modo flatuosus, sed etiam humor quispiam, vnde is oritur, male habet, iis ilico ad tempus dolor sedatur, redit tamen vel in sequente nocte, vel postridie, vel etiam tertio die similis dolor: ac potissimum, vbi in victu aliquid deliquerint, aut importunius particulas excalfecerint. Tibi vero hoc quoq̄ maximum indicium affectus erit: ac curationem pro ratione prosequeris, nec impense partikulam excalfaciēs, & tenuatoria curationis ratione vtens. Quod si in vētre quoq̄ talium quippiam incidat, mirifice hi ex acrium iniectione leuantur. Sed percuranda in his primum doloris accessio est, admota scilicet cucurbita, quod ventosus digeratur spiritus: post id vacuandus humor est, infuso per sedem eiusmodi medicamentorum aliquo. Ego vero oleo quopiam tenuis substantiæ vti

A. li. 7. c. 1.
fol. 2. g

A. li. 7. c. 1.
c. 3. l. 29. a

Avti assueui, rutam incoquens. Porro aliqui in tali curandiratione, vbi oleum acceperunt, maximo dolore cruciantur: postea ex quo interposito spatio excernunt humorem vitreum atque ex hoc protinus simul & a dolore & ab affectu liberatur: quippe sublata causa, quæ spiritum illatuosum gignit, omnia conquiescunt. His humoribus contrariam maxime naturam habent, qui tenues sunt atque acres, sed similem dolorem inferunt: non nunquam autem & conuulsiones crebras accersunt, utique cum in ore ventriculi sunt collecti: veluti dudum illi contigit, qui paulo post eruginosum humorem euomuit. Satiùs vero sit non æruginosum ipsum dicere, sed exactam planè æruginem: talis namque erat, qualis pulcherrima est ærugo. Verum huic adolescenti cum conuulsione & syncope, etiam gastræ quædam frigida, & pullus in summo gradu parui erant. Ex quibus cum conicerem in ore ventriculi, quem publice stomachum vocant, mordentem aliquem contineri humorem, dedi illi aquam tepidam bibere: postquam protinus tale quid euomuit, quale si ipse facere velles, floridissimam æruginem aquæ misceres. Cum igitur talis humor in ventriculo consistit, vomitu est expellendus: cum in intestinis, iniicere per sedem conueniet, quod eluere eiusmodi humorem sit aptum. At id deterius sit omnino, oportebit. Cum autem talium plurima mordeant, commodissime ex iis aliquod deligitur, cui morsus absit: eius generis maxime est prillanæ cremor. Cibi vero exhibendi his sunt, qui & boni sint succi, nec facile corrumpantur: quorum etiam exempla in priore libro iam tradita habes. Quoniã vero etiam eorum, qui ex siccitate vehementi tendunt cruciantur quibus mentionem feci, satius fuerit de his et aliquid apponere. Scire namque licet eiusmodi affectum, si modo curabitur, humectationem poscere, cæterum curatu perdifficilem esse, vel potius, qui curari omnino non possit, si febris occasione est contractus. Succedit maxime exitiali phrenitidi. Nec sanatum quempiam ita conuulsorum aut ipse vidi, aut alium narrantem audiui. Nam temere conuulsio vel ex repletione nervosarum partium incidit, qua ratione eos, quos magna phlegmone premit, adoritur: vel ex mordente & tenui humore, qui nervosa corpora rodat: vel ex ingenti frigore, quod tale quippiam, quale gelu, efficit. Atque hæc tres conuulsiones subinde percurantur: sed, quæ ex nervosarum partium siccitate provenit, insanabilis est. Quippe etiam in libro de marasmo docuimus solidorum corporum siccitatem omnino esse insanabilem. Quo minus adiciendum quicquid de eiusmodi symptomatis præterea puto: sed nec de iis, quæ vitio immodicæ vacuationis vel per aluum, vel per vomitum, vel sanguinis profusione incidunt: quæ & antea de his mediocriter sit dictum, & posthac dicere sit necessum, potissimum cum mihi de tumoribus, qui præter naturam incidunt, erit agendum. Itaque librum hunc iam claudam, quoniam de symptomatis iis, quæ utique tractatu maxime erant necessaria, & præcipue quæ cum febrium affectibus ipsis sunt connexa, abunde disserui.

* συντόνως, vehementer.

* σπινθίς.

GALENI METHODI MEDENDI ID EST DE MORBIS CVRANDIS LIBER TERTIVSDECIMVS

ARGVMENTVM LIBRI

Inflammationes, ac Reliquos præter naturam Tumores curare docet, id quæ Indicationibus diligenter adscriptis, ac iis maxime, quæ sumuntur ex affecta parte.

Quid Hactenus hoc opere actum est, quid Hoc libro agendum: ac de duplici Inflammatione. CAP. I.

DVo iam genera morborum, quemadmodum quis methodo sanet, docuimus, alterum in intemperie positum, cui antiqua est appellatio: alterum cui nos nomen indidimus cõtinuitatis solutione. De qua prima in tertio, quarto, quinto, ac sexto horum commentariorum præcepimus. Post eam de iis, quæ in intemperie consistunt, usque ad duodecimum egimus. In hoc vero totius operis tertio decimo de tumoribus, qui præter naturam incidunt, disserere incipiemus, in quibus scilicet partes à naturali habitu in quantitate recesserunt. Sanè, sanitatè, an naturalem habitum dixeris, ad ea, quæ nunc paramus, nihil interfit. At, cum plures specie affectiones in his sint, primum agemus de phlegmone. Expedit enim ab hac cœpisse, & quæ frequentissime incidit, & quæ febres aliaque symptomata periculosissima excitet. Cum autem veteres Phlogosin (quæ inflammatione interpretare) subinde phlegmonem appellarent, sciri volumus non hoc loco nos de hac phlegmone disserere, sed ea, quæ supra inflammatione, tensione quoque in particula facit, quæ non modo ipsi tactu deprehendamus, sed et ipse æger proprio sensu aduertat. Quin etiam pro tensionis modo tangenti quoque renitenti pars phlegmone oblecta, autior quæ est, quæ pro naturali habitu: nec dolor illi deest, maior minor ue: cum quo non nunquam & pulsationis est sensus, cum scilicet malum amplius increuit, ac potissimum cum suppurat.

Rubor

† διὰ τῆς ἰδίας ὀνυχώσεως συναισθησάσης, ἢ τοῦ σπινθίος (quæ cõtinuitatis solutionis) appellatur.

METHODI MEDENDI

† In cod. grecis antiquis legitur αἱ δὲ πᾶν- τὼς ἐστὶν ἐν τοῖς φλεγμα- τισι μορίοις, i semp in ipse rubor, oīuo in est pnb⁹ phleg mone laboran- tibus, & ita om- nino videtur le- gendum.

Rubor quoq; in parte, quæ phlegmone laborat, maior minor'ue semper visitur. † Semper autem E omnia partibus inflammatis insunt. † adeo, vt siue in ipso pedis vestigio, siue in parte interna ma- nus magna phlegmone incubuit, hæc quoq; magis rubra videntur, quàm ante.

Indicationes, quæ ex fientibus vel factis Inflammationibus præbentur.

CAP. 2.

E Tenim ostensum est phlegmonem omnem e sanguinis confluxu consistere: qui aliis statim calidior est, quàm pro natura fuit: omnibus certe in ipsa parte, quæ phlegmone vexatur, cali- dior efficitur. Atq; hoc omnium sectarum commune est, siue impacium tantum sanguinē in fi- nibus vaforum, phlegmones causam velint: siue intercidentiam eius (paremptōsin vocant) in so- lis arteriis, siue obstructionem aliquam: siue in raritatibus ratione cōtemplabilibus resistentiam. Quo fit, vt et curationis indicatio omnibus sit communis, nempe vacuatio redundantis in particu- la phlegmone obfessa, sanguinis. Phlegmones vero, quæ in generatione adhuc est, duplex indicā- tio est, veluti in reliquis morbis omnibus, quicunq; in gignēdo adhuc sunt, nec dum absolutionē sunt nacti, ostendimus. Nam, quod corū generatum iam est, id medicinæ artis parti, quæ morbos curat, subiicitur: quod in generatione adhuc est, parti, quæ futurum morbum præcauet. Atq; id- circo diximus nō simplicem sed compositam esse totam de iis ægritudinibus, quæ in generatio- ne adhuc sunt, medentis sollicitudinem, ex ea s. quæ prouidet, & ea, quæ curat. Sicuti etiam, si oīno **F** phlegmone laborare adhuc non cœperit, sed tamen appareat iā subesse in corpore genus aliquod eorum, quæ phlegmonem excitare possint, in talibus quoq; omnibus sola prouisio indicatur. At, si nulla adhuc in corpore causa subalitur, iis, qui ita se habent, ea, quæ sanitatis est tutrix, prouidet. Ergo, quæ causæ phlegmonem accersere videntur, has, cum iam in corpore sint conceptæ, sed ta- men exiguæ adhuc & incipientes, vtiq; ne maiores fiant, inhibere conueniet. Atq; hoc præcauen- tis phlegmonem est officium. Cum vero ea magnitudine sint, vt iam phlegmonem creent, eas sub- mouere oportet, ac, quantum iam phlegmones genitum est, sanare.

De Ortu Inflammationum.

CAP. 3.

A Communis omnium phlegmonarum generatio ex sanguinis influxu est, copiosioris s. q̄ pars postulet: veluti tum in libro de tumoribus præter naturam ostendimus: tum in eo, qui de inequali intemperie est inscriptus. Sanè copiosior sanguis influit alia quapiam, aliis'ue particu- lis aliquando eum mittentibus, ac ea, quæ phlegmone laborare incipit, recipiente: aliquando par- ticula, quæ affligitur, hunc ad se trahente. Partes, quæ mittunt, aliàs vt copia superuacuum, vel vt qualitate molestum, aliàs vtroq; nomine, succum propellunt: quæ attrahunt, ea morboſo calore trahūt. Porro in doloribus incipit quidē causa ab eo, quod affligitur, sed quicquid est phlegmo- **G** nes, id superpositæ partes efficiunt. Ergo, q̄ ad partem excoſactam vel trahuntur vicini succi, (vt nos censemus) vel confluunt (vt Aſclepiades putabat) euidenter cernitur: et conſter hoc loco ex ipso, quod cernitur, sermoni fides. At vero, quæ dolent, cernuntur ea quoq; phlegmonem ex dolo- re pati: sed causam eius quidam omnino non assignāt: quidam nullo modo probabilem. Noſtra vero ſententia talis est. Docuimus in eo opere, quod de naturalibus facultatibus edidimus, vnam esse naturæ facultatē, quam excretoriam dicimus. Ea suo munere tum fungitur, cum triste aliquid ſentit. Vnum vero quiddam est ex iis, quæ eam contriſtant, ipsa, quæ dolorem excitat, causa, quæ- cunq; ea ſit. Hanc igitur eicere dū properat, phlegmonem interdum in particula concitat. Cum enim primis ſuis conatibus nihil profecit, vehementius aggreſſa, quod inſeſtat, expellere, ſangu- nis aliquid & ſpiritus ex ſuperpoſitis partibus in aſſiſctam ſimul exprimit. Atq; hinc fit, q̄ ex do- lore particula, pro portione confluentis in eam humoris, in tumorem attollitur.

Tumores omnes præter naturā Ex rei influentis natura Variari: & quæ ſint Inflammationis cauſæ. CAP. 4.

Q Vin etiam omnium tumorum, qui præter naturā ſunt, varietas ex eius, quod influit, natu- ra naſcit. Vbi enim ſtatulenta materia copioſior acceſſit, ſtatuoli magis tumores ſiūt: phleg- mone vero magis ſimiles, vbi ſanguis: ſicut erīſypelati, vbi ſlaua bilis: & œdemati, vbi **H** pituita: ſimiliter ſcīrrholi, vbi crasſus, vel vehementer lentus humor eſt, qui parti eſt infixus. Sanè crasſus humor, quodammodo iā melancholicus magis minus'ue eſt. Lentus autem ex gluti- noſis prouenit cibis: ſed & ex ipsis aliquando neruoſis partibus, vtiq; cum multum excrementi genuerint. Verum de ceteris tumoribus poſt dicetur. Nunc de phlegmone agemus, ac prius, quæ oīum ſunt cōia, ad diſputationem propoſitis, ſic deinde, quæ ſolius eius vitij ſunt propria, adiciē- mus. Cū igitur particula aliqua phlegmone vrgeri cœperit, videndū eſt, an pp calorē aliquē, qui in illa præter naturā ſit ortus, an pp dolorem vel ipſius, vel propinquæ alicuius partis, hanc cōtra- xerit: quo ſ. adempta cauſa, phlegmone non amplius increſcat. Poſt hanc conſiderationem proxi- me illa cōtēplabere, nūquid vicina aliqua particula ſanguinem largius ad partē phlegmone ob- ſeſſam tranſmittat: deinde num totum corpus † ſanguine nimium abundet, & ληθῶραν vocant. †

Inflammationes in Glandofis carnis facillime excitari: & quo pacto Curari debeant. CAP. 5.

CAP. 5.

N Am tibi (arbitror) non excidit, vtpote ſepe à nobis monſtratum, ſuperuacanea, quæ à va- lentioribus partibus ob redundantiam vel qualitatem expelluntur, ea in imbecilliores pro- cumbere: atq; hinc accidere, vt glandulæ, quas adenas vocant, facile fluxiones recipiant, & maxi- me quæ rariores natura ſunt. Quippe valentius eſt arteriarū, & venarū, & neruorū, & muſculo- rum

† πληθῶρι- κῶς διακρη- ται.

A. 1. 1. 1. c. 2. 4. 1. 1.

A. 4. 1. 1. 1. c. 2. 4. 1. 1.

A. 1. 1. 1. c. 2. 4. 1. 1.

Arum robur, imbecillius autem ac forte prorsus nullum, corporū, quæ glandularum sunt naturæ.

Sic igitur fit, ut & propter vlcus, quod in manus aut pedis digito sit, eiusmodi glandulæ in inguinibus & alis tum intumescant, tum phlegmone occupentur, cum defluente † ad ultimos artus †. Iamguinem priores exceperint. Quin etiam in collo, & secus aures sepe numero glandulæ iis, quibus in collo, capite, vel aliqua vicina parte vlcus est natū, intumescunt: nominant autē ipsos Adenas: cum sic intumuerunt, Bubones. Quod si scirrholior earum partium phlegmone aliquā fuerit, hæc & ægre sanabilis est, & Chæceras, id est struma, dicitur. Quæ nam vero sit strumarū curatio, in proximo dicetur libro. Nunc de phlegmonis, quæ de iis differere proposuimus, denuo repetentes dicamus, quod inhibitiō earū incipientium, ex generante illas causa tollenda præstatur. Primum quod de iis, quæ vlcera sequuntur, agamus: postea enim quod prope magnā arteriam aut venā vlcus ortum est, celerrime bubones excitantur. Cernitur autem aliquā ipsa quoque vena per totum membrū rubra, & calens, & distenta, ac si quis eam tangat, dolens. Ergo, si vel totum corpus sit plethoricum, vel malo succo redundet, difficilis curatio redditur: si sanū planè sit, facilis. Quippe excalfacere & humectare modice totum membrum, quod dolor mitigetur, oportet (nostri autem eiusmodi presidiōrum materiā) ipsi utique vlceri tetrapharmaco in linamento impolito, liquatur id oleo potissimum rosaceo, vel, si id non adsit, relaxanti aliquo: toto vero membro, hapso lanæ ex calente oleo imbuto circumdato. Quin etiam ipsi vlceri calidū imponi medicamentū oportet, ac super ipsum, calidum extrinsecus cataplasma ponere, quod ex farina vel hordeacea, vel triticea, vel ambabus multis cōstet: humorem autem habeat aquam cum paucō oleo. Non secus vero etiam ipsi adenæ, quæ phlegmone vrgeri cœpit, ut mitigetur, imponi debet primo die lana ex oleo calente madens, non aut, sicut non nulli faciunt, statim addito sale: post enim sale utemur, cū & tumor per totum membrum fuerit remissus, & dolor vlcis sedatus. Quin etiam macedonicum, quod vocāt, pharmacum similiter, sicut tetrapharmacum, ipsi vlceri imponere licebit: etenim similia inter se sunt, solo thure tetrapharmacum macedonico superante. At, si vel plethoricū corpus sit, vel malo succo redundet, curatio per ea, quæ sic calent, fluxionē ad membrum citat. Atqui nec alia vlla uti datur. Cogimur ergo alias sanguinem mittere, id quod aut vena incisa: aut membris iis, quæ lesa nō sunt, scarificatis. Manu enim laborāte, scarificabis crura: altero crurū male habente, reliquū. Has namque vacationes indicat ipsa copia, sicut etiam succorum vitium, redundantis succi purgationem. Ac plerumque post hæc præidia, glandularum phlegmone desinit. Sepe tamen vel ipso, qui curat, ad corporis totius vacationem segniore: vel ipso, qui laborat, præ molliore eam non admittente:

Bumum rosaceo, vel, si id non adsit, relaxanti aliquo: toto vero membro, hapso lanæ ex calente oleo imbuto circumdato. Quin etiam ipsi vlceri calidū imponi medicamentū oportet, ac super ipsum, calidum extrinsecus cataplasma ponere, quod ex farina vel hordeacea, vel triticea, vel ambabus multis cōstet: humorem autem habeat aquam cum paucō oleo. Non secus vero etiam ipsi adenæ, quæ phlegmone vrgeri cœpit, ut mitigetur, imponi debet primo die lana ex oleo calente madens, non aut, sicut non nulli faciunt, statim addito sale: post enim sale utemur, cū & tumor per totum membrum fuerit remissus, & dolor vlcis sedatus. Quin etiam macedonicum, quod vocāt, pharmacum similiter, sicut tetrapharmacum, ipsi vlceri imponere licebit: etenim similia inter se sunt, solo thure tetrapharmacum macedonico superante. At, si vel plethoricū corpus sit, vel malo succo redundet, curatio per ea, quæ sic calent, fluxionē ad membrum citat. Atqui nec alia vlla uti datur. Cogimur ergo alias sanguinem mittere, id quod aut vena incisa: aut membris iis, quæ lesa nō sunt, scarificatis. Manu enim laborāte, scarificabis crura: altero crurū male habente, reliquū. Has namque vacationes indicat ipsa copia, sicut etiam succorum vitium, redundantis succi purgationem. Ac plerumque post hæc præidia, glandularum phlegmone desinit. Sepe tamen vel ipso, qui curat, ad corporis totius vacationem segniore: vel ipso, qui laborat, præ molliore eam non admittente:

Cearū phlegmone maior efficitur, sic, ut ad suppurationē perueniat. Sed & quæ Phymata quoque græce appellant, memoratis carnibus, sicubi fluxio in eas procubuit, citra vlcis occasionem accidunt. Vbi ergo distentæ vehementer glandulæ sunt, aut alia denique particula quævis, quam phlegmone premit, cogimur toto corpore prius vacuato ipsam scarificare. Sanè vacuumus totū corpus (sicut in libro de plenitudine monstrauiimus) non modo cū in redundantie succorum est habitu, sed etiam cum mediocritate succorum continet, si morbi magnitudo suadeat. Siquidē dolor, & calor membri, in quo phlegmone sedet, etiā si purum ab excrementis totum corpus sit, fluxionis causæ fiunt. Expediit igitur parcius id, hoc casu facere: ac vacuare, prout maxime tum etati laborantis, tum naturæ, congruere videbitur, estimatis præterea tum anni tempore, tum regione, tum egrotantis ipsius cōsuetudine: de quibus sepe iam in multis diximus sic, ut, etiam si adhibita in sermone non sint, subaudire ea conueniat. Vbi vero phlegmones ipse veluti feruor iam subleuit, mitigatoriis cataplasmatibus dimissis, ad ea, quæ digerunt, paulatim est transeundum. Ac primum cum mitigatoriis paulum mellis miscendum. Mox triticea farina in totum prorsus auferenda, contentis hordeacea cum melle vberiore. Deinde ad aliquod eiusmodi digerentium medicamentorum est veniendum, quæ vel humida consistentia sint, similiter iis, quæ in linamentis vel

Dlintheolis excipiuntur (Emmota græce vocant) vel cerati specie. A duris autem abstinendum est, qualia pleraque emplastra sunt: nam & phlegmonarū reliquias contrahunt, & rursus phlegmonem in ægra parte excitant. Quin, si pus aliquod notabile in suppurante particula sit contentum, non expedit (quod nō nulli faciunt) protinus incidere, immo exhalationem moliri medicamentis ad id valentibus, quorum usus ex affectu sit coniectatus: quippe, cum phlegmones naturæ quicquā in membro adhuc restat, acris medicamēta magis irritant, quod digerant. Cū vero, quod ex phlegmone relinquitur, scirrholosum effectum videtur, fidenter iam valentibus medicamētis uteris, sed obseruato bis in die, quem præsent effectum, primum mane, secundo vespere. Quod si balneo quoque utatur, etiam in eo tempore fiat. Si quā ergo egram partem medicamenti acrimonia irritatam videris ita, ut tumentior, aut rubicundior sit, aut magis doleat, mitigabis eam interea fomēto, quod per spongiā ministrabis. Id autem aliquā ex aqua dulci esto, aliquādo etiam sal habente, vbi si scirrholiores phlegmones sunt. Sin aliquā puris copia medicamēta superet, nec ea videantur tibi totum digerere posse, † secare exitū ei, quod digestionī non cessit, † eo potissimū loco oportet, quo est ediuissimum: quippe tenuissimam etiam illic inuenies cutim. Memineris præterea in sectione & alterius indicationis, quæ ad effluxum pertinet: atque ad ambo respiciens, ita, quod suppura-uit, incide: ac deinceps medicamentum aliquod eorum, quæ sine morfu siccant, impone. Quod si

† ἐπ' ἀπὸν
τὸ κέντρον

* κέντρον

* glandulis.

* μέρος

* μέρος

† τέμνειν χρὴ
τὸ εὐτὸς ἀπὸ
σάμενον, id. est
quod sic absceci
sit, secare.

METHODI MEDENDI

† Ex antiquis ita
vertendum, ex
leui occasione
phlegmonē fa-
cile contrahat.

computruisse portio aliqua suppurantis partis videbitur, excidi eam est necesse. Sanè quidam in E
iis, quæ in axillis & inguinibus suppurant, in myrti folij speciem semper excidi cutim iubent, qm̃
in iis laxa ea naturaliter sit, ideo q̃ omne, quod ipsi aduenit, prompte recipiēs: † præterea ipsa ex
leui occasione phlegmonē facile contrahant.} At maximas aliqui sectiones facere solent: quarū
occasione particula, vbi ad cicatricem est perducta, non solum turpissima redditur, sed etiā fit im-
becillior, & quæ sepe homini ad motus sit in mora. Hæc igitur ipsi vitantes, sæpissime certe sola
incisione, & medicamētis valenter siccantibus, huiusmodi affectus sanauimus. Quod si aliquan-
do excidere aliquid propter multitudinem nō puris modo, sed etiam corruptarum partium, fuit
opus, contenti eramus sectione, quæ myrti folium imitatur, planè nō magna. Cum autē in ea ex-
cissione longitudo maior, q̃ latitudo, sit, esto in inguine longitudo p̃ tranuersum ducta, non aut
per membri rectitudinē: quippe ita, cū membrum inflectimus, naturaliter cutis sibi applicatur.
Post excisam cutim, medicamento, quod Græci Mannam vocant, affectam partem implebimus:
est autem ea purgamentum thuris, leui adstrictione prædita, atq; hoc nomine etiam thure ipso
ad nō nulla vtilior. Thus enim puris tm̃ mouendi facultatem obūnet, vtpote nullā adstringendi
vim habens: magis q̃ id facit, quod pinguius ex eo est, & magis albicās: sicuti etiam, quod flauū
ex eo magis est, validius siccet. Manne vero, etiam corticis thuris paululum est admistum: vnde s. F
adstringendi vim habet. Ipse vero cortex thuris tum adstringit, tum siccet insigniter. Itaq; etiam
ad moderatiores sanguinis perfusiones eo vtimur solo: sicut etiā ad valentiores solo vsto, sed tunc
& cribrato, & in mollissimum puluerē redactō. Quin etiam mitigare prius incisam partem (sicut
dictum est) quantum poscere videbitur, oportet, tomētis primū, dein cataplasmate, mox hume-
ctante aliquo medicamento, aut non siccate: singulis s. extrinsecus impositis. Nam in ipso vlcere
tum manna, vt dictum est: tū ex præditiis, quæ linteolis excipiuntur, primum ea, quæ pus citant:
dein ea, quæ expurgant, sunt imponenda: post quæ, si cauitas etiam nū sit, quæ impleant, adhibēda
sunt: sin minus, ea, quæ cicatricem inducūt (græce Synulotica & Epulotica vocant) veluti quod
ex cadmia cōficitur. At, qm̃ in horum quoq; vsu plurimis medicorū non paruum quiddam pec-
catur, non ab re fuerit etiam de iis disserere. Tum nanq; ducere vlcus ad cicatricem incipiunt, ac
idonea illi rei medicamēta applicant, cum iam penitus sit impletum, nec quicq̃ illi restat cauum.
Hinc illis accidit, vt cicatrices efficiant circūposita cute magis eminentes. Quō igitur illi cuti sint
equales, conueniet id genus medicamentis vti prius, q̃ vlcus ad equalitatem prorsus sit impletū,
imposito super ipsas vlcis oras ex specilli mucrone medicamento aliquo sicco ex iis, quæ in vl-
cerū curatione retulimus: super reliquum, linamento dato, quod aliquo medicamēto ex iis, quæ
cicatricē inducant, & humida sint consistentia, fuerit imbutum. Cedente autē prospere curatione,
etiam id amouebis: ac postea sicco tantum medicamine vteris, lato specilli mucrone {ex eo} sup
toto vlcere volutato. Foris autē suffecerit linamētum vel siccū, vel ex vino madens: ac potissimū
quod ex mollibus sit elychniis: cuiusmodi Tarsensia sunt, qm̃ hæc quoq; ad vlcera, quæ supercre-
scant, submittenda vim aliquam obtineant. Atque hæc ducente nos rerum societate diximus.

*De Curatione singulorum Affectuum, qui ad Inflammationem
excitandam concurrunt.*

CAP. 6.

NVnc ad sermonem de phlegmone reuerſi dicamus communem omnium phlegmonarū
curationis indicatōnē esse vacuationem. Quæ vero adhuc in generatione sunt, in iis prior
vacuatione est confluentis ad affectum locū sanguinis inhibitiō. Inhibebitur is cōmode, si ipsam
fluxionis causam inuenerimus. Sane ea duplex est: aliquando enim ex ipsa parte, quā phlegmone
vexat, oritur: aliquando ex alia quapiam, aliis ue. Ex ipsa, quoties aut calidior est facta, aut dolore
(sicuti ante diximus) vrgetur: non ex ipsa, quando vel ab alia quapiam, vel ab aliis, superfluum
illi transmittitur: vel etiam ex totius corporis affectu. Fit igitur calidior vel propter immodicum
motum, vel aliquem ex Sole aut igni teporem, vel acre medicamentum. Dolore vero angitur & H
propter intemperiem, & vulnus, & contusionem, & distorsionem, & tensionem, præterea ob-
structionem quandam, & spiritum flatuosum. Intemperies modo extrinsecus illi prouenit: mo-
do ex succis, qui in ipso habentur corpore: Et extrinsecus, vel ab aliquo venenatorū animalium:
vel pharmaco, quod vehementer exalfaciat, aut refrigeret: etiam ex ambiente non nunquā: Ex
ipso vero laborantis corpore, cum id vitiosos succos, qui facultate sint dissimili, cōgeſſit. His igit
omnibus æstimatis, quæ phlegmonæ adhuc in generatione sunt, earum causas prius abscindes:
quæ vero iam factæ sunt, has utiq; curabis solas. Ergo quid nam medenti agendum sit, si totum
corpus male sit affectum, & dicta prius tum in his non pauca sunt, tum in libro de plenitudine:
& nunc summas eorū, quæ dicta sunt, recensēbimus. Vbi enim æquabiliter inter se succi sunt ad-
aucti, id & Plethos & Plethoran Græci vocant: {nos plenitudinem, & succorum redundantiam
dixerimus.} Vbi vero vel flaua bili, vel nigra, vel pituita, vel serolis humoribus refertum corpus
iam fuerit, eum habitum Cacochymian (quasi succorum vitium dicas) non plethorā nominant.

Ergo plethora tum sanguinis missione curatur, tum frequēti balneo, tum exercitatione, tum fri-
ctione: præterea digerentibus medicamentis: & præter hæc omnia inedia: de quibus in iis, quæ
de sanitate tuenda sunt prodita, dictum abunde est. Succorum vitium purgatione, quæ cuiq; su-
peranti

A. 1. 61. 11.
C. 1. 41. 8.

Aperanti succo sit accommodata, corrigitur. Dictum porrò & de hac est in ea parte operis de sanitate tuenda, quæ de præcauendis morbis est instituta. Illinc igitur huc ea transferas, oportebit, ac consideres, quò nam ex ipsis vti maxime expediat. Siquidem, si iam febricitet æger, nec exercitatione vacuare exuperantiam licet, nec vnctione, quæ excalfaciat: sed nec multa frictione, nec balneo: immo sanguinis missione vnà cum inedia, vel purgatione aliqua. At, si non dum febricitat, omnibus iam dictis vtare, optimum quodq; ad id, quod instat, deligens. Illud enim patere vel me tacente arbitror, eum, cui crura phlegmone laborant, non esse vel ambulatione, vel cursu exercitandum: sed nec stare illi esse iubendum: immo sedenti plurimum fricari, mox manuû motu exercitari illi est satius. At, sicui in supernis partibus cœperit pars aliqua phlegmone tentari, huic motus ex inambulatione aut cursu est salutaris. Similiter & frictio his quidē ea potior est, quæ cruribus adhibetur: illis, quæ in supernis partibus administratur: quippe præceptum in contrarium reuulsionis, in omnibus talibus cōmune est. Neq; igitur, cum vel circa sedem, vel aliquam huic vicinam partem initium phlegmones incidit, aluum deiciēs: neque, cum in vesica, vel cole, vel renibus est cœpta, pharmaca, quæ vrinās prouocent, bibēda dabis: nec, si mulieri in vtero, vel pudente infedit, menses huic prouocabis: sed ad partes, quæ maxime longinquæ sint, semp reuulsionem facies, æstimata scilicet tum phlegmones magnitudine, tum corporis totius statu. Nam, si plurima succorum abundantia sit, nec exercitatione, nec balneo sine periculo vtare: sin exigua sit, licet, & per hæc vacues. Cæterum (quod dixi) hæc tum in ea parte operis de sanitate tuenda, quæ morbos præcauet, sunt scripta: tum in libro, qui de plenitudine inscribitur: tum in iis, quæ de phlebotomia, siue incidenda vena: tum, quæ de purgantium medicamentorum facultatibus edidimus. Sed, quod ad commune faciendum tantum de iis sit satis, nunc etiam abunde est dictum. Itaq; ad propriam de phlegmone disputationem nunc est veniendum. In qua primum merito verba faciemus de phlegmone, prout ab affectu partis, cui insidet, oritur: quippe satis cōstat affectum illum principio tibi esse sanandum: mox, quicquid iam phlegmones est factum. Porro interim iisdem præliis ambo tolluntur: veluti cum ex flatulento spiritu & densitate particulæ dolor quispiam est ortus. Hoc enim casu eorum, quæ modice calefaciunt (quæ etiam Chylastica, id est relaxantia siue remittentia vocamus) vsus est commodus: vt qui pariter & cōnientia corporis laxet, & flatuosum spiritum tenuet, & quod phlegmones iam cōflatum est, digerat. Ad eundem modum, & si ex frigido dominante intemperies sit oborta: nam tunc quoq; calefaciendo non solum intemperantiæ, sed etiam phlegmonæ, vnà medeberis. Itidem, si calor vehementior intemperiem fecit, refrigerantibus præliis ambo lites: siquidem intemperantiā contraria semper requirit: Vacuatur autem, quod impletum est, non modo medicamentis iis, quæ digerunt, sed etiam, quæ adstringunt & refrigerant. Magis q; profectò ad incipientes phlegmonas frigidis adstringentibus q; quàm iis, quæ digerūt, est vtendum: atq; etiamnum magis, vbi crassum, quod cōfluit, non est. Sed, si sanguis in particula, quam phlegmoneprehendit, vehemēter est impactus, non est amplius repercutientibus vtēdum: sed tum digerere est tempestiuum. Vbi autē ex animalis pūctu morsu ue dolor incidit, duplex sedandi doloris ratio est, vel virus ipsū vacuando: vel, quod dolorem excitat, alterando. Sanè vacues id eorum medicaminū ope, quæ vehementer attrahunt: alteres iis, quæ sunt contraria, id q; vel qualitatibus, vel tota substantia. Monstratum nanque est in libris de medicamentis quædam esse totis substantiis inter se contraria: quædam solis qualitatibus. Sed & illud indicatum eque est, quod eorum, quæ contraria qualitate sunt, methodus quæpiam sit: eorum, quæ tota substantia sunt aduersa, methodus non sit, sed omnia sint per experientiam inuenta. Tu igitur, quæcunq; methodo curandi explorentur, hinc discēs: quæ experientia tantū deprehendit, ea in iis operibus, quibus de medicamentis agitur, sunt collecta, vno, quod de facultate eorum inscribitur: altero, quod de compositione: & tertio, quod de facile parabilibus inscribitur. In quibus operibus ostendimus, quæ nā ex sola experientia: quæ nam ex sola ratione: & quæ nam ex ambabus, inuenta sint pharmaca. Ergo methodus, quam hoc opere tradere institui, in doloribus vniuersis, qui vel ex animalium medicamentorum ue noxa excitantur, duplicem indicationem habet, nempe eius, quod dolorem creat, vacuationem, atque alterationem. Vacuant id tum calfacientia omnia: tum quæ citra calefactionem vehementer trahunt, veluti & cucurbitulæ, & caua cornua quædam, quibus nō nulli cucurbitularum vice vtuntur. Sunt autem, & qui ore suo virus extrahunt, ægre videlicet particulæ admoti, ipsam quæ labiis complexi. Huc sanè pertinet & cauterium, & medicamenta, quæ cauteriis similiter escharā efficiunt. Atque hæc omnia totam eius, quod infestat, substantiam exinaniunt. Alterum auxiliorum genus est eorum, quæ qualitatem per contraria alterant, scilicet exhibentibus nobis, si vehementem calorem eger vel in ipso demorso loco, vel in toto corpore sentiat, auxilia refrigerantia: sin frigus sentiat, calfacientia. Docuimus autem vtraque in iis operibus, quæ de medicamentis sunt scripta. At tales quidem omnis phlegmones communes medicationes sunt: variantur autem pro laborantium particularum ratione. Etenim id iam quoque ostensum est, vbi de vlcerum curatione egimus: nec longo sermone est opus ei, qui meminerit eorum, quæ ibi sunt dicta, sed sat erit paucis ea transcurrille.

METHODI MEDENDI

Indicationes tum ex Similaribus partibus, tum ex Instrumentariis, in Inflammationum curatione præberi.

CAP. 7.

VNa itaque indicatio ex ipsis similaribus accipitur partibus: altera ex instrumentariis. Et ea, quæ ex similaribus sumitur, modum calfaciendi, refrigerandi, siccandi, ac humectandi determinat: Quæ vero ex instrumentariis, tum locum ipsum, per quem vacuare oportet: tum vacuationis rationem: tum vero in similis speciei medicamentorum usu ipsum pluris minoris que modum. Ac de similarium quidem partium indicatione supra, ubi de ulcerum curatione est tractatum, diximus: de instrumentaria vero hic agemus.

In Inflammationibus Vacuandi indicationem, indicationem Refrigerandi superare, contra in Erysipelatis.

CAP. 8.

Cum enim phlegmone duplici ratione à natura recessit, & quæ pars ipsa multo sanguine sit referta: & quæ eadem sit calidior: utique vacuationis indicatio refrigerationis indicationem vincit: contra scilicet, quæ in erysipelate, in illo namque refrigerationis indicatio magis urget, quæ vacuationis. Quamvis utriusque affectus curandi commune caput est infestatis humoris vacuatio. Ideo quæ post, quæ refrigeratum erysipelas est, ad ea, quæ digerunt, medicamenta convertimur. In phlegmone igitur tantisper est refrigerandum, quatenus & ad incrementum eius sistendum inhibendum quæ est com modum. Etenim, cum immoderatus calor dolorem excitet, atque etiam aliquid ad egram partem attrahat, utroque nomine augescere phlegmonem accidit. Ergo, quantum refrigerationis phlegmone, seu calido morbo, congruit, tantum certe & incrementum eius inhibere est aptum. Idem parè gratiam præstat, & cum repercutit id, quod affluit. Quod vero ex eo, quod in laborante membro continetur, quidpiam in proximas partes repellit, hoc phlegmones iam genitæ medela est. Simili modo, & quæ modice exalfaciunt, utraque interdum ratione profunt, quoniam & dolorem sedent, & quod contentum in laborante particula est, digerant: quippe dolorem mitigando, augeri phlegmonas vetant: digerendo, quod earum iam conceptum est, sanant.

Quatuor esse in totum Vacuationum genera, quæ ex Partium natura oriuntur.

CAP. 9.

Quoniam igitur momentum omne curationis laborantis phlegmone partis, in redundantis in ipsa sanguinis vacuatione consistit: vacuatio autem hoc genus affectorum excogitata est duplex, aut translato ad alias partes, qui in ægra continebatur sanguine, aut foris à corpore expulso: satius profecto est utraque uti, observantibus diligenter, nequa ex accidenti læsio sequatur. Ergo, cum gemina sit dictarum vacuationum utraque, quadruplex in uniuersum nascitur vacuationum auxiliorum genus. Translationis enim sanguinis ad alias partes alterum genus est, ubi ipsa pars, quæ phlegmone laborat, sanguinem abigit: alterum cum ea, quæ integræ sunt, ad se trahit: Eius autem, quæ extra corpus educit, alterum sensibilibus effluxibus: alterum ratione tantum contemplabilibus perficitur. Atque id, quod sensibilibus effluxibus peragitur, aliàs per ipsam fit partem, in qua phlegmone residet: aliàs per ea, quæ una cum hac aperiuntur. Proinde etiam dissectionum notitia ad eiusmodi consortium intelligendum est opus. Ergo tum hæ indicationes phlegmonarum curationem immutantes à partium natura præstantur: tum supra has, quæ tum ex politu, tum figuræ ratione sumunt: quas nimirum laborans locus, quæ instrumentalis, non quæ similis est, indicat.

De reliquis Indicationibus Similarium & Instrumentalium partium communibus.

CAP. 10.

Sunt etiam aliæ, quæ tum instrumentalium tum similarium communes sunt: sicuti cum actionem earum inspicimus: præterea an rara pars sit, an densa: an acuti sensus, an hebetis. Ad quæ omnia intentum esse oportet, qui recte curare studet.

Ratio Reuellendi, Deruandi, ac omnino Vacuandi Inflammatas partes, iecinoris exemplo.

CAP. 11.

Quoniam vero (ut semper testati sumus) non satis est ipsa tantum uniuersalia nouisse, nisi quis etiam in particularibus se exerceat, ita utique & nos nunc faciamus, non tantum omnia particularia percurrentes, sed ea tantum, quæ nobis satis esse lectori videbuntur. Proponatur itaque iecur iam phlegmonem contrahere incipere: tum, quæ nam mali eius commodissima sit curatio, queratur. Omnium ergo primum ab iis, quæ retuli incipiens, an totum corpus inani ratione indigeat, considerabis. Quod si indigere inueneris, mox ægri virtutem æstimabis, possit ne semel iustam vacuationem tolerare. Primum ergo valida esto. Ab hac æstimabis ætatem. Nam, si puer sit, quæ per dissectam venam fit (ut supra est monstratum) vacuationem non feret: verum, cum pubertatem attigerint, iam pueri missionem sanguinis tolerant. Ergo pariter tum reuellendus, tum educendus, qui ad iecur fluit, sanguis est, interna in dextro cubito infecta vena propterea, quæ & è regione, & ampla via cum vena, quæ caua dicitur, societatem habet: hac non apparente, media secanda est: quod si necesse ostenderit, reliqua ac tertia est incidenda. Modum vero vacuationis tum ex redundantie modo, tum ex reliquis, quæ in superioribus diximus, inuenies, ætate, natura, tempore anni, regione, & consuetudine: tum ante hæc, ipsa laborantis virtute. Hæc enim in omnibus sunt communia. Illud vero, interna ne, an media, an humeralis vena, secanda sit, an ea quæ iuxta malleolum est, an quæ in poplite, id vero ex laborante particula indicatur. Ac definitum iam est in iis, quæ de incidenda vena scripsimus, de vacuationibus id genus omnibus: dicetur quæ nunc, quantum sit ad rem propositam opportunum: primum quæ hoc ipsum, Non esse scilicet solum illud

fatis,

† In antiquis codi. quibusdam addit *ῥεοῦσθαι* i. feruente.

† *διὰ τὸν συναναστοματισμὸν αὐτῆς.*

† Addendum ἢ *ἀνασθῆναι*, id est, an sensu careat

κατ'εὐθερίαν, i. e directo.

A. lib. 1. c. 5. § 11.

A. lib. 1. c. 1. § 11.

A fatis, quod vacuandum sit, inuenisse: veluti sentiunt, qui amethodon feciam colunt: quibus nulla de laborantium locorum differentia habetur ratio. Non enim ratio solū, verū etiam vius ipse indicat aliam alij parti vacationem congruere. Siquidem ex iis, quibus oculi tentari phlegmone cœperant, non nullos sola purgatione per aluum, vno die sanatos vidisti. Quam rem si quis facere in iecinore, cū phlegmone laborare incipit, tentet, maximam excitabit phlegmonē, æque vt, si, cum renes aut velica phlegmone tentari cœperint, quæ vrinas cient, medicamenta exhibeat: aut, si cū vterus phlegmone laborat, menses deuocet: siquidē longissime † a tēta fluxione parte, † quod redundat, reuellere, nequaquā ad eam trahere cōuenit. Hac itaq; ratione, nec si ventriculum aut intestina phlegmone occupare iam cœperit, medicamine, quod aluum deiciat, vt conueniat. Eandem cum his indicationem & vterus fortitur, sicuti cum vrinæ valis, pudenda. At vomitu vti pū dibundis laborantibus, {in diuersa} reuellens auxiliū est, Græci Antispasticon vocant. Eādē ratione in omnibus, quæ circa caput accidunt, medicamentum, quod aluum deicit, ad contrariū auertit. Siqua vero circa fauces, & palatum, aut linguam, aut denique in ore, phlegmone laborare incipiant, in his omnibus cauenda sunt, quæ pituitam per os euocant, Apophlegmatismus vocant: quippe cum id simile sit, ac si deicere aluum intestinis ægrotantibus velis: aut vrinas mouere, cū renibus aut velicæ sit ægre: aut vomitum lacessere, cum partes stomachi sint afflictæ.

† A parro, quæ fluxione tentantur incipiat.

Interpretis Verba.

B Satiū igitur sit, vbi partes, quæ in ore sunt, phlegmonem accersere incipiant, deriuare ad nares. Pari modo venam quoq; vbi hæ partes sic laborant, incidere humeralem in manu: si ea non cernitur, mediā. Vbi iecur, pectus, pulmo, aut cor sic afficiuntur, internam: In angina, quam synanchen græce vocant, primas in manibus: secundas eas, quæ sub lingua habentur: At iis, quæ in occipite sunt, afflictiis, etiam eā, quæ in cubito est, nec nō eam, quæ habetur in fronte: Renibus vero, & velicæ, & pudendo, & vtero sic habentibus, eas, quæ in cruribus sunt sitæ, ac potissimum, quæ circa poplitem sunt: sin minus, eas, quæ iuxta malleolos: Ac perpetuo quidē in omnibus eā, quæ ē directio est: vbi iecur phlegmone inuadit, quæ in dextra sunt manu: vbi lienem, cōtra. Itaq; statim prima vacationis diuersitas pro particularum diuersitate variatur: constat q; communē indicationem non magis esse vtilitatis, q; noxæ, causam. Siquidem, q; vacuandum sit, id communis indicatio est: vnde autem, aut quomodo, vacuatio sit facienda, id eger ipse docet locus. Ad eundē nanq; modum, vbi pectus, aut ventriculus, aut partes circa collum caput ue, phlegmone laborat, excogitatum est artus vincire. Quippe ipsum, quod phlegmone infestatur, vincendum non est: sed, si in manibus phlegmone est orta, crura: sin in cruribus, manus.

C *Ratio Refrigerandi ac Adstringendi inter initia Inflammatis partes.* *CAP. 12.*
Sed nec refrigerare inter initia, aut adstringere, citra laborantis particulæ indicationem, vtilitatis magis, q; noxæ, sunt causæ. Nam in particulis, quæ circa artus sunt, sat fuerit etiam spongiam vel ex frigida aqua, cui paululum aceti sit immistum, vel ex aqua sola madentē, imponere: sicut etiam ex vino aliquo austero: In iecinore vero, si phlegmone laborare cœpit, nemo compositionis his vtatur: imo, nec si melino infundas, aut myrteo, aut mastichino, aut nardino, aut lentiscino, aut aliquo oleo, quod adstringat; aut etiam alio quopiam, cui absinthium sit incoctum, ne horum quidem vllum conueniet frigidū, sicut nec vllum cataplasma frigidum. Sed, si mala præcipue cotonea vino incoquēs, cataplasma ex eo præparaueris, si iecur phlegmone laborare adhuc incipiat, ne id quidem admovebis frigidum: veluti nec oleum, vt dictum est, præparatū, vel oculis, vel oris partibus, sicubi hæ tentari phlegmone incipiant. Auri vero, etiam si acetum cū rosaceo infundas, nil offendes. At non est hoc oculis phlegmone laborantibus vtile, veluti nec medicamen, quod ex moris conficitur, aut aliud quippiam eorum, quæ Stomatica græce dicuntur: sunt enim eiusmodi omnia oculis tristia, quanquam genere sunt ex iis, quæ indicentur. Glandulis vero phlegmone tentari incipientibus, sæpe solum oleum calens sat fuit.

D *Quid differat Vicitus ratio, iecinore, aut Ventriculo, & Glandulis, ac Artuum partibus inflammatis.* *CAP. 13.*
Sed & reliquis vicitus ordinandus iis, quibus glandulæ aut etiā aliquid circa artus phlegmone tentatur, vnam tantum indicationem habet, quæ tot ac talia exhiberi iubet, quot & qualia facillime cōcoquantur. Nec quicq; refert, alicam, an pullanam, an mulsam, an punicum, an malū, an tale quippiā exhibeas. At, si iecur phlegmone infestatur, exquisitissimo vicitu est opus: æque profectō, & si vētriculus sic laborat. Quippe munus eorum toti animali est commune: accedit q; omnibus animalis partibus maximum incommodum, siue non probe concoctū alimentum sit, siue non rite in sanguinem conuersum. Artuum vero partes tm̄ alimenti capiunt, quanto sunt nutriende. Quo fit, vt, siue ex malo, quod probe in ventriculo sit concoctū, alimētum ad eas perueniat, siue ex alica, siue ex pullana, non multum interlit. In iecinore vero quantum referat nutrimentorum differentia, tum q; maximam in vtrinq; partem vim habeat, hinc discas, licet.

Quæ Nutrimenta medicamenta ne assumpta Iecinoris inflammationi conueniant. *CAP. 14.*
Nam expelli e iecinore oportet, quicquid in eo tū amaræ bilis, tū sanici, quæ ex phlegmone provenit, est collectum. Id vero fieri nequit, nisi & vasa, quæ sunt in viscere, detergeantur, & meatus, qui ad ieiunū pūnet, sit apertus. Ergo alica, cū & huic inhæreat, & vasa, quæ in viscere

Septima Classis.

IIIIII in sunt

sunt condita, obstruat, præcipue quæ eorum ora, & bilem in intestinum descendere, & alimentum in E totum corpus digeri prohibet. Poscit ergo tum iecur ipsum, tum os meatus, qui bilem transmittit, cibos & pharmaca, quæ obstruata recludant. Talia vero omnia sunt, lenta quidem minime, sed tenui consistentia, & qualitate mordente. At vero ab his, utpote mordentibus, phlegmonæ irritant. Quare, quæ citra morsum ea detergeant, indigemus, cuiusmodi si multa est. At nouimus dulcibus omnibus tum iecur tum lienem maxime intumescere. Superfunt igitur, quæ culpa vacant, ut in cibis pituitosa: quippe quæ sine morsu deterget, ut in pharmacis oxymeli aqua mistum. Nam & purnicum, & malum, & cetera, quæ adstringunt, dum bilis meatus os arctant, bilem ipsam excerni prohibent: atque inde iccinoris phlegmonis sunt incommoda, præsertim iis, quæ in cauo visceris consistunt: quibus ad angustias, quas facit ipsa phlegmone, etiam ea, quæ ex adstringentibus & lentis fit cibus, accedit. Ac, quæ mordent, ea phlegmonas ipsas, quæ in cauo sunt visceris, magis irritant. quippe iis, quæ in gibbis eius consistunt, mutata iam veniunt ea, quæ assumpta sunt, ita, ut nec, quæ adstrictoria sunt, similiter adhuc adstringant: nec, quod mordens est, similiter mordeat: nec, quod propter lentorem in angustis valis hærebat, similiter etiamnum maneat lentum. Est autem his occasio mutationis duplex, & quæ prius sunt concocta: & quæ sanguini, qui in iccinore prius erat, sunt admixta. Cauo autem iccinoris phlegmone obfesso, protinus etiam venas, quæ in mesenterio sunt, F vnâ phlegmone laborare est necesse, quando ex ea, quæ ad portam pertinet, omnes sint ortæ: protinus etiam, quæcunque osculis earum incidunt, vim suam ostendunt.

Aduersus Attalum Methodicum, qui Theagenem Cynicum inflammatione Iccinoris laborantem relaxantibus cataplasmatibus enecat.

CAP. 15.

AN tibi ad communem phlegmones curationem parua ex particulis ipsis accedere differentia videtur? Mihi sane maxima videtur: quauis enim, qui Thessali stupiditate æmulantur, communem indicationem solam satisfacere putent. Placet autem nunc ad memoriam reuocare tibi egregiam eorum curationem, quam Theageni philosopho Cynico adhibuerunt: siquidem hanc norunt plurimi propter viri famam, ut qui publice disputare in Traiani circulo quotidie sit solitus. Erat, qui hominem curabat, vnus ex Sorani discipulis, nomine Attalus. Is imposuit quotidie iccinori cataplasma ex pane & melle, haud intelligens viscus hoc mediocriter adstringi debere propterea, quod animalibus altricis facultatis principium sit, & venosum ab hoc oriatur genus. Ita igitur viscus curauit, sicut bubonas, meris scilicet & solis relaxantibus vtens, cataplasma ex pane & melle imponens: ac prius oleo calente perfundens: tum sorbitione ex alica cibans. Hac namque tria ferme omnibus nunc amethodis istis Thessaliis ad acutorum curationem sufficiunt. Visum autem est mihi seorsum G Attalum monere, ut adstringens aliquid admisceret, nec nudis vteretur relaxantibus. Ac de visceris quidem natura nihil eram homini dicturus (id enim fuisset plane alino fabulam narrare) sed, quod me persuasurum homini arbitrabar, & cui omnes homines facillime assentire video, id tamen exposui, nempe longam experientiam medicos docuisse, ut iecur mista medicamentorum materia curarent: eam autem scriptam inuenturum in iis medicorum libris, qui sint de medendi ratione conscripti. Si ergo, inquam, tibi videtur, misce aliquid de absinthii coma diligenter tunsa, cataplasmati: oleo vero, totius herbe aliquid, modice id, quemadmodum alios cernis in illo incoquentes. Cataplasmati vero Myrobalani pieisma, & irim, & iunci florem, aut narditidos herbe radicem, aut cyperi miscebis: non inutile sit & ex vino ea aliquando præparare, ac miscere interim etiam de fece ipsa: quin etiam aliquid adstringentium incoquere malorum, cuiusmodi cotonea sunt, & quæ vocantur struthia, præterea, quæ Romæ abundant, vocata cestiana. Oleum vero (nam id quoque video miscere te) non quodlibet esto, sed vel hispanum, vel histricum, vel crudum, vel lentiscinum, vel myrteum, vel melinum, vel nardinum vnguentum. Porro aliam materiam plurimam esse dixi eorum, quæ incoquere liceret: nam & lentisci tenera germina, & myrti, & rubi, & vitis præsertim syluestris, à qua œnanthen vocatam decerpimus. Non alienum etiam sit & atticum H hyslopum tum cataplasmati, tum etiam ceratis miscere: nam & cerata quæpiam illi ex eiusmodi materia imponere post cataplasma suasi. Et apponere illi tentabam vniuersam deinceps curationem, quod scilicet etiam, quæ à medicis græce Epithemata vocantur, ex mista materia componeret. Nam melius, inquam, est sublato cataplasmate aliquid super viscus esse. Attalus vero sermonem meum interpellans, Nisi multum (inquit) tibi tribuerem, nihil horum tolerassem: nam, in quibus superiores medici passi naufragia sunt prius, quam vera medicina inuenta à nostris esset, ea mihi veluti ignaro suades. Ceterum tres (inquit) aut quatuor dies sine me Theageni ex mea sententia prospicere, & sanum eum penitus conspicias. Sed quid, inquam, si, cum subito pauci & hi lenti apparuerint sudores, moriatur, recordaberis ne, quæ promiseris, ac de cetero sententiam mutabis? Atque Attalus post hæc abiit irridens, nec quicquam præterea respondens, sic, ut neque de alica quicquam contulere permitteret: sed nec quod ex iis, quæ vrinas cient, miscere aque paulo post oporteret, quod scilicet iccinoris gibba essent afflicta. Nam, sicuti iccinoris cauum per aluum purgatur, ceu paulo supra diximus, sic gibba eius per ea, quæ modice urinas mouent, cuius generis est apium. Procedente autem tempore, ubi phlegmone iam concoquitur, etiam valentioribus utilicet, assaro, & celtica nardo, & phu quod uocant, & petroselino, & smyrnio, & meo: sicut etiam per ventrem uacuare,

* γυμνασίῳ,

* αἰσπῆ, legunt antiqui codi.

A. li. i. f. 45.
c. i. fol. 9

Avacuare, si cauum afficitur, cnico cibis admisto, & vrica, & mercuriali, & epithymo, & filicula: omnibus præterea, quæ modice aluum deiciunt. Magis quæ in remissionibus tum his ipsis audacius quæ ante vtendum, tum vero quæ his sunt valentiora, partim in pullana incoctis, partim tunlis, ac in mollissimum puluerem redactis: exhibenda vero & hæc sunt vel ex pullana, vel ex aqua. Ego nanque etiam filiculæ aliquid in pullana aliquando incoxi, & nigri veratri corticem. Etiam clystere vacuare eos conueniet, inter initia vel sale, vel nitro, vel aphronitro aquæ mulsæ admisto, contentis: in remissione vero, potissimum quæ siquid scirrhum relictum est phlegmone est, etiam valentiora medicamenta miscētibz: quippe hyssopum eo casu aquæ incoquimus, & organum, & colocynthida, & minus centaurium. Opportunissima nanque ad scirrhum sunt iecur & lienis, † siue quis parum habita de his ratione, glutinoso cibo vtatur, sicut Attalus, qui Theageni quoti die alicam exhibuit: siue nihil offerat, ‡ quod tum obstructions eximat, tum detergeat. Verū, quod contigit Theageni, vel potius Attalo, dici est tempus. Vt enim promiserat post tres dies daturum se hominem à iecinoris phlegmone liberatum, tum magis, quæ prius, calente oleo viscus plurimum perfudit: tum cataplasmate frequentius est vsus, hac diligentia feliciter sibi curationē cessuram sperans: respondit quæ percontantibus de Theagene gloriabundus, meliora. Ceterum contigit, prout ipse prædixeram, subito hominem mori. Et, quod omnium maxime dignū risu fuit, ducebat Attalus secum ex iis, qui de hominis statu rogassent, quosdam, quibus ostenderet adeo recte eum se habere, vt iam esset lauandus: letus quæ cum multis ingressus est domum, in qua iacebat: cum Theagenem mortuum quidam ex amicis, qui & Cynici quidam erant, & alioqui philosophi, lauare ex more pararent. Itaque etiam vsque ad mortuum accedere, id quæ vnā cum spectatorum cœtu Attalo contigit: vt pote cum nemo intus lugeret. Nam Theageni nec seruus erat, nec puer, nec mulier, sed cum eo soli amici philosophantes versabantur: qui iusta quidem mortuorū, citra tamen omnem luctum obibant. Atque hanc laudem Thessalius asinus inter multos spectatores est consecutus, ostendens explicatum à phlegmone hominem intra quatuor (vt pollicitus est) dies. Reliqui vero methodici, cum innumeros quotidie iugulent, adeo rationē curandi mutare adhuc nolunt, vt, quæ à medicis sunt scripta, qui artis operibus vere insudarunt, ne vel semel experiri velint: adeo indelebile vitium vehemens ignorantia est, præsertim si cū superbia sit coniuncta. Eiusmodi igitur in omnibus sunt Thessali sectatores.

Quaratione viscera quedam facile Scirrhis affectibus corripiantur: ac de ea, quæ à

Paulo præbetur, Indicatione.

CAP. 16.

NObis autem vitandi eiusmodi errores sunt: ac, si nihil aliud suppetat, saltem ipsi experientie credendum. Id quod ipse perpetuo suadere non desino iis, qui circa rationem parum sunt exercitati. Nam melius profectò iis est, quā & rudes sunt, & simul in rationabili methodo, quam nos nunc prodimus, minime exercitati, vt nihil penitus ex ratiocinando accipiant. Quippe iecinoris substantia scirrhis maxime opportuna est, vt pote quæ naturaliter lutosum quippiam continet, veluti medicus quidam nostri temporis per iocum dixit. Lienis vero rarior substantia, quæ iecinoris est, ceterum crebrius scirrhis vitis affligitur, propter nutrimenti, quo vtitur, speciem. Monstratū nanque est, quod crasso nutritur sanguine, qui veluti limus purioris est, facillime quæ nigra bilis efficitur: ideo quæ etiam ipsum, melancholicum {siue atrum} appellamus excrementum. Atque hæc duo viscera scirrhis tumoribus tentari, vel experientia ipsa clare indicat. Renes vero, quod cōditi sunt, tactum effugiunt: ceterum hos quoque facile scirrhis deprehendi ratio docet, atque idcirco nephritidas † alias facile solubiles, alias ægre solubiles esse: ‡ cum renes, ambo habeant, quæ in viscerum vtroque prædicta sunt inesse, tum substantiæ qualitatem, tum excrementorū, quæ per eos dilabuntur, uitium. Quo fit, ut, qui crassi succi cibis uescantur, calculi uitio corripiantur. Ergo, quāto trium horum viscerum scirrholi affectus difficilius curantur, tanto magis esse sollicitos oportet, D ne quis in hos incidat. Maxime autē (ut dictū est) incidunt, qui ipsis phlegmone uexatis, iis cibis utuntur, qui crassos lentos quæ succos efficiant. Quin etiam eiusmodi affectuum medicamina inter omnes conuenit ea esse, quæ dissecant, & dissoluant, & frangant: quæ utique ex eorum sunt genere, quæ obstructions eruant & detergent, ceterum uiribus valentiora. Horum non solum materiam, sed etiam facultatem in opere de simplicibus medicamentis exposuimus. Itaque etiam breuior nunc ero, contentus generali facultate, & sola methodo, cum paucis exemplis. Nam, cum & facultatum materiam iam habeas preparatam: &, quæ curationem unā coindicent, sint prædicta: nihil nunc aliud superest, nisi ut proprias cuiusque morbi indicationes commemorem. Coindicantia igitur uoco uirtutem, naturam, ætatem, anni tempus, regionem, & consuetudinem, & si qua sunt id genus alia. Proinde de ea, quæ à particulis sumitur, indicatione deinceps dicam, initio ab ea, quæ à iecinore sumitur, sumpto. Quippe, ubi id phlegmone laborat, quæ extrinsecus applicantur, ea mistæ esse facultatis debere postulat, id quæ non in generatione phlegmones modo, (est enim id omniū phlegmonarum cōmune: quā etiam, si quis repellentibus tantū illo tēpore utatur, non peccet) sed etiā cum nec affluat amplius quicquid, nec repelli, quod in laborante particula continetur, possit. Accidit enim hoc quoque multis de causis. Sanè in principio tum parum est, quod affluit: tum magna ex parte tenuius: tum partis ipsius, quæ recipit, uirtus non nunquā ualentior,

Septima Classis.

IIIIII iij utpote

* Polypodio

Non nulla qui dem exēplaria grāca habent, vt Linacæ veritū impressū autē hoc modo. † Si qs ipse neglexit, vt pūmōto cibo uis fuerit, Attal⁹, q Theageni quonā alicam exhibebat, ac nūc ui

* ἀναλογισμῶν.

† Græci codices legūt, τὰς μὲν αὐτῶν τοπαμάτων ἔναι, τὰς δὲ πάντο δὲ σκληροῦς, i. alias oīno insolubiles, alias ægre admodum solubiles.

utpote non dum lassata: tum quod in afflicta continetur parte, nō dum violenter impactum. At, E cum phlegmone in vigore suo iam consistit, tum multus in ea sanguis continetur, is que crassior subinde, ac vehemēter impactus: tum virtus partis iam est debilior: quam alioqui valentē requiramus, quod scilicet à se superuacua amoliat: quandoquidem haud satis potens est adstringentiū praelidorum vis, quæ sola totum efficiat. Quippe potest hæc cogendis ac cōstringendis, & veluti densandis, & exprimendis corporibus, quæ tenuiora consistentia sunt, ad circumpositas partes expellere: ceterū, nili etiā laborantis particulæ virtus aliquid auxiliæ, nihil adeo magnū efficiat. Tunc igit, quæ à phlegmone sumat, vna dūtaxat agendorū est indicatio: hanc græce Diaphoresin vocat (latine digestionē euaporationē ue dixeris): hæc humorē, qui in phlegmone obseffa parte cōtinetur, p meatus insensibiles educit. Quæ vero ab ipsa sumitur parte, ea in diuersam nos partē trahit, scilicet robur eius seruari iubens. Coeuntibus igit vnā cōtrariis indicationibus, compositū quoq; esse medicamentū oportet. At, femur si phlegmone laboret, aut tibia, aut cubitus, aut brachiū, aut, qui in his sunt, adenes, causa nō est, cur horum robori consulas. Hęc tibi communis indicatio sit in omnibus iis partibus, quarum munus eiusmodi est, vt toti corpori sit ex vfu.

Vnde Similia dissimilia ue Medicamenta, Maioris quoque ac minoris ratio,

Locus vacuationi aptus, indicentur.

CAP. 17. F

ERgo nec lienem tantum relaxantibus curare oportet, cum hic quoque ex iecinore, quicquid limosum & melancholicū est, expurget, propterea scilicet, q̄ ex eo humore nutritur. Idcirco, quoties obstructio quædam in eum incidit, aut phlegmone, potissimum cū scirrhus sit, tum ea, quæ obstructiones eximant, tum quæ dillescent, vehementiora exigit. Nam, quale medicamentū iecinori est absinthium, tale est lieni capparidis cortex: quale rursus iecinori, quod vocant eupatorium, tale est lieni scolopendriū. Siquidem similia genere medicamenta, ambo viscera postulant: ceterum tanto valenti ora lien, quanto crassiore vitur alimento. Scirrhus igitur laborantibus ipsis conuenientia nutrimenta sunt genere quidem eadem, sed maioris minoris q̄ ratione differentia. Itaq; & si capparidis ex oxymelite edatur, vtilis sanè est vtriq; visceri, ceterum nec ipsa pari modo nec similiter mistum habens oxymeli: nam & ipsa copiosior, & ex minus diluto oxymelite lieni erit vtilior. Atq; hæc differentia est, quæ ex maioris minoris q̄ ratione accepta est. At similitum genere, vel specie, aut quomodocunq; dixisse libet, præsidiū, ex actione & compositione indicatio sumpta est. A societate vero cum vicinis partibus, quod idem cum situ est, illa capiuntur, q̄ gibba iecinoris per renes expurgari oporteat: caua vero per inferiorem ventrem. In liene vero alteram duntaxat esse superflui vacuationem: cum, quæ per renes agatur, nulla huic visceri vacuando via pateat. Proinde, vbi phlegmone premitur, deiectionis id medicamētis tum detergemus, tum lacesimus, quod dimittat relaxet q̄ superuacua. Sanè duplex ratio est eiusmodi medicamētorum vsus. Cum partes superius positæ laborant, per ea, quæ eduntur ac bibuntur: cum inferiores, per id, quod sit per clysterem infusum. Quandoquidem, quæ eduntur ac bibuntur, eorum vis ante, q̄ ad inferiores partes perueniat, resoluitur: quæ infusa sunt, ea oīno ad ieiunum vsq; ascendere non possunt: immo, etiam si admodū nitaris, fortasse tenue tm̄ intestinum cōtingant. Ergo illud quoq; ex partium positura didicimus, nempe inferioribus intestinorum aliquid esse per clysterem infundendum: superioribus vero, atque etiam ipsi ventriculo, lieni, & stomacho, superne aliquid exhibendum. Voco hoc loco stomachum, gulam, quam proprie Græci stomachū appellant: non nunq̄ enim ita etiam vocant os ventriculi: veluti cum stomachice † anima linqui} alios quos dicunt. Verū gulæ, quæ proprie vocat stomachus, cataplasmata super spinam dorsī imponimus: † non autem ad pectus idem facimus, cum os ventriculi phlegmone vrgetur, siquidem spinæ gula superiacet, per collum & pectus deorsum vsq; ad ventriculum porrecta.

Quo pacto differenti Remedia indicet laborans Locus.

CAP. 18.

Neq; igitur hæc nouere, qui Theſſalum imitantur, ideo q̄ oēs vna ratione curant: neq; vtiq; illud, q̄ omne membrum phlegmonē laborans, nisi cutim sibi circūdatam habeat spissam, tenuis saniei foras aliquid dimittit, ac laxat. Eo fit, vt ex iis, quæ in ore, & naso, & faucibus, & stomacho, & intestinis, & ventriculo, & visceribus omnibus sunt, aliquid foras effluat. Ad eundem modum etiam ex interna facie pectoris, cum phlegmone premitur, excernitur aliqua sanies. Quemadmodum igitur lienis ipse, & iecinoris caua per intestina: gibba vero iecinoris, & renes, per vrinas purgantur: ita pectus, vbi interna eius phlegmone tentantur, per membranam, qua tegitur (Hypezocota vocant) aliquid in mediū sui pulmonum q̄ spatium transmittit: id autē expurgari per eandē, qua pulmo, viam debet. Dabimus igitur iis, qui sic laborant, medicamenta, quibus tenuatoria sit vis, quibus & viæ aperiantur, & quæ deferenda per eas sunt, dillescentur & ac dissipentur: † præsertim cum vel crasse consistentiæ sunt, vel glutinosæ, qualia in iis sunt, quos empyos vocant. Deligēda tamen ex iis sunt, (quādiu adhuc phlegmone inualeſcit,) quæ mediocria sunt: cum vero planè iam decreuit, aut penitus cessauit, & educi excrementa postulant, quæ valentiora sunt. Ergo mediocri in hoc genere est tum ptissanæ cremor, tum mulsæ: valentius autē & vrticæ semen, & mulsæ, in quam coniectum fuit paululum aliquid acrium herbarum, quales sunt origanum, & hysopū, & calaminthe, & pulegium, & illyricæ ireos radix. Quod si vel plus horum

* Διαπρόσθεσις, i. conformatio.

† συγκόπτεσθαι, i. syncope corripere.

† Non autē in parte anteriore, quemadmodum dicitur os & c.

A. l. 3. fol. 12. c. 6. fol. 3. f.

A horum admisceas, vel irin in mollissimū puluerem tunfam cribratam q̄ in mulsam immittas maxime incidens medicamen habebis. Ad eundē modum & quod ex marrubio conficitur, oxymeli, alia q̄ eiusmodi valenter crassiora excrementa, quæ in pectore & pulmone continentur, incidere possunt. Omnium eorum copiam inuenies in operibus ijs, quæ de medicamentis edidimus.

Differre Curationem Inflammationum, quæ in summo & in profundo sunt corpore: ac de Resulsione pro ratione partium librantium.

CAP. 19

Non solum aut iam dictam remedium differentiam ex laborate loco didicimus, sed etiam illud, q̄, quæ in summo corporis phlegmone laborat, ea proprijs phlegmones remedijs curantur: quæ in alto sunt corpore, si cum his aliquid acrium medicamentorum sit immistum, resoluuntur enim eorum vires, dum alte descendunt. Hac ratione & cucurbitula (strenuum planè auxilium) est inuenta, tum ut foras euocentur, quæ sunt in alto: tum ut eximantur atq; eruantur, quæ iam in scirrhum abeunt. Verum vitendum cucurbita in ipsa parte, quæ phlegmone vrgetur, inter initia non est, immo postea, q̄ totum corpus vacuaueris, ac necessarium sit, eorum, quæ in inflammata parte continentur, aliquid educas atq; eruas, aut etiam foras versus attrahas. Genèrandis autem adhuc vitijs, minime ipsis membris, quæ laborare incipiunt, sed ijs, quæ continuata his sunt, cucurbita imponi debet, auellendi in contrarium causa. Sic namq; ad māmillas cucurbitam imponimus, cum sanguis ex vtero profluit, defixo maxime in ipsis cōmunibus pectoris & vteri vasis, eius ore. Sic, si ex naribus sanguis profunditur, præcordijs maximas cucurbitas affigimus. Sic & omne aliud sanguinis profluuiū ad contrarium per cōes venas auertimus. Quemadmodum rursum & sanguinem (si ita est opus) attrahimus: liquidem cum menses euocare in animo est, in pube & inguine cucurbitam figimus. Præterea cucurbita in occipite defixa efficax est remedium ad oculorum fluxiones. Vacuari tamen prius totum corpus expedit: nam, si † refer-
tum sanguine corpus sit, in quacūq; parte capitis cucurbitam defixeris, totum ipsum implebis.

Ea Medicamenta ad curationem Vsurpanda, quæ noxiam qualitatem cum ea, quæ conuenit, admixtam non habent.

CAP. 20.

Ergo hæc omnis phlegmones communis indicatio haudquaquam similiter in qualibet parte administratur. Accedit ad omnia, quæ prædicta sunt, pro non leui portione, ipsius exhibendi medicamenti natura. Neque enim absolute, si adstringere incipientem phlegmonem est opus, quidlibet adstringens in ijs, quæ deuoranda sunt, adhibebimus, sed ea, quibus nulla corruptrix admista vis est. Nam chalcāthus inter præcipua adstringit, sicut etiam misy, & fori, & chalcitis, & diaphryges, & æs vstum, & squama eius & flos: verum hæc medicamenta deuorata, noxia sunt: quocirca stomaticis ea miscere tutum non est, defluit namq; interdum ex his aliquid ad ventriculum. Sed nec aloen probe miscueris ijs medicamentis, quæ phlegmones alicuius causa, quæ intus constitit, deuoranda sunt: quando huic quoq; admista purgandi vis quædam est. Ceterum, ubi phlegmone prorsus inclinauerit, si quis paululū aloes admisceat causa deijciendi ventris, qui prorsus non deiecerit, nihil ledet. Verum satius est mercuriali, aut vrtica, aut cnico, aut talium aliquo, aluum sic laborantium subducere. In summa vero, si quis eam, quæ à partibus ipsis præstat, indicationem adimat, nihil obstat, quo minus medicinam non sex mensibus, sed sex diebus totam perdisceas. At vero, nec si, quæ à partibus sumitur, indicationem adijcias, iam totum, quod exigitur ad curationem, habeas, nisi etiam methodos de medicamentis didiceris. Itaq; eas aggrediatur, oportet, quisquis consummate sanaturus est morbos. Nunc enim, si alicuius medicamenti meminimus, id (ut sepe testati sumus) exempli causa fecimus.

Quid differat Phreniticorum & Lethargicorum curatio: ac de Loco Principis anime facultatis, aduersus Thessali sectatores.

CAP. 21.

Sed adjiciamus adhuc ea, quæ de indicatione, quæ à partibus sumitur, non dum attigimus, Thessaliorum istorum sectam euidentissime præcipitantes: qui, cum nec dissectionis rationem attigerint, nec partium actiones vsusve norint, tamen, cum floccos carpentem quenquam cernunt, & festucas legentem, audent oxyrhodino caput madefacere, nostro exemplo. Nam cur, queso, non thoracem potius? siquidem indicatorie remedia inueniunt. Sanè fieri potest, ut etiā corde affecto phreniticus quis efficiatur. Empiricus namq; ab experientia se ait eiusmodi medicamentorum nactum inuentionem. Qui autem & hanc vituperat, & inquisitionem de actionibus refugit, huic vnde, queso, succurrit, ut pro thorace caput in phreniticis madefacere eligat? Ceterum, hoc ipsum oxyrhodinum, quod capiti phreniticorum applicamus, ceu quidam ex amicis dicere solebat, non solum amethodos istos Thessali sectatores, sed etiam reliquos manifeste redarguit vniuersos, quicūq; principem animi partem in corde statuunt. Nam, cum aliquando vidissem quandam ex Athenæi discipulis caput aceto & oleo mistis perfundentem, prohibui: iussi q̄ pectori admoovere id remedium: quippe læsam in delirio esse partem principem, eam autem esse auctore Athenæo in corde: itaq; non recte relicto pectore caput eum, integrum præsertim membrum, vexare, ei q̄ negocium facessere, nunc oxyrhodinum infundendo, nunc radendo, tū spondylium, aut serpillum, aut id genus aliquid admouendo, immo vero, si malum traheret, etiam ca-
storeum,

storeum, aut certe etiam cucurbitam: quippe id esse per simile, ac si, cui in femore phlegmone sit, E
calcaneo remedium applicet. Quin etiam in lethargicis nemo est, qui capiti non applicet auxi-
lia: nam & id vitium contrarium quodammodo secundum speciem phrenitidi est. Gignitur aut
cerebro patiente: in quo scilicet princeps animi pars relidet. Ergo, cum humor, qui in cerebro re-
dundat, frigidus est, insensibilitas immobilitas q̄ hominem opprimūt: cum vero calidus est, per-
petuus potius motus, vñ cum rationis noxa. Accidit enim, veluti monstratū in libris de his est,
ex frigore segnitia: ex calore immodicus motus: ex humioris vero vitio dementia. Itaq; inciden-
da in talibus affectibus vena est statim ab initio, si modo tam valens virtus sit, vt sine noxa missio-
nem sanguinis toleret: ac nihil prohibeat eorum, quæ de secunda vena retulimus, sicuti vel crudi
humoris copia, vel puerilis ætas, vel anni tempus, vel regio, in qua sit extremus calor aut frigus.
Atq; hoc quidem commune vtriq; vitio, & ei, quod cum sopore, & ei, quod cum vigilijs incidit.
Commune præterea vtriusq; est, vt oxyrhodinum in principio admoueas: nam repellendus à ca-
pite humor est, quisquis is fuerit. Quæ sequuntur, contraria sunt: nani, quæ cum vigilijs coniu-
cta sunt, ea lenire expedit: quæ cum immobilitate, excitare. Iure ergo, cum in summo incremēto
sunt, ijs vitij, quæ per uigilio & delirio infestant, perfusiones ex papauerum capitibus applicabi-
mus: odorem quoq; naribus obijciemus: ac narium alas intus, vel frontem, ex similibus medica- F
mentis illinemus. Quippe sopire ac stupefacere principem facultatem oportet, cerebrum scilicet,
quod supra modum incaluit, refrigerando: In contrarijs autem vitij excitare: ac noxij humoris,
qui citra putredinem, & citra febrem altos sopores inuehit, crassitudinem incidere, atq; exalface-
re. Tales nimirum altos sopores, Apoplexias, & Carus, & Catochas græce vocant. Quod si ali-
quando humor putrescat, vtiq; cum febre incidunt ea genera: vocatur q̄ morbus græce Lethar-
gus. Incoquētes igitur in aceto thymum, & pulegium, & origanum, alia q̄ id genus, naribus sic
affectorum admouebimus: quò vapor ad cerebrum sublatus, crassitudinem humoris dissecet.
Mox etiam palatum valentibus & acribus medicamentis vngemus. Ab his vero etiam sternuta-
torijs utemur. Tum capiti similes præsidiorum facultates imponemus, adauēta semper eorum tē
ad ipsum vsq; sinapi vehementia, si vitium diu trahat. Quin etiam cucurbitis ad vtrūq; vitium, si
diuturnum sit, utemur: item q̄ castoreo, quippe quod ipsum probe cōcoquit, si debito tempore sit
adhibutum. Quare hic ad communem rursus curationem redeunt lethargus & phrenitis †. Er-
go in eiusmodi affectibus manifeste redarguuntur, & qui Thessalum sequuntur, omnes, & quis-
quis medicus principem animi facultatem statuit in corde. Non solum enim iam dictorum præsi-
diorum destituentur copia, sed etiam, cui ea parti accommodabunt, non intelligent. Neq; enim, G
tanquam in ophthalmia, vel pleuritide, vel angina, tum ab ipso agro affectus locus sentitur: tum
nobis partim tactu, partim visu inotescit: sic in lethargo, & phrenitide, & epilepsia, & delirio, &
convulsionibus, & tetanis, præterea eo, quod proprie vocatur catoche, se habet. In quibus om-
nibus præsidiorum formula ex affectus inuenitur natura: locus vero, cui maxime sint applicāda,
ex prænoscentis tum actionibus, tum vlibus partium.

* In impres. dv-
70, i. ipsum. in
antiq. dvta,
i. ipsa, referēdo
ad ambo vitia.

† est præterea in
græco, ὅτι τῆς
παρακμῆς, i. i
declinatione.

* παραπλησί-
as seu παρα-
πληγίας. vide
superius lib. 9.
cap. x.

Qua Ratione extrinsecus medicamenta Capiti, aut Oculis apponenda sint: ac de Communibus præceptis
illarum partium curandarum, ac de Arteriarum sectione.

CAP. 22.

ILLud aut, quamvis in sermone aliquando omittatur, sæpenumero prius dictum est, meminisse
oportere nos eorum, quæ simul indicent. Cæterum in præsentī eā, quæ à partibus sumpta est,
indicationem propolitum est persequi: veluti statim in ijs, quæ ad caput pertinent, et si nō aliud,
saltem illud nosse cuius est promptum, obiectam nobis ante cerebrum esse crassam membranā,
quæ corijs istis externis sit assimilis: post hanc ēt cranium. Itaq; resoluī in dēlis obicibus & duris,
præsidiorum, quæ imponunt, vim est necesse: ac, nisi futuras in capitis osse natura ipsa fuisset mo-
lita, nihil adeo æstimandum efficeret pharmacum vllum extrinsecus impositum. Sed, quoniam
etiam futuræ, & in his præcipue coronaria non solum impositi medicamēti qualitates, sed etiam H
substantiam, si tenuis est, facile intro transmittit, merito multa circa cerebrum vitia ab extrinsecus
applicatorum remediorum facultate iuuātur. Ipse enim in me ipso expertus memini, cum in fun-
deretur rosaceum frigidū, citissime clarissime q̄ sensisse me in syncipitis loco eius intro penetra-
tionem. Quin etiam plurima diuersitas futuræ huius in hominibus, si inter se conferantur, etiam
ante dissectionem manifeste apparet. Vidimus enim in ijs, quibus rasum caput fuerat, inter man-
dendum, commissionis ossium in coronali futura manifestum motum sic, vt facile appareret ho-
minibus illis laxam esse eiusmodi ossium capitis compositionem. Merito igitur ad hanc maxime
partem applicant omnes medici capiti infusiones, videlicet accepta quasi per manus à primis in-
uentoribus ratione, ad id opus venientes: sed & ipsi, quicunq; non negligenter ijs, quæ fieri asso-
lent, attendunt, cernentes, & quemadmodum futura ea liquido moueri appareat, & quemadmo-
dum celerrime homines hac parte, siue ab externo admoto quopiam refrigeretur, siue exalfiat,
id sentiāt: nam præter reliqua etiam tenuissimum est hoc loco cranium, & rarissimū. Ergo, quo-
ties medicamenti cuiusquā vim vehementer descendere voles, hoc maxime loco impones. Com-
modius etiam fuerit, si & cum infractione id facias, aut tonsis capillis, aut etiā planē abrasis: quòd
si humidū sit, quod applicandū est, si id ex alto effundas, ac veluti, fontis ritu, illidas, qppe penitus
intro

A intro ab ictu magis compellitur. Sicut autem hic vehementior humoris casus cōducit, ita in oculis est contrarius: in capite namq; os est, quod feritur: in oculis membranosa quædam imbecilla q; corpora. Et in capite quidem aliud est, quod ictum excipit: aliud quod curatur, quod q; vt ictum non sentit, ita facultate, quæ ex incussu ad ipsum peruenit, fruitur: at in oculo non est, quod ferit, diuerſum ab eo, quod curatur: sed idem ipsum, quod est curandum, valenter icitur. Ad hæc os capitis sensu caret: oculus acerrimi est sensus. Ergo infundere huic medicamenta oportet, primum superiorem genam blandissime attolentes, mox minime, quemadmodum in capite, incurtiētes. Inueniendi præterea humores mitissimæ minime q; mordentis naturæ, qui cum medicamentis sint infundendi. At mihi quidem magna cum consideratione videntur veteres ad oui deuenisse humorem, electo scilicet ex eo, quod & mordens minime esset, & glutinosum. Nam ex eo, quod minime mordet, modo dictam indicationem ijs compleuit: ex lentore autem, ad indolentiam nō nihil confertur, quippe lenire eiusmodi humores possunt asperitates omnes, qualescunque acris fluxio excitat. Accedit, quod crassus mediocriter ac lentus humor constantius, quam tenuis & aquosus, in loco permanet. Sanè quod lentum id, quod absq; morſu sit, cum modice incaleat, dolorem maxime leniat, id profecto ex mordentibus in aluo deiectionibus didicisti: in quibus inie-

* βλ' αλ'ον, i.
palpebram.

B ctum seuum ilico dolorem mitigat. Quod autem permanere quoq; in laborante particula eiusmodi humidum expediat, manifestum est. Siquidem in ijs, quæ in ventre accidunt, per clysterem assidue infundere molestum est: in ijs, quæ in oculis, genam attollere. At vero exquisitus mēbri sensus læue esse, quod iniiciendum, nihil q; debere in se asperum "fabulosum" ve habere, omnino indicat. Hinc igitur excogitatum commodè est, tum humido oui vtendum: tum, quæ terrea corpora ophthalmicis, id est ocularijs, medicamentis miscenda sunt, ea esse cum summa diligentia ad vnguem leuiganda. Quoties tamen dolores his accidunt vehementes, repetitis ijs, quæ de omnium dolorum generatione accepisti, disquires, quod nam ex his affectu dolere oculos in phlegmone, de qua nunc sermo proponitur, contingat. Nam aut ex vehementi acris confluentis humoris morſu: aut quod eorum tunica plenitudine distendant: aut propter crassorum humorum flatuoli ve spiritus extensionem, vehementes in his excitantur dolores. At morſum quidem tum purgantibus medicamentis, scilicet & deorsum reuellendo & vacuando curare cōuenit: tum ipsi particulae oui humore infuso, quod per eum acris fluxio sine offensa eluatur. Vbi autem prius concocta iam phlegmone ipsa fuerit, & simul corpus vacuum, tum vtique lauationes in balneo his sunt aptissimæ: nam & dolorem statim sedant, & fluxionem, quæ ad oculos fertur, sistunt, maxi-

* Αλ' αλ'ον, i.
mordicationē.

C ma quidem eius parte inter lauandum per totum corpus excreta, reliquo vero diluto. At vero distensionem, quæ ex repletionē provenit partīs, missione sanguinis, & alui deiectione, & internarum partium frictione, curare conueniet: q; si necessitas aliquando vrgeat, ligandis artubus: mox fomentis ipsi laboranti particulae ex aqua dulci modice calida adhibitis. Atq; {humorū vel flatuoli spiritus} extensiones curabimus vacuato prius in his quoq; toto corpore: sed & humorum momento deorsum auerso. Mox localibus remedijs (Græci Topica vocant) vtendum, non tamen medicamentis ijs, quæ repercutiant ac reprimant, immo ijs, quæ euocent. Fouendi igitur sunt, sicut modo diximus: ac sceni græci decoctum ijs infundendum, sed lauato prius curiose sceno græco, nequid illi vel pulueris vel sabuli adhærens clari lateat. Est namque medicamen hoc maxime omnium, quæ oculis applicantur, sine offensa digerēs. Meminisse vero in omnibus, quæ membratim docentur, communium præceptorum oportet. Quorum vnum id est, digerentia medicamenta, vbi redundantia in toto corpore subest, si particulis quibusdam applicetur, implere potius, quam vacuare. Ergo tum reliquos morbos, tum vero phlegmonas (de quibus agimus) sicubi curas, nullo euaporate auxilio prius fidenter vteris, quam totum corpus purgaueris. Illud quoq; attendas in "omni vitio, nedum phlegmone, oportet, aliquando totum corpus mediocri ha-

* contēperato.

* διαφορῶν.

* διαφορῶν, i. q.
* vacuaueris.

D bitu esse in humorum tum qualitate, tum modo: vnam autem aliquam, aut duas earum, quæ suprapositæ sunt, partium, redundantiam suam ad ægram transmittere: veluti non raro, sed planè sæpenumero accidere in oculis videre licet, capite his fluxionem mittente. Manifestum igitur arbitror in ijs quoq; esse, ipsum prius caput sanandum esse, explorato eius affectu, quem superfluum generatio comitatur. Et diutinas quidem oculorum fluxiones curamus oculis ipsis dimissis, atque ad capitis procurationem conuersi. Cuius vitium, si ex genere intemperantiarum sit, curationem ex sibi contrarijs, sicut prius monstratum est, adhibendam indicat. Plurimum igitur vel frigida intemperies caput vitiat, vel humida: nec dubium est, quin etiam ambæ congregiantur. Rariores sunt, quæ propter calorem acrem oculis fluxionem immittūt: in quibus haud expedit ijs, quæ ex thapsia & linapi fiunt, medicamentis vti, immo contrarijs omnino, oleo crudo, & hispano, & rosaceo, tum frequenti ex aqua dulci in balneo lauatiōe. Atque aliquando cerebrum ipsum fluxionem transmittit: debet q; huius intemperies totius capitis epithematis corrigi. Aliquando vasorum ipsorum vitium est, cum venæ vel arteriæ imbecilliores sunt sic, vt aliorum vasorum supuacua recipiāt. Quo casu aliqua earū parte excisa, aut ēt totis bene alte præcisis, dura cicatrice, quod interest, intercipimus: qua disiunctæ incisæ valis partes, continuæ præterea non sint, nec ex altera in alteram confluere aliquid possit. Ceterum, cum eorum vasorum, quæ in profundo

* Aliq co. hnt
σκληρά, i. exiguā. plures tñ
σκληρά, i. dura

profundo sunt recondita, ac è superiore ad oculos vnà cum neruis perueniūt, vitium est, nihil ho-
rum agi licet: proinde ægre curabiles omnes eiusmodi fluxiones sunt. Quæ vero extrinsecus po-
sita vata sunt, ea vel sine chîrurgîa roborare licet, illitîs medicamentis, quæ robur inserant, Græci
Tónica vocant. Est & quando calidus sanguis, ac vaporum plenus, ad caput ascendit, ac maxi-
me in arterijs redundat. Cui vitio excogitatum saluberrimum remedium medicis est, vt ipsa in-
cidatur arteria. Oportet autē derafo capite curiosè tangere, tum quæ retro, tum quæ secundum
vtrinq; aurem sunt, arterias: præterea quæ in fronte, & quæ in temporibus sunt. Quarum, quæ
calidiores alijs apparebunt, ac maiorem exhibentes pulsum, hæ sunt incidendæ: quæcunq; vero
& parvæ & prope cutem resident, harum vel si partem aliquam excideris, veluti facere in crurum
varicibus solemus, aptius erit. Nostro q̃ tempore quidam ex ocularijs medicis non minimus, ex
arterijs, quæ in temporum summis musculis resident, non exiguam excidit partem. Ac ferè qui-
dem, cum excisa est arteria, relique eius partes ad sibi continuas retrahuntur: euenit quæ id magis
in ijs arterijs, quæ tum minores sunt, tum minorem exhibent pulsum. Quod si inter nudandū ap-
pareat tibi vas magnum, aut magnum exhibere pulsum, tutius fuerit vinculo id prius excipere:
mox, quod in medio est, præcidere. Sunt autē eiusmodi vincula ex materia aliqua ægre putresci-
bili: talis autem Romæ est ea, quæ Galetanorum dicitur, ipsa ex Gallijs aduecta: vendita vero
maxime in sacra via, quæ à templo descendit ad fora. Ac horum quidem Romæ facilis est copia:
vilissime enim venduntur. At, si in alia vrbe artem exerceas, comparetur filum aliquod ex ijs, quæ
serica nuncupantur. Habent enim ea diuites mulieres in multis sub ditione Romanorum locis,
potissimum in magnis vrbibus, in quibus multæ sunt mulieres id genus. Sin huius facultas non
est, ex ijs, quæ inueniuntur in regione, quâ incolis, deligito materiã, quæ minus sit putrescibilis,
cuiusmodi est gracilium chordarum: nam, quæ facile putrescunt, eæ cito à valis decidunt. Nos ve-
ro post, quàm vndiq; sunt carne impleta, decidere vincula volumus. Quæ nanq; caro in abscessis
vasorum partibus coalescit, ea pro operculo est, ac osculum eorum cludit. Postea vero, quàm id fa-
ctum cernitur, decidere iam vincula secure possunt. At vero, cum venarum partem aliquã exci-
deris, non est opus, eas tam imputrescibili materiã deliges, sed suffecerit alia quæpiam. Siquidem
in arterijs perpetuus motus inleçti valis ora resoluit: in venis aut, postea, quâ semel sunt vitunq;
clausæ, siue per deligaturam constrictæ, siue per medicamentum adstrictæ, permittunt circūposi-
tam carnem circa coalescere, potissimum si, qui curatur, immotam partē seruet, magis q̃z et, si toto
corpore vacuato ipsam attollat. Quippe etiam varices ita curamus. Vocatur aut varix vena dila-
tata. Porro dilatatur in testiculis & cruribus omninò. Sed, quoniam, cum hos adhuc scriberem cō-
mentarios, non pauci amicorum rogarunt, vt in fine totius operis omnia, quæ ad chîrurgian perti-
nent, deinceps memorem, idcirco tractatio de varicibus nunc differatur. Cum vero nō pauci spe-
ciatim sint oculorum morbi, qui magis specialem curationem desiderēt, ne de his quidem hoc lo-
co pluribus est agendum. Nam, qui curiosè, quæ prædicta sunt, legerit, & naturali prudentia fue-
rit, huic omnia inuenire, eorum ratione sequenti, nullo negotio licebit. Qui autē tales non sunt,
ijs satius fuerit omnium vitiorum, quæ oculis incidunt, curandi rationem priuatim scribere: maxi-
me cum amicorum non pauci ita postulent.

A. ibidem, g

A. l. 3. f. 22. r
C. 15. fo. 400.

* τὸ πῖπαν.

G A L E N I M E T H O D I M E D E N D I
I D E S T D E M O R B I S C V R A N D I S
L I B E R Q V A R T V S D E C I M V S

A R G V M E N T V M L I B R I

De reliquis Tumoribus & Affectibus præter naturam curandis, sumpta ex
singulorum generibus curandi indicatione.

Quid differat Inflammatio, & Erysipelas.

C. AP. I.



E tumoribus, qui præter naturam in corpore cōsistunt, quot numero, qua-
les q̃z sint, proditum à nobis singulari volumine seorsum prius est. Quem-
admodum autem hi methodo curandi sint (quod vtique docere propria
propositi operis professio est) in horum commentariorum tertio decimo
præcipere cœpimus. Et, quoniam in superioribus de omni febrîum ratio-
ne sermo erat habitus, aptius mihi visum est de phlegmone primum disse-
rere, vt quæ & frequētissime incideret, & febres subinde accenderet. Ac di-
ctum quidem nō nihil fuerat in febrîum curatione inter cæteras earum cau-
sas, etiam de phlegmone: verum absolutus sermo, & qui propriè illi debebatur, in libro qui hūc
præcedit, est traditus: in quo methodum curandæ eius, qualis nam esse conueniat, tradidimus:
nequaquam

* ἀγρίως.

CAP. 2.

† ὁ δὲ ἦν δ' ἐν
τῷ ἔσθῃ, καὶ
πόνος μετὰ
σφυγμῶ.

CAP. 3.

lib. 4. f. 3. t. 1.
3. fol. 452. a

* σέρις.

A. † Antiqui
col. ita legunt,
αἰονεῖν τε τὰ
κατὰ πλάσιν
υδατος θερ-
μῶς θάλασ-
σης αλμυρῆς.
τοτε δὲ συ-
σταῖν αὐτῶ
κατὰ
πλάσιν μι-
ναι τοιοῦ-
τον ὕδωρ ἢ
αἰονεῖν ὁ
ἴσας, i. perfun-
dendus q; est lo-
cus plurimū q;
ex aqua cali-
da, & marina.
nunquā ve-
ro inducet ip-
si cataplasmati
ex aqua
vel acetum, vel
mixturam misce-
re.

† Distio
hanc non est in
textu, græcis.

† Cod. mul-
ti hanc non
habent.

† In antiquis
libris παρὰ τὴν
ἐκτέλεσιν.

* ἀθρόως.

& actuca, & intybūm, & lenticula palustris, & cerata ex aqua admodum frigida, & alia id genus. E
Vbi vero inflammatio egrotantis membri iam desijt, cataplasma illi prius, q̃ liueat, ex hordei fa-
rina (ὠμὴν λύσιν græce voco) est imponendum. Quod si iam liuor occuparit, incisa cute cataplas-
ma superponendum est, † perfundendus q; locus plurimum quidem ex aqua calida: sed & mari-
na aqua, & muria interim conducet. Quin etiam ipsi cataplasmati eiusmodi aqua, vel acetum, vel
oxaline misceatur. } Hoc tempore etiam coriandrum cum polenta quidam esse salubre erysipel-
tū medicamentum scripserunt. Alij rursus eodem inter initia vsi, magnæ noxæ occasio laboran-
tibus fuere. Sed & rosaceum ceratum, cui immistum sit calcis aliquid, eodem modo sunt, qui pro-
diderunt erysipelati prodesse, alia q; similis generis non nulla ex ijs, q̃ valenter excalfaciant. Quo-
rum nullum est erysipelatis medela ante, q̃ videlicet mutatum desinat esse id, quod ab initio fue-
rat, atq; alterum iam, illi q; contrarium euaserit. Quomodo enim, quæso, non sit contrarius calido
affectui frigidus: aut ei, qui flauo aut pallido colore est, is qui liuidus aut niger est? Sicuti autem
subinde phlegmone admiscetur erysipelas, ita etiam aliquando œdemati: ac vocetur, quod ex am-
bobus tum est conflatum, erysipelas œdematosum non secus, q̃ vbi ex refrigerando durū egre q;
resolubile redditur, vocabitur erysipelas scirrhum. Iam curatio quoq; veluti in omnibus com-
positis, ita in his administrabitur: ac potissimum quidem contra exuperans pugnabitur, non præ-
termissa tamen nec ea, quæ ex admisto præstat, faciendorum indicatione.

De curandis Oedematis, & Scirrho.

CAP. 4.

Sicut autem ex biliosa fluxione erysipelas, ita ex pituitosa constat œdema ipsum, rarus quidam
Satq; indolens tumor. Equidem scio aliter quoque œdemata prouenire, ^b sicut in pedibus, in
intercutis aquæ affectibus, & phthois, alijs q; ^c qui vehementes sint, } malis corporis habitibus.
Atq; in illis quidem œdema ^d multitudinis eius, quæ hominē premit, est symptoma, nullam seor-
sum propriam curationem requirens. Nam satis erit, (si modo curatione egebit,) ipsa tum crura
perfricare aliàs oxyrhodino, aliàs oleo cum sale, aut etiam oxyrhodino sal habente. At, ^e si ex pi-
tuitoso humore in particulam influente œdema constitit, abunde aliquā satisfacit spongia, quæ ex
aqua, in qua sit aceti aliquid, maduerit. Porro hæc ita attemperabitur, vt vel bibi possit, vel vt nō
multum supra hoc, aceti habeat. Deligare vero spongiā debebis, ab inferiore parte incipiens,
ac supra finiens. Esto autem spongia, si modo conductura sit, omnino noua: huius si copia non
est, cuius erit, hanc detergebis expurgabis q; nitro, & aphronitro, & aqua lixina. Quod si sub his
œdema non subsidat, vbi rursus deligabis, pusillum aliquid aluminis conijcies, ac nouam spon-
giā admouebis: si nouæ copia non sit, melius est eo, quod vulgus vocat Elychnion, vtare. Id ^g
vero ante omnia molle esto, quod genus Tarficum est: cuius si facultas est, audacter vtitor, vti-
lius enim experire, quā spongiā. Madeat vero ex pusca, quæ aliquid habeat aluminis: tum
(vt præscriptum est) deligetur ab inferiore sursum. Sit autem arctatio mediocris, veluti in ossis
fractura: ac primæ quidem fasciæ iniectiones, quæ ^f scilicet inferne incipiunt, magis, arctadæ: quæ
deinceps sunt, sensim remittendæ, cæterum non adeo, vt laxa sit aliqua deligationis pars. Porro
idoneum medicamentum ad hæc & Glaucium est, tum ipsum per se liquatum ex pusca, tum vel
magis medicamentum nostrum, quod ex eo compositum est. Cuius compositionem habes in eo
opere, quod de medicamentis est inscriptū. Sanè hæcenus à me scripta fuerant opera tria, vnum
de simplicibus: alterum post hoc de compositione medicamentorum: & tertium de facile parabi-
libus. Quartum autem adscribere constitui, quandoquidē multi amicorum ita suadent. In eo de
communibus & proprijs cuiusq; partis & vitij medicamentis agetur. Verum medicamen illud,
quod Glaucium habet, non œdemata modo, verum multo etiā magis tū erysipelata, tum phleg-
monas incipientes sanat, ac potissimum calidas. Manifestum autem, quod erysipelatofas phleg-
monas, & erysipelata phlegmonofa, idem medicamentum sanat: At non eas phlegmonas, quæ in
scirrhum iam transierunt: aut erysipelata, quæ iam refrixerunt: aut deniq; vllum scirrhum affe-
ctum sanauerit: de quibus vtique in quinto de simplicium medicamentorum facultatibus aliqd
est proditum: dicetur vero & nunc. Siquidem humor, vnde eiusmodi vitium nascitur, aut glu-
tinofus est, aut crassus, aut vtriusque rationis particeps. Curandi vero eius communis indicatio
est, vt, quod præter naturam in particula est, totum vacuetur. Modus tamen vacuationis eius pro-
prius est: nam detergere id, vbi contumaciter inheret, oportebit. Quod si quis ijs, quæ vehemen-
ter trahunt, dixerunt que, medicamentis vacuare tenter: nec ijs, quæ humectent & excalfaciant,
molliat ac liquet: huic paucis primis diebus egregie processisse curatio videbitur, cæterum, quod
de affectu restabit, id insanabile erit: siquidem toto, quod in eo tenuium partium erat, digesto,
quod reliquum est, veluti lapidosa concretio, linquetur. Quippe etiam, qui in articulari mor-
bo visuntur pori, ex humore crasso glutinoso que proueniunt: quando is non paulatim est di-
gestus, sed violentis medicamentis totus simul licatus. Ad eundem modum & calculi gene-
ratur in renibus, alio scilicet in his crasso glutinoso q̃ succo. Hac igitur de causa ad scirrhus af-
fectus nullum vehementer excalfaciens licans ve medicamentum est aptum, sed ea tantum, quæ
cum molliendo digerere possunt: cuiusmodi sunt tum ceruina medulla, tum vitulina: tum seuum
hircinum, & taurinum, & leoninum: ad hæc ammoniacum thymiana, & bdellium vtrunq; ma-
gis q;

A. ibidem. b

A. lib. 4. f. 3. t.
c. 3. fol. 457. d

A. ibidem. e

Agis q̄ Scythicum, quanto videlicet est humentius. Pari modo & styrax, qui humentior est, sicco vtilior est. His igitur indicationibus attētus, etiam complicatos affectus sanare poteris, pro subinde iam dicta in omnibus compositis vitijs methodo.

Indicationes Remediorum, quæ in Scirrhis & Oedemate ab affectu partibus præbentur. CAP. 5.

Mhi vero iam tempestiuum fuerit de affectarum partium differētia mētionem facere: quam semper in omnibus tum morbis, tum symptomatis, in memoria habendam censui. Diximus autem non pauca de indicatione, quæ ab ijs sumitur, in libro, qui hunc præcedit. Siquidem omnium, qui præter naturam sunt, tumorum, in quibus vtiq; adhuc non sunt geniti pori, prima curationis indicatio vacuatio est. Earum vero partium, quæ iam scirrhum contraxerunt, vacuatio per iam dicta medicamenta perficitur: vocare q̄ ea malactica, id est mollientia, medici solent. Quoniam autem membrorum alia rariora naturaliter sunt, alia densiora, etiam vacuationem eorum diuersa specie remedia postulare est necessum. Hac igitur de causa tum in tendonibus, tum in ligamentis, {cum scirrhus fuerint,} visum mihi satius est ei curationi, quam per molliētia medicamenta molimur, aliquid incidentium admiscere. Ex quorum numero vel in primis acetum est. Interim vero & in alijs partibus, quas scirrhos affectis, eo vtimur: vt paulo post dicam. Verum

B in tendonibus & ligamentis in hunc modum: In aceto acerrimo candentem igni lapidem extinguo, ac, si quidem haberi potest, qui certe in magnis vrbibus rarus non est, pyriten: sin eius copia non datur, molarem, Græci Myliten vocant, scilicet ex quo molas, quibus molimus, faciunt. Deinde ascendente post infusum lapidi acetum vapore calido, in hoc dimoueri scirrhosum ligamentum vel tendonem cogo: atque exinde rursus medicamen, quod molliat, impono. Oleo tamen principio curationis, non aqua, quotidie omnino laborantem particulam perfundo. Esto aut id oleum haudquaquam adstringens, sed planè tenuium partium, cuiusmodi Sabinum est. Incoquimus autem oleo interdum althææ radicem, ac syluestris cucumeris, & liqua est eius generis alia. Atq; hoc vtor (vt dixi) quotidie. Caterum curatio, quæ per acetum administratur, vtilis est vitio iam adulto, & cum præparata iam sub mollientibus pars fuerit. Excogitavi autem & composita quedam ex aceto medicamenta, quæ inter mollientium vsum ad vnum diem impono. Siquidem acetum vis, modo ea quis modice & debito tempore vtatur, salutaris eiusmodi affectibus est, ceu crassos viscidos q̄ humores dissecans ac dissoluens: sin vel immoderatus vel in tempore non idoneo, tenuiores partes violenter absumens, id, quod reliquum est, lapidescere sinit. Sed & si quis eo diutius vtatur, substantiam ipsam neruorum delibauerit. Ob id igitur nec sæpe, nec inter initia, nec

C longo tempore, medicamentis, quæ ex aceto componuntur, ad ligamenta & tendones est vtendū. At in liene & carnosis musculi partibus scirrhus affectis tutus eius est vsum: quippe rara sunt naturaliter hæ partes, nec est quod metuas, nequis neruus eius vi lædatur. Ac ammoniacum quidē thymiamate cum aceto et alij non pauci lieni imponentes vtuntur, ad luti s. crassitudinem, quod ex vtriusq; mistum est, redactio: id q̄ solum ei curando sæpe satis fuit. Ad musculos vero, alium sanè non vidi: ego vero et sæpe sum vsum, vtiq; mollientium vsum interponens. Atq; sub illis nulla cernitur euidentis utilitas: sed postea, q̄ mollitus p ea scirrhosus tumor est, maximū certe vsum animo niacum aceto liquatū confert. Sufficit autē eo vno altero ue die vsum, rursus ad molliētia reuerti: ac rursus his pluribus diebus vsum, denuo ad medicamen, quod ex aceto fit, redire, siue id ammoniacum, siue quid aliud habeat eorū molliētium, quæ paulo supra sunt comprehēsa. Neq; n. aliud quicq̄ est admouendū, cuiusmodi s. pleraq; sunt eorū medicamentorū, q̄ sicca vocat: siquidē inter initia medicamentū probabis, sed id insanabiles affectionis reliquias relinquet. Ego nāq; eius rei causa in medio tpe cataplasmate ex althæa sum vsum: vocat aut hanc vulgus Anadendromalachē. Huius igitur radix seuo soluta salutare ad talia medicamentū est. Esto autē seuū, si fieri potest, anserinū: sin id non sit, gallinaceū: sin nec huius facultas sit, suillo vtendū. Sed & syluestris malus, quæ

D passim nascit, folia cū supradictorū aliquo tusa proficiēt: meliora tñ crudis sunt, quæ modice ante sunt decocta. Ac eiusmodi quidē auxilia, & curationis variatio, qualis iā cōprehēsa estoium particularum, q̄ scirrholis vitijs sunt affectæ, cōia sunt. Ad eundē modū oedematū curatio, quā paulo antē memorauimus, cōprehensio iam differentijs p particulas variat. Iis. n. q̄ in p̄cordijs sunt, oedematis nemo frigidā ex p̄sca spongiā applicuerit: veluti nec alijs, q̄ in his sunt, tumoribus. Iā quis absinthii oleo incoquens, genu vnq̄ perfudit: quis oculum, aut aliquid eorū, quæ intra os sunt, qualitercunq; affectū: at iecinori ægrotanti & lieni subinde cum maxima vtilitate adhibetur. Docet id ipsum & experientia, quæ vim eorum euidenter indicat, non secus, q̄ ratio. Nos tñ nunc hoc opere solam eā remediorum inuentionem, quæ methodo paritur, qualis nam sit, differimus. In operibus de medicamentis ambas miscuimus, omnia medico cognoscēda esse rati, tum quæ solo inuenta sunt vsum: tum q̄ sola rōne: ad hæc tertio loco, quæ conferentibus ad inuentionē vtriusq;. Omnibus autem his ille solus commode vtetur, qui in hac methodo est exercitatus.

Tumorum Induratum differentia, & qui proprie Scirrhi appellantur.

CAP. 6.

AC de phlegmone quidem scirrhus & oedemate satis sunt, quæ hætenus sunt comprehēsa, illo non omisso, quod scirrhum nominamus tumorem durum, qui sine dolore est, non tamen omnino sine sensu: talis enim sanabilis non est: reliqui omnes, sicut egrius sensibilem ipsam partem

* In aliquibus antiquis codi. legitur *oedemate*. I. quæ acetum recipiunt.

lib. 4. f. 7. r. 1. e. 2. fol. 459. e

bidem.

† Quod si quis
dūtaxat tumo-
res præter natu-
ram, qui oīno
sint insensiles.

partem affectam reddunt, ita omnino insensibilem non faciunt, utique si sensilis natura sit: liga-
menta nanque scimus insensilia esse. † Quod si quis eos duntaxat tumores, qui & præter naturam
sunt, & omnino insensiles, } scirrhus appellandos censeat, reliquos non scirrhus, sed tumores scir-
rhos: et se de nominibus litigare sciat: & nos, quoties cum eo disputabimus, ita quoque affectum
nominabimus: siquidem is mos noster est, quibus quisque nominibus delectatur, isdem in dispu-
tatione cum illo uti.

De Inflationibus curandis, ac præsertim de Priapismo. CAP. 7.

Nunc tempestivum est, ut de inflationibus differamus: quibus diversa ab œdematis curatio
est. Illa namque, ceu diximus, ex pituitoso succo ortum habent: proinde, prementibus nobis
cedunt, digiti quoque admodum alte in ipsa descendent. Inflationes vero ex flatuoso spiritu collecto na-
scuntur, aliàs sub cute, aliàs sub membranis, quæ ossibus circumdant, aut musculos viscerum, ut ali-
quod includunt. Porro colligitur aliquando non parum etiam in ventriculo & intestinis, item quoque
in medio spatio horum & peritonæi. Differunt quoque hæc ab œdematis, quæ & pressa digitis non re-
tinent vestigium: & sonitum, veluti tympanum, reddunt: item quoque quæ in cavitate sensibili subinde
continentur, atque hæc non nunquam maxima. Indicatio autem curationis omnium communis est,
ut, quod præter naturam est, vacuetur, in quocumque id contineatur: propria vero post hanc com-
munem est, ut tenuissimis & calidis potestate medicamentis. Atque in ventriculo quidem & visceri-
bus oleum, quod tenuium est partium, quod quoque rutam habet incoctam, aut aliquod calidorum se-
minum, cuiusmodi sunt cumini, & apij, & petroselinæ, id præstabit. Aliquando vero & cucurbita
magna bis ter, ut sine incisione medio ventri affixa: Tanta vero ac taliter applicata etiam totum
umbilicum comprehendet. At in artubus & musculis, qui sub cute, aut etiam membranis, quæ os-
sa vestiunt, inflatio orta, si citra dolorem sit, liquor aliquis tenuissimarum partium, cuiusmodi est
lixivium nova spongia exceptum, satisfecerit: sin dolor quoque urget, vngenda pars est oleo, quod
relaxandi remittendi quoque vim habeat. Incidunt porro ex percussionibus eiusmodi affectus, ubi scili-
cet vel musculus, vel membrana, quæ os circuit, est confusa. Ac super membranam quidem, quæ
os ambit, antedicta imponenda est spongia. Ad musculos vero (namque hi aliquando dolent) me-
dicamentum, quod magis mitiget, est adhibendum. Quo fit, ut ad hos solo lixivium non utamur, sed
immissa ei tum sapa, tum pauculo oleo. Satius autem fuerit in principio non addidisse lixivium,
sed sapa cum vino & exiguo aceto uti, ac, quod mediocre sit, olei adijcere: ubi mista sunt, modice
excalcacere, ac lanam non lotam, quæ œsyperon id est succidam vocant, ipsis imbutam impone-
re. Quod si eiusmodi lanæ facultas non sit, ipsius œsypus iniiciendus miscellæ supradictæ est: G
quod autem Atticus œsypus cæteris omnibus præster, tamen si à me non dicatur, ipse scis. Quin
etiam ceratum, quod ex œsypo componitur, medicamentum est omnibus notum: utuntur plu-
rimi eo ad phlegmonas, quæ in præcordiis sunt. Ergo huius quoque aliquid, ubi œsypus præsto
non est, recte inieceris. Debent enim confusi musculi leniri medicamento, cui mista facultas sit,
quæ simul concoquat, digerat, & modice adstringat: quando, si nihil habet adstrictionis, auget ali-
quando phlegmonas, ac maxime in ijs corporibus, quæ plethorica sunt. Ergo trium iam com-
prehensarum indicationum in inflatis ex plaga quadam musculis memor, ubi dolor maior urget,
mitigativa magis ratione uteris: ubi abest, † maiori vi instabis. } Maiorem vim intelligo, cum bre-
ui via properatur ad finem. Porro brevis via fit per ea medicamenta, quæ valentes habent vires:
hæc maxime in lixivio & aceto habentur, post hæc in vino. Quoties igitur de mitigando non la-
boras, horum plus in misturam coniicies. Rursus, ubi repellere studes, vini plus, quam horum,
immittes. Porro id optimum in hunc usum fuerit, si nigrum austerum quoque sit. At, si digerere ma-
les, lixivium plus indes. Acetum vero si his miscebis, ad ambo erit utile propterea, quod mistas (ut
monstratum est) habet facultates. Ubi vero musculus sine dolore est, licet sanè in lixivii penuria
pro eo aphronitrum immittere: esto autem id minime lapidosum, sed magis spumofum. Est ve-
ro, quod lapidosum est, durum & spissum, ac ægre liquabile, cum dictis liquoribus miscetur: spu-
mosum vero molle est & laxum, item quoque candidius, quam lapidosum: hoc itaque tum celerrime ab
humore soluitur, tum iuvat maxime, utpote tenuium partium. Quæ vero huius generis inflatio-
nes neglectæ inueterarunt, primo quidem loco his ea, quæ ex lixivio componuntur (ut prædi-
ctum est) adhibeas: secundo loco emplasticum aliquod. Dicam autem & horum exemplum. Strig-
menta gymnasiarum feruefacta percola primum sic, ut pura sint: deinde rursus in cacabum im-
missis, calcem viuam in farinæ speciem tunsam insperge ad lutum usque crassitudinē. Salutare his
est & medicamen, quod ex sycomoro componitur, alia quoque id genus. Nunc enim (ut dictum est) exē-
pla tantum eorum medicamentorum scribo, quorum generalis facultas per medendi methodum
inuenitur. Tanquam vero medicamentorum hoc loco ponuntur exempla, tum ut tota hæc me-
thodus clarius intelligatur: tum ut magis nobis ad inveniendam materiam facultas suppetat: sic
etiam & affectarum corporis particularum proponuntur. Statim enim affectus quidam est, quæ
iuniores Priapismum nuncuparunt propterea, quod ijs, qui sic sunt affecti, etiam inuitis puden-
dum arrigitur: quod ubi viderit quispiam, qui in his commentariis est exercitatus, protinus intel-
liget ex inflationum esse genere. Qui, n. memoria tenuerit tum oia, quæ in dissectione eius mem-
bri

A. li. 4. f. 3.
c. 1. fol. 457

οὐκ ἔχω
το ποτὶ

A. lib. 4. f. 3. r
c. 20. fol. 460

A bri apparēt, tum quæ de functione eius & vſu in naturalibus libris ſunt prodita, is nullo negotio intelliget, q̃ cauernofus neruus, qui propriam colis ſubſtantiā conſtituit, halituoſo ſpiritu impletus affectum hunc excitat. Porro halituoſum ſpiritū in animalis corpore ex ſuccis, qui lente lenſim' ue exaltāt, naſci didicimus. Quippe, vbi tum inſitus calor validus eſt, tum partis humiditas ad ſummum concocta, vtiq; in tenuem halitum ſoluta inſenſibili trāſpiratu in ambiētem eſſluit: Contra, vbi vel ingenitus calor imbecillior eſt, vel naturalis humor tum ſemicoctus, tum craſſus, tum glutinoſus, ibi craſſior excitatur halitus, q̃ vt tranſpirare poſſit, ac poſiſſimū licubi particula ipſa denſior eſt reddita. Non nunquam vero humor, qui in membro continetur, ſubfrigidus eſt, præterea craſſus & glutinoſus: auctior vero calor in halitus eū crallos reſoluit. Quæ res proſectō magnopere tibi ad curationem æſtimanda diſcernenda q̃z eſt. Siquidem principiū ambobus affectibus cōmune eſt, nempe ^a totum prius corpus vacuare, ^b t̃ modo id capax vacuationis ſit. } Di-

l. 3. f. 20. r. 1.
9. fol. 377. d

B calfaciunt & ſiccant. Ex accidenti etiā vacuare indicauimus & cibi abſtinentiam, poſiſſimum vbi ambiens calet. Ergo, quicquid horum ſuſtinere cubans aptiſſime poteſt, eo eſt vacuādus, imponendum q̃z ipſi laboranti particula medicamentum, ſi ea calidior ſit effecta, quod ad portione caloris abundantis refrigeret. Sin aliter, inter initia quidem omnino, quod modice refrigeret: poſtea vero id neceſſum non eſt. Pari modo, & quæ circa lumbos ſunt particulae omnes, eiſdem facultatis medicamēto ſunt comprehendendę. Etiam reliquis victus exhibendus, qui & flatui aduerſetur, & ſiccet. Incidit vero vitium hoc nō ſanē multis, ſed iuuenibus magis, q̃ alijs ætatibus: quo magis his ſanguinis miſſio præcipue eſt ſalutaris, ceu nec ætate eorum eam recuſante. Scio enim ipſe quendam à me curatum tribus diebus, naturalem habitum recepiſſe, ſanguine primum miſſo, dein medicamento hoc adhibito. Ceratum ex ſimpli roſaceo factum ita liquidum, ſicut ad fracturas vti ſolemus, aqua frigida imbuens, ac ſimul cum ea ſubigens (nā eſtatis initium erat) pudendo ac lumbis impoſui: atq; ita quidem hunc percurauī. Simili modo & alium, qui poſt miſſum ſanguinē humido medicamento, quod ex chamemelo conficitur, eſt vſus. Porro iſtis ē nymphae aliquid potandum exhibeo, ſaltem in principio: mox ^c amerinæ ſemen: ac, ſi traxerit adhuc vitium, rutæ ſemen copioſe comedendum. Eſt enim illud commune præceptum omnium ferme, quos vitioſus ſuccus creat, morborū, q̃ in fine calfacientibus & ſiccantibus ſit vtendum: quippe hæc, quod reliquum humoris eſt, proriſus abſumunt.

Quo pacto Pratumida Lingua laborans à Galeno curatus ſit.

CAP. 8.

li. 3. f. 6. c. 10.
l. 245. f

S Anē linguam ita tumefactam cui dā vidimus, vt ore hominis contineri non poſſet. Huic nec vena vnq̃ incifa fuerat, & ſexagenarius iam erat: hora q̃z diei ſerē decima erat, cum ad eum primum acceſſi & vidi. Ac viſus mihi eſt vſitatis mihi pilulis, quæ ex aloe, ſcammonea, & colocynthide conſtant, vespere datis purgandus: ipſi tamen particulae afflicte ſuaſi refrigeratium aliquid imponere, ſaltem in initio: poſt enim, inquam, applicabimus, prout ſuaſe debet euentus. Verum id vni medicorum non placebat: ac propterea pilulas quidem ſumpſit, de locali tamen remedio deliberatio in diem poſterum eſt dilata: quo tempore etiā efficacius aliquid præſtiturum quicquid probatum fuiſſet, ſperabatur, & purgato ſcilicet iam toto corpore, & humoribus ad inferna reuulſis. Cæterum ea nocte euidentiffimum per quietem inſomnium, noſtrum homini conſilium approbavit, ac materiā ipſam medicamenti definiuit, lactucæ ſucco collui iubens: quo ille ſolo vſus, proriſus eſt ſanatus, nullius alterius egens. Quod autem in priapismo vomitorijs medicamentis potius, q̃ ſubducentibus, ſit vtendum, in lingue vitio contra, id ex partium ſitu indicari manifeſtum eſt. Nam auerſionis in cōtrarium (quæ ab Hippocrate ^a antiſpaliſ dicitur) non à ſubſtantia, ſed à curandi membri poſitu, inuentio præſtatur.

De Cancro ortu, & curatione.

CAP. 9.

ibidem.

lib. 1. f. 1. d. 4.
1. fol. 7. h

I Am vero tempus monet, vt ad aliud tumorū genus tranſeamus, atq; à re potius, q̃ nomine, initium faciamus: ea nanq; eſt haud dubie vere q̃z ſciētifica doctrina. Quod igitur omnibus eiſmodi tumoribus ſuccus aliquis inſluit, id in libro, quem de tumoribus præter naturā ſcripſimus, indicatum eſt. Quod aut non idem in oībus ſit, ipſe ſenſus euidenter docet, differentibus nimirū ipſis tumoribus nō colore modo, verū etiā iſs, quæ ex calore, frigore, mollitie, duritie q̃z ſpectantur, differentijs. Ac ruber quidē tumor euidenter ſubelle ſanguinis indicat humorē: ſicuti ſilauus & pallidus perſimilem ipſis bilē: ſubalbidus vero & laxus pituitā. Sunt autē & præter hos tumores quidam, qui colore ſint inter rubrū & nigrū medio: cuiuſmodi color ſcuſus eſt. Hunc, cum in corporis partibus ſæpe incidat, plurimi medicorum liuidū, græce Pelidnon vocant. Renixus aut his quoq; tumoribus valens eſt: ac, ſi venas euidentiores membrum haberet, exaltatas eas à craſſo & nigriore quodam mō ſanguine, cuiuſmodi paluum aliquñ non paucis hepaticorum excernit, videre licebit. Sunt q̃z medici, qui mihi eū non abſurde vident ſeci, ^b t̃ quæ ſup vini doſijs hæret, } aſſimilare. Ergo hic humor, vbi amplius incaluerit aut propter putredinem, aut febrē ^c phlégmonem,

Septima Claſſis.

m m m m m m m

nodem,

A + eſt quidē in iſpreſſis cod. græcis τὸν ὅλον ὁ γυναικὶς, i. totū humorē. ſed in manuſcriptis eſt τὸ ὅλον, i. totū, ut intelligatur de corpore, ſicuti uertit Linaccer.

B + τὴν ἀνὸς τὴν δὲ ἀνὸς κένοντιν legūt antiqui cod. i. ea nimirū euacuatione, quā ipſū tunc poſſit.

C + τὴν ἀνὸς.

A In libro de Humoribus à principio.

B + cod. impreſſi habent τὰ τοῖς οἰοῖς ὑπὸ ἀνέστα. ut tres cod. τὰ τοῖς πιδῖς ὑπὸ ἀνέστα. ut uertit Linaccer

C + οὗτος ὁ νόσος eſt in impreſſis in aliquibus aut manuſcriptis οὗτος ὁ νόσος. quid aut inter phlogosimquam Linaccer uertit iſtā mationem, & phlegmonē diſferat, ut in hoc volum. Lib. 15. cap. 1. tum alibi, uideri pōt.

† ne ipsæ qui-
dem muscæ et
ita etia vetus
interpret.

nodem, nigram efficit bilem, quam nullum animal, † ne ipsi quidē mures gustauerint: terra quo- E
que raditur ab ea: ac partes, quę raduntur, oēs in altum attolluntur: vocatur q̄ is effectus (vt Plato
quodam loco inquit) tum feruor, tum fermentatio. Est nāq̄ is humor talis, quale esse acetum do-
cuimus: ex quo ipso quoq̄, si in terram effuderis, idem effectus vilitur. Quo minus alienum est,
si veteres eiusmodi humorem acidum nominarunt æque, vt pallidę bilis amarum. Sanē non raro
etiam in vomitionibus talis apparet. Verum, sicuti paulo ante dixi vnum, quoddam vitium esse
propriū verum q̄ scirrhum, qui præter alia etiam insensibilis sit: reliquos tumores, qui videlicet
non dum sunt omnino insensibiles, dupliciter esse à medicis vocatos, nēpe vel scirrhos, propterea,
q̄ generis scirrhorum sunt, vel scirrhosos tumores: sic & in humoribus, quę quidem haud dubie
nigra est bilis, ea talis est, qualem modo pinximus, certe acida, & terram fermētī ritu eleuans, tum
omni animanti iniucunda. Quę vero fieri talis est idonea, hæc bifariam nuncupatur, vel melan-
cholicus humor, vel nigra bilis, scilicet, qui sic eam nomināt, affirmaturis aliam esse nigram, quę
dum animal naturaliter se habet, quotidie gignitur: aliam quę ex vstione ac velut aflatione con-
flatur. Quod autem semper præcipio, vt nominibus contemptis ipsam naturę rerum scientiam
exerceas, id nunc est faciendum, ac nominandum quidem, prout succurret: cæterum oratione sic
interpretandum, q̄ quidam præter naturam tumores ex eiusmodi naturę succo proueniunt, cu- F
iusmodi est fex in vino, & amurca in oleo: & q̄ hi spatio temporis putrescēte humore propterea,
q̄ in valis sit impactus, exulcerantur. Ergo, sicuti reliqua omnia vitia plurimam habent particu-
larem in maioris minoris q̄ ratione differentiam, sic etiam hoc vitium habet. Quippe phlegmo-
nes alia quidem admodum rubra est: alia paulo magis, q̄ pro naturali habitu, rubra. At species, si-
ue genus, siue quomodolibet appelles, ambobus est idem: nam & rubriores, q̄ pro naturę modo,
sunt: & dolor omnino cum ipsis est, qui ipse quoq̄ magnam habet in excessu defectu q̄ differen-
tiam: ad eundem modum nec renixus nec cutis tensio omnibus est æqualis. Commune tamen
eorum est, tum q̄ pars magis renititur, q̄ ante, cum naturaliter se haberet: tum q̄ in tumorē quen-
dam attollitur, extenta scilicet attenta q̄ eatenus cute, quatenus tumor assurrexit. Simili ratione
& vitium, quod modo describimus, alias cōfusa exigua q̄, & quę vulgum fortasse latere possint,
affert symptomata: aliās ita vehementia & magna, et cunctis euidentia, vt ne puerum quidē clari
sint. Verum cōmune illud in oībus particularibus, quod intelligentiam ad se trahit, vnus id mor-
bus esse ostenditur, & vnā sibi appellationem imponi cogit. At, vbi magna quidem omnia sunt,
nemo de appellatione ambigit, sed nominant vno assensu oēs eiusmodi affectū Cancrum. Cum
autem adhuc incipit, nihil miri est, si vulgus lateat, non secus profectō, q̄ stirpes, quę ē terra iam G A.li. 4. f. 3. t.
exeunt: quando hæ quoq̄ peritis tantum agricolis agnoscuntur. Ergo, quę nam in cancro tum c. 15. fol. 159
communis, tum propria curationis indicatio sit, opportune nunc dicetur. Cōmunis igitur est, vt
humorem, vnde vitium est natum, ilico vacues simili vacuationis genere ei, quę in alijs tumori-
bus supra est comprehensa: mox prohibere, potissimum si fieri potest, ne de cetero eiusmodi suc-
cus in venis colligatur: sin id fieri nequit, saltem eū omnino ex interuallis vacuare, & simul parti-
culam firmare, nequid humorum redundantia ad eam confluat. Veluti ergo amarę bilis humo-
rem medicamento, quod eum humorem trahere sit aptum, educimus, sic & melancholicum edu-
cemus vel simplicium aliquo, cuiusmodi est epithymum, pondo drachmarum quatuor in sero la-
ctis mulsa ue exhibitum: vel compositorum aliquo, cuiusmodi nostrum est, quod ex duobus &
triginta simplicibus medicamētis est compositum. Sed horum materiam in alijs traditam habes.
Hic autem, quę ad propositam methodum proprię pertinent, dicamus. Post nāq̄ purgationem
illud de omnibus eiusmodi affectibus prius est præceptum, q̄ vel retro regerere humorem, qui
in membro procubuit, oportet, vel ipsum digerere: præterea q̄ in principio quidem tam in ipso
purgationis tempore, q̄ ante id, repellere: vbi iam totum corpus exquisite purgaueris, digerere.
Vbi tamen mediocris tātum purgatio præcessit, mistum esse, quod applicabitur pharmacum, ex H
repellēte digerente q̄ facultate conueniet. Sanē ad crassum humorem inutiles sunt tū imbecillæ,
eo, q̄ nullum operapretium efficiant: tum valentes, q̄ vehementer tenuiores, quę in venis sunt,
sanguinis partes vel digerant, vel retrudant: crassas vero & melancholicas, quas faci assimilau-
mus, nec euocent, nec repellant. Ergo, si his inter initia vtire, vtiq̄ minutus aperte tumor erit, ce-
terum, quod reliquum eius est, contumax ad soluendum reddetur. Quare mediocriū virium
medicamentis est opus: quę nec propter imbecillitatem vincentur, nec propter effectus vehe-
mentiam valenter sanguinem crassabunt: Ad hæc item, quę omnino haud mordeant: quando-
quidem vitij malignitas ab ijs, quę mordent, iritatur, ac, vt dici solet, efferatur. Propter hæc igi-
tur, quę viribus quidem sunt mediocria, qualitate vero minime mordentia, eiusmodi affectibus
sunt idonea. Materię vero copia, sicuti in libris de medicamētis est traditum, ex vstis clotis q̄ me-
tallcis habebitur. Quippe, quę medicamenta ex his componuntur, vnā cum purgationibus, ad
sanandos incipientes cancros magnam vim habent: maiores vero, sat fuerit, si his prohibeantur
augeri. Prospicere vero, vt, qui iam sunt sanati, amplius non regenerentur, id artis de tuenda sani-
tate est opus: cuius sanē portio est ea, quę de cibis præcipit. Ceterum, si quando cancrum per chi-
rurgiam curare audebis, cœpisse quidem ab vacuando per purgationem melancholico humore
oportebit.

A. ibidem. c. 1
fol. 460. b

A oportebit. Vbi vero totum, quod vitiatum est, prorsus excideris sic, vt nulla super sit radix, si-
ne effluere sanguinem, nec propere eum inhibebis: immo premendo potius, quæ circum sunt, ve-
nas, exprimes ex ijs crassiorē sanguinem: mox alijs vlcēibus similiter curabis.

De Carbunculis & Reliquis affectibus curandis, qui Vlcere crustoso constant. CAP. 10.

Est tamen & aliud vitium, quod ex humore crasso feruente q̄ nascitur. Incipit hoc plerunq;
a pustula aliquā vero & sine hac. Ceterum inter initia, quibus hoc insit, scabunt particulam
omnino: mox oritur pustula quedā: qua rupta, vlcus cum crusta gignitur. Sepe vero non vna ori-
tur scabentibus pustula, sed multæ exiles, veluti milij semina, crebre in particula relidētes: quib;
perruptis, similiter crustosum vlcus prouenit. In carbunculis vero, qui p̄ Aliam populatim
sunt crassati, et citra pustulas non nullis excoriata statim cutis est. Omnibus tñ, vt dixi, crustosum
vlcus fit, modo crusta ipsa cineris colorem præferēte, modo nigrorem. Omnibus præterea his cir-
cumposita caro in summam peruenit inflammationem: non tamen colore aspicitur erysipelatis,
immo qui adhuc phlegmone colore sit nigrior, veluti si plusculo rubro minus misceas nigri.

† κατὰ τὴν
ἐξουσίαν τοῦ
πολλοῦ διακρί-
νεται.

† in antiquis
quibusdam legi-
tis. τὸν τε-
λεῖτον ὅτι
ἐστὶν, ὁ
ἐν τῇ
ἐρυσιπέλας
ἐστὶν ὁ
φλεγμῶν.

* anagallis.

Quod aut̄ necessario febricitent, qui ita sunt affecti, id q̄ non minus, immo magis, quilli, quibus
erysipelatos est phlegmone, id vñq; latere neminem potest. Sed & incipiendam ab incita vena
B curationem esse, id quoq; neminē latere arbitror, qui præsertim meminerit, quæ in curatione fe-
brium de sanguinis missione diximus. Nec illud obscurū, sanguinis vacuationem, quæ ad animi
defectum vsq; sit adhibita, magis his etiam collaturā: nisi tñ aliud quippiam obstat ex ijs, quæ ve-
nam incidi verent. Imponi vero sibi laborans particula, quod ad humorum inflammationem spe-
ctat, refrigerantia desiderat. Ceterum propter humoris crassitudinem atq; etiam malignitatē, nec
fluxionem auertere vnquam poteris: & siq̄ id feceris, aliud quippiā, quod in alto sit corpore, of-
fendes. Atqui nec affluere is permittendus est: quin potius inquirenda remedia sunt, quæ cū mo-
dice reprimendo et digerere possint. Tale profectō est tum cataplasma, quod ex plantagine con-
ficitur: tum quod ex cocta lente, s. miscentibus his nobis micam panis teneram, qui clibano sit co-
ctus. Esto autē panis nec omnino a fursure purus, nec nimium eius habens. Siquidem, qui oīno
purus est, eius substantia in cutis meatibus herere est apta, Emplastica tēron Græci vocant: fur-
furaceus aut̄ crassiorum est partium. Super ipsum vero vlcus, valens aliquod imponendū est me-
dicamentum: cuiusmodi est Andronis, Pationis, vel Polyidæ: liquari q̄ id cum vino aliquo dulci
ad sordium crassitudinem debet. Porro cōmodissima ad hunc vsum vina sunt tñ thereum, tum
scybelites: in quorum inopia sapa vtēdum, quæ apud nos Hepsēma dicitur. Quæ aut̄ pharmaca
C reliquis adhiberi vlcēibus solent, nempe quæ concoquant & pus moueant, ea nunc adhibenda
non sunt: qñ ita putredinem particulæ auxeris. Quin etiam scarificare eiusmodi tumores possi san-
guinis missionem alienum non sit: sunt autē incisiones mediocribus altiores propter infestan-
tis humoris crassitudinem. Cessante vero iam inflammatione vlcus ad cicatricem similiter reli-
quis vlcēibus perducet. Atq; hæcenus de carbunculis dixisse sat arbitror.

De Strumis, quas Choeradas dicunt.

CAP. 11.

Deinceps de reliquis agam tumoribus, orsus a strumis, Choeradas Græci vocāt. Exsunt he
glandulis in scirrhosum affectum mutatis. Est q̄ curatio earū, quod ad ipsum attinet vitium,
ijs scirrhis, qui in alijs partibus nascuntur, cōmunis. Ceterum, quod ad ipsius partis naturam spe-
ctat, in quibusdam glādulis alias geminas curationis indicationes adijciunt. Præstiterit fortassis
hoc loco de nominibus aliquid clarioris doctrinæ gratia distinxisse. Quippe glādulæ, quæ, quod
in medio vasorum in diuersas partes diductorum habetur, implent, eius q̄ diductionis pro firma-
mento sunt, earum haud magnus vsus animantibus est: sed ex abundantiore prouidentia, sicut alia
quædam, sic has quoq; glandulas natura fabricauit. Earum vero, quæ vel saluam, vel lac, vel geni-
tale semen: ad hæc quæ pituitosum quendam humorem in mesenterio, vel faucibus, vel larynge,
D generant: earum maior est vsus. Atq; aliqui has non glandulas, sed glandulosas vocant corpora, vt
quæ non paulo, q̄ reliquæ glandulæ, & rariore sint & magis spongiosa substantia: quin etiam in
has tum arteriæ, tum venæ sensibiles perueniunt. Atq; he quidem, cum in scirrroso sunt affectu,
non aliter, q̄ cæteræ omnes partes †, sunt sanandæ. At, quæ in medio vasorum spatio consistunt,
in ijs alia curationis indicatio præstatur: qua simul cum vitio etiam pars ipsa tollitur. Est vero du-
plex ea quoq; nempe vel totum, quod vitiatum est, scalpello excidentibus nobis, veluti in can-
cro: vel putrescere id medicamento cogentibus. Porro, quæ eiusmodi medicamentorum materia
sit, id in opere de medicamentis est proditum.

† σκίρρῳ θά-
σις, ἢ. scirr-
hosus, addu-
ctum a scirr-
ho.

De Abscessibus, quæ Apostemata dicuntur.

CAP. 12.

Mhi vero tempestiuum est de alijs tumoribus docere. Quorum se' primum abscessus offert,
Apostema id græce dicitur. Huius duplex item genus est, vnum, cum phlegmone in pus
versa pus ipsum tanquam in sinu aliquo est collectum: alterum, cum nulla præcedente phlegmo-
ne humor aliquis statim ab initio, is q̄ aliās specie alius, ceterū omnino acris, in parte aliqua colli-
gitur. Porro excoriat hic circumposita corpora, spatium videlicet tibi moliens vel inter duas tuni-
cas, vel sub certis membranīs. Excoriat autem omnino ipsa copia distendens: interim vero acri-
moniam quandam putredinosam tempore contrahēs. Sanē inueniuntur in huiusmodi abscessi-

Septima Classis.

m m m m m m ij

bus

bus, cum scalpello sunt diuisi, proprietates quædam non pauca, nec humorum modo, sed etiã solidorum quorũdam corporum. Siquidem vnguĩum, pilorum, ossium, testarum, lapidum, & pori fragmentorũ similia inuẽta in his corpora quædã sunt. Ac humorũ ipsorum alius, veluti lutum, vel cœnum, vel olei quidam limus, vel vini tẽx: alius adeo grauiter olens, vt oẽs auerſentur. Verũ hæc rarius incidunt. Frequentissima vero huius morbi sunt tria genera: quorum singula propriã appellationem græce sunt sortita. Ea sunt, Atheroma, Steatoma, & Meliceris, à similitudine contentarum in tumoribus substantiarũ dicta: est enim aliud eorum veluti seuum, aliud veluti mel, aliud puliculæ, quã Atheran vocat, simile. Curationis vero eorum indicatĩones sunt cões, nempe id, quod continet, vel digerere, vel totum putre reddere, vel excidere. Aliqui igitur eiusmodi tumorum triplicem curationis rationem admittunt, quotquot s. ex tenuiore humore constant, vt meliceris: aliqui duplicem tantum, veluti atheroma, quippe quod tum excidere tum putrefacere licet: steatoma vero sola manuum opera curatur, cũ nec putrefieri possit, nec digerĩ. In ijs vero abscessibus, qui in alto corporis consistunt, ac potissimum in visceribus, medicamẽta, quæ ex aromatis componuntur, maxime sunt vtilia, utpote quorũ vis collectum humorem tum in halitum resoluat, tum digerat. Sunt profectò & alia eius generis non pauca, quorũ laudatissima sunt tum antidotus, quæ ex viperis componitur (Theriacẽ vocant) tum, quæ Athanasia vocatur, tum Ambrosia: atq; hæc quidẽ sumptuosa: viliorum sanẽ optimum est nostrum, quod ex cretica calamintha est compositum. Omnia vero id genus in opere de medicamentis colligemus: quod, vt paulo ante diximus, satius arbitror ijs tribus, quæ supra memorauĩ, quod nihil delit, subijcere.

De Tumoribus, qui toto genere Præter naturam sunt, ac de optima Curandi Via. CAP. 13.

Quoniam vero eorum, quæ per chirurgiam fiunt, curationis indicatĩones aliquid commune habet, aliqd propriũ, satius nobis visum est ea nõ distrahere, sed vniuersa in calce huius operis apponere. Nunc porro tantulum etiã de tumoribus, qui præter naturam consistunt, est adijciendum, q, quicunq; ex his toto genere præter naturam sunt, ij sui ablationem indicent, communiori s. indicatĩoni, quæ per omnia, quæ totis substantijs à naturæ habitu recesserunt, extẽditur, subiecti: veluti in steatomatis & atheromatis habet. Huius certe generis est & q Myrmecia græce vocatur, & quæ Acrocordon, præterea in velica calculus, & hypochyma: & in mulieribus molæ in vtero gestatio, ita vero appellat infirmem carnem: omnia nanq; talia summo uere in totum properamus. Quorum vero etiã locus ipse affectus vna quæpiam naturalium partium est, prima indicatĩo est, vt affectus sanetur. Secunda ab hac, si insanabilis is sit, vt vnà cum vitio pars quoq; ipsa excidatur: sicut in cancro & oĩbus vlceribus, quæ curationẽ respuunt. E cõtrario vero in sutlulione, quod Hypochyma vocant, t victi in prima indicatione, ad alium eam locum, qui minoris sit momenti, transferimus. Non desunt, qui hæc quoq; vacuare sint aggressi: sicut in ijs, quæ chirurgia tractantur, dicam. Nunc illud dixisse sufficiet, q humor, qui in hydrocelis visitur, alienus à corporis substantia tota natura sit, sicut et, quæ in ascitis hydropibus continetur aqua. Quarũ certe vacuatĩonẽ vel medicamentis, quæ digerāt, molimur, vel chirurgiã, in hydrocele quidem immisso siphone: in hydropibus vero adhibita pũctione, quam paracentesin vocat. Porro exciditur vnà cum affectu ipso, veluti in ijs, quæ ante comprehẽsa sunt, etiã pars affecta: ita & in herniosis aliquid peritonæi. Pari modo & columella aliqñ vnà cum vitio ipso exciditur. Itidem q; in cruribus & testiculis, vnà cũ varicibus ipsæ venæ. Ad hæc, tunica in naso cũ polypo, & foratus dens cum foramine: verũ ex his nullum est, quod ad naturalem habitum possit reduci. In columella vero id oĩno est conandũ, nec properandũ ad eã excidendã: sed, qñ gracilis est, & ad lori tenuitatem redacta, tum est auferenda. Porro talẽ eam reddet longius tps: at, qualem Hippocrates in præfagijs || descripsit, paucorum dierum numerus: æque vero & cætera, quæ in magnitudine naturalẽ habitũ excelsierunt: in quibus annuerada sunt omnia, quibus supercreuit caro, & encanthides, & qui in sede thymi dicũtur. Sunt ex istiusmodi vlceribus, & quæ ambigua sint specie, veluti cicatrices, quæ supra circumpositam cutim multum extat: item, quæ in oculis sunt pterygia. Curationis tñ eorum indicatĩo manifesta est. Siquidẽ talia omnia amouere oportebit: atq; id semper agere, vt rationibus, quibus id fiat, pensitatis optimã semp earum deligas. Sanẽ optimẽ rationes tripliciter iudicantur, tum ex tps curandi breuitate: tum ex curando citra dolorem: tum ex maxime tutò curando. Rursus, vt tutò cures, tria propriã sunt, qbus intentus sis, oportet, vnũ primum q; vt oĩno absolutionem operis consequaris: alterum, vt sicubi hunc non consequaris, saltem cubantem non lædas: tertium, vt vitium non facile reuertat. His cõsiderationibus si optimam curationis viã iudicaueris, inuenietur in oĩbus, q nunc proposuimus, qñ potius chirurgiæ, & qñ potius medicamẽtorum ope, sit curandũ. At chirurgiẽ quidẽ studium in ijs præsertim, quæ nunc sunt propolita, ad interemptionem eorũ festinat: vt quæ, quod in animalis corpore toto genere præter naturam habetur, id prorsus tollendũ sibi proponat: quod si perficere nequeat, proximum illud consiliũ habet, vt vitium transferat, veluti in hypochymatis. Quod vero ex medicamentis petitur, primum huc tendit, vt, quod præter naturam est, tum vacuet, tum digerat: quod si per mēbri naturam, aut etiã vitij rebellionem fieri non licet, vt id tum in pus vertat, tum putrefaciat: hoc vero secundo loco destinat. Quippe ita in columellæ vitio facimus, primum scilicet ad naturalem

τῶν κατὰ φύσιν, i. earũ quæ fm naturã sũt.

† ἀποπίπτου-
τες τὸ πρῶτον
ἐκ τοῦ σώματος.

3. Progn. l. 1. c. 11.
4. 209. c

* Non est in antiquis.

A. li. 3. f. 21. v.
c. 13. fol. 88.

A naturalem habitum eam reuocare tentantes: id si consequi non est, prorsus amputantes, id q̄ vel chirurgię opera, vel per caustica medicamenta. Verum medicamenta, melius est, in tractationem de ijs differamus (quandoquidem tribus iam proditis, aliam quoq; quartam adijciendam statui-
mus) ac chirurgiam in calce huius operis apponamus.

Quæ Secundum naturam, quæ Præter naturam propriè in nobis dicantur.

CAP. 14.

Non est igitur, q̄ in his amplius immoremur: sed transeundū ad ea, quæ similem ijs, quæ com-
prehensa sunt, curationem desiderant. Ea sunt, tum quæ in numero & magnitudine conue-
nientem modum excedunt: tum quæ in ambobus his deficiunt. Dixi hoc loco convenientem: q̄
si conferentem, vel conducentem, vel secundum naturam, vel vtilem alibi vsurpauero, eadem ser-
monis vis erit. Ac dictum quidem de his est alibi latius: ceterum redigere in memoriam summa-
tim omnia, etiā hoc loco alienum non fuerit. Omnium ergo, quæ in corpore habentur, primum,
cuius maxime indigemus, est ipsa particularum minime impedita functio. Hanc vero, quia possi-
demus natura, idcirco publice dicimus expetere nos secundum naturam agere. Et, quia hoc ip-
sum cum eo, quod secundum naturam se habet, est coniunctum, merito profectò nihil interesse
arbitramur, secundum naturam habere, an secundum naturam agere dicamus. Quin & sine ad-
Bditione interim græce dicimus expetere nos τὰ κατὰ φύσιν, vtiq; subaudito in dictione, vel ha-
bere, vel agere, vel ambobus: {Latinitas propter articuli fortassis inopiam, ea figura destituitur.}
Atq; hæc quidem causa est, cur medicis recte vsurpata vox hæc, Secundum naturam, sit de omni-
bus, quæ in corpore ex sententia nostra esse cupimus. Scire autē licet in ijs, quibus natura deficit,
nec primum, nec propter se ipsum, secundum naturam à nobis expeti, sed † propter actionem, ‡
& ex accidente. Siquidem sextus digitus non nullis ab ipso statim ortu est congenitus, & quin-
tus defecit: & alia quædam similia, aliqua in numero, aliqua in legitima quantitate, vitiosa. Ac, si
quidem hæc plurimum, recta vero rara fierent, contra, q̄ nunc, de naturæ operibus statueremus,
vitiq; non tuentes vt nunc, sed auferentes ea. Hæc ratio memoria tua nunquam excidat, cum sit ad
nominum vsum utilis, quæ tum fallere inconsideratos possunt, tum discordiæ phantasiā excita-
re, sicubi alter dicat totum, quod præter naturam est, esse tollendum: alter, quod nocet, aut inuti-
le est, aut incommodat actioni.

*De ijs, quæ in Magnitudine, & Numero excedunt vel deficiunt: ac primum de Curandis ijs,
qui Obesitate & corpulentia onerantur.*

CAP. 15.

Ergo denuo repetentes, de rebus loquamur, quando de nominibus est nobis definitum, hinc
ori. Coniuncta comprehensio iam morbis sunt ea, quæ vel magnitudine, vel numero, à debi-
to naturæ modo sunt aliena: in quibus amputare quidem conueniet, quod magnitudine vel nu-
mero redundat, reficere autem & fingere, quod delit, vbi videlicet fieri id licet. Quintum nāq; di-
gitum, aut tale aliud membrum, medico certe gignere non licet, sed vnus naturæ opus sunt oia ta-
lia. Verum in totum tollere, quod numero redundat, aut præcidere aliquid eius, quod magnitudi-
ne modum excessit, hæc nobis quoq; licent. Siquidem ex medici officijs vnum est, nec id leuissi-
mum, vbi in corpulentia eò deuenit corpus, vt nec ingredi sine molestia, nec sedem propter ven-
tris molem contingere, sed nec respirare libere possit, hanc liquare ac tollere, † æque nimirum, vt,
cum corpus ali delinit, (Atrophian Græci vocant) quod genus, quos vomica male habet, patien-
tur, ‡ huic quoque reficiendo prospicere. Sæpe autem euenit, vt non totum corpus, sed vna quæ-
piam pars ex atrophia tabescat: quam scilicet vel neruorum resolutio, vel ipsius partis intempera-
mentum, præcessit. Opportune q̄ iam de curatione horum considerabimus, orsi ab ijs, qui corpu-
lentia nimium onerantur. Ostensum vero in libris est, qui de temperamentis sunt inscripti, q̄ ca-
lidior siccior q̄ temperies exile corpus reddit. Ergo id agendum, vt nimium obeli corporis tem-
peramentum tale esse faciamus, si modo ad debitum modum redibit. Sanè docuimus tum in illo
Dopere, tum nihilo secius in opere de tuenda sanitate, q̄ acuta exercitatio, & tenuās victus, & id ge-
nus medicamenta, & animi cogitatio, temperamentum totum non solum calidius, sed etiam lic-
cius, ac propterea corpus exilius reddūt. Igitur in exercitationibus celerrimus cursus est idoneus.
Tenuantis verò victus materia seorsum singulari libro est prodita. Quod si medicamēta tenuan-
tia quoq; requirant, etiam hæc in operibus, quæ de medicamentis conscripsimus, sunt edita: quan-
quam referentur eorum nunc quoq; quæ sunt efficacissima: quibus, vbi demere nimiam obesita-
tem studes, vtaris, suadeo. Ergo, quæ ad articularia vitia quidem exhibere solent, quæ scilicet va-
lentem incidendi facultatem habent, ijs tu quoq; cum nimiam obesitatem curabis, vtitor. Sunt
porro talia, rutę semen, præsertim q̄ syluestris, vnā cum ipsis corymbis, & aristolochia rotunda,
& minus centaureum, & gentiana, & polium: præterea ex vrinam cientibus, ea, quæ pollentes ha-
bent vires, veluti petroselinum. Vnumquodq; enim taliū, tum ipsum per se, tum vero alijs mista,
vniuersa & extenuare potenter succos, & vacuare sunt habilia, partim quidem sensibilibus per vri-
nas, partim per insensibilem transpiratum: sed & sal, quod ex combustis fit viperis, potenter exte-
nuat. Multi q̄, cum vel graciliores, vel mediocris habitudinis essent, ex eiusmodi medicamento-
rum portione perierunt, sanguine ipsorum excoccto. Ruerant autem ad ea propterea, q̄ liberatos
aliquos articularijs vitijs viderant, minime s. estimantes, q̄ temperies eorum, qui sanati fuerant,

Septima Classis.

m m m m m m iij

humidior

* τὸ πρῶτον.

† δὲ τ. π. ο. σ. τ. ο.
secundatio

† Clarius.
æque nimirū,
vt cū corpus in
ea reddat atro-
phia, quæ in q̄
phthoe detrac-
tur, pauuatur.

humidior pituitosior q̄ erat, qualis nimirum obeforum est: in quibus eiusmodi medicamentorum E
securus est vsus. Ipse nanq̄ iuuenem quendam quadraginta circiter annos natum, oppido q̄ obe
sum percurauit, vsus tum antidoto, quæ aduersus articularia vitia est compolita, tum sale theriaco,
ipsa q̄ theriace, ac reliquo extenuanti victu, & pro exercitatione cursu veloci. Porro præparauit
hominem ad cursum, perfricando primum linteis asperis, quoad cutis ruberet: dein statim cum
oleo, quod in se digerēs aliquod medicamentum habebat: quo etiam post cursum rursus utebar.
Talia medicamenta sunt, tum syluestris cucurbitæ radix, tum althæa, tum gentiana, tum aristolo-
chia, tum panacis radix, tum polium, tum centaurium. Per hyemem vero etiam à balneo iam di-
cto oleo hominem reuinxisse profuerit. Verum cibum exhibere non statim à balneo, sed interpo-
sito somno, conueniet. Quod si velit etiam rursus ante cibum lauari, permittes. Magis etiam ad
rem pertinebit, si aquæ ipsi digerendi facultas inlit. Ac, si quidem talem aliquam sp̄te natam ha-
bemus, ipsa utemur: cuiusmodi in Lesbo vilitur, à Mitylene stadijs quadraginta: sin minus, ipsi
similem aliquam moliemur. Est porro ea, quæ in Mitylene conspicitur, & viribus & colore talis,
qualis vtiq̄ fiat, si quis florem salis aquæ marinæ misceat. Hæc ipsa aqua etiam hydropicis, & reli-
quis tumefactis idonea est, utpote valenter desiccans, ita profectò, ut præpinguibus, ac præcipue
siquis ipsos cogat in ea celerrime natare, nec post largam lauationem protinus esse bibere ue, sed F
somno interpolito, aut omnino saltem quiete. Sanè illud est sciendum, atq̄ ab eo, qui obefitatem
curat, prædicendum, q̄ aliquando ex multo simul obito motu, & febris hominem tentari est credi-
bile: & q̄ febris ad rem propositā non aliena erit vtiq̄, si medicus recte omnia faciat. Etenim per-
spicuum est, vbi ex lassitudine febricitarint, qui ita curantur, q̄ sopita eorum febre, rursus ad ean-
dem curationis formulam redibimus. Sanè fugere in ijs curandis cōueniet & vina, quæ multum
nutriunt, cuius generis crassa sunt: vti vero vel aquosis, id est colore albis, & consistencia tenui-
bus, vel quibus mare est admistum.

De Reficiendis corporibus extenuatis, ac Resituendis particulis, quæ deficiunt. CAP. 16.

AT, vbi eos, qui extenuati sunt, reficere in animo est, ijs vinum exhibebimus crassum: cibum
vero, qui succum efficiat crassum: exercitationes paucas, frictionem mediocrem: ac, ut sum-
ma complectar, omnia iam comprehēsis contraria moliemur. His vero etiam picari cōmodum
est, † id q̄ tertio aut quarto quoq̄ die: † quippe id ad carnem instaurandam, egregium medica-
mentū est adeo, ut si quod singulare membrū hoc vitio laborat, id hoc præsidio restituatur. Ac no-
bis quidē in omnibus ferme hoc vnum satisfecerit, siquidē humectat & calefacit, sanguinis mul-
titudine accita. Ergo nec assidue id ægotanti corpori admouere conueniet, nec, cum conueniet, G
sæpe illinere, verum in hyeme bis, in æstate semel id fecisse est satis. Quibus vero à natali die graci-
lia sunt membra quædam, ijs etiam mangones puerorum hoc ipso præsidio succurrunt, vna cum
certa percussione, quam græce Epicurū vocant. Est porro & illius mediocritas quædam, ut si
nec plus fusto, nec minus fiat. Ea talis est. Ferulas paruas ac leues modice illitas gracilibus parti-
bus incutiunt, donec modice attollātur: quippe in hoc summa rei est: veluti Hippocrates de per-
fusione † aquæ calidæ dixit, Primum quidem pars intumescit, post gracilescit. Ergo, quibuscunq̄
particulis bonam habitudinem reddere studemus, has & fricare, & perfundere, & percutere, & pi-
care oportebit tantisper, dum intumescant: hoc vbi factum est, protinus desistere prius, q̄ digeri
cœperint. Etenim, quæ calefaciūt omnia, sicuti attrahere, ita et digerere sunt apta. Si ergo perites,
dum, quod attractum est, digestū sit, operam luseris. Ad hunc modum mango quidam proximè
nates pueri † fame cōsumptas, † breui auxit, percussu mediocri quotidie vsus, aut saltem alternis
diebus: item moderata picatione. Cæterum, qbus totum corpus est extenuatum, ijs lauari quo-
que post cibum est idoneum. Veluti autem metus erat, ne tenuantibus auxilijs febris succederet,
corpore scilicet inmodice per hæc calefacto, sic ijs, qui à cibo lauantur, timendum est, ne sibi ie-
cur obstruatur, potissimum propter ciborum speciem: quippe cum aliter quoq̄ obstruere soleāt, H
quæ succum crassum gignunt, si quis his liberalius vtatur. Vbi igitur aliàs id efficere solent, mul-
to profectò promptius idem post balneum facient. Incidit tamē ex tali victu diutius exhibito, et
calculi in renibus generatio: quod vitium cur omnibus non contingat, satis patet. Quippe incre-
dibile non est quibusdam vel densos admodum esse renes, vel perangusta venarum in iecinore
ora: quibusdam contra esse habita. Horum q̄ dignotio nulla planè certa est: sed percontandum
assidue ab eo, qui iam dicto modo est cibatus, num quis illi grauitatis sensus in dextris præcordijs
& circa a renes sit. Quod si quid tale aliqn senserit, protinus capparī ex oxymelite in principio ci-
bationis, donec constiterit grauitas, dabitur. Ad membra vero, quæ ægre reficiebantur, ac pluscu-
lum iam refrigerata erant, vsus aliquando & thapsia sum, aliàs ea ex melle membrum illiniens:
aliàs etiam ex cerato: siquidem attrahit ea quoq̄ partibus, quibus superposita fuerit, sanguinis
copiam. Quibus autem exiguum aliquid pudendi preputio de naturali deest quantitate, ijs non
raro citra thapsiam sola tensione debitū modum reddidi, b membranulam mollem firmam q̄, cu-
ti gūmi illitæ circūuoluens. Satis autem constat, q̄ etiam membranulæ finem c parti subiectæ †
agglutinari gummi oportebit: siquidem & siccat cito, & sine dolore adstringit. Porro cui præ-
putij ex interna parte rotundum aliquid ac mediocre supponi prius oportebit, quod videlicet
postea,

* σικτιν, i. ch-
cimetu.

† δι ἡμερῶν
ἡτοι τριῶν ἢ
τετραῶν. i. id
q̄; triū uel qua-
tuor dierū spa-
tio.

Lib. de Offic.
med. sect. 3. t.
16. 7. 215. b

† In impressis
cod. & in plerif
que manuscri-
ptis græcis legi
tur, ὡς ἐπὶ τοῖς
i. gracilioris. in
aliquibus autē
ut Linacur vet-
tit. ὡς ἀπὸ λιμῶ
συνταχέντος. i.
fame plumpti.

A* † ὡς, i. lū-
borū carnes.

B* ἵνα χάρτε
i. sibiā vel mē-
branulā chartæ

C † τῶ ὡς
βελανιδίνης ἢ
τα μέρεϊ τῆς
ινός, i. illi parti
membranulæ,
quæ in superio-
ri regione sibi
subiecta est.

A. lib. 4. f. 7. c. 4
c. 2. fol. 519. b

Apostea, q̄ agglutinata membranula est, facile eximas. Eorum vero, qui thapsia præputium adducunt; quidam rotundum id è plumbo fecerunt, veluti solenarium quoddam: mox illi extrinsecus præputij cutim circuntendunt, ac molli loro deligant. Fuerit q̄ & id non nunquā vtile, vtiq̄ quibus multa deficit cutis: quibus autem exiguum est, quod deest, n̄s (vt comprehensum est) sola membranula circumdata sufficiat: vbi autem circūdabitur cuti, & agglutinabitur, subtus imponi solenarium prius oportebit. Ego vero, cum nihil horum præstō eī, modicum chartæ inuoluens, immittere pro fulcimento præputij soleo, vt postea, cum planè coaluit, quod foris est circumdatū, exempto, quod fulciuerat, facile meiat is, qui curatur. Constat vero hoc quoq̄ vitium ex eo morborum esse genere, quod naturalem magnitudinem est egressum, aliās putrescente præputio incidens: aliās ab ipso ortu minore, q̄ par erat, congenito. Subijcitur autem duplici chirurgiæ rationi, interim in superna pudendi parte circulo incisa cute, quò videlicet eius vnitate soluta, eatenus deorsum trahatur, quoad glandem cooperiat: Interim vero scalpro ex interna parte, qua glandis initium est, excoriata, mox deorsum tracta, ac deinde (vt supra comprehensum est) molli quopiā deligata. Dicemus autem & de eiusmodi rationibus in sermonis progressu æque profectō, vt de curtis id genus, quæ Colobomata Græci appellant: quippe ita vocant, quæ in labijs, aut narium Balis, aut aure deficiunt. Nam methodo quadam curantur hæc quoq̄, primum quidem excoriata vtrinq̄ cute, deinde adductis coniunctis q̄ inter se cutium oris: ac vtriusq̄, quod callosum est, detractō: mox, quæ reliqua sunt, adsutis atq̄ agglutinatīs. Eiusdē generis sunt, & quas in maiore oculi angulo Rhœadas græce vocāt, vtiq̄ vel impēsius minuto, vel prorsus perduto ipso angulo. At prorsus quidem perduto eo, omnino insanabile relinquitur vitium: minuto vero, n̄s, quæ modice adstringunt, curatur, si tamen totum corpus primum ante purgaueris, dein caput. Sunt mediocriter adstringentia medicamenta, & quæ è glaucio componuntur & croco, & quæ nardina vocantur: & in primis, quæ ex vino sunt confecta. Vt vero summa complectar, quibus perit ali quid substantiæ, maxime quidem id agendum, vt ei quā simillimam faciendam curemus: si id fieri nequit, saltem aliquid, quod eundem præstet vsum, machinabimur: erit autem profectō & id eatenus simile. Etenim, cum ossis tibiæ sæpe excidere portionem magnam cogimur, ad alterā loco eius substantiam producendam, carnem gignentibus medicamentis naturam ipsam prouocamus: quæ vtiq̄ inter initia velut dura est caro: postmodum calli durioris firmitudinem accipit: ac temporis spatio roborata, ad ingressum, ossis loco, fit habilis. Quin etiam, vbi internodia digitorum excidimus, in excisorum loco alteram, qualem prædiximus, naturam prouenire cernimus.

C Quod autem venas quoq̄ sensibiles generatas aliquando vidimus, prius est dictum: verum has non tam similes ijs, quæ prius perierant, quā eadē, renasci dixeris: veluti in cauis vlceribus carnem. Cicatrix vero, quæ in hac calli modo durata gignitur, ea cuti quidem est quā simillima, cutis tamen non est: quando & densior ea visu tactuq̄ sentitur: et ratione ex eo, quod pilos non edit, intelligitur. Hæc igitur si præstō tibi ad manum semper erunt, quæ tibi in curationibus peragenda sint, minime requires.

De Reliquis curandis Affectibus, qui ad prædicta genera referuntur.

CAP. 17.

Mhi vero iam tempestiuum est ad alia morborum genera transire, sed quibus est cum supra comprehensis societas. Ergo serpens vlcus, qui Herpes græce dicitur, is eiusdem est generis cum exulcerato erysipellate: Ramex vero, quam Sarcocelen vocāt, cum scirrhis. At vitia, quæ Ophiasin, Alopecian, & Ptilosin appellant, ex eo sunt morborum genere, in quibus naturale aliquid est amissum, æque nimirum, vt Myrmecia eorum est, quæ toto genere sunt præter naturam. Porro triplex omnium horum est differentia. Quædam nanque ex mutatione consistunt solidarum partium: sicut myrmecia, & leuce, & vitiligo, { & ossis caries, quam sphacelon vocant, } & elephas, & scabies, & lepra. Quædam, cum prius omnino non fuerint, postmodum sunt orta: vt Pluti meliceris, & atheromata, & steatomata: atq̄ alio modo helminthes, & ascarides, & cetera, ita enim vocant longā latamq̄ helmintha: omnia q̄, quæ supra diximus in abscessibus quibusdam, callosæ substantiæ, aut lapillis, aut ossibus, aut pilis, aut alijs quibusdam id genus similia inueniri. Itaque attentum esse semper oportet in omnibus, quæ præter naturam habentur, atq̄ diligenter advertere, ex quo ea genere sint: si modo illud recte à nobis dictum est, primam faciendorum indicationem, vnde ad omnia, quæ deinceps sunt administranda, initium capietur, à genere ipso sumi. Herpetas nanq̄ biliosus procreat succus: quo fit, vt eatenus eiusdem sit cum erysipellate generis, atq̄ huius quoq̄ magis etiam cum eo, quod exulceratum est. Differt autem ab erysipellate humoris tenuitate: est enim admodum tenuis, qui herpetem excitat, adeo profectō, vt nō solum oēs interiores partes, quæ vtiq̄ carnosæ substantia sunt, transeat, sed etiam cutim ipsam ad summam vsq̄ cuticulam (Epidermida Græci vocāt,) quam solam propterea, q̄ ab ea renouatur, tum erodit, tum exedit: quando, si hanc quoq̄ sudoris vice transiret, haudquā vlcus excitaret. Quippe id vlcus, quæ ex mordente humore oriuntur, quæ nimirum spontanea vocant, commune est, q̄ humor, qui ea facit, sistitur in exitu ac tardat. Porro ex eo, q̄ alter humor altero sit tenuior crassior ve, vlcus differentia, quæ ex profunditate spectantur, proueniunt. Huius certe generis est, & quæ Phagedana Græce dicitur, & exulcerati cancri. Quorum omnium cōmunis cura

Septima Classis.

m m m m m m iij

tio

METHODI MEDENDI

tio est, ut inhibeat primum humoris confluxio, post sanetur vlcus: propria vero cuiusq; tum ex E
 membri inuenitur natura, tum ex humoribus non solum specie, sed etiam quantitate. At tenuis-
 simus quidem in eiusmodi humoribus est is, qui exulceratum herpetem excitat: crassissimus, qui
 cancerum: proximum ab his locum occupat, quod ad crassitudinem attinet, qui phagedænas
 creat. Harum species quædam sunt, quæ Cheronia ac Telephia græce dicuntur. Iam alie quæ-
 dam eiusmodi appellationes sunt, sed inutiles & superuacue: liquidem ad curationem perno-
 sci oportet humoris tum copiam, tum crassitudinis tenuitatisque eius modum, tum potentiam:
 Veluti statim in herpete, quoniam humor tenuis est, (ut qui ex genere flauæ sit bilis) ubi sum-
 mam cuticulam in transitu perripit, utiq; cum digestus is est, permittit cicatricem vlceri induci.
 Itaq; si quis toto prius corpore purgato, mox, quæ influentem humorem reprimant regerant q;,
 medicamentis utatur, iam herpetem curauerit. Sin neutrum horum fecerit, sed tantum ea, quæ
 cicatricem inducunt, adhibuerit, utique exulceratam cuticulam ita sanauerit: proxima tamen il-
 li, quod minus exulceretur, non consuluerit. Postmodum vero illa quoq; cicatrice inclusa, quæ ip-
 si continua est, exulceratur: id quæ longo spatio, ceu serpente malo ipso, fit, donec humor, qui id
 facit, sit vacuatus. Etenim Romæ mulier quædam illustis, cum herpetem in malleolo haberet,
 primum quidem medicamento, quod algam recipit, est vsa. Hoc cum protinus cicatrix induce- F
 retur, proxima illi summa cutis est excoiata, veluti ex desquamatis. Cui cum deinde superpo-
 situm medicamentum est, rursus illi continua est exulcerata. Id quæ ita assidue perrexit, donec ad
 genu exulceratio perueniret: cum interim quiduis potius pati, quam medicamento, quod bi-
 lem traheret, purgari parata esset. Itaque etiam (quod fieri in talibus assuevit, quoniam plerique
 culpant non culpanda) damnato ex alga medicamento aliud admoueri iussit. Deinceps igitur,
 quod ex sandice componitur, utebatur. Ut vero id quoq;, quod exulceratum iam fuerat, sana-
 uit: quod vero nunc exulcerabatur, non inhiuit, sed iam ad bubones vsque vitium ascenderat,
 ipsa necessitate coacta, serum se lactis sumpturam annuit. Immittentes igitur clanculum mini-
 mum scammonia, inuitam purgauimus, ac sanauimus. Ergo, cuius gratia hæc dicta sint, denuo
 repetamus. Post, quàm communem omnium, quæ sub eodem genere vitiorum sunt, indicatio-
 nem acceperis, utique non hanc in particularibus exequeris, sed reduces semper ad differen-
 tiam, quæ tum affectibus, tum ipsorum causis, sit accommodata: sicuti de spontaneis ostensum est
 vlceribus. Vacuabis nanque eum, qui redundat, humorem, cæterum aliquando medicamento,
 quod flauam purgat bilem: sæpe eo, quod nigram: modo eo, quod mistæ est facultatis, quod scilicet
 bilem simul & pituitam educat: veluti in altero herpetum genere, quem à similitudine, quam G
 habet cum milio, Cenchria græce appellant. Quippe is non protinus vlcus facit, quemadmo-
 dum alter, sed admodum exiguas pustulas, ad speciem milij: quæ ipsæ interposito spatio in vlcus
 abeunt. Adeo non sineratione quibusdam visum est in eiusmodi vitio bili esse aliquid pituitæ
 admistum. Incidunt sanè non nunquam & citra vehemens totius corporis humorum vitium
 in partibus vlcera, quæ haud difficulter medicamentis, quæ repellendi digerendi q; mistas facul-
 tates habent, curantur. Ac repellunt quidem non solum ea, quæ adstringunt, sed etiam, quæ sine
 adstrictione refrigerant: digerunt vero, quæ calefaciunt. Constat quæ, quod in generatione vlce-
 ris exuperare debebunt, quæ repellendi facultatem habent: ubi non amplius confluit in egrotan-
 tem particulam vitiosus humor, quæ digerunt. Siquidem exiguum vitiosi humoris, etiam si quis
 ad viscera & magnas venas retrudat, nullum profecto, quod sensu percipiatur malum committet:
 at, si eius non levis quantitas sit, in princeps aliquod membrum aliquando procumbit, ubi scilicet
 prius nature viribus totum corpus expurgantis non sit vel per deiectionem, vel vrinas, vel
 cutim, quæ totum corpus includit, vacuatum. Atque flauæ quidem bilis vacuatio est facilis: pi-
 tuitæ vero, ac potissimum eius, quæ crassior glutinosiorque est, item quæ nigræ bilis, difficilior:
 quo magis purgantis medicamenti ope indigent. In herpete vero, quoniam tenuis humor est, H
 qui id vitium creat, abunde est etiam aluum leuiter soluisse, vel vrinas per ea, quæ id modice
 efficiunt, citasse. Verum, quoniam de medicamentorum methodo proditum etiam aliquid in
 superioribus est, non pauca autem & in operibus, quæ proprie his sunt dicata, satius sit sermo-
 nem nihil ultra proferre: quando satisfacere etiam ei, qui attentus erit, hæc possint, neque enim
 nos ea à musis accepimus. Verum homini, qui prudens sit & diligens, & mente exercitatus, ipsa
 rerum natura, quid agendum sit, suggerit: ubi vero etiam inueniendi viam ab alio quis traditam
 ceperit, huic facillimum est per eam ultra progredi. Huius rei amplum testimonium fuerit, quod
 eiusmodi uiri artem maximis operibus illustrarunt: qui uero parum sunt prudentes, ij nihil præ-
 terea inueniant, etiam si tota uita infinitos artis effectus conspexerint. Plurima nanque inueniun-
 tur hodie quæ, quæ apud maiores nostros non fuere inuenta: ueluti nunc Romæ quidam excogi-
 tauit, quemadmodum acrochordonas & myrmecias ore sanat. Verum de prioribus, utpote à cu-
 te extantibus, minus est mirum: de myrmecijs uero, potissimum quæ cum summa cute prorsus
 sunt æquales, mirum uidebatur. Veruntamen has quoq; primum labiorum applicatione, ceu
 fuctu, ad se trahebat, atq; à radice euellebat: deinde primoribus apprehensam dentibus totam si-
 mul eximebat. Sed & scalpro ad myrtacei folij speciem formato, & ferramento eo, quod Scolo-
 pomacherion

A.li.4.f.3.t.1
c.7.fol. 452.

* ἀναιμία.

lib. 4. f. 7. r. 3.
3. fol. 16. h

Apomacherion Græci vocât, quîspiam manibus exercitatus, facile eas excidat: cum propriis lineamentis à circumposita cute circumscripta discernatur. Æque vero & valente aliqua pinna circulo myrmecia imposita ipsam educimus. Debebit porro pinna fistula esse myrmecie crassitudini par, ut eam undiq; prorsus constringat: quæ postea circumacta, ac simul deorsum impulsâ, celerime ita myrmeciam etiam cum ipsa radice totam educet. Constat vero, & quod finis ipse pinne, quæ eam circulo secabit, non tenuis modo, sed etiam acutus & firmus esse debebit. Itaq; tum galli veteris pinna, tum vel magis aquilæ, ad hunc usum esse comoda. Abscidere vero ab his tantum radicem versus oportet, quatenus reliquæ partis fistula completi myrmeciâ possit. Sanè ex ipsa statim abscissione, si modo scire fiat, etiam acumen ipsi comparabis. Atque hoc quidem ratio inuenit, non casus. Iam, quod hæc vehementer attrahentibus medicamentis sursum velletur, & putrefacientibus enecabitur, ratione ab aliquo est inuentum, qui iidem postea usus, experientia rem comprobauit. Quædam nanque etiam ante experientiam fiduciam de se manifeste præbent: veluti, quæ aculeum ac telum, quod modo infixum sit, eximunt: item q; arenulas, si quæ oculo inciderunt. Quædam ratione certe excogitantur, confirmantur autē t̄ iplo usu.} Quod autem facilius etiam per te eiusmodi vias ad curationum comparandam copiam inuenias, non te debitaliquod

* ipsa experientia.

Bhuius generis exemplum proponere. Nominamus autem id genus, in numero particularum vitium. Quoniam enim quædam deficient, sicut dens, vel digitus, vel è nato ala, vel auris quæpiam particula, vel pudendi pellis: quædam redundant, veluti sextus digitus, & quæ Græce *Exostoses* dicuntur, & dentium n̄, qui naturalibus adnascuntur: adimere quidem, quod superuacuum est, sanè haud difficile est: aliud vero producere, quod simile ei sit, quod desit, id in quibusdam quidem est facile, in quibusdam difficile, in aliis planè neri nō potest. Si nanq; carnosum sit, quod deest, haud magno negotio id reficias: atque eius rei in cauis vlcibus tradita methodus est. Sin os sit, ipsum quidem instaurare non est, ceterum aliud pro eo durum efficere, id licet. Dictum vero etiā in præcedentibus est de reficiendis venis, nempe quod aliquando nouas alias sensibilibiter progenitas vidimus: aliquando omnia tentantibus non prouenerunt.

De Refarciendo Pilorum defectu.

CAP. 18.

AT, si digitus desit, vel tale quippiam, restituere id prorsus non licebit. Sanè proditum & de præputio prius est, quemadmodum id quîspiam instauraret. At, quæ in naso, vel aure, vel labio sunt curta, ea quidem ut refecisse non licet, ita decorem aliquem his adicere licet, siquis diuisam vtrinque cutim mox in vnum cōductam queat agglutinare. Alia vero ratione huic morborum generi annumerantur atheromata, & steatomata, & melicerides, & ascarides, & ceria, & helminthes: præterea, qui in articulos & pulmones incidunt, calli, quos poros vocant: item q; qui in renibus & vesica inveniuntur, calculi: quippe in omnibus his communis est substantiæ generatio, quæ ante non fuit. Contra fit in alopecia, & ophiali, & ptilosi, item caluitie, in quibus amissio particulæ est, quæ utilis fuerat. Tanquam igitur in ceteris omnibus, in quibus gigni quippiam volumus, id agimus, ut naturæ motus liberos minime quæ impeditos reddamus, eodem certe modo & in pilis amissis. Quippe naturæ opusest, veluti in linuosis vlcibus generatio carnis, iidem in capite & palpebris productio pilorum. Ergo, si recordaberis ea, quæ in naturalibus libris nostris de pilorum generatione didicisti, utique ex ipsis amissionis eorum causas inuenies. Siquidem ostensum in iis est, quod ex succis, qui per cutim transpirant, quod limosum est, id pilos tum à principio gigni: tum de cetero veluti succrescendo auget. Hoc igitur quoties vel prorsus perit, vel redditum est vitiosum, toties pilos corrumpi est necesse. Corruptuntur nanq; & stirpes ipsæ duplici de causa, alias nutriente succo destitutæ: alias non idoneo vsq;. Ac prorsus quidem perditio eo, qui pilos alat, succo caluities oritur. Eodem vitiato, tum quas *Ophiales* græce vocant, tum alopeciae proueniunt. At primum quidem t̄ ex naturali eorum tum ortu, tum mutatione,}

Detiam alienam à natura causam inuestigabis. Ab hinc curationis rationem inuenies. t̄ Quæ utiq; per indicationes omnibus iam dictis (in quibus vel aliud quoduis vitium, vel etiam vlcus, ex humoris vitio incidit) communes peragetur: liquidem & inhibere, quod influit, & absumere ac digerere, quod iam egrotantem locum occupauit, cōueniet. Ergo, ceu in vlcibus illis purgationem nocentis succi primum adhibuisti, eodem modo in pilis ipsis ab hac primū curationem inchoabis, scilicet diligenter prius æstimans, quis color cutis sit, cuius cernis corruptos pilos. Nam, si his albidior, quàm pro naturæ habitu, sit, pituitosi humoris purgationem exhibebis: sin pallidior, eiusmodi bilis purgationem non secus, quàm, si nigrior conspicitur, quæ nigram detrahant bilem, offeres. Sanè ad vitiosi humoris speciem certius agnoscendam non leue tibi adiumentum præcedens victus conferet, præsertim intelligenti, qui nam ciborum nigre bilis succum colligant, qui nam pallide, vel pituite. Ergo, cum iam planè purum ex purgatione corpus existimas, eum, qui in cute continetur, humore digerentibus medicamentis discuties, sic tamen, ut in iis caueas, ne adeo calida acria q; adinoucas, ut cutis exulceretur. Quin etiam ea, quæ valenter liccant, cauere conueniet, ne videlicet cum vitiato humore etiam vtilem, qui adfluit, absumas: veluti in caluicie fit. Hec igitur ipse aduertens, admiscui primum iis medicamentis, quæ alopecia sanarent, exiguum thapliæ. Deinde considerans quotidie, quemadmodum egrotantis natura ab hac esset affe-

cta,

lib. 1. f. 1. d. 5.
1. fol. 10. b

lib. 4. f. 7. r. 1.
1. fol. 505. h

* *ὁ αἰσθητός* est in impressis & in aliquot an-
tiquis: in aliis
αἰσθητός, i.
salignosum.

t̄ in græco tūc
est, *ἐκ τῆς κα-
ταρῆς τοῦ αὐ-
τοῦ δεικνύ-
σας*, hoc natu-
rali ipsius mo-
deratione.

t̄ *ἐν δὲ κατὰ
τὴν φύσιν τῶν
κατὰ τὴν φύσιν
τοῦ αὐτοῦ
κατὰ τὴν φύ-
σιν* —
vix, i. quæ in-
dicantur p̄ sto-
pos oibus iam
dictis & c.

ēta, vbi vel tumefactam plusculum, vel quodammodo excoriatam vidi, illo quidem die à medica-
mento abstinui: illeui autē particulam vel galli vel anseris liquato seuo propterea, quòd hec ma-
gis tenuium sunt partium, & altius descendunt. Deinde postero die, si quidem aliquid iam dicto-
rum remanserat, simili modo illeui. Sin nihil tale apparuerat, rursus medicamēto sum vsus: atq;
vt id alte demitteretur, etiam cutim prius linteo infricui, quoad manifeste rubra fieret. Verum, si
à balneo vti eiusmodi medicamento voles, id ipsum ex balneo factum cernes, quod prius ex fri-
ctione habebas. Iam eos quoq;, quibus periere ex ciliis pili (quos græce Pilus nominant) simi-
libus genere medicamentis sanabis.

De Oculorum vitis, qui sunt toto genere Præter naturam, ac de alui Lumbricis.

CAP. 19.

DEliges autem materiam oculis idoneam: nec per negligentiam committes, vt medicamen-
tum intra tunicas eorum confluat. Itaque sicca tutiora sunt: de quibus æque, ac de ceteris, in
nostris de medicamentis operibus est proditum. Nunc enim (quod dixi) abunde est sola genera
medicamentorum, prætermis-
sa particulari materia, transcurrere, quò minus de iisdem identidem
dicere cogar. ^a Ergo, quæcūq; ab ipsa naturæ moderatione sunt aliena, ea tota tollere conueniet:
quæcūq; vero ^b sub hac se tenent, & cæterū quodammodo corrupta sunt, ea restituere, quatenus
licet, oportebit. Sanè dictum à nobis est aliqua ambiguae naturæ esse. Nec illud nō dictum, q̄ eo-
rum, quæ aliena sunt, quædā tota substantia sunt aliena, ^c logica scilicet inquisitione, nec ad cura-
tiones in quibusdam affectibus perinde vtili. Siquidem pterygium à sanitatis habitu alienū esse,
patere cuius arbitror: non tamen idem substantiæ ratione, quemadmodum atheroma & melice-
ris, est alienum. Sanatio vero huius quoq;, dum paruum adhuc est & molle, per ea medicamenta,
quæ detergent, perficitur, cuius generis sunt, quæ trachomatica vocant: vbi magnum durum q̄
euasit, chirurgiam postulat. Simili ratione & aquularum (quas Hydatidas vocant) quæ magnæ
sunt, chirurgia curabis: quæ parvæ sunt, siccantibus medicamentis iuuantur. At Chalazion (est
enim id quoq; ex vitis, quæ oculos infestant, vnum) cū toto genere alienū à natura sit, auferri po-
stulat. Adeundem modū & pus ab oculis, quos Hypopius vocant: verū id plerunque medica-
mentis digeritur. Hypochyma vero iam incipiens digeritur: vbi diu constitit, non potest. Ætate
vero nostra ocularius quidam medicus, cui Iusto nomen erat, etiam concussione capitis multos
hypopius sanauit. Collocans enim eos in sella rectos, ac capita eorum vtrinque à lateribus appre-
hendens, mox quatiebat adeo, vt manifeste descendere pus ipsi videremus. Mansit autem horum
pus deorsum propter grauitatem substantiæ, tametsi hypochymatis nequaquam manētibus, nisi
admodum ea quis diligenter impingi cogeret. Etenim leuius est, ac, vt ita quis assimilet, nebula
similius hypochyma, quàm pus: quanq̄ horum quoq; ipsorum quædam (hypochymatum dico)
ferioris humoris sunt. Hæc autem punctione ad præsens discutiūtur: interposito tamen haud
longo spatio, ^d ceu limus quidam deorsum fertur. At, quando pus, quod in oculis est, digerere
placet, collyriis, quæ myrrham habent, maxime vtemur: quæ vtiq; & Diasmyrna Græci proprie
vocant: his certe minus, sed reliquis melius faciunt, quæ Dia libanu vocant. Quæ vero impense
siccant, ad præsens certe valenter vacuant, sed, quod reliquum est, ita cogūt, vt egre resolui possit,
veluti de scirrholis tumoribus prius est comprehensum. Subinde vero multum simul puris va-
cuauimus diuisa tunica ea, quæ cornu est specie, paulo supra locum, quo committuntur inter se
tunicæ vniuersæ. Nominant porro locum græce alij irin, alij stephanon id est coronam. Quo fit,
vt hoc quoq; vitium tribus subiiciatur vacuandi modis, & chirurgiæ, quæ simul multum aut to-
tum expellit: & per medicamenta, quæ paulatim: & ei, quæ ad alium ignobiliorem transfert lo-
cum, veluti in concussione. Sunt profectò (vt dixi) ex genere eorum, quæ tota substantia præ-
ter naturam sint, & ascarides, & helminthes, siue eæ teretes sint, siue etiam latæ. Quocirca & pror-
sus eas expelli è corpore conueniet. Expelles autem, si prius enecaueris. Necabis autem ama-
ris medicamentis: viuentes nanque obliſunt intestinis adhærentes, at mortuæ expel-
luntur vnà cum stercore. Expelluntur cum hoc etiam viuæ, sed stupefactæ, &, vt
ita quis dixerit, semimortuæ factæ. At teretes quidem absinthium perime-
re potest. Latæ vehementiora medicamenta desiderant {cuiusmodi
est filix:} Parī modo, quæ Ασκαρίς græce dicitur. Verum
de medicamentorum copā dicere non est præ-
sentis propositi. Quare hic iam huic
quoque libro finem im-
ponamus.

Galenī

Α† ὅσα μὲν
τοῖνυν ἀλλό-
τρια τῆς κα-
τὰ φύσιν ἐστὶ
διοικήσεως.

Β† τοῖνεία μὲν.

C† Hoc loco
inter dictionē
aliena, & logi-
ca codex qdā
antiquissim⁹ græ-
cus intercapē-
dinē plurimum
versuū habet, ī
q̄ vox, λέγει,
q̄, deesse, signi-
ficat, legunt.

† Α†. καθά-
περ δὲν τις
ἰλὺς, i. ceu vi-
ni fex quædā.

H



GALENI DE ARTE CVRATIVA AD GLAVCONEM LIBRI DVO

Nicolao Leonicensi interprete.

Ab Augustino Gadaldino recogniti.

ARGVMENTVM LIBRI

Docet Rationem Curandi, febrium exemplo, quæ vel absque putredine, vel cum ipsa hominem inuaserint: Item propositis symptomatis, quæ frequentius aut vehementius lædunt.

De communi & propria Hominum Natura dignoscenda, ac ex quibus Medendi via ac ratio constituitur.

CAP. I.



QUOD quidem non communem tantum hominum naturam medicum cognoscere oportet, o Glaucō, sed & vniuscuiusque propriam, & dudum ab Hippocrate recte traditum est, & nos in ipsis artis operibus (ut nosti) circa id sufficienter studuimus. Non tamē propriam singulorum naturam æque, atque communem, possibile est scribere. Verum scripta contrario modo se operibus habent, tum in pluribus aliis rebus, tum præsertim in iis, quæ ad præsentem pertinent intentionem. Petisti enim à nobis, ut tibi vniuersalem quandam medendi viam ac rationem, quasi per figuram & quoddam compendium, ostenderemus: hæc autem qualitate & quantitate singulorum auxiliorum perficitur, nec nō & modo eorum usus, & temporis occasione, quæ præ omnibus est cognitu difficillima: circa quam præcipitem admodum existentem (quemadmodum quodam in loco etiam scribit omnium bonorum nobis author Hippocrates) vides plerumque medicos non modo vulgares, sed & præcellentes, aberrare. Quin & quod magni etiam momenti sit, si quantitas bona coniectura viribus accommodetur, idem vir pariter scripsit. Cum igitur ad recte medendum plurimum conferre & temporis occasio, & auxiliorum quantitas, videatur: inuenies autem hæc unicuique egrotanti propria, nihil autem proprium possit sermone explicari: hoc pacto, quod commune est, cogimur scribere, quamuis id sit vsu secundum. Nam & quosdam aliquando ægrotos visimus, cum quibus dum sani essent, non eramus versati: quo fit, ut neque, quem colorem, quam habitudinem, aut naturam calorem, aut quem arteriarum pulsum, à natura habuerint, agnoscamus: quæ si sciremus, magnitudinem morbi satis aliquando iudicare possemus: nam, quantum vnumquodque à naturali statu recedit, ad tantam morbus magnitudinem peruenit: quantum vero recedit, solus ille scire potest, qui naturalem statum exquisitè cognouerit. Cum igitur hoc in ipsis fuerit nobis ignotum, ne omnino hesitemus, ad commune confugimus, quamuis ad usum secundum locum obtineat: hic vero artifex plus aliquid, quam is, qui arte caret, assequitur. Quid vero hoc ipsum plus sit, primus omnium, quos nouimus, & hoc memorauit Hippocrates: plenius autem de hoc scripserunt, qui Hippocrate fuere posteriores, atque illius scripta accurate legerunt: ex quorum numero vnus fuit Mnesitheus Atheniensis, vir tum in aliis omnibus, quæ ad artem pertinent, sufficienter doctus: tum vero, quæ via ac ratione medendi scientiam oporteat exercere, nemini peritiam secundus. Hic igitur Mnesitheus à primis atque supremis incipientes generibus, putauit secari illa oportere in alia genera speciesque & differentias: hæc rursus in alia diuidi: ac denuo ista eodem modo, donec ad talem perueniremus speciem, post cuius diuisionem in vnum numero & indiuiduum desinereamus. Mihi vero, qui ad te scribam, satis est breuibus meam explicasse sententiam. Nam ridiculus

1. Epid. sect. 3.
t. l. 3. a. 17. a

1. Apho. 1. Ex.
ord. 2. b

Lib. de Alimentis
post mediū.

1. Prog. l. 2. 4.
189. c

DE ARTE CŪRATIVA

culus videri possem, si tua te velim docere, tanquam nō multo antea à Platone illa didiceris: neq; E enim vt te docerem, quam viam ac rationem in diuisionibus sectari oporteat, hæc volui meminisse, sed quoniam mihi ad sequentia omnia plurimum cōducere existimaui. Et, cum à me exigeres ediscere causam, ob quam medicorum plurimis aberrare contingit, non aliter tibi ostendere poteram: etenim, quæ in aliis hæresibus contingunt errata, & quæ multi medici nunc in agrotantium curatione delinquant, hanc primam atque præcipuam causam habent, diuisionis scilicet prauitatem. Quidam enim in primis & supremis generibus stant, solum, quæ ab illis sumuntur, indicationibus contenti: quidam vero vsq; ad aliquid diuidunt, non tamen vsq; ad finem perueniunt: non nulli vero etiam vitiosis vtuntur diuisionibus. Qui vero & omnia, quæ sunt secundum naturam, & quæ præter naturam, ad eiusmodi methodum reducit, atque ab omnibus his per diuisionem inuentis sufficientes sumit indicationes, hic solus, quantum humanis permittitur viribus, medendo nō errabit: atque illos quidem, quorum habet notitiam, melius curabit, quā alios: ignotos vero proxime illis, quoad fieri poterit, ad sanitatē perducet. Siquis enim primum distinxerit eam, quæ secundum ætates, differentiam: deinceps autem eam, quæ secundum temperaturas atque potentias, cætera que omnia, quæ hominibus insunt, colores dico, atque calores, habitudines que, pulsuum motiones, exercitia, alitūdines, atque animi mores: his quoque adiunxerit F eam, quæ maris à foemina, differentiam: & quæcunque ad regiones, & anni tempora perinde, alias que eius, qui nobis circumfunditur, aeris constitutiones recto modo distinxerit: hic ad propriam laborantis naturam agnoscendam proxime accedet. Sed ex his omnibus non nulla quidē in libris de pulsibus: non nulla vero in iis, in quibus agitur de temperaturis, sunt determinata: Sicuti, quæ præter naturam sunt, vniuersa quomodo inter se & speciebus, & generibus differant, in libro de passionibus est præfinitū. Nunc vero de iis solum ægrotis dicere proposuimus, quorum natura, antequam morbum contraherent, nobis erat exquisitè perspecta: cum quibus tamen & reliqui omnes intelligentur, qui nobis erant ignoti: nihil enim difficile ab eo, quod est perfecte distinctum, id, quod non tale est, inuenire.

De Causis & Signis Februm Ephemerarum.

CAP. 2.

INitium igitur sumemus à libris: quoniam & tu in his præcipue curandi artificium habere cupiebas. Et primum quidem de his sermonem habeamus, quæ simplicissime sunt, quas Hippocrates ꝑ ephemeræ, id est diarias, appellat. Hæ vero sunt, quæ propter lassitudinem eueniunt, & ebrietates, atque iras, furōres, atque mœrores, atque alias animi curas vehementes. Et, quæ ex bu- G bonibus febres ortum habent, ex hoc genere sunt, præterquam si absque vlcere fiant manifesto: tunc enim suspicionem afferunt, & nullo modo mites sunt. Et vigilie plerunque simplicem febrem induxerunt, sicut frigefactio, & exustio quandoque. Atque hæ omnes febres soluantur facillime. Oportet siquidem eos confestim ducere ad balneas, atque ad aliam consuetam victus rationem: quandoquidem, qui pertritum illum sermone medicorum triduanum terminum admittunt, sæpius aciores febres effecerunt, quāuis & aliter præterea delinquant: quemadmodum cernis ex eis plures in quolibet ingressu delinquere ita, vt manufactas planè faciant egritudines. Sed curatio quidem harum febrium in promptu est, sed earū dignotio maiorem exigit diligentiam, de qua nemo ante nos, quantum oportuerit, scriptum reliquit: quare minus mirandum cōplures tantum in medicinæ operibus aberrare, quātum etiam cognitione falluntur. Sæpius enim quidam ab initio casu aliquo in graues morbos incidunt, veluti vino pleni, aut Sole exusti, aut frigefacti, aut lassitudine oppressi, aut vigilias passi, aut ira concitati, aut quauis alia causa, quæ per se nocere natura sit apta, correpti: deinde totum in causa antecedente consistere, neq; aliam subesse dispositionem arbitrati, circa victum negligentius se habent adeo, vt se ipsos lateant in insanabiles, aut egre curationem admittentes morbos prolabi. Ob hæc igitur ante omnia curare oportet, H quemadmodum etiam Hippocrates admonet, vt non solum futura præcognoscamus, sed præterita etiam atque præsentia. Nam, & quod nunc proponitur, ad eam artis attinet partem: quod pro viribus manifeste trademus. Neque enim parua est differentia, si laueris iam ægrotantem, & securum esse iusseris, aut eum per omnem custodiam securitatem que traduxeris. Cum igitur ad ægrum accedes, primum à maximis, quæ circa ipsum sunt, consideratio incipienda, deinde & ab aliis, adeo vt nec minimum aliquod pro viribus omittamus: nam vt magis aut minus ei, quæ sit ex maximis, indicationi credamus, ex aliorum sit adiunctione. Maxima quidem in omnibus febricitantibus signa, in pulsibus atq; vrinis consistunt. His vero addere oportet, & quæcunque alia circa faciem Hippocrates scribit: accubitum quoque, & respirationem: item ea, quæ per superiora vel inferiora excernuntur: Et siquid aliud accidens circa aliquam corporis partem, aut operationem consistere videas, qualia ille mille in millibus scripsit: neque ex his vllum aliquod negliger prætereas. Hæc quidē omnibus febribus communia sunt. Itaq; etiam in simplicissimis, de quibus præfens est sermo, nihil horū relinquere oportet. At, postq̃ ex pulsibus atq; vrinis febris naturam perceperis: cum pulsus nullum inflammationis signum habuerit, neq; omnino inæqualitas in vna arteriæ cōpulsione apparuerit, aut si hoc affuerit, omnino sit imbecille: vrinæ aut oīno similes

A. lib. 4. l. 1. l.
c. 7. fol. 418. a

4. Aph. 55. Ex.
ord. 33. c
* οργας.
* θυμης.

1. Progn. l. 2.
4. 189. c

* ἴσθες, i. morē.
AP. εἶδος, id ē
speciē seu formam.

A. lib. 4. l. 1. l.
c. 5. fol. 412. d

Asimiles iis, quæ secundum naturam se habent, aut non multum à naturali statu recesserunt: tunc & ad omnia illa, quæ antea à nobis sunt dicta, accedere oportet. Et, cum veluti chorus quidam omnia concinne loquuntur, tunc etiam fidere oportet, ac, si libeat, interrogare, nunquid aliqua manifesta antecesserit causa. Siquid enim huiusmodi ager fateatur, expectata prima febris solutione, statim oportet lavare, cum tunc certior tibi sit facta dignotio, & ex ipso solutionis modo. Nā arteriarum motus in hoc in totum assimilatur ei, qui in sanis deprehenditur: cum in nulla alia febre ad naturalem habitum reuertatur, neque si multum temporis inter primæ accessionis finem & secundæ principium interciderit, quemadmodum in tertianis atq; quartanis: in illis enim febris remanet signum, in ephemeris autem in totum aboletur accessione cessante. Plurimis vero earū & humidi quidam vapores, & quibusdam etiam sudores optimi apparent: aut omnino quidam plurimus veluti vapor ex intimo corporis exit. Sed & vrinæ quoq; multo nunc meliores, quam circa febris principia, videbuntur. Et, si capitis aut alterius partis dolor simul inuaserit, neque hic amplius persistet. Ægrotantis quoque in tolerando facilitas, magnum & ipsa signum, tanquam sigillum quoddam, ultra omnia alia signa, febris bonitatē tibi indicabit. Et, si, dum lavantur, neq; horror quidam insolitus molestauerit, neque alia tristitia affuerit: & si post balneum deinceps

Bene se habere perseveret, tunc ne verearis cibum offerre. Vinum quoque sine formidine ad potandum exhibe, adhibito tamen, ut præsentia exigunt, modo. Nos autem, ut te non latet, eis causam, quæ antecesserit, solemus dicere, neq; expectamus, ut illam egrotus anticipet enarrare: quod maximum est argumētum, illum non errare, qui talem sit adeptus facultatem. Si igitur remanentibus adhuc animi affectibus consideratio habeatur, tunc ex pullibus maxime tentanda dignotio, quemadmodum in libris de pullibus scripsimus: post hos vero & ab aliis dignotio est petenda. Quod si illi iam quidem cessauerint, remaneat autem dispositio, paruum quidem ex pullibus habebis indicium earum, quæ febrem attulerūt, passionum: sufficient autem tibi & sine pullibus reliqua. Communiter quidem omnibus vrinæ rufæ. Adiungitur vero iis, qui propter tristitiā febricitant, acritudo potius, quam abundantia caloris: quemadmodum ē diuerso iis, qui propter furorem. Sed & extenuatio corporis in iis, quos tristitia, quam in iis, quos cura vexauit conspectior existit: oculorum præterea cavitās, ac quedam inconsumpta decoloratio. Hæc quidem sunt & in aliis, qui quouis modo diu cogitarunt, communia. Maxime autem & ex oculis distinguere oportet: nam ex his etiam in sanis animæ mores possumus coniectare: at in egrotis, si quis diligenter inspicere queat, sunt indicia certiora. Sic quidem eos, qui propter disciplinas, aut contemplationem aliquam diu cogitarunt, ab iis, quos tristitia corripuit, discernere oportet. At eos, qui vi-

* *Al. ligatus.*

Cogitarint, distinguit forma palloris: nam in ipsis facies est subtruncata: & oculorum motus manifestus, vix enim palpebras attollunt: inest etiam palpebris humiditas, nam, qui tristantur, aut cogitationibus detinentur, his exiccantur. Cavitās vero est commune accidens omnibus, mœrori, vigiliis, cogitationibus, non tamen furori: in hoc enim neq; oculorum cavitās, neq; pallor manifestus, & plus caloris, atq; celerius ex imo prorumpit: neq; pulsuum magnitudo destruitur, quemadmodum in vigiliis, tristitia, & cogitationibus. Quare hæc à furore apertissime distinguuntur: abinuicem vero, quemadmodum diximus antea. Eorum autem, qui ex lassitudine in febrem inciderunt, cutis est sicciior, quam in alia aliqua ephemera febre. Sed hoc quidem omnibus ex lassitudine febricitantibus commune existit in tempore accessionis, donec consistit: post hoc vero pluribus, modo nō sint supra modum labore vexati, quidam humidi vapores, aut calidus vapor, ex intimo corpore effertur: quibusdam vero, etiam postquam febris consistere desiit, siccitas perseverat: quod maxime accidit iis, quos superfluous labor oppressit, aut refrigeratis, aut à Sole exustis simul cum lassitudine. Et quidem pulsus non eodem in vtrisque modo se habent, quia parui quidem iis sunt, quos superfluous labor vexauit: in aliis vero magni. Quæ vero cute condensata

* *Al. intolera.*

Dta accidunt febres (condensatur autem hæc aut ex frigore, aut ex qualitate aliqua, quæ vim astrin- gendi habet, subito ei adueniente, velut illi, qui aqua aluminosa se lauit, accidit) hæc quidem ex omnibus febribus solæ sunt astricta passio. Has vero tactu cognoscere licet, quemadmodum & arentes febres, & quæ ex lassitudinibus & exustionibus fiunt: nam neque harum densitas eos queat latere, qui tactum habent exercitatum. Sed & caloris motus nescio quo pacto resurgit, qui mitis quidem in primo tactu sentitur: acris autem, si plusculum tardemus. Non tamen & his vrinæ sunt rufæ, neque corporis moles concidit, neque etiam oculi caui atque aridi fiunt: quoniam etiam quibusdam humecti magis atque prominentes apparent, quam n, qui secundum naturam se habent. Neque sunt pulsus minores, cuiusmodi in mœroribus, curis, aut vigiliis, aut valde immodicis exercitiis apparent. Febres autem, quæ ex bubonibus fiunt, pulsus habent maximos, veloces, atq; frequentes: multus q; illis calor inest: ac, postquam febris constitit, statim ex profundo quidam emergit humidus vapor, calidus quidē, sed mitis, acrimonia enim & mordacitas minime omnium febrium, huic generi febrium adest: atq; ut plurimum facies rubicunda illis & magis tumens: vrinæ q; subalbide. Communis autē omnibus huiusmodi febribus est pulsus equalitas: nam pauca admodum ex his febribus eam, quæ in vno icū, in equalitatē ostendunt, & neq; ipsæ satis aperte ac manifeste illam præ se ferunt. Talia quidem sunt ipsarum indicia.

De

DE ARTE CVRATIVA

De Curatione Februm Ephemeraum.

CAP. 3. E

CVrare autem oportet omnes quidem balneis. At, qui ex densitate cutis aut ex bubonibus febricitat, si in aere balnei morari iusseris, haudquaquam nocebis: reliquos omnes qui citissime oportet ab aere semovere: si vero diutius in aqua immorari voluerint, permittendum. Oleo autem tepido & multo & manibus mollibus perfricare quam plurimum oportet, precipue quidem, qui ex lassitudine febricitant: secundo aut loco, qui meatus habent adstrictos: & tertio, qui ex bubonibus febre incurrerunt: sepius aut istos lavare oportet, in quantum contigerit. Cibum autem allumere, qui ex lassitudine febricitat, possunt multoties, non eque tamen, qui ex densitate cutis aut bubonibus febricitat: at his utrisque tenuis victus est optimus: qui vero ex lassitudine febricitant, precipiendum est, ut cibos assumant concoqui faciles, ac cruditate precipue deuitent. Sed & vinum potare, quantum possunt convince re, sunt permittendi. Mensura aut ratio, quemadmodum in aliis omnibus, ex viribus, & etate summi agrotantis, nec non & ex naturali temperatura, & praeterea ex consuetudine, & anni tempore, & regione, atque aliis huiusmodi. Qui vero ex bubonibus febricitat, arcendi sunt a vini potu, donec bubones solvantur. At, qui cutis foramina habent adstricta, vel refrigerati sunt, si non multum hoc affectu laboret, neque plenum corpus habeant, non sunt a vini potu prohibendi: at, qui pleniore corpore sunt, vel multum refrigerati, prohibere utile est. Qui vero ex vigilis aut aliquo animae affectu febricitant, postquam balneaueris, cibo humectate ac boni succi reficere expedit. Vinum vero omnibus, sed precipue iis, qui vigiliam passi sunt, intrepide offerendum est, nisi capitis dolore premantur, aut pulsus venarum in temporibus sentiant: liquet autem, quod etiam in aliis eadem observanda sunt. Sed & iis, qui ira, aut moerore aliquo, aut cogitatione febricitat, vinum est exhibendum: & qui furore febricitant, quando omnino ab affectu quieverunt, prius vero non tutum est uti vino. Tentare autem oportet & contrarium semper asserre ei, quod molestat: labori quidem, quietem: vigilis vero, somnum: iram autem, & furori, atque tristitiae, eam animi iocunditatem, quae ex sermonibus, actionibus, spectaculis, enarrationibus percipitur. Sic, qui cogitatione laborat, omnino ratiocinationes omittat: & qui ex bubone febricitat, prius huius curationi intendat, ac multo prius, vlcere unde originem habuit. Haec quidem febrium ephemerarum indicia atque remedia sufficienter se habeant. Reliquae vero febres nonnullae ex inflammationibus, nonnullae ex humoribus, accedunt. Et, quae ex inflammationibus fiunt, sunt veluti quaedam accidentia partium phlegmone laborantium: & morbus magna ex parte ab instrumeto patiente denominatur phrenitis, aut peripneumonia, atque pleuritis, aut aliquid tale: sed de his postea dicemus.

A. lib. 4. f. 1. l. c. 9. fol. 412. b

A. lib. 4. f. 1. l. c. 18. fol. 413

De Febris Putridis.

CAP. 4.

AT, quae ex humorum putredine febres accendunt, hoc ipso nominantur febres, & sunt non accidentia morborum, sed ipsae morbi. Ex his vero nonnullae quaedam sunt sine accidentibus, quae & minutissimae sunt: quaedam vero simul cum accidentibus infestant. Nos vero de prioribus dicamus febribus, quae accidentibus carent: in quibus maxime, si fieri possit, primo die, qualis sit febris, an acuta vel longi temporis, est cognoscenda: & utrum ex iis, quae intermittentes dicuntur, an continua. Quod si primo statim die fieri non potest, secundo saltem formam invenire est tentandum: quod si neque in hoc aliquid firmum aut stabile sciat, in tertio saltem aliquid manifestius apparebit: nam paucae omnino sunt, quae, ut exquisitae dignoscantur, quartum desiderant. Ego vero, quod brevissime potero, indicia explicare tentabo, ex quibus speciem febris intelliges: planius autem ac manifestius de omnibus alibi disseruimus.

Signa Febris Tertianae.

CAP. 5.

QVAE igitur cum rigore inuadunt, non ab re ex earum numero esse iudicabis, quae per circuitum infestant. Tertianae enim atque quartanae in totum cum rigore faciunt accessiones. Sed tertianae quidem in primo insultu cum vehementi saepe rigore incipiunt: quartanam vero non vidimus cum vehemente rigore incipientem, sed post tempus magnitudo illi superuenit, praeter id, quod neque statim ab initio haec febris ut plurimum solet inuadere, sed aliis, quae antecesserint, subsequi. Quartana itaque eas, quae errabundae aut erraticae dicuntur, insequitur. Quotidiana vero raro aduenit, quin os ventriculi patiat: quemadmodum quartana ex male affecto splene generatur: tertiana ex iecore laborante. Quae quidem cum valido rigore incipit, magis febrem tertianam, quam aliquam aliarum febrium, fore par est. Si vero & alia, quae postea dicentur, signa attestentur, hanc proculdubio in prima die tertianam esse cognoscet. Quod si cum paruo rigore inceperit, tunc magis & alia signa attendere mente oportet: quoniam non quotidiana tantum atque quartana, sed etiam hemitriticus, id est semitertiana, aut aliqua alia ex continuis esse potest. Alia vero signa & ex caloris qualitate & quantitate, & articularum motu, sumuntur: ex ipsa etiam rigoris, qui sentitur, forma, & anni tempore, & regione, & temporis statu, atque ex natura & etate agrotantis, & ex praecedentibus causis, & iis, quae concomitantur. Nam calor quidem, multus & acris esse debet: Pulsus autem magni, & ac calidi, & vehementes, veloces, atque frequentes, omnis inaequalitatis, praeterquam febrilis, expertes: Rigor autem, veluti si a re aliqua acuta magis, quam frigida, cutis pungeretur: cum iis, qui quartanam aut quotidianam patiuntur, potius frigidum rigorem sentiant: Tempus autem anni aestivum, sicuti & locus, & praesens constitutio calida. Sit autem & agrotantis natura calidior, biliosior, & aetas iuuenilis: & exercitationes potius, quam otiositas, antecesserint: magis deustio, quam frigefactio: & parcitas cibi potius, quam crapula: vigiliis quoque, moerores, atque lassitudines,

† quidam cod. addit, propter phlegma.

† in antiquis quibusdam hac non leguntur.

A. lib. 4. f. 1. l. c. 62. fol. 429. a

Assitudines, & intensæ cogitationes ad eundem perducunt effectum. Quod si multos alios eodē tēpore laborantes contigerit tertianis corripi febribus, hoc quoq; maximū præter ea, quæ nuper diximus, signū erit. Quod si, cū hæc omnia affuerint indicia, aut saltē quæ maxima sunt & longe præcipua, litis quoq; vehemēs adiungatur: vomitus q; bilis, aut sudor, vel vtraq; superuenerint: tūc etiā aperte manifesta erit. Quod si post hæc à febre quieuerit homo, hac inquā, quæ in suo motu est & oibus nota: propria vero febrium inæqualitas in arteriarū motu relinquatur: tunc certissime poteris, esse tertianā febrē enunciare, æque, ac si per tertium diē accessionem fecisse vidisses.

Signa Quartanæ.

CAP. 6.

Quartana autem; (nam & huius signa tibi scribere oportet) manifestissimum suū præbet indicium in principiis accessionum, quando rigent adhuc, qui quartana laborant. Nam eorum pulsus satis tardi sunt ac rari. Cum autem consistit febris, aut etiā augetur, necesse quidem est, vt veloces fiant atq; frequentes. Seruatur tamen & tunc propria ipsius tarditas ac raritas, si additam velocitatem atq; frequentiam accessioni, ratione perpendas. Etenim, si comparaueris quartanæ febris consistentiam tertianæ consistentiæ, non paulo velociōres atque frequentiores in tertianis pulsus ostendere arteriæ videbūtur. Et ipsius vnus motus inæqualitas in quartana febre eius formam ostendit: nam, quæ omnibus communis est febribus, in vno pulsu arteriæ inæqualitatem in hac manifestissime licet comprehendere: multo enim velocius principium finem q; motus inuenies, quàm medium. Non tamen in tertiana ita se habet: brevis etenim in ipsa est velocitatis excessus, atq; in cōsistentiā præsertim. Verum & caliditatis indicia diuerso modo se habent: nam tertianarum calorem & æstum & veluti feruorē, in quartanis haudquaquam inuenies. Hæc igitur signa maxima sunt. Reliqua vero extrinsecus: nam neq; hæc sunt omittēda, sed & agrotantis natura est inspicienda, si in ea atra bilis abundat: & tempus quoq; anni, si autumnus: & præsens constitutio, si inæqualis: sic vero & loci natura, & morborum peruagatium populariter: & si lien intumuerit, febris que sine ordine antecesserit, & ætas senior, quàm consistentium: & si cum sudore febres desinant. In his vero bilis flauæ vomitus minime est expectandus, quemadmodum nec in quotidianis: hoc enim tertianarum proprium est. At, cum febris cessauerit, si adhuc signum febris remanserit: pulsus que his, qui secundum naturam, rariores ac tardiores fuerint: quartana proculdubio erit huiusmodi febris.

Signa Quotidianæ.

CAP. 7.

Febrem vero quotidianam vel ex his maxime signis agnosces. Nam eius caliditatem humidio frem cum quadam acritudine esse oportet, non, cum primum manus admouetur, confestim occurrentem, sed per moram: nam quædam fumosa caliditas cum multo vapore commista exire videbitur: cum magis ignis in multo humore suffocetur, quàm ipsum possit cōvincere. Sed & his multo minores sunt pulsus pulsibus quartanarum, quàm istarū pulsus pulsibus tertianarum. Rursus vero tanto rariores sunt in quotidianis pulsus iis, qui in tertianis, quanto illis pulsus quartanarū: at tarditas in vtriusq; eodem modo se habet. Minus vero siticulosa hæc febris est: tantū q; eam quartana excedit, quantum istam tertiana. Lingua vero & totum corpus siccissimum est in tertianis: at in febribus his humidissimum. Et vomitus pituitosi. Et, quæcunq; per ventrē excernuntur, frigidiora sunt, atque humidiora, & crudiora, aquosiora, & pituitosiora. Vniuersum corpus deniq; in hisce febribus plenū crudis humoribus inuenitur. Ideo q; ætatibus, naturis, anni q; temporibus, regionibus, & temperaturis humidioribus accidunt. Nam iuuenem biliosa ac sicca temperatura nunquam vidi huiuscemodi corripi febre. Pueri autē, & maxime paruuli, & ex his, qui iam perfectum corpus habent, pituitosi & habitus crassi, atque ocio plurimo dediti, crapulis, ebrietatibus, balneis assiduīs post cibum præsertim, vtentes, à quotidianis facile capiuntur. Loca etiā humidiora, atq; ex anni temporibus hybernū, atq; ex constitutionibus humidiores, hanc præcipue afferunt febrem. Quod si sit etiā populo communicata, tunc præter ea, quæ antea diximus signa, hoc quoq; non parum ad eam dignoscendam cōducit. Non tamen harum febrium declinationes, quemadmodum tertianarum & quartanarum, sudoribus terminātur. Quare neq; ad integram quietem manifeste (exceptis paucis) perueniunt. Vrinæ vero, quæ procedentibus ipsis adueniunt, totius morbi tempora docent: quæ autem in principiis videntur, febris etiā speciem indicabunt. Nā in quotidianis vel albæ sunt & tenues, vel crassæ & turbulentæ, vel rubidæ. In tertianis autem rufæ vel subrufæ. In quartanis vero variæ quidē, sed crudæ omnes. Hæc quidem febrium intermittentium sunt indicia.

Indicia Febrium Continuarum.

CAP. 8.

Febres autem continuas ex eo cognosces, quod nullum eis adest ex signis, quæ intermittētib; oportere adesse diximus. Et si citra etiā quatuor & viginti horas non cessauerit febris. Si vero inæquale habuerint incrementum, hoc præter alia signa longius etiā tempus ostendit. Et quidem si & proprium febrium signum in pulsibus manifestum habuerint. Si vero & inordinatio quædam, vel inæqualitas ipsis, vel inconcinnitas adsit, & hoc etiā indicium erit simul magnitudinis ac continuitatis. Si vero in hoc statu permanentes, tertio die maiorē accessionē ostenderint, aut excrementa & urinæ omnino crudæ apparuerint, non possunt huiuscemodi febres ad septimum

* Alius et

li. 4. f. 1. t. 2.
c. 1. fol. 429. dli. 4. f. 1. t. 2.
c. 16. fol. 425. hli. 4. f. 1. t. 2.
c. 3. fol. 417. c. d

DE ARTE CVRATIVA

septimum diem iudicari. Si vero & quarta dies tertiæ diei similis fuerit, & febris quodammodo E submersa, neq; facies aut reliquum corpus collabatur quicq; huiusmodi febris ad longius tempus extendi consuevit. Tales quidem sunt differentiae earum febrium, quæ accidentibus carent. Curatio autem earum deinceps scribetur, primum quidem intermittentium, deinde cōtinuarū. Ex intermittentibus vero breuissima quidem ac mitissima est tertiana. Longissima aut, ac, quantum in ipsa est, haudquaquam periculosa, quartana. Quotidiana vero, longa, & nō sine periculo. Quare ab initio statim ad vniuersum ægritudinis tempus inspiciētes, rōnem victus instituemus: nam "egritudinibus, quæ acute sunt, ac celeriter ad statum veniunt, & si valde tenuem victū exhibueris, haud magnum afferes detrimentum. Quæ vero sunt diuturniores, nisi ab initio grandiori cibo reficias, hominē cum morbo pariter perimes: aut intempestiue victus modum cōmutabis: neq; enim oportet statu aduentante grandiore, q̃ prius, cibum offerre, sed cōtra potius, tenuissimum victum, qui in toto morbo exhibeatur, ad statum referuare. Hoc igitur in omnibus febribus cōmune præceptum. Sed oportet præterea, quæ singulis febribus intermittētib; propria sunt, considerare. Veluti confestim in tertianis (neq; enim male ab his initiū sumendum) primū distinguas, si exquisita sit febris, & (vt quispiam diceret) legitima: aut non exquisita, sed velut notha. Nam, quæ exquisita est, in septem, quod longissimum est, circuitibus iudicatur, præter id, q̃ ēt F minime periculosa est: alteram vero, quæ nō est exquisita, vidi q̃nq; cum in autumno incepisset, in vere definere. Deinde vero, vt par est, in tempore adeo longo, tum quia ægrotus medici præceptis parere noluisse, sed in aliquo deliquisset: tū quia ex hyeme lēsus esset: lien valde intumuit, & præcordia flatibus sunt oppleta, & iam subtumida quædam erat decoloratio in facie, ac præsertim circa crura: adeo vt nobis de iuvene dubitare contigerit, ac maioribus vt remediis fuerit necessarium. Sic igitur nihil simile habet huiusmodi tertiana cum exquisita. Quare & ab initio eas distinguere oportet: quantum enim natura differūt, tantum rationabile est rationem victus permutare. Vt igitur eas optime sciamus distinguere, quæ adolescenti acciderint, mihi sat erit scribere: quæ, veluti quoddam exemplum ac monumenta tibi futura sunt earum, quæ non exquisitæ tertianæ sunt. Erat tempus anni medium inter occasum pleiadum & æquinoctium antecedens. Inceperat autē febris cum horrore adolescenti circa aurorā ferē, vt neq; in caliditate similis tertianæ videretur, neq; in pullibus: sed neq; vomitus bilis subsecutus est, neque sudor sufficiens, præterq; q̃ in die secundo tantūmodo circa horam tertiam quidam pauci humidi vapores exierunt: ex quibus febris quidē transpirabat, at ita pedetentim, vt vix circa vesperam expers febris videretur: nam febris signum satis manifestum in pullibus manserat: in reliquis vero circa vespas satis bene se habebat, & per totam pariter noctē. Rursus vero circa tertiæ diei auroram secūda accessio facta est, omnino, præterq; in tempore, similis primæ: nam nocte superueniēte paululū ante diem vapores humidi exhalauerūt, ac circa quartæ diei aurorā febris cessauit. Ac reliquo deinceps autūni tempore atq; hyemis, quo egrotauit, alia oīa & hora accessionis & solutionis febris eundem modū seruauerunt. Agebat autē adolescens circiter decimū octauū ætatis annū, albus aspectu, & pinguis, qui sæpius ante in ocio degerat, & crapulis balneis q̃ plurimis & repletionibus vsus erat: quare neq; bene cibos cōcoquebat. Simul autē aduenit ei durus pulsus, in prima quidem die atq; secūda medicriter: in tertia autē & quarta atq; sequētib; vsq; ad septimā, ad tantam peruenit duritiem, vt quispiam, qui soli crederet pulsui, multorū fore mensium ægritudinem iudicaret: talis autē perdurauit vsq; ad vernū æquinoctiū, in quo cœpit mollescere. Et rursus postea quadragesimo die omnino æger à tertiana est liberatus, tendente paulatim ad mollitiem pulsū, ac minore quotidie fiēte accessione, vrinis q̃ bonam habentibus subsidentiam, etenim hęc quoq; in priore tēpore erāt admodum crude. Talis quidem est tertiana, quæ alteri exquisitæ maxime contraria existit. Reliquas vero intermediās haud numero paucas, ex extremis determinatis haud difficulter inuenies. Quæ enim in principio sermonis tertianarū febriū indicia scripsimus, si omnia affuerint, exquisitā red H dunt tertianā: cuius accessionis tempus breue est, quatuor nimirū horarū, aut quinque, aut sex, aut (quod longissimum est) vndecim, aut duodecim. Huiusmodi præterea febriū vrinę tertio die, aut ad summū quarto, coctionis signū ostēdunt. Hoc pacto quidem exquisitā aut non exquisitā tertianā cognosces: eadē quoq; rōne & quartanā & quotidianā. Cui enim oīa insunt indicia, quæ in quartanis febribus antea scripsimus, hæc vera atq; exquisita quartana est: cui vero minime, spuria est, & nequaquā exquisita: et quotidiana quoq; cui oīa, quæ diximus, insunt, exquisita est: cui aut non, non exquisita. Non igitur sicuti exquisitæ quotidianę & quartanę, ita ēt non exquisitę, sunt diuturnę, sed, quemadmodū exquisita tertiana brevis est temporis, sic & quartana & quotidiana exq̃sitę, diuturni. Hęc qdē in iis, qui p̃ circuitū quendā febricitāt, oportet cōsiderare. In aliis autē febricitantibus vrinas atq; excremēta atq; vniuersum corporis habitū inspicere oportet: calorem quoq; atq; arteriarū motū, & quęcunq; alia præter hæc Hippocrates, & longus vsus inspicere iubent, ¶ veluti regiones, anni tēpora, cōstitutiones, & etates, corporū tēperaturas, cōsuetudines, & causas antecedentes, & quę simul cū morbis inuadunt, & quæ in medio tēpore apparent. Iam totū, vt cuiq; videatur, admonitū est, non tñ re vera ita se habet: nā quoddam maximum ēt inter hęc oīa, breue tamen dictū, nō dum scriptū est. Quid vero hoc est? morbi quātitas ac virium, res, quæ ad eam

A. li. 4. f. 1. 1
c. 8. fol. 419.

A. lib. 4. f. 1. 1
c. 35. fol. 42.

A ad eam explicandam vno indiget verbo, ad vsum vero permagna: neque enim bene prænoscere possumus, nisi horum singulorum magnitudinem diligenter penitemus. Nam, utrū morbus sit exitialis, an non: & qñ magis debeat mori, aut sanitati agrotus restitui: nisi omnium, quæ diximus, quantitatem diligentius animaduertens, ad duo redegeris capita, ad ipsius s. morbi magnitudinē, & agroti vires, non poteris vere prænoscere. Nam, si vires adeo validæ fuerint, vt possint morbum superare, necesse est agrotum euadere: si vero contra, omnino morietur. Non igitur solum inspicias, qualis sit morbi species ac forma, sed & eius magnitudinem aduerte. Non parua autē hoc exigit experientiam, tum alias ob causas, tum quia neq; scribi, neq; omnino sermone edoceri singulorum quantitas potest. † Et, siquid in nobis est, ex nulla re adeo possumus ad exquisitam peruenire notitiam, quantum ex crebra exercitatione circa quātītatis coniecturam: hoc quidem in ipsis operibus & discere & docere possibile est: quæcunque vero in qualitate determinantur, hæc diligenter ac manifeste, q̃ breuibus poterimus verbis transigimus.

Tertianæ Exquisitæ febris curatio.

CAP. 9.

† AP. Et si id, qd nostrū est, aliqd forte est, ex nulla alia re ad tantum p̃cho- nis venit, quā ex crebra & c. Vide explanationem Stephani.

† Al. Iuuatentī & p̃ has partes vrinam & lūdorem, bilis ex purgatio.

A* Quid scod. habent vere- sur, i. generan- darum, sed me- lior videtur ēē Leonicensi lco.

B* multoties

EXquisitam ergo tertianam, vt quæ ex flaua bile cōmota inualeseat, quāto magis fieri potest, refrigerare oportet ac humectare: nam contrariorum contraria remedia sunt, quæ quidem B quod superfluum est, repriment: quod vero deficit, suppleant. At flauæ bilis humor inter oēs, qui in corpore sunt, humores siccissimus calidissimus q̃ existit. Hunc igitur, cū ad ventriculū repit, per vomitū educere oportet: cū vero vergit ad inferiora, per inferiorē excretionē: hoc quidem & sponte fieri solet in tertianis exquisitis. Per vrinā quoq; & sudores oportet diuertere. † Iuuat autē & p̃ inferiores partes bilis expurgatio. Venter autē mollibus clysteribus exinaniēdus est. Vrina vero potionibus, in quibus apium aut anethum maduerunt, prouocanda. Et, si tibi coctionis signa monstrantur, iam cum fiducia absinthium potes exhibere: quod alioquin summū est remedium mordicationum stomachi, quæ a bile proueniunt, si præsertim ex ipsius coma, quantū sufficiat, accipiēs melicrato intinxeris. Balnea vero calida ex aqua potabili profunt, tum quia aliquid bilis educunt, tum ēt quia sua qualitate plurimum iuuant: nā huiuscemodi oīa balnea humectāt, ac potentia refrigerant. Marinæ autē aquæ & salæ, nitrosæ atq; sulphureæ, plus quidem bilis educunt, sed multo minus, q̃ potabiles, profunt: præstat vero neq; ipsas viles dicere, quandoquidem plus qualitate nocent, q̃ euacuationibus iuuent. Equidem noui quendam corrupto iudicio hisce balneis vti persuasum, deinde extenuato corporis habitu ad tantā venisse perniciem, vt tabe consumptus interierit: reliqua vero victus ratio ad bilem etiā^a excernendā exhibita fuerat. Semp C autē oportet contrarias qualitates illis, quæ præter naturā inualuerint, opponere, cum hoc^b multo plus iuuat, q̃ quomodolibet euacuare: sed neq; hoc ipse nouerat, neque alio docente didicerat. Hæc igitur in balneis intentio sit, vt corpus madeat atq; humectetur: atq; iccirco neq; nitrū, neq; sal, neq; sinapi inspergere oportet, (quod genus mali cōplures egrotis asserre videntur) at plurimum olei calidi infundentes ad aquā perducere ac madefacere: & si in ea natate voluerint, quantum id facere possunt, permittendum. At, qui balneis admodum delectantur, si etiā bis in die lauari permiseris, non aberrabis: sed illud semper habeto in memoria, vt in tēpore id faciant. Si vero etiā coctionis signa ostendantur, tunc, etiā si sapius laueris, nihil deliqueris. A vino vero ante, q̃ morbus concoquatur, omnino abstinendū: at, vbi cōcoqui cœperit, dandum est ab initio tenue, aquosum, & paucum: vbi vero iam propē est, vt morbus soluatur, amplius est offerēdum.

Cibi autē, quicunq; humectāt atq; refrigerant, oēs viles sunt exquisitis tertianis: quantitas vero in ipsis sit tanta, quanta optime concoqui possit. Ex oleribus quidē atriplex, blitum, lapathum, & malua, & lactuca, & cucurbita: ex aliis vero & prissanæ succus, & ex alica sorbitiones. Et ex piscibus, saxatiles: ex volatilibus autē, quæ mollibus cōstant carnibus: quæ aut talia non sunt, eorū alæ. Testiculi quoq; gallorū: & suū pedes, & cerebra: paruorum vero si etiā dederis carnē lique D factā, nihil nocebis. Sed & oua^a ad sorbendum sunt concedenda, & præsertim vitelli eorū: nā hi facilius, q̃ pars alba, cōcoquuntur. Ex fructibus autē permittēdum est, vt illos degustent, qui nō sunt omnino difficiles concoqui. Oportet autē abstinere a melle, sinapi, & salitis, atque omnibus acribus: & a vinis & fatis vetustis, & quæ natura sunt calida. Hæc quidem sit victus ratio in pluribus veluti ad coniecturam exposita. Qui vero non sunt delicioſi, iis talis victus est instituendus, qualem nosti me aliquando instituisse in exquisita tertiana secūdum sermonem Hippocratis, ex succo prissanæ vsq; ad crisim. Hæc quidem in exquisitis tertianis seruare oportet.

Tertianæ Nothæ curatio.

CAP. 10.

IN iis vero, quæ non exquisitæ sunt, prouidendum est pro viribus, ne morbus augeatur: ne ue agrotantis vires prosternantur, quæ longiori tempore debet laborare. Difficile vero est serua re vtrumq; quoniam inedia quidem, quantū profunt ad morbi coctionem, tñ vel etiā amplius officiant viribus: cibi vero, quantum agroti robur adaugent, tantū coctiones impediunt. Sed & id quoq; noscere opus est, ad quantam magnitudinem perueniat morbus, ac quantæ sint agroti vires: vt ad ea, quæ maius auxiliū exposcūt, inspiciens, inedia quidē in valētoribus audacius vtaris viribus, & morbo coctu difficili: largiori autē cibo, vbi vires sunt debiliores, neq; morbus admodum cōcoqui cōtumax. Hæc quidē & in oībus aliis morbis considerare oportet. In tertianis

Septima Classis.

nnnnnnn vero

A. 4. f. 1. r. 2.
c. 1. fol. 43. c

ibidem.

ibidem. g

vero non exquisitis, neq; statim circa initia balneare expedit, sed cum iam coctionis signa apparuerint: neq; quotidie cibum oportet exhibere, sed satis est alternis diebus. Quies vero & calefactio circa praeordia iuuant, & sorbitiones concoqui faciles, & clysteres non admodum molles. Quod si sanguinem mittere oporteat, neq; hoc quoq; omittendum, sed ab initio statim adhibita earum rerum, quas scis, distinctione tibi mittendum, quantum praesens exigit status. Sit autem totius victus ratio, non quae humectet atq; refrigeret vniuersum corpus, qualis in exquisitis exhibetur tertianis, sed & aliquem modum alumat ad calefaciendum, atq; incidendum. Plurimum igitur eos iuuat ptillane succus, pipere adiecto: vel etiam hyslopum, vel origanum, vel spicam nardi multa aqua infundens & decoquens, ad bibendum propina: & quaecumq; alia, quae cient urinam, praeterquam illa, quae supra modum calefaciunt atq; exiccant: maxime vero post diem septimam danda est iugiter absinthij coma. Et quidem oxymeli potione plurimos iuuat: & aliquid ex iis, quae molliter ventrem subducunt, quibus me assidue uti nouisti. Vomitus autem post cibum adeo iis, quibus haec febris perdurauerit, utilis est, ut multos sciam solis vomitibus statim prorsus fuisse curatos.

Quartanarum Curatio.

CAP. 11.

Deinceps de quartanis dicemus, quas etiam ipsas ab initio mediocriter ac leniter tractare oportet, nullum forte medicamen aut euacuationem exhibentes, nisi forte sanguis vehementer superabundans appareat. Et, si vena incisa is, qui fluit, niger videatur ac crassus (praecipue vero in iis, qui liene laborant, huiusmodi visitur) audacius mittendus est: quod si flauus aut tenuis apparuerit, statim supprimendus. Venam vero secare oportet vel interioriorem, vel mediam sinistri cubiti: Et victum deinceps instituere minime flatuosum, & optimum: Ventrem, quantum possibile est, mollem facientes iis, quae visitata sunt: Quod si haec nihil proficiant, clysteribus utendum est, a principio quidem mollibus, postmodum vero acrioribus. Arcendi sunt autem a carnibus porcorum, atque ab omnibus eduliis, quae tenacia sunt, & tardum habent exitum, ac quae refrigerant exiccantque corpus. Vino vero utendum est albo ac tenui, ac mediocriter calido: & volatilibus, quae boni succi sunt, & non in paludibus degunt. Pisces autem adhibendi concoqui faciles, mollibus carnibus nihil tenax habentibus praediti. Utendum est autem scillis, & sinapi. Et certis diebus id medicamen, quod Dia trion pepereon vocatur, vel quod Diospoliticum, est assumendum: & si quotidie piper tantum cum aqua biberent, recte etiam facerent. A frictionibus autem, & ambulationibus, & balneis, atq; aliis visitatis non sunt penitus prohibendi. Et, si omnino possent a balneis abstinere, solis contentu frictionibus, quae plurimum ex eo iuuamen admitterent. Et, si quartana febris brevis sit, neq; admodum violenta, nihil nocuerit, si diebus interiectis ad consuetam exercitia se transferant. Haec quidem ab initio & usque ad statum sunt peragenda. Si vero in statu morbi praecipue egrotus esse videatur, tunc subtilioris victus ratio est adhibenda, quam ante vel postea. Statim vero praecipendum est, ut diu conquiescat, ac visceribus prouidendum vngendo atq; emplastrando iis, quae mollire ac laxare possint: deinde medicamentis utendum, quae ciendi urinam vim habent. Et, si coctionis morbi indicia apparuerint, tunc purgare oportet iis, quae humores atros exinanienti vim habent, non semel tantum, sed & saepius, si fuerit necessarium. Utendum autem & vomitibus post cibum tunc continue: & si nihil prohibuerit, elleborum album est exhibendum, primum quidem permixtum radiculis: quod si nihil fecerit, elleborum ipsum. Qui vero nequeunt euomere, hi per inferiora valentius sunt purgandi. Et his postea medicamen confectum ex viperis in potu dandum, & alia, quae ad huiusmodi febres commendantur: ex quibus est & illud nobis familiare praeter ceteris laudatissimum, quod succum cyrenaicum recipit. Quicumque vero ab initio aliquod ex his medicamentis exhibuerunt, aut omnino ante statum, quartanam, quae erat simplex, saepius fecerunt duplicem, aut omnino maiorem ac difficiliorem: ex duplici autem triplicem, aut omnino ambas difficiles maiores quam reddiderunt. Noui autem medicum, qui ausus est homini, qui triplici quartana laborabat, medicamen ex viperis exhibere, quando non dum morbus in statu esset, deinde (ut par est) auctis omnibus, febris continua subsecuta hominem occidit.

Quotidianae Curatio.

CAP. 12.

Quotidianam autem cum volueris curare, utere oxymelite, post primos dies, & illis, quae possunt urinam valide cicare: & vniuersum totius victus caput sit ad incidendum efficacius. Circa statum vero, de ventriculo est habenda sollicitudo, ac de eius ore praesertim. Deinceps iubendum est, ut post radículas & cibos assumptos euomant: iis etiam, quae pituita subducunt, utendum. Reliquam vero victus rationem ad communes intentiones inspiciens inuenies.

Curatio Februm Continuarum, quae Carent accidentibus.

CAP. 13.

In continuis autem febribus, quibus quidem status morbi non ultra septimam futurus est, & vires validae sunt, atq; aetas praeterea consentit, iis quidem admodum exquisitis & tenuis victus est instituendus. Quibus vero vel status totius morbi ultra septimam, vel vires inuvalidae, hi ab initio solidiori cibo sunt reficiendi: prope vero statum, tenuiori. Cum autem iam adest status, tenuissimum victum seruare oportet: deinde rursus assidue solidiorem, ac simile augmentum efficere illi, quod ante statum fiebat, decremendo. Sanguinem vero mittere oportet & ob morbi magnitudinem: Et quibus rubor multo plus, quam naturae conueniat: & maior, quam pro consuetudine, totius corporis

ris

* Codices graeci impressi & manuscripti oēs, Oribasius, Paulus, Aetius, & Trallianus in hoc Galeni reprehendens, legunt humectant. Vide Stephanum Athe. quo hunc locum explanet.

* Salsamentis

* Al. infixum.

† Al. primis diebus.

A. li. 4. f. 1. c. 19. fol. 43

F A. li. 4. f. 1. c. 63. fol. 42

A. ibi. fo. 430

66

CAP. 14.

B

† Manuscripti
tamē quidā co
dices hā ent,
quidā enī nec
vnquā euacua
tionē integrā
pertulerūt, &
multis eibz vli
sunt & c. Sūt ē
codices, qui ha
beant, quidam
enim nec vnq̃
euacuati, ne in
integrā pertule
rūt, nec multis
eibz sanē vltis
co mē a, &
multis videntur
eibz, & euacua
tione bō lenti al
luci.

Septima Classis.

nnnnnnn ij tionibus q3,

DE ARTE CVRATIVA

tionibus q̄, & cataplasmatibus, & balneis: quorum singulorū indicationes rursus ab iis, quæ antea E diximus, sunt assumenda. Ita etiam, si quando duo contraria accidentia consequantur, inspicere oportet, vtrum eorum sit fortius. Eodem modo, si duo morbi eūdem hominem obsederint, qui inuicem pugnautes habeant indicationes: nam & tunc quoque aduersus illū, qui magis vrgeat, instandum, neque alter omnino negligendus. Eas vero, quæ habentur ex accidentibus & morbis indicationes, non simpliciter, sed secundum causam, à qua singula fiunt, considerandum: qualia sunt defectus animi, & dissolutio: nam consueuere medici de vna re hæc duo nomina dicere. Est vnum quidem res ipsa, cuius sunt plures causæ: nam animo deficiunt & ex choleris nominatis, & ex profluuiis ventris, & difficultatibus intestinorum ac leuitatibus, & muliebri fluxu, & vulneribus: & sanguine per ora venarum, quas Græci hæmorrhoidas appellant, emanante, aut per superiora educto, aut per nares aut alios meatus: et ex enixarū purgationibus immoderatis. Non nunquam vero & vehemens cruditas animæ defectum attulit: & tunc præsertim, cum ventrem supra modum soluerit. Et, qui bulimus appellatur, nihil aliud est, quam animæ defectus. Omnem præterea, quæ ex vtero provenit, strangulationē, defectus animi antecedit, sicuti ad vteri versus superiora recursus, & ad latus inclinationes, atq; inflammationes, plerumque consequit. Antecedit autem morbum attonitum, & comitiale, cum malignus existit, & dissolutiones, & F syncopen, & tabem. Sed & in principiis febrium non admodum paucarum aduenit, & tunc præsertim, cum supra modum aut siccum, & squallidum, aut plenum immoderate corpus extiterit.

A† Et cū arden
ti & maligna fe
bre nō nūquā
simul iuasit et
eos, quibus ex
tremæ corpo
ris & c. Nā de
iis potius debet
intelligi, qui in
suasionib⁹ cau
si maligni ex
tremis corpis
partib⁹ refrige
rati, animi de
fectū incurrūt.
vt videte licet
pag. 99. c

B† In exēpla
ri Stephani
atheniēsis hæc
verba non ha
bentur.

A† Et nō nunquam etiam simul cum febre incendente atque maligna inualit. Et quibus extreme corporis partes in principiis febrium plurimum sunt refrigeratæ. Et quicumq; ob inflammatio nis magnitudinem vel hepatis, vel ventriculi, vel stomachi febricitant, his etiam in principiis accessionum non nunquam animi defectus adueniunt, illis præsertim, quibus humores crudi & incocti redundant, aut qui aliquam præcipuam partem obstructam habent. Animo etiam deficiūt, quibus os vētriculi male affectum est, aut humorū vitio mordicatur: aut crassis, vel lentis, ^{bt} vel humidis, vel frigidis humoribus aggravatur. Quidam etiam in vehemētib⁹ animæ affectibus animo defecerunt, sed præcipue senes, & qui alioquin sunt imbecilles: etenim plures eorum tristati, aut lætati, aut irati, animo defecerunt. Sed & roridæ humiditates quædam aliquando his ita affectis haud in tempore superuenientes, animi defectum inducūt: sicuti, & qui magis robusto sunt corpore, ex immoderatis sudoribus idem patiuntur. Et, si abscessus quispiam rumpatur vehementer ei, qui non admodum robustus sit viribus: ac tum præcipue, cum materia simul tota ad ventriculum, vel ventriculi os, aut thoracem defluerit. Et, si quando etiam nos abscessus secan G tes totum simul emittere pus tentauerimus, animi defectum subsequi est necessarium. Et, si quandoq; purgantes, aut clystere abluentes, aut quomodocūq; euacuantes, id aliquo modo vehementius, quam oporteat, egerimus: neque enim in morbo intercute tota simul superfluitas, quamuis sit præter naturam, potest sine noxa euacuari: sed tunc quoq; necessarium est hominem deficere animo. At vero ex vehementia dolorum veniunt dissolutiones, cum morsus quidam ac tormina, aut ilei, aut intestini crassioris affectus, subito accidunt. Sed & nervus percussus, & muscoli caput animi defectum intulerunt, & maligna in articulis vlcera, omnia q̄ gangrenosa & depascencia, & immoderata frigiditas atq; caliditas, vitalis q̄ roboris dissolutio. Hæc quidem sunt defectus animi causæ. Singulæ vero earū propriam curationē desiderant, & de omnibus quidem non contingit nunc scribere: nā, quæ passionibus assident, sine illis curari nō possunt. Tantum igitur in præsentī sermone de ipsis dicemus, quantum quispiam de eis edoctus, possit iis, quæ repente ingruunt, accessionibus occurrere: Veluti quod eos, qui ex choleris & vētris profluuiis & multis aliis vniuersim factis euacuationibus dissoluuntur, aqua frigida spargere oportet, & nares apprehendere, & os ventriculi perfricare, ac iubere vt euomant, stomachum iritando digiti vel penne immissione: sed neq; malum manus & crura alligare. Oportet autem ⁿ nexus fieri plures ac for H tiores circa manus, quando per inferiores partes fiunt euacuationes, quemadmodum, quādo per ora venarum hæmorrhoidum sanguis profluūt, aut ventris profluvia adsunt, aut cum per vteros exeunt in mulieribus menstrua: nam, si tunc crura fortius ligentur, sæpius aliquid ad partes inferiores attrahitur: Contra autem fit in fluxibus sanguinis factis per nares atq; vomitibus, in quibus crura sunt vehementius alliganda. Et quidem, quibuscunq; in vulneribus sanguis emanat, eodē modo, si ex superioribus partibus accidit, inferiores: si ex inferioribus, superiores, vinculis sunt astringendæ. Situm quoq; aliquem in aduersum tendentem parti expedit inuenire, nō tamē hoc multum fiat: nam, si nimium tendatur, atq; ex hoc fatigetur, nihilo minus iritatur, q̄ si inclinaret ad eūdem locū. In vniuersum aut, aut ad cōmunia membris patientibus in aduersum retrahere oportet, aut ad ea, in quibus est euacuationis origo. Atque ideo vehementes euacuationes, quæ ex vteris fiunt, cucurbitulæ iuxta mēbras appositæ statim sedāt: quæ vero ex naribus, hepatis ac splenis secundum narem patientē: q̄ si ex ambabus naribus subito ac multus sanguis efflueret, vtriq; visceri sunt adiiciendæ. Vinum etiā aqua frigida temperatū curat eas, quæ ex magnis fiunt euacuationibus, dissolutiones, & tunc præsertim, quando ad ventriculū fluunt humores. Sed aduertendum est, an aliquid sit, quod prohibeat huiusmodi exhibitionē: veluti si aliquod vnū ex visceribus

A. lib. 4. f. 111.
c. 48. fol. 444

H. A. li. 3. f. 111. b
c. 8. fol. 281. b

Avisceribus inflammationem patiat: aut caput vehementius doluerit: aut passio aliqua, quæ delirare cogat, affuerit: aut febris incēdens in morbo crudo: magna enim & quasi insanabilia ex potu vini in huiusmodi affectibus nocumenta proueniūt. Quod si nihil prohibeat, postmodum ægrotantis naturam, & cōsuetudinem, & ætatem, & ambientis aeris temperaturam, distinguere oportet: ad hæc enim respiciens, vel frigidum vel calidum potum exhibebis. Nam, qui assueti non sunt potare frigidum, aut manifeste ex ipso offenduntur, & quicūq; natura sunt frigidiores, & qui in extrema sunt senectute, & loco natura degunt frigidiori, tempore hyberno, cauere frigidum oportet: at qui contrario modo se habent, hisce intrepide offerendum est. Sit vero vinum in fluxionibus, quæ ad ventriculum fiunt, calidum & tenue, quale Lesbium: in sanguinis autem fluxibus crassum ac nigrum & acerbum. Ipsi vero locis imponere oportet, veluti ventriculo, & vtero, & stomacho, & thoraci, quæ corroborandi vim habent: capiti autem & fronti, præter hæc, illa etiam, quæ refrigerant. Et, quibus in summis partibus, & in naribus vena aliqua dirupta est, medicamen aliquod ex iis, quæ sanguinem suppressere possunt, imponendum. Balneæ vero in fluxionibus quidē ad ventrem aptissime sunt, sanguinis vero fluxum acriter iritant. Et, quicūq; ob sudoris multitudinem animi defectum patiuntur, iis etiam plurimum nocent: horum enim adstringere oportet, ac refrigerare, non laxare cutem: & vinum frigidum præcipue his exhibere, & nihil omnino calidū offerre. Sed neq; etiam crura ac manus ligare oportet, neq; cogere ad vomitum, neq; vllō modo mouere: ac ventis refrigerantibus aditum præparare: aerem quoque domus alterare frigida atque astringente qualitate, myrtorum foliis, vitium capreolis, ac rosīs, pauimentum conspernentes. Nihil vero horum confert, vbi ad ventrem fluxiones fiunt: nam, quo magis cutem densaueris, tanto ipse magis augentur. Iis igitur, qui ex euacuationibus dissoluntur, ita confestim succurrendum est: At, qui ex multitudine, non ita: verum in illis artus quàm plurimum fricare oportet, calfacere, atq; alligare: à vino vero & cibis abstīnēdum, & balneis etiā, si febricitauerint: sufficit autem, si eis dederimus melicratū potum, in quo ebullierit thymus, vel origanum, vel pulegium, vel hyssopus: conuenit quoq; oxymel, & ligare ac fricare manus potius, q̃ crura. Et, quæ etiam ex vtero laborante exoluuntur, non aliter curandæ sunt, excepto oxymelite: fricare etiam atq; alligare magis crura oportet, q̃ manus. Et, quæadmodum in multo effluxu cucurbitas iuxta mammas imponimus, sic, quibus fursum aut in latus tractus est vterus, inguinibus & coxis adhibebimus. Et naribus quidem ea, quæ foetidissimum odorē habēt: vtero autem odorata, & ea, quæ laxare ac calefacere possint, medicamenta afferemus. Si vero os ventriculi fuerit imbecille, atq; ideo animi sequatur defectus, ea, quæ roborandi vim habent, oportet emplastra adhibere, quale est, quod fit ex palmulis, vino, farina hordei, croco, aloe, ac mastiche: madefacere aut iis, quæ constant ex ablinthio, & oleo melino, & mastichino, & nardo, & cēnāthe, & vino: Et, si ipsum estuet, miscere ex refrigerantibus aliquid, veluti cucurbitæ succum, atq; lactucæ, & portulacæ, & solani, & fereos, & vuæ acerbæ: hæc quidem non solū refrigerat, sed etiam astringit. Aqua etiā frigida estuanti ori ventriculi plerūq; prodest, si in tempore detur, alioquin plurimū obest. Atq; iis, qui ventriculi os imbecillum habent, vinum calidū potius oportet exhibere, si nihil sit aliud, quod prohibeat. Plurimū vero iuuat eos, qui ita laborant, etiā frictio extremorum. Quod si ex his remediis nihil melius se habuerint, exastuantes quidem q̃ primū ad balneas ducere oportet: qui vero aliquid frigiditatis sentiunt, medicamen diatrion pepereon nominatum, atq; ipsum piper solum, atq; absinthium bibant. Qui vero ex vitiosis humoribus os ventriculi mordicantibus dissoluntur, hos post aquæ calidæ aut hydrolei potum fac euomere: q̃ si difficulter euomant, prius concalefacere oportet, quæ os ventriculi circūstant, loca, & manus, & pedes: quod si neq; hoc modo possunt euomere, digitos aut pennas demittendo iritare oportet: q̃ si neq; sic euomant, rursus his oleum calidum quàm optimū exhibendum. Soler autem sapius doleum nō solum ad vomitum iritare, sed etiam uentrem molliorem facere. Est autem & hoc presentibus rebus non parum utile: quare nisi sponte accidat, arte procurandum est: præcipue uero & glandibus suppositis hoc tentandum est facere. Quod si ex istis facilius fiat, etiam ablinthij comam in melicrato decoquens ad potandum exhibeas, atq; deinceps uinum: ac omnibus modis membra oportet corroborare partim iis, quæ extrinsecus apponuntur, partim ablinthij potionibus. Non tamē id in principiis faciendū suadeo, sed postea, quando partes, quæ circa aluum sunt, fuerint expurgatæ: quādo uero adhuc humores in ipsis continentur, nō dum adstringere, sed tm̃ concalefacere (ut antea diximus, cōuenit: Vbi vero multa pituita frigida in ore uentriculi fuerit aceruata, fouere quidē plurimum oleo, in quo ablinthium ebullierit, postea uero etiā melicratum exhibere, uel hyssopum, uel aliquid simile infundendo: dandum etiā oxymeli, aut piper, aut diatrion pepereon, aut diaspoliticon medicamen: & uniuersum uictus rationis caput incidendi uim habeat. Quæ uero ex nimia frigiditate ueniunt exolutiones, eodē modo curandæ sunt, quo bulimi, omni modo calfaciēdo. Vinū igitur eis exhibere oportet calida temperatū, ac cibos, qui calefaciendi naturā habēt, fricare q̃ ac calefacere ad ignē simul. Quæ uero ex nimio calore accidunt, iis, quæ refrigerādī, ac corroborādī uim habēt, curādē sunt: hæc uero maxime eueniunt iis, q̃ in aere suffocante ac balneo cōmorant. Statim igitur ipsos corroborabis, si aqua frigida sparseris, & fla-

DE ARTE CVRATIVA

bellaueris ad ventum conuersos, & os ventriculi perfricueris atq; agitaueris, ac postmodum vi- E
no cibo que reseceris. At, qui ob inflammationis magnitudinem, aut vehementis febris mali-
gnitatem animi defectum patiuntur †, & in principiis accessionum refrigerantur, his artus frica-
re fortiter, & calefacere, crura q; ac manus alligare, ac vigilas, cibi que & potus omnimodam ab-
stinentiam, precipere oportet. Optimum vero in his, quid futurum sit, precognoscere, atque hæc
ante accessionem facere anticipare. Eos etiam, qui ex siccitate in principiis accessionum syn-
copam sunt incuriuri, optimum est præuidere: nam, si duabus aut tribus horis ante accessionem
exhibito cibo, manus ac pedes constringi iusseris, non interibunt. Oportet autem cibos esse con-
coqui faciles, & ventriculo aptos. Quod si magnum imminere periculum fueris suspicatus, vinū
dare anticipabis, vinum q; præsertim in alicam elixatam infusum: quod si aliquid † panis loco ali-
cæ exhibueris, idem valebit. At, si mediocris syncopa expectatur, vino parcendum: sufficit enim
tunc mala punica, aut pyra, aut poma, vel aliquem alium fructum astringentem cibus admiscere:
& si ad hæc mediocriter tulerint accessionem, cum rursus cibum obtuleris, non erit necessarium
fructibus uti. Hæc quidē facienda sunt, si quid futurum præuideris. At, qui ex inopinato in peri-
culum inciderint, vinum calidum cum pane est exhibendum, & paululum aliquid cum eo alicæ
calidæ: nam, si is, qui ita affecti sunt, amplius obtuleris, aut cibos difficiles concoqui, non modo
syncopam patientur, verū etiam penitus strangulabuntur. At, qui animo deficiunt ex membri
principalis obstructione, his oxymel dare oportet: atque ex hyssopo, origano, pulegio, & melle
potum: cibos q; incidendi naturam habentes, nam crassi ac tenaces magnas in similibus afferunt
noxas. Sed neq; deterius fuerit artus perfricare atq; alligare. Prodest etiam illis potibus uti, quæ
vrinam ciendi vim habent, veluti qui anethum, & fœniculum, & apium, & petroselinum, &
ami, & claucum, & spicam nardi recipiunt: quæ ubi manifeste iuuerint, iam vino vtendum est
albo & tenui, non admodum antiquo. Nosces vero huiuscemodi obstructiones cum ex aliis in-
æqualitatibus pulsuum: tum ex his præcipue, quæ secundum magnitudinem, paruitatem, ac vehe-
mentiam, & debilitatem fiunt, ubi syndrome id est concursus, quam plethoricam vocant, non ad-
sit: nam istius quoque communes sunt. Fiunt vero & in huiuscemodi dispositionibus, cum ve-
hementes fuerint, pulsus intercidentes. Hæc quidem in libris de pulsibus à nobis latius explican-
tur. Nunc vero transgrediamur ad eum sermonem, qui superest de reliquis exolutionibus, ve-
luti, quæ ex abscessuum diruptione, aut sectione contingunt: aut ex superflua euacuatione in iis,
qui aquam inter cutem patiuntur: confectum quidem hi optimis odoribus fouendi sunt, paulo-
post autem sorbitionibus concoqui facilibus sunt rehciendi. Si vero ob tristitiam, aut gaudiū, G
aut timorem, aut iram, aut terrorem exoluantur, odoribus & narium apprehensionibus sunt re-
uocandi, cogendi que ad vomitum. Eodem pariter modo, qui ex vulneribus, aut purgationi-
bus, aut doloribus, qui in articulis, neruis, & musculorum tendonibus eueniunt, exoluantur, sta-
tim sunt reuocandi: postmodum vero conueniens passioni curatio est afferenda. Animī vero
defectus, qui intestini laxioris doloribus, aut ilei, aut similibus vehementibus cruciatibus fiunt,
ex patientium locorum concalescentiis frictionibus que extremorum præcipue curantur.
At, quæ ex propria imbecillitate virium, quæ regunt corpus, eueniunt exolutiones, ex intempe-
ratura videlicet factæ partium, de quibus vires proueniunt, contrariis curare intemperaturis opor-
tet: frigidas quidem, concalescentes: calidas vero, refrigerantes: atq; in aliis eadem ratione. Vir-
tus igitur, quam vitalem vocant, quam ex corde prodeuntem ostendimus, ex pulsuum debilitate
cognoscitur: At, quæ ex hepate oritur, ac naturalis dicitur, ex sanguineis egestionibus ab initio
aquosis atque tenuibus, postmodum vero crassis ad modum facis: At, quæ ex cerebro originem
ducit, quam præcipue non nulli animalem appellant, ex motuum voluntariorū imbecillitate de-
prehenditur. Sed de his quidem dispositionibus proprio tractatu separatim tibi scribemus: per-
multa enim ab ipsis medicis sunt prætermilla.

Curatio Capitis à variis causis molestati.

CAP. 15.

Quoniam vero sermonem de accidentibus hucusque fecimus, rursus ad primum institutum
redeamus, vnam in omnibus communem intentionem habentes, causas nimirum, à quibus
fiunt eorum singula, considerare: hæc liquidem tibi conuenientem curationē indi-
cabunt: Veluti si quis doleat caput, si quidem os ventriculi illi mordeatur, & fastidium sentiat, iu-
bendum est, vt euomat: nam vel bilem euomet, vel pituitā, vel vtrunq;. Quod si nulla insignis
appareat in vetriculo passio, considerandum, nunquid multitudo, vel obstructio, aut inflammatio
aliquarum capitis partium adsit. Inuenies vero primum quidem, si interrogaueris, nūquid dolor
per totum caput extēdatur, aut alicui particulæ fortius insideat: deinde nunquid cum grauitate,
ve tensione, vel mordicatione, vel pulsu. Nam, qui cū grauitate dolores fiunt, multitudinē osten-
dunt: qui autē cum mordicatione, vel vaporis vel humoris acritudinem: cum pulsu vero, inflam-
mationem: at cum tensione, si quidē sine grauitate ac pulsu, spiritus crudi ac flatuosi multitudo:
si vero cum pulsu, corporis membranosi inflammatio: at si grauitas adsit, multitudo intra mem-
branas cōtenta significatur. Cum igitur omnia distinxeris, causam, ex qua horum singula fiunt,
considerare oportebit: illa enim tibi modū curationis ostendet. Veluti si multitudo vaporis atq;
humoris

† In principiis
accessionū, &
refrigerantur.

† A.P. panis ex
alica.

A. li. 4. f. 1. r.
C. 30. fol. 421

* A.P. in quatuor,
id est rupus.

A. li. 1. f. 1. d. 6
C. 1. fol. 15. h

H

A humoris contineatur, aduertere oportet, nunquid ob magnitudinem februm humores diffusi ac veluti efferuescentes ad caput ascenderint, an propter eius partis imbecillitatem, an ob totius corporis plenitudinē. Hanc enim totius corporis euacuationibus haud difficulter curaueris: eū vero, qui ex partis imbecillitate contingit, partim quidem in contrarium retrahendo per totū corpus, partim ipsi parti remedia adhibendo. Ac retrahes quidem, clysteribus acribus, & nexibus, & frictionibus in partibus inferioribus plurimis, & si expedierit, aliquid etiam sanguinis abducendo. Partem autem sanabis eo tempore, quo ad vniuersum corpus retrahis, iis vtens perfusionibus, quæ a capite vim repellendi habent, ac deinde euacuantibus, postremo vero corroborantibus. Repellit autē oleum, quod omotribes, id est immaturū, nominatur, aut tale aliquid simile: & quod oxyrhodinū, & rosaceum vocatur, ipsum per se ipsum: & quæcūq; ex capitibus papaueris, & teneris oliuæ germinibus, & hederæ corymbis, mēta q; viridi, & sisymbrio parantur. Vtendum vero ipsis in multitudine quidē crudiore ac frigidiore, tepidis: in calidiorē autē & biliosiore, frigidis. Euacuat autem atq; dissoluit & oleū calidum ipsum per se ipsum, magis q; si antiquum fuerit, vel sicyonium aut anethum in ipso ebullierit: nam multitudo humorum, qui non admodum sunt crassi atq; tenaces, sufficienter per huiusmodi euacuatur. Sed, & si spodylion, vel serpyllum intus decoxeris, aut pulegij comam, vel calamenthi, vel mentæ, vel sisymbrij, ita etiam id, quod crassius est, euacuabis. Hæc vero ipsa, virium etiā aliquid membris adiiciunt, & quæ debilia sunt, roborant: vtendum igitur ipsis deinceps vsq; ad integram sanitatis restitutionem. Et, si oportuerit, per nares etiam & palatum expurgabis: & sternutamenta excitabis. Et, si ad balneas hominem induxeris, liccis lindonibus caput est perficiendum, sal q; & nitrum & sinapi sine oleo imponendum. Hæc quidem sunt ex particulæ debilitate doloris capitis medicinæ. At, quando ex magnitudine februm accidit, & medicamenta adhibere est necessarium, frigida qualitates ac vires, & quæ ex hydreleo, & oxyrhodino, & papauerū capitibus constant, infusiones expediunt.

In dolore autem capitis, qui sanguinis fluxum aut vomitum decretorium significat, nō sunt remedia quærenda: neq; enim accidens quoddam, sed bonum signum potius tale quicq; est existimandum, sicuti & multa alia, quæ ante crises contingunt: quæ plurimis quidē terrorem incutiūt, bonum tamen quoddam ostendunt. Optimum vero est posse dignoscere, vbi corpus perturbatur, natura cum alias excretionibus, tum præsertim vomitum, & sanguinis fluxum moliente, quorum inseparabile indicium est capitis dolor. Diximus autem plenius de hisce omnibus alibi: nūc vero, quantum poterimus, primum seruantes institutum, breuiter de ipsis transigemus. Conside-

Cra igitur primum quidem species februm, si calidæ sunt atq; vrentes: nam hæc per excretiones iudicari consueuerunt, quemadmodum, quæ molliores sunt ac veluti submersæ, diu durant, & sæpius feruntur in abscessus. Secundo loco, si morbus sit ad salutem decliuus: quis enim bonā crīsim in morbo pernicioso expectauerit? Tertio ad hæc, totius morbi tempus cōsiderandum: si enim principij vel augmenti fuerit signum, non dum autem status neq; cōcoctionis signa apparuerint in vrinis, vel sputis, vel alui excrementis, non expectandum est bonam fieri crīsim. Hæc sunt, ex quibus sperauerit quispiam morbum per excretiones crīsim habiturum. Eius vero, quod iam in stat, neq; iam etiam futurum est, hæc signa sunt. Difficilis quædam tolerantia omnem crīsim antecedit, & si quidem in die crīsis esse debet, noctu: si autē noctu, in die. Si igitur tale aliquid videas, considerandum est, quotus sit aegritudinis dies. Sunt enim, & qui ad crīsim apti sunt, vel paruo etiam motu a natura accepto: multi vero in magnis motibus nequeunt omnino magnitudinem perturbationis inspicere, nunquid sit secundum diei naturā. Nam septimus dies etiam ex paruo naturæ apparatu ad crīsim per euacuationem mouetur: sextus vero magno apparatu indiget, & sæpe neq; vlla in eo fit crīsis: quod si fiat, neq; sine periculo, neq; fideliter accidit. Sic autem & vni cuiq; dierum aliorum quædam inest propria natura, quam, vbi de diebus decretoriis agitur, defini-

Dniumus. Age, iam sit dies pro magnitudine perturbationis: deinde oportet considerare, qualis erit crīsis. De aliis igitur nihil impræsentia dicere oportet. At, si vomitus aut sanguinis fluxus ex naribus futurus est (nam huiusmodi crīsis vnum diximus esse signum, dolorem capitis) ex his maxime distinguere oportet. Primum quidem, si statim ab initio non inualit, sicut quoddam egritudinis accidens, sed in perturbatione, quæ ante crīsim fit. Secundo loco, etiam si ceruix compatiatur, & hypochondrium retractedum sit, aut anhelitus difficilis repente superuenerit, thorace veluti angustiore facto: si enim post hæc omnia pulsus in tumorem subito elati non reciderint in paruitatem, neq; debiles facti fuerint, statim crīsis expectanda est. Si vero non modo non deciderint, sed etiā in altum attollantur, & vehementiam assumpserint, iam faciē egrotantis inspicere oportet. Nam, si aliqua ex iis, quæ in ipsa sunt, partibus palpitet: aut venæ, quæ sunt in temporibus, pulsent: aut gena, vel nasus, vel oculus rubidior factus fuerit: magis est crīsis expectanda est. Si vero & inuiti lachrymēt: aut marmarigas, id est splendores videre imaginentur: ac manus naribus veluti scalpentes admoveant: tunc non iam fluxurum, sed iam fluentem sanguinem inspicies: nam, vbi semel aut bis scalpserint, statim erumpit. Neq; vero ex his perterrearis, si hominem desipientem, aut resilientē inspexeris: nam & hæc humorum repentiū ad partes superiores indicia sunt, quæadmodū & anhelitus difficilis, & hypochondriū retractedū, & collum simul cū capite

DE ARTE CVRATIVA

aggravatum. At tibi vnà cum his indicio etià sit desipiētia. Et hæc quidem sufficere signa pos-
sunt. Sed accedit quandoq; & ægrotantis ætas, & natura, quæ spem magis confirmat, ac præterea
annī tēpus, & præsens constitutio. Nam, si ægrotus fuerit adolescēs, aut alioquin natura calidus,
aut multo sanguine abūdauit, magis adhuc de hoc sperandum erit: & si etiā sæpius antea, dum
sanus esset aut ægrotaret, sanguis ex naribus fluere visus est, hoc vel solum sufficit fluxus sangui-
nis spem afferre. Si vero & tempus anni estatem videris, vel non quidem estatem, alioquin tñ cali-
dam præsentem constitutionem, non ne ex his aliquam indicationem assumes? Quod si & plu-
res eo tempore crīsim ex sanguinis fluxu habuerint, & hoc tibi spem vehementius augebit: & si
corpus plethoricū extiterit, & consuetæ excretionēs fuerint retentæ. Mihi quidem nō modo non
videtur difficile eū, qui tot & talia habuerit indicia, futuri sanguinis fluxus præcognoscere, verū
etiā absurdum & magnæ imperitiæ, non præcognoscere. Noltri vero temporis medicorum indi-
ligentia ea admiratur, quæ admiratione digna non sunt: nam, siue ex dextra nare, siue ex sinistra,
fluxurus sit sanguis, nihil difficile ex nuper dictis prænoscere: plures vero medicorum hoc nō so-
lum difficile, sed neq; omnino possibile existimāt. Tametli has & alias excretionēs omnes præno-
scere licet, si hæc duo tantum considerauerimus, & vnde naturæ motus agatur, & in quā partem:
nam, & quæ deficiunt adiuuabimus, & quæ immoderate ferunt coercēbimus, si ista nouerimus: F A. li. 4. f. 1. c. 2
c. 7. fol. 419. b
Veluti, verbī gratia, sanguinis fluxus ex splene, magnæ cucurbitæ sinistro hypochondrio suppo-
sitæ facile retrahunt: at, qui ex hepate prodeunt, dextro: & qui ab aliis membris, eadē ratione: nā
ex vno de omnibus colligere poteris, vniuersale contemplando. Quare & ego hoc in loco præ-
sentem finiam sermonem: deinceps autem de febribus, quæ ex inflammationibus accidunt, tibi
transigam, de q; aliis passionibus, quæ in singulis partibus corporis conitituuntur. Phlegmonæ
autem, id est inflammationes, à veteribus vocabantur, quæ sunt veluti phlogōsis, id est inflammi-
na, vel incensionēs: à iunioribus autem non omnes: neq; enim herpetas, neque erysipelata, neq;
tale aliquid quicquam inflammationibus annumerant: sed vni tantum affectui ex calidis, qui fit
cum tumore duro atq; dolore pulsatili, hoc nomen accommodant. Non tamen ad hunc solum te-
bres & dolores sequi videmus, sed ad omnes simpliciter calidas, ac veluti effluēscentes passionē.
De his igitur, atque aliis similibus morbis sequenti libro verba faciemus.

GALENI DE ARTE CVRATIVA AD GLAVCONEM LIBER SECVNDVS

ARGVMENTVM LIBRI

Ratio curandi Omnes præter naturam Affectus, qui communi nomine
Inflammationes dicuntur.

De Gencribus ac Differentiis Inflammationum.

CAP. 1.



E iis autē, quæ in singulis corporis partibus sunt passiones, ò Glauco, deinceps dicemus, ab inflammatione incipientes. Etenim sæpius hæc fit, pluri-
mas q; habet differentiās, ex quibus oībus solent febres cōtingere. Cōmunis
igitur in oībus immoderata caliditas, & veluti phlogōsis, id est inflammen,
vnde & phlegmones i. inflāmationis, nomen de iplis afferre antiqui cōsue-
uerunt. Propriam autē in singulis differentiā inuenies, ex qua eius speciem
agnosces, & conuenientē assequeris curationē. Aliter enim qui herpetes, ali-
ter quæ erysipelata, atq; aliter quæ phygethla vocant, ac reliquas inflāmatio-
nis species curabis. Itaq; hoc ē in loco antecedit ea facultas, qua possumus recte agnoscere passio-
nes: tibi q; hoc primū conabor scribere, oēs ab initio distinguens inflammationum differentias.
Prima igitur inflāmationis differentia est, secundum quā hanc quidē humidam, hanc vero siccā,
esse coniungit: humidam quidē, quæ ex calida fluxione membrū occupante contingit: siccā vero,
qñ nullo humore influente calor naturalis ignescit. Hoc autē vsq; ad aliquid quidē veluti febris
est membri: cū vero iā ad immoderatam caliditatē ac siccitatem peruenerit, corruptio atq; extin-
ctio omnimoda fit. Quare neq; in plura secari potest, quēadmodum differentia altera, sē quam
quosdā influere humores particulę dicebamus. Multę enim sunt huius species: nam fluente san-
guine, altera: flaua bile, altera: ambobus q; simul humoribus, alia tertia. Et quidē in earū singulis
vel iā putruit id, quod influit, aut in membro constrictū putrescit: & vel crassum est, uel tenue: &
vel optimū, uel acre. Sanguine igitur optimo ac mediocrem crassitudinem obtinente ad parti-
culam aliquam vniuersim fluente, atque ob multitudinem conculcato, vehemens dolor arripit
hominem, nisi membrum sensum omnino hebetem habuerit: pulsusque in profundo molestus
accidit, tendi q; omnino ac cōiundi membrum apparet: & uehementem calorem persequitur adeo,
ut

A lib. 4. f. 3. c. 1
c. 1. fo. 451. d. c
Etc. 1.

A vt comburi videatur, & refrigerari desideret: talis q̄ rubor per summa viget, qualis ex balneis aduenit, aut ex igne, aut quouis alio modo calefactis. Hęc quidem passio totius generis nomen accipit, atq; Inflammatio nominatur, sicut multæ aliæ species nomē generis accipiunt: sit q̄ assidue ex omni ferē occasione. Nā & vulneribus, & cōuulsionibus, & contusionibus, & diruptionibus, & defatigationibus ob exercitationem, & exarticulationibus, atq; fracturis, & spontaneis vlceribus aduenit: & præter hæc omnia, quando ad immoderatam humorum repletionem venæ pertingunt, tunc superfluum effundunt ad aliquam partem, quæ eo tempore recipere apta sit. Omnino autem hæc reliquis omnibus est imbecillior, vel rarior, aut ad attrahendum paratior, vel imobilior, quacunq; causa fuerit ad has perducta dispositiones: neque enim de hoc dicere proposuimus. Flaua vero bilis, quando sui seruans naturam vnā cum sanguine per totum corpus defertur, morbum facit, qui Icteros, id est regius, appellatur. Sola vero, quando secreta est, & in aliquo membro consistit, Herpes vocatur. Si quidem crassa sit secundum substantiam, totam exulcerat cutem vsq; ad carnem suppositam: atq; hunc affectum Hippocrates nominat Herpetem exedentem. Si vero tenuior fuerit, id, quod in superficie est, tantum veluti deurit: atq; hæc species generis sortitur appellationem, cum simpliciter & sine additione Herpes vocetur. Nam ex duabus

B alijs speciebus, quæ quidem nuper dicta est, Herpes exedens noīatur: reliqua vero altera, miliaris, qm̄ in hoc affectu pustulæ paruæ ac multæ per summam cutem similes milijs excitantur: sit autem Herpes huiusmodi ex bile quidem & ipse, sed minus calida & acri, q̄ sint priores. Quod si ex sanguine & flaua bile calidioribus, q̄ oporteat, mista fluxio fuerit: vel ex sanguine quidem, sed feruescente & tenuissimo secundum substantiam: Erysipelas passio vocatur, multo inflammatione calidior, magis q̄ colorem flauum repræsentans. Et, si tetigeris, facile sanguis subterfugit, rursus q̄ illabitur exquisitè tenuis, & aspectu rubidus. Non tamen dolet hoc, veluti inflammatio: neque, vt aliqua inflammationis species, pulsū, aut compressionem, aut tensionem inuehit similem: sed quandoq; valde parum infestat, ac tum præsertim, quando per solam cutem diffusum fuerit, nihil inferiorem carnem molestant: & tale sæpius accidit, atq; hoc est exquisitum erysipelas. Quemadmodum, quod attingit subiectam carnem, neq; ex vere tenui fluxione cōsistit, neq; tantum est erysipelas, sed iam dispositio permixta ex erysipelate atq; inflammatione. Exuperant autem in ipsa quandoq; propria erysipelatis accidentia, atq; hic affectus à iunioribus medicis erysipelas inflammationis participans, nominatur: non nunquam vero inflammationis, & tunc ipsum nominant inflammationem erysipelatis participantem. Quod si neutrius accidentia manifeste

C obtinuerint, sed equalia apparuerint, tunc erysipelas atq; inflammatio misceri dicuntur. Exquisitum igitur erysipelas cutis solius passio est, non tamen ipsa inflammatio partium tantum cuti subiectarum, sed harum quidem præcipue, nō nunquam vero etiam cutis. Et est ipsa quidem dolorem afferens nihilo minus, quam altera, pulsus tamen ei deficit. Cum vero sanguis influens calidus sufficienter extiterit & crassus, quodcunq; membrorum subito occupauerit, hoc comburendo facit vlcus cum crusta: quicquid vero circumiacet, in inflammationem leuat, efferuescentem grauius q̄ dolentem: vocatur autē Anthrax, i. carbo, huiusmodi passio. Cum vero sanguis influens niger extiterit crassus q̄, ac feculentus, ac feruens, qualis, quem antea diximus: simul autem & fanies non nullas tenues admixtas habuerit: pustulas quasdam per summa cutis excitat, similes ijs, quæ ex igne fiunt, quibus diruptis crustosum sub ipsis vlcus inuenitur: hoc q̄ etiam Carbo est.

Inflammationis quidem species tot sunt secundum ipsam passionis diuise naturam. Multas vero quispiam prætermittas putaret, deceptus multitudinem nominū, veluti à Græcis bubonas, phymata, phygethla, ophthalmias, synanchas, peripneumonias, pleuritidas, et multa alia similibus appellationibus dicta: hæc enim omnia inflammationes quædam sunt, in prioribus comprehensæ speciebus. Singula vero diuersa sunt sortita nomina, qm̄, qui primi ea imposuerunt, vno nomine

D ne & passionis ipsius & patientis particulæ compositam intelligentiam interpretari voluerunt. Sunt enim bubon, phyma, & phygethlō, partium laxarum (quas glandulas, id est adenas, vocāt) passionēs: Bubon quidem inflammatio: Phyma autem, quod statim augetur, atq; ad suppurationem festinat: Phygethlon autem est id, quod erysipelas particeps inflammationis, aut inflammationis erysipelatis nominatur. Sic autem & Ophthalmia eius membranæ, quæ corneæ inhæret, est inflammatio: Pleuritis autem eius, quæ latera succingit: Synanche autem faucium: Peripneumonia vero pulmonis: eadem quæ in singulis ratione. Eas igitur, quæ sunt in partibus apparētibus inflammationes, promptum est cognoscere: quæ autē in occultis, & febres afferunt omnino, non æque discernuntur. At mihi videtur mente egere perspicaci eiusmodi agnitio, ac præterea peritia naturę membrorum, quam ex sectione simul & exquisita scientia operationum q̄ atq; vsuum comparamus. De his quidem in alijs tractatibus diximus. Nunc vero nō datur de his sermonem adiungere, quando tibi repente peregrinandi necessitas ingruat. Quo pacto vero quispiam eas optime curet inflammationes, quæ in apertis partibus constant, hoc tibi primum transigere satago, principium sumens ab ea passione, quæ plurimum fit, atq; idcirco totius generis affert appellationem. In qua hoc in primis considerandum existimo, quod & in alijs omnibus magnam vim habet, vt morbi occasionem inueniamus.

Est igitur vna quedam apparentium inflammationum occasio, quæ non admodum occulta est, quæ Fluxio appellat, nisi quæ illis coniungatur, quæ aliqua alia ex causa euidenti factæ videntur: quando enim nulla ex ijs præcedente membrum confestim patitur inflammationem, ea, quæ hanc passionem causâ generat, Rheuma, id est fluxio, vocatur: ipsa vero passio, dispositio rheumatica. Oportet quæ in his inflammationibus principia curationum optima fieri: nam, quæ in ipsis errata contingunt, difficulter sanabiles, aut omnino insanabiles, faciunt dispositiones. Sunt autem hæc duo maxima errata, si nulla de toto corpore prouidentia habeatur: & si calefiat atque humectetur etiam membrum. Hæc vero duo medicorum plerique delinquant, non nulli quidem à Methodicorum hæresi persuasi, & inflammationes omnes esse passiones astrictas existimantes, quas elaxare oporteat. Sunt vero quidam, qui sine ratione atque vlla consideratione istos sequuntur, vnam excusationem ad male agendum habentes, cum multis delinquere. Sed neque ex Dogmaticis medicis quispiam, neque ex Empiricis ita sentit: sed, quod & ratio & experientia suadet, totum quidem corpus euacuare congruis euacuationibus consulunt: Ipsam vero inflammatam partem perfundere ac superlinire eis, quæ id, quod influit, repellendi vim habent: id vero, quod in membro patiente continetur, euacuandi vim autem ac robur adiungendi ijs, quæ iam affectæ sunt, **F** partibus. Ad quæ vero inspicientes oporteat euacuare, iam & antea diximus: sed & nunc breuiter commemorabimus, ut in sequentibus memoria seruata, non sit necessarium in singulis passionibus eas, quæ euacuationes indicant, audire intentiones. Ætatem igitur, & tempus anni, & regionem, & præsentem constitutionem, & eius qui afficitur, robur, habitum quæ, & consuetudinem, atque ipsam ægritudinis naturam diximus considerandam: ex his enim, quando euacuare, vel non euacuare oportet, & vnde, & quomodo, inuenitur: Veluti in ea, de qua nunc agitur, dispositione, ad genu fluxus deferatur, atque hoc subito plurimum attollatur: tibi vero totum corpus plenum sanguine appareat, & valida laborantis vis, tempus autem anni sit ver, regio temperata, æger vero sit adolescens aut iuuenis: is sanguinis euacuatione ex superioribus partibus indiget. Oportet quæ incidere eius in cubito venam, aut scilicet interiorem, aut mediam: si vero aliqua pars superior pateretur, per inferiora sanguis est educendus, semper enim fluxionis motum ad contrarium retrahere expedit. Atque emplastrum apponendum est ex semperuiuo & corticibus malorum puni **A. li. 4. f. 3. c.**
c. 3. fol. 451 corum in vino decoctis, & rhu, et farina hordei compositum: hoc enim in talibus optimum est, atque ad omnia, quæ facere intendimus efficax: repellit enim id, quod influit, atque id, quod continet, excicat, & membra circumstantia corroborat. Mille quæ alia medicamina eodem modo componere licet, **G** quorum compositionis viam ac modum in libris de medicaminibus didicisti. Vnde ego quoque in singulis vnum aliquod tibi subiiciam, futurum tibi & monumentum, & exemplum eius, quæ in alijs est, facultatis. Si quidem non admodum doleant, talibus vtendum est: cum magno autem dolore fluxu incidente non sic oportet, neque aquam calidam, neque oleum, neque farinæ triticeæ cataplasmata afferre: hæc enim omnia dispositionibus rheumaticis aduersantur, quauis ab initio aliquid iuuare videantur. Sufficit autem in huiuscemodi affectibus vehementiam doloris mitigare aliquo ex ijs, quæ ex passo, & oleo rosaceo, & pauca cera, quæ in utroque sit liquefacta, conficiunt. Oportet autem hæc lanis excipere sordidis, quæ plurimum cœsiui habeant: & æstate quidem frigida, hyeme autem tepida apponere: Sic etiam cataplasmata ex arnoglossa, lente, pane, & rosaceo oleo adhibere: paulo autem supra patientes particulas apponere spongiâ vino acerbo intinctam, aut aqua frigida: melius vero fuerit, si parum aliquid aceti adiungatur. Quod si hæc cura insigniter profuerit, neque alicubi pus se ostenderit, emplastris, quæ ad fluxionem mollia parantur, est vtendum. Optima vero ex ijs sunt, quæ exiccandi & repellendi, quod fluit sanguinis, sine dolore vim habent: quemadmodum ea, quæ vehementer intendunt, atque idcirco dolorem afferunt, plus doloribus obsunt, quam exiccando proficiunt. Tale igitur oportet esse medicamen, quale nobis in **H** vsu est, quod ex chalcite constat oleo rosaceo dissolutum: si vero lanam mundam vino acerbo madeseceris, & exterius apposueris, plus iuueris. Quod si pus se in particula ostenderit, cataplasma imponere oportet semel aut bis: plus vero in presentibus iuuat farina hordeacea: adiungendum tamen in his aliquid vel aceti vel vini. Et post, quam secueris, & pus euacuaueris, cauendum est deinceps, ne oleum aut aquam imponas. Et, si quando vulnus ablucere, aut abstergere oporteat, melicrato vel oxycrato & vino & mulso vtendum. Superponendum vero, si adhuc inflammetur, ex lente cataplasma: si vero sine inflammatione fuerit, aliquod ex ijs medicamentis, quæ emplastica vocant: quibus in huiuscemodi sectionibus vti consueuimus, & præcipue eo, quod ex chalcite constat. Apponenda vero super hæc extrinsecus spongia aut lana vino acerbo perfusa: quæ si acerbum non affuerit, tanto aceti aqua temperanda est, ut adhuc potari possit, atque hac intingere oportet. Sunt vero & ad hoc opportuna ea vina, quæ aliquid aquæ marinæ recipiunt: & tu quoque, ubi sit opportunum, potes conficere permiscendo sal ei, quod affuerit. Vulneri autem nullum ex medicamentis, quæ oleosa sunt, apponendum, quale est macedonicum, & quod tetrapharmacum nominatur: nam exquisite exiccare expedit. Ita quidem sanare oportet, quæ ex fluxione fiunt, inflammationes. Quæ vero alia ex causa fiunt, humectare & calefacere nihil prohibet. Et, si ad suppurationem

A suppuracionem perducere volueris, cataplasma ex farina triticea, quæ in oleo atque aqua ebullierit, apponendum. Et, si quando scarificare oportuerit, neq; hoc verendum est. Si vero eas, quæ ex fluxionibus sunt, inflammationes scarificaueris, magnum afferes malum, ac per initia præsertim. Nam, quæcunque ex ipsis longioris temporis existentes, post totius corporis euacuationem, atq; aliam opportunam curationem, quasdam durities atque nigrities in membris habent derelictas, his sanguinem auferre nihil absurdum est: neque enim amplius hæ inflammationes existimande sunt, sicuti neq; erysipelas, quod iam liuidum est. Etenim & hoc per initia quidem infrigidandū est, tunc præsertim, cum line manifesta occasio factum fuerit: quando vero iam illi deerit feruor, & scarificare cōuenit, atque emplastrum ex farina hordeacea calida, & ceratum, & aliud aliquod medicamen ex dissoluentibus, apponendum. Non tamen ex vena in talibus sanguinē mittere necesse est, sed ventrem tantummodo expurgare sufficit: dandum autem medicamen, quod bilem flauam educat. Si vero passio parua fuerit, neq; hoc facere est necessarium, sed sufficit clystere acri vti. Quæ vero ex vlceribus sunt erysipelata, & quæcunq; adeo manifestas causas habent, si statim volueris cataplasma apponere ex farina hordeacea, & præsertim si antea scarificaueris, nihil nocebis. Inflammationibus vero, quæ cum eryipelate coniunctæ sunt, & eryipelatus cum inflama-
B tione iunctis, mista, quantum fieri potest, curatio est adhibenda, semper q; illi, quod magis superat, resistentum. Et eorum quoque, quæ Bubones, & Phymata, & Phygethla a Græcis dicuntur, similem res, quæ in alijs partibus similes accidunt dispositiones, curationem oportet adhibere, præterquam in partibus, quæ acriora medicamenta in eisdem affectibus possunt tolerare, quemadmodum laxiores partes, quas adenas vocant. Herpetas autem, quantum ad totius corporis euacuationem attinet, vt eryipelata, curare oportet: quantum vero ad patientem particulam, non omnibus similis curatio adhibetur. Nam, qui exedentes sunt, refrigerari quidem desiderant simili-
C liter alijs herpetibus & eryipelatus: non tamen ea ferunt medicamenta, quæ præter id, quod refrigerant, etiam humectare natura apta sunt, sed sola admittunt refrigerantia, quæ etiam maxime possunt exiccare. Non igitur vel lactucam, vel polygonum, neq; ex stagnis lentem, aut palustrem lotum, vel anthyllon, vel psyllion, vel portulacam, vel serm, vel semperuiuam, vel tale aliquid, quod refrigerare possit atq; humectare, apponere oportet, quæ eryipelatibus erant opportuna: neque vnquam spongietidas frigida aqua perfusæ: neq; solano, quamuis refrigerandi atq; vna exiccandi vim habet, sed mediocrem. Cum igitur maiorem, quàm solano adiit, expetunt siccitatem, superimponere ipsis oportet ab initio quidem ex vite capreolos, & folia rubi, & rubi canini, & arno-
C glossi. Post hæc vero & lens adiungenda, si oporteat, & aliquando mel, & farina hordeacea, & quod antea scripsimus ad inflammationes, quæ ex fluxione eueniunt, cataplasma, dempta ab eo semperuiua. Ipsa vero loca exulcerata inunge medicamentis, quæ ad herpetas in libris, qui Pharmaceutici dicuntur, scripta sunt: multa vero huiusmodi apud omnes inueniuntur, plurima q; ex his ad figuram paruorum circularum formantur. Et, vbi vti volueris, ex passo liquefacere oportet: q; si passum non affuerit, vino tenui & albo & subadstringente, quale est Falernum, & Massilioticum, & Sabinum, & Adrianum, & Arlynum, vtendum est: cauendum tamen, ne ob antiquitatem, aliquam cōtraxerit in gustu acritudinem. Et, si posca aquosa loco horū aliquando vsus fueris, nil deterius feceris. Iam vero in longum tempus protractis vlceribus, neque passo circuli parui sunt diluendi, neq; posca adhuc aquosa sit: & vina, quæ sunt adstringentia, sufficienter conueniunt, præcipue quidem nigra: &, si ea non affuerint, alba. Medicamina autem in hoc tempore ipsis præcipue sunt accommodata, & quod Polyidæ vocatur, & Pasionis, & Musæ, & Andronis, & quæcunque alia his similia sunt. Herpetas vero, qui summa tantummodo exulcerant, nisi diu perdurauerint, nullo horum inungere oportet, † comburūt enim fortiter, ‡ & vehementer exic-
D cant: verum istis sufficiunt, quæcunq; vim glauci habent, medicamenta. Diluere autem maxime quidem aqua: q; si nil profecerit, etiam acetum adiungere oportet: quod si etiam solani succo intinxeris, aut arnoglossi, plus etiam proficies. Summa vero hæc te cognoscere oportet, quod omne vlcus, siue iponte, siue ex accidenti, siue ex vulnere factum fuerit, exiccari desiderat, medicamento (vt inquit Hippocrates) non aspéro, hoc est, non mordente, neque vehementer irritante, præterquam vbi malignum & cum putrilagine fuerit: talia enim acriora expetunt medicamina, & quæ ignis vires habent, quale est misy, & chalcitis, & arsenicum, & calx, & sandarach: etenim non aliter, quàm ignis, adurunt medicamenta huiusmodi: sæpius vero, vbi ista cesserint, ipsum ignem adhibemus. Quapropter & ipsi, qui Carbones appellantur, super ipsam crustam, vbi præcipue particula putret, huiusmodi medicamentorum natura est conueniens. Non tamen loca circumiacentia fāgere expedit, ne te ipsum lateas ea exulcerans, quæ minime expedit, sed antedictis circulis paruis vtendum est, qualis est, qui Andronius nominatur. Si quando vero rubor inualuerit & multa phlogosis, medicamentum passo diluendum, vel arnoglossi succo. Si vero magnus sit tumor, vino quidem acerbo in principio, postmodum vero & aceto. Cataplasma etiam ex orobi farina & oxymelite confectum apponendum: atque ante hæc statim ab initio tantum sanguinis auferendum, quantum sufficit, nisi aliud prohibuerit. Hæ quidem sunt passionum per genera curationes: quæ pro naturæ instrumentorum patientium varietate mutantur.

† In aliquibus
codicibus antiquis
græcis leguntur,
σείων τοῦ
πᾶσι, i. ad totam
formam.

Lib. de Vlceri-
bus non longe
a principio.

* ἀσπέρη.

mutatur. Quatuor vero sunt ab his indicationes, ab eorum temperatura, à formatione, à situ, atq; E
 à virtute. A Temperatura quidem, si non nulla quidem ex ipsis natura sicciore sunt, non nulla
 autem humidiora: quædam frigidiora, quædam calidiora existunt: Et secundum coniugationem
 humidiora ac calidiora, vel humidiora & frigidiora: vel sicciore & calidiora, vel sicciore atq; frigi-
 diora: aut ex toto temperata. Oportetq; in curationibus intensionem haberi ad membri naturam:
 hæc enim, quousq; intrigidandum aut exiccandum sit, docet. Nam, si carnosæ partes inflatio-
 nem patiuntur, paulum exiccandæ sunt: venosæ quoq; quâvis sint carnosæ sicciore, non tamen
 & ipsæ multum exiccari desiderant. Sed, quæcunq; natura arteriosæ sunt, magis venosæ sunt exic-
 candæ, atq; his amplius nervosæ, & multo magis his cartilaginose & osseæ: nam prius, quàm ad
 propriam naturam particula redeat, non dum curationi impositum esse finem arbitrâdum. Ad
 sicciorem vero temperaturam reducunt, quæ natura sicciore sunt: & ad frigidioram, quæ frigi-
 diora: & secundum alias qualitates eodem modo: ad mediocrem vero referunt, quæ sunt in singu-
 lis mediocria. Sic quidem partium temperaturæ passionum variant curationes: At Formatio-
 nes hoc modo: nam quædam ex ipsis intus habent spaciolitates, quædam extrinsecus, quædam
 vtrinque, quædam neutra parte. Velut ex simplicibus arteriæ ac venæ & nervi, quæ quidem sunt
 in artubus seu mēbris extremis, quæ græce *cola* dicuntur, intus: quæ vero intra peritoneum, vtrin F
 que. Nervus autem, qui in membris extremis sunt, neutra parte: qui vero intra peritoneum, ex al-
 tera parte. Visceribus autem ferè omnibus intrinsecus atque extrinsecus sunt magnæ spaciolita-
 tes. Ac præterea caro ipsa, pulmonis quidem, spongiosa: contra vero renum, densissima: & post
 hanc, hepatis caro: splenis vero caro, quanto densior est carne pulmonis, tanto hepatis carne ra-
 rior. In omnibus igitur his, quæ neutra ex parte habent cavitates, quæ superfluum fluxum exci-
 piant, fortiter exiccare oportet, quamvis non fuerint natura sicciore, sicuti nervi, & præcipue il-
 li, qui sunt in membris extremis. Sed, quæ intus & extra aliquid inflammationis possunt relaxa-
 re, non multum huiusmodi fortiter exiccantibus egent, si præsertim laxam carnem habuerint, quæ
 admodum pulmo. At ex Positu indicatio, neq; ipsa negligenda est: nam, per quæ euacuare opor-
 teat, atq; quomodo, ipsa præcipue demonstrat. Fluentium igitur adhuc humorum, Antispasmi, id est
 retractio, sic. n. Hippocrates || nominat: eorum autem, qui iam membrum obfederunt, Parocheteu-
 sis i. derivatio, medela est. Vtrunq; autem euacuationis genus per communes venas fieri præcipit.
 Veluti in locis muliebribus retrahes, si eas, quæ in cubito sunt, secueris venas, aut iuxta mammas
 cucurbitas apposueris, vel manus concalefeceris, & fricueris atque alligaueris: Derivabis au-
 tem, si eas, quæ in poplitibus, aut talis sunt, venas diuideris, & cucurbitas coxis applicueris, & cru G
 ra calefeceris, ac perfricueris, atq; alligaueris. Et, si quidem in parte dextra locorum muliebrium
 passio fuerit, à dextra manu, aut crure detraxeris sanguinem: si vero in sinistra, à membris, quæ il-
 li è directo sunt. Quod enim ab ipso Hippocrate || Cat'ixin, dicitur, hoc ipsum est, secundum re-
 ctitudinem. Interiores autem venas incidere oportet: hæc enim viciniore magis quæ è directo
 sunt patiens membris. Nam, si splene inflammationem patiente, sanguinem vis euacuare, in-
 teriores in manu sinistra venas secato: & si hepate, eadē ratione in dextra: Siquid vero ex superio-
 ribus inflammationem habuerit, veluti in his affectibus, quos Græci synanchas & ophthalmias
 vocant, & quicunq; alij capiti aduenerint, eas, quæ extrinsecus sunt, atque è directo. Patientibus
 vero membris extremis, à coniugibus euacuatio faciēda est, siue retrahere velis, siue derivare, præ-
 terquam ubi passio sit inueterata: tum enim à membro ipso patiente detrahimus. Sic igitur in sy-
 nanchicis eas, quæ sub lingua sunt, venas incidimus, quando iam totum corpus vacuum se nobis
 obtulerit, passio vero sit diuturna. Sic & hepatis & splenis cucurbitulas applicamus. Sic & aliud
 quodlibet patiens membrum scarificamus, si non amplius humores influant (tunc enim magis
 irritaueris, ac malum duplicaueris) sed quando iam totum corpus expurgatum fuerit, neque iam
 aliquid influit, aliquid vero, quod pridem influxerat, in membro contineatur. Et quidem laborā- H
 tibus gibbis hepatis partibus, quod per urinam trahere oporteat: concauis autem per excretio-
 nem inferiorem: situs ipse visceris indicat: atq; etiam thoracem & pulmonem per tussis expurga-
 re: ventriculum autem & stomachum per vomitus: intestina autem per inferiores excretiones:
 quemadmodum & splenem & renes per urinas: locos autem muliebres per menstrua: cerebrum
 autem atq; eius membranas per palatum, & gargareonem, & nares, & aures. Sed, quod et ijs, quæ
 in superficie sunt, partibus talia medicamenta apponere oporteat, qualibus eget passio: ijs vero,
 quæ in profundo sunt, & quas per multa interpolata debent eorum virtutes attingere: non qua-
 lia nunc sunt, sed qualia futura sint, ex situ membrorum agnoscimus. Quare, siue medicamentum
 est ex ijs, quæ extrinsecus apponuntur: siue ex ijs, quæ comeduntur, aut bibuntur: non præsens
 eius vis consideranda est, sed qualem obtinebit, qñ ad membrum affectum peruenerit. Ob hæc igitur,
 buæcunq; in pulmonis inflammationibus extrinsecus thoraci applicantur medicamenta, val-
 de fortiora atq; acriora natura sunt, quàm si ipsa visceri patienti apponerentur: quod enim per
 multorum corporum media ipsi membro patienti est occurrurum, omnino exoluitur, & viribus
 deficit, si ab initio fuerit imbecille. Tm igitur aduentitij roboris adiungere oportet, quantum in
 transitu amittitur, vt, quod relinquit, æquale remaneat ei, quod tactu iuuat. Ob id igitur in thora-
 cis

Lib. de Humo.
a principio.

1. de Rat. vict.
in acut. 29. 7.
113. d. Et ali-
bilispe.

Acis inflammationibus, quæ in parte summa consistunt, ea, quæ solum elaxare possunt, sufficiunt: intrinsicè autem, sicuti in membrana succingente, acriora sunt necessaria. Et de splene etiam, atq; hepate, omnibus q; visceribus intra peritonæum ratio eadem. Sæpius enim ex medicamentis impositis vlcatur cutis, quamuis durior minus q; ad patiendum habilis, quàm viscera. Et, si ip-
 sis visceribus medicamenta applicare possemus, quibus subinde indigent, tãto molliora esse oportet, quanto & ipsorum natura facilior affici. Et quidem omnia, quæ comedere vel bibere iubet, medicamenta viscerum passionibus opitulantiæ, hæc multo acriora ac potentiora viribus esse conuenit præ ijs, quibus indigent membra morbis affecta: exceptis illis, quæ & ventriculo & stomacho auxiliantur, hæc enim sola talia exhibentur, qualia à passionibus exiguntur: reliqua vero omnia acriora, ac viribus potentiora sunt, ea quæ præsertim, quæ vel renum vel pulmonis occasione dantur. Considera itaque, quot numero partes pertransire oporteat id medicamen, quod ad pulmonem sit peruenturum: primum quidem os, & fauces, & stomachum: deinde & ventriculum ipsum, & quædam ex tenuioribus intestinis: deinde eas, quæ sunt in mesenterio, venas: deinde eas, quæ in cauis partibus hepatis: ex quibus ad eas, quæ in gibbis sunt, transumptum, hinc ad concavam peruenit venam: postquam ad cor: & deinceps hoc modo ad pulmonem. Neque negare possumus, quin in singulis partibus his, quibusdam admisceatur humoribus, ac quandam transmutationem, atque alterationem pro natura visceris capiat: quare, quod de eius virtute relinquitur, minus omnino est atq; imbecillius, quàm vt membrum affectum iuuare possit. Quæ igitur à situ partium indicatio sumitur, tantum curationem euariat: Quæ vero à Virtute, quâ tum nunc dicturus sum. Quoniam ex partibus corporis non nullæ ab influentibus virtutibus gubernantur: quædam vero à proprijs atque natiuis: atque ex his ipsis quædam sibi duntaxat, quædam etiam alijs, fons & origo sunt quarundam virtutum: & aliæ quidem opus habent peculiare, aliæ autem commune: permutare opus est curationis formam pro ratione earum, quas diximus, differentiari. Nam pleraq; ex remedijs, morbum quidem finiunt, sed natiuas membrorum virtutes offendunt, quæ quidem offensio ad totum corpus pertinet: Quod dupliciter fit, quatenus aut viscus illud alicuius virtutis est origo omnibus partibus communicata, aut ipsius opus toti corpori vtile est. Hepar enim, cor, cerebrum, & testes, communia vniuerso corpori principia sunt virtutum: ventriculo autem, atque locis muliebribus propriæ insunt virtutes nulli alteri parti communes: opus tamen ventriculi quidem toti corpori confert, locorum muliebrium autem nequaquam. Nocet autem sæpius passionis curatio membri patientis virtuti. Quæ enim immoderate laxant, soluunt
Crobur, quare & membri virtutem: quæ autem supra modum refrigerant, natiuum calorem extinguunt, qui fortassis (vt non nulli arbitrantur philosophi ac medici summi) substantia virtutum existit: & si non hoc, saltem primum & maxime necessarium ipsarum instrumentum. Iam vero & qualitates quædam extraneæ virtutes dissoluere possunt. Nihil igitur horum in curationibus præterire oportet, ne nosmet ipsos lateamus, in eum incidentes sermonem, Morbus quidem curatus est, homo autem obijt: quod à quàm plurimis quotidie factitari videmus, qui irrationalem experientiam colunt, atq; hæresim methodicam, omnia artis bona destruentem, quæ rationes quasdam dogmaticas quidem, sed multis erroribus plenas, consecratur. In indicatione autem, quæ habetur ex virtute partium, quispiam etiam reponeret & Facilitatem & Difficultatem ad sentiendum. Nam, quæ facile sentiunt, acria medicamenta non tolerant, sicuti neq; etiam humores. Nam, cum acris humor in ventriculi ore continetur, sæpius syncopa corripitur. Quod si mediocris sit affectus, anxietatem & nauseam habent: & non nunquam humorem, quo infestantur, euomunt: non nunquam vero frustra agitantur: hoc q; in illis affectibus accidit, in quibus in ore ventriculi vitiatum humor imbibitur. Eodem pariter modo, cum ad oculos huiusmodi defluerit humor, maximum affert dolorem: & pustulas vlcerosas, quæ difficulter curationem recipiunt, excitat. Sic quoque rursus oculi ipsi obeam, quam habent ad sentiendum facilitatem, tolerare non possunt acrium medicamentorum viciniam, quemadmodum neq; etiam ventriculi os: quin immo nec aliquod extrinsecus aggrauans hæc particula tolerant, & minus ventriculo oculus, vtpote qui non nunquam etiam ab ijs, quæ inunguntur, grauatur. At, quæ difficilem sensum habent, hæc cataplasmata grauiâ sustinent, & medicamenta mordacia. Siquis igitur velit ex facilitate sentiendi indicationem illis quatuor, quas antea memorauimus, quintam annumerare: vel in ea comprehendere, quæ ex virtute sumitur: nihil, quantum ad recte medicandum, differt. Has igitur omnes indicationes in memoria habere oportet in quacūq; particula morbo aliquo affecta: nam & ipsius Temperatura, & Formatio, & Situs, & Virtus, singulas, quæ in nobis fiunt, operationes commutant, communi intentione seruata: hanc enim ex morbo semper assumendam esse docuimus. Qui igitur secundum solam & simplicem intemperiem morbi fiunt, per contrarias qualitates curantur: Calida quidem intemperies per refrigerantia, siue primo, siue ex accidenti refrigerent: frigida vero per calefacientia: sic sicca per humectantia: humida autem per exiccantia, curantur. De eo vero, quod primo calefacit, aut ex accidenti, plene (vt nosti) diximus in eo tractatu, quem de Simplicium medicamentorum potestate composuimus: Vbi id, quod primo refrigerat, quandoq; ex accidenti calefacere ostendimus, quemadmodum aquæ frigida infusionem,
 vbi

DE ARTE CVRATIVA

vbi caloris naturalis fecerit reuocationem: & quod calefacit, refrigerare, cum rarefaciēdo corpus E caliditatem fecerit euaporare. Quæ igitur secundum solas actiuas qualitates corporis sunt alterationes, ex sola, quæ ex calefacientibus, refrigerantibus, humectantibus, atq; exiccantibus potestate adhibetur, ad naturalem habitum restituiuntur, neq; sensibili egent euacuatione: Quæ vero ob materiæ influxum, si quidem bene temperata sint, solam euacuationem desiderant: si vero intemperata, euacuationem, atq; vnā per contrarias qualitates expetunt alterationem, veluti quæ rheumaticæ dicuntur dispositiones. De quibus (vt nosti) vnum à nobis volumen est editum, in quo & hoc statim ab initio ostensum est, q̄ ea, quæ totum corpus alit, facultate debilitata, huiusmodi fiunt dispositiones, cum acruata superfluitas ad partes præcipue defluat imbecilles. Si enim per rheumaticam dispositionem sanguis, qui in huiusmodi partes fluat, aliquā habeat cacochymiam, mista oritur dispositio: quod forte rarissime euenit. Sanguis enim sine pituita, aut flaua vel atra bile, fluens, tenuis semper mihi cōsistentiæ apparuit. Ex alia autem quapiam causā si pars intumeat, considerandum est, an huiusmodi affectus sit phlegmone, an scirrhus, an oedema, Phlegmonem id est inflammationem nominantibus nobis omnem calidam ac veluti flammeam dispositionē cuius differentias paulo ante diximus. Tempus itaq; est, vt de oedemate breuiter subiiciamus, vt memineris eorum, quæ latius de hoc nos dicere audiuisti. F

De Oedemate.

CAP. 3.

Oedema igitur vocamus tumorem mollem, doloris expertem, quem ex pituitosa substantia, aut spiritu vaporoso fieri constat, qualis in cadaueribus euenit: Non nunquam etiam in pedibus & cruribus eorum, qui aqua intercute, & phthiri, & alio malo habitu (Græci cachexian vocant) laborant. Verum tale oedema in periculosis illis dispositionibus accidens est, nulla propria præcipua que curatione indigens: sola enim frictio ex oxyrhodino, aut non nunquam ex sale & oleo, vel etiam ex sale iniecto oxyrhodino, sistit ipsum, alia q; huiusmodi multa. Cum vero propter pituitam parti influxam huiusmodi sit affectus, spongia in aqua, quæ parum aceti habuerit, infusa passionem aliquā sedat: quæ si non quieuerit, plus aceti miscendum est: sit tñ moderata ipsius temperatura, vt possit ipsam quispiam bibere. Quæ autem ex ea plus aquæ cōtinet, in principio adhibenda est, maxime in mollibus corporibus: quæ vero hac fortior fuerit in robustis & duram habentibus pellem, & quæ ad primam spongiæ appositionem non iuuantur. Oportet autē spongiam omnino nouam esse, quæ si non affuerit, saltem exquisitè abluatur ex aphonitro & nitro, & ex ea, quæ conia stacte, id est lixiuium distillatū, à Græcis nominatur. Quod si ex his oedema non quiescat, aluminis parum imponendum est, spongia q; omnino noua applicetur. Si vero in aliquo ex mēbris extremis tale fuerit oedema, incipiēdo ligaturam in imis partibus finire oportet in altioribus, iniectionem & compressionem & vniuersam distributionem faciendo, velut in fractionibus. Curationis enim intentio in huiusmodi affectibus mista est, vna quidem vt eorum substantiæ aliquid dissoluatur: alia vero, vt aliquid congregetur ac restringatur. Si igitur per ea, quæ dicta sunt, non sedetur, tunc aliquid fortiorum medicamentorum, quod temperaturam multā habeat, ex dictis viribus adiiciendum est. Ego in diuturno oedemate, vbi prius particulam oleo illeuilem, deinde spongiam ex lixiuiū apposuissem, atq; vehementius strinxissem, affectum perfecte curatum vidi, non amplius videlicet hac curandi regula habente mistam virium intētionem, sed ad discutiendum & incidendum declināte: id quod in omnibus ferē diuturnis affectibus probatum haberi non ignoramus. Postquam vero satis ad te de oedematis scripsimus, de scirrholis deinceps tumoribus dicendum est.

De Scirrho.

CAP. 4.

Exquisitus scirrhus est tumor præter naturam sensu priuatus durus q;: non exquisitus vero H non oīno insensibilis est, difficulter tñ omnino sentit. Scirrhus igitur insensibilis curationem non recipit: qui vero difficulter sentit, nō incurabilis quidem est, non tamē facili curationem admittit. Fit autem ex humore lento & crasso, qui partibus, quæ induratur, tenaciter infigitur. Interdum itaq; statim à principio congregatur paulatim & augetur: crebrius vero medicorū imperitia paratur, cum vehementer erysipelata & inflammationes astringunt & infrigidant. Si quis igitur medicamenta vehementer dissolutiua induratis corporibus adhibuerit, quæ manifestam faciant scirrhi diminutionem, breuī tempore sperabit perfectam curationē, non vere, ignorans, q̄ reliduum passionis hoc curationis modo incurabile redditur: tenuiori enim ex eo dissoluto humore, residuum exiccatum lapidis duritiem assequitur. Non igitur curandæ sunt partes indurate medicamento immodice siccante, sed eo, quod calorem habeat tepidum, humiditatem vero nec multam, nec omnino minimam: quod enim superfluum humorem habet, nihil omnino dissoluit: quod vero minimum, plus, q̄ oportet, exiccatur. Oportet igitur induratum corpus, à medicamento, quod auxilio futurum sit, simile quid pati ijs, quæ sub Sole funduntur: vocantur autem Malactica, id est molliciantia, huiusmodi medicamēta: de qbus amplius diximus in quinto tractatu libri, qui de simplicium medicamentorum viribus inscribitur. Et exempla eorū dicta sunt,

A. lib. 4. f. 3. t.
c. 1. fol. 457.

A. lib. 4. f. 3. t.
c. 1. fol. 459. 2

A sunt, simplicia quidem, medullæ omnes atq; adipēs. Ex medullis primas partes obtinet ceruina, deinde vitulina: ex adipibus autem adeps anseris in volucrum genere: leonis vero in pedestrium, cæteris præstat. At vero, qui ex gallina sumitur, anserinum, & qui ex pardo, leoninum sequitur, ac deinde vrlinus, atq; taurinus. At, qui ex capris accipitur, & crassior & sicciior prædictus est, eo q; adhuc magis, qui ab hircio capitur: at, iam dictum est, q; huiusmodi affectus medicamentis vehementer siccantibus non indiget. De differentia vero, quæ ex eorum tenuitate crassitudine q; oritur, indicatiue quidem dictum est, manifeste vero nequaquam adhuc: iccirco in memoriam tibi reuocanda sunt, quæ inuicem commentabamur, quando Cercyllij puerulum curabam, cui ex erylipelate nimis infrigidato atque astricto tumor scirrhus in toto femore relinquebatur. Existimauimus enim medicamenta, quæ ipsum curare deberent, tenuia esse oportere: quare femur oleo perfundebam in profundam peluimposito puero, quæ multum sabini olei continebat, eo, q; omnium tenuissimum ipsum esse sciebam: à balneo vero abstinēbam, nisi in longo interuallo dierum totius corporis curandi gratia. Postquam vero partem fouimus, medicamenta ex prædictis medullis & adipibus confecta adhibuimus, miscēdo non nunquam bdellium scythicum, mastichē egyptiam, atq; ammoniacum thymia vocatum, quod pingue & non vetustum esset: similiter & chalbanen. Et post, q; per hæc præparatum fuerat, soluens ammoniacum pinguisimum in acerrimo aceto, circūlinui totum femur circum circa: deinde per aliquot dies rursus opopanax pinguisimum miscui aceto acerrimo, & huius videlicet exoluens id, quod recens erat: alioquin pingue non permaneret, quemadmodum nec bdellium, nec ammoniacum, neq; etiam chalbane: iussit q; puerum alteri cruri innixum saltare, ut plus cibi ad illud ferretur. Postea, ubi repulsus erat ita scirrhus tumor, timens, ne eius residuum maneret, omnia ē contrario facere aggressus sum, femur ex aliquo medicamento eorum, quæ pice constāt, perungens. Manifeste itaq; clarebat, q; ex aceto linimenta egregie tumorem cominuerant, laxatiua autem molliorem reddiderant, minorem autem nequaquam: vicissim tñ eis vtendo, adhibito conuenienti moderamine, puerulum curauī, sic, ut, si altero duntaxat medicamentorū genere quis curationem attentasset, nihil ad scirrhi solutionem profecisset. In tendonibus (voco autem sic musculorum aponeuroses, id est enervationes) ex prædictorum medicamentorum vsu manifestissima auxilia videri licet: si quis recte vtatur curatione ex pyrite lapide. Oportet autem eum, cum igne excanduerit, acerrimo aceto aspergere, ac deinde super lapidem mouere partem affectam, ut à vapore sursum lato scirrhus dissoluitur. Multæ enim partes iam planè curatæ conuolutæ q; hoc curationis modo membrum dimouendo, perfecte sanatæ sunt, ut ferè magicum opus videretur. At oportet præparare molliciendo partem scirrhusam medicamentis, de quibus supra diximus. Quin etiam in hac ipsa, quæ sit per pyritem lapidem, curatione, abunde multum oleum sabinum calidum prius perfundendum est, aut aliquod aliud, quod extenuandi vim habeat. Nec minus proderit anethi comam decoquere, præsertim cum viride fuerit atq; recens. Quod si pyritem habere nō possis, molari vtendum est: vocant autem sic lapidem, ex quo molę parantur, quæ frumentum molunt.

De Scirrho Lienis & Iecoris.

CAP. 5.

Splenem induratum non solum de foris fortibus medicamentis curare conuenit, sed etiam per fortissimas portiones: nam eas sine molestia tolerat. Ex quorum numero primas partes sibi vēdicant cortices radicū capparis, & scolopendrij, & myricæ tum radix tum germina, omnibus huiuscemodi in aceto vel oxymelite coctis. At sæpenumero, cum tangitur splen, renitens videtur: non tamen scirrhus, sed flatuosus potius est tumor. In quo oportet, ubi prius locum ablinthio perfuderis, medicamen emplasticum mistas vires continens superponere, quale est, quod ex sulfure atq; alumine constat: sunt profectō multa huiuscemodi in medicamentorum tractatibus descripta: non simpliciter autem mistorum medicamentorum viribus attendendum est, sed & quantum misceatur. Cum itaq; splen flatuoso tumore afficitur, & magis œdemate: si multum aluminis adhibueris, nihil nocebis: in scirrhis autem tumoribus vim dissolutiuam superare cōuenit: parum autem eius, quod stringendi vim habet, admiscendum est. Cum igitur de numero simplicium & sponte nascentium medicamentorū flos salis talis sit natura præditus, sanat splenes induratos, si extrinsecus ipsis in vesica apponatur. Scirrhum autem hepatis ab initio quidem sanauimus sæpius: ubi vero ad plures dies forte foret extensus, neq; ipse potui sanare, neq; alium vidi, qui posset. Omnibus igitur, qui ita affecti sunt, ex necessitate subsequitur aqua intercus: pereunt autē quā plurimi in tempore longo: quosdam vero noui ēt breui pereuntes, quibus alius multa dericiebat. Liquet igitur, q; ijs sufficienter angustata erant ora vasorum, per quæ transmittitur cibus ex simis hepatis partibus in deuexas, adeo quod, si qui ex eis sanati sunt, ea, quā antea diximus in musculorum partium scirrhis, curationis ratio saluauit: neq; enim perfert hoc membrum fortia medicamenta, veluti splen. Augere autem oportet ea, quæ ratione inflammationis ipsi apponuntur, mistura emollientium: erant autem illa ex ablinthij coma, & expressione myrobalani, & viraq; nardo indica q; ac celtica: adhuc autē & croco, & cenanthe, & mastiche chia, & vnguentis, quæ ex spica nardi conficiuntur: adhuc autem & mastichino, & melino, & cenathino.

no. His igitur ammoniacum thymiana, & bdellium, & quas diximus medullæ, & adipēs mīsti, E & quæ incidere possunt, factum in hepate scirrhū sanare poterunt, si etiam ratio conueniens vi-
ctus adhibeatur vnā cum medicamētis, quæ in potu sumuntur ad aperiendum abstergendum q̄;
eum, qui in viscere continetur, humorem. Sunt vero hæc omnia etiam eos, qui in renibus conti-
nentur, lapides comminuerē apta, de quorum materia multi medici conscripserunt. Admiscere
autem oportet & ex ijs, quæ vrinam mouere possunt aliquid. Plurima vero est etiam istorum
materia, quæ à multis quidem scripta est, atq; à nobis comprehensa in eo, quem de medicamentis
scripsimus, tractatu. Quare nunc etiam, quæ dicta sunt, tibi sufficiant.

De Tumore Flatuoso.

CAP. 6.

TEmpus enim iam est transgredi ad alterum genus tumoris, cui materia generationis est spi-
ritus flatuosus. Vocatur autem non solum flatuosus, sed etiam flatus, huiusmodi spiritus,
crassus ac vaporosus existens, non secundum substantiam æthereus neq; tenuis. Cogita vero eius
naturam ex circūstante nos aere, in memoriam reuocans, qualis in austrinis constitutionibus,
qualis ue in aquilonaribus fiat: ei. n. qui in australibus, assimilatur flatuosus: alteri vero, qui in aqi-
lonaribus, is, qui in nobis fm naturam est, spiritus. Adiuuat autem, ne huiusmodi spiritus dis-
flet, etiam densitas corporum. Quare huiusmodi affectus curatio vnā communem q̄; habebit **F**
intentionem ad elaxanda ea, quæ astricta sunt, corpora, atq; ad crassos spiritus extenuādos. Nam,
si subtiliori substantia sufficienter calefeceris, id quidem, quod densatum est, rarefacies: quod ve-
ro crassius est effectum, extenuabis. Patientium autem particularum natura conuenientem auxi-
liorum materiam indicabit, ac in ipsa maioris minoris q̄; rationem. Nam spiritus iste crassus & va-
porosus non nunquam sub membranīs, quæ integunt ossa, comprehenditur: non nunquam ve-
ro sub peritonæo: aliqñ intra intestina vel ventrem: comprehenditur vero aliqñ & intra mem-
branas, quæ musculos complectuntur, quemadmodum & à membranosis tendonibus: compre-
henditur etiam ab ijs, quæ ratione cognoscuntur, spatijs in musculis atque alijs partibus corpo-
ris, quorum locorum naturā in administrationibus anatomicis didicisti. Ita igitur ipse musculus
inflatur, atq; in ventris vel intestinorum corpore flatuosus includitur spiritus: & cum sufficien-
ter frigidus fuerit, tūc maximum dolorem excitat. Communis autem curatio omnibus (quem-
admodum diximus) per subtiliorem substantiam: quæ q̄, quādo passioni dolor adiunctus sit, ta-
lem habeat naturam, vt dolorem queat sedare. Secundum vero patientium partium differētiā,
& materia curationis commutatur: et augetur, atq; obtunditur vis. Cum igitur ex tali spiritu do-
lor interuenerit in vētre inferiore, subtile oleum cum medicamentis, quæ in ipso ebullierint, per **G**
clysterem iniiciens, statim dolorem sedabis. Quæ vero debent ebullire in oleo medicamēta cum
subtili substantia calefacientia, sint cymīnum, & id quod apud nos est, & magis quā ipsum, id qđ
æthiopicum nominatur: & apij, & petrapij semē, & marathri, & sinonis, aneli q̄; atq; libystici, &
sefeleos, & dauci, & spōdylij. Et, si coniectura comprehenderis frigidam esse dolentium partium
dispositionem, rutam, & marathrum, & grana lauri intus decoques: miscebis que asphaltum, ip-
sum q̄; oleum laurinum, & siqua alia similem naturam habēt. Quod si inflammationē huiusmo-
di doloribus adiunctam putaueris, auferes ea, quæ admodum acra sunt, & quæ vehementius ca-
lefacient: ad ea autem, quæ in hoc mediocre naturam gerunt, quæ q̄; vim elaxandi habent, trāsi-
bis. In oleo itaq; ad ebulliendum pones anethum & non rutam: etiam admiscebis adipem anse-
rinum vel gallinaceum: sed hæc quidem, vbi vehementiores dolores infestant. Mediocres vero
etiam extrinseca concalefactione iuuantur, ea præcipue, quæ ex milijs fit: nam eorum leuitas do-
lentibus commodissima est. Si hæc non affuerint, vel ex sale calefacito, vel ex lini semine crudo,
vel quocunq; alio modo. Cucurbita etiam magna cum multa flamma absq; cutis scarificatione, se-
pius statim dolorem amouit: oportet autem eam vmbilicum comprehendere. Quod si etiam post
hæc dolores permanferint, medicamentis ex opio vti non dubitabis, quale est Philonis Tarsen-
sis, omnibus medicis notum: quāuis scieris aliquam noxam ex huiusmodi medicamentis, mem-
bris patientibus necessario affuturam. Sed certe ei, quod magis vrget, obsistendo, hominem, qui
ex nimio dolore syncopa corripitur, parua cum noxa saluare eliges: nā & sequentibus deinceps
diebus noxam membro ex medicamento contractam emendare licebit. Vocantur igitur huius-
modi medicamenta, Anodyna, id est indolentia, quoniam dolorem sedant: & dolorem quidem
sedant, non tamen dispositiones penitus sanant, sed vim sentiendi obtorpescere faciunt. Vti au-
tem oportet Philonis medicamento, omnibus q̄; ex opio confectis, non statim, sed post tempus
compositionis annum, aut omnino semestrem. Maxime vero atq; citissime ex potu horum me-
dicamentorum laborantes dolore liberantur, vbi intestina gracilia patiuntur: sicuti ex ijs, quæ
fedi imponuntur, crassorum intestinorum passionēs præsentaneum habent remedium. Non mo-
dica autem fit virtutis distributio & ex exhibitis, cum inferiora afficiuntur: atq; ex ijs, quæ fedi im-
ponuntur, cum superiora fuerint affecta. Quæ quidem in carnis fit partibus spiritus flatuosi ag-
gregatio, non nunquam omnino vacat dolore, ac longiori tempore durat, ac tum præcipue, cum
fuerint articulationi vicina: hic enim sunt muscoli magis neruosi ac densi, atq; in media sui parte
carnosiores ac rariores. Tales vero (vt nosti) passionēs sanauit medicamentis ex pice, resina, tere-
binthina,

A. l. 4 f. j. l. 2.
19. fo. 460. c. 1

G A. ibid. c. 10.

A binthina, & adipe leonino atque taurino. Conuenit autem ipsis & quod ex sorde balnei, & calce fit, & ex lycodoro, & (vt summam dicam) ea, quæ insigniter subtili constant substantia, quibus ea, quæ molliendi vim habent admiscuntur.

De Abscessibus.

CAP. 7.

ENimvero, cū de his satis dictum, iam tps est, vt transeamus ad apostematum i. abscessum tractationem: licet aut nominant eas dispositiones, in quibus inuicem distant, quæ prius se contingebant, corpora. Spatium igitur vacuum in medio fieri oportet, quod aliquam substantiam spirituosam vel humidam aut mistam ex vtriusque comprehendat. Transmutantur autem in abscessum inflammationes quædam, atque ex inflammationibus erysipelatis participantibus, & ex erysipelatibus inflammationis participantibus non pauca. Sine his vero etiam abscessuum dispositio consistit ex multitudine quorundam humorum, aut spirituum vaporosorum, siue in ipsis patientibus partibus {in medio} generentur, siue ex alijs confluant, ea ratione, qua fiunt illa, quæ Apostema ta id est decubitus vocantur. Noiant vero sic huiusmodi dispositiones, cū, q prius vnū membrum infestant humores, eo relicto ad alterum transeunt. Quocūque vero modo fiat abscessus, id spatium quod abscedentes interiacet partes, humiditatibus: quæ ipsum faciunt, repletur: quæ, vbi aliqui perdurauerint, multiformes habent alterationes. Nam & lapidibus, & arenis, & testis, & lignis, atque carbonibus, & limo, & sordiciei balnei, feci, & amuree, & multis alijs talibus similia in abscessibus corpora contineri sepe numero inueniunt. Qui igitur p summa sub cute consistunt, facile dignosci possunt, neque est eorum sanatio difficilis: nam ex tactus proprietate facillime discernuntur.

Curatur vero ex extrinsecus adhibitis medicamentis, ijs, quæ bibunt, non indigentes, veluti qui in profundo, atque in visceribus præsertim, fiunt. In dignotionibus igitur, cum suppuratur, cedunt digitis prementibus non resistentes, quemadmodum membra inflammata: dignotionem igitur præbent manifestam. At proprietas cessionis alia est in tenuibus humoribus, alia in crassis, quæadmodum & in tenacibus atque mucosis humoribus. Sæpius vero nobis subiicitur cum tentione spirituosam pars aliqua abscedens: quæ vbi secunda fuerit, inuenitur sanguis concretus, adeo vt, qui bis aut ter huiusmodi viderit dispositionem, si solers & memor fuerit, comprehensum in huiusmodi tumoribus sanguinem ita concretum agnoscere poterit, cum in memoriâ ex collatione reuocauerit tentionis ac cessionis proprietatem. At forsitan præstat non proprietatem, sed quantitatem tentionis ac cessionis nominare. Curatio autem earum, quæ in superficie cutis abscedunt, inflammationum, fit incipiente quidē adhuc abscessu per ea, quæ dolorem sedant atque relaxant: procedente vero tempore ad ea, quæ concoquendi ac suppurandi vim habere proprie dicuntur, transire oportet. De his autem dictum est, sicuti de pluribus alijs, in quinto de medicamentorum simplicium potestate tractatu. Statim igitur aqua abundanti perfundere atque fouere oportet: & oleo calido partem inflammata conspergere: atque ex farina triticea, quæ in aqua atque oleo moderate ebullierit, cataplasma imponere, nam hoc citius ad suppurationem perducit, q id, quod ex pane conficitur. Illud. n. maxime dissoluendi vim habet, vt cui adsint sales atque fermentum, optime q; coctum sit: hæc vero omnia defunt triticeæ farinæ. Et, cum suppurari incipientem inflammationem curaturus, suppurationem prohibere posse speraueris, tunc plurimum panem ebullire permittas, oleo scilicet aqua subigens: sit autē aquæ ad oleum multiplex proportio. Plus autem, q hoc, suppurationem prohibet hordeacea farina simili modo præparata. Quæ vero in tali curatione infunditur aqua, habeat althææ radices intus decoctas. Si vero per summa cutis in parte inflammata tensio valida fuerit, multis scarificationibus incidere oportet in superficie, ac postmodum ex farina hordeacea elixata, vt diximus, cataplasma apponere. Tētaui autem sepius multas & in superficie valde q; tenues scarificationes: cōtrario autē his modo alias profundiores magnas: & tertias, quæ medium tenebant in longitudine ac profunditate. Quæ igitur in superficie fiebant, debile auxilium afferbant: Quæ vero longæ erant atque profundæ, plurimum quidem sanguinis exhauriebant, adeo vt ferè animi defectum afferrent: rursus vero ipsæ propriam curationem, veluti vulnere, exigebant: Quæ autem earum ambarum medium tenebant, semper inueni ab inconuenientibus dictis esse remotas: atque ideo eas in vsu censui preferendas. In quibus igitur difficulter ad suppurationem peruenit, neque facile discuti tumor potest, ibi humores esse cōpactos crassiores ac tenaciores est existimandum. In his vero dispositionibus tm conuenit ea, quæ fit per profundiores scarificationes, curatio. Conuenit etiam id, quod ex caricis constat in aqua decoctis, cataplasma.

Oportet autem non ipsas assumere caricas, sed aquam, in qua ebullientes sunt liquefactæ. Expediit vero & caricæ pingues esse & dulces, vt earum humor non dissimilis melli videatur: & si eas assumens decoxeris vsq; ad plurimum temporis, reddetur aqua melli tenui substantia simillima. Huic igitur aliquando hordeaceam farinam iniicere oportet, aliquando panem Syncomistum, sic autem nominant eum, qui medius est inter exquisite purum & furfuraceum: vocant autem non nulli eundem panem Autopyron, quoniam in puro farinam, non qualis natura est, talem ad conficiendum panem assumunt, sed prius purgantes furfur excernunt: contra autem in fufuraceo prius adimunt eam farinæ partem, quæ purissima est: panis autem, qui autopyros appellatur, qualem habet ex natura farinam triticum, talem etiam seruat. Oportet autem triticum ipsum, ex

Septima Classis.

oooooooo

quo

DE ARTE CVRATIVA

quo farina sumitur, esse ex ijs, quæ generosa dicuntur: quædam enim ex ipsis multum fursuris cō-
 tinent, quæ ignobilia nominant: quædam vero siliginem, quæ (vt dixi) generosa vocant. Nequa
 quam igitur oportet fursuraceum esse frumentum, ex quo vtilem ad cataplasma farinam accipi-
 mus, sed, quemadmodum dictum est, multam habere siliginem: q̄ si ignobilis tritici farinam as-
 sumpseris, crassiorem fursuris partem oportet excernere, atque ita panem medium conficere. Ex
 hoc igitur pane partem mediam ac teneram ad cataplasmata commiscebis, quando potentia me-
 dium farine hordeacea & triticeæ volueris facere cataplasma. Nam farina triticea maxime ad sup-
 purationem valet, hordeacea vero plurimum resoluit: hic vero, quem diximus, panis mediam na-
 turam seruat, sicuti & eius farina inter nuper dictas farinas triticeas est media. Ad hoc igitur re-
 spiciens cum decoctione caricarum misce, quod tibi conuenientius videtur, siue ex panibus, siue
 ex farinis. Si vero tumor resoluatur, minus tamen, q̄ oporteret, simul coquere oportet cum cari-
 cis hyssopum vel origanum. Si quando vehementius tumorem exiccare volueris, sales decoctio-
 ni adicias, deinde hoc modo infunde farinam hordeaceam. Eximatur autem & hinc, quicquid
 fursuraceum est: & postq̄ plurimum ebullierit, appone cataplasma. In tumoribus quidem, qui
 difficulter resoluuntur, verendum est, ne eorum reliquiæ, Scirrhus i. duræ, relinquatur. Qua-
 re in singulis solutionibus attendere oportet, ad quid transmutetur omnis, cuius curatio suscipi-
 tur, tumor: nam ea curatio, quæ fortiter exiccantibus agitur, reliquias duras operatur. Hoc vero
 in singulis solutionibus animaduertes, si partem patientem tetigeris, & quod nunc apparet, illi,
 quod prius videbatur, contuleris. Si igitur vnquam tale suspicatus fueris, decoque in aqua cucu-
 meris agrestis radicem, aut bryonia, aut allari, sæpius quidem per se solas, non nunq̄ caricæ pin-
 gues adiciens: deinde aquæ farinam admisce, commiscēs & aliquid adipis, anserini præcipue vel
 gallinacii: quod si hi nō affuerint, suillum adiunges. Radices quoq̄ earum, quas nuper diximus,
 herbarum, atq̄ præterea althææ, si post moderatam decoctionem cum pane atq̄ adipe conteran-
 tur, huiusmodi tumores resoluunt. Fortior autem hisce omnibus est dracōis radix: & si quando
 ea vti volueris, cum sit ijs, quas nuper diximus, multo subtilior atque ad resoluendum potentior,
 omnino adipem commisce. Nisi enim humectaueris atq̄ mollieris induratos tumores, sed forti-
 bus medicamentis resolueret tantum studueris, in primis quidem diebus eos insigniter decrescere
 facies, sed pariter id, quod relinquitur, indurabis: hoc vero induratum difficulter resoluetur. Me-
 lius igitur, sicut diximus, vt fortiter resoluentibus medicamentis commisceamus molliētia, veren-
 tes, ne tumores in scirrhus (quorum curationē in precedentibus audiisti) conuertantur. Rur-
 sus igitur ad suppuratos tumores accedamus, quos vbi posse resolueret desperaueris, ex farina tritici
 cea vtere cataplasmatibus, nam ad celeritatem suppurationis plurimum conferunt. Deinde ape-
 riens, si videris ea, quæ circa sectionem sunt, libera omnino ab inflammatione, medicamentis, quæ
 emplastica dicuntur, vt. Sit autem eorum vis ad exiccandum habilis: careant etiam morfu, vt
 neq̄ adstringentia medicamenta habeant admista, sed ea potius, quæ sine doloris sensu resoluunt,
 vel parum aliquid adstringentis habeant. Ego vero sæpius in huiusmodi vsus sum medicamen-
 to, ex fermento & ostreis combustis confecto. Si vero pars aliqua sectioni circumstans inflam-
 mata fuerit, eo, quod ex chalcite constat, vsus sum, oleo liquefaciens: & vbi paulatim refrigera-
 tum fuerat, in mortario temperans & molliēs manibus, atq̄ vinum infundens, vt nosti. Ad mul-
 ta vero vtile est hoc medicamentum, quemadmodum in libris de Compositione pharmacorum
 diximus. Faciemus etiā alios (si Deus voluerit) de Passionibus, quæ singulis partibus accidunt,
 in quibus omnium medicamentorum, quibus vti consueui, diligenter vires explicare tentabo, at
 que eorum vsus opportunum exponere. Sed tu iam in hisce medicamentis, de quibus in hoc li-
 bro memini, habuisti à me antea & mensuras & præparandi modum. Vbi vero plus opportuno
 cutis colliquata fuerit in suppurationibus, adeo vt panno lacero similis efficiatur, non facile subie-
 ctis corporibus agglutinatur, vt necesse sit eum, qui κατὰ πλάτος, id est per latitudinem, nomi-
 natur, curationis modum adhibere.

De Sinu.

CAP. 3.

CVM vero amplius agglutinandi cutem subiectis corporibus creuerit difficultas, huiusmodi
 affectum Sinum appellant. Deinceps tibi in memoriam reuocabo huius quoque curationis
 modum, quē vidisti me sæpius in pluribus adhibere. Vbi talis dispositio cōsistit, satius est fistulā
 directē perforatam vel ex ære vel ex cornu factam habere paratam: q̄ si hæc non fuerit, vnum ex
 ijs instrumentis, quæ Pyulca id est puris attractiua, dicuntur, quod foramen latissimum habeat:
 & eius, quod à nobis compositum est ex charta combusta medicamentum, tu sæpe vidisti me exi-
 guam portionem multo oleo rosaceo permiscere, ac per id instrumentum puris attractivum in
 sinus injicere, deinde filis euullis orificium claudere. Quæcunque vero emplastica medicamen-
 ta oleo rosaceo liquefacientes injicimus, hoc instrumentum non permeant. In his vero oportet
 vesicam suillam accipientes, fistulam directum foramen habentē apponere. Esse vero acriora me-
 dicamenta liquefacta, q̄ illa, quæ Emmota, id est linamentaria, dicuntur, est necessariū qualia sunt
 apud omnes vsitata, colore viridi insignia: hæc enim oportet non pauco oleo rosaceo liquefa-
 cere, vt in sinum injici possint. Dissoluitur autem emmotorum vis in huiusmodi mictionibus.

Igitur

F A. lib. 4. f. 3. l.
C. 12. fol. 459

Alignitur Emplastica omnino medicamēta, quale est Macherionis, & Epigoni, & quod Iſis cognominatur, vbi ad emmotorum vſum deducuntur, cerati indigent admittione, hæc. n. ad linus vtilia ſunt: qua enim ratione eis ceratum admiscetur, eadem etiam ſunt ad linus vtilia. Miſcentur aut, qm̄ vires mordaces habent, ſi per ſola liqueſcerent, nō admifto iſtis cerato: ſed, vbi quidē oleum roſaceum plurimum fuerit, quod vero in ipſo liqueſcit, medicamentum paucum, non amplius acritudinem ſeruant. Vbi vero linus mediocriter carne oppletus fuerit, tunc agglutinantia medicamenta apponere oportet, veluti ſi recenti & ſanguinolento vulnere medereris. Multa vero tali ſunt natura prædita, alia quidem, quæ ex aſphalto conſtant, vocant autem huiusmodi, nescio quomodo, emplaſtra Barbara: alia vero, quæ Cirrha id eſt ſulua, vel Phæa id eſt fuſca, à colore dicuntur, ex lithargyro & æruginē æris decocta plurimum, ſic enim ærugo ſuluum colorem accipit: ſi vero paucum ebulliat, facit emplaſtra, quæ Melina id eſt lutea, dicuntur. Te vero non latet, q̄ omnia metallica medicamenta ſubtiliores partes habent, & vim exiccandi maiorem, vbi multum ebullierint. His vero medicamentis ſulis, vbi ſtatim reponuntur, quædam extrinſecus ſupereminencia fuſca concreſcit, ſub qua pars medicamenti profundior plus. q̄ ab initio ſulua videtur. Atque idcirco non nulli huiusmodi emplaſtra vocant Dichroma, id eſt bicolora, quidam ve-

Bro Diproſopa id eſt bifacia. Quāto vero ſubtiliora fuerint ac maiorem exiccandi vim habuerint, tanto plus in ſinum operabuntur: nam ad eius profundum oportet transmitti vim, ſi intentionem propolitam aſſequi velimus. Quæ vero recentia & ſanguinea vulnera agglutinant, quamquam his minus exiccant, labra vulnerum, ſi breuia extiterint ac minime profunda, agglutinant: atque ob hoc facile ac cito, quod oportet, efficiunt. Si vero in profundum vulnus protendatur, & futuris & fibulis ſolemus in vnum cogere. Sinus itaq; omnes non ſimplices ſunt diuiſiones, ſed frequenter in ipſis modo vna pars, modo alia excoriata eſt, quod neq; te opotet latere. Cum igitur ad locum ſuperiorem ſinus extenditur, facile per os humor vitiatuſ, (ichor græce dictuſ) elabitur. Si vero vergit ad ima, cum intus retineatur, partem aliquam cōtinuam erodit. In his quidem ſinibus, niſi prius ad effluxum feceris ſectionem, niſi proſicies, neque cum carnem generare, neque cum agglutinare volueris. In alijs vero non opus eſt ſectione, ſi modo conuenientem figuram in parte patiente ſeruaueris: ex qua figura potes aliquando ſinum ad partem ſuperiorem vergentem, facere ad inferiorem declinare: ac contra, vergentem ad ima, conuertere ad ſuperiora. Vidifti me igitur ſinum in brachio exiſtente, cuius os erat prope cubitum, figura in ſuperiora tendente ſanſſe ſine alia facta ex aduerſo ſectione: & in coxa ſimiliter figura ſinus ad ima

Cvergente, cum ſinus verſus genu quidē terminaret, altius vero os media coxæ regione ſuperius, ſine vlla ex aduerſo diuiſione vidifti factam eſſe curationem, ſubſiciente me popliti cervical molle, vt inferiorem ſitum haberet inguen, q̄ genu. Suffecit autem in hoc ſinu & alijs iſto maioribus ſolum melicratum immiſſum, aptum ad conglutinandum omnes eius partes profundiores. Quidam aut lixiuium iniecerunt, ſe ipſos coarguentes in ijs, quæ prius ad carnē ſinui inducendam medicamenta appoſuerunt: neque enim caro noua priori adnaſci poteſt, cum ſordicies circumſedit. Quo modo igitur ſufficienter carne innata ſinui, conglutinatium adhibent medicamentum, ſiquidem veluti ſatis ſordidum exiſtente lixiuiō abſtergere tentant, cum pura caro neq; acrius melicratum toleret: In hoc igitur ſatis eſt, ſi hoc tale immitatur, quale quiſpiam cum voluptate potaret. Et poſt melicratum ſolitus ſum deinceps, antequam medicamentum conglutinatium imponam, aliquando vino ſolo, aliquando vino mulſo, ſinum abluere. Nam ad abſtergendum atq; ad expurgandum circūſtantes humores vitiatos melicratum eſt melius: ſed ad conglutinandum vinum eſt melius & efficacius: ſita aut inter dulce & adſtringens medium. Et quidē poſt medicamenti agglutinantis appoſitionem ſpongia noua ex mulſo vel vino circumſiciatur q̄ molliſſima: atq; alligatio quidē incipiat à fundo ſinus, finiatur autem ad os. Sed & linteorum

Dcircūuolutiones fundū ſinus ſine dolore conſtringāt, paulatim vero laxentur vſq; ad os ſinus: & hoc ipſum habeat laxam pharmaci alligationem, emplaſtro, quod circum apponitur, ita cū forficibus diſciſſo, vt ex ore ſinus humores vitiatī, ſi qui excernantur, poſſint eſſluere, paruo aliquo alio ipſi impoſito emplaſtro vſq; ad ſolutionem: quam tertia quaq; die faciēs, auferes hoc ipſum, quod veluti ſuprapoſitum circumiacet, id, quod per totum ſinum circumiectum eſt medicamentum relinquens. Indiciū autem tibi ſit, nunquid pars ſinus profunda ſit bene cōglutinata, humor emanans ſi multus aut paucus, decoctus aut crudus: adhuc autem ſi neque in ipſo ſinu dolor ſentiat, neq; tumor appareat, ſed totus locus depreſſus ſiccus atq; expers doloris exiſtat. Si autem & pus bene coctum in ore videris paucum, adhuc magis bona tibi ſit ſpes de ſinus conglutinatione: imponens q̄ rursus ſpongiā, ac denuo alligans, vt diximus, ſecunda quaq; die vel tertia ſolue, permutans ſemper, quod ori ſinus ſuperſtat, linteum eodem emplaſtro perūctum, quod totum os in circuitu comprehendet. Oportet autem non eſſe admodum impreſſum, ſed ita, vt omnis humor vitiatuſ ex ſinu per ipſum poſſit euacuari. In prima igitur & ſecunda die ſi aliquis humor tenuis à ſinu excernitur, noli omnino de conglutinatione deſperare. Sapius enim circumiecti membro patienti viſ medicamenti vehementeſ exprimit ex ipſa cute & carne ſubiecta tenuem humiditatem, quando ita aſſectum fuerit corpus egroti, aut ex naturali temperatura,

DE ARTE CVRATIVA

aut ex malo victu, qua humiditate expressa spatia mediocriter exiccata conglutinantur. In tertio E autem & quarto ab initio die si ichor crudus ex ore se ostenderit, tunc scito linum non esse conglutinatum. Sit autem præ omnibus id, quod patienti membro circumijcitur, medicamentum vehementer quidem exiccans, neq; mordens vero, neq; intendens, veluti est nostrum, quod cirrhum i. fuluum seu giluum vocatur, line cera confectum ex metallicis medicamentis elixatis & oleo cicino & aceto, quod vulnera sanguinolenta conglutinat, ac line molestia sinus exiccat. Vidisti vero & ipso sanatas fistulas aliquando, in quibus angusto longo q; existente foramine, cum non dum intus callum haberent, sed fordiciem solum, immisi primum lixiuium: deinde tamdiu intus permanere permisi, donec speravi totam fordiciem penitus excidisse: postmodum medicamentum apposui. Sic vero & eos, qui sub cute sunt sola sinus, in quibus non dum carnem generari oporteat, qui q; inscite a quibusdam curati erant, simul atq; curandos suscepi, hoc medicamento conglutinaui, cum tñ prius lixiuius abluissim: quoniam, qui vlcera curant, nullo ex ijs, quæ expurgandi vim habent, vtuntur medicamento. Vbi vero, qui ad abscessum perueniunt, tumores tarde seci fuerint, aut ob medicantium imperitiam: aut eorum, quibus medela adhibetur, timiditatem, qui secari non patiuntur, sed expectant, vt longiori tempore cutis à pure rodatur: contingit sæpius vniuersam cutim à pure circa abscessum aggregato sufficienter extenuari instar *τῆ πάνης* id est laceræ vestis, vnde & illi nomen Rhacodes i. lacerosa, à medicis inditum puto. Est itaq; huiusmodi cutis conglutinari contumax, præcipue si quis secundum substantiam siccum medicamentum imponat: ex his enim magis fit laceræ vestis similis & sicca cutis, instar pellium detritarum. Visum est igitur mihi opportunum, si quis ad eius conglutinationem vtatur medicamento, substantia quidem humido, potentia autem sicco. Dictum autem in libris de medicamentis, quod potentia sicca medicamenta dici solent à medicis, quæ exiccandi vim habent. Optimum autem ex omnibus medicamentis, quæ substantiam quidem humidam habent, vim autem exiccandi, est id, quod à me compositum est ex lithargyro & adipe suillo antiquo & chalcite, quibus additum sit oleum vetustissimum. Nam vim eius esse efficaciorum sum expertus ad huiusmodi dispositiones, cum neq; admodum durum fuerit, neq; exquilitate non inficiens. Sed, & si tale conficiatur, & vulnerum sanguine manantium conglutinatum erit: & omnia etiam vlcera ad cicatricem perducit, si & oleo {antiquo} remittatur, & cū vino mediocris ætatis commisceatur, deinde in circuitu eiusmodi dispositionibus apponatur: quas sæpius line vlla molestia coglutinauit. Cōfert autem, vt diximus, in lacerosis cutibus non parum & mel, si vsque ad emplastri consistentiam elixetur. Eius vero elixationis mediocritas vix recte perficitur, nisi inspicatur. Oportet enim ipsum neq; adeo esse durum, vt difficulter labatur: neq; ita humidum, vt circumfluat: nam, quod durum est, ad eandem peruenit cum duris emplastris absurditatem: humidum vero veluti superiectum calido corpori, vndique circumfluit, & siccum linteum derelinquit, quod non modo nihil iuuat, sed etiam non nunquam obest cuti, quæ debet conglutinari: at, si mediocriter elixetur, hoc quidem optimum est medicamentum in huiusmodi sinibus. Sed, quoniam elixationis eius mediocritas non facile potest coniectura attingi, rectius mihi visum est ei myrrham subtilissime tritam aspergere, aut aloem, vel thus, aut aliquod ex his, vel omnia simul, tum præcipue, cum linteum inunctum humidius apparet. Oportet autem aspergere ista per cribrum, quod sublime supra mel teneatur: sufficit autem semel aut bis illud agitare, vt mediocriter excidant. Non nunquam vero &, dum elixatur, adijcio melli aliquid ex antedictis medicamentis, quando præsertim sinus maior fuerit atq; profundior. Vfus sum aliquando & tenui centaureo, quod mirum est ad huiusmodi medicamentum. Post ipsum vero & symphytum vtile est, & deinde ireos illyrice radix, postea farina ex orobis. Neq; obscurum est, quin & contundi oporteat, & per cribrum subtile transmitti, ac postmodum conteri talia omnia: melli autem commisceantur eo tempore, quando debet ab igne amoueri, tantum nobis super terentibus, donec melli decocto optime vniantur. Melius autem H fuerit, si cacabum ab igne amouentes, hæc omnia admisceamus, & deinde diligenter agitemus, donec mel adeo tepidum reddatur, vt corpori, cui curatio adhibeatur, possit imponi.

De Gangrena.

CAP. 9.

Consequens est, vt deinceps dicamus de inflammationibus, quæ gangrenæ fiunt. Nominant autem (vt nosti) Gangrenas, eas, quæ ex magnitudine inflammationis nō dum factæ sunt, sed adhuc fiunt, mortificationes. Nam, cum omnino mēbrum effectum est emortuum, vt punctum vel sectum vel adustum non sentiat, quæ patitur, statim recidere oportet, quæ sanam partem vicinam attingit. Sed, quod ita affectum est, denigratur: quod vero in medio est constitutum, ita vt tendat ad mortificationem, Gangrena nominatur. Curatur autem euacuationibus nobis q̄ possumus plurimum sanguinis, qui in membro patiente compactus est, cuius causa fiunt mortificationes, ob id, quod arteriæ ex angustia loci nequeunt se attollere: reliquo autem transpirationes exhibentibus. Aut igitur cutem vniuersam multis sectionibus profundis secare oportet vnâ cum subiecta substantia: aut plurimis scarificationibus profundis incidere. Sanguinem vero manare permittens, imponere debes ex medicamentis aliquod ad putrescentia vtilibus: cuiusmodi sunt, quæ ex oxymelite & farina orobi vel lolij conficiuntur: si vero talia non assint, fabarum farinam

A. li. 4. f. 3. r.
c. 15. fol. 45.

A farinam adhibe, atq; ipsum oxymel solum: & si fortius medicamen apponere velis, adijce sal aut ex trochiscis aliquem exquisitissime tritum, qualis Andronis & Polydori & Panonis est. Et Massa medicamentum ad hæc aptissimum, quod in Heræ tomo scriptum est. Vtari autem & his & aliis, quæ antea diximus, animum aduertens ad corpus ægroti. Nam si rusticum fuerit & durum natura, fortissima medicamenta desiderat: scæmineum vero & molles carnes habens, imbecilliora. Sic et viri, quicumq; & molles carnes habent, & balneas amant, & in ocio degunt, mollia exigunt medicamenta. Neq; dubium est idem in pueris faciendum esse. Et, si quando etiam putrefactam atque emortuam partem abscideris, vt securius agas, nuper dictis vtere medicamentis, naturam corporum simul attendens, atque eius insuper partis, quæ male affecta est. Quædam enim sunt, quæ citissime ad putredinem veniunt: & satius est ob maiorem securitatem, quando abscidis aut circuncidis id, quod iam putruit, eam, quæ veluti quadam radix est, sanæ parti adiunctam, adurere, sicuti sæpius in pudendis facere consueuimus, non nunquam quidem male affectis partibus, quæ adurunt, afferentes, quandoq; vero linamētum ante submittētes. Facta vero adustione, solemus (vt nosti) vti succo porri: qui vbi non adsit, ijs, quæ paulo ante diximus. Vbi vero tibi videbitur his remedijs adhibitis cessare putredo, vt cito crusta excidat, medicamento, quod nominatur Cephalicum, cum melle vtē. Melius verò & ex hydrelæo panem decoquentes, vel farina hordeacea eodem modo parata, vel etiam cum ipsa miscendo triticeam, facere cataplasma. Id etiam medicamentum, quod Tetrapharmacum nominatur, ac præterea Macedonicum, sunt crustarū suppuratōibus, atq; earum excidentijs accommodatissima. Similiter autem & quæcunque vim habent ad suppurationem perducendi. Et panis vero tritus cum apio vel ocymo optime crustas dirumpit, & a sanis partibus separat. Ex simplicibus autem medicamentis iris cum melle, vel radix panacis, vel aristolochiæ, vel acori. In mollibus vero corporibus sufficit orobi farina cum melle vel thure. Aufert autem & crustas Machæionis medicamentum, † & iris cum melle. Cum vero exciderint crustæ, huiusmodi vlcera possunt quibuscunque medicamentis, quæ carnem inducant, ad sanitatem perducī.

De Cancro & Elephantiasi.

CAP. 10.

† In græco. cod. legitur. & ijs cum melle. legitur etiā, & ijs, emmota.

Cum de his abunde dictum sit, reliquum est, vt de cancrōsis tumoribus differamus, qui in omnibus quidem partibus corporis fieri consueuerūt, sed in mammillis præsertim mulierum, quæ purgationem secundum naturam non habent: quæ vbi modum seruauerit, tunc mulier integra fruitur sanitate. Hi vero omnes præter naturam tumores ex melancholica superfluitate generantur, de qua diximus in commētarijs, in quibus de potentijs naturalibus egimus: Vbi ostendimus hunc humorem, dum sanguis in hepate sit, facis vinariæ proportionē generari: expurgari autem à splene, qui ex eo naturaliter habet alimentum. Cum igitur naturalis temperatura hunc humorem paucum generauerit, & ratio victus adhibita confert, & splen satis attrahit ex eo, qui generatur, nulla huiusmodi superfluitas in venis coaceruatur. At, cum contraria eueniunt, tunc in venis multiplicatur: & eas, de quibus dicturi sumus, facit ægrotudines. Dico autem ijs, quæ diximus, contraria, vt scilicet hepar ad generandum huiusmodi superfluitatem sit aptum: sit etiam ratio victus per tales adhibita cibos, qui crassum & scæculentum humorem procreare natura apti sunt: splen vero sit natura imbecillior, & quicquid de ea superfluitate generatur, ad se minime trahere potens. In hoc vero corpore turbidus fit, ac crassescit is, qui in venis continetur sanguis. Et non nunquam à venis habentibus (sicut & alia omnia) vim excernendi id, quod extraneum est, per hæmorrhoidas excernitur. Sæpius autem & ad varices decumbit. Et quandoque ad cutem vniuersam expellitur, fitque is morbus, quem Elephantem nominant. Nam & aliquando ad alias corporis partes, quæ cæteris sunt imbecilliores, humor iste defertur: atq; euidenter apparent, quæ in illa parte sunt, venæ nigro sanguine ac crasso plenæ: quantoque crassior fuerit ac nigrior, tanto deterior est passio. In mammillis autem sæpe vidimus tumorem forma ac figura cancro animali exquisite consimilem: nam, quemadmodum in isto pedes ex vtraque parte sunt corporis, ita in hoc morbo venæ distenduntur, ac figuram omnino similem cancro repræsentant. Hunc morbum per sui initia sæpe sanauimus: sed, vbi in molem insignem satis euectus est, nemo sine manus opere potuit curare. Itaque vniuersæ chirurgiæ tumorem præter naturam excidentis intentio est totum tumorem, quæ partibus sanis adhæret, circuncidere: sed ob vasorum magnitudinem, cum præsertim fuerint arteriæ, profluuij sanguinis statim periculum imminet: quod si laqueis eas circumprehendas, sympathiæ id est compassiones, insequuntur. Si autem & morbi radices exurere statuas, neque huic rei maximum periculum deest, cum prope principes partes sit adustus. Hunc igitur morbum (vt diximus) in principio sanauimus, & tunc præsertim, cum melancholicus humor non admodum crassus videbatur existere: nam hic purgantibus medicamentis, ex quibus sanitas sequitur, prompte succumbit. Neque obscurum est huiusmodi medicamenta debere esse euacuandæ atræ bili accommodata. Quod tã diu faciendum est, donec sanitas pristina parti subsequatur, quando ratio victus optimos generans humores interim adhibeatur. In Alexandria quidem elephantis morbo plurimi corripuntur propter victus modum & regionis seruorē: at in Germania & Mysia rarissima hæc passio videtur.

Septima Classis.

ooooooooo iij

&

lib. 4. c. 19.
83. f

lib. 4. c. 1. 2.
15. fol. 159 g

lib. 4. c. 1. 3.
15. fol. 461. b

& apud Scythas lactis potatores nunquam ferè apparuit. In Alexandria vero plurimum genera E
tur ob vicius rationem: comedunt enim farinam elixatam, & lentem, & cochleas, & plura salita,
& non nulli ex ipsis carnes asininas, & alia quædam, quæ crassum & melancholicum humorem
generant. Nam, cum circumstantis aer calidus sit, motus humorum agitur versus cutem. Huic igitur
morbo, quas antea diximus, conferunt purgationes. Quod si & ætas & virtus permiserint, san-
guis prius mittendus est. In caneris vero non inutile est, neq; in istis, ubi nihil prohibet sangui-
nem mittere, demum purgare: & si fuerint mulieres, menstrua euocare, siquidem non dum quin-
quagelimum annum attigerint. Patienti autem particule succus solani imponatur, nam hoc me-
dicamen ad huiusmodi vtile est. Quod si nolit ægrotans medicamento adeo humido illiniri, cum
præsertim domum exire cogatur ad consuetas negocia peragenda, medicamen ex pompholyge
constans est imponendum, quo me vidisti vti ad caneros exulceratos: & si hoc non adsit, adhibe
alterum medicamentum nostrum, quod ex chalcite fit. In viciis vero ratione succus pissanæ abun-
danter exhibendus, & serum lactis: & ex oleribus malua, atriplex, & bletum: & quando tempus
tulerit cucurbitas, ipsis etiam est vtendum: & piscibus petrosolis, & auis omnibus, exceptis palu-
stribus. Sed ijs, qui elephantiam patiuntur, in viperarum esu est mirabile auxilium. Ita vero eas
condire oportet, quemadmodum vidisti Marfos, qui feris venenatis & aspidibus nutriuntur, Ca F
pite quidè primum absciso & cauda usq; ad digitos quatuor: deinde omnibus interaneis exem-
ptis, cute etiam nimirum adempta: aqua deinde abluto corpore ipsarum. Sed neque aliter, cum
theriacam antidotum conficere volumus, vsque ad hoc præparamus: sed deinceps concoquimus
differenter, in theriaca quidem paululum anethi & pauci salis in aqua ponentes: in ijs autem, qui
elephantia laborant, in olla anguillarum modo præparantes, ex albo iure. Fit autem hoc mo-
do. Aqua abundanter in ollam funditur & paucum olei, & cum hoc porrum & anethum adjici-
tur. Liquet autem, quod viperarum carnes sunt decoquendæ, donec exquillite molles reddantur.
Ipsam etiam medicamentum confectum ex viperis, quod theriacam appellant, optimum est ad
potandum ijs, qui huiusmodi morbo laborant, vel etiam, sicui libuerit, ad cutem oblinendam:
nam, cum omnia hæc facta fuerint, non nunquam solet squama à cute decidere, quale in serpen-
tibus quod senium appellatur.

Strumarum, Meliceridum & Hydropum curatio.

CAP. 11.

IN alijs autem tumoribus præter naturam non putavi oportere eam, quæ manu fit, curationem
hoc in loco scribendam, cum tu medicamenta probatissima à nobis acceperis. In strumis enim
ea, quæ adstringere, & exiccare, & pus etiam facere possunt: In ijs autem, quæ Melicerides dicun G
tur, ea, quæ has dissoluendi vim habent, & quæ pus resoluunt, & aquam in scroto & abdomine,
medicamenta accepisti: Quibus etiam in aqua intercute laborantibus vtaris: in ijs enim duplex
intētio est, scilicet vt sanetur tumor durus in viscere, & coaceruata humiditas dissoluatur. At prius
de induratorum viscerum curatione dictum est: sed differunt cum talem tumorem partes pa-
tiuntur, & differentem exigunt curam. Quare curatio hydropum ad has tres reducitur inten-
tiones, vt sanemus durum tumorem, qui in viscere est: vt ea apponamus, quæ humiditatem dissol-
uunt: & medicamenta, quæ vrinam mouent, in potu demus. Hæc quidem tibi, qui ad longam
peregrinationem accingeris, satis esse arbitror. Si vero (vt institui) librum de medicamentis
secundum morbos & loca patientia composuero, illum in tuo reditu habebis. Sed &
aliud opus magnum amicis exoptulantibus exarabitur, in quo tota ars cu-
randi continetur. Quod si tibi peregre detineri diutius con-
tigerit, singulos, qui à nobis scribentur, com-
mentarios ad te mittere non
grauabimur.

A. li. 3. §. 14. 1.
c. 13. tit. 322.

* At genere.

H

Post hunc librum collocari debuerat liber, cui titulus est, Quos,
& quando, & quibus medicamentis purgare conueniat:
qui in quinta Classe pag. 88 habetur.

Galenus



GALENI IN LIBRVM HIPPOCRATIS
DE VICTVS RATIONE IN MORBIS ACVTIS
COMMENTARII QVATVOR

Ioanne Vasseo Meldensi interprete.

Ab Augustino Gadaldino plerisque in locis emendati.

ARGVMENTVM

Pertractat de ijs, quæ Veteribus medicis in Acutorum morborum Victu controuerſa erant: ac in Primo quidem libro agit de Ptiffana.



Vi Gnidias appellatas sententias conscripserunt, hi sanè, quæ ægri in morbis singulis patiuntur, & quò nam modo non nulla iis eueniant, recte scripserunt. Atque hætenus vel medicinæ quoq; imperitus quispiam recte scribere potuisset, si ab ægro unoquoq; qualia patitur, probe intellexisset. Verum, quæ medicum non referente ægro ipso perdiscere oportet, multa ex his sunt prætermissa, alia in alijs.

Non solum nihil eorum, quæ ægri patiuntur, prætermiserunt, qui gnidias scripserunt sententias: verum quoq; & ultra id, quod iustum est, de quibusdam mentionem fecerunt: vt paulo post ostendam. Neque id artis opus est, si nihil prætermiserint eorum, quæ à plebe ipsa cognosci possunt: non etenim is artificii est scopus, sed, quæ ad curationem idonea sunt, omnia scribere. Quapropter sæpius non nulla adijcere, quæ vulgus nō nouit, erit opus: & multa, quæ huic nota sunt, auferre, si nihil ad finem artis conferre videantur.

2 Et quædam ad coniecturalem cognitionem (τέχμαρσιν dicunt) peropportuna.

Τέχμαρσις est, quæ per τέχμηριον fit, cognitio: Τέχμηριον autem appellant veteres syllogismi cum signum, non autem simpliciter signum omne, vt in opere de coniectura & signo est demonstratum. Quæ igitur medicis ad huiusmodi cognitionem tum necessaria tum vtilia existunt, non omnia ait gnidijs in sententijs scripta esse, sed prætermissa pleraq;

3 D Cum autem ad coniecturalem cognitionem dicatur, quò nam modo curare singula oporteat, in his multa aliter, quam illi enarrauerunt, sentio.

Ex quo multa, quæ ad coniecturalem cognitionem vtilia existunt, à gnidijs medicis prætermissa esse dixit, quam nam dicat coniecturalem cognitionem, ipse deinceps docuit, inquiring, Quò nam modo curare singula oporteat. Nempe, quod ad horum inuentionem vtile fuerit, id ex arte est. Sed forsitan quis opinabitur prætermissas esse, quæ tum ad dignotionem, tum ad prænotionem conferunt, coniecturas. Verum res non ita habet, cum de necessitate in illis, quæ ad curationem idonea sunt, hæ contineantur. Si enim ad optimæ curationis inuentionem nihil conferrent morborum dignotio & futurorum prænotio, prorsus hæ superuacarent: nunc autem, quæ conferant, ob id vtilis existunt. Ergo, quæ affectuum dignotio ad curationem valde necessaria sit, recensere non est opus. Nam in primis, quis nam sit morbus, dignoscere oportet, deinde curationem ipsius ita aggredi. Quod vero prænotio ad curationem quoque vtilis sit, demonstrauit in præfatione § prognostici Hippocrates. Qui ergo omnia, quæ ad medicinam spectant, vtilia ea vel ad dignotionem vel curationem vel prænotionem esse dixerit, virtute idem dicit. Curatione siquidem per se à medicis exercetur: prænotio autem & dignotio propter curationem. Quo fit,

Septima Classis.

ooooooooo iiii

vt

1. Prog. 2. §. 4.
139. d

ut nemo finem artis dignotionem vel prenotionem, sicuti curationem, asseuerauerit. Intelligere autem etiam impraesentia curationem, sublationem morbi, non eam quidem, quae adhuc fit, sed quae iam facta sit. Sed de omnibus abunde est scriptum in eo libro, qui de fine medicinae agit. Nec expedit, ut impraesentia quippiam praepostere & praeter institutum faciamus (grece παρρησιον εργον ποιειν, dici solet) utpote, qui iam veteris mentem vel sine exequito finis examine cognouerimus. Verum, cum & modo alio dictio praesens plerisque in exemplaribus fide etiam dignis scripta sit, de ea mentionem facere non intempestiuum fuerit. Differat autem ab ante scripta dictione litera una videlicet, η id est vel, ut ad hunc modum graece sit: οὐδ' ἔτι εἰς τέχνην λέγεται, η ὥς χρὴ ἐκαστὰ ὑποθεῖν, id est, Cum autem quippiam ad coniecturalem cognitionem dicatur, vel quo nam modo curare singula oporteat. Qui ita scribunt, per τέχνην dignotionem & prenotionem intelligunt: & per verba haec ὥς χρὴ ἐκαστὰ ὑποθεῖν, id est quo nam modo curare singula oporteat, curationem: nolentes eam in τέχνης τῶς nomine contineri. Quod si ita habet, in antelcripta dictione, qua dicitur, Multa praetermissa sunt alia in alijs, & non nulla ad coniecturalem cognitionem peropportuna, non recte sanatoria artis pariter praetermissa videtur Hippocrates. Sed, quod hi respondeant ob id resumptam scriptam quae sequitur, dictionem, ut, quod sanatorium est, adiceret, nemo est, qui ignoret. Verum, quoniam de re ad curationem utili disceptatio non fit, ob eas res sermonem protrahere est superfluum. Pergamus igitur ad ea, quibus, quae ad sanationem utilia sunt, docet.

4
† Alia lectio
ex cod. & ma-
nuscriptis et i-
presis. q̄ tradi-
derunt nisi in
morbis acutis.
& haec magis
quadrare uide-
tur cū Galeni
explanatione.

Atque non ob id solum non laudo: verum quod & paucis numero sint usi medicamentis. Nempe maximus numerus medicamentorum † quibus in morbis non acutis usi reperiuntur. Est tempestiue exhibitorum tum elaterij, tum feri, tum lactis. Quae si bona essent, morbus quae quibus dari censerent, congruerent, multo facilius digniora laudarent, quod paucissima satisfacerent. Sed res impraesentia non ita habet.

Paucis quoque numero auxilijs usus eos ait, nisi in acutis morbis: quasi in his multa dixerint: quod sane fecerunt. Quae vero longis in morbis dixerunt, haec re vera contra se habent. Nam & per tempestiuam elaterij, feri, & lactis potionem perficiuntur.

5 Qui vero secundum adornauerunt librum, hi medice magis, quae singulis exhibenda sunt, percurrerunt.

Liber secundus post primum scriptus, ἐπιδιδασκαλίας, id est adornatus digestus quae dicitur, cum institutum habens idem, & plurimas dictionum easdem, non nulla quidem eorum, quae in prioribus erant, detracta habet, alia autem adiecta, & alia permutata. Exemplum rei huius, si perspicuitatem delideras, secundum Eupolidis Autolicum ex prioribus adornatum digestum quae habes. Sic & Ggnidias sententias a primis secundas gnidij ediderunt medici: quae non nulla quidem haberent eadem omnia, alia vero adiecta, & alia detracta, veluti & alia permutata. Secundum igitur hunc librum Hippocrates prioribus medicinalem magis esse asserit.

A † Vide in
libro de passio-
nibus non longe
a principio.

B † τὰ ἀλ-
λα νοσήματα
ὅσα τῶν
ἐχόμενα ὄντι.

C* ταπίαν.

D* In codic.
manuscriptis
legitur εἶπον,
i. dixi. & ita
uetus tralatio.
& ita oīno ui-
detur legendū:
superiori. n. cō-
mēto 7 de hoc
dixit Galenus.

E † in libro
de internis pas-
sionibus tradit-
ur, phthises
tres, morbi a-
renibus qua-
tuor, icteri
quatuor, teta-
ni tres.

F* AEsympto-
matum.

6 Sed de Dieta, id est victus ratione, nihil, quod effatu dignum sit, conscripserunt veteres, quanquam id magnum esset.

Is curationis ductus contextus quae, qui per consuetas materias efficitur, Dieta, id est victus ratio, nuncupatur: ut, qui per consuetas tum sectiones tum aduersiones & alia quaecumque manibus fiunt, Chirurgia: tertia ab his medicinae pars est pharmaceutice, quae scilicet per medicamenta absoluitur perficitur quae. Accusat autem priscos Hippocrates, quod de victus ratione nihil effatu dignum conscripserint: id quae dixit, non quod nullum dieteticum theorema conscripserint, sed quod non effatu dignum. Quale nam autem sit effatu dignum, docebit in sequentibus.

7 Fuerunt vero, qui varios morborum singulorum modos, diuersos quae horum sectiones diuisiones quae, non ignorauerunt.

Non solum varios morborum modos non ignorauerunt, verum quoque & ultra, quam decet, de his scripserunt: ut ostendam in sequentibus.

8 Verum morborum singulorum numeros clare pronuciare volentes, non recte scripserunt: quippe cum non facile numerari queant, si quis languentium morbos alterum ab altero quadantenus differre, nullum quae morbum eundem videri, quin idem quoque nomen habeat, conieciterit. Mihi vero placet omni in arte animum aduertere. Nam, quae probe vel recte procedunt officia, probe & recte singula peragere oportet: quae item celeritatem desiderant, celeriter adimplere: & quae puritatem, pure: & quae sine dolore administrari postulant, citra dolorem omnem administrare. Cetera quoque huiusmodi omnia insigniter praeter alijs ad meliorem formam nos redigere conuenit. Maxime autem medicum laudauero, qui in morbis acutis, vi quorum plurimi hominum enecantur, insigniter praeter ceteris in melius procedat. † Sunt autem acuti morbi, quos prisci nominatim perstrinxerunt, pleuritis, peripneumonia, phrenitis, lethargus, causus, † & quicumque alij hos consequuntur morbi, quorum febres † prorsus continuae interficiunt.

† Dixit paulo ante gnidias medicos confestim ab initio de morbis, plusquam oportet, scripsisse.

† Scripserunt siquidem bilis morbos septem: pari modo & paulo infra, vesicae duodecim: renum quoque quatuor: stranguriae quatuor: deinde tetanos tres: morbi praeterea regij genera quatuor: atque tandem phthises tres. Nempe ad corporum varietates, quae multas ob causas permutantur,

A† AP. ex Græcis antiquis. Nam, si quis inter exponendum demonstrationes temperet, nec possit longâ parte cent. finem in la nationism inborû causa, is p. cepuâ partē dimitter: partem & c.

B † Al'. morbos
quosdā cōs mul-
tis hoībus euenire
vno tēpore & ita
ēc vetus interpres.

C † Legitur quidem hoc in loco in ipsius codicibus graecis ἀπερ ἴστο καὶ ὡραῖν ἐν τῇ 177^η θύρῃ, id est quod est in reportu superueniens. & Vetus loco καὶ ὡραῖν videtur legisse καὶ ὡραῖν. Alii manus scriptis quibuslibet haec verba non habentur: sed sicut glossa in margine posita ac verum declaratio superioris morbi epidemici, quod sit morbus qui aliquo tempore in regione superuenit: quae posita debet per librarii incuriam in contextu loco non debito inserunt: quandoquidem morbi epidemici sunt illi, qui perpetuo in una regione abundant, ut habetur a Gal. 1. com. primi Epid. diffuse.

*D[†] dictos eē cen
sendum cēt.*

E † AP Nicolaus
Lauachius ita ver-
rit. Cuius rei indi-
cium manifestum
illud est, quod ip-
si se uigantes ad-
uersus euasendi
videntur. quod ob
diligenti est ani-
ma ueruerit opus.
Qui enim medici
non sunt, credun-
tur medici, in hi-
prestem morbis,
cū sit eorum leue
dicere nomina, &
patientibus euas-
endi, consensu
modum creditur.

modum credatur.

enim si genitus mundus sit, neque si interitus conscius: neque si extra ipsum inane non sit, neque si infinitus: neque si is solus vnus sit, neque si plures: neque quot numero, si plures: neque si horum multitudo incomprensibilis sit, aut infinita: manifeste coniectari potest. Ad hunc sane modum & de aliis multis, quae in philosophia quaeruntur, non nulla quidem iudicare prorsus nequiuimus, alia vero non sine magna contemplatione. Verum de ipsis, quae egros iuuant, vel ledunt, non similiter est. Nempe, etsi ad ipsa inuenienda longo opus sit tempore, viro quibus a multis discrepare, quae tamen se se repperisse quidam iactant, ea facile habere iudicationem videbuntur. Nempe, si egris quidem adhibita praesidium attulerint, laudare oportet atque agnoscere: si vero detrimento fuerint, vitare atque repellere: quae vero nihil auxilij vel offensa estatu dignum praestiterint, in neutrius horum ratione censere conuenit. Sed sane medicos ab euidenter offendentibus abhorreere oportet. Si ergo parum exuperantibus insistant, qui quouis modo ab initio sunt opinati, nihil mirum videri debet. In iis vero, quae admodum recesserunt, atque vsque adeo ut a quibusdam laudentur, ab aliis culpantur, admirari quisquam eos poterit, qui valde offendente extollunt, vel eos, qui vere iuantia vituperant. Id sane est, quod Hippocrates particulari vno exemplo proponit. Dictum autem & id, nec secus ipsius solutio, ab Erasistrato in primo libro de febribus paucis quibus & euidenter, utpote qui Hippocratem plane est secutus. Percurrens etenim in libro praefato medicos tum eos, qui aduersissimum febrientibus victum praescribunt, tum eos, qui longis in diebus egros ipsos conficiunt, atque Petronam ipsum, qui tum carnes tum vinum exhibebat: in textura sermonis hoc infert pacto. In multis igitur valde magnis plagis decidebant: si autem febrientes omnes ex tali curationis modo male liberabantur, qui ita curabant, a curatione delisteant. Sed, ut videtur, non febribus omnibus opem fert is sanationis modus. Laudandi igitur cum Erasistratus, tum alij, qui quaestionem hanc proposuerunt, & solutionem eius scripserunt: laudandus quoque & qui praeter ceteris eam proposuit. Sciueris praeterea & eam non magis de acutis morbis, quam de aliis omnibus, proponi solui quibus. Nempe responsio de omnibus communis est. Non enim in acutorum modo, verum quoque & morborum aliorum curatione controuersi fuerunt medici: atque ob id longo tempore sua in cibi exhibendi regula permanet, quod non nullos ab ea euidenter iuuari vident. In ceteris autem, qui nihil inde auxilij recipiunt, cito quidem & egros occulte aliquid deliquisse suspicantur: quamquam id non sit, sed quod retulit Hippocrates in libro de fracturis: ubi agens de iis, qui fracturas cum vulneribus perperam ligant, atque ob id ledunt, ait, Non enim deligationem causam esse existimant, sed aliud quoddam infortunium. Sic & eos in victus ratione opinari par est. Quod autem praesenti in oratione recensuit Hippocrates, id palam est, ubi quis eam secum cogitans bis & ter legerit. Nempe ex particulari exemplo communem doceri sermonem comperiet: quod & uniuersalem uocare consueuerunt, non Philosophi modo, verum quoque & prope omnes Logice artis non imperiti. Erasistratus ergo aduersissimarum meminit uictus rationum. Hippocrates uero relictis monstris alienis quibus, ad moderatiores se contulit. Monstruosae etenim alienae quibus uere sunt, tum quae per inediam fiunt summam: tum quae per repletionem immoderatam, qua utebatur Petronas. Moderatae uero, quarum meminit Hippocrates in acutis morbis, ab insignibus exhibentur medicis. Quidam enim hordeaceam ptisanam in his administrant, alij cremorem duntaxat, alij ne hunc quidem in acutis morbis ante iudicationem, sed tempore interiacente solos exhibent potus, aquam, melicratum quibus, & si opus sit, oxymeli. Controuersiae igitur causa est, quam Hippocrates ipse in sequentibus exequetur, & quam ab Erasistrato in primo de febribus bene enunciarum asserebam. Est autem ea, quod aliqui solo ptisanae cremore indigent: alij hordeacea ptisana: & alij horum neutro, sed potibus solis ad iudicationem usque foeliciter seruantur. Demonstrabit autem in sequentibus, qui nam hordeacea indigent ptisana, & qui solo ptisanae cremore, & qui neutro horum.

14 Sane quaestiones huiusmodi proponere medici non consueuerunt: neque forsan, si proponantur, soluuntur.

Quod primus Hippocrates quaestionem hanc proposuerit, solueritque, ex hac notum euadit Hic dictione. Neque enim, inquit, tales quaestiones proponi a medicis consueuerunt. Quod si & eas quis fortassis proposuerit, solutio non reperietur.

15 Calumniam vero vsque adeo grauem patitur apud vulgum ars tota, ut nullo pacto medicina esse videatur.

Hac quoque in oratione ex particulari exemplo rem quandam uniuersalem docet. Nempe in primis qualemcunque ingredientium exercitationem controuersia iustam ignorantiae suspicionem ostendit. Secundo concordia ipsa iustam magnam quibus cognitionis spem demonstrat: quod nimirum mathematicis demonstrationibus ualde contulit. Neque enim discipulos solum alliciunt, credulosque reddunt, uerum quoque & apud idiotas sese uerissimas existimandas praestant. Mathematicis igitur demonstrationibus usos ait, qui euidenter quippiam & citra quamuis ambiguitatem demonstrauerunt. Sed controuersiae rationem diligenter in sequenti oratione prosequitur.

16 Quapropter acutissimis in morbis usque adeo dissentiant inter se artifices, ut quae alter porrigit optima esse existimas, ea alter mala esse putet: atque ferè ob id uaticinationi (quam graece μαγνην uocant) ars ipsa similis esse videatur. Augures siquidem alitem candem, si ad sinistram uolauerit, bonam faustam quibus esse putant: si ad dextram, malam infestam quibus.

* AZ ledentibus

3. de Fracturis
1.8.74.243.6

* Aiunt fidiotes, est in veteri translatione.

Asiam que. Talia quoque in Aruspicina (quam Ιεροσκοτίαν dicunt) videntur, alia in aliis: sed vaticinantium non nulli contraria sentiunt. { Dico autem speculationem hanc esse & pulcherrimam & germanam, propter quam plurima & commodissima, quæ in arte comperiuntur. }

Μαντικὴν appellauit Hippocrates, οἰωνιστικὴν: ἱεροσκοτίαν vero, θωτικὴν à plerisq; appellatā, quā vere antiqui etiā alij ἱεροσκοτίαν vocant, q̄ ἱερεῖα id est hostias, suspicientes, qui in ea sciētia graues & prestantes sunt, ex ipsis ventura prenunciant: ἱερεῖα, autē scimus appellari omnia, quæ diis ad honorem exhibemus, quales sunt, quæ litantur victimæ, quarum exta inspicientes ἱεροσκοποῖ, id est aruspices, prædicunt. Eos vero, qui ex auium volatu augurātur, quos οἰωνιστὰς & οἰωνοσκόπους, id est auspices, appellant, nunc μάντις, id est augures, appellauit Hippocrates: quanquā μάντιος nomen & μαντικῆς de omnibus, quæ ita prædicunt, artibus proferatur. Nempe μάντις vocant: & ἱεροσκοποῖ, & οἰωνιστὰς, & qui appellātur γενεθλιακοί, & qui per notas & victimas, futura prædicunt, præterea & χρησμολόγοι, i. fatidici, & θεομαντεῖς, id est diuini vates. Sunt, qui & ὄνειροπόλοις, id est somniorū interpretes, à poeta appellatos inter μάντις, id est vaticinantes, collocant. Sed constat Hippocrate ἰσὺς οἰωνιστὰς appellare μάντις, vt poeta appellauit. Nam is in plerisq; sui operis poetici partibus οἰωνιστικὴν artem, venturorum præmotionem esse demonstrat. Quo modo & in primo Iliados circa initia ait, Ἀλλὰ γὰρ δὴ τίνα μάντιν ἔρειομεν ἢ ἱερεῖα, ἢ καὶ ὄνειροπόλον, καὶ γὰρ τὸνα ἐκ δ' ἰός ἐστι, id est, Consulamus itaq; augurem quempiam, aut aruspicē, aut somniorū interpretem: nempe & ab Ioue ostenduntur infomnia. ἱερεῖα quidem dicens, ἱεροσκοπον: ὄνειροπόλον vero, qui circa somnia versatur: μάντιν autē οἰωνιστικὴν, id est augurē auspicem q̄. Sæpius etenim in suo opere poetico huius meminit in maximis rebus, diuinandi etiā arte per alites vsus. Sed forsā hæc, & q̄ decet, plura de huius nominis μάντιος appellatione dicta à nobis sunt: atq; ob id, ad quod dicitur, trāire iā est tempestiuum. Quod enim ait Hippocrates, tale est. Qui diuinatorias artes prolequuntur, in particularibus multis nihil minus, quam medici, discordant. Vidi equidem aliquādo augures in volatibus ipsis, quos dextros & sinistros memorauit Hippocrates, discordantes. Alter Arabs erat, alter Græcus, atq; ex Asia nostra. Arabs dicebat dextram alitem, laborantes mulieres seruare, sinistram viros. Qui vero ex Asia nostra erat, dextram alitem in virorum morbis apparentem, interrogantibus ipsis, si seruaretur, asruere interrogationem recensebat, sinistram vero denegare. Interrogabam igitur eos, si quomodocūq; volentem vel dextram vel sinistram alitem pollere eadem significandi facultate dicerent, nihil q̄ differre putarent, si aut cellissima aut terræ propinquissima, aut media volaret. Et si media, an si propius vel cellissimā, vel infimam, vel adhuc inter has mediam. Pari modo, & si auis vel propinqua vel longinqua volaret, an ne in his nulla foret distinctio. Arabs eas nihil ea, quæ vel in altitudinē vel longitudinem vel latitudinem esset, distantia discrepare respondebat. Græcus vero de symmetro distinguebat, dextro & sinistro: assererebat q̄ ab auguribus hæc scripta esse, atq; immoderatas distantias moderatis contrarias: testes q̄ in eam rem libros Apollētis, Athenæi, Cheræmonis, Artemidori, Phocæ, atq; aliorum multorum, qui in augurandi arte clari essent, proferebat. Deprehendi proculdubio Arabem & confusum & à distinguēdi arte alienum: Græcum vero distincte loqui, & artificem esse. Nempe artis, quæ suorum theorematum iudicium per experimenta habet, distinctia ex distincta & indistincta rerum explicatione oritur. Quod ab Hippocrate edoctus græcum augurem in auium volatu artificiosum magis videri iudicaui: ex abundantia vero celebratissimos augurum testes adducens, adhuc magis hīde dignus erat. Cum vero etiā Arabs plurimos ægrotantiū, quibus vera prædixerat, testes citaret, succedentis vt plurimum euenti subsecuti causam pronunciaui. Nempe, si auis dextra moderate distans viros seruat, immoderate vero distans fœminas: sint autē complures, quæ immoderate distent, vna vero duntaxat, quæ moderate iure quidē multis succedet ex animi sententiā, paucis vero non succedet. Græcus autē alias adiciebat distinctiones, quibus, etsi dextra auis immoderate distaret, interdum tamen seruādum virum laborantē declararet. Nempe, qui molle & muliebre studiū exerceret, veluti & sacrificulum, mulieris schemate seruari dicebat: rursum q̄ & id ab optimis scriptum esse auguribus demonstrabat. Adde q̄ & alias quasdam adiciebat distinctiones, in quibus Arabs nihil intelligere videbatur. Retuli hæc propter sequentē dictionē, quam nemo cōuenienter exposuit, sicuti neq; eā, quæ ante scripta est, ubi ait, Quæstiones sanē huiusmodi proponere non cōsueuerunt medici: neq; forsā, si proponātur, solui reperiuntur. Nam, cū inquit græce τοιάδε, latine huiusmodi, i. quæ ita dissident, quidā de ptisana sola perperam intellexerūt: alij autē paulo his melius de victu acatorum: alij de omni simpliciter uictu: alij uero de curatione uniuersa, prioribus quidem melius, sed neq; adhuc absolute. Causam autē ut dixi, totius dissidij quesituit Hippocrates in omni arte, quæ experientis iudicari possit. Quod autē id ita habeat, manifeste per sequentē condiscēs orationem.

* At. ianificū.

17 Nempe & agros omnibus ad sanitatem magnum quippiam potest, suis quæ ad securitatem, se se q̄; exercitantibus ad bonum habitum, ut quæ ad quod quilibet voluerit.

Sermo præsens eos arguit, qui Hippocratem existimant præscriptam dictionem de ptisana sola

sola proposuisse: eos quos, qui de victus ratione siue acutorum morborum, siue simpliciter vniuersa, factum id putant: pari modo & eos, qui de curatione vniuersa problema esse existimauerunt. Nempe prior oratio, quæ ita habet, Nempe & egri omnibus ad sanitatem magnum quippiam potest, eos arguit, qui de pituitosa: atque alios, qui de sola vel acutorum vel morborum aliorum victus ratione antecedentem orationem esse opinantur. Neque enim egri omnes à sola victus ratione curantur: cum multi sint, qui manuum opera & medicamentorum administratione indigeant: adhuc vero magis neque à pituitosa sola. Neque igitur de dieta sola acutorum, neque dieta simpliciter quæ est in omnibus morbis, sermo Hippocrati existit: neque de sola ea, quæ ex his oritur controuersia: sed de omni simpliciter arte, quæ experimentis tum discerni tum iudicari nata sit. Qui etenim cõe vniuersale quod iudicandi instrumentum reperit, per id, quæ particularia sunt, iudicat. Particulare autem vnum est, & quod de pituitosa medicis in controuersiam venit: sicuti & quod de victus ratione non acutorum modo, verum quoque & morborum aliorum: atque est, quod generalius est, de curatione vniuersa: & quod adhuc hoc generalius est, de omni corporis prouidentia, & si sanorum ea fuerit: nempe & hi ea indigent arte, non quæ ad consequendam sanitatem precepta tradat, sed presentem conseruandam. Quod non pretermisit Hippocrates, cum inquit, Sanis quod ad securitatem, nempe, ut talis seruetur, securitate est opus. Vtile quoque ait esse speculationem & iis, qui exercitantur ad habitum bonum. Vt enim egrorum curatio ea, quæ nunc ab Hippocrate proposita est, speculatione indiget: sic & sanorum securitas, ut presens sanitas conseruetur: sic & sese exercitantiū prouidentia, ut bonum habitum consequantur. Hæc igitur omnia artis, quæ circa corpus versatur, sunt: sed, quod serie continuata dicitur, ad omnem extenditur artem. Quid nam etenim est, quod ait, Et ad quod quilibet voluerit: Nepe augur, aruspex, mulicus, rhetor, & artifex omnis, simpliciter causam eius, quæ in sua arte reperitur, controuersie vnâ esse existimat, cum scilicet vnusquisque ex particulari vniuersale facit. Ita sanè & in auguribus factam controuersiam deprehendi: eum quod qui veriora loqueretur, iudicauit: atque ob id augurum memini Arabis & Greci. Nempe artis omnis constitutio ex priorum à communibus distinctione oritur: qui enim hæc distinguere potest, is optimus censetur artifex. Vt autem constitutio, sic & iudicatio in distinctione subtilitatem habet. Nempe fallunt, qui artes constituunt, cum, quod cuiusque contingit, id vel in omnes vel in plures, quod oportet, extendunt: quod siquidem nulli prorsus contingit, nemo id in tali arte persuadere libi verum esse. Nam in hoc vere oritur controuersia, cum vnusquisque sibi ipsi persuadet, non cum simulans confingens quod contentiose litigat: quo modo non nulli de quibusdam secus, quod animo sentiebant, fecerunt: quo modo & qui proponunt ambiguum esse, vtrum vigilamus dormimusue, aut sapimus insanimusue. Quod si manifestum esse id concedatur, vtrum sanè magis vera loquuntur, anceps inquit esse, an qui vigilant, iis, qui dormiunt: vel, qui non insaniunt, iis qui insaniunt. Nullus siquidem, ita persuasus, aut secum animo opinans, sed litigans, hos sermones facit. Quidam autem in arte medicinali res nouas quidem sunt aggressi, cum tamen rebus prioribus melius quippiam inuenire nequirent, sed vulgi affectionem, quam Hippocrates dixit intelligerent. Nempe vulgus quod nouum inusitatum quod est: & non dum, si utile est, intellectum: laudat magis, quod assuetum, quod utile esse est cognitum. Sunt, qui ob victus suauissimi pollicitationem persuadentes ægros alliciunt, doli vafricia quod non ignari: sed vel propter lucrum vel propter gloriæ cupiditatem talia dolose committere, aggrediuntur. Dicta ergo ea, quæ verbo tenus sit controuersia, quam viri huiusmodi inter se habent, illa quæ secundum rei veritatem est, controuersia oritur, quod enuntiatio non distinguatur, sed vel de pluribus, quod oportet, vel de omnibus tanquam si militer habentibus, efferatur. Atque ob id iuste laudandus venit Hippocrates, qui de sola secundum rei veritatem meminisse controuersia: quam, qui artem constituere aliquam volunt, patiuntur, cum secum sua quod in anima differenter opinantur, & non verbo tenus simulate ac subdole id agunt ob gloriæ vel lucrum cupiditatem. Nullus enim, qui animi consilia vere per experimenta iudicat, Petronæ victus rationem recipiet, carnes assas administrans vinum quod nigrum in iis, qui acuta laborant febre: neque in tanta siti ita temperans, ut cotula aquæ vigelimam porrigat partem. Talia siquidem dietemata absurda sunt: duorum quod alterum existit, nempe vel ob nouitatem vafris ab hominibus parata, vel ob summam stupiditatem, si planè soli veritatem repperisse existimauerint. Quæ vero ab Hippocrate scripta sunt, ea in prudentibus viris, qui vere artem constituere student, reperiri possunt: cum non maxima sit lesio, quam, quibus non oportet, offeruntur. Ac talia quidem distinctu difficilem habent eam, quæ experimentis conficitur, iudicationem: quæ autem valde differunt, facilem. Controuersiam igitur in iis, quæ parum inter se exuperant, iudicare, & quibus nam pituitosa sola exhibenda in cutis morbis sit, & quibus hordeacea: & quibus nullo pacto id faciendum sit, sed potius solus ad iudicationem usque porrigendus sit, demonstrare, Hippocratis intelligentia est dignum.

* Græcè ἐξυπνίζουσιν, id est sublati.

† In antiquis loco dictionis ἐν ἐκπύρωσι legitur ἐν ἐκπύρωσι. & sic est commentum. ut sit interpretandum, & si quod excerni, facile ipsa excernit.

13 Pituitosa igitur frumentaceus gustamenti recte prælata fuisse mihi videtur in acutis morbis: eos quæ, qui ea præferunt, laudo. Nempe viscositas eius lauis, continua, iucunda, lubrica, & mediocriter humens, sitim minime infert: & siquid abluere eger probe abluit: non astringit, non male turbat, neque in ventre tumescit: nempe inter coquendum, quoad maxime potuit, intumuit.

Orationem hanc tantummodo legisse mihi videntur, qui librum hunc de pituitosa inscripserunt: veluti

A. li. 4. f. 1. r. c. 8. fol. 419. g.

A† veluti proœmij partē primam, qui aduersus gnōdias sententias titulum fecerunt. Nam Hippocrates in secunda proœmij parte non amplius contra gnōdios medicos agere, sed se se ad curationis acutorum morborum exercitationem conuertere est visus. Tertia autem proœmij pars, quā hucusq; percurrit, ad eam, quæ victum morbis acutis præscribit, artem speciat. Neq; tamen ad eā solam est utilis, verum quoq; & alteri, qui generalior sit, subiecta est sermoni. Demonstrauimus autem in iis, quos in scripta de fracturis articulis q; parauimus, commentariis Hippocratē subiectos sermones, pro aliis quibusdam vniuersalioribus obliquare consueuisse: doctrinam quæ vniuersalium ex ipsis, quæ tanquam exempla constituit, efficere: neq; enim ita ab instituto recedit, neq; sepius docet, quod multorum commune existit. Quo autem modo in ptīlana sermonem fecit, causam eius, quæ de ipsa est, contentionis tum vestigans tum decernens, sic & de omni acutorum morborum victu rectum tulit iudicium. Nam & de venæ sectione, & purgatione, & tū glandis tū clysteris vsu: de cataplasmatibus item, fotibus, vino, aqua mulsā, oxymelite, & balneo nō parua inter medicos exorta est controuersia: quæ omnia libro in hoc percurrit Hippocrates methodo vna, quam nuper dixi. Vim cuius etiam nouisse visi sunt, qui se empiricos nominauerunt, diorismis i. distinctionibus propria à cōibus separantes: consueuerunt autem diastolas magis, q̃

B diorismos appellare sermones eos, qui quod proprium est, à cōmuni separāt distinguūt q; . Iam ergo, quæ ab Hippocrate de ptīlana dicuntur, videamus. Videntur ergo mihi (inquit) priores medici frumentaceis gustamentis recte prætulisse in acutis morbis ptīlanā. Frumentacea gustamenta intelligit, quæ ex frumētō fiunt: frumentū autem græce σίτον homines appellant, maxime quidē triticum, sed iam tum hordeū ipsum tum zeam σίτον appellant. Appellationē vero ad plura extendentes, δμνίτεια quoq; i. cerealia appellata semina connumerant, lentē videlicet, fabam, lupinum, cicerculam, panicum, milium, pisum, foenum græcum, auenam, tīpham, cicera, & quæcunq; id genus alia. Horū igitur omnium frumentaceorum gustamentorum cetera quidem vulgo damnantur, q̃ protinus magnum inferant detrimentum. Panis autē vnus & chondrus in acutis administrantur morbis: & cum his solis ptīlana est conferenda: lens siquidē, & milium, & fenugræcum, tanquam medicamenta, ob quosdam ventris morbos exhibentur, & non tanq̃ nutritura cibaria. Ptīlanā igitur recte prælatam esse ait frumentaceis eduliis, panis scilicet, chondro, & zeæ, ex qua fit tragus appellatus. Nempe eorū, qui chondrum tīphis Hippocratis non dū fuisse existimāt, ignorantiam argues tum ex quibusdam antiquis comicis, qui chondri meminerūt: tum etiā ex Hippocrate ipso, qui in libro de victu salubri, de chondro ipso mentionē fecit. Nam,

Cet si liber ille Hippocratis nō sit, sed vel Euriphontis, vel Phaontis, vel Philistionis, vel Aristonis, vel alterius cuiuspiam ex antiquis (nempe ad multos librum hunc referunt) sanē omnes hi veteres viri sunt, atq; ex eis quidam & Hippocrate antiquiores, alij vero tempore ipsius vixerunt. Loquor autem de Hippocrate Heraclidæ filio, qui librum hunc confecit: nam auus ipsius Gnōdici filius Hippocrates, quorundam iudicio nihil omnino scripsit: aliorū vero sententia duos scripsit, librum s. de fracturis, & librum de articulis. Quare autem ptīlana frumētaceis eduliis recte anteposita sit, demonstrabitur per ea, quæ ipse infert, inquiens. Quæcunque etenim ad acutorū morborum sanationem insunt bona, nulli alteri inesse comperies. Recte autē iudicabis, si & acutorum morborum naturam, & ptīlanæ vires, cognoueris. Natura igitur acutorum morborum est, vt ipse paulo ante dixit, vt horum febres omnino sint continuæ. Febris vero ortus, caloris natui ad igneum est conuersio, vt alibi demonstraui, & nunc manifestabit, inquiēs ex thorace quidē incipere, ad caput vero flammam mittere. Præterea in libris vulgariū morborum, febrem magnam, ignem vocare consuevit, quasi non aliam habeat naturam, præter quā ignis substantiam. Si igitur contraria contrariorum remedia existant, sanē febris peculiare remedium vt virtute tum refrigerante, tum humectante sit, oportet: id nanque febris naturæ, quæ & calida & sicca

Dest, contrarium erit: talis siquidem naturæ est ignis. Præterea, cum febres & ex humorum putredine oriantur, non paruam diligentiam adhibere oportet, vt, quicquid ex ipsis concoqui possit, concoquatur: & quod iam exustum sit, neque amplius concoqui possit, euacuetur. Quod si febricitantibus ipsis cibi vsus sit, qui hæc efficere queat: si etiā facile tum coquitur, tum distribuitur: iam omnia hæc, quibus est opus, habuerit. Quæ nam igitur sit ptīlanæ virtus, ex Hippocrate audiamus. Viscositas, inquit, læuis est. Leue exasperanti opponitur. Exasperant autem acria, acida, & astringentia. Acria sanē omnia calfaciunt, vt eruum, foenum græcum. Acidorum cetera quidem dimittere oportet: de oxymelite vero est duntaxat agendum. Dimittantur pari modo ex astringentibus pira agrestia, & mespila, & quæcunque huiusmodi, atq; ex frumentaceis lens & similia. Exasperantium igitur malitiam ptīlana effugit, vt pote quæ leuiorem non tactu solum, verum quoq; & facultate habeat. Est item & viscositas eius cōtinua: est siquidem in omni parte sibi ipsi similis propter exactam coniunctionem: † quod zeæ nullo inest pacto. Laudatur præterea nō parum, quod in ptīlana iucundum & mite existit: quod immitti iniucundo q; opponitur, id est quod, dum sumitur, insuauitatem quandam facit: sicut denique & panis insuauis est, dum sumitur, nisi abunde ipsum maceraueris madefeceris q; : immo & ita superatur ab ea, quæ in ptīlana est, iucunditate, quæ mandi non indigeat, sed potuum instar sorberi possit. Neque parua est conditionis

† Veluti primū proœmij, qui aduersus gnōdias sententias titulum fecerunt. Tertia autem pars, quæ de victu morbis acutis præscribit, artem speciat. Neq; tamen ad eā solam est utilis, verum quoq; & alteri, qui generalior sit, subiecta est sermoni. Demonstrauimus autem in iis, quos in scripta de fracturis articulis q; parauimus, commentariis Hippocratē subiectos sermones, pro aliis quibusdam vniuersalioribus obliquare consueuisse: doctrinam quæ vniuersalium ex ipsis, quæ tanquam exempla constituit, efficere: neq; enim ita ab instituto recedit, neq; sepius docet, quod multorum commune existit. Quo autem modo in ptīlana sermonem fecit, causam eius, quæ de ipsa est, contentionis tum vestigans tum decernens, sic & de omni acutorum morborum victu rectum tulit iudicium. Nam & de venæ sectione, & purgatione, & tū glandis tū clysteris vsu: de cataplasmatibus item, fotibus, vino, aqua mulsā, oxymelite, & balneo nō parua inter medicos exorta est controuersia: quæ omnia libro in hoc percurrit Hippocrates methodo vna, quam nuper dixi. Vim cuius etiam nouisse visi sunt, qui se empiricos nominauerunt, diorismis i. distinctionibus propria à cōibus separantes: consueuerunt autem diastolas magis, q̃

† In antiquis codi. legitur, ἐπὶ τοῦ οὗχ ὁ πᾶσι τοῖς λευκοῖς καὶ τοῖς κίττοις, i. quod non inest celi: quis iudicet.

conditionis ptissanæ lubricitas, præsertim cremoris. Pertransit enim thoracem, in nulla ipsius parte quippiam, dum transit, relinquens: veluti faciunt, quæ in meatibus infarctæ adeo obstruunt, ut vix abiolui possint: quod accidit viscosis ferè omnibus excepta ptissana. Hinc sanè, quæ ex chondro fit sorbitio, quod quidem viscosum sit, habet, sed lubrico est destituta: ptissanæ autem inest & lubricum & detergens. Quapropter medici ad detergendum eum, qui in ventre infarctus est, humorem vomitibus exhibito ptissanæ cremore, veluti & aqua mulsæ, utuntur. Crudam quoque conterunt ptissanâ puerorû mangones, facies quæ, ut vitiosos cutis exterat colores, illinunt. Quod autem in ea deterforium existit, id & ad deiectionem est idoneum, distributionem quæ, præsertim ubi ex sima hepatis ad gibbâ transmeare debeat, quæ distribuit alimonia: hic etenim infarciunt, quæ cralli succi sunt, & quæ tenaciter collæ modo adherent. Atque ob id chondrus non in affectis iecinore solum maxime nocet, verum quoque & in iis, qui viscus hoc nullo quidem pacto lesum, sed cum meatuum angustia naturaliter affirmatum habent. Qui igitur ita natura affecti sunt, ipsis tum tenacia tum crassi succi omnia infarciuntur, atque opplent: atque ob id gravitatè in eo viscere sentiunt, cum hæc distribuunt. Præterea ptissanæ viscositas humens est, sed non vehementer, ut aqua & melicratum, sorbitio ite

A† Legitur quidē in omnibus cod. græcis quos viderim, ἡ τὰ ποφύμενα τῶν ὀν. Vetus tamen interpret videtur habuisse aliā lectionē, qui vertit, & quod ex omnis cum speciebus cōdientibus.

B† Co. ipsi habent, ubi a cibo aliquo caco stomacho subuersum. manu scripti habent, ubi a cibo aliquo eustomacho subuersum. vetus translatio hæt, sed, quoniam confortatur per quosdā cibos confortatiuos conuenientes stomacho & c. quam lectionem securus est interpret noster.

C* Ap. cum.

ex chondro, ^a† & ea, quæ sorbentur oua: nempe ea omnia stomachum languentibus ipsis ita manifeste supinant, ut subuersum ipsum esse existiment: verum ptissana humectare quidē valet, sed stomachum subvertere non potest. Stomachum autem hoc in loco intelligere oportet, ut huiusce temporis homines dicere consueverunt, non meatum tantummodo, verum quoque & os ventriculi. Cum igitur id imbecillum fuerit, atque exolutum, manet diutius in eo, quod ingestum est, supernatans. Sed contrarium usu euenire natum est, ^b† ubi à cibo aliquo boni succi reductum, quod continetur, expellit. Nempe humor protinus ab ipso recedit, & coquitur, atque, quod ita expulsum est, deficitur. Sicuti si crudum, manet, tarde quæ cedit, quod in ore ventris supernatat: nempe partis huius munus est appetere, non concoquere. Quæ igitur astringunt edulia, ut ventriculi os roborant, sic & plus iusto exiccant. Pari modo, & quæ ex chondro paratur sorbitio, ut humectat, ita & supinare nata est. Ptissana igitur humectantiū vim allecuta, malitiam effugit. Deinceps ptissanâ litim minime inferre ait Hippocrates, maximū quippiam & hoc esse in iis, qui corpus tum exurunt tum siccant, morbis testatus. Hac sanè occasione ptissana, quæ aqua mulsæ, longe melior existit, quāquā abluendi bonitatē, quam deinceps huic inesse ait, similiter aquæ mulsæ nata fuerit: immo, si ptissanâ aquæ mulsæ comparaueris, ptissanam ipsam in acutis morbis & superiorem & melioris conditionis esse reperies: quod procedente ostendam sermone. Nā de ptissana sermonem absolueri est tempestiuū.

Proinde siquidem abluere dixit cum adiectione /liquid abluere egeat/ quali non in omnibus acutis morbis probe abluente utamur edulio. Nepe cetera omnia, quæ de ptissana dicuntur bona, morbis omnino profunt acutis: sed abluendi bonitas, quibus ventrem subduci volumus, ubi cibus in via moratur, est idonea. Probe igitur abluere febrili affectioni neque tanquam contrarium, neque tanquam familiare auxiliū vnum utile existit, sed bene tanquam symptomatis alicuius emendatorium correctoriū quæ. Deinceps inquit, neque astringit, neque male turbat /viscositas scilicet ptissanæ: sic etenim sermonem de ea inchoauit. Non astringere autem quibusdam maxime bonum existit. Nemo siquidem astringentibus utitur cibus, nisi vel pro symptoma, quod animi deliquium inducat, vel pro immoderatum ventris profluuium: cogunt siquidem cōstringunt quæ corpora, vias quæ tum distributionis, tum alimonie, tum eius, quæ foras fit, perspirationis conuiere faciunt: quas reclusas apertas quæ esse conducit.

Quod autem non turbet, id nullam, dum concoquitur, faciat perturbationem, in laudem & ipsum præstat ptissanæ. Perturbatio autem huiusmodi ex multis paritur eduliis, his quidem ventrem moridentibus, aliis vero instantibus, aliis item, quæ pugnantibus facultate partibus constant: Quod tum in lenticula, tum in brassica reperitur, nempe solidum ipsarum corpus ventrem cohibet, ius autem ipsum proritat, subducit quæ. Sic & qui cerebrum cum oleo & garo condiunt, totum ex ipsis tum dissimilare, tum sibi ipsi pugnans efficiunt, cerebro quidem stabili & tarde meante, multis vero ipsi ad deiectionem excitare idoneis. Pari modo & de ovo dicendum, siue cum melle, siue cum sale, siue cum garo assumatur: nempe quod ex ipsis constat, differentes habet facultates. lura item ferè omnia. Quapropter & circa sermonis initia viscositatem ptissanæ laudans inquit /continua/ quod sanè citra totius in partibus omnibus similitudinē non fit. Verum in presentia huic verbo /turbat/ adiecit hoc aduerbium /male/ (sic græce οὐτε ἀραδον καὶ οὐ) ptissanam non turbare haudquaquam simpliciter asserens, sed /male/ adiciens: nihil enim ciborum concoctioni, quæ hoc ipsum, aduersari magis. Quo fit, ut qui de concoctione scripserunt, ciborum varietatem, præsertim quæ ubi variis constant facultatibus, nocentissimam dixerint, utpote quæ ingesta ipsa probe concoqui prohiberet. Obseruat id maxime, tum qui luctantur, tum qui legitime certant. Prandio siquidem panem duntaxat edunt, in cœna vero carnem. Plura de his enunciare, nisi scirem te inuenire ipsa posse, qui ex iis, quæ de concoctione in commentariis de facultatibus naturalibus dicunt, sis instructus. Commentarios autem huiusmodi si neglexeris, frustra in his versaris. Quapropter de perturbatione huiusmodi super sedens, ad omnem ultimum me transferam, quod ab Hippocrate de ptissana adhuc loquente dici. Neque in ventre tumescit. Nepe multos ptissanâ, quæ flatuosa esset, dantes haudquaquam ignorans, non abs re adiecit, Nā inter coquendum, quoad maxime potuit, intumuit. Qua sanè adiectione criminationem

Acriminationem coindicauit, & ipsius solutionem dixit, elixationem q̄ edocuit. Scribit quēdam & nihilo minus de coctione in sequentibus: sed in praesentia tantillū hoc sermoni de ptillana adiūciam. Ptillanam si plurimum coxeris, cibum flatu expertem efficies: Et nos autem sabaceum (ita Graeci dicūt) neq̄ si tribus coxeris diebus, flatu vnquam orbatum reddideris: nempe ex propria substantia, flatuositatem habet, non autem ob diminutam coctionem, veluti ptillana. Sunt, qui ab ipsius coctione ocyus recedere consueuerunt, potissimum q̄ diutius coqui: terūt liquidem crudam eam, atque deinde parum calfaciunt: non enim coctam dominis offerunt. Sed de coctione ptillanae, vt dixi, rursus dicetur. Nunc autem, posteaquā vires ipsius demonstrant, deinceps vsus distinctiones docebit: ad quem & ego me conferam, vbi me in sequentibus absolutorū sermonem de ptillanae ad aquam mulsam & alia, comparatione, praemonuero.

- 19 Quicumque igitur in huiusmodi morbis ptillana vtuntur, ut ne vno quidem die vasa, vt ita dicam, inaniri permittendum, sed vtendum, nec desistendum, nisi vel propter medicamentum vel clysterem eos desistere opus sit.

Soluere hoc in loco incipit, quod quaeritur. Sed, quoniam dictionem ipsam nō exacte interpretatus sit, ob id obscurum reddidit sermonem. Quapropter, quo nam maxime expolitus modo nihil obscuritatis habeat, referre conabor: sermonem q̄ ab initio hoc repetam pacto. Quē nā est causa discordiae, cui in acutis morbis alij quidem ptillana hordeacea vtantur, alij solo ptillanae cremore, alij ne hoc quidem ad morbi vsq̄ iudicationem: hoc sanē est problema. Sed solutionē deinceps audi. Qui acutis laborant morbis, alij quidem à cremore solo, alij à ptillana ipsa, alij ab horum neutro iuuantur. Sed sanē petulantius de omnibus morbo acuto laborantibus tulit medicorum vniuiusq̄ sententiam, non considerata ea, quae in omnibus esse debuit, experientia. Sed distinguam ego, demonstrabo q̄, qui nam à ptillana iuuantur, qui nam à cremore solo, & qui nam neutro indigeant. Tota igitur ptillana vti debet ex acuto morbo laborantes, qui neq̄ alio quopiam ante vtantur remedio, quale vel per sectam venam, vel ventris subductionem, vel quippiā simile fieri solet, neq̄ et eis inuit, quod periculum minetur, symptoma: Cremore autē, qui aliquid tū fallacius, tum periculi magis particeps habet. Quos vero vel sanguinis missione, vel purgatione vacuare expedit, vel etiam dolores sedare, his non ante vel ptillanam vel cremorē dabis, quam quippiam eorum, quē dixi, feceris. Sanē hęc Hippocratē prescriptū oportuit, & ab vnoquoq̄ singularem incepisse: atq̄ hoc pacto sermonem fecisse, si sanē clarus futurus erat. Verum, quoniam id non fecit, non abiq̄ causa obscurus abiecto conueniente ordine est effectus. Nos autem dictiones ipsius secuti, reducamus vnāquāq̄ ad ea, quae ante dicta sunt, capita: atq̄ in primis diligentia adhibita praesentem exponamus dictionem. Quare me t̄ latius explicantem} Hippocratis dictionem, simul q̄ & verba aliqua gratia perspicuitatis adicientem audito. Quicumque igitur aegrotantes ptillana in his morbis vtuntur (dicam autem paulopost, qui nam ea vtantur) iis quiaē nulla die vasa inaniri (vt ita dicam) permittendū, nisi desistere debeat vel propter medicamentū, vel propter clysterē. His ergo si bis dederis, cum opus habuerint, bene facies, atq̄ quantū corporis tolerat virtus. Explicabo autē tibi scopos, quibus attentus vel per ventrem vel per venas ipsos euacuabis, aut fortibus cataplasmatīs ue vteris. Hęc si ita praedixisset, deinde vnūquodq̄ ipsorū seriatiim resumens conuenienti exposuisset ordine, nō obscurus fuisset sermo ipsius. Nunc autem, quod interreperit, interlabitur q̄, semper t̄ ad finem vsq̄} persequi cupiens, vbi sermonem diutius suspensum esse permisit, iure obscurum fecit. Vera autē me loqui deprehendes, si dictiones singulas oēs claras manifestas q̄ inueneris: orationem vero totam incompolitam, & ob id obscuram.

† παρὰ τὴν

† τέλος

- 20 Proinde, qui bis die cibari consueuerunt, bis ptillanam dare oportet: qui semel, semel quidem t̄ primo die} detur: deinde ex προσαγωγῆς, id est sensim paulatim quē, si fieri potest, bis quoque detur, t̄ si, quid putes aduiciendum.

† τὴν πρώτην, i. primo. & ita in commento.

† si putes oportere, & ita in commento.

D Bis cibandos ipsos inquit, qui bis cibari consueuerūt: cum vero necessitas fuerit eis, qui semel cibari consueuerunt, bis assumendi cibum, ptillanam bis dabis, ab ipso quidem semel incipiens, sed paulatim ad bis ipsum procedēs: nempe ex προσαγωγῆς, id est sensim, id declarat. Fit quē res hoc pacto. Semel quidem dabis, quod satis sit: sed minimum sit, quod secundo exhibeas. deinde paulatim augebis: id quē efficies, donec ambas equari alimonias continget. Sed non dū sermonis huius fides huic patet, qui librum hunc Hippocratis legit, q̄ neque ab ipso est praemonstratū, qui nam sint, qui commode ptillana vtantur. Verum, cum paulo superius, eos qui mediocriter aegrotant, ab ipso ita cibari, praedixerim, paulo post & Hippocratem ipsum velle id demonstrabo. Atque hęc tibi sit praesentis huius dictionis expolitio. Sunt autem plerique, qui dictionem hoc scribant pacto: Qui semel cibari consueuerunt, semel quidem prima die dandum sensim paulatim quē: quod si fieri potest, bis quoque detur, siquid aduiciendum putes. Sed mente caret dictio hęc. Nam, quod prima detur die sensim paulatim quē, fieri non potest: cum sensim ipsum pluribus ingestionibus fieri natum sit: non semel neque itatim in prima.

- 21 Verum, inter initia neque multam, neque crassam admodum, dare oportet: sed quantum & ob consuetudinem, & ne multa vasorum inanitio fiat, ingerere conuenit.

Qui

IN LIB. HIPPOCRATIS DE VICT. RAT.

Qui Hippocratem replere egrotantes asserunt, q̄ his, qui citra periculum agunt, bis quotidie Eptissanā dare iubeat, si, quod in dictione retulit, cōsiderarent, se ipsos cōdemnarent. Tantum si- quidem sorbitionis dari prācipit, quantum alimonie corpori & ob consuetudinē & ut non mul- ta fiat vacuatio, administrari conuenit. Si igitur ptissanā oxybaphum, & id est cotulæ quartam par- tem} quæ quotidie ad septimam vsq; vel nonam diē exhibetur, minoris esse facultatis, quā id, quo alunt, nutrimentum, fatebuntur, mea sententiā a nugis se se cohibebunt. Sed paulopost id de- clarabo. Atq; in præsentiā verbū hoc /inter initia/ quod Græci dicūt κατ' ἀρχάς, exponam. Neq; enim morbi principium id significat: sed ex eo generalius adhuc audi significatum. Nempe, cū ægrotans primum ptissana egere videbitur, tunc protinus neq; multam, neq; admodum crassam dato: a multa liquidē & subita tum repletionē, tum vacuationē, semper abstinuit Hippocrates.

- 22 *Verum dandæ sorbitionis quantitas augenda hoc obseruabitur pacto. Nempe, si morbus siccior, quā ut quis-
piam existimet, fuerit, non multum dare oportet: sed ante sorbitionem, vel mulsam vel vinum, verum magis con-
gruat, propinare conuenit: quod autem modis singulis congruat, dicetur*

† A. totam cu-
tim.

Morbus siccior variis dignoscitur modis, quanquam vniuersalem communem q̄ rationē ha- beant eandem. Peripneumonia quidem, & pleuritis, atq; omnino, qui tum pulmonem, tum aspe- ram arteriam infestāt, morbi, cum nihil ab affectis expuitur partibus: lecinōris vero, vel mesarci, vel ventris, vel ieiuni, vel intestinorū, vel lienis, vbi aliud prorsus cohibita sit, aut pro necessitate excernat tum sicca, tum dura, & caprarum stercori similia excrementa. Morbi sicci tum arteriarū tum venarum dignoscuntur linguæ licitate, & ea, quæ † totū corpus} occupat, ariditate. Phleg- monæ parī modo fiunt siccæ in iis, quæ tum foris tum conspiciue apparent, vlcerebus, vbi scilicet nulla ex ipsis sanies effluat. Sepius & in oculis phlegmonē etiam siccæ oriuntur nihil excernentes. Cerebri præterea ægritudines, quæ neque per nares neque per palatum expurgātur, iure opti- mo siccæ dicuntur. Et sanē superfluitatum nihil excernere, siccorum omnium morborum no- tam esse non ignoras. Non immerito igitur Hippocrates humectantium aliquid ante ptissanam assumi iubet: ut vel aquam mulsam, vel vinum, tanquam hæc, quā aqua, magis humectēt. Sed, quoniam vires ipsorum se se enarraturum pollicetur, ob id & nos eorum, quæ ad aquam est, com- parationem, in eam differemus libri partem, quæ horum vires edocet.

- 23 *At, si os madefiat, & quæ à pulmone expiuntur, talia sint, qualia esse oportet, sorbitionis quantitatem, ut dicam
summatim agere conuenit. Nempe, quæ citius magis quæ madescunt, indicationis denunciant celeritatem: quæ uero
tardius minus quæ, tardiores significant indicationem.*

1 Apho. 12.
Ex. ord. 5. a

A morborum siccorum genere ad eos, qui contrario pugnant, modo cōuersus, deinde memo- rato citra omnium adiectionem vno, narrationem eius commune omnium eiusdem generis exem- plum ratus, non absque causa obscuritatem fecit. Nempe os madescere, & talia à pulmone expui, qualia oportet, morbi non simpliciter sunt humidi notæ, qui omnino in omni sit corporis parte, sed cum cuiuspiam eorum, quæ respirationi subseruiunt, instrumentorū affectione. Ob eam rem, ut dixi, dicitio Hippocratis obscurior est reddita. Sed, quod ab eo enunciat, verum omnino est, q̄ scilicet, quæ per sputa, qualia esse oportet, excreta expurgantur, celeriter iudicantur. Contraria vero duorum alterum subeunt: nempe aut in perniciem, aut in longum finiūtur tempus. Ergo, qui probe expurgantur, his ptissanam dare oportet, ut roborata virtus iis, quæ per tules ex pul- mone fiunt, humidorum expuitionibus sufficiat. Nempe verba hæc /qualia esse oportet/ cōctio- nis habent notas: de quibus absolute diximus tum in iis quos de crisi- bus, tum illis quos de tem- poribus morborum fecimus, commentariis: præterea & in expositione aphorismi illius, vbi Hip- pocrates, quod nā oporteat modo ex apparentibus prænotiones facere, ostendens, sermonis exem- plum pleuritidem scripsit hoc pacto: ¶ Veluti in pleuriticis si sputum inter initia protinus appa- H- reat, morbum breuiat: si vero postea appareat, producit.

- 24 *Et hæc quidem per se talia parte plurima existunt. Sed multa quoq; & alia peropportuna, quæ præmonstranda
sunt, præmittuntur, quæ postea dicentur.*

Dixi & ego sermoni huic deesse non pauca, quæ ad distincte definitæ quæ loquendum vtilia existunt: de quibus & ipse agere pollicetur. Sed in præsentiā de his solum vult intelligere, quæ di- cta sunt: ea si quidem per se talia sunt, qualia ipse percurrit.

- 25 *Et quanto copiosior fuerit expurgatio, tanto plus ad indicationem vsq; dare oportet, sed maxime duos ab indica-
tione dies, quibus vtrique vel quinto, vel septimo, vel nono fieri debeat morbi indicatio: quasi dierum tum paritas tum
imparitas perpendenda sint. Post hoc autem mane sorbitionem dabis, sero autem ad cibaria te conferes.*

A. li. 4. E. 2. 1.
c. 101. fo. 4. b

Κρίσις, id est iudicationē, nunc dixit vel perfectā morbi solutionem, vel permutationem eam, quæ vsq; adeo insignis sit, ut eger periculum omne euaserit. Duos autē ab iudicatione iubet ad- notari dies, ut & eos, qui diebus tum paribus tum imparibus fiant, accessionum circuitus obser- uemus. Contingit siquidem interdum, ut tanquā soluto exacte morbo ægri confidant, cibentur deinde

A deinde negligentius, & eius, quæ per circuitū repetat, accessionis occasionem præbeant. Tutum igitur est, etiam si morbus iam videatur iudicatus, ad duos vsq; dies diligentem victus rationem, qua eger vsus fuit, seruare. Præteritis autē ab iudicatione diebus duobus, iam securum est plenus cibare: licet ut neq; mutationē eam, quæ vniuersim subito q; fit, efficiamus: sed mane quidem forbitionē demus: postea vero progrediente die iā & frumentacea exhibeamus alimenta. Constat igitur Hippocrate languentibus ipsis neq; aliud quippiam ante præfinitum tempus nuper dictū dare, neq; panem, sed ptissana oīno contentum. Quod egrum replentis non est, sed potius, si quis vitio vertere voluerit, tenuius, q̄ oportet, cibantis. Verum ita cibare neq; tenuius iusto est, neq; plenius, q̄ oportet: sed exuperantiā exacte est medium, & maxime laudabile. Quod autē ita cibare sit medium, demonstrat & eorū, qui contraria vitio vertunt, contentio. Quo ē numero Thellalus eius q; sequaces, tanq̄ agros replentē accusant Hippocratem: Erasistratus vero, tanquā fame necantē. Nempe, quæ ab Erasistrato in primo de febribus aduersus Apollonium Dexippum q; Hippocratis discipulos dicūtur, calūniam habent eius, qui per famem fit cruciatus, qui ad Hippocrate magistrū refertur. Sed sanē Erasistrato ignoscendū magis, utpote qui verisimilia dicat: ceteros vero, qui Hippocrate egros replere aiūt, viros Thellalo dignos esse est existimandū: qui neq; aliud quippiam scriptorum Hippocratis, neq; quæ de victus ratione proferuntur, nouerunt.

26 Talia autem magna ex parte profunt iis, qui protinus tota vtuntur ptissana.

Siue totam, siue hordeacea, siue ptissanam simpliciter dixerit, vnū & idem ex tribus his significatur vocabulis, ptissanam vnoquoq; non colatam significante. Nempe si à decoctione quis ipsam colauerit, deinde cremorem separauerit, dederit q; is neq; tota, neq; hordeacea, neque simpliciter dicta, uti ptissana dicetur, sed solo ptissanæ cremore. Rursus autem impræsentia memorabo, qui nam sint, qui ptissana tota ab initio uti debēt: breuis q; erit memoratio, nisi segniter desidiose q; quæ prædicta sunt, audieris. Si ergo, quæ expuunt, utilia fuerint, æger q; neq; medicamentum neq; clysteri egere videatur, ptissana hunc cibare iubet. Sed rationem consilij adiecit inquiring.

27 Dolores siquidem pleuriticorum confestim sponte desinunt, vbi aliquid effatu dignum tum expui tum expurgari cæperit. Nempe & purgationes longe perfectiores existūt, minus q; purulenti ita fiunt, quam si quis aliter cibaret. Præterea iudicationes simpliciores faciliores q; & minus reuersoriae.

Probe autem hæc oīa à ptissana fiunt, tum q̄ humectet, mediocriter q; incidat, quæ expui debent humida, tum demum q̄ virtutem roboret. Concurrentibus siquidē vtriusq; ocyus expurgantur, qui respirationis instrumenta infestant humores: quos quidem & humectare & secare potest ptissanæ modo aqua mulsa, sed virtuti robur nō addit. Contraria autē pollent facultate & panis & chondrus: nempe virtutem quidem roborant, sed neq; humectant, neq; secant. Quod neq; alteri cuiuspiam inest eorum, quæ medici languentibus dare consueuerunt: verbi gratia, ouis, gallorū testiculis, alis, piscibus, iuuenibus columbis, & quæcunq; id genus sunt. Quare, qui lenticulam ex aceto confectam pleuritico morbo iam declinato, ut nihil aliud, q̄ coctorū expuitionem desideraret, exhibuit, is non immerito languenti ipsi, qui sequenti nocte suffocatus est, mortis causa fuisse est visus. Verum lenticulam nemo, qui mentis compos fuerit, dederit. Quod si æger aquam mulsam ptissanam q; fastidierit, pisces saxatiles sunt maxime idonei, ex aqua scilicet & porro, & anetho, & sale, & modico oleo parati: atque ex non saxatilibus aselli. Sed antea oxymeli propinare oportet: neq; enim id stomacho aduersatur, nisi affectis in languente neruis, & in muliere, vtero. Quod si oxymelitis loco medicamentum aliud dare volueris, dabis eam, quæ ex marrubio & iride fit, confectionem. Nempe hæc etiam, si per se cum mulsâ bibatur, maturat probe, quæ tum in thorace tum in pulmone sunt superflua, atque ad expuitiones præparat.

28 D Ptissanam autem ex optimo confectam esse hordeo oportet, atque quā probissime coctam, & maxime si non solo uti debeas cremore.

Probatissimum hordeum prius, q̄ experiaris, ex eo solum, q̄ & plenū sit, & nihil rugosum in se habeat, iudicabitur. Sed experientia iudicatum per decoctionē deprehendetur, vbi scilicet plurimū intumescat: & succū faciat plurimum: quod stabile ratū q; virtutis ipsius est argumētū: nempe, quod à plenitudine sumitur, id scientificū non est, neq; perpetuo verum, quanquā magna ex parte insigne egregium q; Ptissanam autē perpetuo optimā esse iubet: sed maxime si non solo uti cremore velimus, verū & ipsa tota. Quare autē id præcipiat, manifeste declarauit, cum inquit.

29 Nam præter reliquas ptissanæ virtutes lubricitas eius, ne hordeum, cum deuoratur, noxam inferat, efficit: neque enim adhæret, neque in recto thoracis manet tramite, (ἵζιϛ eum uocant.)

Hippocratem ἵζιϛ magna ex parte quidem ἐνθυοπίαν, id est rectum tramitem: interdum autē & ὀσπρὸν, id est lationem, dicere nō ignoramus. Quod autem ptissanæ haustæ per thoracem tum rectum iter tum latior ad ventrem vsq; per stomachum fiat, liquido constat omnibus, vult q; Hippocrates in ea re nihil ipsi adhærere. Nempe, cū multa in thoracis pulmonis, quæ affectionibus

existit caliditas, quod adhæret, arefcit q̄, atq; adeo pertinaciter obstruit, vt vix absolui possit, id ei Eborum fastidium quoddam & sitim facit.

30 *Lubricissima autem est, & ab inferenda siti maxime aliena, facillime concoquitur, & infirmissima existit, si optime cocta fuerit: quibus omnibus est opus.*

Ptissanam probe coctam non lubricissimam modo, maxime q̄ ab inferenda siti alienam, & facillimæ cōcoctionis esse astruxit, sed tandē infirmissimā esse adiecit. Ac quod quidē maxime lubrica sit, si probe cocta fuerit, iā antea est enunciatū. Sed, q̄ ab inferēda siti maxime aliena sit, hic ppter hordei naturam continuo adiicitur: est autē hordeum temperamēto frigidum. Verum, quoniam pacto substantiam ipsam tū frigidam tū calidā iudicare oporteat, inter aīantia quidē in libris de temperamentis diximus: inter ea vero, quæ anima carent, in iis, quos de simplicium medicamentorum viribus fecimus, cōmentarijs. Immo & facillimē ait esse cōcoctionis ptissanā huiusmodi, vtpote quæ dissoluta sit, neq; quippiam habeat, quod & durū sit, & difficulter cōfici possit: atq; flatus expertem iam propter longam cocturam effectam esse. Quod vero in dictionis fine dixit, ptissanam ita coctam, infirmissimam nominans, si nihil de probissima ipsius cōcoctione prædixisset, promptum esset sermonem Hippocratis ad eam, quæ in ventre sit, cōfectionem referendum affirmare: quasi infirmissimam dixisset, quæ in ventre & facillime vincatur, & conficiatur, & permuteur. Sed, quoniam id prædixit, infirmitatem illam intelligere oportet, q̄ vel paucam præstet corpori alimoniam, vel nullam habeat qualitatem vehementem vt vel nervos vel mentem feriat, quo modo acetum vinum q̄.

† Nisi igitur 31 † Nisi igitur quis, quātū deest, cōtulerit, ut ptissanæ sorbitio sufficēter pareatur, crebrius sanē detrimētum afferet.

Docere incipit hoc in loco, quæ paulo ante se dicturū promisit, cum dixit multa quoq; alia peropportuna, quæ præmonstranda sunt, prætermittunt, quæ postea dicent. Quod autem verbum *τιμωρῆσαι*, i. cōferre, tum apud antiquos, tum apud Hippocratem ipsum sæpius pro *βελτιῶσαι*, i. auxiliari dictū sit, demonstratū & in alijs libris per eas, quas in ipsos confecimus, enarrationes.

32 Quibus enim cibus statim inclusus, si quis nō subuacuato eo sorbitionem dederit, dolorem, si adeſt, adaugebit: si nō adeſt, protinus inducet, frequentior q̄; reddetur spiritus: quod malum est. Nempe pulmonem exiccat fatigat q̄; tum hypochondrium, tum ventrem imum, tum septum transuersum.

Cibū (græce σίτον) dixit, quod ab edulijs (hoc est ἀπὸ τῶν σιτίων) i. intestinis ipsis cōtineci excrementū: quod Græci & σκύβαλον & κόπρον appellāt. Si igitur incluso eo, id est ex multo tpe haudquaquā eiecto, ptissanam quis propinauerit, lateri offensam fieri est necesse propter intestinorum oppilationē, quā ex collecto in ipsis stercore flatu q̄ propter oblata ptissanā haudquaquā pertranseunte, & demū ob prauam, q̄ ad affectā partē sit, distributionē, nata sunt. Quo fit, vt exhausta ptissana, necessario dolorem, si lenitus fuerit, adaugeat: & si conquieuerit, generet. Nempe vapores, flatuosi q̄ spiritus, et exhalationes scybalorum, cū ad latus perueniūt, dolorē ipsi pariūt, adaugēt quæ: ob eas causas & frequentior fiet respiratio. Vocauit autem totam respirationem spiritū & in prognostico, & in libris populariter vagantiū morborū. Densata autē frequēs quæ reddita respiratio, respiratorijs in organis assiduū ob motū caliditatē efficit maiore, qua siccantur tum pulmo, tum septū transuersum: siccantur quæ vnā & caltiunt ea, quæ tum in hypochondrio tū in peritonæo existunt aīalis partes: omnes siqdem in respirationibus vnā cū thorace mouent. Quod autē principio dictionis dī, Quibus. n. cibus statim inclusus, vocē hanc /statim/ ordine hēt cōmutato: quæ si suā peculiarem quæ acceperit cōcinnitatē cōpōnem quæ, dictio ita habebit: Nisi præfato ptissanaceæ sorbitionis modo suppetias tulerimus, frequentius orietur læsio: statim siquidem, quibus cibus inclusus est, nisi quis prius: subuacuato eo sorbitionem ita dederit, maximā afferet offensam. H

33 Præterea, si lateris dolor assiduus est, calidis q̄; fomentis non remittitur, sputū q̄; nō procedit, sed καταγλισχραίνόμενον ἀσπείως, id est summe citra coctibilitatem glutinosum sit, nisi quis dolorem vel alui emollitionē, vel sectā venā pro vtriusus exigentia soluerit, ptissanam autem ita affectis dederit, præcipitem aget in mortem.

Quod de pleuritide tanquam exemplo agat Hippocrates, memoria non excidat: fieri autem pleuritidem ipsam propter inflammationem eius, quæ costas succingit, membranæ ostendimus. Si igitur, cū in vigore fuerit inflāmatio, ptissanam quis dederit, ægrum grauiter offenderet. Vigētis autem inflammationis notæ sunt, dolor assiduus, & q̄ nullo pacto a calidis fomentis remittatur. Continuo autem & alia adiicitur pleuritidis non magnæ modo, verum & morosæ, nota, q̄ scilicet sputum abunde glutinosum ab euacuatione arceatur, infarctum affectis partibus & detentum. Nēpe hoc verbū καταγλισχραίνεσθαι plus aliquid indicat, dictione maximam significante glutinositatem, facta præpositionis huius κατὰ adiectione. Satis igitur fuerit ex ipsius additamento, quod ita glutinosum sit, ab eo, quod concoquitur, distinxisse. Nēpe, quod concoquitur, mediocriter glutinosum existit, non tamen καταγλισχραίνεται, i. neq; extreme neq; summe id habet. Et, ne quis in care falleretur, continuo Hippocrates verbo huic καταγλισχραίνόμενον aduerbium

† Nisi igitur quis contulerit, quātū opus est, ut sufficiens sit eiusmodi sorbitionis ptissanæ modus, crebrius & c. De exhibendi enim ratione, non de apparatus, intelligenda eē hac verba, ex sequentibus innoteſcit.

A. lib. 4. f. 2.
c. 9. fo. 421

A aduerbiū hoc ἀσπῶς adscripsit, quod idē cum ἀπέπτως, id est incoctibiliter significat. Nēpe καταλισσρανόμενον ἀπέπτως, id est citra coctibilitatem glutinosum, malum est. Aegro aut ita affecto si quis ptissanā dederit, priusq; dolorē vel secūta vena vel ventris euacuatione soluerit, hominem perimet. Nempe in præsenti & tali pleuritide, postea q̄ a calidis fomentis non remissum esse dolorem dixit, statim duo alia habet aduersus dolorem remedia, sanguinis missionē scilicet & purgationē. Nempe eorum, quę ex opio, hyoscyamo, & mandragora conficiuntur, medicamentorum vsus dolorosam pleuritidis affectionē non sanat, sed sensum tollit enecat q̄. Nunc ergo sectionis venę meminit simpliciter & purgationis. Sed deinceps super vtriusq; vsu distinguitur.

- 34 Ob has igitur ποφάσεις i. causas, atq; ob alias similes adhuc magis, qui tota vtuntur ptissana, septimo die uel celerius moriuntur: alij quidem mente læsi, alij vero ob orthopnœam stertorem q̄ præsocati.

Quod sæpius appellet causas ποφάσεις, demonstratum quidē in iis, quas in alios libros paruimus, enarrationibus. Sed, quas nam alias præter dictas vnā celeriorē inferre mortem dicat, adijcere sermoni oportet. Nunc liquidē sumptionē ptissanę, prius q̄ soluat dolor, recensuit, sputi q̄ ob frequentē respirationem glutinositatem, ob quam & suffocant. Sed ledi quoq; asserit, si prius B (vt supposuit) quā vacuati sint, vinum sumpserint, aquam item mulsam & oxymeli. Nempe de alijs omnibus neque idiotis ipsis non constat. Non abs re igitur ait alios mente læsos mori. Id enim contingere natum est, si vinum vinosa q̄ intempestiue sumpserint.

- 35 Non perperam autem hos antiqui sideratos esse existimauerunt, tum maxime ob id: tum non minime, quod mortuus latus lundum plagę simile videretur.

Veteres talisprehendit opinio tum propter necis celeritatem, tum q̄ non nullorum latus affectum liuore videretur, vbi scilicet inflammationis erat radix. Sanguine etenim in latus ob dolorem perueniēte, quicquid in cute diuisum solutum q̄ est, id in morte refrigeratum nigrorem cōtrahit, similiter illis, qui ita ex plaga affecti sunt.

- 36 Rei huius causa est, quoniam prius, quā dolor soluitur, pereunt. Celeres siquidem sunt respirationes.

Quod autem hoc respirent pacto, deinceps ipse ostendit, inquiens,

- 37 A multo autem frequētior q̄ spiritus, vt iam dictum est, summe tum viscosum, tum incoctum, effectum sputum, fieri egressum prohibet.

Quod prius ἀσπῆς dixit, nunc ἀπῶτον, id est incoctum, dicit: fidem q̄ facit q̄ & probe tunc vocis transpositionem fecimus.

- 38 Nempe & sputum, quod intus retinetur, prohibet spiritus ad internationem, cogit q̄ ipsum celeriter egredi.

Nō oīs spūs in hmōi affectionibus ad interna ferri phibet. Nēpe, si id fieret, hominem ptinus mori cēt necesse, nō secus, q̄ iis accidit, q̄ strāgulant. Verū, quod vsui respiratiōis cōlerat, itro ferri phibet: quapropter ad tempus aliquod sufficiunt, sed tractu tpis aucta indigentia moriuntur.

- 39 Et ita aduersus malum sibi inuicem opitulantur. Nempe retentum sputum frequentem spiritum reddit: qui frequens effectus sputum agglutinat, atq; expui prohibet.

Quod verbo hoc τιμωρεῖν pro opitulari tū antiqui alij, tum Hippocrates vsi sint sæpius, ante dictū est: & nūc sanē συντιμωρεῖν ἀλλήλοις εἰς τὸ κακὸν dixit, p̄ συμπαράττειν καὶ λισυτελεῖν, id est opitulari & prodesse. Atq; quō nam modo sibi inuicem opitulent̄ profint q̄, perspicue quidem ipse ostēdit, sed & a nobis dicitur. Sputum in bronchijs pulmonis tenaciter adherens, transitui D spiritus angustiam parit: atq; ob eam angustiam minus ægri inspirant. Quo autem minus inspirant, eo magis inexpletam reddunt respirationis necessitatem: atque ob id citius a priore inspiratione ad secundam properant: quod frequentem spiritum vocant.

- 40 Prehendunt autem hæc, non solum si ptissana intempestiue vtantur, verum & multo magis si quippiam aliud, quod ptissana deterius sit, vel ederint vel biberint.

Iam rei huius paulo ante mentio habita est, quando dixit, Ob has igitur causas, atq; ob alias similes magis. Immo eo in loco de vino, aqua mulsa, & oxymelite mentionem fecimus: hic autem & alia intelligere est opus, quæ ita affectis non aliter pleriq; medici exhibent: quæ etiam, q̄ aqua mulsa, vinum, & oxymeli, nocent magis.

- 41 Bene igitur vt plurimum similia sunt auxilia tum ijs, qui tota vtuntur ptissana, tum ijs, qui cremore ipsius: verum, qui neutro horum, sed potione sola vtuntur, his interdum diuersimode auxiliandum est.

Auxilia, inquit, similia sunt & ijs, qui ptissana, & ijs, qui cremore ipsius vtūtur. Sed, qui potione duntaxat vtūtur, his interdum diuersimode opitulari oportet. Sed, qualis nam sit huiusmodi diuersitas, in sequentibus perdocet.

42 Verum omnia hæc ad hunc modum facere oportet. Si nuper pasto cuiquam, & alui oneribus non dum expurgato, E febris vel cum dolore vel sine dolore inceperit, à sorbitione tantisper est temperandum, donec cibum ad infernam intestini partem descendisse coniectum fuerit.

Sermonem lacerum frustatim que secū, neq; continenter & conuenienti digestum ordine, fecisse se se deprehēdit Hippocrates: quapropter relumens ipsum, ad accommodum perducit principium. Hoc autē ideo ipsi accidit, q̄ questionem super medicorum controuersia soluere conatus, in ea solutione de rationibus curatoris mentionē fecit: qui sanē re intellecta atq; his quidē permutat, sermonē ab initio aliter percurrere debuit. Nempe & ita mihi aliqñ felicius contingere est visum, utpote qui iis, quæ ante scripta fuerant, permutat, alio de ipsis scripserim modo. Sed, quoniam pacto & questionē ab ipso proposita soluere, & sermoni ordinem dare debuit, iis exponā ego, qui talia interpretari exponi que desiderāt, viam q̄ dilucidabo. Iam ergo animū cōuerte, sermonem ab initio audieturus. Quare contingit, ut interdum præstantes medici de curatione dissideant, q̄ scilicet in non nullis experti, conuenire oībus putauerunt. Sic sanē & in victus rōne in morbis acutis fuerunt cōtrouersi, alij quidē ægros ad iudicationem vsq; ptissanæ cremore seruantes, alij ptissanā ipsam exhibentes, alij autē neutrum horum administrantes: ex parte autē verum F quidem dixerunt oēs, sed ex parte falli circūuenti q̄ sunt. Nempe quidam ex eis, qui acute agrotant, ptissana indigent, alij cremore, alij horū neutro ad iudicationem vsq; verum claritatis gratia de acuto morbo vno, tanq̄ exemplo, sermonē faciam. Proponatur igitur pleuritidis curatio tradenda. Si languenti non multo ante tpe cibato, neq; vētris oneribus expurgato, febris inceperit, sorbitionem huic non dabis, donec, quæ administrata est alimenta penetrans plurimis intestinis, ad vtrūq; vsque eorum peruenisse videbitur. Principium huiusmodi vbi quispiam sermoni fecerit, atq; deinceps oīa proprio dotauerit ordine, doctrinam in his haudquaquam obscuram pariet.

A† Antiqua tralatio hoc in loco hēt, Non est vsus eius i hydromelle in eo, qui ex infirmis hēt sum, ut non abscondat sitim ei, sed ut faciat eum cauere ab usu secantiab plus: propter hanc ergo causam dixit aquā, postquam dixerat hydromel.

B* ἀγανιστῶς γινόμενῳ. vide i lib. d marcote ca. 8

C* ἀναπνευσί.

D† aF. oxybaphū. Antiqua tralatio habet, plus vncis quatuor & semis.

E* aF. οὐλάξαι, i seruat.

F† Hæc addi debent ex antiquis cod. grecis. Sed tūc oxymelitis parum dāmus, tanq̄ in vētriculo prius sit euasurū tepidū, q̄ eius frigiditas ad costā vsq; distribuatur. q̄ si qd exiguū fuerit ē distributū, illud ab ipso oxymelite corrigeretur, ut qd secūdi vim & c. & ita vetus tralatio.

43 Vbi autem dolor aliquis vexauerit, oxymeli bibendum dabis: hyeme calidum, æstate frigidum. Quod si multa situs fuerit, melicrato veniam & aqua.

† Siticuloso existēte ægro, alioqui oxymeli admodum multū deuitans, quapropter cōsequenter tum melicrati, tum aquæ mentionem fecit. Nempe, quantum ad morbum spectat, oxymelite magis est vtendum: verum, si eger accepto multo oxymelite adhuc sitient, melicratum infundere dare oportet. Quod si & ab hoc sitient, aqua offerenda est: nempe aqua per se pota culpa non caret. Causas vero, ob quas aqua pota culpet, in sequentibus in ea libri parte, que de virtutibus ipsius agit, perdisces. Nunc autē, quod præsentī appositū orationi, considerabimus, quæ scilicet præcipit oxymelite vtendū hyeme quidē calido, æstate vero frigido. Nēpe id ad eā, quæ in acutis morbis b† magno est adiumento, nos hortat gelidæ aquæ potionē: quam oīno prætermittit videt Hippocrates, atq; ob eā rem à quopiam culpāri posset: res etenim doceri, non negligenter incuriosē q̄ narrari debuit. Quam ergo opinionē habuit de aquæ frigidæ potionē, ex hoc sermone intelligi potest. Nempe, si Hippocrates sitientibus oxymeli frigidum aliqñ exhibeat, q̄ & aquā daturus sit, est manifestū. Quamuis siquidē non prorsus de frigidæ potionē id præceperit, verumtamē dogmata sequi ipsius: utpote qui febrē ex natūo calore ignescente suscitari existimet, atq; cōtraria contrariorū esse remedia. Cum autē ignis (græce πυρ) tū calidus, tum siccus sit, atq; ob id ē febris (græce πυρετός), sanē aqua febris naturæ aduersissima est, corpus tum refrigerās, tum humectans. Et sanē ab ea, si tēpestiue detur, febres protinus extinguī videntur. Dictū sanē abunde in libris methodi medendi: sed & nunc rei summa diceſ. Cū ergo febris fuerit, cōstante virtute, tunc non solū non offēdes dans frigidam, verū & iuuabis abunde. Potio autē frigida huiusmodi tanta sit, quantū frigidæ aquæ æger ē inspirādo haurire possit. Oxymelitis vero exiguum datur, neq; singulis oblationibus d† plus dimidio: in hoc ergo exhibitionis scopus est dissimilis. Nempe ad H febris extinctionē frigida affatim atq; ad laborantis vsque satietatē bibitur: quæ enim ita bibitur aqua, sanationis gratia bibitur. Oxymeli vero æstate dat frigidum, ne laborantis adaugeat sitim: immo ut aduersus etiā contrarium conferre possit. Ob eas etiā causas frigidum oxymeli ante morbi cōtione dāri iubet: quasi frigidam aquā ad satietatem vsque in eiusmodi affectione dare æstate haudquaquam debeamus. Denſat siquidem inflammationē, si ex ea febrerint, crudos que refrigeratione ē reddit humores, vbi ex ipsis morbum contraxerint: † sed ab oxymelite reducuntur, q̄ candi vim habeat. Nempe quod ſecat penetrat que, id spissanti cogētī que corpora est contrariū.

44 Postea, si dolor quispiam vel periculum comparuerit, sorbitionem dare oportet neque multam neque crassam: sed post septimam {vel nonam,} si validus sit.

Qui Hippocratem ægros ἐμπιπλᾶν, id est replere dixerunt, (ita enim verbo sunt vsi) dictionem hanc prætermittere mihi videntur: ut, qui fame necare ipsum dicunt, solam hanc legisse apparent. Quod si utriusque animaduertissent, eorum que, quæ ab ipso bene enarrata sunt, meminissent, quoniam nam scilicet pacto naturæ inter se valde differant, forsitan eos contraria Hippocrati imponere pudisset, & potissimum si reliqua animo voluissent, quæ ipse demonstrauit, regiones à regionibus

A à regionibus magnopere differre ostēdens, & anni tempora ab anni temporibus, & etates ab etatibus, & consuetudines à consuetudinibus, & proprios peculiare q̃z languēti vniciq̃z ante morbum victus. Si ergo in omnibus, quæ dicta sunt, contrario habentes modo inter se comparaueris, maximas in victus ratione comperies differentias. Quas vbi è regione inter se ordinaueris, iā & hoc pacto, quàm multas consistere in medio exacte videbis. Sed de huiusmodi differentiis dictum quidem absolute in libris methodi medendi, dicitur quoque & nunc rei summa. Statue igitur quempiam natura siccum quidem corporis habitum, superficie autem densum, latis venis, virtute vitali valida, cibis q̃z non multis assuetum, ægrotare hyeme non admodum frigida, in loco tali, atq̃z, prius quàm ægrotaret, ocio deditum, insatiabiliter que † ciborum varietate abusum: præterea & os ventris validum sit, quod & stomachum quidam appellant. Sit autem & alter contrario affectus modo, humidus quidē & mollis, & virtute vitali imbecilla, & qui plures cibos ingerere consuevit: ægrotet q̃z æstatis tempore æstuoso, regione huiusmodi: statuamus q̃z hominē, antequam ægrotaret, tum cutis, tum assiduus necessitatibus fatigatum, pauca præter consuetudinem edisse, & oleracea, & quæ haudquaquam nutriunt: ventris item os non validum, sed natura imbecillum habere: atque his ita habentibus vterque eodem, si volueris, morbo infestetur, ea scilicet, quam Hippocrates veluti exemplum hoc in loco cōstituit, pleuritide. An' ne vna tibi victus ratio in vtroq̃z definiēda videtur? An posterior à prima die alēdus: prior vero potu solo ad septimam vsque gubernādus, vbi morbum nō longius protracturum se se speraueris? Ego sanē, qui longa experientia vtrunq̃z probauerim, optimam ita fore victus formam assero. Nam, si vice versa feceris, priorem scilicet à principio nutrire aggressus, posteriorem vero ad septimum vsque sine cibo seruare volueris, trucidabis sanē ante quartum diem vtrunque: nempe alterum citissime præfocando, alterius vires prostercendo. Ceterum adice, si velis, ætatem vtrique contrariā, priorem quadragenarium cōstituens, posteriorem puerum: nam hoc pacto citius adhuc ad mortem vterq̃z properabit. Sed sanē omnia hæc, quæ nunc dicta sunt, ad vnum reducuntur scopum, qui vno verbo ab Hippocrate est declaratus. Quid enim ait? Sorbitionem dare oportet post septimam, si validus fuerit. Verbum siquidem vnum est: sed ex omnibus, quæ nuper dicta sunt, inuenitur. † Si enim validus ad septimum vsque diem fuerit, oxymel & melicratum & aquam dare satis erit: per quæ, vt dixi, omnia tum liberabitur tum sanabitur. Quali sanē ex ipsis alia quidē præsto sint, alia vero non, quorum vires si vice versa comparaueris, quot diebus sufficere ex tali victus specie eger possit, deprehendes. Verum hæc nostris in tractationibus demonstrata sunt, quas si legisti, memorię mandes, oportet: si non legisti, in eas te prius transfer, si sententiæ Hippocratis veritatem cognoscere volueris. Omnia siquidem in operibus omnibus dicta sunt à nobis, qui verissima Hippocratis dogmata sequimur. Sed, cum fieri non possit, vt homo vnus conuenientem methodum & singularia, quæ in ea sunt, omnia doceat, neque ideo ab Hippocrate singularia omnia audirum te existimaueris. At potius culpa eos, qui, cum ea, quæ ab Hippocrate bene præcepta sunt, elaborare & conficere deberent, laudis appetentia ducti sectam aliam constituunt. Verum nos, qui veritatem honoramus, laudamus Hippocratem cum in ceteris omnibus, tum quod in vnoquoque opere proprium scopum ita docuerit, vt huic attentus omnino quispiam definitam certam que inuentionis auxiliorum habeat viam. Sic sanē & cibandi scopum vnum communem prorsus tum sanis tum languentibus esse demonstrauimus. Is autem facultatis vitalis custodia est, quam nunc manifeste explicuit, cum dixit /si validus fuerit/. Ob eandem sanē facultatem sani edimus, & bibimus, alia que omnia vitæ munia exequimur: propter hanc eandem & egrotantes ad cibos potus q̃z procedimus. Nempe morbus suæ affectionis indicat auxilia, phlebotomiā videlicet, clyisma, cataplasma, purgationem, oxymeli, aquam mulsam, atq̃z aliorum vnū quodque: virtutis vero custodia solam indicat alimoniam. Si igitur morbosam affectionem nullo pacto offenderet alimonia, nos virtuti soli attendentes egros, vt sanos, aleremus: sed, quoniam sæpius noxam, vt ostendimus, affert, ob id morbi affectionem, non tanquam cibi indicatricem, sed tanquam prohibtricem contemplamur. Vbi ergo non prohibuerit, facultas q̃z præceperit, tunc nutrimus. Nunquā enim cibus morbosam affectionem sua ratione iuuabit. Id sanē dixi, quoniam sæpius materia vna vim tum cibi tum medicamenti obtinet, vt ptissana. Nempe, quod virtutem roborat, id ea efficere tanquam alimentum nata est: sed, quoniam & secat & humectat, quæ expui oportet, ideo medicamenti obtinet rationem. Chondrus ergo pleuritico cibus tantum existit: oxymeli vero medicamentum. Sed vtrorumque facultatem ptissana obtinet, vsum q̃z languentibus ipsis exhibet: sed ingeritur viriū quidem conseruandarum gratia, tanquam alimentū: vt vero soluatur morbus, tanquam medicamentum. Cum igitur virtus ad morbi vsque iudicationem sine ptissanæ sorbitione suffecerit, oxymeli & aqua mulsa satis sunt, oxymeli quidem vim medicamenti solam habens, aqua mulsa vero cibi pauci & imbecilli. Si igitur iudicationem septima die citius futuram speraueris, vt verbi gratia circa quartam vel quintam, ægros sanē multos sufficere citra ptissanæ sorbitionem posse comperies: quod si ad septimam vsq̃z protrahatur, paucos omnino: sunt que, qui & virtutem habent valentem, corporis q̃z habitum tum durum, tum egre transpirabilem, succos q̃z vel crassos vel viscosos, atque si ambiens aer

† In A.C.Grec. legitur, πρὸς τὴν Τροχίσις ἐστὶν ἡ αἰτία, id est cibus multi nutrimenti.

† Ex antiquis græcis cod. & translatione veteri ita legi potest. Si. n. valeat ad septimam vsq̃z perdurare, dicta vtes ex oxymelice, & melicrato, & aqua, ex his omnibus, quæ dixi, inueniri ac cognosci poterit: quoniam, si alia quidē præsto sint, alia pro absentibus, vires presentium cum absentium viribus comparando, quot diebus & c.

IN LIB. HIPPOCRATIS DE VICT. RAT.

calidus nō fuerit. Nempe, si nihil ē nostro efflueret corpore, alimento opus non esset: sed, quoniā E
effluit, ideo huius proportionē cibi quantitatem definimus. Quibus igitur per cuticulares meatus
parum exhalat, fieri potest, ut his summam consulamus inedia, & magis, ubi virtutem ab initio
validam habuerint: quasi velociter laboret, quæ imbecilla, veluti senū, fuerit, & si corpus parum
exhalauerit. Quapropter & paulo ante quadragenarij meminimus, & non septuagenarij.

- 45 *At, "si nuper cibato cibus prior non descenderit, virtus quæ valida fuerit, & floruerit ætas, subluere oportet: si ve-
ro virtus imbecilla fuerit, glan- de est vtendum, nisi alius sua sponte probe deiecerit.*

A. li. 4. f. r. t.
c. 3. fol. 419. f

Rursus & hoc in loco remediorum indicationem ab affectu corporis accepit, simulque virtu-
tem considerauit, neque tanquam remediorum vsum aliquando indicantem, sed tanquam con-
trario indicantem modo, interdum autem & prohibentem. Non enim, quod æger valida sit vir-
tute, ob id clysmate est opus, sed clysmatis indicatio ex ventris desumitur affectu. Si vero virtus
valida fuerit, vacuationi non reclamatur: quæ, si imbecilla est, vacuationem ipsam inhibet. Sed rur-
sus ad Hippocratis consuetudinem cōuertere animum, qui in talibus aliquando de sola virtute men-
tionem facit, sicut in ante dicta videre est dictione, interdum autem adiecit ætatem. Præcipuus si-
quidem est virtutis scopus: sed ad notitiam eius confert etiam ætatis cognitio, cito quidem in pue-
ris laborante propter copiam effluuij virtute, in ætate vero florentibus abunde sufficiente. Cete-
rum, quo modo in pueris corporis substantia tum mollis tum humida præcipua exolutionis vi-
rium causa efficitur, licet & in regionibus & anni temporibus res habet: nempe horum caliditas
velociter confestimque virtutem vacuationis quantitate soluit. Iure igitur Hippocrates ex virtu-
te interdum sola distinctionum huiusmodi doctrinam efficit: interdum & quippiam ex alijs adii-
cit, vna cum ipsis & cetera commemorans.

- 46 *Tempus autem dandæ sorbitionis tum per initia, tum per omnem morbi decursum, hoc maxime seruare oportet.
Nam, si pedes frigidi fuerint, non à sorbitione modo, verum quoque & maxime à potu temperandum: at, cum cali-
ditas ad pedes descenderit, tunc dare expedit. Sanè tempus valere admodum putandum cum in morbis omnibus, tum
præcipue in acutis, & potissimum quibus febris vehementior suberit, periculum quæ summum.*

Quo modo dixi vnum quidem esse alimonie scopum custodiam virtutis, necessario autem si-
mul morbi affectionem contemplandam esse, ita cibi offerendi tempus ex morbo non prohiben-
te inuenitur. Quatum siquidem ex primo virtutis scopo est, interdum & per accessionum initia
alimonie existit, necessitas: sicuti & in sanis, ubi primum in naturalibus euacuationibus quis eò
deuenerit, ut propè laborare incipiat, refocillatione est sibi opus. Sed, quoniam in accessionum
tum principijs tum incrementis ingesta alimonia lædere admodum nata sit, ob id differimus ipsius
exhibitionem, quamquam corpus ipsum iam iam indigere videatur. Quod nam igitur optimū
languentibus ipsis dandæ alimonie tempus? Sanè, cum moderatissime habuerint tum thorax
tum venter: deterrimum vero, cum ea deterrime habuerint. Deterrime autem habent in accessio-
num principijs: moderatissime vero in declinationibus. Constat igitur optimum cibi ministran-
di tempus in egrotantium declinationibus esse. Accessionis autem principium fit calore omni to-
to ex corpore ad cor thoracemque concurrente: Incrementum, cum paulatim ad extremas cor-
poris partes sese expandit: Status, cum ex æquo corpus totum occupat. Verum "declinatio cōtra-
rium principio modum habet, perspirante scilicet caliditate atque medium corporis relinquire, quod vno ostendit verbo inquit, Cum ad pedes calor descenderit. Neque enim idem est cali-
dos ex frigidis fieri pedes, & caliditatem in eos descendere: nam descendere commutationem ca-
liditatis ex alia parte in aliam manifestat. Fieri autem potest ut pedes calfiant manente in corporis
medio caliditate, quod in vigore ipso contingit.

A. lib. 4. f. r. t.
c. 3. fol. 411

- 47 *In primis autem & maxime cremore, deinde ptissana vteris, præscriptis coniecturis diligenter attentus.*

H

Posteaquam Hippocrates prædixit, quando potu solo regere agrotantes oporteat, & quando
ptissana, nunc, quando cremore solo, & quando ptissana ipsa vtendum sit, distinguit breui qui-
dem & conspicua distinctione. Nempe ad coniecturas, quas recensuit, animum cōuertens, quis-
nam ex languentibus ptissana vti possit, comperies: sic tamen, ut à cremore ipso exorsus ad ipsam
sensim paulatimque te transferas. Dico autem sensim paulatimque, ut primum quidem solo
vtaris cremore: deinde cremoris quidem plus exhibeas, ptissanæ autem exiguum: deinceps
æqualiter vtrunque, mox ptissanæ plus, atque tandem eam solam: sciens ptissanam
ipsam ad corporis nutrimentum virtutisque robur exuberare, cremorem
autem ad concoctionem confectionemque facilem esse. Cum
igitur morbi conditionem virtutisque robur uerge-
re ad melius uideris, auge & tu ptissanæ
oblationem.

Galenus

GALENI IN LIBRVM HIPPOCRATIS
DE VICTVS RATIONE IN MORBIS ACVTIS
COMMENTARIVS SECVNDVS

ARGVMENTVM

Exemplo doloris lateris agit de Vi ac Vfu Fomentorum, deinde de Repentina tum in victu,
tum in reliquis rebus Mutatione fufe late que pertractat.

1

B



Ateris autem dolorem siue is per exordia fiat, siue postea, tentare calidis quidem fomentis primum dissolvere, non abs re existit.

Quod à me sepius est enunciatum, ad memoriã & nũc id reuocare est melius. Nempe quod explanatio fit in dictionibus, quæ obscuritatem habeant: neque tamen expositores id tantummodo in commentariis faciunt, uerum quoque & ea, quæ dicuntur in libris, in quos commentaria parant, austruunt & demonstrant. Ob hunc igitur morem cogor ego & illis consentire, quos non probo, atque sæpe numero ad ea, quæ explicatione egent, sententiam meam prodere, & efferre. Neque tamen eorum, quæ in huiusmodi commentariis uera mihi apparent, demonstrationes scribo, utpote qui de his peculiariter in eorum unoquoque scripserim: sed solas earum, quæ ceteris in tractationibus demonstratæ sunt, rerum summas ad memoriã reuoco: quod & hoc loco in dolore sum facturus. De doloris ergo generatione diximus quidem libro de elementis secundum Hippocratis mentem: diximus etiam & in libris, quos de symptomatum causis fecimus: quod dolor in sensilibus fiat corporibus, mutationem subitam in id quod præter naturam est suscipientibus: & quod duplex est hæc mutatio, alias quidem, dum ipsa tum subito simul que secundum qualitatem alterantur: alias uero, dum continuas, soluitur. Alterantur autem subito simul que ab efficientibus qualitatibus, cum & calfiunt, & refrigerantur, & siccantur, & humectantur: corrumpitur autem eorum continuas, ubi illa uehementer uel distenduntur, uel comprimuntur. Ad hunc igitur modum, & dolor lateris fit in pleuriticis affectibus, de quibus agit Hippocrates, dum que illis in locis est phlegmone, tum multitudine caliditatis præter naturam, particulas per distemperantiam contristat, tum etiam repletionem corpora phlegmone laborantia distendit. Primo ergo auxilio si dolor is uel sanari uel mitigari fomentis calidis possit, tentandum præcepit Hippocrates. Nempe fomenta calida cutim ipsam ad perspirationes rariorem efficere, phlegmones que sanguinem tum tenuare, tum per halitum digerere, cõsueuerunt. Que si facta fuerint, non solum sanguinis aliquid euacuabitur, uerum quoque & affectus, que minus distenduntur, partes mitius exinde & mansuetius dolebunt. At, cum sanguis in phlegmone non diminuitur, uel etiam spiritus uaporosus ex calore generatur, tunc dolorem augeri contingit. Sanguis autem non diminuitur propter eam, quæ in toto corpore est, humorum redundantiam. Nam pars, quæ calore afficitur, plus trahit, quam euaporet: nempe, quæ calfaciunt, suapte natura hæc, ut, quod uicinis continetur partibus, digerunt, sic, & quod redundat, ex propinquis trahunt. Cum igitur fomenta calida dolorem non soluerint, corpus totum insignis aliqua uacuatione præuacubis. Vacuatio autem insignis in morbis acutis, aut per uentrẽ, aut per uenæ sectionem fit. Quarum alteram assumi præcipit Hippocrates, scopos que eius, quæ præsidio magis esse possit, edocet. Summa ergo præsentis narrationis hæc est: uerum, quæ particulatim ab eo dicuntur, & quæ multis obscura, existunt, in sequentibus explanabo. Multis dixi, quoniam iis, qui sese in dictionibus antiquis intelligendis exercuerunt, pauca omnino obscura sunt. At in hisce commentariis intentionem non eò tantum dirigimus.

A. li. 3. f. 10. l. 5.
fol. 272. g

A. li. 4. c. 30.
fol. 84. c

2 Fomentorum autem calidorum probatissimũ est aqua calida, uel in vtre, uel in vesica, uel in vasculo aut æneo aut testaceo posita.

Θερμὰ σπυγνὰ, i. fomenta calida, proculdubio uocat, quæ corpus quouis modo calfaciunt. Quorum alia prorsus humida, alia sicca, & alia ex utrisque mista: mordentia præterea alia, & alia mordendi facultate carẽtia, & ex iis commista tertia. Primum igitur horum genus, cuius in dictione meminit, morfu caret, atque humidum existit. Secundum ex utrisque sicco & humido, mordenti & morfu priuato, commistum est. Tertium autem siccum quidẽ, sed uel mordens uel morfu carens. Quod si & affectiones, quæ unoquoque dictorum generum egent, recensuisset, orationem pro-

Septima Classis.

PPPPPPP iij secto

fecto suam tanto perfectiorem melioremque, quanto & legentibus ipsis vtiliorem, fecisset. Sed E quia non recensuit, propterea neque id recensere necessarium erit nobis, qui doctrinam alterius ex planamus, non nostram persequimur. At vero, quoniam partes meae sunt contra, quam expolito res ceteri, agere (nempe illi suis in enarrationibus sophisticas, quae discennes ipsos ad finem artis nullo pacto iuuare possint, superseminant quaestiones: ego autem semper, quae commodissima sunt, prosequi molior) ob id & nunc doctrinae Hippocratis praetermissa quidem ab eo, sed quae toti sententiae dogmatisque atque vniuersalibus praeceptis quodam accedunt consequio, adiacere non cunctabor. Quae nam igitur ratione fatus (grece πυρία) omnis doloribus sepiuscule adiumento sit, prius dictum est. Dictum quoque & de illis est doloribus, qui a fatu nullo pacto, nisi prius vacuato vniuerso corpore, iuuantur. Verum, cum haec fatus omnibus communia sint, humidi quidem phlegmonis iis, quae a biliosiore succo factae sunt, opitulantur: sicci vero iis, quae a tenui aquosoque sanguine exorte sunt. Perpetuo siquidem contraria contrariorum esse remedia meminisse oportet. Hoc igitur scopo, fatus morsu carentes aduersus mordentes succos profunt: mordentes vero, quod tenuent, contra crassos viscososque valent humores. Eam ob rem quis nā in ea, quae phlegmone oblidetur, parte euincat humor, obseruabis, ab iis, quae retuli, auspicatus, aetate scilicet laborantis, naturali temperatura, anni temporibus, locis, & vita antecedente: & si phlegmone videatur, ex iis, quae ipsi tum in colore tum in magnitudine, tum in duritie, tum in molitie contigerunt: et si pleuritidem vel peripneumoniam curaueris, ex iis, quae spuendo excernuntur. Verum, cum praefata omnis dignotio coniecturalis sit, & non scientifica, non certa compertaque, praesertim ubi in corporis imo sita sit, quae dolore afficitur particula, ab iis inchoare te oportet, quae, quam cetera, magis auxilio esse tibi videbuntur. Quod si nihil praesidij tuleris, ad alia etiam te transferre conueniet. Dolo autem non sedato, ad totius corporis accede euacuationem.

Videtur ergo Hippocrates ab eo incepisse fatum, qui periculo omni vacat: is autem est, qui minime mordet, humidusque existit. Nempe, tametsi nihil aduersus malum fecerit, non tamen magnum, & insigne afferet detrimentum. Ceterum fatus, qui ex aceto, vel orobo, vel sale fiunt, nisi propriam conuenientemque consequantur affectionem, non solum non salutares erunt, verum quoque & malum augebunt, utpote qui fortem efficacemque habeant facultatem.

A. l. 1. f. 10. r
c. 3. fol. 273

3 Verum prius molle quippiam lateri, ut & mitior & iucundior fatus fiat, supponere oportet.

Postea quam in vtre, vel vesica, vel vasculo aut aeneo aut testaceo, positam aquam lateri adhiberi praecipit, hac in dictione prius molle aliquid supponi iis, quae lateri tum quadrare tum coherere debeant, ut nullo pacto angat, prorsusque iucunda sit eorum, quae exhibent applicatio, praecipit Hippocrates: Cuiusmodi fuerit lana mollis, vel linteum multiplex, vel quippiam eorum, quae tum tenera tum mollia existunt. Sed paulo post de eo, qui per spongiam fit, fatus agens, nihil supponi iubet.

4 Vtilis autem & spongiae mollis magnaeque atque ex aqua calida expressae applicatio. Sed sumentum linteum vestientum, ut vis eius plusculo sufficiat tempore permaneat quae: atque simul ne halitus ad laborantis spiritum feratur: nisi forsitan & id prodesse aliquando videatur, nempe interdum prodest.

A. ibidem e

Cetera quidem, quae in dictione continentur, liquida manifesta que existunt: sed de halitu est discutiendum: qui multum & ledit & contristat, non spirandi difficultatem caloris incremento solum proritans, sed pulmonis angustiam, qua ob replentem, qui humidus est, halitum afficitur. Solis igitur laterum doloribus tum siccis, tum quibus nihil expuitur, idonea est halitus inspiratio, plus auxilij, quam noxae, afferens. Hoc igitur in loco scriptum est primum fatus genus. Mox ad secundum sese conferens inquit.

5 Praeterea & hordeum & eruum in aceto ita diluto ut paulo acidius sit, quam ut quis bibere possit, madefacta perfusa quae & seruata atque in sacculos coniecta lateri apponuntur: atque ad hunc modum fursur.

A. l. 1. f. 4. c. 1
H fol. 84. d

Hordeum eruumque non semina, quae integra sint, ex aceto & aqua excoquere praecipit, sed prius concisa cominutaque: constatque Hippocratem velle id ex verbo hoc δειντα, & διντι siquidem madefacio & perfundo significat: atque aliter ex actione ipsa certior fiet, nempe hoc pacto tum blandior, tum efficacior erit fatus. Fursur denique & hoc pacto parare praecipit: fatus autem huiusmodi priore efficacior virtute aceti redditur. Quod si & ex eruo paratur, conferet sane & id non parum: nempe eruum crassos humores tum secare, tum conficere, tum euaporare potest: atque ob id fatus huiusmodi vtemur, ubi crassos viscososque humores in ea, quae phlegmone oblidetur, parte collectos suspicabimur. Tibi autem sane id constabit ex antecedente victu, si humores huiusmodi produxerit, anni temporibus, & locis, & etate. Praeterea & si beneuoli fatus mansuetique, quos prius memorauimus, nihil praesidij attulerint. Nam, ubi de corporis totius repletionem distinxeris, cum videlicet neque huius notae apparuerint, neque beneuoli mitesque hi fatus quippiam iuauerint, succorum existimabis crassitiem, quae in halitum soluitur, flatuosumque spiritum, qui ob denegatum exitum contristat. Flatum ergo hunc parientesque ipsum humores, praefati discutiunt fatus, & potissimum qui ex eruo parantur. Praeterea & sermonem percurrans Hippocrates manifeste simul & optine

ces ijs, quæ in superficie extant, iugularijs communes. A iugularijs siquidem quæ in superficie ex-
 tant, partes fere omnes tum colli tum capitis in superficie constitutæ nutriuntur: sicut & à iugula-
 rijs altius profundius quæ latentibus partes omnes altius profundius quæ latentes. Verum, quæ circa
 scapulas atque circa dorsalem medullam, quæ est in collo, existunt loca, venas habent, quæ ex in-
 ferioribus præfatæ radices communis partibus ad ipsas ascendunt. Cōmunem dico radicem, quā
 proxime dixi & ijs, quæ in superficie constitutæ sunt, iugularijs & humerarijs communem esse.
 Non imerito igitur humeraria partes, quæ supra claviculas sunt, quæ & in collo & capite existunt, tū
 magis tū velocius euacuat. Axillaria vero thoracis partes, & magis eas, quæ in sublimi sitæ sunt,
 præsertim quæ in hominibus ipsis. Nempe infernas demissas quæ omnes vena vna altera nutrit, quæ
 sub corde à vena caua procedit. Ex sinistra autem parte venæ illius, quæ infernas thoracis partes
 alit, atque ad costarum radices prona fertur, adusque septum transversum singulis intercostalibus spa-
 tijs tum sinistris tum dextris rami distribuuntur. Verum, quod reliquum ex ea est, septum transuer-
 sum penetrat, primis quæ ab eo corporibus dispensatur. Cæterum, quæ per axillas ad manus ferun-
 tur venæ, proximas ijs, quæ sublimes quatuor thoracis alunt costas, radices habent: sunt quæ, quàm
 quæ per humerum ad manus contendunt, non paulo maiores, ascendunt autem ad internam re-
 gionem brachij vtriusque: atque, cum per ipsam pronæ feruntur, musculis ipsis, qui inibi situm ha-
 bent, notabiles dispensant ramos. Verum, cum ad cubiti articulum prope vtraque venerit, venas bra-
 chij internas ad ipsius cubiti ossis nodum, qui hic positum habet, producit: quicquid vero reliquum
 est bifariam scissum diuisum quæ per cubiti flexum defertur, parte ea, quæ in superficie constituitur,
 venam eam, quæ in eo cubiti flexu secatur, efficiente: penitior vero eam, quæ cum arteria diuidi-
 tur. Secatur quoque & vena alia in cubito obliqua, † veluti & ea, quæ in vtraque manu vna est } hu-
 merariæ non exigua portio. Nempe & humeraria ipsa per brachium subter cutem conspicue per-
 currens in ipso cubiti articulo, qua sublimissima extant partes, figurata s. vt Hippocrates in libro
 de fracturis docuit, || manu, diuiditur. Quæ igitur sublimior venæ ipsius à fissura portio per exter-
 na cubiti loca defertur, ea apud fissuram ipsam secatur, qua primæ venæ radici è directo maxime
 respondet. Eam ob causam & sublimiora claviculæ loca citissime euacuat. Portio autem, quæ
 in cubiti flexum oblique fertur, minus quidem ea, sed cæteris magis eas euacuat partes. Pars vero,
 quæ ab interna notabili vena oblique etiam fertur, minime quidem præfatas vacuat partes: verum
 maxime thoracis superiora, { quæ radices tum eius, quæ per axillam ad manum fertur, tum eius, quæ
 superiores thoracis alit partes, vicinæ admodum existant. } Secare igitur hanc iubet Hippocrates
 prius, quæ venæ, quæ ex humerariæ fissura provenit, præsens sit, inferatur quæ. Quæ si aliquando non
 comparuerit, vice huius secamus aliquam ex internis, quas recta in os cubiti deferri didicimus.
 Quod si & ea non comparuerint, accedimus ad eam, quæ ex præfatarum duarum venarum obli-
 quarum infusione progignitur. Verum, & cum ea interdum non apparere possit, humeraria ap-
 parente, seca humerariam: qui scilicet vacationes ab vniuerso animalium corpore fieri noueris,
 quanquam neque celeriter, neque similiter, ex vena omni fiant. Nos vero partem eam, quæ phlegmo-
 ne obsidetur, tum celeriter, tum quàm cæteras partes magis, in acutis præsertim morbis vacuare
 contendimus. Quod sanè interna cubiti vena facit, multo quæ magis, ubi sanguinis redundantiæ ad
 superiora vergere videatur, aut superiores thoracis partes affectæ sint. Tunc enim grauitas ma-
 gis in brachio & circa mammam fit. Verum, quæ partes thoracis inferiores prope septum transuer-
 sum infestant phlegmonæ, non abs re dolorem ad hypochondrium transmittunt. Quo fit, vt do-
 lores huiusmodi non admodum iuuat, quæ in cubito fit, vacuatio, corde s. medium occupante: ne-
 pe venam, quæ inferiores thoracis alit partes, infra cor emergere nuper audiisti. Dicta quidē mi-
 hi hæc sunt super eo, quod ab Hippocrate bene scriptum est, de secanda s. interna cubiti vena. Sed,
 cum vacuandi sanguinis terminum coloris mutationem posuerit, deinceps est de eo disserendum.
 Quicquid ergo sanguinis in phlegmone continetur, id caloris abundantia colore permutatur: re-
 liquum autem in partibus omnibus simile manet. Eam ob causam sanguine, qui in totum spargi-
 tur corpus, pituitosiore existente, rubicundior sanè erit, qui in eo, quod phlegmone obsidetur, la-
 tere continetur. Quod si sanguis in corpus totum diffusus, rubidus fuerit, is proculdubio, qui ad
 phlegmonem est adustus affatus quæ, in nigrum permutabitur. Liuidus autem in ea, quæ fit à rubi-
 do ad nigrum, transmutatione medium obtinet. Coloris igitur mutatio sanguinis ex particula
 inflammata translationem sufficienter monstrat. Vacationis igitur modum mensuram quæ,
 quæ affectui peculiaris sit, diximus. Sed, si interdum virtus tantum vacuare prohibeat, parti ipsi,
 quæ phlegmone obfessa est, minus quidem futurum auxilium scire oportet: sed melius est virtu-
 tem non exoluere, quàm sanguinem vacuare redundantem.

† Veluti & hæc,
 in vtraque ma-
 nu vna.

Secl. 1. t. 1. 7^a.
 223. c. Et t. 16.
 226. g

* Claviculis.

† Hæc ex anti-
 qua tralatioe,
 & recte.

* κατ' ἴξιν.

A. li. 3. Et 10.
 c. 2. fol. 272.

11
 * Ap. felinon, id
 est apium.

† ὑπὸ λαιά.

Si vero eas, quæ sub septo transverso sunt, partes dolor infestat, nullum quæ ad claviculam signum fecerit, ventrem vel
 nigro veratro vel peplio mollire oportet. Sed veratro nigro vel daucum, vel seseli, vel cymini, vel anisum, vel aliud
 quippiam boni odoris miscebis. Peplio vero silphij succum, quanquam hæc inter se mista non dissimiliter agant. Cæte-
 rum veratrum nigrum tū melius tum ad iudicationem iuuantius, quàm peplum, ventrem soluit, sed peplum flatum ma-
 gis excutit. { Dolorem præterea ambo hæc sedant. Sedant quoque & alia multa, quæ expurgant medicamenta. Ve-
 rum

¹ *Arum omnium, quæ nouerim uiderim q̄; hæc potissima existunt. Nempe, & quæ in sorbitionibus dantur purgantia medicamenta, soluere possunt, quæcunque scilicet non valde insuauia existunt, vel propter amaritudinem, vel aliam quampiam inuicunditatem, vel quantitatem, vel colorem, vel suspicionem aliquam.* * ὑπὸ λυατά.

Quod medicamenta purgantia per experientiam inueniantur, & quem nam expurgēt humorem, & si omnino purgent, in libris de simplicium medicamentorum facultate didicisti. Quod vero purgationis necessitas sit, si redundantes humores deorsum repant, est quoque ratione scitum animaduersum q̄; sed id, testimonium ratam q̄; fidem ab experimētis habet. Edocuit autem Hippocrates facultates medicamentorum, quæ in huiusmodi affectibus propinat, veratrum quidem nigrum κλεισμώντεον i. ad iudicationem iuuantius vacuare, peplium vero flatus magis excutere affirmans. Sint autem quæ ab Hippocrate κλεισμώτερα, id est ad crīsim iuuantiora, dicuntur, ea quæ morbi iudicium faciunt magis, quod facultate verbo huic ὀφελιμώτερα, id est iuuantiora, idem existit. At, cum purgantia omnia medicamenta ventrem, præsertim q̄; os ipsius, q̄; maxime tum neruosum tum sensile existat, affligant lædant q̄; ob id eorum, quæ boni sunt odoris, mistio excogitata est, ne sola sincera q̄; purgantium medicamentorum virtus os vētris tangat. Permissa quoque inter se, tum peplium, tum elleborum, ὁμοιότροπα id est modi similis, esse ait, quod est facultatibus conuenire, & in nullo controuersa esse. Nam & in purgantium medicamentorum permissione controuersia est, non quādo aliud quidem bilis, aliud vero pituitæ excretorium fuerit, (nā eodem tempore vacuari tum bilis, tum pituita possunt) sed quando aliud quidem protinus, aliud vero lōgo à propinatione tempore, purgationem mouere natum sit. Nempe hoc pacto inæqualis (eis simul ingestis) sit vacuatio: inæqualem dico, cum iam altera quidem desinere, altera vero incipere videatur. Nempe, quod citius purgare consuevit medicamentū, id & ex alio quippiam simul vacuat: quo fit, ut, quod exiguum ipsius relinquitur, imbecillius reddatur, & longe tardius suam inchoet purgationē. Præfinita igitur vacuationis lege simile est elleboro peplium, potest q̄; elleboro similiter nigrum subducere humore. Cætera tum dictionis huius, tum sequentium patient. Considerare igitur hæc atq̄; in memoria tenere nos oportet, sed non perpetuo in pleuritidis uti debemus, ad memoriam reuocantes aphorismum illum, ubi dicitur, || In acutis morbis raro & in principijs, purgantibus medicamentis est utendum. Vbi igitur (inquit) non solum acutus morbus fuerit, cuiusmodi est pleuritis, verum & cum febre vehementissima, multo magis vitanda est purgantis medicamenti administratio: atq̄; per sectionem venæ vacuandum magis, etiam si ad Chypochondrium dolor pertingat. Nempe & si minus quidem auxilium, quā per purgationē, sequatur, securius tamen multo existit. Immo nullum ex eo, quod per venę sectionem fit, periculum impendet, eo discrimen maximum subeunte, quod per purgationem tentatur: Et potissimū si laborantis naturam expertus quis non fuerit: nempe alij difficulter natura purgantur, alij modico assumpto medicamento purgantur copiose. Quibus igitur dare quadrabit, his medicamenti tantū propina, quantum in plurimis mediocriter vacuari tum nouisti, tum sis expertus. Si enim hominis naturam non noueris, metus est, ne plus iusto vacues, vel nullo pacto vacuationem moueas: aut, si moueris, non tamen sufficienter vacues. Quæ omnia magnas in morbis acutis pariunt offensas: quod non facile, ut in ijs, qui non febricitant, emendatur. Cum igitur febris vehemens non fuerit, naturam q̄; laborantis expertus fueris, ad medicamenti purgantis potum te conferes, ijs, quæ ab Hippocrate dicta sunt, vel etiam alijs similis naturæ vsus. Quo ē numero est, quod ex colocynthide paratur medicamentum: quod iam ex vsu hieram vocant. Id sanē varijs parant modis, sed, quod elleborum accipit scammoniam q̄; non habet, id ijs, qui medicamen subdūctorium omnino assumere possunt, optimum est.

¹² *D* Vbi autem quis medicamentum ebibit, ptisanam protinus sorbendam dato, neque insigniter minore, quā consuetum est, quantitate.

Et maxime quidem ventris ori, quod & stomachum vocant, ut in ipsis purgantium medicamentorum potibus illasum maneat, consulere oportet: præsertim quæ ubi febrientibus tale quippiam propinatur. Verum præcipua, ne offendatur, cautio est, si medicamentum, quod propinatur, purum non sit: sed cum alijs, quæ malitiam ipsius hebetare nata sunt, temperatum mistum quæ. Nempe purgantium omnium medicamentorum natura, corporum, quæ purgantur, naturis contraria est, atq̄; ut quispiam dixerit, lethalis, & deleteria. Ut autē succi papaueris, mandragoræ quæ, & hyoscyami, atque aliorum huiusmodi multorum, quæ nobis & substantia & viribus aduersa corpus perimere nata sunt, portionem exiguam assumentes, magnam percipimus commoditatem: sic & purgantium medicamentorum, quorum natura corporibus nostris aduersa est, exiguam aliquam partem præcidentes ad suppetias ferendas utimur. Quo item modo in horum medicamentorum potu seminum aliqua, quæ boni sint odoris, miscemus, quæ & malitiam obtundere nata sint, & operationem ipsorum non prohibeant, tenuandi incidendi q̄; facultatem obtinentia, ita ut & crassos incidant humores, & vias quibus vacuatio fiat, aperiant patefaciant q̄; sic & à sumpto medicamento ptisanam sorbere confert. Nempe purgās medicamen-

tum

1. Aph. 22. Ext
ord. 10. c

* ὑπὸ λυατόν.

A. 3. f. 13 r. 1.
c. fol. 292. d

tum ipsum, tanquam exiguum sit, ad ventris quidem fundum peruenit: verum, dum transit, stoma-
chus & quęcunq; ventris sublimior pars non qualitate medicamento purgantis modo, verum
& substantię, quę in transitu hæret, aliquid assumēs, vehementer læditur. Ptilanę igitur cremor
superingestus comoditatem affert. Nempe & detergere, & deorsum trahere, quod vię adheret, &
qualitatem medicamēti, quod his adheret partibus, tum contēperare, tum permutare potest. Ob
eas igitur causas a purgantis medicamento potu, ptilanę superforberi præcipit: sed, vbi purgatio
cœpit, ab ea vult abstinendū, purgantis medicamēti operationē exolui veritus: atq; ob eā rem ait,

- 13 *Et, quoniam ab re non est, purgatione in media sorbitione dare non cōducit. At, vbi purgatio desierit, tunc sorbitio
detur, sed consuetudo minor: deinde liberalius perpetuo exhibeatur, si & dolor cessauerit, & nihil aliud obicem fecerit.*

Contra, quā pleriq; huius temporis medici, rem hęc docuit Hippocrates. Nempe hi, vbi va-
cuauerunt, copiose nutriunt: Hippocrates vero a purgatione, ptilanę minus ministrari iubet.
Nam corporum, quę purgata sunt, natura purgatione agitata labefacta q; tolerare alimoniam non
potest, neq; probe eam conficere, nisi omnino pauca fuerit. Purgatis igitur tantum cremoris pri-
mo exhibendum, quantum domare possint: deinde paulatim sensim q; adaugere oportet, si &
dolor, vt inquit, cessauerit, & nihil aliud prohibuerit. Quod de dolore ait est manifestum: sed, ni
hil aliud prohibere, ad præfatas referre oportet, si intelligere volueris, distinctiones, in quibus de-
monstrauit, quod nam pacto morbis acutis laborantes absq; sorbitionibus regere oporteat. Sum-
ma vero horum est, cum vel morbum ante iudicationem nulla sorbitione indigere sperabimus:
vel in quibus summa est, quę phlegmonem facit, cruditas.

- 14 *Ratio autem mihi eadem est, si & ptilanę cremore vtendum sit.*

Tempus exhibendorum tum ptilanę, tum cremoris ipsius, & antea simile esse demonstrauit,
re vna duntaxat differentiam horum definiens. Nempe a cremore principium exhibitionis facit.

- 15 *Melius siquidem esse dico, vt protinus a morbi initio sorbere incipias, quā inanitis vacuatis q; venis vel die ter-
tio, vel quarto, vel quinto, vel sexto, vel septimo, si ante hoc tempus morbus haudquaquam iudicatus fuerit, sorbi-
tionem inchoare.*

1. Apho. 8. Ext.
ord. 4. f

Quod in Aphorismis || scripsit Hippocrates, id & impresentiarum persequitur, in morbi om-
nis vigore, tenuissimo vtendum victu præcipiens. Si igitur, quinta die morbi vigor futurus sit,
& eger solo vsus potu sufficere non possit, melius esse ait si protinus ab initio ptilanam dederis, G
& neq; tertio die, neq; quarto, sorbitionem inchoaueris. Sic sanē & eos, qui vel quinto, vel sexto,
vel septimo, sorbitionem inchoant, falli circumueniri q;, si ante hoc tempus morbus non fuerit iu-
dicatus. Per iudicationem intelligo, vt dixi, non perfectam morbi mutationem solum, verum
quoque & effatu dignam transmutationem.

- 16 *Præparationes autem & his tales fiant, quales dictę sunt. De sorbitionis igitur exhibitione ita sentio.*

Et, quibus ab initio sorbitionem daturus sis, præparationem similiter fieri præcipit. Id est, siue
sectionis venę, siue clysmatis, siue balani necessitas fuerit, illud ante faciendum iubet.

- 17 *De potu quoque, qualem cunque ex declarandis potaturus quispiam sit, eadem omnino mihi est ratio.*

Si laborantem potu solo citra ptilanę sorbitionem rexeris, præfatas quoq; præparationes te
facere iubet, id est aut venam secare, aut clysmate vel balano vti.

- 18 *Verum & medicos contra omnino, quā oportet, agere scio. Nempe omnes, languentes ipsos per initia morborū
duos vel tres vel etiam plures dies inedia siccare, atq; ita tum sorbitiones tum potus exhibere volunt: id quę forsā
quod magnę corporis mutationi magnam quampiam obicere mutationem ipsis dicens esse videatur. Verum muta-
tio ipsa bene quidem habet † non modica, ‡ sed recte transferenda venit. Iam autem & ciborum exhibitio mutatio-
nis rationem maxime subit.*

† A.P. si modica.
‡ non modicū

A. lib. 4. l. 1.
c. 8. fol. 42c

H

Medicos culpat Hippocrates, qui languentes ipsos in absoluta ciborum abstinencia seruant:
deinde eos protinus alij quidem ad sorbitionum, alij ad potuum ingestionem deducunt. Non
tamen mentionem eorum fecit, qui cibos validiores ante morbi cōcoctionem ministrant. Con-
fueuit siquidem, vt antea dixi, interdum prætermisiss, quę maxima sunt, erratis culpæ minora:
& eam, quę ex illis oritur, demonstrare offensam. Qui autem ita transmutant, forsā (inquit)
rationabiliter transmutare arbitrantur, in magna corporis transmutatione effatu dignam victus
permutationem facientes. Quod sanē bene eos existimasse ait: non tamen de transmutatione om-
ni, sed bene aliqua est putandum. De qua partim prædixit, & partim quippiam est dicturus, ser-
moni adstruens declinandas esse repentinas mutationes.

- 19 *Maxime ergo lædentur, qui tota vtentur ptilana, nisi recte transferantur: lædentur quoque, & qui solo vtentur
cremore, quanquam minus: lædentur præterea, & qui solo vtentur potu, sed hi minime.*

Dictam

A Dictam paulo ante subitam victus mutationem, qua primis diebus in absoluta ciborum abstinentia seruatos languentes circa diem quartum nutrire incipiunt, maxime quidem nocere ait, si in pitissimam totam transferantur: minus vero, si in cremorem: sed ἡκιστα, id est ἐλαχιστα, quod minimum indicat, offendi eos, qui ad solos procedunt potus. Nempe ex magnitudine virtutis eorum, quæ offeruntur, magnitudo oritur offensæ.

20 Oportet autem & ex sanorum hominum victu disciplinam, quæ conferat, facere. Nam, si sanis quibusdam tales vel tales cibi variare videantur cum in alijs quibusdam, tum in non nullis mutationibus, quomodo & in morbis quibusdam & maxime in acutis non valde euariabunt?

Incipit Hippocrates præfatam ab ipso de victu sententiã demonstrare, arguens vnã & eos, qui cõtrario victum instituunt modo. Sed, vt dilucidus cõspicius q̃ reddatur sermo, summam ipsius omnem præfari melius esse mihi videtur. Est autem earũ, quæ in eam rem assumuntur, sumptionum dignitas altera vniuersalis hæc: Si bene valentibus læsionem afferant repentinæ victus ad contraria mutationes, multo magis ægotantibus ipsis. Quod varijs etiam modis possumus interpretari, aliud in aliam transuentes dictionem, vt hoc pacto, In repentinis victus mutationibus, **B** qui sani sunt, ægris minus læduntur: Vel sic, Ægri sanis magis læduntur: Vel ad hunc modum, Detrimenta sanos minus, quàm egros, afficiunt: Et adhuc generalior hæc: Validiores minus afficiunt, imbecilliores magis, detrimenta. Licet & aliter vim sermonis interpretari aut ex eo, quod per se & primum vtile sit ad quod demonstratur: aut ex aliqua continentium ipsum vel dignitatum vel sumptionum. Talis quidem tibi sit per se credibilis altera sumptionum (lemmata Græci dicunt) quas sanè vocare cõsuevit Aristoteles axiomata id est dignitates. Sed alteram, cui fides per experientiã lucem accessit, deinceps audi. Sanos etiam repentina victus mutatio offendit. Ex vtraque hac sumptione concluditur languẽtes à repentina victus mutatione lædi magis, sed multo magis, qui acutis infestantur morbis. Hæc est vis sermonis. Verum Hippocrates alteram ex sumptionibus per se tum prius, tum credibilius, protinus citra probationem accipit. Alteram vero ips, quæ singulatim per experientiã noscuntur, fide donat & auctoritate. Quod & sequens declarat oratio.

21 Atqui, quod vitiosus victus cibi & potus semper sibi similis ad sanitatem tutior omnino sit, quàm si quis subito ad alterum vel meliorem se transferat, facile discitur, intelligitur quæ.

C Alteram sumptionum earum, quæ ad præsentis sermonis demonstrationem præstant, nunc ex multis particularibus exemplis astruere incipit, fidem ipsius in vnã colligens summam, quæ talis est. Magnæ & repentinæ præter consuetudinem mutationes non paruam sanis afferunt læsionem. Quanquam sermo hic conspicuus sit, tamen, si quippiam, quod explanatione indigeat, intercideret videbitur, ips, qui exercitati non sunt, in sequenti serie explanare non cunctabor. Nempe hic commentarius liberalior ac humanior est, si non eos modo, qui in rationibus sunt exercitati, sed etiam, qui non sunt exercitati, spectet. Quod si quis præfatas disciplinas neq; didicerit, neque expertus fuerit, aliud quippiam agat.

22 Nempe tum ips, qui bis die comedunt, tum ips, qui semel, noxas & infirmitatem pariunt repentinæ mutationes: eos q̃, qui prandere non consueuerunt, & prandent, statim infirmos reddunt, toto item corpore graues & imbecillos, & desidēs. Quod si supercœnauerint, acidum ructant: alios alui leuitas exercet. Nempe ventriculus præter consuetudinem grauat, superficcescere consuetus, non bis tumescere, neq; bis cibos cõquere.

Non solum, q̃ in repentina consuetudinis mutatione valde lædantur, verum quoq; & quæ nã læsiones fiant, & quo nam modo singulas emendare oporteat, scribens Hippocrates, ob id sermonem prolixum facit: quomodo, si duntaxat, q̃ in repentina consuetudinis mutatione lædantur, ostēderet, ob id sermo illi totus brevis foret. Prima igitur cõsuetudinis mutatio, quam nunc exprompsit, est de ips, qui prandere non assueti pransi aliquando sunt. Ait enim tales & infirmos, & toto corpore graues fieri, imbecillos item & desidēs reddi. Contingunt autem hæc ipsis, graua ta ab alimento, veluti à pondere, facultate: neq; enim imbecilla ea redditur propria ratione, veluti in cibi penuria fieri cõsuevit. Ob eam igitur causam hoc in loco sermoni adiecit totum corpus grauari ips, qui bis cibati sunt, eos q̃ fieri desidēsiore. Verum in assuetis prandere & non pransis imbecillitatem quidem virtutis scripsit, sed grauitatem non adscripsit. Nempe & in talibus mutationibus imbecillitatē sua rōne virtus. Præterea, cū desidēs fieri in p̃senti victus mutatione afferat, in contraria tímidos esse dixit, quasi opus omne perosos, & veluti opus aggredi veritos, diceret. Nempe res ita habet. Nam, qui ita se habent, virtutis imbecillitatem vere sentiunt: atq; ob id eas, quas ante promptius obibant, obire non audent actiones. Quin etiam & ips, qui diminute cibantur, viscera videri pendere ait, eos q̃ tum calidum, tum χλωρόν, id est viride, meiere, Calidum in-
quiens, id est solito calidius: χλωρόν vero, id est viride, iuxta morem quendam Asiaticorum Græcorum, qui & nunc obseruatur: ωχρόνς siquidem, id est pallidos quosdã videntes, causam, cur ita χλωρόι, i. virides, facti sunt, interrogant, χλωρόν & ωχρόν, id est viride & pallidũ, nihil differre existimantes.

* Dieta αἰσθητή, id est vulgaris ac simplex, qd sit, habet a Gal. in cõm. lib. de Fractu. pag. 230. g. & pag. 248. c.

* τὸ ὀπίπαι.

* ἐλατύν. i. elixare. vide in fine cõmenti.

† Al. διοσπερ
ἐν τῷ τῆς κα-
λουμένης ὡ-
χρας, i. veluti
& color & c.

* In antiquis le-
gitur διατη-
νῆσι, i. cibatis.

* πίνειν.
* ἐπιψύχει.

existimantes. Visum quod quendam se ipso χλωρότερον, id est viridiorem, dicunt: ὡχρότερον, id est pal- lidiorum, ita significantes. Est autem ὡχρόν χρώμα, id est color pallidus, veluti ignis, & color ὡχρας vocatur, cuius prima syllaba acuitur. Fit quod talis color permixta aquoso excremento pallida & amara & flaua appellata bile. Nempe flauus color, quantum à rubro in albiorem secedit, tantum à flauo pallidus. Scripsit & alia quedam symptomata, quae ita affectis fiunt. De quibus, cum ad eam, quae de ipsis est, mentionem peruenerimus, agemus. Praesentem autem dictionem discutiamus. Quae in non affueris prandere contingere ait, ijs adhuc & hoc adiecit: Si autem supercoenauerint, acidum ructant. Quod autem ructus acidi fiant & propter ventriculi frigiditatem, & propter pituitam saepius in eo aceruatam, & propter ciborum multitudinem, aut, si pauci quidem sint, potestate tamen frigidorum, didicimus. Omnium autem praefatorum commune est calorem ventris ingenitum vinci à cibis, non eos vincere, neque ijs praestare, neque probe ipsos conficere posse: ut si modicae flammæ lignorum multitudinem superaceruaueris, vel & citra multitudinem tum viridia tum humida superposueris. Caeteris ita cibatis πατίλιν, id est alui lauitatem siue humidam deiectionem fieri ait. Verum in exemplaribus non paucis non πατίλιν, scriptum inuenies, sed ἄσιν, ut eo vocabulo πίπτασμον, id est proiectionem intelligamus corporis hominis huius, qui ita cibatus est: corporis, inquam, ob cibi multitudinem ἀσπορμύς, id est grauiter moleste quod habentis, atque implacidi inquieti quod, dum in lecto iacet, & sese permutatis. Caeterum, quod circa dictionis finem concordationem elixationi similem esse oporteat, manifeste ostendit, tanquam à calido fiat non sicco squallenti quod, cuiusmodi est febrilis, sed humido vaporoso quod, cuiusmodi est, qui in animalibus secundum naturam existit.

- 23 Conuenit autem his permutationem aqua virtute compensare. Dormire siquidem eos oportet tanquam noctem à cœna, hyeme quidem citra frigus, æstate vero citra calorem, agant. Quod si dormire non queant, plures lente ambulando absoluant circuitus, neque stent: nihil cœnent, aut pauca & innocua. Minus praeterea bibant: sed meracius & non dilutum. Magis praeterea & is afficietur, qui ter die replebitur: ac etiam multo magis, qui crebrius: quanquam sint non nulli, qui ter die satiani facile ferant, utpote qui ita sunt consueti.

Hoc in loco referre hoc non erat necesse. Nempe docere proposuerat, quo nam pacto repentinae consuetudinum mutationes nos laedant, non autem, quo tales laesiones modo curare oporteat. Verum, quoniam Hippocrati hoc tentare est visum, propterea, quae scripsit, persequemur. Maxime quidem his dormire ipsos plurimum iubet: & si dormire nequeant, plures lenta ambulatione absoluant circuitus: id quod, ut quam plurimi expositorum aiunt, post cœnam: sed, ut eorum, quae dicuntur, sensus praecipit, post prandium. Nam oratio hæc /tanquam noctem agant/ de somno meridiano non de nocturno dici expostulat. Praeterea, quod continuata est scripturae serie, ubi inquit /Si vero dormire non queant, plures lente ambulando absoluant circuitus, neque stent: nihil praeterea cœnent vel pauca & innocua/ testatur Hippocratem velle eos à prandio dormire, non à cœna. Duorum igitur alterum: Nam aut emendanda, tanquam errati conscia, scriptio, atque ita scribendum, Dormire siquidem eos oportet post prandium, tanquam noctem agant, hyeme quidem citra frigus, æstate vero citra calorem: Vel, si seruare volumus orationem hanc à cœna, intelligenda est hoc pacto dictio: Dormire siquidem eos oportet, ut à cœna ante dormiebant: sic & nunc post prandium, tanquam noctem agant. Quod autem velit Hippocrates eos vel nihil omnino vel parce vel leuiter cœnare, sensus est manifestus. Ventrem siquidem vult requiescere, laborem quod, quo grauatus afficiebatur, refoueri, quod praeter consuetudinem pransus homo fuerat. Hinc sequens est & minus bibere, sed non aquosum, non dilutum. Nempe fluctuationem humiditatem quod & refrigerationem vitare oportet, ubi à ciborum multitudine veter grauatus fuerit. Potum autem, qui exhibetur, non aquosum esse conuenit, sed ventris tum calfactoriam, tum roboratoriam obtinere facultatem. Caetera, quae continuantur, liquida sunt & manifesta.

- 24 Praeterea, qui bis die cibum sumere consueuerunt, nisi pransi fuerint, imbecilli, & infirmi fiunt, timidi quod: ad quoduis opus, & cardiaci. Nempe his viscera pendere videntur, calidum mingunt & viride, id est pallidum, stercus quae exurit. Sunt, quibus os amarescit, oculi cauantur, & tempora saluunt, partes quod: frigescent extremae.

Caetera quidem huius dictionis in eorum comparatione, quae praeter consuetudinem pransus contingere diximus, sunt explanata: sed de reliquis nunc dicam. Αφοδον, id est αποπάτημα, id est stercus ipsorum siue alui purgationem exuri inquit, à calore scilicet assatam. Nempe corpus magis tum liccescit tum ignescit ijs, qui consuetum relinquunt prandium. Alijs os amaricare ait, utpote ijs, qui biliosiores habent naturam: his quod caui fiunt oculi ab eadem, qua excrementum adurit, causa siccescentes. Quod autem in amare bilis naturis innatus calor in id, quod igneum est, digrediat, propterea & tempora saluunt, id est temporum arteriae euidenter pulsant. Partes praeter ea corporis extreme frigidiores fiunt, quod veter biliosis repleatur humoribus: quorum morsu atque contristatione affectus virtutem dissoluit, corporis quod extrema refrigerat.

- 25 Plurimi quoque horum, qui pransi non sunt, cœnare nequeunt: qui, si cœnauerint, ventris grauitate afficiuntur: ac diffidius

A difficilius cubant multo, quàm si pransi fuissent.

Picrocholi natura præter consuetudinem impransi permanentes, cibos auersantur, ventre scilicet male affecto. Verum, qui coacti cibum sumplerint, grauantur: atq; ob id *δυσκοι εἶσι*, ut ipse inquit, id est male habentes in lecto permanent & traducunt.

- 26 Cum igitur talia ob dimidiatæ diei victus à consuetudine digressionem sanis contingant, neque adijci quicquam neque subtrahi commodè videtur.

Rursus inter exponendum, quæ contingunt valentibus ijs, qui subito consuetudinem permittauerunt, sermonis summam obiter atq; veluti appendicem adiecit, cuius gratia omnia hæc exponit, quæ sanis contingunt. Nempe, ut constat, si bene valentibus victus dimidiatæ diei permutatio adeo molesta sit, quo modo non admodum languëtibus ipsis molesta erit? Deinde rursus ad explanationem eorum, quæ sanis contingunt, reuertitur in sequenti dictione, quæ ita habet.

- 27 Qui igitur præter consuetudinem semel pastus toto die exinanitis vas, quantum consuevit, cœnauit, si tunc impransus laborauerit ægre q; habuerit, atq; assumpta cœna tunc grauatus fuerit, multo magis eum grauari par est. Quod si adhuc plusculus horis venæ exinanitæ fuerint, atque repente cœnauerit, magis adduc grauabitur.

Quod ait huiusmodi est. Si, qui præter consuetudinem impransus permanens minus consuetu cœnauerit, nocte grauetur, multo magis grauabitur, qui solito plura est cœnatus. Qui autem plusculo tempore exinanitis vas repente cœnauerit, magis adhuc grauabitur. Nempe, qui impransi præter consuetudinem permanent, horum alij ad minus temporis inediam protendunt, alij ad longius interuallum: hos igitur grauari adhuc magis ait.

- 28 Quibus igitur præter consuetudinem venæ sunt inanitæ, ij eodem die veniunt reficiendi. Vitent in primis frigus, calorem, & laborem: nempe hæc omnia moleste fiuntur. Deinde cœnam solito minorem faciant, eam q; non siccam sed humentio rem: deinceps bibant, neque dilutum, neq; minus, quàm ingestorum ratio postulat. Postero autem die pauca prandant, ut accessione *ἐν ἀποσάργωσις* crescente, ad consuetudinem redeant.

* μεταδεν
νίστεν, i. post
cœnauerit, q;
i imprecis, et
multis manu-
scriptis cod. in
aliquibus autē
μέγα δεινόν
στεν, i. capio-
se cœnauerit.

Uteorum, qui præter consuetudinem pranderunt, detrimenta emendauit: sic & eos, qui, quod semel duntaxat die præter consuetudinem ederunt, afflicti sunt, vult in primis vitare tum calorem, tum frigus, tum labores: hæc nempe omnia moleste ferri ait. Adde, quod & minus solito cœnare ipsos iubet: quanquam pleriq; maxime contra agant. Nam prandere ob negocium aliquod prohibitos volunt in cœna & eam, quæ in prandio omissa est, assumere alimoniam, haud scientes quod eget quidem vere alimonia omissa corpus, sed ipsam conficere non possit ventriculus ob longiorem abstinentiam læsus. Quin etiam Hippocrates, ut alimoniam minus vult exhiberi, ita & eam humidiores. Nempe huiusmodi alimonia exiccatis tum ventri tum corpori vniuerso peculiare auxilium præstat. Roborare præterea & ventrem ipsorum iubet vini potu, neque dilutum, neque minus, quàm cibi proportio exigit, potandum præcipiens. Dilutum enim, ventris tonum seu robur exoluit: minus verò, quàm cibi proportio expostulat, ventri arefacto inhabile existit. Postero tandem die ita affectos victui prospicere iubet: qui Hippocratis præcepto consuetorum ciborum minus ingerere debeant: ut *ἐν ἀποσάργωσις*, id est senlim paulatim q; in pristinam redeant consuetudinem.

- 29 Talia vero molestius ferunt, qui parte superiore picrocholi existunt.

Iam & ego paulo ante dixi picrocholos, id est amare bilis homines, subitariam eam, quæ à victu ad abstinentiam fit, digressionem pituitosis difficilius molestiusue ferre. Bilescit liquidem Docys his totus tum corporis tum ventris habitus. Sed quare non simpliciter dixit picrocholi, at parte superiore? Nempe, cum flaua bilis, quam & pallidam & amaram nominant, superiori supernatat ventri, iure optimo tales parte superiore picrocholos dicimus: cum vero per sedem demittitur, parte inferiore picrocholos asserimus. Paulo liquidem rethori, qui toto corporis habitu pituitosus erat, diebus singulis supernatabat flaua bilis, primam q; ipsam vomebat à lauacro non paucam. Eudemo autem philosopho, qui temperamento biliosus erat, per sedem demittebatur: raro q; is (quanquam aliquando) pallidam vomebat bilem. Ut autem Pauli excrementa bilis exiguum habebant, ita & Eudemi multum. Qui igitur præter consuetudinem non prandent, si & toto corporis habitu, & superiore ventre, picrocholi fuerint, his necessario contingunt, quæ paulo ante dixit omnia. At, qui ventre duntaxat superiore picrocholi existunt, his tolerantia difficultas similiter continget: sed ex reliquis symptomatis alia quidem nullo pacto erunt, alia erunt quidem, sed moderatiora. Prædixit quoq; & eos, qui præter consuetudinem non prandent, timidos ad quamuis operationem esse, stomachi erosionibus, hoc est cardialgijs, affici, pensilia videri ipsis viscera, calidum & viride meiere, exuri q; excrementa: alijs os amaricare, oculos cauari, tempora palpitare, & extrema perfrigere. Sed horum alia toto habitu picrocholis contingunt magis, alia autem superiore duntaxat ventre talibus. Atq; ob id ad quamuis operationem timiditas, extremorum

*At. amaritudi-
nem.

extremorum perfrictio, mictus calidus viridis q̄q̄, deiectionum adustio, cautio oculorum, & ten-
porum saltus, toto habitu picrocholis vsu eueniunt. Vtriusq̄ autem pensilium viscerum opinio, et
oris amaritudo. Nam ob insuetam abstinentiam, tum suspensa tum pendula percipiunt viscera,
Verum ob bilis exuperantiam picrocholis toto corpore os amaricat: non q̄ affectio in ore magis
fiat, sed q̄ sentiendi partem eam natura generis humorum discretoriam fecit. Venter autem ma-
gis quidem ijs exurit, quibus ex hepate in ventrem bilis effusa supernatat: minus autem, qui-
bus deorsum mittitur. Nam his quidem intestinum proritat ad excretionem, illis vero stomachū
mordet. Ob eam rem Eudemus diebus singulis, bis & interdum ter deijciebat: Paulus autem in-
terdum nullo pacto exercebat. Nisi etenim intestina à mordente aliquo iritentur, vel copioso
excremento grauentur, excretionis promptitudinem non accipiunt. Neutrum horum impran-
sis contingit, neq̄ enim mordentur intestina bile in os ascendente, atq̄ illa non mordente contri-
stante q̄q̄: neq̄ grauitas his fit, qui nullo pacto comederunt.

30 Non assuetam autem cibi abstinentiam facilius omnino ferunt, qui parte superiore pituitosi sunt. Quo fit, vt, si
τὸ ὀνίταν. semel die cibo vtantur, facilius etiam ferant.

† In manu-
scriptis legi-
tur τὴν ἀσ-
θιαν καὶ τὴν μο-
ροσότητα, i. ci-
bationis absti-
nentiā, & ci-
bationē semel
die factam.

Prius quidem parte superiore picrocholos vsu cibi, qui semel die sit, difficiliter tolerare dixit. F.
Nunc autem ad pituitosos se, transferens, pro cibi vsu qui semel die sit, inedia meminit, ex haben-
te manifestius detrimētum, ad minus noxium, translationem ex proportionem faciens. Nam, si ma-
gis quidem lædi eos, qui sine cibo totum præter consuetum permāserunt diem, equum sit, minus
autem, qui non prandent: & pituitosi picrocholis cibi vsu, qui semel die sit, facilius ferant: q̄ sa-
nè & inedia facilius ferant, palam est omnibus. Causa autem, cur pituitosi facilius † cibi vsu,
qui semel die sit, ferant, ex ijs, quæ antea de biliosis dicta sunt, euadit conspicua. Nam bilis hu-
mor in ipsis inedijs amarior redditur: pituita vero temporis processu coquitur, sanguis q̄ effici-
tur, neutra bile in sanguinis substantiam redire valente: cum ex sanguine quidem plus calfacto fla-
ua bilis generetur, ex eodem vero affato atque etiam ex crasso atra. Pituita autem generatio in pi-
tuitosis edulij sanguinem perpetuo antecedit: atq̄ generatione ipsius media cibi in sanguinem
transeunt. Neq̄ hoc deterioribus tantum cibis contingit, verum & quibusdam eorum, qui salu-
bres admodum esse videntur: vt panī, chondro, semidali. Ego sanè eam, quæ mihi optima esse vi-
detur, enarraui conscriptionem. Nempe, quod in ea docetur, per se verum est: atq̄ continuatam
cum ijs, quæ ante dicta sunt, habet seriem: qui optimæ explanationis sunt scopi. Non tñ in exem-
plaribus omnibus continilem inuenies descriptionem, sed in alijs & alijs pugnantem. Cæterum G
aliter in libris ferè omnibus reperitur dictio hæc falso sermone, & nullam, quæ antedictis conti-
nueretur, seriem seruare.

31 Potissimum sanè & hoc argumentum, quod maximæ mutationes eorum, quæ circa naturā nostram habitum quæ
contingunt, maxime morbos committunt.

* Sed est in im-
pressis, sed in
aliquibus ma-
nuscriptis legi-
tur τὰς, id
est præter.

Μulta quidem apud Hippocratem φύσις, id est naturæ, nomen indicat: sed hoc in loco tem-
peraturam significari quispiam existimauerit, veluti et partium ipsarum structuram compositio-
nem q̄q̄, & ἔξω, id est habitum, appellari: quo in structuræ genere continetur & bilis ad partes supe-
riores fluctuatio, & ad inferna deiectio, & viscerum tum suspensio, tum constantia stabilitas que.
Nempe, cum venter magnus existit, viscera cōfirmat & stabilit, tametsi cibis vacuus destitutus q̄q̄
fuerit: verum, cum parvus est, cibis quidem refertus confirmat, vacuatus vero subsidentia relin-
quit: hinc fit, vt suspensa sentiant viscera. Quibus autem bilis flaua sursum natat fluctuat q̄q̄, ante
est dictum, meatu, qui bilem ipsam ex hepate ad id intestinū, quod Græci ἐκφυσιν vocant, {qua-
si è ventre enatum dixeris,} defert, structuram differentem habente. Nam interdum quibusdam
portio aliqua ab ipso ad ventrem procedit: his quidem supernatat biliosum excrementum: cæte-
ris vero deorsum omnino voluitur.

32 Non igitur intempestiue, neque fortes vasorum inanitiones moliri: neq̄, cum morbi vigent, feruorem q̄ habent,
cibum dare: neque repente huc vel illuc in toto negotio quicquam mutare licet.

Dictio hæc præter ordinem scripta est, copulari siquidem debuit cum ea, quæ scripta est ante:
vt tota oratio talis foret: Talia vero molestius ferunt, qui parte superiore picrocholi existunt. At
non assuetam cibi abstinentiam facilius omnino ferunt, qui parte superiore sunt pituitosi: quo fit,
vt cibi vsu, qui semel die sit, facilius etiam ferant. Non igitur intempestiue, neq̄ fortes vasorum
inanitiones moliri: neq̄, cum morbi vigent, feruorem q̄ habent, cibum dare licet. Nam, postea
q̄ sermonem, quo magnas victus mutationes ostendit sanos ipsos, non quo modo languentes, le-
dere, compleuit absoluit q̄q̄, iure intulit, cuius gratia mentionem de his omnibus fecit, inquiring,
Non igitur intempestiue, neq̄ fortes vasorum inanitiones moliri licet. Quanquam autem & in-
stitutum etiam per relata sufficienter demonstrauerit, videtur tamen & ad alterum transire ser-
monem, qui hæc cōmonstret, ex abundanti testimonijs vsus. Principium igitur sequens sermo-
nis iure censetur dictio hæc, Potissimum sanè & hoc argumentum, q̄ maxime mutationes eorū,
quæ

A qua circa naturam nostram habitum q̄ contingunt, maxime morbos committunt. Cui quidem dictioni continua fuerit, quæ ita sequitur: Multa autem his germana, eorum, quæ venturæ contingunt, atq; alia quis dixerit. Dictionem fanè hanc sum explanaturus: sed nunc ad præsentem reuertar, quæ hanc habet mentem. Non intempestiue neque vehementer tamen necare, neq; in morborum consistentijs victum ex inedia ad cibi oblationem permutare licet, licet ne iustitiam contrarium. Ex quibus sequitur talem instituendam victus rationem, qualem is præcepit. Sûma autem horum est, declinandas esse subitas repentinas q̄ ad contraria permutationes.

33 Multa autem his germana, eorum, quæ Ventri consingunt, atque alia, quibus diuenter: et exempli gratia, Cilos, quibus uti consueuerunt, facile ferunt, tamen si natura haudquaquam boni fuerint: similiter & potus. Et ut vero, quibus uti non consueuerunt, etiam si mali non fuerint, moleste ferunt: conijuncta morio & potus.

Quæ similia existunt, atque, ut quispiam dixerit, genere admodum iuncta cognata q̃; consuevit vocare Hippocrates ἡδελφικῶς, id est germana: q̃; eorum, quæ genere iunguntur, & familiarissimi & genere omnium iunctissimi sunt ἀδελφοί, id est germani. Nam propinquitates cæteræ his posteriores sunt, ut patrum matrum q̃; fratres sorores q̃; & fratrum sororum q̃; n̄h̄ n̄h̄e q̃; & B quæcunq̃; id genus sunt. Cætera dictionis clara sunt. Nam demonstrat Hippocrates sermonem eundem, quem ab initio demonstravit: cuius summa est, Consuetudo maxime potest: repentina q̃; ab ea digressio corpora non parum offendit.

34 Si ergo multa præter solum carnis deuoratio, vel allia, vel silphion, vel ipsius succus, vel caulis, vel alia consimilia, quæ scorsum insignibus sunt prædicta uerbis, Vetriculis quicquidam magis, quam alia labores inferant, minus quis admirabitur. ^a At uiræ admodum, si didiceris, quantæ Maza turbatione, tumorem, flatum, tormina q; mazam deuorare non assueti patiatur, si præter consuetudinem ingesta fuerint. } Vel qualem Panis ipsi calidius deuoratus situm inferat, & repentinam plenitudinem, quod in eueniet, tum tardi descendat: Et quam uaria inter se patiuntur panis omni confusa nei q; panes, si præter consuetudinem deuorantur: & maza similiter vel arida, vel humida, vel tenax: qualiter item & potenter afficiant, recentes quidem eos, qui recentibus uini non consueuerunt, & alii eos, qui recentibus ex consuetudine uisunt: Ad hæc quid faciant Vini, & Aquæ potationes præter consuetudinem in aliud subito translatæ: quid dilutum item Vinum, meracum q; ^b repente pota: dilutum enim cum infirmitate humentem reddit Ventræ superiorem, flatuosum q; inferiorem: meracum vero Venarum palpitationem efficit, capitis q; grauitatem, & sitim infert: Præterea quid Vinum album nigrum q; præter solum mutata: quæ siambo Vinosa fuerint, ualde alterant corpus. Quare dulce Vinosum q; minus quis dixerit mirum esse non idem posse, ubi repentina fuerit mutatio.

Sermonis totius sensum intelligentiam q̄; vbi prius dixerimus, ad particulares, quæ in eo sunt, dictiones perueniemus. Orationis igitur totius sensus talis est: Victus mutationem in eos, qui insigni præditi sunt virtute, tum cibos tum potus, nemo, qui ledentem corpora viderit, admirabitur: verum eam, quæ fit neq; sine læsione in cibos potus q̄; non insigni præditos virtute, iure quoq; admirabitur. Talis quidem est sermonis totius intelligentia. Sed, vt particulatim dicam, orationis totius principium mentionem eorū facit ciborum, qui fortem vehementem q̄; habēt facultatem, vt carniū deuorationis, alliorum, silphij, succi eiusdem, & caulis: nempe silphium totū fortem habet facultatem, sigillatim q̄; succus ipsius, & caulis. Verum hæc quidem simpliciter dixit, sed cū carniū deuorationis meminīt, adiecit hoc verbum, multa: nempe multa carniū deuoratio magnam habebit facultatem, mediocris vero nō magnā. Quæ huic succedit dictio, ad eos accedit cibos, qui non magna cōstant virtute, mazam videlicet, & panē vel calidum, vel frigidum, vel syncomilton, id est confusaneum. Quod vero panē non purum syncomilton appellet, constat & ex eo, quæ ad purum est, oppositione: panē hunc homines huius tēporis autopyron appellant, non discreto s. iurfuraceo, sed vnā cum syncera pura q̄; farina macerato consperso q̄;. Post hæc de potulentarum differentia mentionē fecit, recentes q̄; vocauit ποτανας. Ionum voce vsus & antiquorum. Memorauit postea & vini & aquæ potationes præter solitū mutatas: meraciore item & dilutiorem potū. Quibus adiecit dilutū vinum in vētre superiore *μελας*, i. humiditatē infirmitatem q̄; facere, flatum q̄; in inferiore: meracū vero palpitatiōē *κατὰ* temporū, capitis grauitatē, & litim, id q̄; caliditate: dilutū aut cōtraria, tum humiditate tū frigore. Mentionē quoq; & de vinorū ipsorum differentia fecit, ex his oībus colligēs, quod in vniuersum ab initio ipli propolitū institutum q̄;, oēm s. consuetudinis subitā permutationem non paruum corpori afferre detrimentum.

35 Caterum partem hanc sermone cōtrario transgredientes, id est iuvare oportet. Nempe his uictus mutatio facta est, corpore neq; ad robur, ut cibos adyccere, neq; ad infirmitatē, ut cibos diminuire oporteret, haudquaquam permittito.

Verbum hoc *τιμωριῶν* opitulandū siue iuuandū indicat. Neq; aut opitulatio alia sermoni huic fuerit prater patrociniū, q; vera loquitur. Nempe, cum ex duobus sermonibus vnus ipsi pla cuerit, alter vero huic aduerset: & ei quidē, qui placuit, hucusq; est patrocinator: nunc ad alterius patrociniū descendit: cuius sententiā quis conuenire dixerit, ut languentes ab insigni victus mu tatione iuuentur, quādo & corporis affectio in contrarium his quidem, qui antea sani viuebant, nunc vero egrotant, permutata sit. Sanē & in huius sermonis gratiam vniuersaliter antea est lo

• A! praxer.

[illegible]

B. praeier cō
suetudinem.

С. Т. Венеръ,
адъютантъ въ ан-
тихвост.

† At. si modica
a. p. nō modicū.
Supra. l. 18.
Supra. l. 32.

cutus his verbis: Transmutatio autem bene habet † non modica: † sed ὁρθῶς, i. recte, transferenda venit. Deinde, quid aduerbiū hoc ὁρθῶς indicet, non paucis ostendit, sed ad summam subducens colligens q̄ dixit, Non igitur intempestiue neq̄ fortes valōrum inanitiones moliri: neq̄, cū morbi vigent feruorem q̄ habent, cibum dare: neq̄ repēte huc vel illuc in toto negotio, quicq̄ mutare licet. Quare & ambiguitatem soluere iam anticipat, quam nuper enunciauit sermoni consentiens. Adjiciet q̄ in praesentia aliquid, cum inquit, Conijcere autem oportet & robur, & morbi cuiusq̄ modum, & cætera quæ his succedunt: quæ in sequenti dictione explanabo.

36 Conijcere autem oportet & robur, & morbi cuiusq̄ modum, hominis item naturam, atq̄ ægrotantis in victu cōsuetudinem, non in cibo solum, verum quoq̄ & in potionibus.

Conuenienti in acutis morbis victus institutioni, quam docuit, & roboris cōsiderationem, & morbi modum, præterea & hominis naturam, consuetudinem q̄ ipsius, adijcere iubet Hippocrates. Nempe summa, quā astruit, est, Non permutandū esse victus speciem prius, q̄ signa cōctionis manifesta sint: id aut̄ fiet, si, quot diebus ad vigorē morbus venturus sit, præcognoueris. Verum, cum victus, quem manifestabo, pro maioris minoris uel ratione permutari possit, q̄ laborātes inter se differant virtutis tum robore tum infirmitate, naturali item temperamēto, & morbi modo, F atque antecedente cōsuetudine, si ad ea respexeris, poteris artificiose tum magis tum minus in specie victus conijcere: {speciem victus intelligo,} si videlicet vel oxymelite, vel melicrato, ægrū regere debeas: aut solā aquam bibendā aduq̄ cōctionis notas dare: aut ptīllanā, aut ptīllanæ solum cremorē: deinde si his & semel die. In victu ergo tum magis tum minus per ea, quæ dixit, conijcere oportet. Nam, si ægrum ptīllanæ cremore indigere cōperias, iam tibi cōstat, quantum de eo sis propinaturus: cōsimili modo de oxymelite, melicrato, & aqua. Verū, quemadmodū ad speciem victus inuentionē, operæpretiū est, ut cognoscas, an robusta vel infirma sit laborantis facultas, quot item diebus morbi cōctio futura sit: sic & considerandū, quantū vel robusta vel imbecilla fuerit, nempe in virtutis tum robore tum imbecillitate magis & minus valde discrepāt. Sic morbi quoque differentias conijcere oportet. Neque enim satis est cognoscere, quod pleuritis, vel peripneumonia sit, sed &, qualis nam ea sit, cognoscere oportet in dolore, febre, & sputis. Nempe pleuritidum, quæ cū dolore sunt, aliæ quidē magis, aliæ vero minus, tales existunt: febrem q̄ vehementem habent tum magis tum minus particulares pleuritides. Sed non parua quoque est in ijs, quæ expuuntur, differentia, ut in prognostico est dictum. Cū igit̄ particulatum in dictis differētis variēt ægri, fieri nequit, ut in Empiricorum appellatis syndromis reperiatur disciplina. Neq̄, n. eorum, G qui in virtute comperiuntur, excessuum differentia scribi possunt, neq̄ febris vehementia, neq̄ sputorum quantitas, neque in particularibus coloribus dissimilibus q̄ educationibus magis minus q̄. Verum cuiusq̄ rei virtute intellecta, oēs inter se cōparare, summam q̄ vnam ex ipsis colligere oportet. Qua quidē in re tum meliores tum deteriores reperiūtur medici, quanq̄ eadem didicerint. Nempe, qui perspicaci magis pollent ratiocinio, ijs, qui hebetius habent, euadunt probatiores: laboris item amantiores segnioribus, exercitatiores q̄ minus exercitatis: atq̄, qui memoriam tenaciorem habent, ijs, qui minus ea valent. Ex particularium igitur oīum virtute colligere in vnam summam vniuersā victus formam singulorum q̄ ciborum quātitatem cōmodius est. Nam imbecillitas sæpius quidem, sed paulatim cibādum indicat: fidem quæ rei huic facit, q̄ æger bis cibari fuetus sit. Facultat̄ aut̄ robur contrariū indicat: nam, si in homine semel cibari fuetō videatur, semel ipsum cibare oportet: quod indicant ambæ coniecturæ. Sic & corpus bene distillabile ad cibationem stimulat: quod ægre distillatur, ad contraria agit. Quod item tenues habet succos, id cibandum indicat: quod his non constat, contrarium comonstrat. Atq̄ in singulis, quæ dicta sunt, magis minus q̄ proportionaliter sibi & auxiliōrū vsum tum auget, tum remittit. Sed de huiusmodi, omnia in methodo medendi deinceps & ordine ita exarata sunt, ut tum citissime H cōdiscere, tum facillime ad memoriam reuocare possis: fieri siquidem nequit, ut libro vno præsentibene omnia scribat Hippocrates, atq̄ ordine doceat: præcipue q̄ cū ipse primus horū inuentio nem sit molitus. Qui tñ hæc ab Hippocrate tum transuersim tum inordinate scripta didicerit, totam q̄ suam vitam in eam, quæ ex operibus docetur, meditationem exercitationem q̄ deuouerit, is & lucem & ordinem doctrinæ adijcere poterit. Quod si & pluribus libris fecerit, quanta futura sit claritatis eorum, quæ docentur, exuperantia, liquido patet. Nemo ergo animo despondeat, si hoc in loco confundatur, scoporum multitudine affatim circūseptus. Nam si, q̄ particulatim horum vnumquodq̄ a nobis in methodo medendi demonstratum sit, intellexerit, atq̄ ad illam trāslatus sedulo singula didicerit, ea sanē, quæ nunc inordinate dicuntur, liquido cognoscet: speculationem q̄ in ipsis artis operibus exercens, veritatem ipsius laudabit.

37 Ciborum autem adiectioni intendendum multo minus: nam subtrahere omnino, sæpenumero expedit, ubi æger sufficere possit, donec morbi vigor maturuerit.

Quoniam victus cuiusq̄ species ex ijs, quæ antea dixit, inuenitur: atq̄ inde, quæ in ante scripta dictione dicuntur, conijcere operæpretium sit, ut in singulis victus formis quantitas reperiatur: præsentī

A præsenti dictione /ciborum autem adiectioni intendendum multo minus: nam prorsus subtrahere, sæpe numero expedit/ cognoscens prælidorum singulorum quantitatē artificiosa egere coniectura: artificiose autem conijcere viri esse, qui vires omnium, quæ in arte sunt, didicerit, memoriz mandauerit, atq; diligentia omni adhibita sese in operibus artis exercuerit: paucos q; tales existere: lure optimo, quæ præsenti, inquam, dictione dicuntur, adscripsit, in quantitate ipsa ad id, quod minus sit, procedendum esse magis, q̃ ad id, quod exuperat, vbi quis à iusto modo abscedit, admonens. Nempe, quod plus est, noxas interdum inemendabiles facit: quod vero minus est, facile emendatur. Nempe, si virtus labascere videatur, cibi exiguum ministrare possumus: verum, si in ventrem absorptus fuerit cibis, quod superfluit, si alias, multo magis in acutis morbis tollere est difficile. Nam prorsus subtrahere, sæpenumero expedit, vbi æger sufficere possit, donec morbi vigor maturuerit. Rursus præfatæ dictionis partem hanc ^a allumpit, nos familiaris huius scopi admonens, qui tum hic, tum in Aphorismis habetur: ^b Nempe, si æger ad morbi vique vigorem sine cibo sufficere posse videatur, in omni ciborum abstinentia eum & potu solo moderaberis, cum tibi videbitur necessitas.

38 **B** In quibus autem id faciendum sit, scribetur.

Quod prædixerit Hippocrates commonstrata vniuersali victus ratione in hoc libro se transi-
turum ad cæteras omnes acutas ægritudines, liquido constat. Verūtamen ^c opus huiusmodi non
reperitur. Nempe, quæ in hoc libro à balneorum consideratione ^d extant, siquis, veluti in typo, ab
Hippocrate scripta, qui sibi hæc ad rememorationem præparauerat, in domo reperiens post viri
mortem deprøpsit, forsitan ratione quidem hoc fecit, verūtamen vt libër, digna Hippocratis men-
te non sunt: sicuti neq; ea, quæ de morbis & affectibus inscripta sunt, quanquam multa in ijs be-
ne scripta sint. Sed super ea re in ijs, quæ in ea scriptæ sunt expositiones, disceptabimus.

39 Multa autem & alia ijs, quæ dicta sunt, germana quis scribere potest.

Rursus ad eum reuertitur sermonē, quem multis certū ratum q; fecit exemplis, mutationē cō-
suetudinis languentibus noxam asferre demonstrans: sed, qm̃ à sanis in eos transijt, ^e ob id, quæ
similia sunt & congruentia bene, ^f *ἡ δὲ λείψωρα* i. germana dixit. Quod aut postea dicturus est, ser-
monis huius testimoniū existit, quanquam nō simile, non cōgruēs, nec germanū, vt ipse appella-
uit, sed id quod peruestigat. Patebit aut tibi mens Hippocratis in sequētis dictionis expositione.

40 **C** [†] Hoc autem verius efficacius q; testimonium. Neq; n. rei, de qua plurimus factus est sermo, germanū existit,
sed res ipsa commodissimum est documentum. Nepe quidam per morbi ^g acuti exordia eodem, quo laborare cœperunt
die, comederunt, alij postero die, alij quidvis, alij cyceonem sorpservnt. Sanē hæc omnia deteriora quidem sunt, quā
si modo alio cibaretur quis: sed, quæ hoc tempore peccata fiunt, ea minus multo ledunt, quā si primis quidem diebus,
vel duobus vel tribus vasa quis integre exinanierit, mox quarto vel quinto talia ministraverit. Adhuc tamē dete-
rius erit, si omnibus his diebus vasa ante exinanierit, & sequentibus diebus ita pauperit prius, quā morbus matu-
rus reddatur. Nempe hoc pacto mortem plurimis liquido affert, nisi morbus omnino beneficus fuerit. Quæ vero in
principio committuntur delicta, ea non similiter his, domantibus renituntur, sed facilius domari possunt.

Ante ab ijs, quæ bene valentibus ex consuetudinis mutatione contingunt, ad languētes ipsos
per similitudinem transijt: transiturus aut & nunc, atq; ipsum, quod nunc instituitur, ferē ita ha-
bere est demonstraturus. Sed quid nam id fuit? sanē q̃ neq; à principio neq; primis diebus fame
cruciatos ægros, cum prope vigorem iam peruenerint, replere oportet. Tota autē dictione vult
ostendere grauiorem cōtingere ægris offensam, cum prope vigorem erratum sit, q̃ si in morbo-
rum principiis quippiam delinquatur. Inquit enim, Quæ hoc tempore peccata fiunt, ea minus
D ledunt, quā si primis diebus, duobus vel tribus, vasa quis integre exinanierit, mox quarto vel
quinto talia ministraverit, ^h atq; etiā ante, q̃ morbus (vt græco verbo inquit) *ἡ δὲ πείρα* red-
datur. Quod *πείρα* appellet *πείρα* i. quod ad maturitatem est perductum, palām est
omnibus. Morbos præterea *εὐνίθεις* i. beneficos dixit, non quidem maleficos morosos q; quos
Græci *κακόνθεις* vocant, sed *εὐπείρας*, i. qui facile ad bonum vergunt. Scimus etenim veterū mul-
tos ita vt dictione, ita quoque & Hippocratem, vt alibi est dictum.

41 Hoc sanē maximum reor esse documentum, quod primis diebus quavis sorbitione nequaquam eos priuamus, qui-
bus futurum est, vt paulo post sorbitionibus quibusvis vti debeant.

Sermonem hoc in loco eundem dixit, quem sæpius antea enunciauit, nutrire scilicet sorbitio-
nibus ab initio præcipiens eos, qui ad vigorem vsq; sufficere citra pristinæ ingestionem non pos-
sunt. Nam eos prope vigorem nutrire compellemur, cum ad tenuiorem victus formam, etiam si
antea plenius cibati fuerint, transcendendum sit.

42 *Πυθμυρὸν* ergo, qui hordeacea vntur pristinā, quod ægri ledentur, ignorant, si duobus vel tribus diebus antea
exinanitis vasis sorbere incipiant: neq; etiam, qui solo vntur cremore, quod sorbetes ledentur, intelligunt, cum sorbi-

A *ἀνέλας*,
sed forte *ἀνέ-
λας*, i. assum-
pti vt sic verta-
tur. præfatæ di-
ctionis partem
hanc rursus al-
lumpsi, vt qui
velim ad me-
moniam reuo-
care familiarē
hunc sibi scopi
pū & hic & in
aphorismis. &
ita videt̃ leg̃ de
vetus iterpres.

B *1 Apho. 9.*
Ex. ord. 4 g.

C *οὐ γὰρ αὐ-
μα.*

D *ἀποκρί-
σις. seu legen-
dum est ut in
antiquis ἀπο-
κρίσις. i. est
adiecta sunt.*

E *† Al. ex
antiquis, ob id
ἡ δὲ λείψωρα,
i. germana di-
xit, per germa-
na similia in-
telligens.*

F *† Al. ex
antiquis. Hoc
tamen melius
est testimonium.
Neq; enim so-
lum germanū
est rei, de qua
plurimus mihi
factus est ser-
mo, sed res ip-
sa et cætera.*

G *† Hæc ad-
denda ex anti-
quis cod. græ-
cis. Adhuc ta-
men deterius
erit, si omnib;
his diebus va-
sa ante exina-
nuerit, & se-
quentibus die-
bus ita pau-
erit, priusquam
morbis ingra-
uatus sit.*

tionem non recte inchoabunt. Sed tunc cauent, magnam quæ; intelligunt læsionem, si æger ante mutationem morbi pristinam hordeaceam sorbeat, cremore uti solitus. Omnia igitur hæc magna testimonia sunt, medicos non recte egrotantes ad victum inducere, quippe qui et in quibus morbis non oportet vasa exinanire, ijs qui sorbitionibus cibari debent, vasa exinaniant; & contra, in quibus ex vasorum inanitione ad sorbitiones transeundum non sit, in illis transeant.

Aduerbum hoc παντὶ, vel παντελῶς, id est omnino, vel ἀρχῇ, id est ab initio, Hippocrati indicat. Nam medicos ignorare ait, quando primum vel pristinam vel cremorem egrotis dare oporteat: bene tamē scire, si ante morbi coctionem pristinam hordeaceam dederint, se ægrum læsuros. Sequentem autem dictionis huius seriem, quæ eadem ex eisdem sæpius dictis ostendit, de industria ob claritatem transgrediar.

43 Et plerumque ἀπ' ἀρχῇ, id est exquisite. Interdum autem hoc tempore, interdum & alio, ex vasorum inanitione ad sorbitiones transeunt, ubi sæpius a sorbitionibus ad vasorum inanitionem transire expedit, si ita ex morbi acerbatione contigerit.

Hoc aduerbum ἀπ' ἀρχῇ & apud auctores atticos, & apud Hippocratem, est in usu pro ἀπ' ἀρχῆς καὶ ἀπ' ἀρχῆς, id est exquisite & absolute. In quo significatu & nunc est usus Hippocrates, demonstrare volens medicos in illo maxime tempore permutare victus rationem ex abstinentia cibi ad sorbitiones, quo ad abstinentiam accedere oportet: atque hinc manifestissime ostendens, cum morbi vigor adest, tunc tenuissimo de necessitate victu esse utendum.

44 Interdum autem & cruda tum a capite tum a thoracis loco attrahuntur biliosa: vigilæ quæ; his accidunt, ob quas non coquitur morbus: peritistes quæ; & amari hi sunt, desipiunt, incerti & discurrentes lucis splendores oculis obijciuntur, aures implentur sono, frigent extrema, vrina crudefcunt: spuma tenuia sunt, falsa, colore sincero, & exigua: sudores circa collum, anxietates inquietationes quæ; & spiritus offendens, in ea quæ sursum sit, aeris latione, frequens, vel valde magnus: supercilia quadamtenus amplificantur, deliquia animi sunt, vestium a pectore reiectiones, manuum tremor, atque interdum labij inferioris concussio.

† ὁρῶντες δὲ τοὺς μετέχουσιν, supercilia grauitate participat.

Vniuersa hæc contingere ijs ait, qui perperam cibati sunt a medicis: qui primis diebus exiccatos egros, die tertio vel quarto vel quinto vel sexto repente ad edulia non peracto morbi vigore permutauerunt: quasi peractio morbi vigore, conuenienter eos victum permutasse dicat. Quod igitur dicebat, Permutare quidem oportet sanorum victum in morbis, neque tamē temere id agendum, iam patere ex predictis arbitror. Nempe, cum vna quidē corporis conditio salubris sit: altera, quæ a morbi initio ad itatum usque extenditur: mox & tertia, quæ ad perfectam usque morbi solutionem sese prorogat: deinde & quarta, quæ totius conualescentiæ tempus ad usque sanitatis habitum occupat: in nulla harum quatuor conditionum permutationes victus insignes facere oportet, nisi prius in alteram conditionis speciem peruentum sit. Qui igitur egros morborum exordijs in omni ciborum abstinentia seruant, si ad vigorem usque talem victus speciem seruare possint, ne mo eos culpauerit: quod si facere non possunt ob interlabentes ægrorum vires, quæ perperam inedia vtantur, ὁρῶντες δὲ πάντες, id est exiccantes egros, palam est oibus. Hoc autem verbo abstinentiæ importunitatem plus iusto corpus exiccantem euidenter demonstrat: ubi etenim, quo tempore prope vigorem tenuius cibandum fuit, in eo cibum dare coacti sunt, quæ ægros abstinentia immoderate exiccauerint, est manifestum, quod vocatur ταχεύειν. Ob id igitur modo cibandi huic succedere ait symptomata multa, & praua: quæ omnia continuata recenset serie a biliosis crudis exorsus. Nempe biliosa cruda ita appellauit, quoniam & excrementorum coctionem appellat, quantū mutata nutrire non possunt, ut bilis utraq; & qui græce ἰχθῆρες dicuntur. Veruntamen, quoniam & talia euincit natura, cocta quidem vocare consuevit Hippocrates excrementa huiusmodi, quæ a natura ipsa euicta sunt: cruda vero, quæ non sunt euicta. Ob id & pus in phlegmonis, quæ concoquuntur, fieri ait, quantū pars nulla ex pure alimoniam accipiat, veluti accipit ex crudis appellatis humoribus & pituita: quæ reliquum perfectionis affecuta & prorsus cocta, corpus nutrire possunt. Sic igitur biliosorum humorum concoctio existit, ut sanguinis, qui in phlegmone est, in pus migrantis, intelligentibus nobis coctionis nomen in suo vniuersaliore significato. Est autem vniuersalius, cum natura causis fortior fuerit, permutauerit que eas pro suo robore. Quæ igitur, veluti in corpore inanimato, putrescunt, nihil ad permutationem conferente innato calore, a concoctionis ratione degenerant: hoc sanè aliquando contingit etiam aquosis ijs ichoribus, qui per vrinas excernuntur: atque ob id incoctas vrinas concoqui dicimus, quantū corpus ex coctis vrinis ali non possit. Generali præterea hoc concoctionis significato vtimur, cum vel catarrhum, vel coryzam, vel fluentes ex his ichoras, vel eos qui ex oculis manant, aut incoctos aut coctos esse dicimus. Ad hunc modum & bilē vel crudam, vel incoctā, vel coctam esse pronunciamus. Cruda quidem flaua admodum est & acris & male olens: cocta autem & pallidior & minimū male olens. Bilem igitur incoctam ait ad venterem de necessitate confluere, quæ ob prauam victus rationem tum ex capite, tum ex thorace trahitur, id quæ cum fame ægros necant, nullo vtili solatiū ventri præstantes, atque cum ex inedia ad validos cibos prope vigorem intempestiue transeunt.

Recenset

A. lib. 4. f. 1. c. 8. fol. 420.

A Recenset deinceps & symptomata alia, quæ prauam ob victus rationem oriuntur, In primis quidē vigiliæ, quæ longā inediā, cibos q̄q̄ intempestiue exhibitos consequuntur, quæ vtroq̄q̄ noīe medicorum culpant victus rationem. Quod autē vigiliæ morbi aplepsia i. incoctio seu cruditas consequatur, manifestū sanē existit, si somnos concoctio sequi debeat. Ceterū pertristes, inquit, fiunt tū ob longā inediā, tum ob validū repentinū alimentum, quo grauat venter, grauat q̄q̄ lāguīdos reddit & mœstos. Adde, q̄ & amarus fieri ait, quippā manifeste præfato consimile aditruens: vt enim sunt, qui ex melancholia tum languidi tum mœsti sunt, sic alij quidem sæpius acriter ex can descūt, tanq̄ collecta in stomacho bile. Vel sanē, cum amarus fieri ait, eam, quæ in ipsorum ore ex tali bile fit, amaritudinem indicat. Delipientiæ & acres excandescētiæ & bilem amarā vel in stomacho, vel in cerebro collectam, consequi nata sunt. Incerti & discurrentes lucis splendores, qui *μαρμαίρει* græce dicuntur, oculis fiunt propter eam, quæ à vētre est, exhalationem, & propter sanguinis, qui ad caput fertur, abundantiam: atque ex his prius quidem ex importuna interdum fit ciborum oblatione, alterum autem propter iudicatoriam sanguinis eruptionem, vel delirium imminens. Consimiliter & aures sonis implentur, tum propter eos, qui à ventre sursum feruntur vapores, tum propter flatuosum spiritum, qui in capite ipso oritur. Corporis extrema, quæ

B sunt pedes & manus prompte perfrigere, male habente ventris ore, haudquaquam nos præterit, utpote cum vel propter longam inediā vehementer à mordentibus mordetur ichoribus, vel ob importunam cibi multitudinem grauat. Patitur autem vtrunq̄q̄ ex ea, quæ antedicta est, victus ratione, qua medici, ægros primis diebus vbi fame exciuerint, tunc, cum tenuiter cibandum sit, ad frumentacea repente transeunt edulia. Ob eandem rationem neq̄ eorum, qui ita cibantur, vrinæ concoquuntur. Nam in ea, quæ citra vel cremoris pituitiæ, vel melicrati, vel oxymelitis oblationem fit, exiccatione, sanguis propterea, q̄ non purgetur, bilefcit: propter q̄q̄ subitā ad esculentā permutationem venter compatiēte ipsi facultate vitali grauat. Quo fit, vt stomachicæ appellatæ syncopæ manifeste nobis indicent facultatis vitalis ad os ventris condolentiam. Hoc liquidem tum magis tum primum ex importunis tum inedijs tū cibis affligitur. Ob id igitur sputa & tenuia, & salsa, & exigua, & synceris coloribus fieri ait, & sudorem circa collum duntaxat, & anxietatem inquietationem q̄q̄, & spirandi difficultatem. Incoctus siquidem manet morbus propter excessum vtrunq̄q̄, longam s. inediā, & intempestiuam cibi oblationē. Apepsiam autē ipsam consequuntur sputa cōmemorata veluti & circa collum sudores, virtute & ob famis anginam languescēte, & ob cibū intempestiuum grauat. Consimili modo & *ἀσπρία* id est anxietas inque

C ratio q̄q̄ cōmune est vtriusq̄q̄ symptoma, & ob longā inediā, quæ ventrem ichoribus replet, & p̄ cibum intempestiuum grauantē. Verum spirandi difficultas, qua spiritus offendit, ob cibum intempestiuum magis, q̄ ob indigentia, oritur. Nā spiritū inter inspirandum & offendere & quasi sisti, tum angustia, tū conuulsionis est nota: latio etenim, q̄ sursum fit, expirationē facit. Tali autē spiritui contrariū tum in || secundo tū in sexto de morbis populariter vagantibus libro percurrit inquit, || Duplex intro reuocatio veluti aspirantibus. Quod autē ob cibum intempestiuū & non p̄ penuriam talis fiat spirandi difficultas, patet ex sermone Hippocratis spiritū frequentē vel magnum valde perperā cibatis fieri asserentis: fit liquidē frequens magnus q̄q̄ actō in angustia septo transuerso ab ea, q̄ in ventre cōtinetur alimonia, cū videlicet neq̄ victa, neq̄ probe à ventre cōfecta, inflationē parit. Nempe tunc ob septi trāsuerſi angustia de necessitate minus aeris inspiratur, quanq̄ thorax se ea, qua prius dilatabat, dilatatione dilatat. Ergo, quod nunc aeris deest priori, q̄ inspirabatur, id deficientē diminutum q̄q̄ respirationis vsum facit, atq̄ ob eā rem animal maiorem respirationem facere cogitur, vel frequentiorē, vel vtranq̄. Dictum autem abunde de spirandi difficultatibus oībus, in libris de spirandi difficultate: vbi tum harum tum aliarum difficultatum spirandi causas vnā cum proprijs demonstrationibus scripsimus: verū, quantū ad præsens attinet, hæc

D sufficiunt. Ait præterea & ex prepostero cibatu supercilia quadantenus amplificari. Verum id bifariam scriptū inuenitur. Nempe in quibusdam exemplaribus singulari numero ad hunc modū, *ὀφρύς διευώσιος μετέχουσα*, id est supercilium quadantenus amplificatur. In ceteris vero pluraliter, *ὀφρύες διευώσιος μετέχουσαι*, i. supercilia quadantenus amplificantur. Significatur autē ex ea dictione + supercilia ipsa quodam modo euelli vel retrahi. Fit q̄q̄ illud interdū quidē ambobus conuulsiue intentis, aut altero solo: interdum autē & altero resolutō. Deinceps ait deliquia animi fieri, sermonē ad symptomata referens, p̄ quæ & vestiū reiectiones fiunt ardētibus egris. Interdum autē & manus totæ tremulæ fiunt, plus aucto malo. Concussio autē labri inferioris, morsum in ore vētris vehementem significat. Quo fit, vt tale symptoma, vomitus acrium humorum etiā signum sit.

45 Hæc si in initijs apparuerint, delirium vehemens indicant, atque magna ex parte ægri moriuntur.

Dicta, inquit, symptomata si circa morborū initiū fiāt, delirium vehemens denunciāt. Morbi initiū nunc intelligere oportet totū illud t̄ps, in quo non dū existunt concoctionis notæ. Nēpe & in libris de iudicationibus dictum est nomē principij & plura significare: & significatū, quod nunc dictum est, secundum eam esse diuisionem, qua morborum tempora diuidentes morbos ipsos constare ex principio, augmento, vigore, & declinatione asserimus. Ergo, cum nuper di-

Septima Classis.

qqqqqqq iij

cia

* Al' expirādū. & ita vetus interpretes.

* Superinspirāribus.

+ *τραπὴ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ ἑξῆς, i. ad latus trahi quodā modo ipsa supercilia, vel sursum trahi. Antiquus interpretes, quod tempora eorum trahuntur ad latus aut sursum. Nā dictionem ὀφρύες uerit ipse tempora*

id sect. 2.
2 medium.
in sextū Epi.
1. 10. 3. 16. d

4. 11. 1. e.
4. 11. e

Et symptomata, ubi prope morbi vigorem apparent, iudicationem futuram salubribus in morbis significant: sanè, si in principio fiat, iudicationem quidè non denunciant, (nichil enim in principio iudicari potest) sed delirii notæ existunt. Scriptum autem & de his abunde in libris de iudicationibus, ex quibus totum, qui de his est, sermonem perdisces, cum illic plenior sit, quàm ut nunc omnino percurrere oporteat. Sed sanè, ut in cæteris, ita in his summam perstringere satis erit.

Ergo, quoties natura ad excretionem properat, effatu digna in corpore fit permutatio, ob quam symptomata huiusmodi cum manifestissimis coctionis signis apparèt. Verum, cum perturbatio efficitur similis, nullo à natura ad infestatum excretionem facto apparatu, tunc periculosissimum est signum. Dictum iam & cæteris in commentariis de *κασιμῶν* id est iudicatoris symptomatis, qualia sint, & quæ nam ipsorum natura, & quò nam pacto ab ijs differant, quæ *ἐπιφανόμενα* i. superapparentia, vocantur, quo in genere erunt & ipsa coctionis signa. Nempe & prognosticū, & librum de humoribus, & aphorismos, iam ante hunc librum exposuimus. Sanè semper de his eadem dicere ad eum spectat, qui prolixioribus uti consuevit sermonibus.

46 Qui autem euadunt, hi vel cum abscessu, vel sanguinis è naribus fluxione, vel puris crassi expuitione euadunt, neque aliter.

F

Cum mori ipsos dixit, non simpliciter dixit, sed magna ex parte ascripsit: quapropter, quò nam pacto quidam ex ipsis seruentur, dicere sequens erat. Quos nunc percurrit, atque quosdam ex ipsis seruari ait, aut per sanguinis eruptionem, aut per abscessum, aut puris abunde cocti expuitionem, simul ex ijs, quæ retulit, egros in huiusmodi symptomata incurrere propter multitudinem significans.

47 Neque sanè horum ita peritos video medicos, qui, ut oportet, cognoscant eas, quæ in morbis contingunt, virium imbecillitates, & quæ ob vasorum inanitionem, & quæ ob aliam quampiam iritationem, & quæ ob laborem, & ab acumine morbi fiant. Quas item natura nostra habuit quæ singulis, affectuum species omnigenas fabreficiat: quamuis cognita salutem, & mortem ignorat, & ferant.

Quoniam de ægri robore imbecillitate quæ sermonem fecit, qui victus scopi sunt non contemnendi, ob id nunc sermonem de imbecillitate repetit, quibus hæc fiat modis, medicos cognoscere debere asserens: Nempe, quod quædam fiat ob vasorum inanitionem: hoc. n. vocabulum *νεκρωγεία* id proprie & primum significat, atque ob id *ἀστία* i. ciborum abstinētia, *νεκρωγεία* i. vasorum inanitio, sapius dicitur, tanquam nomine generis etiam in specie homines omnes uti consueuerint. Alia autem ob *πόνον* i. laborem seu proprie dictum, ut dolori idem sit, seu, ut quispiam dixerit, magis iam affectionem, qua in acutis morbis ægri male afficiuntur. Aliam præterea virium imbecillitatem ob aliam quandam fieri ait iritationem. Nam, si morsum dixit vel ventris, vel intestinorum, symptoma hoc sub dolorum nomine intellexisse est visus. Verum, si vel vigilias vel oris ventris affectionem dixit, non proprie interpretari visus est. Cæterum virtus exolui videtur, & ob euacuationem, quæ fit vel sanguinis eruptione, vel vomitu, vel deiectionibus, vel sudoribus, & ob longiorem, quàm par sit, inediam, & propter tum dolorem aliquem, tum vigilias, tum assiduas purgandi ventris suscitationes: atque et cum os ventris ita affligatur, ut syncopas minetur, id quod vel propter grauatis alimonie multitudinem, vel contristantem quandam ipsius qualitatem, nempe hæc virtutem celerrime tum fatigant, tum dissoluunt. Omnes igitur hæc virium offensa ex manifestis quidè sunt causis: sed aliæ ex non manifestis: ut quoniam absque manifesta vacuatione, vel vigilijs, vel inedia, vel oris ventris sensu, ægri ad talem subtrahuntur corporis affectionem, quam in prognostico scripsit Hippocrates, inquit, || Naris acuta, oculi concaui, collapsa tempora, & quæ deinceps sunt. Nam hæc corporis conditio fit quidem & ob vigilias, & ob excretionem quandam, quæ multa sit, & ob inediā: fit quoque & absque his, cum si corporis humores tenues fuerint, & febris calor acris. Nam euaporantur, qui ita extenuantur, per insensibilem euacuationem. Cæteris autem & ob intemperaturam principis vnius partis affectæ imbecilla redditur facultas. Primum siquidem affecta prima laborat, deinde affectuum participatione & reliquæ duæ. Didicisti. n. vnam esse in nervis facultatem, quæ principium habet cerebrum: alteram in arterijs, cuius principium est cor: tertia vero in venis, quæ ex hepate oritur. Ergo partis vnius, quævis illa fuerit, intemperatura propriam interdum facultatem violauit, cui affectus participatione consenserunt reliquæ duæ facultates. Velocissimæ igitur fiunt corde patiente mortes: deinde affecto cerebro: tardissimæ ab hepate prodeunt. Ut. n. partes hæc intemperie affectæ maximam facultatis vnaquæque suæ offensam incurrunt: sic partes aliæ principio vnicuique propius appositæ, si forti intemperatura affligatur, virtutum principia ad sympathiam agunt. Sunt etiam aliæ, quæ quamuis propius appositæ non sint, ob generalem tamen communitatem, vel quandam affectionis proprietatem, partes virtutum principia continent lædunt. Os igitur ventris, cum vitalem facultatem ad sympathiam agit, syncopas infert: cum vero proprie animalem appellatam, desipientias vel conuulsiones. Vterus interdum & apnoeas (quas non spirationes prope dixeris) interdum & nervorum contensionem. Verum singula hæc completa ab omnibus cognoscuntur: cum vero fiunt, & sensim crescunt, medicos plerosque latent. Quæ sanè non, quoniam ob magnitudinem auxilio iam carent, tunc cognoscere oportet, quod

1. Prog. 6. & 7.
4. 191. a & b

* genetis. quid
sit sit cõitas ge-
neris, vide lib.
3. Epid. sect. 1.
c. 4. pa. 130. c

A. li. 3. E. 11.
c. 9. fol. 181.

A quod vulgo contingit, sed & cum incipiunt, & fiunt: hoc siquidem optimum est. Quod si fieri non potest, saltem omnino, cum increscunt, dignoscere est necesse. Sanè hæc omnia Hippocrates significasse mihi videtur, cum inquit, Quas item natura nostra habitus q̄ singulis affectionū species omnigenas fabrefaciat: vbi naturam, temperaturam dixit: & habitum, struem corporis compositionem q̄. Nam, qui raram ex natura habent texturam, tum euaporantur, tum syncopam facile incurrunt: qui vero densiore constant textura, hi in morbis cunctantur, diutius q̄ trahunt. Sic autem & partes non nulli habent, alias quidem frigidiores, alias calidiores, alias siccores, & alias humidiores: sed omnibus peculiare temperamento malum.

49 Maius siquidem malum est, si ob laborem & acumen morbi imbecillitate porrexerit quis potum vel forbitionem copiosorem, vel esculentum, imbecillitatem eam ex vasorum inanitione contigisse arbitratus. Neq; sanè calumniam effugere potest, qui imbecillitatem ex vasorum inanitione non cognoscit, premit q̄ victu. Periculum siquidē aliquod adfert erratum hoc: sed longe minus, quàm alterum, atq; risu dignum magis. Nam, si medicus alius vel plebeius ægrū interuiserit, cognouerit q̄ ea, quæ contigerunt, dederit q̄: tum edendum tum bibendum, quod alter vetuerit, is præsidium attulisse existimabitur. † Talia autem maxime ab us vituperantur hominibus, qui res ad nigrum vertunt. Nē

† Alqui ita uertunt, Tunc aut artificis facinora maxime ab hostibus vituperantur.

B Ob dolores sepius egri sine pulsu redduntur, animi q̄ deliquia incurrunt, & nullo pacto queunt moueri: similiter & ob morbi acumen. Sunt aut, quibus non ob hæc virtus offenditur, sed ob vasorum quomodolibet facta euacuationem. Siue igitur ob euacuationē sensui manifestam, siue ob eam, quæ per halitum fit, discussionē, siue ob inedia, virtus labefacta fuerit, qui ita affecti sunt, cibari quā celerrime expostulant. Contra aut, qui ob dolorem, vel morbi acumen parū valentem habent facultatem, vacuatione interdum magis, q̄ repletionē, indigent: immo, qui cibū his exhibet, maximū affert detrimentum. Verum, qui ex vasorum inanitione imbecilles sunt, hos siquis diætā tenui prefferit, lædet, quanq̄ non æque euidenter vel celeriter. Ignorare autem, si æger sit imbecillus ob vacuationem magis, q̄ ob dolorem, probro vertitur. Cetera dictionis manifesta sunt.

49 Scribemus autem & horum notas, quibus singula dignosci possint.

Rursum & hic pollicetur Hippocrates, sicuti paulo ante, se librum alium quendam de morbis acutis scripturum.

50 C Similia porrò ijs, quæ ventriculo contingunt, hæc existunt. Nam, si corpus totum præter consuetudinem valde quieuerit, non confestim robustum magis euadit: quod si diutius ociatum ad labores sese repente verterit, uile profecto quippiam euidenter operabitur. Ita de cæteris corporis partibus est existimandum. Nempe & pes, & cætera, quæ articulus prædit, sunt partes, laborare non consuevit, tale quippiam patiuntur, si post longum tempus ad laborem subito se vertant. Hæc patiuntur oculi & dentes, & quicquid huiusmodi est. Præterea & cubile præter consuetudinem & molle & durum, laborem facit. Quod item sub diuo est, præter solitum corpus indurat.

Rursus ad institutū rediit Hippocrates absoluto de virtutis imbecillitate sermone, quē per digressionē à pristino mutauerat instituto: ait q̄, quæ nunc dñr, similia quodā mō esse ijs, quæ ventri contingere dicta sunt. Nēpe scopum dirigit ad summā eam, in qua mutationes subitas magnā languētibus afferre lesionē astruit. Quod aut hoc in loco scribit, huiusmodi est. Vt vter diutius omnino ociatus functionē perficere probe non potest, nisi prius sensim rursus assuescat, & suas exerceat operationes: sic corpus vniuersum singulæ q̄ aliæ partes. Deinde & partes aliquas serie continuata noiatim cōmemorat: atq; tandē in fine sermonis, eius, quæ in cubili fit, mutationis mētionē fecit, astruens sanè & tunc, quod ab initio de consuetudinis mutatione est ab eo propositū.

51 D Sed horum omnium exempla scribere satis fuerit. Nam si quis vlcus neq; admodum insigne, neque valde vile, in tibia acceperit: fuerit q̄; homo, cui neq; admodum difficulter neq; ualde prompte ulcera sanentur: & prima protinus die ita iacens curetur, ut nequaquam crux tollat: hoc sanè pacto sine inflammatione manebit, citius q̄; sanitati restituetur, quàm si oberrans curetur. Quod si vel quinto vel sexto vel superiore adhuc die surrexerit, atque ambulare voluerit, magis laborabit, quàm si statim ab initio oberrans curatus fuisset. Porrò si & multum & repente se fatigauerit, multo magis laborabit, quàm si ita curatus in diebus huiusmodi sese fatigauerit.

De repentina adhuc mutatione, ut antea in exemplis alijs, ita & nunc in vlcere sermonem facit Hippocrates. Nam, si quispiam (inquit) vlcus in tibia habens, qui & quiescere & iacere indigeat, quiete ambulet (hoc enim significat πλανώμενος ὑπὸ νόστο, id est oberrās curetur) lædetur quidem prorsus, sed minus, quàm qui primis diebus quieuerit, deinde subito circa quintum vel sextum, vel diem etiam ἄνωτέρον, id est superiore, tertium videlicet vel quartum, ambulare cœperit. Sunt, qui vocabulum hoc ἄνωτέρον de sequentibus dici diebus existiment, septimo scilicet octauo & nono: quod si ipsis placebat, eos principiū dictionis per α & ε ἄνωτέρον, & nō ἄνωτέρον per α & υ, scribere oportebat. Quare aut, inquit, tale fieri non valet vlcus, ut si non parū lædatur, qui septima vel octaua ambulare cœperit, & antea quieuerit: & grauius, dixerim, si vlcus magnum fuerit, vel laborans fuerit vnus ex illis, quibus vlcus difficulter curatur: & magis, si ambo

Septima Classis.

qqqqqqq iiii

concur-

concurrerint: Quod si neque vlcus magnum fuerit, neque laborans fuerit, cui difficulter vlcera curentur: curetur autem conuenienter, nam & hoc subaudire in sermone oportet: iam circa septimam aut octauam bene habebit, & ambulare citra lationem poterit. Quam ob causam sermoni adiecit, Vlcus neque admodum ἐπίκαιρον, id est notabile insigne quod, neque valde ἐνθες, id est vile, simplex scilicet ἐνθες vocans. Fucrit quod item homo, cui non admodum difficulter vlcera sanentur. Is siquidem, si nihil aliud circa curationem erratum sit, solum quia mediocriter ambulet & incedere indigeat, laedetur, quidem: sed non ita grauiter, ut si primis diebus quieuerit, mox tertia vel quarta vel quinta vel sexta obambulare coeperit. Qui vero magnum vlcus habuerit, & si sit cui difficulter vlcera sanentur, non mediocriter sed grauiter laedetur ab initio obambulans: veluti & qui paruum vlcus habuerit, atque si sit cui facile admodum vlcera sanentur, si primis diebus quieuerit, & quinta vel sexta ambulare coeperit, non grauiter sed mediocriter offendetur. Ob eam igitur causam Hippocrates de eo, qui in utraque oppositione medium obtinet, sermonem fecit. Oppositionem autem dicit tum eam, quae in magno & paruo vlcere comperitur: tum eam, qua homo dicitur δυσεληής & ευεληής, id est cui tum difficile tum facile vlcera sanantur. Quod nihil referat dicere insigne vlcus, vel magnum, palam est. Nempe ἐπίκαιρον, id est insigne, propter loci naturam tale fit: magnum vero virtute perficitur, etiam si sectione corporis paruum sit, vel ipsa sectionis magnitudine insigne fiat: ἐνθες vero, id est vile, quod simplex est & paruum vel propter loci naturam, quae vilis & abiecta est, vel propter sectionem ipsam paruum faciam, dicitur.

52 Omnia igitur haec inter se subitam omnem supra modum huc & illuc mutationem nocuum mentum inferre perpetuo testantur.

In exemplis singulis praesentis sermonis mentionem facit Hippocrates: quapropter & nunc in exemplo, quod de vlcere facit, idem est executus. Nempe διὰ τέλειος, id est perpetuo, idem significat, quod διὰ πάντος & αἰς, id est vbique & semper.

53 Multiplex itaque in ventre est latio. Nam, si ex multa vasorum inanitione repente quid plus iusto ingeratur: similiter si reliquum corporis diutius ocium subito ad laborem vehementem sese verterit: multo magis laedetur, quam si ex multo cibo ad vasorum inanitionem transferatur. Corpus re vera his cessare oportet, etsi ex multa fatione subito ad ocium ignauiam quod descuerit. Oportet autem & illis ventrem a ciborum cessare multitudine: alioqui latio in corpore fiet, & totius corporis grauitas.

Quod primum omnium demonstrare decreuerat, id de subitis in ventre mutationibus fuit. Deinde ab hoc ad generalius, quod & vniuersaliter dicunt, transiens, de repentina omni consuetudinis mutatione hucusque percurrit. Nam, cum specialiora in generalioribus, & particularia in vniuersalibus, contineantur, ventris quod permutatio cum subita oium mutatione demonstrata sit, nunc rursus ad ventrem reuersus, mutationum, quae in eo fiunt, differentias edocet. Ait quod longe grauiorem in victus mutatione esse lationem, cum ex multa inedia repente plus modico ingerit, quam si ex multo cibo ad inediam transmutatio fuerit. Simile huic fieri in toto corpore deprehenditur. Nam minus laeduntur, qui ex motione ad quietem subito transeunt, quam qui ex quiete ad motionem demigrant. Rursus & hoc in loco permutationis interpestiue emendationes correctiones quod, veluti & in premissis, adscripsit, quamquam id ad praesentem non videatur pertinere speculationem. Quae autem adscripsit, haec sunt: Qui ex motu quidem actione quod in ocium segnicie quod transeunt, eos ἐλλινύειν, id est cessare & toto quiescere corpore praecipit: quod idem huic sententiae existit: Vbi famens, laborandum non est. Verum, qui ex multa fatione ad quietem transeunt, eos pauciora ingerere iubet, quod est & ventriculum quiescere. Quoniam, qui toto corpore non laborans consuetam ingeret, is multitudinem subalet: qua efficitur ratione, ut totum corpus grauetur, laboret quod. Πόνος autem, id est labor, nunc Hippocrati lationem indicat, multis specialibus lationibus genus existens. H

2 Aph. 14. Ext.
ord. 11. g

A. lib. 1. f. 3. d. 1
c. 7. fol. 61. h

54 De mutatione in victu, quae in haec vel illa fit, plurima sum locutus: quod re vera haec nouissime commodissimum sit, cum ad omnia, tum ad id, de quo nunc agitur. Nam & in morbis acutis ex vasorum inanitione ad sorbitiones transeunt. Transeunt dum quidem, veluti iam precipio ero: deinde sorbitionibus haudquaquam interdu prius, quam morbus ad maturitatem perductus fuerit, aut signum aliquod aliud apparuerit, ut in intestinis uacuatorum vel proricatorum, vel in hypochondriis qualia scribuntur signa.

Rursus sermonem totum in summam vnam coegit Hippocrates. In habentibus quidem similiter, victum haudquaquam permutare praecipiens: verum in istis, qui ex sanitate ad morbum transeunt, permutare quidem, non tamen ut ceteri permutant. Deinde compendio quodam victus scopum in acutis morbis declarauit. Nam, si morbus maturuerit, transeundum ad cremoris puillanae exhibitionem praecipit: & si adhuc incoctus fuerit, non transeundum, nisi forsan symptoma aliquod, quod vires prosterneat, apparuerit, ut vel vacuatio ventris immodica, vel aliud quippiam, quod proritet. Communi autem prorationis nomine comprehendit omnia, quae quouis modo virtutem ad infirmitatem agunt: quo in numero censentur & morsus, quem acris humor siue in intestinis siue in ventriculo & praesertim ipsius ore parit, & vigilia, & ira, & moror, & lumbrici helminthes, qui ab intestinis ad ventrem usque ascendunt, & cuius totius aut membri alicuius,

A ius, qui nocte aggrediatur, pruritus: ita ut virtus non solum ob iritationem, verum quoque & propter vigilias, exoluatur. Præterea inquit, Vel in hypochondriis qualia scribentur signa. Nam & ipsa danda vel non danda comonstrabunt alimoniam. Fieri siquidem potest, ut intelligatur utrunque: sed alterum magis pro sermonum intelligentia. Nempe præcipiens à puillana abstinentium ante quam morbus maturuerit, cum scilicet eger sufficere possit, adiecit, Nisi signum aliquod appa-
 55 ruerit vel in intestinis vacuatorium aut proricatorium, vel in hypochondriis qualia scribentur: tanquam & hæc cremoris exhibitionem ante quam morbus maturuerit, admoneant. Forte hypochondria dicit, quæ vehementer exaruerunt, & squallida admodum existunt. Talia nempe contingunt & mortiferæ faciei, de qua in prognostico dixit, ¶ Naris acuta, oculi concavi, & collapsa tempora. Nempe is signorum concursus hypochondrium habet ita contractum, ut quempiam ex inexercitatis fallat, tanquam reuulsum videatur. Verum contrahi vehementer ob siccitatem, & propter phlegmonem reuelli, idem non sunt, siquidem exuperans corporis siccitas tensione septo transuerso & hypochondrio pariat maiorem. Sed maxime animaduertas distinguas quæ à siccitate phlegmonem, quæ sanatio non una fit, oportet. Nempe, qui hoc ipsum ob phlegmonem habet, tenuissimo egent victu: qui vero ob siccitatem, contrario, ubi sepiusculum pauculum exhibemus puillanæ cremorem.

1. Progn. 6. &
7. 4. 191. a & b

55 B Fortis vigilia, potus cibos quæ tum crudos tum incoctos reddit: verum ea, quæ in alia fit transmutatio, corpus dissoluit, excoctionem quæ & capitis grauitatem parit.

Sepius existimaui librum hunc in typis repertum, post mortem Hippocratis esse publicatum. ¶ Non secus etenim, quam hoc pacto, facta esse videtur inordinata sermonum compositio. Nam quæ ab Hippocrate inueniebantur exempla, hæc in libro ad fidem vniuersalis scripta sunt, alia quidem in facie, alia in tergo. Neque enim unicuique tum adscripto tum addito suum assignare ordinem potuit. Ergo, quod ab Hippocrate impresentia dicitur, id manifeste inordinatum existit. Neque enim hoc in loco ascribendæ rei huius occasio fuit, sed certe paulo ante, cum de ea, quæ præter consuetudinem ad contrarium fit, mutatione exempla scripsit. Nempe illis adscribi debuit, Quæ etenim ad vigiliam insueta fit mutatio, incoctiores tum cibos tum potus efficit: ad somnum vero multum, eum quæ studio quodam accersitum segnitiam corporis & capitis grauitatem. Quæ enim dixit ἐφθόνητα, id est excoctionem, & dissolutionem, & capitis grauitatem, verbo vno coniunctam comprehensam quæ manifestat roboris exolutionem. Commonstrat autem & nomen ἐφθόνητος, id est excoctionis, quæ ob calidam humiditatem fit, non ob siccitatem. Nempe vigilia
 C per halitum digerere & siccare, non, quæ in imo sunt, coquere nata est: somnus vero humectare, spiritum quæ & effluuia cohibere. Non igitur absque ratione in eorum, qui plurimum præter consuetudinem dormiunt, corpore halitiosa redundant excrementa: atque ob eam rem tota ipsorum constitutio ex coctis similiter exoluta redditur.

† Lauachius
ita venit, &
meo maiore
est. Inordina-
tione namque
haud aliter est
factum quia sic
monstrat.

GALENI IN LIBRVM HIPPOCRATIS

DE VICTVS RATIONE IN MORBIS ACVTIS

COMMENTARIVS TERTIVS

ARGVMENTVM

Exponit Vini, Mulsæ, Oxymelitis, Aquæ, & Balneorum facultatem.

D

DE VINO



Vibus autem vinum dulce vinosum quæ & album & nigrum, melicratum quæ & aqua & oxymeli insigniantur, in morbis acutis, distinguere oportet.

Non inordinate solum, verum quoque et diminute vinorum catalogum fecit. Est siquidem una ipsorum differentia in colore: altera qualitas in gustatu facit: tertia consistentiam respicit: quartam odor progignit: et quinta in virtute reperitur. Quæ ergo in colore est, ea in album, nigrum, fulvum, & flavum, & rubrum diuiditur: verum cum & aliæ, quæ medium obtineant, sint differentia, sanè ut in colore, sic in uirtute permixtæ reperiuntur. Quæ autem ex vinorum gustatu est differentia, ea in dulce & austerum diuiditur: & ex his medium, tum quod nullam, quæ manifesta sit, habet qualitatem, tum quod ex utraque constat qualitate: præterea & in id, quod acre appellatur. Verum, quæ in consistentia reperitur differentia, in aquosum secatur & tenue, & in ualde crassum, & in horum medium, atque in ea, quæ medium hoc & extrema interiacent. At finem eam, quæ in odore est, alia quidam boni odoris sunt, alia vero non boni odoris existunt, sed & ferientem quandam & insuauem natura sunt

sunt qualitatem: alia nullo pacto odorem habent, sed sunt aquæ instar inodora. Differentia vero E in facultate est, ob quam aliud quidem potens, aliud vero imbecillum, aliud medium, atq; aliud quod medium hoc & extrema interiaccet. Vinum potens vehementer celeriter q; corpus calfacit, caput q; ferit: imbecillum contrario agit modo: quæ vero medium obtinent, nota euadunt, si ab extremis distinguantur. Potens, vinosum appellatur: imbecillum, aquosum. Nempe, in quo vinum aquam euincit, id cum in aliquo vehementissimum esse videbimus, iure vinosum appellabimus: sicuti & contrarium, aquosum, quod aquæ maxime in omnibus simile existit tenuitate scilicet, & colore, & odoris carentia, & non manifesta calfactione. Hæ igitur in vinis secundum propriam naturam reperiuntur differentia. Sunt, qui his adiciant eam, quæ ex tempore desumitur, differentiam: qua, vetusta quædam sint admodum, alia recentia, & alia, quæ in medio horum consistent. Sed, q; differentia huiusmodi eorum sint, quæ extrinsecus accidunt, palam est. Nempe, quatenus tempore acriora & calidiora fiunt vina, atq; vna cum his tum colorem, tum substantiam, tum odorem mutant, eatenus differentiam aliquam in vinis tempus facere videtur. Quod si nihil horum immutetur, neq; ab aliquo vinum vetus dicetur, neq; recens: immo neq; nunc ita dicunt, tanquam vini ipsius annis opus prima ratione habentes, sed tanquam simul cum annis facultatem commonstrantes. Non enim ob tempus vina vel iuuant vel ledunt, sed ex propriarum differentiarum mutatione id habent. Ergo, cum de vinorum agimus differentiis, temporis mentionem facimus per accidens, & non proprie, neq; primum. Caterum inter proprias vinorum differentias quedam iuuant ledunt q; propria ratione: alia non per se proprie q; sed per accidens: Dulcedo quidem & austeritas propria ratione, sic tum potentia tum imbecillitas, tum tenuitas tum crassities: Sed differentia, quæ tum colore tum odore desumuntur, non primum, sed per accidens: quoniam vinorum hæc quidem & aquosa & alba & fulua & nigra, alia aquosa & inodora ut aqua, vel instar aromaticis vnguenti q; benevolentia. Si igitur vinorum hæc sint differentia, quæ & secundum propriam virtutem & per accidens numerentur, iam tibi constat de eo tum ordinis tum numeri, qui in presenti dictione sit, defectu. At, si in sequentibus omnium, quæ commodæ sunt, differentiarum meminisse Hippocrates videtur, veniam eius inter exponendum defectui dabimus.

- 2 *Vinum dulce vinosum minus caput grauatur, minus quæ mentem ferit, atque quouis alio facilius per intestina descendit: lienem tamen reur quæ tumescit: picrocholis quæ nullo pacto est idoneum, nempe his situm facit, superius quæ intestinum inflat: non tamen inferiori pro flatu ratione est inimicum, etsi non admodum penetret, qui à dulci vino est, flatu, sed diutius circa hypochondria moretur.*

Vinum dulce secundum gustandi qualitatem nominatur, qua & austerum & acre, ut aquosum prætermittamus, quod non omnino ab adstringendo excidit: tamen penitus exolutam habeat astringendi qualitatem. Nam, si ipsum aquæ comparaueris, percipies manifeste ex ea comparatione gustum huiusmodi vinorum, eorum esse, quæ modicam nata sunt astringentiam. Aquosum autem vinum appellant homines, quod aquæ tum colore tum substantia simile est: perspicuum siquidem, ut aqua, splendidum & purum, & substantia tenue videtur. Protinus autem & facultate aquæ simile existit, neq; imbecillum caput feriens, neq; infirmos nervos, quando ne quidem manifeste calfacit. Sed de vino hoc rursus tractabitur. Dulce igitur vinum hoc quidem modo ab ea, quæ in gustu reperitur, qualitate est nominatum, sed multis numeris ab aqua & colore & substantia recessit. Neq; enim tenue exquisitè neq; album vidisti aliquando vinum dulce: sed plus minus dictis recedit, & neutrum horum habet. Dulcia autem vina maxime sunt theracum & scybelites, crassa utraq; & nigra. Dulcia quoque & ea, quæ in Mæonia sunt, therinum & caryinum tanto dictis & crassitie & nigræ superiora, quanto dulcedine inferiora. Præterea, quod hepsema & siræon à Græcis, { & à Latinis sapa } appellatum ex cocto musto conficitur, quo dulcius vino perficitur, eo & colore nigrius & substantia crassius apparet. Quarto autem de simplicium H medicamentorum viribus dulcem omnem saporem à caliditate, quæ non immoderata & vehemens sit, fieri demonstrauimus: sicuti & acrem in vehementer calfacientibus, acrimonia siquidem horum est inseparabilis. In usu vero vinum dulce mediocriter calfacere videtur, sitim q; facit propter tum caliditatem tum crassitiem. Ita sanè & mustum, quo diutius in igne versatur, eo tum crassius tum nigrius tum dulcius euadit: quāquam supra modum coctum amaritudinem contrahat, quo modo & mel ipsum, quod, quanquam omnium dulcissimum sit, longa tamen coctione amarum redditur. Sed, ut iam retuli, de qualitatibus omnibus gustabilibus in quarto de simplicium medicamentorum viribus est tractatum: atq; hoc in loco, ut in aliis super Hippocratis libros expositionibus, non demonstrationes, sed conclusa tantummodo recenseo. Cum igitur vinum dulce viscus calfaciat, sit q; ut dictum est, substantia crassa, particulares ipsius facultates, quas epotum commonstrat, secundas qualitates consequuntur: color siquidem sua ratione nullo pacto vel iuuare vel ledere potest. Ergo vinum huiusmodi pro substantiæ crassitie tarde meat: quapropter tantum abest, ut ex obstructis partibus aliquid adimat, ut etiam obstructions adaugeat. Atq; ob id ¹ hepatis affecto maximum affert detrimentum, præsertim q; ubi vel phlegmone vel scirrhus ipsum occupauerit. Sed moderatius lædit, ubi vel ab humorum crassitie viscus oppilatur, vel propter

Apter imbecillitatem afficitur, uti in affectionibus, quę proprie hepaticę nuncupantur. Post hepar lien à vinis⁹ crassis leditur: non tamen pulmo, quādo in bronchus crassum habet humorē. Nempe in hepate ex amplius portę valis ad angusta striccta q̄z valorum tum gibbæ tum simæ proceditur extrema: per quę eorū omnium, quę in corpus totū digeruntur, transmeatio fit: at in pulmone contrario euenit modo: nam per venas multas digestū confectum q̄z in amplam bronchiorū, & primo minorū, irruit capacitatem: atq; ab his ad maiora excipitur, secum & crassos tollens humores, quibus non calidius solum, verum quoq; & tenuius exilit. Scis autem pulmonem ipsum ab humoribus crassis viscosis q̄z per tūlles expurgari: nam, qui aquosi sunt, & exquilitē tenues, aerē qui tussiendo extra mittitur, circumfluunt. Aer etenim tanquā manus quædam exilit, quę sursum crassos humores secum ferat: sed crassitiem humorum talem esse oportet, ut ab aere sursum ferri possit, & nō, ut lutum, bronchijs illitā esse & infarctam. Ob id sanē viscosos humores tūlles non expurgant: nempe manēt, & interna, visci instar, occupant bronchia. Ergo, quę ad educationem eorum, qui in pulmone continentur, crassorum humorum futura sunt idonea medicamentā, moderatam humiditatem habere debent. Quod si viscoli humores fuerint, non humiditate solum est opus, verum quoq; & ea, quę ab acidis fiat succis, deterfione. Ob eam rem melicratum

B quidem ad crassorum humorum expuitionem est conuenientissimum, oxymeli vero ad viscosorum. Post melicratum ptillana est, atq; ab ea vinum dulce, si coctis iam tum peripneumonia, tum pleuritide propinetur, amplius non vexatis inflammatione corporibus. Quod si vinum huiusmodi epotum sitim faciat, ad expuitionem minus idoneum redditur. Verum, ut vno absoluam verbo, uinum dulce in acutis morbis ad expuitionem tum propter dictas operationes, tum propter communē uinorum omnium rationem, qua uires roborant, idoneum exilit, & maxime iis, qui quæuis humida, quę tum in thorace tum in pulmone continentur, expuunt. Didicisti autē humida illa uaria tum substantiis, tum qualitatibus, tum uirtute esse, in prognostico, ubi sputorum exposuit differentias. Nullum sanē bonū aliud, uinum huiusmodi habet febrientibus propinatum: minus tamen uinoso, quod uehementer calfacit, ledere poterit. Commodū preterea aliud nihil habet præter antedicta, nisi q̄ uentris permeationem modice iuuat. Ob id igitur Hippocrates, ubi à minus ledentibus, quę multa sunt, doctrinæ exordium fecit, ad iuuamēta ipsorum, quę pauca sunt, circa finem sermonis transit. Percurramus igitur, quę recenset, dictiones ipsius persequendo. Vinum dulce minus, quā fortia potentia quę, mentem ferire ait, id est minus deliria progignere: fortia siquidem uina uehementer calfacientia caput humoribus uaporibus q̄z & caliditate replent. Vina igitur dulcia, quo magis à uehementi caliditate absunt, eo minus cum caput grauant, tum mentem lædunt. Sed facilius per intestina descendere ait, & uiscera tumefacere, i. uiscerum tumores augere. Sed de his dixi paulo ante. Præterea dulce uinum non idoneum esse ait picrocholis, id est qui amaram bilem sibi acervant. Nempe medici *χολήν*, id est bilem, simpliciter & pallidam & flauā dicere consueuerunt, *μέλαιναν* uero *χολήν*, id est nigrā bilem hoc toto appellare, & non *χολήν*, id est bilem simpliciter: sed hæc quidem acida est: amara autē, quę flaua. Ob eas res picrocholos appellat Hippocrates, qui redundantem habent huiusmodi bilem. Permissa autem aquosis ichoribus & liquidissima & pallida videtur: sola uero cum existit, & crassa & flaua est. Quę autem huiusmodi bilem procreant, sunt calida & sicca temperamenta: ad cuius generationem idonei sunt & dulces omnes humores. Quo fit, ut omnium horum maxime mel bilescent, q̄ dulcissimum sit: deinde & dulcia uina. Non solum autem, q̄ caliditas multa tales humores amaros reddit, propterea dulce uinum febrientibus, & præsertim ubi calidi & sicci temperatura fuerint, idoneum non est: uerum quoque & q̄ crassa sint huiusmodi uina, neq; per urinas uelociter descendant, neque cito dissidentur transpirent quę: quo fit, ut biliosos humores neque se cum agant, neq; excernāt. Solis ergo his unum inest bonum, q̄ uentrem emolliant: quod si non

D fecerint, omni pacto nocent. Præterea & siticulosa sunt, hac re, q̄ facile bilescent, commonstrantia. Flatuosum quoq; uinum huiusmodi esse asserit. Nempe incalescentes crassi humores flatum sibi similem generant, tum uaporosum, tum crassum: quod autem tale est, inflationes parit. Quapropter ex tenuibus uinis non prodit flatu, quanquam interdum quippiam generetur, quod & tenuium sit partium & aerosum, non nebulosum uaporosum q̄z. Ceterum dulce uinum inferioribus intestinis non esse inimicum ait, quanquam tarde meet, qui ab ipso est, flatu, moretur quę circa hypochondrium. Ea autem occasio est, ob quam non admodum turbet inferiora intestina, quia circa hypochondrium moretur, donec perfectē coctum & tenuatum fuerit: q̄ si semel coctū fuerit, commeabiliorem tenuiorum quę partium habebit naturam. Qua igitur ratione à supernis ad infernas expellitur partes, eadem ab infernis extra mittitur.

3 *Urinas siquidem hoc minus, quā uinosum album, omnino mouet.*

Quod nam uocauit uinosum albū, cōsiderabimus: nam antea uinosum uinum tum esse, tum appellari diximus, quod iure optimo aquoso opponitur. Valenter igitur ipsum & calfacere, & caput replere, & desipientias procreare, & calorem febrilem augere, est operępretium. Sed uinū huiusmodi albū non est, neq; cum nouum existit, neq; cum uetus: quando ne quidem aliud quippiam

piam antiquorum vinorum manet album, etsi quā maxime circa initia tale fuerit: immo semper E
fuluius redditur, & tandem flauum. Visus est ergo Hippocrates dixisse vinosum album, austerū
quod neq; vrinas mouet: sed, si tale crassum fuerit, circa hypochondriū morā: si vero nō crassum,
neq; multum moratur, vt nigrum, neq; albis simul & mediocriter austeris similiter ad vrinas de-
scendit. Nempe vina hęc vrinas cient, q; vtrāq; tarde per vrinas descendendi effugerūt propieta-
tem, tum eam, quæ aquæ est, quam ob frigiditatem nacta est: tum eam, quam vinum nigrum pro-
pter crassitiem habet. Vinum siquidem album & austerum minime calidū inter vina existit: atq;
ob id iis, quæ ad ventrem fiunt, distillationibus idoneum. Non tamen abunde ciēt vrinas hoc vi-
num. At forsā Hippocrates vino huic nigrum comparans, minus ciere vrinas ipsum ait.

* Al. ὁ δατῶ-
δης, i. aquosū
vini.

4 Sputum autem alio efficacius educit, quod dulce est.

Quod nam aliud dicit? vtrum ne præsens, ad quod dulce comparans dixit, Vrinas siquidem
hoc minus, q; vinosum album, omnino mouet: an nō hoc solum, sed simpliciter omne id, quod
dulce non est? Cum ergo Hippocrates, quantum ad dictionem hanc attinet, obscurus sit, credibi-
lius que sit ipsum nunc de vinoso albo sermonem intelligere, rursus & alia oritur ambiguitas,
quid nam sit vinosum album: q; non valde manifestum sit, vtrum ne id, quod vehementer calfa-
cit: an quod valde astringit, quod σπυρνόν, id est acerbum, Græci appellant, veluti quod mode-
ratus, austerum. Quo nam igitur pacto habeat, quod in dictione est, ego impræsentia exponam.

A. li. 3. Eio. 1.
C. 1. fol. 271. a.

Sputū maxime omnium vinorum dulce educit, vbi non supra modum crassum fuerit, veluti et
quoties non vsque adeo ad fuluum secesserit, vt exoluta in eo sint tum crassities tum dulcedo. Pra-
uum autem febrī auxilium est vinum fuluum, q; vehementer calidum sit. Verum post vinū dul-
ce non admodum crassum ad eorum, quæ in pulmone sunt, educationem cōueniens est aquosum
vinum, virtutem scilicet roborans, & humores tum humectās tum incidens mediocriter. Quod
ceteris vinis omnibus innocentius febrientibus exhibetur.

5 Et sanè, quibus propinatum situm facit, his minus, quā vinum aliud, educit: quibus vero situm non facit, vino
alio magis educit.

Vinum aliud nunc dixit, quod omnino siticulosum non est. Quare autem vinum siticulosum
minus sputa educat, facile intelliges, si, quæ antedicta sunt, ad memoriam reuocaueris. Nempe si-
tis his perseverat, qui dulce vinum bibunt, quod febrilis calor in ipsis morosior maleficientior q;
existat. Qui si talis fuerit, sputum siccatur, crassiusque & viscosius reddit. Quod autem sputū huius
modi difficulter educatur, verbis non est opus.

6 Vinum autem album vinosum iam plurima maxima que parte laudatum quidem & culpātū in vini dulcis enar-
ratione. Ad vesicam vero vino alio magis penetrat, vrinas que prouocat, & perpetuo purgat, atque multa ad opem
his morbis ferendā facit. Nempe, etsi vino alio ad cetera inhabilius existat, veruntamen, quæ in vesica ab eo fit pur-
gatio, liberat, si propinetur, quale oportet. Bonæ hæc coniecturæ sunt de uino tum profectus, tum detrimenti: quas, qui
me seniores sunt, non didicerunt.

* κατὰρρηκτι
κός.

De vino hoc in dulcis vini mentione diximus, postea quā vires ipsorū comparauit, perqui-
siuit que: dixi autem non paruam esse questionem, si album simul & austerum vinum, album vi-
nosum dixit, vel quod vehementer inter uina alba calfacit. Nempe ex vinis albis nullum ualēter
calfacere potest: quod enim summe calidum est, id continuo & flauum existit, ueluti & quod ab
ipso est fuluum: mox ab his rubrum, & deinde dulce. Album autē minus quidem his omnibus
calfacit: sed differentias particulares alia q; omnia pro pluris minoris q; ratione habet interualla.
Quod autem uinum huiusmodi dulci facilius ad vesicam penetret, dictum antea: sed ad alia dulci
inhabilius esse ait, quæ sunt uentris subductio & educio sputorum. Bonas autem has ait conie-
cturas esse, id est notas indicia q; facultatis uinorum.

7 Fuluo autem vino & nigro austero in morbis huiusmodi ad hæc uteris, si neque grauitas capitis fuerit, neque men-
tis concussio, neque sputo uia concludatur, neque teneatur urina: excrementa autem & humentiora & ramentosa
magis fuerint. In his autem ex albo migrandum præcipue est: & iis, quæ his similia existunt.

* in textu est
Anabates.

Aliqui legunt
sybates. Co-
dex quidā ma-
nuscriptus hēt
Αβάτης. In li-
bro etiā de ci-
bis boni et ma-
li succi cap. 11
tractat de vi-
no Cilicio
Abate.

Dulce quidem uinum continuo & nigrum existit: non tamen nigrum omne continuo & dul-
ce: nam ex his quædam austera sunt, qualia apud nos in Asia prope Pergamum in Perperine &
Ægis. Quod autem in Cilicia est Albātes, austerum simul & dulce existit, qualitatibus constans
contrariis: quo fit, ut prauum sit, quia neq; distribuatur, neque descendat, sed plus iusto in uentre
permaneant superiore, atq; ipsum inflat. At, quod citra dulcedinem nigrum austerum est, id uen-
tri utile existit, quando uel plura iusto descendunt uel ramentosa: tunc enim est idoneum, sicuti
& uinum album austerum, & quæcunque alia astringentia. In eum usum & fuluum uinum pro-
desse ait, non omnino simpliciter fuluum affirmans, sed fuluum austerum. Nam de utriusq; te intel-
ligere oportet, quod in principio dictionis existit, qua dicitur, Fuluo autem uino & nigro auste-
ris, in morbis huiusmodi ad hæc uteris. Duplex siquidem fuluum, ut nigrum: aliud siquidem dul-
ce, aliud

Ace, aliud austerum. Atque, cum tertium præter vtrunque existat ex vtriusq; qualitatis permistione constans, attamen, quod vna est præditum qualitate, id colore vtroq; duplex existit. Caput autem & mentem fuluum magis ferit, quod & calidius nigro existat. Febres quoque ratione eadem auget: his enim idonea sola ea sunt, quæ aquosa sunt. Non immerito igitur vinis austeris vtendū prohibuit, siue ea colore fulua, siue nigra fuerint, in capitis grauitatibus & mentis lēione, vbi nimirum febris ipsam percussit: atque amplius in thoracis pulmonis que ægritudinibus, in quibus sputum detinetur, vina huiusmodi inhabilia esse ait, atque cum vrinę supprimuntur, propter crassitiem videlicet & astringendi facultatem.

Quod autem superiora quidem omnia vesicam quæ minus offendet, si dilutius fuerit, intestina vero iuuabit magis, si meracius: neminem latere debet.

Vinum meracius, vt dixit, intestinis magis conuenit: quo fit, vt non abs re iuuat ipsa astrictio- nis ratione, propter quam omnino iuuamētum habet. Verum huiusmodi astrictiōnem exoluit, si aqua temperatum fuerit, atque ob eam rem minus intestina iuuat. Quo autem modo hæc iuuat magis astringendi ratione, vbi meracius fuerit, sic thoracem caput q; magis offendit: hæc sunt sa- B nē quæ manifestauit inquitens/ superiora quidem omnia lēdit. Lēdit quoq; & corpora ea, quibus per vrinas expurgari est opus: nempe austerum vinū, excretiones omnes cohibet. De vinis hæc locutus Hippocrates, continuo ad melicratum transit, ceteris quidem ferē omnibus de vino de- monstratis, at prætermisso vno, quod non absoluit, & ego obiter percūram, q; scilicet febrienti- bus maxime idoneum aquosum sit. Est autem vinum hoc album colore, substantia tenue, nullam earum, quæ ceteris vinis insunt, habens qualitatem: neq; austeritatem, neq; acerbiteratem, neq; dul- cedinem, neq; acrimoniā, neq; odorem. Nempe vino huic omnium soli, vt tum aquæ tum vini mala effugeret, est datum. Prodeunt autem talia in vnaquaque gente aliqua. In Italia imbecillum Sabinum, quod febrientibus ministrāt. In Asia Titacazenum & Tibicēnum. Sed vini huius * Tibiaum. notas vbi intellexeris, talia facile in qualibet gente reperies, vbi & valde tenuia & aquosa produ- * Al. Cyro. cuntur vina. Repperi equidem talia in Cilicia, Phœnicia, Palesine, Scyrō, & Creta, in quibus re- gionibus non facile gignuntur vina tenuia & aquosa: immo, vt retuli, in regionibus vidi oībus, & quod mirum magis sit, in Ægypto. Crassa siquidē vina & odora & valde fortia in feruidis pro- gignuntur regionibus: in Italia vero, & Bithynia, & Asia, si multa producantur aquosa, nihil mi- rum. Sed merito quæret quispiā, quam ob rem Hippocrates in antecedente dictione peculiarem C de his vinis prætermisit sermonē, cum febrientibus, q; cetera omnia, sint minus noxia. Neq; enim est dicendū, q; scilicet Hippocrates tale vinū ignoraret: nempe post paulo, cū de melicrato agit, hæc scribit: Ceterū vino albo tenui paucifero & inodoro quodam modo fortius est, & quodam modo infirmius. Hæc ait Hippocrates, vino albo tenui, & paucifero id est parum aque ferenti, & inodoro, melicratum comparans. Vini igitur vinosi notas tum conspicue tum exacte vbi recen- suisset percussisset q;, quō nam scilicet pacto tum caput tum mentem feriat, de aquoso ipsi cōtra- rio disciplinam sufficientem esse existimauit, cum contraria ipsi inesse ratiocinari possumus.

DE MELICRATO

- 9 Melicratum, id est mulsa, per totum morbum in acutis epota parte plurima tum picrocholis, tum megalosplanchnis (id est quibus magna sunt viscera,) minus, quā non huiusmodi, est idonea.

Oratio hæc /per totum morbum/ ostendit Hippocratē de iis intelligere morbis, in quibus cre- morē exhibere idoneū non esse demonstrauit prius, q; ad morbi peruentū sit vigorē. Nā, si eger acuta febre laboret, neq; tū in thorace tum in pulmone fuerit morbus, vires q; valuerint, & mor- D bus quintū ultra diē sese prorogaturus non sit, aqua mulsa sola epota abūde egro sufficere potest. Ceteris quidem omnibus in morbis huiusmodi est conuenientissima: sed picrocholis minus pro- pitia existit. Nā in ipsis bilefcit, nisi prius vel intestina vel vesicā pertransierit: quæ si pertransie- rit, non solum nihil lēdit, verum quoq; & maxime iuuat, nam secū biliosa deducit excrementa. Hac sanē cum rōne temperaturam quoq; ipsius demonstrauit: nempe in huiusmodi naturis, di- lutior exhibita mulsa confert, neq; enim hoc pacto siticulosa existit, neq; bilem generat. Vt autē picrocholis, ita megalosplanchnis haudquaquam idoneam esse ait. Megalosplanchnos nunc di- xit nō eos, quibus magna ex natura ipsa sunt viscera, sed quibus ea ex affectu aliquo intumuerūt, siue scirrhum, siue phlegmonen, siue œdema nacta sunt. Mala siquidem in his, q; cito pertransi- re viscera ipsa non possit, & facile bilefcit, præsertim q; in phlegmonis propter caloris magnitu- dinem: in ceteris autem, qui præter naturam sunt, tumoribus, minus detrimenti affert.

- 10 Porro & siticulosa minus, quā dulce vinum, existit. Nempe & pulmonem mollit, & sputum mediocriter edu- cit, & tussis mitigat. Habet etenim vim quādam extirandi, quæ plus, quā mediocriter viscosum, facit sputum.

Quam ob causam aqua mulsa minus, q; vinum dulce, siticulosa sit, dixi antea, cū utraq;, quate- nus dulcia sunt, eatenus facile bilefcere demonstrarem. Verum, q; tenuior penetrantior q;, vt oīa subeat

subeat, existit, ea ratione minus vino dulci est siticulosa. Quo fit, ut, si aliquando plusculo tempo-
 re in ventre manserit, tunc vino dulci non minus siticulosa reddatur: quod rareriter contingit.
 Aqua vero mulla, vino dulci citius ventrem intestina quæ omnia penetrat: nec secus hepar adul-
 tum renes tum vesicam non rareriter quidem, sed perpetuo. Ob hæc igitur vino dulci minus siti-
 culosa existit. Hippocrates idem, quanquam non ita, sed modo alio dixit, mulse virtutem ex iis, quæ in
 pulmone facit, demonstrans: nempe, quod hæc non efficeret, nisi vias ipsius penetraret abstergeret quæ,
 palam omnibus existit. Præterea sputum educere non simpliciter dixit, sed hoc aduerbium /me-
 diocriter/ adscripsit: neque enim valenter educit, ut oxymeli: sanè mitigat, quo oxymeli priuatur.
 Nempe oxymeli tussis incitat, tum iritans tum asperans, quatenus scilicet vehementer detergit:
 mulla vero, & præsertim aquosa, deterforia, quæ minima sit, participat facultate. Vocatur autem
 huiusmodi facultas etiam *σμηκτική*, à qua & nunc Hippocrates nomen fecit *σμηγματώδης*, de
 mulla ita scribens, *ἔχει γὰρ σμηγματώδης τι*, id est habet etenim vim quandam exterendi deter-
 gendi quæ. Mediocri autem participare ipsam facultate huiusmodi ostendit adiiciens vocabulo huic
σμηγματώδης, vocabulum hoc *τι*: nempe, quibusvis adiciatur, paucitatem indicat. Ergo exigua
 mulse abstergendi vis, non quia abstergendi vis est, ob id impotens infirma quæ, sed quia exigua est.
 Ad glutinosum siquidem sputum, medicamentum vehementer abstergere oportet, quod gluti-
 nosum cum, qui bronchiis pulmonis inheret, detergere possit humorem. Quod si talis quis-
 piam in thoracis pulmonis quæ medio acervatus fuerit, iam & maior, ut probe spuatur, tum inciso-
 riæ tum deterforiæ virtutis est necessitas, quæ id à succingente costas membrana detergat, dissecet,
 & tenuet: nam fieri non potest, ut talis humor aliter per membranam, quæ viscus ambit, ad pul-
 monis bronchia transferatur. Non igitur bene est usus dictione Hippocrates, cum huic orationi
 /habet enim vim quandam exterendi/ eam, quæ sequitur, adiecit /quæ plus, quam mediocriter,
καταγλισχραίνει, id est viscosum reddit, sputum/. Nam melius dixisset, Habet enim vim quandam
 exterendi detergendi quæ, quæ exigua sit, & quæ sæpenumero viscosum fieri sputum sinit. Non
 enim ob mullam glutinosum fieri sputum contingit, sed id quidem sputo huiusmodi, proprium
 inest: mulla vero nil iuvat, sed excrementi naturam talem permanere sinit: quapropter melius dixisset
 nihil glutinosum sputum iuvare, & non tale à mulla fieri. Nam hoc verbum *καταγλισχραίνειν*,
 quod ab Hippocrate dicitur, sputum à mulla tale fieri, cum emphasi significat.

11 Ciet autem & urinas abunde mulla, nisi ex visceribus aliquod prohibuerit.

Mullam ante, quod vias omnes, quæ ventrem renes quæ interiacent, facile penetret, ciere urinas
 dixit: atque, ubi iecur male afficitur, vsui haudquaquam convenire demonstraui. Lien præterea, si
 phlegmone oblideatur, molesta est: atque multo magis intestinis ventri quæ, nam cito ignescens ob
 phlegmones caliditatem in bilem conuertitur. Melle siquidem ob dulcedinem delectantur tum
 viscera tum venter: quo fit, ut tum citius, tum raptim magis eliciant. Melli quoque & dulcia alia
 idem habere quis dixerit, atque ideo ut ad ventrem, ita ad viscera se habere. Venter autem his oble-
 ctari videtur. Nempe, ubi ea deglutiuit, manifeste quodam modo ab assumptis delectatur, veluti
 è contrario ab asperantibus amaris quæ offenditur: neque solum, cum assumuntur, verum quoque &
 ubi assumpta sunt, ad aliquod usque tempus. Quo fit, ut nemo ea, nisi interdum vice medicamenti,
 ut ob humores præter naturam collectos in ventre, ingerat: ubi enim secundum naturam habue-
 rit, iniucunda ipsi talia omnia sunt: iucunda autem sola, quæ dulcia existunt. Sanè in appellato gut-
 ture maxima ex deuoratis dulcibus exoritur uoluptas, corpore scilicet loci illius peculiare quip-
 piam cum succo huiusmodi habente. Corpus autem hoc facit ventriculi interna tunica, ut & ea,
 quæ linguam ambit: verum in lingua evidentissimam habet dulcedinis sensationem, in gutture au-
 tem uoluptatis. Sensio uero manifesta continuo efficitur & in ventris ore, quod dulcibus assum-
 ptis delectatur, modo animans secundum naturam habuerit. Viscera igitur hoc pacto dulci gau-
 dere succo, plurimum quæ ipsius celeriter attrahentia, cum ualent, frui, alii quæ: cum uero febriunt &
 phlegmone obsidentur, in id, quod biliosum est, dulcem succum conuertere par est. Videntur igitur,
 quæ *συκωτά*, id est ficata, ex carycarum esu appellatur, tum maxima, tum suauissima esse, ieci-
 nore ipso, ut liquet, ex dulcium esu alimentum uberius accipiente. Verum in phlegmonis febris-
 bus quæ rerum huiusmodi ingestio non in probam alimoniam, sed in bilis generationem, demi-
 grat: febrilis siquidem calor exuperat: natius autem deficit, qui bene temperatus erat.

• λωμφ.

12 Biliosa quoque alui deiicit magis: interdum quidem bona, sed interdum, quam decet, redundantiora spumantiora quæ:
 κατὰ κορί- quod biliosis magis, & megalosplanchnis, contingit.
 σίρα

Reuocare ad memoriam oportet dictionem ante enunciatam: in qua mullam uino dulci com-
 parans dicebat, Porro & siticulosa minus, quam dulce uinum, existit. Nam & hoc in loco mullam
 eandem ad uinum dulce comparans biliosa alui excrementa deiicere magis pronunciauit. Nem-
 pe & biliosa deiicere uinum dulce potest: verum mulla, biliosa interdum, quæ bona sunt, subdu-
 cit, interdum & uitiosa, quæ syncere admodum biliosa existunt, bilem scilicet, uel igneam uel flauam
 habentia crassam quæ. Bilis igitur ea spumam accipit sæpius quidem ratione ea, qua in iis, quæ uehe-
 menter

Amenter igne calfiunt, spuma exurgit: sepe numero autem & in iis, quæ à flatu agitantur, humidis. Horum primum caliditatis exuperantis nota est: secundum vero instrumentorum angustiam, & flatuosi spiritus interclusi, viam quæ haudquaquam liberam habentis, agitationem denotat. Biliofa autem huiusmodi maxima ex parte subducuntur in iis febribus quæ colliquant, quibus ferme omnium aduersissima nocentissima quæ est melle potio, veluti & modo contrario potio aquæ frigida iuantissima. Excrementum huiusmodi ait à melle magis generari iis, qui natura biliosi id est immoderate calidi existunt, atque in iis morbis, quibus viscus aliquod phlegmone infestatur. Commune siquidem hoc nomen peculiare nunc factum est eorum, quæ inflammantur: neque enim propter scirrhum vel œdema febris incenditur. Ergo, quod in acutis morbis, de quibus agit Hippocrates, ubi tumor in visceribus genitus fuerit, phlegmone symptoma sit, non œdematis vel scirrhi, comitat omnibus. Hos autem & nunc *μεγαλοσπάλγχεσ* appellauit, {quali viscerosos dixeris.}

13 *Melle igitur quæ aquosior est, sputum educit magis, pulmonem quæ mollit. Meracior vero spumosa excrementa, atque plus, quam conuenit, valde viscosa calidiora quæ, quam aquosior, cogit magis.*

B Mel in acutis morbis bilefcere, atque ob id nobis afferre molestiam antea dixi: aquam præterea tarde penetrare, atque in hypochondriis diutius morari, atque ob eas res fugiendam. At, quod ex utrisque mistum sit, conueniens redditur, quando ea constat temperatura, qua aquæ plurimæ tantum mellis permistum fuerit, ut viam aquæ paret, & ad distributionem agat: nempe his ita temperatis, urinae facilius penetrabunt, ocyus quæ sputum educetur. Quod si mellis plurimum admistum fuerit, situm facit, & viscosum reddit sputum. Atque ob eas res aquosior melle tum ad sputi educationem, tum ad penetrationem urinarum, idonea magis existit: meracior vero ad ventris deiectiones: nempe, quanto magis proritabit, tanto magis & velocius subducet. Clysteribus ergo infusa, quo meracior, eo magis excretoria reddetur. Causa quæ erit deiectionum, tum earum, quæ *κατακορίως*, id est *ικανώς*, hoc est valde, biliofa existunt, tum spumosa: talia siquidem trahere magis potest, quia intestina tum morde, tum deterget. Adde, quod & in bilem flauam transiens ea occasione biliosorum excrementorum copiam simul adauget: quo fit, ut ipsius usum non laudet Hippocrates. Declarat autem ex horum verborum adiectione, *καὶ μᾶλλον τῆ καρῆ κατακορίως χολώδεα*, id est atque plus quam conuenit, valde biliofa. Nam *μᾶλλον τῆ καρῆ* dicere consuevit pro *μᾶλλον τοῦ προσήκοντος*, id est plus, quam conuenit. Spumosas item deiectiones & in prognostico damnauit. Et *κατακορίως*, id est *ἀκράτως*, hoc est sincere, biliofa praua sunt: neque enim *κατακορίως*, neque *ἀκράτως*, sed mediocriter talia esse oportet. Horum igitur non inmemor, cum vel ex melle epota vel absque ipsa quis spumosa simul & sincere biliofa deiecerit, febrem sciueris esse, quæ colliquet: atque ob id ab usu melle abstineto, atque in pullanæ cremorem deuenito, obseruans ut aliquod signum licet exiguum coctionis morbi ex urinis videas. Nam, si tunc frigidam dederis, maximo eris præsidio.

14 *Deiectiones autem huiusmodi habent quidem & alias magnas offensas. Neque enim hypochondriorum extinguunt ardorem, sed excitant. Inquietationem quæ; & iactationem membrorum faciunt. Intestina etiam sedem quæ; exulcerant.*

Consuevit Hippocrater *ελάβας*, id est offensas, *σίβειν* dicere, ut in libris de fracturis & articulis est demonstratū: nam *σίβειν* Iones dicunt pro *ελάπτειν*, id est ledere: immo & *ελαβερα*, id est nocua *σινάμορα* sepe numero appellauit. Magnas igit offensas habent (inquit) præfata deiectiones, id est puræ biliofa simul & spumosa. Consuevit autem Hippocrates inter signa notas quæ; vobis vti, tum causarum, tum, quæ leduntur, corporum. Deiectiones ergo huiusmodi significare commodius dixisset: sed habere dixit, quanquam corpora affecta lesionem habeant, causæ faciant, & signa indicent. Sed, quæ nam sint, quæ à dictis proueniunt deiectionibus offensæ, ab Hippocrate audi inquitente. Neque enim hypochondriorum extinguunt ardorem, sed excitant. Hoc autem ideo dixit, quoniam sepius biliosorum deiectio hypochondriorum feruorem protinus extinguit. Quare in malignis maleficis quæ; biliosis adiecit, quæ talia excernentibus ipsis non extinguuntur, sed omnino vice versa increfcunt augentur quæ; Neque ardor hypochondriorum sedatur, quin potius vehementior redditur. Adde, quæ *ρίπτάζονται*, id est *ἄσπην* & *δυσφορίαν* habent, id est implacidi inquitenti quæ; fiunt: deiectiones siquidem huiusmodi flammantis in hypochondriis ipsis affectionis symptomata existunt. Atque in intestinis ramentosam parit acrimonia affectionem. Sanè affectionis huius, quæ sincere biliofa sunt, causæ existunt: eius vero, quæ in hypochondriis existit, signa: verum Hippocrates, ut dixi, vocabulis causas indicantibus inter signa vti consuevit.

15 *Sed horum auxilia scribentur.*

Quod morborum singulorum remedia se scripturū dixerit, ut antea exposuit, sic & hoc in loco nō minus. Verū, si & quæ libro huic post sermonē de balneis adiecta sunt, digna Hippocrate existant, et quæ in libris de morbis vel de affectionibus scripta sunt, ea inter exponendū cōsiderabimus.

Qui

- 16 Qui ergo in morbis huiusmodi relictis sorbitionibus mulsæ potionis alterius vice utetur, is multa feliciter confectetur: sic ei nequaquam præter animi sententiam succedent multa. Verum, quibus danda sit, & quibus non, & quæ ob causam, iam magna ex parte est dictum.

Significauit & nunc manifestissime, donec morbus iudicatus fuerit, sola uti mulsæ consulens. Nempe in solis, qui colliquefaciunt, morbis, vel in quibus hominum virtus ad morbi vique iudicationem sufficere non possit, ad pituitiæ cremorem perueniemus. In aliis vero sola cibare mulsæ est melius.

- 17 Damna autem propterea ab hominibus est mulsæ, quod bibentes summe imbecillitas, atque ob id citam afferre mortem sit credita. Verum id ob languentes ipsos dictum fuerit: sunt enim, qui sola utantur mulsæ, tanquam huiusmodi existat.

* ἀποκατε-
φύοντας, id est
inediā sponte
tolerantes.

Dicere κατὰ φύσιν, id est summe imbecillitatis à mulsæ, & mulsam nullo pacto nutrire, vel exigue, idem non est: quippe cum tria hæc inter se distent. Nam, quæ vires imminuunt, ut sanguinis eruptio, deiectionis superflua, sudor immodicus, & per accidens cibi abstinencia, summe imbecillitate dicuntur. At, quæ nullo pacto nutriunt, ut aqua, ea virtutem neque summe imbecillitate neque roborare quispiam vere dixerit, nisi id aliquando per accidens contingat. Aqua siquidem non ut alimentum vires recreat, sed bene ut medicamentum, ad temperamenti symmetriam, quæ propter ipsius immoderationem imbecilla sunt, reducens. Tertio deinceps loco sunt, quæ exigue nutriunt: quibus qui tantummodo utitur, tametsi interire possit, non tamen tanquam vires imminuentibus, sed tanquam eas non, quod satis sit, roborantibus. Quo è genere est mulsæ. Nam, si quis diebus quatuor cibo priuatus interire deberet, is mulsæ usu non quantum modo, verum quoque & sextum attingere posset. Sermonem hunc & de melle intelligas. Nempe mellis natura & mulsam ipsam inter modice nutritia facit. Nam humiditatem non modo Hippocrates, verum quoque & medicorum probatissimi fere omnes, cibi vehiculum non cibum censuerunt. Hæc sanè eadem, quæ nunc dicuntur, de mulsæ & melle scripsit non obscure Hippocrates in sequentibus.

A. lib. 4. f. 1. l.
c. 8. fol. 419.

1- lib. de Ali-
mentis in fine.

- 18 Sed hoc ita non omnino habet.

* ἀποκατε-
φύοντας.

Non omnino siquidem verum est agros ipsos propter mulsam mortem obire, moriuntur etenim, & si aquam solam biberint: sed, quæ exigua corpori præstet alimoniam, ob id solum vitam seruare non sufficit: quod etiam accidit, ubi quis pituitiæ cremorem solum perpetuo sorbeat.

- 19 Sed mulsæ, quam aqua, multo potentior est, sola epota, nisi aluum perturbet.

Indicare videtur per hanc vocem /potentior/ quod & aqua aliquam nutriendi vim habeat: euenit autem eo, quod corporis ventriculi ariditas irrigatur, ut diu, qui aquam bibant, magis durent, quam qui nihil assument. Secure autem /nisi aluum perturbet/ addidit, de mulsæ sermonem faciens, illos enim iure peius habere facit propter euacuationem, quibus aluum perturbat: simul quæ verbum id /perturbat/ immoderatam significat excretionem & non mediocre. Scire quidè oportet mulsam crudam aluum magis soluere, coctam autem bene, magis nutrire. Hoc autem obiter à te sit cognitum. Videamus autem, quæ deinceps scribit, vino mulsam comparans.

- 20 Ceterum vino albo tenui paucifero & inodoro, quodam modo fortior est, & quodam modo imbecillior.

Sunt, qui dictionem scribant sine hoc verbo /est/ hoc pacto: Ceterum vino albo tenui paucifero & inodoro, quodam modo fortior & quodam modo imbecillior. Alij pro /quodam modo/ legunt /interdum/ ad hunc modum: Ceterum vino albo tenui paucifero & inodoro, interdum qui dem fortior, interdum autem & imbecillior. Sed ex omnibus vis est eadem atque idem intellectus. Nam Hippocrates mulsam vino huiusmodi quadantenus fortiolem, & quadantenus imbecilliolem dicit. Feci autem mentionem vini huius in ea, quam de vinis feci, tractatione. Quod tanquam nescientis vice functus Hippocrates subticuit: sed nunc quædam manifestauit tum substantiam memorans ex hoc verbo /tenui/ tum virtutis imbecillitatem, cum adiecit /oligophoro/, id est paucifero. Vocatur siquidem oligophorū siue pauciferum, quod, ut bibatur, minima eget aquæ mistione. Contrario autem modo polyphorum vel multiferum appellatur, quod, ut bene temperetur, multam exigit aquam: æquiualeñter dixeris, quod aquæ multum sustinere possit ad bene temperatam mistionem. Quod vero pauciferū appellatur, id exolutum imbecillum quæ & ad potum inutile redditur, si multa dilueris aqua. Atqui, quæ in vino hoc est carentia odoris, ea imbecillitatis frigiditatis quæ efficacissima existit nota, quippe in hoc aquæ est assimilis: non secus, quam fortis odor efficacissimum roboris signum. Vinum siquidem aquosum leuissimam in ligno vitis habuit transmutationem: leuissimam quoque & elementi terre permistionem, ita ut aqua sit, quæ tum paulum terre calidæ quæ substantiæ assumpserit, particeps ue fuerit, tum leuissima in horum coniunctionem indiguerit confectione. Contrarium autem tum vinosum tum multiferum, neque à leui confectione tale efficitur, utpote quod ab aqua longissimo recedat intervallo. Qua de causa insignem

κρηθίνου, i.
semperetur.

A signem consecutum fuit tum caliditatem tum odorem.

- 21 *Mulsum tamen differt & vini & mellis meracitas, ad vtriusque robur. Nam si duplum vini mensuram ad melis delinctum quis biberit, à solo nimirum melle validior longe reddetur, nisi ventrem turbauerit. Nempe multo plus stercoreis deicietur.*

Si mulsæ & non mellis dixisset Hippocrates, manifestius enunciaisset. Nam de mulsâ hucusq; egit, ipsam q; vino ex aqua diluto comparauit, neque ipsam per se: sed, vt iusta fieret comparatio, ob id sermonem suum ad mel vinum q; reuocauit. Sunt autem, qui in huiusmodi comparationibus non reliquos modo volentes, sed se ipsos quoq; inuitos circumueniant fallant que. Ceteri meraciore puriora q; experti non puris solis, sed quouis modo temperatis illorum vires adaptât. Non secus alij aquosiora experti, ex illis de omnibus quoquo modo temperatis sententiam ferunt. Non ita tamen de rebus iudicium est faciendum. At, si iustam facturum sis de ipsis comparatione, mulsam ad eorum, quæ bibuntur, vinorum temperaturam in aquæ permissione, ita ex proportionem existimabis, vt vinum non meracius & mulsâ aquosior fuerit. Sed, quoniam in mitione proportionem exacte seruare difficile est, ob id ad ea, quæ vere immista & proprie ἀκρατα, id est pura, appellantur, transtulit sermonem Hippocrates, vino nullo pacto diluto mel ipsum comparas. At q; duplum vini epotum minus alere, q; mellis simplum. Verum, quoniam plura vinorum genera existunt, non, quæ fortia sunt, caput q; feriunt, & desipientias creare possunt, in hoc exprompsit sermone, sed vinum imbecillum aquosum q; mel q; ipsum huic comparans plus alere enunciauit. Ceterum, cum vini duplo mel dimidium comparare voluerit, non q; solum vtrumq; per se & citra aquæ mitionem æger sumere debeat, asseruit: sed, si post vtrumq; dimensum, pro arbitrio ingerat, nō minus differt. Potest siquidem, si res tulerit, mellis cyathum vnum vel per se accipere, vel aquæ, quantum volet, mistum ingerere, atq; id quotidie bibere: vel denuo vini cyathos duos diebus singulis, vt volēt, aqua temperatos. Tali siquidem experimento tum in plurimis similiter in ceteris habentibus hominibus, tum etiam in vno magis, per idem temporis spatium cognoscetur exquisita vtriusque facultas. Si enim mel non ex naturæ proprietate ventrem turbat, qui melle vtuntur, diebus pluribus abūde sufficiēt. Si ergo res ita habet, cur in principio orationis dixit Hippocrates, Ceterum vino albo tenui paucifero & inodoro interdum fortior & interdum imbecillior est mulsâ? Non enim interdum fortior & interdum imbecillior, sed semper fortior secundum nuper dicta videtur. Quoniam prius, q; de comparatione iusta distinxisset docuisset q; citra distinctionem absoluto sermone, bene & secure dixit, Inuenietur mulsâ vino quadatenus fortior, & quadatenus imbecillior. Si enim temperamentum vtriusque analogiam quis non distinxerit, interdum quidem imbecillius vinum, interdum & mulsâ, esse videbitur. Verum, si hæc distinxeris, vt est dictum: atque eam, quam mel in ventre faciturbationem contemplatus fueris: mulsam ad nutriendum validiorem semper deprehendes, quam vinum eadem proportionem dilutum temperatum que. Quod si & stercoreis, quod ex mulsâ ita moderatum excernitur, vt virtutem non exoluat, adnotaueris, tibi etiam magis ex mulsâ copiosior videbitur nutritio, q; ex vino. Nam, & si duplum exeat stercoreis, laborans tamen pluribus ex diebus mulsâ sufficiat, certe ad nutritionem mel vino tum potentius tum validius videtur.

- 22 *Mulsâ tamen post ptisanæ sorbitionem epota valde replet, inflat, & hypochondriorum visceribus est inutilis. Sed, si ante sorbitiones bibatur, non vt super epota lædit, sed inuat.*

De ordine ait Hippocrates, quem in vsu mulsæ ptisanæ que quis optime seruare debeat. Verum vno mulsæ ptisanæ que edoctus exemplo vniuersalem hunc accipe sermonem. Nam perpetuo prius ingerenda sunt, que & facilius corrumpuntur, & quæ subducuntur magis: posterius vero contraria. Ptisana autem, quod mulsâ difficilius corrumpitur, & descēdit tardius. Si ergo mulsâ primo sumpta fuerit, ex ea quædam ptisanæ ad deiectionem fit prouocatio: verum, si ptisana primum sumpta fuerit, subduci mulsâ prohibetur: inflabit hypochondria: atq; tandem in bilem conuersa, ptisanæ detrimentum afferet.

- 23 *Coctâ autē mulsâ facie quidem cruda longe est melior: splendida siquidem & tenuis & alba & pellucida existit. Sed, quæ ab ea euariat virtute, non habeo. Neque enim est suauior, si mel bonum fuerit, imbecillior tamen & minus stercoreis habens: quorum neutro, vt auxilietur, mulsâ opus habet. Coctâ tamen probabilissime, vtendum, si mel vitiosum fuerit, impurum, nigrum, & mali odoris: nempe coctura plurimam malignitatem turpitudinem tollit.*

Tota dictione coctæ crudæ que mulsæ differentias docet Hippocrates: sed nullam desiderat expositionem.

DE OXYMELITE

- 24 *Oxymeli vocatum potum, sæpius quidem in his morbis commoditatem habere reperies. Nam sputum educit, & facilem reddit spirationem.*

Καλέμενον id est vocatū, aut quod vocatur, & καλεῖσθαι, i. vocari, atq; his similia adiciere Hippocratem

Septima Classis.

rrrrrr

pocratem

* In aliquibus antiquis cod. legitur ἀσπερίσσει, per obscurum.

pocratem non ignoras: interdum quidem quod hæc appellatio Græcis omnibus nullo pacto usitata est: interdum vero quod improprie dicatur: atque interdum quod artificiosum quippiam demonstrat, ut ἐπὶ τῶν προταφίτων καὶ μασσητήρων μυῶν, id est temporalibus & masticatoriis musculis, declarauimus. Sed, quod artificiosum nihil indicet oxymelitis appellatio, constat omnibus. Appellationem igitur ex adiectione τῆ καλεσμένης vel damnauit, vel tanquam inusitatam indicauit. Potest autem & utrunque fecisse, nam forsitan tunc primum in communem cœpit usum venire. Forsan & vocem damnat, tanquam ex solis aceto & melle constare medicamentum explanantem, vel tanquam mellis differentiam indicantem: quasi ita quispiam diceret: † Mel autem acetum quibus tali sunt prædita facultate. Ergo de verbi huius καλεσμένης adiectione nemo ignorat: quapropter ad id, quod vtile est, descendamus. Non enim ex aceti mellis quibus multitudine tantum oxymelitis est compositio: verum ex mulla paulum aceti accipiente. Sed melius est, ut concoquatur: nempe virtus aceti ita coctura imminuitur, ut mulla quidem ab eo, cui miscetur, auxiliū sumat, offensam autem non habeat. Auxiliū autem in orationis exordio enunciauit, atque ab his enūciabit: offensas vero ad dictionis totius calcem adiiciet. Dictum est igitur in exordio, Sputum liquidum educit, & facilem reddit spirationem. Quæ autem deinceps sunt, dictiones secuti, ab eo discemus.

A. l. 3. f. 10. c.
c. 1. fol. 27. c.

† Græce τὸ δὲ μέλι τὸ ὀξύ δύναμιν ἔχει τριάνδε, id est, Mel autem quod acidū est, tali est præditū facultate.

25 Tempora vero hæc habet.

Καιρούς, id est tempora, dixit vel tempora, quibus ex consuetudine vtendum sit, vel tempora, quibus iuuare soleat. Nempe & in hoc significato καιρῶς, id est temporis, appellatione interdum vti Hippocratem ostendi.

26 Quod valde acre existit, nihil mediocriter in iis, quæ non facile educuntur, sputis efficiet. Nam, si † quæ detinentur } educeret, guttur quæ lubricaret & veluti † gestientem redderet, } pulmonem certe leniret: nempe ipsum molliret: quæ si contingerent, maxime prodesset. Interdum vero accidit, cum valde acre fuerit, ut sputum non educat, sed viscosum reddat, afferat quæ detrimentum.

■ ὀξύ, i. acidū & sic vbiq.

† τὰ ἐγκέφαλον.

† διαπτερύσσει.

In quibus acri oxymelite vtendū sit, in iis fieri aliquando ex eo offensam docet Hippocrates. Nempe, in quibus nemo prorsus tali, quod acre est, medicamentū vteretur, tales recensere offensas superfluum est. Neque enim simpliciter de acri oxymelite sermonem fecit, sed aduerbiū hoc κάρτα, id est valde, adiecit: quod λίαν & σφόδρα, id est admodū, vehementer quibus, significat. Tale igitur oxymeli nihil mediocriter in crassis glutinosis quibus pulmonis sputis efficere cōsueuit, in quibus eo solo quispiam vtatur, sed ea vel secat, detergit, educit quibus: vel facere id nō valens, exiccat. Nempe, ut huiusmodi medicamentū secandi vim habet, ita & exiccandi: vtimur autem eo in crassis pulmonis sputis non tanquam exiccante (nempe hoc pacto detrimentum afferret) sed tanquam incidente & detergente. Cum igitur hæc facere non valet, tantū abest, ut vtilitati sit, ut etiā maxime noceat: sed, quā neque secat neque detergit, in sequentibus docebit. Volo autem impresentia de ea, quæ in multis reperitur libris, scriptura agere. Non enim per σ, secundā huius nominis μέσον, id est mediocriter, syllabā, sed per ζ scriptā inuenimus, ut dictio tota talis sit, τὸ μὲν κάρτα ὀξύ ἐδ' ἐν ἀν μέζον ποιήσειεν, id est, quod valde acre existit, nihil insigne efficiet. Sed id falsum est: nempe inferens magnum aliquando fieri ab eo iuuamentum, ostendit interdum & detrimentum. Quare perpetuo insigne quippiam facit, & nullo pacto leue paruum quibus. De quo autem est verum dicere, quod perpetuo magnum vel malum vel bonum facit, de illo melius nihil mediocriter ab eo fieri quispiam dixerit.

27 Potissimum autem ita afficiuntur, qui maxime perniciose habentes, neque tuſſire, neque, quæ intus continentur, excreare possunt.

Sputa crassa vehementer glutinari, nihil quæ ab exhibito, quod acre sit, oxymelite iuuari, ait iis contingere, qui maxime perniciose afficiuntur, id est quibus crudus supra modum existit morbus: nempe hi nihil expuunt.

28 Cum hæc ita habuerint, vires hominis perpende. Nam, si de eo speraueris, dabis.

Postea quā eos, qui maxime perniciose ægrotant, ab acri oxymelite nihil iuuari prædixit, pauci quæ ex ipsis adiuti liberantur, ob id & ipsius, quod rareriter contingit, non tacuit auxiliū. Fit autem auxiliū huiusmodi ab acri supra modum oxymelite, cum ægri vires valent. Nempe, si non valent, non iuuabit, quod tale est oxymeli. Duorum liquidum alterum efficiet: nam vel prorsus non secabit, sed, quod glutinosum est, glutinosius reddet: vel dissecabit, absterget quæ. Verum si bitam vniuersam quæ tum educationem, tum uacuationem, quam molietur, non sufferente natura continget strangulari hominem.

29 Cum autem dare volueris, perquam tepidum paulatim quæ & non affatim dabis.

Si eger ob sputorum tum crassitiem tum viscositatem nihil expuerit, virtus quæ valida fuerit, oxymeli dari iubet valde acre, paulatim & ἀποχλίσσον, quod est ἀκρως χλίσσον, id est perquam tepidum. Id autem calidi frigidi quæ exacte est medium. Nam, quod vehementem habet facultatem

A tatem, propterea copiose ipsum vno haustu offerre veretur. Pari modo & astate frigidum porrigere, ut antea præcepit, ideo timet, quia tum pleuritides tum peripneumoniae, in quibus nihil expuitur, incoctæ sunt. Coctiōi autē perpetuo calidum opitulatur confert q̄: frigidum vero renititur & aduersatur. Cur ergo calidum etiam oxymeli deuitat Hippocrates? An ob morbi malignitatem malum q̄: morem, ne videlicet protinus ex tali potione cruda persistat affectio, hominem q̄: a calido oxymelite siticuloliorē fieri contingat? nempe, q̄ symptoma hoc viscosum reddat sputum, exposuit. Tutius ergo mediocriter tepidum esse oxymeli arbitratur Hippocrates, utpote qui calidi eam, quæ succedere possit, frigidi q̄ de necessitate succelluram, fugiat lesionem.

- 30 *Quod autem parum acre est, os fauces q̄: humectat, sputum educit, & sitim sedat: qua occasione hypochondrii visceribus q̄: est beneuolum, mellis que inhibet noxas: nempe, quod in melle biliosum est, castigat.*

Postea q̄ de supra modum acri oxymelite sermonem absoluit, ad id, quod mediocriter acre est, trāiit, humectare ipsum os fauces q̄: & sputū educere, et sitim sedare, in textura orationis ingens. Nēpe, quod omnia, quibus iuuari egritudines natę sunt, habet, id eorū, quę nocere valēt ob vni tēperaturæ, nihil habet. Nam mulsæ tm̄ aceti est admistū, ut, quod in ipsa biliosum sit, queat sufficenter καλᾶσαι, id est καθελεῖν & ταπεινῶσαι, id est castigare, inuerrere, & suppressere. Nēpe in quarto de simplicium medicamentorū viribus dulcem succū acri maxime potētia aduersari monstrauimus. Cum itaq; mulsæ facultas cætera quidem omnia, quibus morbi huiusmodi opus habent, contineat: in vno autem duntaxat contraria, q̄ s. supercalfacta ipsa bilescat: migrationē sanē huiusmodi permistio aceti cohibens, optimum efficit medicamentum. Nempe minime siticulolum erit: atq; ob id sputa, quæ non omnino crassa glutinosa q̄: sunt, facile educet: hæc autem, quæ duo numero existunt opera, consequitur partium oris faucium q̄: humectatio. Qua vero occasione hoc facit, ea tum leni tum hepatis maximam affert commoditatē, viscera innoxie expurgās.

- 31 *Flatum præterea discutit, & vrinas mouet.*

De mediocriter acri oxymelite adhuc differens, hæc protulit. Nam in pulmonis thoracis q̄: affectionibus plurimo est vsui, maxime q̄: insignē habet patrocinaū ob metricā illam aque aceti q̄: & mellis permissionē. Tale siquidem oxymeli spiritum crassum flatuosum q̄: in hypochondrio secatur: flatu q̄: abrūpens, vias oēs expurgat: atq; ad vrinas tū serosa tum biliosa agit excrementa.

- 32 *Sed partem intestini infernam reddit humentiorē, facit que ramenta.*

Eam, quæ supra id, quod secundum naturam est, innascitur partibus, humiditatem, πλάδον Hippocratem nominare neminem ex nobis præterit: hoc igitur efficere ait oxymeli. Nam, quicquid crassi glutinosi que succi superius infarcitur, id abradit secatur que, atq; tanquam ad excretionem subducit: facile item & hac facultate ab iecinore facit excrementorum educationes, ita ut collectis superioribus cunctis humiditatibus in intestinis ipsis & potissimum infernis, ob multitudinem quidem innascatur ea, quę supra naturā est, humiditas, ob qualitātē vero intestini abrasio: nempe & oxymeli detergente præditum facultate, tandem abradet intestinum. Eiusdem quoq; est facultatis, quod cum oxymelite descendit chylōsum excrementum: quapropter & sine oxymelite, si aliquando exuperauerit, intestinum abradet.

- 33 *Interdum autem & in acutis morbis est inutile, & potissimum, quod non flatum modo foras prodire vetet, verū quoque & reuerti faciat. Præterea & maxime vires imbecillitat, & extremas infrigidat partes.*

In acutis interdum morbis abrادی intestinum, bonum non est. Vlceratio enim quædam superficialis est ipsa ramentosa affectio. Quæ cum talis existat, ab irrupentibus omnibus, & præsertim mordentibus, molestiam recipit intestinum. Quod affectum, nisi protinus mordentia excreuerit, ad regionem superiorem ea, quæ irrumpunt, remittit. Quo fit, ut ea occasione flatu etiam sursum recurat. Naturalem siquidem functionem circumstrictoriam, sortita sunt intestina, ut in commentariis de facultatibus naturalibus est demonstratum: sed, quæ irrumpunt, a partibus, quibus continentur, reici velōcitatis est opus. Cum igitur superne motus exordium habet, quæ continentur, deorsum habent excretionem: verum, si motio inferne capit exordia, sursum feruntur. Quod sanē in habentibus secundum naturam vsu venire videtur, cum scilicet vniuersim raptim que subeunte ad inferna intestina bile continemus excretionem, aut propter aliquam, quæ prompta sit, negocij curam, quæ interpellari non possit: aut quod non prope sit, quo venter exoneretur, locus. Nempe tunc recurrere sursum que ferri bilem ita percipimus, ut non adhuc externi possit, quibus ex huiusmodi bilis recurso stomachus male habet: aliis caput repletur, & ob morsum dolet: alij patiuntur vtrunque. Hoc igitur pacto, ramentosa in intestinis affectio, deorsum interdum externi celeriter, ægorum molestiam nequaquam sustinens: interdum autem & a partibus inferioribus ad superiores, vbi, quæ irrumpunt, non protinus ad sedem prodierint, sed is, qui sedem circulariter ambit musculus, tum contractus, tum recti intestini extremum ipsum abstringendo complexus, principium motionis obstri-

* In oibus antiquis grecis legitur χαλᾶσαι, id est biliosum, & ita et habet vetus tralatio.

* vetus interpretis legit, huius virtutis.

Floris ex infernis partibus ad superiores fecerit. Ob eam igitur causam non flatus modo, verum E & extremum in huiusmodi affectionibus reuertitur. Contingit autem & vires offendi ob eum, qui in transitu ipso sequitur, morsum. † Nempe abradentia, tametsi, quod irrumpit, breuissimum habeat morsum, vehementer tamen infestant. Scimus autem dolorem omnem vires exolucere, atque ob id partes infrigidare extremas.

† Nempe
qua abradun-
tur, tametsi id
quod pertran-
sit, minimam
habeat mordi-
cationem, vehe-
menter tamen
infestantur.

34 Et hæc sola est, quam nouerim, oxymelitis noxa, quæ scribi digna sit.

Oxymeli mediocriter temperatum, noxas omnes, quæ ex mulla, vino, & aqua emergunt, effugisse paulo ante est monstratum. Si quando igitur nocuerit, solum nocet, quod abradat intestinum: id quæ facit in iis, qui imbecillius habent natura & pati idoneum intestinum.

35 Exiguum autem potionis huius nocte quidem & ieiuno ante sorbitionem dare expedit: quanquam & à sorbitione, modo longum intersit tempus, nihil vetet bibere.

Vbi facultatem, quam habet, percurrit, ad rationem temporis, quo maxime ipsum quis porrigere debeat, in præsentem peruenit †: & potissimum, cum, qui oxymelite vti debet, is sorbitionibus alatur. Nempe, vbi quis non sorbitionibus, sed potione sola regatur, tempus in illis postea docet. F. At ergo in sorbitione vtentibus illud duntaxat obseruandum tempus, quo sorbitio ingeri debet. Ptisanæ autem cremor sorbitio est: qui, vt corpus alat roborat quæ, assumitur. Ad quæ confert, si nutritionis tempore solus in ventre contineatur: nempe antea didicisti cibos multiplices & præsertim facultate dissimiles magnam progignere in ventre turbationem. Ob eam igitur causam non porrigendum oxymeli, nisi cremor concoctus fuerit. Qui si coctus fuerit, licet tum nocte tum appetente die ante sorbitionem sumere. Tempus autem inter sorbitionem oxymeli quæ mediū latus facit, † si ptisanæ cremor vacuum simul & purum ex ea, quæ ab oxymelite facta est, abstersione, ventriculum ingreditur.

A † Ex Grecis
co. & tralatōe
veteri clarius.
& primo quidē
tēs explicat, qñ
maxie quispiā
ex is, qui sorbi-
tionib⁹ alunt⁹,
oxymelite vti
debeat: postea
vero, licet non
sorbitionibus
sed potione so-
la quis regat⁹,
tēs quoq; quo
illi exhiberi de-
beat, docet.

B † Antiqua
tralatō hęc ad
dij. quantitas
duarū horarū.
quod est, quia
oxymeli præce-
dit in hoc spa-
tio, & penetrat
parcius ad ve-
nas, & parcius
descendit: ita vti
ptisanæ cre-
mor vacuū si-
mul & c.

C † Præsertim
quidē ob abra-
sionē vel exa-
spirationē in-
testini: ei enim
sine stercore
existētī magis
vtiq; hęc in-
ferat p̄sente vaso
rū inanitione:
postea p̄o, qā
melicraci ēēt vi-
res aueſcat.

D † Tum qā,
cū intestinum
nudū sit, id ve-
hemētius abra-
dit, a ptisana
enim quodam
modo inungit⁹,
vbi eam abfor-
pserint: tū quia
melicraci vtili-
tatem corpus
haurit quaquā
assumit.

κατάκο-
πο

36 Qui autem non sorbitionibus, sed potione sola vtuntur, his non semper oxymelite vti expedit, † præsertim quæ quod intestina abraduntur, satiscant quæ, & succumbant. Nam, cum stercore vidua & destituta sint, vacua uem venæ, atque ablata à melicrato vires, citius inducuntur.

Qui victus rationem non ex ptisana, sed ex potu solo, sibi instituunt, iis non per totum morbum est conueniens oxymeli, † quod vehementius intestinum ipsum tum nudum tum humore alio destitutum abradat. Nempe à ptisana quodam modo inungitur, vbi eam assumpserint, & cū corpus nihil à mulla auxilij acceperit. Mulla autem auxilium, quod corporibus affert, cū de mulla ageret, prædixit.

37 Quod si potum hunc quidem multum per totum morbi tempus profecturum existimaueris, paulum aceti, tantum quæ, vt duntaxat sentiri possit, infunde: sic enim & iuuabit, et lædens, minimū lædet, et ea, quæ oportet, præstabit.

Cum sitim quidē mulla inferat, sputa autē in bronchiis pulmonis contineantur vel glutinosa vel admodū crassa, tūc solo est vtendū oxymelite. Neq; memoria excidat dicta hæc fuisse de iis, qui solo potu sine sorbitione vtuntur. Si igit, vt dixi, solo vtendū sit oxymelite, paulū aceti mullæ infundere conuenit, vt aceti vsu cōmodo quæ fruatur: & fugiat, quod ab eo est, detrimentum. Sed acetum mullæ cōmixtum excoquere oportet, nempe hoc pacto ad nocendum imbecillius redditur.

38 Vt autem in summa dicatur, quæ ab aceto est acredo, picrocholis magis, quàm melancholicis, prodest. Amara si quidem dissoluuntur desciscunt quæ in putitam, cum ab aceto in sublime attolluntur. Nigra autem fermentantur, attolluntur, & multiplicantur: nempe nigra educit acetum.

Picrocholas naturas appellat Hippocrates, quæ amarum sibi cōtraxerunt succū, cuius generis est bilis flaua: his idoneū esse ait acetum, quod melancholicis aduersissimū existit. Nam & bilem nigrā acidam esse contingit, cum s. præter naturam habēte corpore † & syncera & impermixta fuerit. Nempe, cum recte valet, plurimum quidem prædictæ habet qualitatis, non tamen exquisitam ipsam. Reliqua dictionis manifesta sunt. Docet siquidem in ea, quoniam pacto acetum picrocholis, qui in temperamento calido ceteros vincunt, adiumento sit, vt ipote quod frigidum sit.

39 Mulieribus autem longe magis, quam viris, aduersatur acetum: nam vterum dolore afficit.

Quod acetum suapte natura neruos offendat, testatur experimentum, & ratio demonstrat. Nempe exangues sunt, & ideo frigidi, facile quæ ab iis, quæ refrigerant simul & tenues habent partes, afficiuntur medicamentis. Læduntur præterea & à reliquis refrigerantibus omnibus: led, substantiæ aceti quod tenuium est partium, in eorum mergitur profundum: atque in omnes ita penetrat partes, vt ne minimum quidem ex eis illæsum maneat. Sic igitur acetum neruosas offendit partes. Vterum autem anatomici ferè oēs neruosum esse dicunt. Verum & absque eorum adnotatione, quam ex anatomica inspectione fecerunt, poteris & tu de eo ratiocinatione colligere.

Nempe

A Nempe ad maximā laxatur molem, & ad minimam contrahitur: quantus etenim foetus fuerit, tantū ipsum perpetuo circulariter ambit: impletur q̄ spatium omne ab eo, etiā si foetus paruus fuerit vel magnus, veluti vter a cibis. Sed vteris non magna est cōtraria permutatio, vteri autem maximæ: plurimum autem dilatari neruorum proprium est corporum, & non carnosorum.

DE AQUA

40 *Aquæ, quæ in acutis bibitur morbis, nullum sanè aliud habeo, quod illi concedam officium. Neque enim in p̄rip-
neumonicis iussim sedat, neque sputum educit: immo ceteris minus, si quis aquæ potione prorsus utatur. Verum, si
inter oxymeli & mulsam paulum aquæ insillitur, ob qualitatis potionum transmutationem sputum educit: nempe
intus inundationem quandam parit. Aliis neque sitim sedat, sed amarescit: nempe ei, qui suapte natura biliosus exi-
stet, ea est biliosa. Hypochondrio præterea est mala, atque etiam pessima biliosissima quæ, & vires maxime labefa-
ctat, ubi in vacuitatem venerit. Adde, quod venem auget iecur quæ, ubi inflammata sunt, fluctuat quæ & innatat:
tarde siquidem meat, quod subfrigida & incoctibilis sit, neque aluum deicit, neq; urinas mouet. Atque ex eo quoq;
nocua est, quod stercoreis suapte natura expers sit. Quam si pedibus frigentibus aliquando quis biberit, ea his omnibus
multo magis nocebit, ad quoduis eorum venerit.*

* Al. pleuriticis

* Al. ἐπι-
φειμένον, &
inforbeatur.

B Neq; incidēdi vim aliquā habet aqua, vt acetum: neq; calida est, vt mel: quod sanè non calfacit modo, verum quoq; & detergit, secat q̄. Tarde igitur iure optimo meat aqua, difficulter concoquitur, atq; ægre descendit, quanq̄ alioqui & optima sit, & culpa omni vacet. Nam, quæ vel limosa, vel male olens, vel salsa, vel alterius cuiuspiā medicamentosa qualitatis particeps existit, ea nō simpliciter est aqua, sed cum tali quadam permistione medicamenti: vt si mel vitiosum, vel pituitosa, vel acetū, vel uinum, vel quippiam tale designaueris: non enim ex illo genus totū culpabis, sed id solum, ad quod conuertis mentē. Cum igitur super lingulis, de quibus enunciat Hippocrates, sermo de optimis sit, ita & nunc intellige, singula, quæ dicuntur, ad optimā referens aquam. Ea autem purissima est, & omni aliena qualitate destituta. Hæc igitur quanq̄ optima sit, multo tamen tempore in ventriculo manet, fluctuationes q̄ plurimū parit. Quo fit, vt, cum biliosus ventriculus fuerit, corrumpatur & illa. Præterea, & cum ex ventriculo ad ieiunum intestinum egre perueniat, non facile distribuitur neq; in hepar, & minus in renes, thoracem, & pulmonem. Quo fit, vt neq; urinas mouere nata sit, neq; sputum educere. Immo neq; per totū corpus molitur transpirationes: id nanq; substantiæ, quæ tenuium sit partium, opus est, calidæ q̄, non frigidæ & crassarum partium. Neque præterea sitim sedat, q̄ in amplis tum ventris tum intestinorum animalis

C instrumentis plurimo maneat tempore: neq; prorsus imas ipsorum penetret partes, neq; ariditatem humectet. Quod autem non alat, antea est dictum: quo fit, vt neq; facultatem vitalem roborare possit. Atq; ea est causa, propter quam Hippocrates ad mulsam, oxymeli, & vinum se contulit, in egris ab aqua abstinens. Iam igitur ob eas causas nunquam ea quis utatur: vtuntur tamen & alij quidam medici, atq; etiam Hippocrates: sed hic minus, ceteri magis. Nempe, quod ceteris perperam vtantur, circumuenti, ad aquam ipsam recurrunt, quæ non insigniter, quod præter animi sententiam succedat, habet, quando ne virtutem quidem. Sic enim Erasistratus dicebat, For-

tes tum ciborum tum potuum facultates tempestiue quidem assumptæ maximum iuuamētum: intempestiue vero maximam offensam afferunt. Quem autem vitiosum esse dico, tum oxymelitis tum mulsæ, tum vini vsum, is quidem oritur & ob repentinas mutationes, vt ipse ostendit, & magna ex parte ob synceram, quæ a medicis fit, permistionem. Cum igitur seni cuidam agrotanti quotidie vinum aquosum exhiberem, quidam ex huiusmodi medicis præsens, me vini minimum aquæ ipsi instillantem contemplatus risit, egrum quæ vinum non bibere, sed duntaxat videre dixit, non sanè intelligens mistionis vini, quod gratia voluptatis datur, ad aquam aliam esse symmetriam, & aliam esse eius, quod ad opem ferendam ministratur. Nam vini omnino mi-

D nimum veluti excitationem quandam, quæ ad distributionem aquam trahat, permiscemus, quod duntaxat aquæ tollamus synceritatem, non autem aquam vinum faciamus. Sunt autem plerique ex sanis, qui vinum aqua dilutum bibant, sed in his aquam gustatu ipso euincere non oportet, sed vinum: in agrotantibus vero adhuc magis, ita vt pauca sit vini repræsentatio. Sic & de oxymelite paulo ante dicebat, aquosum laudans: quod item tutius quispiam ea vteretur, quæ aquosa est mulsæ. Nam syncera pura quæ, nisi ventrem subducere anticipauerit, magis nocebit, & potissimum in amaræ bilis hominibus, & illis, quibus præter naturam tumefacta sunt viscera: in quibus & aqua detrimentum affert, cum plus iusto in hypochondrijs morata bilefcit. Nempe & præter hæc omnia, quæ habet mala, stercoreis adhuc expers existens, nullo pacto aluum subducit. Aquam autem in principiis accessionum potam lædere, (quod manifestauit, cum dixit /quam si pedibus frigentibus quis aliquando biberit, ea his omnibus multo magis nocebit/ eorum est, quæ omnibus & nota & certa & confessa sunt. Quando igitur bibi idonea est aqua: Cum scilicet potu solo eger usus fuerit, non dum accepto pituitosæ cremore: tunc enim in potionum aliarū medio aquam tempestiue quis ingesserit, & præsertim cum siticulosus æger fuerit: nempe eam πλεμμυρίδα quandam, id est humidam cuiuspiam copiam facere ait. Quo fit, ut inter mulsam oxymeli quæ parum aquæ exhibeat, quod iis, quæ expui debent, conferat ad humectationem. Immo,

* Al. manum.

& cum uinum grauiter nocet, tunc aquam propinant. Quo' nam autem pacto id enuntiaturus esset Hippocrates, audiemus.

41
* χιρρόν, quod
superius verte-
rat fuluū, Gel-
lius giluū ver-
uit.

Cum vero in huiusmodi morbis fortem capitis grauitatem vel mentis lētionem suspicatus fueris, à vino penitus est abstinendum: aquam quē tunc dare oportet vel vinum aquosum, flāuum quē & prorsus inodorum: atque ab ipsius potione, aquæ exiguum superbibendum, nam hoc modo vini potentia caput mentem quē minus tentabit.

Mens tentari ledi quod dicitur, cum æger febre correptus desipuerit. Nunc ergo mentis lētionem desipientiam dicit: in qua uino abstinendum præcipit. Pari modo & in uehementibus capitis doloribus. De utroque antea est dictum. Sed in prædictis symptomatis à uino omnino abstinendum prædixit, cōsequenter aquosum flāuum quod omnino, & quod odore careat, dandum ait. Aquosum quidem & inodorum dare bene dicitur, sed flāuum non admodum recipio: nam ad ea aquosum album melius existit. Etiam uero in eam gratiam, cum uina talia sunt, superbibendam confestim aquam tutius præcepit. Minus enim (inquit) uini robur, quod uehemens est, caput mentem quod tentabit, ἀπὸ τοῦτο quidē uerbo usus sibi ipsi usitato cōsueto quod, quo ἀπὸ τῶν φρενῶν, id est mētis lētionem, ab huiusmodi uerbo, quod ἀψευδὲς nomine hominibus usitatus est, sese fecisse ostendit: caput autem mentem quod uino tentari ait, quod propter caliditatem celeriter ad caput feratur, feruētes quē in corpore secum ferat humores. Qua autem ratione caput male afficit, ea & mentem: nam in capite sapere ipsum situm est, & ea animę pars, quę ratiocinatur.

42 In quibus autem maxime aqua utendum sit, & quando ualde multa, & quando modica, & quando gelida, & quando calida, partim quidem antea dictum est, partim uero suo tempore dicitur.

Erasistratus quidem in libro de febribus malitiose satis criminatur Hippocratē, discipulos ipsius propē accusans Apollonium & Dexippum: quos ait cereos cyathos duodecim in sextantali cotulę cyatho effluisse, atque unum ex illis uel duos febrientibus admetiri. Verum Hippocrates non hic solum, uerum quoque & in ante dictis potionibus omnibus, copiosius largius uel manifeste uti uisus est. Quod & in presenti dictione liquido ostendit inquit, In quibus autem maxime aqua utendum sit, & quādo ualde multa. Nam & τὸ κάρτα πολλῶν, τὸ λίαν πολλῶν, id est ualde & supra modum multa significat: sed sanē satis erat dicere multam aliquando dari aquam sine adiectione aduerbii huius κάρτα, in ostensionē malitię Erasistrati, qui de Apollonio & Dexippo mentionem facit, nec ullum horum librum ostendere potest: nec Hippocratem ipsum intelligit aperte dicentem, Et quādo utendum ualde multa. Quin etiam & superiore oratione mulsam G inter oxymeli quę aquam porrigens utilem esse ait, quod πλημμυρίδα, id est humiditatis abundantiam parit. Scripsit & antea de mulla & oxymelite aquosis, quod os humectant, & urinas cient, non utique cyathum horum porrigens, sed quantitatem insignem, qua & os humectari, & urine cieri, & quę pulmonē infestent, expui possint. Pręterea & de oxymelite ita scripsit, Quod si potum hoc & quidem multum per totum morbi tempus profuturum existimaueris, adiciens hic multum. De malitia itaque Erasistrati aduersus Hippocratē dicta hęc sufficiant. Ceterum recordemur Hippocratē, quo modo ante, ita & nunc, polliceri se in morbis singulis propriam faciturum doctrinam: cum hoc in loco uictus instituendi artem non sufficienter conficiat, sed uniuersalia sola in exemplo morbi unius, scilicet pleuritidis, prosequatur.

43
* tritico.

* ἀρμενα.

† ὥς ἐν ταῖς
οἰκίαις ἐτι
θερμαινόμενα
τῷ ὕδατος ἐν
λέβησιν εἶτ'
ἐγχεομένου
τῶν ἐμβάτων
ταῖς πυέλοις,
ἐνδείξι μὲν
quorū uerborū
sententiā opti-
me uidetur ex-
pressisse uetus
traliatio. signifi-
cant, quod hoīes
adhuc, quā uole-
bant balneari,
calefaciebant
aquā in uasis,
& fundebāt eā
in tinam, dein-
de sedebant in
illa tinā.

De reliquis potibus, cuiusmodi est hordeaceus, & qui ab herbis uiridibus, uua passa, uinaceis, pīris, cnico, myrtis punico, & aliis parantur, cum horum aliquo uti intempestuum fuerit, in morbo ipso scribetur, ubi & de compositis agitur medicamentis.

Habet quoque suam & hęc dictio doctrinæ alterius, quæ de morbis singulis sit, promissionem. Verum, quicquid sit, liquido constat uel libros, qui de singulorum acutorum morborum curatio H ne ab Hippocrate scripti sunt, non extare, uel prorsus nō scriptos. Hi siquidem, qui nunc circūferuntur, præstantię Hippocratis non sunt: habent tamen multa, quę mentem ipsius oleant: ueluti, & quę huic libro adiacēt ab eo, qui de balneis est, sermone. Sed, ut dixi, de singulis in horum expositione commodius differemus.

DE BALNEIS

44 Balneum in plerisque morbis confert, in his quidem perpetuo, in aliis uero non. Est quę quando minus utendū sit, quod imparatum homines habeant: nam in paucis domibus parantur nēcessaria, reperiuntur quę, qui rem, ut oportet, curent. Quod si exacte quispiam non lauetur, non mediocrem incurret noxam. Tecto siquidem est opus, quod summo careat: copiosa item aqua, & crebra lauatiōe, sed quæ immediocris non sit, nisi res ita postulauerit.

Balnea huiusmodi, temporibus Hippocratis non dum parari uidebantur. Nempe dicere paucis in domibus parari nēcessaria, & reperiri, qui rem probe curent, opus quod præterea tecto esse non fumoso, copiosa aqua, & quęcunquē deinceps dixit: quod item in domibus calefiat adhuc intra lebetes aqua, labris quod infundatur: argumentum habet. Quod autem in fine dictionis ait, crebra opus esse lauatiōe, sed quę immediocris non sit, nisi res ita postulauerit, si utique memoria non exci-
dat,

A dat, in sequenti doctrina obseruabimus. Nam ipse dicet, quí nam sint, qui immediocri aliquando egent lauatione: id autem est, cum æger multa, dum lauatur, perfunditur aqua. Quod si dicere ipse non videatur, nos ipsi non simpliciter quidem, neque ut inciderit, sed cum eorum, quæ ab ipso scribuntur, consequentiæ obseruatione percunctabimur.

- 45 *Et magis quidem non abstergendum est: Quòd si aliquando abstergendum sit, calido aliquo, atq; multiplici plus, quàm existimetur, vtendum abstersorio, perfundenda quæ aqua non pauca, & celeriter post perfundenda.*

Nullus æger, cum lauatur detergi exoptulat, nisi sordidus sit, & pruritu vexetur. Nempe, qui ægrotant, aqua citra laborem omnem læsionem q̄ prolui debent. Deterfio autem purgamentis fit tum mordentibus tum siccantibus: quo fit, vt ea tum virtuti tum vsui balneorum aduersissima sit. Si vero æger detergi debeat vel propter sordes vel propter pruritum, vim medicamenti deterforij multa admixta aqua, immisso quoq; oleo, exoluere oportet. Quocirca inquit Hippocrates, Atq; multiplici plus, q̄ existimetur, id est, q̄ sanis consuetum sit, vtendum abstersorio. Non enim substantiam medicamenti abstersorij in ægris multiplicem accipiendam præcipit, cū non abstergēdū esse magis, q̄ abstergendū velit: sed deterforij q̄ritatem in ægris multiplicē fieri iubet p aque badauctionem. Ea siquidem ratio detergentia quoq; vitare præcipit non excitante vel sorditie vel pruritu, acribus q̄; ipsis & synceris non vtendum. Sicut autem multitudine aquæ admixtæ exoluit detergentis medicamenti acrimoniā, eodem modo totius deterforij vim exoluit, superinfundens statim multam aquam calidam puram q̄; atq; deinceps aliam.

- 46 *Via ad solum breuis sit.*

Cōmune id est, siue in balneo hoīem laueris, siue in domo aliqua extruxeris pyrā, & labrū aqua impleueris. Quod & nunc in castris fit sæpius, cū lauari quempiam deficientē balnei loco oportet.

- 47 *Facilis quæ tum ingressus tum egressus.*

Prorsus siquidem citra fatigationem lassitudinem q̄; ægrum seruare iubet: atq; ob id solum facilem tum ingressum tum egressum habere voluit. Id proculdubio fiet, si paries, qui aquam continet, neq; sublimis, neq; angustus fuerit. Maxime autem laudabile & à labore omni alienum est, quod in aquarum sponte nascentium conficitur lauacris. Nempe folia humilia ita depressa q̄; prope omnes conficiunt, vt nihil solij pauimento, quod prope est, emineat.

- 48^C *Qui lauatur, componat sese, taceat, & nihil agat: sed ceteros tum perfundere tum abstergere sinat.*

Hæc quoque prædictis similiter, vt æger non laboret, conferunt. Nempe & ægrotantis quies, vt corpus in balneo tum laxius tum mollius reddatur, est idonea. Nam, cum mouetur corpus, musculi tenduntur, tenfi vero minus tum molliuntur, tum relaxantur.

- 49 *Multæ quoque aquæ misturæ parentur.*

Cum Hippocrates inquit, καὶ μετακέρασμα πολὺ ἡτοιμάσθαι, i. multæ quoq; aquæ misturæ parentē, potest vnico legi verbo μετακέρασμα, atq; intelligi hæc præpositio μετα per se, & seorsum κέρασμα. Nam Hippocrates non in hoc solū libro, verū & in aliis, Ionum more per defectū vti præpositione μετα videt. Plene enim atq; integre ita leget, καὶ μετὰ ταῦτα κέρασμα πολὺ ἡτοιμάσθαι, i. multæ quoq; post hæc aquæ misturæ parentur. Siue aut quis vno intelligat verbo μετακέρασμα, siue distinguat distrahat q̄; pro μετὰ ταῦτα κέρασμα, vna est dictionis vtriusq; intelligentia: vult siquidem misturā parari, eū, qui in labro lotus est, perfusus: quod medici huius temporis oēs efficere consueuerunt, cū ægrum lauerint. Neq; enim in solū frigidum ingredi permittunt, sed tepida perfundunt aqua. Alij labra tota aqua huiusmodi replent. Nam, vt corpus, tum laxius, tum rariū, calida lauatione est redditū: ita rursum quiete paulatim q̄; contrahere ipsum, & cogere, & densare in animo habet. Nempe id ad virtutis robur confert, vt non facile homo lædatur, nisi subita quædam in ambiente aere fiat ad frigidum permutatio. Ob id, qui recte valent, à balneo calido sese in frigidam proiciunt aquam. Sed, qui ægrotant, contactum frigidæ non sustinent citra læsionē: quapropter frigiditatem calidæ mitione frangimus. Mitionis autē quantitatem inueniemus, in primis quidem, si corporis affectionē inspexerimus: deinde & propriā laborantis naturam, ætatem q̄; & anni tempus, & regionē, & præsentem cœli statum. Melius autē facient, qui à calido balneo tepidas non minus trium generū aquas, quæ inter se differant, parabūt: vt prima quidē admodū tepida sit, secunda vero minus: & tertia adhuc, quæ magis ad frigidū declinet. Tale autem quippiam velle visus est Hippocrates, cum præcepit misturas parari. Nempe, quod paratur, id non simpliciter modo multum, verum & multiforme, esse est melius, vt paulatim à calido ad frigidum procedatur, cum subitam ad contrarium mutationem æger non ferat.

- 50 *Celeres quæ faciant perfusiones.*

Ταχέας, i. celeres, referre oportet, non ad eam solum, quæ in perfusione fit, actionem: verum Septima Classis.

rrrrrrr iij quoq;

IN LIB. HIPPOCRATIS DE VICT. RAT.

quoque & ad illud, quod actiones interiacet, spatium: ut primam inter perfusionem secundam quod E parum sit intervalli. Quod si quis proprie nominaverit, non ταχέας, id est celeres, sed πυκνὰς, id est frequentes, dixerit. Quanquam apud veteres usus horum nominum πυκνὰς & ταχέας confundatur: nam aliquando πυκνὰς, id est frequentes actiones, ταχέας, id est celeres vocant.

51 Et spongiis pro strigili utantur.

Neque strigilibus in aegris ipsis, neque spōgia, medici huiusce temporis utuntur, sed à balneo eos linteo contegunt: alij vestibus & potissimum puris, ut plurimum sudant, obvolunt. Sed non semper egrum ipsum à balneo copiose sudare convenit. Nempe sepius laborantem ad balneum non vacuandi corporis gratia ducimus: sed prorsus contrariam ob rationem, ut scilicet humectetur madescat quod, quod immoderatus exaruit. In talibus igitur neque intus in balneo sunt expectandi sudores multi: sed quam citissime labri aquam ingredi, & postea egressos resiccare expedit.

52 Et non valde siccum perungant corpus.

Oratio hec succedit quidē huic, Et spōgiis pro strigili utant. Sed, quod sermonis proprietatem contemplatū fuerit, is de unctionis in balneo usu intelliget, ne eorum, quae de necessitate dicenda sunt, quippe praetermissum esse videat. Nam, ubi post balneum spōgia aqua deterfit Hippocrates, obscurum quidem est, si corpus unxerit: bene tamen egrum corpus, cum humidum existit, non perungendum esse constat: nisi si quispiam dixerit, quod Hippocrates hoc ipsum oleum, quod cum aqua est, relinquet. Est igitur utile, ut de unctionis in balneo usu discutiatur: sed necessaria magis est super unctionis tempore discussio, si oleum perfundere conveniat, vel ubi, qui lauat, sudaverit: vel cum siccus adhuc est, confestim, ubi sese exuerit, & prius, quam sudaverit: vel horum neutrum fuerit, sed ubi humescere coeperit. Sanè, quicquid eorum meminit, quod de olei facultate in simplicium medicamentorum tractatione dicunt, is exacte novit optimum esse olei usus in iis, qui lauantur, tunc, quod tertio dicitur loco: novit quod, quo nam pacto calfactum corpori exhibere conveniat. Nempe id corpus mollius reddit laxius quod: cum frigidum suo contactu non solum horum neutrum efficere natum sit, sed & eos, qui lauantur, frigentes reddat.

53 Caput vero spongia, quoad maxime fieri poterit, resiccare oportet.

Quod in balneo caput curiose resiccandum sit, ut ne minimum quidem supersit humiditatis, nequaquam est ambiguum: nam, quicquid relinquit, refrigerare consuevit. Non tamen, à spongia ut fiat, effici potest, nisi statim ab initio post misturarum usum. Capitis tamen aquam linteo resiccare est melius. G

54 Neque caput ipsum modo, verum & extrema, & quavis aliam partem corporis, à frigoris iniuria prohibere convenit.

A. li. 3. f. 3. d. 1
c. 5. fol. 61. e

Dixisse id per se seorsum, quae parum esse mihi videtur: quod enim pars nulla omnino nuda esse debeat, cum à balneo aquam eorum, qui lauantur, resiccant, constat liquido omnibus: nam, quae ita denudantur partes, cito eas refrigerari nemo ignorat.

55 Lauari quoque is non debet, qui nuper vel sorpsit vel bibit.

Non in aegris modo, verum quoque & in sanis, nullus confestim à cibi vel potus sumptione lauari debet. Nam qui biberunt, his caput repletur: qui vero cibum sumpserunt, his non caput modo, verum & corpus totum, alimoniam ad se prius, quam concocta fuerit, trahent.

56 Neque confestim à balneo forbendum, neque bibendum.

Sedata, quae ex balneo est, turbatione, tum esse tum bibere melius est: veluti & composita ea, quae ab exercitatione oritur. Nam cibum protinus vel potum sumere, caput replet, deuoratum quod interdum superfluitare facit. H

57 Magni autem admodum pendere oportet, si aeger, cum recte valuit, balneum valde affectavit, & lauari fuerit assuetus. Nempe tales magis appetunt, iuuantur quae, cum loti fuerint, adeo, ut laedantur, si non fuerint loti.

Demonstrata sunt haec per totum ferè horum commentariorum secundum, ubi dictiones exposuimus, in quibus parte prima consuetudinum vires enarrauit.

58 Peripneumoniae autem magis, quam ardenti febre, confert. Nam lateris pectoris quae & dorsi mulcet dolorem, spiritum maturat educit quae, & spiritum facilem reddit, lassitudines tollit, mollit articulos & cutem per summa apparentem, urinas ciet, capitis soluit gravitatem, & nares humectat. Tot ergo insunt balneo bona, quibus omnibus est opus. Ceterum, si in apparatu re una vel pluribus defectum sit, metus est, ne non prosit balneum: unum siquidem horum, quodvis fuerit, si à ministro non, ut oportet, praeparatur, valde laedit.

A. ibidem. e

Quare peripneumonias magis, quam febres ardentes, iuuat balneum, ostendit Hippocrates, cum inquit, Nam lateris pectoris quod & dorsi mulcet dolorem, sputum maturat educit quod, & spiritum facilem reddit. Ob haec etenim omnia peripneumonicis maximo est praesidio. Sanantur siquidem, qui contenta in pulmonibus sputa expuunt. Pleuritici quoque ob doloris mitigationem nem

A nem valde iuuantur. Quapropter duorum alterum: nempe vel ita scribendum, Peripneumoniæ autem & pleuritidi magis, q̃ ardentī febri, confert: vel in peripneumonia pleuritidem subaudi-
re oportet. Nam pleuritis dōlorem in latere habet: Peripneumonia non habet. Ceterum, cum peripneumonij magis, quā ardentibus febribus, conferre balneū inquit, docet quoq; & estuan-
tibus quibusdam auxilio esse: verum oratio hæc distinctionem expostulat, quam non dum erice-
re possumus, quia tempus, quo lauari ægrotantes velit, nō definitur. Vbi autem sequenti dictio-
ne enarrantem Hippocratem, quos nam haudquaquam lauare velit, intellexerimus, ad balnei tē-
pus ita perueniemus.

- 59 *Qui in morbis aluum plus iusto humidiores habent, ij non sunt lauandi: neq; ij, quibus magis, quā decet, deri-
netur, & soluta non sit: neq; summe imbecillitati, nec cibum fastidientes, nec vomitabundi, nec biliosa ructantes: nec
quibus sanguis ē naribus profluit, nisi minus, quā decet, fluxerit, quod autem decet, nō te latet. Si vero minus, quā
decet, fluat, lauabis, & si vniuersum corpus in ceteris, et si caput duntaxat iuuerit. { Si igitur apparatus hi conue-
nientes fuerint, æger q; foeliciter balneum suscepturus sit, quotidie lauare oportet. }*

Quibus complura per ventrem subducuntur, ijs balneum sistit, ea ad corpus vniuersum reuel-
lens: atq; hac occasione detrimentum affert. Quod autem, qui nullo modo deiecerunt, eos antea
vetustam fecem euacuasse melius sit, nemo ignorat: sicuti, neq; q̃ γερωνιδες, hoc est, τὰς κατὰ
λελυμίδες τὴν δυνάμιν, i. viribus resolutos, balneum amplius euertit. Ait præterea & ἀσώδεις,
id est cibum fastidientes, & vomitabundos haudquaquam lauandos: nempe hos viribus ita defici-
metus est, vt succedat ea, quæ stomachica appellatur syncope. Succedunt his, quibus os ventri-
culi bile redundat, quos nota indicauit inquiring, Nec biliosa ructantes. Pari modo neq; eos laua-
re conuenit, quibus profluit abunde ē naribus sanguis: † nam, si minus fluxerit, lauare est consen-
taneum. Hi autem sunt, qui etiam largo egent balneo: vt sanguis, qui in capite est, vehementius
moueat. Consimiliter lauabimus, si sanguis nullo pacto erumpat, & erumpere debeat. Ex adie-
ctione autem huius sermonis, Et si vniuersum corpus in ceteris, & si caput duntaxat iuuerit, cla-
rius adhuc significauit, quo nam pacto sæpius in domo calfacta ægrum absq; labro collocet, &
caput duntaxat citra reliquas corporis partes calida perfundant aqua.

† Ex antiquis
codic. grecis &
ex tralat. iōe ve-
teri hæc addē-
da. immodera-
tissime enim ip-
sis produci lau-
guis.

- 60 *Lauandi autem cupidos si quotidie bis laueris, nihil nocabis.*

Qui Victori Romano principi librum de victus ratione Hippocratis tradidit medicus, is di-
ctionem hanc & alias quasdam decurtatas scripsit: sicuti & illam, in qua dicit, † Non protelentur
primi sorbendi dies: Præterea & † Qui bis die cibum sumere sunt assueti, ijs bis dare oportet. Ve-
rum vtriusque harum dictionum dimidiam partem subtraxit, sed præsentis quidem nihil: tem-
pus vero nōn adiecit, vbi φιλοθυτρώντας, id est lauandi cupidos, eos intelligit, qui cum sani sunt,
lauari gaudent, atque ob id sæpius lauantur. Nempe hi, cum lauantur, eum accipiunt, qui ex
consuetudine est, scopum. In sequentibus autem ab Hippocrate tempus, quo ægros lauare velit,
audiemus.

† Vide tex. 41.
lib. 2 vbi ad ver-
bū interps tra-
duxerat. primis
diebus quauis
sorbitione, ne-
quaquam eos
prius mouet
bus & c.

- 61 *Tutius autem longe balneo vti possunt, qui tota vtuntur ptissana, quā qui solo vtuntur cremore: quanquam et
ij interdum vti possint: minimum autem, qui potu solo vtuntur.*

Tempus, quo lauādum sit, hoc in loco patefecit Hippocrates: quod si ab initio pronunciaſset,
multa sanē, quæ loco medio dicta sunt, non obscura essent. Ptissanam sanē totam porrigit ijs, qui
mitius habent: solum vero cremorem ijs, qui deterius degunt: verum ijs, qui periculosis acuti-
us q̃ laborant, potus solos. Quod autem toto in hoc cōmentario de thoracis pulmonis q̃ affe-
ctibus egerit, plurima quidem exempli vice in his morborum partibus & præsertim pleuritidis
vniuersalia præcipiens, sæpius est demonstratum. Est expositum quoque, quo nam pacto coctis
morbis ptissana vti velit. Eo igitur tempore etiā balneum sine periculo conciliatur, vt pote quod
ad sputorum, quæ in thorace & pulmone continentur, expurgationem maxime conferat. Qui
igitur ita habent, & quæ ex consuetudine est, accesserit indicatio, his lauationem duplicare ni-
hil prohibet. Ait præterea balneum ἥκιστα, id est minimum, iuuare eos, qui solo vtuntur potu:
vbi ἥκιστα ἐλάχιστος id est minimum significat, & non, vt quidam aiunt, & ἀμῶς, id est nullo pa-
cto. Nam inferens, inquit,

† Tex 20. libri
primi.

- 62 *† Sunt autem & ex ijs, qui vti possunt. } † Ex ijs autem, quæ ante scripta sunt, quos nam in singulis viuendi
modis iuuaturum sit balneum, & quos non, conyere oportet. Nam, quibus aliquid eorum, quæ balneum & bonum
reddere & iuuare possunt, deest, hos lauare non expedit: quibus vero nihil deest, signum q; adest ipsis, in quo laua-
re conueniat, lauare oportet. }*

† Hæc verba in
cod. antiq. & i
tralat. iōe vete-
ri, coniungunt
cū superiorib;
verbis Hippo-
cratis. ita vt v-
num duntaxat
sit cōment.

Non adiecit autem, quando ij balneo vti possint, sed nos, qui sententiam ipsius sequimur, di-
cemus. Potum solum ijs exhibet Hippocrates, quos acuti infestant morbi, vbi vires ad morbi vf-
que vigorem, qui interdum cum ipsa coctione existit, veluti in morbis thoracis, pulmonis q̃, suf-
fecturas sperauerit. Coctis siquidem, qui affectum progignunt, humoribus, confestim excrea-
bunt.

† Non sunt in
aliquibus vete-
ribus codi. nec
in tralat. iōe ve-
teri.

2. Aph. 47. Ext.
ord. 18. h

* ἐκ ποσὶν ἔχεται.

bunt. Quòd si, qualia oportet, solum expuere cœperint, in neutro adhuc modorum neq; in affe- E
ctu, neq; in symptomatis, morbus augebitur. Nam sapius affectio ipsa, qua laborant, mitior qui-
dem exilit, sed symptomata augentur, vt in phlegmone obfessis particulis quo ipse inquit mo-
do, || Cum pus conficitur, tunc dolores & febres fiunt magis, q̃ cum factum fuerit. Sapius autē
mutuis exultant incrementis decrementis q̃ symptomatum magnitudines, et ea, quę affectionis
est: sit q̃ id in ijs phlegmonis, in quibus pus effluit, quod iam est cōfectum, vt in vulneribus qui-
busdam fieri cōsuevit, & in peripneumonijs pleuritidibus q̃. Possunt ergo in his morbis & ij,
quibus potus solus vsui est, non inutiliter lauari: nempe dolorem ipsorum balneū mitigare ait,
& sputa maturare. Sed sanè vacuato prius corpore id faciendum. Sciueris q̃ in vniuersum de
balneorum viribus, q̃, si non antea vacuato corpore exhibeatur, membrīs affectis fluxionem pa-
rit. Vacuato autem si exhibeatur, coctionem iuuat: nempe corpore toto ante vacuato adhibi-
tum, aduacuatoriam obtinet facultatem. Quo fit vt ex febre ardente laborantibus, ijs tātum opi-
tuletur, qui sine tumore vel phlegmones vel erysipelatos laborant, seruēte in ipsis per totum cor-
pus bile. Quòd si coctionis signa habuerint, his multo magis conferet. Verum, si ardens febris
ob falsam pituitam putrescentem oriatur, aduersissimum illis esse balneum scire oportet. Neque
enim pituitosus humor, vt biliosus, per cutim euacuatur, propterea q̃ tum crassus tum glutino- F
sus sit, neq; extinguitur, longa egens concoctione.

DE IIS QUAE Pollicitus fuerat se postea dicturum.

Sect. 1. 2. 1. 108. c

Sect. 1. 2. 22.
112. c

* medicis.

Ibid. t. 32. 113. f

Ibid. t. 42. 114. c

Ibid. t. 45. 115. c

Sect. 2. 2. 11. 117. c

† In quibusdā
cod. græcis ad-
ditur τὸν δὲ
φλεγμονώδεις
i. pituitosus, et
ita vetus in-
terpres.† de ea q̃ i sanis
fit, mutatione
diætæ, docuit,
quō corrigēda
sit: c̃ de ea q̃
in aegris.


Nō sum immemor verborū Hippocratis, quæ in principio libri huius hoc refert pactio: || Quę
autem medicum ante animaduertisse agro non referente oportet, plurima dimissa sunt. Hæc si-
quidem, qui Hippocratem dogmaticum esse putāt, locos affectos esse dixerunt, & affectiones ip-
sorum, & causas. Sed, qui Hippocratem empiricum esse existimant, anni tempora esse, regiones,
ætates, & ambientis nos aeris conditiones, affirmauerunt. Hæc equidem omnia, tum quę a dog-
maticis tum quę ab empiricis dicuntur, vtilia esse non ignoro. Verum scopos multos hoc in li-
bro recensens Hippocrates, ad quos quis respiciens victus formam inuenire possit, nullius eorū,
quę dicta sunt, præter q̃ consuetudinis, mentionē fecit: sed sanè non nulla, quę reminiscentiā exi-
gunt, præposuit. Atq; ob id sermonem sum remoratus, vt hac, quę brevis sit, interpretatione eos,
qui totum legerunt librum, habeam sermonis huius per intelligentiam assecutores. Vnus sanè et
præcipuus scopus, tanquam in exēplo pleuritidis, talis in dictione ab Hippocrate enarratur: || Si
quidem sicior fuerit morbus, q̃ vt quispiam putauerit, non multum dare oportet, sed ante sorbi-
tionem, vel mulsam vel vinum, vtrum magis auxiliaturum putaueris, propinare conuenit. Post G
hæc deinceps ait, At, si os madescat, & quæ a pulmone expuuntur, talia sint, qualia esse oportet,
sorbitionis quātitatem, vt dicam summam, augere conuenit. Verum tum hæc, tum quę serie cō-
tinuata dicuntur, non sunt a gnidijs sententijs definita. Sed & post hæc, morbi coctionē animad-
uertendam esse ait Hippocrates, qui sanè scopus totius propemodum est Hippocrati speciei vi-
ctus instituendæ, atq; earum, quæ in ea particulariter fiunt, permutationū. Sed & alias deinceps
apponit definitiones, quæ tales sunt: || Quibus enim cibus statim inclusus est, si quis non vacuato
eo sorbitionem dederit, dolorem, si adest, adaugebit: & si non adest, protinus inducet. Et rursus
deinceps: Præterea, si lateris dolor assiduus est, calidis q̃ fomentis non remittatur, sputum q̃ nō
procedit, sed extreme citra coctibilitatem glutinosum sit, nisi quis dolorem vel alui subductione,
vel secta vena pro vtriusvis significatione soluerit, pituitas autem ita affectis dederit, præcipitē
aget in mortem. Post hæc & rursus definiēs, ait, || Si nuper pasto cuipiā, & alui oneribus haud-
quaq; purgato, febris vel cum dolore vel sine dolore inceperit, a sorbitione tantisper est temperā-
dum, donec cibus ad infernam intestini partem descendisse coniectum sit. Tum rursus, || Si nu-
per cibato cibus prior non descenderit, virtus q̃ valida fuerit, & floruerit ætas, subluere oportet:
si vero virtus imbecillior fuerit, balano est vtendum, nisi alius sua sponte probe deiecerit. Adie H
cit ergo in hac dictione eum, qui a virtute est, scopum, veluti in sequentibus sæpenumero, & id
considerari præcipiens, quæ nam causa & affectio sit, quę virtutem prosternant: vbi & hoc a me-
dicis ignorari adiecit. Præterea adiecit, || q̃ ijs, qui dolorem ad hypochondrium pertinentem ha-
bent, ea, quæ per talia medicamenta fiat, auxilio sit purgatio: ceteris autem, quibus dolor vel gra-
uitas ad brachium vel pectus extenditur, venæ sectio. Hæc igitur & reliqua huiusmodi, quæ itē
de consuetudine dicta sunt, a gnidijs medicis omnino sunt prætermissa, multo q̃ magis naturæ
& corporum temperamēta, de quibus sæpenumero in hoc libro egit, hos picrocholos appellās †,
alios melancholicos. His scopis inherens ac insistens † de ea, quæ tum in sanis, tum in aegris fit,
victus ratione agit, quō nam pacto & emendare & corrigere oporteat, demonstrans. Præterea &
in eo, quem de vino, oxymelite, & aqua facit, sermone scopos recensuit eosdem. Meminit quo-
que & coctionis morbi sapius, non paruum scopum vniuersæ victus rationis, earum quę, quæ
in ipsa fiunt, mutationum hunc faciens. Pari modo & de morbi vigore quippiam dixit: & ad
hunc respiciens, non tanquam ad abiectissimum in victus ratione scopum, alimoniam ministrat.
Cuncta hæc & reliqua talia a gnidijs medicis prætermissa sunt, quæ medicum ante animaduertis
se non dicente agro oportet.

A. 1. 4. f. l. 2.
42. fo. 424. h

GALENI IN LIBRVM HIPPOCRATIS
DE VICTVS RATIONE IN MORBIS ACVTIS
COMMENTARIVS QVARTVS

ARGVMENTVM

Liber à Quopiam ex Hippocratis discipulis, multis diuersis q̄; theorematis inordinate q̄;
dispositis conflatus, quorum plurima ad acutos morbos videntur pertinere.



B

Vā in libro de victus ratione post eum, qui de balneis est, sermonem scripta sunt, iure optimo pleriq; medicorum Hippocratis non esse sunt suspicati: nam à superioribus, & vi interpretationis & theorematum integritate longo discedunt interuallo. Neq; tamen abs re moti sunt, qui & Hippocratis esse existimauerunt. Nempe eorum, quæ scripta sunt, sententia propositum ipsius mentem que vsque adeo redolet, vt discipulum Hippocratis aliquem scripsisse suspicio sit: immo et ex his multa dictionem vnā cum sententia ita absolutam inculpatam que habent, vt rursus & ea ab Hippo

* exposita.

crate scripta esse suspicandum sit, vtpote qui librum componere, vbi singulariter morbi cuiusque acuti curationem doceret, vt in libro de victus ratione in morbis acutis promiserat, sese appaauerit. Præterea & alias in præsentī libro reperies dictiones, quæ Hippocrate ita indignæ sunt, vt legitimis iustis que adscriptas esse suspicari te oporteat. Sicuti & in aphorismis ipsis quidam huiusmodi visi sunt, partibus libri vltimis adiecti. Qui enim interserunt, quia multis in memoria sunt primæ librorum partes, vltimis adscribunt. Quod & in libro de capitis vulneribus factum esse videtur, & in secundo de morbis vulgaribus. Nec secus in eo, qui nunc nobis proponitur, libro reperimus, quæ interseruntur, atq; adhuc magis partibus vltimis. Cum igitur quatuor, vt quispiam dixerit, in eo reperiantur species, vna quidem quæ & dictione & sententia Hippocrate digna sit, altera autem quæ alterutro solum, vel dictione vel sententia, non nullæ vero quæ horum neutro: in singulis earum, quæ ad expositionem nobis expromuntur, dictionibus id ipsum C declarabimus.

I Causus, id est febris ardens, fit, cum venulæ tempore æstiuo exiccant & acres & biliosos, ichoras ad se traxerint.

Æstiuum anni tempus dixit calidū & siccum, siue vltimo vere fuerit, siue prima estate siue media vel extrema, siue primo autumno. Quod aut aeris nos ambientis temperamentum dispositionem corporis secum mutet, siccum quidem ad sicciolem, humidum vero ad humidiolem, in commentarijs Epidemiorum est demonstratū: Quod item & anni tempus mediocre & temperatum naturalem seruet temperaturam, cæteris, quæ in vniuersa victus lege agunt hoies, modo habentibus simili. Demonstratū præterea & corpus, quod à naturali moderata q; conditione sese alienauit, cōmutauit q; id, propter quod alienatū est & cōmutatum, ob illud peculiari egere auxilio, vt arefactum humectatione, humectatum exiccatione, calfactum refrigeratione, & refrigeratū calfactione. Cum igitur ob aliquam rerum, quarum exēpla dicit Hippocrates, circumstantiā venulas aliquas qualibet in parte corporis exiccati contigerit, à vicinis partibus trahunt hæ humiditates. Si ergo, quæ ad arefactas venas feruntur humiditates, vt substantia humidam naturam, ita & vim humectatoriam habuerint, pars naturalem commoderationem recipit. Verum, si humiditas D qualitate acris fuerit, & facultate siccatoria, corpus incenditur: vt si ex nobis quispiam siticulosus effectus liberaliter biberit vel vinum, quod, quia aqua marina largior mista sit, tethalassomenon dicunt, purū, vel aquam salfam. Scio equidē me aliquñ ex æstiuo itinere siticulosum redditū bibisse vini veteris paulo sincerioris calicem vnum, atq; ex eo sitim magis auxisse, nō placasse. Vt igit nos, quantū mente, quæ appetitum moderet, præditi, interdum quidem negligentius, interdū aut & incontinētius, atq; ēt, cum in prōptu melius nō sit, ad potū aliquem q & falsus & acris sit, peruenire cogimur: sic & venarū facultas attractoria perpetuo vicinis ex partibus humiditatē attrahit, substantiā ipsius, qualis nam sit, nullo pacto discernēs. Ratione etenim caret, qua quippiā ex meliori scrutari possit: sed, vt pueri bruti q; ad casu oblatū humidum, cū sitiunt, irruunt, hoc pacto & illa. Si ergo in vna quapiā corporis parte affectio ea fiat, in ea solum, q erysipelas referat, affectus quispiā erit. Verum, si venæ totius corporis supra modum exiccatae calidas carnosae ē partibus humiditates traxerint, in toto corpore fiet, quæ causum referet, affectio. Causus vero pprie dicitur nō caliditatis, quæ per totum fit corpus, præstat mō vehementia, verum quoq; & siti: nam sitis in eo vehemens est, & incompscibilis. Deest ergo presenti dictioni singularis de causi generatione sermo de partibus, quæ nos nuper adiecimus. Nempe in vna corporis parte, quæuis illa sit, interdū causus gignitur, interdum & toto in corpore. Verum, cum in toto fit corpore, sitim omnino

omnino parit: cum vero in vna parte, non de necessitate, nisi pars ipsa sitim pariat. Omnium autem E primum & maxime id facit os ventriculi, deinde ventriculus, atque ab eo stomachus, post pulmo, & subinde ieiunum intestinum. Vtrum igitur ita tantummodo sit causus, ut dixit, cum scilicet acres & biliosos ichoras ad se traxerint venule? An ne & carne id patiente erit causus, siue in parte vna, siue toto in corpore, pati eam contigerit? Ostendimus etenim eam vim habere eorum, quorum indiga est, attractoria. Preterea & fieri potest, ut modo altero similis affectio fiat. Modum alterum dico, cum ex validioribus partibus ad imbecilliores aliquam mittantur excrementa: nempe, quod particulis singulis ut attractoria, sic & expulsores inlit facultas, est declaratum. Fieri ergo potest, ut interdum quidem ex parte vna, interdum vero & ex pluribus, acres & biliosi ichores exacte ad dictas fundantur particulas, quae scilicet imbecilliores sunt. Quod Hippocrates ichoras, tenues humiditates appellet, liquido constat.

2 Febris quoque multa habet, corpus quae veluti ab ossaria lassitudine habitum laborat, dolet quae.

Febris ergo multa habet, propter naturam ichorum, quos & acres & biliosos ait. Nempe his superueniunt febres vehementissimae, id est quae multam & acerrimam habent caliditatem: sicuti quae & minorem & minus acrem habent, & pituitosos sequuntur succos. Laborat autem corpus totum lassitudine vlcerosa propter ichorum acrimoniam. Sed de lassitudinum omnium differentijs absolute in libris de tuenda valetudine est tractatum.

3 Fit autem magna ex parte longum ob iter, longam quae sitim, cum venulae arefactae, & acres calidas quae fluxiones ad se traxerint.

† Aliqui cod. antiqui habent, acres calidos & ichoras.

† & πῶν ὀίον καὶ τὴν κρᾶσιν ἔχοντος τὸ πλεῖον.

Tum in principio dictum est, tum rursus hoc in loco adiecit verbum hoc, arefactae, procatacticas appellatas causas, veluti exemplo, manifestans {primitiuas nunc dicunt.} Siquidem calide omnes & siccae causos progignere possunt. Scio equidem non nullos ob liberalem vini, quod tetralassomenon vocant, potionem causo fuisse correptos: Veluti & alios ob salsamentorum salsarum quae carniū atque aliorum quorundam salorum usum immoderatum. Alius ex ambulatione & estu veniens, primum quidem lauit se, deinde domum perductus, & vini misti plus bibit, coepit quae protinus affici causo. Alius autem ob iram, & alius ob vigilias causum incurrerunt.

4 Fit quoque & lingua aspera, sicca, & valde nigra: ventris quae morsu dolet, deiectiones quae & liquidae & pallidae sunt: urget quae sitis vehemens & vigiliae, atque interdum mentis aberratio.

† A. quae est causa vigiliarum.

* In aliquibus antiquis haec vox non habetur.

* ἑστῶν, i. focū.

Percurrit hoc in loco, quae causum subsequuntur, quae & συνεδρεύοντα, id est confidentia vocant. Sunt autem haec, lingua sicca aspera & nigra, ventris morsus, deiectiones pallidae, vehemens sitis, & vigiliae, interdum quoque & desipientia. Lingua sanè arefcit, quod tota corporis affectio sicca sit & calida, febris quae ipsa talis. Ventris vero morsus propter ichorum qui illuc confluant, acrimoniam oritur. Deiectiones autem pro succi redundantia. Liquidas quae eas (graece ἐξύγρως) dixit, nullo pacto concoctas exprimens: coctio enim omnia cogit incrassat quae. Qui autem ita habent, vigilant ob siccitatem. Nempe humiditatem immoderatam ad somnum dejectiones (graece cataphoras) multam vero siccitatem vigilias procreare est demonstratum. Accedit quoque & ab alijs symptomatis fatigatio, & quae ob vigilias efficitur. Desipientiam autem fieri sciimus ob eam, quae ad caput recurrit, bilem, & ob temperaturae caliditatem siccitatem quae. Quod autem, ubi quispiam bilem simpliciter dixerit, amara significetur, antea est enunciatum: quod item bilem eandem & pallidam & flauam appellent. Vt ergo nihil eorum, quae ad causum biliosum spectant, praetermissum videtur, nisi quod non solum sit per attractionem, sed & per effluuium ichorum, sic inordinate scripta quaedam sunt. Nempe ex ijs, quae dicta sunt, quaedam sunt symptomata causum indicantia, quae παθογνωμονικά dicunt, alia vero συνεδρεύοντα, i. confidentia. Verum, quae causos procreant, alia quidem προηγμένα, i. antegrediētia: alia vero προκαταρχόντα, id est praecipientia à medicis appellantur. Omnium autem, quae dixi, praegredientium symptomatum, potes tibi, ut lubet, catalogū facere. Sed, qui librum hunc scripsit, à praegredientibus fecit exordium. Venulas etenim exicari praegrediens causa est. Deinceps autem, cum praecipientia, ut ambulationem longam & sitim, dicere debuit, non ea dixit, sed ex ijs, quae affectum indicant, quippiam dixit, ut febrem vehementem. Debuit & hic sitim vehementem adijcere, quam postea simul cum alijs, quae confidentia vocantur, symptomatis dixit: quorum quaedam aliquando, alia perpetuo, causis insunt: quod & ipse ostendit inquit, Interdum autem & mentis aberratio. Nam, interdum, perpetuo opponitur. Ego autem dico & ventrem morderi & biliosa deijcere non esse ex ijs, quae perpetuo causis insunt. Nempe, quod vehemens morbus sit, motus quae acrium ichorum ad interna sit, propterea haec contingunt, ijs quidem, qui ventrem hepar quae causi veluti sedem habent: verum ijs, qui pulmonem veluti sedem habent, haec non admodum contingunt, sed quae de lingua dicuntur, & desipientia magis. Difficiliter etiam & hi spirant, ea scilicet, quae densa & magna est, spirandi difficultate, efflant quae continenter os aperientes, ignei quae spiritus effusione leuantur: verum totam spirandi difficultatem praetermisit, quā in prognostico dicta ostendimus. Caterum inordinate

A. lib. 4. f. 1. r. c. 41. fol. 424

A dinate symptomata linguæ recnesuit. Nempe debuit primum siccam dixisse, deinde asperā: nam ob immoderatam siccitatē lingua aspera redditur: vt, si aspera sit, omnino & sicca exsistat. Quod autem ob caliditatem immoderatam nigrescat, vt ijs, quibus cutis Sole vsta sit, iā ante didicimus.

5 *Huic, aquæ, mulsæ q; coctæ & aquosæ, quantum voluerit, bibendum dabis.*

Liber hic, etsi Hippocratis non sit, antiquus tamē est, quippe qui legitimo operi iam Erasistrati temporibus adiectus fuerit. Quapropter mirandum, quod nam pacto Erasistratus calices cereos in Apollonium & Dexippum retorisse ausus sit. Nam, qui librum hunc scripsit, mentem Hippocratis Erasistrato melius intelligens, causo laborantibus, quantum placet, bibere concedit: demonstrauit q; & in legitima voluminis huius parte ita sentire Hippocratem. Sed de Erasistrati malitia satis hæc sint. Etiam scrutemur, quæ in oratione dicuntur. Præcipit siquidem neq; aquam solam, neq; mulsam solam, ijs propinandam, qui causo laborant. Scis etenim aquam, q; natura frigida sit, tarde penetrare, & q; plurimo tempore in hypochondrijs manentem corrūpi in acutis morbis: mel autem facile bile scire. Ob id mulsam aquosam dari iubet, vt aqua, nulla in superiore ventre facta mora à misto melle ad distributionem trahatur. Ob eas causas & coctam ipsam exhibet: nempe, q; cruda, sitim magis arcet, & flatu magis vacat, vrinas q; magis ciet, vt, quæ cruda est, deiectionem. Minus siquidem acris, quæ cocta est, non solum, q; in coctura peragatur cōficiatur q;, verum q; & spumofum ipsius omne tollatur. Nempe, quod acre & flatuosum existit, in mellis est substantia: cocta autem tum morfu caret, tum flatu vacat, distribuitur q; melius, q; per intestina descendat: quo fit, vt eam ob causam magis alat, q; cruda. Cæterum, qui ita laborant, citra prissang succum mulsæ nutriendi sunt. Sed, quod in acutissimis morbis solos exhibere potus oporteat, in libri huius non spuria parte est prædictum. Hæc omnia, quæ ad præsentis orationis expositionem pertinent, ijs, qui & ante legerunt, & meminerunt eas, quæ in illis factæ sunt, expolitiones, ad hunc modum & dicta sunt & dicentur.

6 *Quod si os amarum fuerit, vomere confert, & ventrem subluere.*

Bilis amaritudo, amarum os reddit. Nempe communem vnam, quæ efficiunt tunicam, & quæ ventri interna est, & omnis ea, quæ os subungit. Non ergo sine ratione sermonis huius scriptor bilem tum per vomitum tum per clysterem euacuat.

7C *Verum, si ad hæc non soluantur, lacte asinæ cocto purgabis.*

Quod omnino quidem eam, quæ in vtre est, bilem, vacuare præcipiat, timeat autem purgantia medicamenta, q; & acria & calida prorsus existant, ob id ad lac asinæ diuertit, vtpote quod nullam, vt non aliud vllum, habeat acrimoniam, sed præ omnibus vnum humiditate exuperet, atq; ob id solum ventrem subeat. Præcoquit autem ipsum ob flatum. Sed sanè solo vti sero poteris, per oxymeli ipsum, vbi lac ante coxeris, separans, vas ænëum frigida plenum aqua continenter in lac demittens: nam, & hæc si probe fiat demissio, serum à caseo separat.

* Af. argenteum. & ita etiā Dioscorides.

8 *Salsum autem nihil neq; acre exhibendum, non enim descendet.*

Salsus succus qualis nam sit, ex sale apparet. De acris autem tum substantia tum facultate dictum est in quarto simplicium medicamentorum. Piper siquidem, sinapi, pyrethrum, & quæcunq; sunt eiusmodi, viribus calida sunt, & acria gustatibus apparēt. Quo fit, vt tū acria tū salsa, tanq; causum augētia, vitare iubeat. Hæc aut acribus magis siccāt, quanq; illis non similiter, sed minus calfaciāt.

9 *Sorbtionem vero, † nisi iudicationes transferint, non dabis.*

D Sermonem ita, vt robustam esse virtutem subaudiendum sit, intellige. Nempe hoc pacto Hippocrates doctrinam facit magna ex parte, quæ singulis in scopis præcipiuntur, scribens: atque ita deinceps semel dicens, comparare inter se, quæ demonstrata sunt, cōsideratis ipsorum viribus oportere. Quod vero sorbitio ante iudicationem danda non sit, si virtus sufficit, in prima huius libri, quæ legitima est, parte est demonstratum.

† Aliqui cod. habent, donec extra dies iudicatorios sit, ne dato.

10 *Et, si è naribus fluxerit sanguis soluitur ægritudo, atque si sudores supernenerint iudicatorij legitimi, cum vrinis albis crassus q; & lauibis subsidentijs.*

In acutis febribus quod ex sanguine feruet, ad caput fertur. Cum igitur rescissis ruptis q; venis natura id ipsum vnā cum acruatis vaporibus effluerit, cæteris prōptius dominatur & imperat. Pari modo, & cum per sudores ichoras feruentes expulerit, morbum sanat, si vtique morbo iam cocto superuenerint. Nam de re huiusmodi iam sæpius in alijs explanatorijs commētarijs est dictum, atq; in ijs, qui de iudicationibus sunt confecti. Vt igitur in prima libri huius parte, || quam omnes legitimam fatentur, eum, qui à morbi coctione est, scopum ad victus rationem commodissimum accepit, sic & nunc ad prædictionem. Subiicit quidem coctionis nomen: sed cōstanissimam ipsius notā in vrinis scripsit. Optima igitur vrina est, quæ albam & leuem habet subsidentiam,

sect. 1. 1. 2. 3. 11. 2. f

tiam,

1. Prog. t. 26. 4.
100. b

tiam, ut in prognostico || est demonstratum. Neque tamen ad spem salutis semper apparere expositum est, sed satis tibi sepe numero fuerit, si encephaloma naturali tum colore tum substantia commodum videris. Et iam his ita habentibus in interpretatione exuberavit dictio: nam ob dictas urinas constat & sudores iudicatorios esse, quapropter & frustra adiectum. Legitimi præterea non proprie in ipsis dicitur: nam secundum morborum ideas talem inferre consueverunt appellationem cum alij medicorum probatissimi, tum Hippocrates ipse.

11 Et si abscessus aliquis factus fuerit.

Rarissime per abscessum iudicatur causus, atque adhuc magis, si citra partis corporis adiectionem, recensionem quis fecerit. Nempe parotidibus, & id est abscessibus, qui post aures fiunt, & causos aliquos scio iudicatos, sed non legitimos. Id autem paulo post condiscas post expositionem.

12 Verum, si absque his solvatur, reuertetur agritudo, vel coxa vel cruris dolebit, expuetque crassa, si sanus est futurus.

4. Aph. § 8. Ext.
ord. 33. g

Vbi de sanguinis eruptione sudoreque egit, si absque his causus desierit, suspectam ait esse solutionem: nam paulo post reuertetur. Erit liquidem, ait, in recidiva crurum dolor vel coxae, spuetque crassa. Nempe, quod iudicandus, sanguinis eruptione, vel sudore, vel abscessu opus habeat, potest quis arbitrari recte dictum esse, si dictis adiecerit, quæ curationi intendens ipse scripsit, vomere scilicet præcipiēs, atque aluum subducere, potumque aquam & mulsam aquosam coctam comministrans. Quare, si cum his quidem & sanguinis eruptione, & sudore, & abscessum, causum solvere quis dixerit, aliās autem solui non posse, sermonem fortasse εμεν, hoc est iustum æquumque, dicere videbitur. Iustum autem æquumque dico, quasi mediocriter vera loquentem, atque priore magis, non tamen inculpatum prorsus. Neque enim verus est sermo. Nempe, quod in aphorismis dicitur, || A causo habito rigore superueniente solutio, verissimum existit. Rigorem autem hunc de necessitate sequitur interdum quidem sudor solus, interdum vero & biliorum vomitus solus, atque interdum deiectio sola: sed plerumque ex dictis tribus duo fiunt, & rursum quandoque tria. Nempe horum duorum de necessitate alterum in causo fit, si perfecte solui debeat: nam bilioli humores vel perfecte vacuabuntur, vel extinguentur. Prætermissa itaque videbitur præcipua causi sanatio, frigida scilicet potus, quo caulos perpetuo curauimus, nullo ex his moriente, quibus frigidam propinauimus in tempore opportuno: cuius expositionem priore quidem libri huius parte paucis percurrimus, at in cæteris tum commentariis tum operibus fusi. Sed forte quispiam me asserere putabit nullum ex istis, qui causo laborant, moriturum, qui aquam tempestive biberit: quanquam id non asserui, sed quod omnibus, quibus propinaui, cum adeo multi extiterint, ut numeri non meminerim, successit auxilium & salus: quod idem non est, ut si dicerēs causo laborantes omnino, si frigidam biberint, seruandos. Nam, qui perniciose insalubriterque habent, eos neque per aliud quippiam, neque per aquam, seruari est possibile: quibus neque ministrare sum conatus. Quod autem in fine dictionis narratur, Expuetque crassa, si sanus est futurus, in his tantum causis obseruare debes, qui passo pulmone oriuntur.

* insanabiliter

13 Causi genus aliud. Alius soluta, sitis magna, lingua aspera, sicca, salsa.

† quo tandem
ferantur duo cau-
sorum genera,
considerandum.

Veteres Græcos reperio nomen generis interdum in homonymis, id est æqui uocis, usurpare: homonymis inquit, quæ vnum quidem habent significatum, sed ex ipsius diuisione ad plures deducuntur differentias. In quo sæpius dicere consueuimus genericas rei huius differentias esse vel duas, vel tres, vel quatuor, vel quotquot esse possunt. Sed, cum & homonyma duplicia sint, aliqua quidem nullo pacto inter se communicantia, ut cum canem dicimus & terrestrem, & marinum: alia vero, quæ cum synonymis, id est vniuocis, aliquatenus cōia existant, cum ab vno factam appellationem habuerint, & ad quam interdum referantur: considerandum, ut dictum est, duo esse causorum genera: Huius quod exacte quidem cognoscetur, si substantiæ utriusque ratio, quæ in appellatione est, ostensa fuerit. Sed, quoniam à mentis conceptu ratio iudicium accipit, perscrutandum, si mentis conceptum causi ita consonum habemus, ut hominis, bouis, & equi. At, cum oratio commentario prolixior futura sit, tum ipsam tum ceteras ad breuem contrahere summam conabimur, hoc exorfi modo. Febre causum medicos reperio appellantes, cum vrens caliditas sitisque incompossibilis hominem torquet. Quod si ita habet, causum eum, in quo corpus non vritur, sitisque leuis sit, causum quidem simpliciter, exquisitum autem legitimumque non dicemus: pro dimidia autem parte cum talis sit, breuioris doctrinæ gratia causum nothum appellare haud perperam fuerit. Quo autem modo tertianis in febribus appellatione huiusmodi uti consueuimus, ita duo causorum genera esse intelligemus, ut tertianarum genera duo esse quispiam dixerit, vnum exquisitum legitimumque: alterum vero nothum spuriumque, cui videlicet ex legitimi quidem symptomatis non nulla insunt, aliqua vero non. Quod autem secundus causus, de quo in hac parte docere institui, tantum diminutus quidam sit, atque non exacte absolutus, certior fiet, si mentem ad ea symptomata, quæ à scriptore ipso in eo fieri dicuntur, conuerteris. Nempe principio ait, Alius soluta, sitis magna, lingua aspera, sicca, salsa, non eo adiecto, quod in priore adiecit. Nothus siquidem causus ex legitimi symptomatis alterum quidem

A. lib. 4. f. 1. l.
c. 40. fol. 41 d

A. lib. 4. f. 1. l.
c. 35. fol. 42 b

Adem habet, alterum non. Deinceps autem linguam asperam esse inquiens & siccam, non adiecit nigram, quo modo in priore: sed pro hoc symptomate falsam dixit. Nempe, ut, cum lingua amarulenta redditur, flauam redundare bilem ostendit: ita, cum falsa, falsum falsuginosum q̄ appellatum humorem, qui vnum existit ex pituitæ generibus: quæ tria sunt, ut tibi innotuit, acidum scilicet, dulce, & falsum. Quo modo igitur prior causus ex amara bile constas, pallidas geminam ob causam parit excretionem, tum q̄ tenuis fuerit, tum q̄ febris vrens augeatur, prænata in eo, quæ flaua est, bile: sic pituitosus humor neq; facile excernitur, neq; febrem auget, neq; sitim ardentem habet, neque in spiritum vertitur: atque ob id de eo dixit, aluus soluta, excernere ipsam solum ostendens, quod ipsi non excernere aduersatur: subit siquidem his venter, non tamen secundum humoris cuiuspiam ideam, sed ijs, quæ in alimentum ministrata sunt, corruptis. Non enim hi potu reguntur, ut quàm plurimi eorum, qui priore infestantur causo: nempe ij citam habent excretionem, ex tenui scilicet & feruenti humore constituti: seram vero hi ob frigidam glutinosam que & crassam pituitæ substantiam. Fieri ergo nequit, ut qui ita laborant, solo vtantur potu. Id siquidem didicimus in ijs morbis, qui in quinta vel septima die valida existente virtute coctione sunt recepturi: verum, si morbus ad nonum vel decimum quartum vel vigesimum sese prorogatur, rus sit, in eo circa initia puillanæ cremore vtimur.

14 *Vrina interceptio.*

Dici id ab ipso consuevit, vel cum non effatu digna, vel nullo pacto emittitur vrina: fit autem in instituto præsentis sermoni causo propter humoris crassitiam.

15 *Vigilia.*

Causo vtriq; hoc commune est atq; ob id in priore mentionem huius fecit: fit siquidem in illo magis, q̄ caput accendatur, inflammetur q̄ magis.

16 *Et refrigerata extrema.*

Symptoma hoc secundi est causi. Verum sermonem non simpliciter efferre conuenit, sed cum definitione aliqua: neq; n. perpetuo talis existit, at cum malignus fuerit. Nempe in biliosis vrentibus q̄ febribus, caliditatem ad extrema vsq; corporis extendit, etsi non malignus causus fuerit: at in pituitosis fumosa est caliditatis substantia, cum s. vel in ventre, vel hepate vel pulmone sal-
Causus humor putruerit, ob quæ quidem caliditas ignea redditur. Verum, si malignus euaserit mor-
 bus, refrigerantur extrema ob virtutis imbecillitatem, phlegmones q̄ totum ad se sanguinem tra-
 hentis magnitudinem: nam absque his nunquam lethalis efficitur morbus.

* sunt quidam
 cod. qui non ha-
 bent illam par-
 ticulam, non.

17 *Causus hic, nisi sanguis è naribus fluxerit, vel circa collum abscessus fiat, vel crurum dolor, et æger sputa crassa expuat (hæc autem adstricta aluo fiunt) vel coxarum dolor, vel pudendi luor superuenerit, non indicatur: testis quoque intensus indicatorius existit.*

Quod soluantur per abscessus magis, quàm per excretionem, quæ ex pituita putrescente oriuntur febres, sapius est demonstratum. At in præsentis causo non abscessus modo commemorauit, verum quoq; & sanguinis profusionem adiecit, magis q̄ in ijs causis, quorum sedes in pulmone existit. Nempe in huiusmodi affectionibus caput incalescens, sanguine repletur: effundit que, quod ex eo redundat, tum ruptis, tum adaperitis venis. Ob eandem causam circa ceruicem abscessus fiunt, & parotides, ijs, qui ita afficiuntur. Verum, quibus affectionis constitutio in partibus, quæ secundum ieiunum vel hepar sunt, existit, deorsum magis fiunt abscessus: quæ efficitur ratione, ut coxæ doleant, pudendum liueat, testiculus q̄ ijs tendatur, qui ita afficiuntur. Fit autem testis in-
Dtentio interdum ab ea, quæ in eo sit inflammatione: interdum quoque, quia à quopiam eorum, quæ superius inflammantur, attrahitur. † Quosdam autem eorum, qui in pulmone afficiuntur, crassa expuere cocto iam morbo diximus. Ex eo igitur liquet doctrinam confusam esse & inordinatam & indefinitam: quod, tametsi eam, quæ τὸν πυρρὰ καυμάτων i. librorum gratia fit, ὑποτύπωσιν i. subfigurationem deceat, libro tñ nullo pacto est peculiare proprium q̄. Nā, cum ex multis mēbris pallis tales fiant febres, deinceps & ex ordine symptomatum catalogū scribere oportebat, & non inordinate indefinite q̄, sed s̄m peculiarem proprium q̄ & propositum morbum, efficere. Et sanè in hunc dictum est modum, Aluus soluta, nō q̄ causis symptoma hoc perpetuo insit, sed ut interdum. Nam, qui in ventre dictam habent affectionem, ijs, corrupto cibo deiectiones liquidæ existunt. Qui vero in pulmone habent, ventre haudquaquam patiente, ijs deiectiones huiusmodi de necessitate non fiunt, cum interdum contrarium ita affectis cōtingat, ut dura s. sit aluus, difficulter q̄ excernat. Præterea † & quibus in iecinore causi subest radix, } & qui ob iecur causo laborant, ijs, quæ excernuntur, interdum quidem liquida existunt, & interdum sicca, veluti quæ αὐραθώδην appellant. } quasi caprarum stercorei similia excrementa dixeris, } cōbustis s. à visceris phlegmone scybalis. Cum igitur viscus huiusmodi solū phlegmone obsidebitur, id efficiet: verum, si cum phlegmone fuerit & imbecillitas, liquida deijciuntur, viscere scilicet alimentum ad se tra-
 here

† Quod aut qui-
 dam eorum cras-
 sa sputa expu-
 ant, hoc dictū
 est ac intelligi
 debet ijs, qui
 affectū in pul-
 mone habent
 concoctione s̄
 facta.

† Hæc non ha-
 bentur in anti-
 quis codicib⁹.

here nequeunte. Sed deiectiones huiusmodi ab ijs, quæ ventre affecto fiunt, chylisitate distinguuntur. E

18 Sorbitiones dato attractorias.

Quod sæpius dicere sum solitus, quod si obscura lectio nihil doceat, id & nunc dicam. Nam, qui ex pituitæ vitio laborant, pro potu quidem oxymeli est utilissimum, pro alimento vero pituitæ cre mor. Ego tamen, quando hoc noscam, nec opus habeam, ut ab alio discam, diuinare non possum, quas nam dicat attractorias sorbitiones. Oxymeli liquidem & secatorium, & incisorem, & absterforium dici potest, attractorium tamen nullo pacto, quia sanè, quod ab ipso attrahatur, demonstrare non possumus. Ad hunc modum neque pituitæ cremor attractorium esse asseremus. Sed forte quispiam dicet velle ipsum ventrem subducere attractorijs, id est, quæ crassum trahunt succum, cuiusmodi est, quod pituitam trahit. At vero sorbitiones non dixisset. Nempe hoc munus medicamentorum est & non sorbitionum, sicuti neque potuum. Innotuit ergo, quod nam pacto in obscuris dictionibus nihil certi comperti quod habeamus. Quapropter neque dictionem hanc defendere conabimur, quod nihil in ea certum finitum quod reperiat. Cæterum non mihi constat, quod nam homines pacto, ut in alijs multis manifeste errent, sic & in eo, quod ijs, quæ obscure dicuntur, gaudeant: quæquam omnes vno fermè ore perspicuitatem orationis virtutem esse, obscuritatem vero vitium, proclamant. F

19 In acutis autem morbis sanguinem detrahes, si vehemens morbus videatur, vigeat quæ ægrotanti ætas, & virum ad sit robur.

Sermo hic nimirum Hippocrate est dignus. Subit quod mihi in admirationem, quod inter aphorismos eum non scripserit, cum in paucis verbis vis magna comperiatur: quod aphorismis usu euenire solet. De his ergo, qui sanguinis egent detractio, frequens apud medicos fuit sermo. Quorum quæ de ea detractio maxime probabilia videntur, duobus à me scriptis secure sunt enarrata libris. Quorum alter de sanguinis detractio inscribitur: in quo, quæ commodant, omnia docentur. Alter scriptus est, ut dixi, medicis tum empiricis, tum dogmaticis. Verum amethodi, id est ab omni methodo alieni, Thessalij, uti & cætera sine demonstratione simpliciter dicunt: sic & sanguinis detractio *χαλασικόν*, id est relaxatorium, censent esse remedium: *χαλασικόν* vero non vno exponunt modo, ut per commentarios nostros, cum de methodica secta ageremus, ostendimus. Qui autem omnem de sanguinis missione historiam intelligere voluerit, legere tum nostros tum reliquorum medicorum libros potest. Nunc vero summam ipsam in paucos tandem relata scopos audi. Sanguinem etenim primum detrahes, si magnus tibi videatur morbus. Manifeste à G
*Al. paruos. perspecta quantitate tali utitur remedio propter vehementes affectus: neque refert, si vel vehementem vel magnum morbum dixeris. Secundus sanguinis detrahendi scopus est, si æger ætate vigeat: neque enim puer neque senex sanguinis sustinent detractio, etiam si morbus, quo ipsi laborauerint, magnus fuerit. Tertium scopum non pratermisit libri huius conscriptor, qui facultatis vitalis robur existit: neque enim in ijs, qui ætate vigent, cum ægrotant, perpetuo robur apparet. Quam ob causam quis forte duo hæc sola pro scopis detrahendi sanguinis satis esse autumabit, magnitudinem scilicet morbi, & virtutis robur. Neque enim senex, quod annosus sit, per se, sed propter virtutis imbecillitatem non fert sanguinis detractio. At certe pueri, quamquam vitali facultate valeant, tamen neque hi sanguinis sustinent missionem: prompte enim eorum substantia tum propter humiditatem, tum propter temperamenti caliditatem, euaporatur. Detractione igitur sanguinis non egent, qui connatam habent à temperamento vacationem. Ob eam causam scoporum sanguinis detrahendi numero non satisfacere videntur magnitudo morbi, & virtutis robur: melius quod feceris, si & vigentium ætatem adieceris. Quod porro in fronte dictionis dictum est, In acutis morbis sanguinem detrahes, ut consideretur, est dignum. Quo modo enim longorum morborum non meminit? Quoniam sanè de acutis nunc docet, atque ob id solos eos memorauit: nempe H
& ex longis multi sunt, qui sanguinis egent detractio, cum & hi dictis tribus subiaceant scopis.

Cæterum, cum omnia hæc recte dicta sint, quosdam tamen non recte usos fuisse est putandum. Quo enim nunc est Menodotus empiricus in sola plethorica appellata syndrome sanguinis missionem obseruari asseuerans. Nos autem & ea non existente, venam secamus, cum dolor vehemens hominem statim prehenderit, vel pars aliqua fracta fuerit, vel os ex loco pulsum sit, vel alius quispiam articulus contractus reductus quod sit. Neque etiam plethorica facta syndrome sanguinem semper mittimus, sed & frictione, & balneis multis, & abstinentia, quæ tribus vel quatuor diebus fiat, ad id, quod naturale est, reuocamus. Verum de his abunde tum in libro de plenitudine, tum in libro de sanguinis detractio, est pronunciatum, præterea & in libro methodi curatiuæ. Ad præsens ergo hæc de sanguinis detractio, veluti in commentario, dicta sufficiant. Verum, ut nihil desit, adijciam & eum, qui ab ambiente nos aere desumitur, scopum, cum fuerit abunde calidus & siccus, ita ut cito ab eo corpus euaporetur. Nempe tunc à sanguinis missione abstinemus, etiam si morbus magnus fuerit, vigens quod ætate homo. Id ergo auctor solum pratermisit, reliquis scriptis, atque etiam patientis ipsius corporis habitum. Verum procedente oratione & mentionem habitus fecit: qui & ætatis differentias in se comprehendere potest, ut ostendam.

Porro

20A Porro, si angina fuerit, & si aliud quodpiam ex pleuriticis malum, eclymate repurgato. At, si imbecilliores appareant, vel plus sanguinis detraxeris, clysmū tertio quoque die vētri infundes, donec in tuto ēger fuerit, et fame indigeat.

Συνάγχη, id est angina, partium, quę in faucibus sitę sunt, phlegmone est, quę post sanguinis missionem repurgari eclymatibus potest, id est quę in partibus phlegmone obfessis cōtinentur, per spūta euacuari possunt. Nempe corpus impurum excrementosum quę, quod vacuatur, iure optimo expurgari quispiam pronunciauerit. Ceteris autem acutis morbis omissis, de pleuritide mentionem facit, quo modo & in prima libri parte fecit. Si vero imbecilliores, inquit, tibi esse videbuntur, vel propter sanguinis ablati copiam, vel ob aliam quamuis rationem, purgationis vice clysterem tertio quoque infundes die. Nempe relaxato per sanguinis missionem corpore, quod ex morbificis humoribus qualitate vitiosum superfluit, per clysteres id euacuari iubet. Quod autem scopus illi sit non solum alimenti excrementa subducere, verum quoque & passum locum expurgare, palam est. Quod vero finē orationis facit, Et fame indigeat, iis, qui in primo libro a nobis demonstrata meminerunt, etiam manifestum euadit.

21B Φλεγμαίνοντα hypochondria non spirituum interceptione, septi transversi intensio, vel spirituum protensiones, quibus orthopnoea sicca pus non subit: sed a spirituum interceptione pathemata hæc superueniunt. Potissimum vero & iecinoris dolores, & lienis gravitates, atque inflammationes alię, & superiores septo dolores, morborum quę collectiones, quas συσροφές dicunt, solui non possunt, si quis prius medicari aggressus fuerit. Nam venę sectio in his præferenda venit: deinde clysmus est opus, si vehemens & magnus fuerit morbus: si vero non, & postea medicamento opus sit, sanē id post sanguinis missionem secure & mediocriter porrigendum.

* περιωδύται

* Αλ. αἰθ

Morborum, qui prius sanguinis egent missione, deinde ab ea purgari expostulant, catalogum facit. Primum quę inter omnes scribit, φλεγμαίνοντα hypochondria. Neque vocem hanc, φλεγμαίνοντα, ex Hippocratis consuetudine audias, velim. Nempe flammanes morbi omnes & calidi voce hac significantur: cuiusmodi sunt erysipelata, herpes, & carbunculi, & quę proprie phlegmonę appellantur. Verum recentiores medicis omnes speciei flagrantium corporum vni vetus commune nomen indunt: vocant quę hoc pacto solum eum tumorem, qui renitens cum dolore & multa caliditate existit. Verum, cum & alij præter naturam existant tumores, ut scirrhus, & qui a recentioribus medicis oedema appellatur (fuit siquidem & id aliquando commune nomen tumorum omnium præter naturam atque ipsius inflationis:) diximus quidem alibi, libro vno, de tumoribus præter naturam, verum impræsentia, ut cætera, ita & hoc summum dicatur. Scirrhus quidem renitēs tumor est, & doloris expers. Verum inflatio bifariam fit, nempe collectio in quibusdam cavitatibus vel sensui expositis, vel ratione contemplabilibus, flatuoso spiritu. Fuerunt sanē, qui aliquando tumores præter naturam in musculis secuerunt, tanquam pus in imo reperturi: sed nihil aliud, præter quàm spiritum, qui totam per carnem minutatim disseminatus esset, inuenerunt. Præterea & thrombi soli aliquando ab iis, qui ita secant, vel viscosa humiditas vel mucosa est reperta: verum in talibus tumor vel ex thrombo vel mucore erat, carne ad hunc affici modum apparente, spiritus autem in ea per minuta est disseminatus. Non igitur in præsentī dictione φλεγμαίνοντα hypochondria secundum alietum Hippocrati significatum dicta esse videntur. Nempe quam mentem habebit, quod ipsi adiicitur/non flatuum interceptione/ cum flammea caliditas in hypochondriis, siue cum flatu fuerit, siue non, eandem habeat indicationem: Neque etiam ita dicere est visus, ut coniunctim tum phlogolintum spirituum interceptionem, fieri dicatur, cum id falsum sit: nunquam enim spiritus interceptio flammeam hypochondrio infert affectionem. Qui ergo hæc scripsit, φλεγμαίνοντα hypochondria, dicere est visus, quę in tumorem sublata sunt. Post hæc autem mentionem de septi transversi intensione fecit, deinde & protensione spiritus. Septi transversi intensio manifesta est omnibus: sed spiritus protensos dicere visus est, veluti interruptos. De quibus in prima libri huius parte scriptum est, Spiritus offendens in ea, quę extra fit, aeris delatione. Super quo in dictionis illius expositione est enarratum. Siccam autem orthopnoeam dixit eam spirandi difficultatem, quę sine sputis vel educatione per tussim usque adeo vehemens est, ut inclināri citra suffocationem, qui ita afficitur, non possit. Quam fieri non ignoras ab angustia† earum pulmonis capacitarum, quę spiritum deferunt, quę id patiuntur iacentibus magis, minus autem stantibus, & profecto recte collocatis omnibus, quę in thorace existunt partibus: quo fit, ut & orthopnoea appelliteretur. Sed, cum ea interdum fiat ob visceris phlegmonen, ut in peripneumoniis, interdum quę & oppletis bronchiis, sanguinis missione ait egere eos, qui orthopnoea sunt affecti, eos inquam, quibus pus collectum non sit. Nempe, quibus pus collectum sit, eos puris vacuatione egere constat. Qui autem a spiritus interceptione (quod in angustiam acto pulmone fieri solet) hæc patiuntur, eos sanguinis missione iuuabis. Pari modo & iecinoris dolores splenis quę, atque cæteras omnes inflammationes, sanguinis detractio iuuabit, atque vniuersas morborum collectiones, Græci συσροφές dicunt. Quod autem morborum συσροφές dixerit eas, quę ab in-

* Aliqui cod. habet non, τοῦ μέρους, id est corporum, sed τοσούτων, id est morborum.

* κατακλίται
† capacitates spiritus, q̄ sunt i pulmone, quę id, & c.

Septima Classis.

ssssss

tumescensibus

tumescentibus fiunt partibus, par est: audio liquidem & nunc multos in Asia nostra tumores E præter naturam omnes ita nuncupantes. In his liquidem prius, quàm sanguis mittatur, purgationem interdiceret oportet, quàmquam & hanc quoque mentem rationem que deinceps dicat in ea, quæ sequitur, dictione.

- 22 Quicumque autem ea, quæ inflammantur, statim morborum inter initia medicamento solvere conantur, ij non solum ab intensa inflammata que parte nihil adimunt, cum non cedat obsequatur que, quæ adhuc cruda est affectio: verum quoque, & quæ morbo resistentia & sana sunt, absument colliquant que: Vbi autem corpus imbecille sit, morbus præualeat: Vbi autem morbus corpori præualuerit, remedium non habet.

1. Aph. 22. Ext.
or. 10. b

† Manuscripti quidam co-
dices habent,
ὅπερ, ὡς ἐφ' ἡν,
συσπέρφασθαι,
λέγεται ἐν τῷ
δε τῷ χω-
ρίῳ, i. quod sa-
ne, vt dixi,
συσπέρφασθαι
dicitur hoc in
loco.

Hunc exposuimus aphorismum, cū illum exponeremus, || Cocta medicari & mouere. Atq; in eisdem, quibus & nunc, symptomatis recte ad sanguinis missionem propius deueniendum præcipit, vbi vitiosi aliqui humores in partem aliquam confluant, atq; in ea acerventur, † quod modo quodam vt dixi συσπέρφασθαι, i. colligi, in ea parte dicitur. Quod autem in fine ante hanc scriptæ dictionis scribitur, quidā dignotioni inaccessum efficiūt, nomen φαρμακείας in casu accusandi pro genitiuo haud recte legentes ad hunc modū: ἀσφαλείας μὲν καὶ μετριότητος δ' εἶσθαι φλεβοτομίαν μετὰ φαρμακίαν, id est securitate & mediocritate indigere sanguinis missionē post medicamentū: F qua dictione significari volunt ad sanguinis missionem à medicamento veniendum. Verum in tota dictione prius ad sanguinis missionem veniendum, deinde ad medicamentum, præcipitur: non autē ē contrarium, vt ij scribunt, assumendum medicamentum, deinde ad sanguinis detractio- nem deueniendum. Cetera dictionis dilucida iis sunt, qui exacte dicta eius animaduertunt.

- 23 Quod autem quis repente obmutescat, id venarum interceptiones occlusiones que faciunt, si sano absque occasione vel fortī alia causa id contigerit.

Venarum ἀπολήψεις, i. interceptiones, appellat oppletiones, quæ à copia exoriuntur. Cum igitur supra modum oppletæ fuerint venæ, grauari virtutem est necesse, atq; in extinctionis agi periculum natuam caliditatem, quæ ob copiam suffocationi quippiā simile patitur. Oriuntur liqui- dem epilepsiæ, & apoplexiæ, & syncopæ cardiacæ. Nempe vno communi aphoniæ, i. vocis caren- tiæ, symptomate, symptomata huiusmodi significauit. Adiecit autem orationi, Si sano absq; occa- sione vel alia forti causa id contigerit. vbi προφασιν, id est occasionem, dicit causam manifestam, vt si quis in luctu vel pæcratio ex brachiorū accommodatōne ad periculū suffocationis circūductus fuerit. Causam vero aliā fortē dicit, qualis vel timore vel maximo animi mœrore percussis accidit. G In ægris autē vocis priuatio huiusmodi fieri potest, interdū levis duntaxat iis, quæ voci efforman- dæ subseruiunt, instrumentis, vel etiam iis, quæ respirationi deputauit natura. Potest quoq; con- tingere ob recentē quandam exolutionem & afflictionem virtutis. Vt autē ab huiusmodi apho- niis vocis q; priuationibus eam distinguat, quæ orationi appositā est, adiecit, Si sano contigerit.

- 24 Venam igitur brachij dextri internam secare oportet.

Velocissime & plurimum ex iis, quæ principes sunt, partibus, vena ea corpus vacuat: atq; ob id in acutissimis morbis ad eam sese confert.

- 25 Sanguinem que auferre inspecta secundum habitum ætatem que plurius minoris ue ratione.

Superius, cum de scopis missionis sanguinis ageret, corporis habitum quidem omisit, sed hoc in loco virium non meminit. Verum habitus nomen pro virtutis nomine dictum esse opinatur non nulli, vna ex re duo dici perperā existimantes. Nempe habitum ad corporis constitutionem referentes dicimus, vtpote cum quis vel mollis vel durus fuerit: robur vero virtutis functionum vehementia attribuiamus. Ex quo fit, vt duo hi sint scopi, vacuandi quidē † indicationem, q; com H munes sint, † habentes, sed inter se differentes, veluti & ab ætate. Verum ætatem ipsam ad corpo- ris habitum referre est melius, & nō virtutem. Nam pueris propter habitus molliciem, succi per- spirabili cute facile digeruntur: senibus vero nō facile propter siccitatem & frigiditatem. Satis q; esse tres hos detrahendi sanguinis scopos quispiam dicere potest, Indicationem euacuandi acci- pientibus nobis & à morbi, qui curatur, magnitudine, & habitu, & virtute. Cuius nam autē am- biens nos aer esse debeat temperaturæ, inspicendum esse, est, supra dictum.

† ΑΡ. κοινὴν εἶναι
δειξίν, i. eodem
indicationem.

- 26 Quam plurimis autem horum accedunt hæc, faciei rubores, oculorum constantiæ, manuum porrectiones, dentium stridores, pulsus, maxillarum contractio, refrigeratio extremorum, & spirituum in venis interceptiones.

* ΑΡ. ἐξ αὐτῆς,
id est repente.

Inter hæc, quæ deinceps accedunt, faciei solius, qui ante scribuntur rubores, sanguinis topiam indicant. Succedit oculorum constantia, id est immobilitas, & manuum porrectiones: nempe & eas lædi ob neruorum principium contingit, sed aliter, quàm sit oculorum constantia. Nempe ea veluti torporem quendam functionum in neruorum primordio indicat: manuum vero por- rectiones & dentium fremitus neq; ob quietem neque ob principij immobilitatem, sed propter vitiatam motionem, exoriuntur. Quid autem pulsus indicent, non omnino constat. Nempe ve- teres

THE

27

† MET: 0001, 1.
Sub!m: 1.

† ан-мвн
авгмвн,

semper eade
statum inter-
nam & c. in

aliquibus au-
tem manuscri-
ptis, ita tem-
perantia, ut
idest potius se-
cundum, et c.
Et ita videtur
italiano.

† dum subli-
mes sunt spūs
nec euacuatio-
ni cōsumaces.

Septima Classis.

ssssss n videatur,

videatur, ad eam, quæ per superiores partes, id est per vomitum fit, purgationem agatur. Verum E purgans medicamentum neque nominatim perstrinxit, neque ipsius fecit delectum: nempe, quod ad morbi magnitudinem virtutis que robur respicientes vel album veratrum, vel ex aliis, quæ vomitum cient, quicquam exhibeamus, nemo ambigit. Quæ autem de aluo inferiore dicta sunt, clara existunt, expolitoris que haud indiga. Neque admirationi sit lactis copia, cum antiquis omnibus ita fuerit assuetum. Quod autem lac alinæ propter humiditatem exhibeat, supra est dictum: atque amplius, quod non coaguletur epotum, veluti quæ crassa sunt. At cum eo mellis quippiam salis que miscere conuenit.

† Impresi habet πασι τοῖς παλαιῖς, id est antiquis omnibus, aliqui manuscripti habent, παρὰ τοῖς παλαιῖς, id est apud antiquos. Et ita vetus interpret.

* Al. περὶ μα. i. fluxionem.

30 Synachus, id est angina, fit, cum hyeme vere que fluxio multa & viscosa à capite ad iugulares defluerit venas, plurimum que hæc propter latitudinem traxerint spiritum. Cum autem frigida & glutinosa fuerit, spiritus obstruit permeationes, sanguinem que coercens, quæ sanguini vicina sunt, congelat, sanguinem que ipsum immobilem reddit & stabilem, quippe cum frigida natura sit & obstruitoria. Ob id suffocantur luente lingua, atque in rotundum acta, reflexa que propter eas, quæ lingue subduntur, venas: nam præcisa vna, quam non nulli cionida, id est columellâ, vocant, vna utrinque crassa apparet. Cum igitur hæc oppletæ fuerint, lingue, quæ ob siccitatem & raram & spongiosâ existit, immituntur. Lingua autem vi ex venis humidum accipiens, ex lata, rotunda: ex bene colorata, huius: ex molli, dura: atque ex facile flexili, flectenti contumax efficitur: ita ut cito suffocet, nisi quis cito auxilium ferat, sanguinem ex brachiis trahens, & venas, quæ sub lingua sunt, secans, & medicans quibusdam attractoris, & calida exhibens gargarismata, & caput abradens. Debet uero ceratum tum collo tum capiti circumponere, lanis que circumuoluerit, mellibus que spongiis ex aqua calida expressis fouere. Bibat etiam aquam, & mulsam non frigidam. Cre morem que assumat, ubi ex iudicatione in tuto fuerit.

† Legitur in manuscriptis codicibus τὴν τῆς τοιαύτης διδασκαλίας ἰδὲ αὐτῆς, id est talis doctrina ideam seu formam. Et ita vetus interpret. male enim legitur impresis διδασκαλίαν.

† Al. pharynge, i. faucibus. Et ita vetus interpret.

† clarius ex antiquis. tum ob reuulsionem quæ ad vacuandum fit, tum quia vacuatum corpus, ubi ab affectis locis id quod influit retrudimus, facile suscipiet, nihil quod & c. et ita vetus interpret.

Siue synanchon dicere volueris, siue cynanchon: vel alterum quidem horum synanchen, alterum vero cynanchen: siue utrunque synanchen vocaueris: duas synanches sciueris esse rationes. Nempe ad curationem nominibus opus nobis non est: consuevit liquidem eam docere longe melius, quæ ipse, qui in nominibus monstruosa enunciant. Subscribam autem tibi compendiose & doctrinam ipsius peculiarem, suscepto ita exordio. Fluxionum, quæ ex capite deferuntur, quædam substantia tenues existunt, aliæ ex crassis viscosis quæ humoribus constant. Quæ igitur tenues sunt, hæc latis penetratis venis in angustioribus detinentur. Tales autem sunt, quæ in larynge i gutture sunt. Contrarium autem in crassis contingit, quod non ingrediant vniuersas, quæ stricte admodum existunt, venas, ante si in capaciore detentæ. Cum igitur in faucium venis tales impacti fuerint humores, pars in tumore attollit, veluti guttur ex aliis: tanquam gutturis, quæ faucium, strictiores multo existant venæ. Corpus autem totum vacare excrementis debet & non plethoricum esse geminam ob causam, nempe tum ob eam, quæ à vacuatione est, reuulsionem: tum quod vacuato corpore, cum à parte affecta, quod influit, expellimus, id facilius cōsentit, nihil quod, si calido aliquo euaporare volueris, à corpore ipso parti calfacere mitteret. Corpus igitur totum vena secta vacuare oportet, et purgatione, & clysteribus: verum affectas partes medicamentis astringentibus, quæ profluentes retrudant humores, atque ex firmatis eos, qui non admodum infarcti sunt & glutinosi & crassi: tum calidis & acris, quæ cōtentos in membris passis digerant humores. At line medicamentis veng, quæ sub lingua sunt, eam, quæ in faucibus est, phlegmonem vacuant. Sed, quoniam humorum crassi aliqui glutinosi quæ sunt, acrioribus propterea indigent medicamentis, quæ siccant & secare, & in tenuia diuidere, & tum glutinosa tum crassa cōfringere possint. Præterea & ad exteriorē superficiē reuellere oportet, circumpositis collo, quæ attractoria polleant facultate, medicamentis. Nepe colli superficiarias partes, quam imas, affici est melius: quod spiritus quidem, cum inspirationes fiunt, ad fauces guttur quæ irruat, & cum expirationes fiunt, per ea foras deferat. Sæpius vero, quæ ad partes prædictas procedunt fluxiones, eæ ad partes quasdam alias exprimente natura transmutant: atque interdum principio ita deferuntur, ut rursum aliæ oriantur tum faucium, tum gutturis, fluxionum differentie. Quod autem, quæ ad cutem recesserunt, iis, quæ in profundum decubuerunt, multo salubriora existant, cōsistat omnibus. Commune tamen in utriusque tum colli tum capitis, à quo fluxiones fiunt, auxilium tibi sit. Sermo hic & synancharum species, & causas, & affectos locos, & curationes docuit: neque, si vel synanchen vel cynanchen, vel synanchon vel cynanchon, appellaret, fuit sollicitus. Qui igitur librum hunc scripsit, neglectis nominibus omnes, qui tum in faucibus tum gutture existunt, arctat quæ respirationem, affectus synanchos appellans, duas horum species esse ait, alteram quidem, quæ à glutinosa frigida quæ fluxione facta sit, quam pituitosam vocare possis: alteram vero à calida acris quæ, quam si picrocholam biliosam quæ simpliciter appellaueris, non peccabis. Priorem autem fluxionem in latiores decumbere venas ait: biliosam, etiam in tenuiores peruenire ostendens. Cetera dictionis sunt manifesta. Ad ea autem, quæ retuli, conuertas animum, oportet: & si prima vice non intellexeris, bis & ter lege, & intelliges: ego autem ad secundam synanchi speciem transibo.

31 Cum æstate vel autumno fluxerit ex capite calida & nitrosa fluxio, quasi ab anni tempore tum acris tum calida fuerit, atque huiusmodi sit, mordet, ulcerat, spiritum implet, orthopnoeam parit siccitatem que multam: præterea, quæ inuenti apparent, gracilia videntur.

Quomodo

A Quo modo & quam ob causam hæc fiant? quoniam à calidis & acris. Priorem siquidē fluxionem, quæ pituitosa est, hyeme vel vere decumbere ait: hanc vero secundam autumno vel æstate: in aliis anni temporibus ex proportionē, ut antea est dictū. Orthopneam autem hunc superuenire angine generi ait, quæ insignis nota est angustia, partem ex iis, quæ respiratori tuberculiunt, aliquam fatigantis, ut supra est demonstratum. Quod si hos amplissime aperire os volueris, linguam quæ represseris, ut, quæ in faucibus sunt, inspectare queas, nullum sanè præter naturam tumorem, ut in ante dictis, inuenies: quod scriptor explanauit, cum inquit, Præterea, quæ intuiti apparent, *ισχνὰ* id est gracilia, videntur. Nempe, quod in faucium meatu inflammatum est, non videtur: quod autem ex apertis videtur, id omne citra inflammationē existit, partes quæ ipse sunt graciles: nempe hæc vox, *ισχνὸν*, tumenti præter naturā interdum opponitur. Quam vocis huius nunc dictam significationem ignorantes non nulli, dictionem ridicule exponunt. Alij autē permutant, ut & qui ad hunc scribunt modum: Præterea, quæ intuiti apparent, *ἄχροα* id est decolora videntur. Ceterum ita affectis fit interdum, ut & fluxionis partem recipiant faucibus vicini atq; à tergo siti ordinati quæ musculi, ubi & stomachus: qui sæpius & ipse vnā afficitur. Post hoc sanè in præsentī dictione scriptum quoque est, quod sequitur.

* *Al. χῶρος, i. loco, & ita uerius interpret.*

* *Laryngi, habent cod. omnes, quos uide rim.*

B 32 *Tendines quoque ceruicis posteriores contenduntur, apparent quæ tetani modo intendi.*

Quod deinceps dictum est, magis adhuc guttur affici ostēdit: nempe & vocis generationem in ea animalis absoluti parte est demonstratum. Quapropter inquit,

33 *Vox quæ ἀπὲρρωγῆ, id est abrupta est, & spiritus paruus est.*

Nēpe vox oīno ἀπὲρρωγῆ, i. ἀπόλλυται, i. disperit abrupta q; est, passo, ut dictū est, gutture. Respiratio autē parua redditur pp meatus angustia. Recenset autē in cōmentariis de difficultate spirandi, q; longior tpe fit & interuallis frequentior: quod scriptor in hunc enunciauit modum:

34 *Spiritus quæ reuulsio frequens & violenta accedit.*

Spiritus, & eam, quæ inspirationi succedit, expirationē: & eam, quæ expirationi succedit, inspirationem, dixit. Ex utroq; enim frequens redditur spiritus: nam ita affectis, quæ inspirationi succedit quies, breue tempus habet: similiter & quæ expirationi succedit ante inspirationem. Demonstrationes horum in libris de spirandi difficultate enarratæ sunt.

C 35 *Talibus arteria ulceratur, incenditur quæ pulmo: neque externum aerem admittere intro queunt. Quibus nisi ad exteriores partes malum sua sponte perferatur, hi grauius inuitabilis quæ habebunt, & propter anni tēpus, & quod à calidis acris quæ id fit humoribus.*

Arteriam quoq; ulcerari iis, qui ita affecti sunt, dictū est & propter humoris acrimoniam, sed pulmonem ardere † viduatū destitutū q; ait, dogmati vero sermonem copulans. Nempe in commentario de usu respirationis demonstratum est animal in respirationis priuatione, non ob substantiæ penuriā perire, sed quod calor natiuus tum refrigerio tum ventilatione destituatur: quapropter non immerito, qui immoderatio existit, pulmonem accendit. Hanc igitur anginae speciem tum grauiorem tum inuitabiliorem esse priore ait, tum propter ante dicta, tum q; æstiuum autumnale quæ sit anni tempus, & q; ex acrioribus oriatur humoribus. Qua efficitur ratione, ut ea, quæ cum coniunctione, & est dictio, melior sit, q; ea, quæ sine cōiunctione, & est. Significat autem ab iis, quæ ante dicta sunt, & propter anni tempus, in quo fit, & propter humorem, à quo oritur, maioris esse periculi secundam anginae speciem. Non est ergo simpliciter scribendū, q; tum grauior tum vitatu difficilior sit propter anni tempus. Quod si & absque coniunctione descriptionem seruare quis voluerit, coniunctionem eam ita subaudire oportebit, ut si in dictione esset: multa siquidem atque alia apud antiquos defectiuo modo scripta reperiuntur.

† *Ap. strictura & ita etiā uerius interpret.*

36 *Si febris hominem prehenderit, vetere excremento descendente, vel nuper cibatum, siue cum lateris dolore, siue nō is quieti tantisper permittendus, donec cibus primum ad ventrem imum descenderit.*

Dictiones quoque huiusmodi ea, quæ libro de victu in acutis morbis adiecta sunt, Hippocratis scripta nō esse ostendunt. Non enim, qui perfecte de pleuritide in legitima libri huius parte traçauerat, eum rursus hic pauca apponere oportebat.

37 *Sumat autem in potu oxymeli. At, cum grauitas ad lumbos usque descenderit, tum vel clysmum dare, vel medicamento purgare oportet. Atque, cum purgatus fuerit, sorbitionem primum & aquam mulsam, deinde cibaria & elixos pisces ministrare: vinum quæ, quod aquosum sit & exiguum, noctu, interdum vero dilutam mulsam. Cum vero flatus male olentes fuerint, balanus vel clysmus confert: si non, bibentem oxymeli tantisper cohibere oportet, donec ad inferiorem aluum descenderit, deinde clysmate subducere conuenit.*

Indefinite indistincte q; dictum est: quāquam, quod hic scriptum est, definite distincte quæ in legitima libri huius parte dictum sit, & quæ post id, usquequo piscium meminit Hippocrates:

Septima Classis.

ssssss in quoniam

quoniam adhuc de languentibus in libro ipse agebat, & non iis, qui ex morbo reualefcunt. Cetera dictationis manifesta sunt.

38 *At, si liquidam aluum habenti caussus superuenerit, si tibi purgatio idonea uideatur, eam non tribus primis diebus adhibebis, sed quarto.*

† θαρμὰ-
κεύειν.

2. Aph. 21. Ex.
ord. 10. b

1. Aph. 24. Ex.
ord. 10. c

Quod intempestiue quidem hic de caussu egerit, prædictis scilicet in principio tum differētiis, tum curationibus, nemo est, qui ignoret. Nempe & dictiones ex mēte sunt aphorismi illius, || Cocta medicari & mouere, non cruda, neque in principio, nisi turgant: plurima vero non turgent. Quidam aliter scribunt caussos ab initio medicari volentes: ut dictio talis sit: Intra tertium diem adhibebis. Expedit igitur non omnino à tertio medicari die, sed ut aphorismus canit, || In acutis morbis raro & in principiis medicamento purgante uti. Rem ergo secundum aphorismorum mentem definire oportet, scrutari quæ, cum in principiis purgatione utendum sit, & cum morbi coctio expectanda sit. Qui autem vel in principio simpliciter dixerit, vel neutrum definierit, fallitur.

† καὶ πολλὰς
ἀσθὺς μεσὶ δι-
έτιο αὐτὴ ἀσθὺς,
& ἀσθὺδες,
uario modo ab
hoc interprete
vertitur hoc i
libro.

† καὶ μετεωρισ-
μὸς γινώμενος.

39 Cum autē purgaueris, sorbitionibus utitor, obseruatis ita febrium accessionibus, ut nunquam, cum adsunt, neque cū futurae sunt, exhibeas, sed vel cum cessant, vel quieuerunt & maxime à principio recesserunt. Frigentibus ergo pedibus neque potum, neque sorbitionem, neque aliud quippiam huiusmodi, dabis: sed maximum existimato, si id tantisper obseruaueris, donec valde incaluerint. Deinde ita, quod confert, exhibe. Frigiditas siquidem pedum, magna ex parte febris accessus signum existit: quo tempore siquid porrigas, maxime prorsus peccabis, nempe & morbum non parum augebis. At vero, cum febris desinit, contrario modo, pedes reliquo corpore calidiores fiunt: nempe, cū augetur, pedes refrigerat, incensa quæ ex thorace ad caput flammam mittit. Calore igitur toto ad supernas partes concurrente atque ad caput exhalante, non absque causa pedes frigescent, utpote qui natura & carne vacent, & nervis abundant: præterea & à calidissimis distantibus locis refrigerantur, sese ad thoracem colligente calore. Rursum, & cum febris soluitur, & in minutas redigitur partes, calor ad pedes ex proportionem descendit. Quo tempore caput, & thorax refrigerant, atque ob id cibis dandus. Nempe, cum pedes frigidi fuerint, venter de necessitate calet & fastidit quæ cibum, intenditur hypochondrium, iactatur propter internam turbationem corpus, & mens fixa non est, dolet ager, lancinatur uellicatur quæ, vomere affectat: & si mala vomuerit, doluit. Ergo, cum calor ad pedes descenderit, currit quæ vrina: & si non sudet, omnia cessant: Quo tempore sorbitionem dare expedit, nam alias perniciofa existit.

De particulari cibi ministrandi tempore dictum quidem est paucis in legitima libri parte: sed æque & nunc prolixius manifestius quæ dicitur, quali sermo præfens sit illius explanatio seruata Hippocratis mente, quam tum in ceteris dixit, tum in eo, quod febrem ex thorace, hoc est ex corde, accendi, atque in caput flammam mittere, ait.

40 Quibus autem aluius per febres perpetuo liquida est, his pedes maxime calfaciens, ceromatis quæ contegens, atque fasciis obuoluens, ita attende, ut reliquo corpore frigidiores non sint. Si vero pedes calent, calorficium nullum exhibe, sed, ne frigescant, obserua. Potu est utendum quam minimo, aqua frigida vel mulsa.

Διὰ τέλεος idem cūm διὰ παντὸς τῆ χρόνῳ, semper & perpetuo significat. At, cum multi existant affectus, in quibus per totū malum aluum liquidam esse contingit: fieri quæ nequeat, ut curationem habeant vnā, quo modo sepius est demonstratum: tantum abest, ut ex dictione quicquam vtiliter dicatur, ut etiā iacturam facturus sit, qui scriptum curationis modum in affectibus multis iuuare crediderit. Nam, ut cætera omittam, cū aluius liquida esse possit tum propter ventris phlegmonem, tum propter colliquantem febrem, frigida potus maxime contrarius est phlegmonæ: colliquantibus vero febribus conuenientissimus, eo, quod didicisti, tempore exhibitus.

41 Quibus per febres aluius liquida est, & mens turbata: horum quæ multi floccos vellunt, nares quæ fodiunt: & parum quidem interrogatus respondent, sed ex se nihil, quod compositum sit, dicunt: talia his melancholica esse arbitror. His igitur ita habentibus, si venter liquidus fuerit, & colliquans, sorbitiones frigidiores crassiores quæ exhibendas esse puto: potus quæ, qui sistant, vinosiores quæ, vel etiam astringentiores.

Phreniticorum sanè cætera sunt symptomata: sed ventris liquidi symptoma, interdum quidē in phrenitide fit, non tamen id proprie ipsi inest: quapropter aluum liquidam ex distinctione curare expedit: phrenitidem vero alia seorsum persequi sanatione. In ea autem, quam auctor scripsit, sanatione nullo pacto animi intentionem ad phrenitidem dirigit, sed curare eum magis velle arbitror affectionem quandam, ex ventris quidem parte aliqua prodeuntem, sed caput ita ad condolentiam trahentem, ut ex ventris affectu desipiat. Talia autem non recte melancholica esse dictum est: magis enim ea à flaua proficiuntur bile, cohibita aluo.

42 Quibus item febribus vertigines à principio, & capitis pulsus sunt, & vrina tenuis, his ad iudicationes usque febris accessionem expectare oportet. Quod si delirarent quoque, non mirarer.

Cum caput circumagitur videtur, δῖνος, id est vertigo, vocatur affectio: cū autē, & tenebrosa simul fuerit visio, σκοτόδινος, id est tenebrosa vertigo, appellatur. Fit autem ob inordinatam spiritus flatuosi motionem, qui vel in capite localem habet generationem, vel sursum ex infernis fertur partibus

20 A partibus. Omnes autem spirituum huiusmodi generationes turbationem indicant: ob quas & cum symptomatis tumultuosis iudicationes fiunt. Scire etenim oportet affectiones huiusmodi medium quodam modo obtinere tum earum, quæ periculo vacat, tum perniciosarum. Conatur siquidem caliditas nativa corporis humores tum dissolvere, tum elundere: sed tenere ipsos & per inuisibilia foramina excernere non potest. Cum vero perfecte languet, (hoc est *ἀκίνητος*) neque solvere incipit, atque ob id spiritus flatuosus non summe languente nativa caliditate ortum habet. Languere igitur periculo omni vacat, natura siquidem morbo superior existit: uerum maxime languere lethale est, natura enim non parum à morbo vincitur. Cum autem non vincitur, prædicta fiunt symptomata: atque postea, quam agrotauerit, iudicationes absoluntur, alia ad salutem, alia ad mortem. Pulsus autem, qui in capite fiunt, id est sensibiles arteriarum motiones, caliditatis multæ symptomata existunt: ob quas causas sæpenumero deliria fiunt. Ad hunc itaque modum vniuersim habentibus, quæ dicta sunt, cum, ubi quis parum valere coeperit, ab urinarum quidem tenuitate cruditas morbi indicetur, caput autem flatuoso impletum esse spiritus significet vertigines cum pullibus, scire oportet naturam haudquaquam quiescere, sed interdum contentos in corpore prauos humores ita aggredi, ut à bonis eos separet, atque quouis modo excernat: **B** vel ad eam, quæ minus præcipua sit, reiciat partem. Prædictus igitur sermo ad antedictorum prænotationem maxime confert. Nempe interdum ab initio morbi, febres quidem moderatæ fiunt, sed symptomata huiusmodi caput infestant propter exustionem, vel exhalationem humorum in ventriculi corpore contentorum. Sanè capitis solius, quouis aliter modo habentis, caliditatem balneum iuuabit: pituitiæ quæ cremor pro sorbitione satis erit. Verum, cum spiritus calidus flatuosus quæ ob humorum prauitatem ad caput fertur, lauare hos non confert. Tute igitur singula hæc facienda sunt. Definitio autem affectionum vna sola est ex urinarum cruditate & concoctione: quorum auctor recte meminit inquitens /urina tenuis/ quod sæpius cruditatis lignum esse est pronunciatum. Quo fit, ut nullus sit medicus, qui in morbis huiusmodi negligentius urinarum inspectionem negligat.

43 Quibus principio *urinae* & *nebulosæ* & *crassæ* existunt, hos annuentibus ceteris *sulphurare* conuenit. Quod si *urinae* inter initia *tenuis* fuerint, tales non *purgabis*: at, si videatur, *chyliterem*, exhibebis. Tales autem ita curare *confert*.

Siue iis, quæ in antedicta oratione relata sunt, hæc coniungit, siue non, quod ex ipsis utile quis habere commune potest, quod scilicet corporis purgationem prorsus vitare oporteat, cum in humoribus adest cruditas, id manifestauit inquitens /urinae tenuis/ tanquam crassæ coctionis notas habeat. Iam hoc ipsum substantiam indicat: & verbum hoc *νεφελος* est, id est, nebulosæ, urinas significat, nebulas habentes. Nempe nigras adieciisset, si nos eas audire voluisset. Multa siquidem nomina communia citra distinctionem dicere consueuerunt, cum id, quod in significantiis rerum melius est, declarare voluerint. Sic sanè, cum iudicationes ad salutem fuerint, simpliciter dicunt, iudicatus est: defuncto vero iudicato, non simpliciter efferunt, sed hoc totum, iudicatus obiit. Præterea, cum quis excretam bilem simpliciter dixerit, pallidam & non nigram intelligimus. Sic certe & impræsentia urinas nebulosas audire oportet eas, quæ albas habent nebulas: quæ coctionis notæ exiunt. Quoniam igitur cocta medicatur, ob id & nunc ita scripsit libri huius author: Tales autem ita curare confert. Nihil autem de sanguinis missione locutus, ea particulatim enarrat ex ordine omnia: non quod interdum ita habentibus, sanguinis missione opus non sit, sed quod nunc sola alia docere velit: nempe de sanguinis missione abunde supra est dictum.

44 Corpus quieti permittere, *ungere*, & *equaliter* contegere oportet: ac pro potu *mulsa aquosa* uti, pro sorbitione autem *cremore pituitiæ vesperti*. Ventrem ab initio *chylitere* ducere, sed *medicamenta purgatiua* non admonere. Nèpe, si ventrem *dmoueris*, *urina* non maturabitur, *febris* quæ citratum sudorem tum iudicationem in longum protrahetur tempus.

Sermonem quoque hunc percurrit, scopum in eo habens eam, quæ cum moderata calfactione sit, quietem. Cremorem autem pituitiæ ab initio dat, quod mulsa ad vigorem usque & iudicationem sufficere non possit: morbus siquidem crudus est, & longe absunt concoctiones. Præterea mulsam, quæ aquosa sit, exhibet propterea, quod aquam per se & solam nihil boni habere demonstratum sit. Vesperti autem pituitiā mauult exhiberi, quam mulsam. Nempe, cum antea in legitima libri huius parte didicerimus pituitiā mulsam posterius exhibendam, melius fuit & nunc ita dicere, Mulsam quidem prius, posterius vero pituitiā exhibere. At vero, cum vesperti pro posterius dixerit, particulariorem efficit doctrinam & non vniuersaliorem. Cur autem eos purgare haud velit, in quibus summa inest cruditas, causam recensuit epilogisticam magis, quam analogisticam: quā recensere ad eum spectat, qui, quod fit, sola citra logicā indicationem experientia nouit. Dogmatici autem viri erat docere, quam ob causam purgantibus nobis ita habentes non coquatur urina, febris quæ sine sudore & iudicatione perseveret. Perfectius quidem & diligentius alibi hæc omnia sumus contemplati: sed impræsentia, quod præsentī enarrationi prodesse possit, summam dicemus. Tu ergo animum ad me conuertere. Cum facultates, ut scis, quatuor sint, atque inter eas non minime valeat alteratrix, per quam, dispensatis ab ea corporibus natura alimentum assimilatur, coctio nuncupatur nutrituræ iustitiae

permutatio secundum qualitatem existens. Natura igitur assumpto in ventrem deuorato que ali E mento, à ceteris quidē motionibus cessare debet, vt soli, quod coquēdis deputatū sit, operi vacet: sed auxilio externo aliquo indiget, si aliqñ imbecillior reddita fuerit, quo modo & in ea humorū, quæ in venis fit, concoctione contingit. Quiete quidem indiget sequentem ante caliditatem, q̄ calfactum, frigidum q̄, vel exiccatum, & humectatum sit, singulis horum alio & alio tempore factis. Ob id igitur, qui hæc scripsit, hominem curari voluit quieti permissum, vnctū, & equaliter vestimentis obuolutum. Nempe aduersus vim febris humiditatem eam, quæ vnctionibus comparatur, remedium esse putauit: præterq̄ quod neque valenter calfaciat neq; refrigeret, sed leniat mulceat q̄: quibus maxime indigent, quæ coquuntur maturantur q̄. Quod si hæc coctioni humorum conferant, purgationes contrarię existunt: nempe corpus vehemēter mouentes frangunt: tali siquidem virtute prædita sunt oia, quæ purgant, medicamēta. Hęc est ergo causa, cur purgationes coctionibus aduersentur. Ad eam autem, quæ sermoni huic continuatur, scrip̄ pergamus.

- 45 Cum iudicatio prop̄ fuerit, sorbitiones ne dederis, si perturbetur, sed cum perturbatio desierit, atque in melius profectum sit. Obseruanda autem febrium omnium indicationes, sorbitiones que hoc auferendæ tempore.

Mentem Hippocratis hoc in loco seruat, qui librum hunc scripsit. In principio quidem mul- sam & prissanæ cremorem exhibens: & cum prop̄ est iudicatio, cremorem tollens.

- 46 Confucuerunt febres hæc protrahi & abscessus habere, † si aurium quidem ceruicis que infernæ partes frigida fuerint. Quod si frigida non fuerint, alias mutationes habent: nempe flui ē naribus sanguis, & ventres his turbantur.

† si quide infernæ partes fuerint frigida, circa aures et ceruicem. s. solent habere ab secessus.

Quibus vrina ob humorum cruditatem tenuis est, his iure optimo protrahuntur febres, quæ ante coctionem solui nequeunt. Quod autem tales per abscessus iudicentur, sæpius iam est dictū. Rarius autem & per excretionem solutiones horum fiunt. Vtrum autem in superiore corporis parte vel inferiore abscessus generabitur, quæ hic dicuntur, iis, quæ in prognostico scripta sunt, concordant consentiunt que.

- 47 Quibus febres graues & implacide sunt, & hypochondria contēdunt, iacentes q; ægri sese continere nō possunt, atq; extrema frigescent, absolutissima tum diligentia tum custodia indigent: eos que ita degere oportet, vt nihil præter oxymeli aquosum tangant: sorbitionem autem non dabis, donec sese malum remiserit, & vrina maturentur.

Ἀσώδεις febres appellat, in quibus ægri ἀσώδους, id est grauiter afficiuntur, atque implacide habent. Hæc autem difficilis tolerantia & atque implacitas seu inquietatio, sequitur interdum G quidem febrem itabilem & æstuosam, sæpius autem & stomachi malitiam: os autē ventriculi ita me dicentē nunc audi. Incepit ergo à febribus ipsis, ἀσώδεις, id est graues & implacidas, ipsas esse inquiens, & hypochondria contendentes, deinde ad febrientes pertransiit. Nam, q̄ iacentes sese continere non possint, de febrientibus est dictum: veluti & q̄ extrema refrigerantur. Iacentes autem sese non continere, grauiter affectorum, atq; difficulter ferentium, & implacidorum q̄ & inquietorum, nota est: Extrema autem frigere, magnæ viscerum phlegmones, quæ ex crassis succis orta sit: vt antea monstrauius, cum de secunda causi specie ageremus. Quod si vehemens frigus fuerit, q̄ virtus valde infirma sit, iam tibi coniectura est. Non immerito igitur ita languentes plurima tum custodia, tum diligentia indigere ait. Dat autem & ipsis non absq; causa oxymeli, vt pote qui à crassis viscosis q̄ humoribus molestantur. Adiecit autem sermoni, aquosum, tanq̄ contrarium illi, quod illis exhiberi solet, in quorum pulmonibus tales continentur humores. Nam acrius longe in illis esse conuenit, quod propter longam in distributione ad affectam partem delationem de necessitate soluatur virtus: his vero tale hypochondrio incurfat, quale epotum est. Nullo autem pacto sorbitionem ita habentibus dare prius, q̄ morbus ad maturitatem deductus fuerit, indistincte est pronunciatum: seruatis nobis, quod edocuit Hippocrates. Adiciendum H est sermoni, si æger suffecerit: quod, tanquam manifestum, forte prætermisit.

- 48 Decumbere autem in conclau obscuro debent, & lecto maxime molli, diu que decubitu cum sustinere: & quam minime sese proicere & iactare, nempe id tales maxime iuuat.

Nunc decubitu obscuro in domo, nō tanq̄ maturatoriū auxilium, sed tanq̄ difficilis tolerantie inquietationis q̄, quæ ob ἄσυν, id est molestiā angorem q̄ fit, correctoriū voluit: gratia cuius & lecti mollis meminit. Tentare autem se ipsum non proicere, sed conuiuiscere, laborati modo utroq; commodat, tanq̄ & morbi totius concoctionem iuuans, & virtutem ipsam conseruans.

- 49 Hypochondrium autem lini semine illines: cauebis que, ne, cum apponitur, frigescat: sit autem summe tepidum ex aqua & oleo coctum.

Mollit lini semen, nec manifeste calefacit: quæ maxime expostulat phlegmone omnis. Et sanè tactu tale ipsum ostēdit, quale & fm virtutē est, summe tepidū ipsum adhibere præcipiens. Ceterum aque & olei mistura tepidam generat caliditatē, mollit q̄ & mitigat, vt pote moderatā habēs facultatē: cuius potissimū esse debent, vt demonstrauius, quæ & maturat & phalitū digerunt.

Coniectura

50 A Coniectura autem colligere oportet ex vrinis, quid nam futurum sit. Nempe crassiores pallidiores q̄; meliores: tenuiores vero & nigriores, deteriores.

Non, quicquid futurum ex vrinis, docet, sed vel salutem vel mortem. Salutem indicant crassiores & pallidiores. Crassiores autem dixit, tenuibus & non naturalibus comparans, ut & paulo ante intelligere voluit: neq; enim crassas, neq; tenues, quæ secundum naturam habent, dixeris, si recte volueris interpretari. Porro tenues & nigrae, deterrimæ sunt. A tenuibus siquidem solis, morbi incoctio indicatur: nam, quod exacte tenue est, id aquosum est, quapropter & album. Sed præ notiones ex vrinis in commentarijs prognostici dictæ sunt.

51 Si aut mutationes habet, tempus indicat: morbus q̄; de necessitate, modo ad peius, modo ad melius, permutat in equalitatem.

Nempe, si id & in laborantibus obseruaueris, vere hominem ex vrinarum varietate in longius decidere tempus reperies, atq; medias incurrere permutationes. Plures namq; significantur affectiones, quæ non eadem egent curatione, neq; æqualem habent solutionis præfinitionem.

52 B Inconstantes vero febres, donec constent, sinere oportet: ubi autem constiterunt, victum & curatione conuenienti pugnabis, quod naturale est, contemplatus.

Febres ἀγγας αἴτες, i. inconstantes, dixit, in quibus nihil καθ' ἑσινός, i. constans quietum q̄; existit, quod significat τὸ βεβαιόν, i. certum cōpertum q̄;. Sunt aut certa, quæ in periodis & vrinis et exq̄litis febrium formis apparēt. Periodi itaq; † principiū non ostēdunt primis diebus: Vrina vero supueniunt aliæ aliæ: & sæpenumero ter quater q̄; interdiu & noctu mēiere cōtingit, dissimiles q̄; inter se apparēt vrinae. Formā ergo talis febris inconstante esse ait, qd idē est perinde, atq; si diceret nō exacte formā vnā seruante. Exposui tibi exactas febriū formas & in cōmentarijs de febrium differētijs, & in secundo iudicationū libro. In hmoi itaq; febribus nō in principio victu uti præcipit, sed sinere, donec, qualis nam sit febris, cognoscamus, & tunc victus formā præfinire.

† τὸν ἀρχὴν
ἐστὶν οὐκ ὀρθὴν
id est, nullatenus
apparet, ut
vultus
vultus interpret.

53 Sunt autem facies ægrotantium multe.

Ὅψιας, id est facies, dixit, quasi differentias, vel modos, vel formas: ægrotantium vero, pro ijs, qui ægrotantibus fiunt, morbis. Nempe sæpius est demonstratum eam esse antiquis omnibus consuetudinem, ut à pathematis ad patientes, & à patientibus ad pathemata, transferant appellationes: quasi febrium vel febrientium differentias dicere nihil referat: sic & pleuriticoꝝ vel angina laborantium, aut pleuritidis vel anginae. Facies ergo dixit laborantium, quoniam eos oculis contemplantes, reperimus differentias.

54 Quo fit, ut animaduertere debeat medicus, ne quampiam occasionem ignoret.

Quod manifestas causas græce ἀφορμαίς, hoc est occasiones, appellet, didicimus: & sanè nūc eam de his appellationem ferre constat. Infert igitur,

55 Neq; eas, quæ ad ratiocinationem spectant, neq; quæ in numerum parem vel imparem apparere oportet.

Quasi causarum alias quidem manifestas absq; ratione artificiosa cognoscant omnes: alias vero soli, qui ratione artificiosa vtuntur. His quoq; & attendendum ait, quas in numerum parem vel imparem apparere oportet.

56 Maxime vero numerus impar est obseruandus. Nepe hi dies in hanc vel illā declinantes partē reddunt laborantes.

Dies impares multa pollere virtute non simpliciter, sed in acutis morbis, est intelligendum, quod insignes in vtrāq; tum salutem tum mortem mutationes efficiat: id enim significat vocabulum, quod græce ἐτεροπρότεας, id est huc & illuc declinantes, dixit. In acutis quidem hi sunt, tertius, quintus, septimus, nonus, vndecimus, decimusquartus, & decimusseptimus: In longis, sexagesimus, & octogesima. Mediū horum sunt vigesima, trigesimaquartus, & quadragesima. Impares autem & hi.

† ὅτι τὸ πρὸς
μακρὴν ἢ
ἐν δὲ τῇ
q̄; alii morbi,
& si bona pars
tolerantia ip-
sum habeat, et
sic in cōmento.

57 Obseruare autem oportet primum diem, quo æger parum valere cepit, principium q̄; unde & quando, inspicere: existimatur siquidem id scitum præcipuum. Cum autem ægrum interrogaueris, atq; omnia fueris perscrutatus, in primis quidem, quod nam habet caput modo, si dolore careat, nec gravitatem in se habeat: deinde si hypochondria latera q̄; dolore infestentur, si videlicet hypochondrium laboret, vel attollatur, vel obliquitatem habeat vel satietatem, aut latus doleat, simul q̄; cum dolore iussicula fuerit, vel tormina dolorū ue ventris: cum inquam horum quippiam hypochondrio aderit, potissimum ventrem clysmis soluere oportet: bibat autem mulsam calidam coctam q̄;. Ad hæc perdiscendum, si, cum exurgit, defectus animæ corripitur: † & si facile spiret. Inspectendum quoque, utrum ne, deiectio nigra admodum colore fuerit, vel sincera, qualis sanorum existit: & si febris exacerbet in tertium diem, † nempe in humiliori morbis, tertianæ consideranda sunt exacerbationes. Conspicienda præterea & alia, & si quarta dies tertie quippiam simile attulerit, nam tunc æger in periculo est. Quantum autem ad signa attinet, morbi deiectio mortem indicat: Quæ vero sanæ similis, cum omni die apparuerit, salutem.

† ubi aut opti-
me per se ex-
eris tales in his
morbis tertianæ,
postea tã
& alia conspi-
cito: et si quar-
ta dies aliqua
ex eisde ipsiis
simile tertianæ
habuerit, cum
æger & c.

Obseruandam

Obseruandam in primis ait primam esse diem, in qua morbi causam cognosci iubet: nempe F. hæc oratio *ὅτι τοῦ καὶ ὅτι*, id est, unde & quoniam, quis nam sit morbus, indicat. Interrogari aut præcipit in primis quidem, quo nam modo habet caput, mox hypochondria, & latera: hypochondria quidem, si dolor quispiam afficiat, vel attollatur, vel quandam habeant *σκολιότητα*, id est *ἀνομαλίαν*, id est obliquitatem siue inæqualitatem: quod in prognostico hæc dictum est oratione: Si inæqualiter affecta sunt dextra ac sinistra parte, vel si *κόρον*, i. satietatem habet, inquit: quod ciborum repletionem esse arbitror. Interrogari quoque & alia, quæ in dictione sequenti habentur, iubet. Deinde hypochondrijs ita affectis soluere aluum clysteribus præcipit, mulsam quoque bibere calidam & coctam. Sed indistincte hæc locutus deinceps scribit, Ad hæc perdiscendum, si, cum exurgit, defectu animi corripiatur: & si, inquit, facile spiret, quod defectu animi correpto apponitur. Cōspiciendam præterea iubet deiectionem, utrum ne nigra sit, vel sincera & inculpata, qualis in sanis esse videtur: veluti & si febris in tertiam exacerbet diem. Et, si his ita habentibus quarta dies tertiæ quippiam simile in accessione attulerit, periculosam eam esse asseuerat: nempe quartam diem, quæ septimæ index est, rem nouam edere ex grauibz est notis. Rei autem nouæ editio designatio quoque patet omnibus. Nam, si prima die & tertia accessio fiat, & secunda facta haudquaquam fuerit, quæ quinta accessionem habitura sit, par est, & non quarta: quapropter, si quarta habuerit, mali cuiuspiam alterius generationem demonstrat. Si autem & nigra deiecerit, mortem indicat fore. Tu autem multa ex dictis præmittens, memoriam rei huius habe. Nam, si prima & tertia die proportionalem attulerit accessionem febris, ^a atque nouiter quidem quarta paroxysmum fecerit, sed æger nigra deiecerit, signum est lethiferum. Quod si diebus omnibus, sanis similia deiecerit, salutem ægro futuram spera.

A + nonim
quæ, si et quar
ta paroxysmū
fecerit: si uero
& nigra deie
cerit: lethiferū
est signum.

B + ἐν τῇ δὲ τῇ
πυρμαλὸς ἐν
copin.

C + δοκεῖ δ' ἐν
ὁρῶντες ἐχέειν
ὁ κάμνον.

58 Cum autem venter glandi non obedierit, ^b spiritus quoque tum placidus tum quietus fuerit, surgens quoque æger in sedem, vel dum in lecto est, animæ defectu corripiatur: si hæc vel mari vel saminæ inter initia fuerint, delirium fore expecta.

Confusa est dictionis huius intelligentia. Nempe ubi glans nihil profecerit, ^c videtur quoque æger placidus quietus quoque esse, si utique, & cum exurgit, defectu animæ corripiatur, delirium expectandum, perperam dictum esse mihi videtur, cum rei huic neque experientia neque ratio patrocinentur: quamquam tale quippiam aliquando fiat. Prænotiones tamen non eorum sunt, quæ raro accidunt, sed eorum, quæ semper vel magna ex parte.

59 Manus quoque cōtemplari oportet. Nam, si tremulæ fuerint, huic sanguinis è naribus destillatione futura expecta.

Sermo quoque hic neque quod continuum est, neque quod magna ex parte fit, sed quod raro accidit, docet.

60 Nares quoque inspicende. Nam si per utranque spiritus equaliter trahatur, & si multus ex ipsis feratur, conuulsio fieri consuevit: {quæ si fiat, propinqua mors est: quam prædicere pulchrum fuerit.}

Cum tremulæ sunt manus, nempe ita dicere expedit, si spiritus multus per utranque narem feratur, conuulsionem superuenire ait. Consuevit autem ita appellare conuulsificam affectionem, quæ in musculis naris pinnas mouentibus fit.

61 Si in febre hyemali lingua aspera reddatur, prehendant quoque animæ defectiones, huic, tametsi febris remitti consuevit, in eo tamen, qui per famem sit, cruciatu conseruare ægrum oportet, & aquæ mulsæ quoque potione, & ptissanæ cremore. Neque febris quieti est fidendum: nempe, qui signa huiusmodi habent, his mortis periculum impendet. {Ergo, cum hæc noueris, optime quæ contemplatus fueris, ita prædicere pulchrum fuerit.}

Sunt, qui febrem hyemale simpliciter intelligant eam, quæ in hyeme fit: alij eam, quæ hyemi peculiaris sit. Ea autem ex pituita est, veluti æstiuæ ex ipsa bile. Si ergo, inquit, in huiusmodi febre lingua aspera fuerit, atque animæ defectus, eam periculosam esse est fatendum. Atque ob eam rem febrium quieti fidendum non est, si cum prauis fiant tum symptomatis tum signis, veluti in præsentia cum animæ defectu & linguae asperitate. Non negligenter itaque ait regēdos ægros: aquam quoque & mulsam & ptissanæ cremorem exhibendum. Sed sanè hæc pugnare videntur aduersus id, quod fame cruciandos dixerit. Nam huiusmodi cruciatus, qui græce *λιμοκτονία* dicitur, maxime quidem abstinentiam omnimodam significat: aut, si non, saltem eam, quæ in potibus solis fit, victus rationem. Hic tamen auctor & mulsam & ptissanæ cremorem dare permisit. Videtur ergo eos ob id fame cruciandos dicere, quod, qui remissiones huiusmodi quietissimas habent, longo ita tempore in his morentur, protrahant quoque, ut falsi circumuenti quoque non nulli validiorem ministrauerint alimoniam, & potissimum ob animæ defectionem. Quo fit, ut ad victum hunc ipsi, qui per mulsam atque ptissanæ cremorem multis fit diebus, recte dictus sit *λιμοκτονία* id est ex fame cruciatus.

62 Cum autem in febribus quinta die terrificum quippiam fuerit, vel venter repente liquida deiecerit, & animæ defectus prehenderit, vel vocis priuatio, vel conuellatur æger, vel singultiat, ex his angustia grauior quæ affici consuevit, sudores quæ circa tum muscicem, tum faciem, tum cernicem ab occipite esse consueuerunt. Qui autem hæc patiuntur, spirituosius paulo post moriuntur.

Exjs,

A Ex ijs, quæ per obseruationem empiricè à medicis scripta sunt, quædam talia existunt, vt ex semel aut bis conspectis, modi vniuersalis annotationem habeant, tanquã sæpenumero in eisdem & similiter considerari possint. Tale aut quippiam & id est, quod nunc dicitur. Nempe contem-
platus ægrum quendam liquida quædã deieciſſe, atq; animæ defectu prehensum, voce q; priua-
tum, alium vero conuulſum: & postea vel ambos vel alterum *ἀσώδης*, id est fastidijs plenũ graui-
ter q; affectum, partes q; tum faciei, tum colli sudantes, deinde obijſſe: hæc scripsit, q; lignorum em-
piricorum concursum existimaret. Sed sanè hæc possunt & stomachicam p̄gredi syncopen: he-
ri q; valent & propter copiã oppressa virtute, vel ea ipsa alio languente modo. Vnumquodq; si-
quidem eorum, quæ dicta sunt, per se malum est, nedum si omnia conuenerint. Nempe ex repen-
tins deiectionibus deicere animam periculosum est, veluti & voce priuari, & fastidijs angore q;
plenum esse. Partibus vero tum faciei tum capitis duntaxat, sudare non bonum. Quo igitur mo-
do hæc tum multa tum mala existunt, sic & alia, quæ in prognostico scripta sunt. Potest q; qui-
piam hæc inter se connectens videri nouum quippiam docere. Quod si & dictionem obicuram
veluti anigma, sermoni miscuerit, iam plebeijs & ex ea sapientior esse videbitur: admirantur si-
quidem plebeij, quæ non intelligunt. Viro autẽ, qui superuenientia symptomata ab eorum, quæ
B morbum indicant id est pathognomoniconum concursu distinguere nouit, sermo is varius qui-
dem deprehendetur, sed inutilis: nempe pathognomonica syndrome morbi speciem demonstrat:
superuenientia vero symptomata mansuetudinem ipsius & malignitatẽ. Eum q; qui singulorum
horum symptomatum vires didicit, quæ apparent, tũ æstimare, tum inter se cõparare oportet. Et, si
quidem tum fortiora tum plura videtur, q; bona, mala, hominem in periculo esse citi sciendum:
verum, si bona malis & fortiora & plura fuerint, de ægro bene sperandum. Quod te facere iubet
& ipse Hippocrates. Nempe in prognostico singulorum tum symptomatum tum lignorum vi-
res particulatim docuit, atq; circa libri finem ita ait: Oportet autem eum, qui recte sit tum conua-
lituros tum morituros predicturus: præterea & in quibus egritudo pluribus diebus, & in quibus
paucioribus, permansura sit: signa omnia perdiscere, atq; ætū matris eorum inter se viribus, vt scri-
ptum est, ferre sententiã. Signorum aut vires æstimari præcipit, atq; ex ipsis prænoscere, quid nã
futurum sit. Vbi ergo bona malis permixta fuerint, viribus quodam modo paria æqua q; exerci-
tato est opus viro, qui in operibus ea sæpenumero fuerit contemplatus. Vbi verò omnia vel ma-
la, vt nunc, fuerint, vel bona, cuius patet, quod futurũ sit. Cum enim deiciente alio deicere ani-
mam signum per se malum sit, pari modo & malũ, vocis priuatio: si præterea ager neruorum di-
C stentione conflictetur, vel singultuat, vel fastidijs refertus sit: manifestius indicabit periculum. Si
præter hæc & aliud quodpiam malum superuenerit signum, vt circa faciem ceruicem q; sudores:
atq; adhuc, quæ nunc à scriptore huius libri dicuntur, nullo, quod bonũ sit, malis permixto signo:
q; talis de necessitate ex lignorum malorum aceruatione morietur, notum euadit. Adiectum au-
tem in fine dictionis *πνευματώδεις*, id est spirituosũ facti, tãquam anigma, ceu quippiam eorũ,
quæ de necessitate fore conceduntur, quicquid significet, siue spirituum copiam, quibus venter
inflari possit: siue magnam & frequẽtem respiraonem, quam sanè ijs, quas conuatur, affectio-
nibus haudquaquam bonam esse didicimus, veluti & eam, quæ ventris est. Quapropter vestigan-
da alia signa non sunt, his de necessitate antegredientibus. Neq; enim amplius ex his, veluti ex
non nullis, quæ casu eueniunt, futurorum obicura quædam sit prænotio.

3. Prog. 37.4.
211 c

63 Quibus per febres crura tuberculosa fiunt, ea q; tractu temporis manente etiam num febre non maturuerint, fauci-
bus q; gracilibus existentibus irreperi suffocatio, non maturuerint, inquam, † sed extincta sint, is sanguis e naribus
fluere consuevit: qui, si multus fluxerit, morbi solutionem portendit: si non multus, morbi prolixitatẽ. Quo minus ve-
ro fluxerit, eo deterius & prolixius erit malum. Quod si & alia facilia fuerint, pedum dolores sunt expectandi: qui
D si pedem affecerint, & dolorosus perseueret, inflametur q;, & non leuetur, dolores post paulo ad ceruicem peruenient,
clauiculam q;, & pectus, & articulũ: nempe & hic tuberculosis fieri debet. His autem extinctis, si manus vel con-
trahantur, vel tremule fiant, talẽ neruorum dislentio prehendit, & desipientia: sed & supercilij oriuntur, quæ
φλῶζα vocant, rubores q; ægrum habent: & ex palpebris altera ad alteram germinat: alia prehendit phlegmo-
ne: tumet vehementer oculus, & delirium valde crescit, intenditur q;: atq; noctu magis, quam interdiu, induitur.
Signorum aut multa sunt in numero impari magis, quam pari. Viro tamen horum fiant, perniciosi superueniunt.

† Cod. aliqui
manuscripti
habent, dicitur
quod si prolixius
sit, sed nec extin-
cta sint. Et ita
est uetus inter-
pres. Galenus
tamẽ uidetur
legisse, sed ex-
tinctis.

Qui librum hunc confecit, is hæc omnia, quæ dicta sunt, deinceps inter se contẽplatus vniuer-
salem quendam particulari ex obseruatione sermonem temere fecisse mihi videtur. Melius liqui-
dem erat, si, quo Hippocrates modo in epidemijs scribere consuevit, is ita fecisset, præfatus qui-
dem ab initio patientis nomen: deinde dies, in quibus singula facta sint, narratione assecutus, vt
& in ipsis, quæ nunc dicta sunt, symptomatis facere potuit. Nempe in cuiuspiam cruribus orta
sint tubercula, ea que non recipiant maturitatem, febriat quoq; is, & suffocationem incurrens
ab his liber sit tuberculis: existimabit profecto quis sursum factam humorum, qui crus infesta-
bant, transmutationem, quæ in horum transitu suffocationem homini peperit. Si ergo talis, (vt
Hippocrates dixit) euasurus est, profluere per nares sanguis poterit: qui si multus fuerit, morbum
soluet:

soluet: si non, protrahetur egritudo. Et, si reliqua bene fiant, rursus ad pedes decumbere huic do-
lor poterit. Quod ita factum esse statuatur, veluti ex his hominem *συνεφλεγει* factum esse, quod
caliditatem multam circa pedem manifestare consuevit, vel febrem multam igneam q̄. Et, si post
hæc nō soluta fuerint symptomata, reuersa iterum ad superiores partes humorum copia dolores
pariet in collo, clauicula, humero, & pectore. Vt autem huic omnia hæc absq̄ ratione contige-
runt (nempe id extincta esse, fuit) ita manus tremulas factas esse statuatur: deinde neruorum di-
stentionem, q̄ ad neruosas partes decubuerit humorum copia, principium q̄ ipsorum prehende-
rit, vnde desipientia, subsecutam esse. Contemplatus igitur auctor quendam ex ijs, qui ita affecti
sunt, *φλυταίνας* in supercilijs habentem, (nempe id significant *φλυζάνια*), omnibus ita habentibus
futurum symptoma hoc temere pronunciauit. Idem q̄ de ijs, quæ continuata serie scripta
sunt, sermo existit. Nempe, quod vni ita affectorū vel duobus factum est, id ad omnes extendens,
ait & ipsos rubores habere, & ex palpebris alteram ad alteram germinare, durā quoq̄ fieri phleg-
monem, & vehementer tumere oculos. Quorum cætera quidem cuius patent, sed ex palpebris
alteram ad alteram germinare est ambiguum, vtrum ne significare voluerit quādam ex parte ea-
rum exurgentem consertionem, vel carnosam quandam germinationem, ab altera quidem ena-
scentem, sed ad alteram sese extendentem. At vero, si rei huius aliquo pacto inuentio quippiam
utilitatis afferret, de ea amplior foret scrutatio.

* A. morbus.

64 *Hos si ab initio purgare volueris, id ante diem quintum facito, vbi venter murmurauerit: si non, a medicamentis
abstineto. Verum, si murmurauerit, fuerint q̄; excrementa biliosa, scammonia mediocriter subpurgato. Quantum
vero ad aliam pertinet sanationem, quam minime exhibebis tum potus, tum sorbitiones, vt melius ager habeat, nisi
decimam quartam fuerit egressus.*

Sanationem prædictæ concursione scribit, quā nominatim perstringere mihi, vt dixi, nō pla-
cet, cum etiam & sanatio nihil cōmune habeat præter ea, quæ sæpius ante sunt enarrata. Ait si qui-
dem consideranda alium, quam per murmurationes cognitam, purgandam esse præcipit: & si
biliosa deorsum repant, scammonia biliosa purgantē exhibet. Quod vero ad reliquum sanationis
attinet, sorbitiones per q̄; exiguas ministrari præcipit, quousq̄ decimum quartum pertransierint
diem: qua oratione morbum ante decimum quartum diem coctum esse non posse significatur.

65 *Cum felicitant: decimoquarto die vox intercepta fuerit, tantum abest, vt morbus celeriter rē solui tum discedere
consequeretur, vt etiam diuturnitas ipsi indicetur. Cum ergo in eo die apparuerit vocis interceptio, morbus protrahitur.*

Dictio hæc his superfluit, qui mala symptomata maiori prædita esse facultate didicerunt, cum
in diebus iudicatorijs apparent. Nempe, qui librum hunc scripsit, nūc in re vna, quæ decimo quar-
to die est particularis, hoc est vsus vniuersali. Nempe, vt diebus cæteris iudicatorijs, sic & decima
quarta, si malum aliquod symptoma apparuerit, id maiorem habet efficaciam. Annotare autem
oportet, quod futurum est, neq̄ simpliciter, neq̄ vt res tulerit, sed cum definitione. Nam, si ex si-
gnis bonis, quæ maiorem habet efficaciam, laboranti quædam affuerint, lōgiori tpe saluari ager
poterit: at, si nullum tale fuerit, morietur, nequeunte morbi concoctioni satisfacere virtute. Qui
igitur hæc scripsit, prolixior omnino fore morbum male pronunciauit. Nempe & is cito mori
potest, cui vox decimo quarto die interrupta est, si cū sæuis alijs notis factū fuerit hoc symptoma.

66 *Cum febrientis lingua quarto die turbata quædam loquitur, venter q̄; liquida biliosa deiecit, talis delirare consue-
uit. Sed obseruare oportet, quod euenientibus succedit.*

Id quoq̄ & in alio quodam die apparet: verum, si quarto apparuerit, in primis periculosiorem
septimum fore demonstrat, id est quæ illo die futura sunt.

67 *In acutis morbis, quæ æstate & autumno fit repentina sanguinis destillatio, robur multam q̄; in uenis inflāmatio-
nē significat: itē q̄; quod postero die vrina tenuis apparebit. Et, si ager ætate uiguerit, fuerit q̄; corpore ob exercitatio-
nes bene carnosum vel melancholicum, vel ex potatione manus tremulæ fuerint, delirium vel conuulsionē prædicere bene est.*

Dictio quoq̄ hæc symptomatum multorum, quæ non in ægro omni coeunt conueniunt q̄;
complicationem habet: quo fit, vt inutilia sint, quæ ad hunc scribuntur modum, cum doctrina
ab vniuersalibus recipiat commoditatem, quo Hippocrates modo facere consuevit. Dictum au-
tem est, quod vniuersalium, quæ quidem perpetua sunt, primam habent virtutem utilitatem q̄;
quæ vero magna ex parte sunt, secundam. Quod si anceps quippiam vel rarum fuerit, id ad do-
ctrinam inutile censetur. Quæ igitur recensuit, particulatim contemplemur, atque ante omnia
quod primo est dictum. In acutis morbis, quæ æstate & autumno fit repentina sanguinis destil-
latio, robur & multam in uenis inflammationem indicat. Melius siquidem erat pronuciare,
quod robur venas curatione egere indicaret. Nouimus enim, quod sanguinis è naribus stillatio-
nes malum semper quippiam esse ait, propterea quod natura quidem concupiat, quod super-
fluum est, excernere, sed ob propriam imbecillitatem nequeat, vel sanguinis crassitiem, vel par-
tium densitatem, vel quædam ex his, vel propter omnium concursum. Cum autem malum sem-
per hoc

A per hoc signum sit, magis q̄ quod primis tum æstatis tum autumnis temporibus virtutem ipsius intendi contingit, (nempe in eis diebus flaua redundat bilis, ambiens q̄ nos aer calidus est: quo fit, vt sanguinem vtrinq; ob causam, bene fluẽtem esse oporteat,) magnitudo quædam causæ indicatur, propter quam fluere inhibetur, quam robur esse ait, forte densitatem ita appellans. Quod porro ita affecti venarum curatione egeant, non dum ostendit, prius quàm alitruat, quàm nam dicat curationem, nec tamen dixit. Prædictionem præterea primam dixit, quod scilicet postero die vrina tenuis apparebit, non solo eo die de necessitate incoctis apparentibus, verum quoq; & alijs præcedentibus. Conuulsionem quoque & desipientiam fore ait, si laborans ætate viguerit. Præterea & exercitati, & bonæ ipsius carnositatis meminit, & tẽperamenti: nempe melancholicus, nomen est temperamenti. Huc adde, q̄ ex potatione eum manus habere tremulas ait. Hæc ergo symptomata possunt inter se complicari, non tamen de necessitate, neque magna ex parte succedent desipientia & conuulsio.

68 Et, si paribus quidem diebus superuenerint, melius: in iudicatione aut perniciosum, nisi multus abunde effusus sanguis viam redundantie fecerit vel per naves, vel per sedem, vel per abscessus, vel commutationes, vel ad hypochondriorum dolores, vel ad testes, vel ad crura. Coctis autem his, via patent sputis: vrina q̄; excernitur crassa, leues, et albæ.

Gemina est scriptio in hoc verbo *ἔπι νεύει*, id est superuenire, vna quidem scripta per *τ* elementum tertia syllaba, altera per *γ*. Verum, siue per priorem scriptiõnem ægros diebus paribus *ἔπι νεύει*, id est intendi dixerit: siue secundum posteriorem prædicta symptomata diebus paribus *ἔπι νεύει*, id est superuenire affirmauerit: non continuo existit & melius, quàmquam id dixit. Neq; enim, si pares fuerint, intueri oportet, sed si & iudicatorij: nempe quartam, quæ par est, & ipse ex ordine paulo ante maximam habere facultatem asseruit. Ceterum, quod deinceps dicitur, verum existit. Nam, si sanguis multus, quouis modo id fiat, excretus fuerit, salutis spem habet. Præterea & per abscessum ipsos, & per commutationem, seruari ait: abscessum quidem ferè sua peculiari appellatione declarans, sed commutationem, cum ait, ad hypochondriorum dolores, vel ad testes, vel ad crura. Differunt autem inter se, quod *ὑπόσασσις*, id est abscessus, iudicationem intert, ægrum q̄ à molestijs omnibus liberat: *μετάσασσις* autem, id est commutatio, aliarum habet principium accessionum offensionum q̄, vt & aliud exigat tempus ad coctionem mali, corporis locus, ad quem infestatum humorum facta sit commutatio. Eam ob causam adiecit, Coctis autem his permeationes fiunt sputis, vel crassis vrinis leuibus & albis, signa coctæ commutationis edocens ex coctis, tum sputis, tum vrinis.

69 Febri singultuosa lasepitiij succum, oxymeli, daucum tritum propina: galbanum q̄; ex melle & cuminum in eclegmate: postea q̄; sorbendum pitissanæ cremorem dato. Talis autem euadere non potest, nisi sudores superuenerint iudicatorij, & somni æquales, vrina q̄; exierint crassa & acres, aut in abscessum firmetur morbus.

Λύγγας & *λύγγας*, id est singultus, appellare consueuerunt. Sunt autem motiones quædam stomachi conuulsoriæ, quas quidem fieri aiunt propter immoderatam vel inanitionem, vel repletionem. Quæ si propter inanitionem fiant, ferè sanationem non recipiunt: si vero ob repletionem fuerint, ab ijs, quæ infarsa secant abstergunt q̄, sanantur medicamentis: quo è numero sunt, quæ in hoc loco scripta sunt. Videtur autem & nunc morsus is fieri propter acrimoniam stomachum mordentem, vt cū quispiam piperis plus vel simile quippiam deuorauerit. Et sanè fuerunt ex febrientibus, qui in singultu rodentem acerrimum q̄ vomuerunt humorem: à quo tãdem symptomate sunt liberati. Verum febris huiusmodi nequaquam singultuosa appellatur: nempe, vt singultuosa vocitetur, permanere amplius debet singultus, vel etiam per totum morbum simul cum febre exacerbare. Febrem hanc per sudores iudicatorios, somnos q̄; æquales, vacuatas q̄; vrinas, tum crassas tum acres, sanari ait, talibus quidem vel excretis, vel in abscessum firmatis.

70 Cocalus, id est nux pinea, & myrrha, in eclegmate exhibeantur, bibant q̄; oxymelitis perquam exiguum.

Scriptum quoque & inordinate hoc est. Commodius siquidem fecisset, si paulo ante in ea orationis parte, qua eos sanauit, quibus tum thorax, tum pulmo per sputa expurgari debent, id scripisset, & non febris singultuosa adiecisset. Et sanè, quod dicitur, obscurum est. Nempe *κόκκαλος* ab ipso dictus, non ita, sed *κῶνος* magis, ab antiquis Græcis appellatur, veluti à recentioribus medicis propemodum omnibus *σέβιλος*. Consuevit autem ex eo eclegma cõfici, vbi maxime pinguis fuerit, id est vbi multam circumfusam habuerit, quæ peculiaris sit, refinam. Coquunt autem fructum hunc in aqua cum prassio, hoc est marrubio, recenti: mox decocto mellis exiguum miscent, coquunt que iterum, donec mellis accipiat crassitudinem: quo ad hunc modum confecto medicamento vtuntur ad thoracis pulmonis que expuitiones. Quo autem modo & alia quædam medicamento huic sapius immittunt, ita & auctorem libri huius myrrham immittere verisimile est: quod postea, velut compendio, manifestauit, inquiens, Cocalus & myrrha in eclegmate exhibeantur. Potest autem & ipsos, qui eduntur, cōnos cum myrrha exhibere: atq; huic fortasse

tasse mel non perperam medicamento misceri intellexerimus. Sunt, qui dictionem hanc ab ante E scripta separant, seorsum quod scribunt: alij finem ante scriptae principium huius efficiunt hoc pacto: Si autem abscessus firmentur, coccalus & myrrha in eclegmate exhibeantur: ut morbis in abscessum firmatis ei medicamentum esse intelligamus: quod a ratione alienum censco propter id, quod ita infertur, Bibant quod oxymelitis perquam exiguum. Nempe in singultuosa febre formidandum acetum praecipit ratio: in iis vero, quae in abscessum firmantur, nequaquam. Eam ob causam sunt, qui dictionem hanc quadantenus quidem antea scriptae copulent, quadantenus vero separent, atque adiecta coniunctione, autem, ita scribant: Si autem in abscessum firmetur, tanquam de singultuosa ante dicta febre id dictum sit: volente auctore, si in abscessum aliquando firmari contigerit singultuosam febrem, coccalum cum myrrha exhibere, & copiosam oxymelitis vitare potionem. Syllaba autem ultima verbi huius *σνειζει*, id est firmetur, siue per ζ litteram scribatur, siue per ξ, nullam, quae insignis sit, facit sermonis mutationem.

71 *Quod si supra modum siticulosi fuerint, bibant aquam hordei.*

Quod potum hunc, tanquam sitim adimentem, exhibeat, est manifestum. Sed melius fecisset, si prius, quo nam pacto parare hordeum oporteat, enunciasset: utrum ne simpliciter madefacere: vel F ex eo zythum, ut huius temporis homines, conficere: vel quouis alio parare modo.

72 *In peripneumonias & pleuritide ita considerare oportet, si febris acuta fuerit: si dolores lateris vel alterius, vel utriusque infestent: & si aeger in ea, quae sursum fit, spiritus latione laboret: tussis quae adsint, & spuma educantur, rufa, vel liuida, vel & tenuia, & spumosa, & florida: & si quippiam aliud discrepans praeter ea, quae didicimus.*

Pleuritidis peripneumoniae quod tum magna tum effatu digna quidem omnia in legitima libri huius parte sunt definita distincta quod: sed, quae medicis omnibus patet, ea sunt praetermissa. Talia autem sunt, quae in praesentia ab auctore scribuntur. Et primum quidem a veteribus empiricis appellata syndrome, quam veteres affectibus confidentia symptomata appellabant: si videlicet febris acuta, dolor quod lateris, vel alterius, vel utriusque, & potissimum, qui in expiratione fit: nempe id est, Et si aeger in ea, quae sursum fit, spiritus latione laboret: tussis adsint, & spuma educatur, rufa, vel liuida, & tenuia, & spumosa, & florida, & quouis aliter modo praeter solitum euariata. Nepe hoc significat, inquiens, Et si quippiam aliud discrepans habent praeter ea, quae didicimus. Quae omnia in pleuritidis peripneumonicis quod apparere ait, si contingant. Sed hos ita regere oportet.

73 *Si dolor sursum penetrauerit vel claviculam, vel mammam, vel brachium, venam brachij internam secare oportet, qua dolor afficit parte.*

Rursus & in praesentia loco partis legitimae sententiam elaborat, quoniam in ea praetermissum est, quod simul cum dictis intelligitur: adijcit quod illud, venam scilicet secundam recto a latere dolente tramite: quod exposuit inquiens, Venam brachij internam secare oportet, qua dolor afficit parte: sed manifesta usus breuitate orationem negligentius percurrit: nam venam cubiti dicere debuit, cum venam brachij dixit.

74 *Sanguinem quod auferes pro corporis habitu, anni tempore, aetate, & colore. Amplius quod non veritus, si dolor acutus fuerit, ad animi usque defectionem detrahes.*

Rursus hoc in loco plus, quam mediocriter, scopos detractionis sanguinis omnes recensere conatus, quosdam silentio praeteriit. Neque enim virtutis meminit, neque sanguinis mutationis, nec vero regionis, nec constitutionis. Plus autem auferre atque ad animam usque defectionem id audacter agere praecipiens, deliquit sane in dictione, cum adiecit, quam ob causam audere conueniat. Nempe, quod dolor acutus sit, plus quidem sanguinis vacuumus: sed fluere sinimus, non quia acutus sit, sed H ob alia: utpote si virtus robusta fuerit, viguerit aetas, sanguis abundauerit, & laborantis natura tum densior, tum durior, atque aegre magis perspirabilis, & sanguinis copiosi fuerit: anni etiam tempus, & constitutio bene temperata: sic sane & regio. Nempe, quod ad animam usque defectionem sanguinem auferre non vereamur, nobis ex his accidit.

75 *Clysterem postea exhibebis.*

A sanguinis missione clysterem exhibere iubet. Sed melius erat adiecisse, si non sponte probe deiecerit aluus.

76 *Si vero dolor sub thorace fuerit, valde quod infestauerit, pleuritico ventre subpurgabis: nihil quod, dum purgabitur, dabis, a purgatione aut oxymeli. Veruntamen si purgans medicamentum ministrabis quarto die, tribus quod primis diebus clysteres exhibebis: quibus si non leuetur, ad hunc subpurgabis modum. Custodies deinde aegrum, donec ad febris priuationem & septimum peruenierit dies: qui si in tuto esse videatur, in primis exiguum tenuem quod cremorem, cum quod melle misces, dabis: si vero facile renocatur, & facile spirat, latera quod non doleant, sensim crassiore copiosiore quod, & bis die ministrabis.*

Pleuriticum nominauit, id quod ab Hippocrate in legitima libri huius parte est dictum: ubi ita habentes

A habentes pleuríticos purgat: facit autem id duobus modis. Quarto vero die medicādum indistin-
cte pronunciauit. Neq; enim inter initia aliquod remedium huiusmodi agro iniungere opor-
tet desumpto à numero dierum scopo: sed, quod Hippocrates recensuit, est exequendum. Nam
vel statim ab initio prius, q̄ in partem aliquam firmati sint humores, medicādum: vel postea cum
concocti fuerint. Quā ob causam & prima interdum die, & secunda, & quarta, & interdum quin-
ta, medicati sumus, & non in quarta solum, quo modo is dixit.

- 77 Quod si non facile liberetur, potius minus, sorbitionem exiguam, cremorem q; tenuem, & semel exhibebis: at-
que eo, quo melius degit, tempore: quod ex vrinis deprehendes. { Nempe in istiuscemodi morbus sorbitio non prius
danda est, quā lotia aut sputa matura facta videris. Quod si purgatus multa deiecit, dare oportet, minus tamen
& tenuius. Non enim poterit præ vasorum vacatione dormire, neq; concoquere similiter, neq; iudicationes sustine-
re: Verum, vbi crudorum colliquatio facta fuerit, & quæ renituntur, reiecta, nihil obstabit. }

De particulari cibi exhibendi tempore agens Hippocrates & libri huius auctor in ijs, quæ su-
pra scripta sunt, eam, quæ tum in thorace, tum in pedibus est, caliditatem animaduertendam esse
voluerunt. Nempe vinarum consideratio ad vniuersalem victus formam, non ad particularem,
B vtiles esse videtur. Quo fit, vt non recte dicat hoc in loco cremorē tenuem semel exhibendum eo,
quo melius degit, tempore, id q; deprehendendum ex vrinis. Nēpe, tametsi breuissimam in par-
ticularibus accessionibus ad melius inclinationem vrinæ habuerint, tempus tñ huiusmodi non
vsque adeo protrahitur, vt has recondamus, expectemusque, dum nebulas vel sublimes vel subsi-
dentes habuerint: hæc siquidem non paucō fiunt tempore. Atqui in acutis morbis interdū egri
in declinationis principio de necessitate sunt alendi.

- 78 Cocta autem sunt sputa, cum puri similia fuerint: Vrinæ autem, cum hypostases erui modo subrubris habuerint.
Cæteris autem laterum doloribus tepesfactoria apponere & ceromata nihil vetat, crura q; & lumbos calido inunge-
re, & pinguedine illincere: hypochondrius quoq; adusq; mammae ex lini semine cataplasma imponere. Vbi autem pe-
ripneumonia ad statum peruenit, quando non repurgantur, auxilium non habet, & mala est, si laborans egre spi-
rauerit, fuerint q; vrinæ tenues & acres, atque si sudores circa ceruicem caput q; oriantur. Nempe sudores huius-
modi mali sunt, vincente ob æstum impetum q; & violentiam ægritudine, nisi vrinæ multæ & crassæ prodierint, et
concocta exierint sputa. Vtrum autem ex his sponte euenierit, soluit morbum.

Neq; sui ipsius est memor, qui non ad hunc modum de coctis vrinis supra scripserit, neq; Hip-
C pocratis, qui aliter dixerit, || Nempe q̄ vrina optima sit, quæ sedimentum habet, tum album, tum
læue, tum æquale. Cætera, quæ perineumoniacis pleuriticis q; in orationis textura narrantur, con-
spicua sunt, tum vbi libri huius auctor ab Hippocratis recedit sententiā, tum vbi maxime, vel pror-
sus, vel aliqua ex parte, huic annuit & consentit.

1. Prog. l. 26. 4²
209. b

- 79 Peripneumonia eclicton seu eclegma. Galbanum & nucleum pineum ex melle attico dabis: abrotonum ex oxyme-
lite. Piper quoq; & nigrum elleborum, vbi feruesceris, pleurítico etiam circa initia dolenti bibendum offeres. Quod
si panacem ex oxymelue feruesactam percolatam q; propinaueris, bene facies. Proderit autem & hæc hepaticis, aut
ex septi transversa dolore affectis, atque iis omnibus, quæ aut per alium aut per vrinas expelli desiderant, ex vino et
melle. Verum, quæ ventri expurgando exhibiturus sis, ea cum mulla aquosa & multa propinabis.

Medicamentum primum secundum q; sputa educunt. Sed, quod ex elleboro nigro cōficitur,
ventrem subducit. Quod vero ex panace est, quibus nam vtile sit, recensuit.

- 80 Dysenteria, q̄ cessauit, abscessum vel tuberculū aliquod pariet, nisi desierit vel in febres, vel sudores, apparuerint q; ^{tet} vrinas cra-
ssæ & albæ & læues, } vel in tertianas, vel in varices, aut dolor in testiculū vel crura vel coxā firmetur. ^{sas et albas et}
^{valde perspi-}

et urinas cra-
sas et albas et
valde perspi-
cuis.

D Sermo quoq; præfens sine definitione & distinctione est prolatus, q̄ neq; qualem dicat dysen-
teriam, demonstrauerit, q̄ neq; omnis, quæ cessauerit, hæc inferat.

- 81 In biliosa febre morbus regius cum rigore ante septimum diem enatus morbum soluit: si vero absque rigore præter
temporis occasionem superuenerit, perniciosum.

Neq; proculdubio ante septimum diem cum rigore enatus morbus regius febrem soluit, neq;
post septimum. Sed sanè ita distinguere oportet. Febrientibus morbus regius superuenit, inter-
dum quidem tāquam affectionis hepatis symptoma: interdum quoq; & natura bilem per cutim
excernere contendente, sed nequeunte: veluti in abscessibus omnibus fieri consuevit. Verum in
|| Aphorismis de huiusmodi morbis regijs est enunciatum.

4. Aph. 61. Ext.
ord. 34. b

- 82 Lumborum tetanus, atque in melancholicis per venas spirituum interceptiones cum fuerint, sanguinis detractio-
ne soluntur.

Cum inquit, propter melancholicū sanguinem in venis redundantem spirituum interceptio-
nes fiūt, sanguinis missio soluit: si interceptionem dicit spirituum, qui in arterijs sunt, nam & ar-
terias antiqui venas appellabant: quæ nam alia fuerit, quā pulsus carentia priuatio q; Græcis
ασπυξια

ἀσφυζία dicitur: si vero eorum, qui in pulmone sunt, spirituum interceptionem dicit, rursum & E appellatam apnoeam, quasi respirationis priuationem dixeris, obscure insinuabit. Potest quoque sanguinis tum copia tum crassitudo non arterias modo inflare, ut permeare non possit, verum quoque & proprie appellatas venas.

- 83 Cum autem ob tendines vehementer in anteriorem reuellantur partem, sudores quoque circa ceruicem faciem quoque oriuntur, morsus ob laborem & arefcētibz ijs, qui ad ἔρπαιον id est caudam, vergunt, tendinibus: crassissimi hi spinam continent, qua maximè enata copulæ ad pedes usque finiuntur: Is, si neque febris neque somnus superuenerint, fuerint quoque secuta coctionem habentes urina, sudores quoque indicatorij, vinum creticum vinosum bibat, edat quoque potentiam coctam. Cetrato quoque perungatur: & crura ad pedes usque calidis in pelui madefacta, superimposito velamine contegantur: brachia item ad digitos usque inuoluantur. Spinam præterea à ceruice ad coxam usque molli pelle, quæ pinguedine & cera illita sit, velabis ita, ut anteriora etiam contineantur. Intermixtis quæ, quæ per vtriculos fiunt, fomentis, calida perfundes aqua, lintheo obuolues, & in conclauis cubare eorum facies. Ventrem autem ipsum non admodum solueris, nisi balano, si longo iam tempore se continuerit, id quoque si bene tibi processerit: sin autem, modo radicem in vino odorato tritam & daucum mane ieiuno, prius quam madefeceris, propina. Post hæc cito farinam coctam tepidam voret plurimam: vinum quoque cum voluerit, bene temperatum superbibat, id quoque si ad melius tibi processerit: si non, prædicere te oportet. F

Sermo quoque hic indistincte & indiscrete est prolatus, præter id, quod & nomina quædam improprie scripta sunt. Nempe ob laborem morderi tendines improprie est dictum, verbo hoc morderi acribus humoribus & non doloribus quadrante: præterea & quod in principio dictionis dicitur, Vehementer in anteriorem reuellantur partem. Deinde ait, Arefcētibz, qui ad ἔρπαιον id est caudam, vergunt, tendinibus, qui crassiores spinam continent, eos, qui usque ad caudam protenduntur, ita vocans: appellant autem ἔρπαιον, ossis extremum. Quod si partem viramque tendi manifestare voluerit, atque tum in scapulas tum in pectus tetanum intendi, fieri sanè potest: quo modo paulo ante dixit, Tetani lumborum. Non tuto autem morbi facilitatem ex urinarum coctione prænoscit. Nempe, tametsi febris cruditates per urinas manifeste iudicentur, morborum tamen musculos infestantium, haudquaquam secuta est per urinas significatio: sed hoc quidem exiguum. Vinum autem his exhibere distinctione non facta, utrum ne ob frigiditatem passus æger fuerit, an aliam ob causam, non exiguum est delictum, immo petulans potius immodestum quoque. Absque item ratione dictum est ventrem soluendum non esse, nisi balano. Nempe in huiusmodi morbis commode interdum soluitur. Cætera dictionis manifesta sunt.

- 84 Morbi omnes solvuntur vel per os, vel per alium, vel per vesicam, vel per aliam, quæ talis sit, partem. Sudor autem morbis omnibus est communis. G

Sermo hic neque vniuersalis est, neque communiter inest omnibus: neque enim per hæc solum morbi solvuntur, verum quoque & per vterum, & per sanguinis e naribus eruptionem.

- 85 Quibus à capite fluxio est, his elleborum dare oportet.

Elleborum dare omnibus, quibus à capite fluxio est, non est necesse: nempe interdum capitoli soli providere consueuimus.

- 86 Quicumque propter abscessus, vel phleborrhagian, vel incontinentiam, vel aliam quampiam sortem causam suppurati facti sunt, his ne elleborum dederis: neque etenim proderit: & si quippiam afficiatur æger, fecisse id videtur elleborus. Si vero corpus dissoluatur, vel dolor in capite sit, vel oppletæ aures, vel nares, vel sputatio, vel genuum grauitas, vel corporis præter solitum tumor: quodcumque horum contigerit, dabis: modo hæc neque ob potum fiant, neque ob veneres, neque ob tristitiam, neque ob curas, neque ob vigilias. Si enim quippiam horum causam fecerit, ad id curationem dirigere oportet.

Phleborrhagian, venarum ruptionem dicit. Quod autem neque ijs qui ob huiusmodi causas, neque hijs qui propter abscessus, neque ijs qui ob causam aliam suppurati facti sunt, dare elleborum oporteat, nemo ignorat. Sed qui ob incontinentiam intemperantiam quoque suppurati sunt, perperam in hoc recensentur catalogo, intemperantia ipsa per se intemperantes lædente, ut redundantia, cruditate, crapula, venere multa, vigilijs, & quibusdam similibus. Cæterum prædicens, quibus nam elleborum exhibere oporteat, inquit, Si vero corpus dissoluatur, id est fractum admodum reddatur, absque occasione, vel dolor in capite diuturnus & solutus difficilis fuerit. Nempe & id te subaudire oportet in capitis dolore, & deinceps in ijs, quæ serie continuata dicuntur omnibus, oppletis id est auribus, naribus, & sputatione. Adijcit & genuum grauitatem dolorem quoque, & corporis præter solitum tumorem. In omnibus siquidem ijs, quæ sine manifesta causa facta sunt, vult elleborum exhiberi. Diuertens autem sermonem vniuersalem ad particularia inquit, Modo neque ob veneres, neque ob curas, neque ob vigilias, dicta facta sint. Si enim ex horum aliquo facta sint, pugnandum aduersus efficientem causam præcipit. Quæ nam autem ex his omnibus, quæ recensuit, vere diligenter quoque dicta sint, & quæ non, didicistis tum in Hippocratis libris, tum in commentarijs nostris.

- 87 Dolores ex itinere si fuerint, laterum, dorfi, lumborum, & coxarum, & qui inter respirandum dolent, occasionem habentes

Abentes. Sæpius enim dolores ex crapula cibis q; infantibus ad lumbos & coxam ventre consueverunt. Quibus talia fuerint, vrinæ difficultas accedit. Horum iter causa est, coryzæ item & raucedinis.

Sine ordine hæc interpretatus est. Nam prædicens dolores ex itinere, laterum, dorli, lumborum, & coxarum, rei inanis exhibitionem repræsentationem q; fecit, perinde atq; quo nūm modo hæc curentur, esset dicturus. Deinde factio ita additamento, Sæpius enim dolores ex crapulis cibis q; infantibus venire consueverunt: intulit, Quibus talia fuerint, vrinæ difficultas accedit. Post hæc quoq; inquit, Horum iter causa est, coryzæ item & raucedinis: acephalum vt quipiani dixerit, id est line capite & vertice, rei faciens sermonem.

- 88 *Quæ ob victus rationem eveniunt, multa quidē vni quique pro non assueti victus forma maxime declarat. Næ, qui grandere non consueverunt, & præsi fuerint, his tumor ventris ingens accedit, flatuatio, & proeluctio, & pleuritis: quod si supercarnauerint, venter turbabitur. Et si a balneo (consert enim) dormiant, exasperati q; plures longa ambulatione absoluant circuitus. Et si ventrē exonerauerint, cœnent partem q; vni, sed meracioribus, si non vtrē non exonerauerint, corpus caudo perungat. Et, si situerint, vinū aquosum ad unum et dūto bibant: si non, amplius dormiant, conquiescant q;. Cæterum talis institutus victus, quibus ex crapula latrantibus institus fuit. Ponula aquosiora tarde morant, ac veluti in onē aguntur, innatant q; circa hypochondria, & non decurrunt ad venter, quibus qui repletus fuerit, nihil celeriter ex in alijues opus, quæ & impossibile corpus in del celeriter accipiente potest. Quæ tamen maxime aut quiescat, donec cū oem concocta fuerint. Meraciora vero & austeriora palpitantem in corpore, acque in capite pulsum efficiunt: his bene fuerit, si superdormiant, calidum q; quidam forbeant ex q;, quæ sunt forma habent: ieiunium enim aduersus capitis dolorem crapulam q; malum est. Qui semel tantum die cibum assument, venter cilli sunt, & calidum mungunt, venter præter consuetum vacuat: os ipsis salum efficitur, & amara ac: atq; in quo uis opere contremunt, tempora concutuntur: cœnam q; non ita concoquere potest, atq; si præsi fuerint, quunt. Minus igitur, quam consueverint, bibant, liquidiorum q; magis partem loca assument: atq; ex oleo non mungunt, vel malum, vel betas, & pennisam. Dum autem cibantur, vinum modice bibant, aquosius q; atq; a cœna partem ambulent, donec excurrat vrina, munerint que. Pessibus præterea eluxu vrantur.*

Totum hunc sermonem in legitima libri huius parte abunde tum elaboratum tum explanatum scimus: quo fit, vt ex illis, quæ modo dicantur simili, possis tum discernere tum iudicare. Neque mihi diutius morari in his est necesse.

- 89 *Cibi autem maxime notas & indicia faciunt.*

Eduliorū vim non ex rōne aliqua sed experientia iudicari conuenit. Neq; hic refert *Εὐδαιμονία* vel *ἡδυσμασία*, id est cibos vel edulia, dicere. Cæterum, qui hæc scripsit tale quippiā ostendit p hoc verbum, *ἡδυσμασία*, i. notas & indicia facere. Neimpe nota corporibus lignum q; fit, vt ingt) secundum vnāquamq; quæ ex cibis valentibus fit, mutationem. Consequenter aut ea enumerat.

- 90 *Allium flatum parit, caliditatem que in thorace: capitis item grauitatem facit, & cibi fastidium: & si alius quispam dolor ex consuetudine ante infestauerit, tritat. Cæterum vrinas ciet, est que hoc prædictum bono: cum que, qui potaturus sit, & sese crapule daturus, vorare allium optimum est.*

Si vnumquodq; eduliorum experientia iudicandū sit, non recte dictum esse videt flatuosum esse allium: neq; caliditatis maioris sensum, q; cepam comedentibus, inferre, nec in vlla alia corporis parte, neq; et in thorace: neq; similiter *ἡδυσμασία*, i. cibi fastidium, & potissimū vbi quis ipsum parum ante feruefactum assumpserit. Eduliorum aut multa corpus, si phlethoricū fuerit, efflaciunt: cum vero ante vacuatum fuerit, licet abunde. Peccauit igit libri huius auctor, qui in discrete rem enunciauit: nam melius erat, vū dictum est, definire. Impresencia aut simpliciter de alio censuit: sed melius fecisset, si & exicare & calfacere ipsum dixisset, & non flatuosum esse: nempe aduersus indiscretum indistinctum q; ferre sententiam consuetudo non est. Subaudire aut oportet, vbi repestiue datum fuerit: quod parato ante corpore manifestat. Ante aut paratur, si neq; phlethoricū neq; caco-chymum fuerit. Non recte igitur capitis grauitatē ab eo fieri ait: nempe, si prævacuato corpore allium obtuleris, capitis grauitatē sanabis, partis q; alterius ois. Demiror aut, quo nā pacto, quæ hucusq; percurrit, præfatus, deinceps dixerit eum q;, qui potaturus sit, & sese crapule daturus, vorare ipsum optimum est. Videtur aut ex his neq; crapulam neq; ebrietatem efficere, sed ab his ita præseruare, vt & grauitatē expellere possit, et flatus sanare. Vera quidē hæc dixit atq; adhuc ex ciētibz vrinas vnum esse allium. Sed alia falso adiecit, simul que & pugnātia, si dicantur.

- 91 *Caseus flatum, atque adstrictionem, & ciborum accensionem facit: crudum & incoctum: facitque, qui se potu repleuerunt, deterrimum est.*

Caseus recens & mollis duro & sicco flatuosior existit: minus que, q; durus siccus que adstringit, i. lilit ventrē. Siccus etenim flatuosus minus est, sed vtrē magis lilit: pterea & liti culosius magis existit: quod ostēdit, cū inquit, & ciborū accensionē facit. Crudum aut et incoctum in dietionis iacet medio: quod exacta enunciatione caret. Ostēdit aut, q; crudum oē incoctum que in cor-

† *peſſimū aut
ait, & reple-
tos cū potu co-
medere ipſū.*

poris humoribus contractum ex huiusmodi edulijs fieri natum est: cuiusmodi est caseus, crudum E
& incoctum existens edulium: quali ita diceret, Caseus flatum parit atque adstrictionem ventris,
æstuosus q̄ est: præterea & crudū & incoctile est edulium, tales q̄ succos generat. † Ait præterea
& deterrimum esse ijs, qui se potu repleuerunt: quod & idiotis ipsis patet: neq̄ siquidē aliā bo-
num est edulium caseus, utpote qui crassum succum & coctū difficilem pariat. Si vero inter bibē-
dum eo quis utatur repletus, deterrimum omnium eduliorum redditur: grauat siquidem os ven-
tris, primus q̄ ipse corrumpitur, & alia deinceps secum corrumpit.

- 92 *Legumina omnia flatuosa sunt, & cruda & elixa, & fricta: minime vero vel macerata vel viridia. His autem
utendum non est nisi cum cibarijs. Sed horum singula suum vitium habent.*

Ventrem implent legumina omnia, coctū q̄ difficillima sunt, quæ cruda existunt: fricta, fla-
tuosa minus, sed concoctioni non minus renituntur: quæ autē plurimum elixa sunt, ea existunt
moderatiōra. Quod autem sequitur, in exemplaribus non nullis scriptum est ita: Et macerata, &
viridia: ut & talia præfatis vitijs sint prædita. In quā plurimis vero non ita scriptum reperitur,
sed principio altero in hunc modū: Minime autē macerata, {vel viridia.} Viridia dicuntur, quæ
neq̄ sicca sunt, neq̄ exglite iā perfectā: macerata vero, q̄ in aqua fuerint madefacta. Ceterū legu-
minibus haudquā sine cibarijs utendū esse præcipit, cibaria nimirū maxime quidē eos, qui ex tri-
tico panes fiunt, affirmās: vel simpliciter oīa, quæ quouis modo parātur: forsitan vero & alia oīa,
ex quibus panes conficiunt, zeam scilicet, tiphā, & hordeū: rustici autē & ex milio panes cōficiunt.

- 93 *Cicer flatum parit crudum frictum q̄, & laborem.*

Sunt, qui cicer scribant ob id flatuosum esse, q̄ pudenda intendat. Quod autem in fine dictio-
nis laborem dixerit, id ad eum referre oportet, qui propter inflationem fit, dolorem.

- 94 *Lens astringit, atq; turbationem facit, si cum cortice sit.*

Vocem hanc ἄρα Nov, turbationem quandam & veluti pugnam, quæ in ventre ex discrepanti-
bus facultate cibarijs oritur, significari dixi: quo modo & nunc significat, si cum cortice assuma-
tur, utpote quæ, q̄ caro ipsius, longe coctū difficilior existat.

- 95 *Lupinus inter hæc minime mala habet.*

Vocabulum hoc ἥκιστα, id est minime, vocabulo huic μάλιστα, id est maxime, cōtrarium indi-
cat. Lupinum autem minime prædictorum omnium ait habere mala.

- 96 *Laserpitij tum caulis, tum succus, non nullus quidem maxime, inexpertis vero per ventrem non descendit. Nomi-
natur autem hoc malum cholera arida.*

Laserpitij radicē hoīes æquiūoce cum tota herba vocare consueuerunt: hanc & herba succum
inexpertis, i. inassuetis siccā generare cholera ait. Sed, quæ nam ea sit, post paulo ipse docebit, ita
inquiens, Ab arida cholera venter inflatur, & strepitus insunt. Patet ergo spiritum flatuosum ex
laserpitij ingestione colligi in vētre, est. n. acre & æstuosum. Quid nā autē significet vocabulū hoc,
/nō nullis/ nihil ex dictione est manifestū. Atq; ob id explanaturus quispiā horum singula, quod
maxime probabile sibi videbit, dicet: nēpe in talibus dicere, quod ex ratione est, difficile existit.

- 97 *Maxime autem id fit, si cum multo caseo, aut bubularum carniū edulio, misceatur.*

Siccā ab eo vocatā cholera ait maxime ijs fieri, qui laserpitium simul cum caseo multum
ingererunt, aut cum carne bubula. Nempe flatus, qui ex laserpitio oritur, cum emplasticis & tar-
de penetrantibus edulijs mistus manet in ventre, & non descendit.

- 98 *Bubulæ etenim carnes melancholica proritant pathemata. Nempe harum natura insuperabilis est, nec quivis ven-
triculus eas concoquere potest.*

Agebat quidem de laserpitij virtute, sed bubularum carniū esum supermiscuit: factūq; ad pa-
themata melancholica trālitu, ea à bubulis carnibus proritari ait. Deinde geminas assignans cau-
sas hoc ait, Nempe harum natura insuperabilis est. Vfus est igitur hac coniūctione, nempe, eo-
rum modo, qui dictorum causas referunt. Non tamen, cur à bubulis carnibus melancholica pro-
ritentur pathemata, causā dixit: quanquam aliā quampiam communiorem dixerit, quæ s. na-
tura ægre conficiatur, & valida sit: natura enim ea insuperabilis est, quam nullus superauerit.

- 99 *At optime liberabuntur, qui perelixis utentur & perquam vetustis.*

Hæc quoq; sermonis textura vniuersaliorē habet admonitionē non in melancholicis. Nā bu-
bulis carnibus & perelixis & vetustis uti præstat, sicuti & alijs oībus, quæ difficulter concoquunt.
At improprie voce hac βέλτισα, i. optime, est vsus. Neq̄. n. melancholico laborātes morbo, neq̄
homo alius quispiā vel sanus vel eger, optime liberat, bubulas carnes & perelixas & vetustas inge-
rens.

Arens. Nempe inter oīi, quæ edunt, hæ non bonā præstant alimoniam: bene tñ talia ingerētes ceteris munus ledunt. Si ergo pro voce hac βελτιστα dixeris ἡκιστα, i. minime, sermonē reddes integrū.

100 Caprinæ carnes, quæ in bubulis mala sunt omnia habent, & crudæ item. Sunt q; flatuosiores, ructus q; magis gernerant, & cholera pariunt. Verum, quæ odoratissimæ, solidæ, & suauissimæ sunt, hæ optimæ sunt, tum perueniæ, tum frigide: quæ vero suauitate omni carent, male olent, & duræ sunt, hæ deterrimæ, & quæ recentes.

Cur caprinæ carnes bubulis vitiosiores sint, causam hoc in loco dixit. Nempe, cum coctū difficile bubularum modo exsistant, flatuosiores etiam sunt, & sæpius mouent ructus, qui malam habeant qualitatem. Cum igitur bubulis & aciores & calidiores sint, si incoctæ maneant, cholera pariunt. Quæ efficitur ratione, ut frigidas eas magis, q̃ calidas, elitare oporteat.

101 Optimæ autem æstate, autumno vero pessimæ.

Optimas esse ait caprinæ carnes, inter se quidē non cum cæteris comparatas: oportebat igitur, quantum ad annū ipsæ attinet, vitiosissimas ob temperaturam esse. Contingit autē capris tempore æstiuo meliorem esse alimoniam: quo modo praua sunt, quæ herbas vorant animalia, ubi viridem herbam non habeant. Capris autē maxime idoneam præbent alimoniam germina arborum caulesque: quos à fine veris ætas largiter habet. Quod autē alimonia ad carnis bonitatem plurimum possit, potes ex vulpibus certior fieri, quæ autumno probatissimam ob vias habent carnē. Sic passer & hiedula maxime laudabilem carnem obtinent. Autumno igitur capre nutrimento idoneo destitute tum deterrimam, tum perq̃ tenuem, habent carnem. Hyeme autē meliorem sanguinis consequuntur habitum, naturalem intemperiem à temperatura temporis contractam corrigentes.

102 Porcelli carnes prauæ sunt, cum vel crudiuscule vel ambustæ fuerint: nempe tum choleracæ sunt et turbatorie. Suiile autem carnum omnium optimæ sunt: valentissimæ vero, quæ non admodum neq; pingues neq; graciles sunt, nec victimæ veteris ætatis sunt assecutæ. Edende vero sunt detracta pelle & frigidiusculæ.

*ειωποτος, est inimp. c. 2. σωματες, id est corpora, est in man. scriptis. & tunc interpret.

α Χοίρων proprie appellabant veteres porcum valde paruum, ut apud poetam reperitur, & οὐκ ὄν ὡς ξείναι τὰ δὴ δμῶαςι πάρεσι χοίρε. αἰτὰρ σῶα λου; γε σῶας μνηστῆρες ἐδυσιν, i. vescere nunc o ho spes, seruorū cibus porcelli sunt: proci etenim plus, q̃ absolutos, edunt fues. Non sanè video, quo pacto syalos ederent proci, (nā & syalos veteres appellabant fues eos, q̃ perfectos absolutos q; supra essent,) nisi q̃ & ignarissimi essent dignoscendorū tum eorū, quæ facile concoquunt, tum suauium eduliorū: quales & sese ostēdebāt, cū ventres caprarū pingui & sanguine plenos elitarent: quo sanè quod difficilius concoquat, eduliū reperies nullū. Caro autē optima tū ad suauitatem tū ad concoctionē eorū est, q̃ mediam ætatē sunt allecuti: hæc ēt sanguinē bonum gignit. Veluti deterrimā est porci vetustissimi: atq; eius, qui confestim à partu voratur, porcelli: nēpe hi terrestriū ferē oīum, quæ vorant hoīes, animalium maxime humidā obtinent carnem. Atq; ob eam rem, cū nuper genitorū caro exuperatè humida sit, plurimam inde generat pituitā: & si suberudior fuerit, inulto adhuc magis. Simili quoq; ratione pinguisimā suam carnem ea, quam mediè & bene carnosam habent, deteriorē existimat, suspiciōnē humiditatis habēs, ob quā pinguedo oīs carne sui generis deterior tum ad concoctionē tum nutritionē existit. Quæ autē ob allationem ambustæ sunt, tum ad succi bonitatē, tum ad cōcoctionē, sunt inhabiles: cholera q; pariunt propter eam, quæ his accedit, acrimonia: nempe ea choleraceorū eduliorū cōmunis est malitia, cum & humida & acra fuerint. Talia siquidem similiter corrumpunt, sua q; acrimonia vasorum eorū, quæ ad ventrem decubunt, ora remordent: atque fluxionum earū, quæ ex toto corpore in eum sunt, causæ efficiuntur. Quod autē porcelli absq; pelle, i. absque cute edendi sint, nemo ignorat: non enim cutis aialis carni similiter concoqui nata est, utpote q̃ frigidior existat. Frigidiusculos quoq; & dhos manifeste edēdos præcipit, calidas oēs carnes veritus. ac fortasse calidas frigidiusculis tū ætuo fiores tum flatuosiores esse existimās. Ego autē in caprinis carnibus, & quæcunq; calidæ sunt natura, sermonē admitto. In moderatis vero tū caliditate tū frigiditate, cuiusmodi suiile carnes sunt, simpliciter indiscrete ita dici nō admitto: nēpe ei, q̃ distinxerit, calidæ frigidis idoneæ magis erūt.

103 Ab arida cholera veter inflatur, si repitit fuit, & dolor tū laterū tū lūborū, nihil q; aliud deyen, sed adstricta est.

Cholera ab hoībus simpliciter appellatam ab arida per humiditatē distinguit. In vtraq; autē noīe cōmuni est vsus generationis modū, qui cōis est, respiciens. Vt. n. cholera humida ex acribus oritur humoribus, qui ex esorū corruptione prodierunt, sic arida ex spiritu flatuoso acri. Quo fit, ut, quæ prope ventrē sint, neruosa corpora mordeant, intendatur q; & dolorē pariat. At, cū spiritus hi possint interdū quidē retineri, interdū & exire, aridā propter retentos spiritus generari cholera asserere non possum: nam probabilius fuerit ita appellare eos, qui penetrant egeruntur q;.

104 Ita affectum, ne vomat, seruat, sed venter subducatur. Chylarem ergo ex calido & perquam pingui celeriter adhibebis: perunctum q; in aquam demittes candidam, & quam plurimam in scapha reclinans, & calida sensim perfundens: & si calfacto ipsi venter subducitur, morbus solutus est.

Septima Classis.

tttttt ij

Quam

Quā citissime clysterem exhibere et vomitum prohibere precepta sunt cōmunia oīum, quę in E ventre præter naturā continētur, & quę vt deorsum excernant, apprime contēdimus. Simili modo & calidū exhibere clysmā: prouocat siquidem calidū, & frigidum reprimīt. Clysmā autē pingue aridam proprie sanat: qm̄ & virtute contrariū est, siccitatem nimirum humectans, morsus q̄ leuiens. Eundē habes scopū, si in scapha fouendo tū aqua tū oleo & calfacis & mitigas solaris q̄.

105 *Confert quoque & huic dormire.*

An cum, dum in scapha fouetur, dormire velit, an sine illa, non constat. Quod autē ipsum dormire per se cruditatibus omnibus maximo remedio sit, consideranti patet.

106 *Bibere item Vinum tenue & vetus & meracius.*

Vinum quidē exhibet, vt concoctioni adiūmēto sit: sed tenue, vt in ventre non moret: vetus vero & meracius, vt calfaciat magis. Vinū liquidū omne habitū calfacit, magis q̄ quod vetus est.

107 *Oleum quoque dabis, vt quiescat, & venter subducatur, & solvatur morbus.*

Oleum, quę acria sunt, lenit, placat q̄, & siccitatem emendat, ventrem q̄ moderate subducit: F, quibus omnibus ei qui curatur est opus.

108 *A cibis autem atq; alijs abstineat.*

*AP. πoτὼν.
potionibus. &
ita vetus inter-
pres.

Si corpori nihil desit, nulla q̄ apponēdi quippiā premat necessitas, & cruda quędā concoctio- nis indiga contineant, his requie est opus & nō cibarijs, prius q̄ cōtēta mediocriter cōcoquant.

109 *Verum, si dolor non cessauerit, lac asinæ bibendum, vt purgetur, dabis.*

Si feceris, quod dictū est, & dolor non soluat, cōtristātis causæ maiore esse acrimoniā existimā dum, atq; ob id corpus purgare oportet. Lactē asinę vtendū præcipit, quod purgatiā inter medicā mēta oīa mitius tranquillius q̄ existit: id quoq; & lactē oī humidius est, et ventrē magis subducit.

110 *Si venter liquidus fuerit, bilis quę excernatur: vexat quę tormina, & vomitus, & mordicationes: quiescere his est optimum, mulsam bibere, & vomere.*

An de arida adhuc cholera agat, an per se hæc intelligenda sint, non satis constat. Sed, quocūq; res ierit, contineri in ventre videtur bilis, quę acris & elui contumax sit. Ventrem autē moderate G subducere, atq; quę in vētre continent, concoquere molitur. Subducetur autē mediocriter aqua mulla: & per requiem concoctio fiet. Qui autē in affectionibus huiusmodi sepius valēter auxiliatur, is cacochymiam valente medicamento affatim expurgat, vires ægri & habitum contēplatus, anni tēpus, ætatem, & constitutionem. Quod autē in fine dictionis dicitur, mulsam bibere & vomere, quali superiorem ventrem expurgari auctor voluerit, melius cum aduerbio /non/ dicitur. Nam mulla detergendī pollens facultate, quę corrupta sunt, in naturalem præuertit viam, id q̄ ci tra oris ventris tum læsionem, tum periculum, quę per vomitum contrahi possunt.

111 *Hydropum duę sunt naturę, quorum hypofarcidius, si fieri aggreditur, vitari nō potest: alter ex flatibus constat, multa q̄ & bona indiget fortuna. Curatur maxime tolerantia, fōtu & temperantia. Sicca autem & acria edat: ita enim maxime tum minget, tum valebit. Si difficulter spirauerit, fuerit q̄ anni tempus æstiuū, & vigerit ætas, viribus q̄ fuerit valentibus, sanguinem à brachio tolles: deinde calidos panes ex vino nigro & oleo tinctos edendos dabis: is quę quā minime bibat, & quā plurimum laboret: suillam quę carnem edat carnosam ex aceto coctam, vt aduersus arduas resistat inambulationes.*

† infra thoracem.

† quę aliquid quidem cōe habet omnīū hydropū, sicuti in principio scripsit, tolerantia, & fōtu, & temperantia, cōsulens comedere calida & sicca: aliquid vero solius anasarca, quem, vt & c.

Sunt, qui nō hypofarcidium, sed epifarcidium scribant. Neq; tñ anasarca & catafarca alicubi H scriptū repperi, quāq; recētiore ita nominēt. Cum autē hydropum naturas duas esse affirmauerit, atq; de posteriore flatus citra quoduis aliud symptoma dixerit, de priore autē nihil oīno, manifestū est aliqua ex parte confusum ipsum esse ac falli in hydropū differentia. Quidam ergo ex medicis quatuor hydropum differentias esse affirmāt, à iusto recedentes: aduersus, quos verba impresentia facere tempestiuum non est. Verum, qui hæc scripsit, manifeste defecit. Nempe hydropū vnus humidī consistentia tenuis copiam, in tota † inferiore thoracis regione acervat: quam aliqñ per- pungentes, humidū euacuamus. Alter locū hunc non aqua, sed spiritu, plenū habet, & ferē superiora oīa tumentia: hunc Tympaniā appellāt. Alius autē habitū totū pituitā plenū hēt: eū Hypofarcidiū non nulli appellāt. Quo fit, vt deficiēter duas hydropū esse naturas dixerit. Neq; ē recte protulit ἐγχεσπέων γίγνεσθαι, i. si fieri aggredit: nā verius dixisset ita scribens, Interficat autē protinus, postea q̄ factus fuerit. Scripta est autē ita dictio, sed perperā, ab eo, q̄ primū scripsit. Alterius sane hydropū, quē ex flatu constare ait, sanationē scribit: † quę profecto hydropum oīum, quod cōmune est, habet. Principio autē scripsit tolerantiam, fōtu, & temperantiā, calida & sicca gustare admonens: quod solius anasarca est, quem, vt insanabilē, prætermisit. Nepe hic solus, cū incipit, eget interdum sanguinis detractiōne, cum sex retentione vel hæmorrhoidum, vel muliebrium, vel ex

E vel ex quapiam, quę ita plethorica sit causa, inceperit. Tympaniā vero, & Ascitem nullus per sanguinis missionē sanare est ausus. In eo igitur, qui sanguinis detractiōe eget, fiat, quę subsequens est curatio, quę scilicet calfacit & siccāt. Sanē qui hęc scripsit, ad id, quod expedit, intentionē dixisse videt. Non tñ recte dixit, Si difficulter spirauerit, sanguinis eget detractiōe: si re vera non propter plethorā hydropa incurrat, propē scilicet ad extinctionē accedente naturali caliditate, vt igni contingit. Nempe, vt ignis propē extinguitur immixtis lignis tum humidis tum multis, nisi quis multitudinem sustulerit: sic & in frigidiorē ob copiam sanguine, vbi calor natiuus propē extinguitur, presentissimū est remedium sanguinis missio, quo tempore periculū ita prehenderit. Perperam quoq; dictioni apponit, Fuerit q; anni tēpus æstiuū. Nempe plus minus auferendi sanguinis alia quędā scopi esse dicta sunt, sicuti & anni tēpus: auxiliū vero huius, affectiōis natura. Dioscorides nō æstiuum anni tps scripsit, sed vernū, virtutis exolutionē estate affuturam suspicatus, hyeme vero affectiōis refrigerationem. ^a Vulgāriter autē & ^b inēpte admodū panes calidos ex vino nigro & oleo ei, cui sanguis est detractus, exhibet, scopū quidem verū roborandę virtutis habens, vt exercitationū patientiis sufficere possit. Sed materiā scopo dignā non inuenit: vinum etenim nigrū, sanguinē plurimū generat, sed tñ, vt & superfluus sit, & melancholicus fiat. Verū huic melius est vinū dare fuluū, tenue quidē substantia, vt vrinas moueat, sed nō etate nouū: quo modo sanē multis cōtingit. Vinorū etenim nouorū nullū est fuluum, sed vel albū, vel rubrū, vel nigrū: vetustate autē fiunt & fulua & flaua. Atqui, quā minimū bibere, & quā plurimū laborare, rectissime ē dictū: nēpe talis viuēdi modus calfacit & siccāt. Suillę carnes, si, quo dictū ē. mō edant, uigētibus etate & validis nō male dari possint: ceterorū autē nullus utiq; eas, pbe coquere possit, vt pote q; iā, ppe est, vt calor natiui patiat extinctionē. Melius ergo ita affectis dare, q; pbe coquēt.

A* ιδιωτικῶς

B* ἀπ' αἵματος

112 Qui ventrem inferiorem calidum habent, subeunt q; acres diēctiones & inæquales, hī à colliquatione id patiuntur. Qui si ualentes fuerint, reuelles elleboro albo: si non, cremorem tritici frumentacei crassum frigidum q; dabis, quod ex lente etnos conficitur, panem q; subcinericiū: & pisces febrientibus quidem elixos, non febrientibus vero assos. Vinum præterea non febrientibus nigrum dabis: alius vero aquam aut à mēspilis, aut myrtis, aut malis, aut sorbis, aut palmulis, aut vitium cœnanthe.

Glossēma est, nec ē antiquus quibusdā est, nec in translatione veteri.

Excrementa his ob combustionem non ob colliquationē subire proprie magis dixisset. Nam colliquatio in eo fit liquata cōtabefacta q; propter febrē malignam vel pinguedine, vel molli carne: cōbustio vero in vētre oritur propter acrē eorū, quę ingelita sunt, caliditatē, ob quā & febrire cōtingit. Elleborū ergo huic album exhibet: quod indicauit per hoc verbū ἀντισπᾶσαι, i. reuel lere, nempe per ventrē superiorē. Si vero eger quauis ex causa nō possit elleborum assumere, vice rit q; acrimonia, pocula dare iubet tum astringentia, tum refrigerantia. Adicit autē eduliis, & quæ assiccare possunt, veluti panes subcinericios, atq; assos pisces. His ita & nō sine ratione enunciat, quem nā ventrem inferiorē dicat, est cōtēplandum. Veteres enim thoracē interdum ventrē superiorē appellantes, alimenti receptaculū omne, quod à septo transuerso est, ventrē inferiorem noiant. Interdū autē ventrē superiorē appellātes, in quē cibi assumuntur, quę ab eo sunt oia, ventrem inferiorē vocitant: Interdū quoq; & sola, quę crassiora sunt intestina. Sunt, qui colōn dūtaxat ventrē inferiorē vocant. Forfan igitur quęsiuissēmus, quā nam vel quas nā ex p̄dictis particulis probabilibus imprēsentia itelligere deberemus, si effatu dignū quippiā percepturi fuissēmus: sed, qm̄ horū inuentio nihil nos admonet magis, q̄ ea, quę ipsi & scimus & discernimus, q non nulla quidē recte dicta sunt, nō nulla vero nō, cognitionis q; curiolitatē magis, q̄ cōmoditatem, habēt: melius est cito relinquere, & potissimū cū huiusmodi liber Hippocratis legitimus non sit.

113 Si vero febris nō n habeat, & tormina adsint, primum quidem lactis asinini calidi pauxillum, deinde † sensim paulatim quę plus bibat, & lini semē, & triticeam polentam mista hordeacea, & sparsa adempto amaro faba ægyptia: vel oua semiconcreta edat assa, & simillam & milium, & chondrum ex lacte coctum. Cocta hæc & refrigerata edat, atque his similia tum pocula tum edulia ingerat.

† Diētio, non, nō hētur in aliquo cod. graecis nec in translatione veteri.

Quām plurimi exponentium conuenientius hęc cum p̄dictis componunt, præsentem sermonem adhuc de iis, qui calidum habent ventrē inferiorem, fieri existimantes. Alij, pauci q; separant, & seorsum exponunt: scopus q; his est partim quidē caco-chymiam expurgare, partim vero ἐπιπεπνύουαι, hoc est cōtēperare infrenare q;: partim q; reliccare, & partim refrigerare. Lac ergo asininū expurgare potest & cōtēperare: Lini semē tñ liccare tum refrigerare. Quę autē ex tritico cōficiuntur polentę, cōtemperāt: quibus nō perperā remiscēt hordeacę, utpote quę siccēt & refrigerent. Fabę ægyptiē mediocriter refrigerare possunt. Oua autem & similia & chondrus crassi sunt succi & boni, & humorū acrimoniā infrenāt. Siccāt autē i edulio miliū, quo refrigerat modo. Omnia hęc frigida exhibet propter humorū, qui affectū procreant, tū acrimoniā tum caliditatē.

† ἐκ πρῶτου γωγῆς

114 Eius medicinę partis, quę victu medetur, maximum est febrium tum intentiones, tum declinationes, non in acutus modo, verum quoque & in longis morbis, obseruare, vt tempora, quibus cibi offerēdi non sunt, & tuto, & quibus offerēdi existunt, cognoscas: atque adhuc quando plurimum ab intentione aberunt.

Artis

Artis ciborum exhibendorum maximum esse ait particulare cibi porrigendi tempus nosse: E scopum quod vnum ait, quod scilicet tempus illud, quo cibus exhiberi debet, quam plurimum absit ab febris intentione, quam ἐπίτασιν dicit, accessionis principium intelligens. Id autem non in diuturnis solum, sed quoque in acutis verum esse videtur. Sed quare longis in morbis adiecit? Nempe quod in his magis & forsitan solis evidens sit scopus. In acutis etenim morbis deprehensa in pedibus caliditas, cibi tempestive offerendi signum sufficiens fuit: non tamen in longis ita nutrire oportet, sed melior declinationis pars est expectanda: quod in acutis haudquaquam expectari potest, timore cito futurae accessionis. Sunt, qui dictionem hanc ita scribant: Eius medicinae partis, quae victu medetur, maximum est, ut in acutis, ita & in longis, observare & scire, quando cibum dare oporteat. Alij finem dictionis ita scribunt: Atque adhuc, cum plurimum a febris accessione ab erunt, scire oportet: ut praeter cetera, quae nos in agro contemplari voluit, & id admoneat. Quod si quis perquirat, & non particulari tempestive cibandi inuentioni copulat, id importunum esse de alimonia praecipuum, atque re nulla dignum, videtur.

115 Cognoscere autem & eos oportet, qui capite dolent vel ob exercitationes, vel cursum, vel iter, vel venatum, vel quemvis alium importunum laborem, vel venerca: Decolores item, raucos, lienosos, exangues, spirituosos, sicce tussientes, siticulosos, flatuosos, & venarum interceptiones. Huc adde, quibus extenta sunt tum hypochondria, tum dorsum, tum latera, torpentes, obscure videntes, eos quibus aurium tinnitus est molestus, eos qui urinas non continent, morbo laborantes regio, quorum venter cruda egerit, sanguinem e naribus vel sede vehementer profundentes, inflatos, & φαρμακείν quos vehemens labor infestat. Nulli etenim horum, nisi superuenerint, medicamentum exhibebis. Nam periculo aegri expones, nihil quae iuuabis: spontaneas quae tum permutationes, tum iudicationes adimes.

Quod inordinate, & praeparationis ad commentationem modo, omnia hoc in libro scripta sint, cuius patere arbitror. Multa sane, ut dixi, in hoc bene dicta sunt, ob quae iis, quae dicta sunt, non recte quidam fidem adhibuerunt, magis quod qui sibi conscij fuerunt veluti discretoria eorum, quae scribuntur, scientia carentes. Quae ergo haec in dictione dicuntur, catalogum habent eorum, qui, ut medicationem recipiant, idonei non sunt: καθαίρεσθαι autem, id est purgari, & φαρμακείν, id est medicamento purgante uti, idem significant, ut φαρμακείν & καθαίρεν. Videamus ergo, quibus nam ab initio purgationem interdicat. Capite dolentes recenset vel ob exercitationes, vel alium quemvis importunum laborem, summam eos intelligens, qui ex intempestivis laboribus capite dolent, haudquaquam purgandos. Labores autem intempestivi importuni, quae omnino sunt, quos praesens hoc tempore corporis affectio ferre non potest. Admonebo autem te G impraesentia rei, quae ad multa est utilis, quam semper in memoria haberi velim. Corpore igitur nostro ad morbosam affectionem non nunquam parato, ita ut propere completa sit, externum quippiam obueniens eam affectionem manifestavit, febrem videlicet accendens: vel capitis dolorem, vel catarrhum, vel tussim excitans, vel aliquid quod tale sit. Deinde ex eo continenter ad morbosae affectionis praeparationem non sine periculo languent, neque cursu morbum excitante, vel vehementi omnino motione, ut neque intemperantia, vel refrigeratione, vel alia quavis simili causa: nihil etenim horum suapte natura vehementem generare languorem potest. Nam, si febris ab horum aliquo fiat, haec ex diariarum genere erit: aut, si symptoma aliquid aliud generetur, id paucum edurabit interuallo. Et sane saepius, ut retuli, propter corporis dispositionem vnumquodque horum non morbi causa, sed πρόφασις, id est occasio, redditur. Nam huiusmodi causas propriissime quis appellauerit προφάσεις, non simpliciter evidentes & manifestas, ut hi saepius vocare consueverunt, cum ab aliqua manifestarum causarum noxa in corpore evidens fuerit. Si enim nulla alia corporis dispositio affuerit, neque morbus effatu dignus subsequetur: eiusque, quod in corpore sit, detrimenti, quod ipsum fecit, causa est. Sciueris itaque hoc in loco de his agi causis, quae non sua ratione corpori afferunt detrimentum. Summa autem horum H est una quidem & prima labores varij & particulares: cursus scilicet, luxuria, pancretia, venerea, frictio, aestuatio, frigus, vigilia, ira, moeror, & timor. Venercorum quidem meministi, verum cetera subticuit, quanquam virtute eadem praedita forent. Nam, quae, ut dictum est, spiritum perturbant, ea purgatione non egent, quod morbus huiusmodi a cacochymia contractus non sit. Ab his autem digressus indicis auctor, quos prius dixit, declaravit. Proprie autem ἀχρόες, id est decolores, λειψαίμες, id est sanguine carentes, vocant: eosque, qui propter aliam affectionem corpus non secundum naturam, affectum habent, κακοχρόες, id est mali coloris, appellant. Hi ergo decolores calferi expostulant tum exercitationibus, tum vini facultate calidi potu, & cibis, qui talem obtineant facultatem. Raucos deinde subiungit. Nempe & horum humiditatem & frigiditatem ob delapsam ad guttur rheuma sanare conuenit, exiccatis scilicet topicorum auxiliorum usu tum capite tum ceteris, quae affecta sunt, membris. Praeterea & lienosos purgatione haudquaquam egere inquit: quod non recte dictum arbitror, cum lienosis, si aliis quibusdam, purganda sint, quae nigra existunt. Post lienosos meministi λειψαίμων, id est eorum, qui sanguinis inopiam habent, etsi non aperte manifeste quae fuerint decolores. Deinde mentionem de spirituosos facit, sicce tussientibus, & siticulis, obscure ita locutus, ut non constet

A fiet, vtrum ne singuli horum seorsum intelligendi veniant, an hi tres vnà comprehendendi. Neq; adhuc in singulis horū seorsum intellectis p̄spicius est sermo, vt et antea iam est enunciatū. Nēpe *ωνειματωδεις*, i. spirituosos, sepius eos dūtaxat vocant, qui, cum inspirant, aeris indigent: interdū aut̄ & inflatos: quorū vterq; multas habet causas, quas oēs si p̄curerō, prolixior, q̄ par sit, sermo est futurus, prāter id, q̄ quidam ex his sanguinis mīlionem exigere videntur, alij purgationē, & remedium aliud alij. Sic & sicce tussientes non affectione vna fiunt, neq; liticulosi. Neq; ēt imp̄fenti certiores fieri possumus, an ne de febrientibus liticulosi sermo sit, an de non febrientibus liticulosi, an de vtrifq;. Quod si vnius horum, quæ in aphorismis recēsentur, meminēri mus, quod
 « vniuersale est, tolletur. Dīctū aut̄ in aphorismis, || Si nō febriēti inappetētia fuerit, oris ventriculi
 « morsus, tenebricosa vertigo, & oris amaror, id p̄ superiora purgatione indigere significat. Si autē
 os amaricat, liticulosi sunt. Pari modo, & qui nā flatuosi ab ipso dicantur, haud scio, an videlicet cū
 venarū interceptione flatuosi effecti intelligendi sint, cum ad sint non nulli, qui per se legāt. Atq;
 adeo singula dictionis huius possem transmutare: possem q; oīa, quæ cognoscere vtile sit, citra li-
 brorū multitudinē docere: velut & de iis, quæ deinceps dicunt. Ait enim, Quibus extēta sunt
 tum hypochondria, tum dorsum, tum latera, torpētes, obscure vidētes, eos, quibus aurium tinni-
 tus est molestus, & qui vrinas non cōtinent. Nēpe in singulis his pathematis & causæ & affectio-
 nes sunt multæ, variis q; egentes curationibus. Quarum profecto non nullæ eā, quæ per bilis edu-
 ctōrium medicamētum fiat, purgationē expostulabunt. De his ergo oībus, atq; adhuc de iis, quæ
 deinceps dicuntur, nō enunciationes indistinctas, sed distinctiones doctrinas q; tum claras, tum
 longo rerū vsu probatas, habes in nostris tractationibus: quas qui intellexerit, omnia quæ ab au-
 ctore hoc recitātur, discernere valebit: atq; an partis meminērit, quam & legitimam & commo-
 dā doctrinā plenā falsi sumus. In ea siquidē parte cū demonstratione & explanatione congruen-
 tibus q; distinctionibus scripta sunt omnia: sed, quæ ita disseminata sunt, vt præsens oratio, nihil
 iuuare possunt. Nēpe, si quis nunc singula horū simpliciter & indistincte audierit, is multa in ar-
 te perperam molietur. Quod si singula, vt oportet, distinxerit, primum quidem nihil imp̄fentia
 ad eorum inuentionem iuuari deprehendet, deinde ad eam, quæ de præsentibus sit, contempla-
 tionem multis egere libris cognoscet. Nec vero plerifq; hominum suaderi potest, vt aggrediatur
 quidem sola ea scripta, quæ manifesta sunt: quæ vero talia non sunt, iis, qui ea scripserunt, relin-
 quant. Nempe, si nullā illi curam habuere, vt nos ea, quæ scripserunt, intelligeremus: & nos haud
 quaquam diligenter adhæreamus, ea, quæ dicuntur, tum quærentes tum diuinantes, par est.

4. Aph. 17. Ext.
or. 29. 2

116 C Si cupiam sanguinem auferre confert, ventrem confirmare oportet, & ita auferre, & inediā præcipere, & vi-
 num tollere: deinde congruenti victu & fotibus humidis reliquam curationem absoluerē.

Fluente aluo sanguinem non detrahes. Nam, si post detractionem perseuerat fluor, virtutem prostermit. Inediā autem præcipere, hoc est *λιμον τονειν*, quibus detractus fuerit sanguis, & vinū tollere, recte dictum est, vt & congruo vti victu. Sed fotibus humidis curare, si de oībus quidem, quibus sublatus fuerit sanguis, dicatur, id falsum est: si vero de aliquibus, dicere oportuit.

117 Si vero venter densus astrictus que tibi videatur, mollem huic adhibe clysterem.

Dignum conscriptione, quod omnibus pateat, hoc non est.

118 Quod si medicamentum opus sit, elleboro tute sursum expurgat: deorsum vero talium neminem.

Tanq̄ ægritudinē prædixerit, in qua hæc fieri iubet, sermonem facit, tametsi nihil prædixerit. Vel ergo exempta est quædam oratio, in qua ostendebatur ægritudo: vel obliuiosus fuit, qui hæc scripsit: vel talis, qualis à multis appellatur *μετέωρος*, id est non dum fixo animo, sed suspensus.

119 D Optimum autem est, si vrinæ cieantur, sudores prouocentur, inambulent, & tranquille ita sese perficient, vt non densiorem reddant habitum. Quod si in lecto iacuerit, perficient eum alij.

Scripsit quoque & hæc ita, tanquam ægritudinem prædixerit.

120 Et si in thorace supra septum transversum infestet affectio, resideat frequentius, qui afficitur: minime q; reclinent, donec vires valeant, sedentem q; calido multo diu refricent. Si vero dolor ventrem inferiorem sub septo transversum infestat, iaceat is (conuenit enim) nullo q; pacto corpus moueatur, seclusa etiam frictione omni.

Oratione ex hac quis coniecerit tum hæc, tum quæ ea præcedunt omnia, de doloribus scripta esse. Prætermissa igitur principio dictionis sunt hæc, peccante primo libri huius scriptore, & manente postea peccato. Quamobrem fieri nō potest, vt quispiam in his veritatem peruestiget, et si plus, quam temere, in huiusmodi tempus contere videamur.

121 Quæ autem ex ventre inferiore soluantur tum per vrinas, tum per sudores, si mediocriter per se delabuntur, quæ parua sunt, soluantur. Vehementia vero pernicioſa sunt: nempe tales vel intereunt, vel non sine malis aliis sanescunt: nam eiusmodi confirmari solent.

Per

Per talem quoque dictionem conicere licet de dolorum curatione omnia, quæ ab ipso ante scripta sunt, dicta esse, & hoc etiam,

- 122 *Poculum hydropi. Cantharides tres abiectis singularum tum capite, tum pedibus, tum alis, in cyathis aquæ tribus terantur: atque, cum bibens laborauerit, calido perfundatur, ungatur prius. Ieiunus bibat, & panes calidos ex oleo vel pinguedine edat.*

A. li. 3. f. 11.
C. 13. fol. 32.

Quidam dictionis huius mentem haudquaquam intelligens audax medicus prædictas partes à cantharidibus abiecit, deditque hydropi: cui cum à primo die abscellus in fura cõparuisset, post tres alios dies sectus est, effusaque copiosa aqua, curatus esse visus est, quod pars tumoris præter naturam plurima statim ad moderationem redacta sit, veruntamen non multis post diebus obiit, Quam ob causam medico quidam crimen ingessit, perperam data esse cantharidum corpora inquiens: nempe propinanda ablatis corporibus tum caput tum pedes tum alas, idque esse, quod in dictione enunciaretur. Quare non cunctatus audax ille medicus hydropi alteri ita propinauit, mox quæ factio similiter in femore abscellu, secto quæ, atque effluxo similiter humore, multis post diebus hominẽ mori contigit. Quanquam vrinarum prouocatorio medicamento ex cantharidibus confecto quidam citra bibentium incommodum vli sint.

F

- 123 *Sanguinem supprimentia, quæ Græci ἰσχυρὰ dicunt. Fici succum lana susceptum intus ad venam appone. Vel coagulum inuolutum ad nares immitte. Vel chalcitidem digito ante tractam preme, charitilages quæ viring; foris comprime. Ventrem lacte asinæ cocto solve, capuique rade, & astringentia, si calidum anni tempus fuerit, exhibe.*

Sesamoides superiorem ventrem purgat sesquidrachmæ pondere in oxymelite tritum & potui datum. Miscetur autem veratris ita, ut tertiam efficiat partem: nempe id hoc pacto minus suffocat. Ad Trichasiam. Filum ubi acui foramen habenti subieceris, celsiorem quæ atque acuminatam supra tenet palpebræ partem ad inferiorem usque traieceris, quod superius est, inferiorem uero, fila autem extendens consue & colliga, donec deciderit. Et, si satis quidem fuerit, bene cedat: si non, defuit quæ aliquid, hæc refice. Hemorrhoidas modo simili persequeris. Nam acui crassissimam lanam pinguis filum & quam maximum colligabis, securior etenim est huiusmodi curatio: deinde comprimes, & putre faciente vteris medicamento: neque prius, quam deciderit perfundes: unamque perpetuo relinques: & postea purgabis elleboro. Exercitur deinde, & iudet, & mane multum perficitur. A cursu continetur, & crapula, & ab acribus, excepto origano. Vomam sequenti diebus, aut ter in mense: nam hoc pacto optime corpus habet. Vnum filum bibat, auterum, & aquosum, & paucum. Purulenti digestos scilicet orbiculos in aqua excoque: aquamque ualde feruè factam effunde, aliam quæ infunde, & coque ita, ut turgent percoctum, & molle appareat. Deinde, ubi trueris, & minui frictum misce, sesamamque albam, & recites, quæ trita sint, amygdalas: atque ex melle & ligma succo, dato quæ. Post hæc vinum bibat, papauerisque albi triti leuciscium aqua perfusum, & cum frumentacea farina melle quæ; coctum tepidum quæ sorbeat, Sic quæ diè transigat. Deinde ad ea, quæ contingunt, respiciens, cœnâ dato. Ad Dysenteriam. Fabarum purarum quadrantem accipe, surculos quæ rubræ duodecim immisce, atque abundanter excoque, deinde delingendum porrige. Ad Oculos. Cinerem Græce σφιδον, lotum abundanter quæ maceratum, ut pinguedine non liquidam leuem quæ teres: acerbæ quæ vix acerbæ amaræ quæ succo humectabis, in Sole desiccabis: humectare enim oportet, ut non solutu facilis sit. Cum autem siccus factus fuerit, leui trito & sicco perunge oculos, et angulos consperge.

A. li. 3. f. 17.
C. 4. fol. 353.

Adeosdem. Ebeni drachmam, eris vsti obolos nouem, & croci obolos tres, in cote tere: quæ ubi trueris, vini dulcis cotulam atticam infunde: deinde Soli expone, contege: atque ubi concoctum fuerit, eo vtere. Ad eorum dolores.

Chalcitidis drachmam, vix expresse partes duas, myrrham crocumque tere, mustum permisce, in Sole excoque, et eo dolentes oculos perunge: sit autem in vase id æneo. Quoniam pacto Vulus strangulatio cognoscatur. Digiti duobus comprime: si sentit, ea est: si non, consulsio est. Hydropi potio conueniens. Mecony id est pepley rotundi leuciscium atticum. Catapotia eidem. Lepidos id est squammæ, melle tres latitudine cum farina triticea agglutinetur, terantur quæ, & in catapotia conuoluantur, dentur quæ: deorsum enim aquam purgant, & fecem deiciunt. Aliud.

In caricis singulas, tithymalli guttas septem etiam pueris instilla. Deinde in vase nouo compone cœnâ quæ, & asferua: atque ante cibum exhibe. Aliud. Meconium tere, aquam infunde, & percola, farinam macera, tritum coque, mel coctum infunde, & edendum hydropi exhibe: bibendum quæ vinum dulcis aquosum, vel dilutâ mulsam, porrige. Quod ab excrementis meconium colligis, asserua, & cura.

Liber hic ex his planè ostenditur commentarius esse, variis mistis quæ cõstans theorematibus, & in eo inordinate ab aliis in alia fiat transitus: quomodo & hic in ea, quæ per nares fit, sanguinis profusione, scripta sunt auxilia. Nempe alia parti ipsi, quæ sanguinem profundit, exhibentur: alia reuellunt, ut alui solutio: alia caput addensant, altringunt quæ, ut refrigerantia. Quæ deinceps sunt, omnia medicamentorum scriptiones habent, & quædam commista auxilia. De appellato igitur sesamo sermonem in primis facit. Mox pilorum in palpebris manulem operationem scribit, quam ἀναστροφὴν χισμὸν appellant. Pari modo & hemorrhoidon, alteriusque earum sanationis meminuit. Postea purulentorum tum medicamenta, tum sorbitiones, scripsit. Atque ab his compositio nes eorum, quæ ad oculos deputata sunt, medicamentorum. Præterea de strangulationis vuluæ dignotione egit: mox de meconio: postea de aquæ eductorio medicamẽto, & subinde facis. Et deniũ hydericis ex meconio & itriis exhibet. Sunt autem eorũ, quæ serie continuata dicta sunt, plurima quidem manifesta: alia nequaquam manifesta sunt, de quibus deinceps faciam sermonem.

Galenii

Quæ hoc loco de Flatibus in vetusto libro sunt adiecta, sumpta ad uerbum ferè sunt ex libro 3 de causis symp. ca. 2, cl. 3, pag. 27 f



GALENI DE DIAETA HIPPOCRATIS IN MORBIS ACVTIS

Augustino Gadaldino interprete.

In omnibus quos viderim Græcis codicibus hic liber sub Galeni nomine, & sine principio circumfertur. Galenus certe in libro de propriis libris cap. 4. & 6. quendam huius argumenti librum se fecisse asserit. sed an hic ille ipse sit, dubium est: tum ob doctrinam, quæ Galeni doctrinæ haud ex toto similis videtur: tum ob verba quædam medica ab hoc scriptore usurpata, quæ fortasse nusquam alibi apud Galenum reperiuntur: tum præterea, quod in fine libri pollicetur se in libro de consuetudine de quibusdam tractaturum, quorum tamen nulla sit mentio in eo libro quem de consuetudine habemus. Quisquis tamen est huius libri auctor, is in Hippocratica doctrina est admodum versatus. Magis autem ipsum extollere possemus, si hunc librum integrum haberemus. Nam licet aliquid adiumenti alter huius libri interpretes attulerit, & nos etiam trium græcorum exemplarium ope ac Hippocratis lectione non paucas mendas sustulerimus: principium tamen libri hucusque inueniri non potuit: atque aliqua adhuc superesse fatemur, quæ velut interiecta esse videntur, nullamque cum superioribus & inferioribus connexionem habere: aliqua item, quæ nullo modo, aut vix intelligi queant.

Deest principium.

In paroxysmis quietem ac solamen non motum indicari.

CAP. I.

quietem vero & mitigationem indicat, ac obsequendum potius, quam cogendum, omnibus, quæ mouere possint, præliis amotis. ^a Cum vero irruunt morbi, quiescere oportet & laborantē & medicum à curationibus, ne quid mali fiat. Hoc idem etiam de particularibus paroxysmis, id est exacerbationibus vaticinatus est, inquiēs. ^b Illis qui per circuitus exacerbantur, nihil dandum, neque cogendum, quod est, nullo, quod cogere possit, vitandum. Nihil enim in paroxysmis, quod vel apponere queat, vel violentum sit, assumendum censet. Forte vero & hoc idem innuit, cum inquit. ^c Quæ iudicantur, vel iudicata sunt integre, neque mouenda sunt, neque innouanda, neque pharmaciis, neque aliis iritamentis: sed sinenda. ^d Satis sit paroxysmi malum: ne simul adsit & hoc, & id quod ab arte fit. Verum de indicationibus deinceps considerabimus.

A Libro 3. de morbis. cap. de pleuride ex dorso.

B 1. apho. 19. Ex. ord. 9. f. Et lib. de humo.

C 1. apho. 20. Ex. ord. g. Et libro de humo.

Morbos omnes sua tempora habere.

CAP. 2.

Videamus autem & tales temporum * deinceps differentias. Dicamus quoque morborum alios natura quatuor ipsa tempora acuta habere: alios producta: nonnullos tarditatem cum celeritate compensare, hos in principio, illos in fine, alios, ut fors tulerit. * In Epidemia enim, cum prius posuisset febrium differentias secundum ipsarum figuras, continuarum scilicet, intermittentium, semitertianarum, tertianarum, quartanarum, & reliquarum: postea hæc infert. ^a Sunt autem modi & constitutiones & paroxysmi singularum harum febrium tam continuarum, quam intermittentium. Etenim continua quibusdam incipiens floret ac viget maxime, atque ad grauius perducit: circa crisi vero atque una eum crisi attenuatur. quibusdam vero molliter incipit ac summissim, increfcit autem, & exacerbatur quotidie: circa crisi vero & una cum crisi satis elucet, quibusdam autem blande incipiens increfcit, exacerbaturque: atque cum aliquandiu vigerit, rursus submittit se usque ad crisi & circa crisi. contingit autem hæc fieri in omni febre & omni morbo. Esto, ut hæc Hippocratis verba precipue quidē intelligantur in febribus continuis ob notabilitatē: prædictę tamen temporum motiones non solum in omni febre contingunt, sed etiam in omni morbo. Ita ut nec ab Erasistrato nec ab ullo recentiori discendum nobis sit, ophthalmiam, i. oculorum inflammationē, et otalgiam, i. aurium dolorē periodos seu circuitus habere, sed ab eo, qui medicinā inuenit & perfecit. Contingit enim (ait) hæc fieri in omni febre & omni morbo. Cum autem intulisset omnē etiam morbum quatuor habere tempora, rationē ad usum reduxit, inquiens. ^b Oportet autem diætēmata ex horum consideratione offerre. Sed quia non ex hoc solū diætēmata sumit, iccirco addidit. ^c Multa vero etiam alia opportuna signa his sunt germana, de quibus partim quidem scriptū est, partim vero scribetur: ad quæ ratiocinando examinare atque considerare oportet, cui horum acutus & letalis vel salutaris sit: & cui adhibendum sit vel non: & quando, & quantum, et quid offerendum erit. Et quis breuiori sermone remedium scopos tradidisset, quam hic ipse Hippocrates, qui considerandum esse ait quantum, quid,

D† Videtur in nuere locum libris τὴν παρὰ γγνησιν, id est præceptorum, non longe à principio.

E 1. Epid. sect. 3. 1. 10. cl. 3. 11. a

F 1. Epid. sect. 3. 1. 11. cl. 3. 12. b

G Ibidem.

DE DIÆTA HIPPOCRATIS

& quando. Etenim ordo in hoc & tempus cōsistit. Qui ergo prius nutrit, postea apothērapia uti-
tur, is peccat in quando: nā quod tempus requirit, non offert: quo nō indiget, id assumit. hic ipse
vero, qui tempus transposuit, nec feliciter, ea quæ ad ordinem spectant, coniectatur.

De tempestiuitate & intempestiuitate. Quod terrestria cœlestibus compatiantur. CAP. 3.

Li. de Morb.

Ibidem.

Lib. de Alim.

Li. I. de Morbis

Sed de his quidem alibi. Nunc autem de temporibus docēdo disputabimus, ut ab initio ad fi-
nem vsq; locum hunc omnem absoluamus. primumq; verba ex libro de Morbis afferemus,
in quo cum prius declarasset, necessarium esse, ut sciatur, quid sit tempus (hoc est *καιρός*) & quid
intempestiuitas (hoc est *ἀκαιρία*) postea hæc subne-
cit. Tempora autem (ut semel dicam) multa
& omnimoda sunt in arte, quæadmodum & morbi, & eorum curationes. Sunt autem acutissima
tempora, illis scilicet auxiliari qui vel exanimant, vel mingere, aut egerere nequeunt, vel suffocan-
tur, vel mulierem parientem, aut abortientem liberare: vel quæcunq; sunt eiusmodi. & hæc qui-
dem sunt tempora acuta, nec paulo posterius conferunt. plerique enim obcunt paulo posterius.
Tempus igitur est, si quis homini aliquid horum patienti, anteq̃ anima exierit, in tempore opitu-
letur: qui vero hoc facit, is certe opitulationis tempus scit. Quicquid enim quis in tēpore assump-
serit, id propterea quod eo instanti tempore assumptum est, opem tulit. Cum autem de acutissi-
mis, ac maxime repentinum auxilium requirētib; dixisset: deinceps & de tempore protracto
docet. Alij autem sunt morbi, quibus tempus est, ut semel die curentur, & quando sanē, nihil re-
fert: alij tertio vel quarto quoq; die: alij semel in mense: alij tertio quoq; mense: & an tertio inci-
piente, an finire, nihil refert. Talia sunt tempora, in quibus non aliam habent certitudinem,
quàm hanc. Incepit sanē ab hypostasi quæ in temporis puncto consistit, atq; ita ad horas acces-
sit, & ab horis ad dies, & a diebus ad menses, eosq; per lunæ incrementum vel decrementū nume-
ratos. Quod autem aliquibus fortasse paradoxon esse videtur, id ego magnam vim habere osten-
dam ad morbos destruendos, ac præcipue diurnos, in quibus permissum est artifici, idonea tem-
pora expectare. id autem est, compati contrasmutariq; cœlestibus terrestria. Conspiratio enim
vna & cōfluxio vna, nō solum in nostris corporibus, sed etiam in vniuersis. Si quidē mutationis,
quæ in ambiente est, participes fiunt & plantæ, & animantes, & multo magis in lunæ transfigura-
tionibus. eius enim calor, terræ vicinior est. vnde & carnes quorundam animalium & viscera co-
augentur, & vniuersaliter alia quidem tabescunt: alia vero liquecunt. Coadnotat autem & homi-
num corpora, ac multo magis in morbis. potens enim est sanitatis robur tales morbos occultare.
Morbi autem si per detractionem fiant, decrescēte luna ad deterius adnotationem faciunt: si per
abundantiam & affluentiam, crescente luna præcipue premunt. Scire itaq; debet artifex, non so-
lum in oceano mari recessum & accessum fieri aquarū circa tales lunæ transfigurationes: sed etiā
in nostris corporibus quandam esse reciprocationem, id est *ἀντιπρῶτον*, humorū, in quibus crescen-
te luna, conuenit auxilia quæ replent assumere: decrescēte autem, detractione uti. Cōtraria enim
quæ in toto pugnant, non solum ægotantem superant, sed etiam medicum. ita enim arti coope-
ratur & numen diuinum. Quapropter etiam sermonem prædictis consequētem infert, etiam ad
horarum vsq; circumuersionem, cum inquit. Intempestiuitas autem est huiusmodi. Quæcunq;
quidem materie curari debent, si meridiē curentur, intempestiue curantur. intempestiua autem sunt
hæc, propterea q̃ inclinationem ad peius habent propter curationem nō in tempore adhibitam.
Quæcunq; autem cito, siue meridiē siue vespere siue noctu curentur, intempestiue curantur. Et si
hieme curari debeant, curentur æstate: vel si quod iam curari oporteat, id ipsum differatur: vel si
quod differri oporteat, hoc iam curetur: talia intempestiue curantur. Et hæc quidem obiter ac ve-
luti præter sermonis tradendī propositum dicta sint.

*Duo cum sint tempora ex Hippocrate, alterum totius morbi, alterum cuiusq; paroxysmi: alimenta pro
eorum ratione exhibenda esse. Multaq; de hac re traduntur regulæ. CAP. 4.*

Videtur innue-
re t. 11. sect. 3.
primi Epid.

1. Aph. 7. & 9.
Ext. ord. d. g.

Forte glossē-
ma.
1 aph. 8. ext.
ord 4 f

Volo autem iam opportuniōra scribere. Sunt autē hæc. Duo tempora tradit Hippocrates, al-
terum totius morbi, alterū particulare cuiusq; paroxysmi. Dicit ergo in Epidemiis neces-
se esse, ut totius morbi incrementum et remissionem vīgoris consideremus. & ad vtrāq; tempora
respiciendo, semp auxilia adhibeamus. Et hoc facile in omnibus doceri potest, at in alimēto osten-
detur. Alimentum enim optimum est in diætā auxilium. Id enim solum si ceteris comparetur, om-
nibus equiualeat: omnia etiam in se continet. Huius rei testis est Hippocrates, qui alimenta, diētas
vocaui: totius enim appellatione partem exornauit. Est autem totus hic sermo iunioribus medi-
cis maxime cōtrarius, medicinæ tamen cōsequens. Vult enim Hippocrates ut medicus à primis
diebus sciat, quis morbus cito, & quis tarde vigeat: & ubi hoc prædidicerit, virtutem etiam labo-
rantis consideret: ac tanq̃ in quadam suæ ipsius cogitationis libra, de vtriusq; ponderet: vtrum, si à
principio tenuiter nutriatur laborans, sufficere ad vīgorem vsq; poterit (ita ut post principij tem-
pus vsq; ad vīgorem tenuiter semper cibetur. Quādo enim vīget morbus, tunc tenuissima diē-
ta necesse est vii) an prius ipse deficiet, nec ad vīgorem vsq; perdurare poterit. Nam si futurum est,
ut

Aut aeger ante vigorem dissoluatur: primis certe diebus virtus resumí debet, vt possit postea aeger, dum vigor aderit, tenuiter cibari. Non enim in omnibus dictum est, in principio pinguius cibari oportere: sed in iis, in quibus futurum est, vt virtus circa vigorem dissoluatur. Discamus autem & huius dogmatis rationem: ita enim ipso audacius ad artis opera vtemur. Natura archegonon, i. primogenian, & primam suam ipsius eucrasiam seruans, oportune appetit quae offeruntur, riteque quae assumpta sunt dispensat, & in vniuersum corpus distribuit, appositionesque & detractiones commoderatas facit. Cum autem morbi inciderint, ac *σάσις*, i. seditionem & *ἀνερχίαν*, i. carentiam principatus rebellionem ue effecerint, quantum utique passiones valuerint, tantum etiam natura fatigatur. Ac circa quidem morborum principia, exigua est naturalis status euersio: multum vero est naturae robur. circa vigores autem magna est status praeter naturam vis: multa vero naturae infirmitas. Quare, si futurum est, vt quispiam a principio tenuiter nutritus, circa vigorem solidiora alimenta, virtute prius consumpta, sit postulaturus: hunc in principio roborare consulit, vt cum postea vigor adfuerit, tenuiter cibetur. Etenim rationi consentaneum est, vt in difficillimo morbi tempore, & in quo potissimum pugnare natura creditur, paucus sit cibus, tenuissimeque id, quod offertur, nutriat: ne in distributione vellicet, neque multam faciat additionem, sed, non secus ac irrigationes, so-

Bletur: totumque corpus permeet, labore aut tempore quo dispensetur, minime indigens. Neque enim in particularium quidem paroxysmorum vigore cauendae sunt alimentorum oblationes, in vniuersalium autem morborum vigoribus nutrita sunt danda. Prope posita est (inquis) declinatio. Ego vero haud quaero quid sit quod futurum est, sed quid quod praesens est. Neque enim id quod humanius est vigorem denotat, sed declinationem. Morbi vis adeo cita est, vt minime comprehendi possit. Nonne sepius magnitudinem nescimus, quamuis etiam virtus vigerit? Hac certe plurimum eueniunt. Quod autem non omnes circa principium velit pinguius nutrire, sed quibus futurum est, vt circa vigorem virtus dissoluatur, patet ex iis quae inferuntur: quid enim ait? Neque igitur

2. de Viſt. acu.
32.7^a.120.h

licet praeter tempus, neque vehementissimas vasorum vacationes facere, neque vigentibus morbis et in inflammatione existentibus, cibos offerre. Et rursus. Hoc igitur maximum documentum esse cenſeo, quod primi dies non sint sorbitione tali vel tali priuandi, iis qui paulo post talibus vel talibus sorbitionibus sunt vsuri. Praesumpsisse hoc decebat, propterea quod de acutis sermo est. Et paulo post ostendit, se non in omnibus, sed in aliquibus, talem victum instituere, inquiens. Haec igitur omnia magna testimonia sunt, quod non recte medici ad dictemata aegrotantes ducunt, sed in quibus morbis non oportet vasa vacuari, iis scilicet qui sorbitionibus cibandi sunt, vasa vacuant. & in quibus ex vasorum vacatione ad sorbitiones mutationem facere non oportet, in iis mutationem faciunt. et plerumque absolute. Aliquando autem in his temporibus ex vasorum vacatione ad sorbitiones mutationem faciunt, in quibus sepenumero expedit a sorbitionibus ad vasorum vacationem accedere, si ita morbum exacerbari contigerit. Hoc autem est vigoris tempus in quo ob virtutis dissolutionem coacti, a tenuioribus ad solidiora cibaria accedunt, cum tamen corpora iam ab inflammatione detineantur. Non igitur licet praeter tempus nec vehementissimas vasorum vacationes facere, neque vigentibus morbis & in inflammatione existentibus, cibos offerre. Neque decet, ait, immodicas *ἀνατάσεις*, i. protractiones assumere, neque interpestiue nutrire. In multis autem interpestium maxime est, ad tertium vsque diem ascendere: nocua etiam male est quae alternis diebus fit nutrimenti oblatio. Ad eos enim qui ita cibant, respiciens, omnia haec scribit. In principiis enim magnum peccatum est ipsa diatribe, i. triduana inedia, qua tamen etiam Hippocratis tempore utebantur. Testis est ipse Hippocrates rursus in libro aduersus Cnidias sententias, dicens. Noui autem medicos, qui contrario maxime modo ac oportet, faciunt. volunt enim cuncti, vbi in morborum principis, duobus vel tribus vel pluribus diebus fame arefecerint homines: ita offerre sorbitiones & potiones. Nec increpat, quod aliquos ad praedictum vsque dierum numerum protrahant, sed quod o-

2. de Viſt. acu.
41.7^a.122.d

2. de Viſt. acu.
42.7^a.122.c

1. de Viſt. rōne
ac. 32.7^a.120.h

Dnes. quandoquidem & ipse protrahit ad tres & ad quatuor vsque dies: sed protrahit quos oportet. Inconstantes enim febres, donec constiterint finit, vbi vero constiterint, hoc modo curat. sorbitiones enim & potiones in conuenienti die offert. Consulitque tertium & quartum diem cauendos esse. Quandoquidem hi dies, *παλινοσίαις*, i. recrudescencias, vt ipse ait, potissimum pariunt: ea item tum quae ad phlegmonem & immunditiam incitant, tum quae ad febres tendunt. & magni admodum momenti, perinde ac quoduis aliud, documentum hoc est. cum qua enim ex opportunissimis in medicina rebus non circa vlcerum solum sed etiam circa alios multos morbos non communicat? Nisi quis alios etiam morbos vlcerum esse dixerit. habet enim quandam & haec oratio aequitatem. Videamus ergo id quod sequitur, per quod patrocinator iis, qui in plures dies protrahunt. Et forte aliqua etiam aequitas videtur ipsis esse, vt cum magna mutatio in corpore facta sit, aliqua etiam valde magna mutatio obiciatur. At mutare quidem, non parum bene habet. Recte quidem sanè transferenda est & ipsa mutatio. & ex mutatione, exhibitio gustamentorum adhuc magis. Recte ergo cum mutatio facta est in corpore, protractionem ad tres vsque dies faciendam laudat. sed recte ac artificiose hoc facit, dum genus, & magnitudinem affectionis, & tempus, & regionem,

2. de Viſt. acut.
18.7^a.119.h

4. de Viſt. acut.
54.7^a.114.a

3. de Fract. t. 3;
7^a.246.d

T. 34.

2. de Viſt. acu.
18.7^a.118.h

DE DIÆTA HIPPOCRATIS

& ætatē & anteaetæ diætæ formam considerare contulit, quæ certe mutationis diætæ, firmissimæ & sunt indicationes. Illud certe est obseruandum, ne cum alimentum circa primos dies subtraxeris, quando id & laborans sumere, & virtus conficere poterat, circa vigorem postea, dum virtutem se re dissolutam vides, mutationem aggrediaris, pugnareq; adhuc magis virtutem cogas, quo tempore ne sorbitiones quidem confici ab ægrotante possunt, id illi hoc suadens, nutrimentusq; eum suffocans. Videre enim licet ratione quidem methodicos, opere vero amethodos medicos, vinū & carnes dare, tanquam in vas inanime alimenta infundentes. Ac ei quidem qui recta ratione in principio protrahit, in vigore etiā virtus cōstans perseuerat. ei vero qui indebite protractionibus vsus fuerit, circa principium etiā debilitatur, partim quidem à morbo, partim vero à prauo artifice coacta. Eiusmodi etiā medicos in aliis redarguerat inquit, || Quid enim tandem mali erat, si præmiū ignorantia ferrent ij, qui artis opera male administrant? nunc autem ægrotis qui extra culpam sunt, non sufficiens videbatur ex morbo noxa, nisi etiā medici imperitia accederet. Oportet ergo ita semper circa initia & protractionibus vtī, vt ne quidem cogitandum sit, circa vires morbos esse mitissimos, etiā si post protractiones, & maxime eas quæ plurium dierum sunt, cibis exhibeatur. Didicimus autē, & ex iis quæ int ulit: rationem enim subnexuit. || Ac mutare quidem non parum bene habet: recte quidem sanē transferenda est & ipsa mutatio, & ex mutatione exhibitio gultamentorum adhuc magis. A communi ratione, si recte fiat mutatio, firmiter etiā debet sequi iuuamentum. Malum sanē est in alterutro peccare, peius tamen est in additione. Audiamus & quæ deinceps dicat. || Coniectandum sanē est & robur, & modus morbi in singulis, & naturæ hominis, & consuetudinis, & diætæ laborantis, non solum ciborum, sed etiā potuum, multo autem minus ad additionem eundem est, quando quidem subtractionem omnino auferre sepe numero confert, vbi perduraturus est laborans, donec morbi vigor concoctus sit. Neq; enim virtutem considerare debemus, an phlebotomiam {vel aliud quicquam validum præsidium} omnino ferre queat, sed an his neglectis, perdurare ac portare morbi vigorem possit. Quare mihi ne dicas, & ego virtutem inspicio, neque enim ita inspicis, vt oporteret, quocunque autem modo inspicis, præterquam quod nihil noui dicis, † tua etiā ipsius} vniuersalia theoremata subuertis. Quæ igitur artificialis ratio est: || Coniectandum est, an ægrotans ex diætā vsq; ad morbi vigorem: perdurabit & vtrum ille deficiet, & ex diætā non perdurabit, vel morbus prius deficiet ac obtundetur.

Libro præcepto
rū non longe à
principio.

2. de Viēt. acut.
18.

2. de Viēt. acut.
36, 7^a. 121. c

† σευτε, i.
tui ipsius, forte
tamen αυτε,
i. ipsius scilicet
Hippocratis.

1. apho. 9. Ext.
ord. 4. g

Notæ traduntur ex Hippocrate quibus scire possimus qui morbus cito & qui tarde
vigorem sit habiturus.

CAP. 5.

G

2. Epid. sect. 1,

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

* Al. febres,

1. Aph. 12. ext.
ord. 5. a

Ibidem.

3. Epid. 3. t. 88.
3^a. 151. h

CUm autem ipse sciret, non cuiusvis medici esse, à primo morborum insultu, scire, quinam cito, & quinam tarde vigeant, multas ad hoc notas dedit in omnibus suis libris, præcipue vero in secunda Epidemia, dicens, || Circa principia morborum considerandum, an statim floreat, manifestum autem hoc, fit ex incremento. Nosces, inquit, ipsum vigorem prope, vel procul esse, si probe incrementum consideraueris. Morbi enim qui paulatim crescunt, tardum: qui celeriter, celerem denotant vigorem. || Incrementa autem ex circuitibus, & crises quoque hic manifeste. Per incrementum quidem vigorem agnosces: incrementa, vero per circuitus. Aliud enim est, singulis diebus adnotationem habere: & aliud, vno die vel duobus interiectionis. Nec hoc tantum satis fuit, sed adiecit etiā artificiosiora. || Et ex paroxysmis in circuitibus considerandum est, si citius an non: & si longiori tempore an non: & si magis an non: Vult vt ad præcognoscendum accelerantem vel tardantem vigorem, prædicta obseruemus, id est vtrum festinanter an secus, incrementum adueniat: & vtrum modus propius accedat ad continuitatem, an multum absit à continuitate. Ad hæc etiā paroxysmi in circuitibus an citius an non. hoc est, an anticipent, an postponant. Nam qui anticipant, celeritatem, qui postponunt, tarditatem magis significant. Quoniam H autem potest qui anticipat paroxysmus, prius etiā desinere: ob id addidit, Et longiori tempore, an non. Præterea cum sciret non in longitudine tantum et breuitate paroxysmorum, differetiam esse, verum & in vehementia & imbecillitate, fieriq; posse vt in æquali adnotationis dimensione difficilius vel leuius aliquis exacerbetur: iccirco addidit. Et magis, an nō. Cum videris magnum aduenire incrementum: ac sequentem paroxysmum præcedenti semper & multo longiorem & multo difficiliorem, scias vigorem statim affuturum. || Nam & eorum qui repente moriuntur, celeres sunt ipsæ crises, quoniam & celeres sunt dolores & continui & validi. Ex contrariis autem contrarium. Forte vero & aliarum rerum hoc commune est, vt quæ quidem citius fiunt, breuiiores sint: quæ vero tardius, longiores. Non solum autem in Epidemiis, sed etiā in Aphorismis, rationes docet, per quas præscire poteris vigorem prope vel procul esse. || Paroxysmos autem & constitutiones indicabunt morbi. Nam horum alij natura acuti: alij natura diuturni. Et tempora anni. Quæcunque enim ipsorum adiuuant, morbis aduersantes, celeriter & incrementa et vires faciēt. || Ideoq; necessarium est scire, bonum esse quod in cōstitutione & in morbo commune est.

Et

« **A** Et circuituum inter se incrementa. Hæc quidem sunt communia cum iis quæ in Epidemiis dicta sunt. Adiciet autem & aliam quandam præterea rationem, per quam vigorem scire poteris. « Et ex iis quæ mox apparent, vt in pleuriticis, si sputum statim appareat, incipiente quidem morbo, abbreviat: si vero post appareat, prolongat. « Concoctiones enim celeritatē criseos sanitatisq; securitatem significant. « Et vrina, & deiectiones, & sudores, mox apparentes, morbos ægre & facile iudicandos, breues & longos indicant. Habes, inquit, vbertatē, si nostra legas, nec solum celerem vel tardum vigorem, sed etiam alia multa eorum quæ futura sunt, prænoſces. Hoc tantum prius accipe, ac firmiter crede, optimum esse, vt medicus providentium adhibeat, non ad gloriam tantum, sed et multo magis ad curandi rationem. His prius constitutis, rationem ad artis opera accommodato.

1. Aph. 12. ext. ord. 5. a
Ibidem.
1. Epi. com. 2. t. 45. 3. 1. 12. b
1. Aph. 12. ext. ord. 5.

Regula cibandi pro ratione totius morbi.

CAP. 6.

« **Q** Vibus igitur statim est vigor, ij statim tenuiter sunt cibandi. Neque enim de virtutis dissolutione est timendum, vbi vigor statim affuturus est, sicuti in angina vsu venit: Licet enim, vt totus ad morbum tollendum incumbas, nihil de virtute formidans. « Quibus autem potius est vigor: in illud tempus & paulo ante illud subtrahendus est cibus: antea vero pinguius est cibandus æger, quo durare possit. Hoc in loco de vtriusque simul passione inquam & virtute coniectari oportet. Cibari autem plenius, est paulo solidius nutriri, quam fiat in extreme tenui dieta. « In paroxysmis autem subtrahere oportet. Per hæc verba documentum valde curatiuum ac ad artem maxime spectans tradit, hoc est incumbente grauiori paroxysmo, nihil nutrimenti apponendum esse, siue enim per *επαύλασιν*, quasi dixeris superascensionem, vehementiores fiant paroxysmi, pulchrum sanè est, virtute proiritata, ad detractiones accedere: siue etiam nunc quidem leuiore, rursus autem grauiore fiant adnotationes, ex arte rursus est, ante difficiliorem paroxysmum nō nutriri: sed semper post grauiorem adnotationem. Sed exacerbabo, inquires, morbum, si primis diebus alimentum dederō. atq; ita quem curandum suscepī, ledam. At certe magis iuuabis, virtutem seruando. Omni sanè auxilio noxa aliqua cōiuncta est, quod enim iuuat, id etiam nocet. Si ergo eum in principio nutriuerō, cui futurum est, vt virtus circa vigorem dissoluatur, morbum quidem aliquantisper augebo: at virtutem magnopere corroborabo. « Qui vero opinatur virtutem non refici, sed morbum exacerbari, mortem is proculdubio ægrotanti afferet. « Peccata autem quæ per initia committuntur, non æque, vt hæc, immedicabilia sunt, sed multo facilius corrigi possunt, patet ergo, quod non lubens in primis diebus ad alimentum exhibitionem accedit, sed tanquam in angustia quadam detentus, commodissimum eligit tempus. Quod, si nihil ipse de virtute vereatur, maxime ex arte esse existimat, ad tertiam & ad quartam vsque diem, non nunquam etiam & ad longius tempus protractionibus vti, quando & robur virum adit, & morbi modus cogat, multaq; subsit humorum redundantia: et loco phlebotomiæ vel aliorum vacuantium prælidiorum, longiorem eligimus protractionem. Aliquibus enim in diatrīte, aliquibus ante diatrīten, aliquibus post diatrīten, probe primum exhibitum est alimentum. Et in vniuersum quidem, symmetriam attingere oportet. Si autem hoc fieri nequit, vergendum est magis ad protractionem plurium dierum, quam ad celeriores alimentum appositionem, si virtus nihil prohibeat.

1. Aphor. 10. Ex. ord. 4. h

Ibidem.

1. Aphor. 11. Ex. ord. 5. a

Locus mendis nō vacās. vñ at inuere tex. 40. 2. libri de Viēt. rōne in morb. acu. Sed sanè deterius agit q omnibus vala ante & c.

2. de Viēt. rōne in acu. t. 40. 7¹. 12. c

Animaduersiones de virtutis fortitudine & imbecillitate. Signa imbecillitatis virtutis ob inanitionem, ob morbi acumen, ob iritamentum aliquod, exemplo flammæ lucernæ.

CAP. 7.

Sed quispiam ex iis qui methodum perturbant, inquit. Et ego virtutem animaduerto. Ad quem licet respondere. Et quomodo virtutem inspicis? non enim apparet. nam sepius qui primo aspectu fortis videtur, imbecillus est, dissolutusq; facilis. Nam qui fortis videtur, * non per ea, per quæ virtus, dignoscitur. Accipis ætatem, anni tempus, regionem, & similia. Nonne tibi licet pulsus tangere? At neque si tetigeris cognosces, vtrum in spiritu, vel in humoribus vel in solidis sit virtus. Mentem adhibes naturalibus actionibus, vt scire possis, a quot rebus virtus impediatur. Si autem nunc quidem permittat, posterius autem dissoluetur, præuidere poteris, si naturæ *πράματα*, idest temperamenta consideraeris, præcognoscere item vigores poteris. Si vero noueris alicui quidem firmam esse virtutem, alicui vero facile mutabilem, diiudicabis alterum septentrionalem, alterum meridionalem esse. Quoties autē imbecilla visa est manere virtus, at per detractionem corroborata est. Audi Hippocratem ignaros medicos redarguentem. « Non enim video medicos talium rerum esse peritos, quomodo scilicet dignoscere oporteat imbecillitates in morbis, & quæ ob vasorum vacuationem fiunt, & quæ ob aliud quoddam iritamentum, et quæ ob dolorem & ab acumine morbi: itemq; quot passiones & omnigenas formas natura nostra & habitus singulis pariat. quamuis talia salutem vel mortem inferant cognita vel ignorata. Neque enim paruum periculum est, si ignoretur vtrum virtus per indigentiam dissoluatur, ita vt nutrimentu

2. de Viēt. rōne in acu. 47. 7¹. 12. f

DE DIÆTA HIPPOCRATIS

menti additione indigeat, an ob phlegmones magnitudinem suffocatur, ita vt detractiōe indi- E
geat, an ob aliud quoddam iritamentum, idest ob mutationem & corruptionem eorum quæ assu-
muntur. Sicuti enim lucernæ flamma & ob defectum olei extinguitur, & ob multam confer-
tamq; infusionem: & quando non purum & argillosum est: Eodem modo & calidum quod est
in nobis, natura existens flammæ similis, & indigentia & abundantia & prauitate alimenti cor-
rumpitur. Itemq; quot passiones & omnimodas formas, natura nostra et habitus singulis pa-
riat. Quidam enim natura famelici sunt, quidam stomachum habent qui facile afficitur, & animo
facile delinquant, ac à minimis affectionibus leduntur, et alimenti appositione semper indigent.
Et aliæ sunt priuatim in singulis syncrises. Animaduertendumq; est ne cum in eiusmodi habitus
incidimus, aliquod peccatum committamus. || Maius enim malum est, si ob dolorem & acumen
morbī debilitato, potionem vel sorbitionem copiosiore aut cibum quis obtulerit, existimans
ob vaforum vacuationem imbecillum esse. Indecorum etiam est ob vaforum vacuationem debi-
litarum nō cognoscere, ac diætā eum premere. Affert etenim aliquod periculum & hoc peccatū,
multo tamē minus quā alterum. Ridiculosum autem magis est hoc peccatum quā alterum.
Si enim alius medicus vel etiam idiota ingressus cognouerit ea quæ contigerunt, & edenda po-
tandaq; dederit ea, quæ alter prohibuit, aperte iuuasse existimabitur. Talia artificum instituta ma- F
xime ab hominibus vituperantur. videtur enim ipsis ille qui ingressus est medicus, vel idiota, tan-
quam mortuum suscitasse: scribentur autem & de his signa, quibus singula dignoscere oportet.
De vniuersalibus igitur temporibus & de primā alimenti exhibitione hæc satis sint.

Regulæ cibandi pro ratione particularum paroxysmorum.

CAP. 8.

1. Aph. 18. Ext.
ord. 9. f. lib. de
humo.

1. Aph. 11. Ex.
ord. 5. a

7. Aph. 62. Ex.
ord. 59. g

1. Aphor. 11.
Ext. ord. 5. a
Lib. de Alim.

Li. 3. de Morb.
ca. de pleur. ex
dorso.

1. de Vi&ct. rōne
in acu. 46. 7.
115. f

4. de Vi&ct. rōne
in acu. 39. 7.
139 f

Videamus iam & de particularibus. || Is qui in circuitibus exacerbatur, nihil dare oportet,
neque cogere, sed detrahare de additionibus ante criseis. Item. || In paroxysmis subtrahere
oportet, addere enim, noxa. Et, quæcunque per circuitus exacerbantur, in paroxysmis subtrahe-
re oportet. In morbis sane qui per circuitum vexant, siue continui sint, nullasq; habeant intermis-
siones, siue ex quibusdam interuallis exacerbentur ac reiuuenescant, obseruandum est ne in paro-
xysmis esculenta aut poculenta aut diaclysmata demus: quandoquidem quicquid tunc offertur,
morbī non corporis fiet alimentum. || Si quis enim alimentum febricitanti dederit, vt sano robur,
ita laborati morbus. Neque cogere, hoc est, nulla re cogente vti. solamine enim potius est opus,
quā vi in paroxysmis, expectandumq; est remissionis tempus, & in eo vehementia cogentiaq;
remedia assumenda sunt: vbi vero paroxysmi inciderint, lenientia. Quemadmodum enim feræ G
etiam valde agrestes, si quis eas placide adeat, blandeq; demulceat, mansuetę redduntur: si vero ex
aduerso ipsis irascatur viq; adoriatur, agrestiores efficiuntur: Ita & morbi quodam modo agre-
stiores effecti, si quis eos in paroxysmis soletur & mitiget, leuiiores ac mansueti euadunt: si vero
ex aduerso se opponat vimq; inferat, excitantur ac exacerbantur. Propter has & alias id genus cau-
sas nec rebus cogentibus, nec alimentis vult vti in paroxysmis. partim quidem ob additionem,
partim vero ob turbationem quæ in dispensatione fit. || Et quæcunque per circuitus exacerbantur,
in paroxysmis subtrahere oportet, addere enim noxa. || Non solum autē dum adsunt paroxysmi,
nulla re quę mouere aut addere possit, vtendum esse censet: verū neq; dum mox futuri sunt: sed
dum deorsum inclināt morbus. Hocq; sapiēter admodum in libro de morbis demonstrat, cū ait.
|| Cum autē irruunt morbi, quiescere oportet & laborātem & medicū à curationibus, ne quid ma-
li fiat. Omnium autem clarius ac magnificentius in libro aduersus Cnidias sententias, cū inquit.
|| Tempus autem exhibendæ sorbitionis hoc maxime obseruare per initia & per omnem mor-
bi decursum oportet. Quando sanē pedes frigidi fuerint, inhibere oportet sorbitionis exhibi-
tionem. Maxime vero & à potu abstinendum est. Quando autē caliditas ad pedes descenderit,
tunc exhibendum est. & putandum magnopere valere hoc tempus in omnibus morbis, non mi- H
nime vero in acutis. maxime vero in magis febrilibus, & periculosis morbis. Forte quis di-
ctionis græcanicæ ignarus, dicat, Hippocratem in vigore alimenta offerre: cum enim caliditas in
pedes descenderit, tunc febrem vigere, corpore vniuerso æque ac similiter calefacto. Verum qui
hæc in veteres dicere audet, stoliditatem summamq; inscitiam præfere. nec quid sit τὸ καταβαί-
νειν, idest descendere, intelligit. Discant ergo qui hæc aduersus Hippocratem effutiunt, eum non
in vigore sed in remissione febris alimentum dare. Quid enim ait? Quando caliditas in pedes de-
scenderit, tunc exhibendum est. omne autem quod iam descendit, superiores partes reliquit, &
infernās adiit. caliditate non extensa, sed ad infernas regiones transposita. Et hoc adeo clare ipse
edocet, vt & à stolidis etiam intelligi queat. dicit autē in hunc modum. || Cum vero pedes sunt fri-
gidi, neque potum neque sorbitionem, neque aliud quicquam tale dato. sed maximum hoc esse
existimato, si obserues, quousque valde calidi fiant. deinde ita id quod confert, exhibe. Vt pluri-
mum enim signum est futuræ exacerbationis febris, ipsa pedum frigiditas. Si vero in tali tempo-
re exhibueris, maxime per omnia peccaueris, morbum enim nō parum augebis. Cum autem fe-
bris

« Abris definit, è contrario pedes calidiores fiunt reliquo corpore. Augetur etenim, frigefaciens pe-
 « des, accensa ex thorace, in caput flammam emittens. Vbi vero calor totus sursum concurrerit, &
 « exhalauerit in caput, merito pedes ipsi frigidi fiunt, cū excarnes neruoliq; natura sint: præterea,
 « cum multum à locis calidissimis distent, frigefiunt, calore sese in thoracem colligente. Et rursus
 « ex proportionem, cum febris soluitur, & in minutas partes redigitur, in pedes descendit. Hoc ergo
 « tempore caput & thorax ipsorū perfrigerata sunt. Non est ergo in toto corpore caliditas, neq;
 « extensa est: sed licuti, dum vigeat paroxysmus, partes circa thoracem caputq; affatim incende-
 « bantur: ita & nunc, vbi adest remissio, caliditas nobiliores quidem partes reliquit, circa pedes au-
 « tem extremos versatur. hocq; naturaliter fit. Rationi enim maxime cōsentaneum est, vt hos, qui-
 « valde prius refrigerati erant, calor etiam ingens deprehendat, natura nimirum tribuente ipsis mu-
 « tuam contrariorum successionem. Vnde cum quis per frigidas regiones iter fecerit, vbi in aestuo-
 « sam peruenerit, ignitos obtinet pedes. quandoquidem cum magis ij friguerint, magis etiam
 « ac vehementius iure incallescunt. Quapropter & in difficillimis febribus, quando inualio cum
 « pedum perfrigeratione fit, in remissione pedes vehementer calefieri contingit. Quare cum lo-
 « cum absolueret Hippocrates, inquit. ¶ Hac de causa offerendum est. nam vbi pedes frigidi sint, ne
 « B cesse est inferiorem ventrem calidum esse, multoq; fastidio plenum, & hypochondrium exten-
 « sum, & proiectionem corporis ob internam turbationem, & mentis suspensionem, & dolores,
 « & vellicatur æger, ac vomere affectat. liq; praua vomat, dolore afficitur. Vbi autē caliditas in pe-
 « des descenderit, vrina que pertransierit, etsi non sudauerit, omnia cessant. In hoc igitur tempore
 « oportet sorbitionem dare: tunc autem pernities. * Et præcipue nocumentum, quod ex intem-
 « pestiuitate in morbis acutis euenit: mortem esse inquit sub paroxysmum nutrire. Aperte igitur
 « & hæc imperat. Oportuerat igitur satis iam hæc te edocum fuisse. si quid tamen discere cu-
 « pis, Audi & hæc aperte præcipientem Hippocratem. ¶ Cum autem medicamentum dederis, sor-
 « bitionibus vttere, ac obserua paroxysmos febrium, vt nunquam cum adsunt, neque cum futuri
 « sunt, offeras: sed vbi desinunt, aut desierunt, & quā longissime à principio. Alimenta danda
 « sunt, non expectata exquisita febris declinatione, vbi nimirum laborans fame intolerabili premi-
 « tur, vel à longis ciborum protractionibus male admodum affectus est, vel aliqua pars à stomacho
 « obriguit, & valde exoluta est. Tunc sanē in remissionibus febrium, corpore adhuc calido existen-
 « te, alimentum apponimus: potissimum que cum remissionis interstitium angustum fuerit. Qui
 « enim paulo ante quā terminauerit, cibum offert: is longius à futura adnotatione cibū exhibet.
 « C Quod autem perfecte iam cessata adnotatione cibis offerri debeat, clare ipse ostendit, inquit.
 « Et quā longissime à principio. Vt enim adnotatio alimentum non dispensatione priuatum
 « sed probe concoctū ac iam corpori familiare redditū suscipiat, cessata nuper adnotatione alimen-
 « tum præbet. quod tempus plurimum à futuro paroxysmo abest. Adhuc vero & in libro aduer-
 « sus Cnidias sententias ea adiungit, quæ & iis quæ dicta sunt & artis etiam operibus consentiunt.
 « ¶ Dieteticæ partis maximū est obseruare ac cauere, sicuti in acutis ita in longis ægritudinibus, &
 « intentiones febrium & remissiones. ita vt tempora obseruare scias, quando cibaria offerre non
 « oporteat, & quando tuto offerre oporteat. ea autem sunt, cum longissime ab intentione distant.
 « Et hæc rursus fatebitur, qui in artis operibus fuerit exercitatus.

Ibidem.

4. de Vi& rōne
in acu. 39. 7^a.
139.c

4. de Vi& rōne
in acu. 114. 7^a.
249.d

Quomodo in morbis diuturnis sint obseruanda tempora.

CAP. 9.

Maximum enim est in morbis diuturnis obseruare tempora. quandoquidem in iis obscuri
 « ac latentes sunt paroxysmi, & per symbola deprehenduntur, ex vigilia, grauitate, motus
 « difficultate, insomniorum turbulentia, decoloratione, inappetentia, & similibus. In acutis enim,
 « D quos potissimum febres continuæ comitari solent, magna sunt inter paroxysmos & remissio-
 « nes discrimina. ita vt & ab idiotis etiam sepenumero dignoscantur. in diuturnis autem tenues
 « quidem sunt febres, vixq; deprehenduntur: occultiq; sunt paroxysmi, ac præcipue vbi plurimum
 « traxerint, vt & ipsos etiam ægros multoties lateant. Vnde vel exquisitum omnino signū illud
 « erit, si aliquantulum differentie ipsorum dignosci possint.

In febribus synochis matutino tempore esse cibandum.

CAP. 10.

In febribus autem quæ non cedunt (quas synochos vocamus) consentaneum est mane ali-
 « mentum dare. Sapius enim tum alibi, tum in Epidemiis, diem anno comparauit, ita vt tem-
 « pus matutinum veri assimulatum sit: meridiēs, æstati: pomeridianum tempus, autumnō: no-
 « cturnum, hiemi. Vnde pomeridianum tempus quod autumnō assimilatum esse tradidimus, si
 « matutino, quod veri simile esse diximus, comparetur, exitialissimum erit: sicuti matutinum, salu-
 « berrimum.

2. Epid. sect. 1.

DE DIÆTA HIPP. IN MORBIS ACVTIS

2. Apho. sect. 1. »
 berimum. ita sanè crepusculum vespertinum conturbans & exacerbans est: matutinum tempus, E
 benignum ac relaxans. || Tanquam annus circuitum habeat morborū. quale est dies morbi, qua- »
 le est vespertinum tempus ad exacerbationem, tale est morbi & vniuscuiusque constitutionis in- »
 ter se inuicem. Quare vbi nullum sit vestigium remissionis, tempus eucraliæ aeris assimilatum »
 eligito. id autem est, quod circa crepusculum matutinum est. idq; accommodatissimum esse po-
 terit tum ad alia remedia, tum ad cibū offerendum. Hæc quidē satis sint ad suadendum id quod
 à nobis propositum est. Portionem enim selegi ex infinitis ferè quæ apud Hippocratē leguntur. ∴
 Ex arte tamen erit, vt ex iis quæ adhuc citari possent, aliqua quidem in librum de Consuetudine *
 à nobis conscribendum, aliqua vero in librum de Qualitate & Quantitate, reponamus. illic ergo
 quàm plurima ponentur ex Hippocrate, quæ in præsentī libro silentio præteriuimus, largaq; etiā
 copia in vnoquoque theoremate tradetur.

*Vt oculi se habent ad Solem, ita imperitorum hominum animas ad scripturam
 Hippocratis se habere.*

CAP. II.

TEmere ergo aduersantur illi, qui ad Hippocratis scripta imparati prius accedunt, quàm pri- F
 mas literas didicerint. Suam enim ipsorum ignorantiam incusare cum debuissent, obscuri-
 tatem Hippocratis reprehendunt. quippe qui ob propriā imbecillitatem non possint magnitu-
 dinem Hippocraticæ virtutis assequi. Ita enim opinor affectæ sunt ad Hippocratis scripturas insi-
 pientum abiectorumq; hominum animæ, vt oculi ad Solem dum in ipsum intuetur: vt enim illi
 de propriā imbecillitate redarguuntur à Solis pulchritudine conuincunturq;, quippe qui haud
 possint perseveranter citra laborem in ipsum intueri, sed tandem cæcutientes ad tenebrosa se ver-
 tunt: ita animæ profanorū hominum, quæ prius in encyclopædiis non fuerint educate, à pul-
 chritudine scripturarum Hippocratis fulgore circumcirca perculsæ, & dogmatum lu-
 mine uallatæ, quodam modo cæcæ fiunt, & ab iis quæ maiora sunt quàm vt ipse
 ferre possint auersæ, ad parua quædam ac obscura suæq; ipsarum ignora-
 tioniaccommodata accedunt. Nos autem non illorum causa, sed vt
 illis qui probe instituti sunt gratificemur, tum hæc conscri-
 psimus: tum omnia, quibus res medicæ ex Hip-
 pocratis sententia absolutissimæ fiant,
 digna vt rursus scribantur
 censebimus.

Finis sermonis Galeni de Diætâ Hippocratis, in morbis acutis.



GALENI DE REMEDIIS PARATV
FACILIBVS LIBELLVS AB HVBERTO
BARLANDO PHILIATRIO
LATINO SERMONI TRADITVS

Nunc denuo, accuratissime castigatus, & ab omni labe purgatus.

PROOEMIUM



ARtem medicam, nullis vnquā ciuitatibus, nullis locis publicis opulen-
tis, ve hominibus, aut nobilibus, aut principibus, aut potentibus, circū
scriptam: sed quæ potius, præ ingenti erga genus humanū beneuolen-
tia, suaq; maxima utilitate, ad omnes tandē homines pertinet: quæq;
saltem potestate, quamuis actione, ob negligentiam eorum qui illi ope-
ram nauant, nunc videatur deficere, ad rura ipsa ac etiam solitudines fi-
nes suos prorogauit: æquum esse duxi vt pro mea virili, ad eorum mi-
nisterium, qui iter facerēt, & eorum etiam maxime qui ruri ac in solitu-
dine versantur traducerem, vbi in corporibus facilis quidem, & præter
omnem expectationem est morborum tum prouentus, tum vis: nec ta-
men postea ita facilis est remediorum copia. Nam neq; quocunq; loco in promptu medicamenta
preciosa esse possunt, neq; præterea medici præsentis sunt, qui eis vti nouerint: cum tamen tales
plerunq; adsint circumstantiæ, vt nullam dilationis occasionem præstent: vt in angina, veneno-
sisq; medicamentis, atq; morsibus animantium virus eiulantium, nec non in sanguinis profluuijs,
cholerisq; ac id genus alijs solet euenire. Vnde neq; scientificas, atq; exquisitā curandi rationem
omnibus suis præceptis absolutam, hoc in loco explicare institui: sed eam qua possit quis, vel etiā
vulgaris, periclitantibus casu quopiam, aut alioqui male affectis hominibus illico opem ferre, illis
sanē remedijs vsus, quæ in tanta rerū difficultate, sint paratu faciliora: id enim reor iure esse suppo-
nendū, qd ratio materiæ quæ exquisita, & oino ex arte est, atq; etiā remediorū vsus, qui ex scientiæ
ratione sit, eo maxime tpe necessaria sunt, quo & medicamentorū, atq; etiam medicorū copia no-
bis suppetit. At vbi occasio præceps est, nec in promptu copiosa ac larga sit remediorum affluētia,
summopere necessaria eo tpe facultatem medicamentorū, quæ paratu facillima sint, illis esse arbi-
tror, qui quauis corporis particula male afficiuntur. Describam igitur remediorū facile parandorū
D materiam: qñq; tñ, quāuis id raro, aliquā etiā exquisitiorū medicamentorum, quæ ppter ea qd in vsu
multis sint, facile haberi possunt, mentionem faciā: sumam q; à capite exordiū. Ipsum etenim tanq̃
arx totius corporis est, & veluti habitaculū sensuum, qui in summo sunt honore, atq; hoibus maxi-
mopere necessarij. & pinde, ab illis remedijs quæ illi ex vsu sunt, initiū faciā: in primis, psequens q̃
facile haberi possint, quæq; maxime aperta sint. Caput multifariā affici potest: nam ex æstu, ex fri-
gore, ex vaporibus qui à vētriculo tolluntur atq; id replent, ex externis etiā quæ grauitatē illi affe-
runt, quæq; foetida sunt, & ex alijs multis. Præterea vero sæpe turpitudine quadam fm cutem & ca-
pillis tenetur, vt sunt alopecie & ophiales, variæq; vlcerū differentiæ. Æstus itaq; ac frigoris, vapo-
rumq; præterea qui ex externis rebus excitantur, ligna quæ satis esse possunt, sunt illæ ipsæ causæ
manifestæ, procatarcticas græci appellant. Iam vero illos qui ex æstu laborant, hæc consequuntur,
dolor cum pulsu, vt vniuersum caput sideratione teneri videatur (græci sphacelum vocant) cum
sensu ignei caloris, vasorum circa frontem distentio, oculorum rubor, plerunq; etiam vigilia. Eos
vero qui ex frigore, grauedo cum stupore: congelatio vasorum secundum frontem concisio: qd si
frigori iungatur humiditas, sopor. At eos qui ex vaporibus, dolor pungens, pulsus arteriarum
quæ circa frontem sunt vertigines, oculorum hallucinationes, aurium sonitus: quæ eadem etiam
his, quibus ex interna causa caput vaporibus repletur, euenire solent.

Septima Classis.

uuuuuuu

D: Capitis

DE REMEDIIS

De Capitis Doloze, & Primo de dolore ex Solis æstu.

CAP. I. E

Capitis ex Solis æstu dolori medetur fots ex oleo immaturo, frigido: q̄ si vehementior fiat dolor, ex rosaceo & aceto. At si ad manū non fuerit rosaceū, oleo acerbo siue immaturo vtendum. Porro olei partibus quatuor, aceti vnam commisceto, si mediocriter refrigerare cupias, alioqui plus aceti foret adiiciendum. Feruente autem estuante q̄ vehementius capite, commiscendus aceto succus, aut polygonij, id est sanguinariæ, aut plantaginis, aut portulacæ, aut lactuce, aut vuæ acerbæ, aut denique alius quiuus, similis cum dictis facultatis. At ex succis hisce, magis ne an minus temperatura frigidus conueniat, satis super q̄ docebit affectus ipsius magnitudo siue vehementia. Consultius ad hæc fuerit, decumbere agrotum in domo quapiam frigidiori, si non natura saltem arte, vtpote strata folijs & vitis, & rubi, & pomi: & alijs horum similibus, quibus fuerit pro tempore refrigerandi facultas. Dicto porro affectui perquam similes sunt, qui è quauis intemperie ortum habent, & non à causa externa. Verum vt ab intemperatura, tum calidiori & sicciori, tum frigidiori & sicciori, graues oboriuntur dolores, ita nulli ab humidiori. Cæterum curantur ab intemperie orti capitis dolores modo eodem, quo à causa oborti externa, suo nimirum contrario.

De Capitis Doloze ex Frigore.

F

Capitis ex frigore dolori medentur fots natura calidi. Qui si ex mediocri habuerit ortum, satis fuerit vti oleo aut anethino, aut rutaceo, calido: si autem intendatur ex vehementiori videlicet frigore, cucumeris agrestis radix prodest, cui modicum euphorbij interdum addito. Vel oleo irino, aliove id genus tenuis substantiæ vtitur, aliqua ijs commiscendo. Porro admiscebitur horum quantitas modo maior, modo minor, pro ratione vincentis frigoris considerando ac metiendo.

Ad Capitis Dolorem ex Vaporibus.

Quibus caput ex vaporibus dolet, his subducenda alius est: prospiciendum q̄ de domo vndique perspirabili, aeris q̄ clari ac puri: cienda sternutamenta, præsertim si febre vacent, attractio per nares trito aut struthio aut pipere: vacuatis enim ratione hac vaporibus, facile discutietur dolor. Fouendum præter hæc oleo caput est, cui adiectum sit aceti non nihil: sic enim reprimetur immodica ad caput vaporum sublatio, quodq̄ nunc cerebri ventriculis insedit, discutietur. Non sinatur autem talis dormire, & potissimum interdiu.

De Doloze Capitis ex Ventriculi cruditate.

Quibus caput per consensum dolet ex cibi in ventriculo cruditate, aqua tepida liberalius est in potu exhibenda, dein vt vomant iubendum. Multis eorum sanè, qui stomacho laborant, cum è lecto surrexerint, caput dolere consuevit: ijs statim assumpto cibo dolor leuari solet. Quod si quando præ nimio capitis dolore, repente aliqui obmutescant, id q̄ causa non satis cognita, horum caput aqua tepida liberalius infusa foueri conuenit, auribus q̄ oleum infundi, & lanam inseri.

Ad Capitis Dolorem ex Vini potu.

Quod vinum natura calidius capitis faciat dolorem, opplens ipsum facile vaporibus, interdum autem et succis: quod etiam citra vini potum vapores id genus petant facile non nunquam ipsum caput, dolorem inducentes, præsertim ijs, quibus cerebrum contingit temperaturæ calidioris: omnibus manifestum existimo. Proinde curationis intentio in his est, vaporū vacuatio ac discussio: qui quoniam natura calidi sunt, caput ipsum distendentes, egent refrigerantibus: hinc illinendū capiti rosaceum actu admodum frigidum. Conueniunt etiam talibus somnus ac quies, & sub vesperam balneum, cibis boni succi, cui tamen calefaciendi natura nō sit, cuius generis sunt ptissane succus, oua sorbilia non addito garo, panis aqua maceratus, lactuca, vt quæ refrigeret, & brassica, vt cui sit vapores desiccandi natura: vtendum ad hæc aquæ potu. Cæterum ijs, quorum os ventriculi aquæ potu subuertitur, dabimus aut malum punicum, aut coctum seu pomum seu pirum, quæ coquenda sunt ratione hac. Infusa in ollam aqua feruida, suspensis q̄ in ipsa olla fructibus eiusmodi autumnalibus, tantisper sub hac ignem succendemus, donec fructus illi percoquantur, solo ab aqua illa feruente sublato vapore. Quin etiam vuæ passæ corroborandi ventriculi habent facultatem: At palmulis in totum abstinentium, vtpote natura sua inducentibus capitis dolorem. Quod si post hæc, sic affecti nondum probe dormiant, in crastinum ducendi rursus in balneū sunt, aquaq̄ calida frequenter perfundendi: deinde interiecto aliquantulo tempore denuo lauandi, ac tandem cibandi, eodem, quo nobis paulo ante dictum est, modo. Cæterum si quando post omnia hæc, relinquatur adhuc pristini non nihil seu vaporis seu succi, exilioribus capitis meatibus impacti: atque ita perduret adhuc veteris doloris vestigium: rosaceo abstinentes, fovebimus ipsum caput chamamelino moderate calido, deinde irino, quod maxime quadrat id genus affectibus. Cæterum omnibus his vino est abstinentium.

*Al. modica

De Doloze Capitis ex Ictu, & Casu ab alto.

Quandoquidem ex icu & casu ab alto, obueniunt capitis dolores, existimaui non inutile, saltem paucis, de his etiam agere. Admouendus igitur his per spongiam aut lanam molliorem, vapor aquæ calidæ: iniungenda post hæc quies, cibi subtractio, inferioris ventris vacuatio. Fugienda autem sunt, Sol, balneum, vini potus, clamor atq̄ vociferatio, omnes præterea cibi acres, acidi, ac salsi.

A ac falsi. Cæterum illud cuius manifestum existimo, variandas inueniendorum auxiliorum intentiones pro causarum affectus inducentium varietate ac natura.

Ad Capitis Dolorem ex Contusione siue Collisione.

Vsu venit non raro, ut ipsum caput cõtundatur, interim sine vulnere, interim cum vulnere, ita vt ob hoc complicantur curationis intentiones. Porro contulioni propria sunt remedia, Græcis *παρηγορητικά*, Latinis vero mitigatoria dicta: cuius generis sunt, aquæ calidæ super caput effusio, & fœtus capitis hapso lanæ ex oleo. Quod si qua adlit capitis fractura, quæ occasione hac conglutinari prohibeatur, huic deterfæ prius spongia ex vino sideriunt herbam tritam alligabis. *Aliud.* Resinam frictam cataplasmatism modo impositam vulnere alligato. *Aliud.* Aloen tritam ac melli mistâ imposito. *Aliud.* Vlmi virentia folia concisa, deinde contrita, applicato: quin vlmi etiam cortex pro vinculo vulnere circumuolutus idem præstat.

De Capitis Dolore ex Ebrietate ac Solis æstu.

Quandoquidem Archigenes scripsit cõferentia capitis dolori remedia dicta Græcis *πείραγμα*, { Latinis vero amuleta, sic appellata, quod de collo suspenduntur, aut alicui corporis parti alligantur } haud existimaui absurdum, adscribere paulo ante dictis & hæc. *Capitis arcentia Dolorem, B tam ex Ebrietate, quam Solis æstu.* Polygoni, id est sanguinalis herbæ, duos connectens ramulos, capiti coronæ in modum imposito. { *Aliud.* } Polygonio læuigato ex lacris crema caput sub vesperam inungito, ac superposito leporis pellem, sicq; in crastinum finito: tum enim hanc detrahens, comperies finitum dolorem. } *Aliud.* Cichorion, quod Romani Intybum dicunt, applicato dolenti capiti. *Aliud.* Sertum rosaceum, ex recentibus rosarum floribus confarcinatum, inducito dolenti capiti. *Aliud.* Cinge caput ferto ex callitricho, quam alij adianton, alij, trichomanes vocant. *Aliud.* Scripsit Archigenes summopere cõferre capitis dolori verbenacam, quam quidam sacra herbam vocant, tam ferti modo impositam, quam ex aceto & rosaceo inunctam. Testudinis lacustris, quam Amyda quidam appellant, sanguinem instillato capitis incipiti.

Ad Capillorum Desinium.

CAP. 2.

Ladanon conspersum vino odorato abstringenti q; contere, adfundens & myrteû, vt sordium consequantur crassitiem, capiti q; inunge. *Aliud.* Nuces virides, sed iam submature scentes, confactæ numero centum, olei sextaria duo, aluminis liquidi libræ tres, conijciuntur in nouum vas testaceum præfaturatum aqua, ne combibat concreditum sibi humorem: quod postea accuratissime oblitum reponitur in domum liberi patens q; aeris, diebus quadraginta: demum aufertur, atque in vsu conservatur sic præparatum oleum. *Aliud.* Ladanon^a † ablinthium, & iuniperi bacca: ^b † conteruntur, linteo q; illigata conijciuntur in oleû, maceranturq; diebus quinque: quod postea fuerit vsui. Idem possunt nigra myrti, ^c aut gallæ partes duæ, ex oleo: quin hoc ipsum medetur etiam capitis furfuribus. *Aliud.* Ladanon, detritum ex^d † vino dulci quoad sordium habeat spissitudinem, infricatur. *Aliud.* Anemones florem læuigatum ex oleo, illine. Idem hoc reddit etiam capillitium nigrum. *Aliud.* Verbenacam rectam, vnâ cum radicibus desiccata, deinde exacte admodum læuigatam, cum tantillo misceto oleo, quantulo opus sit, vt luti consequatur crassitiem, finito q; deinde ad tempus simul putrefieri, demum vitor.

Ad Capitis Furfures, quam Πιτυρίατι dicunt Græci.

CAP. 3.

Præfricatû caput illinitur betæ succo, fœnogræci farina, & nitro, oibus æqua portione contritis.

Ad Capitis Pediculos.

CAP. 4.

Herbæ pedicularis partes duæ, sandarachæ † pars vna, ex aceto ac oleo capiti infricantur. *Aliud.* † & nitri, ana Alumine scissili ex oleo vitor.

De manantibus Capitis Vlceribus, quas ἀχῶρες dicunt Græci, & Fauis.

CAP. 5.

Αχῶρες, id est manantia vlcera, cutis capitis vitium sunt, ab ipso sic dictæ affectu, quod cutem tenuissimis foraminibus perforant, ex quibus glutinosa effluit sanies. Huic vitio affine est, quem *χῆλις* dicunt Græci, (nos faurum) in quo foramina sunt, quàm in illis maiora, melleum cõtinentia humorem. Est autem vtrique vitio initium ex humore superfluo. Porro incipiunt cum pruritu, demum extubescunt. Curatio est, si quidem graue ac magnum fuerit vitium, corporis totius vacuatio, catapotij ex scammonia, aloe, & colocynthide: hæc enim æquali pondere contrita excipiuntur brasicæ succo, ac conformantur in catapotia erui magnitudine. Quorum maxima vice vnica offerenda quantitas, sunt catapotia decem & septem numero: cæteræ autem variant pro viribus eorum, quibus sumuntur. Sin mitius ac minus fuerit vitium hoc, satis fuerit topica, id est localia, tantum dicta remedia applicuisse, è quorum albo est cimolia ex acerrimo aceto illita.

Aliud. Cræta ex acerrimo aceto similiter inungitur. Idem possunt samia terra, & pompholyx.

Aliud. Illinitur similiter lithargyrus cum charta vsa ex aceto. At achores ac faui, quibus adiuncta est vlceratio dolorosa, præfouendi diebus lingulis sunt aqua calida, in qua decocta sit aut myrtus, aut rubus, aut morus, aut asparagi radix, demum inungendi. *Aliud.* Salicis folijs ex aqua, aut lente ex melle, aut decocta asparagi radice, delinea caput, aut betæ succo cum fœnogræci farina. Apposita præter hæc remedia his, sunt pini cortex cum cera, vel cadmia ex oleo, aut lithargyrus, aut cerussa. Proderit etiam abstergere in balneo cimolia ex betæ succo. Cæterum il-

Septima Classis.

uuuuuu ij lud

A † æquis portionibus.

B † decem

C † adiati partes æquales.

D † oleo, &

DE REMEDIIS

Iud neminem latere velim, in mollis carnis corporibus, vt mulieribus, remedia hæc non ex aceto, E sed vino illinenda.

De Alopecia, & Ophiasi, id est Arcis.

CAP. 6.

Geminum^a accidit pilis capitis vitium, alterum defectu, alterum mutatione ipsorum in colore contrarium siue diuersum: defectu, vt in caluitie: mutatione coloris, vt in alopecia & ophiasi, id est arcis, vitijs pilorum cum primis indecoris. Euenit autem pilis hoc vitiij genus, eadem ferè qua stirpibus ratione, quæ corrumpuntur intereunt q̃, interim penuria nutrientis ipsas succi, interim immutatione huius in alienum ac cōtrarium. Porro tam alopecia quàm ophiasis, vt sunt ex equo affectus præter naturam, ita similiter eadem habent tum ortus tum curationis rationem, ob solam tantum figuram ac formam, diuersas sortitæ appellationes: siquidem in ophiasi persimilis serpenti species in capite apparet: at alopeciam ferunt dictam, quod ἀλώπηξ id est vulpes, vitio eo frequenter laboret: quod aliud est nihil, quàm pilorum denudatio, qua locus affectus apparet colore prorsus exangui. At nos cur hoc aut illo modo appellatum quidpiam sit, curiosius non inquirimus, pro comperto habentes, id q̃ physica siue naturali quadam ratiocinatione adducti, horum omnium causam esse, vitiosos succos. Proinde tempus iam est, vt ad ipsorum transgrediamur curationem, quæ & ipsa varia est, pro nimirum affectus, seu vitiij diuersitate quæ tibi cutis color monstrabit: qui in alijs confestim albidior est, in alijs pallidior, in alijs vero nigrior. Esse porro omnia hæc vitiosi succi germina, neminem fugit. In quibus igitur cutis in capite color apparet albidior, a corrupta pituita vitium esse indicat: quod curatur medicamentis pituitam educentibus, nec non apophlegmatismis, hoc est medicamentis quibus per os pituita purgatur. In quibus autem color apparet pallidior, vtendum medicamentis quæ bilem pallidam vacuant: sicuti ijs quæ nigram, vbi color apparuerit nigrior. Necessum enim totum prius corpus purgari, quàm loco affectio topica, id est localia, dicta remedia applicentur, ne his irritato affectu, plus etiam adfluat ad membrum læsum vitiosi succi: cuius rei cum præpurgato toto corpore nullum sit periculum, tum demum localibus remedijs vtendum. Sunt porro ἀποφλεγματικά id est, pituitam per os educentia medicamenta, pyrethron, & vua taminia, quorum alterum per se, aut etiam vtrunque simul, cum mastiche masticatur: & sal glebosus cum pulegio: aut sinapi contritum, ex oxymelite, & diutius ore contentum ac gargarissatum. Cæterum purgantium medicamentorum quodque peculiarem sibi humorem trahit, educit q̃: aliud quidem pituitam, aliud vero bilem, hoc flauam, illud nigram. Sed longum nimis esset quodque horum singulatim recensere, nec adeo ad rem, cum alterius sit instituti. G At in communi quidem, alopecie & ophiasi hæc ferè conueniunt. Initio catapotia siue pilulæ eg, quæ constant ex medullæ colocynthidos parte vna, aloes ac scammonia partibus duabus, succi ab sinthij parte vna: excipiuntur autem omnia hæc succo pomorum. Quantitas horum exhibetur pro sumentis ea corporis viribus. Deinde paucis, vtpote septem forte interiectis diebus vtendum hiera διακολοκυνθιδων, sic dicta, quod colocynthidos sit particeps. Porro ratio hæc curandi non raro vel sola satis est, vbi nimirum vitia hæc sunt etiamnum noua, ac tantum non recentia: inueterata enim difficilioris sunt curationis, egent q̃ remedijs localibus. Cum igitur (vt modo dictum) fuerit iam corpus totum, quàm fieri potest, mundum, subductis superfluis vitiosis succis purganti medicamento, tū confidenter admouebis loco affecto topica, id est localia remedia, quæ omnia in genere calida sunt, & diaphoretica, qua facultate vitiosos succos tum vacuant, tum discutunt. E quorum albo est thapsia succus, cum ceroto inunctus. Aliud. Euphorbium detritum, & ex oleo illitum: sulfur ignem non expertum, & nitrum alexandrinum, ex aceto infricata. Aliud. Laurinū illitum: nasturtij semen ex oleo. Aliud. Erucae semen tritum, pinguedine q̃ agnina exceptum, illinitur. Aliud. Alcyoniū asperum illud tostum ac læuigatum, ex aceto aut cedrino liquore inducitur. Aliud. Calami radix vsta, aut cortex vstus ex oleo cedrino aut pice liquida delinitur. Aliud. H Murium sterus contritum ex aceto inungitur. Aliud. Integras amygdalas vstas imbue acri aceto. Aliud. Erinacei terrestris pellis vnā cum ipsius capite tosta, & in puluerem tusa, ex melle inungitur. Aliud. Cepam vetustam affecto loco, sed præfricato panno lineo donec rubescat, frequenter infrica. Aliud. Raphani corticem contritum ex melle illinito. Aliud. Læuigatam ferri squamā ex oleo & aceto inducito, infricans donec locus rubescat. Aliud. Hordeū tostū, & muscerda, id est murium fimus, æquali pondere ex aceto illinuntur. Cæterum cum dictorum medicamentorum sit hoc quidem vehementer, illud vero minus calidum, silentio neutiquam prætereundum, calidiori vtendum tum in durioris carnis corporibus, tum vitijs hisce vetustioribus: sicuti contra minus calido, cum in recentibus id genus vitijs, tum etiam puerorum ac mulierum, similibus q̃ alijs tenerioris carnis corporibus. Esto autem commune præceptum hoc in omnibus eius generis remedijs. Huic adde præfricandam partem affectam panno lineo, neque ruditer adeo, vt non excorietur, neque contra leniter adeo, vt non mediocriter saltem rubescat, ante prædictorum remediorum applicationem. Est postremo affectus locus frequenter radendus: qui si quando vsu veniat vt dictorum medicaminum impositione vlceretur, illinendus aut porcino adipe, aut rosaceo.

Al. anserino.

De Aurium

Idē in li. de c
med. sec. loc. i
2. e

De Aurium Vitijs, & primo de Doloribus.

CAP. 7.

A **O**boriuntur auriū dolores interim à frigore: atq; fiunt hi ferè à frigidis aut ventis aut balneo: interim ab aqua medica, quæ auri incidit: interim ab inflammatione, quæ consistit modo extrinsecus, utpote in foraminis seu meatu adiutorij cute, modo parte huius ima, inflammata ea, atque ita distendēte etiā particulas proximas. Est cum spiritus flatulentus auri inclusus, non reperiēs egressum, huiusmodi excitet dolorem. Quin efficit raro idem sanies auribus quauis occasione in nata. Cæterum dolores ad frigus relatos, discutiunt celerrime calefacientia. Cuius generis sunt, instillatum auribus oleum, in quo incocta sit cepa. *Aliud.* Piper curiose admodum detritum ex oleo. *Aliud.* Nardinum calidum auri infusum. *Aliud.* Oleum, in quo decocta est ruta.

Ad Aurium Nocumēta ex aqua.

Oleum calidum frequentius instillato, quod molli deinde lana exuccato, rursus q; aliud inguttato. *Aliud.* Oui aquato, modo eodem, quo in oculorum inflammationibus uti ipso consueuimus, præparato, aut lacte muliebri tepido, vitior. *Aliud.* Confert adeps tum anserinus, tum vulpinus, tum gallinaceus.

Ad Aurium Inflammationes.

B Nardus cum medicamine basilico immissa iuuat. Quod si immensus, intolerabilis q; sit dolor, castorio ex lacte muliebri, aut aquato oui tepido, vitior. *Aliud.* Parua opij portio cum sapa. Cæterum cauendum hic, ne præter rationem & temere auditorio meatui facessas negocium: qui suauiter tantum detergendus siccandus q; est, specillo molli lana circumuoluto. Fouenda porro auris spongijs mollibus ex aqua, in qua decocta sit althæa, quam quidam à magnitudine vocant *δενδρομαλάχην*, id est arborecentem maluam: aut furfuribus tenuioribus macrioribus. Quod si flatulentum fuerit, quod in aure includitur: & obstructio verius, quàm dolor, hâc obsideat: aphronitro ex aceto vitior, aut succo dracontij herbæ, aut centaurij, aut polij.

Ad igneum in Auribus Feruorem.

Ardorem igneum in auditorio meatu perceptum, cui nō sit adiunctus pulsatilis dolor, solet initio iuuare acetum cum rosaceo.

Ad Aurium Vlcerā.

Glaucium ex aceto contritū instillato. Quod si plurima ab his defluat humiditas citra dolorem, scoriam ferri ex aceto acerrimo curiose detritam multos dies in Sole immittito.

Ad Grauem Auditum, Aurium q; Sonitus seu sibilos.

C Ad aurium sonitum repente obortum, nardinum ex aceto instillato. *Aliud.* Cyminum tantillo misceto oleo, quoad mellis habeat crassitudinem, ac infundito. At sibilos morbi cuiuspiam reliquias, curamus sotu auris ex absinthij decocto, cui post hæc acetum ac rosaceum inguttantur, aut raphani succus cum rosaceo, aut helleborus † cum aceto. Quinimmo solum acetum, sed acre, instillatur tepidum, aut solum mel, aut aqua mulla, aut mistum oleo acetum, quod *ὀξέλαγον* dicunt Græci. *Aliud.* Porri succum cum lacte muliebri aut rosaceo immittito. *Aliud.* Oleum amygdalarum amararum in cepa decoctum inguttato tepidum. *Aliud.* Cepam, allium, & adipem anserinum æqua portione simul terito, deinde colatum adipe infundito. *Aliud.* Lentis decoctum addito melle immittito. *Aliud.* Vinum dulce in quo decocta sit myrtus, in aurem mittito. Vel succum ex oliua folijs expressum, melli incoquito, ac postea vitior. *Aliud.* Idem potest ceparum succus cum melle. *Aliud.* Nasturtium tritum rosaceo dissolue ac vitior. Vel intestina terræ ichori incoque & instilla.

† niger cū acetococtus.

Ad Grauem Auditum.

Subduc initio ventrem catapotijs ex colocynthide. Vtere dein apophlegmatismo, id est medicamento pituitam per os educente, ex pyrethro & mastiche. Ipsi autem auri extrinsecus admouedo fomentum per calamum ex absinthij decocto: cui deinde instillato acetum album, & aquam æquali mensura, in quibus seruēfactum fuerit nitrum. *Aliud.* Vitior similiter decocto, aut foliorum, aut baccarum lauri.

{ In Aurem Infundi apta. }

Porri succum irino vnguento mistum infundito. *Aliud.* Fel seu taurinum seu caprinum rosaceo mistum instillato. *Aliud.* Corticis raphani succum ex rosaceo immittito.

Ad Vermes Aurium.

Auribus verminosis infundito ex bubuliscarnibus inter assandum defluentem liquorem. Aut aristolochiam tritam ut emplastrum iplis admoueto. Idem potest immixtus iplis succus tam nepetæ quàm rubi. Eodem modo & succum absinthij instilla.

De Parotidibus, id est Abscessibus iuxta Aures.

Quæ ex morbis proueniunt, parotides, ab alijs ratione alia obortis inflammationibus differunt: proinde dissimilem etiam postulant curationem. Quæ enim à sola destillatione, seu defluxu materiæ proueniunt, neque multa existente, quæ influit materia, neq; venenosa, nec toto denique corpore plethorico, sola spongia ex posca impolita sistuntur. Contra in parotidibus, { quæ morbi alterius sunt soboles, } medicamentis utimur, quibus in cutem attrahendi est facultas, aut etiam

Septima Classis.

uuuuuuu iij

imposita

imposita cucurbitula. Tantum enim abest reprimamus influentem hic succum, ut cōtra è profundo in summam cutem euocandi sit studium nobis: nisi forte vehemens fuerit ac copiosus humoris influxus, sic enim nihil opus iuueus naturæ conatum: quandoquidem si tum aut cucurbitulam quis admouerit, aut attractorium medicamentum, quo ex alto in cutem pertrahat materiam, grauem excitabit dolorem, qui & vires ægrotantis prosternet, & somnum ac quietē turbabit. Proinde mitigatorijs est hic remedijs opus, non autem ijs, quæ humoris fluxum iuuent etiam. Cataplasmata autem *καταρροια*, id est mitigatoria, sunt Panis oleo maceratus ac impositus. *Aliud.* Triticea farina ex oleo apposita. *Aliud.* Hordeacea farina cum axungia admota. *Aliud.* Hyoscyamus herba, cum butyro in modum emplastri applicata. Quod si abscessus ad suppurationem deuenierit, aut cute discissa pus excernendum, deinde vlcus ipsum communi vlcere ratione curandum, aut tentandum possit ne pus discuti disijci q̄, id q̄ remedijs simul attrahendi simul extenuandi facultatem habentibus: quæ bis sunt diebus singulis renouanda. Fouendus porro locus affectus donec sedetur dolor: quo iam mitigato, locum habebunt, quibus est discutiendi facultas, è quorum numero sunt, plantago detrita cum sale, ut q̄ emplastrum imposita: rumicis radix in vino decocta, sulfur ignem non expertum, & cimolia ex aceto, fici in muria decocta ac trita, marrubiū cum sale. Applicatur etiam commode sal tritum cum butyro, succida q̄ lana exceptum, maxime F parotidum initio, multo autem magis in teneræ carnis corporibus. Induratis enim parotidibus, omni q̄ iam dolore carentibus, stercus caprillum ex aceto vtiliter imponitur. Caterum si quando breui tempore volumus pus mouere, fouebimus parotidas assidue calida, & farina hordeacea oblinemus.

Ad Narium Vitia, & Primo ad Ozenam ac Polypum.

CAP. 9.

* Al. niens.

† Deest hic limaciarū nomen.

IN curandis narium vitijs, & potissimum ozena, ac polypo, exiccandum initio roborandum q̄ est ipsum caput, imposito emplastro *διτρίων*, sic dicto, quod salicem contineat: aut anemonite, aut barbaro, aut de limacibus, cuius hæc est confectio. Myrrhæ ūncia, thuris tantundem, limacię integræ †, duo ouorum aquata, Omnia hæc contusa in pila misceantur: deinde linteo excepta capiti admoveantur, quod continuis fiat diebus nouem: atque tum demum localibus hisce vtendum in naribus remedijs, nempe succo nepetæ naribus infuso: ac ipsamet nepeta siccata, & trita, demum naribus per arundinem inspirata. *Aliud.* Ranunculi herbæ succus cum melle supine iacentis naribus iniicitur, ut q̄ ipsum ægrotus attrahat præcipitur. *Aliud.* Mali punici succum creto vase tantisper decoquito, donec crassecat, demum naribus infricato. *Aliud.* Gallas ac myrrham aqua portione conterito, naribus q̄ inspirato.

De Polypo.

Atramenti sutorij vnciæ quatuor, militi vnciæ vna, redacta in puluerem, naribus per calamum inspirantur. Simili modo insufflatur pulvis tostæ radices bryoniæ. *Aliud.* Atramentum sutoriū & sandaracha æquo pondere teruntur, naribus q̄ inspirantur. *Aliud.* Cornu ceruinum vstum et sandarachen naribus inflato. *Aliud.* Plumbum vstum ex vino inungito. *Aliud.* Acidi mali punici succum coquito in vase æreo, donec mellis habeat cōsistentiam, deinde illinito. *Aliud.* Auripigmentum lauigatum stylo applicator. *Aliud.* Auripigmentum & calcem aqua nō restinctam aqua portione, trita applicato.

Ad Sanguinis è Naribus fluxum.

Principio concretum in naribus sanguinem specillo, cui lana ex aqua madens addita sit, absterge: dehinc lycium aqua dissolutum, penicillo q̄ ex intorto panno lineo exceptum, naribus inferere. *Aliud.* Linamentum tortile igni accensum, succo q̄ aut polygonij aut porri extinctum, naribus inferito. *Aliud.* Acetum accerrimum coquito, in quo maceratam spongiam naribus immittito: quam ut facilius possis, cum voles, extrahere, præstat lineo filo deligatam imponi naribus. Frontem præterea spongijs ex aqua frigida foueto: sit q̄ ægrotus capite eleuato erecto q̄, iubeto. *M*anus & pedes vinculis constringito, nec non aures valide obturato. *Aliud.* Gypso, aut luto figulino frontem illinito. *Aliud.* Cucurbitulam magnam applicato, hepatis quidem, profluente è dextra nare sanguine: lieni vero, à sinistra: sin ex utraq̄ nare effluat, utrique visceri.

De Vitijs Oculorum.

CAP. 10.

OMnia sanè corporis membra exactissimis in curando præscriptionibus egent, si re vera ad sanitatē reduci debeant. Verum oculi, quo præstantiorem habent præ ceteris vsum, dignitate q̄ præcellunt, hoc debent exactius considerari ab eo, qui quis inoffense curabit crebros in ipsis affectus, varijs differentibus q̄ de causis eueniētes ac augescētes. De quibus exactius verbosius q̄ agere, alterius est commentarij opus: præsens tamen eatenus de ijs agit, quatenus id patitur ipsius compendium. Affectus igitur oculis accidentes ortum habent, interim ab aestu & calore, interim à frigore, cum particulæ sensu quodam subitupido. His accedit, fieri modo cum inflammatione, modo sine hac. Est etiam cum ortum habent ab humorum defluxu seu destillatione, & cum sine his. Non nunquam ad hæc cū partis affectæ grauedine & dolore, non nunquam absque his. Ceterum leues sed calidas oculorum perturbationes satis super q̄ reprimat foris oculorum ex sola posca, sicuti frigidas fomentum per spongiam ex vino albo diluto: at validas vehementes q̄, ut

quas

Aquas magna grauis q̄z comitatur inflammatio, si quidem sanguinis in fronte vasa, præ plenitudine distenta fuerint ita, vt ultro se proferat conspiciendam sanguinis plenitudo, curat facta mox ab initio venæ sectio, nisi quid prohibeat hanc fieri: sicuti eas quæ ab alijs causis fiunt, atq; in farctū cōcitantur, ventris per medicamenta vacuatio. Quibus factis vtendum τοῖς ἐγχευτοῖς, quod in oculos instillantur, sic dictis medicamentis: vt fœnogræci decocto eum in vsum pulchre preparato: quod optime hac fit ratione. Principio lotum diligenter in aqua dulci fœnogræcum, leuiter in eadem coquitur, donec quicquid habet in se acre abijciat: deinde alij rursus aquæ incoquitur effusa priore. Vtile etiam in vsum eundem est oui candidum ac tenue, oculis frequenter instillatum: quin etiam lac muliebre, quod necellum & boni sit succi, & ex ipsis mulieris mammis in oculū immulgeatur. Mitigandus porro sedandus q̄z oculi dolor impositis emplastris ad inflammationes conscriptis; nec non ex oui exiguo luteo, sertula campana seu meliloto, pane, & rosaceo. Quin vtendum etiam collyrijs hunc in vsum conscriptis præparatis q̄z, quæ longa quadam experientia longo q̄z vsum omnibus ferè sunt nunc cognita, alijs alio vti consuetis, si tamen eorum adlit copia. Sunt autem ea ex oui candido leniter & indolorose adhibenda. Innatans porro oculis lippitudo, detergēda est spongia ex aqua calida. Vicius ratio sit tenuissima. Quod si vehemens fuerit capitis grauitas, auferenda erit, ac occipitio cucurbitula adfigenda concisa prius cute scalpello, copiosus q̄z inde sanguis de trahendus. Quod si sublati sursum vaporibus caput impleatur, ac pituita obstruat omnes ipsius meatus, sternutatorijs mitioribus apophlegmatismis q̄z vtentes purgabimus ipsum caput, humorum q̄z in farctum dilijciemus: si sternutatorijs quidem ex pipere, quod tritum naribus attrahant, iubebimus: apophlegmatismis vero ex sinapi accuratissime læuigato, additis aceto tenuis substantię & quantitatis mediocris, melle, & aqua, ea portione vt fluidiora omnia & ore facilliter cōrineantur & gargarissentur: facta enim hunc in modum per nares {ac palatum} vacuatione liberaliori, in farctus obstructions q̄z omnes capitis discutientur. Porro quod modo curandæ lippitudinis, verū etiam cuiusuis ferè alterius agritudinis, primus præcipuus q̄z curandi scopus consistat in exacta vicius ratione, neminem fugere existimo. Caterum lippitudinibus æstiuīs medemur aridai um rosarum decocto, quod oculorum palpebris per spongiā assidue admouetur.

Ad Disturnas Lippitudines.

Specilli mucronem allio tantisper insertum, donec huius tingatur succo, oculis inducimus.

Aliud. Triticum ignitis ferreis laminis incoctum ex vino illinimus palpebris. *Aliud.* Atramentum sutorio ex melle inungimus & frontem, & palpebras.

C *Ex Archigenis de Pharmacorum compositione commentarijs præcepta, ad Humorū in Oculos defluxum.*

Destillationi humorum in oculos, maxime ab ipso protinus exordio conducunt parcitas tum cibi tum potus, aquæ potus, ac præ omnibus absoluta à coitu continentia, ventris inferioris laxitas, frigida multa potatio, frontis assidua irroratio ex aqua, cui sit adiectum aceti pauxillum. Quidam ex aqua id faciunt, in qua præmaceratum fuerit calcanthum. Fugiant omnes acres odores, puluerem, tumum, splendorem tam lampadis quàm Solis. Imponatur fronti per noctem lana, aut munda ex vino, aut sordida ex aqua frigida: mane abluantur. Quod si destillatio ingrauescat accedat q̄z dolor, conueniunt venæ sectio, & omnimoda abstinentia tum cibi tum potus, nisi forte & ægroti vires prosternantur, & protrahatur morbus. Sit venter continue fluidus, aut medicamento ad hoc appposito, aut validioribus clysteribus. Post hæc iuuant viridia vitis folia, in modum cataplasmatum fronti assidue inhærentia: aut folia seu myrti seu lentisci. Similiter succus tum rubi, tum brassicæ. Idem præstant vitis folia cum tenui polenta, vel sampsychi, vel sedi, vel portulacæ, vel cotoneorum: cuiusque enim horum tenera folia, cum vino & tenui polenta instar cataplasmatum fronti vtiliter applicantur. Ipsi autem oculis foris lana munda ex oui aquato, nec non coctum oui luteum cum vino & tenui polenta, vt emplastrum aut fronti, aut ipsis oculis admouetur. Iuuant præterea tum eryngij radix trita ex aqua, tum cicutæ semen eodem applicatum modo: nec non mollis ac nuper salutis caseus, cum apij folijs. Panis præterea ex vino aut rosaceo mirum in modum confert. In summa, quæcunque adstringendi reprimendi q̄z vim habent, vtilia sunt initio, vt sunt cicuta, psyllium, apium, solanum, & paludibus innatantes lentes, serpyllum, sampsychon, folia vitis, coriandrum, portulaca, lens aquis innatans. Horum vnumquodque ex vino tritum emplastri modo apponatur, psyllium ac lentes paludibus innatantes ex aqua.

Ad Calidam Destillationem.

Brassica & polenta trita, ex aqua instar cataplasmatum imponuntur. Eodē applicatur modo, con trita folia tum ocimi, tum sampsychi. Multam impetuosam q̄z destillationē cohibent papauerum capita: herba apollinaris, quam hyoscyamum dicunt, cum tenui polenta ex vino. Memineris tamen non nisi foto prius loco, cataplasmata applicanda. Quod si protuberent palpebræ distendantur q̄z, lintheum butyro madens oculis imponitur. Porro graui difficili q̄z oculorum chymosi (dicta est autem chymosis rubra carnosā q̄z corneæ oculi pelliculæ inflammatio) medentur præsentissime, accuratius detritæ mûrium carnes, cum crudo oui luteo, ad ceræ consistentiam, & ex panno lineo impositæ.

* Al. coagulatus.

† Al. muscati.

DE REMEDIIS

Linimentum pro Oculis.

Panis purus tostus, additis acacia & sativæ punice flore (cytinion dicunt) ex aqua illinitur.

Ad Oculorum Dolores.

Rosas aut aridas aut virides in aqua dulci premaceratas ac leuigatas addito cādidū oui luteo, & emplastri mō ipone, aut hordeacea farina cocta similiter in aqua dulci. Quod si grauior mole sitior q̄ fuerit dolor, hyoscyami folia, aut carnē seu peponis seu cucumeris^d cū ouo cocto, aut huius luteo, & pauco vino, vt cataplasma applicato. Pulchre his medetur pini cortex & polenta ex vino.

Ad Vementes oculorum Dolores.

Coriātri succum cum lacte muliebri oculorum angulis guttatim instillato. Aut platani folia trita cum tenui polenta, in modum emplastri oculis extrinsecus imposito.

Ad Destillationem in Oculos Cataplasmata.

Conducit ad hanc viridis tum cupressus tum sabina herba ex vino: & folia tum paliuri tum portulacæ, detrita cum pinguedine anserina, & croco: nec non iris sicca ex melle, & apij folia cum polenta. Porro graui impetuoso q̄ defluxui cōfert viridis pulegij semen: & quā hoc autem, magis adhuc, cera cum aceto ad malagmatis crassitiem redacta, capitis q̄ syncipiti admota, cui superdato lanam, suauiter q̄ illigato: aut imposito ipsis oculis in modum emplastri rosas, melilotum, & amy E lum simul cocta: aut amyllum ex vino & albo.

Anacolle mata, id est Resstringentia fluxum.

Limacem cum testa tufam, toti fronti & temporibus illinito.

Ad Hemalopas & Hypophagmata.

Incipientibus oculorum sanguinolentis suffusionibus ab icu percussu ve, confert ab ipso confestim initio, ne inflammatio ac dolor comitentur, instillatus sanguis columbinus, præsertim alis expressus tenerioribus. Confert & oui aquatum eodē modo immisum, aut lana pura exceptum, & foris admotum. Plurimum ad idem faciunt oui luteum assum ex vino impositum. Et trita rosarum tum folia, tum flores, per se, aut cum vino, cum tenui polenta, vt emplastrum apposita.

Ad Oculorum molles ex icu Tumores, dictos Oedemata.

Plurimum ad hoc facit fomentum ex posca molli spongia frequenter adhibitum, deinde spongia noua ex eadem posca oculo imposita.

Ad Oculorum Pterophthalmiam, i. pruriginosam scabiem, à Sole & puluere ortam.

Iuuat hæc aqua liberalius infusa, æstate frigida, hyeme calida: nec minus fots spongia factus ex lentis decoctio: immittere etiam guttatim ipsis oculorum angulis succum aut rubi aut rosarum, G quēq; singulatim ex aqua: aut applicare rosas aridas tritas ex vino. Porro illinuntur dormituri oleo & . Abstinentum his in totum ab omnibus tam acribus, quā acidis.

Ad Inueteratos Palpebrarum affectus præcipue Callum.

Coctam amurcam, & ex oleo tritam inunge.

Ad Caluas pilis q̄ carentes Palpebras summpere hoc conducit, faciens renasci pilos.

Muscerda, id est simum murium, & caprinum, æquali mensura torrefacta & ex melle illinuntur. Facit hoc etiam ad vitiligines.

Ad Pilos Palpebris innatos oculum infestantes.

Euullis radicitus pilis, cimicis sanguine confricato locum, & nunquam renascentur. Idē potest illitus pediculi canini sanguis. Idem præstat, euullis prius radicitus pilis, fel aut hyæne foemine, aut hirci, inunctum confestim à pilorum euulsione.

Ad Oculorum Λευκόματα, id est Albugines.

Celeriter his medetur nitrum exacte contritum & ex oleo veteri inunctum. Idem præstant illitus lacertæ fimus, & nycticoracis ouum, his enim tinguntur oculi.

Ad Visus Obscuritatem.

Omne oculorum obscuritatem, incipientem q̄ suffusionem, curat felvulturis, cum marrubij succo, & melle attico: cuius si nulla sit copia, tenero ac molli vtere: esto autē tum succi marrubij, tum mellis, dupla ad ipsum fel portio. Idem possunt fel taurinum liquidum cum æquali pondere succi foeniculi, & duplo mellis: & fel vrsinum cum aquæ duplo.

Ad Pterygion, id est Oculi Vnguem.

Populi nigra liquorem cum dupla mellis portione mistum illine.

Ad Nyctilopa, id est Nocturnam Oculorum cecitatem.

Iecur hircinum assa, inter q̄ assandū defluentem saniē siue saniosum humorem collectū oculis infrica, ipsum q̄ iecur edendū præbe. Iuuat etiā colūbe sanguis instillatus, & fel capræ. Aut capræ iecur decoquens, p̄cipe, vt haberes caput pannis circūuolutum, teneant intentos in ollam oculos, suscipiantq; vaporem. Vel expressum ex recenti onide, id est stercore asinino, succum oculis illine.

Ad Oculorum Tubercula, quæ Crithæ i. Hordea appellantur.

Cera alba foueto. Aut muscæ reliquum corpus, præciso abiectoq; capite, tuberculo ipsi infricato.

Ad Sugillata.

Raphanus, quam radiculam dicunt, trita & imposita, iuuat confestim: quam vbierodere inceperit

A † Al passio.
B † Al. ac croci
quātū sufficit.
C * Al. passio.
D † Al. aut ou
assati luteū cū
pauco croco lē
uigatum vino
medico.

† Cod. impres-
si hoc in loco
legunt vnter
presertim lūc
et q̄d
ou. & c.
Al. p̄cipue
ou. & c. id est,
p̄cipue in ho-
c in acce-
ptis nō ag-
noscit etiam
re. & c.
Al. p̄cipue
ou. & c. i. p̄-
cipue solum
seu illud cū
aceto ad ma-
lagmatis & c.
† Additur in
ant. aut ou.

† veteri.

† calamigraci
duplum.

H

Aperit, aufer. Iuuat similiter impositus caseus recens salus. Porro cerotum cū absinthio vel raphani succo impositum summopere confert ad recentia & liuida sugillata. Item spongia ex muria assidue admota. Præter hæc frequens fotus ex calida plurimum iuuat liuida sugillata. Cæterū quibus sanguinolenta sunt, aut subflaua, aut subpallida, muria vitanda est, imponendūq; emplastrum ex rūbo, aut absinthio, aut hyssopo, aut origano, aut raphani cortice, aut vua passa absque acinis: horum. n. quodq; singulatim imponitur: aut ex melle, aut aceto, aut incocta aqua. Nec nō bulbus candidus cum ouo ac melle, aut cyclaminum cum vua passa. At vetustis iam & denigratis sinapi cū duplo adipis ouilli: vel fabacea farina cum melle mista, aut mansa & cum salua inuncta. Aut cyminum veteri linteo illigatum intinge feruenti aque, oculos q; hoc foue. Aut hordeaceam farinam † cum cocta aqua mulsa † applicato. Aut tritum fœniculi semen cum ceroto.

Ad Sugillata cum molli tumore.

Spongiam ex aceto impone, & emplastro vttere ex farina hordeacea, cocta † cum aqua mulsa, ad iustam crassitudinem: post hæc apponito coctam lentem & cum melle tritam.

Ad Recentia Sugillata.

Imponitur trita ex aqua cicuta, aut detrita vitis albę radix ex mulso.

De Vitijs Faciei, & Primo de Varis.

CAP. 11.

Nascitur in faciei cutē tumor exiguus durus q; dicitur Græcis *ῥόνθος*, Latinis varus, Differt autem a ficosis tumoribus in mēto prouenientibus, non solum q; ex crasso humore consistat; † verū etiā q; participet tenui quadā sanie, rōne cuius facile vlcerat non recte atq; ex arte curatus.

Ad Varos in Facie.

† Ficosus tumor.

Acetum acerrimum cum melle æquali mensura mistum varis accuratius illine, digito infricans.

Aliud. Ex amygdalis amaris aceto dissolutis ac curiosius tritis, conformato pastillos, atq; in vmbra deliccato. Vbi autem vsus postulabit, dilutum ex his aliquē aceto varis inducito: & simulat q; aruerit, nunc sapone abstergito. Facit hoc ad tumidos, affectus, faciei pruritus, & principium elephantialis.

Ad Ficosas in mento excrecentias.

Salem fossilem ex aceto, aut glutinum fabrile cum milto, id est rubrica illine.

Ad Mentis Impetigines.

Acceptum magna copia triticum incudi impone, cui deinde applicato candentem laminā græā: qui q; effluit humorem etiamnum calentem affectui infrica.

Ad Diuturnas Impetigines.

Trita capparidis folia ex aceto acerrimo cum tantundem mellis imponito. *Aliud.* Idem potest contritus ex aceto radicis rumicis cortex. *Aliud.* Chamæleontis radicem in aceto decoctam, ac leuigatam superdato. *Aliud.* Detritam rumicis radicem, & hordeaceam farinam, ex acerrimo aceto applicato.

Ad Scabras Impetigines.

Tritis amygdalis amaris frequenter ipsas inungito.

Ad Genarum Exanthemata siue Papulas.

Ferrum candens paliuri ligno imponito, acceptum q; qui ex hoc defluit humorem, illinito.

Aliud. Contritas myrti baccas ex vino inungito.

Ad Dentium Vitiā, & Primo ad Dolorem.

CAP. 12.

Abluito dolentes dentes calido gallarum ex aceto decocto, aut tedæ pinguis talearum, aut alterci tum seminis tum corticis, aut cedrę id est cedrini liquoris, vel propoleos, vel solani, vel capparidis, vel allij, vel myrti ramulorum in aceto decoctorū, aut calidę vini scis, aut polij corticis, aut etiam ipsiusmet herbe, aut marrubij: horum inquam quodq; cum aceto iuuat. Idem præstant Dplatani pilulæ, & rosę aridæ, decoctę in vino albo, ad tertias vsq; quo dentes frequenter colluantur. Idem efficit tum eupatorię radix cocta in vino, tum pulegium. Aut decoquito ceruinū cornu in oxycrato, sepe q; eo os abluito. Aut scillę interiora i minutas secato particulas, addito q; acetis sextario, in vas aliquod conijcito libram vnam: finito q; hæc in fimo asinino defossa macerari diebus triginta, eluito q; eo dentes. Eiusdem est effectus lac asinum, quod motos dentes confirmat etiam. Aut tithymalli radicem in oxymelite ad medias vsq; incoquito, aut etiam hyoscyami, lauto q; decocto eo dentes. Item lacte mori commisto probe cum vino, deinde tepescito collue, dentes. *Aliud.* Lauantur item dentes vtiliter decocto allij, seminis erucę, & nitri.

De Fomentis ad Dentium Dolores.

Extrinfecus ad dentium dolorem conueniunt fomenta ex frictio sale, vel milio, in marsupium coniecto: aut etiam ex sordidis panniculis admodum calētib; . At intrinfecus huiusmodi sunt fomenta vtilia. Aridi origani ramulum in feruens oleum demissum, superne affecto denti applicato. Vel ricini fruticis colicolum simul cum cera imponito dolēti denti. Aut tange hunc frequenter specilli mucrone, vehementissime calente. Cæterum illius in vnūuersum meminerimus necessum, vtendum fomentis id genus omnibus, tam ijs inquam quę extrinfecus, quàm quę intrinfecus adhibentur, ante cibum, aut longo post assumptum cibum tempore.

Apophleomatismi

DE REMEDIIS

Apophlegmatismi pro Dentium Dolore.

Optimi apophlegmatismi vtilissimiq; dentium doloribus sunt, herba pedicularis masticata, aut singulatim, aut cum pulegio. Vel quod in galla nigrum interius est affecto dente cōmordeto, finito q; hians interim effluere pituitam. Aut quinque alliī nucleos cum nigræ myrti pauculis folijs in aceto ad dimidias decoquito tædæ rude assiduo commiscens, ac eluito eo dentes, ore q; contineto: post hæc hiato, donec pituitæ satis profluat: demum rosaceo os abluito.

In Nares injici idoneum, pro Dentium Dolore.

Solum radices betæ succum naribus immittito, & dentium leuabis dolorem.

Ad Dentes Denigratos.

Prærigatum melle fossilem salem, torreto super igne, ex sarmentis vitis, terito q; deinde adiecta paucula myrrha dentibus infricato.

Ad Colluendos Dentes.

Vino odorato, incoctam aridam iridem habente, dentes colluito.

Ad Colluendum Gingiuas.

Lauato gingiuas aceto, in quo coctum sit hyoscyamus.

Dentes à Dolore Præseruantia.

Lauato dentes bis mensibus singulis vino, in quo ad medias decocta sit tithymali radix, & nunquam dolebunt. F *Subscripta Dentifricia maximopere conducunt ad Dentium à Dolore præseruationem, & ad Confirmandum tam dentes, quàm gingiuas, Conciliandum quæ dentium Candorem.*

Lanam succidam linteolo alligatam torreto: adiecta deinde tertia salis portione terito omnia simul, & perfricato hoc puluere dentes. Idem præstat puluis vlti contriti q; capitis leporis. *Aliud.*

Contritum ex melle salem ad ceræ crassitiem, linteo q; mundo illigatum, vrito: quo deinde adita iridos portiuncula perfricato dentes.

† Ad gingiuarū affectiones.

† *Ad Oris Graueolentiam.*

Hordeū melle & vino præmaceratū illigatur chartæ, teriturq;: quo deinde cōfricatur gingiuæ.

Ad Motos Dentes, vt confirmentur.

Teritur ex oleo atramentum futorium, quod lana exceptum dētiū applicatur radicibus. Vel vltmi cortex in vino decoquitur, decoctum q; hoc ore continetur, confirmat enim dentes.

Ad Dentium Erosionem.

Folia capparis in aceto acerrimo ad dimidias coquito, ac tepido eo lauato dētes. Idem potest coctus similiter capparis cortex: hoc idem dentium medetur dolori. *Aliud expertum.* Nigellam præfrictam, deinde tritam ex acerrimo aceto, dentis erosioni vt emplastrum imposito: sic enim in posterum plus non erodetur, sed perdurabit vt est erosio.

Ad Omnes tam Oris, quàm Columellæ ac Faucium Inflammationes, Cæteros q; affectus, seu vlcera ea sint, seu crusta, seu putredo.

CAP. 13.

Commune in omnibus hisce præceptum, reprimendum repellendum q; mox ab initio omnem ē capite defluxionem. Cæterum ab elapso iam morbi initio, ad ipsius finem vsq; vtendum simul reprimentibus simul resoluentibus. Reprimendi igitur facultatem habet medicamentum *δία μόρων*, sic dictum, quod ex moris conficitur. Eiusdem q; sunt facultatis vix immaturæ succus, cum pauxillo melle & florum rosarum, aut ipsarummet rosarum siccarum: sicuti & pini corticis ex aqua decoctum. At vbi iam morbi principium præterierit, quando adhuc à capite deflueret, alia digerendi ratione esset opus. Proinde adijciendum cuius prædictorum aphronitrum, aut ipsum nitrum beronicarion dictum. Vel incoquendū in sapa pulegium, aut satireia, aut thymus, aut nepeta. Poterit porro quicūq; copioso repente influente succo paratam habere similitum medicamentorum copiam, seu venator erret per agros, seu opus rusticum in agro faciat, seu etiam viator iter suum, enumeratorum medicamentorum indigus, si meminerit dictis affectibus rubi succum, ac dictorum etiam quemuis, immo omnia ferè quibus adstringendi facultas est, oris affectibus esse accommodata. Electissimum tamen ad ipsos medicamentum fit ex succo corticum nucū viridum cocto, cum paucis melle. Vtile similiter ad eosdem, decoctum cotoneorum, adiecto mellis pauxillo: sed quod ex viridibus nucibus fit medicamentum, multo est vtilissimum, ad vehementes tonsillarum inflammationes, & suffocationes. *Aliud.* Accipe dulcis mali punici tussim cum suo cortice expressum colatum q; succum, cuius sex partibus addito vnam mellis, demum coquito ad mellis spissitudinem ac vtitor. *Aliud.* Musti sextarium decoquito ad tertias, adiectis rhu coriarij vncijs quatuor: demum reponito in vsum. *Aliud.* Tulas gallas numero triginta, decoque in mellis sextario, quo vtire.

Optimum Medicamentum Stomaticum.

Florum rosarum vncias duas, *ωϊτινίδων*, id est fructus pini vnciam vnam, tere ex melle, ac vtire.

Ad Inflammationes Tonsillarum ac Columellæ, & Oris Putredines.

Succi mororum, aut rubi, & rosarum aridarum, singulorum vncia vna, coquuntur parum cum melle, quod his illinitur. *Aliud.* Cotoneorum acerborum succum cum æquali mellis portione coctum

A coctum illine. *Aliud.* Acerbum malum punicum cum suo cortice tusum incoquito passo: quo colato vtitor. *Aliud.* Immittito in sapam pulegium, aut thymum, aut origanum, aut hyssopum, aut nepetam, ac simul coquito sufficienter: deinde colatum hoc teneatur in ore.

Ad Oris Putredines ac Crustas.

Album canis fimum inūgito ex melle: sit autem eius canis fimum qui solis vescitur ossibus. Aut aquam rhu sutorij cum melle ad sordium crassitudinem decoctam. Aut etiam vstarum hirundinum cinerem ex melle illinito.

Ad Columellæ Inflammationem & Relaxationem.

Palmularum ex aqua decoctum, adiecto pauxillo melle, gargarissatur, ore q̄z continetur. Ad idem faciunt decoctum rosarum, & clauicularum vitis, rubi, lentis canine, pomorum acerborum, sorborum denique immaturorum, rhoi quo in cibis vtimur, & rhoi coriarij, & fructus myricæ: horum enim quodq̄ singulatim, aut cuius ex prædictis adiunctum, & ex aqua decoctum, gargarissatur. Aut ex his siccatum quodpiam in puluerem cōteritur, & columellæ apponitur, quæ lenissim ac leniter sursum ducitur: solet autem is cochleario iniectus, columellæ apponi. Quin etiā cuiusvis prædictorum, tam plantarum, quàm fructuum succus, cum pauculo melle vix illitus iuuat.

B *Aliud.* Ad vuulæ inflammationes conferunt sales triti & ex melle inuncti. *Aliud.* Palmularum ossa, ac nuces, teneræ, virides, aridæ q̄z pari portione vruntur, in q̄z puluerem comminuuntur, quo columella tangitur. *Aliud.* Rosas liccas in tenuissimum pollinem laeuigatas ex melle inducito.

Ad Aphthas, quæ Oris sunt Vlcera.

Portulacam melle madentem masticato. Aut foliorum oliuæ ex vino decoctum gargarissato.

Ad Aphthas Nigras depascentes.

Deterfas prius, orobea farina ac gallarum ex melle illinito. Aut lycij decoctum gargarissato. Aut face dulcis vini ex melle perfricato. Aut tamaricis fructum cum melle tritum infricato.

Ad Depascentes Aphthas.

Gallarum decocto cum mellis æquali mensura misto seruefacto q̄z vtitor.

Ad Aphthas Albas.

Pluma oleum in quo chalcitū præcoxis illine, & confestim curabuntur. Aut deterso nunc mundato q̄z loco affecto, tritum tamaricis fructum ex melicrato aut vino pluma similiter inducito: & cito sanabuntur.

Ad Aphthas Nigras.

C Vuam passam sine acinis & anisum tere, loco q̄z affectio ex melle infrica. Aut pruni folia concisa, asinino lacte misceto, colluito q̄z ex eo os. Idem possunt marrubij succus, & lentis ac rubi decoctum: nec non tritum cornu ceruinum loco q̄z infricatum.

Ad Aphthas Infantium.

Lentem cum paucō pane & cotoneorum succo mistam exhibe, & rosarum florem: quin ipsas etiam rosas aridas: vtitor autem oris collutione ex rebus mediocriter adstringentibus. Ceterum oleum aphthis ipsis aduersissimum est, nec non omnia vehementer acia: illud quidem q̄ humectat sordidat q̄z, hæc vero q̄ sua mordicatione noceant.

Ad Vitia Instrumentorum Voci respirationi q̄z deferuientium, & primo ad vocalis Arteriæ Asperitatem.

CAP. 14.

D Vlcis radice, quam glycyrhizan dicunt, vncie tres minutim admodum conterantur: deinde addita gummi tragacanthæ vncia vna, excipiantur omnia passo, conformentur q̄z ad fabæ magnitudinem pilulæ: ex quibus contineat vnam sub lingua dormiturus.

Ad Intercisam Vocem.

D Ficus & eryngion affatim coque, huic q̄z decocto adde gummi pauxillum, ita vt quàm mellis, crassior sit ipsorum consistentia, & sub noctem exhibeto. *Aliud.* Brassicæ succum cum melle decoctum lambat. Conducit hoc idem ad tussim. *Aliud.* Lini semen tostum, ac per cribrum excretum, vuas passas bene pingues sine acinis, purgatos pineæ nuce nucleos ac frixos, nuces ponticas siue atuellanas præpurgatas, omnia hæc in pari portione trita excipe melle crudo: datur cochlearij mensura.

Eclegma Tussi accommodatum.

† *Πυρίων*, id est nucleorum, pineorum vncias duodecim, carnem duorum dacrylorum, terito simul exactius, melle q̄z crudo excipito.

Ad Tussim siccam.

Iridis ex aqua decoctum, cui mellis pauxillum adiectum sit, da frequenter sorbendum.

Ad Sanguinis Reiectionem, expuitionem ue.

Rosarum aridarum vnciæ octo, gūmi tragacanthæ hexagia tria, teruntur, & in pastillos drachmæ pondere ex aqua conformantur: propinantur ex aqua. *Aliud.* † In cucumeris domestici ventrem infundito aquæ sextarium, coquito que ad tertias: demum expressum ex his cremorem in sorbitione dato. *Aliud.* Rubricæ synopice vncias duas, terræ sanie vncias duodecim, amyli

† Hanc cōpositionē integrā inuenies lib. 7. de cōpos. med. secundum loc. cos fol. 182. b.

† vide lib. 7. de compo. medic. secundum loc. fol. 184. c.

DE REMEDIIS

amylī vncias tres, coge sanguinalis herbæ succo: propinato trium obolorum quātitatem. *Aliud.* E. Fricti feminis lini vncia octo, gummi tragacanthæ vncia duodecim, prædicto modo commode excipiuntur. *Aliud.* Polygonij siue sanguifugalis herbæ radices aqua incoquito ad tertias, addito q̄ trito pauculo gummi offerto in sorbitionem.

Ad Tabidos, & Thoracis vitia.

IReos decoctum cum melle ad potandum dato. Aut ad sorbendum hyssopi decoctum cū melle. Aut coctum marrubij herbæ succum cum melle. Aut eruum rufescens, frixum primo, deinde tritum cum viginti partibus mellis, da in eclegmate. Aut amygdalas amaras leuigatas cū melle exhibeto. *Aliud.* Seminis apij vncie sex, piperis nigri vncia vna, mellis libra vna, datur cochlearij mensura. *Aliud.* Mistum cum melle, lento q̄ igne decoctum, butyrum offerto. *Aliud.* Apij & piperis cuiusq̄ vncia vna trita, cum mellis libra vna, sensim decoquitur, propinatur q̄. *Aliud.* Scillæ crudæ expressum succum cum mellis aqua portione, carbonibus superpositum coquito: ac dato ex hoc mystri quantitatem ante cibum & post cibum. *Aliud.* Abrotonon, pingues passulas sine acinis, rutæ germina, in aqua decoquito, percolato q̄ decocto huic mel adijce, rursus q̄ decoque, ac vttere.

De Stomachi & Ventriculi affectibus.

CAP. 15. F

Inflammationes tam oris ventriculi, quā hepatis, adstringentium medicaminum indigent admistione. Etenim si in curādis his vtatur quis solis relaxantibus, vitæ adducet discrimen, id q̄ omnibus empiricis vocatis medicis experientia edoctis, & in artis exercitatione obseruantibus. Non pauci vero eorum, qui se methodicos nominant, curandi hac ratione innumeros sustulerūt ē medio, oborta syncopa stomachali: sicuti nō paucos etiam hepatis vitio affectos, solis vli relaxantibus, quibus hepar plerisq̄ dissoluitur. Cuiusmodi nihil eueniet, si eorum, quibus est adstringendi facultas, aliquid his semper adijciatur, seu oleo affectum locum foueas, seu admoto cataplasmate cures. Sunt porro ex adstringentium numero, absinthium, vnguentum nardinum, aloë, coto-
neorum tam decoctum quā oleum: nec minus Ceratum ex aloë, mastiche, cera, & nardo, cuius fuerit hæc confectio. Accipitur ceræ vncia vna, mastiches vnciæ quatuor, aloes vnciæ duæ, & nardi quantitas conueniens. Quod si vehemens adeo fuerit ventriculi imbecillitas, vt ne alimentum quidem cōtineat, adijciantur his succi vuæ immaturæ † vnciæ duæ. Porro si succi absinthij fuerit facultas, addatur & huius vncia vna, aut labruscæ flos, aut succus rhu.

De Calida Ventriculi Intemperie.

In calida ventriculi intemperie medicamentum hoc per os commode exhibetur, quod constat G mastiches vncijs duabus, mentæ vncia vna, coactis succo plantaginis: huius medicamenti fabæ exhibetur magnitudo ex aqua. Quod si contra ventriculus frigida afficiatur intemperie, dicto medicamini adijcito castorei vnciam vnam, exhibeto q̄ similiter. Cognoscetur autem calida ventriculi intemperies partim ex bilioso vomitu, partim ex sensu mordicationis biliosæ in ore ventriculi perceptæ, parum q̄ hoc ipsum admotæ manui calidum appareat.

Ad Ventriculum iusto Frigidiores.

Ad ventriculum refrigeratum, qui q̄ ob pituita in ipso hærentis crassitudinem opus habet simul calfactione simul humorum incisione, perquam aptum est medicamen hoc, quod, cōstat corticis radice fœniculi vncijs sex, aceti libra vna, mellis libra vna. Decoquuntur primum radices cū aceto, ac coctæ nunc exprimuntur, abijciuntur q̄: demum adfuso melle incoquuntur rursus simul omnia ad mediocrem crassitiem. Propinantur autem huius cochlearia tria ex aqua.

Ad eos Quibus in Ventriculo Cibus acescit.

Quibus assumptus cibus in ventriculo acescit, medicamentum hoc accommodatum est, quod constat piperis vncia vna, feminis anethi vncia vna, cymini vncijs quatuor: omnibus diligenter tritis, propinatur ex eis cochlearium ex aqua vino mista. H

Ad Ventriculi Subuersiones.

Ad subuersiones ventriculi idoneum est hoc medicamentum, quod constat ex succi mali punici acidi, cum suis acinis expressi, partibus tribus, succi mentæ parte vna: decoquuntur hæc in vase fictili, assidue miscendo: cum q̄ iam crassescunt, sublata reponuntur in vsum. Datur sex medicamento hoc postulante necessitate, ante cibum omnem mystrum vnum, aut etiam duo.

Ad Dysentericos, & Cibus Vomitu reijcientes.

Radice arboris cotoneæ libram vnam, decoque in vini myrtei sextarijs tribus ad tertias vsque: expresso deinde cremori adde mellis libram dimidiam, coquito q̄ rursus assidue miscendo: tādē reponito in vsum. Datur huius ante omnem cibum mystron.

Ad Ventriculi Subuersionem, Cœliacos, & Dysentericos.

Mala cotonea quatuor numero, integra mala punica decem numero, sorba octo, in aquæ sextarijs tribus accurate decoquito: cum q̄ omnia flaccescere iam cœperint, exprimito: demum abiectis crassis fructuum partibus cremorem eum iteratō coque ad tertias vsq̄: postremo additis generosi mellis libris quatuor, rursus coquito impositum carbonibus, continuo miscendo ad conuenientem consistentiam: sic q̄ in vsum reponito. Vtitor q̄ vt medicamento præcedenti.

Immodicam

A *Immodicam ex nimio ardore Sirim extinguentia, Catapotia.*

Seminis cucumeris domestici vnciæ octo, seminis portulacæ vnciæ octo, tragacanthæ vnciæ quatuor: dissolue tragacantham recentium crudorum ouorum aquatis, dissolutam q̄ adfundito cæteris probe tritis: conformato q̄ ex omnibus mistis catapotia, quæ in vmbra desiccentur: teneatur q̄ ex ipsis vnum sub lingua, solutus q̄ salua humor paulatim deglutiat.

Ad Ventriculi Subuersionem, & Feruidos halitus.

Anesi, apij, cuiusque vnciæ duæ: cymini vnciæ vna: propinato ex his bene læuigatis, ieiuno qui dem cochlearium ex aqua, sub somnum autem aliquando ex vino. *Aliud.* Bibatur tribus continuis diebus ablinthij dilutum.

Ad Ventriculi Refrigerationem & Singultum.

Piperis vnciæ tres, castorei vnciæ vna mediocris cochlearij quantitas, ex aqua ieiuno datur. At si ex calidis succis in ipsa ventriculi concoctione corruptis singultus ortum habeat, quod ex ventriculi ardore mordicatione q̄ cognosces, aqua tepida epota, iube affatim vomant, & cessabit confestim singultus. Porro sternutamētum in tempore factum, sedat singultum: sicuti etiam acetum in sorbitione acceptum.

B *Ad Aestuantem Ventrículum.*

Quibus ventriculus præ nimio ardore exoluitur, aut animi sequitur defectus, siquidem sine febre hoc vsu veniat, dato in potu frigida cyathos tres, aut quatuor, id q̄ per temporis intervalla.

Quod si his malum mitescat, cibo est reficiendus æger: sin vero perduret, astrictis cōiunctis q̄ extremis, ei præbeto sorbendam assidue aquam, in qua maduerint cotonea, pira'ue, aut mespila, aut bacca iuniperi, aut pampini vitis, aut rosarū. Vel succum mali punici, aut vix acerba. Vel dato, quem bibat, tritum mentæ ramulum, aut labruscæ florem, & finito quiescat.

Ad nimiam ex Ventrículo Saluam.

Nimia diffuentes salua masticent siccam conyzam. Porro extrinsecus imponentur ventriculo, contrita vitis viridia folia, aut cotonea, aut viridis portulaca, aut etiam cucurbitæ ramentum.

Ad Dolorem Ventriculi.

Ventriculi ex inquietudine aut anxietate dolores sedat ac mitigat potum lac muliebre, aut vacinum, aut asininum, cui incocti sint lapilli. Et rosarum decoctum. Quin etiam alium oui luteum cum polenta potum.

Ad Vomitum Bilis nigrae.

C Ad nigra bilis vomitum ventriculi q̄ inflationem, & potissimum † inter maducandum, † imponitur vtilliter ventriculo spongia ex aceto quàm acerrimo calido. Aut hederæ folia, vino decocta, vt cataplasma, ipsi applicantur. Porro cibus sit boni succi, cuius generis sunt oua, alica, & iuscula, vtpote auicularum, extremarum porci partium, phasiani, iuuenis perdicis, aliorum q̄ omniū his similium.

† Al. in distentionibus.

Ad Ventriculi Inflationem.

Ad inflatum distentum q̄ ventriculum iuuat polij fasciculus foris impositus, nec non potum eiusdem decoctum. Idem præstant nepetæ decoctum addito mellis momento, & piper drachma pondere.

Doloris Stomachi Mitigatorium.

Stomachi dolorem sedat cuminum assum, & apij pauxillum potui ex aqua datum. Item abrotani ac thymi vtriusq̄ obolos duos potui dato.

Ad eos qui Grandem Famem dictam Βούλιμον facile incurrunt in via.

Βούλιμον dictam famem incurrētes, seu in itinere, seu modo alio, refocillamus reficimus'ue, porrigentes olfactandum acetum, aut pulegium, aut terram aceto madentem, aut poma, aut pira, aut his similes fructus alios, quorum pro tempore fuerit facultas: aut etiam panem ex vino eos assumere cogentes.

Ad Singultientes.

Singultientibus da rutam, cum vino in sorbitionem: aut nitrum ex melicrato, vel apium, vel castoreum, vel abrotonon, vel aristolochiam, vel cyminum, vel anisum, vel calaminthē, {quam nos nepetam dicimus.}

Ad Hepatis Vitia, & primo ad Obstructionem.

CAP. 16.

A Mygdalarum amararum vnciæ tres: cymini, seminis apij, cuiusque vnciæ vna: datur cochlearium ex vino. *Aliud.* Baccharum iuniperi vnciæ tres, seminis brassicæ vnciæ vna, seminis erucæ vnciæ duæ, excipiuntur melle crudo, datur q̄ cochlearium vnum. *Aliud.* Succus cichorij cyathum cum aquæ calidæ cyathis duobus, & mellis cochlearijs duobus, exhibeto. *Aliud.* Succus anethi cyathus cum tribus cyathis aquæ mulsæ calidæ. Porro dictorum omnium quodq̄ seorsum, aridum, tustum, aut cibo inspergitur, aut coctum bibitur. *Aliud.* Camæpityos, decoctum cum pauxillo melle bibitur. *Aliud.* Chamæpityos vncias octo, radicis cichorij vncias quatuor, contunde, & excipe melle cocto: datur huius auellane magnitudo ex aqua calida.

Pastillus.

DE REMEDIIS.

Pastillus Hepaticus, id est ad Iecur, inscriptus.

*A*nisi, seminis apij, asari, amygdalarum amararum præmundatarum, absinthij, cuiusque vicia vna: conformantur ex aqua in pastillos drachmæ vnius pondere: exhibeto febrientibus ex hydromelite, non febrientibus ex vino misto. *Aliud.* Erigerontis eundem in vsum bibitur decoctum. *Aliud.* Aristolochiæ drachma dimidia trita offertur, febrientibus ex aqua, sicuti ex vino non febrientibus. *Aliud.* Trifolij herbæ ad tertias decoctum dato potui.

Ad affectos Morbo Regio.

*M*orbo regio affectum lauato in balneo aquæ potabilis, totum quæ corpus oleo confricato anethino. Quod si febre vacet, in colocynthidos corio calefactum vinum propinato. *Aliud.* Laniæ tritæ cochlearium ex aqua dato: aut ex mulso, liberis à febre. *Aliud.* Cichorij succi cyathos tres propinato, febrientibus quidem, nullo admisto alio: non febrientibus vero, ex mulso misto. *Aliud.* Ciceris dicti *κπίος* id est arietini, & fœniculi, coctorum cremorem exhibeto: febre carentibus, cum vino misto. *Aliud.* Tenerrima folia tam nasturtij, quam rorismarini terito: expresso quæ ex his succo, vitior, ex mulso, si febre careant. *Aliud.* Elaterion cum lacte muliebri maceratum naribus infundito, & iubeto sursum attrahi. *Aliud.* Cyclamini succo aqua misto, ut modo dictum, vitior.

Aliud. Editur eundem in vsum sentis caninæ rubeus fructus. *Aliud.* Chelidonij herbæ succum cum vino & aqua mulsa porrigito non febricitantibus. *Aliud.* Hyperici drachmam vnam propinato ex aqua mulsa. Porro ieiunis dato in cibum amygdalas amaras.

Ad Liencos.

CAP. 17.

*D*atur his in potu decoctum chamædryos, vel chamæpityos, vel polij, vel rubiæ: id quæ aut per se, aut cum oxymelite non febricitantibus. *Aliud.* Candidæ hederæ corymbi numero tres, dantur deuorandi, & superbibendum acetum mulsum. *Aliud.* Radicis capparis ex oxymelite decoctum non febricitantibus datur. *Aliud.* Tamaricis fructum tritum & per incerniculum excrementum duorum cochleariorum quantitate, dato ex oxymelite. *Aliud.* Ferrum ignitum aqua restinguit, quam da in potu cum vino, si nulla adsit febris.

Epithema Splenicum, id est lieni aptum.

*F*œnogræci viciæ quatuor, hordeaceæ farina viciæ tres, seminis nasturtij viciæ tres: caricas acerrimo primum aceto maceratas contundito fortiter in pila: deinde adiiciens cætera, vnito omnia simul, ac vitior. *Aliud.* Moly herbam etiamnum virentem cum suo semine in ollam coniçito, in qua diligenter obturata coquito plurimum lento igni: coctam quæ nunc & in pila tritam imponito lieni, ante tres dies non soluturus.

Ad Hydropicos, id est Aqua inter cutem affectos

CAP. 18.

*F*œnogræci vicia vna, hordeaceæ farina viciæ tres, stercoreis columbini viciæ quatuor: frixæ resina picis, cuiusque libra vna: axungie veteris libæ duæ: liquato quæ liquari ex his possunt: demum addito cætera ex aceto trita, ac vitior. *Aliud.* Fimi caprilli sicci libras duas coctas in oxycrato, ut malagma imponito.

Ad Colicos.

CAP. 19.

*A*nethum & cuminum in tribus olei vicijs coquito, & simul exhibeto. *Aliud.* Rutam coctam similiter in dicta olei mensura, adiecto resinæ terebinthinæ cochleario, præbeto.

Ad eos qui Refrigerati sunt.

*A*nethino vtore, cui additum sit triti castorei cochlearium.

Ad Inflammationes.

*A*nethino vitior, cui admista sint casei non saliti duo cochlearia. *Aliud.* Additur similiter vel pinguedo anserina, vel cerui medulla.

Ad Dysentericos & Cæliacos, & Primo ad Dysentericos.

CAP. 20.

*I*n dysentericorum curatione, illud præmeminisse fuerit perquam opportunum, videlicet optimum dysentericæ remedium cibi esse paucitatem. Necessum ad hæc sunt ea, quæ dysentericis in cibo dantur, quam licet leuia, ab omni aliena grauitate, & concoctu facilia. Porro decoctum malorum punicorum integrorum, nec minus cotoneorum commode his tum ad sorbendum propinatur, tum per clysterem iniçitur. *Aliud.* Plantaginem herbam cum oryza exacte decoctam da in cibo: quin huius ipsius succum adiecta pinguedine hircina commode subministrabis. *Aliud.* Myrti baccas vino incoquito, si quidem febre careant: sin aliter, aquæ ac immittito. *Aliud.* Cochlearum integrarum vstarum vicia vna, cornu cerui vsti viciæ duæ, vniatur succo plantaginis: exhibeatur ex hoc fabæ magnitudine, febre carentibus cum vino, cum aqua vero febricitantibus.

Ad Cæliacos & Dysentericos.

*B*accarum myrti siccarum contusarum quæ, rosarum aridarum, cuiusque vicia vna: baccarum iuni peridecem numero, pirorum aridorum tusorum quæ tria & viginti numero: ceratiorum, quas dulces filiquas dicunt, contusorum vicia vna: corticis pini viciæ quatuor: propinato excreti ex his puluisculi cochlearium ex vino. Porro solidius illud crassiorum quæ partium pinguibus palmulis coactum ventri imponito. *Aliud.* Potum leporis tum hinnuli tum etiam capreæ coagulum ex vino, nec non immissum cum oryza cremore iuuat.

Ad

A *Ad Diuturnam Dysenteriam.*

Chartæ vstæ, calcis, cuiusque vnciam vnam vuæ immaturæ succo excipiens in pastillos conformato, ponderis diuersi, nempe modo vnius, modo duarum, modo etiam trium vnciarum, vt cuiq; ætati apta sit ad manum quãtitas. Porro vbi vsus postulabit, vnum ex his vino austero dissolutum adiecto oryzae cremore, per clysterem iniice. *Aliud.* Cocti anserini oui putamen minutissime tritum dimidiæ drachmę quantitate ex vino propinato.

De Sedis Vitijs, & de Applicandis sedi Medicamentis.

CAP. 21.

Sedi diuersa accidunt vitia, vt sunt rhagades i. rimæ, condylomata, aliæ q; inflammationes. Aperta autem his sunt tenera, mollia, omni q; vacantia mordicatione, inuncta medicamenta.

Ad Sedis ex ardore Dolores.

Oui luteum ex vino albo tritum, & rosaceo cerato exceptum illine, emplastri q; modo vttere. Cõueniunt autem his *ἀσπλά* id est mollia tenera q; dicta pharmaca, & *ἀδιννα* id est mordicatione carentia, illita. *Aliud.* Recentem anseris adipem inungito, & emplastri in modum imponito. Vtile his etiam cataplasma ex pane mundo dissoluto cocto q; in aqua & rosaceo: quod fuerit efficacius, additis ouorum luteis aliquot coctis. *Aliud.* Fœnogrecum elixum tritum q; adiecto butyro vt cataplasma applicato. *Aliud.* Anserinum adipem inungito. *Aliud.* Rosarum vnciæ tres, coctorum ouorum lutea duo, trita ex vino albo, rosaceo q; cerato excepta, illinuntur.

Ad Ani Pruritus.

Terram vocatam cimoliam tritam cum vino, cerato q; myrteo exceptam appone.

Ad Procidentem Anum.

^a† Recrementi plumbi vncia vna, rosarum siccarum vnciæ quatuor, accurate admodũ trita, sicca insperguntur ano, eloto prius vino myrteo. ^b† *Aliud.* Cyclamini succum & mel aqua portione decoque in vase æreo, doneq; cerati habeat crassitudinem, & inunge.

De Renum & Vesicæ Vitijs.

CAP. 22.

Potio ad Renum & Vesicæ affectus inflammationis participes, & Exulcerationes. Seminis lini vnciæ duæ, amyli vncia vna: propinato ex aqua cochlearium.

Ad Vesicæ Vlcerationem, & Vrinæ Difficultatem.

^c† Pinei nuclei, & amygdala, singulorum numero viginti, palmulę quindecim, tragacanthę vnciæ quatuor. Datur ex his cum aqua.

Ad Renum Obstructionem.

Capij decoctum tribue in potu febre carentibus ex condito, febrientibus ex aqua. *Aliud.* Decoctum cicerum, quæ à similitudine *κρίαι* i. arietina appellantur, cum condito, detur in potu.

Ad Calculosos.

Lini semen exacte tritum, datur ad bibendum cum condito. *Aliud.* Seminis cucumeris domestici frixi vnciæ sex, seminis maluæ vnciæ quinque, nucleorum pineorum fruxorum vnciæ sex, seminis apij vnciæ octo, amygdalorum amarorum mundatorum vnciæ nouem, passo excipiuntur. Cochlearij datur mensura, vt ante dictum est.

Ad Coxendicum, Pedum, & Articulorum Dolorem

CAP. 23.

Eiusdem inter se sunt generis omnes huiusmodi morbi: proinde eandem ferè postulant curationem, differentes solum efficientibus ipsos succis: quorum hi quidem calidi sunt, illi vero frigidi. Dignoscuntur aut, q; calidum succũ comitentur rubedo, calor, & si adiuncta fuerit inflammatio, vehementes dolores. Contra frigidum, tumor albus laxis, ac mollis. Porro vtriusq; curatio est, vt calido frigida, frigido vero calida discutientia q; applicentur. Et si quidem magna fuerit efficientis morbum succi abundantia, hic vacuante medicamento primo est educendus. Quod si corporis adsit plethora, principio secanda est vena: deinde repellendus cohibendusq; influxus oxy-

crato, aut hoc etiam frigidioribus medicamentis alijs. At omnibus de his scriptum nobis abunde est, cum alijs in libris plurimis, tum maxime, mi Glauco, duobus illis de arte curatiua ad te missis. Proinde verbosius de his disserendum non est, hoc præsertim commetariolo, qui de rebus acquisitu facilibus tantummodo instituitur nobis. Cæterum in coxendicum doloribus, reprimentibus medicaminibus nunquam est vtendum. Cũ enim in alto corpore sit iuncturæ huius situs, reprimentibus medicamentis succus à circũstantibus vasis musculis q; deferetur ad ipsam iuncturam, grauius etiam discruciaturus. Quapropter mitigantibus tantum lenientibus q; est remedijs vtendum. Neq; porro vehementer aut calidis, aut frigidis medicamentis in coxendicum est dolore agendum, q; ab his iritetur verius, quàm curetur, humorum fluxio: † admodum enim calida attrahunt magis, quàm vel discutiunt vel disijciunt: è diuerso frigida congelant coarctantq; quodammodo fluentes humores, discuti q; reddunt contumaces. Cæterum coxendicum dolore affectos vomitus, quàm alui deiectio, iuuat magis, q; humorum ad inferiora defluxum retrahat. Prouocandus autem initio vomitus, est ab accepto cibo. Postea vero ad ciendum hunc, licet etiam vti bulbis vomitorijs, & raphano, id est radícula: exhibentur autem in aqua cocti bulbi, ex oxymelite: radícula vero concisa in tenues particulas, edũ similiter ex oxymelite. Deinde vbi nunc à sumptis his longum satis tẽpus præterierit, ad vomitum ducendi sunt: quo prouocato, deinceps longo interposito tempore,

^a† Vide l. 9. de cõpõne medi. fm locos.

^b† Vide ibidẽ cap. de hæmorrhoidibus, Ex tractatum hæmorrhoidum magni Tassẽsis.

^c† Vide l. x de cõpõne medi. fm medicamentũ Andromachi integrum istius medicamenti compositionem.

† Ex impressis cod. ita posset verti calor .n. multus ipsas attrahit magis q; discuti phibet. ex li. aut x de cõpõne medi. fm locos hoc pacto. caliditate nimis ipsam fluxionẽ magis attrahẽte, q; phibẽte.

DE REMEDIIS PARATV FACILIB.

to tempore, lauandi sunt: deinde iterum tantisper est ipsis quiescendum, donec omnis oborta ex E eo corporis turbatio conquieuerit: demum tenui sunt victu reficiendi,

Ad Podagræ Paroxysmum, id est acerbationem.

Brassicæ folijs decoctis ac tritis addito aceti facem, lutea duorum outorum crudorum, ac rosacei parum: quæ accuratius deinde mista in modum cataplasmatiss tepida imponito, frequenter renouans. *Aliud.* Cataplasmati vulgari & vsitato ex caricis elixo adiecta hyoscyami folia incoquito, ac vti tor.

Ad Feruidas Inflammationes.

Lentem palustrem ex aceto & rosaceo imponito. *Aliud.* Vlmis folijs expressum succum, & coctum, cum cerato illine.

Ad Excedentes & Veluti immensos Ardores.

Lactucæ folia ex acie cum pane trita, applica, frequenter remutans. *Aliud.* Coriandrum viride tritum cum polenta vt emplastrum admoueto.

Ad Laxas Inflationes.

Salem ex oleo diligenter tritum succida q̄ lana exceptum vt emplastrum impone.

L I C E T commentarij huius initio de cholera dicto vitio, & mortiferis pharmacis, de q̄ serpentibus qui ic̄u morsu ve venenum relinquunt, & sanguinis etiam fluxu, sit non nihil dictum nobis, non fuerit tamen à ratione alienum paucis adhuc de ijs agere, licet ad alium locum hæc pertineant.

Ad Sanguinis è Naribus fluxum.

CAP. 24

T Riticeam farinam porri succo maceratam tortili linamento adfrica, perfluenti q̄ nari inferito. *Aliud.* Tortile linamentū aceto quā acerrimo madens ad lucernam comburito, & mananti nari inferere. *Aliud.* Alinini fimi, etiamnum calentis succum, mistum cum æquali aceti portione, & tanta farinæ triticeæ, vt sordium habeant consistentiam, linamento adfricato: quod affectæ nari imponito. Iuuant ad hæc tam pedibus quā manibus iniecta vincula, nec non refrigerare caput. Magnas præterea cucurbitulas præcordijs adfigere, iecoris quidem, profluente dextranare sanguine: sicuti sinistris siue lieni, affectæ nare sinistra. Cæterum de sanguinis per os reiectione, dictum nobis antea est.

De Fluxu Sanguinis è Vulnere.

CAP. 25.

Sanguinis è vulnere effluxum curant myrrha & thus trita, & ex ouiaquato pro vulneris ratione impolita. *Aliud.* Vite ranæ cinerem vulnere inspargito. Superponenda porro his spongia ex oxycrato, & frequenter siccitatis ratione mutanda. *Aliud.* Recentem ac calidum adhuc finum alinum cataplasmatiss modo superdato: quod si aridus fuerit, dissolue pauxillo aceto.

Ad Choleram dictum affectum.

CAP. 26.

Si sine febre, alia q̄ vacuatione eueniat, da buccellam panis ex vino misto, da q̄ potu frigidam, & cucurbitulas magnas medio adfige ventri. Quod si is, qui affligitur quadrato sit habitu, in frigidum inducito lauacrum, in quo diutius permaneat. Porro cibus conuenit adstringentis facultatis, vt sunt ex autumnalibus fructibus poma tam cotonea quā punica.

Ad Pharmaca Mortifera.

CAP. 27.

De lethalibus medicamentis, neq̄ indistinctius hic agere tutum satis est, neq̄ parui laboris de omnibus singulatim, de q̄ sequentium ad hæc symptomatum siue accidentium curatione: ne interim referam adiunctam huic rei male faciendi occasionem, præsertim ijs, quibus male facere volupe est. Proinde ea hic tantum tradam, quæ in communi ferè creduntur conferre ijs, quos lethalia eiusmodi medicamenta deuorasse contigerit. Principio igitur iubendum, vt hi tales cōfestim vomant, epoto prius hydrelæo, id est mistis aqua & oleo, & plurimo & frequenter. Deinde varijs diuersis q̄ sunt cibandi ferculis: à quibus non ita multo post rursus vomant, iubeto: sic enim aut simul reijcietur mortiferum medicamentum, aut saltem infringetur ipsius virtus. Quod si post hæc ventriculus videatur à vomitu veluti aduri, hydrorhodynnon, id est aquam rosaceo oleo mistam, potui offerto: dehinc vomant, rursus iubeto. Quod si vsus postulare videbitur, dabis theriacen ex vino, aut iuniperi baccas numero nouem, & rute trita viginti folia, aut herbe chamæpitios. A somno in totum abstineat, præcipito, extremarum q̄ partium vti tor frictione. Quod si malum videbitur tibi altius in ventrem nunc descendisse, quod ex mordicatione iritatione q̄ inferioris ventris cognosces, instandum acrioribus clysteribus: cuius generis sunt, qui ex melle copiosiori, & aphronitro constant, aut alio quouis, cui iritandi ventris sit facultas. At strangulationi à deuoratis fungis medetur nardus, ex oxymelite pota. Idem potest gallinarum domesticarum finum, ex oxymelite. Cæterum suffocationi ex concreto in ventriculo lacte, auxiliatur potum cum vino coagulum.

Galeno



GALENO ASCRIPTVS LIBER
DE MEDICINIS FACILE PARABILIBVS
AD SOLONEM MEDICORVM PRINCIPEM

Iunio Paulo Crasso Patauino interprete.

C E N S V R A

Liber, cuiuscunq; is fuerit, non omnino inutilis.

GALENVS CLAVDIANO SOLONI ARCHIATRO S.

Ex translatione
reteri.



Via petijsti, vt de facile parabilibus remedijs ad te scriberẽ, Solon charissime, gratum tibi fore putavi, si quæ mihi per experiẽtiam cognita sunt, scriberẽ, & ad te mitterẽ, à capillis vsq; ad pedes procedens, vt homo facile possit ipsa adipisci. Incipiamus igitur primo à capillis.

De Tincturis Capillorum.

CAP. I.

¶ *Vnctiões Capillorum*, vt etiam cani fiat nigri. Scoriam ferri, & plumbum, coque in aceto vsque ad tertiam partem, & illine: interim tamen ne tange capillos oleo. *Aliud.* Radices capparis tere, & coque in lacte asinae vsq; ad tertiam partem, & vttere. Hoc serua, quia prorsus denigrat pilos capitis. *Aliud.* Testudinis marinae fel dissolue cum oleo,

& vnge capillos. *Aliud.* Racemulos in nucibus pendentes in oleo coque, bitumen liquidum adde, & vnge. *Aliud.* Plumbum cum oleo reponere in vase plumbeo, & eo vnge capillos. *Aliud.*

* Melongiam terrestrem combure, & cum oleo dissoluens, vnge capillos, et dimitte per totam noctem. ¶ *De prohibenda Canitie.* Accipe colocynthidem, & perfora eam, & purga ipsam bene ab ijs quæ sunt intus: deinde imple oleo laurino, & adde semen hyoscyami non contritum: dimitte vnũ diem, & vnge semel in anno. ¶ *Ad Dealbandos Capillos.* Stercus hirundinis terens cum felle tauri, vnge. *Aliud.* Verbasci albi combure florem, & extingue aceto, & leniens vnge. ¶ *Vt Flauī fiant Capilli.* Alumen coque in aqua, & madefacito capillos duobus diebus: &

* *Aliter stratiotem.*

¶ *Post hoc laua cum aqua, in qua est dissoluta fex vini combusta.* *Aliud.* Decocto lupinorum amarorum madefacito capillos: vel ipsos lupinos amaros crudos terens, & permiscens cum aqua, illine. *Aliud.* Facem vini permisce cum sordibus balnei ad spissitudinem cerati, & vnge caput, quando vadis dormitum. *Aliud.* Folia ligustri infunde in succo lanariae, & vttere hoc diluto. *Aliud.* Rubiam, stoechadem citrinum, polytrichum, absinthium & lupinos, conijce in aquam, reponens in vase vitreo: & dimitte per nouem dies, mouens bis in die. Tempore vero vsus accipiens dictæ aquæ quod sufficit, mitte in eam spongiam, & dimitte vt imbibat aquam: & quando fuerint desiccati capilli ea aqua prius irrigati, ablue cum aqua calida & sapone.

De Casu Capillorum.

CAP. 2.

Ad casum capillorum, vltimi radicem, et foliorum manipulum j macera in iij cyathis aque, & vnge: & post hoc vnge cum oleo. *Aliud.* Sambucum cõburens, misce cū cerato, & vnge. *Aliud.* Aloen permisceto cum vino nigro austero, & vngito. *Aliud.* Myrrham & ladanum illine cum vino aut oleo myrtino. *Aliud.* Accipe apes multas, & combure, & misce cum oleo, & vnge cauens ne vngas ea, quæ sunt circa. *Aliud.* Nigellam accipiens combure, & miscens cum aqua illine: maxime autem hoc confert supercilijs. ¶ *De Capillis, qui Cadunt ijs, qui reficiuntur ex aegritudine.*

Septima Classis.

xxxxxxx

Ladanum

DE MEDICINIS

Ladanum cum vino & oleo rosaceo coquito, ad spissitudinem cerati, & vngito. *Aliud.* Radicem Emori decortica, & combure, & coque ut dictum est. *Aliud.* Pulicariæ semen terens, pone in lixiuio, & laua caput: deinde coque lentiscum, & collue caput. *¶ Ut in loco Combusto ab igne oriatur Capilli.* Folia ficus terantur, & in farinam vertantur, & apponantur loco. *¶ Psilothrum.* Cerebrum vespertilionis terito cum lacte mulieris, & illine. *Aliud.* Fel thynni misce cum gummi hederae, & illine. *Aliud.* Accipe sanguinem recentem leporis, & adhibe. *Aliud.* Sanguinem cerui permisce cum aceto, & obline. *Aliud.* Semen vrticæ sylvestris accipe, tere cum oleo, & frica ipso locum. *Aliud.* Vespertiones plures viuos pone in bitumine, et dimitte, ut putrefiant, & vnge quem vis locum.

De Alopecia.

CAP. 3.

Murem combure, & tere, & puluerem permisce cum adipe vrsino, et vnge prius fricans locum capæ alba. *Aliud.* Cantharidas combure, & tere, & puluerem permisce cum melle, & vngito. *Aliud.* Folijs ficulneis frica diligenter, deinde vnge cum adipe vrsino. *Aliud.* Spumam maris combure, & terens permisce cum oleo, & vnge. *Aliud.* Ranam habentem longa crura combure, & terens misce cum pice liquida, & vnge locum præfricando ipsum. *Aliud.* Equi fluuiialis pellem combure, & vnge locum. *Aliud.* Sanguine testudinis marinæ vnge locum. *Aliud.* Accipe muscerdam & tere & permisce cum aceto, ad mellis crassitudinem, & vnge præfricato loco. *Aliud.* Asphodelum tere, & permisce cum aceto, vel vino, & præradens locum frica folijs ficus vel panno aspero, & illine. *Aliud.* Radicem canne vrito, & permisceto cum adipe vrsi, & vngito. *Aliud.* Tithymallum tere, & vnge locum.

De Porrigine.

CAP. 4.

Cimoliam perfunde aqua, & misce succum betæ, & vnge: deinde laua: post accipe thus masculum, tere, & permisce cum vino & oleo atque vnge: sequenti vero die herbam pediculari ex oleo illinito. *Aliud.* Accipe nitri, fecis vini, mirobalanorum, singulorum libram: herbæ pedicularis sesquilibram: permisce cum oleo antiquo, & vnge. Humidas autem porrigines aqua salsa, vel decocto lupinorum, ablue: est enim vsu pbatum. *Aliud.* Laua caput succo portulacæ. *Aliud.* Vnge caput succo betæ cocto vel crudo permisto cum melle. *Aliud.* Cimoliam permisce cum decocto fœnigræci, & impone. *Aliud.* Radicem cucumeris sylvestris coque, & eius decocto lauato. *Aliud.* Scillam in fornace obrue: ubi fuerit mollis, exprime succum, & ei parum olei admisce & vnge.

De Psyracis & Exanthematibus.

CAP. 5. G

Psyracia sunt parua exanthemata facta in capite, similia vesicis emineñtibus in superficie. Exanthemata vero sunt vlcerationes factæ in summa cutis subrubicundæ & asperæ. Curantur autem sic. Accipe lomentum, & funde in vinum, & appone ut ceratum. *Aliud.* Fac ceratum ex ligustro & cerussa, & illine. *Aliud.* Accipe amyli, cerussæ, aluminis, foliorum viridum rutæ, singulorum drachmas quatuor: permisce cum aceto, & oleo myrtino, & vnge. *Aliud.* Accipe spumæ argenti, cerussæ, singulorum sesquiunciam: sulfuris signem non experti drachmas octo: dilue oleo myrtino, & vnge.

De Achoribus & Fauis.

CAP. 6.

Achor est affectio oriens in capite, perforans cutim subtilibus foraminibus, per quæ exit sanies parum viscosa. Fauis autem facit foramina maiora continentia humiditatem melli similem. Curantur autem sic. Abrasum caput foue bis aut ter aut sæpius aqua calida decocti myrti, aut rubi, aut lentis, aut lupinorum amarorum, aut radicis asparagi: cum autem effluet multa sanies capiti, folia salicis, aut lentem coctam in aqua imposito. Confert etiam ante caput sulfure & parietaria & sapone oblinere. *Aliud.* Accipe lithargyri drachmas xvj, foliorum rutæ drachmas viij, herbæ pedicularis drachmas quatuor, atramenti lutoriij drachmas duas: aceto & oleo myrtino H excipito.

De Tremore Capitis.

CAP. 7.

Stœchadem da bibendam ex aqua. *Aliud.* Artemisiæ succum parua habentis folia permisce cum oleo rosaceo, & vnge neruorum origines. *Aliud.* Spinæ albæ semen bibendū exhibe. *Aliud.* Castoreum aqua dilue, & bibendum præbe.

De Doloze Capitis.

CAP. 8.

Cornu cerui combure, & tere, & permisce cum oleo rosaceo, & vnge frontem ac tempora. *Aliud.* Cerebrum vulturis terens, illine caput, & tempora. *Aliud.* Psyllium fundens in oleum rosaceum permisce, & vtire: hoc autem confert & ad hemicraniam. *Aliud.* Syracem liquidam permisce cum oleo, & applica. *Aliud.* Oniscos id est asellos, sub hydryis degentes, coque in oleo, & vnge caput. *Aliud.* Flores mali punici, vel ipsa balaustia, coque in vino, aut aqua marina vsque ad consumptionem tertiæ partis, & tere, & cum cerato permiscens admoue. *Aliud.* Pulegio & fœniculi radice cum farina hordei line tempora. *Aliud.* Mentam aut sinapi cum aceto permisce, & madefac tempora bis in die. *¶ Ad Dolorem Capitis & Temporum.*

Accipe

A Accipe opij magnitudinem fabæ, & pulegij partes sex, & lentisci: & excipe aceto ac oleo rosaceo, & vngito. *Aliud.* Rumicem acidum & gallam tere, & vnge tempora & frontem. *Aliud.* Castoreum dissolue cum oleo rosaceo & aceto: vnge frontem & tempora. *Aliud.* Iridem siccam & cardamomum minus aceto resolue, & line capillos, sicut faciunt mulieres cum inungunt eos. *Aliud.* Succum peucedani oleo irino diluens imponito. *Aliud.* Hirundinū nidum ne permittas in terrā cadere: & lutum, quod est stercorei mistum, capito: et aceto in vase lineo subigito, & illine frontem. *Aliud.* Gummi hederæ aceto & oleo rosaceo diluens vnge tempora. } *Aliud remedium.* Caprinum stercus ex aceto & oleo rosaceo terito, fronti illinito, & fascia deligato: id facito multo mane, ac vespere, & caput dolentem sanitati restitues. *Aliud.* Euphorbio & atramento scriptorio vna cum aceto detritis frontem illine. *Aliud.* Puer venerem non expertus in limine agroti ianue mingito: tu vero acetum infundito, atque vtrumque in vnum super limen commisceto, donec sordium acquirat crassitudinem: ac eadem illa hora fronti imponito. *Aliud.* Siqua ex partu capitis dolore tentetur, cinerem cum aceto admiscens fronti superdato. *Aliud.* Hederæ lachryma cum aceto & rosaceo mista tempora & frontem obline. *¶ Epithema ad idem.* Nasturtium cum aceto & rosaceo misceto ad cerati crassitudinem: imponito q̄ ita, vt à tempore ad tempus pertineat: illi-
B co dolorem auferes. *¶ Ad eos, qui ex Altera Capitis parte dolent.* Acaciam roseo cerato excipiens vtere. *Aliud.* Cichorium impositum & capitis dolores, & exustiones à Sole, efficaciter tollit.

Ad Comitalem Morbum.

CAP. 9.

Icĭnum, hoc est miluum, in olla cremato viuentem: cinerem q̄ propinato, & sanabis. *Aliud.* Eiusdem iecur exustum & tritum ex aqua potui dato. *Aliud.* Alini stercus frictum cochleariorū duorum pondere quotidie exhibeto, atque agrotus morbo liberabitur: id remedium longa experientia comprobatum est. *Aliud.* Vrina verris in fumo arefacta ex oxymelite pota bene facit: esto autem vrinæ portio ad ægyptiæ fabæ magnitudinem: sed optima est apri. *Aliud.* Hircinum stercus ad morbum comitalem proficit, si ex eo quindecim globuli summum exhibeantur. *Aliud.* Agrestis maluæ succum agrotus per triginta dies ieiunus bibat, & curabitur. } *Aliud.* Mustellæ iecur aridum ex aqua propinato: id facias autem, cum agrotus mox est casurus. *Aliud.* Parum olei leporis coagulo infundito, & pilulas facito: ex quibus modo vnam, modo duas præbeto. }
Aliud. Mustellæ sanguine oblinito, ac mustellam pedibus capite q̄ abiectis edendam apponito. Pariter & strumis exhibita mustella prodest. *Aliud.* Murem dissecans per Lunę silentium, iecur
* C ipsius extrahito: & assum agro, vt comedat, exhibeto. } luvat etiam oxymel scilliticum, et luliani, & theriaca. } *Aliud Odorabile ad Comitalem affectum.* Tithymallum cum aceto & polenta terens placentulas conficito, olfaciendas q̄ laboranti offerito, & non cadet. } Confert etiam odorari peucedanū & picem. *¶ Suffimentum Comitalem morbum detegens.* Lapidem gagaten suffito, ipsum circumuelas, ne odor dissipetur, cadetq̄, si re vera comitali morbo affectus est. *¶ Potiones, per quas Diagnoscitur, Vtrum Comitialis morbus Sanabilis sit.* Acaciæ drachmam aqua diluens bibendam dato: si vomuerit, insanabile malum est: sin autem febricitauerit, potio ipsi prodest. *¶ Ad Sidere percussorum curatio.* Alini lotio ipsos consperge, & sanescunt. *¶ Si Comitiali morbo humi prostratum confestim excitare vis.* Thymum aut pulegium conterens eius naribus admoueto. *¶ Materiam per Nares detrahentia.* Anagallidis cœruleum habentis florem succum naribus instillato, iubeto q̄ supinum agrotum spiritum adducere: hoc enim omnibus ex capite laborantibus opitulatur. } *Aliud.* Succum hederæ albæ naribus instillato. } *Aliud.* Nigellæ expressum succum cum mulla instilla. Ad eundem modum & iride veteri oleo admisto vtor. *Aliud.* Betæ radice succum in nares infunde, & caput purgat.

De Aurium vitijs, primumq̄ de illis quæ in Auditorijs sinibus fiunt.

CAP. 10.

D Vino diluto, aut mulla, aurem subluo: ac lycium in oui putamine macerans infundito. *¶ Ad Inflammationes, & Dolores.* Allij capitula conterens cum oleo in olla calefacito: oleum q̄ in aurem infundito, & dolor sedabitur. *¶ Ad magnum Dolorem.* Anserinum iecur salsum cum nardo eliquato, & repurgans in aurem indito. *¶ Ad Aures Sanæ manantes.* Liquidum alumen aqua diluens in vitreum vas conde, & maceratum instilla. *¶ Ad Aures Purulentas & grauius Dolentes.* Porri succo melle diluto vtere. *Aliud.* Opium dulci vino eliquans ac tepefaciens in aurem iniice. *Aliud.* Cedri lachrymam ex pauca nardo immittito. *Aliud.* Mel & oleum vna in vasculo prius tepefacta instillato. *¶ Ad Teredines & Sanem.* Alumen scissile cum aceto & dulci vino elixum ad mellis temperaturam, infusum, tam in recentibus quam antiquis vitijs efficax est. *¶ Ad Sonitus Aurium intra seipsas & acres Dolores.* Cedri lachryma cum melle admista, et infusa prodest. *Aliud.* Aloe, quæ iecoraria dicitur, cum mulso ad sordium crassitudinem temperata, & infusa benefacit. *Aliud.* Vulpis adeps eliquata infundatur. *Aliud.* Nardum tepefactum infundito. *Aliud.* Cassiam ex rosaceo iniicito. *Aliud.* Blattæ domesticæ oleo rosaceo inferuefactæ opitulantur. *¶ Ad Dolores paulatim ingruentes.* Lanam succidam in aceto feruefacias, exprimito q̄ humorem in aurem: deinde foramen summum, ipsius lanæ succidę portione integito. *Aliud.* Mali punici im-

Septima Classis.

xxxxxxx ij

maturi

DE MEDICINIS

maturi succo cum melle vtere: aut lentisci, aut herbae muralis, aut ligustri, aut rubi: horum cuiusque succum aut per se aut melli admiscens & elixans, vtere: pariter & plantaginis, aut lactucae, aut sanguinalis, succo vtendum est. *¶ Ad Dolores absque Ulcere.* Sulfur ignem non expertum per calamlum naribus in suffletur. *Aliud.* Papaueris lachryma muliebri lacte temperata instillatur.

¶ Ad Grauem Auditum. Ablinthium in aqua decoquens, aurem decocto eluito. *¶ Ad Surditatem naturalem.* Caprae nuper iugulatae cornu caprino lotio impleto, & ad fumum per dies nouem suspēdito deinde vtere. *¶ Ad Sonitus ex profundo.* Acetum, et oleum rosaceum, rutam, et cuminū, cum melle macerans, vtitor. *¶ Ad Tinnitus Sonosque repente exortos.* Acetum acre tepesactum in aurem demitte. *Aliud.* Vitis albae, mellis, veratri albi, & rosei olei portionem, in vnum permiscens in auricula dato. *¶ Ad Aurē Dolerentē & Sanie manantem.* Acetum, mel, roseum quod permisce, & tepesactis vtere. *¶ Ad Acerbos Dolores.* Subactam oleo euthypaston adipem infundito, & spongia locum occludito: bene facit & ad neruorum morbos cum vulpino adipe atque suillo aqua portione permista. *¶ Ad Dolores Aurium ac Phlegmonas.* Hastulae regiae radicem mundato, & in oleum vase vitreo contentum demittito: & per continuos quadraginta dies sub Canis aestu insolato: deinde vtitor. *¶ Ad Vlceras Aures & purulentas.* Lacertas pusillas venatus mundo oleo eliquato, atque ita in aurē demittito: & vermes, si in aure fuerint, interficies. *¶ Ad Aurium Vermiculos: & ad ea, quae in aurē subierunt.* Capas & hyssopum in lotio vetere conterens instillato. *Aliud.* Partis interioris cucurbitulae syluaticae seminum, aluminis aegyptij, pares portiones in cedrino oleo macerans infundito. *¶ Ad Sordes Aurium educendas.* Lanam vnguentaria glande madidam in aurē demitte, & ipsam sordium plenam inuenies. *Aliud.* Nitrum tenue in aurē conijcito, acetum quod instillato: super lana mollis addenda est, & per noctem relinquenda: sequenti vero die calida aqua et oleo aurē eluito. *¶ Ad Aurē Dolerentē.* Salis flos cum roseo & aceto infundendus est. *¶ Ad Sanie Aurium & magnum Dolorem.* Nitrum rosaceo dilutum in aurē demitte. *Aliud.* Album veratrum ex vino, aut aceto, cum alumine infundendum est. Radicis praeterea calaminthae succus aceto maceratus instilletur. *¶ Aliud ad Diuturna Vitia.* Lycij & mellis aequas portiones commiscens vtere. *¶ Ad Inflammatas Aures.* Capitulum papaueris cortices contere, & tertiam partem cum hordeacea farina permisce: & in dulci diluto incoque, cataplasma quod confice. *¶ Ad Aures Sanie manantes & Dolentes.* Medullam vituli liquefaciens instilla. *Aliud.* Scoriam ferri terens in aceto acerrimo instilla.

Ex eralatione
veteri.

Ad Strumas & Parotidas.

CAP. 11. G

Strumas communi quidem curatione discutiunt ea quae scirrhus, propria vero ita. Farinam lupinorum amarorum coque in oxymelite, & illine. *Aliud.* Stercus bouis aut caprae coque in aceto, & appone. *Aliud.* Calcem melli aut oleo aut adipi porci permisce, & appone. *Aliud.* Farinam iridis, & stercus columbi, coque in vino, & adhibe. *Aliud.* Accipe axungiae veteris, seminis hyoscyami, picis, olei antiqui, stercoris citrini gallinae, singulorum pares portiones: commisce, & admoue.

De Morbis Oculorum, & primo de Ophthalmia incipiente.

CAP. 12.

Succum mentae infunde: resoluit enim, sed melior est sanguis columbi. *Aliud.* Foeniculi succum exprime, & vtere: antiquus autē est melior: permisce autē eum aque, & vtere. *Aliud.* Ex ruta recente succum exprime, & pone in pyxide aeris rubri, & vtere. *Aliud.* Ex coctanis coctis, & farina hordei, & vino albo cataplasma facito. *Aliud.* Folia papaueris & cortices granatorum cum poliline hordei superdato. *Aliud.* Rosas coctas & tritas impone. *Aliud.* Decoctum meliloti infunde. *Aliud.* Ex folijs coctani tritis fac cataplasma cum vino et polēta. *¶ Ad Vngulam.* Dicitur vngula morbus oculi, quando cornea aliquando quidem superficietenus, aliquando vero in profundo, pus continet: & assimilatur paruae vngulae, quare morbus ille vocatur vngula. Ad moderatas ergo vngulas confert mulla, & succus foenigraci, & collyrium quod fit ex thure. Ad maiores autem accipe aloes, myrrhae, croci, singulorum, partem i: vini partes iij, mellis partes vj: dissolvas cum modico vini, deinde aloen & myrrham: deinde infunde mel: & vnies, in vase vitreo reconde: & vtere bis in die, expurgat enim, carnem gignit, & solidat. *¶ Ad Sugillata.* Sinapin tere, & appone cum cerato. *Aliud.* Ossa sepiarum tere subtilissime, & permiscens aceto illine noctu, tollit enim ea. *Aliud.* Radicem cucumeris agrestis melli commisce, & impone. *¶ De Liuoribus Oculorum.* Hyssopum tritam liga in panno, & infunde in aqua calida, & tange liuores fomentum faciens. *Aliud.* Farinam iridis melli admisce, & adhibe. *Aliud.* Cyminum tritum admisce lacti mulieris, & appone: vel origanum appone similiter. *Aliud.* Erucae semen terens cum felle bubulo imposito. *¶ De Pterygijs.* Pterygium dicitur neruosa supernatae oculi membranae eminentia, incipiens ab angulis & procedens vsque ad corneam: quando vero amplius augetur, cooperit & pupillam. Magna igitur & diuturna pterygia per chirurgiam inciduntur: recentia vero & moderatae magnitudinis iuuant aë combustum vel atramentum futurium

Arium cum adipe porci. *Aliud bonum.* Atramenti sutorij partem j, gummi arabici partem mediam: dilue vino, & vnge. Quidam autem hepar capræ melli miscentes inungunt. *Aliud.* Accipe Lycium & ligustrum, & cum aqua fac collyrium, & illine. *¶ De Vlcenibus Oculorum & Albuginibus.* Vlcera, quæ fiunt in oculis, quæ quidem sunt superficietenus, nephelia nominant: quæ vero profundum petunt, albugines. Nephelia ergo succus anagallidis expurgat, & succus centaurij minoris cum melle. Diuturna vero extenuat cedria, & æs vltimum solum dissolutum aqua in modum collyrij. Albugines autem iuuat nitrum dissolutum diligenter oleo, & illitum. *Aliud.* Accipe succum dracunculi et misce cum melle crudo, et vnge. *Aliud.* Felle hirci confrica oculum. *Aliud.* Os sepia combure, & dissolue cum melle, & impone. *Aliud.* Ex stercore lacertæ faciens collyriū cum aqua indito. *Aliud.* Felle canis marini vnge, vel raphani succo, vel felle galli. *Aliud.* Sumito succum malorum granatorum, & pone in vase terreo, & contege panno, & ex pone Soli, donec habeat mellis crassitudinem: & ei misce mellis tantundem: & serua, quia inueteratum valet magis: & cum it dormitum patiens, vnge oculos. *Aliud.* Fel leonis cum melle indito. Si vero puer paruus habet albuginem, mater infantis mandat ammoniacum, & insufflet in oculum: similiter vngat oculum mēitruo alicuius de cognatione sua: & similiter mater eius incidat paruum digitum suum, & sanguine, qui effluerit perfundat oculum. *¶ Ad Caliginem & Nebulas Oculorum.* Illine oculos succo foliorum dracunculi. *Aliud.* Succum betonica misto vino calido instilla. *¶ De Hordeolo.* Aqua decoctionis hordei foue oculos, vel cera alba. Vel accipe muscas, & abscinde capita earum, postea reliquo corpore frica oculum. *¶ De Madarosi.* Madarosis & Milphosis est casus pilorum genarum. Curantur autem his. Accipe nucleorum palmularum combustorum drachmas tres, spicæ drachmas duas: tere, & vtere. *Aliud.* Stibij albi, piperis, ana drachmam vnam: spicæ drachmas tres. *¶ Aliud faciens ad Casum Pilorum Superciliorum.* Auellanas combure, & permisce cum adipe vrsi aut capræ, & vnge. *¶ Aliud quod etiam confert ad Alopeciam Barbae.* Alterci drachmas duas, muscerdæ drachmam, polytrichi drachmas duas, olei irini cyathos quatuor: tere & permisce oleo, & præfouens vngito. *Aliud.* Vernationem anguis combure, & insperge: facit enim nasci pilos. Vel nigellam tere, & fac similiter. *¶ Ad Supercilia Pilosa.* Origanum combure, tere, & applica: prius tamen euelle pilos. *Aliud.* Lacertam viridem coque in oleo, & postquam euulseris pilos, vnge locum. *Aliud.* Chamæleontis seu chamæleæ radicem permisce cum sanguine ranæ, & vnge locum. *¶ Ad habentes Oculos Glaucos.* Glaucos mulierum oculos nigros reddit hyoscyami flos caruleus siccatus in umbra, & tempore vsus permistus vino austero & illitus. *¶ Ad Suffusiones.* Theriacam, quæ fit ex viperis, permisce melle sine fumo, & impone. Conferunt etiam caput purgantia, & purgatio cum hiera, & fomentum cum decocto fœniculi, & sagapenum, & helleborus albus cum melle appositus, vel mel cum succo fœniculi. *¶ Ad Aegilopes.* Aegilops est abscessus paruus inter magnum oculi angulum & nares: qui si negligatur, scinditur vsque ad os: & dicitur ægilops, ante, quam scindatur. Huic confert glaucium & crocum simul cum succo perdicij appositum: oportet autem frequenter ea permutare. *Aliud.* Conchulas cum testis suis tere, & appone. Aliqui vero miscent & aloen, vel myrrham. *Aliud.* Fel porcini sicca, & appone. *Aliud.* Ex perdicio cataplasma facito. *Aliud.* Ex ægilope herba cataplasma impone. *Aliud.* Portulacam & thus masculum appone: prius tamen ea manducabis ieiunus. *Aliud.* Caluariam hominis tere, & appone. *¶ Ad Nyctilopas.* Hepar hirci alba, & vnge liquore qui defluit, oculum: iuuat enim duodecies illitus. *¶ Ad Pediculos Oculorum.* Aqua marina tepida foue.

De Affectibus Narium, & primo de Polypo & Ozena.

CAP. 13.

D Atramentum sutorium terens ex aceto illine. *Aliud.* Corticum granatorum drachmas xvj: fellis tauri, amomi, myrrhæ, calaminthæ, marrubij, ana drachmas viij: croci, drachmas ij, ellebori albi drachmas ij: vtere sicco. *¶ Ad Factorem Narium.* Accipe amomi, myrrhæ, rosarum siccarū, pares portiones cum oleo nardino, & vnge: confert autem & vnctio cum hedychroo magmate. *¶ Ad Vlcera Narium.* Capelithargyri drachmas iij: rutæ recētis, aluminis scissi, ana drachmas ij: dilue oleo myrtino & aceto. *Aliud.* Accipe cerussæ, drachmam vnam, lithargyri drachmas iij: scoria plumbi, vel plumbi combusti, drachmas iij: omnia lauentur & excipiantur oleo myrtino. *¶ Ad Extrahendum Sanguinem e Naribus.* Florem graminis impone. *Aliud.* Rubiam cum oleo accipe, & vnge nares. *¶ Ad Fluxum Sanguinis, e Naribus.* Corticem oui combure, & accipe partē vnā, & gallæ partem mediam, & insuffla. *Aliud.* Lycium impone. *Aliud.* Asini sterces comburēs insuffla cinerem eius: aut exprimens insilla succum. *Aliud.* Lapidem molarem candentē extingue in aceto, & olfaciendum præbe. *Aliud.* Thus masculum & aloen albo oui excipe, & fac linamentum, & impone, addens pilos leporis. *Aliud.* Cucurbitulam magnam affigito hypochondrio e regione naris patientis. Oportet autem & ijs, quæ astringunt & prohibere possunt impetum sanguinis, vti. }

Septima Classis.

xxxxxxx iij

Ad Nares

DE MEDICINIS

Ad Nares Vlceras, & Polypus, & Ozenas. Spuma nitri attinge. Et ad spiritus odorem cōcilian E
 dum, albæ violæ florem non dum ex coliculo delapsum lege: tere q̄ ex aqua, donec mellis crassitu
 do fiat. *Aliud.* Æruginē ex melle decocta locum attinge. *Ad Interiores Phlegmonas.* Adipe an
 ferino cum porri solani q̄ succo æquis portionibus diluto interdū obline. *Ad Narium Vlcera*
cum duritie. Plumbum tritum vino puro macera: myrtē q̄ olei, quod satis est adde, ad mellis spiss
 itudinem. *Aliud.* Æris squamma ex melle decocta vtē. *Sanguinem per Nares euocantia.* Men
 tam excipiēs melle, & collyrium faciens, in nares mitte. *Ad Profluuium Sanguinis ē Naribus.* Ru
 tam excipito oleo excipito, & intra nares conijcito. *Aliud.* Gummi ac thus contrita & aceto liqua
 ta in nares da. *Aliud.* Cinerula cypria cum succo porri temperata bene facit. *Aliud.* Spongiā
 vstā pici admistā, & arefactā, linamento insperā in nares pellito. *Aliud.* Acuti iunci flo
 rem naribus imponito. *Ad Sanguinis Eruptiones, quæ Suppriminequeunt, præsertim cum diutius febric
 itantibus sanguis effunditur.* Pyriōn imponito non nunquam aridum, non nunquam linamentum
 illitum: & crassitudinem cauis nasi respondentem faciens, ita immittito: iisdem & nares & tempo
 * ra & frontem illinito. *Aliud.* Diphryges vstū, et ex aceto tritum superimponē. *Aliud.* Lanā
 ouialbo madentem admoū. *Aliud.* Lanā herbæ sanguinalis aut solani succo inbutā in na
 res dato. *Aliud.* Ruta ex aceto trita circumponenda est, & suffiēda. Vtendum præterea est re
 primere cohibere q̄ sanguinis impetum valentibus: Vt cicutā naribus suffito, odorem q̄ æger
 attrahito: nares etiā digitis comprimito: aut cerato, aut alio quopiam diligenter occludito: quin
 etiā penis extremum papyro deligato: in mulieribus vero, manimarum papillas similiter. Item
 refrigerare potentibus frontem caput q̄ oblinito, & conspergito. Præsentissimum remedium est
 capiti cucurbitulam affigere: vel etiā frontis venā soluere. Sternutamenta quoque plerunque
 sanguinem reuocant. Aut herbā buglosson, aut alini finum ex aceto in nares conijce. *Ad*
 * *Sterentes.* Anethum capiti clam subijcito: id & profiliētibz ex lectulo remedio est. *Ad Pun
 ctū & Aeram vocatā absq; cicatrice & Vlcere.* Nitro locum detergens resinā terebinthinā super
 dato, & per dies quinque dimittito: mox locum soluens puncta scriptorio specillo perforato:
 deinde thus nitrum ac mel pari modo mista, vt cerati crassitudo sit, imponito: post solue, & ablue.
Aliud. Ex trito veratro cum pane, aut ex acido lacie per se, cataplasma facito. *Aliud.* Fici trito
 cortice illine. *Aliud.* Vuam taminiam, in cataplasmati modum imponito.

Ad Vitiligines, Ephelidas, Lenticulas, & Alias id genus Faciei affectiones.

CAP. 14.

G

Cucumeris syluatici radicis tritæ & cribratę succo faciem deterge. *Aliud.* Alcyonio ex vino tri
 to faciem obline. *Aliud.* Vitem syluestrem contusā, & vino ægyptio maceratā, & in farinā re
 ductā superdato. *Aliud.* Erucæ agrestis radice trita & ouis felle excepta vtitor, facie prius nitro
 perfricata. *Aliud.* Elaterium ex aceto terens, & ad mellis crassitudinem redigens, cerato q̄ admi
 scens inunge. *Aliud.* Cinabari ex melle faciem illine. *Aliud.* Cachrys semine trito ipsas lenticu
 las inunge, & arefactū ablue. *Aliud.* Syluatici cucumeris radicē, fici q̄ summos ramulos in ace
 to decoctos tritos q̄, imponito. *Aliud.* Veneris vmbilici radicibus ex melle contritis faciem illi
 ne. *Aliud.* Rubia ad maculas à Sole contractas & vitiligines benefacit, si ea trita ex oleo facies in
 ungatur. *Aliud.* Zōchum amarum terens, ex melle faciei imponito. *Aliud.* Anethi semen ex vi
 no vetere tritum & ad mellis spissitudinem redactū, faciei obducito, atque ita per integram no
 * ctē remaneto: sequenti mane illud remoueto, recens q̄ aliud reponito. Eodem quoque semine
 commanducato ephelidas & lenticulas vtiliter illinito. *Aliud.* Alba viola ex aqua ad eadem pro
 ficat. *Aliud.* Aphronitrum tritum cum cerato ex tyrrhenica cera confecto faciei superdato.

Ad Vitiligines & Album colorem. Alcyonium vstū melli q̄ admistū illitū prodest: eodem
 quoque cum erui farina & tritici misto quā maxime calido faciem detergito. *Aliud.* Amara H
 amygdala cortice spoliata aceto acri excipito, & cataplasma facito. *Aliud.* Ocymi semen cum gal
 linaceo aut anserino adipe tritum bene facit. *Aliud.* Fœnum græcum ex aceto tritum squammu
 las, si illinatur, detrahīt. *Ad Ephelidas & Lentigines.* Myrrha & crocum si aqua macerentur, il
 lita iuuant. *Aliud.* Purpuras, aut vocatas cerycas, hoc est buccina, expiscatus; in ollulam conij
 ce, & in furnum assandas mitte: deinde ex melle tritis vtē. *Ad Faciem albam & extenta cure
 reddendam.* Cucumeris syluestris radices in frusta diuide, & refrigera: deinde aqua elixatis ac tritis
 in cataplasma vtē. *Aliud Faciem splendidam reddens.* Ex eruo bene olente vino macerato ac
 trito cataplasma facito. *Aliud.* Tritici, quod semidalin vocant, succum exprimens, humidiorē
 partē abijce: partē illi autem, quæ subsedit, oui album commisceto ad mellis spissitudinem: at
 que hoc faciem perunctā oleo deterge. A Sole autem maculatā faciem frigida multa lauato,
 & per vnum diē facies coloratior redditur. * Violā elixans parū aluminis inijce: dein
 * de lixiūm admiscens ac terens vtē multo inungens oleo: sic enim facies grati coloris, bo
 num q̄ odorem os spirans efficitur. Cupressi atque ilicis ramenta vnā feruefaciens, decocto cor
 pus totum madefacito. *Aliud.* Thuris & pæderotis aquas portiones misce, & ex melle tere: ita
 faciem

A faciem inunge, atque integrum diem sic dimitte, deinde ablue. *Aliud.* Lini fecem melli admiscēs sub Sole iter faciurus corpus inungito, eo tamen prius nitro perfrecto. *¶ Ad impediendam Solis exustionem, & Exustam faciem sanandam.* Bulbo candido trito ex melle inungito. Quod si facies citra phlegmonem tumefacta fuerit, nigram terram ex aqua conterens superdato. *Aliud.* Alcyonio et nardo gallico simul tritis vttere. *¶ Ad Panum & Lentigines.* Dracunculi radicem cum melle in cataplasma redige: vel nigellam cum aceto, vel pentaphyli semen. *¶ Ad faciendam Faciem rubicundam.* Rubiam tere & permisce cum oleo, & vnge. *Aliud.* Bulbum amarum terens permisce cum melle, & vnge. *Aliud.* Accipe ciceris, rubiæ, thuris, myrrhæ, ana drach. ij: excipe adipe vituli, & oleo mastichino, & vnge: & post spatium absterge spongia calida. } Ex tralatione veteri.

Ad Oris Vitia & primo ad Labiorum Rimas.

CAP. 15.

Immaturam gallam tritam accipito, & resinam terebinthinam cum hyssopo & melle, atq; his perunge. *¶ Ad altiores Scissuras.* Caprinus adeps mundatus proficit. *Aliud.* Adeps anseris, & mel, & terebinthina, æquis portionibus, addito flore rosarum, hyssopo arido, & masliche, fiat in unctio. *¶ Ad Oris Halitum commendandum.* Vino vetere bene olente, in quo iris maduerit, os collue, assidue q; in ore breui tempore contine. *Aliud.* Vino paulisper os subluue, in quo serpillum maduerit. *¶ Ad Oris Tetros absq; Ulcere odores.* Non nulli meraco vino, cui myrrha admista sit, os eluunt: atq; rotundum odoratum iuncum terentes, partes oris internas perfricant: & cimoliam cū sale tritam affricant: perinde & marmore vsto cum aniso vtuntur: ita & hordeo cum sale & melle. Quidam & linteolum cremant, & vino inñciunt, atq; ita trito vtuntur, & pumice & nardo & myrrha ex melle. Semidalin quidam & irin cum melle miscentes comburunt, atq; ita vtuntur: & ex ostreis purpura & buccino cum myrrha: cum q; cubitum eunt, aceto acerrimo colluunt. *¶ Commanducant autem non nulli domum egressuri, piceæ folia, & aqua os subluunt.* Quidam præterea & anisum, aut dulcem radicē, aut irin, id q; genus alia, aliqui iter faciuri cōmanducant. *¶ Ad Oris Ulcera & putredines.* Melantheria contusa prodest. Ad eadem benefacit oleum immaturum per se aut cum melle propinatum. Prodest etiā glaucuris vocata cōtusa: eius succum ex melle & aqua paribus portionibus ad gargarizandum exhibeto. *¶ Ad Fluxum Sanguinis ab ore.* Colluatur os ex decoctione rosarum in posca, postquam erit frigida, & deglutiat. *Aliud.* Gargarizet patiens & colluat decoctione rosarum frigida, aut extremitatum vitis, aut foliorum lentisci, aut rubi, aut cytoniorum, aut vinaciorum aut rhoe. *Aliud.* Semen rose cum mastiche da ex vino adstringente bibendum, vel ex vino decoctionis rubi, aut rosarum. *¶ Ad Oris Ulcera.* Gallam in vino coquens collue os, deinde appone gallam tritam permistam cum melle, aut florem rosarum: collue etiam os decoctione foliorum oleæ. } Ex tralatione veteri.

Ad Dealbandos Dentes, Alia q; eorum Vitia sananda.

CAP. 16.

Vtuntur autem & huiusmodi quibusdam dentifricis, quæ vnā & gingiuis profunt, & dentes splendidos firmiores q; reddunt. Terram eretriada vocatam vstam tritam q; adhibent: hoc valde bene splendidos dentes reddit. Farina erui lotio subactam illine. *Aliud.* Cuniculi caput vstū cum foeniculo quā albiſſimo, sapiæ tritis ossibus admiscens vttere. *Aliud.* Cornu ceruino vsto trito q; vtitor: hoc & dentiū dolores tollit, & ex rosaceo impositum capitis dolores discutit. *Aliud.* Pulegio & sale frictio mistis ad eadem tritis vttere. *Aliud.* Outillo talo vsto ad similia vtitor. *Aliud.* Hordeo tosto & sale mistis tritis q; vttere. *¶ Diachysma, id est lauatio ad Ulcera, & Dentes titubantes infirmos q;.* Alicacabi radicē vnā cū malicorio crassiore elixā imponito. *Aliud.* Albæ populi, aut verbenacæ, radicem accipito: aut eryngij radicem vel ipsam herbam: aut polij radicem accipito: & terens apponito. *¶ Ad Concussos Dentes & dolentes.* Asini vngulam vstam tritam q; aceto excipe. et orbiculos faciens repone: ad vsum aceto orbiculum vnum liquato, dato q; ore continendum: illico enim dolorem sedat tollit q;. *Aliud.* Nigri chamæleonis decoctio si foueas, dolorem dentium curabis: id & mures necat. *Aliud.* Betæ succo si fiat collutio, confestim dolor finitur. *Aliud.* Alterci radicis calidiore decoctio si foueas, dolor quiescet. *Aliud.* Rutam, hyssopum, & myrrham, ex vino tritas ore cōtinet. *Aliud.* Si ex aceto, posca, aut vino, vbi verbasci radix incocta sit os colluatur, bene facit. *Aliud.* Ex nitro cum oleo facta collutio dolorem pellit. *Aliud.* Cupressi baccis lex vino et rosa elixis os foue. Quod si dentes omnes doluerint, cedri liquore os si collues, protinus dolori succurres. Dens molaris si doleat, maluæ vnicum habentis cauliculum radice si tangas, dolor abibit. Dentes dolentibus herbæ muralis radicem, cum balneas ingrediuntur, commanducandam præbeto: quā sub molari dente, quoad ex balneis egrediantur, retineto: & dolor euanesceat. *Aliud.* Pyrethri radícula commanducata eodem die fugat dolorem. *Aliud.* Herbæ pontitidis vocatæ radix manducata dolorem finit. *¶ Suffimentum Dentes dolentibus.* Alcyonij suffitu continuo dolor tollitur. *Aliud.* Alterci semen suffitum dolori medetur. *¶ Ut Dentes bene oleant.* Cimoliam

Septima Classis.

xxxxxxx iij

liam

liam cum sale terito, dentes q̄ fricato. *Aliud.* Dentem canis accipito, & in ignē conijce, suffitum q̄ facito: ut enim iste crematur, ita dentes confirmat. *¶ Ad Exesos Dentes.* Ad exesos autem dentes, atramento sutorio trito permistum piper accipito, aut gallam. Aut ex melle fissum alumen in cauū dentis inferito, & dolorem leuabis. *¶ Aliud.* Limacis lapidem in frustula sesami magnitudinē equā trā cōfringe, & in dentis foramen immitte: illico dolorem sedat, sed ex cera operculū facito. *¶ Aliud.* Taurinum iecur lento igne frictum, denti q̄ impositum, simul atq; tetigit, dolorē discutit. *¶ Aliud.* Testudinis vnguis in maxillaris dentis exeli foramen coniectus multum proficit. *¶ Aliud.* Fel vrsi impositum illico dolorem leuat: curat autē etiam, quoquo modo illinatur. *¶ Ad Dentes Motos & labantes.* Testudinis sanguis diu ore contentus dentes corroborat. *¶ Aliud.* Alcyonio indico ex vino trito si os colluatur, motus sistitur. *¶ Ad Dentes ex ictu Concussos.* Coralliū imposito, & satis diu contineto. *¶ ¶ Ad Dentium Stuporem.* Egrotus portulacam mandito. Aut oleo omphacino perungito. Aut amurcam olei in vase æneo ad mellis temperaturam coquito: hac enim vetusta si inungas, valde prodest. *¶ Ad Dentes Eximendos sine ferramento & absque dolore.* Fermentum denti circumdato, & paulisper relinquito: mox dentem lacertę sanguine circumfundito, & excidet. *¶ Ut Sponte Dens excidat.* Pyrethrum aceto molitum, sale q̄ per triginta dies maceratū, denti prius mundo factio circumponito. *¶ Aliud.* Artemisiā herbā ex aceto tritam obline. *¶ Aliud.* Dentem circumfustodiens, vermiculis, quas campas vocāt, in summis brassicarū aliarum q̄ herbarum folijs reperitis illine, ab alijs dentibus cauēs. Quod si inferiores dentes eximere voles, illis vermiculis vtere, qui in inferiore parte illarum herbarū reperiuntur. *¶ Aliud.* Sandaracham ex aceto tritam siccaripermite, & sicca vtiliter vti, prius sanguinem circum dentem eliciens: sic. n. paulisper dimitte, digitis ipsum eximes. Aut agrestis cucurbitulę radicem in foramen dentis conijce. *¶ Aliud.* Mœdi immaturi radicem in vmbra arefactā tritam & cretam radicibus dentis circunda: & paulo post digitis apprehende, sequetur enim. Aut æthiopica olea lachryma affectum dentem tangito. *¶ Aliud.* Lacertā agrestem arefactam, dissectam, contritam q̄ repone: cum dentē circum purgaue- ris, imposito: & paulo post attrahito, quoniam sequetur. *¶ Aliud.* Vrticę semina cum galbano mista affecto denti circumline, & protinus excidet. *¶ Ad Eximendos sine dolore Dentes.* Herbae lapae radix calefacta, & denti apposita facit, ut statim digitos sequatur. *¶ Ut Dentes digitis euellantur.* Syluestres cucurbitulas contunde, & aceto macera ad mellis spissitudinem: deinde ferramentū ad scalpendos dentes in medicamentum demitte, eoq; dentem circum scarifica, atq; os paulisper clausum haberi præcipe: deinde apprehende digitis dentem & attrahe: absq; dolore euelletur. *¶ Aliud.* Farinam ex lacte tithymalli adhibe, & hederacea folia super impone, per horam q̄ dimitte: frangetur G enim sine dolore. *¶ Ad Dealbationem Dentium.* Nitrum, os sepię, & os palmularū terens vtere. *¶ Aliud bonum.* Corallium rubrū, pumicem, ossa palmularum, ossa sepię, & salem assum terens vtere. *¶ Ad Dolorem Dentium.* Oleo lentisci non antiquo colluantur dentes. *¶ Aliud.* Colluatur os cum folijs rutę coctis ex oxymelite: vel colluatur cum aceto scillitico: vel coquatur in aceto pyrethrum & hyssopum: oportet autem humiditatem & humorem euacuare.

Ex tralatione
veteri.

De Morbis Gingiuarum.

CAP. 17.

Ad gingiuas corrosas, florum rosarum drachmas viij, gallarū drachmas iij, myrrhę drachmas ij, commisce, & appone. *¶ Aliud.* Lactē asinę gingiuas collue. *¶ Aliud.* Foliorum olea decocto os collue. *¶ Aliud.* Aceto scillitico gingiuas ablue. *¶ Aliud.* Rubiginem ferri & balaustia sicca appone. *¶ Ad Gingiuas Tumidas, & carnis incrementum.* Succū portulacę ore detine, vel aquā salitā oliuarum colymbadum, vel oleum ex immaturis oliuis expressum calidum, vel lentiscinum, vel de cotoneis. Sicca vero, quę profunt, sunt, rubigo ferri, aut æris, radix aristolochiæ, semen plantaginis, atramentum sutorium assatum, & balaustia. *¶ Ad Inflammationem Gingiuarum.* Collue decocto foliorum olea, & appone gallam. *¶ Aliud.* Coque in sapa folia olea & gallam. *¶ Ad Gingiuas De H migratas & putridas.* Confert fricatio ex facie vini vsta: abstergit enim mundat dealbat q̄. *¶ Ad Gingiuas Sanguinolentas.* Confert missio sanguinis e cephalica, & scarificatio gingiuarum: confert etiam succus hyoscyami, vel eius decoctum ex sapa, si retineatur in ore. *¶ Aliud.* Extremitates lentisci et balaustia coque in posca, et collue. *¶ Aliud.* Radicē rubi coque in vino, et os collue: vel rhum & gallam coque in vino, & vtere similiter. *¶ Ad Oris Vlcera, & putredines.* Melanteria contusa efficax est. Ad eadem proficit & oleum omphacinum per se & cum melle potui datum. Prodest & Glaucuris tusa, si ex melle & aqua pari portione eius succus gargarizandus exhibeatur.

Ad Columellę morbos.

CAP. 18.

Gallā tritam per se admovento digito oleo intinctio: aut in conchleariū iniiciens, applica. *¶ Aliud.* Spinę ægyptię semen tritū atq; aridū appone. *¶ Aliud.* Caricas cū olea folijs esui dato. Succū cyrenaicū cū sale arefactū apponito, prius gargarizatione ex aqua calida facia. Aut fissum alumē vstū diligēter admotū iuuat. Aut stellionē viteis lignis crematū imposito, et bene facit. *¶ Aliud.* Rubi * cauliculos ex melle & pice liquida maceratos circunda. *¶ Aliud.* Lapidis agerati florē admistū gar- garizandum

A garizandū dato. Aut brassicę succo admistū alumē fissum & gargarizatū mirifice pdest. *¶ V/lorum columellæ apponendum.* Misy & calcē viūā æquis portionibus resina terebinthina excipe, & subde, retinendam q; permittē: intra horas tres aufert. Item proficit ad vūæ affectum picis recrementum, quod ex Cilicia aduehitur, cochleario exceptum & subditum. Et vūæ acerbæ succus ex melle, aut prædulci vino. Dicitur autem incolumem seruare columellam, si quis vūæ acinos quotannis ieiunus deuoret: & nunquam eius partis affectus vexabitur. Iisdem præterea gargarismatis in vūlæ vitijs vtendum est, quę ad tonsillas affectas describentur. Primū atq; inter initia iube aqua calida os fouere: deinde frigida gargarizare, aut posca, aut mali punici dulcis succo ad mellis crassitudinem decocto, & oxymelite eliquato: aut posca, aut dracunculi succo gargarizet, & optime proficient. *¶ Ad Vūlām Phlegmonem patientem.* Fiat gargarizatio cum succo mali punici ex mulsā, vel cum aqua decoctionis rosarū, vel cū Diambron ex aqua calida. Confert etiam glycyrrhizæ succus cum melle appositus & terra sigillata & fructus spinæ ægyptiacę. Mitiora autē sunt hæc, gummi arabicum, tragacanthum, sarcocolla apposita. *Alud.* Fructum spinæ ægyptiæ, & sic cum appone: vel cauliculos rubi terens illine cum melle. } Ex translatione veteri.

Ad Inflammationes Tonsillarum, & Anginas.

CAP. 19.

B Id vero benefacit in tonsillarum inflammationibus. Myrteas baccas præparantes melle, & absinthiū, & dracūculum inungere consueuerunt: hoc autem medicamentū illitum, aut cum aliquo gargarizatum mirum in modū prodest. Quod si aliquæ phlegmonis reliquiæ super sint, tōsillæ q; exasperatæ sint, lacte planē calido per se, aut cum supra positorum aliquo vtendum est: aut fursuribus aqua elixis, aut mulsā, aut fursurum diluto: aut oryzæ aqua calida farinam subigēs bis aut ter, succo vtē: aut gallinę hœdī ue iusculo: aut hordeum cortice liberatum vnā cum passulis decoque: aut maluæ decocto per se vtē: aut vnā cum melle maluā elixa, aut cum lupinis & passo & vitior. *¶ Ad Tonsillarum Humores, & Anginas.* Dulcis radice succum eliquās vtē. Quod si crustę factæ sint, ad has remouendas, mulsā gargarizandum est, aut lentis decocto per se, aut cum hyssopo, aut iride. Vel etiam oliuarum salarum aqua gargarizetur. Aut croci parum & myrrhæ cum modico passi inferuescant. Aut ficis elixis hordei farinam permisce, succū q; exprimens percola, & succo vtē. Aut ficorum decocto sinapis modicum adijciens gargarizandum propina, pituitā nāq; detrahit, & phlegmonem discutit. *¶ Ad Abscessus in Tonsillis.* Aliquod ex ijs, quæ supra comprehensa sunt, proficit. Item aphronitro contrito locum tange: interdum autem & florem nitri adiunge, separat enim crustas, & abscessus attenuat, si per collutionem detur. Et lixiuio percolato marrubij succus dilutus vtiliter exhibetur: Aut ipsum marrubium in mulsā coctum: Aut rutę decoctum cum marrubio, aut per se, aut in mulsā elixum subsidio est. Item & succus gargarizatus, & erui decoctum similiter prodest: Aut misy cum galla immatura mistum: Aut myrrum liquido aluminiac melli paribus portionibus tritam miscens illine: hoc remedium non crustas solum abijcit, verum etiam antiadas à Græcis vocatas glandulas mirifice dissipat. Aut porcelli cruore manus imbuens, ter laborantis collum attinge. *Alud.* Cochleas testa nudatas in ollam inijce, deinde torreas: & in cinerem redigens, puro melle ac leni excipe, atq; perunge: vis eius incredibilis est.

Ad Interruptam submissamq; Vocem.

CAP. 20.

Bulbos duos crudos ex melle esui dato. Auxiliatur & fici decoctum cum thure & myrrha gargarizatum. Ad idem facit & sulfur ignem non expertum in ouis deuoratum cochleariorum duorū aut trium mensura. *Alud.* Accipe amygdalas amaras xx, seminis lini assi drachmas quatuor, tragacanthę aqua maceratę drachmas duas, nucleos pini triginta: melle excipe, & vtē. *Alud.* Pulegij drachmas quatuor: seminis lini, piperis, calamenti, añ drachmas duas: petroselinij drachmam vnā, mellis librā vnā. *¶ Ad eos qui propē Suffocantur.* Humanum sterces in panniculo deligatū & crematū potui dato: hoc his, qui iā strangulant opē fert. *Alud.* Et caprinū sterces cū melle & liquida pice illitum angina laborantibus summe prodest: Aut rutę succo & lacte per clysterē transmissio laborantis fauces collue: multam enim lachrymam detrahit, & malum leuat. *Alud.* Vrina assidue gargarizata sanitatem restituit: vnā vero & succum brassicę gargarizare oportet. *¶ Ad Puerorum crustas in faucibus.* Prius inungito: deinde vinum, in quo aristolochia decocta fuerit, gargarizetur: citissime curabitur.

Ad Ossa Deuorata, alia q; omnia ex gutture excutienda.

CAP. 22.

Aquæ & olei parem modum in os fundens contineto, quoad rem deuoratam eijciat. Si quis comedens aliquid deuorauerit, & suffocetur, ex eadem re, quam comedebat, particulam vtriq; auri superimponat ac super caput: res enim deuorata strangulansq; descendet. *¶ Ad Hirudines ex gutture eijciendas.* Marina aqua gargarizetur. *Alud.* Oleum, aut succus cyrenaicus, ad magnitudinē erui ex vino puro calidus potui detur: Aut succum anagallidis, aut acetum acre, cum thymo propina: postea calenti aqua gargarizetur.

Ad Distillationes.

CAP. 21.

Caseus antiquus in cibum sumptus iuuat: ipsas enim resiccat. Oleo veteri nares assidue perunge: Aut sulfure & myrrha contrita cum vino & melle & oleo.

Ad Tusses

Ad Tusses.

CAP. 23. E

Ici puro vino mac facti & in cibū sumpti bene faciunt. *Aliud.* Resina terebinthina in melle cocta linctui detur, postea vinum merū dulce sorbendum exhibeatur. *¶ Aliud Pueris magis commodum.* Coagulum purum cocto melle comprehendere, & exhibere. *Aliud.* Cānem lycurgum vocatum excoctum epulandum appone. *Aliud.* Allium ex melle decoctum succurrit tussientibus. *Aliud.* Scillam accipito, & eius summum excuato: in cauo conijce ouum, locum q̄z creta obtege: & tostum edendum exhibe. *¶ Ad Tussientes assidue.* Hyssopi fasciculum in aqua ad tertias decoquens, ieiuno per triginta dies calidam potui dato: pueris vero etiam cum caricis.

Aliud. Pernam contundens, & instar farinae in potione spargens, iuuat. Hoc idem & sanguinis ex ore eiectioni succurrit egregie. *Aliud.* Sinapi tusum tritum q̄z cochlearij mensura cum vini cyathis duobus deinceps per dies tres bibendum dato. *¶ Ad Nocturnas Tusses.* Mentham tritam in acetum conijce, & sorbendum præbe. *¶ Suffitus ad Tussim.* Styracis, malliches, piperis, petroselinī, ana drachmam vnam: sandarachæ drachmas sex: baccam lauri vnam: impone carbonibus accensis, & per calamum æger fumum excipiat.

Ad Asthmaticos, id est Suspiriosos.

CAP. 24.

Vinum, aut mulsam, vbi scilla decocta fuerit, propinato. Facit & pulmo vulpis siccatus, & tritus, ex vino nigro potui datus. *Aliud.* Nasturtium album tusum & melli mistum lingendum exhibeto. *¶ Ad spiritus difficultatem.* Ouium pilos, qui circum anum sunt, accipe, hos q̄z vstos ac tritos in passo propinato. *Aliud.* Sulfur ignem non expertum ex vini cyathis quatuor potui dato. *¶ Ad Recta ceruice spirantes.* Radiculam ex aqua calida propinato. *Aliud.* Sedum ex melle tritum linctui dato: aut bulbum, aut abrotonum, aut halicam ex mulsā, aut hyssopum in mulsā coctum, aut herbam stœchada, aut castoreum ex dulci vino, aut scillæ intranea ex aceto mulso.

Ad Sanguinis ex Ore profusionem.

CAP. 25.

Symphyti herbæ radice, quanta potest, vescatur, eodem q̄z die acetum ne gustato. *Aliud.* Terram saniam dato, interdum cum succo herbæ sanguinalis, interdum per se. Dicebat autem Hippio Centaurius, Ad sanguinis eruptionem magnifice proficit vrticæ succus ex vini cyathis tribus epotus. Iuuat præterea acetum absortum præcipue scillinum: item & menthæ succus & traga canthæ sub lingua contentus.

Ad eos Quibus ex aliqua vi interiora Sanguis erupit.

CAP. 26.

Accipe vitis cinerem aceto extinctum, plus q̄z acetī superfundens madefacito, & per panniculū G excola: id modica aqua temperatum propina cochleariorum sex mensura: hoc & locum sanguinem fundentem adstringit, & concretum sanguinem deuoratum excernit, & cruoris profluuium compescit: nam sanguinis in interioribus locis exitum coercet. *¶ Ad omne Sanguinis profluuium.* Symphyton herbam ex aceto faciei superdato, si ex naribus sanguis decurrat: si ex thorace feratur, ossi pectoris: si ex vesica, aut vtero, aut renibus, coxendicibus imposito.

Ad Sanguineum Sputum, & Tabem vel Phthisim.

CAP. 27.

Gūmmi partem nigram passo elixam exhibe sub lingua continendam ac deuorandam: ad sputum enim sanguinis & tussim gūmmi nigra pars vehementer facit. *¶ Ad Phthisim non perfectam sanandam.* Pulmo cerui calamo extractus & arefactus conteratur: ipsius cochlearia tria ex mellis cyathis tribus exhibeantur: deinde paucis diebus interpolitis iterum propinetur. *¶ Ad Phthisicos, & Purulentā sanguineāq̄; sputa reiicientes.* Vtīmur fassamento cum pane esui dātes, ipsum ita colluentes aqua ter & quater, donec aqua salsa non reddatur: ipsum deinde charta inuoluentes cremamus, damus q̄z sine oleo, exiguum mulsi infundentes. Herophilus autem fassamentum solum cum pane exhibet: postea vero aquam potandam iuber, dicens, cum sal in fassamento aluum perturbat, vinum quidem datum soluit. Vtīmur & scilla tosta cum fassamento in ipsa, & vehementer purgantur: item & porro cum pane. Postea cum diligenter purgati esse videbuntur, si infirmiores fuerint, ipsos carnibus & alijs id genus reficimus. Eadē ratione vtīmur in ijs, quæ ad purgationem attinent, vbi abscessus eruperint. Herba quoque piscis vocata cum axungia non salita esui data sanguinem reiicientes ac tussientes: mirifice adiuuat. *¶ Ad Sputum Sanguinis.* Iuuat etiam terra sigillata, & trochisci ex electro, & trochisci ex corallo, & theriaca data in lecto.

Ex tralatione veteri.

Ad Latris Phlegmonem.

CAP. 28.

Radici corticem in potum exhibe. Cuminum, quo in obsonijs vtīmur, in aquam iniice, & bibendam præbe. *Aliud.* Rutæ coliculos quinq̄z contritos quotidie dato: aut herbæ stœchadis q̄tū tribus digitis capi pōt. Itē trifolij semen, aut panacis radicē, aut aiugā, silr potui dato. *¶ Ad Pleuritidem.* Si quidē vsq̄ ad clauiculā puenerit dolor, mittendus sanguis est: si vero ad præcordia descendat, corpus est purgandū, & vtendum clysteribus valētibus. Si dolor fuerit moderatus, dāda est aqua mulsā & ptisanæ cremor, aut chondri: in processu vero morbi permiscendum sorbitio nī calamentum vel marrubium: confert etiam semen vrticæ cum melle. Ad fortiores autem dolores vtendum est facculis ē milio & furfure: vel fomentis ex aqua calida, aut oleo in aliqua vesica posito,

Ex tralatione veteri.

Aca posito, vel lana succida p̄fusa oleo & vino habente sal. Post septimum vero diem & emplastro dicto rutaceo utemur. Multoties aut̄ bulbi cum axungia suffecerūt. Dandū est & eclegma, quod fit ex nucleis pineis, & amygdalis amaris, & semine lini, & amylo. *¶ Unguentum bonum.* Accipe bdellium, costum, cauliculos brasicae combustos & redactos in cinerem, permisce cum adipe: hoc enim medicamentum praeclare discutit.}

Ad Extollendas distendendas q̄; Mammās pendulas ac flaccidas.

CAP. 29.

Terram pictorum capiens, & cum melle elixans, panniculo illitam imposito à summo mane usque ad vesp̄ram: deinde spongiā ex olla superaddito, quoad cataplasma abduxeris: hoc autem & erectas & turgidas mammās facit. Crassius autem cataplasma imponas. Si vis ipsum efficacius reddere, gallae acerbae vncia vna misceat̄. *¶ Ut Mammāe plures annos molles sint.* Ex cicuta caristia cataplasma facito. *¶ Ut Mammāe maiores ne fiant.* Porcellū distecans cruore māmās obline, amplius non auget̄. *¶ Ad Lac siccandum.* Cretariū aceto maceratū illitū & impositum lac arefacit. *¶ De Mammillis & primo de Abscessu mammillarum.* Cimoliā, thus, & oleū rosatum permisce, & appone. *Aliud.* Principio infunde spongiā in posca tepida, & exprime, & appone, & superliga. *Aliud.* Palmulas & micam panis tere, permisce cū posca, & appone tepidū. *Aliud.* Coriandrū & psyllū cū cerato appone. *Aliud.* Panē & herbam muralē viridē cū cerato imposito per diē.

Ex tralatione veteri

Aliud. Panē cum aqua mulsā, vel melle & vino, admoueto: si vero non tolerant gravitatē māmilla, perfunde oleo calido & lana succida molli, vel decoctione fœnigraci, vel althaeae, vel seminis lini. *¶ Ad Attrahendum Lac.* Raphanū cū furfuribus i vino coque, cola & propina. Sesamū ex vino dulci da potui. *Aliud.* Anethū vel semē eius coque cū carnibus, vel cū faciētibus lactis copiā. *Aliud.* Furfures cū radicibus fœniculi coque in aqua, & da potui. *Aliud.* Nigellae drachmā j pone in mulsā, & propina. *Aliud.* Porrū coque in aqua, & da bibendum eius decoctum. Vel porrū tere, & cola, & da aquam potui. *Aliud.* Succū fœniculi da bibēdū. *Aliud.* Radicē fœniculi & hordeū assūm coque in aqua, & p̄misce butyrū, & da bibēdū. *Aliud.* Decoctū erratici fœniculi da bibēdū: da et̄ elui ipsum fœniculū. *Aliud.* Cardamomū cū vino da potui. *Aliud.* Semē viticis da cū vino bibēdū. *Aliud.* Succū betae da bibēdū. Oportet aut̄ abstinere ab acribus & salis & acidis, & oleribus crudis. *¶ Ad Prohibendum Lac.* Fove māmās ex aqua marina, & eis admoue adstringentia, & siccantia. *¶ Ut Mammillae remaneant tenae diu.* Cicutā māmāe imposito per dies novē, spongiā q̄; posca madētē superdato. Cymīnū terens impone cum aqua, deinde spongiā p̄fusa posca superappone & liga: post tres aut̄ dies aufer cymīnū, & tege māmillas cum radice lilij & melle, & dimitte tribus diebus: & hoc fac ter in mense.}

Ad Fætidus Sudores, & Alarum tetros odores.

CAP. 30.

Asaro alas sublie à balneo, & sūmo mane quotidie. Aut alumine liquido pūge quotidie. Aut ocymi feie ex vino & melle illinito: hoc odores fædos alarū discutit. Aut puluerē tenuē admoue.

Ad Vicio Stomachi laborantes.

CAP. 31.

Cedri liquoris cochlearia duo, olei immaturī cyathū, in vnū miscens sorbēdū dato: id omnē dolorē funditus tollit: est aut̄ Serāpionis, fidē q̄; hoīum superat. *Aliud.* Anesum in panniculo succi plenū deligato, & in aquā calidā conijcito, & sorbere iubeto. *¶ Ad Imbecillos, & Nauscantes.* Mēta coliculos duos aut tres, mali punici dulcis succo atq; aceto inferuefaciens, sorptui dato. *Aliud.* Sābuci tenera folia ex munda aqua si bibātur, supra fidē proficiūt. *¶ Ad Morsus Vetriculi sine bilis vomitu.* Tragoriganū in aqua pari modo macerans sorbēdū exhibeto, lactis faciens tēperaturā.

Ad Stomachi Imbecillitates. Sinapi frictū ex aqua tritū & potū bene facit. *¶ Epithema ad Stomachi Hypochondriorum q̄; Vicio laborantes.* Fecēm aridā cerato myrteo aut roseo excipe, & vtere. *¶ Ad Singultum.* Cū semel singultū sensit, digitū tuū sinistrae manus, quē saluatoriū vocant, ter ore cōtineto: aut acetū ei sorbēdū dato: aut cuminū, & alicā: aut vomat: & singultus sedabit̄: aut spiritū

Ex tralatione veteri.

Dcontineat: aut sternutatione utat̄: aut rutā ex vino bibat: aut micā panis aceto madentē bibito: aut porcelli officulū manu atterito. Singultus quoq; terror incussus finit. *¶ Ad Dolorem Stomachi.* Castoreū da bibēdū cū posca: & si est flatus causa, coque in oleo cymīnū, & semen dauci, & petroselinum, & vnge: & si est frigus coque in oleo baccas lauri & rutā, & nigellam, & semen fœniculi. In immoderatis autē doloribus fac fomentū cū milio. Confert et̄ cucurbitula magna vmbilico imposita. *¶ Ad Debilitatem Stomachi.* Confert oleū de succo cotoneorū. Semē linapis vstulatū tere, & ex aqua propina. *Aliud.* Mastiches, styracis, ana partes ij: absinthij, cenan. es, ana partes tres: olei malini partes quatuor, vini quod sufficit: rosarū partes duas: hæc trita, & mista assūme ex purpura aut lana, & appone stomacho. Quidā addūt cyphi vocatū. Quidā apponūt cerā, & ceratū faciunt. *Aliud.* Mēthē ramos duos vel tres coque in succo punici dulcis & aceto, ac potui dato.

Ad Cholera & Vomitum, & Voluulū & Vomitum stercoris.

CAP. 32.

Vinum olbinum in cholera ex vsu est, stomacho enim commodat, & ad ventrem bene facit.

¶ Ad Vomitum comprimendum. Herbae sanguinalis succo cibos inficito. *Aliud.* Absinthium in aqua ad tertias decoctum potui dato, habitum agroti considerans: centaurium præterea, aut thymum, aut nigras myrti baccas similiter exhibeto. *¶ Ut Facilis sit Vomitus.* Sampsuci folia elui

DE MEDICINIS

esui dato. *Aliud.* Lixiuio percolato oras poculi oblinito. *¶ Ad Voluulum mirum auxilium, & ad E Stercus vomentes.* Ita facito. Oleum, in quo anethum decoctum sit, propinato: quoad autem elixatur, egrotum in calidam aquam demitte, & ab olei potu calidas micas esui concedito: seruabitur enim etiam si iam strangulatur. Hoc ego principem in nostra Asia seruauī. *¶ Ad eos, qui crebro Vomunt.* Rhun & cuminum in vnum cōtundens da ex aceti mulsi cyathis sex vnciam in potum. *¶ Ad Cholera vexatos valde efficax.* Mentha ex vino sumpta, si febris absit, herba quinq; folia arida trita ex vini cyathis septem, aut ex aquæ calentis cyathis duobus pota, statim dolorem leuat. *Aliud.* Cochlea cum testa contusa potui danda est. *¶ Ad Supprimendum Vomitum.* Foliorum & capreolorum vitis succus cum polenta ieiuno in potum detur ex aqua cochlearij mēsurā. *Aliud.* Panacis obolum ex vino & oleo calido propinato.

Ad Iecinoris Vicia.

CAP. 33.

* Petroselini feminis cochlearium, mentha inspersa & epota proficit. *Aliud.* Herba fumaria vocata in succum soluta, & in pastillos redacta arida q; indolentiam præbet: ter autem ex aqua pota liberat. *Aliud.* Lupi iecur denarij pondere ex passij sextario exhibitum bene facit. *Aliud.* Piperis albi grana nouem, & myrrhæ quod auellanæ magnitudinem æquat, omnia vnā contusa sereno cœlo alternis diebus exhibeto ter aut quater. *Aliud.* Equi iecur penū cedrino reponito: dein de chio vino & aqua dilutum exhibeto: quibus enim iecur vlceratum est, ne amplius exedatur, efficitur. *Aliud.* Maluæ succus ex melle potus iecinorosis medetur. *Aliud.* Hastulæ regiæ radix pota iecinoris dolores leuat. *Aliud.* Alba viola pota cōfestim iecinorosos dolore liberat. *¶ Epithema Iecinorosis commodum.* Laserpitium contusum veteri axungia comprehendere, & linteolo illitum super impone. *Aliud.* Fico in mulsa decocto & trito absinthium contusum quā plurimū admisceto, & vtor. *Aliud.* Brassica cruda superdata iecinorosis celeriter opitulatur.

Ad Arquatos.

CAP. 34.

Radices acanthi, quod Romani tricardumæam vocant, virides tres, aut aridas quatuor, in aqua decoquito, donec dimidium relictum sit, & expressis radicibus aquam potui dato. *¶ Ad Auriginem valde efficax medicamentum, & longa experientia comprobatum.* Raphanos virides cum folijs contunde, & vnus duorum ue succum ex vini cyatho vno exhibeto: ante balneum vero, si ieiunus fuerit, propinato, & in calidum solium descendere iubeto: videbis enim auriginem aquæ supernatantem. Quod si contumacior agritudo fuerit, succum bibere iubeto. Aut anchusæ radicis aride cochlearia duo accipiens ex aquæ cyathis tribus potandam dato. Aut sulfuris ignem non experti cochlearia quatuor ex vino. Aut herbæ sabinæ vnciā ex mulso. Ego sanè & hoc vtor, vehementer faciente. Aphronitri vncias duas in vini aminæi cyathis duobus macerans, sub diuo q; noctem integram exponens, do ieiuno potandum: id q; facio per tres aut quatuor continuos dies, & sanitatem restituo. *Aliud.* Herbam hypericon & adianton aquæ incoctam potandam offeras. *Aliud.* Myricam ex aceto tritam potui da: arquatos curat. Regio morbo affectum in balneum abducens, & in solium descendere iubens iunci odorati vncias duas ex vini mulsi cyathis tribus potui exhibe: discutiet longam auriginem, & liberabit. *Aliud.* Herba rubia vtere in quotidiano victu absque carne suilla: ipsam contundens & cribrans da vsque in sextum diem cochlearium vnum ex vini decem cochlearijs: deinde semper subtrahens dato vini cochlearia nouem, deinde octo, deinde septem, postea sex, postea quinque, deinde quatuor, deinde tria: quod si trigesimo die fuerint aliquæ morbi reliquæ, eādem exhibeto similem ordinem seruans. *Aliud.* Chamæmelum ex aqua potum arquatum pellit, & iecinorosis vehementer auxiliatur. *Aliud.* Radicula ex melle & lacte pota medetur. *Aliud.* Aselli, hoc est centipedæ, sub aquarijs valis repertæ, tritæ, ex mulso potæ, regio morbo liberant. *Aliud.* Serpillum aquæ incoctum, & potui datum, auriginem submouet. *Aliud.* Sulfur ignem non expertum mensura vnus cochlearij, aut duorum, ex vino potum arquatum curat. *Aliud.* Ferri ærugo cito liberat. *Aliud.* Capræ stercus aridum tritū cribratū cochlearij mensura ex vini odorati cyathis quatuor ieiuno & loto exhibe: febricitantibus autem ex aqua eandem portionem. *Aliud.* Vrsini fellis quantum græcam fabam æquat, exhibeto, deinde aquam superbibito. *Aliud.* Sabinæ cyathus ex mulso potus hoc morbo liberat. *Aliud.* Thus aquæ incoctum propinato. *Aliud.* Terrestrem lumbrieum tritum potui dato. *Aliud.* Aristolochiam ex aqua exhibeto. *Aliud.* Cichorij succi cyathos quatuor si biberit, sanabitur. *Aliud.* In medium balnei conclaue descendere iubeto, vt sudet: & egressus sanus erit. *Aliud.* Stercoris canini albi, quod genubeos vocant, cochlearium ex vini optimi cyathis tribus per dies decem propinato. Hoc idem ad colicos dolores & inflationes pariter proficit. *¶ Medicamentum ad Morbum Regium, quod in nares fundi debet.* Elaterij quantum fabæ græcæ amplitudinem æquat, muliebri lacte liquatum in nares fundatur. *Aliud.* Nigella aquæ incocta in nares coniecta in balneo auriginem detrahit.

Ad Lienosos.

CAP. 35.

Rumicis agrestis radix tundatur in pila, & tritæ succus exprimatur, & per tres dies singuli cyathi

Athi bibantur. *Aliud.* Panacis radix contusa cochlearij mensura ieiuno ex aquæ calidæ cyathis tribus exhibeatur. *¶ Ad Lienosos cum prædura tumore.* Capparis radicis corticis vnciam accipe, acetri sextarium semis, aquæ sextarium integrum: decoque ad tertias: propina à cibi perfecta concoctione cyathum vnum duos ue, & hoc per interualla facito. *Aliud.* Hederæ foliorum aceto incoctorum & contusorum succus expressus robustis purus potui detur: sed delicatioribus, aqua dilutus: antequam bibant autem ipsos cōcitatus ambulare cogito. *Aliud.* Centaurij tenuioris, quod iam consenuerit, in pila contusi, cochlearium febre carentibus dato. *Aliud.* Leporinus lienis recens ita deuoratus, vt ne dentibus attingatur, lienosos magnifice iuuat: ignoret autem laborans quid deuorauerit, oculis fascia velatis. Idem facit & catellorum non dum visum adeptorum lienis perinde in ventriculum transmissus. *Aliud.* Venatorij canis catulum aridum tritum modico nardo adiecto ieiuno exhibe. Dicebat autem Marcellus id quoque ad lienosos vehementer facere, si cardamomi cochlearium vnum aut duo ex acetri scillini cyatho vno duobus ue ieiuno dētur: id q̄ per tres dies continuos facito. *Aliud.* Radices hederæ molles elixæ ex vino bibantur: aut crudæ contusæ ex vino itidem. *Aliud.* Asini sterces aridum aceto dissolue, & per linteolum excolatū potui dato. *Aliud.* Raphani succus ex oxymelite maceratus per tres dies accipiatur, singulis diebus cyathi bini: lienem attenuat. *Aliud.* Ferri cremēri cochlearium ex posca potui dato. *Aliud.* Irin longam aceto incoque, & acetum propinato. *Aliud.* Elcorōdani cor potui esui que exhibeto. *Aliud.* Muxin ex aqua elixum, si aridus sit, succū propinato: muxin vero dicitur lingua Cappadocica. *Aliud.* Stichechadis triti cochlearium ex vini lentiscini cyatho bibatur. *Aliud.* Ammoniacam guttam ex aceto tritam ieiuno exhibe cyathi mensura. *Aliud.* Muris lienem, & pipenis grana septem, in ficō torreas, & clam epulanda exhibe. *¶ Epithema ad Lienosos.* Lapidem alium in vesicam bubulam conijcito, & aceto acri madefactam lienem superimponito: ipsum comminues. *Aliud.* Glandem, qua vnguentarij vtuntur, ex aceto maceratam, & ad cerati crassitudinem redactam, imponito. *Aliud.* Vulpis lienis super locum alligatus lienosos morbo liberat. Item hœdi lienis impositus lienem digerit. *Aliud.* Sylvestris brassica, si ex ea cataplasma fiat, lienosis medetur. *Aliud.* Persici arboris folia eodem modo imposita bene faciunt. *Aliud.* Myricæ semen aceto incoctum, tritum atque superdatum, iuuat. *Aliud.* Ammoniacam guttam aceto maceratam linteolo illitam impone. *Aliud.* Crocomagma aceto maceratum, & ad cerati temperaturam redactum, imponito: non amouetur, quoad ex toto sanauerit. *Aliud.* Capparis radix curiose trita, & linteolo illita ac loco imposita eodem die opem tulit. *¶ Ad Lienosos.* Radicis capparis corticem in aquæ libra & acetri semilibra incoquito vsq; ad tertias, & potandam præbe sex quinciam. *Aliud.* Hederacea folia aceto inferuefacta contunde, & humorem exprime, ac robustioribus ipsum præbeto: delicatioribus autem aquam admisceto: sed prius ipse ambulato, atque ita bibito. *Aliud.* Capparis radicem tusam & aceto mulso incoctam ieiuno potandam præbeto. *Aliud.* Accipe cupressi baccas, & valide conteras: & erui farinam quā tenuissimam in acetum mitte, & vsque ad emplastri temperaturam decoque: lienem que per triduum impone: post tertium diem solue, & emplastrum aquæ plenum inuenies. *Aliud.* Ammoniacam guttam in scillino aceto per triduum demersam ac læuigatam panniculo illine, atque impone: neque amoue, quoad emplastrum decidat. *Aliud.* Folia fycamini mori refrigerata & arefacta in vmbra terito: & aridum medicamentum facito scrupulorum quatuor pondere: & cum pauco pipere & caryophyllis, & ex vino mero calido, cum descendit in balneum, potui præbeto.

Potio ad Aquam inter cutem, vt humor inclusus per lotium eijciatur. CAP. 36.

Aeris vsui quantum fabam ægyptiam æquat, fimi columbini vnciam, vini ciathos tres, exhibe: esto autem vnica potio. *Aliud a nobis in multis vsu comprobatum.* Tithymali characiæ vocati radicem pro egroti viribus esui dato: statim enim largiter aquam ducit. *Aliud.* Granum cnidium tritum & cribratum melle comprehendere, vt sordium crassitudo fiat: & cochlearium plenum ex vini multi cyathis tribus & modico aquæ calidæ ad laetis temperaturam, aut ex ouo forbili, propinato: plurimum enim aquæ dericit. *Aliud.* Hebuli radicem succi cyathi duo, vini tantundem, in vnum misti & exhibiti liberant absque stomachi subuersione. *Aliud.* Graminis decoctum potui datum vrinam citat. *Aliud.* Solani succi cyathi quatuor, mellis cyathi sedecim, in potum sumpti, benefaciunt. *Aliud.* Hyssopum, & hirci lotium, ex passo potum, vrinam mouet: perinde & si caprini copiam habueris. *¶ Epithema ad Hydropicos.* Heteram crematam diligenter in modum cataplasmatismis impone. *Aliud.* Raphanos aquæ incoctos, quoad teneritate fiacefcent, accipe: dein de hordeacea farina adiecta misce: decoque, & cataplasma facito.

Ad Umbilicos Proclidentes.

CAP. 37.

{ Gallas combure, vel tere, & permisce cum cortice thuris, & albo oui, & appone. }

Ad Tormina, & Ventris dolorem.

CAP. 38.

Aristolochiæ radicem in vino potui dato: ad tormina, singultum, capitis dolorem, & partus difficultatem bene facit. Sternutatio ad tormina & omnia interna vitia proficit. *Aliud.* Lychniudis

Ex translatione vocat.

nitidis herbe radix lota, dulci vino incocta, deinde percolata & pota, magnifice prodest: *fin minus E*
autem, cibis tuis adijce modicum casia & olyra non confusa. C Ad Tormina intestinorum, & Ven-
tris. Cumini fricti & contriti cochlearium vnum duo ue ex aqua cyathis tribus potandum est.
 Et aduersus inflationes acetum feruefacito ac refrigerato: postea apij semen tusum admisceto, ac
 iterum acetum feruefacito, ex eo q3 potionem dato. *Aliud.* Irionem herbam ex aqua tritam po-
 tandam dato. *Aliud.* Ex lampyro, quod satis est, tritum ex aceto ieiuno exhibe. *Aliud.* Laurum
 commanducans ieiunus succum deuorato: partem cominanducatam vmbilico imposito: illico
 tormina finiuntur. *C Medicamentum ano immutendum Alui purgatorium.* In fel tauri lance hapsum in-
 tingito, anoq3 immittito. *Aliud.* Gallicum saponem lana inuolutum submitto, aut liquidum alu-
 men potissimum. *C Ad Intestinorum Tormina.* Lentem teneram confusam cum rubi radice eli-
 xam imposito, ac esui dato. *Aliud.* Flores mali punice domestica acido lacti incoctos contere:
 & oleum eodem modo infunde, & edendos appone. *Aliud.* In milium confusum elixum, vituli-
 num adipem infunde, & quam pinguiusimum calidissimum q3 sorbendum exhibe: postea geli-
 dissimam aquam sorbeto, & confesum erit incolumis. *Aliud.* Gallae interiorum partem tritam
 ac laeuigatam accipito, farina q3 admista & oui albo pastillos effingito: atq3 assos frangito, vino q3
 simplici madefacito, & esui dato. *C Medicamentum ad Torminosos, Ventriculosos, & Leuorem intestinorum* **F**
laborantes, quod per linctum accipitur. Lasepitij rameta melli commiscens linctui dato. *Aliud.* Oui,
 mel, vinum, mali punici putamina, pari portione in vnum miscens frigit, & piperis modicum in-
 spergito, ac potionem dato: vehementer facit. *Aliud.* Oua tria accipiens in aceto conijcito, ac ita
 per triduum macerari finito: deinde simlaginis modicum capiens cum tribus ouis subigito: mox
 affans, & meraco vino madefaciens, exhibeto. *C Potiones ad Torminosos, & Ventriculosos, & Leuo-*
rem intestinorum. Vinum astringens, cui rhus obsoniorum vsq3 ad tertias, incoctus sit, potandum
 iubeto, quibus ventriculus male se habet. *Aliud.* Vinum austerum, cui galla incocta sit, illi potui
 pro viribus concedito, quorum ventriculus fluxione vexatur. *{ C Ad Tortiones, & Dolores ven-*
tris. Da cyminum mandendum, & deuorandum. *Aliud.* Cnicum, & fœnugracum tere, & coque:
 & da decoctum bibendum. *Aliud.* Baccas lauri siccas & excorticas tere, & da bibenda cochlea-
 ria nouem. *Aliud.* Serpyllum terens da cum vino bibendum. *Aliud.* Decoctum samplici da cū
 vino in potum. *Aliud.* Eringij radicem da cum vino potui, vel decoctum spica, vel castoreum.
 Ad dolorē aut dysentericorū, cotonea cū cerato roseo aut myrteo, æquis portionibus, vētri impo-
 ne. *C Ad Colicam.* Spolium serpentis in vase æneo frigēs cum oleo quousq3 comburatur, dissol-
 ue ipsum in illo oleo, & vnge ex eo cum tuo digito. *Aliud.* Glandulam opio in succo lactucæ **G**
 liquato obline, & ano indito.

Ex tralatione
veteri.

Ad Ventris Profluuium.

CAP. 39.

Callitrichi ex aqua decoctum potui dato. *Aliud.* Stœbēn, qua ad testacea vasa vti solent, spi-
 nis asperam, in pila contundito, & aque incoquito: & aquam in dolore ventris absq3 vino propi-
 nato, cum febrim habent: cum febre vacant, vinum commisceto. *Aliud.* Nucum putamen, quod
 nucleos includit, tritum, ex aqua potui dato cochleariorū triū mensura. *Aliud.* Cornu ceruinum
 mollius vsum cum gallae pari portione in potū dato. *Aliud.* Rumicis semen contritum & potio
 ni cibo ue inspersum optime facit. *Aliud.* Nucum internum illud, quod instar columellæ est: &
 capitum papaueris, quod veluti operculum est: pari portione ex vino exhibeantur. *Aliud.* Quer-
 nas glandes confusas & diutius cribratas, vt polentam in vinum austerum spargito, potionem q3
 concedito. *Aliud.* Carabi testas frictas & tritas ex aqua porrigito. *Aliud.* Struthocameli ventri-
 culus, & gallinarum similiter, cochleariorum duū mēsurā ex vino potus febris absente, præsente
 vero ex aqua. *Aliud.* Thuris grumus fabæ magnitudinis in vini nigri cyathos vno, solani succi
 cyathis duobus, eliquatus, in potum detur. *Aliud.* Gummi albi cōtusi vnciam ex vini nigri cy-
 athis sex bibito: ad idem ano impositum facit. *Aliud.* Cochleam aphricanam sumens, in eam liqui **H**
 dam picem infunde, & calefactæ carnem exime, & in anum bis aut ter immitte. *Aliud.* Serpentis
 senium, hoc est spolium, in vase æneo ex oleo frigens, quoad in carbonem vertatur, cōtere: & di-
 gito in oleum intincto anum perunge. *Aliud.* Herba sacra inferius foueto, aquam ne attingito.
Aliud. Beta ex aceto confusa, & cataplasmatas more à superioribus ad inferiora vsq3 imposita, tor-
 minosis magnifice prodest. *Aliud.* Cornorū ossa confusa ventri illinito. *C Ad Dolores Tormino-*
forum. Malum cotoneum assum, cum cerati rosei pari portione impositum, illico dolorem leuat.

Ad Laxioris intestini, quod Colon vocant, Dolores.

CAP. 40.

Ostreorum teste crematæ & tritæ potui dentur: duarum ligularum modus sit ex calentis aquæ
 cyathis tribus. *Aliud.* Thymum cretense aque vsque ad tertias incoctum ex attico melle pro-
 pinetur. *Aliud.* Sacram radicem tenuem in aquam mitte, & ad dimidias elixa: decoctum per
 quinque dies potui detur, & morbo liberat: hoc in multis probatum est. *Aliud.* Viridis mem-
 ta elixa per triduum exhibeatur, & nunquam dolebit. *Aliud.* Lauri summitates teneræ ligneæ
 esæ per triduum, liberant: ollula vero, vbi menta incocta sit, caue ne per triduum illud terram
 attingat. *C Ad Interseptum.* Fraxini ligni ramentorum cyathus triduum potui datus sani-
 tatem

Atatem restituit. *Alud ad multa faciens.* Cucurbitulam syluestrem alexandrinam excavatam non ferro, & expurgatam, in vini Coi sextarium mitte, & feruefacito: vinum postea ad temperatū calorem reuerfum bibito, & deambulato: & dolore solutus erit. Detrahit multa excremēta hec potio: ** falem autem, ne nauseet, ore contineto.* Bene facit & ad coxendicis dolores. *¶ Medicamentum ad Coli dolores ano immittendum.* Opium Hispanum lactuca excipe, & in pessum redactum sedi immitte. *Alud.* Allij nucleolum lixiuo calefactum ex inferiore parte indito, & arido fiercore detrahit sanescet. *Alud.* Si coli dolore tentatus dormientem canem expergefecerit: & in locum ubi canis dormiebat, meierit: statim dolore leuabitur, & canis morietur. *¶ Remedium Colicis & Inflatibus exterius imponendum.* Cerato ligustrino laserpitium comprehende, & impone. Ego vero & modicum castorei admisceo, & efficacius redditur. *¶ Ad Termina.* Græcum cuminum manducato ac deuorato. *Alud.* Cnici confusi & sœnigræci elixi succum potui offer. *Alud.* Pectinem in aqua calida madefactum & ablutum propina. *Alud.* Baccarum lauri aridarū corticis cochlearia nouem in potum dato. *Ad omnes Intestinos Dolores.* Ex intestinis dolenti si quis pedes lauerit, & ex aqua ea potui dederit, dolor confestim euanescet.

Ad Intestinorum Scissuram.

CAP. 41.

B Egyptiæ spinæ radicem, & carnes hœdi capræ uel cum pilis & corio, capiens terito, & similagini commistas cepas vino temperatas potionem facito. Eadem radix & phlegmone pulmonum laborantibus in potu auxiliatur. Eadem suspensa tertiana febris & quotidiana liberat, & ex oleo porta vulneribus medetur.

¶ Ad Renum & Coxendicum dolores.

CAP. 42.

Ex translatione veteri.

Accipe farinam iridis, & acetum potens: & permisce eis resinam pini, & lupinos, & pyrethrū, & terebinthinam, & sulfur, & nitrum, & baccas lauri: & miscens omnia cum melle appone. *¶*

¶ Ad Coxendicis dolores Purgatorium. Tithymalli succi guttas quinque in hœum instillato, & esui dato: purgat.

Medicamenta, quæ Exterius imposita Aluum ducunt.

CAP. 43.

Granum cnidium cortice liberatum cerato comprehende, & ventri puerorum super umbilicum imposito. *Alud.* Felle tauri umbilicum perungito. *Alud.* Suillus talus vstus tritus q̄q; ex aqua potui detur. *Alud.* Herbam anthemin, hoc est chamæmelum ex oleo terito, & inungito: statim dolor finietur. *Alud.* Reticulum, cuiusmodi volueris, de mulieris capite detractum capiti laborantis imposito: sanitatem ei restitues: melius fuerit autem, si prius calefactum reticulum cimpofueris. *Alud.* Coriandrum vstum, oleo maceratum, umbilico superimposito, & lana conregito.

Ad Vrinæ Difficultatem, & Calculos.

CAP. 44.

Scorpij vstiedantur: illis autem, qui forsitan aborrerent, cum adipe misti, tosti q̄q; clam & citra suspicionem exhibeantur: mirifice profunt. Calculus etiam per vrinam redditus oliuæ nucleo similis, cōtritus & igne candens, si bibatur, eos, qui in vesica sunt, calculos exterit. Felis iecur vstum tritum q̄q; ita, vt bibi possit, calculosis remedio est. Iaspis quoq; lapillus potui datus vesicę calculos dissipat. *Alud.* Umbilici veneris radix elixa & trita vnciæ pondere in diem ex diluto vino bibatur: ad renum calculos vehementer proficit. *Alud.* Succu vucę immaturæ, & rusæ hederę corymborum, par modus ex albo vino teratur: succo illinito mictus difficultate male habitos. *¶ Medicamen Exterius Calculosis imponendum.* Vrina reddita butyro veteri remollito penem oblinito, & cubitū eunti lana apponatur per triduum. *¶ Epithema Vrinam pruritans: prodest & Calculosis renibus.* Calaminthā cū aceto & pipere cerato colligito, & umbilico supdato. *Alud.* In samplici decocto desideat. *Alud.* Herbā perdicion, id est parietariam, oleo incoctam super locum vesicę imposito: illico vrina decurret. *¶ Ad Calculosos.* Montana trixago mulsæ incoctā potanda offeratur: hoc remedio Samius Priscus utebatur. *Alud.* Albæ hederæ corymbi ex vino poti lapillos confringunt. *Alud.* Salicis folia tusa ex vino austero tantisper accipiantur, dum sanitas restituatur.

† Ad eos qui nolentes Vrinam reddunt. Galli guttur vstum ligulæ mensura ieiuno ex aqua propinato. *Alud.* Leucanthemi flores septem tritos ex aqua potui dato. *Alud.* Leporis testiculum aridum minutatim concisum ex vino odorato potandum præbe. *Alud.* Cimices tres confusos ex vino austero propinato per nouem dies. *Alud.* Calamintham & myrrham ex aqua ante cœnam potui dato. *Alud.* Anserinas linguas per triduum, quoque die vnam, edendas apponito. *Alud.* Rutæ syluatice semen per triduum esui dato. *Alud.* Iplius penis cimolia ex muralis herbæ succo oblinatur. *Ad Difficultatem Mingendi.* Rhum & corymbos hederæ rubræ tere ex vino albo: & vnge partes, quę sunt sub umbilico patientium dysuriam. *¶ Ad Sistendum exuberantiam Vrinę excurrentis.* Accipe pelliculas, quę sunt in ventre gallinarum, & sicca in Sole: & sume ex eis drachmam. Ex thure masculo & glāde sicca, & floribus punici syluestris & galla, ana drachmas iij: tere, & da ex eis ieiuno cum melle rosaceo & aqua frigida.

† Hæc i græco codice in fine sunt scripta.

Ex translatione veteri.

Ad Fœminarum Vitiā, & primo ad Conceptum.

CAP. 45.

Caricas ieiuna cum oleæ folijs edito. *Alud.* Ruminantis pecudis spumam digito sumens ex vino

DE MEDICINIS

Ex traslatione
veteri.

ex vino in potum exhibe. *Aliud.* Nasturtium tritum ex aceto per quadriduum edito, postquam E corpus mundatum fuerit. *Aliud.* Vulpinum stercus in pello apponatur, & loci muliebres sublinantur, atque ita venere vtatur. *Aliud.* Artemisiam tritam apponito: inunge autem muliebre pudendum gummi, cum à purgatione menstrua tertius fuerit dies, & concipiet. *¶ Vt Mulier Marem generet.* Alba fascia puerili dextrum pedem ligato, & coeat. *Vt Fœminam.* Nigra fascia sinistrum pedem. *¶ Vt Mas concipiatur.* Anserino adipe & resina terebinthi loci perungantur per biduum: tertio die cum viro coniungatur, & marem concipiet. *Vt Mas gignatur,* vir sinistro testeligato venere vtatur: vt fœmina, dextro. *¶ Ad Conceptionem.* Vterum leporis sicca, & tere, & da potui quādo fuerit à mensruis purgata. *¶ Ad Difficultatem Partus.* Aiugam, & bitumen, pone super carbones, & suffumiga: vel ipsa appone. *¶ Ad Extrahendum Fœtum mortuum.* Fellis tauri magnitudinem amygdalæ dissoluens in vino aquato, da cochlearia ij potui, & emittet confestim. *Aliud.* Lycium crudum trito caule iunge cum cedria, & calefacias, & da bibendum ieiuno. *Aliud.* Artemisiam coque in mulsâ, & propina. *Aliud.* Super lapidem, quem mordet canis, quando proijcitur in eum, positum in Sole, transeat mulier, quæ patitur difficultatem partus. *¶ Ad Educenda Menstrua.* Marrubium, nepitam, rutam, corticem celli, ana drachmas iij, coque in vino aut aqua, & da bibenda. *Aliud.* De aqua, qua dissoluitur fermentum vetus, quando fit panis, potui dato. *¶ Ad Dolores Vteri.* Pæoniæ radicem propina, vel radicem iridis, vel seminis pæoniæ granula xv, vel pulycariæ aut vrticæ succum appone, vel folia apiastrî cocta in vino. *Aliud.* Accipe rutam viridem, & tere: & cum butyro & adipe porci fac vnguentum. *Vt Mulier Violatâ appareat Virgo.* Accipe gallarum immaturarum, ligustri, xylocassia, rosarum siccarum, piperis albi, granignidi, ana hexagium vnum: tere, & prius lotæ vuluæ apponat ista. Confert autem & semen rumicis aciditritum & appositum. }

Note Maris & Fœminæ in Vtero.

CAP. 46.

Apium in scia muliere super caput imposito, quod q̄ primum voce protulerit, aut marem, aut fœminam, illud pariet: incorrupte veritatis hoc signum est. *Aliud.* Grauidæ mulieris vrinam accipiens duas foueolas facito: in vnam hordeum, in alteram triticum conijcito: deinde vrina conspergito, atq; ita demum terram superiacito: si prius triticum expullulauerit, mas parietur: sin vero hordeum, fœmina.

Vt Fœtus Retineatur.

CAP. 47.

- * Lapis Aetites appendatur. Fœtum quoque & lapis ille retinet, qui in piraistro adnatus inhære scit: iste similiter pensilis gestetur. Et malug agrestis radix, quam epiboscon nominant, appensa. G Sardonius etiam lapis retinet fœtus vsque in finem: ventri autem eum deligare oportet. Est herba quoque sideritis, cuius appensu fœtus custodiuntur.

Vt Partus Acceleretur.

CAP. 48.

- Bulbi amari triti ex vino dulci potui dētur: illico pariet. *Aliud.* Dictānum ex vino, aut aqua, propinatum idem facit. *Aliud.* Suillum lac ex melle bibitum. *Aliud.* Galbanum ex aqua tritum potum q̄, confestim educit fœtum. *¶ Suffitus ad Aegre parientes.* Aiuga super carbones posita: aut bituminis, quo fabri ferrarij vtuntur, duplum carbonibus iniectum, mirifice prodest. *Aliud.* Pulegij fasciculum in aquam calidam mittito, in ea q̄ mulierem delidere iubeto: ipsi q̄ in aurem dicito, Chu, ea, mi, dus. *Aliud.* Oleum manibus continens eius ilia perfricato, atq; ita dicito: Secundæ sistite corpus, quoniam præcipit vobis magna Dei genitrix.

Ad Lac Creandum.

CAP. 49.

Radices cum tritico, vino incoctos, percola, & vinum potui offeras. *Aliud.* Aquam, cui fursures cum fœniculi radicibus incoctæ sint, propinato. *Aliud.* Mulsæ nigellam permixtam habentis vncia bibatur. *Aliud.* Mulsæ hederæ folia contusa habens potui detur.

Ad Lac Resiccandum.

CAP. 50. H

Aqua maris foueto, & astringere siccare q̄ valentia superimposito. *Aliud.* Muriam calidam spongijs exprimens, & thuris puluisculum inspergens, deligato: & chartas eodem modo.

¶ Quod si Mamme Duræ inflammatae q̄ fuerint. Lini semine aceto mulso incocto illine: aut fœno græco similiter elixo: aut sesamo non loto refrigerato, trito, & melli admisto: aut ex ficis cataplasma facito. *Aliud.* Cuminum tritum mulso temperatum ad cerati crassitudinem linteolo illitum impone. *¶ Potio Fœtum Mortuum, aut non ritu naturali exeuntem, eiiciens.* Fellis tauri quanta est nux amygdala, vini veteris diluti ligulis duabus temperatum, potandum offeras: statim fœtum excludit. *Aliud.* Ouum crudum cedri lachryma illinito, calefacito, & ieiunæ forbendum dato. *Aliud.* Mulsam artemisiam incoctam habentem propinato. *Aliud.* Lapis phœnicites vocatus illitu fœtum detrahit. Item lapis demorsus à cane fœtum adhuc imperfectum euocat, si prægnans mulier super ipsum transeat: nam quod in ventre est, valde cito expellit.

Vt Cognoscatur, Mulier an Abortum fecerit, & ad Abortiendum, & Fœtum mortuum ac Menses ducendos.

CAP. 51.

Mammæ gracilescentes abortum significant. *¶ Cataplasma ad Abortum impellens.* Vicæ mundæ cyathi

Adæ cyathi duo in ollula ex aceto decoquantur: cum ad dimidium consumptum fuerit, aloes vnciâ adijciatur, vt malagmatis instar reddatur: deinde illinito ab vmbilico ad peçtinē vsq; & adalligato.

Cataplasma ad Necandum Foetum cura noxam vllam que suspicionis notam. Cupressi foliorum partem aqua elixâ curiose terito ad malagmatis tēperaturā: atq; vmbilico et abdomini imposito, fascia q; deligato: deinde supinā iacere iubeto, aut in sella sedere, qua in partu mulieres vti solent: & sopita sine dolore foetū emittet. **C**Medicamen discriminis expers, vt Trimestris, aut Quadrimestris Foetus eyciatur. Opopanacis obolum accipe, & collyrium fac, & locis muliebribus submitte: tutū est, atq; in multis expertum. **Aliud.** Radiculam tritā melle exceptā pellisilline paruis, & eos mulieris genitalibus impone: educit hoc secundas & menstrua purgamenta. **Aliud.** Artemisiæ folia teras ex roseo, & sordium crassitudinē faciens appone: mēses citat. **Aliud.** Caricas duas & semissem, nitri obolum accipe: pessum facito, & submitte. **Aliud.** Artemisiam tritā impone. **Aliud.** Rutæ agrestis semen immitte. **Aliud.** Galaçites lapis suffitus nō purgatis mulieribus menses ducit. **C**Ad Mulierem, quæ à partu non purgetur. Ari semen tritū ex vino albo ieiuna bibito. **C**Ad Pallorem mulieris à partu. Panacis radices contusæ ex dulci vino à ieiuna potē pallorem discutiunt. **Aliud.** Flores mali puniceæ domesticæ odorato oleo incocti potui dentur. **E** Accipe fecem vini antiqui, & radicem lilij, & **B**allia, & lenias: & vnge faciem vespere, & mane laua: & hoc quousq; facies rubefiat.

Ex tralatione veteri.

Ad Ventrīs, Mammarum, Femorum, Coxendicum que Scissuras.

CAP. 52.

Marinam cochleā oblongā cremato & conterito: deinde oui albo, aut afinino lacte adiecto illinito. **Aliud.** Lapidē, qui diaphanes hoc est perspicuus vocatur, cōtere: cōtritum q; in ingressu balnei, anteq̃ inungatur, illinito: vicelimo die scissuræ euanesçēt. **C**Ad Sudores Ventrīs, præcordiorum, femorum que à partu. Cimoliæ & pulueris thuris (mānam vocant) par modus oui albo exceptus cū ligustrino cerato illinatur. **C**Ad Inflationes in Coxendicibus. Panis medullā et melanteriā vnā subiigito, & imposito: bene facit. **C**Ad Prominentes Vmbilicos. Gallas vltas tritas q; ex aqua supdato. **C**Vt Vmbilicus à partu magnus ac elegans fiat. Operculum vrcei chartaceū sumēs pāniculo inuolue: deinde thuris puluisculū oui albo cōprehendens illine, & in vmbilicū mitte, tenaciter q; alligato.

Ad Vteri Strangulatus.

CAP. 53.

Testudinis terrestis iecur tritū in pello naturalibus imposito: ppetuo respōdet, cuiq̃ ne cōmunices. **C**Potio ad Vteri Dolorem. Leporis coraridū, & in ramēta cōcūsum, potui detur. **C**Ad Tormina Vteri à partu, Corruptiones, & Strangulatus. Leptosphaeros accipito ad oboli semissem, (orefinema vocant) tribus digitis, & ex dulci bibito. **C**Ad Vteri Dolores. Mali puniceæ dulcis radicem ex vino propinato. **C**Ad Vteri Duritias. Cuminum tritum & rutæ folia pice liquida excepta & butyro, in pello ex lana factio impone. **C**Potio ad Mulieres ex Vtero laborantes. Castoreum cum aniso propina. **Alia.** Cuminum tritum, & nigellæ semissem, ex aceto mulso propina.

Potio ad Muliebrem Profluuium.

CAP. 54.

Peucedani radiceis, & cupressi baccarum, pares portiones, ex vino albo potētur. **Alia.** Vuæ nigra acinorum arida semina ex vino nigro austero potui dentur. **Alia.** Hædi coagulum acerrimo aceto maceratum ieiuno propinato. **Alia.** Corallium ex nigro vino dato, & confestim supprime tur profluuium. **Alia.** Ferulæ cinerem, & papaueris puluerem ex aqua pauxillum exhibeto: q; si largius effluat, spongiæ cōbustæ drachmas iij exhibeto. **Alia.** Cornu ceruinū vstum potui dato. **C**Medicamenta Naturalibus imponenda. Malum punicum in lana more cataplasmatiss appone. Aut mali punici coria elixa in lana q; trita in pello apponenda sunt. **Aliud.** Gallæ interiora, & thuris tantundem, in pello accipiens ex aqua appone. **Aliud.** Pulegium tritum lana munda cōprehendens naturalibus impone. Opitulatur etiam spongia feruenti aceto madida, & mediocriter exprefsa: femorum præterea coitio, extremorum deligatio, atq; in caput decubitus.

Vt ne Mulierum Naturalia in concubitu humescant.

CAP. 55.

D Gallæ immaturæ grana quatuor: cinerulæ, qua in oculorū vitijis vtī cōsueuerūt, mystra duo: terito, in vnū misceto, & in vitreo vase reponito. Ex hoc mystrū sumens veteri vino dilutū eo primis diebus nupta naturalia sublinat, ac per totā vitā locorū illorū humiditatem non percipiet. **Aliud.** Gallas per octo dies in aqua macerato: deinde lanā mollē sulfure suffumigatā aqua illa madefacito, & nō expressam siccescere sinito: ex lana pessum faciēs naturalibus immittito: in cōgressu venereo virgo putabitur: deinde lanā tollito, exiccato q; atq; iterū, si lubet, vtitor. **Aliud.** Acidi rumicis semen tritū submittendū exhibeto, & nō different à virgine. **Aliud.** Gallas contusas in aquā demitte, ex qua subluantur mulierum naturalia, angustiora. n. reddentur. **Aliud.** Panniculos tenues in aquā alumē liquatū habentē demergito, & exiccato: deinde quadratū iūci, casia, gallarū, singulorū parē modū ex vino veteri cōterito, donec mellis crassitudo fiat: in hoc panniculos madefaciens rellicato, vtq; imponat, cōcedito: atq; ita p duas horas retineat, vel prout requirit necessitas: et cū venere vtī volent, eximant. **Aliud.** Melle & nitro vsq; ad pubē naturalia oblinito, atq; ita concubito.

Vt Ne cui Penis arrior possit.

CAP. 56.

Buccinū vstū lotio bouis castrati extinguito: hoc in cibis, aut potionibus, vtitor: qd̃ remanet, in vase reponito. **Aliud.** Paruulū lignū appedito, & desinit. **Aliud.** Acutus iuncus impositus, vt in figurā cyrici redactus illius, qui cito semē excernit, sub stragulis vestibus positus impetum in venerem cohibet. **Aliud.** Coriandrū aut pulegiū si frequentius edatur, penē flaccidū reddit. **Aliud.**

Septima Classis.

YYYYYYY

Fel

DE MEDICAMENTIS

Ex tralatione
veteri.

Fel torpedinis si quis potui det, genitale mēbrū minime rigebit. *Aliud.* Lucernæ sponte extinctæ E
scintillam adhuc viuā si in poculū conieceris, & potui dederis, per totam noctem penis arrigi non
poterit. { *Ad Arrectionem Pudendi.* Pudendū intendūt & mouēt ad coitū ista, nucū pinearū, pi
peris, petroselinī, scobis pudēdi ceruini aridi, terebinthinę, singulorū partes equales excipe melle:
& ex vino bibēdas præbe. *Aliud.* Cicerū crudorū, nucū pinearū, singulorū partes duas: seminum
erucæ, piperis albi, singulorū partē vnā: mellis quod sufficit: da cū vino. *Aliud.* Vnge pudendū
melle anteq̃ coeas. *Aliud.* Semen erucæ bibendū exhibe cum melle. *Aliud.* Succū erucæ cyathos
ij cū pipere albo, quod sufficit, da tribus diebus alternis diebus. Vel succū erucę et piperis albi da co
chlear vnum ieiuno. Confert etiā testa marini erinacei bibita: & lac bubulū bibitum. *Aliud.* San
guinalis herbæ semen, & carnem pisciū fluuialiū siccā terens, bibendā præbe: tentiginem enim fa
cit. Similiter semen portulacæ coctū cū lacte bubulo mire prodest. Itē oua perdicis, si comedātur.
Aliud. Semen porri cū vino mero bibendū exhibe. *Aliud.* Succus sanguinalis herbæ bibitus fa
cit promptiores ad coitū. *Aliud.* Aquā, in qua extinguitur ferrū, bibe cū vino. *Aliud.* Testiculi
vulpis sicci bibe cochlear vnum. *Aliud.* succum expressum, ē radice hastulæ regiæ da bibendum.
Aliud. Quando taurus, postq̃ coiuert, minxerit, terrā cōmisce: & luto, quod fit ex vrina, vnge pu
dendum. *Aliud.* Stercore bouis recentī vnge pudendum. *Aliud.* Granum gnidium tere, & per F
misce cum oleo rosaceo, & vnge. *Aliud.* Succo verbenacæ vnge pudendum.

Ad Somnum conciliandum.

CAP. 57.

Lauri folia inscripta capiti clanculum subijcito, nominans Concophon brachereon.

Ad Eos, qui coire nequeunt.

CAP. 58.

Scammoniam ex aqua illinito.

{ *Ad Morsum Venenosorum animalium.*

CAP. 59.

Ex tralatione
veteri.

Ad morsum venenosorum animalium fraxini folia tere, & succi da cochlearia tria non febrici
tantibus cum tribus cyathis vini. *Aliud.* Corticem arboris glādis, vel erucā, quæ in oleribus nasci
tur, vel aiugam, vel allium, vnum ex his terens da cum vino non aquato ieiuno bibendum. *Aliud.*
Sanguis anatis aduersatur omnibus venenosis & mortiferis. Hoc idem etiam faciunt carnes galli
næ nuper occisæ, si morsibus imponantur: obliſunt. n. omnibus venenosis, & curant, præter aspi
dis morsum. *Aliud.* Rutam da cum vino bibendam. *Aliud.* Cerebrum gallinæ bibitum iuuat.

¶ *Inunctio ad Morsum Vipere.* Ex chalbano cum cyprino vnge. *Aliud.* Serpyllum cum aceto simi
liter illine. ¶ *Suffumigia fugantia Venenosa animalia.* Pyrethrū & sulfur incende, & fugient. *Aliud.*

* Cornu cerui & eius pinguedo idē facit. Pellis etiam & pedes dextri si infigantur ianuæ prohibent G
ingressum cuiuslibet venenosi. *Aliud.* Pulmo asini si fumigetur, omne venenosum fugat. ¶ *Vt*
Vipera non mordeat. Dracunculū tere & obline manum, & non mordeberis. Semen vero ipsius her
bæ tritus cum aqua, & positus in aquis peregrinantium, fugat eas. *Aliud.* Ex succo solani manus
illine. ¶ *Epithema in Morsu à Vipera.* Vipera caput abscidens applica partem cruentam loco de
morſo, liga, et dimitte sic. ¶ *Fomentum ad Morsum Vipere & Muris aranei.* Trifolium bituminosum
coque: & decocto calido locum demorſum fove. Nullus autem fomento illo vtatur, qui non pati
tur: transit enim affectus in eum, vt putet se à vipera vel araneo mure demorſum. }

LIBER TERTIVS DE MEDICAMENTIS

QVÆ AD MANVM SVNT

GALENO ASCRIPTVS

Iunio Paulo Crasso Patauino interprete.

C E N S V R A

Liber ordine ac iudicio vacans.

De Gurgulionis, quæ & Vva dicitur, vitij curandis.

I.



Vrgulionem male habitum ita sanè curare poteris. Initio phlegmones, vi
ctus tenuis & boni succi esto. Sorbitiones & gargarizationes ex mulso fiāt,
aut mulsa, aut sapa tepida, aut ex aceto mulso, quod gargarizetur solū & ef
fundatur, & ne deuoretur. Manducetur autē pyrethrum, aut piper, aut vva
taminia, quam & staphida agrian vocant: hæc trita cum nitro & sale, palato
columellæ q̃ affricta, phlegmonen dissipat: exterius autem hæc eadem im
posita, & alia, similiter calefacientia & phlegmonen mitigantia, & dolorem
leuantia: epithemata vero & cataplasmata idonea sunt.

Ad Pendentem Columellam.

Hysſopi radicem & caricarum succum vnā misceto, & gargarizato. Perinde & ad tonsillas ac
columellam vnā feruefaciens palmulas & lentem gargarizato.

Vt sine

A *Vt Sine Siti diu quis conseruetur.*

CAP. 2.

Dulcis radicis succus potui deī. Aut portulacæ succi cyathū deuorato. *Aliud.* Ancorū pōdo vncia, dulcis radicis succi pondo vncie duę, tragacantę madefactā pōdo tantundē: cōficito patil-
los, & in vmbra liccato: ex his vnū sub lingua cōtineto, & succū descendere pmittito, & nō sities.

Ad Grauem Auditum & surditatem.

3.

Caprinū fel recens cum pari portione mellis ad carbones decocti mistū tepidū in aurem instil-
lato. *Aliud.* Leporis fel recens cum pari mellis portione mistū, & in capæ corio tepesactum, in au-
rem mitte: hoc enim remediū ei, qui vel nihil audiat, auditum restituit. *Aliud.* Suis mansucti fel
pari mellis ad carbones cocti portioni admistū tepidum infunde. Aut scillæ succum & rosaceum
miscens vttere. *Aliud.* Erui succum instillato, & stupam rosaceo imbutam superimponito.

Ad Coeliacos, hoc est ventriculosos.

4.

Myrteas baccas virides, rosas aridas, malicoria, flores mali pūicæ sylvestris, gallas quinq; mulso
vino subigēs in ventriculū mitte. Aut fabæ cortices vino inferuefactas p clysterem iniice. Aut lēris
decoctas, aut oryze nō purgatas, aut sideritidis herbę succū tepidū perinde p clysterem immitte. Itē
& acaciæ succū p inferiores partes in vētrē da: aut cerusam, & argēti scoriā, ex melle & vino tritā.

B *Ad Ventris Tormina.*

5.

Cuminum ex melle elui dato, & profectum miraberis. Aut calami radicē ex vino calicis vnus
mensura propinato.

Ad Supprimendum Alui Profluuium.

Aquam origanum incoctum habentem propinato. *Aliud.* Sepię testam & capillamenta cre-
mata ex vino veteri potui offerro. Aut rubi fructus cū folijs ad tertias decoctū propinato. *Aliud.*
Cuminum græcum & gallam non tritam cremato, & ex vino veteri potui dato, cum ad tertias re-
dactum fuerit: id facito per triduum.

Ad Eminentias internas, Scissuras, Ficosq; in sede.

6.

Auripigmenti fissi pondo vncias tres, quernæ cariei pondo vncias quatuor: ex omnibus in
vnum tritis aridum medicamentum componito. Ita vero vtitor, locum prius vrina pueri vene-
rem non experti subluito, deinde inspergito.

Ad Eminentias, quæ intus forisque in Ano sunt.

Laserpitij radicem tusam tritam q; superdato.

Aridum medicamentum ad Exesas Gingiuas, Dentesq; labantes.

7.

C Mastiches pondo vnciā, thuris pondo vncias duas: myrrhę, rosarū aridarū, vtriusq; pondo vn-
cias tres: sarcocollæ, gallarū, vtriusq; pōdo vncias quatuor: oīa in vnū cōtere, & gingiuas consper-
ge: quas prius fedi, aut myrti, aut lentisci, aut viticis, aut oleæ solorium, decocto tepido collueris.

Ad Dentium Dolorem.

8.

Aceto, cui hyssopum aut origanum incocta sint, foueto. Aut pyrethrum, piper, & zemma, &
mastichen, paribus portionibus commanducanda exhibeto. *Aliud.* Vuæ taminix acinos qua-
tuor, mastiches micas vel grana octo, manducari iubeto.

Ad Dentes obiectum Decidentes.

***** Oleo vuulas passas incoctas habente locum foue: deinde aceto, dolore videlicet exacerbato: tri-
duo interposito iterum repete, atq; ita dentes renascentur.

Ad Corrosas Gingiuas.

9.

Aristolochia ex melle contrita gingiuas conspergito. Aut ceruinum cornu exustum, donec al-
bescat, & cerusam, & argenti spumam, & nardum, & pumicem, cerato comprehende, et illine. Aut
testudinis crematam testam ex oleo tritam in gingiuam instillato. *Aliud.* Eruce semen cum suc-
co, & capræ fel cum melle, aut nigellam itidem cum melle, illinito.

D *Ad Oculorum Dolorem.*

10.

Caprina medulla oblinito, & sanabis. Aut caprinam, ouillam' ve adipē calida aqua madentem
imponito. Aut lini seminis succo, aut muliebris lacte madefacito.

*Ad Albugines Oculorum, Græci Leucomata vocant, & Cicatrices Veteres paucissimis
diebus curandas, Remedium, quod etiam Visum mirifice exacuit.*

***** Aeruginis rasæ vncias quatuor accipe, ammoniacæ guttæ tantundem, cerusæ vncias duas, gum-
mi vnciam vnā: liquidum autem medicamen, esto cucumeris agrestis radicis succus. *Aliud.*
Lauri baccarum mundatarum & tritarum, gummi, quantum satis sit, permisce, & fiant collyria.
Quando vti voles terito, & ex pueri venerem non experti vrina illinito: probatum est.

Ad Aegilopas, hoc est Fistulas oculorum.

Fimi columbini aridi drach. iiii accipe, & cum masculo thure tritas inspergito: expertum est.

Ad Albugines comprobatur, multos enim iuuat.

Perdicis masculi felle ex melle illinito. *Aliud.* Ladani vncias duas terito: ex vino optimo, &
oleo, quantum satis erit, illinito.

Ad Suffusionem admirabile, quod illico Visum restituit.

Muris sanguinem, & galli fel, & muliebre lac, æquis ponderibus misce: & bene subactis vttere:
probatum est enim, & magnifice profuit.

Septima Classis.

yyyyyyy ij

Aliud ad

DE MEDICAMENTIS

Aliud ad Inueterascentes Suffusiones, Hebetem Visum, & ad omnia, quæ Oculis Tenebras offundunt. E

Baccas lauri cortice liberatas numero decē, gūmi drach. ij: ex aqua pluuiatili collyria facito, & illine, suffusos quidem ex vrina pueri venerē non experti: cæcutientes autem, ex aqua pluuiatili.

Ad Oculorum Dolores, & Vigilias.

Mulsam instillato: & ouum prius coctum, putamine mundatum in duas portiones secato, & super oculum deligato: & somno occupabitur. ∴

Ad Carbunculos Oculorum totiusq; corporis.

Herbam muralem cum panis micis posca prius madefactis tritam adhibeto. ∴

Ad Acuendum Visum.

Foeniculi caule trito ex melle in nouo alueari facto, & super carbones cocto, illinito. ∴

De Ordeolis in palpebris enatis.

Acacia ex vino vtere.

Ad Fluxiones Oculorum.

Oculis fluxione laborantibus initio quidem cibus modicus conuenit, aquæ potus, à venere abstinentia, & alius ducatur. Primum q̄ multa frigida modico aceti permisto assidue faciem lauet, et in lectulo olfaciat. Puluerem, fumum, lucernæ Solis q̄ splendorem deuilet. Deinde rosas virides vel aridas passo madefactas contere, oui q̄ vitello admistas superdato: aut ex hordei farina passo in F cocta cataplasma facito: quod si dolor vehementissime cruciet, altercum quoq; admisceto.

Ad Capitis Vitia diuersa.

11.

Cataplasma ad caput Fluxione vexatum. Hæc compositio caput fluxione tentari non sinit, neq; oculum male haberi. Accipe cimolix, nitri, albæ vitis radices aridæ, cucumeris syluatici radices, fabaceæ farinæ, singulorum pondo vncias duas: pariter tritis & in vnum redactis ad sordium crassitudinem vtere in balneo: longe valentissimum remedium est.

Vt Manducatum Pituita ex capite detrahatur.

Vuam taminiæ & mastichen manducato, aut mastichen & zingiber: si mastiche dura sit, partem ceræ admisceto. ∴

Ad Capitis Dolorem.

Rutam diligenter contere, & ex aceto atq; rosaceo frontem illine.

Ad Capitis ab Altera tantum parte Dolorem, quem Hemicraniam Græci vocant.

Porri caput comam q̄ oleo incoquito, ex eo caput perfundito, statim q̄ dolor tollitur. *Aliud.* Hecera extrema oleo incoquito, & ex eo caput perfundito: effectum miraberis. *Aliud.* Amaris amygdalis tritis frontem oblinito.

Ad Clauos probatissimum, etiam si in capite sint.

G

Accipe sandarachæ, aluminis scissi, atramenti sutorij, mysios, viuæ calcis, saponis, singulorum parem modum, sed calcis tantum duplum: tritis ex primo saponis iure vtor: admirabile est.

Ad Dolorem Capitis Hemicraniam vocatum.

Accipe erucæ seminis vncias tres, rutæ viridis vncias septem, piperis grana vnum & triginta, ouorum trium alborem, aceti quod satis est: omnibus permistis illinito frontem. *

Pastillus celebris Socratis ad Capitis Dolorem & Hemicraniam, Omniaq; ex fluxione vitia, mirificus.

Accipe euphorbij drach. iij, thapsiæ succi drach. vj, zingiberis drachmā vnam, opij drach. iij, opopanacis drach. ij: oia in vnū ex aceto liquato, pastillosq; conficito. Cū vti voles, aceto dilue, et fronti illine. Suffiri etiā potest, & ad membrū aliquod fluxione male habitū magnifice proficit. *

Ad Clauos.

12.

Clauos enumera, & totidē formicas accipes, & in pāniculo lineo raro deligato & cum his etiam cochleam: deinde cremato, tritasq; ex aceto oblinito. Aut finum bubulum aceto maceratum per triduum imposito, omnesq; clauī decident. *Ad Clauos, & verrucas Myrmecias vocatas.* Palmularum ossicā partē vstam ac tritam cū sale & gutta ammoniaca in Sole subigito, imposito, et curabis.

Ad Dolorem Capitis Hemicraniam dictum.

13.

Lumbricos terrestres quindecim accipito, piperis grana quindecim, aceti quod satis sit: oia simul conterito, & illinito. H

Ad Ictus Venenosarum ferarum.

14.

A bestiis venenatis, rabiosoq; cane demorsos, sanat cācri interiorū cinis ex aqua semel ac bis potus, quantū manu capere potes. *Ad Dolorem Capitis ex Vinipotu.*

15.

Herbæ sanguinalis coliculos duos connecte, & sertum capiti circumdato. ∴

Ad Hemicraniam dolorem.

16.

Nasturtij semē tusum cū oui albo permisce, fronti q̄ impone, & stupā superda. Aut aquilæ capitis os simile, simili appēde, perinde & vulturis. *Aliud.* Lapilli in capite labracis, i. lupi piscis, reperi dolore capitis leuant: & ad hemicraniam faciunt appensī, dexter dextræ parti sinister sinistræ.

Ad Defluuium Capillorum & Barbæ.

17.

Betam ex myrteo, & polytrichis capillis illinito: aut adiantum ladanumq; paribus portionibus trita, ex immaturo oleo, aut myrteo, aut lentiscino imposito. *Aliud.* Ladanū vino amynæo, & oleo myrteo, maceratum, vtroque ad mellis spissitudinem, caput in balneo perungito: melius est autē, quod aliqui polytrichon vocant, si portio septima ladano adiiciatur, atq; ita illinatur.

Ad Capillos Defluentes, vt plures instaurantur.

Murini stercoris drach. iij accipito: calamorum, quos conatelos vocant, drach. iij: amygdala amara ∴

Amarum numero lxxij: succi balsami, ladanii, vtriusque drach. iij: polytrichi drach. vii, nardi gallici drachmā vnā: in pice liquida madefaciēs ladanū vino oleo q̄ macerato, arida vero in puluerē redigens cū liquidis pmisce & vtere, quotidie perungēs. Mihi videtur & caluis polle capillos reddere.

Ad Tussim diuersa remedia.

18.

• Iuniperi fructus esu potu q̄ sumptus. Aut bdellium epotum. Aut daucus creticus ex vino potus. Aut dracunculi radix pariter elixa, & ex melle trita. Aut Inulæ. Aut perdiciadis herbæ succus tepidus ante cibū ex aqua potus. Aut sanguinarie succus eodē modo sumptus. Aut personæ radix. Aut pineus nucleus ex aqua potui datus. Aut propolis suffita. Aut resina epota, & terebinthina suffita. Aut arsenicum icillile cū chalbano suffitum, & fumus deuoratus. Præterea bituminis, thuris, styracis, cumini q̄ suffimentum. Aut cinnamomū ex melle tepido potū. Aut cupressi baccæ contuse ex vino cū myrrha ieiuno exhibitæ. Aut fœniculi radix semen q̄ vino incocta, & propinata. Aut vinū, cui viridis ferula incocta sit. Aut origanum melli incoctum & bibitum. Aut myricæ flos, semen, ac folia, vino elixa, & potui data. Aut piceæ cortex ex aqua potus.

At albæ populi folia & ramuli ex aqua aut vino potui oblata. Aut verbasci radix ex vino in balneo pota. Aut alliū crudum elixum ve esui datum. Aut lanariæ herbæ radix ex melle sumpta, pes

Blime affectos liberauit. Leporinum stercus contritum ex vino calido sumptum arteriæ & columellæ vitis, & spiritus difficultati, summopere opitulatur. Ad eadē facit & lingua aquilæ collo suspensa. Aut nucleus pineus integer vltus tritus q̄ cū modico piperis, melle exceptus, laboranti q̄ exhibitus cochlearij mēsurā. Ad veterē tussim autē leuandam, sulfur ignē non expertū ouo iniectū, & in balneo sorbeto. Aut sinapi terens miscens q̄ melli dacos tres exhibeto. Aut nasturtij semen tritum ex aqua potum cubitum eunti. Aut thus cum melle tritum linctū datum summo mane, aut cubitum eunti. Aut raphani succus ex melle sorptus diluculo. *Aliud.* Iuniperi baccæ quinque aut septem, ex melle potæ. *Aliud.* Accipiantur piperis drach. iij, nucum drach. ij: nucleorum pineorum, hyssopi, vtriusq̄ drach. i: pulegij, iridis, seminis vrticæ, singulorum drach. iij: mellis quantum satis sit: detur ligule mēsurā. *Aliud.* Sinapi, cuminum, nigella, nasturtium, paribus portionibus vnā conterantur: vino excipito, & propinato. *Aliud.* Pulegium assidue manducetur: tritum q̄, & vino maceratum, bibatur. *Aliud.* Cumini fricti, nigellæ frictæ, vtriusque vnciam: piperis grana quadraginta: vnā trita, & melle fermentata, ieiuno dato & cubitū eunti. *¶ Suffumigatio.* Accipe auripigmentum scissile, piper, marrubium, hordei farinam, trixaginis, & vitis radicis corticem, chamæleucen, mastichen, croceum oui, costū: omnia in vnum misce, & collyria con

Cfice, & ieiunum suffumigato cubitum q̄ euntem. *Aliud.* Piper, nuces, auripigmentum scissile, simul terito, misceto q̄ cum melle, & propinato. *Aliud.* Butyrum, anserinam adipem, & resinam, vnā cum melle conterito: & ieiuno cubitum q̄ eunti exhibeto. *Aliud.* Virgulam fœniculi, semen piperis, vnā terito, & melle fermentata concedito. *Aliud.* Vesicarium scolanum cum radicibus elixum potui dato. *¶ Ad Tussim, Reiectionem quæ Sanguinis.* Accipe costi, cinnamomi, rheubarbari, singulorum vnciam: limū & trita, & in vnum corpus redacta, ex vino tepido propinato.

• *¶ Aliud ad Tabescentes faciens.* Accipe thuris, piperis, auripigmenti scissilis, cariophylli, singulorum parem modum: omnia conterito ex melle, & fermentata concedito diluculo, & cubitū eunti. Aut auripigmentum scissile pro sale in ouum sorbile mittito, & sorbeto ieiunus. Aut arsenicū tritum ex vino tepido in balneo propinato. Aut arsenicum fissile & vitellum oui misceto, & bombici illinito, & per instrumentum, quod cichonen Græci vocant, suffumigato. Cum vero laboras suffumigio tristabitur, ipsi butyrum ad auellanæ nucis magnitudinem deuorandum exhibeto: iterum q̄ suffumigato: id autem septies repetes. *Aliud.* Styracem bonum, & brasicæ succū, vnā terito: & fermentata ieiuno, aut dormitum eunti, exhibeto. Au. laurei olei & vini boni accipe singulorum vncias iij: misce, & tepidum in balneo propina: & œnelæo i. vino oleo q̄ misto, in olla ca

Defacto stomachum foue. Oenelæum phthifico potui ne dato, sed œnelæum curiose paratum calefacito, & spongia stomachum foueto. *Aliud.* Lupinorum decocto calido myrrham statim vocatam madefacito, & pedes tuslientis foueto, & spongia detergens inungito butyro: deinde iterum foueto: hoc ter facto curabitur. *Aliud.* Hedera grans, aut lignis, aut folijs, tuslientem suffumigato. Aut resinam ex vino veteri tritam ieiuno propinato. Aut agrestis canabis semen tritum ex aqua. Aut cedri liquorem, ieiuno potui dato. Aut hyssopum & pulegium in posca incoctum.

• Aut beronicen melle subactam edendam offeras. Et raphani asii mane ac vesperi si edantur, bene faciunt: & chamæleuce suffita. *Aliud.* Baccas laureas cum pipere, & nucleos pineos ex melle, dato mane & cubitum eunti. *¶ Ad Tussientes, Arteriam asperam, Vocem amissam, & Sanguineum spiritum.* Accipe tragacanthæ, gummi, vtriusq̄ vnciam: myrrhæ bonæ tantundem: dulcis radicis succi, ac vini dulcis, quantum satis est: omnia confusa in vnum redige: cum trita fuerint, arida cum reliquis misce. *¶ Aliud ad Tussiculam, & Vlcera Arteriam.* Accipe terebinthinā, gummi, mellis boni, singulorum vnciam: & terebinthinā prius cū melle elixa gummi adijce: & exhibe olea magnitudinem ore cōtinendam. *Aliud.* Gummi, lycij, vtriusq̄ vncias quatuor in aquā mitte, macerari q̄ finito: deinde heminam cretici pasli infunde, & feruacito vsq̄ ad sordium spissitudinē: & delingendū præbeto. *¶ Aliud, ad Tussiculas, Raucedines, & Sanguinis creatum.* Accipe tragacanthæ

Septima Classis.

YYYYYYY iij

drach. ij.

DE MEDICAMENTIS

uncias ij, lini seminis fricti uncias iiij, amygdalas delibratas decē, nucleum pincum adipi incoctū: E
tragacantham aqua calente madefacito, & reliqua admisceto, passum q̄ infundens conterito. Ad
vocem autem amissam, & sanguineum sputum, pro passo melle vtor. *Aliud.* Raphanum in ta-
leas rotundas concidito, & super prunas assato, ex melle q̄ ieiunus edito. *Ad Tuſſim diuturnam.*
Accipe piperis vnciā, lupinorum farinae uncias tres, & mellis ligulam sorbendum dato. *Aliud.*
Auriculae porcinae os perforatum collo alligatum a tussi futura custodit. *Ad Tuſſim, Columellae*
Vitia, & Tonsillarum phlegmonem. Lapilli in nidis pullorum hirundinum reperti, appenli q̄, a tussi ru-
tum reddunt. *Ad Tuſſim, & Vitiaradicis Vuae, & Destillationem.* Accipe zingiberis drach. j: chal-
bani, opij, styracis, singulorum tantundem: passo excipe, & globulos erui magnitudinis cōficio:
& locopilulae duos cubitum eunti concedito, & passum dilutum postea sorbeto. *Aliud.* Zingi-
beris, styracis, singulorum drachmas quatuor, passo excipito, & instar erui cōficio: & cubitum
eunti pro pilulis tria dato, passum q̄ dilutū postea sorbeto. *Ad Destillationem & Tuſſim probatum.*
Accipe papaveris lachrymae drach. ij, castorei drach. j: confice pastillos erui magnitudinis, &
eunti cubitum pro eius viribus dato. *Aliud quo vtebatur sapientissimus Alexander.* Accipe pyre-
thri drach. ij, costi drach. j: tunde & cribra: in vtendo autē iube nares tangere, statim q̄ constringe.
Ad Arteriam ex destillante pituita laborantem, & Tuſſim. Accipe styracis drach. viij, castorei drach. f. *Ad*
iiij: zingiberis, chalbani, vtriusq; tantundem: in vnum misceto, pastillos q̄ magnitudinem erui
aquantes efficio: & de nocte duos, tres ve exhibeto, postea q̄ bibat, sed non illico, & iuuabitur.

Medicamentum Capiti inspergendum eius Fluxionem finiens.

19.

Accipe hyperici, iunci odorati, iridis, ligni balsami, singulorum vnciam vnam: confusa creta q̄
caluariae inspergito. *Aliud caluariae inspergendum Exiccatorium.* Accipe costi, foliorum, mālaba-
thri, gallarum, spicae nardi, iridis, nardi gallici, rosarum aridarum, singulorum vnciam vnam: tusa
cribrata q̄ inspergito. *Aliud.* Erica seminis, gallarum, iunci odorati, sanfuci, costi, iridis, ligni bal-
sami, singulorum vnciam vnam: tuis cretis q̄ caput conspergito.

Medicamentum, quo hyeme per Manducationem ex capite Pituita detrahitur.

20.

Accipe hyssopi, origani, vtriusq; drach. iiij: pulegij drach. ij, calaminthae drach. vnam, pyrethri
drach. ij: vuae taminiae, marrubij, sinapis, singulorum drach. j: sapae, aceti, vtriusq; sextarium vnū:
oīa in vnum misceto, & vsq; ad tertias decoquito, & gargarizato. *Aliud eiusdem facultatis, quo*
verno tempore vtendum est. Accipe hyssopi uncias iiij, origani uncias ij, pulegij uncias ij, calamin-
thae vnciam j, sapae sextarium vnum, aceti sextarios tres. *Aliud quo aestate & autumnio vtendum.*
Accipe hyssopi vnc. iiij, origani vnc. tres, pulegij vnc. ij: calaminthae, spicae nardi, caryophyllorum, &
singulorum vnciam vnam: cinnami vnc. iiij, marrubij vnc. iiij, iridis vnc. tres, iunci quadrati vnc.
duas, pyrethri vnc. vnam: sapae, aceti, vtriusq; sextarium vnum: decoque vsq; ad tertias, & viere.

Ad Destillationem.

21.

Accipe origani fasciculos duos, pulegij fasciculum vnum, cum aceto in mundam ollam demit-
tito: item caricis sex, vuae passae acinos duodecim: omnia q̄ decoquito vsq; ad tertias: mox perco-
lato, & in poculum conijcito, ac gargarizato.

Ad Humores in Pectore contentos.

22.

Vrticae folia cum hordei cremore decocta exhibeto: hoc inflationes digerit, & materiam ex pe-
ctore euocat.

Ad Tuſſim, Spiritus difficultatem a stomacho, & Sanguinea sputa.

23.

Nouam spongiam & candidam accipito: huius vsuae trita q̄ cinerē cū melle & pipere, quantum
satis est, cōmisceto: in eam q̄ formā redigito, vt delingi possit: vesperi q̄ a coena, quantum tribus di-
gitis capere potes, accipito. *Ad Anginam.*

24.

Bouis masculi felle collum oblinito.

Ad Tuſſim Exiccatorium.

25.

Foenum graecum vsq; ad tertiam partem delixato, iusculum q̄ summo mane ex melle propinato. *H*

Pastillus ad Tuſſim, Fluxionem q̄ pectoris.

26.

Accipe pulegij, hyssopi, piperis, nasturtij, singulorum vnc. vnam: melle comprehende, & pastil-
los effice, singulos vnciae pondus aequantes: his vtor.

Ad Tonsillarum vitia.

27.

Salicis folia & semen in aqua diutius feruefacito, gargarizandam q̄ exhibeto: hoc pinguē pitui-
tam maxime detrahit, & ad anginam bene facit. *Aliud.* Ex myrti lenticulae q̄ decocto gargariza-
ri praecipito. *Ad Anginam.*

28.

Caprinum stercus ex melle gargarizato. Aut rutae succo ore adaperto fauces sublinito.

Ad Destillationem.

29.

Hyssopum, ficos, mel, ac rutam aquae incoquito, eam q̄ gargarizato.

Ad Vocis Claritatem.

30.

Tragacantha vino madefacta & epota vocem claram praestat.

Ad Amissam Vocem.

31.

Styracem aqua maceratum in globulos ciceris magnitudinis redigito: tres exhibeto: & statim
voce recuperata loquetur.

Ad Inflammationem

A *Ad Inflammationem ab erysipelate.* 32.

Sedi folia cū polēta in cataplasmatīs modū iposita. Aut portulacę folia cū polēta. Aut brassicę, aut calami, folia virentia cōterito, & sup̄imponito. Aut rubi, aut rhamni & rosarū, folia sup̄dato.

Ad Lumbricos Aluum occupantes. 33.

Polypodij radicem cum sapa mistam edito. Aut raphani semē ex aqua potato. Aut allium corrodito. Aut vlmī radicē ex mulsa aqua bibito. Aut sycamini radicis cortex aquę incoctus potui detur. Aut nigella potui detur, & in cataplasmatīs modum imponatur. Aut ex aqua brassicę semen habente potio fiat: aut ex mentę succo: aut ex nasturtio atq; menta. *¶ Proprium Experimentum.* Canabis semen aridum tusum cretum q̄ misceto cum aqua, vt succi tēperatura fiat: mox linzeolo mundo percolatum in potum offer. Aut bubulum finum aridum combustū in puluerem redigito, ex eo potui drachmam vnam ex vino dato. *¶ Ad Lumbricos latos & rotundos.* Accipe nitri, nasturtij, piperis, singulorum vnciam: fac puluisculum, & ex vino ligulam propinato.

Ad citandum Sudorem, Finiendam quę Febrim. 34.

B Canchrys semen ex oleo illitum prodest. Aut pyrethrum ex oleo calefactum, & per horam ante inuasionem illitum bene facit. *¶ Aliud ad Febrim expertum.* Oleum cum cinnamo paratum, Boleum chamæmelinum, acetum, nitrum cum laureis folijs: omnia bene elixētur, & ex eo laborans perungatur: & vndiq; contactus statim sudabit. *¶ Illitio ad Febricitantes.* Butyri partes duas, mellis partem vnam, misce: & calefactis vt̄ere. *¶ Aliud.* Lactuę foliorum succi partem vnam, olei vulgaris partes duas, misce: & curiose agitans totum corpus inungito: experientia probatum est. *¶ Aliud.* Artemisię succi partem vnam, rosacei olei partes duas, misce, & vt̄ere.

Ad Dolorem Hemicraniam vocatum. 35.

Solani succus ex oleo illitus vehementer proficit. *¶ Aliud.* Sinapis semen ex melle imponito. *¶ Aliud.* Rutam domesticam aceto & rosaceo incoctam illinito.

Ad Canis morsum. 36.

C Vrticę semen impositum iuuat. Aut nigri marrubij folia. Aut apialstrum ex vino potum, & morribus illitum. Allium quoq; illitum prodest: & tostum in cibum potumq; assumptū. *¶ Ad Timentes Canum impetum.* Nerij radicem collo circumdato, & liberabitur: q̄ si experiri volueris, cum canis in furem versus sit, illi circumponito, statim q̄ furorē deponet. *¶ Ad Morsus Canis rabiosi.* Vulneribus rabiosi canis morfu factis brassicę folia cum lassere trita ex aceto imponantur: per se enim brassica aduersus rabiosi canis morsus proficit: & ipsius decoctum potui datum. Elixā vero Brassica ante alios cibos sumpta phthisicos sanat, vitij q̄ arterię subuenit. Contusa autem, & cataplasmatīs modo lieni imposita, illum extenuat.

Ad Anginam, Colli quę Dolorem. 37.

Alba populus arida cōtrita, & collo illita. Aut nasturtij semen, & finus colūbinus, ex melle imposita bene faciūt. Aut mel tepidū gargarizatū. Aut canino stercore candido trito ex aceto cololum oblinito. *¶ Ad Narium Fœdum odorem.* 38.

Hederę foliorum succus tepidus naribus instillatus. Aut calaminthę succus æque tepidus infusus. Aut myrrha ex muliebri lacte trita infusa q̄ naribus, narium halitum commendat.

Ad Prorumpentem ē Naribus Sanguinem. 39.

Acaciam ex aceto tritam naribus infundito. *¶ Aliud.* Acetum cum sale sumēs in ollam aut mortarium mittito, lanam q̄ accipiens in ipsis madefacito: hæc q̄, quantum laborans ferre poterit, calefacta, eius capiti imponito: illico q̄ velamentis quā plurimis contegi præcipito. *¶ Purgatorium Narium.* Thymum & organū melle exceptum in pastillos redige, cōmanducādos q̄ exhibe.

Ad Lateris Phlegmone correptos. 40.

Hęc oīa benefaciunt, Bdelliū ex vino pariter & ex aqua potū: Aut balsami semen ex aqua potū, aut ex melle delinētū: Aut aristolochię radix ex aqua potui data: Aut ruta ex mulsa itidē pota.

Ad Acutam Febrim. 41.

Peponis domestici succus, aut cucurbitę ramentorū succus, illitus benefacit. Aut rosę ex oleo: Aut plantago in cataplasmatīs modum imposita iuuant.

Præparatum in Febricitantibus. 42.

Rosaceo prius inunge, & apij semen tritum superda: deinde stupam rotundam instar rotę cor di superimponito, luteum q̄ oui infundito, & reticulo contegito. Tum si fiat oui dispersio, mortē adesse scito: hoc enim ipsa anima facere dicitur.

Ad Glutinanda Vulnēra. 43.

Radix graminis contusa, vt aridū medicamen imponatur. Aut sideritidis herbę folia superdētur.

Curatio ad Dolorem Auris. 44.

Amygdalinum oleum in aures instilletur: aut ex nucibus oleum, aut laureū, aut balsamum. Aut dracunculi herbę seminis succus ex oleo infusus. Aut herbę vrceolaris succus ex oleo rosaceo tepidus instilletur. Aut ruta virēs oleo incocta, & tepida in aurē mittatur: aut myrrha ex melle tepida. Aut ruta ex mulieris, quę marē peperit, lacte, tepesiat, & instilletur. Aut ex allio expressum succum in aurē mittito: aut porri succū tepidū: aut sapam tepesactā: aut porri succū melli admixtum.

Septima Classis.

YYYYYYY iij

mistum.

DE MEDICAMENTIS

mistum. Aut oleū ore continens in aurem inspuito. Aut cucurbitæ succum ex rosaceo instillato. E

Ad Scabiem Pruritus que.

45.

Vlmi folia arida trita in balneo inspergito. Aut sulfure ignem non experto, & sylvestri vua, & auripigmento, & sandaracha ex oleo & aceto in balneo oblinito. *Aliud.* Myrrha ex muliebri lacte cutē oblinito. Aut dulcis radicis succū ex passo potui offerito. Aut oua gallinæ integra in acetū acerrimū demitte per diē noctem q̄; quæ si tria fuerint, ipsi cum putaminibus in eodē aceto contritis adijce sulfuris ignem nō experti, auripigmēti scissili, vuæ taminia, cerussa, spumę argēti, nerij fucci, singulorum vnciam vnā: olei veteris quantū satis est: omnibus cōtritis obline in balneo.

Remedia ad Stomachi Vitia.

46.

Ex folijs calaminthæ virentibus, & hordeacea farina, cataplasma conficito. *Ad Cruditatem Inflationes q̄; Ventriculi: quisquis hoc vsus fuerit, statim esuriet.* Accipe anesorum drach. duodecim: piperis albi, lybistici, ammi, petroselini, fœniculi, singulorum drach. sex: hæc tusa & creta melle cocto com-
* prehende: exhibe drachmam vnam. *Ad Aestuantem Ventriculum nec cibi tenacem.* Lactucæ succum ex dulci vino potui dato, nec vomet amplius. *Ad Dolorem Ventriculi.* Lac, in quo carbonēs querni extincti sunt, laboranti propinato. *Ad Acorem in Ventriculo.* Trixago ex vino pota acore liberat. *Ad Inflationem Ventriculi.* Piperis, baccarū lauri, cumini, aneli, pares portiones F
* contusas & cribratas ex temperato vino ieiuno dabis ligulæ vnus mensura per triduum. Aut anesum ieiunus manducato.

Ad quædam Oculorum Vitia & primo ad Oculos Fluxione laborantes.

47.

Fœniculi succus per triduum illitus, aut thus ex melle & lacte, aut centaurij succus ex melle, aut folia herbæ quinq; folij ex melle impolita, benefaciunt. *Ad Caliginem Oculorum.* Cucurbitæ ramentorum succus superdatus proficit. *Ad Albuginem Oculorum.* Alterci folia cum polenta superdato. Lignū balsami quoq; ex muliebri lacte illinito. Aut rutam viridē imponito. Herba præ-
* terea pulicaris ex muliebri lacte, aut calami virentium foliorum succus, illitu prodest. *Ad Oculorum Vertiginem remouendam.* Oleæ folia contunde, & succum expressum illine, atq; miraberis.

Ad Oculorum fluxionem Cataplasma. Portulacæ cum croco & adipe anserino contere: aut apij folia cum polenta. In magnis autem fluxionibus rosas fertulam q̄; cum amylo coctas oculis imponito.

Ad Dentium Dolorem.

48.

Aceto nigellam habente os collue: aut oleo acerbo gallas incoctas habēte: aut aceto, in quo plantani globuli incocti sint, aut quinque folij radix. Item peucedani radix trita & combusta illinatur. Aut malicorij rosarum q̄; decocto os collue. *Ad Dentium Vubius.* Accipe nitri, sepiæ testæ, G
myrrhæ, singulorum vnciam: tritis vtere.

Aridum medicamen, quod Humidum Os cruentum que deterget, Gingiuarum carnem instaurat, Dentes que dealbat.

49.

Accipe nitri cōbusti, myrrhæ troglodytidis, sepiarum testæ, singulorum vnciam: rosarum aridarum vnc. iij: tritis & cretis vtere: addito etiam iridis vnciam vnam: huius effectum miraberis.

Ad Latēis Dolorem.

50.

Virentis brassicæ caules cum radicibus cōbustos adipe suilla comprehende, & vtere: valentissimū remediū est. Aut apij semen decoctū, donec tertia pars relicta sit, potui da: vehementer iuuat.

Ad internos Ani Tumores.

51.

Amaranthum aqua maceratum mane vesperi q̄; propina.

Ad Lienem Cataplasma ualde bonum.

52.

Accipe apiū, sinapi, baccas lauri bene contritas: deinde detrahe corticē nouellæ arboris nucis, & parū cōtunde: deinde oia in pilam coniecta vehementius cōtundito: mox extracta acerrimo aceto per tridū macerato: & omnia in vnum confusa tyberiadis succo incoquito, donec cataplasma fiat: deinde lieni superimponito à matutina vsq; ad octauam horam, aluo tamen prius subducta: H
medicamenti effectum miraberis. *Aliud, ad Lienem, experientia comprobatum.* Ficus nouellæ arboris corticem viridem detrahito, & cum cinere permisceto & calefacito.

Ad Tertianam Febrem.

53.

Mel cum scammonia semel potum curat.

Ad Quartanam.

Accipe piper contritum, laureas baccas, cuminum, mastichē, myrrham, thus mundum: singula separatim trita in vnū cōmisce: & mellis boni, quod satis sit, adijce: & per quatrduum imponito.

Ad Sanguinis ex Naribus profusionem.

54.

Oui putamen integrum comburito, & liquorem ex eo exactum cum fissili arsenico permisce-
* to, in naresq; patientis immittito: si arsenicum præsto non fuerit, solus oui liquor suffecerit. *Aliud.* Capræ fœminæ setas vstas & tritas, & myrrham similiter tritam, cum setis q̄; caprinis mistam, in nares sufflato, si viri fuerint, cum charta: si fœminæ, cum alio quopiam: qua parte autem sanguis erumpit, arcuissime deligato.

Ad Violentas Sanguinis Eruptiones.

55.

Gallas mola tritas, & malicoriū, & punicę malī grana contusa & mista cum oleo, scissili & mel-
* le, ac bene subacta, mane vesperi q̄; propinato, vt mel gallarum.

Ad Ventris

- A** *Ad Ventris Tormina & Inflationes.* 56.
 Accipe piperis, rutæ, zingiberis, pares portiones: & tritas ex aqua calida propinato. Aut artemisiā tufam cretam q̄q̄ dato. Aut nitrum vltum tritum q̄q̄ ex humore aliquo exhibeto.
Vt ne Boves ægrotent. 57.
- Cerui cornu in Panis dei facello ponito, cādēlā q̄q̄ desup accēdito, & ne interdiu accensam obliuione demittito: & in tpe sanctū Demusarim inuocato, & Arsum, q̄ armēta tua & vitā custodiēt.
Vt ne Porci ægrotent. 58.
- * Rhafdi radicem tritam in aquam, vbi sese proluunt sues, projicito.
Ad Carnem Glutinandam. 59.
- Terræ lumbricos frictos tritos q̄q̄ inspergito.
Plagarum Curatio. 60.
- Myrrham & aloen tritam inspergito. Aut resinam pini, vel & mastichen & hederæ lachrymā, ex his factum emplastrum imponito. Aut hircina axungia plagam obline, & capræ nigræ cornu insperge. *Aliud.* Aut costum, spicam, cinnamum, zingiber, cuminum, singulorum parem modū terito: cum pice subigito & imponito. Aut panis crustam aridam tufam, & vino oleo q̄q̄ subactā,
B superdato quotidie per vices mutans.
- Ad Equorum Scabiem.* 61.
 Anguem discindito, eius q̄q̄ adipem capiens ligno equi vngularum oras inungito.
Ad Somnum conciliandum. 62.
- In lauri folijs hæc elementa inscribito, iacentis q̄q̄ stragulis cervicali eo nesciente subijcito.
 ξς, χςς, φθ. *Vt Ne Homo noctu Somniet.* 63.
- Rutæ semen cervicali ipsius nescientis suspendito, nullas q̄q̄ in somnis imagines videbit.
Ad Pectus. 64.
- Cum ouo arsenicū fissile misceto, & piper, & hordei farinam, & lauri baccas, pineos q̄q̄ nucleos, & exhibeto. *Aliud.* Allij accipe spicas septem: arsenici fissilis, piperis, vtriusq̄ grana tredecim:
 • bambacem, pini nucleum, ceræ modicum miscens, cum oui vitello accipe frequenter,
Ad Corrosos Dentes. 65.
- Arsenicum, piper, caseum, calcem viuam, aceto macera, & appone.
Clyster ad Renum Vitia. 66.
- * Accipe pulegium, origanum, sampfucum, serpyllum, chamemalum, absinthium, centaurium,
 Clauri folia, cucumerem syluaticum, peponem: vnā omnia prius contusa aquæ incoquito: deinde cum melle oleo & sale decocti quantum satis est, injicito.
Clyster ad Coxendicis dolorem. 67.
- Accipe cucumeris syluestris radices, lauri folia, rutæ folia, absinthium, plantaginē, trixaginē, marrubium, calamintham, pulegium, origanum, thymum, lactucam, euphorbium, anethum, pyrethrum, vuam taminiam: hæc oninia in aqua incoquito: deinde melle oleo & sale adiecto, per instrumentum admoueto.
Vt Dentes Putridi nigri que splendidi reddantur. 68.
- Accipe salis contriti, ropi, sepiarum testæ, pares portiones: omnibus in vnum tritis dentes fricato, quos prius aceto puro collueris.
Caraplasma ad Caput Fluxione tentatum. 69.
- Hoc remedium præstat, ne caput fluxione vexetur, neq̄ oculum vnquam iniuria affici sinat. Accipe mastiches, myrrhæ, sarcocollæ, thuris, ladani, nitri, cerussæ, terræ cimoliæ, styracis, rosarum aridarum, singulorum vnciam: saponis sancti libram, mellis tantundem, lupinorum amarorum decoctum quod satis est: omnia in vnum misceto, & pro sapone in balneo vtitor.
Pastillus de Seminibus ad Tussientes. 70.
- D** Accipe aneforum amarorum vnciam, fœniculi seminis, alterci seminis, ammiij, singulorū drachmam: apiij seminis drachmas tres, opij drachmam: singula bene terito, & aquam paulatim tepidā infundito, donec sordium balnei spissitudo fiat: pastillos fabæ magnitudinis conficito, vnum q̄q̄ exhibeto, tussientibus nanq̄q̄ prodest.
- Ad Iecoris Vitia remedia experientia confirmata.* 71.
- Gallarum cum papaueris capitulo coctarum ius in balneo potato, contactus, & in latus affectum iacens. Aut hederæ radices decoctum cum vino propinato. *Aliud.* Baccas lauri septem, grana piperis septē, trita ex vino in potum dato. *Aliud.* Aloes drach. iij: assari, costi, eupatoriij, hedyfari, fertulæ campanæ, mastiches, croci, ocymi seminis, singulorum drachmas duas: conterito, cribrato, & ex aqua temperata exhibeto. *Aliud Iecori & Ventriculo commodum.* Accipe lauri baccarum, cinnami boni, caryophyllorum, aloes, hedyfari, costi, singulorum drachmam: contrita, & melle excepta, ex vino vetere potui dato. *Aliud.* Accipe acori, seminis lini, zingiberis, rutæ foliorum mollium, singulorum drachmam: aneforum drachmas quatuor: ex mulsā dato. *Aliud.* Mel cum pane mistum calidum emplastri modo imponito. Aut absinthij ligulam vnam ex temperato melle potui præbe, & super iecur ægrotus decumbat.

DE MEDICAMENTIS

72. E
- Ad Linguam Fluxione laborantem.*
Cynaræ folijs contulis ex melle linguam perungito. Aut venam partis, vnde fluit materia, incido, & bene faciet.
- 73.
- Ad Oris Ariditatem.*
Palmularum ficorum q̄ decocto per pennam illinito, & contineto.
- 74.
- Ad Labia Scissa.*
Lini semen ex melle contritum imposito.
- 75.
- Ad eos, quibus Menti Pili decidunt, quos Græci appellant Spanopogonas, hoc est raribarbos.*
Accipe piperis, euphorbij, pyrethri, singulorum vnciam: calami foliorum molliorum succum, murinum stercus, oleum per combustionem expressum: trita omnia affricato, & assidue radito.
- 76.
- Vomitorium Medicamentum, quod mystri mensura exhibetur.*
Aphronitrum album in aquam tepidam conijce, quoad dissolutum sit: & modicum olei adijce, potandum q̄ exhibe.
- 77.
- Reprimentia Vomitus.*
Menta tusa creta, & rosaceo admista nares pectus q̄ illinito. *Aliud.* Palmulas Thebaicas, & mentæ ramulos, aquæ duorum scyphorum mensura incoquito, quoad sordium balnei temperatura fiat: dimidium propinato. *Aliud.* Palmæ glandium contusarum, quod sufficit, accipe: vini myrtini modicum instillato: deinde exceptas ex mulso aut aquæ hemina exhibeto.
78. F
- Ad Sanguinem Vomentes.*
Iunci odorati ex aqua decoctum propinato.
- 79.
- Ad Citandum Vomitus Pituitæ.*
Viridem mentam, aut siccam ex aqua temperata bibito. *¶ Vt Facile autem Vomat.* Samplici folia potui, raphani vero semen esui, dato: pituitam multam vomitu rejiciet.
- 80.
- Compositio Pilularum purgantium Pituitam.*
Accipe aloes vnc. sex: mastiches, absinthij succi, vtriusque vnc. duas: cucurbitæ syluaticæ vnc. quatuor: dentur pilulæ nouem & viginti.
- 81.
- Ad Oris Stomachi vel Cordis Vitio vexatos.*
Lentem cum spantæo, palmulis, & vino mendelio, elixam potui offero. *¶ Ad Dolorem autem Oris stomachi, vel Cordis.* Herbam sanguinalem curiose tritam, aut mala, aut cotonea elixa cōtrita q̄, rosaceo cerato comprehensa, in modum cataplasmati imposito. Aut portulacam roseo cerato aut myrteo exceptam superdato. *¶ Aliud admirabile, experientia comprobatum.* Accipe seminis lini heminas quatuor, aquæ heminas septem: elixato, & vitior: hoc medicamentum sanitatem creat: neque enim ægrotus in peius ruet, sed in melius proficiet.
- 82.
- Pastillus ad Spiritus difficultate laborantes, & diu Tussientes, suffitu proficiens.*
Accipe nasturtij, sinapis, abrotoni, rutæ syluaticæ, sandarachæ, singulorum vnciam: terito, & ex aqua factis pastillis accurate vtitor.
- 83.
- Ad Difficultatem Spiritus.*
Thymum cum pipere tufum, & melle exceptum, delinctui dato: studiose q̄ vitior, valde enim efficax est. *Aliud.* Porrorum capita melli incocta ieiunus edito. Aut rutæ aridæ, mentæ, vtriusq̄ vncias quatuor, cum melle terito: & cerati duo cubitum eunti ex aqua temperata propinato. luvant autem ægre spirantes & pistaciæ esui data.
- 84.
- Ad Cruentum Sputum.*
Accipe symphyti, mastiches russæ, vtriusq̄ drachmas quatuor: lemnij sigilli, balaustiorū, vtriusque drachmas duas: terito & cribrato, & ex aceto mulso ligulam potui dato. *¶ Aliud expertum.* Lemnij sigilli, vnciam: terræ, quæ astrum dicitur, vncias duas: corallij tantundem: dato ex aceto mulso puro heminam vnam: mane & vesperi hoc vtire. *Aliud.* Acaciæ russæ, amyli medicinalis, pares portiones, terito: & ex aqua temperata potui dato ligulas quinq̄.
85. H
- Ad Febrem Ardentem tollendam.*
Sempuuii & anesi folia quinq̄ aut septē accipito, & oleo rosaceo incoquito: et ex eo à capite vsque ad pedis vestigium pungito, & demiraberis. Aut oleo, in quo pyrethri radix macerata fuerit, inungito: hoc. n. sudores mouet, & diurnos rigores discutit, et corporis partes refrigeratas aut resolutas curat. *Aliud.* Lauri baccas & thymum ex vino terito & illinito, vestibis q̄ contegito: sudabit enim.
- 86.
- Ad Vim Genitalium & Veteres affectus.*
Calamintham tufam cribratam q̄ in pilā conijce: & melle exceptā decoque vsq̄ ad cataplasma tis spissitudinē: & tenui linteolo illitā imposito, & fascia deligato: à multis probatum est. *Aliud.* ad Genitalium confirmationem & Renum. Sed quenquam ne curato, antequam mercedem acceperis: à multis enim expertum est. Accipe zingiberis drach. iiii: herbæ sabina, piperis albi, vtriusq̄ drachmam: ex mulso exhibeto. *Aliud.* Picis aridæ, telephij, colophonix, mastiches, nitri albi, pares portiones: conterito, & aridum medicamentum facito: et locum prius lotum & adhuc calentem liquida pice oblinito: & aridum medicamen inspergito, super q̄ imposito, & bene deligato.
- 87.
- Ad Discutiendas Genuum Fluxiones.*
Caprifici contritæ succo perfricato. Aut radicis succum in balneo affricato. Aut salem columbinum q̄ finum terens ex oleo inungito.
- Cataplasma.

- A** *Cataplasma ad Pedum laborem, ex offensione, aut casu, aut aliquo alio acri dolore.* 88.
 Accipe salis vsti, origani, cineris sarmentorum vitium, pares portiones: vitellos ouorum duos aut tres: cum vino mista superimponito.
Ad Scabros Vngues diuinum auxilium. 89.
 * Vnguibus ex casu reuulsis, & vitio, quod paronychion græce, latine Reduuiā dicitur, affectis, sachar tritum & in puluisculum redactum, ac inspersum, succurrit. Scabros autem vngues mundabis, si sulfur igne non expertum & oui luteum equa portione miscebis, atq; ex aceto imposueris.
Ad Ambusta. 90.
 Accipe argenti spumæ, croci, vtriusq; vncias duas: ouorum assatorum vitellos ponderis vnciarum quatuor: rosacei, quod sufficit. *Aliud.* Linteoli vsti cinerem cum rosaceo misce, & cera anchusa q; adiecta vtere.
Ad Sanguinis ex quavis parte Eruptionem. 91.
 Accipe foreos, atramenti sutorij, aluminis, chalcitidis, mysios, gypsi, gummi, singulorum drachmas octo: tritis vitior: valde bonum est, & experiētia testimonio comprobatur. *Aliud.* Chalcitidis drachmas vi, resinę frictæ drachmas iij, pulueris thuris drachmas duas: arido medicamine
B vitior. *Ad Impetigines expertum.* 92.
 Ex his constat. Thuris masculi, zingiberis, aloes, sulfuris ignem non experti, singulorum drachmas binas: aceto excepta penna illinito, loco prius laneo panno perfricato. *Aliud.* Ammonia cæ gutta, alcyonij, sulfuris ignem non experti, pares portiones: contere, & vtere.
Ad Dealbandam Faciem. 93.
 Accipe alcyonium combustum: & tritum, cum melle & farina misce, & deterge. *Aliud.* Lyso-
 mumudon terens ex aceto in Sole illinito. Aut ollarum florem terito ex aceto: deinde locum panno perfrictum, quoad rubescat, in Sole inungito. *¶ Vt Facies munda fiat.* Butyro cum sapone misto faciem illine.
Ad Dolorem Vteri remedium Sanctorum argentum non possidentium. 94.
 Asarum cum pulegio potui offerro. *Paximadum vocaturum, i. panis biscocti, purgatoria* 95.
 Accipe scammonie drach. ij aut tres, mastiches drach. iij, apij seminis drach. ij, polypodij drach. iij, cinnamomi drach. i, fermenti mundi libram i: arida permisce, & subige diligenter.
Ad Necandos Culices. 96.
 Ex nigella & sutorio atramento suffimentum facito. *Ad Abigendos Serpentes.* 97.
C Chalbanum, cerui cornu, caprinæ vngulas, & lilij radicem, suffito. Ad morsum vero serpentis
 sal porrum q; imponuntur vtiliter. *Ad Fugandos Pulices.* 98.
 Syluestris cucumeris foliorum decocto domum conspergito.
Ad Difficultatem Urinæ lumentorum. 99.
 Salsarum oliuarū quod intus ligneū est, conterito, & contegens per dies quinq; suffumigato.
Ad Ictum Calami. 100.
 Radices calami combustæ cinerem superimponito.
Ad Morbum Comitialem valde efficax. 101.
 Coturnicū cerebrū ex vnguento myrteo tritū stāneo vase reponito: & cum quēpiā morbo comitiali prolapsus videris, eo faciem illinito: admiraberis. n. huiusce naturalis auxilij efficaciam, nam statim ægrotus consurget. *Ad Appetentiam Cibi excitandam.* 102.
 Accipe myrrham, thus, ammoniacum, mastichen: & ex oui albo tritis peccus viscera q; oblinito, & stupam superdato. *Ad Hirudines deuoratas.* 103.
 Eos, qui hirudines deuorarunt, aduersus Solē cōstituito: & locū, vbi inhæreant aiaduertito, & garum ipsis instillato: statim. n. locū relinquunt, & expuuntur. Aut acetū cū butyro mistū, in quo
D ferrū candens extinctū sit, potui dato: hirudines. n. eiicit. Aut eum, qui hirudinē deuorauit, in calidā aquā mento tenus demittito: phialā vero frigidā plenā ori eius adinuoeto, sed potui ne dato: statim hirudo exhibit. *Aliud.* Hirudines deuoratas calidum acetum absorptum excutit: aut succus syriacus epotus: aut suffiti cimices. *Ad Apum Ictus.* 104.
 Succus maluæ ab apibus ictos indolentes reddit. *Ad Serpentum Morsus.* 105.
 * Cornu ceruinum vstum & ex aceto tritum illinito: aut furni fuliginem. Aut calami radices, &
 * cicer, & baccas cupressi, & cornu cerui, combusta omnia trita q; in vnum misceto, & ex aceto ac porro propinato.
Ad Inflammationes à Venæ incisione factas, & Duritias humerorum, & Deuersiones, & Sanguinis concretiones. 106.
 Fermento triticeo, cum axungia subactio, summo studio vtere: probatum enim est.
Ad Hydropicos. 107.
 Stercus bubulum accipito, si mas egrotet, maris: si foemina, foemina: in ollam nouam conijce, * contege: operculum luto, ne diffletur, obline: ollam deinde super cinerem viuæ calcis per dies septem statue. Octauo die detecta olla sterus exime: & aridum medicamentum vitreo vase reponne. Cum vti voles, tres ligulas ex vino per septem dies exhibeto, sed in vino rurā feruefacias. Hæc potio

DE MEDICAMENTIS

potio bene facit, etiam si tumores adsint, & oedemata: resiccat, euacuat q̄ per lotium: agrotus autem non potest per totum diem, nisi ter, expertum nanq̄ est.

Vt Vinum odio sit, & quo modo Cauenda Ebrietas.

108.

Vinum, in quo anguilla suffocata sit, potui exhibitum, vini odium parit. Idem præstat & vua inferuetacta. Si tutus ab ebrietate & morbo custodiri velis, folia rutæ edito: finiunt eadem capitis dolorem ex vino. Idem & acorus facit in cibum sumpta, & Thebaica palmula. Ebrietate non tentatur, qui prius aut septem, aut nouem, aut vñdecim amaras amygdalas ediderit. Ita etiam qui pulmonem ouis elixum ieiunus ediderit, quantumvis bibat, ebrietatem non sentiet.

Vt quis ex vñotantum vini scypho Ebrius fiat.

109.

Sarmentorum viridis aut aridæ vitis modicum comburens, in phiala, vbi vinum est, extinguit: statim ebrietate corripitur.

Ad Lenticulas in Facie.

110.

Baccarum lauri interiora ex melle trita illinito. Aut nucleum pineum melli incoctum oculis imponite.

Ad Infantium Procidentem Sedem.

111.

Fabrorum aqua, in qua candens ferrum extingunt, calefacta subluo, deinde cochleam combustam & in puluisculum redactam inspergito.

Ad Gingiuas Pueri, & Dentes orientes.

112.

Rosarum floribus tritis ex melle illinito, aut ouis cerebro ex melle, aut butyro ex melle.

Ad Lac multum Creandum.

113.

•• Sesami semen tritum ex passo potum, aut ptisana elixa cum fœniculo absorpta, aut nasturtium cum brassica potum.

Ad Exustiones per Hyemem.

114.

Muria foueto. Ex elixa lente & micis panis cum rosaceo tritis cata plasma facito.

Ad Aquosum Ramicem.

115.

* Plumbaginem cum sulfure, & aceto pauco, & oleo decoque, & illine locum. Aliud. Veteres nuces putridas contritas in mortario accipe & inunge. Aliud. Acetum potui dato, & cerui cornu vñsum ad cataplasmatum modum imponito. Aut ex argenti spuma cum aceto & oleo mista ad Solem perungito.

Ad Vñlus incurabile in quauis corporis parte.

116.

Buglosson herbam euellito, & succisas radices curiose lotas in pila conterito, suillam axungiam adijcito, ac bene emolliens vulnere imponito.

Ad Vomitum.

117.

Accipe apij radices quinque, fœniculi radices teneras quatuor, anesi drachmam, acetum, mel, & crocum inerum: omnia sine croco decoquantur: & post cocturam crocum iniiciatur, detur q̄ phialæ dimidium.

Ad Aphas, hoc est Oris Vlcera.

118.

•• Oliuæ molles manducentur. Aut vuæ passæ agrestes aceto incoquantur, & ex eo os colluatur.

Ad Capitis Tumores, quos Talpas nominant.

119.

•• Locum prius mulso lauato, deinde bubulum fel iniicito, & leporis sterus, aut quod ex sapone confectum est. Aut rutæ succum in foramina instillato. Aut aristolochiam tritam in ipsa foramina cum aceto infundito.

De Viribus Rutæ.

120.

Ruta in primis esui potui q̄ data visum acuit: veneris appetentiam extinguit: capitis dolorem leuat, si quis teneris eius folijs capitis ossa contegat. Succus præterea rutæ cum fœniculi succo, & melle commistus atq̄ illitus hebetem visum acutiorem reddit. Idem præstat & seminis rhani succus ex mulso illitus. Menta quoq̄ cum polenta in cataplasmatum modum imposita abscessus sanat.

Ad Supprimendum Sanguinem.

121.

•• Beronicem mellis super prunas cocti plenam edendam apponito: & brassicæ ocymi q̄ seminis, vtriusq̄ grana sex trita potui dato ex vino mulieri à multi sanguinis profluuiio male habitæ.

Præsagium de Agrotante.

122.

Salicis tenera folia contusa illinito: si roseus fiet, euadet: si viridis, morietur.

Ad Impediendam Venerem.

123.

•• Erucam sacerdotes edunt & rutam & viticem. Erucæ igitur semen ex melle, aut cum fœnogracæ co ieiuno illitum penem arrigi non sinit.

Ad Dolorem Oculorum.

124.

Crocum tritum, & cum liquore, qui à rosa stillauit, fermentatum, illinito.

Ad Capitis Dolorem.

125.

Si hæc adsint signa, oculorum tenebræ, capitis ipsius dolor, aurium sonus, nasi obstructio, summo mane oculorum lachrymæ, non nullis & oculi caligant: quibus hæc adsunt, caput hunc in modum purgato: origano hyssopo & sale nares perfricato, neque in posterum caput dolebit. Quod si neglexeris, morbi huiusmodi sequentur, obtusus visus, aurium sonus, capillorum casus, & dentium dolor.

De Pectore

A

De Pectore Humano.

126.

Cum pectus aliquod vitium passurum est, in primis humiditatem in ipso sentire videtur: & in costis, crudis abundat humoribus, æstuationem sitim q̄q̄ habet, ipsius lingua aspera est & spumās, & singulis horis saliuā decurrit. Conuenit autem ipsum a cēna vomere: aut summo mane stomachū purgare præsumptis raphani radicū corticibus, aut sinapi virēti, aut cruca, aut nasturtio ex aqua tepida, & statim vomens sanabitur. Si negligenter se gesserit, in spiritus difficultatem, & lateris dolores, & febres acutas incidet, atq̄ penitus somno carebit.

De Ventre.

127.

Quando in ventre vitium aliquod suborturum est, primo tormina dolores q̄q̄ in ventre sentiantur: & alui suppressio, & excretio: & in ipso cibi perturbantur, & potiones amaræ videntur: & grauitas in gēnibus, & circa lumbos renes q̄q̄ dolores sunt: & omnino febricitabit. His ita se habentibus, simplicibus medicinis purgare oportet. Cnicum igitur contusum, & aqua dissolutum, potui dato. Aut brassicæ, aut betæ succum melle conditū adiecto modico salis propinato, & miraberis. Si res neglecta fuerit, difficultas intestinorum, desidendi immoderata cupiditas, & dorsi dolores impendent.

Ad Grauem Auditum, & Aurium Sonum.

128.

Nitrum in acetum conijce, oleum q̄q̄ roseum & vinum infunde, & capitis posteriora inunge. *Abud.* Nigri veratri radicem in aurem conijce, & sanabitur: expertum enim est.

Ad Custodiendam Vitem.

129.

Centaurij decocto palmites vitis conspergito: hoc canes, vulpes, & cœli volatilia propulsat.

Ad Vteri Strangulatus.

130.

Os cordis cerui accipe, tere, & potui da mulieri: & videbis gloriam dei.

Ad Lumbricos mirabile remedium.

131.

Nigellam tritam ex garo potui dato.

Ad Dignoscendum Mas'ne, an Foemina, Sterilis sit.

132.

Lentem in vtriusq̄ vrinam separatim conijce: & vtrius lens germinabit, ille est filium creans, cuius vero lens non germinat, ille sterilis est.

Ad Rigorem.

133.

Scribe i tribus malis Pepopulas: aut ita dicito, Sauus, drauus, danonus, danubius: & esui dato.

Confectio Gari Ioachi martyropolitæ.

134.

Accipe frustulorum panis non fermentati, non conditi, putrefacti, libram: nigellæ tziaricam, semicontusam mentam, calamintham, bunisam aridam, vtranq̄ semilibræ pondere: rutę, syluestris thymbre, sceniculi, singulorum tramia quadraginta: anisi tramia triginta, nanachuā tramia quadraginta, vuarum passarum pinguium maturarum semilibram, palmularum mundarum tziaricam: mellis veri, hilari melisij semilibram: sacchari cantij tziaricam: rosarum aridarum, aut humoris ab ipsis per ignem extracti, tramia centum. Hæc in doliolum cum aqua conijcienda sunt, Soli q̄q̄ per quadraginta dies exponenda. Iplis vero adijcere oportet in puro linteolo deligata ligni aloes tramia quinq̄, spicæ tramia septem, caryophyllorū tramia duo, croci tramia tria: mastiches, thuris, vtriusq̄ tramia decē: struthij corticis tramia quindecim, musci tramiū, ampar tramia duo. Omnia linteolo inclusa in dolioli medium succum demittito: & per quadraginta dies quotidie terito, & exprimito, suspendens videlicet in dolio in medio succo: & post quadraginta dies aquam succo superfluantem colligito, & in altero vase reponito: & in succum alteram aquam inijcito, & vtraq̄ insolato. Sed postquam totum ius coactum fuerit in altero vase, tūc in nitido cacabo aut in olla vsq̄ ad tertias decoquito, & cotoneis maturis impleto: linteolum autem nunquam de medio garo eximito: & optimum garum, omnibus q̄q̄ hominibus vtile conficies.

De Capitis Doloze Barnabæ monachi.

135.

Accipe farinam fabaceam, quantum manu capere potes: & mastiches, cumini q̄q̄ parum, in vnū miscere oportet cum succo malorum cotoneorum: emplastrum facito, & membranæ illitum fronti imponito.

Ad Vrinæ Difficultatem.

136.

Vnguentum optimum in vrinarium iter infundito, statim vrinam reddet. Aut mel, & syluestrē canabim, in vnum misce, & perinæo impone. Aut muscum in vrinarium meatum immitte.

Ad Sanguinis è Naribus profluium.

137.

Canabina folia trita & arida in narem sufflato. Aut pannum lineū combustum ex acri aceto in nares immittito.

Ad Vteros.

138.

Obsonium è iusculo, & amanetarium verum, & cardid: vsta ex vino veteri potui dato.

Ne Arbor Fructum amittat.

139.

Lilij radicē arbori supendito: ibi q̄q̄ fructus hærebit, & nō cadet.

Ad Vulnus.

140.

Corcum pelle & cornu cerui combure, & ex oleo inunge.

Ad Stomachum.

141.

Rutam & thymbam cum ouo: & cuminum, & mentæ radices potui dato.

Ad Impetigines.

142.

Pipere trito ex muliebri lacte inungito, & sanabitur.

Ad Dolorem Dentium.

143.

Ouorum putamina, sapiam, & oleum misceto: & coquito, donec tertia pars relinquatur: & tepidum ore contineto.

Ad Lumbricos Ventris.

144.

Cornu cerui ramenta ex vino veteri potui dato à balneo.

Ad Vrinæ

DE MEDICAMENTIS

145. E
- Ad Vrinæ Difficultatem.*
Coriandrum, mentam, & aquam cum melle decoquito, quoad tertia pars supersit, & in potum offerro. *Ad Vultus, dulce.* 146.
- Suillum fimum cum oleo & acri aceto misceto: & locum prius setaceo panno excoriatum inungito. *Ad Dolorem Lateris.* 147.
- Paliuri radicem vino incoquito, donec tertia pars remaneat: & à balneo potui exhibeto. *Ad Iecur & Stomachum.* 148.
- Accipe aloes, & spicæ, vtriusq; miliarisium: ex vino à balneo propinato. *Ad Conciliandum Somnum.* 149.
- Caprinum fimum cum trixagine ad luti spissitudinem misceto, & faciem oblinito. *Ad Tussim.* 150.
- Raphani semen & fœniculi ex melle potui dato. *Ad Cordis Dolorem.* 151.
- Rutam, & lini fœniculi q; semen cordi imposito. *Ad Lumbricos aluum occupantes.* 152.
- Lupinos, lauri baccas, taurinum fel misceto, & vmbilico superdato. *Ad Hæmorrhoidas.* 153. F
- Testudinis testa suffita bene facit. *Ad Exustionem.* 154.
- Ouorum assorum vitellos in sartagine combure, & in modum emplastri impone. *Ad Pruritus.* 155.
- Garum, sulfur ignem non expertum, & oleum misce, & inunge: effectum miraberis. *Ad Morbum Regium.* 156.
- Chrysolachani semen, mel, & crocum confundito, & in lectulo cubantem illinito: bene facit. *Ad Vermes.* 157.
- Chamaeleonis radicē contunde, & vrticæ summitates contritas iniice. *Ad Tussim.* 158.
- Fœniculi radices contritas ieiuno potui dato: admirabile remedium est. *Ad Comam.* 159.
- Maluam, & saluix radicem, conterito diligenter, & in vas cum generoso vino conijcito, à balneo q; comam illinito. *Ad Aurium Dolores.* 160.
- Rubi succus expressus, tepesactus, & in aurem infusus dolorem finit. *Ad Regium Morbum.* 161.
- Chrysolachani contuli, mellis, vtriusq; ligulam vnā, ex vino calido ieiuno exhibe. *Aliud.*
- Valde bonum. In dextram aurem iacenti tenuem venam cædito: & sanguine effluente vtilitatem miraberis. Si lienis vero doleat, idem facito in sinistram latus iacenti. *Ad Iecimorosos, Lienosos, & à Stomacho laborantes, præsentissimum remedium.* 162.
- Viticis grana esui potui q; ex vino mane vespere q; exhibeto. *Aliud.* Apij & petroselinī macedonici semen, & cicer, & viticis semen: omnia conterito, & ex vino calido potui dato. *Remedium ad Renum Vitia.* 163.
- Eruce, nasturtij, raphani semina, conterito, & melle attico comprehendito, & ex vino vetere drachmam potui concedito. *Basilij Iſci Melitini de Ratione victus ad regium notarium grammaticum.*
- Confectio Vini perspicui & coccini.* 164.
- Dolium vino impleto, quantum fuerint mensuræ viginti: & ex ipso mensuras duas accipe, & in lapideam ollam conijce: & adde seminis fœniculi, lini, singulorum miliaria centum: anisi miliaria l. cū his bene seruefacere oportet: & ex sacculo percolare, & sextarium in dolium mittere: deinde accipe trispidij miliaria centum, caryophyllorum miliaria quinque, croci miliarium: cyperi, ligni aloes, vtriusq; miliaria quinque: omnia in vnum trita & cribrata lineo linteolo inuoluito, & in medio dolio statuito, atq; vitior. *H*
- Eiusdem Roborantia Stomachum pituitæ plenum, & dolorem capiti inferentem.* 165.
- Te oportet singulis diebus rosei mellis miliaria viginti accipere, apij seminis miliarium vnum, anisi miliarium semis: & ieiunare vsq; ad meridiē, & tūc cibū capere. Nam propterea ita te facere statuimus, quoniam rosa stomachum confirmat, māstiche calefacit: fœniculū & apium, si in ieiunore ac liene multitudinem atrorum succorum offenderint, detrahunt, & per lotium eiciunt absq; molestia: anisum vero, eo q; flatu à ventre dilijcit, stomachum q; corroborat. Iccirco te vsq; ad meridiem cibo abstinere præcepimus, vt ne alter morbus appareret, vt q; vis herbarum diutius in ventriculo moraretur. Cum vero decem dies præterierint, eundem ordinem assidue obseruato cum roseo saccharo, vt stomacho robur addatur, viuasq; indolenter. Fecimus autem & de alimen
- to sermonem hunc in modum. *Ratio victus in cibis & ieiunio.* 166.
- Primo die amygdalas amaras decē cū pane & vino, quantum satis sit, te edere cōuenit. Secūdo die mel cum pane & vino, quod sufficiat, edito. Tercio die agni anniculi carne vescaris: eius scapu
- lam elixam igne torreto, cum pane biscocto & vino quod satis, edito. Quarto die oryzam solam aquæ incoctam addito melle cum pane & vino, quantum sufficit, edito. Quinto die grana punici
- * mali, amygdalas, allium, cum dauco, ficis aridis, & vuis passis decoque: & vescere cum pane & vino,

A vino, quod sufficiat. Sexto die similem carnem anniculam in sartagine cum dauco decoquito, & vescere: panis & vini, quod satis est, addito, ut vis punici mali obtundatur, frigida enim est: atque ideo malum punicum adiectum fuit, ut quæ antea per quinque dies assumpta fuerant, refrigerarentur, erant enim re vera calida. Septimo die carnem minutatim concisam cum cicere & condimentis decoque: & vescere, quantum satis est. Octavo die carnem cum aceto, caricis, amygdalis, nucibus syriacis, croco, dauco, passis vuvis, cum alijs carnibus concilis, cum melle, quod satis sit, decoque: & vescere cum vino, quantum sufficiat. Decimo autem die ciborum ieiunijque ratio ita se habet: mali punici granum, quemadmodum & prædicta, decoque: & cum vino, quod sufficit, æde. Hæc est sumendi cibi ratio: semper tempore cœnæ menta ex melle vitior, ut cibi conficiatur, & ne pituita ventriculus abundet. Quod aut bona valetudine fruaris, venam sine noxia causa ne secato. Quod si morbus caput tentauerit, venam caluariæ secato, & extrahe sanguinis miliaria decem: hoc autem bis feceris & aprili mense, & septembri, per triduum ante & post abstinentiam imperans. Auxilium quoque bis prædictis mensibus deuorato: & capitulis papaueris, ut dormias vttere: caueas que a coitu: quod si velis, semel in septimana post noctem mediam id facito. At Iulio mense & Augusto te per biduum vomere oportet: utrumque, quoniam per diem vnicum stomachus purgari non potest.

B Quando autem vomis, caueto, ne aquam prius, aut postea biberis: dum quod vomis, oculos velato, & deligato, stans quod vomito loco edito, aut super fluuium: a vomitu si sitias, bibe zulapium, & sobrius esto. Te vti lauatione oportet mense Aprili usque in totum Nouembrem: ceteris mensibus abstineti: quod si lauari volueris, semel tantum in septimana lauato, id quod semper ieiunus. Si sitias, temperatam aquam bibito: & balneum egressus oleo, & mulieris lacte, quæ foeminam peperit, caput irrigato: per noctem autem pedes calenti aqua cum fursibus foueto.

Ad Capitis Dolorem.

167.

Accipe amygdalarum libras tres, seminum cucurbitæ librâ vnam: oleo ab utrisque expresso, capitis verticem, nares, pedes ac manus inungito.

Aduersus Vini Noxam.

168.

Coronea mala matura dulcia accipito, & mundato: deinde succum exprime, & in vinum infunde.

Inunctio experta ad Artuum Dolorem, Manuum pedumque intertrimenta, corruptelas, adustiones hyemis

¶ Ventri manus pedesque laedentis, qui Sarracenica lingua Tlen dicitur. Compositio ita se habet.

169.

Accipe axungia anserina partes duas, & medullam ceruorum iuuenum, & martasancem rapam, & mel super carbones decoctum & percolatum: pone in lapideum lebetem, & seruefacito, quoad prædicta pingua tabescant: quibus adhuc calidis martasancem iniicito: & cum prorsum

refruxerint, mel addito, & bene instar malagmatis subigito: & ad ignem, aut in furno inungito, & bene perfricato: tantisper autem inunge, donec dolor abscesserit.

Ad Aegylopos, i. fistulas angulorum oculi.

170.

Taurinum fel, & liquidam picem, & acetum, in vnum miscens, emplastrum conficito, & imponito. Aut rute folia cum chorygio in foramina immittito.

Ad Vulnere Incurabilia.

171.

Ariore panij radicem in vinum dulce demittito, & agrotanti potui dato.

Ad Pulmonum Inflammationes.

172.

Piperis grana xv, salis micas non lotas totidem: terito, & teaphen addito, in vnum quod cogito: & cum fimo galline rufæ, atque oleo inungito. Aut dauci semine, & nigellâ, & porrû cõttere, & potui exhibe.

Ad Talpas.

173.

Accipe trixaginem & hordeaceam farinam cum melle fermentato, & inungito, & in modum cataplasmatismatis imponito.

Ad Dolorem Ventris & Stomachi.

174.

Thus cum vino antiquo in cacabum coniicito, & donec tertia pars supersit, decoquito, atque ita in balneo propinato. Aut oleum & vinum perinde coquito, & tepidum in balneo potui dato.

Ad Stomachi Vitia.

175.

C Cuminum & cinnamomum cõtрито: & myrrhâ, mastichê, & bliscune modicum adijcito: deinde cocta & mista potui offero. Aut mentæ ramulos tres, & grana punici mali, & palmulas propinato.

Ad Debilitatem Genuum.

176.

Lini semen & mel in aqua seruefacito, & cordi in modum cataplasmatismatis imponito.

Ad Dolorem Lateris.

177.

Ex cumino triticea farina & vino veteri cataplasma facito, & cordi superdato.

Ad Lienosos.

178.

Brassicæ folia, ammoniacum, acre acetum: omnia misceto, conterito, & locum per triduum oblinito. Aut platani folia aqua incoquito, quoad tertia pars supersit, & potui dato. Aut brassicæ folia igne torreto, & trita ex vino propinato.

Ad Profluuium Sanguinis muliebri.

178.

Taurini cornu ramenta ex aqua pota sanguinis profluuium sistunt. Aut lulacem, & brassicæ semina, & scammoniam, in vnum misceto, & potanda exhibeto.

Ad Stomachi Compressionem.

180.

Accipe gallas tritas, & rhoi flores, aut mali coria, & usque ad tertiam partem decocta: aut foeniculi mellis incocti ius, potui dato.

Ad Coeliacos, hoc est Ventriculosos.

181.

Nasturtij semine in nouâ ollâ conijce, & decoque: deinde ouum separatim elixa, & eius putamen detrahito.

DE MEDICAMENTIS

trahito, & ipsum diligenter coterito: & nasturtij semini elixo adijcito, & vnâ seruefacito: atq; si ve-
lit egrotâs, edito, sin id nō possit, aquâ potato. Aut taurinos renes frictos potui dato. Aut veterē
caleum acri aceto incoctum ieiuno esui concedito. *Ad Vrinæ Difficultatem.* 182.

Pagurum fluuiatilem conterito, & panniculo expressum potui exhibeto. Aut fœniculi radi-
ces ad tertiam partem decoctas laboranti propinato.

Ad Exterius prominentes An tumores. 183.

Viuam calcem & recens auripigmentū in vnū mista imposito. *Ad Artuum Dolores.* 184.

Quinqueneruiū & scorpidiū & acetum modicū misceto, & locū oblinito. Aut sinapi & caricas
in vnum conterito, & in balneo superdato. *Ad Dolorem Genuum.* 185.

Maluam, hordei farinam, lini semē, vnâ contere: & in sartagine cum oleo fricta loco impone.

Ad Ossa Fracta. 186.

Accipe picē, thuris puluerē, palmulas, maluæ florem, oui album: omnia mista imposito, & stu-
pa superaddita, calamis ac fascia deligato: sanabitur. *Ad Quartanam.* 187.

Vinum vetus trixaginem incoctam habens ter potui dato.

Ad Morsum Scorpij. 188.

Testā igne candentem impone. Aut alam ex melle potui dato. Aut humum respiciens, quem F
lapidem piemebas, eum imposito. *Ad Veneficia & Præstigia.* 189.

Caridion & latum cuminum & zochij radicem ad tertiam partem decoque: & ex vino vete-
re potui da. Gestet & glaneum ossa: hæc enim suffita demonas abigunt.

Vt Mulier concipiat. 190.

Leporis vterum frige, tritum q; assidue propina: habeat autem & leporis sanguinē. Aut vul-
pis stercus cum seuo bubulo misce, & mulieris viri q; genitalia inunge.

Ad Fœtum in Vtero Mortuum. 191.

Muliebri lac cū melle & radicibus amarāthi potui dato, & exhibet. *Vt Lac abundet.* 192.

Fœniculum & anethum cum melle & vino decoque, & quotidie mammas obline: lacte mulier
affluet. *Ad Vteros.* 193.

* Gallinam iugulato, & festucam lineo panniculo inuolutam intra eam condito, atq; ita elixato:
ius potui dato: suito vero gallinæ oculos, & manetarem verum, & caridion vre, & propina.

De Inuoluntario Mictu. 194.

Galli gulam gutturi annexam concidito, & vrito, ac diligenter terito, & ex vino vetere potui
dato. *Ad Roborandum Penem.* 195. G

* Rapi semen tritum melli admisceto, & panniculo attrito illitum peni circumdato.

Ad Scabiem Vnguium. 196.

* Sinapi mentam q; ex aceto coctam imposito.

Ad Intertrigines. 197.

Muscum marinum aque marinæ incoquito, & expresso humore imposito.

Ad Podagram. 198.

Accipe myrrham Mur vocatam, herbam q; policarem, aut pyzurcatum mystri mēsurā ex ace-
to, pedes illinito. *Ad Roborandum Stomachum.* 199.

* Accipe lignum aloes, acorum, cyperum, mastichen, thus, nigellam, fœniculum, & spanthos:
valde conterito, & in vnum corpus redigito: & ex succo punici mali & melle super carbones co-
cto potui offeras. *Ad Sputum.* 200.

Rosaceum Zupha, aut hyssopi, quod ad Tussum facit, & Angustiam & Dolorem Pectoris. Compositio hæc est.

* Accipe manuliacorum drach. ij, vnapia, vel zizipha numero viginti, zepistania, vel myxia to-
tidem, ficos aspr. dulces numero xv, aut dulcem radicem semitritam mensura drachmæ: chaschalis
contuli, vel papaueris capitulorum drach. v: parelausia, vel polytrichi, drach. ij: anesuen, vel dulcis
anesi drach. ij: tolme caraus, vel apij seminis, drach. ij: vuas passas, grana bona logaricæ s. zupha H
vel hyssopi drach. ij: rhazani, vel seminis fœniculi, drach. duas. Vuas passas, grana q; mista laua-
to: & emoschasum ex aqua refrigera per diem vnum & summo mane: vt elixatum cum prædicto
videlicet logaricyon vnc. iiij: & tantisper decoquatur, donec aquæ remaneat logarica vna & se-
mis: & tunc percoletur, vt certo sciatur in ipsa nullam remanere materiam: deinde sacchari logari-
cam vnam addito, vt zulapion fiat: & quotidie vnum potato per dies octo, & oleum amygdalinū
instillato. *Ad Vomitum Biliosum.* 201.

Bilem vomētibus huiusmodi cataplasma adhibendum est, quod ex his constat: Palmulis mali-
corio gallis in vino aut posca incoctis & pane exceptis. Acacia præterea, hypocistis, & balauitia, &
rhus cataplasmatibus adijciuntur. Item cucurbitula magna cum multa flamma stomacho si affigatur,
bene facit. Cibus paucus & crebro exhibendus est. Verum ad atram bilem vomentes & stoma-
chum inflatum spongiâs aceto acerrimo calido imbutas adhibeto. Aut ex hedere folijs vino inco-
ctis cataplasma facito. *De Singultu.* 202.

Singultus aut ex repletione, aut ex inanitate, aut ob acres humores stomachum mordentes, ex-
citur: quibus vomitu reiectis desinit. Pleriq; autem, si compositione ex tribus piperibus deuo-
rata, mox vinum biberint, singultu solent. Cibo præterea in mordacem qualitatem corrupto qui-
dam

Adam singultiunt. Vomitu sanè ob plenitudinem aut morsum singultientibus remedio esse inuenimus: calorem ijs, qui ex refrigeratione. Si vero ex humorum copia singultus fiat, euacuare vehementius oportet, id sternutatio præstabit: sed ab euacuatione singultu sternutatio non curat. Singultientibus autem ruta ex vino danda est, aut nitrum ex mulla, aut fefeli, aut daucum, aut cuminum, aut zingiber, aut calamintha, aut nardum gallicu. Hæc singultibus ex cibi corruptela, aut ex frigore, aut ex multitudine ciborum, auxilia sunt. Ad eos vero, qui ob frigidorum, aut crassorum succorum multitudinem singultiunt, castorium ex posca potui datum bene facit: cuti quoque ex oleo vetere cucumerino illitum prodest. Scillinum quoque, aut mullum acetum potum iuuat. Item spiritus retentio magnifice singultum discutit.

Ad Pedum Intervimenta, Scissuras, & Perniones.

CAP. 203.

* Rubricæ vel sinopidis, & cimoliæ, paribus portionibus ex caprifici succo illinito. *Aliud.* Hederam, calamintham, & salem, in aqua simul incoquito diligenter, ac pedes semel atque iterum lauato: & sanitatem recuperant. *Aliud.* Muriam crassam cum feceris, calide aquæ admisceto: ex ea pedes ac perniones foueto. Tertium, sal, cuminum, oleumque misceantur: & prius inuncios pedes illinito curiose: nam per occultos sensibus meatus materia elabatur.

B

Ad Podagram.

20

* Semperuiui succo diligenter cocto vtere. *Aliud.* Vini succum asinino lacti, ac dulci vino, admisce, & illine. *Aliud.* Phocæ aut leonis aut lupi aut vulpis corium siquis elaboret, & calceos gestet, pedes non dolebunt. *Aliud.* Vespertiones tres aquæ pluuiatili incoquito: deinde hæc aquæ adijcito, lini seminis trii vncias quatuor, oua cruda tria, olei cyathum vnum: bubuli stercoreis, cereæ, vtriusque vncias quatuor: omnia in vnum corpus redacta subigito, & cubitum eunti semel atque iterum applicato.

Aceti Scillini confectio ex Galeno.

205.

Remedium optimum ex scilla à Pythagora scribitur, quo omnes Imperatores vsi sunt. Ab ipsius auctore fertur, quicumque hoc vtantur, longæ vitæ fore, & eius extrema integra vsque ad finem permanfura. Et ipse quidem Samius senex huiusmodi extitit: quantum enim temporis vixerit, haud ignoras: de ipso enim in libro traditum est, quod cum suis consanguineis hanc facultatem communicauit, cumque hoc medicamento vti incepit, quinquagesimum annum natus erat, & vsque ad centesimumdecimumseptimum vitam produxit integer, & nulla vnquam aduersa valetudine tetatus. Hæc sanè medicamenti autor differuit, qui vir philosophuserat mentiri nescius: nos autem viri huius fidei periculum fecimus, ac firmam constantemque huiusce medicamenti facultatem esse testamur. Oportet igitur scillam montanam libræ vnius pondere capientem dura circuncidere, & mollia minutatim concidere: & aceti acerrimi sextarios octo in vitreum vas mittere, atque obturare: ac per triginta dies in caniculæ caloribus, vt maceretur sinere: deinde scillam extractam exprime. Id genus aceti parum mane sorbeto: tibi enim hæc euenient, vt ne faucium orisque partes vnquam remollescant: os ventriculi bene valebit, facile spiritum duces, vox recte habebit, oculi acutissime cernent, aures in officio manebunt, nullusque flatuosus vapor in ventre vnquam excitabitur, nullum viscus suspensum erit: bene spirans, bene coloratus deges, ad ciuilia negocia recte affectus: non acidum, non falsum ructabis, si aliquid aceti huius assumpseris. Et ieiunus vt assumas præcipio, septemque postea stadios deambules, ita enim dissoluetur. Hoc aceto qui vtitur, in victu quauis licentiosus esto: omnia enim cibaria conficiet, & à nullo vnquam offensam patietur: neque valde implebitur, & eius, quod vtiliter sumitur, nihil superuacui in corpore relidebit, non flatus, non bilis, non stercoreus, non vrina, sed omnia facile excernit atque educit: aluus lubrica omnino est, totiusque corporis purgatorium est medicamentum, etiam si in ossibus sordes inhæcant. Item phthisicos ab omnibus deploratos hoc medicamento sanitati restitutos nouimus. Morbo comitali diuturno efficaciter profuit, vt nisi post longa temporis interualla non redierit: incipientem vero ac nouum perfecte discutit, neque reuerti amplius hunc affectum permittit. Ad podagras præterea, & articulorum morbos, iecoris lienisque duritias, vehementer facit. Et singulares quidem aceti scillini effectus hi sunt: communes autem quam plurimi, quibus nos commoti salutare hoc medicamentum sanitatis integritatisque causa tibi tradidimus. Deficit.

Vini Scillini compositio ex Galeno.

Vinum hoc potui datum omnem sanitatem affert. Humores enim attenuat, sed maxime pituitam: neque ipsam in stomacho, aut ventre, aut capite, aut iecore, aut liene, aut neruis, aut ossibus, consistere permittit, neque alium id genus tenacem humorum obstructions facientem, sed omnia dissoluit, & ventrem lenit, atque ita subducit. Et urinam mouet, & per ipsam causas attenuat excernitque. Adeo vero caput purgat, vt nares prorsus humore vacent. Commodum est podagræ, articuli & comitali morbo: denique omnis sanitatis autor est. Ex his constat. Scillam albam montanam circiter canis exortu accipito libræ pondere: per dies decem in vmbra refrigera: deinde scillæ folia refrigerata in vitreum vas mitte, & vini albi veteris sextarios duodecim super funde, & suspensum vas per quadraginta dies habeto: postea scillam exime, & abijce: & vino ad antedicta vitia vtere, & eius vim percipies. Subinde ante cibum vini duas vncias exhibe: unam autem a cibo, & vnciam mediā. Quod si ipsum potui commodum efficere

+ Aliter a
femina.

DE MEDICAMENTIS

efficere velis, vt magis delectet, mellis sextarios duos aut tres admisceto.

E

Medicamentum, quod Manducatum Stomachi pituitam detrahit, Gargarizatum

Caput purgat.

CAP. 206.

Origanum, gummi, hyssopum, sampfucum, pulegium, thymum, passi vncijs iij incoquito, donec vna remaneat: & gargarizandum dato: excutit. n. etiam pulmonis materias, si manducetur. Id autem quotidie facito: probatum est enim.

Ad Vrinam reddentes ægre, aut nequaquam. 207.

Leſuli cimices terito, & vrinarium foramen illinito: statim vrina decurret. Id etiam ad pueros mingere nequentes benefacit.

Ad Calculos, & Vrinam prouocandam.

208.

Baccarum lauri, & piperis, æquas portiones terito & cribrato: & ex mulſæ menſura vna exhibeto: mulſa vero calida eſto. Aliud Lapidis atterrens, mulieribus viris q; Vrinam prouocans. Lauri corticem aquæ incoque & permisce, ſorbendum q; propinato: vehementer facit.

Ad Sanguinis Miſtum.

209.

Accipe zingiberis drach. ij, braſſicæ ſeminis drach. iij, papaueris drachmā ſucco excipe, & globulos facito, laboranti q; exhibeto.

Ad Vrinæ Stillicidium.

210.

Thymi & fœniculi æquas portiones conterito, & ex aqua temperata calida potui dato.

F

Ad Dolorem Viæ Vrinariæ, & Difficultatem miſtus, atque ſpiritus, & ad Sanguineum lotium, & Calculum.

211.

Aſari, myſios, nardi gallici, æquas portiones accipito: melle attico cuius ſpuma abiecta ſit, excipito: & dato nucis ponticæ magnitudinem: facit enim etiam ſenes cōualeſcere, quibus effluxus ſiccior eſt, eum q; validiorem reddit.

Ad Inuoluntarium Vrinæ exitum.

212.

Lilij radicē elixam potui dato. Alterci quoq; ſuccū aut ſemē in vino & lacte maceratum corio cerui includito, & dextro femori appendito: miraberis. Aliud. Apri ungulas vſtas ex vino potui dato. Aut galli teſtem vſtum edēdum apponito. C Ad Inuoluntarium Miſtum. Cochleam cū teſta vſtam tritam q; ex vino cubitum eunti potui offerito.

Ad Difficultatem Vrinæ, & Calculum.

213.

Lini ſemen, piper, petroſelinum, tuſa & creta: ex condito accipe cochlearium vnum.

Ad Exterendos Calculos expertum.

214.

Scorpiones marinos exiguos tres integros comburito, & cinerem ex condito propinato.

Ad Supprimendum Alium.

215.

Rhun atq; oryzam vino incoque, donec tertia pars remaneat, & per inferiores partes immitte. Aut vinum auſterum, in quo hirci iecur incoctum ſit, potui dato. Aut gallas vſtas bene terito, & ſuillam adipem miſceto, friſtas q; ex aceto eſui dato laboranti * piperis drachmam, farinæ lupinorum drachmas tres, mellis ligulam.

Ad Citandum Sudorem, & Finiendam Febrem.

216.

Cachryos ſemen ex oleo illitum. Aut pyrethrum ex oleo calefactum & illitum horæ vnius interuallo poſt annotationem.

Ad Canis Morſum.

217.

Vrticæ ſemen emplaſtri modo impoſitū. Aut nigri marrubij folia ſimiliter. Aut apiaſtrū ex vino potum, vel morſibus impoſitum. Aut allium illitum, aut aſſum, potui eſui q; datum. C Ad Morſus Canis rabioſi. Braſſicæ folia cum laſlere ex aceto trita imponito: p ſe. n. braſſica rabioſi canis morſibus aduerſatur, & iplius decoctum potui exhibitū. Elix autē braſſica ante alios cibos aſſumpta phthiſicos ſanat, & arteriæ vitia emendat: contrita vero & lienī ſuperdata ipſum conſumit.

Ad Anginam, & Colli dolorem.

218.

Alba populus arida, trita, & ex melle illita collo. Aut naſturtij ſemen, & columbinum ſimū ex melle, inſtar cataplaſmatis imponito.

Ad Internas Ani prominentias.

219.

H

Amaranthum aqua maceratum mane veſperi q; potui dato.

Ad Lienem Cataplaſma valde efficax.

220.

Inulam, ſinapi, baccas lauri ſm proportionem, accipe & tere: deinde nucis nouę corticem parum contundito, mox in pilam coniectum validius terito, & eximens aceto acri macerato per triduum: & omnia in vnum redigens cū ſucco Tiberiadis vſq; ad cataplaſmatis temperaturam decoquito: & lienī ſummo mane per octo dies imponito euacuato prius ventre, atq; miraberis.

C Aliud ad Comminuendum Lienem. Capparis radicū vnc. iij, calcis viuæ vnc. iij, contuſas cribratas, aceto q; commiſtas, imponito nō diutius horæ ſpatio: totus lienis abſumitur. Aliud. Braſſicæ decoctum ſolum ex aceto mulſo ieiuno potui dato. Aut rubi radicem vſq; ad tertiam partem decoque, & decoctum per triduum dato. Aliud. Corticem nucis aceto ac melli incoctam ieiuno propinato. Aut ferrum candens in mulſo extinguito, & potui dato: admirabile eſt.

Ad Nigros Dentes.

221.

Palmularum offibus maſtiche & melle dentes per ſeptem dies perfricato: & albi redduntur.


Ad Lumbricos alui.

222.

Lupinos, lauri folia, ac fel taurinum miſce, vmbilico impone: id bene facit.

Ad Interiores

- A** *Ad Interiores Exteriores q; Ani prominentias.* *CAP.* 223.
 Amylū, picē, aquā, vnā feruefacito, donec tertia pars remaneat: ac per septem dies potui dato.
Ad Dolorem Aurium. 224.
 Vitis racemum capiens in sartagine frigito cum oleo, auri q; instillato: & conualefcet.
Ad Hirudines. 225.
 Aristolochiam terito, & sale conspergito. *Ad Calculos.* 226.
 Lauri baccas piper q; misceto equa mēfura, & ex mulfa mystrū vnū dato. *Aliud Calculos frangēs.*
 Lauri corticē aque incoquito, quoad tertia pars supsit, & sorbēdū exhibeto. *Aliud Calculos frangēs.*
 Turturis stercus vitum ex mulfa p̄beto, lapides. n. per vrinam exturbat. *Aliud expertū ad Calculos.*
 Struthij, rha pontici, capparis, singulorū drac. accipito: dato quotidie ex vino albo drach. & per
 mictū subsidentia calculosam eiiciet. *Aliud.* Origanū in aqua vsq; ad tertiam decoquito, & deco-
 cti cyathum vnū potui dato. *Ad Stillicidium, & Difficultatem vrinae, & primo ad Stillicidiū.* 227.
 Foeniculī, seminis palmularum Thebaicarū, pares portiōes cōterito, & ex aqua tēperata calidas
 propinato. *Ad Vrinæ Difficultatē & Stillicidiū.* Costi, mellis, aqua cyathos nouē, accipe: des potui
 craterē, mercede prius petita. *Aliud.* Cyperi asiatici triti cochleariū vnū, ex vino meraco, aut ex
B melle exhibeto: periculū de ipso factū ē. *Ad Vrinæ Difficultatē.* Petroselinū macedonicū terito, &
 ligulā vnā exhibeto. *Ad Stillicidium.* Cucurbitā aridā cōterito, vt farinā istar sit: cuius exiguū co-
 chleariū ex aqua potui dato. *Ad Mungentes in stratis.* Leporis cerebrum ex vino propinato. *Aliud.*
 Vesicā assam esui dato per triduū. Aut cyperū tritū * potui dato. Aut leporis testiculū ex vi-
 no odorato tepido propinato. *Ad Stillicidium.* Thus accipe, & in vino diutius feruefacito, propi-
 nato q; per triduum *. Accipiens Raphida marinum pisciculum, comburito, & potui cinerem
 offerto. *Ad Impetigines.* 228. ∴
 Cornu ceruini ramenta acerrimo aceto incoquito, vsq; dū tertia pars remaneat: ex eo illinito.
Ad Feras Impetigines. 229.
 Hordei farinā aceto acri pmistā iponito. Aut hastulæ regiae radice ex aceto trita illinito frequen-
 ter. Aut lineū pāniculū super cādēti ferro cōburito, & illinito. Aut nucis virentia folia cataplas-
 matis modo imposito: hoc & ad scabiem facit. *Ad Penis Dolorem, & inflammationem.* 230.
 Cuminum & ouorum putamina bene decoquito, & foueto: effectum miraberis.
Ad Impetigines. 231.
C Allium, & theaphen, aquam, & oleum: omnia misceto, & illinito.
Cataplasma ad Vulnera recentia a gladio aut ligno illata. 232. ∴
 Salicis folia trita imposito, & sanguinem profluentem supprimes, & vulnera glutinabis, atq;
 sanabis. Aut ouillum fimum ex oleo tritum instar cataplasmatismatis imposito.
Ad Perniciosa Medicamenta. 233.
 Rutā, ficū, & nucē terito, ac ex vino potionē dato. Aut fulicę sanguis liquidus ex oleo potus ser-
 uat a potu venenosi medicamenti, & a vipere morfu liberat. *Ad Fluxionem Gutturis.* 234. ∴
 Nido hirundinis trito ex aceto illinito. *Ad Mammarum mulierum Tumores.* 235.
 Caprinum stercus aridum ex vino meraco imposito: inflammationem enim dissoluit.
Ad Dolorem Capitis lupinum. 236.
 Suillum fimum cōburito, & cinerem melli admisceto, caput q; rasum inungito, ac super brassi-
 cæ folia dato. *Ad Tussim, & Hecticam febrem.* 237.
 Styracē & brassicæ succū simul terito, & fermētatos ieiuno & cubitū eūti exhibeto. Aut laurei
 olei, & vini generosi, vtriusq; drach. iij, misce & calefacias * in balneo interius: & vinū oleum q;
 calidū tēperato, & stomachū foueto. *Aliud.* Lixiuū percolatū calefacito, & tussientis pedes foue-
 to, & spongia deterfos inunge, & foue: id vero tussibus medetur. *Ad Tusses.* 238. ∴
D Relinā ex vino vetere tritā ieiuno potui dato, & pulegiū in posca decoctū: & beronicē cū melle
 fermētata esui dato. Aut raphanū tostū mane ac vesperi edēdū apponito. Aut butyrū insulsum,
 quanta est nucis regiae magnitudo, deuorato. *Ad Humores Pectore contentos.* 239.
 Vrticæ folia cum ptisana decocta potui dato: bene facit ad inflationes, & materiam ex pectore
 euocat. *Ad Tusses.* 240.
 Fenumgracum, quoad tertia pars super sit, decoque: & iusculū summo mane ex melle exhibe.
Vt Vox Canora reddatur. 241.
 Tragacantha vino madefacta, & in potum assumpta, vocem splendidam reddit.
Ad Vocem Amissam. 242.
 Styracem terito, & ex aqua globulos amplitudinem cicerum equantes conficito: & tertio cum
 dederis, statim loquetur. *Vt Capilli & Barba Crescant, si decidunt.* 243.
 Betam, & myrteum oleum, & polytrichū misceto, capillos q; oblinito: Aut adiantū, & ladanū,
 equis portionibus terito ex immaturo oleo, aut myrteo, aut lentiscino: & illinito. *Aliud.* Lada-
 num in vinum aminæum myrteum q; oleum mittito: & terens vtrunq; ad mellis spissitudinem
 redige, caput q; in balneo perunge. Melius est & illud adiantum, quod nō nulli polytrichon vo-
 cant, si septima pars ladano addatur, & illinatur. *Ad Renes Dolentes.* 244.
 Cum pulegio farinę surfures decoquantur, & ius pcolei, spongia q; eo imbuta fomentum fiat.
 Galeni



GALENI DOCUMENTVM DE PVERO EPILEPTICO

Nicolao Leonico Thomæo Patauino interprete

CAP. 1.



Go te Ceciliæ existimabam ad ægritudinē filij tui nostris admonitionibus haud quāq̃ indigerē: nā q̃ prius ipsum vidit, & tecū Athenas iterū nauigatu-
rus est, Dionysius, idoneus est & p̃sens facere ea q̃ opus erūt: & rursus disce-
dēs, ad habitudinē ægritudinis cōdecencia documēta relinquere. Ego autē q̃
nunq̃ puerū hūc vidī, forsan multū decipi possē: cū neq; à principio morbi
qualis fuerit ipsius natura, neq; nūc qualis ob morbū sit, cognouerim: sed à
vobis hoc tū audierim epileptiæ accessionibus puerū infestari. Verū, ne for-
sitā me suspiceris negligētē magis q̃ veridicū scriptionē hāc subterfugere,
qd̃ nunq̃ antea feci, laborē hūc libēs subibo, vt tibi rē gratā faciā, scribēdo qdā medicinalia p̃cepta
pueri epileptici: in q̃bus necesse est medicæ artis imperitū decipi & aberrare circa mēsurā vel ips
vidēdi. Demōstratū. n. à nobis est in alijs libris, q̃ nō cōtingit quēpiā recte mederi ne minimis qdē
ægritudinibus, nedū adeo magnis vt ē epilepsia, nisi methodū aliquā curatiuā nouerit. Atq̃ Diony-
sius mihi itā cōcavit, & mecū prius cōsiderauit, de tota pueri curatiōe, quā tu mihi iposueris, vt hęc
documēta cōscriberē. Dionysio q̃; meā tū ipse sniam facile manifestauit, cū intelligeret, oīa q̃ ego di-
cerē: nihilq; ille obaudiret, ceu methodi curatiuē valde pitus. Tecū vero neq; quō sermonē, istituā,
nouī: nā accuratus distinctionibus multis indiget, & obscurior est q̃ imperito hoī cōueniat: bre-
uis autē & manifestus haudquaq̃ accuratus esse pōt. Quapp subuerebar tibi documēta cōscribere,
quīs rē tibi gratā facere p̃cupere, existimās mihi simile q̃piā euēturū, quale Phidiæ utiq; accidit-
set, si postq̃ Palladis simulachrū absoluit, q̃piā illū coegillet separatim digitū, manū, pedē, nasum,
aures, singulas q̃; corporis partes effingere. Ego vero methodū curatiuā tanq̃ quoddā simulachrū
in pluribus cōmentarijs à nobis scriptā fuisse arbitror, q̃ nō mō iperitos hoīes, sed ne medicos qui-
dē quoscūq; iuuare non pōt. Qm̃ autē cogis me de parte vna artis curatiuæ sermonē facere seorsum
ab alijs, tuā cedo volūtati & pareo: atq; in tuā gratiā documenta scribo, q̃ tibi in hoc sufficiēt: satis
enim est medicæ artis inexpto nō magnū aliqd̃ & irremediabile, in medicorū p̃ceptis committe-
re, p̃cipue cū didiceris legitime versari in his cōmentarijs. Eruditis illis curatiuæ methodi nego-
cium scriptum est: tibi autē & alijs, qui nonnullarum rationalium artium sciētes estis, medicinē au-
tem inexperti, arbitror, fortasse nonnihil utilitatis & in his cōmentarijs, proueniet. Conabor autē
quantū fieri poterit manifestissime enarrare quānam vtens puer dicta non parum iuuatur: & ab
accidentibus quotidie ipsum inopinate inuadentibus minime lēdatur.

CAP. 2.

Cōuenit igitur in primis quantū fieri pōt hęc obseruare. Nāq; puerū necesse est interdū occur-
rere magnis frigoribus, immensis caloribus, ventis validis, balneis malis, cibarijs caput tētātibus,
rotarū obuolutionibus, coruscationibus p̃terea, & tonitruis, & vigilijs, & cruditatibus, tristitijsq;
ēt, & iracundiā, & lassitudinē, atq; alijs huiusmodi rebus, à q̃bus (vt summatim dicā) corpus ve-
hemētē moueri & perturbari solet, atq; in reminiscentiā quandā morbi referri, & ad generationē
paroxysmi deduci. Hęc igitur conuenit, multo ante cauere. Etli q̃nq; his p̃cedentibus paroxys-
mus succedet, tunc ab omni penitus motu oportet illū remouere, & domi cōtinere, & victū valde
tenui illum nutrire, donec à paroxysmi incōmodo liberetur. Quis autē sit tenuis victus, quamuis ar-
bitrer te cognoscere, tū si ea quæ sequuntur perlegeris, aliquid etiā de ipso percipies.

CAP. 3.

Tēpus itaq; est vt huiusce rei documēta tradere aggrediar. Accedēte vere (nā ægritudines q̃ re-
uertī solēt, quodā mō tūc moueri cōtingit,) puerū purgandū affirmo mediocri purgatione. Huic
autē purgationi Dionysius p̃sens moderabit, & q̃ opus erūt impabit, accurate cognoscens quā nā
mō ad purgationē corpus p̃parare oporteat, & quo vti debeat pharmaco, quā ue q̃titate, & in quo
tēpore: nā de his inter nos sæpe cōsultū est. Quare Athenis p̃sentē habes Dionysiu, sed nihilo mi-
nus cū ipso mētē simul & cōsiliū habes meū. Post purgationē autē q̃n recesserit Dionysius, & puer
Athenis remāserit, hanc oportet ipsum victus rōnē obseruari. Cū à cubili mane surrexerit, anteq̃
ad p̃ceptorē accedat, mediocri deambulatione vtatur, gressu nō admodū frequēti: posthac autē vsque
ad palestrā tps, disciplinis vacet quibus assueuit: cū primū autē ab illis discesserit, vbi mediocriter
rursus deambulauerit, ad p̃dotribā accedat. Hūc autē p̃dotribā si quēpiā alium ex ijs qui puero
p̃sunt, multū oportet esse prudētē: sed talē inuenire difficile est, p̃sertim cum electio fieri debeat ex
hoibus ineruditis & ignaris, nō minus aīam q̃ corpus hebetē & crassam habētibus. Nō igitur tāq̃
paruū hoc te fugiat: neq; cuius ē populo pueri curā tradas, probe cognoscēs q̃ summa curatiōis
in hisce duobus versat, in vsu videlicet à me tibi datū pharmaci, & in exercitij mō, alia nāq; oīa ho-
rum sunt

A.I. 3.f. r. l. 5
c.10. fol. 210

Arum sunt præparamenta quædam. Pædotribam igitur hūc tecum simul Dionysius eligit. Sit autē ipſius ſcopus in exercēdo quo ad quātitatē quidē, ut puerū anteq̃ defatigetur cellare faciat, nec nō ut vniuerſum corpus calefaciat, & mediocriter euacuet. Ambo aut in eodē tēpore contingent: qñ enim quod ſupfluit ſufficienter euacuat, & quantum ſatis eſt corpus incaleſcit, tūc ſi quiſpiam ab exercitio ceſſauerit, quieſcet anteq̃ in defatigationē incurrat. Exercitiū vero ab hoc tēpore ultra in ſolida iam agit mēbra, & corporis habitū colliquat: aggregat aut omne id quod colliquat in mēbris maxime & muſculis: ad hocq; ſequitur virtutis laſſitudo: poſtea vlceroſus ſenſus, qñ aliquā corporis partē mouere tentauerint, & hoc eſt ipſa laſſitudo. Nō ſolū igitur pædotribā prudētem eſſe oportet, ſed et mediocris exercitiij expertum, ne citius q̃ par eſt puerum ab exercitio cellare faciat, ſecuturam timens laſſitudinem: ne ve ſatagens calefacere, & complete quod ſupflui eſt euacuare, in laſſitudinem puerum ducat. Mediocrum igitur exercitiōrū in quantitate huiuſcemodi ſunt ſcopi: In qualitate vero, ut corroborētur oēs corporis particulæ, maxime caput & ventriculus, & huius præcipue quod ori circūſtat. Ut aut quiſpiā iſtud aſſequi poſſit, nūc dicam. Primo qñ exercitiā vehemētia caput replent, ab his abſtinere præcipio. Secundo, ſi qñ his vti neceſſe fuerit, capite erecto quæ infra ſunt moueātur, & ex his maxime crura. Tertio à paruis & tardis motionibus inci-

Bpiat pædotriba, & ſic ad vehemētiores & celeriores motus deueniat: nam ſubito ab intenſis exercitijs incipere non ſolū imbecilibus, ſed et robustis corporibus, ſumme pernicioſum eſt. Conſiderare præterea oportet, q̃ frictiones exercitiij loco habentur, maxime in corporibus imbecilibus: immo ſæpenumero ſolæ, modo recte fiāt, aliarū motionū vicē ſupplent. Opus eſt aut primum manibus molliter cū ſindone à ſupernis partibus ad inferna delatis, corpus ad rubedinē deducere inſitio à brachijs & manibus factio, atq; ita ad pectus & ventrē deuenire. Subinde etiam crura multū fricare cōuenit, ut ſiquid ex ſupnis partibus illuc fuerit deriuatū, cōmode abſumatur. Poſtremo ad caput deueniendū eſt, nā ſtatim à principio ad ipſum accedere periculoſum: corpore. n. adhuc pleno exiſtente, ad id quod primo caleſcit, facile ſupfluitates attrahuntur. Vltimo igitur loco poſt alias corporis partes, caput cōfricari oportet, ut nūc diximus, abſq; oleo: qñ aut & oleū applicare libuerit, nihil phibet capitis frictionē ſimul cum alijs fieri mēbris, ut vnus caput fricet, duo alijs pectus & ventrem, & totidem alijs crura. Sic aut & poſt exercitiā, immo vero magis tunc, oīa ſimul cōfricentur mēbra: ita. n. celerius ad quietē corpus deducitur, & minus refrigerat. Oportet autē ſi de quapiā alia re, de hac ipſa magnā curā habere. Non lauari autem, ut plurimū cōuenit: neq; ſtatim poſt exercitiū palæſtram exire, ſed poſtq̃ planē quieuerit ſpiritus, & ab exercitijs cōmotio prorfus ceſſauerit: atque tunc etiam ſindone caput multum fricare cōuenit, & ſæpenumero pecūne vti.

C. A. P. 4.
ibi. fol. 211. a

Poſt hæc aut ad prandiū eat: & prius quippiā ex ijs quæ ventrē molliūt aſſumat, vel oīis, vel ſaſamētum, vel piſſanā, vel oliuas, cū tertia parte panis: reliquas vero duas in coenæ tps ſeponat cū valentioribus obſonijs. Quæ aut huiuſmodi exiſtūt, paulo poſt dicētur, ſi prius enarrauerō ex olerū genere oīa quæ abſq; nocumēto ſumī poſſunt. Ex oleribus igitur, nec à lactucis, nec à malua, nec ab atriplice, nec à blito, prorfus illū prohiberi iubeo: nō tñ idē ſemper capiat volo, verū aliās aliud, moderate. Ex eodem et eſt genere beta, & braſſica: oportet. n. et ex ijs quippiam moderate guſtare. Porrum quā etiam interdū, & apium, & ſmyrniū, deguſtare conferet: & de horarijs fructibus quicunq; nō ſunt penitus crudī, aut ſuapte natura difficulter cōcoquuntur: ij nanq; & ſuas ipſorū ſupfluitates, & aliorum etiam eſculentorū, retinere cōſueuerunt. Ergo & mora & quæ præcocia nominātur, & ficus, et ſiqui ſunt eiufmodi notæ, ſine moleſtia deſcēdunt. Et quæ cucurbita dicitur, nihil ab oleribus ventrē molliētibus diſferre videtur: itē pepones cucumerini, nā q̃ tales non ſunt, prauī ſunt. Maturæ et vuae aliquantulum qñq; puero concedi poteſt: mala vero & pira raro & in parua quantitate deguſtet: & hæc ipſa non ſolū ut in arbore ſua ſint bene cocta, ſed etiā domi ſeruita ad maturationem recte peruenerint. Scire aut oportet eadem poma quæ recentia à matre ſunt dederpta, & quæ domi depoſita referuantur, permultum inter ſe diſferre, nullamq; inter ſe ſimilitudinē habere. Poſſunt aut conſeruari poma pira q; nec non plurimi et alijs fructus, & pruna quæ vocātur damaſcena. Ficus quā etiam quæ carycas vocant, ex huiuſcemodi ſunt genere: & ex arbore palma dactyli, quorum comēſtionem penitus illi non interdico, ſed opportune et moderate illis vti pmitto: aſſidue aut & multū illis vti minime velim. Atq; ut ſemel cōcludā, quicunq; mali ſucci ſunt cibi, vel aluū aſtringunt, vel inflāt, vel difficulter cōcoquuntur, ſi aſſidue vel pluſq̃ cōueniat aſſumātur, nō ſolum huic morbo, ſed oībus et alijs nocere ſolēt. Atq; huc uſq; ſermo de diætæ modo protracius, alijs et q̃ plurimis ægritudinibus cōueniens erit: Huiuſce aut morbi peculiaris & proprius eſt, ut caueamus ab ijs præcipue eſculentis q̃ pituitā generāt. Vnde in cibarijs, quæ, tametiſi in alijs nō obſint, viſcoſos aut frigidos aut craſſos humores generant, haudquaquē eſſe immorandum cēſeo. Huiuſmodi aut ſunt atriplex, & blitū, & malua: quos ſanē ut guſtet non phibeo, aſſiduū aut eorū vſum vehementer dāno. Ex hoc ſunt genere & cucurbitæ: multo q; magis cucumeres, & poma, & pira: & demū quæcūq; humorē pituiſoſum gignūt, aut viſcoſum, aut craſſum: vel quæcūq; ſunt in genere peſſimorū eſculentorū, quales ſunt q̃ vulgo appellātur fungi: ab ijs. n. oīno abſtinere conſulo, quemadmodū & à rapis, & à quibuscunq; radicibus quæ mandi ſolent: craſſos. n. habent ſuccos, & male concoquuntur, exceptis quibuſdā, quæ acrimoniā quandā & caliditatē in ſe habent,

Septima Claſſis.

zzzzzzzz

quemadmodū

quemadmodū sunt dauci et raphani: sed ex raphanis haudquaquē illū degustare prohibeo, verū quo-
dā intercedēte spatio: a dauco autē abstinere cōdīscat, magisq; ēt a rapis. In esculētorū autē vsu abun-
dēt illa quæ acria sunt, & virtutē incidendi habēt, dūmodo insignīter nō sint mali succi, odorē q; ha-
beant q; caput tentet: quorū ex genere sunt quæcunq; per caliditatē replent caput, quæadmodū vi-
nū, & sinapi, & petroselinū, & daucus, & cepg, & smyrniū: hæc. n. vltra modū inflāmatiua sunt, &
malos humores generātia. Sinapi vero licet cōueniat ad humores crassos incidēdos, tñ ab eo absti-
nendū est, qm caput tentat. In oxymelitis autē vsu secure cōfidat, etiā si quotidie sumere velit. Potest
autē cappares ex illo comesse, & parua quædā salsamenta oleo modico superinfuso, vt concinnetur
obsoniū: quod pfecto huiuscemodi ægritudinis, veluti medicamentū quoddā reputari potest, præ-
cipuæ si sit acetū scilla cōditum: hoc oēs vulgo iā scilliticū vocāt: quod ego si quippiā aliud in hoc
casu sanē laudo. Horū vero alterutrū singulis diebus assumere contenderim, dico autē vel cappares,
vel salsamenta oxymelite condita. Si vero puer oxymel bibere velit, id sit in promptu & ante præ-
paratū, & nō ex tpe ex vtriscq; crudis confectū: quo autē modo ipsum preparare oportet, paulo post
recensebimus. Cæterum plurima aqua cōmiscetur, nā quod sic factū est, suauius redditur: ac hye-
me quidē calidū accipiatur: æstate vero nō erit malū etiā, si plerūq; frigidū sumatur, si & vehemētes
fuerint calores, & ipse vehementer sitiat, potui q; frigidū assueuerit antea: nā inter alia sitim egre-
gie sedat oxymel nō valde dulce, præsertim si aquæ frigidæ miscetur. Mihi q; nō parū sæpe conti-
git puerū a comitiali morbo penitus liberaffe, nō immutata victus ratione, cū post primā purgatio-
nē oxymel sumere, eo q; vti pharmaco iussissem. Verū qm neq; filij tui naturā noui, nescioq; quā-
tum virium is sibi asciuerit morbus, et ipse assistere nequeo, diuinare haudquaquē possum. q; paucis-
simis indigeat remedijs. Melius itaq; mihi videtur de oibus sermonē facere. Igitur post exercitiū,
in prandio (vt dictū est) vtatur & quibuscūq; oleribus, & oliuis, & nucibus, & ficibus, cū siccis, tñ re-
centibus: verū nō simul quotidie oibus, vnū enim sit & simplex quod assumat: sed vt victus ratio
variari possit, de oibus verba feci. Eodē etiā tpe (vt dictū est) si desiderauerit puer, alij etiā fructus
cōcedi illi possunt: cū alioqui ab ipsis melius sit abstinere, nō solū morbi illius deuitandi causa, sed
ad integrā etiā totius valetudinis incolumitatē: quæadmodū vides nos ferme ab oibus horarijs fru-
ctibus abstinere. † Verū qm philosophis in præsentia salubris victus præcepta nō cōscribimus, sa-
nē perq; optandū erit si nō solū ad pueri curā hæc documēta, sed ad vniuersam illius vitā facere pote-
rūt. } Est igitur illi concedendū vt palām & tempestiue eos comedat fructus, quicunq; magni nō
fuerint nocuenti, ne clam & intēpestiue illos comedēs, magis lædatur: qui. n. palām ab aliqua re,
quam valde appetūt, prohibentur, ij cum data est facultas, plus nimio ingurgitare se cōsueuerunt. G
Quamobrem pueris ego plura esculenta concedere soleo ex ijs quæ non valde nocent, vt tempe-
stiue & palām illis moderate vtantur potius, quām, vt diximus, propter vehemens desiderium fur-
tim ex his & voraciter assumere festinent. Atq; hæc de cibi ratione sufficienter sint dicta.

† At sane philo-
sophis salubris
victus documē-
ta non conscri-
bimus qd cer-
te maximo pe-
re optarem, nō
solū ad huius
afflictus cura-
tionem sed ad
vniuersā pueri
tui vitam.

CAP. 5.

Post cibū autē vbi paululū tps intermiserit, priusq; ad studiā disciplinarū accedat, leuiter deambu-
let cēseo: & rursus vt id ipsum a studijs rediens ante coenā faciat, sanē cōsulo: quo tēpore duas reli-
quas panis portiones quas seruauerat assumat, itē aliorū vnūquodq; sic (vt dictū est) carnes qdem
ex omni ferē autūm genere, præter palustres: ab oīum autē quadrupedū esu præcipue abstineat.
Quod si qñ illis vti necessitas fuerit, domestici quidem suis extremitatibus & stomacho vescatur,
syluestris vero carnibus vniuersis bene vti potest: hœdorum quīn etiā carnes degustet, et non nun-
quā leporū ēt. Carnes autē oēs sint vel simpliciter cōditæ, vel sine nidore assæ: simpliciter cōdiun-
tur si aquæ incoquātur, & anetho porro sale & oleo concinnētur. Quō nā autē modo sine nidore re-
cte assetur caro, clibanū quod apud me vidisti, exēplo tibi esse potest. Ex marino autē genere crusta
intecta quidem oīa nocua, & incōmoda: ex piscibus vero optimi sunt ij, qui in saxosis degūt locis:
sumere ēt poterit ex ijs qui in alto degunt, quos pelagicos vocant: ex chartilagineo autē torpedo
ferē sola conueniens est & cōmoda. Cæterum de leguminibus ptissana qdem præcipua est: hanc H
sequitur lens, alica, et pisum: alia autē ferē oīa mala. Et vt vniuersaliter dicatur, quæcunq; viscosum,
& crassum generant succū, ventosāq; sunt, & multarū superfluitatum, nec non difficilis cōcoctio-
nis, sicut ante dicebamus, maxime sunt cauenda: Ostrea quīn etiā oīa, & chartilaginea ea quæ σελά-
χια vocātur, & squāmis carent: præterea bulbi, & cochleæ, & caseus, & fungi, bouinæ q; carnes: &
oua in aqua durata cū difficilis sunt cōcoctionis, tum crassos generāt succos. Alica vero & carnes
suille bonū quidē generant sanguinem, sed viscosum. Palustria autē omnia superfluitates generāt
plurimas. Legumina vero omnia ventosa sunt, & præcipue faba, & ciceres: ptissana q; non diligē-
ter cocta, ventosa est, quamobrem bene coquere illam oportet, vel ea non vti: lens quoq; bene de-
cocta omnem ponit ventositatem, verum illa non assidue crebro ve vti oportet, quoniam humo-
res generat crassos. Cæterum ad victus quotidiani rationem hæc abunde sufficere possunt.

A. l. 3. f. 1. r. 5.
11. fol. 211. b

A. l. 3. f. 1. r. 5.
10. fol. 210. f

CAP. 6.

Medicamento autē ex scilla, quod tibi tradidimus purgatione præmissa, quod q; primo vere fie-
ri iussimus, singulis diebus secure filius tuus vtatur, priusquā ad palæstram accedat: nam nisi valde
magna fuerit ægritudo, & occalluerit, sperandū sanē est in quadraginta dierū spatio hoc medicamē-
to illam perfecte cessaturam, quoniam iam innumeros pueros nulla ellebori opera sic curavi. Ve-
rum post purgationem prius, quām hoc vtatur pharmaco, semel aut bis absinthiū sumere oportet.

De

CAP. 8. Verum qm̄ pleriq; scillæ succum non recte faciunt, qñ id tibi ē cognoscere cordi est, huic ego sermoni adiungam, quó nā modo illū cōficere sū solitus. Vas quodpiā accipio à quo extractum fuerit mel, mehterium id Græci vocant: in quod scillam cōijcio manibus prius illā in exiguas discerpens particulas. Postea bene apto operculo illud obturans, extrinsecus q; pelle circundans, & diligenter colligans, in loco quopīa meridiē spectāte colloco, qui à borealibus omnino non perflatur ventis. Id aut̄ facere soleo ea anni parte, in qua caniculam exoriri omnes asseuerant Græci: quæ draginta aut̄ huiusmodi sunt dies, viginti quidē ante, totidem q; post exortum: paulatim q; in ijs diebus vas illud ad Solem cōuertere soleo, vt ex oībus similiter partibus incalescat. Transactō postmodum pręstituto temporis spatio, vas illud aperiens, in illo reperire soleo scillæ partes elixis limiles, succum q; ex illis in vasis fundo quendā defluxum, quē colligēs, q̄ optimo melle cōcinno. Huius singulis diebus, cui dare voluero, cochlearis plenī mensurā præbeo, pueris quidē minoris, adultis vero maioris. Quin etiam scillæ ipsius carnes accurate contundens, illasq; cum melle dissoluens, & conterens, ex illis cochleare vnum vt dictum est, præbere consueui: quod sanè quo ad vires & efficaciam secundum à prædicto locum obtinet. Ceterum quicumque scillam elixantes, illam postea conterunt, illius proculdubio vires resoluunt: quemadmodum, qui istud ipsum ex aceto faciunt, pharmacum quidem validum admodum faciunt, verum neruis non innoxium.



Victore Trincauelio interprete.



In priore horum cōmentariorū libro opus de natura humana exposui : nūc quæ illi perperā adiecta sunt aggrediemur : quæ & ipsa quodā ordine cōposita digesta q̄ sunt. Est etenī liber vnus exiguus, in quo de victu sanorū agitur, is à Polybo Hippocratis discipulo videtur fuisse scriptus. Quod autē inter hunc, & illū de natura humana, est interpolitū, ab eo qui primū hosce duos libros de natura humana, Hippocratis, & Polybi de salubri victu in vnū coegit, conscriptū & collocatū est. Quo enim tēpore Attalus et Ptolomæus certatim inter se de cōparandis libi libris contendeāt: ab his qui ex oblati celebriorum virorum scriptis pecuniam à Regibus reportabāt, cœpere inscriptiones & digestiones

Septima Classis . zzzzzzz ij librorum

IN LIB. HIPPOCRATIS DE NAT. HUMANA

librorum vitari. Vnde, quum utriusque libri, & qui de natura humana est, & qui de salubri victu, essent pusilli: arbitratus quispiam ob paruitatem neutrum ipsorum multi faciundum, ambos in vnum contulit: subinde vero alius quidam, vel ille idem etiam qui hos primum in vnum redegit, hæc ipsa illis interposuit quæ nunc exponenda suscepturi sumus.

1. Oportet præterea et hæc nouisse, quod morbos quicumque ex repletionem ortum habent, euacuatio sanat: quos vero parit vacuatio, repletio curat: quos gignunt labores, illis quies remedio est: quos nimium inducit otium, labor tollit. Summatim vero sciendum, quod oportet medicum presentibus morbis, formis, anni temporibus, ætatibusque contrarium opponere: atque contententia laxare, laxata contendere. Sic enim maxime quod molestum est, remouetur: mihique curatio hoc ipsum esse videtur.

Sigillatim omnibus huius orationis versibus signum id Dioscorides ascripsit, quod obeliscum appellat: quo signo Aristarchus omnes notabat versus qui apud poetam sibi erant suspecti: Sic & Dioscorides agebat, quia suspicabatur partem hanc fuisse Hippocratis qui fuit Thessali filius. Nam duo hi magno Hippocrati fuere filij, Draco, & Thessalus, amboque genuere filios nominatos Hippocrates. Hæc sane in presenti capite proposita sunt. Expediit autem ut & nos de ipsis disquisitionem institueremus, particulatim dictionem vnamquamque examinantes. Quicumque morbi ex repletionem ortum habent, euacuatio sanat. Idem non est, ut dicas repletionem esse continentem morborum causam, vacuationem vero, & cætera quoque, quorum subinde mentio habita est: aut quod a repletionem, vel ab aliquo aliorum quippiam fiat. Nam quod morbi aliqui ex repletionem fiant, vel a repletionem (nihil enim interest hoc vel illo modo dici) verum est: haud tamen verum deinde est, quod repletio sit causa morbi continens. Quippe quod morbus affectio quædam est in animantis corpore, quæ, ut in libro de morborum differentiis monstrauimus, primum actionem lædit. Repletio vero ipsa, ut & id in libro de plenitudine ostendimus, primum minime lædit actionem, sed intermedia alia affectionem: quam aliter Erasistratus, aliter Asclepiades, secus etiam medicum qui Pneumatici vocati sunt, gigni constituere. Nos etiam alibi pluribus explicauimus, in quem modum ex utraque plenitudine exoriantur morbi. Monstrauimus etenim duplicem esse plenitudinem, alteram quo ad vires, alteram quo ad vasorum concauitatem. Quæ vires respicit, humores ad corruptionem perducit, fluxionemque ad imbecilliores in corpore particulas immittit. Quæ vero infusionem, & vasorum ora aperit, ea quæ sæpe dirumpit, sæpe etiam mortem repentinam infert, si corporis obstruat perspirationes. Iam & curatio non modo dicitur morborum eorum qui facti sunt: verum & eorum qui fiunt. Porro si quis voluerit in his uti nomine proprio, huiusmodi omnia, causam προηγμένην, quali præcedentes dicas, erunt, ut fecit Athenæus, appellandæ: sicuti ea a quibus hæc ipsæ, præcedentes inquam, efficiuntur, προκαταρκτικὰς vel προκαταρχοντάς, quasi ante incipientes, nominabis: ciborum enim multitudo, cruditates, balneæ, exercitationes non opportune, & cætera tandem quæ in commentariis de procatacricis causis recensuimus, præcedentium vniuscuiusque morbi causarum effectrices sunt. Quos vero parit vacuatio, repletio curat. Qui hæc scripsit, abusus nomine repletionis videtur: quum nedum medicum omnes verum & cæteri Græci repletionis vocabulum excessibus immoderate quantitatibus accommodare soliti sint: at vacuatio per contrarium excessum corrigenda non est. Subinde tamen audi rationem, quæ immoderatis excessibus fauet. Sunt cibi quidam, qui ad alicuius iam sani habitum moderati sunt: horum collatione excessum & defectum intelliges. Qui vero vacuatus est, si id quod de suæ prioris mediocritatis quantitate detractum est, refarcire velit: cibum adaugebit. Qui si tantundem nunc alimenti ingerat, quantum ante quam vacuaretur solitus erat: nunquam id quod exinanitum est replebit. Ad artificem sane pertinet moderate incrementum id afferre, ut neque intempestiue repleat quod demptum est, neque cõfertim atque repente. Sunt nonnulli ex medicis, qui nolint in causis morborum ponendas esse vacuationes, quas dicunt tum virum imbecillitatem, tum habitus gracilitatem solummodo parere, & quod nullus vnquam morbus ex defectu oritur. Hi profectio non animaduertunt, qui morbi eos arripiant, qui immoderate vacuantur. Nam facillime ex quacunque occasione refrigerantur, iteque paruo negotio vruntur, faciles etiam ut in lassitudines incurrant, omnibusque externis causis obnoxij sunt: & longe præterea magis quam ex vigilia, tristitia, cruditate, & ira, quam qui bono sunt habitu, in morbos decidunt. Quos labores gignunt, quies remedio est. Labores eos appellat, qui in motionibus fiunt præter modum. At vero qui in hunc modum affecti sunt, quod quiete sint reficiendi: nemo mortalium est qui hoc nesciat, qui quod id etiam non agat, ut neque in hac re medicum consilium expectent: immo & bruta etiam (ut iam ostendimus) nedum homines, noxam per ea quæ contraria sunt, lædentibus auferunt. Quos nimium induxit otium, labor tollit. Neque primum, et per se otium morbos excitat, sed media plenitudine: ociosis enim minus corporis particula digeruntur, & præterea imbecilliores redduntur, ut inde utraque gignatur plenitudo. Itaque immoderatio motus vires quidem nequaquam validiores reddit: humores tamen qui redundant, euacuat. Liquet igitur, quod si in his motus qui modum parumper excedat adhibeatur, sensim a lassitudine capietur homo, ut tamen non illico febricitet. Summatim vero sciendum quod oportet medicum presentibus morbis, formis, temporibus anni, ætatibusque contrarium opponere.

Formas

A. l. i. f. d. l. e.
1. fol. 18. d

A Formas appellare videtur corporum naturas, quarum substantiam ostendimus in temperatura quatuor elementorum sitam esse. Morbi itaque curantur ab his quæ facultatibus contraria sunt, ut iam monstratum est, non autem apparentibus imaginationibus. Porro natura corporis quæ temperamento idem est, non omnis per contraria corrigitur: quemadmodum neque anni tempora, aut ætates: sunt enim in ipsis temperatæ quædam, sicuti multæ etiam intemperatæ: unde temperatarum limitibus seruatür temperies: contrarijs vero intemperies intemperatarum emendatur. Hæc quippe in libris de tuenda sanitate definita sunt. Atque contententia laxare, laxata vero contendere. Nequaquam, ut decebat, morborum oppositionem constituit: contententia. n. laxans, laxato contentum proprie opponitur: contententia vero & laxantia proprie de causis, & non de læsionibus dicuntur corporibus: contenta autem & laxata, ad ipsa læsa iam corpora referuntur. Præterea et contenta & laxata corporum nomina sunt, minime vero morborum contentorum aut laxatorum: quem ad modum durum & molle, rarum, & densum: de quibus à nobis probe in sexto epidemiorum libro actum est eo loco. Cutis duræ mollitio, contentæ remissio. Quo etiam in libro subinde de condensando, quod rarefactioni contrarium est, sermonem habuimus: id autem cum inspissare idem est, sicut inspissatum & densatum.

Non reperio hæc verba in lib. Epid. habetur tamē in li. de vitu humidorū Hipp. in principio.

2 B *Fiunt autem morbi, tum à victu, tum vero à spiritu, quo attracto vivimus.*

Victum nonnunquam solum cibum potum quæ appellant: sæpe etiam hoc nomine omnia vitæ instituta comprehenduntur: qua significatione hic usurpatum esse est arbitrandum. Neque enim ex his solum quæ comedendo vel bibendo ingerimus, verum ex balneis quoque & exercitationibus, otio, vigilijs, mœrore, ita, refrigeratione quæ & æstu, morbi ortum habent: quandoque etiam ex solo spiritu, quo respiramus, lædimur, ut in locis qui Charoni dicuntur.

3 *Vtrosque vero hoc dignoscere modo. Quum multi homines vno corripuntur morbo tempore eodem: id in causa esse arbitrandum, quod communissimum sit, quoque omnes maxime vitimur: id vero est, quo respiramus. Constat enim quod victus cuiusque nostrum causa minime sit, ubi morbus omnes subinde tentat, tam iuvenes quam senes, tam viros quam feminas, prætereaque tam eos qui vinum quam qui aquam bibunt, quiq; maza, & qui pane vescuntur, & tam eos qui in multis sunt, quam qui in paucis laboribus. Non igitur, quum homines quocunque victu vni in eundem morbum incidunt, ratio victus erit causanda. Verum ubi eodem tempore vni suboriuntur morbi: clarum est quod suis cuique victus causa sit.*

C Quod communem causam habeat, siquid multis morbis commune sit: probe profectò ab eo dictum est, perinde ac cætera huius orationis: ut tamen id non omnino recte dictum sit, quod ortus communium morborum in aerem solummodo sit referendus: quādo ex fame in Æno leguminibus vescentes, crura imbecillia habuere: qui vero eruo, illis genua dolebant. Iam etiā novimus quod comesse semiputridum triticum famis necessitate compulli quidam, communi morbo ex communi causa arrepti sunt. Sed & exercitus quandoque, dum pravis vterentur aquis, simili in omnibus militibus noxa vexatus est. Cætera huius capituli clara sunt.

4 *Sic autem curatio instituenda est, ut contra occasionem morbi (quem ad modum alibi à nobis dictum est) & victus etiam rationem venias. Nam satis patet, quod ea quibus homo in victu vitetur, vel omnia, vel pleraque, vel ex illis saltem vnum, illi inopportuna sunt. Quæ quum animadverteris, commutabis: atque hominis tum ætate, tum forma annique tempore, & ipso morbi modo recte examinatis ad curationem accedes, nunc detrahendo, nunc addendo. Iam enim docuimus semper tam in exhibendis medicamentis, quam in victu instituendo, prospiciendum esse ad ætates singulas, & anni tempora, ad formas & ipsos morbos. Quum vero idem morbus populariter invaserit, tunc obscurum non est, victum haud esse in causa, sed id quod spirando trahimus: quippe quod morbosa quædam habeat excrementa. Itaque eo tempore homines sic monebis, victum, quod minime causa sit, ne mutant: sed id curent, ut corpus quam minime fieri possit tumidum aut imbecille sit: paulatim etiam de cibis & potionibus, quibus uti consuevere, demant. Nam subita victus immutatio citra periculum non est, ne quid in corpore innouetur ab ea permutatione. Porro hac victus ratione erit vitendum, si quando nihil videatur hominem eo offendi. Verum cura erit adhibenda ut quam parcissime spiritus in corpus influat, sitque maxime familiaris. Locum præterea, in vim alienam ab eo in quo morbus ille excitatus est, mutabis, & corpora extenuabis. Sic enim fiet ut homines neque multo neque frequenti spiritu egeant.*

D *Maneam communium morborum, quorum causa sit aer circumfluus, curationem protulit. Nonnunquam enim halitus stagnorum, paludum, & coenoforum locorum, vel huiusmodi alicuius terræ istiusmodi gignendis morbis occasionem præstat: interdum vero sola anni temporum intemperies. Recte igitur, quum halitus sola potius substantiæ proprietate, quam simplici aliqua qualitate corporibus noxii sunt, curandi rationem explicuit, rem hanc in duos referens scopos, locorum mutationem, ac usum modice respirationis. At vero in his qui ex qualitate læduntur, non morbo modo iam dum factorum, curatio: verum & custodia ne illi suboriantur per contrarias perficiantur qualitates: quia si corpus ab immoderato offendatur calore, per refrigerantia: si ex frigore, per calefacientia: et pari etiam modo in alijs tam simplicibus, quam compositis qualitatibus. Iam au-*

IN LIB. HIPPOCRATIS DE NATURA HUMANA

tem à nobis de his indicationibus quæ ab ætatibus, anni temporibus, corporum quæ temperamentis E
sumendæ sunt, actum est. Illud vero τῇ φαρμακείῃ προτρέπεται græce dictum arbitror pro προσφέ
ρεσθαι i. occurrere morbis per contraria. Nam nunc etiã in Asia dicunt aliquem alicui προσφέρεισθαι
χρησῶς, ἢ φιλικῶς, ἢ ἀπὸ πῶς, hoc est bene cū eo agere, vel amice, vel perfide, vel crudeliter.

- 5 *Morbi quicunque ex Valentissimo corporis membro ortum habent, vehementissimi sunt. Nam si ibi permanse-
rint, ubi coeperint, necesse est ut laborante membro validissimo, totum male afficiatur corpus. Sin autem ad imbe-
cilliores partes à robustioribus quicquam delabatur, non erit facilis dissolutio. Quæ vero ab infirmioribus ad fortiora
deveniunt, soluti faciliora sunt: influxus enim facile à robore repellitur.*

* Alicubi legi-
tur ὁμογενῶς
hoc est consi-
miles.

Siue membrū, siue corpus, valentissimum quis dicat, id proprie dicet quod ad actiones validio-
res obeundas sit optime constructū: quo pacto Herculem robustissimū fuisse dicimus. Altero etiã
modo validum esse hoc corpus dicimus, vel hoc mēbrum, pro hac certa actione, quæ admodū aliud
pro alia, & in omnibus alicui quidem singularum actionum robur adsit, ita tamen, ut aliud in eorū
alio robur habeat. Vna itaq; actio earum motionū quæ in animante voluntariæ sunt, ut si aut cur-
rat, aut cum alijs animantibus cōgrediatur, aut corpus aliquod animatum vel inanime diuellat, aut F
quicquā auellat. Est & una alia facultas quæ ad actiones vitales pertinet, unde arteriæ & cor habet
expulsiuam. In his præterea quæ genere inter se differunt, sunt aliæ quædam dissimilēs, quæ non mo-
do in animalibus, sed etiã in plantis, reperiuntur, quapropter naturales eas nominamus, attractrix,
cōtēntrix, alteratrix, & expultrix. Potest itaq; aliās quidē in alio atq; alio corpore venter, verbi gra-
tia, facultatem quantum ad vnā quampiā actionem spectat robustissimum habere, ut ad conten-
tricem aut alteratricem: non nunq̄ etiam vel iecur, vel lien, vel aliorum aliquod. Contra etiã in ani-
mante eodē inualida crit ventris attractrix, vel expultrix facultas, quas tamen iecur robustissimas
obtinebit, Sed is author qui hæc literis mādauit, ista prætergressus est. Mihi vero robustū videtur
intelligere id, quod præter hoc quod à causis quæ morbos pariunt haud facile afficitur, habet etiã
ut si in ipso aliqua humorum excrescat redundantia, in aliud quodpiam membrum ope expultri-
cis facultatis propellat: sed est sanē manifestum quod oportet ut valentius sit id quod propellit, eo
quod recipit. Erit quippe in omni corpore, hoc quidem membrum infirmissimum, alia vero va-
lidissima: in quo omnes tam medici quā vulgares consentiunt. Et proinde podagricis pedes
aiunt esse inualidissimos: vniuersum autem articulorum genus ijs qui arthritidi obnoxij sunt: in-
firmum etiam caput esse, quibus id dolet: & lien, lienis vitio laboranti: oculos quoque illis, qui in G
lippiitudinem procliuēs sunt: eodem quæ in cæteris partibus modo. Præterea vero, ut duplices sunt
causæ morborum efficiētes, aliæ externæ, alię vero quæ à nobis ipsis prodeunt: sic ad externas in-
terdum offensiones non nullæ in nobis partes imbecilliores sunt: ad internas aliæ: quando & cau-
sarum ipsarum non eadē genere vis est. In nobis etenim morbi vel ex humorum multitudine,
vel ex eorundem suboriuntur prauitate. Externæ item causæ corporibus animantium no-
cux sunt, tum quod intemperiem quampiam gignant, tum quod contundant, vel incidant. Lu-
xatio enim & ab vtrisque videtur habere occasionem: solus enim absque alterius congressu qui-
spiam ambulans interdum genu, aut mētum oscitans, luxauit: sic et alium aliquem articulum aliud
quicquam agens, aut se contorquens: sed & sine vlla externa causa aliquibus infractum est mem-
brum aliquod, dum subito contorquetur, aut vi maiore salit. Vnde totidem sunt membrorum
facile aut ægre patientium, totidem etiã firmitatis vel infirmitatis genera, quot sunt causarum.
Morbi siquidem qui ex humoribus habent originem, ipsi etiã à robore vel imbecillitate expul-
tricis facultatis ortum habent. Nam quum omnes animalis particulæ naturali quadam connexio-
ne inter se deuinctæ sint, à robustioribus repulsi noxij humores, ad alias confluunt: & inde rur-
sus ad alias, donec in imbecilliozem partem quampiam delati, ibi figantur, quod nullam se præte- H
rea inualidiorē habeat, quod morbosum humorem propellat. Hæc si, perinde ac intestina, venter,
vesica, vterusque, effluxus habeat, inde excreta noxia causa vacuatur: quæ tamen si consistentia
tenuior sit, sepe canalibus quæ in ea parte sunt, disruptis, aut vasorum ostijs reſeratis, copiosior sub
sequitur euacuatio: in quem modum fiunt sanguinis quæ absq; vulnere sunt, profluvia. Si vero ea
neq; dirumpantur neq; aperiantur, sed crassus sit humor aut tenax, qui in aliquam incumbat par-
ticulam, tumorem aliquem in ea parte præter naturam excitat. Sic ergo hæc est membrorum no-
stri corporis imbecillitas, & eorundem robur, in affectibus illis qui ex nobis ipsis prodeunt. Qui
vero ex externa causa, ij dum calefiunt vel refrigerantur, exiccantur aut humectantur, plurimū af-
fici vidētur. Alioqui enim quæ aut cōtundunt, aut incidunt, vel aliud quodpiā huiusmodi agūt,
raro admodum corporibus animalium morbos afferunt. Quo fit ut aliud membrum ad aliud in
huiusmodi morbis collatum sit vel imbecille, vel robustum. Membra siquidem natura frigidio-
ra, faciliora etiam sunt ut à refrigerantibus causis afficiantur: calidiora vero, à calefacientibus: nec
secus etiam ea se habent, quæ præ siccitate aut humiditate sunt intēperata. Sunt porro in his non
nulla, quæ & si non ægre à calefacientibus refrigerantibusve, exiccantibus quæ aut humectantibus cau-
sis afficiantur, quia tamen vim expultricē obtinent valentiorē, in aliam partē suā impellunt malū.

Quum

A Quam igitur non vnus neq; simplex modus sit, quo membrum robustum aut debile aut sit aut intelligatur, sed multi potius ac genere varij: nemo est qui possit pronuntiare, præsens pars vera sit nec ne. Verum enimvero vt de hac, ita de alijs omnibus quæ modis pluribus dici, & accipi possunt, id sanè dixerim, qd quum ita indistincte proferantur, confusam ac mimime articulatam habet interpretationem, vt inde nequeant auditores aliquem fructum referre. Præterea necleuem obiectionem id patitur, quod præsens insinuat oratio, vbi ait: Quæ vero ab infirmioribus ad fortiora deueniunt, solute facilia sunt: influxus enim à robore facile ἀποκλείζεται. Et proinde expolitores varij in exponendo illud ἀποκλείζεται fuere. Nam quidam ἀποκλείζεται scripsere, alij ἀποκλείςται. Fuere & qui ἀποπαγίσσεται, tertia scilicet syllaba verbi istius per ω scripta: Sicut alij in quibus est Dioscorides, per η & σ, ἀποπαγίσσεται dicunt ita, vt pro repelli sit positum hoc verbū. At vero si ab infirmioribus particulis ad validiores propulsus noxius humor, ab illis rursus repellatur, nihil inde ægrotus proficiet. Quare melius sanè erit vt hoc modo scribatur locus iste. A robore. n. quæ influunt expendentur, hoc est concocta ac digesta consumentur. Quidam autē validissimas partes eas appellari hic quæ principes sunt, autumant, & falsam reddunt hanc sententiā. Satiū. n. est vt humores prauī, reliquis principalioribus partibus, in ignobiliores ferantur, q̄ q̄ ab ignobilioribus in principes impellatur. Aspeximus etenim sæpe in his qui articulari morbo, aut podagræ obnoxij erant, qd repullis ab artubus humoribus cō delatis, illi in principē aliquā partē contendentes, homini interitū attulere: cui ea sola relinquebatur spes salutis, si iterū possent ad artus reuelli.

6 *Vena, quæ crassissima, sunt in hunc modum digestæ: Quatuor sunt in corpore earum paria, quorum vnum ab occipite per ceruicem exteriorem vtrinque; delatæ ad spinam, & inde ad coxas & ad crura, & tandem per tibiae exteri ad malleolos vsq; ad pedes perueniunt. Quare in dorso aut coxendicium doloribus sanguis mittendus est scetus exterioribus in poplite aut malleolo venis. Alteræ autē quæ à capite ortū habent venæ prope aures, & iugulares appellantur, per ceruicē interiorem † à caua iuxta spinam vtrinque; & lumbos in testes delatæ & femora per poplites ex parte externa, atq; per tibiae in exteriores malleolos & pedes: Vnde ad lumborū dolores testiumq; venas incidere in tibijs oportet & malleolis interioribus. Tertiæ venæ per ceruicem ex temporibus sub scapulis in pulmonem subinde tendunt, & vna à dextris in sinistra, altera à sinistris in dextra procedit. Et dextra quidem à pulmone sub mammam transiens, se ad lienem & renem confert. Quæ vero à pulmone ex dextris in sinistra delabitur subter mammam ad iecur & renem pertingit: sic tamen vt ambæ in sedem descendant. Quartum deinde par à sinistrite oculisq; sub ceruicem & clauiculas deferuntur, mox vero ab his ad flexus brachiorum & cubitum brachialiaq; & digitos: item à digitis per pectinem & cubitum ex superiore parte manuum ad inflexus, & per brachiorum inferiores partes ad alas, & a superioribus costis altera ad lienem, altera ad iecur descendit: postea vero vtræque super ventrem incidentes, ad pudenda tandem concedunt vtræque. Sic ergo se habent venæ crassiores. A vena tamen caua multæ aliæ variæq; per corpus dispartuntur, quæ alimenta corpori ministrant.*

† Alibi tamen legimus ἀποκλείςται: hoc est a venæ.

Ea quæ in artibus in cōtrouerfiā veniūt, partim sensu, partim demonstratione dijudicantur. Quæ ad iudicium sensus pertinet, vigentē à quo iudicetur sensum expolcunt: sed quæ ad demonstrationes, rationē exercitatione elaboratā. Iam igitur si de ciborum concoctione, tum ea quæ in ventriculo fit, tum vero quæ hanc excipit, humorum generatione, distributione, nutritioneq; & id genus reliquis, sermo habeatur: ratione qua veterū opiniones iudicentur, egemus. At vero an quæ ruminant animalia, quatuor ventres habeant: quæ autē vtrinque sunt dentata vñ, à sensu hoc, non ex demonstratione petendum. Vnde diuersus modus est, quo conuincendi fallitatis sunt qui aberrant, in his quorū sensus, & in illis quorū ratio iudex est. Eorū. n. quæ ad sensum attinent, quū inter se alij disputant: ad id quod in corporū dissectionibus conspiciunt, si se cōtulerint, facile erit iudiciū. Sed q̄ demonstrationē requirūt, possunt sine vlla ēt dissectione, sola ascripta demonstratione iudicari. Igitur quū scriptis cogimur cū his cōtendere, qd de aliquo dissectionis theoremate, quod sensum in primis iudicē habet, impudentissime pariter ac imperitissime pronuntiaūt, fieri nequit vt ignari eorum q̄ in dissectionibus videri solita sunt, possint mendaces à veridicis discernere. Vt enim si quis Cretam esse insulam negauerit: statim ab omnibus qui id audierint, despicietur, quippe qui probe nouerint eam esse insulam: Sic si quis canibus quatuor esse ventres affirmauerit, vnicū vero ruminantibus, hūc illi qui in ruminantibus quatuor, & vñ in canibus inspexere, facile deridebūt. Idipsum quoq; de venarū sectione dicas: nam à sensu, non à demonstratione huiusce rei petendum est iudiciū. Porro quoadusq; illi q̄ in hac re discordes sunt, in suis chartis q̄qd illis visum sit descripserint: veritas eos q̄ sectionis imperiti sunt latebit. Sic itaq; quum in hoc præfenti sermone in cōtrouerfiā venerimus cum his qui ausi sunt affirmare quatuor venarū paria à capite in corpus descendere: dissectionis rudibus nullam possumus validam scriptis asserre demonstrationem, nempe qd non demonstratione, sed sensu iudice egeat. Nisi quis forte velit ea proponens, quæ de iudicanda historia, tum à multis tam philosophis q̄ medicis, tum vel maxime ab empiricis tradita sunt, horum institutis vsus iudicium asserre. Et equidem antiquiorum iudicia, atque etiam consensum authorum minime fugerim, dū illi qui scribere fuerint in re de qua scribere consummati, quemadmodum in dissectionis disciplina Eudemus & Hierophilus: Crateuas, & Dioscorides in metallis

IN LIB. HIPPOCRATIS DE NAT. HUMANA

medicamentis. Quod si quis huiusmodi subterfugiat iudicium, non modo non poterit quatuor E
venas offendere à capite descendentes, verum neque tres, neque duas: quia una tantummodo vena est,
& ea maxima quae caua appellatur, à gibbo iecinoris per totam animalis longitudinem protrahita. Nam
quum septum transversum animantis partem superiorem ab infera separet, vena caua pertransiens trans
uersum id septum sursum versus ad cor tendit, deorsum vero à gibbo iecinoris per spinam concedit.
At ab ea quae sursum contendit parte plane perspicitur tanquam à caudice omnes exoriri, quae septo
transuerso superiores sunt venae: sicut ab ea quae ad spinam deflectit, inferiores. Horum Hippocra
tes in secundo epidemiorum libro meminit, ubi venam cauam iecorariam vocat. Huic ceteri omnes qui
cunque in dissectionibus versati sunt, consentiunt: nec quisquam alius unquam medicus repertus est,
siue dissectiones diligentius siue negligenter pertractauerit, qui asseuerauerit octo esse venas, quae à ca
pite in corporis infernas discurrant partes, non Diocles, non Praxagoras, non Erasistratus, non Plistonius
cus, non Philotimus, non Mnesitheus, non Dieuches, non Chrysippus, neque Antigenes, vel Medius,
vel Euryphon, nec alius tandem quisquam è numero praeceptorum medicorum. Et quid de recentioribus
dicam, à quibus anatomica disciplina plurimum adacta est: in quibus Herophilus & Eudemus
fuerunt: quos nullus ad tempora usque Marini & Numesiani subsequutus est, qui illorum methodo ali
quod inuentum addiderit, ut neque Heraclianus, cum quo Alexandriae magna attentione versatus sum. F
Horum virorum & alij etiam plures extiterunt discipuli: sed omnium praestantissimi fuerunt, Numesiani qui
de, praceptor noster Pelops: Marini vero, Quintus. Quintus vero ut de nulla praeterea re alia quic
quam scripsit, sic neque de dissectionibus. Sed aliorum non paucos habemus anatomicos libros. Immo
& commentaria reperiuntur anatomica à discipulis Quinti aedita, qualia sunt Satyri praceptoris no
stri & Lyci. Igitur quum ab his omnibus, & ab alijs praeterea multis, de corporibus secundis scriptum
sit: nullus tamen nouisse potuit quatuor venarum paria à capite delabi. Neque hoc secus esse videtur,
quam si quis vellet contendere Athenis octo esse arces, ubi unica tantum est. Romae etiam si aliquis diceret
colles octo esse qui inhabitentur, alius vero sex tantum, uno uterque mentiretur. Si tamen quisquam
unum pro septem habitari collē, contra vero Athenis pro una octo dicat esse arces, hic longe maiori
mendacio erit obnoxius, quam alter, qui uno tantum à vero aberrat. Sic ergo quum una sit vena,
quae à iecinoris gibbo in supernas corporis partes fertur: quae etiam si quis à superioribus sectione
exordietur, descendere potius quam ascendere dici poterit, ut tamen nihilo secius una videatur: ille
profecto ab omnibus deridendus veniet, qui octo dixerit à capite venas deferri. Quia siue ex super
na parte deorsum, siue ex ima sursum, ferri dixeris venam iecorariam, quam cauam appellant: illa una pe
nitens semper erit per gibbum iecinoris porrecta. Et proinde si ullus cuiusquam reperiatur liber, G
qui anatonem huiusmodi litteris mandauerit: nullus sane unquam eam poterit illius habere ratio
nem, ut pati possit particulatim omnia capita legere: immo hoc uno audito, quatuor esse venarum in
corpore paria, statim quali à stolido quodam instituto aufugiet. Verum posteaquam haec à non nul
lis interiecta sunt Hippocratis operibus, coacti fuimus nos hoc temporis, quod tamen in his refellendis, tamen
vero illis quae vel praeter scripta sunt legēdis consumimus, dispendium subire. Est (ait ipse) par unum ve
narum, quod ab occipite exoritur, per ceruicem descendens, & ab exterioribus spinae partibus ad coxas de
latum, mox inde per tibiae ad malleolos tandem exteriores peruenit: Alterum vero par à partibus iuxta au
res originem habere ait, quod per collum delatum, constitutis quibusque venis iugularibus vocatis, mox ut pri
mum ex externis circa spinam partibus, ita hoc ab internis, ad testes & femora pertingit: deinde vero per
poplites ad internos concedit malleolos. Quis unquam si vel diu unam secari corpora viderit aliquando,
haec audire queat? Multa quidem in sectionibus existunt theoremata obscura, nec facile demonstratio
nem habentia, quae merito quempiam ex his qui in ea re non admodum consummati sunt, latere pos
sunt: & propterea de his aliqua suborta est dissensio: at maxime illius venae negotium ita omni
bus apertum est, ut illos qui ex anatome quicquam addiscere potuerint, fallere nequeat. Immo
adeo penes omnes in confesso est, ut etiam poetae id cognoscant. Vnde Homerus ait, H

Et venam praecidit inde,

Quae dorso incumbens in collum fertur utrinque.

Sic igitur unam, ut una etiam est, nouit, non quatuor: duas extra spinam, duas item alias quae eo
dem sicut illae modo utrinque secundum spinam porrectae sint: ut tamen nullum sit animal,
quod, in quem modum qui hanc descripsit anatonem fingit, quatuor habeat. A vena hac ma
xima, per vniuersos spinalem medullae fines, ut in secundo Epidemiorum libro scripsit Hippo
crates, germina oriuntur: superior eius terminus ad clauiculas est, inferior autem ad os sacrum.
Horum alter in venas iugulares scinditur: alter in illas, quae in crura deferuntur. Iam ergo quo
modo is, qui hoc secundum par commentus est, putauit iugulares venas duas permanentes iux
ta spinam ex internis partibus ad crura deuehi: quo etiam interius ad malleolos peruenire
quum una in utranque & sola vena feratur, & non una intra, altera vero extra malleolos, sed
vnius & eiusdem sunt rami. His autem praeterea ineptius est tertium id venarum par, quas à
temporibus deductas per ceruicem, sub scapulis transire ad pulmonem dixit: inde vero muta
to incessu, à recto in obliquum, dextram ad sinistram latus peruenire, sicque ad lienem, & si
nistram renem concedere: sinistram vero ad dextrum renem: & ambas tandem in sede finire.
Sed

A Sed dicat quispiam authori huiusce inuenti, o bone vir, sedes habet sua venarū germina à caua iuxta lumbos exorietia, qua sanè parte duæ illæ q̄ in vtranq; partē deducit à caua ortæ, quali rami maiores in crura deueniūt. Et quis præterea est nedū medicus sed nec coquus, qui nesciat sanguinē à corde, cuius ille qui hoc tertiū cōfinxit par, vsquā in suo sermone ne meminit quidē, pulmōni per venā vnā subministrari? Immo is istius sermo id si vllam habeat venam ignorasse videtur, quod tamen à non nullis sectoriæ disciplinæ peritis tanquam fons & origo venarum omnium per vniuersum corpus distributarum, habitū est. Quartū enim venarū par à lincipite oculis q̄ suum initium habere ait, vnde sub ceruicem & clauiculas delatum, brachium ingredi, ad vtranq; manum vnā: subinde vero ex superioribus partibus in digitos ferri, & mox referri rursus per vniuersam manū ad alam, inde q̄ per costas progredi, alteram quidem in iecur, alteram in lienem, vt tādē à ventre decurrentes ambæ ad genitalia desinant: sic q̄ nec istæ vllam cordi partem attribuūt. Qui ergo potuit is horum, veluti nouus quidam Prometheus, confictor, tātum viscus, cor inquā, omnino obliuioni mandasse? At nec cerebri vsquam meminit: vel forsitan quod malleolis esset in minori honore habendum. Sed quod de renibus tradit omnē videtur cecitatem superare: quippe qui à vena caua maximas venas habeant, quas iste prætergrediens, sibi quasdam alias eò à pulmōne deferri cōfingit. Iam igitur satis ex omnibus istis constat, q̄ vir iste nequaquam, vt alij quidā sectionibus operam dantes sæpe faciunt, quædam quasi cæcutiens præterierit, sed potius nihil prorsus viderit. Nā si quis vel maxima non videat, hunc nihil omnino videre, q̄ cæcutire verius dicas. Atque is qui de venarum à capite in vniuersum corpus partitione habitus est sermo, q̄ ebriorū somnijs similis sit, eorum qui sectionibus vel parum interfuerint, nemo ignorat. Porro paruas aliquas venas viros anatomicos fefellisse, magnum non est: nunquam tamen quisquam aliā alio modo descripsit, neq; eas quæ à cæcis etiā, modo digitos admouissent, comprehendi poterant, prætermisit. Itaq; vna est vena, per quā sanguis ex iecinore in vniuersum corpus influit, à qua multæ aliæ minores quali rami à trunco prodeuntes, illum omnibus corporis dispertuntur particulis. Quod si sanguinē in caua vena fluuiō compares, riuulis vero illum qui inde in corporis particulas defluit: minime à vera aberrabis similitudine. Sed siue fluuiō, siue trunco similē esse venam magnā quis dicat: omnes penitus medici consentiunt vnicam eam esse, præter q̄ ille qui audacissime quatuor hæc paria huic libro interseruit. Et præter alia multa, tum cor, tum venam ipsam cauā silentio præterijt: quum tamē iugulariū meminerit, in quas illa in supremo thorace scinditur. Quicquid enim præterea inter locū hunc & vltimam spinæ partem clauditur, vena caua occupat, à qua venæ vtrinque germinant. Ex

C vitroq; vero ipsius termino, & ex vtriusq; partibus bipartita est. Nam à superiore eius parte duæ prodeunt venæ maximæ, quæ per collum inuectæ iugulares appellātur: ab inferioribus vero in vtrūq; crus vna, vt iam diximus, & ea q̄dem maxima descendit. Eorum sanè quæ p̄ collum feruntur, & iugulares vocantur, in suo illo secundo parī meminit nouus hic noster Prometheus: vbi temeritatē ac ignorantia maximam ostendit, nulla vnquā cauæ venæ, à qua istæ ortū habent, facta mentione. Debuisse quippe, si vnq; vel tantillū secādis corporibus interfuisset, dixisse venas has iugulares in vnum coire & efficere iecorariam vel cauam venam, vel quomodocunq; quis illā in præsentia velit appellare. Quod si de istis tanq; semper sic duabus permanentibus ab eo sit sermo habitus, qui dicat illas per internas prope spinæ partes ad interiores malleolos deuchi: quid deinde de alijs venis post quatuor illa paria descriptis erit dicendū? quas ipse putauit alimentū à caua vena in corpus vniuersum afferre: ac si quatuor illa cōmemorata paria alterius cuiuspiā negotij gratia fuerint à natura fabrefacta, neq; vnū idem q̄ & cōmune sit venarū omnium munus: nempe sanguinē ex hepate in ceteras animantis partes aduehere. At vero quæ à ventriculo & intestinis succum ciborū in iecur asportant, earū nulla vltra iecur progreditur: immo nec in multis secundum iecur locis apparent, quamuis numerosæ admodū ex ea parte sint, qua ventrem & cætera attingūt intestina: sed

D in vnū locum quem portas iecoris vocant, omnes cōueniunt: quē locū qui primus portas nominauit, iecur vrbi aut ædibus amplis comparauit: intestina vētrem q̄ agris, ex quibus instar viarū per venas multas cibi in vrbi ædium ve portas vehuntur. Delirat itaq; in hoc animante, quē libi nouus iste Prometheus, suo sermone fingit. Nā nemo vnquā animal aliquod effectu ipso sic formabit, vt in eo venæ à vētriculo & intestinis alimenta in totū corpus deferant: oēs siquidē in vnū concurrunt locū, portas scilicet iecinoris: vnde quæ per id viscus dispertite sunt venæ assumptū alimentum in cauam venā ferunt: à qua in totū corpus sanguis (vt paulo ante diximus) distribuitur.

7 Ferunt præterea à crassioribus Venis in cauam & in reliquum etiam corpus, atque ab exterioribus intro, multoq; impartiuntur: internæ extra, & externæ intro.

Poterant huic nouo Prometheo quatuor ea venarum paria suffecisse: nec tamen satis isti fuisse, immo præ inexplibili quadā impudētia, has illis insuper addidit, q̄ corpori à caua vena alimentū ministrēt. Et nūc coronidē sermoni impositurus, de venarū cōione hoc tandē minime verū, ptulit. Ex his etenim venis q̄ à caua oriūtur, quas ille crassas vocat, nulla in alia partita paria intestinis aut ventriculo inferitur. Porro vt ne verbū quidē is, qui hæc venarū anatonien cōmentus est, verū attulit: sic Hippocrates epidemiorū libro secūdo, in nullo prorsus aberrauit. Quare insaniūt profectō

Septima Classis.

zzzzzzz v

qui

2. Epid. sect. 4.

IN LIB. HIPPOCRATIS DE NAT. HUMANA

qui ne per somnū quidē corporū sectiones attigere, & libros Hippocratis exponere aggrediūtur, E
& illi quammaxime, qui quum velint Hippocratici appellari, in eundē tamen authorē & has vni-
uersas de venarum sectione nugas, & exactam eiusdem disquisitionem in secundo epidemiorū tra-
ditam referendā arbitrantur. Si. n. in alterutro eorū aliquod præterea accessisset inuentū: fieri sanē
potuisset vt idē vir tēpore peritior factus, illis q̄ ab eo prius, pbe dicta fuerāt, alia ēt addidisset. At
quū videamus Hippocratē nō modo omnia ad amussim in cōmentarios retulisse quē cūctis planē
conspicua sunt, verum & ea q̄ ad videndū sunt difficiliora, is vero qui hanc anatomen cōposuit, ea
etiā non viderit quā quisq; vel palpādo inueniat: Quomodo potest quispiā affirmare eundē vtra-
que hæc scripsisse? quomodo etiā probabile est, vt absoluto vniuerso qui de hominis elementis in-
stitutus erat sermo, de venis subnexuerit? Aut enim tota anatomes ratio explēda erat, aut neq; de
venis erat tractandū. Hoc. n. magis ad cōmentationes, quas nobis iplis memoriæ gratia describi-
mus, attinet vt eiusmodi varia theoremata simul explicentur. Iusto autē & legitimo volumini ne
quaquam conuenit, vt priore doctrina consummata, subinde illi alterius pars aliqua annectatur, at
que iterum illa relicta, paulo post alia, & postmodum etiam alia: quod in his euenisse videmus,
quæ libro de natura humana subiecta fuere.

8 *Sanguis ergo istis institutis mittendus erit.*

F

Quæ ipse videlicet præmonstrauerat, qñ ad finē primī parīs subiunxit hæc verba. Venā itaq; ad
coxarum & dorli dolores in poplitibus secabis & exterioribus malleolis. Secundo item pari hæc
adscripsit. Vnde ad lumborum dolores & testium, venas in tibijs incidere oportet & malleolis in-
terioribus: vt tamen in tertio & quarto pari nihil de vena secanda meminerit: quapropter hac etiā
parte mancā tradidit hanc institutionem, qui multas præterierit corporis partes, quarum venæ
tundendæ essent, explicandæ erant. Vt ergo ab vniuersa anatomes ratione particulam quandam
auulsam litteris commisit: sic & quod de sanguine mittendo referendum erat.

9 *Procurandū autem est vt sectiones quā maxime procub ab illis locis faciamus, vbi dolores excitari, sanguineq; col-
ligi nouerimus. Sic. n. nulla magna permutatio repente fiat, cōsuetudoq; interceptetur ne amplius in eundē locū co. n. at.*

Quod sectiones venarum hic intellexerit, quas phlebotomias cōposito appellamus nomine: re-
cte ab expositoribus acceptū est, q̄ in hoc oēs cōsentiunt. Quod vero minime definierit nū dolenti-
bus iā partibus cēseat, pcul esse reuellēdos humores, vel potius sanitatis tēpore: ea ratione forte ve-
niet reprehendendus. Et mihi quidem videtur quod id in his quis prospera vtantur valetudine di-
ctum sit: quippe quod voluerit author assuefacere humores redundantes in alias ferri partes.

10 *Qui sine febre multū puris expuunt, quibus etiā absq; dolore plurimum puris in vrina subsidet, & quibus cruentæ
sunt deiectiones, vt in dysenterijs, & diuturnæ, quæ iuuenes annos quinq; & triginta natos atq; seniores arripiūt: in
his omnibus spontanei oriuntur morbi. Hos. n. in laboribus versari oportet, & corporeos labores diligere, & in adole-
scentia in operibus esse: deinde vero reiectis laboribus, carnē reficiāt mollē à priori plurimū differemē, corpusq; quod
prius habebat, plurimū ab eo dissideat quod reiectū est, vt nihil inter hæc cōueniat. Quādo itaq; morbus aliquis eos qui
ita se habuerint, arripiat, tūc quidē euadūt, demū attamē post morbū liquefit corpus, & per venas qua maxime patēt,
effluūt saniosa. Quod si in inferiore aluū feratur: tales erūt deiectiones, quale erat id quod in corpore inerat: quū. n. si
sit declius, diutius in intestino nō permanet. Quibus vero in pectus delabatur, hi suppurati fiunt: ac cliuis. n. expurgatio
est, & in pectore longiori tēpore cōmorans putrescit, & in pus transit. Quibus in vesicā eijcitur, ex loci istius calore
albescit & excernitur: quodq; tenuissimū est, superius delatum consistit: crassissimū vero subsidet, & pus appellatur.*

Omnia quæ hac traduntur serie, clara sunt, potius q̄ lectorē qui animū aduertat, q̄ expositorē de-
siderant qui declarer: q̄ tñ an vera sint, partim experiētia, partim rōne examinanda sunt. Experien-
tia quidē obseruandū est, nū aliq̄ a febre immunes vili vnquā sint aut sputo pus reieciisse, aut vrinis H
aliquid excreuisse: p̄terea si priorē vitā duxerint laboriosā, mox q̄ quieuerint multo tēpore: atq; si
ij a morbo detēti incolumes euasere, & subinde si purulētē excretiones supuenerint. Hæc experiē-
tia sunt iudicāda: Ratione vero, si quā is retulit, causa vera sit, vel secus. Iā vero q̄ ista ab ipso autho-
re pducta nullā secū habeant necessitatē, facile oībus conspicuū erit, qui demonstratiuis methodis
operā nauarūt. An autē p̄babile saltē habeat, secū quisq; perpendat: videtur. n. p̄babile in his esse,
q̄ ad aliud referunt. Et egdē quantū ad ea spectat, q̄ in experimētis apparēt: tñ hoc habeo qd̄ tibi
asserā, me cruētas vidisse sepe numero deiectiones p̄ aluū ab his q̄ cōsuetas validasq; exercitatiōes di-
miserint, excretas: purulētas vero nequaq̄. Vidi p̄terea ex quibsdā piodis tū ordinatis, tū ēt inordi-
natis mucosa ab his in vrinis reddi et p̄ aluū deijci: sicut et sputa cocta qdē, purulēta vero minime.

11 *Gignuntur etiam in pueris calculi ob calorem tum loci illius, tum vniuersi corporis: viris prae corporis frigore cal-
culi non nascuntur.*

Loci nimirum vesicæ, de qua in fine prioris orationis sic ipse ait: Quibus in vesicam eijcitur a
loci istius calore albescit. Inquit ergo quod calculi pueris innascuntur ob calorem tam velicæ quam
corporis totius. Postea de puerorum calore hæc subiungit.

Nam

12 A. *Nam hoc probe nouisse expedit; hominem primis illis diebus calidissimum esse: postremis vero frigidissimum.*

Qui simpliciter absq; limitatione primis illis diebus hominem aiunt calidissimum esse, eorum sermo non est verus: at cum limitatione, verus. calidissimus siquidē est, si de innato calore loquamur, is enim in pueris plurimus est. Id autem, vt sequens indicabit oratio, ille qui hæc scripsit obaudivisse videtur, quod tamē in hoc sermone præcipuū erat. Neq; enim, vt Hippocrates dixit, Qui augentur plurimum habent innati caloris: ita hunc sensisse ostendes, immo nauo prætermisso, simpliciter putasse calida esse quæ crescunt.

1. aph. 14. Ex.
or. 7. a

13 *Necessē siquidem est, vt augescens corpus & ad vim progrediens calidum sit.*

Quum Hippocrates dixerit, qui augētur plurimum habent innati caloris: videtur hic author existimasse corpora his qui augentur, calida simpliciter esse: qui innati nihil in hoc meminerit sermone. Quod enim ad vim progreditur, calidum fore ait. ad vim autem progredi, vult quid huiusmodi indicare. Videtur ipsi incrementum esse rem violentam, & validam. & vt opera alia vehementiora operarios exalfaciunt: sic & incrementum. At contra debuerat dicere, ex innato calore pueros augeri: non aut ob id eos incallescere, q̄ augeantur. Nā calor ipse innatus nō solū moderate calidus, sed præterea ē humidus est. Igitur iure merito eiusmodi augentur corpora, quippe q̄ in tres distendantur dimēliones, & quali inflantur, & propterea omnibus illis fit accessio. Itaq; candiq; natura distendit ad hoc negotium organo vsa calore innato. ex humore. n. habet vt facile protēdantur. At qui pleriq; pueri, vt pote qui plurimū voraces sint, humorē non modicum aggregant, quem crudum proprie vocamus: qui calculo gignendo in primis opportunus est. rationem siquidem materiæ habet, accedente calore vti effectrice causa.

14 *At vbi flaccescere corpus cœperit, ac in ocium prolabi, frigidius euadit.*

Et hic rursus, quando non amplius augetur corpus, his qui inclinata etate sunt, ipsum ab ocio fieri ait frigidius. At satius erat vt contra ratio causę assignaretur. ob id enim quia illis innatus calor imminuitur: & incrementum etiam cessat. Clarius tamen horum author suam in sequenti parte sententiā aperuit.

15 *Et hac ratione, quo magis priori die homo augetur, eo calidior redditur. quo etiam postrema die marcescit plurimū, eo frigidior fieri necesse erit.*

C. Nos ergo recte partem superiorē, vbi ait: Necesse siquidem est vt augescens corpus & ad vim progrediens calidum sit, interpretati sumus. Erat enim ē contrario dicendum, ob calorem innatū augeri quæ augentur: non autem quia augeantur, ideo esse calida: vt eadem sit ratio in his quæ decrescunt. Putat nanq; quando non amplius crescit, frigidum fieri propter ocium, dum pristinum incrementum quod in opere erat, nunc quiescit.

16 *Qui eo modo se habent, pleriq; eo ipso anni tempore quo decrescere cœperint sani sua sponte fiunt, diebus quadraginta quinque. Qui vero id tempus excesserint, anno sua sponte sani fiunt, nisi re alia ledatur homo.*

Quosnā eo se habentes mō nominat? Nimirū quos prius cōmemorauerat. Qui ab exercitatione ad ocium translati pus expuunt, & mingūt, dysenterijs q; corripiunt. Vbi equidē dixi me plures vidisse cruentis arreptos dysenterijs, qui laboriosa negotiosa q; vita relicta, ad delidem se contulerint. Qui vero pus expuerint aut minxerint, nullos vnquam vidisse. At hic (vt arbitror) crudū quem vocant humorem, vbi concoctus sit, pus esse putat. Qui autem hoc mirum sit? quando & Erasistratus quoque ea quæ in vrinis febricitantium sublidant pus esse, non hunc humorem censet? neq; nouerit in bene valentibus ē qui voraces sint, id genus plurimum sublidere? Nos multos obseruauimus, qui in ocio aliquādiu vitam egere, vrinis magnam copiam rei quæ muco sic appellato similis erat, excreuisse, & in eorū nonnullis vbi hæc tarde permeabant, puri similia excrenebantur, quemadmodum & in respiratorijs instrumentis, quando diutius contenta concoquuntur. Huius autem & ipse paulo ante causam retulit: in dysenteria quidem, quum dixit viam decliuem in causa esse celeris excrementorum transitus: quem ad modum tardi accliuem in ijs quæ tussif reſciuntur: in vrinis vero loci calorem. Quod si quis concedere nolit in vrinis, aut spuitis, aut excrementis à pure crudum humorem differre: is alterutro errori obnoxius est, quia vel vtro, ne suū dogma prodere videatur, dolose agit, Erasistratū imitatus, qui voluit febres omnes habere ab inflammationibus ortū: vel sophistes est, qui in operibus artis nunquam versatus sit. hos antiqui recte λογιάτρεις appellant. Porro à crudo humore pus colore, substantia, ac odore distat. Iam & per nares & per os certis quibusdam vel incertis circuitibus fit huiusce crudi humoris excretio, vnde expurgatur cerebrum, cuius nulla nunc ab illo qui hæc scripsit, mentio habita est. Merito tamen dixit prædictos sponte sua fuisse sanatos, id eī nullo nostro negotio. Nam ipsa quantum satis sit, natura expurgat. At expurgationis duplicem ipse præscripsit terminum: Alterum eo anni tempore quo dicta iā excretio ipsis cœpisse contigit: alterū qui in annum protenditur: vt tamen qui brevior est, ad quinq; & quadraginta dies producat. Nonnulli vero nō quadraginta quinq;, sed quadraginta

IN LIB. HIPPOCRATIS DE NAT. HUMANANA

* Melius in
manuscriptis
ὅπως legitur ἢ
ἢ impres. ὡς ὦν.

17 *Morbi qui celeriter fiunt, & quorum occasiones manifesta sunt: hos quàm maxime periculo vacare denuntiabis. His vero curationem adhibebis, contraria occasione ipsius morbi instituendo. Nam sic illud, quod morbum in corpore excitat, depellas.*

Supra textu I.
181.e

18 Quibus in Urina Arenosa subſidet, vel pori, his inter initia Tubercula ad craſſam Venam exoriuntur, ac ad ſuppu-
rati onem ducuntur. Poſtea vero ſi ea tardius erumpant tubercula, ex pure coguntur Pori, qui cum Urina extrudun-
tur per Venam in Veſicam.

Potest quidē esse, vt ea de causa quam ipse attulit, eiuscemodi vrinę fiāt: pōt & pariter esse, vt fiāt absq; vena ex affectu renis. Frequenter tamen huiusmodi excretiones in vrinis proueniunt etiā sine tuberculis: nempe quando crassus & satis viscosus humor tarde egrediens, ab illius loci calore exiccatus cogitur.

19 *Quibus Urine sunt Sanguinolentæ, his Venæ laborarunt.*

Obscurum est quæ de re laborarunt/dixerit. Nam significare potest eas imbecilles factas, ut solutis viribus semicoctum sanguinem generent: qui vel præ earum imbecillitate facile profluat, vel quasi res aliena ab illis excernatur. Potest præterea communiter laborarunt/significare affectus sunt, quod scilicet tota affectio citra renū incommodum ad solas venas pertineat. Quæ tamen illa sit, haud ex hac expositione indicatur. At vero perquam manifestū est quod neque Hippocrates, neque Polybus, unquam *ἐνίματα* dixissent, quum ita dicere potuerint, quibus sanguinolenta sunt τὰ ὄργανα. Alioquin enim Hippocrates frequentissime ὄργανα scripsit: ὄργανμα vero nullibi in eius scriptis inuenias. Sunt & alia multa adscripta in hoc libro, quæ manifeste indicant ea neque Polybi neque Hippocratis fuisse.

Hæc particula
in manuscrip-
tis non habet.
4. aph. 76. Ex.
or. 36. b.

H

21 *Quibus Urina nunc pura est, nunc autem veluti fursures innatant, his Vesica scabie tenetur.*

4. aph. 77. Ex. Hoc item loco eum aphorismum descripsit, || Quibus in vrina crassa furfuraceum quid excernitur, his vesica scabie laborat.
or. 36.e.

22 *Plurimæ Febres ex bile gignuntur, quarum formæ, præter eas quæ ab occultis doloribus proveniunt, sunt quatuor. Earum nomina sunt continua, quotidiana, tertiana, & quartana. Quæ continua vocatur, ea a bile plurima fit & sincerissima: iudicationes quæ sincerissimas, & tempore brevissimo facit: corpus etenim quod nunquam refrigeratur, citissime colliquefit, quippe quod ex multo calore feruet. Quotidianam post continuam copiosior bilis parit, & alijs velocius depellitur: est tamen quæ continua longior, quia a minore bilis copia gignitur: quiescit quæ interim corpus, quod in continua requiem nullo habet tempore. Tertiana vero longior est quàm quotidiana, utpote quæ ex pauciore bile nascatur. Ut autem diutius in tertiana quàm in quotidiana corpus requiescit, ita etiam hæc quotidiana prolixior est. Quarta nam in alijs eadē ratio, nisi quod tertianis sunt longiores: quo. n. minus bilis participes sunt, quæ calore præstat, eo magis habent*

A habet vt corpus refrigeretur. Ab atra autem bile provenit is excessus, atq; etiam quod egre depellatur: nam bilis atra omnium quæ corpori insunt maxime lenta est, sedem q; diuturniorem habet. Quod quartanæ febres expertes non sunt bilis atræ, sic cognoscas: Autumno siquidem homines à quartana corripiuntur, & a quinto & vigesimo suæ ætatis anno, ad quintum & quadragesimum. Hæc autem ætas præ omnibus alijs ætatibus atræ bilis est particeps, & autumnum præ alijs omnibus temporibus. Quos vero extra id anni tempus, eam q; ætatem quartana inuadit, nouisse oportet, eam febrem, nisi homini aliquid obfuerit, minime fore longam.

Sec. 3. c. 8. 3.
119. h
4. Aph. 59. Ex.
or. 33. g

Pleriq; expostores, in quibus posuerim Sabinum, illum mihi imitari videtur, qui quum aqua inter cutem laboraret, medicum exposcebat vt suam diligenter reduuiam curaret: alterutrum sanè erat, aut is se vniuerso corpore laborare non animaduertebat, aut putabat curationem non requirere. Pari modo & expostores, aut animi oculis cæcutiunt, aut arbitratur leuioribus quidem erroribus esse consulendum, maioribus vero nullum esse remedium adhibendum. Hi quali ex profundo excitati somno sentiunt tandè, quæ ea quæ in hac parte tradita sunt, nèpe quotidianam esse tertiana breuiorem, cum Hippocratis sententia pugnent, qui in primo epidemiorum libro || necnò in aphorismis || aperte protulerit tertianam celerrime iudicari: & proinde aiunt librū hunc nō esse Hippocraticū, quū & falsa cōtineat, & quæ ab his quæ alibi scripta ab Hippocrate sunt, discrepent. Quippe si in hac tantummodo reputant hunc qui ista quæ libro huic inserta sunt, adscripsit tū mentitum fuisse, tū èt Hippocrati refragari, similes illi sunt qui reduuiam attendit, corpus vero vniuersum esse pessime affectum non aduertit. Quem. n. latet quotidianam esse longiorē tertiana, is se in operibus medicinæ parum esse exercitatum prodit. Porro ille non tam ex impudenti stupiditate mendaciū id effinxit, quā probabili ratione motus: eo magis q; inter antiquos non nulli fuere, in quibus est Plato, q; sensere cōtinuas febres ex ignis excessu gigni, quotidianas aeris, tertianas aquæ, quartanas terræ. Platonis vero hæc sunt verba: Itaq; corpus quod ex ignis abundantia laborauit, continuos feruores & febres efficit: quod vero ex aeris, quotidianas: at ex aquæ, tertianas, vt q; igne & aere sit tardior: quartū aut quum ex terra sit, oīum lentissimū est, & quadruplicibus temporis circuitibus purgatur, quartanā efficiens egre remouetur. Igitur quū Plato elementū pigerrimū, quod & firmissimū est & ad motū difficilissimū, quadruplicibus purgari dicat circuitibus, verisimile ipsis visum est alia quoq; inter se eadē pportione differre, qua genita sunt, vt qd subinde segtur terrestre elementū, vtpote aqua, circuitū èt quaterno proximum pducit: itē quod huic consequens est, q; aer est, quotidianū: quod vero citissime mouetur, id aut planè ignis est, febrē parit continuā. Probabilior tñ ea ratio est, q; causam ortus ipsarū in calidū natura refert elementū, id est ignē. Neq; n. cōsentaneum est affectū calidissimū à frigido domināte elemēto in corpore gigni: cōgruum sanè est calidū affectū ex redundantia elemēti calidioris excitari. Discrepant autē mutuo febres suis ipsis differentijs, quas in quantitate causæ ponas. Quod si cōcesserimus, febris, q; cōtinentissima iuxta q; & calidissima est, à plurimo igne proficiscetur: quod huic cōtinens est, secundum sibi vendicabit in quantitate locum, tertium tertiana, quartū quartana. Solutiones quoq; earum erunt causis consequentes: calidissimæ quidē febris, citissimæ: ab his vero temporis spatio secundū ordinē habent quotidianæ, tertiu tertianæ, quartū quartanæ, ita vt si ad pprobabilitatē respicias, hæc sanè erunt recte pñuntiata. Hanc vero rationē rerū ipsarum explanatio cōiūcit. At in superiori venarum anatomie eius author nulli innixus probabili argumento non semel, aut bis, aut etiam ter, euentus est, sed sapissime: vt neq; vnum quippiam in illis inuenias quod vel casu sit recte expositum: vnde mirabile profectò est, quod in nullo eorū authorem, qui omnia hæc à libro de Natura humana usque huc conscripsit, accusauerit vnquam, in præsentia accuset ita, vt ob hoc non amplius illi videatur liber hic fuisse Hippocratis. Porro & id mirandum est, q; Sabinus, & alij pleriq; expostores, superioribus omnibus semper applauserint asserētes hoc quidē mirifice fuisse ab homine dictum, illud vero summa cum felicitate, aliud diuine: nunc, aut eorum oīum obliti ex vna tantum cōtradicendi occasione, statim cœperit illis videri liber hic nō esse amplius Hippocratis, ipsum q; in Polybū trāserunt. Quali ipsi aphorismos legerint atq; èt primū epidemiorum librum, non legerit aut Polybus: quem, fieri nequit, quū Hippocratis discipulus fuerit, non sapissime ab eo de febriū differentijs audiuisse, & non raro etiam eius libros relegisse. His accedit q; viderat & ipse in egris tertianā cito iudicari, quotidianam vero longiori tempore perdurare. Nam neq; in eis ponendus est Polybus, qui Alexandriæ diuinabant: ij nullo vnquā vel viso egrotante, in scholis versabantur, nihil vnquam quod sanum esset dicentes, neq; ea etiam quæ in egrotis clarissime apparere animaduertunt qui in arte exercitati sunt. Vnde is horum author aut sophistes fuit, aut veterator, vt videtur: quippe qui vt notam aliquā senī inureret, falsa libro annexuit. Nam iuniorem illum fuisse qui hæc tradidit literis, nomen σύννοχος argumento est. Neq; enim vnquam Hippocrates vel ex antiquis alius continuam febrem σύννοχον nuncupauit, sicuti neq; vrinas οὐρήματα. Sunt sanè vocabula ista medicorum recentiorum, qui linguam antiquorum ignorarunt. Quare hæc missa faciamus quæ supposititia sunt, & ad librum de victu salubri, quem Polybi fuisse aiunt, accedamus.



GALENO ASCRIPTVS LIBER DE INCANTATIONE.

A DIVRATIONE ET SUSPENSIONE



Væfisti fili charissime de incantatione, adiuratione, & suspensione, si qua possunt prodesse: & si inuenerim in libris Grecorum hoc: & qualiter in libris Indorum est inuenire. Cui quæstioni compendiose in hac epistola correspondere. Omnes inquam antiqui in hoc videntur esse concordati, corporis complexionem animæ sequi virtutem: quæ virtus si sit æqualiter temperata, actio quoque corporis erit perfecta: vnde quia virtutes actionis animæ, in pueris, senibus, & mulieribus, imperfectæ plurimum esse videntur, complexio quoque corporis eorum imperfecta esse probatur. Et hæc imperfectio similiter contingit habitatoribus intemperatæ regionis, utpote caliditatis Aethiopiæ,

& frigiditatis Scythiæ. Inde Plato inquit, Quando mens humana rem amat aliquam, licet naturaliter non iuuat eam, sibi eam prodesse certificat. Ex sola autem mentis intentione, corpus resiliat iuuat, verbigratia si quis incantationem sibi prodesse confidat, qualiscunque sit, eum tamen iuuat. Si enim, ut diximus, complexio corporis virtutem sequitur animæ, necesse est rem taliter se habere: quod certificatur, quia ex timore, tristitia, letitia, stupore, non solum corpus in colore mutatur, sed etiam in multis alijs rebus, ut ventris solutione, siue cōstipatione, vel nimia defectione. Ego autem vidisti ista, sanitatis diuturnarum passionum fuisse causas, maxime illarum quæ corruptiones sunt mentium. In sanis autem fuisse infirmitatis causæ hæc eadem. Vnde Socrates, Incantationes, inquit, verba sunt decipientia rationales animas secundum spei inceptuonem, aut secundum timoris incisionem. Indi autem medici tantum confidunt incantationem siue adiurationem iuuare. Græci vero antiqui medici intendunt his in animam erroneam perfectionem suam reuocare, qua reuocata necesse est ut corpus reuocetur ab ipsa, cum complexionem corporis virtutem animæ constet sequi. Vnde Galenus super libro Hippocratis de Humoribus, Siquis, inquit, dixerit humores corporis mutatos immutare actionem animæ, ut animæ actio mutata mutat eosdem, non mentitur. Quod certificatur, quia quando complexio cholerica dominatur, fit inde iracundus: & contra in sæpe irascentibus, cholera rubea augmentatur: necesse est enim complexionem animæ corporis complexionem imitari, & corporis animæ. Iterum inquit Galenus, Intellectus & scientia in anima, ex complexione augmentatur cholerica: continentia & studiositas, ex melancholica: deambulatio vero & delectatio, ex complexione sanguinea: phlegma nihil adiuuat virtutem animæ nisi in prima gustatorum mutatione. Constat ergo, quod si medicus animæ complexionem quoque adiuuerit incantatione siue suspensionem, corporis complexionem ad vitam perducit: si autem his cōueniens adiungit medicina, corpus incantatione animæ adiuuat: quibus coniunctis necesse est sanitatem utriusque citius consequi. Itē inquit Galenus, Sunt homines leti naturaliter, & delitiosi, qui quā infirmant, sanos eos subito futuros confirmet medicus, & eorum dietam cum exercitijs reuocet: quorum spes, sanitatis est causa. Sūt & alij cōtrario, natura tristes, & vnde tristentur & angustientur, eorum animis semper cogitantes: quorum cogitationes oportet fallere medicum, & latificante intentione mutare animas eorū. Sed neque excedere debet latificandi modum, ne promissionū magnitudine negligat se medicandus. Memini enim quendam nostræ terræ nobilissimum murmurasse se esse ligatū, ne cū mulieribus coiret: quem adiuui falsificando intentionem suam, & hoc magnis ingentijs, sed tamen nunquam reuocare potui: propter quod certificare & confirmare in epi quod ipse prius intendebat: deinde adducens sibi librum Cleopatraz, quem fecerat de formandarum formanda speciositate, legi locum, ubi dixit taliter, Ligatus fel coruinum accipiat mistum

Astūm cum solamī oleo, quo vngens totum corpus, adiuvabitur: Isie autem audiens, confusus libri verbis, sic fecit, cito q̄; conualuit, & augmentata est concupiscentia cocundi. Ego quoque, in antiquorum libris multis legi suspensa collo suffragari cum proprietate, non ex natura sui, quod nō nego posse fieri propter confortationem mentis, ut dixi: de quibus cum sint multa, pauca, tibi tan gere disposui. Aristoteles in libro de lapidibus, Suspendens Smaragdum collo, aut portans ipsum in digito, defendit à casu epilepsie suspecto: vnde semper mandamus nobilibus, ut e collo filiorum suorum suspendatur: ne in hanc infirmitatem incidant. Item, quodlibet genus Hyacinthorum suspendens collo, siue habens in digito, si intret regionem pestiferam, nō læditur, sed potius in mentibus hominū honoratur, & à maioribus petitiones eius complentur. Item, Sardam. xx granerum hordei pondus portans e collo, seu in digito, nō videbit terribilia in somno. Item, Corneolam e collo portans, siue in digito, mitigat iram in contentione: cuius autem color est sicut lotura carnis, sanguinis fluxum cuiuslibet membri stringit, maxime in foeminis. Onyx suspensus vel digito portatus augmentat in somno terribilia, & trifutiam, & inter homines contentiosa, in pueris autem suspensus saluam oris auget. Galenus ait, Stercora luporum oīsa comedentium si in ventribus illa dolentium, vel e collo patientium suspensa fuerint, statim dolorem mitigant: aliquando & in coxis suspenduntur, & cum fune laneo ligantur, illius, scilicet ouis quæ à lupis comesta est, sic q̄; melius iuuabuntur & fortius, q̄ si huius non inueniatur, cum corrigia ceruina ligantur. Idem, Galenus in vas argenteum posuit, cuius, quantitas fabæ fuit, & in coxis suspendit, & multum profuit: hoc autem dixit in libro de simplici medicina. In libro autem eodem ait, Si Vipera suffocata collum cum filo lineo suffocandi e collo suspenderis, ab soluitur à suffocatione sua, & multum valet apostematibus faucium. Dioscorides ait, Dentes canini canis rabiosi quando hominem momorderit, in frusto corij ligati, & armo suspensi, defendunt à moribus canis rabiosi. Idem Pullis hirundineis paruis in augmento lunæ acceptis, & primogenitis, si fuerint in ventre scissi, duos lapides inuenies, vnum vnius coloris, & alterum diuersi & oppositi: quos si ligaueris in corio vituli antequam terram tetigerint, & e collo siue armo suspenderis, epilepticis valet, & aliquando perferant. Quidam medici suspendunt e collo radices herbae Acetosæ propter scrofulas, & valent: Alij suspendunt radices Arnaglossæ propter easdem, & dissoluuntur. Auricularis digitus abortiuus si e mulieris collo suspendatur, non concipit dum collo habebit. Hyoscyamus cum lacte caballino temperatus & corio ceruino impositus & suspensus e collo mulieris, concipere non permittit, dum in collo erit. Quidā dicunt mulierem ranam accipientem & os eius aperientem, ter q̄; ibi inspuentem, non concipere illo anno. Alij oculum hirci ligant radici sampluchi in horto, & irrigant cum vrina rursi tauri vespere: mane autem extracta radix ligatur cum eodem oculo in armo, libidinem augmentat. Galenus inquit, lapis Coralli multum valet ad passionem stomachi, si suspensus fuerit super stomachum, vel e collo patientis. Dioscorides, semen Croci hortensis ad scorpionis morsum valet in manu tentum, vel e collo suspensum: simile facit radix Lauri: idem etiam Iris agit. Alij dicunt, radices Asparagi sicca super dentes ligata, trahunt sine dolore. Item pedes Leporis & renes dextro armo ligati canes latrare non permittunt: similiter iecur facit canis, nisi coloris eius generis fuerit, cuius iecur fuit. Indi dicunt sterces Elephantinum cum melle mistum, & in vulua mulieris impositum, nunquam permittit concipere: testatur hoc, quia arbori suspensum non permittit fructificare. Aaron dicit, sterces Elephantis cum lacte caballino mistum & corio ceruino ligatum, & vmbilico mulieris suspensum, non permittit concipere. Quidam medici dicunt pedem testudinis dextrum pedi podagrici dextro suspensum iuuare, sinistro sinistro: idem & in manibus. Item radix Peoniæ e collo suspensa pueris valet epilepticis: similiter pyrethrum: idem facit pilus ex toto nigri canis. Nos autem hæc ex libris antiquorum excerpimus, ut mens tua in incantatione, adiuratione, & suspensione non refragetur amplius. Sed omnia si ex libris antiquorum philosophorum extrahamus, librum protendemus. Atqui voluntatem nostram hæcenus exhibuimus. Hæc autem ego non tentauī: Sed nec etiam neganda sunt mihi, quia si non viderimus Magnetem sibi ferrum trahentem: non certificamur, nec credimus: similiter quod Plumbum rumpit adamantem, quod ferrum non facit: & lapis, qui vocatur Nitrum, foco incenditur: Piscis autem quidam marinus se capientis sensum aufert: quæ omnia si à nobis non videantur, non creduntur, sed tentata certificant. Et forsitan itidem se habent dicta ab antiquis. Quorum enim actio ex proprietate est, rationibus vnde sit comprehendi non potest: rationibus autem tantum comprehenduntur quæ sensibus subministrantur. Aliquando ergo quædam substantiæ habent proprietatem ratione incomprehensibilem propter sui subtilitatem, sensibus non subministratam propter magnam sui altitudinem.



GALENI DE OCVLIS A D E- METRIO TRANSLATVS NVPER A VARIIS MENDIS EXPVRGATVS

*Quòd oculorum, & partium eorum, & operationum notitia est necessaria volenti curare ocu-
los: & quòd crystallinus est pars principalis oculi, cui cætera subseruiunt.* CAP. 1.



Portet medicum oculorum curam habere volentem, prius eorum na-
turam optime cognoscere: vnūquodq; enim membrū infirmū ideo
curatur, vt ad naturam suæ propriæ sanitatis conuertatur. Sed scientia
naturæ membri, & vniuscuiusq; compositi, non potest comprehendi
nisi partes totius noscantur. Qui igitur oculorum naturam scire desi-
derat, primo omnes partes quibus constructi sunt intelligat: noscat q;
operationem cuiusq; partis, & quæ fuerit illius necessitas, & quo mo-
do quæcunq; pars illa componatur. vnde de difficilioribus dicamus.
Sciamus itaq; q; omne membrum compositum habet propriam actio-
nem propter quam factum fuit, quam actionem cum vna suarum par-

tium operatur, cætera vero illi operanti ministrant. Sic & de oculis est, qui cum è multis partibus
diuerlis compositi sint: visus tamen proprie fit ab vna suarum partium, id est humore qui dicitur
crystallinus. Cæteri vero humores, atq; panniculi sunt propter iuuamentum ipsius, quod expla-
nabimus, cum de omnibus disputabimus.

*De colore, figura, & situ humoris crystallini, Vitrei & albuginei, Et de tribus tunicis quæ sunt
post vitreum: Et de tribus quæ sunt ante albugineum: Et de tela aranea.* CAP. 2.

Crystallinus est humor albus, splendidus, lucidus, non omnino rotundus, sed aliquantulum pla-
nus, qui locatus est in medio oculorū. Albus est & splēdidus, vt cito varios colores recipiat, quia
album & splendidum corpus cito & velociter coloribus opponitur, sicut in claro vitro fieri pa-
ter. Rotundus, ne cito patiatur, quia omnis forma rotunda non cito patitur, quia angulis caret.
Parum latus, vt lumen sumere possit: si enim rotundus esset exquilitate, lumen non cito sumere
posset, quia in loco vno stabilis non esset. In medio locatus, vt cætera partes sibi ministrant: quæ-
dam, quibus defenditur: quædam, quibus adiuuatur: vnde necessario in medio sibi ministrantiū
fuit. Quod aut in eo sit visus, testatur id qd' videmus in cataractis. aqua enim cum inter crystallinū
& corneam steterit, vt non possit species præ aqua ad crystallinum transire, lumen amputat vi-
suale: sed aqua ablata, lumē reparatur. Crystallinus autem in medio duorum locatur humorum,
quorum vnus retro est, qui dicitur hylēnos, id est vitreus, quasi vt vitrum lucidus. Alter vero est,
qui est quasi albumen oui, & dicitur albugineus. Post vitreum sunt tres panniculi, quorum pri-
mus vitreum circumdat, quasi rete, inde & retina dicitur. Post hunc est alius, similis secundinæ, &
dicitur secundina. Iuxta quem est tertius, qui ossa cōtangit, durus & solidus: vnde & scleros voca-
tur. Ante albugineum sunt tres panniculi, quorum vnus albugineo coniungitur, eum q; circun-
dat, qui est quali vœa, eius q; color nigredini pertinet, vnde vocant eum rhagoida, id est vœam.
Ante hunc est alter cornu similis, vnde ceratoidis, id est cornea, dicitur. Iuxta hunc est alius, qui
penitus non circumdat sicut alij sed eos intra se iungit, vnde coniunctiua dicitur, quia si cornea ab
ea operiretur, spiritus eam perforare non posset. Inter crystallinū & albugineum est tela aranea.
Sed nunc videamus examen vniuscuiusq; ipsorum. Et primo de vitreo tribus q; panniculis post
eum existentibus.

*Quòd crystallinus vitreo nutritur, Et quòd nervi optici soli concavi & de cerebro veniunt tecti dura
& pia matre ad loca oculorum, Et de tribus tunicis quæ sunt post vitreum.* CAP. 3.

Dicamus igitur ita. Omne mēbrum necessarium est vt habeat cibum, quo instauretur id quod
calore

A calore naturali & accidentali intus & extra dissoluitur. Cibus vero mēbro conueniens est, quem sibi mēbrū bene assimilatur. Crystallino ergo cibus est sic necessarius, vt ipse sit albiſſimus, & clarissimus: & hoc cū sanguinem in sui naturam ſumere non poſſit, neceſſario vitreum habuit mediantem, qui medius est inter naturam ſanguinis & crystallini: albior enim ſanguine est, & minus albus quā crystallinus. Hic autē vitreus humor est de ſanguine in venis ſubtilibus & arterijs digeſto: vnde mutatus est à ſuo colore in ſpeciem vitri. Ipſe enim venæ & arteriæ ſunt de retina, quæ procedit à ſubtilibus cerebri panniculis, neruum per quem ſpiritus ducitur circundantibus, qui neruus concavus est: quod planius dicemus vt pateat. Natura enim à cerebro ſenſum & voluntarium motū omnibus tribuens mēbris per neruos mediantes, duos neruos à cerebro prodeuntes, ad oculos mittit: quorum vnus durus est, vnde fit motus: alter mollis & concavus, neq; præter ipſum in toto corpore concavus alius est: quod ideo fuit, vt animatus ſpūs viſum faciens, per eum duceretur. Cerebrum vero duobus panniculis est opertum, vno ſubtili & molli, altero duro & craſſo: ſubtilis autē ſecundinæ aſſimilatur, quia venas & arterias habet, qui cerebro prodeſt, quia nutrit & defendit eum cum ſuis arterijs & venis: craſſus vero defendit ſolummodo ab offibus capitis appropinquantibus ei. Omnes autem nerui à cerebro procedentes, iſtis panniculis ſunt operti, donec à capitis offibus egrediantur: ſimiliter nerui ad oculos venientes, his duobus panniculis circundantur. Vnde molli panniculo cōcauus neruus circūtegitur, & extenditur in modum telæ cum ſuis venis: est autem rete vitreum humorem cooperiens. Vitreus autem humor medium crystallinum comprehendit. Retina venis & arterijs ad vitreum portat cibum, & cum ſuis neruis ſenſum & ſpiritum viſibilem ad crystallinum ducit. Subtilis autem panniculus qui ſecundina dicitur, quo neruus circūtegitur, cum alio qui retina dicitur, coniunctus est illi ſecundo loco crystallino iunctus est, cui ſecundina præſtat auxilium, quia ſuis venis & arterijs nutrimentum portat ad retinam, & defendit eā ne rumpatur. Durus autem panniculus ſubtili coniungitur, eum q; circundat: qui ad hoc valet oculis, quod eos ab offe defendit in quo locati ſunt, ne eis ſua duritie noceat, & est quali ligamentum oculorum. Sufficiant hæc de tribus humoribus, & tribus panniculis poſt crystallinum exiſtentibus.

De Tribus Tunicis ante crystallinum iunctis eis, quæ ſunt poſt ipſum: De q; Iuuamentis earum & Albuginei humoris: Et de Coniunctiua, & Musculus qui mouent oculos & palpebram, & ſuſtinent neruos opticos.

CAP. 4.

Panniculi vero tres ante crystallinum exiſtentes taliter ſunt. Diximus enim panniculos cooperire cerebrum, neruos q; ad oculos venientes circundare: ſed tamen in oculis exiſtentes diuiduntur, & faciunt duos: vterq; tamen ad medium crystallini iungitur in loco qui dicitur iris. Super pupilla est panniculus cornea, qui à duro panno cerebrum cooperiente procedit: & panniculus qui vuea dicitur, & ab illo quem ſecundinam dicūt procedit, qui, vt diximus, iungitur duro, qui cooperit, vt dictum est, ſecundinam. Panniculus vero exterior, id est coniunctiua, ſuper corneam procedit. Cornea vero ad hæc neceſſaria est vt crystallinum defendat, ne ab exterioribus, quia durus panniculus est, patiat. Hæc autem ſubtiliſſima, alba, & dura est: ſubtilis & alba, vt cito ſpiritus eam penetrare poſſit: dura, ne propter ſubtilitatem cito rumperetur. Vuea tribus de cauſis neceſſaria est: vna, vt corneam nutriat, quæ venas vnde nutriatur habere nequit: alia vero, vt media ſit inter corneam & crystallinum, ne cornea duritie ſua noceat crystallino: tertia, vt coadunet lumen ſuo colore nigredini pertinente: omne enim lucidum, lumen diſpergit, nigrum vero coadunat. Vuea ergo multitudinem venarum habuit & arteriarum, vt corneam nutriat: mollis fuit, ne crystallino inferret nocumentum. Proprios habet villos in quibus aqua coadunatur in cataractia. Lenis autem exterius est, ne cornea ſibi noceat. Color eius est ſicut color cœli, vt lumen ſicut diximus coadunet. In medio eius foramen est, per quod lumen ingreditur: & intrinſecus plena est humore qui dicitur albugineus, vt faciat crystallinum à cornea diſtare. Albugineus alterius iuuaminis est, quia crystallinum defendit, ne ab exteriori aere delicetur: & humectat vueam, ne noceat crystallino. Sed inter crystallinum & albugineum quidam est panniculus tenuiſſimus, ſicut cortex tenuiſſimus cœpæ, vel araneæ tela, qui mediū operit crystallinum, vt eum ab vuea defendat. Ideo q; quidam medici dixerunt oculorum panniculos ſeptem eſſe, dixerunt alijs ſex, alijs quinque, quidam quatuor, quidam tres, nō nulli duos, quorum diſcordia non erat in re. Dicentes enim ſeptem, computabant retinam, ſecundinā, ſcliron, araneam, vueam, corneam, coniunctiuam. Qui autē ſex, retinam non eſſe pāniculū dicebant, aſſerētes defenſorium panniculū quoddam eſſe: retinam potius nutrire, q; cuſtodire. Sed qui quinque autumabant, araneam nō panniculū, ſed crystallini partem, eſſe dicebant, neq; coniunctiuam. Dicentes autem quatuor, contendebant coniunctiuā non eſſe panniculū, ſed ligamentū oculorū, neq; retinam nec araneam telam. Tres eſſe dicentes, vueam & ſecundinam vnū eſſe dicebāt panniculū, quia vuea à ſecundina procedit: retinam quoq; & araneam vnū panniculū: item ſcliron & corneā vnum pāniculū. Qui duos dixerunt, ſcliron & corneam vnū intēdebant: & ſecundinam & corneam vnū: retinam vero & araneam & coniunctiuam non eſſe panniculos. Intentio ergo antiquorum erat vna. Nūc de coniunctiua dicamus, de qua hucusq; tacuimus. Sciendum ergo lacertos oculis eſſe neceſſarios,

DE OCULIS

cessarios, quibus possent moueri, & visibilibus rebus opponi. Ideo q̄ septē habent lacertos, quo- rum vnus mouet oculos erga nares, alter versus tempora, tertius sursum, quartus deorsum, quin- tus firmat & corroborat neruū vnde visus procedit: duo aliq̄ alligant coniunctiua ne vsq̄ ad cor- neam tendat, & operiunt lacertos ibi existentes in angulis oculorum. Tres iterū superiores palpe- bras mouent, vnus superius & duo inferius: inferiores vero palpebræ nullum habent motum.

PARTICULA secunda est de ortu neruorū sensus à cerebro. Et triplici specie regitiuæ virtutis: Et de ner- uis opticis & ipsorum coniunctione, & spiritibus visuiis. Et de modo quo fit visio. Cuius sex sunt ca- pita. Quod omnes sensus à cerebro procedunt, & ab ipso prodeunt septem paria neruorum, ceteri vero nerui à spinali medulla. CAP. 1.

NEcesse est qui naturam oculorum vult scire, prius cerebri naturam optime cognoscat. Vi- sus enim ab eo procedit, & superior eius actio ad eum conuertitur. Cerebrū autem frigidius & humidius ceteris mēbris est, quod postea explanabimus. Initium enim est sensus & voluntarij motus ac regitiuæ virtutis. Nullū enim aliud mēbrum hac actione fungit, sed cerebrum. His enim modis operatur, vel per se, vel per viam adiuuantis, instrumento adiuuante sensum agit, & mo- tum voluntariū. Instrumenta sunt nerui, qui duobus sunt modis, quidam à cerebro, quidam à spi- nali medulla procedūt: medulla spinalis tñ de cerebro est, vnde cerebrū fundamentum neruorū est F omniū. Sed duris neruis voluntarius motus efficitur: dum nerui cū lacertis componūtur. Lacerti enim de neruis sunt & carne & ligamento compositi, & ligamenta ab ossibus procedunt. Molles nerui quinq̄ sensus faciūt. Quibus omnibus subtilior & acutior est visus, qui sensus igneus est, & igneam habet naturā. i. splendorem & ruborem: lumen igneæ est nature, quia cum coaduna- tur intus, ignis ex eo succenditur. Post visum est auditus. post quem olfactus, post olfactum, gu- stus: qui quidē quia sentit qd̄ est aquosum, aque pertinet. Sapor enim qui sentitur nihil aliud est q̄ aqua alicuius corporis siccitati admista calore operante: proinde antiqui saporem vocauerūt chy- mum. i. liquorem. Ceteris sensibus tactus crassior est, qui quidem sentit quod terreum est, & terræ pertinet. i. durū, molle, calidū, frigidū, & liccū, & quæ ex his procedunt. Omnes autem nerui sen- sum habent tactus, sed non voluntarium motum, vt diximus: quia duri nerui tantū volūtario mo- tu fungūtur: sed molles duris sunt sensibiliores: procedunt vero duri plus à spinali medulla. A ce- rebro autem procedunt septem paria neruorum: quorum primum & secundum par ad oculos ve- niunt: Vnum est concauū per quem sensus visus fit. i. per quem animatus spiritus visum dans ad oculos tendit: Secundum par oculi lacertos & palpebras mouet. Tertium ad linguam tendit dans ei sensum saporum. Quartum ad palatum deuenit vbi gustus sensum facit. Quintum ad aures acce- dit sensum auditus faciens. Sextum ad viscera descendit, & per ea diuiditur, dans eis tactum. Se- ptimum mouet lacertos linguæ, Ceteri quibus mouentur manus, pectus, pedes, dorsum, & caput de spinali medulla procedunt. Sic cerebrum cum instrumento. i. neruis, motum agit, & sensum.

De Trina actione virtutis regitiuæ & de animali spiritu, & natura cerebri. CAP. 2.

Regitiua vero actio per se solum tribus modis est, phantasia in fronte, ratio in medio, memoria in puppi. Cerebrum habet quatuor concauitates quæ dicuntur ventriculi, duæ sunt in prora, ter- tia in puppi, quarta inter proram & puppim, in quibus semper est animatus spiritus, quo actus, vt diximus, fit. Spiritus autem animatus, de vitali fit: vitalis in corde generatur & nascitur. A corde enim duæ venæ ad cerebrum ascendunt, quæ subtus cerebrum venientes, multis diuiduntur mo- dis, & protelata faciunt quasi rete, per quas spiritus vitalis à corde ad cerebrum ductus, in illo reti moratur, quousq̄ mundificetur, & subtilietur. purificatus deinde ad medium ventriculum cere- bri tendit, ibi q̄ aliquantulum permanens subtiliatur, postea ad puppis vadit ventriculum. Sed via quæ est à medio ad puppim non est aperta: habet enim portam, in qua quoddam obstaculum est, cuius forma est sicut pinea, quam anatomici Vermem vocant: sed ferme semper clauditur. Vnde cum spiritus qui est in puppi, fuerit motus, fit memoria: cum is qui est in medio, fit intelle- H- tus & ratio: cum ille qui est in prioribus, fit sensus communis & phantasia. Hæc est dispositio ce- rebri, suæ q̄ actionis. Cerebri autem natura frigida est & humida. Frigida duabus de causis: Vna propter multitudinem sui motus: quo fiunt memoria, intellectus, & imaginatio. Secunda, pro- pter motionem quæ ab eo dirigitur: vnde fiūt sensus & voluntarius motus, ne causa suæ motio- nis calidissimum factum, incenderetur, & incensum consumeretur amplius. Si cerebrum calidum esset, memoria instabilis esset: caput enim calidum, mobile est naturaliter, frigidum contra. Me- moriæ vero requies & stabilitas est necessaria, quod sic attestantur, quia calidum cerebrum habentes, instabiles, & mobiles sunt. Humiditas autem cerebri duabus de causis est necessaria: Vna, ne ex motu nimio desiccaretur: motus enim calorem facit, calor vero desiccet humiditatem: Alia, vt in eo velociter imaginatio formaretur, & cito sensum qui eam dirigit, suscipere posset, & veloci- ter ad audita discernendum moueretur: rursus vt nerui ab eo procedentes molles essent. Impo- ssibile est enim à duro, molle, vel à molli, durum generari: proinde prora mollior est puppi, quia de prora molles, de puppi, duri nerui procedunt, quibus motus voluntarius fit.

De neruis opticis & eorum differentijs à ceteris neruis.

CAP. 3.

Qui instrū visus optime scire desiderat, primum naturam vtriusq̄ nerui visibilis inuestiget, vt bene

A vt bene cognoscat, quibus cum cæteris neruis cõicet, & quibus discrepet. Deinde de visibili spiri-
tu pquirat, quatenus sciat cū quibus spiritibus cõueniat, & in quo discrepet: postremo de ipso vi-
su quo modo fit, quod in hoc capite planè describam. Primum itaq; neruorum par, quod supra di-
ximus cū vtroq; cerebri panniculo descẽdere, & secum visibilẽ spiritum ducere, cum ceteris neruis
sensum facientibus duobus modis conuenit: Vno, quia vt aliq, a cerebri prora descendit: Alio, q̃a
& ipse nobilis est, discrepat tñ ab eis, sex modis. Primo, quia maior ceteris est à cerebro & à ipinali
medulla procedentibus: Magnus vero quia cõcauius est: si enim esset paruus, necessario subtilis ef-
set, vnde cito frangibilis: Cuius concauitas necessario fuit larga, vt nullam pateretur obstructio-
nem & ideo magnus fuit. Secundo, quia solus sic concauus est, vt eius concauitas sensui osten-
datur, quæ concauitas protenditur vsq; ad locum in quo panniculus oculorum qui rete dicitur, se
procreare incipit: quod facile sensui patet, si anatomia cernatur. Inchoat quoq; ipsa concauitas ab
vtrorq; cerebri ventriculo, qui est in cerebri prora: in quo tamen loco cõcauitas videri non potest,
quia subtilissima & angustissima est. Hoc foramen qui vult aspicere, quærat in cerebro magnorũ
animalium in hora, qua occiduntur. Caveat tamen ne in æstate, calido ue tempore fiat: & vtroq; cerebri
panniculos tangat caute, ne frangantur, & in fine illorum panniculorum inueniet illud
B neruorum par ab vtroq; ventriculo procedens: poterit q; videre qualiter ipsa concauitas ab ipsis
vẽtriculis inchoet. Tertio, quia vterq; visibilis neruus, intrinsecus est mollissimus, vt facile sen-
tire possit, extra aliquantulum durus, vt à passione sit illasus. Quarto, quia per hoc par neruo-
rum multo maior spiritus quantitas, q̃ per oēs neruos sensum & motum voluntarium facientes
ducitur, in illis tñ non substantia liter, sed sola virtus eius per eos vehitur, per illud autem par, multa
spiritus essentię quantitas defertur. Oculi enim cum sint nobilissime acũonis, vadit, ad eos multũ
de substantia spiritus, vsq; ad panniculum qui dicitur vnea: hoc enim fuit necessarium ad adiuuan-
dum visum. Quinto, quia ceteri nerui quanto sunt à cerebro remotiores, tanto sunt duriores, &
à propria natura mutantur: iste intrinsecus mollissimus est, extrinsecus vero solidior, vt molliues
interior exteriori duritie tueatur, nequãdo desicceat. Cuius molliuem & si aliquantulum inue-
nies indurari, tamen ad oculos veniens, in naturam, quam in cerebro existens habuerat, conuertit-
tur: in panniculo enim qui rete dicitur, mollis efficitur, ita vt in naturam cerebri procedat, hĩc que
quasi rete. Sexto, quæ & laudabilior eius proprietas est: quia hoc par neruorum cum è prora
vtriusq; ventriculi separatim egrediatur, non recto itinere sicut exierat, vadit: sed per interiora ca-
pitis torquetur, & ad ossa narium veniens commiscetur: sic vt ipsorum vtraq; foramina fiant vnũ
C ibidem, iterum hi nerui separantur, & recto itinere, vt egressi fuerant, vadunt, vnus q; è dextro vẽ-
triculo exiens, ad dextrum oculum tendit: alter de sinistro prodiens ad sinistrum peruenit, de quo-
rum coniunctione & separatione plures antiquorum diuerse senserunt.

De Opinionibus circa causam coniunctionis neruorum Opticorum, & de causa ob quam non

vnus exiit crassus à medio primi ventriculi cerebri.

CAP. 4.

Quidam hæc ideo fieri dicebant, vt si vnus læderetur, alius subueniret, aliq; eos ideo esse coniun-
ctos, quia omnis sensus ab vno fundamento procedit, quorum sententia prorsus vana est. Natu-
ra enim tam optime, tam fortiter, membra compleuit, vt nullam timeant passionis occasionem,
nec solum nerui visum ferentes ab vno loco exeunt, sed oēs ab eodem loco egrediuntur, neq; tamẽ
postea coniunguntur. Nõnulli ob hoc eos dicunt coniũgi, vt vnus ab alio confortetur: si enim se-
parati essent, pp itineris longitudinem rumperentur, quod quidẽ non impossibile est, sed tamen
non est via tam longa, vt in ea rumpi debeant. Alij sic aiunt, quorũ intentio vera est: spiritu visibi-
li veniente ad oculos, necesse est, vt vno oculo clauso totus spiritus ad aliũ veniat, quod heri nõ pos-
set, nisi nerui prius separati coniungerentur, & iterum separarent: quod huiusmodi experimen-
tum testatur, Si aliquod corpus super nasum ponatur, vtroq; oculo ad videndum directo, fit visus
D debiliior & obscurior, sed vno clauso, fit visus in altero fortior, q̃ in vtroq; fuerat, & quod vtrique
cernere nequiuert, vnus solus clarissime aspicit. hoc ideo, quia spiritus qui in vtroq; fuerat, ad
vnum conuertitur: altero enim clauso, alterius pupilla clarior efficitur. Alij alio modo sentiunt,
quorum sententia est necessaria, nisi nerui ad oculos directi primum coniungerentur, & postea
separarentur, necessario res vna, dupla visui appareret. cum enim res visibilis videri non possit,
nisi visu oculorum pupillas exeunte: ipse aut visus per lineas rectas egrediatur, & rẽ recto tramite
ante se p̃cipiat, sicut videmur radios solis p angusta cavitatem pomũ ingredi, & lineæ ipsæ, angus-
tæ sunt in exordio sui: deinde vero paulatim dilatant, fiat q; in vtroq; oculo quasi quadam pineæ
forma necesse est, vt vterq; visus lineatim directus, & in loco vbi est res vidẽda cõiũctus, eã aqua-
liter pcutiat: deinde quousq; ad pupillam perueniat, cõuertatur necesse est, vt exordium vtriusque
a pupilla æqualiter egrediatur, & p vnã superficiem ambo ambulẽt. Duorum exordia sunt in loco,
vbi vtriq; nerui coniũgunt, ibi vnus idem q; factus, & sic ex vtraq; pupilla à suo loco egressus, vi-
dendam rẽ videt, eam q; sicut est, comprehendit: qm̃ si vna pupilla à suo loco inferius vel superius
mutaret, res superiori pupilla visa, superius videret, sic q; dupla appareret: pp quod oculis tria fac-
tũ necessaria, s. pupilla funditiua visus, locus vbi vterq; cõiũgit neruus, & rectæ lineæ, vt visus re-
cte p eas trãseat. Hæc est cã q̃re nerui ad oculos veniẽtes prius cõiũgunt. Sed tñ qdã sic obiciunt.

Cum

DE OCVLIS

Cum illos duos nervos necessarium sit coniungi, quare non statim vnus facti sunt, sed duo. Quibus est respondendum: vnus ideo nervus non fuit, quia à cerebri medio exire non potuit, maxime quia magnus est vterq; lit, magna quaedam cōcauitas illic est, vbi palati foramina cerebro cōiungunt, p quā, cerebrū suā supfluitatē expellit: via ēt quā ad nares ducit, ibi constat: illa autē cōcauitas, & hac via, ibi esse nō posset, si nervus vnus ibi locaret. Nares. n. sunt in media facie, vñ nisi earum foramina cerebro opposita essent, olfactus nō esset. Quia ergo cerebri loca rebus hisce cōprehenfa sunt, necesse fuit, vt nerui visum ferentes nō ab vno loco egrederent: quos natura in vno loco coniunxit, vt idem foramen eos habere faceret: deinde, vt separatim ad vtrunq; oculum irent, seiunxit.

De Animato Spiritu, & Visibili, & quod visibilis spiritus substantialiter ad oculos peruenit, & aliorum sensuum organa solum perueniunt eorum spiritus irradiatue. CAP. 5.

Visibilis, vt diximus, spūs de spiritu nascitur animato, à ventriculis prorā cerebri procedēs: ibi q; mūdificat: vt diximus, cū de cerebri natura disputauimus: qui spūs, spiritualiter est sensibilis, quia visus vnus ē sensibus, ceteris dignior & nobilior. Porro ipse habet proprietatē, quā nullus aliorū sensuum habet. Animalis siquidem spiritus in cerebri ventriculis existens, sensum & voluntariū mandat motum: virtus enim ipsius per nervos penetrat ad cetera mēbra, essentia vero in proprio permanet loco: sicut Sol totū aerem illuminat, ipse tamen in vno loco stat. Sed ad oculos non solū virtus visibilis spiritus, sed ipse spiritus essentialiter dirigit: & tanta eius quantitas, quanta est necessaria, illuc adducitur: quod vtriusq; nerui cōcauitas attestatur. Id etiā hoc testat, quia vno oculo clauso, ad pupillā alterius tota virtus conuertitur causa neruorum coniunctorum: inde foramē paniculi, qui dicitur vnea, prae multitudine spiritus necessario dilatatur: aperto vero oculo cum spūs ad eū reuertatur, foramen vneae ad propriā redigitur mensuram. Hoc signo ēt, si obseruari possit, cognoscitur, si vno oculo aqua clauso pupilla alterius dilatetur: spūs enim visibilis in eo esse demonstratur, vnde aqua quā transitum eius obstruit, ablata, visus redditur. Si vero non dilateat, hoc ideo est, quia nervus per quē spiritus ducit, obstructus est. Vnde etiam cū ceteri nerui nullam habeāt cōcauitatē, quia virtus animata spūs, nō ipsemet essentialiter per eos ducit, oculorū nerui necessario cōcaui fuerunt, vt spūs substantialiter per ipsos transire possit. Ceteri autē non sunt cōcaui, ne per corpus diuisi, & à suo fundamento remoti, leuiter rūperent: vel quia tanta spiritus quantitas sensui motui voluntario non est necessaria, quanta visui. Nullus enim sensus, prae visum, sentit sentiendam rem, nisi ei coniungatur: visus autem pupillam egrediens longe remota sentit: vnde multa spiritus quantitas necessaria est: & ideo nerui necessario cōcaui facti sunt.

De Modo quo fit Visio.

CAP. 6. G

Videndum est ēt, quō fiat visus. Diximus ergo, cū aliqua res videtur necessario: vel aliquid ex ea dirigitur visui, p quod quid ipsa sit, cognoscitur: vel virtus visus ad eam mandatur, vel aliquid mediū est inter visum & rē visam, per quod ipsa cognoscitur. Sic potest ergo inuestigari quod horum certum sit. Oēs philosophi cōcordati sunt, q res nō possit videri nisi per foramē pupillae. Si ergo ad visum à re vidēda aliquid dirigitur, siue sit virtus, siue sit forma, siue qualitas, siue quantitas mensurata, quō illud angustū foramē intrare poterit: quē ēt virtus esse pōt, quā ad oculos diuerforum in momēto rē vidēdā deducat: quod qā impossibile est, spernat. Quod autem visibilis spiritus pupillam exiens solus ad rē vidēdā vadat, eius q; quantitas magnitudinē cōprehendat, falsum est. Ipse enim spiritus non tantae est quantitatis, vt adeo dilatari possit, vt tot & tantas rerū ambiat quātitates, cū in vno momento multa & diuersa & maxima indiuidua comprehendimus. Ad tertium ergo membrū cōuertamur. Quippe aer corpora circūdās, si clarus & lucidus fuerit, supplementū visui facit, quod nerui cerebro: quia sicut splendor Solis, sic spūs recipit virtutē. Sicut. n. Solis splendor superiorem aeris extremitatē percutiens, totum aerem penetrat, eū q; clarificat: sic & visibilis spūs pupillam egressus, mox totū aerem penetrat, & extensus per loca remotiora, mutat ea in suam naturā, quod fit cū aer in toto iunctus est, quod in Sole palam fieri videtur. Si enim aliqd corpus i aere ponatur, cum Solis splendor illud nequeat penetrare, forma illius corporis post se obscura apparet. Causa, quia nō suscipit aer lumē nisi sit cōtinuus, nec Solis splendor, separatim à se aerem mutat, qm si actio splendoris fortiter in aere operata fuisset, posset in eadem actione permanere, splendore Solis absente. Sed vtriq; hac caret proprietate, q neq; Solis neq; spiritus splendor suam actionē aeri, ipso absente, pōt dimittere. Recte ergo causa dans lumen ablata, ipso momento, lumē ab aere aufertur. Eodē modo de neruis intelligitur: quia si nervus fuerit incisus & à cerebro diuisus, illico membrū cui sensum dabat, fit insensibile. Propterea haec duo sic debent esse coniuncta, i. aer & spiritus, sicut nerui & cerebrū. Et quāuis aer in altera mutetur actione, sicut cū calefit vel infrigidatur, & in qualitate rei calefacientis vel infrigidantis permanet, lumen tamen nō idem in aere operatur: ipso enim absente & lux ab aere amputatur. Deinde necesse est semper vt aer cōtinuatim illumineat: hoc. n. nisi fuerit, nullo mō lucidus fieret: sic & nerui cerebro faciūt supplementū, quia licet de substantia sint cerebri, duriores tñ sunt, quō lucidioribus passionibus subiacēat, vnde aliquātulū à natura cerebri sunt mutati. Sed nerui duobus modis sunt: qdam. n. motū faciūt, qdā sensum: & faciētes sēsum, molles sunt: opantes motū, sunt duri. Et quis nerui duri sēsum hēant rāgēdi, molles tñ nerui nō inueniunt illā cū duris neruis hēre societate, sed ipsi duri hoc faciunt:

Aciunt, quia tactus cæteris sensibus est crassior. Sensus autē visibilis, quia cæteris sensibus est acutior & subtilior, ideo nervus spiritum visibilem seruans, cæteris sensibilibus nervis cerebro est propinquior. Quia igitur oculi in aere agunt, sicut cerebrum in nervis, ideo multam quantitatem spiritus habuerunt, ut in aere rem suam faciant, sicut in nervis proprias res cerebrum. Visus autem primo colores sentit, quod ei proprium est: deinde corpus in quo fundati sunt, sicut gustus prius sentit sapores, postea fundamenta eorum. Gustus tñ & cæteri sensus rem sentiendam ad se venturam expectant: Visus vero ab oculis elongatur, & per aerem extenditur quousq; ad corpus perveniat coloratum. Hac de causa solus visus sentit formam corporis, ac quantitatem, & cum eius colore motū rationabiliter, non tñ essentialiter, sentit: quod nullus habet cæterorum nisi tactus accidentaliter. Verbi gratia: Siquis per tenebras ambulans fustem in manu duxerit, eo amplius non potente penetrare, cognoscit q̄ motum per corpus solidum fieri, impossibile est. Visus autem habet alteram proprietatem, quia incidens supra corpus leue, solidum, & lucidum: rectius ad pupillam conuertitur, vnde exierat: vnde in speculo vel in alijs splendidis corporibus prope nos stantibus, videmus formam nostram: & si quis studiose in oculū alterius spectet, videt in eo suā faciē: causa, quia visus ad pupillam conuertitur propter luciditatem panniculi, qui araneæ tela dicitur: est. n. supra crystal linum, sicut adeps superne coagulatus: & quali rutilans, clara est. Veruntamen quantum præ cæteris solus per aerem motum rei sentiendæ sentiat, non tñ arbitratur, sicut cæcus se cōfusse sentire: quia aer, mox ut rem sentit, eā visui ministrat: quæ proprietas soli inest visui, aerē videlicet in sui mutare naturā. Alterius etiam dignioris est proprietatis, q̄ non solum recte, ex transverso conspicit necessario, cum multus spiritus a cerebro ad oculos dirigitur, rursus spiritus pupillam exiens, & aerem percutiens, mutat eum in suam naturam. Recte ergo visus, igneus dicitur: auditus, aereus: gustus, aquosus: tactus, terreus: olfactus, fumosus: quatuor. n. elementa sensus quatuor constituunt, ut unusquisq; eorum vnum ex his comprehendat, & ea, cum in natura sua sunt, vel in aliud mutantur, vel aliqua accidentia patiuntur, discernat: præter hos quatuor sensus, fuit alius qui fumosa comprehendere: fumus. n. in sua natura mediocris est, cum elementa non nisi quatuor sint. Sed visus qui ad hoc est, ut colores comprehendat, necessario luminosus fuit: solum. n. quod lucidum est, conuertitur in colores. Testatur hoc aer, qui cum clarus & lucidus sit, facile in colores mutatur: nam palam est, quia si quis candidis indutus iaceat sub arbore, color vestimentorum in frondium colorem mutatur: vnde patet aerem in illum colorem fuisse mutatum. Videmus etiam sæpe aerem in colorem lucidi parietis mutari, illum q̄ colorem per aerem ad illud corpus mutari, maxime si paries viridis, vel rubeus fuerit vel citrini coloris: & sicut Solis splendor cum ad suā mutat naturam, sic & colores in suas eum qualitates conuertunt. Similiter et lumen visibilis spiritus mox ut aerem percutit, ipsum immutat. Hæc tria sunt, quæ aerē sine vilo tēporis spatio immutant, lumen Solis, fulgidus color, & lumen visibilis spiritus. Palam est ergo, visum non fieri nisi aeris mediocritate, quod sensus attestatur. Antiqui etiam concordant dicentes aerē esse visui veluti ramus, & conueniens est instrumentum cum fuerit lucidus, vel aliorum corporum lucidorum lumine illuminatus: & sic seruire aerem visui, sicut cerebro nervi. Sicut enim cerebrum non sentit quod oculi comprehendunt, nisi nervis mediantibus: sic & oculi nihil sentiunt, nisi lucido aere mediante.

PARTICVL A tertia est de prima & vniuersali medicinæ intentione, et de rebus naturalibus, non naturalibus, & præter naturā, & de generibus & speciebus, & causis & accidentibus morborū. Cuius sunt quinque capita.

De prima medicinæ intentione, & de necessarijs ad eam.

CAP. 1.

Oportet medicum præ oībus primam & vniuersalem medicinæ intentionē præuidere, & eam particulariter diuidendo ad indiuiduum ducere. Prima autē medicinæ intentio est, quæ bifariam diuiditur: aut. n. in sanis, cum similibus sanitas custoditur: aut in ægris per cōtrarium sanitas redditur. Quorum primæ necessaria est rerum naturalium scientia: naturalibus. n. agnitis, patefiunt dea quæ sunt similia sanitati: & sic etiam cognoscuntur quæ sunt cōtraria: similibus ergo seruatis, cōtrarijs prohibitis sanitas custoditur. Secundæ autē intentioni duo sunt necessaria: nō naturalium. s. & contra naturā rerū scientia. Sanitas. n. infirmo cū quadā mutatione restituitur: quā mutationem qui facere vult, necesse est sciat ad quid mutare decet. Nisi. n. sciat de quo, & ad quid mutandum decet mutare, nō securus est quin vnde cōuenit nō immutari, mutet: & nisi nouerit ad qd decet mutare, ad id quod non oportet, conuertere poterit. Sanitas infirmo redditur cōmutatione rerū cōtra naturā ad naturalia: vnde & ista sciri debet ad q̄ illa trāsmutantur, et illa etiā q̄ ad illa conuertantur.

De rebus naturalibus, non naturalibus, & contra naturam.

CAP. 2.

Res autē naturalis duobus est modis, generalis & specialis. Generalis dicitur esse humani corporis complexio, & vniuscuiusq; corporis cōpositio. Complexio quidem multipliciter est: tum ætas, & consuetudo. Naturalis complexio est secundum differentiam sexus, ut in mare et femina: vel secundum euentum, ut est complexio spermatum, vel spirituum de quibus fit. Consuetudo sex modis est: Primo, ex aere & eius mutatione, quæ mutatio vel localis est, vel temporalis, cum aliquid in tempore contingit: Secundo, ex motu vel quiete: Tertio, ex repletionem vel inanitione: Quarto, ex somno vel vigilia: Quinto, ex cibo & potu: Sexto, ex animæ accidentibus. Specialis est, ut virtus, quæ triplex est, naturalis, vitalis, animalis. Superius animalem tetigimus,

Septima Classis.

AAAAAAA

cum

cum de cerebro disputauimus. Vitalis est, quæ cor & arterias facit pulsare. Naturalis triplex est, generatiua, nutritiua, & augmentatiua. Nutritiua quadruplex est, attractiua, retentiua, digestiua, & expulsiua. Res autem extra naturam duplex est, aut est nocumentum actionis, aut quod ex eo generatur. Nocumentum actionis, aut quod ex eo generatur, duplex est: aut est sine mediatore, & morbus dicitur: aut cum mediatore, & causa vocatur. Quod aut actionis nocumēto generatur, accidēs nominat: quod iterum duplex est, scilicet, aut ex diuersis corporis qualitatibus, aut à qualitatibus diuersis à corpore egredientibus. Corporis qualitatis diuersitas quinque modis est. Sunt enim qualitates quæ sentiuntur. Qui ergo agro sanitatē vult restituere, decenter debet inuestigare septē res naturales, quæ sunt, elementa, complexionēs, humores, membra, virtutes, spiritus, & operationes, & quæ sequuntur eas, vt ætates, colores, figuras, distātia inter masculū & fœminā: Et res non naturales, quæ sunt sex, aer, cibus & potus, inanitio & repletio, motus & quies, somnus & vigilia, & accidentia aiæ: Et res extra naturā, quæ tres sunt, morbus, causa morbi, & accidentia morbum cōcomitantia.

De Generibus & speciebus Morborum.

CAP. 3.

Morbus generaliter triplex est, quia corporis cōpositio trīna est. Prima corporis cōpositio est in mēbris simplicibus, ex elementis cōpositis: in quibus quædā morbi species generantur, quæ duobus modis sunt, vel simplices, vel cōpositæ. Simples quidē sunt calida, humida, frigida, & frigida: cōpositæ vero sunt, calidæ & sicca, calidæ & humida, frigida & humida, frigida & sicca.

Secunda corporis cōpositio est in membris quæ cōposita vocātur, ex simplicibus cōpositis: in qua fiunt morbi quatuor modis, aut secundum formam mēbrorū, aut secundum cōpositionē, aut secundum magnitudinē, aut secundū numerū. Secundū formā quinque modis, in figura, foramine, concauitate, lenitate, aut asperitate. Secundum cōpositionē dicitur cum à loco mutatur, vel in loco malo ponuntur. Secundū magnitudinē bifariam, vel vltra modū, vel infra. Secundum numerum similiter, vel vltra modum, vel infra: vltra modū, naturaliter, vel extra naturam. Tertia corporis cōpositio est corporis totius ex vnitate simplicium & cōpositorum membrorum facta, in qua morbus generatur, qui separatio iuncturæ vocatur. Hæc sunt genera morborum & species.

De Causis Morborum.

CAP. 4.

Causa autē morbi est generaliter sicut genus, sed specialiter est triplex. Causa enim morbi simplicis, aut calidum facit morbum, & est septupla, i. nimius motus aiæ, corporis passio, calor exterior, angustia pororum, putredo, rerum acutarum acceptio, cibi paruitas. Aut frigidum facit morbum, & est octo modis, tactus rerū frigidarum, acceptio earum, multitudo cibi et paruitas, obstructio pororum & largitas, nimius motus & quies. Aut facit morbum siccum, & est quadruplex, sicca rei obuiatio, cibi licci, cibi paruitas, nimius motus. Aut facit morbum humidum, & est contraria proxima dictæ. Sed simplicibus morbis quos diximus cū materia existentibus, commiscetur causæ intraneæ: quæ sunt, virtus mēbri impellentis, debilitas recipientis, materiæ multitudo, pororū largitas, defectio nutritiue virtutis. Causa morbi cōpositi vel est secundū figuram, vel foramen, vel concauitatem, vel asperitatem, vel lenitatē. Secundū figuram, aut ppter quantitatem spermatis, vel qualitatem: vel ppter aliquod accidens quod infans patitur qñ nascitur, vel cum lac sugit: vel propter alia. Secundum foramen, vel propter obstructionem, vel propter cōiunctionem. Obstructio fit à fortitudine retentiue, vel defectione expulsiue, vel propter frigiditatem & siccitatem, vel ligaturæ stricturam. Secundū concauitatem, aliquid innascens vel in mēbro incidēs, vt est chymus, lapis, verruca. Largitas foraminis coniunctioni contraria est. Asperitas de genere separationis est iuncturæ, cum nō est à caliditate: quod post planius dicemus. Lenitas est asperitati contraria. Corruptio loci fit cū mēbra à naturalibus suis locis mutantur, vel separatione, vel mollitie cōcatenationis membrorum. Magnitudinis causa est multitudo materiæ, vel fortitudo naturæ: paruitas membrorum cum contrario est, aut propter incisionem. Magnitudo in numero, aut naturalis est, ex spermatis abundantia, aut accidentalis vt lapis in vesica: paucitas autem est e contrario. Separatio huius iuncturæ triplex causa est, incisione exterius facta, vt igne vel ense: vel interius, vt ex acutis chymis: Aut extensione, vel exteriori, vt cum fune: vel interiori, vt ex crassa vëtositate: Aut de fractura, vel exteriori, vt à lapide: vel interiori, vt ex crassis chymis.

De Accidentibus Morborum.

CAP. 5.

Accidentia sunt tria, scilicet, nocumentum actionis, diuersitas egredientium à corpore, diuersitas qualitatum corporis sensibilium, quorū duorum causa est nocumentum actionis. Actiones tres sunt, animalis, naturalis, vitalis. Nocumentum actionis triplex est: nā omnis actio tria patitur, vel enim ex toto aufertur, vel minuitur, vel mutatur: verbī gratia, tactus aut amputatur, et dicitur stupidus: aut minuitur, & titillatio vocatur: aut à sua natura mutatur, & tunc corrupta vocatur: causa horū duorū est frigiditas tertij gradus, & iuncturæ separatio. Palam ergo est quod causa nocumēti actionis morbus fit. Morbus tñ nocet actioni sine mediatore: ideo nocumentum actionis est significatio morbi. Nec est differentia inter accidens & significationem, nisi in nostra intentione. quia nostra intentio est in nocumento actionis, & id ad quod sequitur nocumentum, morbum vocamus: et illum insequentia, accidentia dicimus: morbum autem dicimus causam accidentium: vnde morbo cognito, cum accidentia scire volumus, dicimus accidentia significationes.

PARTICULA

A *PARTICULA quarta de accidentibus, & morbis oculorum, & nervorum suorum, & musculorū, & palpebrarum. Cuius sunt quatuordecim capita.*

De accidentibus morborum oculorum in generali.

CAP. 1.

Sed quia intentio huius libri est patefacere significationes morborum oculorum, prius oportet scire eorum accidentia: ut via, qua ad morbi notitiam veniamus, sit nota. Accidentia ergo oculorum sunt triplicia: nocumenta actionis, & quæ ex illis sequuntur: diuersitas in oculis. scilicet sensibilibus qualitas, & diuersitas ab eis exeuntium. Nocumentum actionis oculorum, est secundum quantitatem actionis, id est eorum quæ sunt actionis, vel animalis, vel naturalis. Nocumentum naturalium actionum, est quod accidit quatuor virtutibus naturalibus: animalium vero actionum, quod sensui & voluntario motui accidit. Actiones animales tamen duas species sensus habent. Nocumentum naturalis actionis in hoc loco non oportet notari: quoniam in hoc non differunt oculi à corpore toto: sequitur enim nocumenta tactus, ut sunt mollities, titillatio, & dolor: ita oculis ut toti corpori accidit. Accidentia vero visus & voluntarii motus, quæ oculi patiuntur, hic oportet dici.

De diuisione accidentium oculi, & declaratione membrorum diuidentium.

CAP. 2.

Sciendum itaque quod accidentia quæ oculis contingunt, aut in eius instrumento sunt, aut in sua virtute, aut in ministris. Instrumentum visus est humor crystallinus qui patitur, vel vnum ex octo similibus morbis, vel ex compolitis morbis, cum à suo loco mouetur, vel iuncturæ separationem. Si mutatur à loco sursum vel deorsum in utroque oculo, vident rem duplam: si mutatur dextrorsum vel sinistrorsum, non apparet res dupla. Virtus visus à cerebro per concauum neruum descendit: unde eius passio vel de nerui, vel de cerebri fit infirmitate. Quorum infirmitas triplex est, simplex: quæ est vna de octo: vel officialis, ut apostema, & obstructio, vel iuncturæ separatio. Ministri visus sunt humores, & spiritus, & panniculi, qui in oculis septem habentur: quorum illi qui sunt ante crystallinum, sunt foramen vueæ, id est pupilla, albugo oui, spiritus qui est in pupilla, & quantitas pupillæ, quæ corona dicitur.

De accidentibus pupillæ.

CAP. 3.

Coræ id est pupillæ contingunt quatuor, largitas, angustia, mutatio de loco, & tortuositas. Largitas vel naturalis est, vel accidentalis. Accidentalisis est, vel de extensione panniculi quo tegitur: cuius extensio de passione est vueæ, vel de multitudine humoris albuginei. Passio vueæ aut simplex est, ut siccitas: aut compolita, ut apostema. Angustia pupillæ, vel naturalis est, vel accidentalis: de mollitie, quæ mollities de nimia fit humiditate dominante, & lubricum faciente, aut de albuginei paruitate. Largitas pupillæ siue naturalis, siue accidentalis, semper est mala, quia spiritum spargit. Sed angustia, si propter rem de qua facta est stricta, naturalis est, bona est, quia spiritum coadunat: accidentalis tamen molesta est, non ideo, quia angustia, sed propter causam de qua facta est stricta: maxime si fuerit propter albuginei paruitatem. Duplex enim malum est: vnum, quia crystallinus est discooperitus ad lumen: aliud, quia ex paruitate albuginei desiccatur. Mutatio pupillæ de loco, vel naturalis est, vel accidentalis. Accidentalisis consideretur. Panniculi qui sunt iuxta pupillam contumescunt, vulnerantur, & consolidantur. Hæc tamen mutatio non multum est mala. Separatio iuncturæ, si sit in vuea, & non sit perforata, non multum nocet visui: quod si perforetur, currit humor albugineus, & vueam tunicam coniungit araneæ. Unde quinque accidentia generat. Vnum, quod vuea crystallino propinquatur, nec habet unde cooperiatur: atque spiritus visibilis de cerebro procedens, non coadunatur in pupilla, sed egreditur ab ea, & dispergitur.

De accidentibus albuginei humoris.

CAP. 4.

Albugineus humor in quantitate et qualitate patitur: In quantitate, si augmentatur, unde visus obscuretur, vel minuatur: unde nequit crystallinum cooperire, in qualitate, liquore & colore: liquore si parum crassus fuerit, longinqua videre non sinit, & propinqua bene discernit. Si sit crassissimus omnino, visum occupat, & amputat, & cataracta dicitur: quæ vel in parte vna, vel in multis locis dispersita est, in vuea, vel in pupillæ medio, vel circa eam. Si sit in medio, omnia perforata videntur infirmo. Partem enim quam videre nequit, putat concauam esse. Si circa pupillam, multa in vna hora vuea non permittit videre, propter paruitatem pineæ visus. Si crassitudo dispersita sit, & particulariter sit diuisa, quæ videt putat esse quasi stricta: unde patiens cernit quasi muscas & similia, quod pueri & febricitantes plurimum patiuntur. Color si mutetur, omnia coloris istius esse putantur: utpote si fuerit plumbeus, omnia fumosa apparebunt & tenebrosa: sic & si fuerit alterius coloris, idem ipse color in visis omnibus apparebit: eis tamen ad cataractam præparati sunt oculi, de quorum stomacho fumus ad caput ascendit, & patientibus fluit de naribus rheuma.

De accidentibus visibilis spiritus.

CAP. 5.

Spiritus visibilis in qualitate & quantitate patitur: In qualitate, utpote si fuerit subtilis, unde bene discernit, ac res optime comprehendit: vel crassus, unde ad remota loca penetrat: & longinqua videt, vel paucus, ad remota se elongare non valens, sed solum propinqua cernens.

De accidentibus corneæ.

CAP. 6.

Panniculus corneæ, quo pupilla tegitur: si quo modo patiatur, visui nocet: cuius nocumentum propter se, vel propter aliud fit. Propter se, tria morborum genera patitur: videlicet simplicem, compolitionem

positionem, & separationem iuncturæ: Simplex, vt humiditas, & siccitas: humiditas visui nocet E propter quantitatem: vt si fuerit multa, omnia sicut fumus & nebula apparebunt: vel propter qualitatem: vtpote si rubea fuerit, omnia videri rubea facit, veluti qui patiuntur sebel contingit: si autem citrina fuerit, citrina apparebunt omnia, sicut ictericis fit. Siccitas spasmus generat, vnde visui nocet: si multa, multum: visus ergo quandoq; ex toto amputatur. Separatio iuncturæ, si fuerit perforata cornea, duobus modis visui nocet: vno modo propter putredinem in illo vulnere congregatam: secundo, quia crystallinus secundo lumini fit vicinus. Passio corneæ, quæ propter aliud fit, vel propter coniunctiuam, vel propter palpebram est. Propter coniunctiuam, si vngula nascatur in ea, vel fiat apostema corneam operiens: Sed passio corneæ & coniunctiuæ & aliarum partium oculorum non nocet visui, nisi accidentaliter.

De accidentibus motus voluntarij oculorum.

CAP. 7.

Passio vero motus voluntarij oculorum est triplex. Velenim amputatur, & mollities vocatur: vel minuitur, & tremor & titillatio dicitur: vel propter lacertos, cum non vt oportet, mouentur, & spasmus nuncupatur. Quorū trium vnumquodq; fit: aut propter cerebrum, aut ppter nervos, aut propter lacertos. Sed diuersitas mollitiei ac spasmī lacertorū oculos mouentium est secundum diuersitatē motionis eorū. Quod quō videat, vel vnde procedat, in fine sexti cap. planius dicitur. F

De diuisione morborum oculorum in apparentes & occultos. Et primo de apparentibus.

CAP. 8.

Morbi oculorum vel sensui apparēt, & facillime cognoscuntur: vel latent, & eorum notitia est obscura, quorum significationes intellectuāli inuestigatione comprehenduntur. Incipiendum igitur à morbis sensui apparentibus, & ostendendum in quo loco oculorū appareant, & nascantur. Morbi ergo qui sensui apparēt, vel sunt in coniunctiuā, vel palpebra, vel in angulo oculorum, vel in cornea, vel in vnea, vel inter vneam & crystallinum. In coniunctiuā septem sunt, videlicet petia, vngula, ophthalmia, tumor, duritia, & cætera. Petia est sanguis fluens de aliqua arteria, vel vena incisa, quam patitur ex ictu. Vngula est superfluitas nervosa aut carnosa, extendens se ab angulo ad pupillam, & prohibens visum. Ophthalmia triplex est, quæ visum turbat: cuius causa vel exterior est, sicut fumus, sol, puluis, & similia: vel interior, sicut humores ad coniunctiuam fluētes. Sed prima ophthalmia mala non est: causa enim quā primum ablata, morbus amputatur. Secunda vero, postquam causa amputatur, habet & signa quæ habēt cætera membra, cum patiuntur apostema: quæ sunt, tumor, inflāmatio, durities, lachrymæ, rubor, plenitudo venarū oculi. Tertia cæteris est fortior, quia & alias habet significationes. Acumen enim palpebræ inuersatur extrinsecus: eiusq; motio vix fit, & albugineus ascendit super nigredinē. Tumor est quadruplex: Vnus G fit ex crassa ventositāte: Secundus, ex phlegmatico humore nō crasso: Tertius, ex phlegmate crasso. Quartus, ex melancholia, qui dicitur scleros. Qui omnes sic adinuicem discernuntur. Primus euenit subito, sicut videmus seniores in ætate pati propter muscarum morsus. Secundus et tertius paulatim fiunt, sine magno dolore & mollitie, minor in secundo quā in tertio: quorum color est sicut color totius corporis. Quartus vtplurimū fit in angulis oculorū, & aliqñ dilatatur & ascendit ad supercilia durus, multum habens dolorē. Eius color plūbeus est, qui multoties sequitur varias & diurnas ophthalmias, & maxime quæ mulieribus contingunt. Duritia nascitur in oculō toto, nascitur & in palpebris, quæ motū grauem facit cū dolore & rubore: nec patiens valet oculos aperire cum à somno surrexerit, attamen sunt lachrymæ salæ & nitrosæ. Dolor & rubor in toto * corpore palpebris fiunt ex humiditatibus salis aut acutis: si cōiunctiuā est plena crassi sanguinis, quæ cum inflatur, rubei fit coloris: est & proflua, quæ dolorem & tumorem facit.

De passionibus palpebrarum & angulorum suorum.

CAP. 9.

Passiones palpebræ quædam sunt communes morbis totius corporis, sicut verrucæ, scrofulæ, & similia. Nascuntur q; vel extrinsecus vel intrinsecus. Extrinsecus, sicut est crassities, quæ est quasi pinguedo viscosa relata nervis & panniculis. Nascitur q; in palpebra superiori intrinsecus, H scabies, grando, petrositas, & viscositas. Scabies quatuor modis est, vna dicitur psorophthalmia, alia trachoma, tertia sycosis, quarta telosis: prima, secunda leuior est: quæ magis aspera, dolorē & grauitatem facit: vtraq; tamen in oculis humiditatē generat: tertia dura est & asperior, quia palpebræ interioris quasi scissura est: quarta cæteris deterior est & durior ad sanandum. Grando est tumor crassus in interioribus coagulatus, vt quasi grando videatur. Inuiscatio est quædam viscositas palpebram cum pupilla iungens siue in eius albedine, siue in eius nigredine: vel vtrasque palpebras simul iungens, qualis fit propter vulnera in oculis. Item nocumentum palpebræ triplex est: Vnum, erectio palpebræ superioris, ne oculi albedo possit cooperiri: quod aut est naturaliter, aut cum palpebræ tortura mala fit: Aliud est, palpebræ breuitas: Tertium est, palpebræ inuersio ad partem inferiorem, quando nascitur, aut propter aliquod vulnus, vel propter carnem superfluum in carnibus natam. Rasura & vulnus nascuntur in eis sicut & in corpore toto in extremitate palpebræ. Pili superflui ad interiora conuersi nocent: Et pili aliquando à palpebris cadunt: Nascuntur ibi pediculi & hordeoli. Pili superflui in interioribus palpebræ nascuntur, qui pungunt & ad oculos humorem adducunt: Pili cadunt aut propter humorem ad eos fluentem, aut propter alopeciam: & aliquando cum duritia, crassitie palpebræ, & rubore, Hordeolus est apostema

A apostema nascens in extremitate palpebræ. Aegilops est vlcus inter oculos & nares: quod si fuerit neglectum, fiet ex eo fistula putrefaciens os, & quandoq; putredo fluit per foramen ad nares: aliquando ad palpebram, eius q; cartilaginem putrefacit: & si palpebra digito tacta fuerit, putredo ab ea effluit. Grando & lachrymæ noxiæ sunt oculis. Lachrymæ fiunt vel apostemate in foramine inter oculos & nares existente: qui hoc habent semper lachrymas patiuntur: vel hunc lachrymæ ex conamine medicorum acutas medicinas in scabie ponentium.

De passionibus corneæ.

CAP. 10.

Passio in cornea nascens, vel propter oculos, vel propter totum corpus causatur: in qua tamen infirmus magnum dolorē sentit in neruo, & patitur extensionem in panniculis oculorū, qui panniculi ruborem & extensionē sentiunt ascendere: & maxime, si ambulat, aut mouetur, capitis dolorē patitur, & ab oculis subtiles & acuti humores fluūt: neq; potest acuta collyria sustinere, neq; valēt oculis imposita. Passio corneæ, ppria est vulnus, macula, obscuritas, sanies, & talia multa, septem nominibus dicta: quarū quatuor intrinsecus, tres vero sunt superficietenus. Intrinsecus hæc sunt: Prima est vulnus, cuius color est quali fumus, quandā partē nigredinis operiēs: Secunda, vulnus plus primo concauū, sed tamen albidius: Tertia, vulnus partē albedinis & nigredinis operiens: **B** pars in qua regitur albedo, rubei coloris est: quæ vero super nigredinem stat, alba est: Quarta est vulnus quoddam in modum faculæ putrefactum. Passiones vero exteriores hæc sunt: Prima, est quoddam vulnus cōcauum & angustū: Secunda, est vulnus concauū, sed largius: Tertia, vulnus plus ceteris putrefactum: hoc obliuioni tradito, oculorum panniculi putrescent. Quare autem oēs corneæ passionēs aliquā curabiles, aliquando incurabiles sint, causa duplex est: aut propter diuersitatem vulnerum, aut propter diuersitatem materierum in vulnere existentium, & cornea de multis corticibus composita est, vno super alium locato. Aliquando vulnus in primo, aliquā in secundo, non nunquam in tertio cortice nascitur, propter materiam quæ in quātitate multa est, aut pauca: aliquā alba, aliquando nigra, modo subtilis, modo crassa, calida solā, vel acuta, vel nitrosa, vel dulcis. Quod post tertium corticē est, molestius est, q̄ quod post secundū: & post secundū, q̄ post primū, salubrius quod fit in superficie: deterius quod est post oēs cortices. Materia si fuerit multa calida, patiens magnum in oculo sentit dolorem: Multitudo enim materie facit extensionem & calidum dolorem. Item salubrius est quod non est in loco pupillæ, deterius quod in loco pupillæ: quia si scindatur vulnus, non sumus securi, quin per vueam pupilla egrediatur, & fluat humiditas oculorum. Quod si vulnus super pupillam sit, vulnere sanato visus offenditur.

Al. j. f. j. t. c.
fol. 124. d

C *De egressione vueæ, & passionibus eius.*

CAP. 11.

Egressio vueæ quatuor modis fit. Aliquando enim egreditur parum, vt videntes pustulam esse putent: sed si discrete inspiciatur vuea sani oculi, & vuea infirmi oculi: & si earum colores sint dissimiles, scias pupillam egredi: si vero similes, apostema ibi ortum esse. Aliquando plus exit: & tunc satis apparet eam esse egressam. Tertius modus est, cum tantum egreditur vt palpebræ minus præualeant, & pili palpebram pungentes iungendo dolorem inferant: & hunc modum melon dicunt. Quartus modus, gomphos græce, latine dicitur clauus: quia egrediens pelliculas vueæ superficietenus operit: vnde eius forma fit quasi clauus. Passiones vueæ sunt, dilatatio aut contractio. Dilatatio autem fit quatuor modis, aut ex nulla causa patenti, vel propter percussione, vel propter apostema, vel propter aliam passionem.

De suffusione, seu cataracta.

CAP. 12.

Inter vueam & crystallinum humorem aqua nascitur coagulata, prohibens spiritum visibilem à pupilla exire: quæ passio si est incipiens, obscura est: perfecta vero, facillime cognoscitur. Sed qui ad hanc venturi iunt passionē, eis ante oculos cimices volant: quibusdam autem quasi flammæ apparent: incidentibus autem visus amputatur, & color pupillæ amputatur. Huius aquæ color est diuersus: quædam enim aeri, quædam vitro assimilatur, alia est quasi album habens colorem, alia quasi cœli colorem, alia quasi viridem, alia quasi venetum: vnde antiqui cataractas, veneticos oculos appellauerunt: sed differentia est, quia venetici oculi duobus modis fiunt, vel propter aquam, si nimium fuerit coagulata: vel propter siccitatem, quam patitur crystallinus. Species aquæ, quæ aeri assimilatur, facile potest curari: licet eius accidentia sint, quæ supra diximus. Secunda vero species quandoque curabilis est, quandoq; non: quod sic dignoscitur: Si vno oculo clauso pupilla alterius dilatatur, possibile est sanari: sin autem, minime: causa, quia neruus concauus quo visibilis spiritus ad pupillam ducitur, oppilatus est. Hæc cataracta ex passione stomachi procedit, vel cerebri: sed sic discernitur: Si apparatus in vno oculo fuerit, vel in vitroq; sed diuerse, cataracta ex cerebro esse intelligitur: si in vitroq; aequaliter, stomachi esse cognoscitur. Item si modo plus, modo minus apparuerint, ita quod stomacho minus digerente maior fit. Item si patiens, de stomachi arsurā, vel ardore murmurauerit. Item si ex picra exhibita, ista imaginatio decreuit: cum enim non fuerit huius mali cataracta, picra videtur nihil esse proficua. Si fuerit propter cerebrum, plurima ex phrenetica nascitur passio: quia phrenetis est apostema calidum nascens in cerebri prora: fit q̄ quasi fuligo, calore secundum humorem de quo nascitur, deliccante: & per venas circa cerebrum & oculos ad oculorum substantiam penetrante: talia enim appa-

rere facit. Sufficit de passionibus oculorum visui apparentibus. Oportet de his dicere quæ diffici-
le intelliguntur, quia intrinsecus nascuntur.

De passionibus oculi natis intus, & occultis.

CAP. 13.

Passiones intrinsecus nascentes, sunt mollities quæ dicitur paralyfis: & desiccatio, quæ spasmus vocatur. Paralyfis autem triplex est: vel enim motum amputat, vel visum, vel vtrumq. Sed visu amputato absq. causa manifesta, vel etiam minorato notabiliter: propter nerui concaui passio-
nem, vel propter visibilis spiritus paruitatem fit. Neruus patitur constrictionem, vel iuncturæ se-
parationem, & tunc necessario visus corrumpitur: nec enim manifestatur, nisi rationabili inuesti-
gatione comprehendatur. Verbi gratia, si visus absq. manifesta causa, vel minuitur, vel aufertur:
interrogetur patiens an grauitatem sentiat in prora capitis, aut circa frontem: quo id patiente, scias
humores humidissimos ad concauum neruum fluxisse, eum q. obstruxisse, vel apostema ibi gene-
rasse. Potest etiam aliter inuestigari, si vno oculo clauso pupilla alterius non dilatatur, neruum ob-
struendum esse non dubitatur. Item patiens interrogetur si in capite fuerit percussus, vel propter ca-
sum aliquem vulneratus: quod si fuerit, nec pupilla exierit post, nec magis subito virtus conuersa
fuerit: scias neruum esse constrictum. Si autem propinqua videat, & non longinqua, & non par-
ua: scias spiritum visibilem esse defectum. Quod si longinqua & minime propinqua viderit: & si F
meridie, vespere vero non, sicut accidit senibus: scias causam esse crassitiem spiritus, vel suam com-
missionem cum turbidis humoribus. Hæc sunt accidentia in substantia oculorum latentia. Sed
passiones oculorum in mobilibus locis nascentes, aut sunt propter cerebrum, aut propter neruos,
aut propter lacertos. Si propter cerebrum, necessario in vtroq. oculo corrumpitur motus: si pro-
pter neruum, illa pars oculorum offenditur, quæ ab illo neruo regitur: quod si neruus non in toto
patitur, sed in parte, motus lacerti, qui neruo illi pertinet, corrumpitur, non nunquam passio non
in neruo, sed in essentia lacerti nascitur.

De musculis qui mouent oculos & palpebras, & de vijs per quas fluunt humores ad oculos. CAP. 14.

Lacerti autem oculorum sunt, vt diximus, duodecim: quorum quinque oculi ipsi mouentur: tri-
bus vtriusq. nerui fundamentum corroboratur, & per eos oculi seorsum mouentur: reliqui qua-
tuor palpebras mouent. Passio vero lacertorum est duplex, mollities & spasmus. Quod si lacerti
motus oculorum, molles fiant: oculi suæ grauitatis causa descendunt inferius, & cum palpebris se
infigunt. Si autem spasman, versos oculos torquent: & sic cum nerui spasman, in eadem parte
qua ipsi patiuntur, oculi torquentur. Tres vero lacerti vtriusq. nerui fundamentum corroboran-
tes, oculos superius eleuantes, si spasman, oculi non patiuntur, immo inde confortantur: si autem G
mollificantur, oculis nocent, quia extra egrediuntur. Oculis ergo absq. vlla percussione existi-
tibus, visu q. permanente, scias neruos esse mollificatos: q. si fuerit ex percussione neruorum, fractu-
ram esse cognoscas: si neruus qui palpebras sui sum mouet, mollificetur, palpebra deorsum cadet:
si spasmat, non valet oculum claudere: lacertis quibus interius mouentur palpebræ mollificatis,
oculi non clauduntur: si spasman, palpebræ superius non eleuantur. Quod si lacerti in parte pa-
tienten non patiuntur, nec palpebræ in loco eius attinente patiuntur. Humores autem ad oculos
fluunt, vel per venas supra craneum existentes, vel per venas sub craneo existentes. Si per venam
supracraneum manauerint, frontis & temporum venæ crassæ sunt & extensæ: vnde valet si inci-
dantur, vel desiccatiua emplastra vel cataplasmata apponantur. Si autem hæc non apparuerint:
scias humores per venas, quæ sub craneo sunt, manare.

PARTICVLA quinta est de virtutibus medicinarum sanantium morbos oculorum. Cuius sunt capita sex.

De distinctione medicinarum oculorum penes sapes.

CAP. 1.

Q Vi oculorum passionem volunt curare, eorum medicinas, & virtutes earum oportet co-
gnoscere, quæ maxime saporibus ostenduntur. Sapor enim virtutes innuit. Vnde sci-
endum quod quæ ad linguam veniunt, & nihil in eam faciunt, insipida vocantur. Insipida H
autem vel sunt simplicia, sicut aqua, vel composita: nulla tamen qualitate præualente. Quod si ali-
qua præualuerit, erit aliquantulum frigiditati attinens, sicut medicina quæ dicitur obstruens, quæ
duobus modis est: aut terrestris & sicca, sicut hæmatites, & tutia, & cadmia, & his similia: vel vi-
scosa, vt oui albugo, oleum omphacinum. Quibus aer dominatur, linguam pati faciunt, vel
cum delectatione, vel cum nocumento. Quæ delectationem inferunt, necessario patet quod qui-
bus ea faciunt, eis similia sunt. Linguam ergo delectantia, humanæ complexionis sunt similia. Hu-
mana autem complexio, temperate calida est & humida: Hinc ergo & omnia linguam delectantia,
& humana corpora, sicut aqua tepida, delectant. Delectationem ergo facientibus si aqua domi-
netur, dulcia sunt: si aer, vinctuosus erunt. Ideo q. omne nutrimentum vel dulce, vel vinctuosum, vel
compositum ex vtroq. Quibus vero præter istos sapor alius dominatur, non nutriunt, sed sunt
propter medicinam. Quæ vero nocent, faciunt linguæ punctiorem: quæ punctio species est sepa-
rationis iuncturæ. Separatio enim iuncturæ aut nimia constrictione fit, aut incisione. Quæ inci-
sionem faciunt, calida sunt: quæ nimiam constrictionem, frigida sunt. Item linguam separantia,
aut multum, aut parum separant. Multum separantia, crassa sunt, terrestria, dura, & amara. Quæ
non multum separant, salsa vocantur. Quæ vero subtilia & ignea, dicuntur acuta. Quæ autem cō-
stringunt,

Astringunt, vel sunt crassa, terrestria, vel subtiliatiua, & aquosa. Terrestria, & crassa, multum constrictiua & pontica sunt, Quæ vero minus constrictiua sunt, & styptica, subtilia dicuntur acetosa.

De Speciebus saporum, & impressionibus quas in lingua faciunt.

CAP. 2.

Sapores autem sunt isti, dulcis, vinctuosus, amarus, salus, acutus, ponticus, stypticus, acetosus. Ponticus coadunat linguam & premit, non solum superficietenus: verum etiam intrinsecus, vnde obstruit & asperat: Stypticus similiter: Sed salus lauat & mundificat. Amarus magis falso mundificat, exasperat, & excoriat. Acutus vero mordet, pungit, & calefacit, Acetosus vero line calefactione. Dulcis humectat & lenit asperitatem linguæ, & delectationem tribuit: Vinctuosus similiter, sed debilius. Sapidus de genere dulcedinis aquositatem non habet sibi dominantem, etiam in sapido dulcedo tantilla sentitur: Vnde fructus à terra sublimes sunt dulces, & propinqui sapido, quia humiditas eorū vicina est humiditati sapidi. Ponticus ergo terrestris est & frigidus: Acetosus, aquosus: Amarus, terrestris, calidus, & igneus: Dulcis, calidus & terrestris: Vinctuosus, aereus. Ponticum quoque pororum scimus coadunatiuum, constrictiuum, incrassatiuum, refrigeratiuum, & desiccatiuum. Acetosus incidit, subriliat, aperit, mundificat, repercutit, dissoluit, refrigerat. Amarus mundificat, lauat, attenuat, & calefacit. Salus coadunat, obstruit, delibet, non multum calefacit. Dulcis mollificat, maturat, & moderate calefacit. Vinctuosus humectat, & mollit sine manifesta delectatione. Et sciendum quod ponticus & acetosus sunt in infrigitatione æquales: sed ponticus, terrestris: acetosus, aquosus est: quod & sensu patet & intellectu. Videmus enim in initio fructus ponticos esse suæ arbori similes, sicut oliuam, vnam, coctana, granata, & similia: quorum quidem quanto sunt pluris temporis, humefiunt: & cum sua humiditate & ponticitate acetositatem recipiunt: deinde sapor paulatim mutatur, quousque dulcis fiat. Sed non nulli ad dulcedinem veniunt nulla mediante acetositate. Sed maturatio fructuum fit calore, quæ duobus est modis: Vna naturaliter fit in fructuum essentia ex proprio ipsorum calore: alia ex calore solis. Item sensui patet, quod videmus ponticum linguam constringere & delibet, quod est eminentis frigiditatis actio. Palam igitur est ponticum frigida complexionis esse. Item acetosum subtile est, etiam penetrabile: cuius causa est calor in eo ebulliens. Vnde patet ponticum crassum esse & terrestre: acetosum vero, subtile, & aquosum: quod sic certificatur. Inuenimus fructus in initio ponticos esse & frigidos, quorum ponticitatis minoratio, aut est propter solis calorem, aut propter humiditatem, aut propter utrumque. Si propter solis calorem, maturati dulcorantur, sicut castaneæ: Si autem propter humiditatem crassam, fiunt fructus pontici. Si autem propter humiditatem aquosam & quasi aeream mutantur, fiunt acetosi. Si causa caloris & aquosæ humiditatis mutantur, dulces fiunt. Si vero humiditas aerea fuerit, fiunt vinctuosi. Item dulcia & amara sunt calida: sed dulcia sunt in caliditate & humiditate temperata: sic vinctuosa: vnde utraq; naturæ humanæ conueniunt, quæ in humiditate & calore temperata sunt. Amara vero sunt calidiora dulcibus, & sicciora: quod arbitratione probatur. Omnis liquor, si naturali vel extraneo calore coquatur, in primis dulcoratur: sed augmentato calore fit amari saporis: sicut mel cum inueteratur, & etiam super prunas excoquitur. Idcirco dulcia & amara mundificant & lauant: Sed dulcia, cum moderamine & delectatione: Amara vero, non moderate, quia & iuncturam separant: Acuta, & salsa, calida & sicca sunt: Acuta tamen calidiora & sicciora quasi ignea: vnde incendunt & elidunt: ideoque exterius posita mundificant, & superfluum carnem in vulneribus natam corrodunt. Salsa vero potui data crassos humores de pectore & capite educunt, epilepsiæ repugnant: neque enim velociter ut acuta penetrant, neque in eis est tanta crassitudo, ut diu morentur ingredi, sicut pontica. Salsa vero terrestria & calida sunt, sed minus, quam amara. Et hac ratione sapores inuestigantur.

De Virtutibus Medicinarum primis, secundis, & tertijs, & suis effectibus.

CAP. 3.

Virtus autem medicinae diuersa intelligitur. Est enim prima, secunda, tertia. Prima quidem quadruplex est, calida, frigida, humida, & sicca: quarum vnaquæque quatuor gradus habet, & unicuique graduum est initium, medium, atque finis. Quæ igitur primo gradu est, corpus immutat à suo temperamento, sed hæc mutatio sensu non apparet. Quæ autem in secundo, corpus à temperamento mutat, sed non multum apparet. In tertio gradu consistens, manifeste mutat, sed non corrumpit. Quæ vero in quarto gradu est, mutat & corrumpit: sed calida cum intentione destruit, frigida cum dormitatione. quæ vero in quarto gradu sicca sunt, necessario separant iuncturas. Hæc primam habent virtutem. Secundam virtutem habentia, vocantur, maturatiua, mollitiua, obstruentia, aperitiua, mundificatiua, incrassatiua, incisiua, incensiuua, putrefactiua, carnis depascitiua, carnis generatiua, solidatiua, doloris mitigatiua. Maturatiua & mollitiua calida sunt. Maturatiua etiam necesse est ut tantum habeant calorem, quantum membro curando necessarium sit, ne minuant vel augmentent suam naturalem humiditatem. Mollitiua calidiora & humidiora esse oportet: quia membra mollitiuis egentia duritiem habent, cuius causa est humor crassus frigidus & viscosus: vnde calida necessaria sunt, quæ crassitatem & coagulationem illius chymi dissoluant. Oportet ergo ne ille calor sit nimius, ne illius chymi subtilitate resoluta, quod crassum est, indurescat, atque putrescat. Item necesse est ut calor eius sit in fine primi gradus, sicut bdellium, sigia, id est styrax liquidus, galbanum, ammoniacum: tum cum medulla vitulina, caprina, bouina, & similia. Maturatiua, si sunt

si sint calida & humida, obstructionem tamen quandam oportet ea habere, qua pori claudantur: **E**rga illis obferatis calor interius adunatur & corroboratur: vnde & digestiua & ceteræ acti ones naturales vigent, sicut facit oleum cum aqua calida, farina frumēti cum aqua mica panis, seuum porcinum, vel camelinum, pix, resina, gummi cypressi, cera cum oleo, thus, & similia. Hæc ergo obstructionem faciunt, sed non tantam, vt dissolutioni repugnet. Si igitur mollitiua huiusmodi esse oportet, induratiua necessario erunt frigida, sicut portulaca, psylium, lens, aqua, solanum, & similia. Obstruentia adeo poros oblimant, vt facile aperiri non possint: vnde necesse est ea esse terrestria, viscosa, nullam punctiōem facientia: quæ si pungunt, membra ferre non possunt, & attenuant, pori quæ aperiuntur: & sic oportet ea esse absq; calore nimio & frigore. Aperitiua dicuntur esse contraria, vt crassam materiam attenuent: quæ virtus in amaris & nitrosis inuenitur, sicut sunt iris, amygdala amara, nitrum, orobus, lupinus, dictamus. Sed aperitiua, quæ stypticitatem & ponticitatem habent, extra posita non aperiunt: sed potata viscerum aperiunt obstructionem. Mundificatiua sunt necessario quasi aperitiua, tamen debiliora, vt lauent & mundificent, vt violæ, fabæ dulces amygdalæ, & similia. Medicina corpus mundificans temperate calefacit, nec desiccet, nec crassitiem habet, sicut chamæmelum, malua, sambucelgon, radix elenij, & similia. Incrassatiua est quasi obstruens, constrictiua oris venarum crassa est & frigida, styptica, omni carens resolutione. Incensiua multum calida est, sicut allium, capra, fel tauri, & similia. Putrefactiua subtilissima est, vastans primo superficiem. Carnis minutiua, est quasi putrefactiua, debilior tamen. Cicatrizatiua est sicca & styptica, sed incisuiua, aliquando carnem generat, si modice vulneribus apponitur. Attractiua dicitur naturaliter & accidentaliter: naturaliter, cuius attractio est cum calore, & subtilitate, sicut sagapenum: accidentaliter, cui propter putredinem virtus innascitur, sicut fermento. Doloris mitigatiua debet habere calorem similem calori corporis. Huiusmodi secundam habent virtutem. Tertiā habent virtutem, quæ lapidem frangunt, pectus & pulmonem ad screandum iuuant, lac & sperma generant, vrinam & menstrua prouocant. Medicina attenuans & incidens nimietate caloris lapidem frangit, vt radix capparis, radix calamenthi, vterq; elleborus, acetū scilliticum. Si enim multum habent calorem, lapidem frangere videntur: Si nimium calorem nō habuerint, & cum aliquo humido accipiuntur, ad screandum vtiliora fiunt: Sed si aliquantulum sint calidiora, & tamen in statu temperamentū permanceant, siccitatem quæ non habeant, lac & sperma generant: Si autem multo plus calidiora fiant, sed non licciora in vltimitate, menstrua prouocant, vt acorus, petroselinum, seseli, & similia, quæ sunt calida, nec nimis sicca.

*De diuisione medicinarum sumptarum à plantis, & metallis, & animalibus
exemplis quæ earum.*

CAP. 4.

Medicinam oculorum scire volentem, virtutes medicinarum suarum oportet prius cognoscere. Sciendum, itaque, quod oculorum medicatiua quedam de nascētibus terræ, quedam de metallis, quedam de animalibus sunt. De nascentibus est, vt gummi, assa, sagapenum, euphorbium, myrrha, opium, thus, tragacanthum, galbanum, sarcocolla, oculi lyciorum, ammoniacum, aut hypocisthis, acacia, marathrum, scœnugræcum, rosæ, glaucium, aloes, amygdalæ, vel sicut galla, aut flos rosæ & frondes, aut folium, aut lignum, vt casia, & cinnamomum: vel vt cortex thuris, vel mandragoræ, vel spicæ nardi. De metallis sicut hæmatites, sal ammoniacum, flos aris, ærugo, arsenicum, cadmia, nitrum, chalcantum, plumbum, antimonium, ferrum, ferrugo. De animalibus aliquando sunt humores, sicut fel, lac, albumen oui, & vrina: aliquando membra eorum, vt cornua, castoreum: quarum omnium virtutes singulariter ostendam.

De prædictis medicinis & earum effectibus speculariter.

CAP. 5.

Assa cæteris gummis calidior est, incendit & dissoluit. Sagapenum calidum est & subtile: mundificat & attenuat maculas oculorum: valet quoque suffusioni & obscuritati, quæ fit ex turbiditate. Euphorbium subtile incensiuum est. Myrrha calida & sicca: pustulas oculorum absq; dolore mūndificat. Thus calidum in secundo gradu, liccum in primo. Gummi arabicum frigidum est & siccum: obstruit: Tragacanthum similiter. Sarcocolla desiccet & consolidat sine nocumēto oculi. Lycium temperatum est in calore, vnde mundificat & attenuat crassitudinem super pupillam nascentem. Ammoniacum apostemata oculorum mundificat & dissoluit. Rosa refrigerat: Glaucium similiter. Succus hypocisthidis confortat & refrigerat: Acacia similiter. Mandragora refrigerat, dolorem placat, quia dormitionem prouocat. Marathrum valet cataractæ, maculas mundificat. Malum coctanum oppilat & refrigerat. Galla repugnat humoribus ad oculos fluentibus, & membra confortat. Crocus maturat. Balaustia refrigerat, repugnat, desiccet, & confortat. Spica dissoluit & attenuat. Cinnamomum calefacit, maturat, atque desiccet, & confortat. Hæmatites desiccet, & valet asperitati palpebrarum, carnem superfluam manducat. Sal mundificat, & desiccet: Similiter sal ammoniacum. Arsenicum rodit & incendit, carnem dissoluit & minuit. Cadmia desiccet atque constringit & mundificat: quæ incensa & lota, superiora agit sine punctiōe: adiuuat et oculorum vulnera, maxime si humida, quia desiccet ea. Plumbum desiccet. Antimonium desiccet, & constringit, & calefacit. Æs vstum vulnera consolidat. Cerusa desiccet & infrigidat. Flos aris desiccet, constringit, & calefacit. Tutia desiccet & infrigidat sine dolore, maxime si lota est: valet et, vulneribus

A vulncribus, pustulis, & lachrymis oculorum. Ferrugo desiccatur & constringit: valet quoque contra pustulas spinosas. Ferrugo carnem minuit & attenuat. Sciendum est, quod omne fel est siccum & attenuatiuum, quod mistum oculi medicinis visum acuit. Albumen oui confortat & oppilat. Lac lauat & mundificat. Castoreum scindit atque maturat.

De nouem potentissimis medicinarum oculorum, & suis effectibus.

CAP. 6.

Hæc est diuersitas specierum medicinarum oculis pertinentium. Oppilatiua, Colatiua, Mundificatiua, Aperitiua, Putrefactiua, Constrictiua, Contractiua, Maturatiua, Dormitiua. Oppilatiua duobus modis est, terrestris & sicca, vel humida & viscosa: Terrestris desiccatur humores calidos & subtiles ad oculos fluentes, maxime si ibi sint vulnera, quibus oportet adhiberi mundato capite, prout necesse est, & toto corpore fluxuque humorum cessante. hæc enim medicina leuiter & subtiliter mediocriter desiccatur humores, qui in oculorum venis latitant, & ad oculorum panniculos prohibet penetrare: transacto quoque humorum cursu, causa quoque fluxionis eorum præterita, hæc medicina non amplius debet dari, quam ne dolor oculorum augmentetur, quia panniculi oculorum nimia humorum multitudine extenduntur, unde & quandoque finduntur. huius tamen medicinarum posteritas non in pauco declaratur tempore, quoniam aliquando operatur, & si ratio non exponatur, scilicet vulneribus in oculis apparentibus, vel corrosione in cornea existente, vel vicia egrediente: acutis tamen humoribus ad eos fluentibus, non audemus desiccatiua ponere. stypticis enim illic positis humores fluere prohibentur, unde dolor augmentatur. quod si medicina apponatur, materia ad oculos fluentis acumen augmentatur. Mollitiua vero seu dissolutiua seu maturatiua, si dentur, humores quidem maturantur: sed tamen in vulneribus caro non generatur, neque vulnus sanatur. Acetosis frigidis applicatis, punctura, & morsura, & tumor in oculis generantur. Nulla igitur medicina conuenit huic passioni, nisi quæ inter calidum & frigidum temperata est, vel temperamento vicina, quod facit tutia lota, cadmia vsta & lota, similiter cerusa lota. Alia autem medicina oppilatiua, scilicet humida, viscosa, quam diximus, valet in hoc loco modis duobus: vno, quia non pungit, sed dolorem mitigat: alio, quia lædit asperitatem ex humorum fluxu factam: vulnera enim lauat, unde dolor mitigatur, quia crassi humores acuti mundificantur. Sed oculorum medicina sapissime metallina est: quia vero oculi sensum habent acutum, cum metallina, viscosa & humida misceantur, ne asperitatem faciant, sicut albumen oui, scænuigræcum, lac, gummi arabicum, tragacanthum, & similia. Medicina aperitiua dissolutiua, necesse est, ut sit acuta, quam non expedit ponere in pustulis corneæ, nisi res maturatiua propter sui duritiem non valeat. Similiter cum Capositema tunicarum panniculorum & pellicularum, maturatiuis non curatur, acuta imponatur: quibus tamen maturatiua misceantur, sicut assa, sagapenum, euphorbium, cinnamomum, amomum, calia, assarum, achorus, folium, spica. Mundificatiuarum & Colatiuarum quedam mundificant, & colant modicum: & valent contra paruas pustulas & vulnera: sicut cadmia, thus, cornu ceruinum, & caprinum, & ut dicit Galenus, antimoniū. Quedam vero nimium mundificant, quæ valent ad vngulas, scabies palpebrarum, pruritus, & crassas pustulas: ut ærugo, tragacanthum, sal ammoniacum: quæ omnia pungunt: sed cum lauantur, eorum punctio minoratur. Putrefactiua valent vetustæ scabiei & asperitati: vngulam vetustam purgant: & pruriginem, si longi temporis est, curant: ut arsenicum, flos æris, & similia. Constrictiua medicina etiam temperatæ actionis est, & optime prohibet humorem fluentem, pustulas & vulnera, ut rosa, folium, crocus, glaucium, thus fortiter stringit & fluxum humorum amputat. Contractiua magnum generat dolorem, quæ etiam valet commista cum medicina visum acuate, quia oculos coadunat. & est optima contra asperitatem palpebrarum, sicut est balaustria, cortex thuris, ferrugo, flos æris, succus hypocistidis, succus viciæ agrestis, acacia, glaucium, Hæc enim lauant & leniunt asperitatem. Maturatiua cōuenit apostematibus oculorum & doloribus propter humores clausos in interioribus corneæ: sicut myrrha, crocus, castorium, scænuigræcum, lycium, sarcocolla, mellicratum, & similia. Soporifera dolorem magnum patientibus valent: tunc. scilicet cum doloris magnitudine perire videntur. Caute tamen adhibeantur, quia visum minuunt, & nonnunquam amputant. Idcirco non sepe apponantur, vel appositis calefactiua misceantur. Talia sunt opium, mandragora, & similia.

PARTICULA sexta de Apostematibus, & doloribus, & ipsorum curis in generali. postea de ipsis ut insunt oculis, peria, pruritu, carbone: & pilis, vulneribus, fissuris, pustulis corneæ, panno, scabie, Nyctalope, suffusionibus, oculorum exitu, & collyrijs multis contra morbos oculi. Cuius sunt capita duodecim.

De Apostematibus & causis ipsorum in generali.

CAP. 1.

Maximo studio curationes passionum, quas quarta particula scripsimus, necesse est ostendere. Ac primo de ophthalmia, quoniam quod proposuimus, tractabimus. Sed quia ophthalmia de genere est apostematum magnorum, quæ faciunt dolorem, decet nos de apostematibus generaliter tractare, deinde ad ea, quæ in oculis fiunt, peruenire. Diximus secundo, quod causa omnium apostematum sunt humores ad membra fluentes, cuius causa vel interior est vel exterior:

rior: interior, vt superabundantia materiæ: Exterior, vt percussio, casus, fractura, vulnus, & similia. Præterea membri præparatio ad recipienda superflua quatuor modis est, aut propter membri defectionem: aut raritatem, viæq; largitatem membra tendentem: aut propter suæ virtutis attractiua, fortitudinem: vel sui locationem naturalem. Defectio membri aut naturalis est, aut accidentalis: naturalis, vt cutis quam constituit natura defectiuam, vt superflua ab interioribus ad exteriora, à nobilibus ad ignobilia expulsa, facilius suscipere possit: accidentalis, vt ex infirmitate præterita. Raritas membri, vt teneritas maxillarum & inguinum. Attractiua membri fortitudo fit in membris fortibus propter nimium calorem: qui calor aut naturalis est, aut accidentalis. Propter situalem positionem, sicut si inferius locatum fuerit: humores enim ad corporis inferiora maxime descendunt. Sed materia, quæ defluit, aut est humor, aut est ventositas: Si humor, aut sanguineus, aut aquosus, aut phlegmaticus, aut melancholicus: Ventositas autem, cum non sit subtilis, non generat tumorem. Sanguis autem si temperati caloris est, phlegmonem generat: si calidior & subtilior, erysypelas generat: sed calidissimus sacrum ignem facit, & variolas. Aquosus tumor est qui hydropilis dicitur, phlegmaticus: si fuerit subtilis, tumorem: si crassus, apostema generat, quod interius est quasi pingue seuum. Melancholicus autem cancerum generat. Ventositas autem, si fuerit, tumet. Hæc est diuersitas apostematum, quæ diuersa exigunt medicamina. F

De Curis Apostematum.

CAP. 2.

Apostemata ergo, quæ fiunt ex sanguine calidissimo, si eorum causa extrinseca fuerit, nec corporis extiterit plenitudo, medicamine dissolutiuo & repulsiuo curetur: excelsio quoq; vel incisio adhibebitur opportune. Quod si causa sit intrinseca, ab initio non dentur mollitiua vel dissolutiua, cum plus quam necesse est dissolutiua à locis remotis ad apostema attrahant. Sed neq; repugnantia audemus apponere, ne materia ad membra principalia conuertatur. In initio ergo curationis phlebotomia corpus purgetur: deinde apponantur repugnantia & desiccatiua, temperiem facientia, vt sua siccitate resistent humoribus, ne ad tumoris perueniant locum, & temperiem complexionis confortent & locum, vt superfluum materiam deuincant. Sciendum quoq; omnia apostemata quatuor tempora habere, initium, augmentum, statum, & declinationem. In initio ergo conuenit repugnantia opponi calori. Repugnantia, tenui materia dissoluta in parte & crassa remanente, mollitiua & dissolutiua ponuntur: non nunquam in augmento, magno dolore existente, stypticam medicinam & refrigeratiuam ponimus: nimio dolore coacti soporiferam adhibemus. Medicina sanguinolenti apostematis, id est erysipelatis, quæ cum nimio est dolore & calore, si causa eius fuerit extrinseca, ab initio mollitiua & dissolutiua sit: Si autem intrinseca fuerit, G primo detur cholera rubea pharmacum purgans, deinde si opportunum est, phlebotomemus, postea medicina infrigidans & humectans apponatur: calore transacto dissolutiua aptetur. Apostema, cuius materia fuerit sanguis crassus, si cum vulnere, punctione, & putredine sit, in initio phlebotomia ei subuenias: deinde vulnera medicina corrosiua & mundificatiua curantur. Sed tamen considera apostematis magnitudinem ex calore: quia si magnum fuerit, repugnantia ponas: si calidissimum, fortem caue medicinam. Aquosum apostema vel solutione, vel incisione curetur. Prima autem species phlegmatis, quæ est, vt mel, curatur constrictiuis vel confortatiuis & solidatiuis, sicut est vinum mistum cum lycio & nitro: oportet autem à leuioribus incipere, & sic ad fortiora procedere. Quod si fuerit inueteratum apostema, incisiuis & dissolutiuis: & superius ligentur fortiter & inferius leuiter. Secundum genus phlegmatis taliter curatur, dissolutiuis putrefactiuis & incisiuis. Tertium vero, putrefacientibus & incidentibus, dissolutiua vero non valent. Quartum genus stylo incensiuo curatur. Melancholicum apostema id est cancer, difficile curatur. Non incidatur, incisio multis inconueniens est modis: primo, quia syncopam generat, si locus multas venas habuerit: secundo, quia membra principalia non patiuntur membrum ligari neq; sanguinem constringi nisi cum cauterio: & in loco aliquando nascitur, in quo non audemus H cauterium apponere. In huius igitur initio corpus ad temperamentum oportet reuocari: & ad bonum, cum phlebotomia, & pharmacia, & diæta, & similibus immutari. Apostema de ventositate factum dissolutiuo curatur.

De Causis & cura Doloris in generali.

CAP. 3.

Dolor duobus est modis, subita qualitatis immutatione, & iuncturæ separatione. Mutatio vel est de frigore vel de calore, unde causam eius non oportet inuestigare. Separatio iuncturæ tribus modis fit, incisione, fractura, crepatura. Incisio vel extrinseca est cum gladio: vel intrinseca, vt cum acuta humorum qualitate. Fractura autem fit de exterioribus, sicut solidis & crassis corporibus ponderantibus: aut de interioribus, vt de apostematibus: De exterioribus, si sit lapis, locum in quo scindit conculcat propter vtranq; loci extremitatem, qui depressus necessario extenditur. Iunctura, quæ separatur de interioribus taliter fit, augmentata materia concavitates replet membrorum, dolorem q; generat. Materia vero humorum est, vel ventositas vel acuta qualitas. Ideoq; sex sunt causæ doloris, chymus nimius, ventositas non habens exitum, magnum apostema, vel durum, humorum acuitas, vel vulnerum siccitas vel caliditas vel frigiditas. Si dolor propter nimium chymum fuerit, ipso purgato cessabit: Si propter crassam ventositatem, cibo subtili & potu calidis q; fomentis

A fomentis & cataplasmatibus curatur: Si ex apostematibus, ipsorum curatio est dolorum amputatio: Si ab humorum qualitate processerit incensura, necesse est chymum purgari, siue in bonum mutari cum medicina doloris mitigatiua, quod si non sufficiat, soporifera imponamus, vt dolor mitigetur. Quod si de frigidis crassis & viscosis humoribus processit, soporiferam caueamus, quia non est tantus dolor qui de his nascitur: Si crassa ventositas exitum non habet causa fuit doloris, res attenuatiua & dissolutiua adhibenda erit, vt ventositas dissoluatur, & humores desiccantur. Sic etiam de ceteris contraria contrarijs appone.

De causis & cura dolorum Oculorum.

CAP. 4.

Oculi vero patiuntur ex apostemate vel propter acutos humores ad ipsos fluentes, vel propter pellicularum suarum extensionem ab humorum plenitudine, aut inclusione crassorum humorum & viscosorum, vel crassae ventositatis in loco illo. Si sit propter acutos humores, pharmacia detur, materia deorsum ducatur, & oculi cum albumine oui lauentur. Purgato corpore & apostemate maturari incipiente, balneum diligenter aptetur. Quod si dolor fuerit propter humores interius clausos, totum corpus maxime purgetur, deinde calefacientibus vtatur, & oculi cum decoctione foenugreci lauentur: & ante purgationem totius corporis dissolutiua & calefactiua caueantur, **B** quia ad apostema plus attrahunt quam dissoluunt. Sciendum qd humores ad oculos veniunt, vel de omnibus partibus, vel de solo capite: si de solo capite, solum caput expedit purgari, postea confortari, & ad temperiem duci, ne vltra malos humores generet, plurimumq; digerat humores. decet etiam confortare cor, & corroborare, & temperare, quando arteriae in causa sunt, quare humores ad ipsos defluunt: quae si supra carneum fuerint, desiccatiuum cataplasma & emplastrum apponatur: his non proficientibus incidantur. Nonnunquam dolor fit in oculis propter sanguinis coagulationem in venis oculorum clausi, vnde plenae videntur, & oculorum essentia sanguinolenta: Quae passio curatur vini potatione, tamen balneo precedente.

De Ophthalmia & eius cura.

CAP. 5.

Diximus qd ophthalmia est apostema calidum nascens in coniunctiua, & ostendimus curam apostematum solis oculis pertinentium. Vnde quia oculi sensum habent acutissimum, & dolore ferre nequeunt: non temere curentur forti medicamine, sed cum rebus dolores mitigantibus temperentur. Et fiat, quod apponendum est, humidum: & viscosum in loco in quo congruit, immisceatur: & palpebra suauiter eleuata, medicina guttatim injiciatur: & ab initio non nimio existente dolore, medicina aliquid stypticitatis habens, sicut collyrium in quo est acacia ponatur: etiam dissolutiuum & maturatiuum medicamen sicut crocus & lycium: similiter & styptica, vt myrrha & castorium, thus masculinum. Collyrium quoq; si multum stypticum fuerit, humefiat cum albumine oui, lacte, & decoctione foenugreci. Haec si fecerimus, in vno die dolor remittetur, & passio declinabit: qua declinante balneum succedat, deinde collyrium priore fortius imponatur sicut nechium, vt constringat & confortet oculos: tamen parum acuti collyrij cum eo misceatur & parum a medio ad multum ascendantur. Quod si ophthalmia cum nimio dolore fuerit, ponatur ab initio collyrium, quod dicitur diarhodon asperon. Apostemate vero decresciente diarhodon erimoni imponatur. & calefiat saepissime, si nimio pungetur dolore: & si dolor non sit multus, sufficit semel aut bis: & haec calefactio fiat de meliloto, foenugreco, & similibus. Cataplasmentur quoq; croco, meliloto, coriandro, oui vitello, pane loto in vino. Sed si dolor nimius fuerit, misceat illi cataplasmati decoctio papaueris: vnguentum factum de croco, glaucio, lycio, gummi, & aloe, ponatur supra frontem. Si calidi sunt humores, ramus portulacae, citonij, vel succus portulacae, psilij, strigni, & similia. Si calidus non fuerit multum, puluis molendini, myrrha, thus, albumen oui. Humoribus vero frigidis existentibus, sulfur, pix liquida, colophonias, & similia apponantur.

De Curis petiae, tumoris, & Pruritus Oculorum.

CAP. 6.

D Ad petiam sanguis columbae, pauonis, & omnia talia profunt, si cum thure modico misceantur: & calefactio decoctionis hordei & hyssopi prodest. Oculorum tumores habentibus fiat cataplasma ex visis passis sine acinis ex melicrato vel aceto. Si tamen apostema non dissoluatur, radix trita admisceatur: tumore nondum dissoluto, succus columbae apponatur. Pruritus sicut apostema curetur purgatione corporis: & dissolutione materiae intus clausae, & collyrijs, & cataplasmatibus, & fomentatione aquae calidae in nocte oculis apposita: quae mista cum oleo rosato, aut in ovo anatis pruritus amputat, & oleum rosatum temperate calidum. Saepem tamen oculis cholicam imponimus medicinam, vt lachrymas in eis prouocet, quibus lauentur, & mollificentur. Pruritus cum nimio fluxu humorum, medicina Erasistrati curatur.

De Carne addita in Oculis, & Carbone, & Cura.

CAP. 7.

Si carnes additae propter vulnera fuerint, non curantur, nisi chirurgia. Excrecentia superfluae carnis acuta medicina curetur, sicut erugine aris, sulfure, & similibus. Si autem caro oculorum excreuerit superfluae, non curabit nisi chirurgia. Quod si locus ille tumidus fuerit, valet allium gummi cum glaucio & vino. Nascitur etiam quoddam in oculis, quod dicitur carbo: & sicut apostema curatur: cum qd saniem habuerit, sicut vulnus curatur saniem habens. Quidam medici ponunt in hac passione glaucium, tragacanthum, rutam, succum malignanati, lanam vstam, vel myrrham & aloen,

aloe. Huic passioni valent ammoniacum cum aceto: & aliquando admiscemus cum eis de hor-
deo & zedoario: & capita muscarum e cera cataplasmata.

De Pilorum ablatione & Remedio contra Casum pilorum.

CAP. 8.

Pilis ablatis lauentur loca ipsorum aquis salis, & aluminosis, & vngantur loca pilorum palpe-
brae cum albumine oui, & alumine, staphisagria, & farfima i. stercore columbino. *Collirium*
Sabor, valet ad Pilos Cadentes de Palpebris. Recipe ossium dactylorum drach. iij, cadmiae drach. ij.

Aliud Sabor. Recipe antimonij, chalcanti, tragacanthi, pondus aequale: quae omnia cum
melle temperata terantur, deinde collyrium fiat. Si autem pilis cadentibus palpebrae appareant
crassae, stercus muris cum melle temperatum valet: superflui pili de palpebris sunt amputandi.
Quidam dicunt pilos non vltra nasci, si radicibus pilorum extractis, sanguine testudinis vel denti-
bus caninis locus vngatur.

De Curis Vulnerum, & Fissurarum in generali.

CAP. 9.

Oportet primo vniuersaliter dicere de vulneribus, postea vero de ijs, quae propria sint oculis.
Omne vulnus vel cōcauum est tantum, vel fissum. Si multum fuerit fissum, trina intentione cura-
tur. Iungamus vtranq; partem, & suamus studiose, & curemus ne incidat pulvis vel pilus. Quod
si magnum vulnus fuerit, nec pars parti possit coniungi, nec sanies permaneat in concauitate, ne-
cessse est vti desiccatiuo medicamine, vt finita sanie vulnus impleatur carne. Cuius compositio est
cum causa vel morbo vel accidenti. Si cum causa sunt humores ad illud fluētes, corpus purgetur
pharmacia, & phlebotomia: diæta quoq; temperetur: deinde desiccatiuis siccetur. Quod si fuerit
cum morbo, vel est simplex vel compositus. Si morbus simplex est, ad temperiem membrorum
reducatur. Quod si cōpositus, vel vt naturam suam membrum egrediatur, vel vulnus multū con-
cauum sit, duplex medicina necessaria est: vna, qua membrum ad temperamentum redcat: altera,
qua concauitas carne repleatur. Impleatur ergo medicamine desiccatiuo mundificatiuo, quod
humores coadunatos destruat, vulnus q; a putredine mundificet. Sed vt per poros possint egredi
superflua (vnum subtile & continuum, quod latet sensum: aliud crassum, quod vt lutum in cor-
pore coadunatur: & haec duo superflua plus in vulneribus, quam alicubi sunt propter loci defe-
ctionem atq; dolorem) necessaria est desiccatiua & mundificatiua medicina, qua mundificetur &
desiccetur superfluitatis sordities. Omne etiam vulnus vel cōcauum est, vel fissum. Et si fuerit cū
accidente sicut cum dolore, mitigatiua conueniunt. Fissura si parua sit, non est necessaria nisi con-
iunctio partium: & parum medico eget, nisi locus vulneris partem amiserit, quae pars vel caro est,
vel cutis, vel vtranq;. Si sit cutis, apponantur styptica vel desiccatiua, vt locus induratus cuti assi-
miletur: non nunquam acuta medicina facit hoc accidentaliter: calida medicina paulatim apposi-
ta facit hoc accidentaliter, & locum sua siccitate indurat: multa vero quantitas ex ea, loco apposi-
ta resoluit causam, & minuit fissuram. Quod si caro a vulnere sit amota, in initio carnis generatiua
expediunt: deinde locus mundetur, & cuti assimiletur. Sed omnem medicinam, quae vulneribus
pertinet, necesse est siccam esse, quae tamen propter causam quandoque cauenda est. Parum sicca
erit, ne multum siccans, carnem prohibeat generari. Mundificatiuam quoq; siccam esse oportet,
vt putredinem mundet vulnera consolidans. Desiccatiua esse debet ea, quae generat carnem, quae
nec mordicatiua sit, nec abrodens, sed styptica, vt caro induretur, cuti q; assimiletur. Haec est dispu-
tatio vniuersalis vulnerum, & medicina.

De Vulneribus Oculorum, Pusculis in cornea, Panno, Vngula, Nyctalope, Scabie.

CAP. 10.

Sed vulneribus oculorum, si sint simplicia, mūdans & colans cōgruit medicina, quia humores
cito vndi q; fluunt ad oculos propter acumen sensus eorum. Quod si vulnus cum tumore sit, vel
nimio dolore, apponuntur collyria, quae thus & metalla vsta recipiunt: & cataplasmata: nec pun-
gitiua cataplasmentur. Aliquando tamen, si putredo vulnere insit, colatiua tunc apponatur. Sed
intueri oportet an vulnus carnem rodatur: inuestigandum quoq; vnde humores ad oculos fluxe-
rint: quo perfectio, caput & corpus expedit purgari. Deinde apponenda sunt collyria desiccatiua,
nullam q; faciētia punctiōem: sicut ea, quae respiciunt casum, cū dantur cum lacte vel cum deco-
ctione fœnugraci. Si dolor est nimius, aliquando soporifera medicamina apponuntur: fluxu hu-
morum cessante, eis styptica apponuntur. Prauidendum tamen ne vnea egrediatur, cui egredien-
ti stypticum conuenit adiutorium. Collectio & pustulae in cornea nascentes curantur cum medi-
cina maturatiua mediocriter colatiua, sicut collyrio recipiente crocum, thus, myrrham, castorium,
decoctionem fœnugraci. Quod si non inuenerint, & tumor non dissoluatur, calidum & aperi-
tiuum appone, sicut sagapenum, euphorbium, & similia. Pannus in oculorum albedine natus co-
latiuo & mundificatiuo curetur. Quod si fuerit subtilis, sufficit succus rubei papaueris, vel deco-
ctum minoris centaureae cum melle: si grossus, fortiora dari necesse est, sicut picem liquidam, es
vstum, nitrum, stercus muris, myrrham, sal ammoniacum, & similia. Si aliquid ex eo remanserit,
gallam, acaciam, & chalcathum appone. Vngula & scabies, si durae sint etiam & veteres, incide-
re eas vel excoriare optimum est: sin autem subtiles, appone as vstum, florem aris, fel porcinum,
sal ammoniacum. His non dum proficientibus, appone medicinam putrefacientem atque roden-
tem. Scabies non stypticis est curanda, quae si sit cum vulnere magno q; pruritu, cōuertatur palpe-
bra

Abra et cum hoc excoletur. Est quedam passio oculorū, quam qui habuerint, vespere non vident: quos phlebotomari conuenit de cephalica brachij: & vtantur pharmacia, & clysteribus, & caput purgantibus, & gargarismate, et sternutatione mundificentur: vena auris incidatur. Oculis mel cū alumine & sale ammoniaco apponatur, & cum hepate caprino fumigetur: hæc omnia profunt.

De Suffusione, Egressu Oculorum, & Petia.

CAP. 11.

Suffusio, idest visus defectio, sic curatur. Caput, & totū purgetur, vt diximus: diæta sit tenuis: deinde vtatur collyrijs scænumgræcum, mel, sagapenum, alarū, thus recipiētibz, & opobalsamum, & ammoniacum. Valet quoq; si vena hepatica incidatur, & sanguisuge tēporibus apponantur.

Oculis extra exeuntibus, ventosa in collo apponatur: oculi ligentur, & aqua salsa sulfumigetur.

Petia curatur sanguine oculis instillato: deinde cum albumine oui oleo q; rosarum ligentur.

De Collyrijs multis ad Oculorum ægrotudines.

CAP. 12.

Collyrium quod dicitur Dia rhodon in modum piperis, valens in Augmento Doloris Ophthalmie. Recipe cadmiæ, cerussæ, ana drach. xiiij: rosarum drach. duodecim: gummi, amyli, ana drach. j: tragacanthi drach. iij & f, aloes drach. vj: tempera cum aqua pluuiali, & informa. **Aliud in Initio Ophthalmie, quod etiam vetusta valet.** Recipe acaciæ drach. liij, gummi 3 xliij, cadmiæ drach. xxxvj: tempera cum vino pontico ana drach. xij: tempera cum aqua pluuiali. Hæc omnia à Paulo sunt ordinata. Ista vero Galenus dicit. **Collyrium valens ad Dissoluendum Apostema die vno, & ad Ophthalmiam.** Recipe antimonij, acaciæ, ana 3 lxx: cadmiæ drach. ix, æris vsti loti 3 xxj, cerussæ drach. xij 5, myrrhæ 3 vj, sulfuris drach. vj: castorei, opij, chalcanthi vsti, ana drach. vj: gummi drach. ix: tempera cum albumine oui: in vno die est validissimum. **Aliud Pauli.** Recipe cadmiæ, croci, gummi, ana 3 iij: æris vsti drach. xxij: cerussæ, rosarum, ana drach. xxij: polij, croci, chalcanthi, opij, ana drach. vj: aloes, spicæ, castorij, ana drach. j & f: tempera cum aqua: curat vero ophthalmiam, & humores vel propter dolorem, vel vetus vulnus fluentes. **Aliud.** Recipe cadmiæ, acaciæ, gummi, ana drach. ix: antimonij triti drach. xx: castorij, opij, ana drach. vj: lycij drach. iij & f: myrrhæ drach. xij: spicæ, aloes, ana drach. iij: gummi, tragacanthi, chalcanthi, ana drach. j & f: tempera cum vino & aqua myrtina. **Aliud ad superiora.** Recipe acaciæ, gummi, ana 3 lx: plumbi loti 3 xxx, spicæ, casia, ana 3 vij: rosarum, cadmiæ, ana 3 xxx: cerussæ, aloes, opij, croci, ana 3 ix: castorij, lycij, ana 3 iij & f: tempera cum albumine oui. Valet vulneribus & omnibus passionibus oculorum vetustis & putrefactis. **Aliud in Statu conueniens cum albumine oui, in Declinatione cum aqua.** Recipe cadmiæ vetustæ & lotæ, cerussæ, ana drach. vj: amyli, tragacanthi, ana drach. iij: hyoscyami drach. j & f, croci drach. vj: glaucij, sarcocollæ, ana drach. vj: opij drach. iij, tragacanthi drach. vj, croci drachmas tres: gummi, opij, drach. j & f: tempera cum aqua. **Aliud valens in Augmento Ophthalmie.** Recipe cadmiæ, cerussæ, ana drach. xxiiij: rosarum 3 xij: gummi, amyli, ana drachmas quatuor: tragacanthi drachmas quatuor & f, aloes drach. iij: tempera cum aqua. Valet in vulneribus, & humoribus vulnerosis, & lachrymis ex oculis fluentibus. **Aliud valens ad Ophthalmiam, & Vulnera, & Adustiones, & ad Mundificandum Vulneris putredinem.** Recipe antimonij vsti, cadmiæ, rosarum, ana drach. xxiiij: cerussæ tritæ 3 xxij, opij drach. vj: tempera cū aqua. **Aliud nimio Dolori conueniens, & liquidissimos Humores ad Oculos fluentes reprimens.** Recipe rosarum drach. vj & f: opij, spicæ, ana drach. j. **Aliud.** Rosarum drach. xxij, croci vj, æris vsti & loti drach. j & f: tempera cū aqua pluuiali. **Aliud.** Recipe rosarum drach. xvij: cineris locorum, vbi es funditur, drach. vj: croci, opij, gummi, ana drach. vij: tempera cum aqua pluuiali. **Aliud.** Recipe gummi drach. iij, tragacanthi drach. j & f: tempera cum aqua pluuiali. **Aliud.** Recipe myrrhæ drachmas lxxv, rosarum xl, croci vj & f: tempera cum vino. **Aliud valet nimio Dolori, Pusculis contanis, putridis Vulneribus Corneæ, Oculos q; exeuntes comprimit, Omnemq; oculorum passionem ad sanandum difficillimam curat.** Recipe rosarum drachmas centumocto, gummi xxxvj, cadmiæ vste & lotæ drach. xxj, croci vndecim: opij, antimonij, drach. ij & f: iarri spicæ drachmas tres, myrrhæq; tempera cum aqua pluuiali. **Collyrium Pauli.** Recipe æris vsti, tragacanthi vsti, ana drach. viij: croci ij, nitri drach. j: coquantur ad mellis spissitudinem. **Aliud eiusdem, valet Scabiei palpebrarum, Veteri q; Ophthalmie, Sanem, & Vulnera Aurium, & Os rodentia sanat.** Recipe æris vsti drach. quatuor, myrrhæ drachmam vnam & f: piperis, croci, vini, ana drach. ix. **Collyrium Pauli.** Recipe cadmiæ auri & argenti drachmas tres: tempera cū aqua pluuiali. **Collyrium Oribasii valens in Initio Ophthalmie, & Vulneribus.** Recipe cadmiæ, cerussæ, tragacanthi, ana drach. vigintiquatuor: antimonij, gummi vsti, ana drach. xxj: plumbi incensi, tutiæ, ana drach. vigintiquatuor. **Aliud.** Amyli xvj, gummi ix: æris vsti, tragacanthi, ana 3 vj: myrrhæ, opij, ana 3 v. **Aliud valens Vstioni, Vucam egredi prohibens, subueniens Vulneribus.** Recipe antimonij vsti, cerussæ, ana 3 vigintiquatuor: myrrhæ drachmas tres, amyli xix, tragacanthi xij, gummi vj: tempera cum aqua pluuiali. **Aliud valens Pusculis, Vulneribus saniosis, & nimio Dolori, duræq; Ophthalmie.** Recipe cadmiæ vste & lotæ drachmas vigintiquatuor, antimonij loti & vsti xvij, amyli iij, plumbi incensi & loti xij: tutiæ, myrrhæ, ana drachmas xij: tempera cum aqua. **Aliud.** Recipe tutiæ drachmas duodecim: cadmiæ lotæ, cerussæ, ana drachmas cxxij: antimonij incensi & loti xvij: myrrhæ, opij, ana drachmas quinquaginta & 5: tragacanthi drachmas duodecim: tempera cum aqua. **Aliud vtilissimum Asperitati Palpebrarum & Scabiei.** Recipe chalcanthi

Septima Classis.

BBBBBB

drachmas

DE RENVM AFFECTVS

drachmas duas, cadmiæ drachmam vnam: ad Solem cum vino sufficienter agita. *Aliud.* Recipe cadmiæ drachmas vj, chalcanti grana triginta, piperis grana xxxviij: spicæ drachmam vnam & 5, aliter drachmas tres & 5: cadmiam & chalcantum tritura sufficienter & agita, deinde cum pipere spicam commisce & tempera. *Aliud Valens Scabiei, & Humoribus ad Oculos fluentibus, Veteri q̃ passioni, & Pusillus.* Recipe cadmiæ, gallæ rosarum, gummi, croci, ana drachmas tres: opij, drachmam vnam: omnia puluerizata cum vino ad Solem sufficienter agita. *Ad Oculos Caliginosos & sanguinolentos.* Aloe trita cum albumine oui mirifice prodest. Si aloen non habueris, canabis trita idem facit. *Ad Oculos Dolentes, & Lachrymas stringendas, & Pruritus tollendum.* Collige mel despumatum, & ex eo vnge folia hederæ, & superaspere puluerem facis vini, & oculis superpone per noctem: expertum est. Item chelidonia cocta in aqua, si ex ea oculi fomētentur, dolentibus prodest. Item coriandrum viride tritum admisto lacte mulieris oculis superpone: dolorem & tumorem tollit. Idem facit radix cucurbitæ agrestis trita & imposita. Fel caprinum cum melle antiquo mistum & inunctum oculorum caliginem destruit. *Ad Pannum ab Oculis abstergendum.* Facem vini, album oui, rasuram ossis sepia: facto puluere mitte, donec corrodat. Vitellus oui tritus succo que apij mistus & inunctus sanguinem spargit. Absinthium viride cum albumine oui tritum, & nocte suppositum, sanat. *Ad Tumorem calidum & sanguinem Oculorum.* Anagallis cum albumine oui trita & imposita prodest. *Ad Tumoris calidi dolorem.* Herbam violariam cum oleo rosaceo tere, & superpone: mire iuuat. Valet etiam mali granati succus: in vase æneo vel stanneo ipsum coque & cola, & cum opus fuerit vtere. Item Recipe plantaginis, centaureæ, vngulæ caballinæ, pulegij, betonicæ, chamædryos, apij, fœniculi radicem, partes æquales: pone in olla noua, & intra sparge fœnugræcum. Item lycium in rhodostomate guttatum impositum valet. Item auripigmentum, pannum subtile laneum, & fimum hominis, combure in olla bene argillata.



GALENO ASCRIPTVS LIBER DE RENVM AFFECTVVM DIGNOTIONE ET MEDICATIONE

Christophoro Heyl Vuifsbadensi interprete

Nunc primum ad græcorum codicum fidem accuratissime recognitus.

De Substantia, Figura, Situ, Partibus, & Vsu Renum.

CAP. 1.



Enibus peculiare quoddam corpus est ex fibris & carne constitutum, quod cum alia parte nulla commune habent: & caro hæc densa est, ne sanguis qui ad ipsos deferretur, facili momento disfluat, effundatur, & abeat cum vrina. Carnea hæc substantia non paucas habet inuolutiones, in quibus quoniam singulatim per substantiam lapides plerumq̃ generantur, sunt in renibus grauissimi dolores. Ac de substantia quidem hæc tenus. Figuram autem renes habent græcè literæ Γ: & in medio cavitatem quandam, qua ex venis & arterijs serolum excrementum excipiunt: nam ad eos non maiores solum venæ, quarum aliæ in cavitatem hanc inferuntur, aliæ in membranam, quæ renes circumtegit: sed meatus etiam capillis modo exiles deferuntur. Dexter autem sinistro sublimior est: ne inter operandum, alter trahat, alter retrahat. Iacent ad spinam renes, paulo altius quam ilia:

Alia: & ex se, vrinarios meatus duos emittunt, quibus ad vesicam vrina deducitur. Sed habent isti quoque meatus propriam corporis sui substantiam, quam in alia particula nusquam reperias. Duos autem natura renes produxit, non vnum: quoniam alias excrementorum species serosa hæc superfluitas non parum superat, quam attrahere, renum officium est: ignorare enim nō debemus alteram causæ venæ partem ad corporis nostri inferiores partes deferri: quæ bifariā diuisa est, altera parte sursum, altera deorsum porrigitur. Pars quæ descendit, rursus tripliciter finditur, & pars vna ad crura porrigitur, altera ad testiculos, & tertia ad renes. Procedunt vero & de corde arteriæ, quæ serosum excrementum & vna caliditatem immittant: vt ab eis renes calefiant: nam renes ita ex seroso isto excremento frigent, vt ex atræ bilis succo lien: Quamobrem à dictis iam arterijs calor renibus suppeditatur, quō natiuam suam frigiditatem possint euincere. Postquam vero serosum id excrementum renes attraxerunt, vtilem qui in eo est sanguinem ipsi retinent, & ex eo nutriuntur: excrementum vero ipsum serosum à facultate segregatrice seu inutile expellitur. Sed quandiu in venis & arterijs hoc cum sanguine currit, excrementum serosum: cum segregatū est, lorum nominatur. Proinde quod in sanguine vtile est, id sibi renes in nutrimentum seruāt: quod autem inutile, id abigunt. Atque vt bilis vesica, bile delectatur: & lien, atræ bilis succo: ita renes seroso isto excremento gaudent. Renum autem operatio est secernere & percolare serosum excrementum à sanguine. Atque hic renum vsus est. Non solum autem renum, sed & singularum partiū operatio medico est inuestiganda: quod ex operatione labefactata cognoscatur, quæ particula morbo sit affecta: & ex modo ruinæ operationis, quantum sit quæque affecta.

Quibus ex causis Calculi oriuntur: & quæ ratione Pueris in Vesica, Adultis in renibus, frequenter oriri soleant.

CAP. 2

OMnis affectus, quo ren laborat, quanquam Nephritis dicitur, siue is similis sit, siue instrumentalis, siue communis: proprie tamen Lithiasis, id est calculi morbus, Nephritis appellatur. Sunt autem lapidis huius quatuor causæ. Efficiens, materialis, instrumentalis, & finalis. Nec operosum fuerit discere à rebus externis, lapidis concretionem, aut à frigore, aut à calore fieri: velut in riuulis & canalibus, cum caliditas, materia non expirante & ventilata, exoritur: cum aqua in aliquo canali substat, calor quidam præter naturam accenditur, quo dispergente id quod in aqua sic coenosa partium erat tenuium, quod crassarum est partium in terram durefcit: Cmanens que eo in loco substantiæ lapideæ ex qua factus canalis est, adhærescit: & in lapidem sic colligitur. Subnectiam aliud de eadem re notum exemplum. In lebetæ generari lapides sæpe compertum est aquæ parte, quæ tenuis fuerat, dissoluta, manente alia, quæ crassa & terrena est: ea enim lebetis vel alius aris corpori affigitur, & lapidescit. Verum in nobis lapidem frigus non parit: neque enim fieri potest, vt viuo corpori tantum frigus accadat, quo concrefcere valeat in homine lapis, quemadmodum fieri in externis videmus: quo fit, vt à calore lapis in homine generetur, eo quæ vel vehementi, vel tepido. Nam si crassa materia est, sufficere potest tepida & moderata caliditas, & quæ naturalis est, ad firmandam & indurandam terræ modo crassam hanc materiam: est enim crassities ad generandum lapidem singulariter accommodata: Sin tenuior est, vehementiori tum planè indigebit caliditate, siue naturali, siue præter naturam, qua durefcit in terram: siquidem calor tenues materiæ partes euaporare facit: atque ita, vbi valuerit, lapidem conformat. Ideo quæ simpliciter à calore fit in nobis calculus. Materialis causa est crassus aut glutinosus succus, vel vtroque modo vitiat. Instrumentalis causa est ren, aut vesica, vel pars alia quæ generando lapidi sit opportuna. Finalem causam haud aliam dicas, quam lapidem ipsum. Sanguis qui in renes fertur, aut crassior seipso est, aut pituitosior, aut magis ad bilem Datram, aut rufam demutatus: fertur que ad eos per venas & arterias, vel in cavitatem, vel substantiam: eò delatus, si quantitate, vel qualitate, vel consistentia excedat, astringitur, detentus quæ concipit caliditatem præter naturam: hæc caliditas præter naturam amplius eum densat, agglutinat, & assat, assatum quæ ipsum in terram & lapidem commutat. Qui itaque arbitrantur in renum concavitate lapides consistere solum, cum per vrinæ meatus transeunt, dolere laborantes dicunt: Qui vero in ipso renum corpore gigni lapides arbitrantur, quo modo & in arthriticis nodi gignantur: non solum cum pertranseunt, sed & quando generantur, & quando renum concavitatem subeunt, dolere laborantes asserunt. Sed fieri vtroque modo lapides posse nobis satis persuasum est, cum succus tenax & crassus tempore aliquo assatur in ijs atque exiccatur. Demonstratum est enim in commentarijs de facultatibus naturalibus renem trahere ad se quicquid in venis serosi & tenuis cum sanguine permistum reperitur. Si quando igitur meatus, qui in renis ventriculum illud transmittunt, latius aperiantur, crassius vnà aliquid colatur: quo calefacto & exiccato in renis cavitatem, lapidosam consistentiam assequitur. Quamobrem si virtus segregatrix ipsius renis id omne in vrinis expulerit, arenosum in ipsis sedimentum proveniet. Si infarctum id & solum difficile sit quod renis cavitatem suscepit, ad eum aliud adhuc nō ablimile ex caua vena immistum deinceps colligitur, & augetur (circumlinitur enim semper quod affluit ei quod iam adest) itaque

Septima Classis.

BBBBBBB ij

lapis

lapis non adeo contēenda magnitudinis exurgit. Quod certe vt facilius fiat, renum tempera-
tura iuuare potest haud mediocriter, si calore naturali hæc ceu feruens & acris fuerit. Atqui si for-
amen & meatus, qui ex vena caua in renem peruenit, fuerit rarefactus, & sanguis humens, neque
erassus neq; glutinosus: tum vrina fiet cruenta. Cum itaq; ex sola pituita tenaci et crassa porosorū
& lapidosorum corporum, quæ in renibus coguntur, substantia coierit: color inesse solet, quem
cineritium nominamus: non absimilem lapidi, quem fieri in aquis sponte natū, quæ *αυτοφύει* gre-
ce dicuntur, videmus. Hæc nanque, si tepidiores sint quàm pro temperatione, tephos videntur pro-
ducere: neq; alij causæ acceptum feremus, quod pueris in vesica lapides generentur, ætate vero flo-
rentibus in renibus. Quippe cum actiones naturales in pueris sint omnes fortes, fusa est in eis &
dissoluta succorum crassities. Contrario modo se habent qui ætate processerunt: nam actionibus
in hisce debilioribus coacta est crassities succorum. Apparet vero in externis id quoque, cum vi-
delicet quæ crassam naturam habent, per tenuia foramina traicere institutum sit: quæ nanq; fusa
calore sunt & colliquata, transire ocyus videmus: quæ vero liquata non sunt, traiectioni resistere:
harum materiarum exempla nobis sunt pix, resina, adeps, cera, & mel. Cum itaque in pueris cali-
dum innatum abundet, & fortes sint actiones: crassitudo materiæ diluta in renes delabitur, inde q;
facilius in vesicam transit, non parum etiam adiuuante ad transitionis celeritatem ipso actionum F
robore: in vesica autem existente frigida (membranosa est enim pauciq; sanguinis, & ampla intus
capacitate) rursus consistit, densatur q; ad eam crassitudinem, quam paulo ante mōstrauimus: con-
sistentiæq; principium sumit, si diutius in vesica commoretur. Ipsa liquidem glutinosa credibilis
est ab innato puerorum calore facilius subigi, atq; ideo magis vniri, consistere, et condensari. Adij-
ciamus si libet, puerilium vrinarum crassitudinis causam: quæ certe alia non est, quàm puerorum
voracitas, & mouendi excessus mox ab alimento assumpto, dum scilicet pueri ferociunt et ludunt.
In læcentibus autem ipsa etiam materia plurimum facit: in adultis enim qui caseo & similibus re-
rum esu delectabantur, lapides in vesica & renibus fieri cognouimus. Idcirco lithiasis vesicæ, pue-
rorum est morbus. Haud enim potest vesicæ collum tam angustum in maioribus corporibus es-
se, vt humorem crassum remoretur. Attamen ne putemus solum hoc sufficiens esse ad lapidis ge-
nerationem, nisi calida intemperies eodem accedat: quæ calorem ignitum habeat, non temperatū
aut modicum. In puellis ceruix vesicæ dehiscit in membrum genitale, & brevis simul est & lata,
vt nullo labore crassa per eam ipsæ meiant, quæ in vrina feruntur: quæ dum pueri retinent, quod
sæpe fit, & propter longitudinem & angustiam ceruicis vesicæ, materiam vesicæ æstuantem præbent
ad calculi generationem. G

Indicia quibus Calculi, & reliqui Renum Affectus deprehenduntur. CAP. 3.

Signorum alia sunt, vt ita dicam, scientialia, alia artificialia, alia propria. Proprium signum
est, quod certe, nulloque medio morbum ostendit, in renibus nempe lapidem: vt cum
arena in matula sublidet, tunc planè ostendatur lapidem in renibus esse: signum que hoc con-
stans & proprium. Quoniam vero affectus quidam complicantur, dicemus quoque de signis
communibus. Cum lotium quod excernitur, sanguinolentum est, signum id esse commune po-
terit, vel quod vasorum apertio sit, vel ruptio, vel erosio, vel imbecillitas, vel dilatio, vel aliud
quicquam eiusmodi. Quoniam ruptionem exquisiti & confertim egesti sanguinis vacuatio se-
quitur. In apertione paulatim fertur, & sanguis tenuissimus emanans cruentam vrinam effi-
cit. Si quocunque tempore & momento sanguis egeritur, imbecillitas vasorum est: Sin vnà
cum sanguine, aliæ quoque crassitudines excernuntur, dilatio. Sin sanguis sit aquosus,
manifestum est certumque, lapidem consistere. Sin sanguis qui excernitur sit crassus, manife-
stum est ipsius crassitudinem violenta coactione in lapidem esse abituram: si (vt fit) in ea sangui-
nis vacuatione frigidam exhibeamus, vt vena atque arteria: coarctetur & conuiueat, nec amplius
sanguinem vllum in renes ingerat, qui cogi istuc possit. Fit enim proculdubio in hisce sanandis
error: nam venam coarctant frigida, vt alium sanguinem inferre non sinat: verum ea ratione fit,
vt sanguis in renibus commoretur. Proinde si frigidam exhibeas, venam comprimes quidem,
ne sanguis deferatur: sed qui renibus illatus iam est, mox indurabis. Ex stupore cruris quod à
rene secundum lumbum porrigitur, cognoscere poteris quis ren laboret: nam si dextrum crus
stupor occupabit, dexter ren agrotat: sin læuum, sinister. Est vero stupor, sentiendi & mouen-
di in particula difficultas: qui fit in crure, quia vena quæ ad inferiora demissa est, triplici ramo di-
uiditur, quorum vnus cum arterijs ad testiculos vadit, & vasa seminalia: alius renes ingredi-
tur: tertius ad crura porrigitur. Cum igitur in renibus lapis generatur, vnà tum afficitur vena
quæ ad crura descendit: sunt enim ambæ ab vna sobole cauæ venæ, quam inferis partibus na-
tura distribuit: igitur vena quæ ad crura porrigitur, repletur: qua repleta, stringuntur neruus
quandoque aut musculus: cum stringitur neruus, animalem spiritum ad crura non transmittit,
vnde sensu crus priuatur, & prouenit stupor. Porro ex testiculo, quoque † secundum lum-
bos † retractio, scire possumus renem esse affectum. Si nanque dexter testiculus retrahatur,
dextrum

† In impressis
est κατ' ἑνὶ.
sm ppektionē.
vel rectitudinē

A dextrum pati renem argumento est: si sinister, sinistrum. Nam à iecore & corde vena & arteria ad renes procedit, quæ in eorum cavitatem inseritur: vasa autem seminalia ad testiculos feruntur. Quando igitur lapis in renibus generatur, vena illa & arteria distenduntur, & seminalia vasa quæ ad testes pertingunt, atque ita per compactionem testes retrahuntur. Tradunt aliqui, vehementis doloris ratione vigilias vomitum excitare: debebant itaq; podagriet, lippientes, & qui vehementi dolore, & vigilijs exercentur, vomere. Sed ea de causa hi non vomunt, immo propter polituram renum: ij nanq; positi sunt secundum spinam post intestina & ventriculū: quapropter facia in renibus violenta quadam distensione, per copulas affectio ad intestina & ventriculū digreditur, inde q; affectione ascendente, sequitur subuerlio. Quoniam vero cum lapis subest, quadam veluti titillatio oritur, natura q; ad eius quod molestat expulsiōem stimulat, ideo spiritus occurrūt: quibus irrumperibus in fistulosam pudendorum partem, ipsam immaniter contendunt: nam in omni motione naturali sanguis & spiritus concurrunt, qui sunt naturæ vehicula. Cum vero demonstratum sit cor, iecur, & renes in concavitate non sentire, in superficie autem sentire (quoniam in superficie nervi sentientes feruntur, in concavitate vero nulli sunt) quomodo hæc dolorem perferunt? An quia gravatur cavitās, ideo dolor exurgit: extenditur nanque membrana quæ foris est, vndique, quod cavitās interna sit repleta, & sic extensa membrana dolorem facit. In renum itaque substantia dolor itidem generatur, quando concavitas ex lapide gravata est, & circumdenditur, profert q; consensione dolorem in superficiem: quippe quæ nervos sentientes habeat & membranam. In meatibus autem vrinæ, ut qui nervosi sint & sensibiles, dolor fit sæuissimus. Dolor præterea vehementissimus fit in renibus, propterea quod eorum cavernulæ non sunt latæ, sed angustæ, & renes ob firmitatem substantiæ non diducantur ut vesica. Eadem causā, renū lapides magna ex parte minores sunt, æquales, & molliores, utpote qui diuturni non sint. Qui calculo laborant, his primo vrinæ sunt aquosæ: cum enim sit obstructio, ceu per cribrum effluunt, post arenosæ: denum calculi excernuntur, cum dolor cessauerit. Sicut in mulieribus parientibus ad fœtus egressum partes dilatantur: ita hic violentia, renū substantia fassit, & egreditur lapis: cum ad renū cavitatem subit, in membrana, quæ illic substat, quoniam facili sensu est, dolorem movet vehementem: & multo magis cum meatus vrinæ ingreditur, propter angustiam & sensum eorū: quantisper enim in renū corpore sistitur, nō multum sollicitat, quoniam, ut diximus, eorū substantia sensibilis non est. Sape nanque præ magnitudine in collo vesicæ detenti lapides in extremum periculum doloris acumine patientes agunt, nec vrinas sinunt excerni. Vidi ego quēdam, cui per alias vias elapsus in virilium extremitate lapis hæserat, minimum q; abfuit quin vrinæ difficultate, & dolore acutissimo homo interiret, nisi angusto tandem forcipe eximere potuissimus, sectionem per longum superne moliti: nam vrinæ meatum, nili vrgeat, magna necessitas, incidere non oportet, ne fiat fistulosa pars ea, & vrina profluat. Inuenias tamen qui dolorem non habent, nec sanguinem mingunt, quibus meatus in renibus congesti non sunt. At tenues arenulæ haud magno negotio quidem excernuntur: quod qui faciunt, nec ægrotare se putant, quando dolorem nullum sentiant. Verum nihil est hac in re contemnendum, cum tempore omnia grauiora reddantur. Lapides & arenulæ colore differunt, tum ob caliditatem, tum ob materiam: nam ut quidque illorum longiori tempore retinetur, ita rufum, flauum, rubrum, aut nigrum efficitur. Haud aliter & à succis fiunt lapides & arenæ, colore vel sandarachæ simili, vel nigro, vel pallido, vel alio aliquo colore pro succorum varietate. Fiunt autem lapides in concavitate renū, in eorū substantia, & ubicunque fieri commode possunt, aut parui, aut maiusculi: interdum pauciores, interdum plures. Differunt q; magnitudine, figura, colore, asperitate, & multitudine. Nigros siquidē inuenias, & subalbos, & pallidos. Ac rotundi, lenes, & parui, facile excernuntur: maiores, vel aliter figurati, & maxime oblongi & asperi, difficulter. Arenulæ vero prodeunt & egeruntur dum fiunt lapides: cum facti sunt, haud fieri potest ut efferantur, quia in lapidem sunt coacti, nili natura ipsa ultro conterat & excernat, vel ars per medicamentum tritorium naturæ auxiliata, conterat & euacuet ipsas. Nemo vero ignorabit colicum & renū affectum vna plerunque incidere. Deprehenduntur tamen proprijs signis: nam alius exonerata colicis medetur: nephriticos quoque à principio mitigat. Etiam aliqui dederunt medicamentum quo alius subducta est, & dolor cessauit primo, secundo, & tertio die, quarto prodijt lapis. Cum autem simul inciderint renū & colī dispositiones, mutuo particulas communicant intentione & remissione: tenduntur enim ob continuitatem partes haud aliter quàm funiculus: & neque superne ructus ullus, neque infra flatus quispīam exit.

Calculi, & reliquorum Renū Affectuum Curatio.

CAP. 4.

Si renū affectus subito inuadat, & qui laborat cibo nuper refectus sit, cibi que adhuc sint in, scocti sicut ægrotus eos ingessit, aut, semicocti, vel succorum multitudine corpus grauatū habeat: oportet ante aliam curationem, vel potius mitigationem, nisi quicquam impedimento est, vomitum prouocare. Mox si in intestinis excrementorum superfluitates fuerint, per idoneos clystieres extrahere, modo nihil obstat. Postea si totum corpus plenum fuerit, considerare quib;

Septima Classis.

BBBBBBB iij

nam

nam humor sit, qui ipsum repleuerit. Atque si sanguis is est, euacuationē instituere oportet, cum nihil impedit: minorem tamen multo quam plenitudo desiderabat. Quid ita? quoniam lapidem non planē statim eximere possumus, potissimum cum magnus est: ideo quod oportet pleniorē sanguinis euacuationem cauere, propter consumptionem, quæ tempore adhuc aliquo in corpore futura est. Sin quatuor humores abundauerint, potius vena incidenda est ante purgationem, quam purgandum ante venæ sectionem. Quoniam si per sanguinis missionem corpus prius vacuatum fuerit, purgans medicamentum exhibitum, venas & arterias, & inanes corporis regiones inuenit non oppletas: quo fit, ut absque villo impedimento in totum corpus dimanet ad attrahendum succos, facillime quod fiat eorum euacuatio per vasorum spatia & fusionem tenuitatem quod succorum. Nam si vasa sanguine repleta sint, & purgatiuum dederis: non poterit propter plenitudinem in corpus diffundi: unde fit, ut substat, & nihil efficiat: aut si quicquid facit, male faciat. Ex medico quidē purgans medicamentum: Ex natura vero totum negotium pendet: hæc etenim à purgante medicamento excitata, facultatem segregatricem aduocat, qua segreget inutilia ab vtilibus: ac vtilia quidem retentrix facultas detinet: inutilia vero expultrix facultas expellit. Non oportet autem simul venam secare & purgare: verum prius sanguinem detrahare, deinde virtutem pulchre refocillare: quoniam ipsa nos gubernat, & medicamenti auxiliatur: medicamenta enim per se ipsa nihil efficiunt: ideo quod corroboranda virtus est, ut possit natura vti purgatiuis exhibitis ceu instrumentis, atque quod decens est, perficere. Huc præterea accedit, quod vna cum sanguine multum est vitali spiritu excernitur: quo excreto refrigerat totum corpus, & opera naturalia deterius obeuntur. Ea propter virtutem prius refocillare oportet, deinde medicamentum purgans exhibere. Sed quia affectus renalis est, & materia, ex qua lapis generatur, crassa, materiam quod crassam sursum reuellerē promptum non est, magis vero ad ipsius lationem spectantibus deorsum vacuare expeditum: ob id si valida sit virtus, venam quæ in poplite est, aperiemus, vel quæ ad malleolos: sin imbecillis, venam quæ est in cubito: nam si virtute debili infra euacuabimus, retentrix facultas, quæ est imbecillis, non retinebit: sed vniuersa in præceps rapietur, & partem assiduo defluxu impetet, succis videlicet in locum imbecillem perpetuo procumbentibus. Quapropter cum firma virtus est, conuenit ex vena, quæ in poplite est, sanguinem mittere: cum debilis ea est, reuellerē ad superiora. Quam vero ob rem? Ne materia plus in renes deriuetur. Hinc est quod cum cibaria, pituita, & succum vomitu euacuauimus, tranquillitas quædam fiat & leuatio. Eijcitur namque cibus & pituita, quæ ventriculum grauant: à ventriculo autem renes stringuntur & vrine meatus, quo fit ut grauior sit oblatio. Sunt itaque primum ista diluenda, quæ stomachus excipiens ceu debilius distendebatur & premebatur: quibus euacuatīs leuatio sequitur, nondum tamen perfecta liberatio. Vacuamus etiam per clysterem excrementa: ne colo & reliquis intestinis constrictis atque grauatīs, vna quoque ren laborans stringatur prematur quod, atque sic amplius doleat. Quod manifestum est, quia stercoreis obstructione renes plerumque exasperari compertum sit, enematis iniectione renalem dolorem esse mitigatum: vel quod ab ea vacuatione ren aliquis non sit amplius compressus: vel quod ex stercore nulli postea flatus prodierint: qui in renes impingentes, ipsos ut imbecilles comprimunt & extendunt. Sed neque sanguinem, neque alium succum plus æquo relinqui in corpore par est, ne multa hinc renis vasa distenta plus doloris concitent. Quæcunque enim vel dolent, vel calent, vel extenduntur, per vehementes & acutos dolores, ad se materias accersunt. Proinde doloribus siue repente, siue pedetentim in renem incurfantibus ex commemoratis iam causis, illico, nisi quid prohibeat, aluum decocto aliquo eluimus, caricarum, scenogræci, aristolochiæ, & similibus: ac, si vacuatum satis est, bene vertit: sin minus, bis, ter, aut amplius vacuandum enemate est, sed ex eorum decocto quæ conducibilia sunt, & familiaria naturæ agrotantis, ne angantur grauentur quod renes & viæ vrinales. Posteaquæ autem aluus satis excreuit, iniicienda sunt, quæ vrinae vias dilatare, renes laxare, calculum deprimere, & morsus mitigare queant: vtilis ad hæc materia est oleum anethinum, in quo eliquatus sit gallinaceus adeps quàm recens: maximopere vero phasiani adeps, vel butyrum recens, aut similibus aliquid. Quæ si in promptu non sint, scenogræcum, & altheæ vel radicem vel semen, aut similibus aliquid decoquentes oleo iniiciemus. Nam hæc omnia vias dilatant, & lapides deprimunt, nec non doloris vehementiam mitigant. Sed horum usum frequentius assequitur is, qui exploratum habet naturalium facultatum firmitatem: immoderata namque emollitio & laxatio virium robur exoluit: quod solatur, & perfecte curat vniuersum dolorem. Post vomitum autem & enemata, conferet locum qui affectus est, fomentis humectantibus & relaxantibus delinire, quantisper lapis in rene heret: ut interim tamen curemus, ne, ut dictum iam est, is abutamur. Huc faciunt etiam cucurbitulæ, quæ sæpe lapidē celeriter adeo transferunt, ut subitam eius mali leuationem possint comparare, lapide nimirum in locum ampliorem translato: quapropter supra à renibus initium faciendum est, procedendumque ad inguina per obliquam illum positionem, quo loco frequenter dolores incedunt: quod cum institueris, nihil est vtilius quam partes eas in laborantibus prius calfacere, postea cucurbitulas ad mouere: alioqui lapis si cubi maior fuerit inuentus, arctius figitur: cum quod violentius vrgeatur, nonnunquam periculum haud mediocriter doloribus accersit: quare fomentare iam nominatis in sessionibus proderit, si mali communicatio

Amunificatio ad pudenda vsq; processit, atq; id cum scœnogræco, althea, semine lini, anetho, gummi, & similibus, aqua diligenter incoctis & dulci oleo infusis. Conducat etiam emplastrum ex triticea farina, aut hordeacea cum lini semine, & scœnogræco, & melle, & oleo anethino, & glaucino: quæ cum decoctione prædicta elixabimus, inspergentes in ipsa cataplasmatisebullitione, radicem altheæ pulcherrime tusam, & cribro discretam, terebinthinam q; resinam cum desinit feruere decoctum, aliquibus adiectis seminibus, quæ flatus discutiunt, siquam subesse inflationem intelleximus, vt sunt anethi & aprij semina, scœniculum, ligusticum, & alia id genus, pro laborantis temperamento. Fiet autem cataplasma optimum ex lupini farina decocta cum multo, si a decoctione peucedani radicem minutissime leuigatam admisceamus & chamamelum. Bonum etiam fuerit panem musto incoquere, & cataplasma inde lumbis imponere & ilibus. Nec minus proderit vesicam & partem sub vmbilico cataplasmate confirmare ita, vt crebra permutatione alia atque alia subinde admoveamus, priusquam refrigeratum sit primum quodq;. Sin illud non liceat, tepescitorio possumus alio, ne refrigeret, quod impositum est, fouere: quod fiet si pro fomento cataplasmati aquam calidam in vase testaceo vel aneo imponamus. Post alui vero & supra & infra sicut diximus, euacuationem, phlebotomiam, purgationes, fomenta, iniectiones, si dolores adhuc perseverent, vt lotionibus conuenit dulcium aquarum. Aliqui enim vel ante venæ sectionem & reliquam curationem, balnea ad miserunt, propter doloris immanitatem: Aliqui, si nihil esset, qd' vrgeret, post sanguinis missionem & curationē reliquam. Balnea sane humectant & calefaciunt euefugio: calida liquidem aqua lenitionem affert cum calefactione: In quam tamen qui frequentius se dimittit, inescatus lenimento doloris, quod lotio præstat, corporis vires exsoluit: quarum est, quicquid corpus infestat, propulsare. Eam ob rem cum cessauerit dolor, auferenda balnea sunt, & fomenta adhibenda: sed ex medicamentis, quæ patientis naturæ sint accommodatissima. Cæterum si excessu doloris homo periclitetur, commodius erit stupefacientibus succurrere: nam aliter ea nunquam vsurpes, quippe cum dolorem non sedent, sed sua temperatura sensum auferant, ipsum q; fallant: quæ dispositio postea multam curā requirit. Quod si spiritus aliquis crassus, qui vnâ cum calculo morbum exasperet, suspectus nobis fuerit: prædictis fomentis & cataplasmatibus admiscebimus, quæ digerendæ inflationis naturam habent, sicut rutam, anethum, nigellam, & hoc genus alia, diligenter attrita, post perfectam ebullitionem. Sed eadē ad fomenta & enemata aquæ incoquimus absq; contusione. Verum si omnibus his peractis adhuc lapides fixi permancant, à multis cibis atq; potionibus laborantem abstinēbimus, & ijs, quæ ipsius naturæ sunt minus conuenientia: ne venter repletus, grauatus, inflatus q; ciborum succorumue aut flatuum copia, repletionem hac renes premat, & violentiā prosequatur. Sint vero quibus vtitur, omnia modica, & laborantis naturę tum qualitate, tum quantitate accommodata. Veruntamen si laborantis natura calidior esset, & litis vehementior, vacuato prius toto corpore & ab excrementis repurgato, si qui frigidam bibere essent consueti, & phlegmone nullum viscus laboraret, nec esset imbecille: frigidam sepe copiose exhibuimus, renibus ita corroboratis, euefugio lapidem impactum expulerunt. In corporibus autem plethoricis, id est quæ succorum quatuor multitudine æqualiter redundant, & excrementosis, & in quibus viscus aliquod debilitate affectū est, & ea sorte alijs, frigide potionem cauere conuenit. Cæterum si & post hæc omnia, quæ diximus, lapis adhuc firmiter resistat, vtendum est medicaminibus quibus conteratur, quæ tepidam facultatem habeant. Nam calida urinam prouocantia indurant lapidem: quæ vero tepidam virtutem habent, paulatim comminuunt lapidem, nec eum duriores reddunt: eiusmodi sunt damasonium, petrolelinum, polytrichon, & his similia. Sed forsan dubitaret aliquis, quomodo lapidem possint comminuere, quæ tepidam facultatem habent: Cui nos respondemus. Lapis ille cum ab intemperie & valido calore sit factus, ob id merito exhibemus, quæ virtutem tepidam obtinent, vt quæ contraria ijs sint, à quibus lapis est defectus. Sic enim multo tempore attenuamus, conterimus, & superamus ipsum. Quippe tepida, ceu minus calida, sunt valde calidis contraria. Diureticis ergo & valde calidis vti non poteris, ne crassam materiam eo pacto indures, & in lapidem celerrime commutes. Cū vero lapis nondum constitit, neq; magnus est, sed tantum obstruētio fit ab arenis, vel crassis & tenacibus succis: tunc calida secure porrigas, & quæ obstruēctiones aperiant, haud veritus vt lapidescat materia. Cū nāq; arene sint, quæ obstruunt, si porrigas, quæ aperiant, & calida, qualia sunt medicamentum ex aniso, ex pipere, apium, phu, & similitum aliquid: euacuabis & dissolues eas.

De ratione Præcauendi ab Affectionibus Renum.

CAP. 5.

AD prædicta vero breuiter delibandum est, quomodo quis se à lapide præseruet, ne qui iam curati sunt, eos noua lapidis generatio rursus perturbet. Quoniam autem eorum qui calculo infestantur, sanabiles sunt alij, alij minime: In præseruando maximi sunt momenti ciborum moderatio, & bonæ coctiones. Satietales enim & cruditates hunc morbum non exacerbant modo, sed etiam pariunt, vbi nullus erat. Quapropter nihil est feruens ingerendum, quod renes possit & vesicam calefacere. Nec minus cauendum à cibis est, qui duram substantiam habent, & qui egre diuiduntur: qui q; substantiam habent pleniorē, & qui multum nutriunt, tum qui celeriter in corpus distribuuntur ante perfectam concoctionem: item qui innatant, difficulter q; descendunt, & insistant,

& inflant, ac vias oblimant, aut aliter corporibus adhærescunt pertinacius. Nam ventriculus tali-
 bus alimentis grauatus, cruda hæc ad iecur & renes detrudit: incoctum autem alimentum à ventri-
 culo confertim illuc expulsum praeue excolatur, atq; cum tumultu semel atq; iterum per renes tran-
 siens, in lapides concrefcit obrenis diuturnam percussione. Sed ad victus rationem transe-
 mus. Vinum itaq; sit tenue admodum & album, non valde vetus: dulcia vero & nigra vina calcu-
 losis sunt inepta. Aqua vero in vniuersa victus ratione sit purissima & purgata: nam fluuiales, pa-
 lustres, & omnes aquæ stagnantes, quæq; segniter fluunt, & non commouentur, omnes genera-
 re lapidem possunt. Atq; vt paucis de omni victus ratione præcipiam, in frigidis & carnosis, dig-
 ta sit planè extenuans: in calidis & gracilibus media sit inter extenuantia & crassefacientia. Ab
 aliorum omnium saturitate cauere conuenit, & præcipue dulcium, & caseaceorum nutrimento-
 rum, & crassorum, & tenacium, & pinguium. Cruditatem q; ideo aduersissimam esse putandum
 est: in quam si calculosorum aliquis incidat, somno diutius aut quieti prorsus indulgeat: præcor-
 dia q; proprijs manibus calfaciat, donec concocta rite omnia sint, & infra sublidant. Locis tempe-
 ratis & in aere puro fiant exercitia ab his quibus liberum tempus est. Irascantur interdum. Deam-
 bulationes & exercitia laborantis naturæ conueniant. est enim desidria in primis noxia. Sit alius
 soluta assidue, modo ne insit aliud quippiam. cum nanque hæc probe excernit, vrinæ profluent **F**
 libere. Vnctionibus si oportet vri, quando oportet vri, sint quæ contra locorum iniuriam queant
 corpus communire: vt sunt rubrificationes, dropaces, & quæ ex linapi fiunt. Aquarum enā spon-
 te natarum, vsus prodest, cum nihil prohibet. Considerare etiam accurate debes de sanguine mit-
 tendo cum tempus adest, si corpus sanguine plenum videatur. Exundans enim nisi euacues, con-
 fluet in partem imbecilliolem. Sed purgatione vri præstiterit in his qui malis succis sunt repleti.
 nam eos qui inordinate degunt, & succum crudum in superiori ventriculo multum colligunt, à
 cœna frequenter vomere facito, nisi sit quamobrem prætermittant. Post prouidentiam, quæ toti
 corpori adhibetur, offerre conuenit medica menta, quæ renes purgent: sicut quæ obstructions
 aperiunt, quæ vrinas crassissimas, viscosas, foetidas, & multas, à venis, renibus, vrinæ meatibus, atq;
 velica educunt: quo numero sunt radicis cardui decoctū, & alia prædicta. Sape etiam magno vsui
 sunt, quæ vrinā mouent. Hæc vt omnes homines communiter moneremus, non vt exquisitam
 disciplinam traderemus, sunt à nobis exposita. Quamobrem tibi gratia est habenda, quoniā per
 te sunt omnia tradita. Porro constat ab vnica dispositionis indicatione, parari perfectam & ex-
 quisitam curationem non posse: sed indigere nos alijs adhuc, quæ ab eo genere non sint aliena:
 hinc est, quod commonefacere de illis etiam aliquid operæpretium putemus. Variatur enim me- **G**
 dicatio pro diuersis causis, ætatibus, locis, anni temporibus habitibus q; & dispositionibus, mor-
 ribus & consuetudinibus, temperamentis, sensus facilitate & difficultate, partium differentijs, po-
 sitionibus, alijs q; id genus compluribus. quamobrem opus est optimū medicum diligenter id
 nosse, quod secundum naturam est. Qui nanq; id, quod secundum naturam est, exquilitate perspe-
 xit: celerius cognoscet id quod est præter naturam. Neq; enim prædictæ causæ solummodo me-
 dicationē variant, sed proprii quoq; naturarum modi, propter quos medicamenta, vel plurimum
 probata sæpe nihil conducunt atq; fallunt. quapropter obseruare conuenit. Et nisi curationi ob-
 temperent, vel ob naturæ proprietatem, vel affectus apparatus, vel aliud quippiam: his relictis,
 ad alia quæ vtilia planè sunt, transire necessarium est. Id quod faciendum non tantum in medica-
 mentis est, sed & alijs omnibus tum auxilijs, tum viuendi institutis. Verum memoratas hic pro-
 prietates, alia q; complura, quæ dicta non sunt, non omnes qui ad medicinæ sacraria accesserunt
 (licet sint alioqui argutissimi) sed qui semper ægris assistent, & explorabunt naturæ motus, asse-
 quentur. Proinde si ob latentem aliquam & propriam causam, artificiali cuiusquam coniecturæ,
 medicamenta non respondeant, oportebit propter vrgentem vehementiæ necessitatem, ad ea quæ
 veteres obseruatione tradiderunt, & quæ à tota substantia operantur, descendere: Ea dico, quæ **H**
 experimento, & exercitatione irrationali sunt reperta: quod genus sunt passer troglodytes, lepo-
 rina pellis combusta, sanguis hircinus, & alia infinita tam simplicia, quam composita medica-
 menta. Quorum multa abominanda sunt, quæ exercitatio irrationalis inuenit: vel natura, vel for-
 tuna quadam, vel obiter nō data opera, vel imitatione, vel insomnio, vel oraculis, vel traditione,
 vel alijs quibusdam, ex quibus empirice constat. Quæ omnia cum ratione indiscussa nostro tem-
 pore sint, nō ponemus magnam in eis fiduciam, quia modum vtilitatis illorū ignoramus. Quod
 si aliquādo cogente aliqua necessitate adhibeamus, non debemus his abuti, ne quemadmodum
 absq; comperta & manifesta causa iuuarunt, ita vicissim offendant. Qui nanq; volet esse præcla-
 rus medicus, & ratione quæque, non temere agere: circa qualitates effectrices, & operationes de-
 bet versari, & in eis fiduciam ponere: quippe qui sic methodo compertum habeat calidi & frigi-
 di, humidi & sicci effectus, item acerborum, austerorum, acidorum, dulcium, salforum, amaro-
 rum, acrium, & omni qualitate carentium. nec ignoret, quem effectum præstent, quæ crassarum
 sunt partium, quæ tenuium, quæ obstructions aperiant, quæ attrahunt, quæ emplastica sunt, &
 alia quoque sigillatim. Enimvero vt plurimum ratio constat lapides conerentis materiæ, has vt
 magis decens est, quam quorum ratio cognita non est, veluti damafonio, petroselino, polytricho,
 & simili-

A & similibus his virtute, quæ probatiora etiam eo sunt, quod tepida facultate consent. Verum si tandem calibus ita deploratis, & hæc frustra admoueris, non absurdum erit nos Christianos (sic Deo rem committas) ad maxima nostra & vere arcana confugere: quibus ego quidē & credo & confiteor, non corporis solum affectus, & à quibus omnes medici desperarint perferari, sed oēs etiā animi passiones funditus extirpari. Reliquū sermonē ad te peculiariter, tanq̃ hypothelīm cōuertā.

De Alimentis quæ Calculorum morbis conueniunt.

CAP. 6.

Cum multa sint, quæ restaurare sanitatem possunt, mihi ab alimento necessario incipiendum videtur: nam alijs auxilijs non semper vtitur, sed alimento carere nullum animal planē potest, siue valeat, siue egrotet. Quoniam vero tutior est & compendiosissima via ad affectus leuationem vnica victus ratio: quandoquidem aliorum medicamentorum abusus ad affectus leuationem, sicut comperi, multis sepe non leues morbos pepererunt: tu animæ meæ Sol, qui calidius es & humidius temperamentum sortitus, & ætatem puerilem, vires q̃ nō ita robustas, habitum gracilem & rarum, & facilem insuper ad percipienda incommoda sensationem: Ob temperaturam, ætatem, habitum, & raritatem, assumere debes horum qualitati similia in nutrimentis ciborum & potuū, & quæ valeas concoquere: Ob debilitatem autem virtutis pauca, & eo sepius: pauca quidem, debi-

Blītatis viriū gratia, nā onus ferenti conueniat oportet: sapius vero, quia necessitas vrget. Athletæ enim, viatores, milites, & omnes qui valida exercitiā obeunt, modo valeant inculcate, astinere à nullis debent, vel cibis, vel potibus, quæ ad manum sunt, vel quæ occasio præstitit, quia vii ijs oportet, quæ est necessitas elargita. Quibus non solum viuere ita licet, sed & his qui negocijs urbanis plurimum distrahantur, & patroni aut vindices propugnandis clientibus negociolius degunt. Tu vero, qui nunc tui iuris es, hyeme comedes plurima: plurima dico non ad tuas vires, sed aliorum anni temporum respectu. Quemadmodum & Hippocrates artis nostræ princeps inquit, || Æstate & autumnō cibos difficillime ferunt, hyeme facillime, ver secundo loco est.

Idem rursus alibi ait, || Ventres hyeme & vere calidissimi sunt natura, & somni longissimi. In his itaq̃ temporibus alimenta plura tribuenda sunt: siquidem calor innatus multus est, ideo pleniori alimento indigent. Indicio sunt grates & athlete. Bibes autem aliorum anni temporum compa-
ratione minimum: debet q̃ potus esse album & tenue vinum, quod admodum vetus non sit. Sed & obsonia hoc tempore alla debent esse vt plurimum. Vtēdum q̃ oleribus & leguminibus tum parcissime est. Et hæc omnia magna ex parte calida & sicca non propter temperiem etatem q̃ tuam assumes, sed propter intemperiem, quæ ex anni tempore frigida & humida est. Post vbi ver-

Caduenerit, potus vberior, dilutior q̃ parum conducet, & esculenta molliora pauciora q̃. Quin & obsonia ex assis ad elixa commutabis, olera q̃ non nunquam assumes. Verum ad hæc ab illis non subito, sed paulatim tibi transeundum est, ne vniuersa illa & subita mutatio comparet offensam: sicut traditum ab Hippocrate est, || Plurimum atq̃ repente euacuare, vel replere, vel calfacere, vel refrigerare, siue quouis alio modo corpus mouere, periculosum, quoniam omne nimium est nature inimicum: quod vero paulatim fit, tutum est, cum aliās, tum vero cum ab alio ad aliud transi-
tur. Vberiore vero & aquosiore potum præcipio, non plurimum, neque aquosissimum. Plurimum enim & aquosissimum æstate bibitur, quod tempus hiemi planē contrarium est. Ver autem sicut medio loco est inter hæc duo extrema, ita mediam quoque rationem viuendi requirit. Hæc autem viuendi ratio tibi conducit non ob anni tempus solum, sed ob tuam etiam temperaturam atq̃ ætatem. Et hunc in modum, verno tempore te geres. Alijs autem anni temporibus paulo diuersius, non propter ætatem tuam & temperaturam solum, sed & anni temporum intemperiem.

Sicut vero anni temporum differentiæ non eandem victus rationem demonstrant, ita & corporis habitus. Carnosos siquidem & molles, frigidos q̃ & humidos, vt plurimum siccus alimentū confirmat: qui contrario modo se habent, contrarium. Tibi itaque, quia medio es & temperato

Dhabitu, maiori tempore victus ratio temperata conueniet. Quæ nanq̃ secundum naturam sunt, vt plurimum similibus indigent: quæ præter naturam, contrarijs. Puerorum temperamentum calidum est & humidum, cum non possit auctio & conformatio in alia temperatura fieri, quàm puerili. Ob hoc igitur similia te oportet & multa nutrimenta vsurpare, vt multa & varia concoquere assuescas: quippe hac ratione natura ventrē & iecur ampla & capacia formabit, & alias vnā oēs partes. Quod si quando tibi plus humiditatis q̃ pro sanitate conueniat, aderit, liccari tamen non vt alij debes, propterea, q̃ auctiori nihil æque aduersetur ac liccitas. Hac de causa vitanda tibi sunt quæcunq̃ exiccant, calefaciunt, & extenuant. Atq̃ hic modus est, quo vitam insituas, vt tua natura valeat inculpatius. Senes autē propter membrorum quidem duritiem, frigidi sunt & sicci: propter excrementa vero, frigidi & humidi. Itaque ipsi partium quidem solidarum frigiditate, contrariorum contraria postulabunt (nempe frigiditatis calefactionem) in cibarijs poculentis & reliqua viuendi ratione: euacuationem vero illis ipsis accommodam, propter eadem excrementa. In his paucum nutrimentum desideratur, ob virtutis imbecillitatē, id quod est ab Hippocrate tra-

Editum: || Qui crescunt, plurimum habent innati calidi: plurimo igitur egent alimento, alioqui corpus absumitur. Senibus vero parum innati caloris inest, paucis propterea fomenti indigent. Et rursus: || Senes facillime ieiunium ferunt. Panes differunt materia, fermentatione, & ratione co-

quendi.

† xgi τὸ καλὸν
μὴν πρὸς
ἐκ τῆς βίῃς.
Vid. Cl. 1. 39. h

1. Aph. 18. Ex.
or. 9 c

1. Aph. 15. Ex.
or. 8. a

2. Aph. 51. Ex.
or. 19. c

1. Aph. 14. Ex.
or. 7. a

1. Aph. 13. Ex.
or. 6. g.

DE RENV M AFFECT V S

quendi. Materia differentia sunt quatuor: ac primus quidem *σιλιγνίτης* græce, id est filigineus, E nominatur. secundus *σιμιδ αλίτης*, latine similagineus dicitur. tertius *αυτόπυρος*, quem *συγκόμης* quoq; Græci nominauerunt, quod ex farina vniuersa comportata, non discussis fursuribus, conficitur. quartus *πιτυρίας*, ac si fursuraceum diceret latine. Horum nos incommoda atq; effectus edocebimus. Plurimi est alimenti filigineus, qui & diutissime in corpore moratur, & efficacissimus est. secundum locum obtinet similagineus. inferior his est syncomistos, ita vt haberi medius possit. oibus infirmior est fursuraceus. Tibi vero, vnicū mihi caput, cū vales, commodissimus filigineus est: cū renū morbus infestat, qd' nolim, dum laboras ab hoc abstinere: & si te moueat edendi desiderium, fursuraceis vti medijs q; tuto poteris. Nam conducibilis tibi esse genus hoc potest, nisi prohibeat aliquid, quia pauci nutrimenti est, & in ventre facit excrementa, quibus ad excretionem descendit expeditius: astringit q; nō nihil ex fursuris natura, quamobrem ocysus deijcitur, intestinis ad expulsionem iritatis. Quando in hoc affectu nihil perinde conducit, atq; ventrem semper lenem & solubilem habere: cum enim probe is subducitur, vrinae possunt puriores proferri. Panes reliqui, maxime q; filigineus & similagineus, contrario modo aluum retinent, quia difficulter discernuntur. Et hinc est, quod iecoris & renum obstructions pariant: tamet si alibiliores sint & magis corroborant. E' volucris laudantur, quæ mediam quandam materiam præstant extenuantium & crassefacientium: vt sunt perdices, attagines, galli, gallinæ, columbæ, phasiani, passeris, & ante alias, quæ turritæ nominantur. hæ nanq; habent naturalem efficaciam. E' terrestribus optimi succi est caro suilla, & hominibus maximopere familiaris, maxime q; tum nutribilis, tum corroborans: sed glutinosum quiddam habet & crassum: ob id qui diutius ea viciant, iecoris & renum obstructione corripiuntur: eo q; longiori ab ea interuallo abstinendum. Paruorum autem porcellorum carnibus si parum, & assidue vtaris, nihil offendit. Ceruinam carnem vitabis, quippe, quæ dura sit, concoctu difficilis, & melancholica. Ouilla carne vtilius est ex interuallis vti, q; excrementosa sit & mali succi. Agnorum vero hœdorum q; carnibus quoties libitum fuerit, vteris. Ex aquatilibus animalibus, pisces qui saxatiles nominantur, erunt tibi comesti vtilis: erunt et gobij, muli, chartilagineorum genus, alij que qui generare bonum succum possunt. Ad hæc marinorum alij, & qui mollem testam habent: Astaci, paguri, cancri, carabi, & carabides & quibus dura testa est. De fructibus autem quid dicam: neque enim nobis ceu alimentum idonei sunt plerique ipsorum: sed ceu medicamenta, quæ stomachum & ventriculum corroborant, assumuntur. De cibarijs hætenus. De potu autem dicendum nunc est, & vino potissimum: nam alij liquores vel ad nutritionem nihil conferunt, vel aduersantur etiam nutritioni plerumq;. Vinū vero so- G lū nutrit, quoniam plus habet ad nostra corpora familiaritatis, quàm alij humores oēs. nam oleū & mel habent quidem & ipsa aliquid conuenientia nobiscum, sed non tantum, quantum vinum. Sunt tamen vini differentia quibus discernatur: inter quas prima est, quæ color exhibet: Secundā præbet degustata qualitas: Tertiā consistētiā debetur: Quarta in odore est: Quintam viribus metimur. De quibus omnibus singulatim differere superuacuum erat: dicendumq; est, quodnam tibi vinum peculiariter conducatur. Aliud etenim alij vinum confert, idemq; rursus alij minus. Tibi vero conducit tenue & album vinum, quod q; parum aquæ sustineat. Nam eiusmodi vinum facile descendit, & succos qui sunt in nobis attenuat, & excernit per vrinas, virtutem q; corroborat. Alia vina tibi non conferunt, sicut in alijs vtilia sunt.

De Aqua, Exercitatione, & Lotione.

CAP. 7.

Non videtur ab re, de aqua paucis hic sermonem facere. Aqua tam sanis, quàm ægrotantibus commune solatium est, & maximopere necessaria, quod mundanorum & singularium elementorum hoc vnum sit, ex quibus vniuersis tota nostri corporis constitutio est conflata. Quamobrem de ea fuero haud ociose dicturus. Aqua purissima tribus sensibus iudicatur, gustu, visu, olfactu: Gustu, si nullam planè qualitatem præ se ferat, sed videatur ab omni qualitate immunis: H Visu, si pura, sincera, & exquisita clara: Olfactu si eorum nihil inest, quæ in aquis vitiosis esse olfactus testatur: vt sunt aciditas, putredo, acredo, falsedo, aliquid ue aliud vitium, quod nomine careat. Quæ tu autem commodè quouis & tempore & modo vti possis aqua, sit purissima defæcata, leuis, & fontana, cuius natura est frigida. q; si etiam cito à præcordijs descendit, potiorem non desiderabis. Haud vero sicut vino, cibis, exercitijs, vigilijs, & somno, secundum etatum & temperaturarum diuersitatem alijs atque alijs vti commodum est: sic etiam aqua non eadem semper vti est ex usu: Immo quam vtilem esse modo diximus, ea vti audacter poteris, & puer, & adolescens, & senex, quacūq; nature differentia sis præditus. Quoniā vero aqua vna plus alia frigida reperitur, hæc de causa non omnibus prodest aquæ frigida potu indifferenter vti: verum supra modum calidis, pinguibus, & carnolis siue naturali habitu siue acquisito, & his qui se vehementer exercent, qui q; consueuerunt frigidam potare, innocua est si frigidā bibant. Quod si aliter aliqui se habeant, minus bibant ex ea, qui vero iuuenili sunt ætate, & in rebus ciuilibus versantur negociolius, quā vt exerceri ordinate & viciare queant, fontanam sument, relicta niuali aqua. Hæc nanq; tamet si iuuenilia corpora mox offendere non videtur, noxa videlicet, quæ paulatim increfcit, non percepta: tempore tamen procedēti, cum ætas declinat, difficulter sanabiles aut incurabiles planè mor-
bos

A bos inducere nata est, in nervis, articulis, & visceribus. Quam offensionem pars aliqua corporis percipit, quæcunq; debilissima est natura. Quam ob rem vti debes fontana, & ea defæcata, de qua plus assumes, quàm de vino. Ac de aqua quidem breuibus hætenus. Tempus nunc est, vt de exercitationibus verba faciam. In quibus corpus contentiosius mouendum non est, donec videlicet vires succumbant. nec imperfecte exercitandum, vt membra perspiratione non satis distrahantur: sed vt viribus cuiusq; proportionem respondeat. Quippe vehementia relatione ad aliquid est: quo fit, vt dimotio eadem alij sit exercitatio, alij minime. Vtile est igitur quæq; id exercitationis genus eligere, cui est potissimum assuefactus: nec pugilum, cursorum, & luctatorum exercitationem subire. Ab exercitatione vero tria in primis commoda proueniunt: nam instrumentorū duritiam, dum inuicem conflitantur, & innati caloris incrementum, concitatioꝛē q; spiritus motum efficit: Quæ tria vniuersæ commoditates aliæ singillatim sequuntur: Instrumentorum namq; duritiam sequitur firmitas, atq; immunitas ab iniurijs, quæ vndecunq; in corpore expectantur: Augmentum caloris sequitur fortis alimenti distribuendi attractio, & promptior alteratio, & commodior nutritio, & excrementorum fulio, per quam dura quidem membra molliuntur, humentia vero extenuantur & digeruntur, meatus q; totius corporis dilatantur & patefcunt: Ex valido **B** autem spiritus motu eosdem meatus purgari necesse est, & euacuari superflua excrementa. Cum vero nobis ab exercitatione commoditates tantæ accedant, commodum earum vtendarum tempus inuenire difficile non est. Nam cum alimentorum distributionem adiuuent, nullam oportet multitudinem crudorum, neq; ciborum, neq; humorum, vel circa ventrem, vel mesaraicas, vel iecur, vel reliqua vasa contineri, quia periculum esset, ne effunderentur ad omnes corporis partes, priusquam concocta fierent nutritioni vtilia. Et quia meatus expurgant, euacuant q; superfluitates, melius est ante cibū eas instituere. ¶ Corpora enim nō pura (inquit Hippocrates) quanto magis nutries, tanto magis lædes. Quare ex prædictis clarum est, hoc tempus exercitationibus admodum conuenire. Illud præcipue curandum in quocunq; exercitationis genere, vt fiat in loco salubri & aere puro. Sed hæc de exercitationibus dicta sufficiant. Crebris autem lotionibus vtēre, temperatis & breuibus, non propter egritudinem, sed quod ad auctiōem tuam, nutritionem, conformationem q; faciant. Cui rei optimum erit tempus, cum nutrimentum hesternum perfectē concoctum est & subsedit, alia q; iam nutrimenti necessitas impendet: item cum & in iecore, & venis celebrata concoctio fuerit. Id quod sciet medicus qui tibi assidet, & tui perpetuo curam gerit. Nempe ventris exquisitam concoctionem ex deiectionibus: lecoris & venosi generis ex naturalibus vrinis. Vnde constat tibi à cibo lauandum non esse, ne obstructio circa iecur & renes eueniat. Cauebis etiam vini assumptionem protinus à balneis, nam vino caput tentatur: vt conducibilius sit primo temperatam aquam assumere. Igitur non frigida aqua, non vini, non zythi, vel licera potus mox cum laueris, damno carebit: quippe quæ & ipsa ventriculum, iecur, & nervos offendant: si non temperie, cōtactu saltem. Profuerit insuper tibi non statim vbi à somno surrexeris lauare, sed aliqua dimotione interpolita: nōnunquam etiam mediocri exercitio. Nam exercitia moderata atque idonea, tuæ naturæ sunt vtilia, quod concoctionem, sanguificationem, & nutritionem meliorem operentur: & ob id ad bonum habitum, idest eutrophian, & ad virium robur, & ad perfectam tertiæ concoctionis actionem conferunt. Sed de his hæc quoq; sufficiant.

1. Apho. 10. Ex.
or. 12. c

Ordo vniuersæ Curationis ante traditæ.

CAP. S.

PRoinde si te calculorum passio repēte inuaserit, si cibum nuper assumpseris, & nauseam præsentiscas: totum euomito, siue id naturaliter facias, siue arte adiutus, vtrocunq; modo visum tuo medico fuerit: postea somno te committes. Cum q; aliqua in aluo indurata iam excrementa harere suspicatus fueris, clystere hæc nisi quid prohibeat, vacuentur. Quod si dolor intolerabiliter affligit, in aquam calidam te dimitte. Veruntamen ne ipsa, sicut paulo ante ostendimus, abutere: nam calida perfusio dolorem mitigat quidem, sed vires etiam exoluit, quæ morbi causam, & quicquid in corpore inutile est, discutiunt. Post vomitus & enemata, fomentis & emplastris laborantem particulam delinias: atq; id ex medicamentis, quæ naturæ agrotantis conueniant. At si lapis defixus in rene subsisteret, acetum, saccharum, acetum scilliticum, & quæ lapidem simpliciter conterunt, assumere oportet, sicut est decoctum radicis graminis, damasonij, adianti, polytrichi, & similium. Quæ si inefficaces videantur, ijs quæ lapidem frangūt vti poteris, quales sunt regalium asparagorum radices, bdellium ex Arabia aduectum, semen altheæ, milium solis, betonica, saxifragia, pulegium, capparis ægyptiæ radix, domesticarum ficuum semina, & quæ istorum viribus sunt propinqua. Quod si aliquo pacto ne hæc quidem proficiant, vtendum putarim medicamentis, quæ lapidem potenter frangendi virtutem habeant. Potenter vero diuidunt lapidem, lapis iudaicus (& si calculum in renibus fixum est masculo: sin in vesica hæreat, & ob magnitudinem excerni haud possit, foemineo lapide vtaris. Nam masculus, lapidem qui in renibus est frangit: foemineus, qui in vesica) vitrum combustum, lapis cappadox, & palmi semen. Hæc sunt, quæ calculum violentius frangunt. Si vero crassus succus in corpore subest, & vinarum crassarum euacuatione sit opus: crallam vrinā agunt cardui radix, rubia, & similia. Quod si frequentes vrinæ

nas

DE RENVM AFFECTVS DIGN. ET MED.

† κατακρη-
σασθαι.

nas ducere opus fuerit, frequentes vrinas ducent acorus, pastinaca, asparum, ammi, & similia. E Quod si natura in deponenda vrina pigra fuerit, ipsam excitabunt, scordiū, chamedaphne, bryoniae cauliculi, & quæ viribus sunt ad hanc rem paribus. Quæ vero mouendæ vrinæ naturam habent, ea periculosius lapidem pellunt: temperatura nanque sunt acri, & ob id calida & sicca, insuper quæ nature colligentis & segregantis collectam serositatem. Sed quæ ignitas constitutiones in se non habent, rumpendo lapidi sunt magis idonea, quia incidunt opportune, & minimam caliditatem obtinent. Caliditas autem exiccando porrum colligit, non incidit aut diuidit. Quapropter quæ minus calida cum hoc, quod incidendi facultatem habent, sunt meliora. Quæ vero vrinam mouent, calida sunt & sicca, atque acra, quamobrem secernunt quidem serosum sanguinem: sed quæ quid in se crassius ille habet, id cogunt & compingunt. Propterea ijs qui calculorum morbo sunt affecti, apponi non debent. Hæc tamen, si veluti ductoribus & vectoribus ad locum affectum vli quandoque fuerimus, proderunt. Ceterum post lapidis excretionem, {medicamentis} vtendum est opportunis † {ad reficiendum & colligendum,} quæ morfu, asperitate, & feruore descendens calculus exulcerauit: præsertim, si magnus atque angulosus is fuit. Postea vbi corpus ex colligentium {medicamentorum} beneficio, satis collectum agnoueris, tum & foris & intus præseruantia admouebas. Sed ne in hoc rei summam esse putemus. Immo quantisper ad prouidentiam hanc F opera datur, tantisper conferentibus tam cibis quam potibus, & quæ concoquere valeas, vtaris. Ex nutrimentis enim & potibus, quæ naturæ tuæ conueniunt, balneis quæ, & exercitijs atque similibus, virtutes singulariter corroborantur: sicut inuicem ex illorum contrarijs debilitantur & dericiuntur. Hinc est quod propter virium erectionem & vigorem, usus similium maxime desiderentur. Viribus etenim roboratis & confirmatis, tantum momentum ad morbi generationem habere nihil potest, quin ab ijs illico profligetur. Quod adeo verum est, vt nihil subesse in vniuerso corpore inutile eadem patiantur. Hæc sunt pauca, quæ non equidem iniustam hac de re institutionem, sed breuem submonitionem sedulo tuus minister tibi offero. Quod ad perfectam de his omnibus traditionem attinet, id nobis vetustissimi sapientiæ professores diligenter prosecuti exhibuerunt. Quod restat, medicus qui tibi à latere est, & curam tuam perpetuo gerit, meus conseruus & hæc, & veterum scripta, & tuæ naturæ conuenientia me magis & alijs omnibus, quantum homini permissum est, prospexit ex ijs, quæ edoctus iam est, & ex naturæ tuæ exprompta cognitione perspiciet. Ei te ergo solum committas, nam ita te ille (quod Deo teste affirmare aulam) sedulo curat, vt quisquam alius curare omnino possit. Quandoquidem is, cui natura hominis alicuius perspecta sic est, vt quid secundum naturam in ea sit exploratum habeat: expeditius alijs omnibus G cognoscat, quid præter naturam eidem acciderit. At quanquam animus erat disceptationem logicam de paucis quibusdam in medium asferre, id tamen referuandum in aliud tempus videtur, nam in præsentia locum habere non possunt. Cuiusmodi est, quinam ab hoc affectu liberari possint, qui liberari non possint, & an lapsus hic causa sit, an morbus, an morbi symptoma. Et, si est causa, præincipiens ne sit, an antecedens, an coniuncta: Id quæ simularium, an instrumentorum, an vtrorumque. Iam si morbus est, an similis sit, an instrumentalis, an communis. Si symptoma, actio ne sit læsa, an excernatur quod retinendum erat, vel retineatur quod excernendum.

An affectus sit quidam, an vtrumque illi
sic acciderit, vt & causa sit &
morbus, & symptoma.



GALENI IN HIPPOCRATEM DE OFFICINA MEDICI

COMMENTARIUS PRIMVS

Vido Vidio Florentino interprete.

ARGVMENTVM PRIMI LIBRI

Communi vniuscuiusque artis Dignotione constituta, docet, ex quibus constet: quibusque munus eius Medicinæ compleatur, quæ manuum opera exercetur. Liber autem hic de iis quæ in Medicatrina fiunt, aut Hippocratis, aut Thessali eius filij, Galeno teste est, ad memoriam magis, quàm ad editionem compositus.

D



Pus hoc ad medicum pertinens inscripsit /de officina medici/: satis autem fuerat /de iis, quæ in officina medici/, sicut non nulli Dioclis, Philotimi, & Mantix opera inscribunt. Nam, cum singuli horum de eadem re libros confecerint, legitur quidem in plerisque inscriptio sine præpositione atque pronomine /officina medici/: in paucis autem præpositis illis /de iis, quæ in officina medici/. Sed eorum volumina præceptis plena sunt: Hippocrates verò, ubi in suo libro ea recensuit, quæ medicinam manu curantem perficiunt, fasciandi rationem exequitur, cui voluit medicum primo assuefieri: quæ res in ligno, quod in hominis speciem exculptū sit, vel certè in puerili corpore fieri potest. Hæc liber ipse priusquam singularum partium explicationem aggredere, præfari me coegit: iam venio ad ea, quæ me impellit non liber, sed quicumque maiorum scripturam promptè im-

Septima Classis.

CCCCCCC

mutat,

mutat, ad quamcunque sententiam voluerit, ipsam traducens. Quidam igitur conati sunt vetustissima volumina inuenire, trecentos abhinc annos scripta, quæ partim habent in chartis, partim in libris, partim in membranis, sicut Pergami apud nos videre licet. Constitui ego omnia æstimator, quæ tradita à primis expositoribus fuerunt, ut de plurimis ac maximè fide dignis, germanam scripturam comperirem: quod mihi longè melius cessit, atque putaueram: nam omnibus ferè tum exemplis, tum expositorum commentariis, animaduerti inter se conuenire, ita, ut admiratus fuerim audaciam eorum, qui vel nuper exponunt, vel suo iure omnia Hippocratis volumina edunt, quemadmodum Dioscorides, & Artemidorus, qui Capito cognominatus est, qui complura in vetustissimis scripturis innouarunt. Sed longius labi mihi videor explicando, si scripturæ cuiuslibet fecero mentionem: melius igitur duxi antiquas solùm adscribere, paucis quibusdā, quæ immutata paulum fuerunt, adiectis, de quibus præsertim cōueniat inter eos, qui ante libros enodauerint, qui, cum quatuor sint, duo, Zeuxis & Heraclides omnia Hippocratis opera explicarunt: at non omnia, sed obscura tantum, Bacchius & Asclepiades. Ac de his quidē hætenus, quo tamen clariùs exordium sit, à principio repetentes breuissimè agemus, quasi nihil præfati.

Liber Hippocratis, qui de officina medici/ inscribitur, primò totius artis commune procemium habet, ut mox indicabo: atque ea de causa non nulli ante omnes libros iure legendum esse existimarunt, quippe, qui talem docendi viam polliceantur, qualem in suis libris, quos primas institutiones appellant, recentiores aliqui tradiderunt, proximè à communi procemio subiicit, quæ medicinalem artem nunc primum addiscentibus vtilissima sint, ex iis, quæ in officina medici fieri possunt. Quam rem ita esse liquidò constabit, si ad verborum ipsorum enodationem animum adiunxeris.

1. *An similia, an dissimilia, principio à maximis, à facillimis, à quibuscunque, quomodocunque cognitis.*

Sive quis benè valere, siue bonam valetudinem, siue aliud quid tale, medicinalis artis finem constituat, hunc ipsum propter se student, qui in hac arte versantur. Neque vlli dubium est, quin contemplatio quædam sit, cui operam dare oporteat eum, qui restituere velit (vbi corruptatur) naturalem nostrum siue habitum, siue administrationem, seu structuram, seu quod est aliud verbum, quo placeat nominare: at non propter se cætera omnia, quæ ad artem spectant, addiscimus, docemus, aut denique audimus, sed quod ad finem singula eorum conducant. Quemadmodum in proposito sermone eam partem, quæ ad indicia pertinet (recentiores græci *σημειωτικὴν* dicunt) tractari necesse est, quibus rectè mederi propositum est, antequam eam, quæ curat, aggrediantur, ut, quum simile quid nacti fuerint, morborum discrimina ad vnguem in ægrotantibus teneant. Nihil autem in sequentibus intererit, habitum nostrorum corporum naturali administrationi contrarium, morbi vel affectus vocabulo nuncupare, sicut græci omnes consueuerunt, interdum *νόσημα*, interdum *πάθος*, genus hoc vniuersum appellantes. Nunc igitur docet, partis, quæ ad indicia spectat, maximè generale propositum, quemadmodum fit in parte, quæ medetur. nam sicut in hac curationis cuiusque commune consilium est contrariis per contraria subuenire: ita in illa posse cognoscere, quatenus ea, quæ in affecto corpore conspiciuntur, benè admodum valentis sunt similia. Quod Hippocrates ipse in prognosticis indicauit, cum inquit, ¶ Maximè ad rem pertinet intueri, an sibi quis ipse aliqua ex parte similis sit/. Idem in libro quoque de articulis proposuit, quum vitiatam corporis partem ad eam, quæ integra est, conferri iussit: vbi similiter voluit non simpliciter comparari, sed affecti hominis dextram partem cum sinistra conferri, nihil alienis articulis, hoc est aliorum hominum inspectis. Quod etiam nunc faciendum duxit, cum ait /an similia, an dissimilia, principio à maximis, à facillimis/ ac si ita dixisset, laborantium corpora ab initio protinus inspicere debent, quatenus similia sint sanis, quatenus dissimilia. quam rem, quum agemus, ex iis, quæ maximi momenti sunt, & in quibus expedita admodum cognitio est, morborum notas intelligemus. quandoquidem nos ignorare non oportet, non esse alia maxima, alia facillima: sed iisdem signis contingere potentia maximis esse, & cognitu facillimis. huiusmodi sunt, quæ in prognosticis statim à principio traduntur his verbis, ¶ Nares acutæ, oculi concaui, collapsa tempora, & quæ sequuntur/. Namque hæc maximi esse momenti in pranotione, eorum qui mediocriter in medicinali arte fuerint exercitati, nemo est, qui nesciat: esse verò cognitu facillima, omnes sanè vel artis etiam expertes intelligunt, quum nullam corporis partem prius facie protinus videat, qui ad cubantem accedit. Ergo ipse cubans, si cum seipso conferatur (ut præcepit) certiore quoque notam exhibet. atque hac ratione ab iis, quæ facillima & maxima sunt, initio sumpto, iam poterit, quod ad artem attinet æstimari. Fortè autem interdum fiet, ut decipiatur quis homine, qui natura habet nares acutas, oculos concauos, collapsa tempora: sed, si laborantis corpus plerisque hominibus simile comperiemus, nullo pernicioso morbo, aut affectu, detineri hominem facile intelligemus. vbi, quod ab Hippocrate scribitur,

1. Progn. 5. 4.^a
190. g

1. Progn. 6. 4.^a
291. a

A scribitur, notabimus, si reliquæ totius corporis notæ salutem denuncient, consili eam esse naturalem hominis faciem, ut rem magis perspectam habeamus, de ijs, qui antè ipsum nouerunt, percontabimur: qui ubi idem asserent, nostram prænotionem confirmabunt, non perinde tamen sciemus, ac si ipsi hominem nouissemus, atque adeò, si vbi familiariter essemus, eo enim quod benè valentem sæpenumerò viderimus, in signis, quæ in ipso apparent, nunc, ubi aduersa valetudo est, discriminis modum certius deprehendimus. Vt enim audiuerimus, coniecimus quæ hominem acutis naribus esse, concauis oculis, familiaris duntaxat modum intelligit, quæ res medico in primis necessaria est. non enim id solum nouisse operæ precium nobis est, quod corpus à naturali habitu recessit, sed quatenus nares acutiores sint, oculi magis concaui, tempora collapsa, & alia singula, quæ deinceps exequitur: è quibus, quod simili maximè contrarium est, non simpliciter graue dixit, sed grauissimum, est autem maximè contrarium, quod à naturali habitu distat longissimè. ergo, quemadmodum, quod maximè contrarium est, non simpliciter graue, sed grauissimum posuit, sic graue magis minus uel dixit, quatenus plus minus uel contrarium se ostendit. Notæ igitur, quæ in facie sunt, nullo negotio percipiuntur, & plurimum ponderis habent, tum quas à principio protinus recessit, tum quas de oculis subiecit. Complura autem ex ijs, quæ

B in prognosticorum libris tractauit, si mentem adhibeas, intelliges partim non maxima esse, partim non facillima, partim quibus utrumque abest, vis scilicet & facilitas. quæ in eorum librorum expositione latius persequuti sumus, persequemur & nunc exempli causa non nulla. Nam, quod eger supinus cubet brachijs cruribus, quæ similiter iacentibus, ut resolutis, non modò ob grauem affectum euenire potest, sed ob mollitiem quoque hominis, delitias, quæ ultra modum, quare nisi mores ægri cognitos habeamus, facile decipiemur. At fieri minimè potest, ut quos curamus, omnium nobis mores innotescant. quamobrem percontari hos oportet, præterquàm in paucis. Comperimus quidem aliquando non magni momenti rem denunciari, ut in ijs, quæ ad cubandum pertinent: interdum maximè, ut in viro ornato, ubi trucem vultum habeat, vel flatum per ventrem reddat cum crepitu, dolorem, aut mentis alienationem significat, si in eo sit, quem id facere audiente aliquo puderet: sed si nullam præsentium rationem haberet, nihil is prorsus ostenderet. Quocirca hic etiam nouisse hominis mores conuenit, non secus atque consuetudinem in ventrem cubantium, eorumque naturam, qui per somnum dentibus strident, vel quorum palpebræ non committuntur. namque hæc, ubi cubantis consuetudinem, vel naturam medicus nouerit, aut ab altero quæsierit, qui eos cognoscat, indicium faciunt, idque modò bonum, modò malum.

C In vrina verò nigra, nigro item sputo, tum in atra bile, morbi initio apparētibus maximè vis inest, & expedita cognitio, sicut è contrario in acutis morbis summam securitatem pollicetur facile spirare, subsidere in vrina album leue & æquale. Hæc de ijs, quæ ad cognitionem pertinent, posuisse volumus, ut sint exempla eorum, quæ maximam vim habent, & cognitu facillima sunt, tum quorumcunque, quomodocunque nobis innotescant, seu experimento, seu ratione. quamquam non tantā vim habent, nec æquè facile percipiuntur, nisi ægri usus, natura, mores, vel sciantur, vel quærantur. Deinceps mihi sermo erit de ijs, quæ attinent ad chirurgiam. Vt autem res magis in aperto sit, quoddam exemplum apponemus, quod habetur in libro de articulis inter initia protinus, ubi de prolapsio humero agitur. in quo, idem quod maximum est, nullo negotio comprehenditur. nam, si quod turgidum, rotundum, ac durum in ala se ostendat, id ibi esse nulla ratione potest, nisi humeri caput suo loco motum in alam exciderit. Sed sinus in ea parte, quæ humeri iuncturæ superiecta est, commune indicium est, & humeri prolapsi, & lati scapularum ossis, quatenus summum à iugulo recedens, attollitur: atque idcirco debemus affectam partem integrè comparare, quæ ubi non suæ naturæ deprehendatur, existimare licebit humerum excidisse. In hoc igitur signo, non æquè magna vis inest, & expedita cognitio, atque in tumore sub ala.

Sect. 1. c. 3. 7.
2548

D imbecillius adhuc est, quod ex motu colligitur, humerus enim sursum non porrigitur, & ubi huius partis muscoli atteruntur, tenduntur, inflammantur: & ubi aliquæ ipsorum fibræ altius abrumpuntur. Ego autem huiusmodi casum aliquando nactus sum. latum scapularum os summum antè à iugulo recessit, deinde alterius brachij humerus loco suo motus est, quod accidit in palæstra. intuitus autem medicus sedem iuncturæ humeri superiectam ab utraque parte æqualem, inconsideratè dixit eum ipsum locum plagam accepisse, & iure hominem dolere, iuncturam verò illasam esse. quocirca præcepit, ut in balneum iret quàm celerrimè, & multo vltus oleo in solio moraretur: atque ubi exiret lana tincta in oleo, cui paulum cæaræ adiectum esset, ictam partem obtegens, se contineret in lectulo, quiesceret que. His factis homo, quàm totam noctem dolore vrgeretur, mane eundem medicum, & quosdam alios accersiuit ex ijs, quos non ratio, sed sola sustinent experimenta. Qui pridie ob temeritatem deceptus, articulum benè se habere protulerat, ubi ad ægotantem accessit, videns duos alios medicos se ignobiliores, ut qui parumperderetur, iniquo animo tulit, id tamen dissimulans promptius adhuc ob indignationem dixit articulum nullo modo læsum esse, quàm utramque partem iuncturæ humeri superiectam similem inueniret, cum que inflammatio iam ictum humerum occuparet. Perfundens igitur homi-

nem multa aqua calida subinde oleum copiose immiscens, iussit, ut lana rursus circumdatus eadem ratione conquiesceret. At, quum per hæc nihil proficeretur, ego tertio die adhibeor: conspiciens, que partem iuncturæ superiectam magis cauiam esse ab eo humero, qui dolore vacabat, quam ab eo, qui dolebat, nimirum inflammatione aucta, humerum, qui integer videbatur, diligenter inspexi, visum, que est mihi ab ea parte summum lati ossis scapularum in superiorem partem recessisse. Hoc igitur adductus, & eo quod per idoneam curationem homo nihil leuaretur, sub inflammati humeri alam digitum demittens, ibi humeri caput inueni. quo tamen res certior esset, animaduerti alterius humeri alam, in qua, ubi nullum huiusmodi tumorem repperi, pronunciaui humerum quidem luxatum esse, medicos verò id latuisse, eò quod ignorarent latum os scapularum in altero brachio summum à iugulo recessisse, compararent, que percussum locum ad illud perinde, ac si in statu esset naturali. Nobis inquam discere licet ex homine percontantibus, num ab altero brachio, quæ cum iugulo latum os scapularum iungitur, aliquando plagam acceperit. ille principio non habet, quod dicat: dein, quum sibi in mentem veniret, se quondam ex vehiculo decidentem percussum fuisse fatetur, sed paruo negotio liberatum lana oleo tincta tribus aut quatuor diebus super iectam partem imposita. Sed quorsum hæc? ut ostendam quantum dignitate inter se distent indicia, per quæ innotescunt morbi manus curationem requirerentes. Non posse enim affectum brachium sursum porrigi multis quoque alijs commune, quum & chordæ musculorum, qui ea parte sunt, & sæpenumero ipsi quoque muscoli, ubi indurati, aut inflammati sunt, tum confusi aut altè abrupti, vel ubi aliquæ ipsorum fibræ perrumpuntur, sursum ferre brachium non sustineant, neque solum sub hoc, sed sub omni etiam motu indolescant. Sinus verò ea parte, quæ iuncturæ humeri superiecta est, & ipse communiter recedentis quoque ossis facit opinionem. At rotundus, durus, que in ala præter naturam tumor abundè humerum loco suo motum testatur. quare is minime decipietur, qui ei tantum confidet. quid quod & ipsum cognitu facillimum est, solum, que oportet tumorem contingere digitis in alam coniectis, quæ humeri caput euidenter se ostendet. Sed musculorum affectus, sub quibus neque sursum porrigere humerum possunt, neque citra dolorem mouere, exercitatum rationem, summam, que animaduersionem exigunt. Has igitur notas illis annumeramus, quæ plurimum valent, & facillime comprehenduntur, siue quis rationalem, siue in experimentis positam medicinam profiteatur. Empiricus enim inspiciens quas *συνδρομας* appellat, quæ nihil aliud sunt, quam concursus eorum, quæ morbis superueniunt, ubi sapius eadem notauerit, æquè omnium simul in tempore meminit: dein, quum ex hac obseruatione multorum concursuum usum habet, tunc ex ijs, quæ morbis superueniunt, quæ nam in multis concursibus viderit, & quæ in vno duntaxat, dignoscit: atque hoc pacto communia intelligit, & propria, quam rem sequitur rursus notitia signorum, quatenus inter se viribus distent. nam, quod in multis, vel omnibus concursibus fuerit animaduersum, longè iis cedit, quæ notantur in vno tantum: quod autem in paucis, minus vincitur, ac præcipuè, quod in duobus. medicus autem, qui spectat experimenta communia, perinde ac propria intuetur, & in memoria habet. cum hæc, quæcunque sint, & quocunque modo cognoscantur, vnà cum proprijs venientia obseruauerit. Qui ratione nititur, multo magis celerius, que singulorum morborum indicia comperit, & ubi communia sint, & ubi propria, nec Empirici modo diu moratur, sed ne diem quidem aut horam. Concipiens enim humeri caput in alam excidisse, id simul intelligit, primò quidem quod tumor ea parte non naturalis apparebit: deinde quod sinus erit super humeri commissura, cum humeri caput, ut quod in alam venerit, inde absit, ubi esse consueuerat: tum quod ceruix lati scapularum ossis humero superimposita sursum porrigi brachium non ita sinet, & quod muscoli admodum dolebunt, quum vehementer extendantur, ubi attollere humerum conentur, quod quæ non absimile tormentum sentient, cum ad latus tentant affectum membrum adducere. Atque ita quæcunque, & quomodocunque cognita, nec, quæ magnam vim habent solum, sed cætera etiam intelliget. quoniam hac vna via cuncta inueniuntur, quum altera in obscuro sint, quæ non sunt facillima, sed indicatione comprehenduntur. Humeri quidè caput in ala magnam vim habet, & nullo negotio cognoscitur: at musculorum affectus maiori egent cogitatione, sed & à tumore qui in ala conspicitur, utroque viribus scilicet & facilitate superati, eadem contemplatione artificioso medico innotescunt. Merito igitur Hippocrates ante alia artis opera, id est ante prænotationem & curationem, eam partem, quæ ad morborum indicia pertinet (iuniores *σημείωσιν* nuncupant) intelligi ex similibus ac dissimilibus notatione voluit: merito etiam ex valentissimis, & cognitu facillimis: item tertio ex quibuscunque, cum his quomodocunque cognitis, dignitate verò & cognoscendi facilitate inferioribus. Hactenus itaque præfatus à quibus vitia indidentur, nempe ab ijs, quæ rectè habentibus similia sunt, aut dissimilia, deinceps cuiusmodi illa sint, ea nunc persequitur his verbis.

2 Quæ & videre, contingere, atque audire licet.

Quum voluerit eam medicinæ partem, quæ de morborum notis est, per ea exerceri, quæ in affecto corpore

A corpore ad exemplum sanorum similia sunt, aut dissimilia: item quædam maxima esse & facilissima, quædam cum ipsis necessario percipi: nunc iam (quod supra commemoravi) quæ nam illa sint, exequitur inquit / quæ & videre, contingere, atque audire licet. Videre quidem licet, quæ conspectui subiiciuntur: contingere, quæ tactu: audire, quæ auribus comprehendi possunt. Ergo, quæ inter prognosticorum initia de facie proponuntur. Nares acutæ, oculi concavi, collapsa tempora / sentiuntur visu: tactu, frigida æures: tactu simul & visu, cutis faciei dura, arida, atq; extenta: quæ eodem libro sequuntur, auditui subiecta sunt, nempe siernutamentum, tussis, crepitus, strepitus / quæ hominis præter naturam loquentis, vel quod mens non constet, vel quod vox sit stridula, rauca, aut huiusmodi quopiam vitio affecta. In morbis autem, quæ manum possulant, oculis expolita sunt, quæ nigrescunt, rubent, tum quæ quavis ratione suum colorem variant aut retinent. adde exempli causa in humero, quod sinus in parte eius articulo superiecta, & extremitas latæ scapularum ossis elata, visu percipitur, caput in ala contingitur, auribus accipitur strepitus in corpore ægrotantis, quemadmodum ubi thorace perforato, è plaga fertur spiritus cum sono.

1. Prog. 6. & 7.
4^a. 191. a

3^B *Quæ item oculis, tactu, auribus, odoratu, gustatu, mente sentiuntur.*

Subiecit hîc omnibus sensibus mentem, quam dixit *γνώμην* (græci communiter *νῆν* & *οὔρα* vocant & *λόγον*, hoc est rationem) sed quoniam & in voce quædam ratio est, philosophi illam dixerunt *ἐνδὲ ἰατρικῆς*, hoc est interiorem, ut ab hac ipsam seiungerent. Comprehenditur interiori, quid cuique consequens sit, quid quæ contrarium, ad hæc diuisio, compositio, resolutio, demonstratio, & si quid est generis eiusdem. Requiritur autem non immerito, cur olfaciendi & gustandi sensus ante seorsum mentionem non fecerit, quum dixit, / quæ & videre contingere, atq; audire licet. / postea verò omnes quinque proponens, mentem quoque adiunxit. Multi sanè dixerunt non nulla absurda, & quæ scribi non merentur: alij verò probabilia, ac memoratu digna. hinc autem ordiuntur. Hippocratem dicunt præcepisse, ut ex eorum, quæ sub sensibus cadunt, similitudine ac dissimilitudine, morborum notas intelligeremus. Proprie autem sub sensibus cadere volunt ea, quæ, ut comprehendantur, non aliam potentiam requirunt, sed una sensuum comprehensio sufficit: sub sensibus cadere similiter, sed non proprie, quæ pluribus sensibus simul, & tum memoria, tum ratione, quam vocant componentem, & colligentem, accipiuntur. Colorem verò ex eorum numero esse existimant, quæ proprie sub sensibus cadunt, itidem succum, vaporem,

C vocem, præterea duritiem, mollitudinem, calorem, frigus, & vno nomine qualitatem omnem, quæ tactu comprehenditur: at mali, mali punici, piri, aut cuiusvis alterius rei totam naturam sensu minimè percipi, sed (ut Plato dixit) opinione cum sensu rationis experite. omnia quæ esse opinabilia arbitrantur: & propterea quosdam sapius in ipsorum cognitione decipi, cum vel colorem tantum, vel figuram, vel vtrumque naturali non absimilem intuentur. mala enim, mala punica, pira, vuam, nucem iuglandem, & plura alia ex iis, quæ edendo sunt, ubi ex cera componuntur, priusquam vel ad nares admoveantur, vel gustentur, tangerentur quæ, à veris abhorrentia non videntur: eum verò falli non posse, qui ipsorum usum singulis sensibus æstimet: omnibus autem rem discutere sine memoria & enumeratione non licere, & hanc non ad sensum aut memoriam pertinere, sed ad mentem. nominant autem enumerationem, non solum *συναριθμῶσιν*, sed etiam *συναριθμῶσιν*. Hippocratem ergo, quum inquit / quæ & videre, contingere, aut audire licet / volunt eorum, quæ sensibus subiiciuntur, meminisse, ut exemplum aliquod in medium afferret: atque ubi ab ijs, quæ sensibus simpliciter, & proprie subiecta sunt, ad totam naturam transiit, iure tunc sensus omnes, & mentem quoque commemorasse, ita, ut vniuersa oratio sit huiusmodi.

D Aggredi medicus debet ad vitiorum notas, orsus à similibus ac dissimilibus inspectione, interdum solam qualitatem, interdum tota conferens corpora. quæ quidem expositio ratione non caret. Est & altera hunc in modum, Hippocratem, quum inquit / quæ & videre, contingere, atq; audire licet / de medico loquutum esse: quod verò addit / quæ item oculis, tactu, auribus, odoratu, gustatu, mente sentiuntur / ad ægrotantem ipsum referri, ita, ut medicus non modo indicia colligat ex iis, quæ ipsemet, sed ex iis, quæ æger videt, tangit, olfacit, gustat, tum ex eius mente, quatenus labat aut consistit. quod autem medico ad cognitionem expediat, nouisse mente ne homo labatur, an sui compos sit, in aperto est. Placet alijs, quod scribitur / quæ nem oculis, tactu, auribus, odoratu, gustatu / ad ægrotantem, quod adiungitur / mente / ad medicum pertinere. si quidem ex iis, quæ cubans videt, audit, contingit, gustat, medici mens aliquid ratiocinatur. conijcit enim de laborantis gustatu aliquid ad ipsum pertinens, non secus ac de morbo, nam, si gustanti amara omnia videantur, quemadmodum ijs, quos morbus regius malè habet, redundat in lingua bilis: si salsa, pituita salsa: si acida, acida similiter pituita plurima in ea est. sic quæ hominem dicunt qualitatem sui sudoris interdum in os destillantem percipere. Hoc pacto enodantibus aduersari videtur, quod olfactum medici præterierit, quamuis eo sapius utatur, cum indicia ex deiectione, vrina, sputo, vlceribus, spiritu ægrotantis, collecta. olfactu à medico æstimetur.

Septima Classis.

CCCCCCC iiij Porro

Porro autem à ratione non abhorret, fuisse hunc à librario prætermisum, sicut alia multa in plurimis Hippocratis aliorumque voluminibus, partim omissa inveniuntur, partim euidenter deprauata. Nec absuerunt, qui locum hunc ita explanarent, non idem scilicet significari his verbis /quæ videre, contingere, & audire licet/ atque illis /oculis, auditu, tactu sentiuntur/. potest enim videre quis, contingere, aut audire, nullo modo re comprehensa: sentire verò sine comprehensione non potest. Refertur huiusmodi explicatio verbi /sentire/ ad Semium stoicum, cui propterea subscripsit Iphicianus Quinti discipulus, qui stoicam philosophiam sequutus est. Quod censent igitur huiusmodi est. Priora verba solummodo in rerum genere, ex quibus notæ sumuntur, accipi debent: sequentia in eodem ad vnguem habito atque comprehenso, quali ita scripserit. Colligendæ notæ sunt ab iis, quæ in corpore ægrotantis suæ naturæ similia & dissimilia se ostendunt. Sunt autem hæc ea, quæ subiecta sunt sensibus, atque ex ijs ipsis, non quæ non bene videntur, aut audiuntur, vel quouis denique sensu non bene sentiuntur, sed quæ singulorum sensuum comprehensione & mente percipiuntur. abusum verò Hippocratem dicunt vocabulo /sentiuntur/ de mente verba facientem. Ita, vt in prioribus verbis sensum vnum vel alterum prætermiserit, vniuersum enim eorum genus sub exemplo demonstraui: in sequentibus omnium meminere, & mentem adiecerit, magis exquisitam firmioremque enunciationem reddens. nam commune est omnibus comprehensi obiecti speciem imprimere. Sed, quum, quod polliciti sumus, præstiterimus, referentes, quæ non nulli probabilia attulerunt, ne videretur Hippocrates eadem sæpius repetere, proximum est, vt ad ea, quæ sequuntur, veniamus: tu vero superiores sententias scrutatus optimam eligas. Vsurpat autem *γνώμης* vocabulum more priscorum, quod idem significat, atque mens, siue intelligentia, quam rem, & si possem multorum testimonio confirmare, pauculos tamen adducam, qui mentem *γνώμην* dixerunt. Critias igitur in primo aphorismo hæc scribit /Nec quæ reliquo corpore sentit, nec, quæ mente intelligit/. & iterum /Intelligunt homines mente an sanus aliquis sit/. Et in primo libro, qui de colloquijs inscribitur /Si ipse excitatus ita fuisses, vt mente valeres, non sic ab ipso tibi iniuria fieret/. & in eodem sæpenumero, & in secundo colloquiorum, *γνώμης* sæpius mentionem fecit, sensibus ipsam in diuisione opponens. Ad hæc Antipho in primo de veritate /Qui hæc intelligit, nec oculis longitudinem comprehendit: nec qui longitudinem intelligit, sine mente eam intelligit/. præterea /Omnes enim homines, tam in secunda, quam in aduersa valetudine, atque in alijs omnibus mente vtuntur/. Et Plato, sicut prius sæpè, ita in quinto de reipublica /Huiusmodi igitur cogitationem, vt cognoscens mentem, ita opinans opinionem rectè dicere possumus/. Et Lysias in Polyuchum /Ille enim, G in omnibus rebus, quas sua vsus mente, pro nostro populo gessit, multorum bonorum in nostra ciuitate causa fuisse videbitur, & multa hostibus attulisse incommoda/. Æschines item Socraticus in Miltiade, & Hyperides in Dioclem, & alij rhetores, medici atque poetæ, quorum omnium meminisse superuacuum est, eodem modo id vocabulum vsurparunt.

4 Quæ item omnibus, quibus cognoscimus, intelligi possunt.

Iure etiam hic quaeritur, quas præter sensum, & mentem, natura nobis potentias dederit ad percipiendum obiecta exteriora. Adiungit enim /quæ item omnibus, quibus cognoscimus, intelligi possunt/ perinde quali non enumerauerit omnes. Explicabo igitur, quamobrem hæc adscribi ab ipso existimem, illud præfatus, quod & sequentibus necessarium est, & memoriæ proditum fuit à multis veterum: quibus placet ex opinionibus, quas videntur sectarum auctores inuenisse, nullam esse nouam, sed, quæ priori sæculo tradita fuerunt, vnà cum aliorum mente interuisse. Siquis in opinione ad res ipsas animum aduertat, neque Pyrrhonis sectam, neque Academicam, Stoicam, Peripateticam, nec quamuis aliam, post Hippocratem sumpsisse initium iudicabit, quum ipsi Pyrrhones ad vetustissimos auctores suam referant sectam. Quocirca verisimile est, vel adeo non verisimile, sed necessarium Hippocratis sæculo de naturalibus iudicandi potentiis disceptatum esse, & quosdam nullam talem posuisse, quemadmodum postea Pyrrhones: quosdam sensum duntaxat: alios nihil huic tribuentes id verum putasse, quod vulgatum est /Mens videt, mens audit, cætera surda sunt & cæca/: alios vtramque dedisse iudicandi potentiam, sensum in iis, quæ sensibus subiiciuntur, mentem in iis, quæ comprehenduntur intelligentia: quosdam alias animi nostri potentias concepisse. Itaque Hippocrates, vt eorum vitaret importunitatem, generatim duarum potentiarum meminit, sensus & mentis, quas solas in nobis (vt scitis) ubique docui cognoscendi ac iudicandi vim habere: propter cauillatores autem orationi adiecit /quæ item omnibus, quibus cognoscimus, intelligi possunt/. Iam verò aliqui censent aliam esse naturam intelligentiæ, aliam mentis, aliam illius rationis, quam *ἐνδίαφρον* vocant, atque harum plures adhuc potentias introducunt. Nos autem in libris, qui de communi ratione sunt, tres hominibus in vniuersum inesse potentias demonstraui, quibus ad artes constituendas, librosque conficiendos vtuntur, sensum, mentem, memoriam: atque in memoria quidem herere seruarique quicquid

A quicquid sensu ac mente conciperetur, quum singularum rerum naturam non inueniat, sed eorum, quae inuenta sunt, receptaculum quoddam sit: ad ea vero, quae inquiruntur inuenienda, iudicanda, quae naturam nobis mentem dedisse ac sensum. Sed, ubi de his verba sunt, demus, si qui ita sentiant, aliam vim esse intelligentiae, rationis aliam, rursus quae, si velint, aliam mentis, aliam consilij, quum aduersus eos id nobis sufficiat, quod omnes homines euidenter cognoscunt malum, mespilum, vnam, & alios fructus, siue vna animi potentia, siue altera, siue tertia, siue pluribus comprehendantur. Omnes autem homines aequae sibi persuasum habent sentum, mentem, memoriam & voluntatem esse, quae Asclepiades, quasi nulla sint, praeter alia multa conatus est funditus euellere. His igitur propositis satis planam esse causam existimo, quorū, quae postremo perfecte docuerat, adiunxerit / quae item omnibus, quibus cognoscimus, intelligi possunt. Inire medicus debet artis opera, initio ab affectuum cognitione accepto, comparans ea, quae in aegrotante apparent, ad ea, quae in sanis conspiciuntur, intuitus, quae similia, quae item dissimilia, & haec atque alia omnia sensu ac mente comprehendere: tum, si qua sit praeter has potentia, quae communiter possit secundum naturam de omnibus iudicare, hac etiam perinde, atque illis de inuentis iudicare, sicut etiam cognoscere omnes homines possunt, quemadmodum nos in medi-

B cinæ operibus, principio habentes pro materia, quae sensu comprehensibilia sunt, his verbis / quae contingere atque audire licet: potentiam verò haec iudicantem duplicem, sensum scilicet & mentem, quam ostendit, cum inquit / quae item auribus, odoratu, gustatu sentiuntur. utrique autem euidenter memoria subseruit. si quis aliam quamuis potentiam introduxerit, nihil pugnabimus, modo subiectae materiae utilis videatur. His enim verbis / quae item omnibus, quibus cognoscimus, intelligi possunt / & mentem complectitur, & permittit, ut si quis aliam iudicandi potentiam esse arbitretur, illam quoque nobis declaret. Haecenus igitur, quae in hoc libro tradita sunt ab Hippocrate communiter ad vniuersam medicinae artem pertinent, atque idcirco ea esse proceum totius artis proposui. Proximè autem transit ad medicinae partem, quae manu medetur, & ex iis, quae huius partis sunt, ad ea, quae in officina medici discere possunt, aut tractare, qui in arte primum exercentur. Nemo autem existimet expositionem me longiorem praeter meum morem fecisse, siquidem, quae totius artis communia sunt, pluribus verbis explicari debent, quam quae proprie ad singula pertinent, ut quum maximè, ubi quis in aliquo opere ipsa pertractet, nunquam aliàs commemoranda: id quod ego consitui in horum librorum Hippocratis expositione, ubi de mente ac sensu omnia persequutus, eorum, quae proximè retuli,

C nullam amplius faciam mentionem. Quin haec dixi paucioribus fortasse, quam res petebat, quia quum proponere possem agitatam de numero potentiarum animi, controuersiam, ac de ea pronunciare, magis opere precium duxi eum, qui harum absolutam notitiam requirit, ad librum de communi ratione referre. Aliud etiā vertitur in dubium, ubi praecipit, ut ab inspectione illius, quod simile est, & dissimile, inchoemus, propterea, quod non ita distinctè omnibus notum sit, quo simile & idem inter se distent. quod ipsum de industria omni alibi explicatum. Attinent ad eandem contemplationem, & alia multa, quae similiter praeterij: & hoc verum, qui medicinam in usu positam profitentur, eorundem vel similium obseruatione vtantur. ex iis enim quidam similia censent animaduertenda, alij cautiore ea, quae suae sectae vniuersae consentanea sunt tenentes, omnia eadem obseruari volunt, seu ad morbos significandos, seu ad prognostica, seu ad curationem pertineant: & Dionem phreneticum eundem esse, atque Theonem phreneticum, quatenus ambo febricitantium insania opprimuntur. alij neque simile vno modo usurpari dicunt atque intelligi, sed duobus, vno quidem simile significat, quod nulla conditione differt, ut Castor & Pollux: altero non huiusmodi, sed id, in quo maius & minus conspicitur. Quin & apud vetustissimos medicos ac philosophos, quorum scripta adhuc extant, videre licet simile ita viur-

D patum. ut qui confuse ipso citra omnem distinctionem vtantur, & modo eandem formam habentia nulla ratione distantia similia dicant, ut dextrum oculum & sinistrum, quum vterque in eodem homine consideratur: modo, ubi vnus glaucus, celsius alter est, aut niger, vel quatenus oculi sunt in diuersis quoque hominibus, similes vocent. Magis tamen consuetum est apud ipsos glaucum glauco, & celsium celsio, non secus ac nasum aduncum adunco, simum limo, rectum recto, similem appellare.

5 *Quae autem ad Chirurgiam, in Officina medici.*

Huiusmodi breuitate constat eos de industria uti, qui volunt obscure quid enunciare. nam, ubi interdum vno nomine aut verbo adiecto, interdum altero, aut summum tertio, lucida reddi oratio poterat, cur neget quis eius auctorem operam dedisse obscuritati? Equidem verborum formam adiungam, qua quis claram fecisset orationem. ea est. Medicinalis ars vniuersa in affectuum cognitione ad ea commune consilium dirigit, quae sanis similia sunt, aut dissimilia, ex illis, quae mente ac sensu aperte comprehenduntur, inueniens atque diiudicans, e quibus, quae chirurgi tan-

tummodò sunt, exequar, atque ex his ipsis, quæ in officina medici ostendi addiscentibus, aut præstari egrotantibus possunt. Sic igitur diceret, qui clarè loqui vellet. Officinam medici κατ' ἰατρείον appellat, cuius non nulli postremam syllabam per *η* scribunt: quo modo si scribatur, significabit, in arte medicinali, non in loco, quem ἰατρείον appellamus, quasi ita dixerit: Quæ in medicinali arte eius partis sunt, quæ manu curat, talia sunt. In sequentibus autem patet eum, qui librum composuit, seu Hippocratem ipsum seu Thessalum eius filium, non explicasse omnia chirurgi munera, sed neque omnia, quæ in medici officina aguntur, sed ex his ipsis, quæcunque addiscere debent, qui primas institutiones aggrediuntur. Quin & inde originem traxit inscriptio libri, quam postea sequuti sunt Diocles, Philotimus, & Mantias. Satiùs autè fuit sic inscribi, περὶ τῶν κατ' ἰατρείον, hoc est, de iis, quæ in officina medici fiunt. Miror autem Asclepiadem, qui κατ' ἰατρείον scripturam seruans, putauerit significare artem medicinalem, quam κατ' ἰατρὴν significat, at non κατ' ἰατρείον: sic, vt ἰατρείον pro officina accipiatur, ἰατρὴ ad morbos curandos pertineat. Sed huiusmodi contemplationes attinent ad nomina, quibus parum insistere debent, qui in rerū veritatem incumbunt. Ea verò, quæ proposita sunt, proximis verbis docere incipit.

6 *Agrotans, agens, ministri, machinamenta, lumen. Vbi, quomodo, quot, quibus, quomodo, quando, corpus, instrumenta, tempus, modus, locus.*

Omnia hîc percurrit à quibus, per quæ, quibus cum, & circa quæ chirurgiâ exerceatur: deinde narrat quale esse prædictorum vnumquodque debeat, & quomodo, aut quo tempore adhiberi. Ex his pleraque in aperto sunt, sicut agrotans, agens, ministri, machinamenta, lumen: sed & in sequentibus ab ipso quoque auctore exponuntur, quum referat, quomodo æger se medico exhibeat, qua ratione medicus agere circa ipsum debeat, & assistentes subseruire. Non secus etiam quæcunque de machinamentis, & lumine, nouisse nobis necessarium est, in sequentibus persequitur. Post hæc vberius de fasciandi ratione pertractat, non quo multa verba faciat, in toto enim libro studet breuitati: sed quo nihil, quod vtile sit, voluerit præterire. Ergò quæcunque propositis verbis continentur, præterquam agrotans, agens, ministri, machinamenta, lumen/ examinanda sunt. Atq; ante omnia/vbi/ quod primò propositum est, ἐκεῖ dixit, cuius dictionis posteriorem syllabam Iones per *η*, nos per *π* scribimus. hæc significat locum, in quo quis situs est. quo circa non absurdè dicet aliquis ad omnia, quæ dicta sunt, eam referri. Siquidem agrotanti idoneo loco opus est: vocantur autem egrotantia, quibus manus curatio adhibetur. iis non minùs idoneum locum requirunt, medicus & instrumenta. ex luminibus verò, quod artificiosum est, licet vbi volumus collocare. Quod deinceps adiungitur/quomodo/ ὅπως dixit, nos per *π* scribimus ὅπως, notat autem non modò apud nos, sed apud Iones quoque rerum, quæ traduntur, veluti qualitatem. eos enim qui artem addiscunt, non solùm scire locum conuenit, vbi eger iacens, aut sedens, manu curandus est, sed quomodo figurandus, quomodo item, qui agit, & qui agenti subseruiunt. Machinamenta item non solùm debent loco idoneo collocari, sed in ordinem quoque disponi. singula enim & medico & eius ministro, sic erunt maximè ad manum. Videtur autem hîc omisisse instrumenta, vt quæ intelligi ex machinamentis possint: sed quamobrem inordinate eorum meminerit, mox considerabimus. nunc autem explanare conuenit, quæ proximè subiiciuntur/quot, quibus, quomodo/. Singula hæc ad ea referuntur, quæ superius dicta sunt, quæ ad chirurgiâ præparata scire debent addiscentes, quot sint, & quibus ex ipsis quomodo vtendum. sic, vt particula/quomodo/quum paulo superius particula/vbi/ subiiciebatur, situm: nunc vtendi rationem significet. Ibi ergo ponitur/quomodo/ iuxta aduerbiū loci/vbi/: hic autem iuxta relatiuum ad exponendum, quibus instrumentis machinamentis/que agendum sit. Quod adiicit/quando/ occasionem apertè demonstrat, per quam vtī singulis conueniat. Quæ subiiciuntur his verbis/corpus, instrumenta, tempus, modus, locus/ non immeritò requiritur, quid sibi velint. nam, quum agrotans/ dixit egrotantis corporis, similiter verbo/quando/temporis, verbo/quomodo/modi, verbo/vbi/loci, vim notauit. cur igitur hæc repetit, & turbato ordine instrumenta inserit, cum proximè à machinamentis ordine poni magis potuissent? quanquam, & si nullus eorum meminisset, intelligi ex machinamentis poterant. Sed his occurrere possumus affirmantes instrumenta nunc intelligi scalpellum, terebram, hamum, scalprum, laminam membranæ custodem, & quæ similia sunt, quæ possumus etiam ex machinamentis comprehendere, quum sint eiusdem generis. Huiusmodi instrumenta, quia propriè parata sunt curationis gratia, idcirco ἀρμενα nuncupauit. quod vocabulum in opere de ratione victus in morbis acutis, quæ de balneo, vsurpauit, quum inquit/quippe in paucis domibus, vel instrumenta (quæ ἀρμενα dixit,) vel ministri inueniuntur/. scaphia igitur, rotas, peluim, labra, & quæcunque accommodantur agrotantibus, sub eo nomine comprehendisse credibile est. Restat adhuc absurdum in reliquis, quorum vnà sit mentio cum instrumentis. Fortasse autè corpus

nunc

A nunc dixit affectam partem: tempus verò id, quod ipsi adiungitur, nam, ubi manu curatio ad-
mouetur, scire conuenit, quàm diu inceperit affectus, qui curandus est. Ipse enim cauit, ne tertio
aut quarto die membra extenderentur, aut articuli reponerentur. Potest item /tempus/ nunc di-
xisse, dū manu curatio fit, quandoquidem conari in quibusdam debemus manu quam celerrimè
ut, quum periculum maximum ex frigore iam sequatur, sicut in ijs, qui suntur, celerrimè enim
intolerabili doloreprehenduntur, qui manu curantur: in alijs autem, vt suffusionibus longiori
tempore agenda res est, quum demissa acus diu contineri ea parte debeat qua non fluere, sed ve-
hementer insidere suffusionem volumus. At modus vitiorum originem nunc significare po-
test, quum ipse censeat cognoscendum esse medico, quomodo os fractum est, aut suo loco mo-
tum, sicut ipse etiam in || libro de vulneribus capitis indicauit, quibus modis illata plaga fuerit, Non longe à
principio
ubi ait /Vulneratur autem caluaria os tot modis/. & rursus /sunt que vniuscuiusque modi spe-
cies fracturæ plures/. addit præterea /collidi etiam os potest, quamuis in suo statu seruetur, &
colliso rima non accedat, atque hic est secundus modus/. tum alium adijciens, inquit /tertius hic
modus est/. & rursus /quartus hic modus/. Illud insuper à ratione videtur alienum, quod lo-
cum iterum adscribat, quum supra dixerit /ubi/ quo aduerbio locus significatur. Quare non nul-

B li eam dictionem aliter exposuerunt, simulque scripturam immutarunt, sic, vt pro /locus/ ite-
rum /ubi/ legatur. hæc tamen scriptura libri expolitores non later, quam non ignorant plurimi
eorum, quos experimenta sustinent. Sed, vt res magis perspicua sit, eam repetam. habet autem
sic /Ægrotans, agens, ministri, machinamenta, lumen, ubi, quomodo, quot, quibus, quomo-
do, quando, corpus, instrumenta, tempus, modus, locus/. Volunt igitur, quando inquit pri-
mum /ubi/ id simpliciter intelligendum, quum liceat id verbum referre ad ægrotantis corpus &
instrumenta, vocari que hic instrumenta credunt ea, quæ supra machinamenta dixerat: at quum
secundò repetit /ubi/ definisse laborantis corpus, & instrumenta idoneo loco collocanda. Sed,
si prior scriptura, & superior expolitio maneat, locus in fine totius orationis affectam corporis
partem significabit. Consueuerunt enim medici tam locos dicere, quàm corporis partes: & à
quibusdam confecta sunt integra volumina de locis affectis. Hactenus percurta sunt sola capita
rerum, quæ tractari debent: docere verò proximis verbis ingreditur, quapropter ad ea adiungen-
dum animum existimo, nam, si quid eorum non rectè intelligatur, in arte exercenda detrimen-
to erit: ex ijs, quæ adhuc proposita sunt, si quid non benè acceptum fuerit, non admodum officiet.

7 C *Agens, siue sedeat, siue stet, commodè, tum sui habita ratione, tum illius, qui curatur, ac luminis.*

Antea exposui illa ab Hippocrate recenseri, à quibus, per quæ, quibuscum, circa quæ chirur-
gia exerceatur. /A quibus ergo/ intelligere debemus medicum & ministros: /per quæ/ instru-
menta: /quibuscum/ lumen & locum: /circa quæ/ corpus totum laborantis, & vitiatam partem:
quæ & propositis verbis & sequentibus singula exequitur, qualia esse oporteat, non tamen eo
ordine, quo enumerauerat. quandoquidem orsus fuerat ab ægrotante, quod ab antiquis omni-
bus fieri solet, atq; ubi velis, sexcenta legas exempla apud omnes. quod autem pertinet ad hunc
locum, satis erit, quod à Poeta secundo Iliados in enumeratione profertur:

Dic mihi Musa, virum quis maximus est, vel equorum,

Atridas pariter qui sunt in bella sequuti?

Primò enim proposuit viros, deinde equos, non tamen primò de viris respondit, sed inquit,

Prima Pheretiadæ debetur gloria equarum,

Quas autem in morem celeres Eumelus agebat

Æquales ætate, pares tergo que pilo que.

D Monte in Pierio, quas enutritur Apollo.

Insignes ambæ, & Martis terrore carentes.

Maximus at longè fuit Ajax ille virorum.

Indignatus adhuc, dum nulla subibat Achilles

Prælia, nam pugnans omnes virtute præibat.

Alibi rursus, cum dixisset,

Tristis erat gemitus toruo & iactantia vultu.

Subiecit prius satisfaciens illi, quod secundo loco propositum fuerat.

Cædentum, & dura miseri, qui morte peribant.

In septimo autem Iliados volens quasi de industria indicare, non esse habendam huiusmodi ordi-
nis rationem, quum perpetua quinque tradidisset, primum de secundo tractauit, tum de quin-
to, post hæc de quarto, deinde de tertio. qui locus ab his versibus incipit:

Beotij hic, Iones, prolixa veste decori

Et Locrij & Phthij, & qui resplendebat Epeus.

Hæc de ordine orationis nunc semel dixisse sufficiat, ne quis alibi de huiusmodi re cupiat audi-
re. Quæ igitur ad agentem attinent, id est ad chirurgum, clara sunt omnibus, qui ad ea volent
animum

animum aduertere. Ostendit enim agentem, siue sedeat, siue stet, dum manum adhibet, commode figurandum esse, tum quod ad se ipsum pertinet, tum quod ad ægrotantem & lumen. Quod consilium quum perpetuum statuerit in singulis, quæ dicta sunt, commodam deinceps collocandi rationem demonstrat orsus à lumine, quod postremum positum fuerat.

- 8 *Luminis quidem duæ species, una communis, altera artificiosa. Communis non est in nostra potestate: Quæ arte comparatur, sita est in nobis.*

Speciem dixit εἶδος, quod vocabulum nunc semel intelligens ubique in memoria habeto. Maiores enim græcè soliti sunt appellare, & διαφοράς, & εἶδη, & τρόπους, partes, quæ generi subiiciuntur. Dixit igitur nunc Hippocrates luminis esse duas species, quali differentias duas & modos dixerit. Est autem commune lumen, quo omnes homines utuntur, sub dio potissimum; deinde in amplissimis ædibus, quibus patentiores fores sunt, ac luminis plenæ, quales nunc habitant in multis ciuitatibus, qui medicinalem artem exercent, quas à medico ducto vocabulo medicinas appellant: artificiosum lumen maximè fit, ubi lucernas, faces, lampadas, aut tale quid accendimus, deinde, quum totas fenestras, aut earum partem patefacimus, seu alias claudimus, alias aperimus. quod equè in foribus accipiendum est.

- 9 *Quarum utriusque duplex usus lumine aduerso, aut auerso.*

Duplicem proponit usum utriusque speciei luminis, & communis, & eius quod arte comparatur, aduersi scilicet, aut auersi. aduersum nominans πρὸς ἀντὶ γλῶ, ubi scilicet id, quod à chirurgo curatur, aut inspicitur, ad lumen spectat: auersum verò ὑπὲρ ἀντὶ γλῶ, ubi à lumine paulum declinat, quod in suffusione fit, & vno nomine in omnibus vitij oculorum, quorum affectus neque benè cognosci, nec curari queunt, ubi homo ex aduerso luminis collocetur, atque idcirco fugiendum est aduersum lumen: auersum autem ita sit oportet, ut is, cuius oculi à chirurgo tractantur, vel à lumine auertatur, vel ad ipsum spectet obliquus. Loquor autem nunc de ipsius oculis, non de palpebris, siquidem hæ tractari possunt, & si homo aduerso lumine collocetur, sicuti quando aquosa vesica extrahitur, vel pili laqueo excipiuntur, aut futura palpebris iniicitur, aut denique ubi medicus diducit palpebris non eget. Igitur, si lippiens aliquis vehementer exulceretur, vel id morbi experiat, sub quo figura in oculo sit acino similis, auerti ex toto à lumine debet per omne tempus, nisi quando medicus oculis remedia adhibet, cum eorum pars, quæ laesa est, sine lumine subijci curantis conspectui non possit. id quod etiam accidet, si in oculo excidere vnguem velit, suffusionem deducere, vel manu tale quid præstare. sed obliquus ad lumen spectare debet, cui manus iniicitur, ita, ut nec lumen pupillam feriat, nec medicus prohibeatur arte, hoc est aspectu earum partium, quibus medetur. Græcè autem aperte dicitur, qui auersus à lumine est, non πρὸς ἀντὶ γλῶ, non ὑπὲρ ἀντὶ γλῶ, sed potius ἀπὸ τῆς ἀντὶ γλῆς, aut λεξὸς πρὸς ἀντὶ γλῶ: Hippocrates tamen vsurpare ὑπὲρ ἀντὶ γλῆς maluit, quàm ἀπὸ ἀντὶ γλῆς.

- 10 *Auersi quidem luminis exiguus usus, & euident moderatio.*

Hoc supra demonstratum est, nulla enim pars exceptis oculis in eiusmodi lumine manus curationem desiderat. sed quoniam (sicut diximus) nullo pacto admoueri manus potest, ubi eger ex toto auersus est à lumine, præcipit, ut inter aduersum lumen, & auersum figuretur. at non propterea æquè in omnibus morbis à lumine auertendus est, sed quatenus res ipsa cogit. nam, si exulceratio est, aut pus subest, aut in oculo figura similis acino fit, aut ingens inflammatio, seu acris materiæ cursus oculum exercet, lumen vel modicum infestissimum est, sic, ut momento, materiæ cursum excitet, & dolorem moueat: leuiorem offensam sub lumine sentiunt, quibus curatur suffusio, vnguis, vel tuberculum in angulo, quod parum palpebras diduci patitur. iam verò qua moderatione auertendus homo sit à lumine, facillè comperies, si in hæc duo incumbas, ut & chirurgus id, quod agit, in oculo aperte videat, & ægrotans non magnopere affligatur. quod si vtrumque contrariè figurari hominem hortetur, ei, quod magis vrget, insistito: si neutrum superare iudicaueris, hominem prorsus medium collocato inter lumen aduersum, atque auersum. Nos sanè tibi viam indicauimus: hac usus inuenies, quā moderatione æger à lumine sit auertendus. Hippocrates verò ita loquitur existimans omnibus euidentem futuram, si qui in uenire ipsam studeant. non enim rudes docuit, quemadmodum nos nunc, sed admodum in disciplinis affueros, sic, ut ex eorum, quæ supra ostensa sunt, consequutione, talia per se nullo negotio assequantur.

- 11 *Quod verò ad aduersum attinet, ex luminibus, quæ dantur, conferunt quæ, conuerti ad illustrissimum oportet, cui manus adhibetur.*

Ut planè conspiciari chirurgus possit, quicquid in corpore ægrotantis molitur, in omni corporis

A corporis parte, oculis exceptis, eligere locum debet maxime lucidum. Est autem maxime lucidus sub dio in Sole, ubi nihil officit ei lucis. sed talis locus interdum nullus est in ædibus ægrotantis: sapius est quidem, collocare tamen ibi hominem non expedit, hyeme propter frigus, æstate propter ardorem. utriusque enim sua noxa est. adde, quod cauere perflatum oportet, cuius causa sæpe non modo idoneo aeri hominem non committimus, sed cauemus, ne prope portas & fenestras ducatur, si vehementior perflatus accedat. Vitamus autem ut quum maxime perflatum, ubi veremur, ne quid neruosum patiat, sicuti rursus Solem in ijs, quæ putrescunt, ut pote quibus periculū subest, ne sanguis erumpat. Recte igitur adiecit /ex luminibus, quæ dantur, conferunt q3./ non enim simpliciter ex luminibus, quæ dantur, eligendū est maxime lucidum: sed intueri etiam oportet an illustrissimum sit, ex ijs, quæ conferunt.

12 *Nisi ubi quidpiam, aut latere oportet, aut conspici non decet.*

Sententiam suam his verbis auctor minus euidenter expressit, ita, ut partes, quæ tractantur, non videantur in aduerso lumine collocandæ, quandoque aut latere quidpiam oportet, aut conspici non decet: at longe aliter sensit, idcirco subiicit.

13 *In quo casu id, quod manu curatur, ad lumen conuertendum: Chirurgus autem ad id, quod curatur, cum eo ne lumen officiat.*

Debuit enim ipse totam sententiam aperire hoc modo. quod verò ad aduersum attinet ex luminibus, quæ dantur, conferunt quæ, conuerti ad illustrissimum oportet, cui manus admouetur, non tamen purum ac sine vllis tenebris lumen seruare: sed, ubi latere quidpiam oportet, vel conspici non decet, se ipsum ita collocare, ut partes, quæ curantur, sibi conspiciantur, cum ceteros omnes lateant. Vniuersa igitur orationis sententia sic habet. Roget fortasse quis causam, quamobrem medicus velit assistentes celare, an quia docere magisterium chirurgiæ aliquos ex presentibus nolit, tanquam indignos, qui id percipiant: quin & ab ægrotantium necessarijs est etiam cauendum, quod non ferant id incidī, quod necessarium est corporibus, quæ eiusmodi manus operam requirunt, indignantur enim, & chirurgo quasi carnifici succensent. Quid quod res sepe numero cogit, vel putrem testem abscindī ex toto, vel neruum transuersum secari, ne homo neruorum distentione prehenderetur? Quidam verò idiote, nec videre multitudinem puris sustinent: alij ne suppurantem quidem locum planè aperiri à medico permittūt, in quo casu medici propositum est, ut his minime aduertentibus abunde affectum locum secet, & pus vniuersum effundat. id quod & ob laborantis timorem nobis interdum accidit: non nulli liquidem ita manus curationem pertimescunt, ut exanimentur metu ipso tormenti, priusquam incidantur. in quo casu medicus dicere probabiliter debet, quantum spectat ad manum adhibendam, postero die se consideraturū, nunc se nolle manum iniicere, sed perfundere aqua, vel spongijs fouere, ut locum cataplasmati aut medicamento idoneum reddat, atq; interim unidum hominem nec opinātem secare. Hæc quidem medicus assistentes celat, ut ipsos aspectu prohibeat: Alia verò ob laborantis pudorem, ubi graui animo fert videri à multis, quo vitio in ano vel obscenis partibus affligatur. has enim partes inuitissimus quisque alteri ostendit: foemina verò clunes, pectus, ventrem, atque adeo magis pubem. Porro autem quidam Hippocratem reprehendens, hæc ait ab ipso ridiculè appolita. nam, qui has partes celari volunt, quæ manu curantur, his in procliui est omnes eicere foras, & medico duntaxat, aut vni cuiuspiam, vel alteri ex ijs, qui adsunt maxima familiaritate cōiuncti, rem committere. Verum qui hæc profert, ignorare videtur complures, quos æquè pudet prohibere præsentibus aspectu, & millos facere, atque suos affectus conspici. Fit etiam sepe, ut, & si iussi fuerint discedere, curiosi quidam aut non nulli ex familiaribus atque amicis solliciti studio cognoscendi quæ ad egrum spectant, remaneant impudenter. Per huiusmodi ergo occasionem, ineat medicus gratiā apud ægros, quæ nihil obest, polliceatur quæ ipsis seorsum nullo audiente, se manum ita adhibiturum, ut multos lateat, potest enim (ut dixi) dum vel aquam perfundit, vel spongijs fouet, quasi non dum sit manum admoturus, momento effectum perficere, ijs, qui videre cupiunt, aliam rem agentibus. Verum huiusmodi quæstiones præter medicinæ præcepta sunt, quæ nos eorum, quæ dicta sunt, consequutione impulsī, & contradicentium importunitate, commemorauimus. Sed proximum est, ut ad sequentia transeamus.

14 *Hæc enim via, qui agit, videt quod tractatur, conspectui non subijcitur.*

Hic quoque, perfecta oratio huiusmodi est: /Hæc enim oratione, qui agit, partem cernit, quæ manu curatur, ea quæ ipsa cerni ab alijs non potest, / neque enim, quod parti accidit, quæ curatur, utrumque

utrumque ad medicum refertur, nempe, ut oculis exposita sit, & lateat.

E

- 15 Verum sui habita ratione, dum sedet, Pedes habeat è regione genuum deorsum ad rectam lineam, quod quæ ad intervallum spectat, non magnopere inter se coniunctos: Genua vero, paulo supra inguinum regionem, diducta sic, ut cubiti insidere illis possint, & vtrinque dari ad latera.

Postquam modum expressit, quo Chirurgus respectu luminis debeat figurari, ad habitum venit, quo sui ipsius habita ratione commodè collocetur. supra enim inquit Agens, siue sedeat, siue stet, commodè, tum sui habita ratione, tum illius, qui curatur ac luminis: deinde primò exequutus, quod postremum positum fuerat, & necessariò simul mentione facta moderationis, quæ collocari debeat, ratione eius, qui manu curatur: iam docet, quo pacto se ipsum intuitus debeat commodè figurari. commodè autem respectu habito ad se ipsum collocari nihil potest, quod simplex sit, & quasi articulis distinctum: sed, si partes consideres, variè potest aliàs alio modo figurari, sic quæ inter dum etiam commodè collocari. Ergo, si quis seu consolidat, seu stet, crura plurimum inter se diducat, erit eorum habitus à moderatione alienus, perinde, ac si ex toto hæc committat, efficiat quæ ut se contingant, vel alterum alteri superimponat, atque adeò, si in longitudinem crus totum extendat, vel si pedem non statuat è regione genu, sed versus partem posteriorem, multum à recta linea declinantem. Merito igitur Hippocrates docens quæ moderatione, sedens chirurgus sui habita ratione, utatur in singulis partibus collocandis, præcipit, ut pedes è regione genuum contineat. Sed, cum è regione accipi bifariam possit, modò in ijs, qui membrum in longitudinem extendunt, modò in ijs, qui ipsum recta deorsum continent, sicut, ubi stamus, iure deorsum ad rectam lineam addidit, ut semper autem consuevit, situm è regione *ἴση* appellat. Iubet igitur pedes modicè inter se diduci, genua quæ paulo inguinum altitudinem excedere, eo consilio ubique, ut decorè figuretur, ut paratus ad opera sit, ut sic stabilis sedeat, ne labet. quare genua & femora tota usque ad inguina, eatenus inter se diduci iussit, ut decorè, ut tutò sine curationis impedimento, cubitis & aliqua brachiorum parte modò femoribus insidat, modò vtrinque porrectis utatur. quam rem his verbis expressit: *ἑστῆς* significavit femoribus insidere: verbo *ὑπὸ ὧν* dari vtrinque ad latera.

- 16 Vestis succincta, distincta, æquè, similiter, in cubitis atque humeris.

Succinctam dixit pro collecta, ut neque fluat, neque medicum strangulet: verbum distincta ad vestem refertur, cuius nullam partem voluit duplicari. Quod postremis verbis adiungitur æquè, similiter in cubitis atque humeris, ambiguum est: aut enim æquè & similiter vtriusque brachij & cubitum & humerum veste velandum existimat, ita, ut brachia inter se conferantur, quod grecorum plerique *συγκρίνειν* dicunt: aut cubitos cum humeris comparat, volens cubitos æquè & similiter, ut humeros, in utroque brachio circumdari. Constat autem noluisse vestem supra cubitos terminari, cum eos nudari turpe sit, non solum medico, qui artem adeo honestam exercet, sed & forenses causas publicè agentibus, quos pudere manifestum est athletarum more supra cubitos vestem rejicere: sed & huiusmodi genus amictus expelli alioquin debet, ut potè sub quo non modò ad cubitum, sed ad totum brachium, frigus aspiceret: non tamen ostendit, quatenus ultra cubitum velari brachium debeat. an id omisit, quia manifestum erat, & inueniri à nobis omnibus facile poterat: quum in qualibet opera, non magno negotio consiciatur, quatenus ultra cubitum tegendum veste brachium sit, si in decus & propositæ manus curationis usum hinc quoque incumbamus. Verum, quod paulo supra, ubi latere quid oportet, contraria consilia esse proposui, nempe obscuro aere opus esse, ne quod curatur, oculis patere possit: claro lumine, ut id chirurgico conspicuum sit: illud autem sequendum esse, quod superat, ac si vtrunque idem posse videatur, medium prorsus accipiendum: idem hinc faciendum est, & ubicunque consilia contrarias res hortantur. medium siquidem inter vtrunque semper est eligendum: si alterutrum superabit, ad illud vergendum. Quod igitur ad manus curationem pertinet, ipsa per se nudari totum brachium exigit: contra, decus velari totum. quamobrem deligi semper vtriusque medium convenit, atque in id, quod vrget, inclinari.

- 17 At ratione habita partis, quæ tractatur, quod pertinet ad longe vel prope, ad supra vel infra, ad hinc vel hinc, ad medium. Quod quidem ad prope vel longe, termini sunt cubiti, qui in priorem partem ultra genu, in posteriorem ultra latera ferri minimè debent. Quod ad supra & infra, non superius quàm ut manus ad mammas perveniant: non inferius quàm ut pectore super genua incumbente, manus cum humeris ad rectum angulum figurentur. Quæ quidem in medio sunt, ita se habent: sed, quod ad hinc vel hinc, porrigatur corpus, & huius illa pars, quæ agit, quatenus inclinari convenit, modò sede non excedat.

Cum medico imperaverit, ut tum sui habita ratione, tum illius qui curatur, ac luminis, commodè

A commodè vel federet, vel staret, & primò commodam pro vno quoque horum trium sessionem aggressus fuerit, orsus à lumine, deinde ad sessionem medico idoneam transiens, hanc ipsam expoluerit, venit ad tertium, quod restat, sedendi moderationem ostendens, quantum spectat ad eum, qui manu curatur. neque enim sedere chirurgum maximè prope hominem conuenit, ne loci angustia manus ab agendo prohibeantur, neque ita recedere, vt vix ad illum perueniant. hic igitur terminos quosdam constituit, quos chirurgus in priorem aut posteriorem partem excedere non debet. illud autem obliuisci non oportet, quod primò sedentis mentionem facit. Chirurgum igitur iubet adeò recedere ab ægrotante, vt cubiti nec in priorem partem quam genua, nec in posteriorem quam latera porrigantur. hos itaque fines statuit interualli, quod ad priorem & posteriorem partem refertur, id quod in longitudinem appellatur: in reliquis vero duobus, vno in latitudinem, altero in altitudinem, siue profunditatem (vtrouque enim vocabulo dicitur) altitudinis eum finem chirurgus posuit, ne superius quam sit mammarum situs, manus porrigat, nec inferius quam vt pectore super genua incumbente ad rectum angulum cum humeris figurentur, quem habitum *ἰσχυρὸν* appellat: hic autem medius est, inter vltimum cubiti flexum vltra quem flexi, & vltimam porrectionem vltra quam extendi, brachium non potest: latitudinem, quæ ad vtrumque latus pertinet dextrum scilicet & sinistrum, eo finit, vt catenus inclinari vtile sit, dum sedes non moueatur, hoc est illæ partes corporis, quibus sedemus, sedili que innitimur. Scripsit quidem terminos perpetuos non eodem tempore, quia non licuit, quando egit de longitudinis interuallo, latitudinem aut altitudinem docere, sicut nec vbi de altera, reliquas duas. vult autem (vt arbitror) medicum ipsum animo hæc, quæ commemorauit, omnia quocunque tempore persequi. quum, quicquid agatur, omnia simul vsui sint. Sed, quum medius quidam sit sessionis habitus, vbi medicus nihil intuetur, nihil agit, in eo figurari decorum magis atque honestum est, quasi pingi debeat eius imago, aut fingi. At, quum ad chirurgiam venit, mouere manus debet interdum in priorem & superiorem partem simul, tum in sinistram priorem ac superiorem: rursus ab eo habitu in posteriorem partem, vel vtramque manum, vel alteram tantum adducere: sic & in inferiorem interdum & rursus in superiorem, aut in dextram vel sinistram. interuallis enim inter se coniunctis, variè status mutantur. commune est omnium sessionem tueri, quam non nulli relinquunt ex interuallorum termino excedentes. nam, si pars, quæ tractatur, adeò sublimis sit, vt medicus manus ferat super mammas, cogetur interdum sublimior à sede leuari, vt quasi confurgens, neque sedeat, neque stet, sed litus sit in medio vtriusque, neque hæreat. at si plurimum in dextram vel sinistram partem inclinet, ob id sedili mouebitur, ita, vt periculum sit, ne de eo cadat. quid attinet dicere, si & in priorè vel posteriorem partem conuertatur idem ipsi in vtrâque euenturum esse. Tantum, vbi in inferiorem partem inclinet, præterquam quod indecorè sedebit, lumini etiam officiet.

18 *Stantem verò oportet pariter ambobus pedibus bene insistere, sed agere altero insistentem, at non eius partis, cuius manus agit: Tum genu inguinis altitudinem æquare, perinde atque vbi sedet: In cæteris seruare eosdem fines.*

Quum sessionem absoluerit, ad standi rationem venit, eadem prorsus iubens obseruare stantem, quæ sedenti supra imperauit, excepto quod id, cui pedes insistent, non debet æqualem vtrumque pedem sustinere. alterum enim vult sublimiorem haberi, qui tamen non sit e regione manus agentis: in quo statu perseverandum esse, quoad manus opera vtitur, modò pars, quæ curatur, neque erectior sit, neque multum in longitudinem aut latitudinem recedat, nulli dubium est, qui eorum, quæ dicta sunt, meminerit. Pars enim, quæ adeò sublimis sit, vt medicus cogatur super suarum mammarum regionem manus admouere, illum plus iusto sursum trahendo, loco dimouebit: eundem loco excedere similiter, coget, si longè rursus adeo distet, vt in priorem partem ferri necesse sit. Quoniam verò alterum pedem voluit rei cuiuspiam inhaerere, hic quoque altitudinis modum declarauit, præcipiens genu eodem modo ad inguinis altitudinem figurari, quo in sedentibus dixit. ibi enim ait genua habenda esse paulo supra inguinum regionem, quandoquidem huiusmodi sessio stabilis maximè est, & ad agendum honestissima, atque expediissima. Sed nunc alterum genu tantum vult haberi sublimius ad inguen spectando: ibi multitudinis numero genua posuit, quum vtrumque crus equè altum contineretur.

19 *Ægrotans autem cæteris corporis partibus Chirurgico subseruiat, stans, sedens, aut cubans, sic, vt in eo habitu facillime perseueret, obseruans fluxum, statum, inclinationem ad latera, inclinationem deorsum, ita, vt conuenientem habitum, Speciem que affectæ partis sueatur, in porrectione, in tractatione, in habitu, quo contineri potest debet.*

Non immeritò expolitores huius libri variè hunc locum explanarunt. nam & quatuor vocabulorum

1. Prog. 15. 4.^a.
193. f.

bulorum obscuritas ὑπορρύσεως (inquam) quo ipse fluxum indicauit, ὑποσάσεως, quo statum, E
ἐκτρέψεως, quo inclinationem ad latera, & καταντίας, quo inclinationem deorsum: & q̄ paucis
significare multa voluerit, in causa fuerunt, vt de propolis dissiderent. quippe qui auctoris sen-
tentiam vt potè obscuram, opinione & coniectura magis, q̄ scientia persequuti in varias dissen-
siones incurrerunt. Equidem, quod in huius generis omnibus facere conitui, nunc quoque
conabor, omisis enim, quæ minimè sunt probabilia, referam, quæ mihi non sine ratione excogi-
tata esse videbuntur, simulque, quid ipse in hac sententia, explicabo. initium verò faciam ab ob-
scuro nomini enodatione. siquidem simplex cōposito prius est, & sæpe simplicium com-
positio facit obscuritatem, quamuis ipsa plana sint: id quod videre licet in propositis verbis. Nā-
que ὑπορρύσειν quidam in humoribus acceperunt, atque hi bipertiti sunt: non nulli referunt ad
eos, qui extrinsecus infunduntur: alij ad eos, qui ex corpore fluunt. Sed & horum quidam loqui
Hippocratem aiunt de ijs, qui educuntur, dum manus curatio adhibetur: quidam postquam ad-
hibita est. Eadem dissensio est de vocabulo ὑποσάσεως. nam, cum status humorum fluxui aduer-
setur, iure de hoc quoque controuersia est. Alter expositorum grex non de humoribus, sed de so-
lidis corporis partibus vocabulum ὑποσάσεως & ὑπορρύσεως dictum existimat, volens ὑπόσα-
σιν significare erectiorem situm, vel partis, quæ tractatur, vel corporis vniuersi: ὑπορρύσειν verò F
inclinationem deorsum, perinde quasi κατάρρυσιν dixisset. vsurpauit enim in hanc sententiam
vocabulum κατάρρει in prognosticis, vbi inquit, || Id verò grauius est, si se ipsum æger conti-
nere non valens in lecto, subinde ad pedes delabatur. vbi delabatur dixit κατάρρει. Cum hac ex-
positione faciunt vocabula ἐκτρέψεως & καταντίας, quæ superioribus proxime subiecit. namq̄
inclinationem ad latera ἐκτρέψιν appellauit, siue totius corporis sit, siue partis quæ curatur. κα-
ταντίαν verò dicunt accipi propriè in membris, non secus atque ὑπορρύσειν in toto corpore. vbi
enim corpus vniuersum in eadem sede cōtineatur crure aut brachio immobili, & deorsum delaba-
tur, eiusmodi situm aiunt κατάρροπον appellari. quæ ipsa per se vera dicunt, quamuis sibi nō sa-
tis in vniuersa oratione consent. Aliter enim omnes iterum inter se discrepant, q̄ eum habitum,
qui quatuor verbis, nempe statu, fluxu, inclinatione ad latera, inclinatione ad inferiora significa-
tur, alij seruandum esse, alij cauendum agris, velle Hippocratem arbitrantur. Nihil autem inter-
est, quod attinet ad totius orationis sententiam, triplicem scripturam esse vocabuli ἐκτρέψεως. cum
non nulli secundam eius syllabam per τ ρ ε scribant, non nulli σ quoque primò adijciant ἐκστρε-
ψιν scribentes, alij & ἐκτριψιν per τ ρ ι, nos enim suprà vnam duntaxat adscripsimus. Propo-
sita igitur vocabula manifesta sunt, à verbo enim ἐκτρέπεσθι ducitur ἐκτρέψις, à verbo ἐκτρίβε G
σθι ἐκτριψις. quum scriptura nihil aliud velit, quàm vt hæc ab ægrotantibus obseruentur. viden-
tur tamen omnes, qui hunc locum explanarunt, auctoris sententiam perspexisse ex parte: totam
tamen ad vnguem comprehendere minimè potuisse. si quis enim animaduertat, quod postre-
mò additur, / in porrectione, in tractatione, in habitu, quo contineri postea debet, / omnes ve-
rum dixisse videbuntur. quum tribus temporibus aliter alia sint ægrotantibus profutura, scili-
cet in porrigendo, in manu adhibenda, in continendo post curationem. non tamen poterunt
omnia coniungere, quod liquido constabit, si hæc tria tempora discernantur. Primum est, cum
ægri se ipsos medicis tradunt, vt vitium benè cognoscatur, quod ἐν παρέξει, id est, in porrectio-
ne dixit: alterum deinde, quum medicus circa vitiatam partem aliquid agit, quod vocauit χει-
ρισμὸν, id est tractationem: tertium, quod dixit ἐν τῇ ἐπειτα ἔξει, id est, in habitu, quo conti-
neri postea debet. tunc enim ad id consilium dirigitur, vt homo affectam partem eodem modo
contineat figuratam. Deduxit ergo vocabulum habitus, eo quod se habeat in eodem. In om-
nibus autem tribus temporibus, quoddam commune est omnium, quoddam proprium singu-
lorum. commune est seruare vitiatam partem immobilem in sua figura, quod requiri dictum
est, nisi medicus aliquo modo mouere ipsam tentauerit: inde ad perfectam curationem singu- H
lorum proprius est vsus, in porrectione, vt medicus exquisitè, quid curaturus sit, intelligat, in
manu admouenda, vt, vbi ossa fracta sunt in diuersa extendat, rectè componat, atque deuinciat:
vbi prolapsa, in diuersa extendat, reponat, vitiatam partem idoneo vinculo complectatur: vbi
scalpellum adhibet, vt pus vel saniem effundat, vel quod putre alicubi est, excidat, aut candenti
ferramento adurat. His igitur utilis est humorum fluxus, ac status, ille, si excitetur, excerni si-
quidem oportet humores à natura alienos: hic, si euitetur, quum subsistere intus noxium hu-
morem non expediat. sed interdum subsistere commodum est, sicut vbi in magna suppura-
tione subito excerni pus, aut humorem aquosum volumus. Multo autem magis in membris,
quæ tractantur, dum manus adhibetur (vt diximus) obseruari statum ac fluxum conuenit: si-
militer & in solidis partibus animalis obseruari, quæ dicta sunt, à laborantibus debent, vt eā-
dem ratione fiant per tria tempora, nimirum porrectionis, tractationis, & eius habitus, quo
contineri postea conuenit. Pars enim, si dum inciditur, nimis porrigatur, chirurgum coget alie
no loco secare, ac nec modum aliquando, nec quæ seruanda sunt; tueri, propterea quod æger
anteueniat

Ante aeniat scalpellum atq; anteuertat: si retrahatur, efficiet, vt curatio minus absoluat, & a medico interdum dimidia, interdum quoq; minor, relinquatur: quod accidet ægrotantibus, interdum etiã deligatis, vt, vbi, dum ad ventrem manu curant, aut se attollunt ad spinam, aut conuertunt in latus: quod significauit, quum dixit /in latera inclinationem/. Aliqñ autem nihil tale moluntur, sed musculos vehementer intēdunt: atq; hanc ipsam mutationem mihi videt indicasse quum ait, *δ δ εἰ*, id est conuenientem, vbi inquit, /ita, vt conuenientem figuram, speciem que affectæ partis tueatur/. Cuiuslibet autem in aperto est, quod malum afferat æger, vbi oculus perforat, si habitum speciem q; non seruet, aut transmutetur vel intenda, ita, vt facies sanguine suffundatur. æque etiã exquilatam manus curationē corrumpit, si medico caluarię os excidēte paulum caput attollat, aut demittat, vel in latus inclinet: id quod ēt euenit, si se vehementer extendat, moto enim habitu mouetur quoq; litus partis, quæ curatur. Efficiunt aut intēdones in alijs quidem partibus, vt sanguis erumpat: in musculis non solum hac ratione nocent, sed & partem interdum sublimiorem præstāt, interdum humiliorem. vbi enim subiectum os est, musculus attollitur: vbi inane spacium, contrahitur ac deprimitur, sicut euenit in sede, quæ inter costas est, & in ea, quæ iuxta ventrem.

20 B *Vngues, neque longiores, neq; breuiiores sint, digitorum summitatibus. In exercendo vtendum digitis quidem summis, plerunque indice cum pollice: tota autem manu prona, ambabus verb aduersis.*

Quum de ægrotante egerit, quatenus illi cum cæteris cōmunitas est, iterum his verbis ad chirurgum reuertitur, indicans quanti esse vngues debeant, & quales digiti, tum qua ratione illis vti oporteat. Vngues igitur ad summorum digitorum opera, quæ propriæ digitorum sunt, neq; ipsos exuperare, neq; exuperari, optimum esse vberius in primo de vlu partium explicauimus, vbi totam manus naturam ostendimus: quod ad hunc locum attinet. satis erit verba duntaxat exponere. Duplex autem scriptura, quum sit, vtramque explanabo. Altera huiusmodi est, vngues neque longiores neq; breuiiores sint digitorum summitatibus: exigua liquidem corpuscula, quæ summis digitis capiuntur, & ad quæ summorum digitorum opera egemus, hac ratione facilius legentur. deinde ab altero capite exorditur /in exercendo vtendum digitis quidem summis, plerunque indice cum pollice/ sic, vt prioribus verbis magnitudinem vnguuium digitorum completatur, sed his digitorum vsum. Altera verò sic habet, /vngues, neque longiores, neque breuiiores sint/. dehinc alterum principium est, /digitorum summitatibus in exercendo vtendum/ vocabulo /summitatibus/ sexti casus posito, vt vniuersa sententia sit huiusmodi: Vngues neq; excedant oportet digitorum longitudinem, neque exuperentur ab hac, sed prorsus ipsam æquent, si quidem eorum summitatibus vtimur. Videbitur hoc falsum, nisi, vt congruū est, accipiatur. Non nulla quidem opera totis manibus præstamus: brachium femur crus aut aliud quid huiusmodi vtrâque manu prehendentes, in diuersa ducimus, intendimus q; in quibus operibus digiti agunt tanquam particulæ manuum, perinde atq; prominentiores palmæ partes, & alię particulæ: at vbi in oculum demittimus acum, vel superiorem inferiorem ue palpebram, aut oculi vnguem incidimus, tunc digitis vtimur, vt digitis, non vt particulis manus: similiter, vbi scalpello, vel quopiam alio tali quid agimus. in omnibus igitur digitorū actionibus summis ipsis vtimur, ac propterea dixi rectē scriptum esse digitorum summitatibus vtendum. Deinde ab altero capite incipit, /digitis quidem summis plerunque indice cum pollice/ vna oratione declarans plerasque musculorum actiones fieri, vbi index pollicis (quem *αὐτὶς* vocant) ē regione occurrit, sic videlicet, vt quod comprehendendum est, summis ipsis vtrifque capiatur: tunc enim duntaxat propositis digitis vtimur. quin, & si tribus digitis aliquid comprehendatur, vt, vbi specillo illinimus, aut acum demittimus in oculum, maximam partem operæ duo illi præstant, aliquid etiam confert & medius. Sed tota manu prona vtitur chirurgicus, eius sinu id prehensens, quod curatur. Digiti qui-

Cdan oportet digitorum longitudinem, neque exuperentur ab hac, sed prorsus ipsam æquent, si quidem eorum summitatibus vtimur. Videbitur hoc falsum, nisi, vt congruū est, accipiatur. Non nulla quidem opera totis manibus præstamus: brachium femur crus aut aliud quid huiusmodi vtrâque manu prehendentes, in diuersa ducimus, intendimus q; in quibus operibus digiti agunt tanquam particulæ manuum, perinde atq; prominentiores palmæ partes, & alię particulæ: at vbi in oculum demittimus acum, vel superiorem inferiorem ue palpebram, aut oculi vnguem incidimus, tunc digitis vtimur, vt digitis, non vt particulis manus: similiter, vbi scalpello, vel quopiam alio tali quid agimus. in omnibus igitur digitorū actionibus summis ipsis vtimur, ac propterea dixi rectē scriptum esse digitorum summitatibus vtendum. Deinde ab altero capite incipit, /digitis quidem summis plerunque indice cum pollice/ vna oratione declarans plerasque musculorum actiones fieri, vbi index pollicis (quem *αὐτὶς* vocant) ē regione occurrit, sic videlicet, vt quod comprehendendum est, summis ipsis vtrifque capiatur: tunc enim duntaxat propositis digitis vtimur. quin, & si tribus digitis aliquid comprehendatur, vt, vbi specillo illinimus, aut acum demittimus in oculum, maximam partem operæ duo illi præstant, aliquid etiam confert & medius. Sed tota manu prona vtitur chirurgicus, eius sinu id prehensens, quod curatur. Digiti qui-

Ddem affecti abundē altera manu extenduntur, componuntur q;: at non abundē brachium, femur & crus, sed exigunt huiusmodi partes ambas manus ex aduerso concurrentes, vt membrum vniuersum in orbem complectantur. Insuper manu prona opus est, vbi cucurbitulam dehgimus, & vbi paruum, quo adurimus, ferramētum comprimimus, & spongiā imponimus: sed & in multis medicinæ operibus, quæ fortasse euidentiora sunt, quàm vt necessaria sint, quæ proposuimus: cuiuslibet enim per se venire in mētem potest omnium actionum, & digitorum, & manuum, quas partim vtrâque manu, partim altera tantum, partim solis digitis molimur.

21 *Optima autem digitorum structura est, vbi ipsis magnum spacium interiectum est, & ē regione pollex cum indice concurrat.*

Non enim fieri aliter posset, vt in agendo ē regione pollex cum indice concurreret, nisi spacium esset inter eos latius. quod & in alijs digitis cōmodissimum est, vt, vbi vastius quidpiam oporteat vndique in orbem comprehendere, plurimum inter se distantes id præstare valcant.

22 *Morbus, quo & leduntur, quibus à primo natali die, vel in educatione, assuevit pollex sub alijs contineri part.*
Cum

Cum eadem sit vtriusque scripturae sententia, duae enim reperiuntur, ad eam, quae dilucidior est, prius aggrediar. Arbitrantur non nulli, qui rationem ignorant, referendum hoc esse ad consuetudinem eorum, qui solent pollicem sub alijs digitis tenere: quo fit, ut laboris expers paruius sit, & intervallum inter ipsum et indicem minimè augeatur: quae res in morbum manus, quod perinde est, ac si noxam dixerit, terminatur. Placet alijs referri rem ad morbum, oriri verò hunc, vel pollice sua sede excedente, vel loco, qui inter pollicem & indicem est, exulcerato, & in curatione dura cicatrice inducitur, ita ut musculus, qui inter eos est, induratus, vel quopiam vitio tabescens alimento incremèto quod prohibeatur. interdum etiam carne inter digitos, quod valde putruerit, absumpta, ac dura postmodum cicatrice inducitur, intervallum angustum inter pollicem & indicem redditur, & ipsi inter se, quasi vincuntur, ac praecipue, ubi locus (ut dixi) duram acceperit cicatricem. Quin & huiusmodi vitia in pueris negligi plerumque verisimile fit: eos verò, qui firma aetate sunt, iussos à medicis mollire pollicem, mouere quae, intervallum, quod inter ipsos est, alimento idoneum reddere. adde, quod ipsi totum corpus increvit, & si quid laedatur, aliud duntaxat desinit: at infantibus, ubi primò crescunt, cum morbo ipso opprimuntur, praeter id vitium, quod digitos non moueant, affectae partes non augentur, & propterea, quod inter digitos est, intervallum contrahitur. Quibusdam hoc inquit euenire: alijs verò ob cicatricem duram, & aliquod eius loci, quod in medio est vitium durum. quare quasi aliquo vinculo continetur, hoc est, prohibetur pollex ab alijs diduci: sic enim accipiunt aliqui verbum/contineri/, & si his illud maximè aduersetur, quod iuxta hanc expositionem non debuit Hippocrates /sub alijs/ dicere *ὑπὸ τῶν ἄλλων*, quod causam, sed *ὑπὸ τῶν ἄλλων*, quod loci intervallum significat, cum mala, quae inter ipsos incidunt, intervallum contrahant, atque alligent. De his igitur, ut tibi videbitur, iudicabis, eligens, quod maximè probabile sit: verba enim ita obscura diuinationem magis exigunt, quam sapientiam: nos autem ad antiquam scripturam reuertemur, quam Asclepiades fortasse vitiatam suspicatus integram hoc modo habere coniecit. /Morbus, quo & laeduntur, quibus à primo natali die, vel in educatione assuevit/ & quae sequuntur. fortasse autem haec fuit germana Hippocratis scriptura. Putauit Heraclides Tarentinus intelligendos esse affectus, ut perfecta oratio tota sic scribatur /morbus à quo, & laedens affectus, quibus à primo natali die, vel in educatione/, & quae sequuntur.

- 23 *Agens uti vtraque manu ad omne opus debet, & ambabus simul, siquidem ambae similes sunt, id spectans, ut recte, ut decorè, ut celeriter, ut iocundè, ut eleganter, ut promptè.*

Prestari quoduis iubet vtriusque manus auxilio: id enim ad celeriter ac decorè agendum maximè accommodatur. Posset quidem medicus tentare dextra, ubi dexter hominis oculus curatur, acum dimittere, vel excidere vnguem, vel aliud quid tale, & idcirco adducit /id spectans ut rectè, ut decorè, ut celeriter, ut iocundè, ut eleganter, ut promptè/ quoniam haec consequemur, si, quae ratione proposuit, exerceamur. quale autem vnumquodque esse debeat, mox indicat. Quod verò ad hunc locum attinet, illud meminisse conuenit, quod omnium, quae hic habentur, caput est /quomodo/: id vnum ex illis est, quae prima diuisione comprehenduntur. Illud etiam obliuisci non oportet, quod manus similes appellauit, quanquam specie non distant.

- 24 *Machinamenta autem, quando, & quomodo, exponuntur: ubi oportet, ne operam impediunt, ne ue longius distet, quam ut prehendi possint, sed collocentur iuxta eam corporis partem, quae tractatur: quod si ab altero praebeantur, is paulo ante paratus sit, exequatur autem, ubi imperaueris.*

Non solum spatham habentem in summo capitulum rotundum, cauum quod, & scamnum, cui ab vtraque parte axes sunt, & alia, quae machinationum structura continentur, sed & quae communì nomine *ἄρματα* id est instrumenta, vocantur, venire sub *ὀργάνων*, id est machinamentorum, appellationem planè hic ostendit, quum inquit /quam ut prehendi possint/, deinde /quod si ab altero praebeantur/: namque haec, dum manum adhibemus, & nos ipsiprehendimus, & ab alijs accipimus.

- 25 *Iam verò assistentes, id, quod curatur, eo modo praebeere debent, quo traditum fuerit: reliquum verò corpus continere sic, ut immobile praesent: item habere silentium, & ei, qui praest, auscultare.*

Clariora haec verba sunt, quam ut explanationem desiderent.

ARGUMENTVM SECVNDI LIBRI

Ab affectarum Partium ac ipsarum affectionum natura communia Praecepta de recta Deligandi ratione traduntur.

Galenus

GALENI IN HIPPOCRATEM
DE OFFICINA MEDICI
COMMENTARIUS SECVNDVS

Vido Vido Florentino interprete.



Inculi ratio duplex, altera illius, quod inijcitur, altera illius, quod iniectum est. Quod inijcitur, ut celeriter, iocundè, promptè, eleganter: celeriter quidem, ut opus expediat: iocundè, ut facile præstetur: promptè, ut ubique sit in promptu: eleganter, ut oculos deleat. Qua verò exercitatione hæc assequamur, dictum est.

B

Quædam communia sunt vtriusque rationis vinculi: quædam propria alterius. promptè, & celeriter proprie ad vinculum pertinent, quod inijcitur: rectè, & decorè, ad id, quod iam iniectum est, ipse autem id quod

inijcitur, vocat *ἐπὶ ἀσπίδος*, quod iniectum est, *ἐπὶ ἀσπίδος*: iocundè, & eleganter vtriusque sunt communia, iocundè quidem, tam voce, quam significatione: at eleganter, quod ad vocem spectat, commune est vtriusque, quod ad significationem non ita. nam elegantia vinculi, quum adhibetur, in manuum motu consistit: quum iam adhibitum est, in ambitu linteorum. Possumus autem dicere fascias eleganter circumdari, loquentes de vinculo, quod inijcitur. At iocunditas num magis etiam attenditur, cum adhibetur, quam quum iam adhibitum est: siquidem hoc solo fasciarum pressu dolorem affert: at quod adhibetur, & eo nomine, quod membrum incommodè continetur, interdum enim ea de causa comprimitur, licet fascia rectè circumdetur. Neque alienum est etiam censere communem vtriusque esse compressum eorum, quibus tanguntur, quæ vel comprimunt, vel non comprimunt, eius quidem, quod inijcitur, quatenus pars, quæ curatur, premitur, vel non premitur, sub continentibus: at eius, quod iniectum est, quatenus suspenditur, ut quum brachium mitella excipitur, vel quatenus continetur: ut quum ea cruri subiiciuntur, quibus fulciatur. Non mediocriter autem confert ad vincendi iocunditatem, agendi celeritas: celeritati verò maximè promptitudo conducit: quin & hæ sunt perfectiones vinculi quod inijcitur, potissimum propria, ut & sine pressu contineat, & promptum sit, atque paratum. namque error in collocando ad partem quoque alligatam spectat, sed nunc agit de membro vinciendo, ubi commodè figuratur. Statui verò suæ sunt perfectiones & vitia, non secus ac fasciis, quarum, omisso statu, in præsentia mentionem facit. Ergo, ubi paratum vinculum adhibeatur, opus maturè perficitur. ipse enim, quid sibi veller promptitudo, expressit, cum inquit / promptè, ut ubique sit paratum: quod evenit, ubi, qui deligat, prouidit, ut nihil ambigere nihil scrutari debeat in agendo, hoc ne, an illo modo circummagere fasciâ conueniat. Promptitudo igitur, quæ idem est, atq; præparatio, operam facillimè absoluit: iocunditatem ipse docuit sitam esse in facile agendo: sed celeritatem constat cum præparatione & agendi velocitate coniungi. Iocunditas igitur illis annumeratur, quæ magnopere ei conducunt, qui manu curatur, atque ob eam celeritas, quam promptitudine, dum agimus, facile consequimur: elegantiam vero aspectu gratam (sicut ipse deinceps adscripsit) præter ea, quæ necessaria erant, in chirurgico posuit, ut quæ ipsius gloriam augeat apud vulgus, cui obnoxius est ambituosus, perinde quasi amore captus. hac quanquam non capitur, qui humanus est, non tamen laudem aspernatur, eo incum-

C
bens, ut magis apud agros valeat auctoritate. quandoquidem sibi magis obsequuntur, quæ res illis utilissima est. Huius ergo auctoritatis apud vulgus gratia non modò medicus illâ non aspernatur, sed ne philosophus quidem. magis enim homines iuuat, ubi apud eos in honore & admiratione est, ut qui magis ipsius facta imitentur, & iussis eius obediant, non secus ac numinis cuiusdam. / Qua verò exercitatione hæc assequamur, dictum est. qua exercitatione celeriter, iocundè, facile, promptè agamus (inquit) dictum est. id potissimum docuit. ubi ait / agens vtrique manu ad omne opus debet, & ambabus simul, siquidem ambæ similes sunt: tum ubi ostendit in exercendis digitis pleraque agenda esse pollice atque indice, tota verò manu prona, & ambabus aduersis.

2 Quod iniectum est, ut rectè, ut decorè. Decorè quidem, ut simpliciter, ut distinctè, aut similibus & equalibus, equaliter, & similiter: aut inequalibus & dissimilibus, inequaliter, & dissimiliter. Species autem simplex orbicularis, ascia, sima, oculus, rhombus, dimidiatus. Aptetur vero species speciei, ac morbo illius, qui deuenitur.


Quum duplicem proposuerit vinculi rationem, vocans quod inijcitur *ἐπὶ ἀσπίδος*, quod iniectum iam est, *ἐπὶ ἀσπίδος* proximè præfatus qua via, quod inijcitur optime inijciatur, nunc id

Septima Classis.

DDDDDD

exequitur

exequitur, quod iniectum est, vbi decorè ait iniectum esse, si simplex sit, si distinctum. simplex E
est, vbi linteum non implicitum est, non duplicatum, non rugosum, sed eque ab omni parte ex-
tenditur: distinctum, vbi iterum aut tertio circa idem conuenienter datur. ex duobus autem in
quibus consistit iniecti vinculi decor, alterum, nempe simpliciter, tanquam clarum, mihi vide-
tur sine expositione prætermittens in enodationem verbi /distinctè/ sequentia omnia adiecisse:
ad quæ animum adiungas oportet, non oblitus me dixisse dudum, distinctè, idem significare,
quod conuenienter. Siquidem propositum est, vt alter fasciæ circuitus primò interdum æqualis
ad vnguem sit, ac nullo modo impar, interdum inæqualis. fit autem æqualis, vbi extremæ fasciæ
partes in latitudinem eodem loco ita finiantur, vt neque exuperent, neque exuperentur, sed in
vtroque circuitu desinant non aliter, ac si iniecta sit ima fasciâ duplicata: eadem que ratio sit ter-
tij circuitus, & quarti, si hoc quoq; opus sit. Ergo & in eo, qui rhombus, & in eo, qui semirhom-
bus dicitur, exquisita hæc observatio adhibenda est.



Sed vinculi fracturis accommodati, quum ad brachium, humerum, aut femur datur, item distincta ratio est, in quo priorem fasciam iubet sursum ferri, secundam vero prius deorsum, deinde sursum ductam, quæ prior desinit finiri, quod fieri non potest, nisi, quod spectat ad latitudinem lintei, orarum altera alteram excedat. hæc igitur æqualis erit, si tota æquè in ea inclinatione perseueret, quæ à circuitu in orbem recedens orsa est. Vocatur autem orbicularis, quæ affectam partem ex toto in orbem sine inclinatione complectitur, in quo oræ fasciæ secun-


do & tertio circumactæ alijs insident, sic, vt neque excedant, neque exuperentur.



Rotunda sincera æqualis.

At in eo, qui declinat, necesse est fasciam vel ferri ad vitiatæ partis regionem superiorem, vel ad inferiorē dimitti: q, si ubiq; similem inclinationem habeat, G distinctum vinculum præstabit. Quare, si ea, quæ dicta sunt, diligenter consideraueris, planè intelliges circuitus in orbem vnā duntaxat esse rationem, vbi nihil plus est aut minus: at non vnā eius: qui declinat, quū alter altero declinare plus possit aut minus. Hic tamē translatione vsus illum, qui paulum inclinat, asciam: qui multum, nuncupauit finum. Asciam fabri dicunt instrumen

tum quoddam extrema parte, qua ligna incidunt, modicè incurvum, & labrosum in speciē labri.




Afcia syncera inæqualis

Simum græci appellant locum, vbi planities cū colle coniūgitur, qua enim committuntur, simum efficiunt, quū neutrum per se simū sit. cū planities ipsa recta sit, & æqualis collis, acclius, & altus. at vbi inter se coeūt simam figuram representant. eadem figura fit, quā decliūs via, cum accliuī cōmittitur. eodē modo in naso sima pars illa dicitur, quæ vtrinq; sublimioribus partibus terminatur, iam' que ab hac parte totus nasus nuncupatur simus. Cōstat enim plura vocabula in totis vsurpari corporibus, à non nullis ducta, quæ partibus accidunt, quo modo simus homo dici-


atur, siquidē nō eodē modo vocatur simus, quo plenus, ac tenuis, aut albus, aut niger, sed sicut glaucus, celsius, vel gibbus. nasus igitur, vel via, propriē simi nominantur: vinculum verō simum ab Hippocrate appellatur eādē ratione, quā *αμβη* spathe capitulum rotundum & leniter cauum,

&

A & σκέπαρον, id est ascia, genus quoddam circuitus ipsorum linteorum. namque, ubi præcipit, ut panni in ascie figuram imponantur, diducit ab orbiculari circuitu eum, qui labrorum ascie modo declinat. non enim censet pannos ita oblique circumponendos, ut ab orbiculari circuitu nimium absint, sed paulum declinent, sic, ut fideliter comminuta ossa contineant.



C
q̄ in parvis, non eo modo accipientes, quo auctor voluit, decipiuntur. sed de his satis est semel dixisse. Præfatus autem Hippocrates decorè quidem, ut simpliciter, ut distinctè, deinde subiiciens aut similibus, & equalibus, æqualiter, & similiter: aut inæqualibus & dissimilibus, inæqualiter, & dissimiliter: quasi cōmuniter docuit, quo consilio distinctè vinculum adhibeatur. æqualia enim, & similia corporis membra fasciam vniuersam æqualiter & similiter per omnes partes circumactam requirunt: inæqualia & dissimilia, inæqualiter & dissimiliter. Hæc autem verba in vetustis exemplaribus, & in libris expositorum, præcise leguntur, non adiectis inæqualiter et dissimiliter: sed, cum solum scriptum sit, aut inæqualibus & dissimilibus, intelligi etiā volunt inæqualiter & dissimiliter, id q̄ ab Hippocrate prætermisum fuisse, q̄ manifestum videretur, eo q̄ propositis cōsequens esset. Verum hæc ratio scribendi non breuitatē, sed errorem manifestum, præ se fert. Satiùs ergo fuerit, si ita scriptum inueniamus, existimare hæc veluti complura primorum exemplarium esse corrupta, id q̄ propterea fieri, q̄ librarius ea præterierit, atq̄ error hucusq̄ manserit. Ergo super humerū similiter & equaliter circuire fascia potest, minus aut super femur & brachium, sed paulo magis super crus: at in capite humeri, & in coxa, contrarijs partibus indigemus, quemadmodum & ubi caput à latere vinciendum est. frons quidem & nasus similem & equalem amat orbicularem fasciæ circuitum, non secus ac vertex, qui etsi in orbem circumdatam fasciam nō postulet, equaliter tamē & similiter præcedentē requirit. de his autē diligentius in sequētibus tractabitur, nunc ad verba, quæ restāt pergamus.



Septima Classis

Hippocrates positis tribus simplicium vinculorum formis, nempe orbiculari, ascia, sima, deinceps trium compositorum meminit, oculi, rhōbi, & dimidiati, dimidiatum semirhombum etiam appellant. quibus adiungit aptetur verò species speciei ac morbo illius, qui deuincit/ cōmonens, ut accōmodetur, & vitiata partis formæ, & vitio, quo detinetur. species enim vinculi, quam oculum appellamus, ad oculum adhibetur, ubi vel periculum est, ne procidat, vel contineri quippiam volumus ipsi superimpositum: rhombus verò, ubi vel capitis futuras diductas adducere in vnū

DDDDDDD ij

oportet,

oportet, vel hians vlcus interdum contrahere, & valde resolutam cutem adducere atque agglutinare. non abfimilem effectum præstat semirhombi vsus.



Verum enimvero hæc scripta sunt ab Hippocrate tanquam exempla, ad quorum similitudinem inueniendum nobis est, vel ab his, qui compererunt descendendum, quod vinculum ad quamvis corporis partem atque valetudinem accommodetur. Expedit autem doctorem non imperare simpliciter, sed viam exponere, qua ipse vinculum inuenierit. eo enim fit, ut discipulus, si quando obliuiscatur, in memoriam redeat, & quæ ab altero non didicit, possit cogitare. quocirca non ab re fortasse fuerit, si librum conficiamus, ubi de fascijs & corporis parti F

& vitio accommodatis pertractemus.

- 3 *Rectè iniecti vinculi due species, firmitas in pressu, & linteorum multitudine consistit.*

Dictum est in superioribus consueisse Hippocratem τὰ εἶδη, id est, species appellare διαφορὰς, id est differentias. præbuit autem maximam questionem dissensionis causam inter huius libri expositores, quum duas species nominatim non posuerit, quod antè in alijs fecit, vna quidem in vinculi modo sita est, quam ipse firmitatem dicit: eam explanauit, quum inquit, /firmitas in pressu, vel linteorum multitudine consistit/. est enim moderatio quædam in vinculi firmitate, quam si partes comprimens excedat, dolorem ægrotantibus affert: sed laxius continet, si ad eam non perueniat. Alteram verò speciem rectè iniecti vinculi non posuit, sed ijs, quæ de robore loquutus est, subiicit.

- 4 *Vinculorum aliud per se remedio est: aliud ijs, quæ remedio sunt, subseruit.*

Hæc profectò non sunt altera species rectè iniecti vinculi, ut potè quæ communem vsum cuiuslibet vinculi comprehendant. quin & post hæc de omni vinculi moderatione agit, qua ratione seruetur, deinceps de nodo. tum quod subiectum est docēs sic incipit /licet quidem benè scientem ad partes decliues, et quæ in extremitate tenuantur, labi fasciam omnem, ut in capite, sursum, in crure, deorsum / & quæ sequuntur. Ab ijs transit ad qualitatem vinculi, cuius item, quum partes sint, nosse, vnde incipere fascia in singulis vitijs ac partibus debeat, & qua nouissime fini-ri, tum qua via, dum circuit, circumagi, & obuolui singulis partibus, hæc quoq; indicauit. nam; ubi inquit /quæ mouentur, ut articuli, quæ curuantur / obuoluendæ fasciæ rationem exequitur. post hæc adscribit, quomodo extremæ fasciæ fideliter in ijs contineantur. inde pergit ad fasciarum vsus exponendos, sic, ut rectè iniecti vinculi altera species, quæ firmitati opponitur, totius vinculi qualitate contineatur. Fortasse autem quod difficile sit communi vno vocabulo complecti singulares differentias, eius speciei, quæ è regione firmitatis est, eam non tentauit vno verbo notare. Rem autem ita habere verba ipsa testantur, quibus ostendit, quæ varietas insit in singulis capitibus à me commemoratis. sed, ut rem clariorem magis ac breuiorem faciamus, vocetur totum ipsum genus qualitas vinculi. /Firmitas in pressu & linteorum multitudine consistit/. quemadmodum potentia nomen interdum imbecillitati contrarium dicunt: interdum ad id significandum, quod roboris & imbecillitatis commune est, vsurpant: sic & magnitudinis vocabulo uti solent, & alijs quàm plurimis, partes & totum communi nomine appellantes: ita nunc quoque vsurpat firmitatis vocabulum. debent enim affectæ partes fascijs neque valenter adstringi, neq; ita leuiter, ut homo iniectum vinculum non sentiat, quin & linteorum multitudo pro numero accipienda est: at non ita intelligenda multitudo, quasi è regione sit paucitatis, siquidem moderatio rectum vinculum præstat. rectum appellat, quod confert, iuuat quæ. At dum comparantur inter se duo vincula, ut ea, quæ ex comparatione spectantur, quod adstrictius est, validius, reliquum infirmius dicemus. neque absurdum est, si vinculum habita ratione subiecti vitij moderatum sit, sed comparatum, cum altero validum dicatur, aut imbecillum. Quando autem solvere, aut arctare vinculum expediat, vel fasciarum numerum augere, aut minuere, ipse in opere de fracturis demonstrauit.

- 5 *De quibus lex quidem est.*

Lex in ciuitate ratio est, quæ iubet ea, quæ facienda sunt, prohibet q; contraria. his legibus similia dicit, quæ nunc proponuntur, cum coniecturale nihil contineant, aut ambiguum, ut quædam
alia

A alia ad medicinam pertinentia. Idem quoq; dixit in opere de fracturis, liberam orationem moderatus. non enim scripsit simpliciter /de quibus lex quidem est/ sicut nunc, sed oratio hæc veluti lex iusta fertur de curatione fracturæ.

6 In ijs autem maximè ad vinculum pertinet, vt arctetur quidem, sic, vt quæ iniecta sunt, neq; recedant, neq; comprimant, sed fulciantur, non tamen cogantur, id quæ minus quidem in extremis partibus, minimum in medijs.

In his inquit, quæ traduntur de ea specie, quæ ad firmitatem attinet, potissima vinculi præcepta sunt, vt quæ vitiatæ parti iniiciuntur, hoc est lintea, neq; à cute diducantur, neq; ipsam premant, sed fulciant, hoc est firmiter insidant, at non cogant. dicitur aut vinculum cogere, quod ita arctè affectis partibus circumdatur, vt dolorè afferat. Hæc aut præcepta de modo premendi, quæ vitium est, minimè oïum conuenit præterire. quod & in extremitatibus quoq; prorsus est attendendū, sed minus q̃ in medio. siquidem optimū est artem culpa vacare: si quid tñ peccet, id in illis partibus ac vitijs euenire, vbi detrimenti minus affertur: minimè verò errare, vbi noxa ingens est.

7 Nodus & filum non ferantur deorsum, sed sursum, in porrectione, in præparatione, in vinciendo, in habitu, quo postea continetur.

Cur hæc sine ordine adijciat ijs, quæ de vinciendo ratione pertractat, paulo post persequemur: nunc id primū studendū, vt quod propositum est, intelligamus. Dissentiunt expositores inter se, cum /deorsum & sursum/ alij simpliciter ad longitudinis spacium referant, alij ad affectum: sed neutri dictionem /ferantur/, nec quod ad nodum, nec quod ad filum spectat, explanant.

Quod extrinsecus
iniectū est com-
prehensamentū.

Nodus ex vno ca-
pite in duo crura
discisso.

Nodus ex duo-
bus capitibus
fasciæ.

Constat autem omnibus id appellari *ἀμμα*, id est nodum, quod fit in fascijs, cum ambo capita implicata inter se vinciuntur, vel alterum scinditur, vel tertio quum extrinsecus ad continendum adijcitur id, quod græcè *κατάλημμα* vocatur: *ῥαμμα* verò id est filum id vocari, quod in acum conijcitur, vel vt incisæ corporis partes inter se cōiungantur, vel vt extrema pars fasciæ inferioribus alluatur. quoniam & nunc loquitur de filo ad hunc vsum parato. iubet quidem sursum hoc ferri, quod ipse dixit *τὸν νομὸν ὀρέξαι*. quid autem appellet *νομὸν* ab ipso discere oportet, qui eo verbo sæpius vtitur ad fascias, quum à principio ad finem feruntur. Itaq; in fracturis iussit, vt vtriusq; fasciæ caput super fracturam iniiceretur, sed prior fascia sursum tereretur, altera verò antè deorsum, postea sursum, *νομὸν* vocas quasi iter quod fasciæ tunc faciunt, cum à principio ad extremum laborantis corporis obuoluuntur. Simile est id, quod *νομή* significat in filo, nam, cum liceat acum à superiori parte deorsum, & contrà ab inferiori sursum transmittere, & præterea in neutram partem inclinam, sed sine inclinatione, aut à dextra in sinistram, aut à sinistra in dextram demittere, precipit oïno, vt sursum feratur. Quod si extrema pars fasciæ duntaxat inferioribus alluenda sit, in eo quidem vinculo, vbi contrarijs partibus nō indigemus, vt in brachio, humero, femore, crure, in quibus etiam necesse est vel à sinistra parte in dextram acum immittere, vel contrà, utrobique nobis enitendum est, vt sursum tendentes extremam fasciam hac ratione cum inferioribus

Nodus aciz in fascijs.

Nodus in futuris cutis.



partibus suamus: vbi contraria parte opus est, vt in capite humeri, & in coxa, danda opera est, vt fascia, dum sursum fertur, finiatur, ibi q; acu ab inferiori parte sursum traiecta hoc modo alluatur: neq; debet superior vinculi pars deorsum attrahi, sed inferior sursum, vtrunq; enim fieri potest, dum fascia fuitur. Ergo transmissa acu filum ducente, inferior pars fili sursum adducenda, non tamen superior deorsum, consilio ad id directo, vt inferiores vinculi partes à superioribus trahantur: quod facere ab ipso iubemur, et quo tempore homo affectam partem videndam medicis porrigit, & quo manus curatio paratur, ac tertio quo vinculum iniicitur, quod & ipsum ad manus curationem pertinet, & quarto quo postea membrum continetur, vocauit primum *ἐν παραξεί* id est in porrectione, alterum *ἐν ῥέσει*, id est in præparatione, tertium *ἐν ἐπιδέσει* id est in vinciendo, quartum *ἐν τῇ ἐπειτα ἔξει* id est in habitu, quo contineri postea debet. quanquam alij *ἐν πίεξει*, id est in compressione scribant, sed priorem scripturam magis probo. nam in superioribus

ribus dixit id temporis *ἐν ἔξει*, id est in habitu. Neque dubium est, quin, sicut eandem figuram par Et tium, quæ vincuntur, ijs omnibus temporibus seruari iubet, sic & filum & nodum, quum feruntur, semper sursum attrahi velit, in primis quidem extremitate fasciæ sursum firmiter attracta, & contenta, atque ob ipsam fasciā tota. Illud verò animaduersione dignum ab expositoribus Hippocratis intactum relinquitur, quod nodum & filum ad superiora affectæ partis ferri voluit, dum egrotantes se ipsos medicis tradunt, non secus atque in alijs temporibus. pro suo enim arbitratu, quidam ad medicum pedibus eunt, quidam gestantur, modo affecta parte suspensa, aut deuincta, modo vtroque facto. Nodus igitur & filum in eorum potestate est, non medicorum à quibus inspicendi sunt, aut curandi. censet fortasse tunc quoque interdum laborantes medicis uti. nam in itinere & ruri non nunquam tenuioris fortunæ homines, plagas accipiunt, vulnerantur quibus, vel ossa ipsis suo loco mouentur, in quo casu ad curationem plurimum medicorum conuentu opus est, tum diligenti inspectione, machinamentis quibusdam, aut instrumentis, aut linteis, aut etiam laqueis, quæ ruri vel in itinere nulla sunt. quare si eo tempore medicus adsit, lesam partem suspendet, & deligabit linteis illis quorum copia erit. constat quibus, siue nodo, siue futura opus erit, medico hac apte efficienda esse. Quo facto in ciuitate rursus æger consuetos medicos adhibebit, primum ut diligenter vitium cognoscant: deinde, ut prolapsum articulum restituant, vel fractum os componant, aut plagam suant, aut collisilis recte opem ferant: post hæc medici idoneum vinculum admovent: postremo, quod deuinxerunt, prouident, ut eodem modo figuratum contineatur.

S Principia & nodus iniiciendi sunt, non quæ vlcus, sed hinc, vel hinc.

Quid nunc vocet *ἀμμη*, id est nodum iniicere, ostensum est, in prioribus enim verbis è regione *ράμματος*, id est fili ponebatur, nunc alterius tantum meminit, quod debeat & filum desinere in nodum. nam in quauis futura in hunc finitur, cum acu non sola, sed sequente filo traiciantur, quæ fiuntur, & nodo inter se alstringantur. Sepe quidem euenit, ut inter se proxima sint fili capita, & nodus, sicut, ubi cutem suimus: interdum distant, quod sepe in vinculis accidit, ubi fili partes longe adducuntur, ut communem nodum accipiant.

A. l. 4. f. 5. l. 2. c. 9. 485. a

Nodus fasciæ in fascijs.

Nodus in futuris cutis.



Verisimile ergo est nunc ipsum edicere, ne fili principia, quæ vlcus est, iniiciant, quo præcepto illud quoque intelligitur, quod neque nodus super vlcus collocetur, vrgeretur enim non solum nodo, sed fasciā à nodo fortiter pressa, eo quod vehementius esset coarctandus, ut fasciam contineret. Eodem modo si citra filum fasciæ extremitates inter se complicate nodum accipiant, vel aliquid extrinsecus vlceri superdetur, non debet nodus super vlcus imponi, impositus enim ipsum comprimeret, præsertim si fasciā ante obuoluta tenuis esset, & absque lana circumdata. Nunc sanè mihi videtur Hippocrates agere siue de filiis, siue de habenulis, quæ inter se complicate in nodum finiuntur: sed censent alij velle ipsum principia fasciarum super vlcus non imponi, ex quibus non nulli variarunt scripturam, ve

rè quidem, sed propositæ orationi parum conuenienter, cum non de fascijs, sed de filo tractare nunc propositum sit: quam quidem scripturam veram & artificiosam esse non inficior. sic autem habet fasciarum principia iniicienda sunt, non quæ vlcus, sed hinc vel hinc/ hoc est, ab utraque parte eius, vel dextra vel sinistra. sic autem fiet, ut id verum sit, quod ab ipso traditur in opere de fracturis, & huic loco minime repugnet. Imperat enim ibi, ut fasciarum capita affectæ parti superimponantur, siue fractura, siue vlcere laborent, non tamen supra, aut infra. in eo enim libro de dimensione in longitudinem loquitur: nunc, quum non ad hanc sed ad latitudinem respiciat, principia iniici dixit, non quæ vlcus, sed hinc vel hinc, hoc est, ab utraque parte eius. cui non aduersatur, quod neque supra neque infra iniici debent, quod tamen latet expositores huius libri. Merito igitur dubitant, quum Hippocrates inquit / principia & nodus iniicienda sunt, non quæ vlcus, sed hinc vel hinc/. Placuit etiam quibusdam principia fasciarum intelligi τὰ πέρατα, quamuis πέρατος nomen latius pateat τῆς ἀρχῆς, id est quàm principij, quod & Plato nos docuit, asserens τὰ πέρατα principium esse & finem. Ergo, si liceat latiori vocabulo pro eo, quod angustius est, rem appellare, licebit nobis tam principium, quàm finem nominare πέρας, non tamen finem nuncupare principium. Iam verò principia, ad nullum aliud referri possunt, quàm ad fascias fila & habenulas, cum quæ nullo modo fieri possit, ut hic de fascijs loquatur, necesse est principium in filiis accipi, & habenulis, & si placet etiam in panniculis. quandoquidem hi quoque comprehendere vinculum possunt, non secus atque habenule, quarum extrema inter se complicata vinculi vicem exhibent.

Nodus

9 A *Nodus non ea parte fit, cui innititur: non ea, qua agimus: non qua inanis esset, ne inanis collocetur.*

Quum proximè in præcedentibus iusserit, ut qui futuram adhibet, principia super vlcus non ponat, sed alia parte, qua nodus etiam collocandus est, nunc docet quibus locis ponere nodum oporteat. Docemur autem res interdum per ea, quæ ipsis non accidunt, sic enim appellatur, quæ, cum accidere possint, non tamen accidunt. Vis autem orationis huiusmodi est. Nodum non continet ponere qua parte vlcus est, sed qua ferri possit versus superiorem regionem, cum eo, ut cauteatur pars, cui innititur, qua agimus, & tertio, quæ inanis est. Vocat autem qua agimus eam partem, qua vitimur, cum extendimus, curuamus, vel ad latera porrigimus. pars vero cui innititur, in ambulando quid est planta pedis, in cubando totum dorsum, atque eius pars potissimum, quæ in eo extat, præterea capitis partes posteriores, in sedendo, ima pars natum. si quis autem deligatis brachijs aliquid agere debeat, considera quid nam illud sit, & circa quæ externa. in ea actione poteris partem, cui innititur, inuenire. agunt quidam articuli, quamobrem ubique vitandi sunt, atque illi præcipue, quibus agere vinculis egrotantibus conuenit. Constat autem recte ipsum edicere, ne nodus, qui continere totum vinculum debet, super eam partem ponatur, quæ in motu figuram mutat. necesse enim erit nodum, ubi super articulos collocetur, modo iusto laxiorem fieri, modo coarctari. Quod in fine orationis dixit *ἐνεδν*, id est inanis, omnes accipiunt pro superuacuo, perinde ac si dixisset, nullum ad usum. græci enim *ἐνεδν* dicunt eos, qui à primo natali die surdi sunt, & voce citra verborum conformationem obstrepunt. quemadmodum igitur hi ad vitæ actiones prorsus inutiles sunt, sic aiunt ab Hippocrate appellari *ἐνεδν*, quod nihil ad vinculum conducit. Potuit id verbi ab ipso scribi per *κενεδν*, corrumpi vero ab initio protinus atque ita seruari. sed, quod ad sententiam pertinet, idem hæc scriptura significat, siquidem *κενεδν* est, quod à nobis dicitur *κενεν*, & *μάταιον*, hoc est inutile. sed quia multos videmus, vel ob incertitiam, vel quod velint diligentes videri, nodos adhibere fascijs inutiles, idcirco Hippocrates nunc præcipit, ne ponantur *ἐν τὸ ἐνεδν*, hoc est inanes, quod videlicet inutiles significat, & superuacuos. Putauit quidam ex ijs, qui hunc librum explanarunt, Hippocratem intellexisse inanem, locum inanem, ut puta alam, poplitem, inguen, ex aduerso capitis, humeri, genu, coxæ, ea deducens. inhaerere enim dixit oportere nodum corpori, at non perinde collocari, quasi suspensus sit, quod eueniret in ala atque inguine. Si quis autem & hoc probabile iudicabit, ipsum poterit accipere: nam in obscuris, vel eo quod mediocriter probabile est, conuenit acquiescere.

10 C *Nodus & filum, molle, & non magnum.*

Hic rursus, sicut principio duo vocabula proponit, cum & res inter se diducere sint, quibus illa indita esse videntur. *παύμα* id est filum vocatur, quod una cum acu traicitur, cuius materia linum est, siue lana, siue quid aliud eius generis: *ἀμμα*, id est nodus, qui ex habenulis, vel scissis fascijs extremitatibus implicitis efficitur. Patet autem utrumque molle conuenire, si futurum est, ut non comprimatur. quod vero non magnum esse expediat, indicio est celeritas, quam ipse in agendo laudat: eam prohibet longitudo, vel fili, vel separatim etiam habenularum scissæ extremitatis, aut eorum, quæ continendi vinculi causa superiniiciuntur. Pendebunt igitur hæc magna à nodo frustra, præterquam quod tardum afferent, quum non nunquam vulnera contingant, dum complicantur. Ex qui sitius autem scripsit /non magnum/ quum potuisset scribere /paruum/, verum sicut magnum vitari oportet propter ea, quæ retuli, incommoda, sic & paruum, quum in agendoprehendentes digitos effugiat, atque ob id remoras tempus producat: tum in vinculo propter breuitatem sapius ab eo, cum quo deuinctum est, elabatur, atque idcirco nos cogat in eodem iterum versari, adde quod cum opinionem aliquam faciat rei deligatæ, nodus exiguus postea soluitur, ubi contineri debet. Merito igitur cauendum est, tam quod omnino paruum est, quam quod magnum: & hic perinde atque in alijs, quod modicum est eligendum. id alterius extremi negatione non nunquam appellant, quemadmodum nunc Hippocrates /non magnum/: qui si non paruum dixisset, idem utique significasset.

11 *Licet quidem bene scientem ad partes decliues, & quæ in extremitate tenuantur, labi fasciam omnem, ut in capite sursum, in crure deorsum.*


Si pro /scientem/ scriberetur /scire/ perfecta foret oratio: at nunc pendere videtur, & cum alia coniungi, eo quod sit, ut non nulli copulent, quæ sequuntur, sic ut tota sit huiusmodi: Licet quidem bene scientem ad partes decliues, & quæ in extremitate tenuantur, labi fasciam omnem, ut in capite sursum, in crure deorsum, deligare dextram partem ad sinistram, sinistram ad dextram. præterquam in capite. sed nullo modo continuari videtur, quum non propterea deligare eo modo conueniat, quia nodus consueuerit ad partes labi decliues, & quæ in extremitate tenuantur. alia enim de causa iussit (ut in sequentibus ostendemus) dextram partem ad sinistram, sinistram ad dextram deuinciri. quoniam cum his /licet quidem bene scientem ad partes decliues, & quæ in extremitate tenuantur, labi fasciam omnem/ connectuntur ea, quæ hic tradit, quæ autem adiciuntur ad continendum quidem, quæ circa hæc sunt: ad suspēdendum vero fasciam omnem, quæ corpus quie-

scit, & magis cautum est, superimponenda/ & quæ sequuntur. quod ipsum paulo post exponens Eclarius demonstrabit: nunc quæ interiecta sine ordine sunt, per se consideremus.

12 Deligare dextram partem ad sinistram, sinistram ad dextram, præterquam in capite: hoc enim est regione.

Præceptum hoc potissimum ad fracturas spectat. perpetuo enim in contrariam partem inclinandum est: vbi vlus ab altera fuerit, vt si dextra pars læsa sit, in sinistram: si hæc, in contrariam: sicut vbi totum os transuersum fractum est, vinculum in neutram partem inclinandum, quum panni in orbem superimponentur. Huiusmodi igitur est, quod proponitur. Quum deligamus, si dextra pars affecta est, in sinistram inclinare debemus: & contra si sinistra, in dextram. quod fit, vbi caput fasciæ super affectam partem ponimus, non exquilitè quidem super fracturam, aut vlus, sed vtrobiq; hinc vel hinc: reliqua verò fasciæ, quod affectum est, in contrariam partem attrahimus, & simul etiam adstringimus. At quum hanc ad contrariam partem adduximus, ibi non amplius æquè adstringimus, & multo minus etiam inclinamus, donec in orbem circumacta ad suum principium reuertatur. ibi enim id manu prius tenebamus, cui rursus fasciæ partem, quæ ipsum contingat, superpositam valenter continemus sic, vt iterum incipiat circuire super partem prius inuolutam similiter adstricta, & in contrariam partem inclinata: tum eodem modo circumdata, vbi rursus ad principium redierit, æquè fasciam altera manu cōtinemus, altera coarctamus, atque in contraria vitiatæ sedis attrahimus. Non solum autem hoc modo membra deuincimus, sed & latera. nam, si affecta sit pars dextra, orsi ab ipsa fasciam eo modo, quo dictum est, ducimus ad sinistram: si vitium sit in sinistra, ab hac, fasciæ incipientes, quasi iter facimus versus dextram. sed caput non licet ita in orbem comprehendere, quod non patiantur id ceruices, quæ cum ipso committuntur. Quamobrem siue dextram, siue sinistram partem occupet vitium, quod vinculum postulat, fasciam è regione, hoc est rectam ducimus per summum quidè caput porrectam, inde ad extremam maxillam demissam, post hæc iterum ad affectum locum similiter datam, siue iterum, siue tertio ipsam circuire abundè putamus, & dum finiatur, circumactam. finiatur autem in vertice prorsus, is enim locus maximè idoneus est, qui fideliter contineat.

13 Deligatio per contrarias partes. Deligatio per processionem




Sed in contrarijs fasciæ in vtramque partem attrahatur, quod si ab vno capite incipiat, similiter quæ firmiter contineatur, vt in medio capite, & in alio eiusmodi loco.

G

Duplex esse potest huius loci sententia, vt vel ad omnes corporis partes, vel ad caput tantum referatur. quia, quum dixerit, præterquàm in capite dextram partem ad sinistram, hoc autem è regione deligandum esse, ceteras eius partes, quæ inter se contrariæ sunt, quarum quidem hæc posterior est & in occipitio, illa verò prior & in fronte, deuinciri iubet, fasciæ in vtrâq; partem ducta. ducitur autem in vtrâq; partem, vbi media affectæ sedi iniecta, vtrumque caput æqualiter ad contrariam attrahitur. Ergo fasciarum, quæ sic volutæ sunt, extremitates valentius continentur, si in fronte, quàm si in occipitio collocentur. Verum, si de omnibus corporis partibus loqui Hippocratem statuamus, contrarias dicemus partes, quarum vtriusque structura est similis, nempe dextram & sinistram, priorem & posteriorem: quæ vbi pariter vitiatæ sint, sicut in transuersa fractura euenit, fasciæ in vtramque partem attrahenda est, quemadmodum faciendum diximus in pannis, qui in figuram fasciæ superdantur. Quod si (inquit) ab vno capite incipiat, perinde ac si in vtrâque partem duceretur, circumagenda est, sic quæ, quæ firmiter contineatur, adducenda, vt ibi finiatur. pro exemplo autem loci, vbi firmiter contineatur, attulit mediū caput, contentus nunc eo solo, quum paulo post, perfectè vniuersam orationem sit explanaturus, docens quæ parte desinere fasciæ conueniat, vt iuncturam totam fideliter tueatur. Particula autem /similiter/ in vtroq; accipi potest, & in toto fasciæ circuitu, & in fine.

14



Quæ mouentur, vt articuli, quæ curvantur, minimis, & maximè collectis, veluti poples: quæ extenduntur, simplicibus, & latis, veluti patella, circumdari debent.


Minima lintea danda esse docet circa poplitem, cetera quæ eius generis, & maximè collecta, hoc est contracta in angustum: partem verò popliti contrariam scilicet patellam, contraria via. est autem contraria via, vbi lata sunt, & quantum minimè

A minime potest, contracta. quod omnibus articulis conuenit, quā curuantur, quemadmodum popliti: quā extenduntur, quemadmodum patellæ, quam non nulli vocant *ἐπιγνατὶς*, sicut alij *ἐπιγνατὶς α*. super hanc igitur dixit latam fasciam extendendam esse, sic, ut ipsam vniuersam cōplectatur. nam, quæ non sic obuoluatur, sursum vel deorsum facile feretur: ad utramq; enim partem labetur, propterea quod patella gibba est. At poplitem contracta fascia. inuoluendum censet. nam neque admittere, neque seruare eam potest, quæ in latitudinem explicatur.


- 15 *Quæ autem adiciuntur ad continendum quidem, quæ circa hæc sunt: ad suspendendum vero fasciam omnem: quæ corpus quiescit, & quæ magis cauum est, superimponenda, ut supra vel infra genu.*

Laudare eiusmodi breuitatem decet, quæ vno vocabulo aperte id notare potest, quod oratio. Quemadmodum & nunc, vbi /ad continendum/ *καταλῆψις* dixit, quo verbo significatur oratio, quam proferre sic possemus, vinculorum, quæ ad articulos adhibentur, extremitas firmiter tenenda est extra articulum aliquo insuper vinculo addito: /ad suspendendum vero *ἀναλῆψις*, quo monemur, ut magnopere prouideamus, ne fascia ad partes decliuiores delabatur, ne ue sursum tendat ad gibbas, quas ipse supra dixit *ἀπόξιν*, id est in extremitate tenuatas, quum inquit /licet quidem bene scientem ad partes decliues, & quæ in extremitate tenuantur, labi/. Plane autem constat ex verbis ipsius, recte id à nobis dictum esse, quod quæ nunc proponuntur, continuata illis sunt, quibus ait /licet quidem bene scientem ad partes decliues, & quæ in extremitate tenuantur, labi/. quin & breuissimè sedes commemorauit idoneas, quibus fascia finiatur, duobus vocabulis cas comprehendens, quum inquit /quiescit, & cauum est/. Quiescunt, quæcunque extra articulum sunt, in utroque ossium, quæ inter se committuntur, ut, quod ad genu pertinet, quæ in femore sunt, aut crure, hæc siquidem magis caua sunt. Caua autem, *λαττωτέρα* dixit, partes significans, quarum contrarius habitus est, atque extantium, hoc est, quæ deprelle sunt ac delidit. omne enim, quod cauum est, delidit. Proprie autem vox *λαττων* inane significat, sicut *λαττω* exinanire. nam illud *ἰλίον ἐξαλαττᾶξ ἐδ' ἐναύουρον πολλέθρον*, exinanire urbem Troiæ frequentem significat. *λαττω* item dicunt illas corporis partes, quæ inter costas nothas positæ sunt, & ossa, quæ ad ilia pertinent. Iam verò omne quod delidit, *λαττων* appellant, trās lato vocabulo ab eo, quod communiter accidit, siquidem omne, quod vacuum est, necessario delidit.

- 16 C *Consentit autem cum capite humeri, fascia ad alteram alam demissa: cum inguine, ad alterum ilium: cum crure, super partem huius posteriorem, quæ carnosā prominet. Quibus autem sursum labitur, ab inferiori parte suspendenda est: quibus deorsum, à superiori.*



Reprehensio circū ile aduersum Reprehensio circū alam



Reprehensio

supra surā

Vbi vinculum non eorum commoditate, quæ laboranti particula superimponuntur, sed propter se adhibetur, eo consilio primum potissimum quæ iniicitur, ut affectam partem, & quo modo composita est, seruet, & ab inflammatione tueatur, quod plene ostensum est in opere de fracturis. sed quia prestare hæc vinculum nequit, nisi contineatur, ne ad superiora vel inferiora corporis procedat, idcirco necesse est fascias dare ad partes integras: & ubi verisimile est vinculum totum sursum ferendum esse, à contraria parte suspensum deorsum attrahere. In quibusdam igitur partibus à contrariis suspendimus vtilius, sicut in capite humeri, & in inguine. exquisitiùs verò ait in capite humeri, nō ad alterū humeri caput, sed ad alam: in inguine ad alterum ilium, ducendum esse fasciam. cum neq; humeri caput, neq; nates fideliter seruare iuncturam queat, sicut ala, atq; ilia. Vocatur aut (ut mox retuli) *κενέον*, quod inter thoracem est, et os quod ad ilia pertinet, ita dictum propterea, quod inane sit, hoc est, delidat. Iam verò constat consentire, quod *ὁμολογεῖν* dixit, positū fuisse pro congruere & cōuenire. nā, qui bene factis consensuunt, non modo nihil cōtrā faciūt, aut dicūt, sed perficiēdi socij sunt: sic ex locis, quæ pposita sunt, alia, quum ad hæc

hæc quoque fasciæ pertineat, alia adiuuant. Similiter & in crure, cuius partem, quæ carnosâ promi-
net, faciliè iunctura effugit, ad superiorem partem fasciæ vtiliter datur, vbi videlicet carnosam ip-
sius prominentiam vinculo comprehendere necesse est. Locus similiter, qui iuxta talos est, fortiter
vinculum continet, quum inter duas eminentias positus sit, nempe suræ tibiæ quæ extremitates,
quas non nulli perperam vocant ἀσπρὰ ἄλυσ. idem quoque præstat superior locus per eam cru-
ris partem, quæ posterior carnosâ prominet.

- 17 Vbi nihil tale est, quemadmodum in capite, quâ maximè æquale est, contineri fasciæ debet, & duci quàm minimè
obliqua, vt postremò obuoluta, quâ valentiſsimè hæreat, vagos circuitus contineat.

Comprehensio

Deligationis in frõte.



Qua ratione partes vinciri debeant, iuxta
quas nulla talis sedes est, qualem in crure di-
xit, quibus ue non est contraria pars altera,
quemadmodum humeri capiti, & inguini,
ostendit, nominatim capitis mentionem fa-
ciens, iubet qz quâ maximè æqualitas est, to-
tam iuncturam contineri, nempe extrema F
tem in neutram partem inclinâtem, rectam
finiri, vel in frõte, vel in medio capite, vbi ea
pars est, quæ βρέγμα vocatur. nam, vbi ad
mentum fasciæ ducitur, commodè finitur in
medio capite attracta sic, vt nullo modo in-
clinat: vbi verò in orbe circumdatur, in fron-

te similiter citra omnem inclinationem. nam, quæ sic circuit ad posteriorem partem feretur, quâ
occipitium est, quod inter collum est, & gibbam à tergo caluariæ partem. Dixit autem postremò
fasciæ quàm minimè obliquè circumagendam esse, idcirco, quia priores ambitus, vt diuersis lo-
cis affectam sedem inuoluant, sæpius necesse est obliquos duci: sed postremus minimè obliquus
priores continet, qui morbi causa obliquè sunt adhibiti. hos itaque constat hoc modo contentos
immobiles permanere. Quemadmodum igitur in capite, & supra vel infra genu, postremus cir-
cuitus seruari penitus sine inclinatione debet, sic in vinculis, quæ dantur ad inguen, vel humeri
caput, vbi ad contrarias partes porrigere fasciæ cogimur, extremi circuitus citra omnem incli-
nationem in orbem esse debent, in ilibus quidem ab vtraqz parte, vbi deligare inguen volumus: G
ab vtraqz ala, vbi caput humeri, quod similiter seruandum est in cubiti commissura.

- 18 Verum, vbi nec contineri, nec suspendi commodè potest, contineri filis debet, vel subiectis, vel ad futura adhibitis.

Quod proponitur, huiusmodi est. in quibus vitis, aut partibus difficulter extrema lintea con-
tinentur, aut suspenduntur, in his oportet filis, vel in orbem datis, vel futura adhibita ad extremū
vinculum, efficere vt contineatur. Vtrum verò fieri possit, vt aliqua pars, qua difficulter extre-
mum linteum contineatur & suspendatur, filum faciliè ferat, nihil cum expolitoribus dicere pos-
sum. Nescio autem an aliquæ sint partes, quæ huiusmodi iuncturam nō sustineant, sed quosdam
nouī, qui, vbi paulum vitata pars mota esset, intolerabili dolore premerentur, sicut is multo antè,
cui, quum ex alto caderet, regio iuxta spinam icta est, ita, vt ne si paulum quidem moueretur, fer-
re magnitudinem doloris posset. necesse ergo fuit tunicam illi primū detrahere, non exuendo,
sed futuras omnes scindēdo: deinde tradere hominem plurimis, qui totum corpus continerent,
& suspenderent sic, vt in neutram partem inclinaret: tum extendere super lato scamno pannicu-
lum, lanæ hapsi superiniecto. quod imperauimus, vt, quum primū homo ab iis, qui illum con-
tinebant, à cubili attolleretur, celeriter super id imponeretur, subiiceretur qz in latitudinem spinæ H
hominis sublatis. nos verò alterū lanæ hapsū, calido oleo madentē, vbi dempta tunica fuit, spinæ
absqz mora subiicientes, super subiectum panniculum, cui alter hapsus lanæ superimpositus erat,
hominē collocauimus. post hæc madentis hapsi extremitatum ab vtraque parte vnam ad priorē
corporis partem adduximus, deinde super ipsas attraximus extrema sicci hapsi, tum lintei, quæ su-
tura coniunximus. Quod si non futura, sed filis contineri quis iuncturam voluerit, primū illa sub
panniculo extendat, oportet. hoc siquidem fieri non debet vinculo iam iniecto, quod similiter in
coxa conuenit, tum in femore, in humero, & interdum in ceruicibus à posteriori parte.

- 19 Fasciæ "mundæ, leues, molles, tenues.

Materiam nunc docet fasciarum, eas adhiberi iubens, mundas, leues, molles, tenues. mundas
quidem, ne ob fordes sensum mordentium excitent, ne ue humorū, qui superinfunduntur, vim
penetrare vsque cutem prohibeant: leues, ne vitiatas loci oneretur: tenues, vt leuiiores sint, &
molliores, facile qz per eas transeat, quod infunditur: molles, ne premant. Constat autem hæc om-
nia ad id valere, ne inflammatio affectas partes inuadat.

Circumagendæ

20A *Circumagende autem, vel ambabus manibus, vel vtraque in vicem.*

Quod supra dixerat communiter de omnibus operibus chirurgie, præstari ea volens vtraque manu, vel ambabus simul, id nunc de sola circumagendi ratione scripsit. huiusmodi enim manuum exercitatio celeritati, quæ in dolore potissimum requiritur, magis est accommodata. Ergo ambabus manibus simul circumagitur fascia, quæ in vtranque partem attrahitur: ceteræ, altera tantum. sed & in his vtraque in vicem fasciamprehendit, nam, ubi in vtranque partem attrahitur, ambæ eodem tempore similiter agunt: in reliquis in vicem, altera maximam iuncturæ partem efficit circumdans, cui ministerio vtiliter altera subseruit.

21 *Idoneis verò utendum, partium latitudine, crassitudine quæ in pectus.*

Imperat, ut idoneam fasciam inueniamus, partium, quas deuincimus, latitudinem, crassitudinem quæ intuiti. Sed, quomodo recte fascia adhibeatur per ea, quæ dicta sunt, in quibus docuit, unde incipere debeat, qua ratione affectu sedis circundari, quas quæ partes cum ipsa comprehendere, tum quæ finire, & quomodo adhibere ibi nodum & filum expediat, scire conuenit nihil indicari ex his, siquidem nihil ex his, quæ proposita sunt ex partium, quæ vinciuntur, latitudine aut crassitudine colligitur, sed ex ipso morbo, & ex figura partis, quam morbus occupat. Nunc igitur par est ipsum tradere, quis nam sit profectus fasciarum, ubi partium, quæ vinciuntur, latitudinem & crassitudinem attendimus. hinc enim ipsorum linteorum longitudo ac latitudo intelligitur. Paruulo puero exempli causa consentaneum est fascias iniiciendas esse, quæ, quod ad longitudinem spectat, breues sint, quod ad latitudinem, angustæ: ut magnæ stature iuueni longas, & latas, pro quæ eorum proportionem ceteris corporibus, quæ inter magna sunt, & parua. si quod enim corpus vincitur, quod penitus mediam inter vtranque latitudinem & crassitudinem habeat, fascias adhibemus, quod ad longitudinem & latitudinem attinet, medias inter eas, quibus ad magnum corpus, & quibus ad exiguum vli sumus: sed si ad alterum extremum magis accedat, augentes vel minuentes pro eo illarum modum variabimus.

22 *Circuituum capita, dura, equalia, distincta sint.*

Vtraque fascia circuitum habet, & quæ laborantis corpori non dum circumdata est, & quæ locum affectum comprehendit. Capita verò fasciarum, quæcunque illa sint, vtrique communia sunt, seu capita nunc intelligantur principia fasciarum, seu fines, siue vtraque, & præter hæc etiam extremitates in latitudinem: hæc omnia attinent ad vtrumque fasciæ circuitum, ubi scilicet per se glomerata est, & ubi laborantis corpori obuoluta. quare hoc explicare nullo pacto difficile est, quamuis de eo huius libri expostores inter se dissideant, vera enim oratio est, seu referatur ad glomeratam, seu ad eam, quæ corpori superdata est. Quin & omnes extremitates intelligimus, non, ut quidam estimarunt, eas, quæ in longitudinem, vel, ut alij, eas, quæ in latitudinem: illi ad solas fascias, quæ extra corpus sunt referentes: hi arctatum fasciæ circuitum indicari ab Hippocrate censes. Constat autem fasciam per se, priusquam corpori iniiciatur, arctandam esse. sic enim facilius prehendetur, quum & tenuior sit, & circuitus habeat distentos, eo quod in globum intenta coarctetur, quum adstringi aliter nequeat. sola verò capita adstringenda esse aperte falsum est, quum non hæc tantum, sed tota fascia debeat coarctari. Ergo velut in re ambigua id, quod sentio, iam explicabo. Capita intelligenda sunt omnes tam in longitudinem, quam latitudinem, fasciæ extremitates: existimandum quæ est minus proprie dicta fuisse, dura, atque ea de causa orationem esse obscuram. præfatus enim supra, fasciæ mundæ, leues, molles, qui nunc denuo eas duras inquit: Equidem arbitror usum fuisse *σκληροί*, id est duræ, vocabulo rei, quæ significatur, accommodato. nam sæpius in extremitatibus linteorum, quæ quaternæ sunt, binæ in longitudinem, totidem in latitudinem, vel solum stamen conspicitur, cui subtegmen usque ad finem non connectitur, vel solum subtegmen sine stamine. est etiam interdum, ubi alterum eorum laxius extrema parte residit: vel alia parte residit, alia extat. In his igitur linteis circuituum capita molliora sunt, quam in quibus stamen & subtegmen perpetua usque ad finem procedunt. His, quæ hoc modo molles sunt, duræ aduersantur (ut dixit) conuenienter glomeratæ, satius autem fuisset dicere non molles, ut supra dixit de nodo, non magnum: quæcunque enim media sunt inter immodica (ut retuli), proferri negatione alterius exuperantiæ solent. capita igitur dura iure sic accipi potuerunt, tum quod nihil aliud vel mediocriter probabile asserri possit, tum quod Hippocrates de huiusmodi errore circa linteum nullo alio loco pertrahet. Aequalia significant ea, quæ tota sine vlla varietate similia sunt: id quod fit, ubi nulla pars linteae durior est aut latior, nulla item mollior, aut angustior, tum ubi nihil deest, nihil corrosus est (*συνεπής* græci dicunt), sicuti videmus in telis, quarum textura inæqualis est. Distincta verò heri accipimus,

accipimus, quum æquæ omnes partes extentæ sunt, neque vna extenta & simplex est, altera duplex atque implicata.

23 *Casura sanè deteriora sunt, quum citò cadunt: hæc autem sic, ut neque premant, neque decidant.*

Hæc loquendi ratio perturbata omnino est, quomodo cum accipiatur verbum ἀποπεσόντων, quo /cadunt/ expressit: siue iuxta atticorum consuetudinem dictum existimemus, qui genitium participij pluralem pro tertia persona pluralis imperatiui ponunt, cuiusmodi illud est ἵπποι δ' ἐς δόλιχον παριόντων: siue genitiui casus, cuius rectus sit ἀποπεσόντες, oratio perturbata est. nam, si prius significatum admittamus, talis erit /casura deteriora citò cadant, vel si mauis, cadat/ cum dictio, casura, neutri generis sit: hoc autem in numero multitudinis acceptum græcè verbo iungitur tam singulari, quam plurali. iuxta alterum significatum, eiusmodi reddetur oratio /casura deteriora sunt, iplis citò cadentibus/. sed satius fuit sic scripsisse /casura sanè deteriora sunt, quum citò cadunt/. Colligitur autem euidenter ex hac oratione, & aliis quibusdam, librum hunc rudem adhuc editum fuisse, propterea quòd partim auctor ipse vnam vel alteram literam prætermittendo, addendo, aut variando errauit, quemadmodum plures scribunt: partim peccauit primus librarius, qui quædam ab auctore obscuris literis scripta minus perspicuus, non bene coniecit, addè, quòd litera perierit, vel confusa fuerit abrupta charta, vel alio casu interueniente. fortasse etiam alij errauerunt, literas præposterè componentes, & non nulli veterem scripturam immutantes. ex quibus omnibus fit, ut magnus errorum numerus, in multis exemplaribus accumuletur. Hæc profectò vel semel habita, memoria tenenda sunt: in singulis enim erroribus eadem repetere longum est. Dantes autem integra verba sic habere /casura sanè deteriora sunt, quum citò cadunt/ inquiremus, de quibus hæc dicantur, num de quibusdam corporis partibus casuris: an de fasciis: an de iis, quæ affectæ parti ad sanitatem comparandam imponuntur, qualia sunt cataplasmata, medicamina, linamenta, laquei. nanque extra hæc tria genera nihil videtur ab ægotantium corporibus posse cadere. quin & ab iis, qui librum hunc explanauerunt, sigillatim vnumquodque dictum est, non tamen omnia tria: quanquam, si cui singula probabilia visa fuerint, poterunt & omnia videri. Equidem non alienum existimo accipere orationem hanc in linamentis, quæ, vel per se sapius imponuntur ut ad sanguinis eruptionem, vel, ut medicamenta excipiant, vel, ut eadem superdata contineant. expedit enim prorsus ea decidere, at non citò, sicut neque laqueos: sed, ubi suppuratione facta perfectè caro producta fuerit, & circa venas sanguinem fundentes increuerit. At neque crustas etiam candenti ferramento, vel adurentibus medicamentis inductas, conuenit citò cadere. Sed complura medicamenta, quæ partim liquida putrescentibus partibus infunduntur, partim insperguntur arida, partim ad lienosos dantur, & ad aquam inter cutem summopere prosunt, quum non celeriter decidunt: medicamenta item, quæ, quòd bene inhærescant, ἐχέκολλα dicuntur, ad alias partes atque affectus imposita valdè proficiunt, si diutius contineantur: ad fracturas etiam, & ad humeri caput frequenter excidens, tum ad pedum, coxarum, renum, omnium articulorum tormentum, capitisq; dolorem acutum, experti sumus admodum conferre, nisi citò decidant. è quibus quæcunque dicuntur ἐχέκολλα, cum ita glutinentur, ut vix resolui possint, & corpori inhærescant, vinculum non requirunt: alia verò decidunt, nisi fasciis contineantur, de quibus nunc loquitur. Inquit igitur /hæc autem sic, ut neque premant, neque decidant/ quasi ita scripserit, quæcunque medicamenta non expedit citò cadere, ita vincienda sunt, ut affecta parte sub vinculo non coacta valenter teneantur, quod idem significat ac non decidant. In his igitur, quæ extrinsecus superdantur, satis verba hæc excussa sunt: consideremus rursus, num de partibus corporis. illud verè dicatur /casura sanè deteriora sunt, quum citò cadunt/. non nulli siquidem orationem hanc falsam existimant, quos fallunt partes putrescentes, quæ celeriter excidantur necesse est. quod ipsum per se verum est, nihil tamen illi repugnat, multum enim interest inter ea, quæ casura sunt, & quæ excidi debent. sæpè enim ossis testa, vel squamula tempore decidit, quas præstat à natura compulsa tempore paulatim abscedere, quàm sub irritantibus præidiis, aut sub instrumentis resoluentibus cadere. quæcunque enim subita vi extrahuntur, sinus fistulis similes relinquunt: ubicunque casura sub crescente calloso quopiam vel carnofo remittuntur, locus quàm primùm plenus conspicitur, & celeriter ad cicatricem perducitur, si medicina modicè siccans, atque adstringens adhibeatur. Atqui non nulla etiam neruosa, & à membranis non abhorrentia, sæpius excidunt, paulatim tutò longo tempore suppurantia: quæ si cogantur vehementibus medicamentis, id est acrioribus, vel si instrumento quopiam, seu digitis nostris euellantur, reliquas partes afficiunt, inflammationem, febrem, delirium, neruorum distentionem concitantia. Iam verò ad reliquum, nempe ad tertium genus eorum, quæ cadere diximus, pergamus, hæc autem sunt (ut non nulli concipiunt) fasciæ, quas aiunt, ubi laxæ sunt, futurum quæ omnino est, ut cadant, vtilius longiori tempore cadere.

sed

A sed hoc falsum est, siquidem, quæ malè affectis partibus circumdatae sunt, fatius est cadere quam celerrimè, ne dum tempore: atque adeò expectare non debes, dum illæ cadant, sed cito ipse iuncturam soluens rursus moderatius deligare. quare non nulli ex iis, qui sic exponunt, fatentur expeditius esse, laxas fascias citò cadere. Sed, quod ab Hippocrate effertur, præcise dicitur, nisi quiddam aliud intelligatur, ut vniuersa oratio sit huiusmodi /casura, quum diutius manent, deteriora sunt iis, quæ celeriter cadunt/. sed, si hoc detur /cadere/ minimè probabiliter refertur ad alias fascias. Equis tam diu expectat in iis, quæ sponte sunt casura, cum possit celeriter soluere, & rectè deligare: alij verò in contrariam partem inclinantes, veram quidem dixerunt orationem, sed explanando verba contorserunt. nam, qui non contorta est hæc expolitio: Casura deteriora sunt, quàm non casura, præstat tamen ea citò decidere. ut vna sententia contineatur priori parte orationis hætenus /casura deteriora sunt/: & rursus ab alio principio orli legamus /ταχέως ἀποτεσσόντων, hoc est citò cadant/. At contorta est (ut diximus) hæc expolitio iuxta figuram loquutionis συλλαβῶν appellatam. adde quòd si illud /casura sanè deteriora/ in vniuersum accipiat, falsum est, compluribus enim cadere bono est. Melius est igitur (ut narrauimus) orationem ad ea referre, quæ superimponuntur, & ad partes casuras: fascias verò, & postremam expositionem reicere.

24 *Ad quæ autem fasciæ spectant, vel quæ super alias dantur, vel quæ primæ iniiciuntur, vel utraq;.*

Supplendum est /hæc sunt/: dein protinus legendum /fasciæ quæ primæ iniiciuntur, efficiunt, ut quæ abscesserunt, propellantur/ & quæ sequuntur. /Spectant dixit ἐχέται, eo significans, quasi desiderant, & sibi vendicant. & spectant, quæ rursus omnia idem sibi volunt, nempe quæ vinculi vires sint, quæ ue opera. Voco autem nunc opera, non operas, sed effecta, quomodo domus opus est ædificatoris, fabri lectus, textoris vestimentum. In vinculis itaque, præsertim quæ ad fracturas adhibentur, binæ fasciæ obuoluuntur, antequam panni iniiciantur, secundum hos reliquæ. Priores duas Hippocrates proprio nomine dixit ὑποδυστασ: iuncturam verò, quæ ex his fit, nuncupauit ὑποδυστη. Audiamus deinceps ipsum dicentem, quæ præstare possint tam illæ fasciæ, quæ primò iniiciuntur, quàm fasciæ communiter. debuit autem primùm explicare cuius gratia vincula à medicis iniiciantur, quomodo primùm partitus est, allicens alia sanare, alia sanandi socia esse: tum qua via iniectum vnumquodque eorum sanet. ad curationis enim consilium respicientes idoneam iuncturam inueniemus. indicabit autem consilium valetudo, quæ curabitur. Hippocrates tamen non ita scripsit, sed hætenus præfatus, qualem adhibere iuncturam debeamus, transit ad opera, & vires ipsius.

25 *Fasciæ, quæ primæ iniiciuntur, efficiunt, ut quæ abscesserunt, propellantur: hiantia coniungantur: contracta separentur: peruersa dirigantur: aut contraria.*

Abcessisse nunc dicit, quacunque corpore integro cum alijs partibus iungebantur: hæc, cum aduersa valetudo est, vnitatem & contactum non amplius retinent. Vnitas quidem abest omnibus fracturis, vlceribus, fissis, contulis: contactus verò abscissibus, sinibus, inflationibus, tumoribus. Hiantia dicit, quæ plurimum inter se recedunt, quod fit duobus modis, vel vbi ipsa tota, vel vbi oræ duntaxat inter se distant. Ergo consilium curationis est, quæ abscesserunt propellere: hiantia coniungere: peruersa dirigere, quod communiter ad omnia superiora pertinet. græci hoc ἐπ' ἀντιθέτῳ & δι' ὁμοθέτῳ dicunt, significantes, quæcunque aliquo modo excedant, in statum restituere moderatum. Consilia igitur in vinculis adhibendis, hæc sunt: quanquam eodem vis non modò hæc præstat, sed interdum etiam contraria: cum rectè iniiciuntur, hæc: quum malè, contraria. Merito igitur in extrema oratione adiicit /aut contraria/. constituit enim ostendere, quid fasciæ, quæ primò iniiciuntur, efficiant, & non tantum de rectè adhibitis tractare. In principio sanè huius orationis /ad quæ autem fasciæ spectant, vel quæ super alias dantur, vel quæ primæ iniiciuntur/ loquitur de omni vinculo, non de optimo tantum: si quis tamen de optimo tantum velit ipsum agere, quod in extrema oratione additur, hanc sententiam habebit. Sicut in habitu præter naturam alia diducta, hiantia alia, non nulla peruersa conspiciuntur, sic videre licet alia vitiis his contraria. corpore enim benè valente, quum moderata cuncta sint, omne vitium inde oritur, quòd moderatio corrumpitur. Ergo, sicut quæcunque naturali habitu sunt, vbi cum quibusdam continuantur, vel quædam contingunt, amissa vnitatem & contactu ægrota- re & habere præter naturam dicimus, ita etiam, quæ neque continuabantur, neque se contingebant, vnitas & contactus morbo implicabit. quare, quum hæc contraria sint, vbi curentur, contraria consilia exigent. Illavero videbuntur rationi repugnare, quæ contraria sunt peruersis, directæ quæ nuncupantur. oportebit enim, & hæc (quantum ex propolita oratione colligitur) peruertere,

tere, qui effectus non amplius est vinculi idonei, sed alieni. verum, si quis meminerit eorum, quæ E ab Hippocrate de femore, & de humero traduntur, comperiet his rectum habitum præter naturam esse. quum secundum naturam in exteriorem & priorem partem gibba sint. Sed quendam hoc latuit, qui femur humerum ue transuersum fractum, primo quidem rectum composuit, tum callo glutinandum in eo habitu deligauit: sed, quum naturalem ossis habitum animaduerteret, eum que seruandum esse intelligeret, sentiens fractum os non dum callo solidatum, aqua calida perfudit oleo copiosè adiecto: dein vehementer extendens, primo quidem perfregit, ut initio fractum fuit, tum naturali figura seruata composuit, post hæc ita figuratum naturæ commisit callo glutinandum. Quare verum est non solum imprudentes medicos ob alienum vinculum contrariam vtilitatem superioribus asserere, sed optimos etiam de industria: quoniam, quæ præter naturam duplicata sunt, ad contrarias partes conuertunt: in iis, quæ coalescunt, coniunctionem soluunt. videmus enim quibusdam exulceratos digitos cohærere, ita labra, & palpebras. Spectare igitur hæc oportet in huiusmodi vitiorum curatione, quorum singulorum propriam iunctionem subiicit, primo proximis verbis agens, qua via parari fasciæ debeant.

- 26 *Iam Verò Fasciæ parentur leues, tenues, molles, mundæ, latæ, sine futuris, sine eminentijs: ita valentes, ne extent & F rumpantur, & paulo amplius: non siccæ, sed eo humore madentes, qui singulis sit idoneus.*

Scripsit iam antè de fascijs, sed mutila quædam, ex quo colligitur librum hunc, neque ab Hippocrate fuisse adeo politè limatum, ut edi posset, neque à filijs. nemo enim post obitum Hippocratis eadem, vel breuissima etiam oratione attigisset, sed vel hæc, vel quæ antè proposita sunt, resecuisset. dixit enim superius /fasciæ mundæ, leues, molles, tenues/ nunc adiungit opus etiā esse, ut latæ sint, sine futuris, sine eminentijs, tum valentes, non solum sic, ut non rumpantur, quum vehementius extenduntur, sed eo etiā amplius, hoc est validæ sint, & firmæ, quo fidelius teneant. Præcipit autem, ut sine futuris sint inæqualiter prominentibus, & sine eminentijs, quæ sunt in iis, quæ texuntur, interdum de industria, interdum invito textore, oblongis quibusdam extantibus, modo ex ipso subtegmine, modo etiam ex purpura. sed & sceminæ in iis, quas vocant *παιδοφάδες*, data opera omnino hoc faciunt, quæ omnia cauere iubet. At quod inquit /fasciæ parentur latæ/ iis annumerari potest, quæ minus accuratè proferuntur, nam, si angustis comparantur, poterit quis redarguere, conferens eas cum iis, quæ iusto latiores sunt: sed si ad moderatas, quod à moderato in vtramvis partem recedit, siue amplius sit, siue minus, id omne vitiosum est. Quor- G sum adhibeantur tenues, leues, molles, mundæ, superius dictū est. Quod addit /non siccæ, sed eo humore madidæ, qui singulis sit idoneus/ ad fascias quoque refertur. quo autem motus argumento id præcipiat, euidentissimum est. in nullo enim vinculo siccas ad mouendas censet, sed ex eo humore madefactas, qui *σύντροφος*, hoc est idoneus sit singulis vitijs, quæ curantur. Siquidem cerato liquido simplici, & quod picem habeat, & vino nigro austero madefieri has docuit in opere de fracturis, & de articulis. Quod si incipientur siccæ, præterquam quod ea ope carent, quam afferunt madefactæ, comprimendo ipsas partes, quibus superdantur, earum calorem augent, atq; ea de causa proximorum locorum humores euocant ad sedem affectam: quod cum tumores excitet, cuius constat maximo esse detrimento.

- 27 *Quæ abscesserunt quidem, eatenus, ut quæ sublimia sunt, sedem contingant: at non premant. Incipiendum verò a parte sana, & quæ vlcus est finiendum, ut quod subest, effundatur, neque aliud ultra coeat.*

Siue fracti ossis partes præter naturam inter se recesserint, siue quæ coniunctæ sunt, inter se dehiscant, siue magnum vulnus sit, coniungenda sunt, dum se tangant, non tamen vrgeant. H quandoquidem partes, quæ sic deligarentur, inflammatio & dolor inuaderet. De his autem nunc potissimum loquitur, quæ ventriculi nuncupantur, id quæ exempli causa, hoc enim ipse explanauit in sequentibus. Illud verò /eatenus, ut quæ sublimia sunt, sedem contingant, at non premant/ communiter refertur ad alia omnia, quorum naturalis contactus, vel coniunctio soluta est. sed, quæ proximè subiicit, cum inquit /incipiendum verò a parte sana, & quæ vlcus est, finiendum/ patet de tumoribus dictum esse. ab iis enim saniem effundi oportet, & glutinationis tempore nullum succum concurrere ad partem. quod sanè continget, ubi imum finem adstringamus, dum comprimatur: tum paulatim vinculum laxemus, usque ad os sinus, quod seruare apertum debet, & de uexum. sinus itaque, ubi pueros reddiderimus, glutinare volentes, ea ratione deligabimus. At ubi latum os scapularum summum à iugulo recesserit, sublimior ipsius pars valenter comprimi, & cogi debet, nullum enim afferet incommodum eiusmodi pressus, quemadmodum, ubi iugulo comminuto altera pars eius sublimior sit: minus tamen comprimemus hanc quàm latum scapularum os summum, alias insuper fracturas minimum, veriti

A veriti ipsam inflammationem. Nos itaq; de omnibus, quæ abscesserunt, locuti sumus. Hippocrates autem exempli causa de solis sinibus, in quibus deligādis, moderationem aperte docuit. cum ait /quæ sublimia sunt/ hoc est, quæ abscesserunt, /sedem contingant, at non premant, sedem videlicet id nuncupans, quod abscedenti corpori subiectum est. perpetuo autem debet inhaerescere, insidere quæ quod admouetur. siquidem priusquam partes se contingant, nullo modo possunt inter se glutinari, glutinantur enim, cum se contingunt, & non vrgent. In aperto sane est ne minem simpliciter imperaturum, ut sinus, qui glutinatione indigent, ita vinciantur, cum primò vindicandi sint ab inflammatione, dein purgandi, aut siccandi: præterea si quid carnis tabuerit, reficiendum: at nec filia, nec contusa, quæ ad vlcera simul & sinus spectant, per propositum vinculum conuenit curare, quum primò incidunt, sed simulatque inflammatione vacant, & sicca sunt. In vtrisque autem dixit continui solutione carnosas partes affligari, cum eo quod aliquid sanguinis inter eas subsistit, quod commune est abscessus & sinus. pars enim, quæ sic afficitur, quousque aperta non est, abscedere dicitur, id quæ vitium nominatur abscessus. Verum, si quæ aperiat, ut humor, qui receptus est, exitum habeat, vitium iam non amplius abscessus, sed sinus vocatur. Omnia igitur hæc mala perpetuò iuncturam postulant, ceterum non perpetuò similem. quoniam superueniente inflammatione iunctura ne per se quidem expetitur: sicut neque ubi suppuratio fit: quum sinus iam est factus, & caro increuit, moderata admodum opus est, ita, ut quæ abscedunt, sedem non contingant, per os enim demittenda sunt purgantia, & aperientia medicamenta: ubi glutinandi tempus est, quod Hippocrates nunc agit, necessaria est vincendi ratio, quam tradidit. Sed neminem decipi velim existimantem velle Hippocratem sinus omnes ita deligari. ostensum enim est non omnes, sed quibus nullum aliud accessit malum, nempe quum nec inflammatio est, nec putrescit caro, nec sordes aut succus subsistit. quoniam ipsi vnus generis soli per se suam curationem admittunt. Hæc autem abundè fuerunt à nobis diffinita in libris de ratione curandi.

28 *Atqui obligentur recta rectè, obliqua oblique, eo modo figurata, & quo minimè lædantur, & quo fasciæ non premant, non laxentur: quem habitum non mutant, quum suspendendi, aut colligandi causa, mouenda erunt: sed similiter hæc omnia se habebunt muscoli, venæ, nervi, ossa, bene contenta, & bene suspensa.*

Recta & obliqua nunc dicit non partes corporis, sed abscedentia, de quibus agit exemplo dumtaxat sinus adducto, qui ad longitudinem eius, in quo fit, relatus, prorsum vel rectus est, vel obliquus. Rectum igitur nunc intellige decliuem, obliquum verò eum, qui talis non est. Vocauit autem rectum linum, cuius os in inferioribus partibus situm est, imum in superioribus: obliquum verò, ubi spectat ad latera. Veruntamen fiunt etiam sinus, quorum situs his contrarius est, quippe quorum imum ab inferiori parte sit, os à superiori, quos, ut detur exitus saniei, imos aperire rursus oportet. quod si os ab inferiori parte penitus non fuerit, sed à latere, necesse est commodum partis habitum & vincendi modum, ut inde sanies excernatur, inuenire. tanta enim in talibus est habitus vis, ut sæpenumerò nos, eo variato, os, quod à superiori parte videbatur, in inferiori collocauerimus. Femur itaque, in quo sinus versabatur, os habens prope inguen, imum prope genu, sanauimus, quum ita figuraremus, ut inguen genu superius esset, quod facile cecidit, ac sine dolore, popliti subiecto puluino molli: eadem quoque via sinus in posteriori parte cruris, quæ carnosa prominet, quorum os popliti finitimum erat, ad sanitatem perduximus, extremum pedem sublimiorem poplite collocantes: brachium præterea sinu detentum mitella suspendentes, sæpè curauimus, manum cubito altiore constituentes: cubiti articulo similiter offenso, sic, ut sinus iuxta ipsum insidens à superiori parte humerum, ab inferiori brachium occupet, maximè accommodatur, qui nunc dictus est habitus, in quo articulus vtroq; D osse humilior collocatur, cubiti scilicet & humeri, in quo casu, duabus vtimur fasciis, quarum vtraque à vitio orsa ad os, quod in articulo est, finitur. Ergo, ubi sinus rectus omnino sit, iuncturam adhibebis, quæ in neutram partem inclinet, perinde, ac si fractum membrum deuincias, quod rectum debeat contineri: sed, si ad latus conuertatur, vinculum aequè eodem spectet, & is habitus seruetur, quo sanies exitum habeat. Deligare autem debemus affectam partem in eo statu, quo continenda est, scientes ea, quæ mutantur, magnopere lædi, ita, ut necesse sit, non nulla ex his, quæ attollebantur, subsidere, quædam, quæ deprimebantur, assurgere: quo necessario fiet, ut quæ attolluntur, vrgeantur à fasciis, quæ subsidunt, cum fasciæ relaxentur, non contineantur. Dixit autem Hippocrates in fasciis, quæ premunt ἀπὸσθιζω: in iis, quæ laxantur, ἀπὸσσω: imperauit quæ, ut propriam linui iuncturam iniciamus, cum habitum deligentes, sub quo neque fasciæ premant, neque laxentur. nam, ubi laxentur, coguntur affectæ partes mutari. Quod si vincendi tempore simpliciter obliquum linum dumtaxat spectemus, obliquam iuncturam admouebimus in eo habitu, in quo durare vitiatæ partes non possunt, ubi contineantur, aut suspendantur. ubi autem alligatæ partes moueantur, non nullæ adstringentur, non nullæ laxabuntur, quæ in figurando mutantur, ipse nominatim exposuit, cum inquit /musculi, venæ,

venæ, nervi, ossa/ his enim continetur corporis moles. Intelligendæ autem venæ sunt iuxta maiorum consuetudinem, non solum, quæ nunc venæ nuncupantur, sed etiamnum arteriæ. Mens igitur totius orationis hæc est: cuius singula verba non admodum obscura sunt, fortasse tamen non ab re fuerit ea paucis declarare. ἀναλήψας, hoc est suspendendi vocabulum accipit in brachio, quod, ubi deligatum est, collocatur in mitella, quæ à cubito ad manum excipiens, ipsum sustineat: ῥέσω, hoc est continendi in crure. Patet autem id, quod suspenditur comprehendere sub genere eorum, quæ continentur. In fine orationis /bene contenta/ εὐθετα dixit, /bene suspensa/ εὐχεται: illud ad crura, hoc ad brachia refertur.

29 Tum eo modo figurata suspendantur, & iaceant, quo minimè lædant, & secundum naturam sint.

Non aliud est, quod minimè lædit, quàm quod secundum naturam est: sed vni & eidem contingit secundum naturam esse, & minimè lædere. quid hoc sit in opere de fracturis satis ab ipso expositum est: quod & hic etiam suo loco exponetur.

30 Quæ verò non abscesserunt, contraria ratione.

Quidam adiecta negandi particula /non/ scripserunt /quæ verò non abscesserunt/ asserunt quæ, ubi abscesserit aliquid, utendum esse vinciendo ratione superius posita, ubi non abscesserit, contraria. Ratio superius posita, incipiebat à parte sana, & super vlcus delinebat, coarctandi vim remittens. contraria igitur incipiet ab vlcere ac fractura, & superius procedet laxius adstringens. Sed qui verba hæc declarant citra negationem scripta, commonere ipsum aiunt, ut, ubi operam damus, ut quæ præter naturam contracta sunt, aut commissa, abscedant, superiorem vinciendo rationem immutemus. Perspicuum autem est, ubi ea, quæ admodum inter se iuncta sunt, quocumque modo non conuenienter inter se concurrerint, deducere volumus, contraria vinciendo ratione opus esse. quin & in multis magnis vulneribus, in quibus, ima parte non sanescente, cutis agglutinatur, vel ex duplicatis oris altera super alteram excedit, item ad similitudinem orarum cutis, in illis fracturis, ubi fracti ossis extremitates altè sunt diductæ, quæ concurrerunt, abscedere debere, id quoque in aperto est. quod ipsum illis quidem ossibus accidit, quæ intrinsecus multum caua sunt. Hæc quidem per se vtilia esse certò scimus, quæ quis nunc reprehendere posset, ut malè adducta, eo quod propositis verbis nullo modo accommodentur, ita enim habent /quæ verò abscesserunt contraria ratione/, at non idem significatur his verbis /quæ verò abscesserunt/ atque illis, /quæ verò ut abscedant, operam damus/. debuerunt hi sicut priores negationem preponere verbo /abscesserunt/ sic quæ orationem suæ sententiæ consonam reddidissent, scripturam quæ ita mutata potuissent suo iure exponere: nam, si ita habeat, ut nunc habet, eorum explanatio aliena est. Ne putes igitur hic de iis tractari, quæ operam damus, ut abscedant, hæc siquidem in sequentibus ostendet: sed de iis, quæ abscedunt, & non dum perfectè abscesserunt, vel quamuis perfectè abscesserint, non dum tamen versa sunt in sinum. amant enim hæc primò curationem, quæ dolorem leniat, concoquat, & pus moueat: sed postquam ad suppurationem venerunt aperienda sunt, ut exitum habeant: tum si quæ remaneant inflammationis reliquæ, qua parte continetur pus, quod effunditur, soluendæ sunt ex toto: deinde (ut posui) siccare conuenit, & carnem producere: quibus factis, ubi vnus ipse relinquitur sinus nulli vitio iunctus, ac neque inflammatio est, nec sordes, nec superat humor, aut deest caro, ad glutinationem veniendum. Ergo nihil mirum est, si iubet contraria fieri in his, quæ abscedunt. nouit enim quilibet, qui medicinalem artē professus in operibus eius versatus sit, abscessibus, qui maturari possunt, inimicum esse, si quid eius humoris in pus verum effundatur, magis enim ad rem pertinet, expeditius quæ est intus subsistentē reliquum iuuare. in quo casu affecta pars, quod ad morbum attinet, vinculum non requirit, cum hoc adhibeatur, non quo per se curet, sed quo iuuat curantia. Distat ergo abscedentium curatio à totis sinibus, in abscessibus enim expedit prius quæ ad maturitatem peruenerint, nihil effundi: contra in sinibus, excretis omnibus nihil intus relinqui. Præterea abscessibus nullo ore prorsus est opus: sinus os requirunt, id quæ apertum. Itē quæ abscedunt, sub calido cataplasmate, & madefaciendi vim habente, coqui debent: sinus per vehementer siccantia pueros reddere, siccòs quæ oportet. Ad hæc sinus proposito vinculo curantur: abscessus non alio nomine vinculum postulant, quæ sanantium præsidiorum commoditate. Sed Asclepiades illud /quæ verò abscesserunt contraria ratione/ referens ad vinculum, eius mentē vniuersam esse autumat. Quod si partē sic figuratā deligaueris, ut fasciæ neque premant, neque laxentur, hoc totum secundum naturam est: in iis verò fasciis, quæ abscesserunt contraria efficitur, hoc est contrario modo figurans deuincito. Scribit autē ad verbum sic /Si quo modo parte figurata vinculum abscedat contrario figuratā alligato, ut si, ubi extēto cubito humerum deuinxeris, fascia non maneat, sed recedat, contra, atque ubi extentus erat figurato, hoc est cubitū inflectens ipsum denuo vincito, quoniam verò secundum naturalem habitum crura extenta sunt, si, quem iis curuatis deuinxisti, extendere ipsa iusseris, cum musculi locū mutant, diducetur fascia ab illis locis, à quibus musculi recesserunt,

A recesserunt, quòd contrariò modo figurentur, atq; vbi curuata erant, liquidem crura extenta vincienda sunt, eo' que modo figurata continenda/. Hactenus Aſclepiades, proximum iam eſt, vt ad alia verba tranſeamus.

31. *Vbi verò hiantia coniungenda ſint, in cæteris eodem modo, tantum ab vltioribus aliquid adducendum erit, & paulatim comprimendum. Primò quidem minimum, deinde magis, maxima compreſſio contactu terminetur.*

Reducamus in memoriam id, quod ſummatim Hippocrates à faſcijs, que primò iniiciuntur, fieri dixit his verbis, quorum principium eſt /faſcijs, que primò iniiciuntur, efficiunt, vt abſcedentia propellantur/ tum ea, que hactenus ab ipſo prodita ſunt. ſupplebimus enim hac via id, quod propoſitæ orationi videtur deſſe, ſic, vt eo adiecto talis fiat /vbi verò hiantia cõungere oportet, in cæteris eadem agemus, tantum ab vltioribus aliquid adducemus/ & que ſequuntur. Hiantia verò nunc ab ipſo dici exiſtimandum eſt, que, præter quã q; vltra debitũ inter ſe recedunt, vtranq; etiam oram habent in exteriorẽ partem cõuerſam: quod in vulneribus fieri conſtat, vehemẽti interdum inflammatione accedente: vbi, cùm carne altè admodum vulnerata tranſuerſus muſculus incidatur, deinde non glutinetur, iungatur q; ſed magna inflammatio ſequatur, ſub quã ex-
B tenta cutis vtrinq; proximam oram attrahat, ab vtraq; parte vulnus hãbit. Eiuſmodi figuram re præſentant labra inflammata palpebrę, & cutis que glandem tegit: in capite etiam cùm aperta cutis eſt, vt locus terebrę ſit, adiecta inflammatione hiantium ſpeciem videmus, id q; ſepius accidit, potiſſimum, vbi cute coacta ſpaciũ, quod in medio eſt, linamentis implemus. id quod interdũ facimus, vbi aut muſculorum vulnus tranſuerſum altè infederit, aut ſanguis eruperit, lintea carpta (que *μωτῆς* vocant, id eſt linamenta) inferentes: atq; vbi timemus, ne cutis ſaneſcat, vtrinq; contracti muſculi partibus non glutinatis. Poſtulant ſanè cuncta hæc vitia & alia præſidia, que in inflammationem ſubmoueant, verũ ipſe nunc non quamlibet cuiusq; morbi curationẽ exequitur, ſed eam, que propriè vocatur chirurgia. Hiantium igitur vinculum idem eſt, quod abſcedentium, quod ad reliqua ſpectat, orſum enim à parte ſana paulatim ad cutem venit apertè viceratã: ſed eo diſtat, q; in his ab vltioribus incipit, q; in abſcedentibus, quod' que compreſſionem intendit vſq; ad hiatus. In ſinibus igitur vinculum ab imo incipiebat: at in hiantibus non rectè inde orditur, vbi quaſi radix eſt, ſed longiũs à parte ſana. præterea cutem paulatim adducit ad vlcus, quam compreſſionem non remittit, ſed paulatim intentum primo ambitu cutem premit, deinde magis. Vocabulum /primo/ non nulli accipiunt in vno vinculo, non nulli in pluribus. q; ſi ad
C vnum referatur, notabit vinculi principium: ſin ad plures, primum vinculum vniuerſum oſtendet, vtrunq; autem verè dicitur aliter in alijs affectibus, non genere, ſed magnitudine inter ſe diſcrepantibus, liquidem oras leuiũs in exteriorẽ partem conuerſas vno tantum vinculo reducere ad naturalem habitum conabimur: vbi ampliũs hient, vi non cogemus, cùm primò deligabimus, tunc enim magis ad rem pertinet inſiſtere inflammationi, q; componere hiantia. Adicitur autem poſtremis verbis /maxima compreſſio contactu terminetur/ quoniam hiantia magis adduci poſſunt, q; vt ſe contingant: ſed vbi ſic adducta ſunt, alterum altero vrgetur, & dolet, eo' que ipſorum inflammatio augetur. ducenda ergo ſunt, que hiant, vt ſe contingant, ſed non vltra id. Hęc autem ſcriptura dupliciter legitur, in quibuſdam exemplaribus /maxima compreſſio contactu terminetur/, quam agnouit Aſclepiades: in alijs autem /maior compreſſio contactu terminetur/. quæ /maxima/ habet, ſicut potior eſt, ita etiam vetuſtior.

32. *In diducendis iis, quæ contracta ſunt, ſi inflammatio eſt, contraria ratione vti oportet: ſi ea non eſt, præparatione eadem, ſed vinculo contrario.*

Contraria ratio eſt contractionis, atq; hiatus, liquidem ſub hoc labra plurimum inter ſe in contrarias ſedes recedunt, ſic, vt alterum in dextram partem, reliquum in ſiniſtram conuertatur: contra ita inter ſe concurrunt que contracta ſunt, vt vel vnum alteri inſidat, vel inter ſe duplicentur quodammodo, vel inſtar eorum, que inuoluta ſunt, implicentur: id, quod interdum ob inflammationem accidit, non aliter q; contrarium malum, ſub quo hiantis corporis partes plurimum inter ſe diductę in contrarias ſedes recedunt. Neq; mirum eſt, ſi ab eodem morbo inflammatione vide licet, hi contrarij caſus oriuntur, cùm non iisdem particulis vehementer inflammatis vtrinq; accidat, vt hient & contrahantur. in oculis enim, vbi exteriorẽ palpebrarũ cutem ingens inflammatio malè habeat, & intentione quadam proximum locum afficiat, palpebra ob inflammationem intenta, in exteriorẽ partem conuerſa apertè deprehenditur: vbi non cutis, ſed interior tunica, que vſq; ad nigrum oculi pertinet, valde inflammetur, palpebra tunc in interiorẽ partem trahitur. que res, cùm ambabus accidit palpebris, morbum facit, quem *ζυμωσις* dicunt, ſub quo aperire eger oculum non poteſt. quod vitij genus labris interdum incidit, tum cuti que glandem tegit, & ano: quorum cauſa eadem eſt, exteriores enim eorum partes inflammationis vi in interiora vertuntur, eadem vitia & in ſceminarum naturalibus verſantur. ſimile quoddam accidit & vulneribus, & iis, que vtcunq; vlcerauntur, interioribus enim partibus inflammatis peruertuntur

Septima Claſſis.

EEEEEE

vulcerum

ulcerum labra in interiorem partem: sed concidunt etiam intro, in quo casu extenuari & emacrare E
 scere ac putrescere eadem labra necesse est. nam qui aliter fieri posset, ut promptè introrsum con-
 uerterentur? Deficit etiam pars interior, vel quod non subministratur alimentum, quæ res ad tabem
 perducit: vel quod subiectæ carnis scalpelli opera plus iusto excisum fuerit, vel quod putrescens absumat-
 ur. Ergo huiusmodi affectibus succurrit idoneum vinculum, quod ubi inflammatio accedat, non
 solum per se non iuuat, sed onere etiam lædit. Adhibetur autem commoditate medicamentorum
 inflammationem curantium. quod spectans dixit Hippocrates debere nos, quæ contracta sunt di-
 ducentes, ubi inflammatio quidem est, contraria ratione iuuare, hoc est à vinculo cauentes. quoniam,
 nisi magna necessitas urgeat, ut quædam teneantur inflammatis partibus superiniec-
 ta, nullo mo-
 do deuincimus: cum quod hæc confidimus posse sine vinculo manere, fascias ad continendum non
 iniicimus. Accipimus autem lintea quæ tenuissima, & leuissima: ac circuitibus, quantum fieri potest,
 rarissimis, vel vno tantum etiam contenti sumus: quæ res plures medicos latuit inflammatis par-
 tibus, quæ tumor esset, super cataplasmata imponentes duos & graues panniculos, multam lanam,
 plures fascias, quæ per se omnia sunt inflammationibus aliena, cum onere potissimum offendantur.
 Iam verò in iis, quæ citra inflammationem contracta sunt, iubet, ut fasciarum præparatio eadē
 sit, quæ prius: vinculum verò contrarium, atque in hiantibus. Siquidem in illis fascia longè orsa, à F
 parte sana, euoluta ad ipsum hiatum procedebat, paulatim quod compressio eius intendebatur: at in
 contractis ab affecto loco incipientes fasciam euoluimus super cutem, quæ iuxta est. Adungi ve-
 rò hic debet, quod ab Hippocrate prætermittitur, ut qui non constituerit ipsorum, quos memo-
 rat, affectuum vniuersam curationem docere, sed eam duntaxat, quæ manu adhibetur. nos verò
 ut sermo absoluat, quod restat adscribemus. Vbi quid eorum, quæ contracta sunt (ut dictum est)
 diduxerimus subiectum locum, in quem labra inciderunt, implere linamentis debemus, vel ido-
 neo medicamento, donec contractæ partes proximæ cuti æquentur, tum propositam vincendi
 rationem admo-
 uere.

- 33 *Dirigere item ubi peruersa oporteat, cetera fieri eadem debent. In iis autem, quæ recesserunt, adducendis, vincire opus est per fascias, quæ primò inuiciuntur: tum glutinare, atque suspendere: in contrariis verò contrà.*

Sect. 2. r. 29. &
 43 7^o. 265. c.
 Et 266. f
 Sect. 1. r. 51. 7^a.
 231. a

Corpus peruertitur, ubi aliquid sua sede, modo in exteriora corporis, modo intro in spacium
 quodpiam laxius mouetur, quemadmodum in naso: qui, si quid vel ossis, vel cartilaginis in exte-
 riorem partem recedat, ab exteriori parte deprauatur: sin in foramen interius, ab interiori, ad cu-
 ius exemplum reliquæ partes peruertuntur. Cõstat autem & in iis commune cuiusque curationis G
 consilium præsidia ostensurum. est autem commune ubique consilium contrariis contraria curare.
 quocirca nunc etiam, quæ recesserunt, & per alia auxilia (de quibus tractare nunc propositum non
 est) & per fascias coniungenda sunt. docuit autem ipse deligandi modos huc pertinentes, iunctu-
 ram (ut ipse antea scripsit) ad ea quæ abscesserunt, quæ hiant, & quæ contracta sunt: glutinationē,
 ut in opere de articulis ad || nasum & maxillam: suspendendi rationem, quemadmodum, ubi in li-
 bro de fracturis inquit, || Quod si utroque osse comminuto, vel eo, quod subiectum est tantum, de-
 ligatum brachium mitella suspendatur, ea quod plurima circa fracturam detur, partes verò hinc atque
 hinc suspensæ sint, homini necesse est os ad superiora peruertere: sin ossibus sic fractis, mitella ma-
 num duntaxat & cubitum excipiat, reliquum verò brachium suspensum sit, deprauatum specta-
 bit deorsum. debet ergo brachium suspendi per mitellam latam mollem quod multum brachij cum
 prima palmarum parte æqualiter sustententur/. Hæc igitur verba alienam suspendendi rationem, de-
 prauantem quod indicantia, deprauatorum quoque curationem demonstrat. Demus brachium cui-
 piam in inferiora peruertere, suspendendum erit mitella angusta ab inferiori parte exceptum: at si
 sursum intendens deprauetur, ea utendum erit suspendendi ratione, quæ in inferiora peruertit,
 per quam & regione iuxta primam palmarum partem, & cubito mitella comprehensio, quod inter hæc H
 est, nulla re fulcitur. Consimili modo, ubi prima palmarum pars in superiora cõuertatur, iuncturam
 adhibebimus, quæ deorsum inclinetur: hac complexi, quæ in vicinia cubiti sunt, alteram extrema-
 tem à prima palmarum parte sine fulcitra relinquimus. itidem cubitum in superiorem partem inten-
 dentem sic suspendemus, ut ipsum sine fulcitra relinquamus. quæ suspendendi ratio efficiebat,
 ut, cum non dum peruersus esset, in inferiorem partem inclinaretur. Sed (ut summatim dicam)
 quæcunque deprauare possunt, quæ deprauata non sunt, eadem dirigunt, quæ in contrariam par-
 tem sunt peruersa. Ad horum autem similitudinem deprauantur, diriguntur quod, quæ in femore,
 & quæ in crure, cum totum crus iacet, quod enim in brachio efficit suspendendi ratio, id iacen-
 di in crure. sed supplere oportet /iacere/ ubi Hippocrates inquit /suspendere/. Illud autem in fi-
 ne sermonis /in contrariis verò contrà/ potest ad prædictos deligandi modos referri: intelligemus
 enim ipsum velle vitia, quæ iis contraria sunt, contrario modo vincita curari, hoc est iis, quæ per-
 uertunt ea, quæ præter naturam recta sunt, quorum in superioribus mentionem feci.

Galenus

G A L E N I I N H I P P O C R A T E M
D E O F F I C I N A M E D I C I
C O M M E N T A R I V S T E R T I V S

Vido Vido Florentino interprete.

ARGVMENTVM LIBRI

Quæ in communi de Deligationibus dicta sunt, trahuntur ad rationem deligandarum fracturarum, sed pleraque in libris de fracturis & de articulis latius exponuntur.


1
A. lib. 4. f. 5. t. 2. B
c. 5. fol. 484. b



N fracturis, quod ad pannorum¹ attinet longitudinem, latitudinem, crassitudinem, numerum, longitudo quidem, vinculi longitudinem æquet: latitudo trium sit, vel quatuor digitorum: quod vero attinet ad crassitudinem, triplices dentur aut quadruplices: tot autem numero, ut neque plures sint, neque pauciores, quam ut ambiant.

Scriptum in opere de officina medici, primò de naturalibus iudicandi potentijs, quibus vniversi homines & ad tractationem omnium artium, & ad totius vitæ rationem vtuntur, necessaria siquidem fuerunt, non solum ad propositam medicinæ partem, quæ manu medetur, sed ad omnes in medicina morborum notas (σημειώσεις græcè vocantur) quæ sanè iudicandi potentijs discernuntur: proximè in proposito opere docuit, quibus constet medicinæ pars, quæ manu curat: tertio, qualem adhibere vincendi rationem debeamus, tum ab affectæ partis natura, tum ab ipso affectu indicium sumentes. In propositis autem verbis de fracturis agit, quæ spectant ad commune vitium continui solutionem. Sic enim ego solitus sum hoc morbi genus appellare: sed Hippocrates corpora, quæ huiusmodi malo torquentur, abscedentia dicit, quare & malum non iniuria abscessus nuncupabitur, fiet q; abscessus morbi quædam species, quæ græci ἀπόσπασιν propriè vocant & ἀπόσπασμα. Hæc diximus, ut in memoriam redigeremus, quæ in superiori expositione narrauimus: sed iam pergamus ad reliqua. De fracturis verba faciens, pannos ante omnia proponit, iubēs, ut horū longitudo sit æqualis vinculo, quod constat ex fascijs, quæ primò iniiciuntur, cum eo nomine illi adhibeantur, ut has fulciant, atque immobiles teneant: latitudo trium, aut quatuor digitorum, hominis videlicet qui deligatur: tum quod ad crassitudinem pertinet, triplices sint, aut quadruplices, quoniam, ubi fasciæ, quæ primò iniiciuntur, fulctura egent firmiori, quadruplices, ubi non tanta opus sit, triplices obici abundè putat. Illud autem euentissimum est, quod quo magis comminuta ossa sunt, eo debet firmitus contineri. Numero autem tot, inquit, esse oportet, ut affectum membrum complectantur. at iugulum fractum, & costia, comprehendi in orbem nequeunt, sed magnitudo fracturæ in quibusdam pannorū numerum indicabit. iugulo ternos pannos, quadruplices plerūq; imponimus. duos quidem primos ad similitudinem literæ X, ut medium vtriusque, quæ inter se committuntur, fracturæ obiciatur. tertium extendimus super reliquos duos in longitudinem iuguli, ut ea, quæ subiecta sunt, adstringat, & fracturam ipsam adurgeat.

2 D



A. ibidem.

At quum hi complendi causa iniiciuntur, longi sint, ut ambiant: latitudinis & crassitudinis coniectura fiat de eo, quod deest, id autem compleatur non confertim.

Miror Hippocratem non docuisse prius vsum pannorum, deinde viam, qua quis eum possit cōparare. Vsus quidem duplex est, ut cōtineantur fasciæ, quæ primò iniiciuntur, & ut impleantur partes, quæ in extremitate tenuantur, quas ipse nominare solet ἀπόξην & ὑπόξηρα, cuiusmodi brachium est iuxta primam palmæ partem, & crus iuxta pedem, quibus iubet pannos in orbem circūdari, ut postquā iniectæ illæ fasciæ fuerint, quæ alijs superdantur, iunctura sit æquè crassa. Ergo, quum panni duplici de causa superdantur, & ad continendum, & (quod διακλώσιν dixit) ad com-

plendum, commonet, ut ita longi adhibeantur, ut corpus quod alligatum est, omplecti in orbem possint: lati verò, & crassi pro eo quod complendum est. nam, si longiores sint, q̃p ut partis ambitū Septima Classis. EEEEEEE ij æquent,

æquent, necesse erit extremitatum alteram alteri insidentem reddere membrum tumidum magis ea parte, quàm vtrinq; sic, vt iunctura inæqualis fiat, atq; idcirco laxior: sin breuiiores fuerint, quàm, vt extremi se tangant, quum inter ipsos aliquid inanis spaciū relinquatur, iunctura itidem contraria ratione inæqualis erit, siquidem locus in iis necessariò reddetur inanis & cauus, perinde atq; vbi longiores erant, gibbus & eminēs. Edicit, ne huiusmodi panni semel subito iniiciantur, sed paulatim, tenuiores quidem à superiori parte, crassiores ab inferiori. quòd si vnum subito inieceris, locus talem habitum acquireret, qualem primò habuit membrum.

- 3 *Ex fascijs, quæ primò iniiciuntur duæ sunt, prior ab affectu orsa in superiori parte desinit: altera ab affectu deorsum procedit, inde sursum finitur.*

Sect. 1. t. 23. &
deinceps. 7.
227.8

Suprà quoq; ostendi fascias, quæ ante pannos affectæ parti primò iniiciuntur, ὑποδερμίδας ab Hippocrate nominari. Scripsit autem in libro de || fracturis quorsum vtraq; imponatur. prior namq; ex iplis non modò prohibet, quod concurrat, sed & eius quod in affecto loco receptū est, sursum aliquid expellit: altera non nihil sanguinis in vitiosa parte superantis ad extremum membrum transmittit. Commune est vtriq; compositum os sine deprauatione continere.

F

- 4 *Adstringendæ autem maximè sunt, quæ morbus est, extremis partibus minimè, alibi pro ratione.*

Ibidem.

Horum item ratio in commentarijs de || fracturis exposita est. In vniuersum autem sub omni vinculo, vbi subiecta caro magis adstringitur, humor in ea contentus ad proxima loca propellit: vbi verò leniùs, admittitur quod procedit ab iis, quæ vehementius comprimuntur.

- 5 *Comprehendatq; Vinculum integræ partis quàm plurimum.*

Qua ratione hoc quoq; consilium dederit, manifestum est, quia cum vinculum integræ partis multum complectitur, firmitus continetur, & humor ab affecta parte ad ea, quæ iuxta sunt, magis exprimitur, reprimitur que valentiùs, quod à superiori parte descendit.

- 6 *At quod ad fasciarum numerum, longitudinem, latitudinem spectat, numero quidem tot accipiantur, vt à vitio minimè superetur, ut ferulas cōprimere non sinant, ut onere non ledant, ut inclinationis causa nō sint, nec effoeminēt.*

Alij ferè omnes sub eodem nomine fascias habent, quæ primæ iniiciuntur, & quæ his superdantur: sed Hippocrates priores appellat ὑποδερμίδας, quæ pānis superdantur ἐπιδέρμεις. has igitur quot, quàm longas, quàm latas, adhibere conueniat, nunc persequitur. Imperat itaq; vt tot sint, quot compositum os fideliter contineant. illud enim /vt à vitio minimè superentur/ id sibi vult quòd, vbi non superent, in contrarium incident, nempe vt cedant, & à vitio, hoc est vitiosa parte superentur. quòd si tunc vincunt, quum compositam partē immobilem conseruant, si quid hæc moueatur, iure dicet quis eas superari. Quod autem inquit /vt ferulas cōprimere non sināt/ nihil ampliùs notat, quàm quòd ferulæ, vbi fasciæ iusto pauciores sint, membrum prement, hoc est cogent atque vrgebunt, quæ noxa violatam quoque sedem afficiet: quin si tot adhibueris, vt laborantem oneres, sic quoque peccaueris, quum modum excedas. quæ duo cauentes fasciarum numerum coniciemus, ea obseruatione adhibita, vt neque premant, neq; onerent. Sed ne fasciarum numerus (inquit) causa sit inclinationis, quam dixit περιρρέειν verbo inde ducto, q̄ iunctura tota in alteram partem dextram vel sinistram περιρρέειν, id est inclinetur, id quod accidit ob exuperantem numerum fasciarum. Vsurpat autem verbum effoeminare, quod ἐκθινύειν dixit. quidam in partibus vitiatas accipiunt, vt quas redditurus sit infirmas & molles superimpositorū linteorum numerus: alij in ipso vinculo, quod imbecillum fiet, quum ferulæ, sub iniectorum linteorum numero laxiùs contineantur.

- 7 *Quod verò ad longitudinem & latitudinem pertinet, impleant trium quatuor, quinque, aut sex, longitudinem quidem cubitorum: latitudinem verò digitorum.*

Tot igitur digitorum, & cubitorū, illius scilicet, qui alligatur, superdari vinculum iubet. neq; vnum statuit longitudinis & latitudinis terminū, eo q̄ nullum sit vinculum, quod adhiberi omnibus æquè longum debeat, sed numerum, longitudinem, & latitudinem fasciarum pro magnitudine fracturæ definit. atq; hoc est postremum vinculum, quod in opere de fracturis iniici voluit, quo tempore inflammatione à sede affecta sublata ueniendum est ad ferulas.

- 8 *Ambitus itaque panniculorum totidem sint, nec urgeant.*

Imperat, ut panniculi toties fascias cingant, quoties earum unaquæque circuiert. Illud autem /nec urgeant/ ad modum refertur adstringendi. eatenus enim coarctari panniculi super fascias debent, ut firmiter maneant, sed non urgeant. At quid magis præstat, q̄ coniunctè hanc partem
contextere

A contexere cum priori, vt tota oratio sit huiusmodi: / Ambitus itaq; panniculorum totidem sint, vt ne vrgeāt. quandoquidem premunt, vbi sapius circumduntur. Expediit fortalle pro τοσαῦτα, id est totidem, legere τοιαῦτα, id est talia, σ̄ tertia litera scilicet versa in ι. nam ambitus panniculorum qualitate potius, quàm numero vinculum exhibent moderatum.

9 *Mollia autem adhibeantur, & minimè crassa.*

Hæc omnia videlicet præcipit mollia adhiberi, & nō crassa, cauens, quemadmodum suprà de linteis diximus, ita etiam nunc, ne subiecta corpora comprimantur.

10 *Omnia quæ hæc pro longitudine, latitudine, crassitudine quæ sedis affectæ.*

Idem quoq; iam suprà dictum, vbi alia res agebatur, non huic dissimilis. Meminisse autē ubiq; conuenit ad vitiatæ partis longitudinem, latitudinem, & crassitudinem referri, quidquid de longitudine linteorum, tum latitudine, crassitudine, numero ue propositum fuerit.

11 *Cæterum Ferulæ, leues, æquales sint, ab extremo resimæ, ab vtraque parte vinculo paulo breuiores, crassissimæ quæ fractura extat.*

Alib. 4. f. 5. t. 2.
c. 7. fol. 484 g

B Spectant tam ferulæ, quàm panni, ad stabilitatem vinculi, ac firmitatem, panni quidem, vt fascias tueantur, quæ primò iniiciuntur: ferulæ verò, vt omnia, quæ subiecta sunt, muniāt, sic vt in vniuersum quatuor sint, quæ singula suum vsum præstant. In primis enim fasciæ, quæ primò iniiciuntur, compositum os continent, & affectum inflammari non sinunt: deinde panni, qui superdantur, delabi ipsas non patiuntur: tum ferulæ firmant, quas circumponi Hippocrates iubet leues, & planas. Est autem cōtrarium leui asperum, inæquale æquali, id q; quod asperum est, omnino inæquale est: at non sequitur, si quid inæquale sit, id prorsus asperum esse, quemadmodum nec via idcirco aspera est, quia inæqualis. potest enim cū ascensu & descensu contineatur non aspero inæqualis & esse & appellari. quin & ferulas nihil prohibet leues esse, non tamen equales, nam vbi in latera, vel sursum, aut deorsum spectent, æquales utiq; non erunt, poterūt tamen esse leues. Fracturis itaq; saluberrimum est ferulas nec asperas esse, nec peruersas, vtraq; enim de causa comprimunt, præterquam q, quæ peruersæ sunt, vinculum quoque peruertunt, quo deprauato pars etiam, quæ comminuta est, deprauatur. Monet autem, vt ab extremo resimæ imponantur. resimas intelligere possumus leniter ab inferiori parte derasas, cū, quæ ad finem vsque æquali crassitudine sunt, vinculum ibi æquè atq; in cæteris partibus contineant, quod minimè opus est facto. placuit enim ipsi mediū arctius adstringi, inde versus extrema laxari, extremis q; partibus omnium esse laxissimum: tum ferulas vinculo ipso breuiores superaccommodari, ne vltra ipsum vlla in parte cutem tangant, quæ sapius intumescit, eò quod humorem admittat sub fasciis depulsum. Crassiores item ferulas imponi voluit, quæ fractura est, quandoquidem ad hunc locum potissimum pertinent.

12 *Atque vbi partes gibbæ sunt, & natura minimum carnis habent, vereri oportet, quæ eminent, vt iuxta digitos aut talos, vel imponendo, vel breuitate.*

Cauere iubet, ne iuxta ossium eminentias ferulæ superaccommodentur, id quod duplici ratione fit, vel vbi nullo modo ab illa parte ipsius vinculi dantur: vel vbi adhibentur breuiores, quàm vt ad eminentiam pertineant, prius q; desinunt, quàm illam attingūt, quod expeditius est. In quibus autem vitamus ferulas, ne quid lædant, ab illis planè abstinentes, dixit / imponendo: at / breuitate / cū longitudinē aliquid demimus, quasi ita dixerit: Cauere debemus, ne ferulæ tangant, quod eminet, vel non imponentes, vel breuiores dantes.

D 13 *Panniculi verò fulcire debent, at non comprimere primò.*

Paulò suprà proximè à fasciis panniculorum mentionem fecit, non tamen expressit panniculos illis superiniiciendos esse, sed illud nobis consequutio ordinis indicauit: nunc autem ait / fulcire debent / id est firmare ac stabilire, cum eo vt ne premāt: id q; vbi primò vinculum iniicimus, ita, vt si homo sequentibus diebus rogetur, respondeat se nihil sentire, quod comprimat, cū liceat nobis per panniculos ferulas coarctare. Scripserunt quidam / primò / non in fine propositorum verborum, sed in principio sequentium, ita, vt habeant / primò inuoluere oportet ceratum, molle, leue, purum. / fatius autem fuit cerato molli, leui, puro, in sexto casu accipere, ita, vt oratio reddatur: Primò circa fractam partem cum ipso circumdare fasciam oportet.

14 *Ceratum, molle, leue, purum.*

Non enim fasciis ipsis aridis iniectis solam vitiatæ partis cutem cerato inungendam censet, sed subinde singulos etiam fasciarum ambitus. nam, si cute tantum illita fectas fascias dederis, eo præsidio affectas partes priuabis, quod per ceratum erant consequuturæ, cū lintea ceratum ipsum,

Septima Classis.

EEEEEEE in quod

Alib. 4. f. 5. t. 2.
c. 2. fol. 484 d

quod cutem madefaciat, absorbeant, & eam ob id siccam reddant. Patet autem quam ob causam Eceratum esse molle velit, cum eo in vicem perfusionis utatur, quæ perficere quidē hoc ipsum potest: sed tutius id ceratum præstat, præsertim ubi tunc assidere usque medicus non potest, nec minus frum nouit hominem laboriosum, qui ue sedulo det operam ægrotanti. Iubet insuper, ut ceratū illinatur non solum molle, sed & purum, hoc est, cui nihil sit immixtū propolis, sordium, aut terreni vel arenosi. præter ceram. id autem protinus etiam leue erit, nisi propter eas, quæ vocantur ἐγχερίδες, latius pateat leue, quam purum. Leue autem λεῖν ab Hippocrate dicitur. quod uerbū non solum inuenitur sic scriptum, sed λίβη etiam, adiecta litera β ante η: tunc quæ non leue, sed liquidum significat. Sic autē magis scribendum putant, quicumque significatione uerbi /purū/ censent leue quoque contineri, liquidum uero dicunt ē regione aridi esse, quod non est tale.

DE AQUA CALIDA

- 15 *Quod ad Aquæ calorem pertinet, & copiam, calor uehementior non sit, quam ut infusa ferri possit à manu: Copiā, ubi relaxandum, extenuandum quæ est, esse conuenit maximam: ubi caro producenda est, aut molliendum, modicam.*

Exigit fracturæ curatio, ut de aqua non nihil etiam dicamus. Vbi cumque igitur fasciæ resoluuntur, confluxerunt medici omnes fracturas aqua calida perfundere, ut potē eius opem euidenter experti. Verum in duobus peccare solent, qui ea utuntur, in modo & qualitate. in hac quidem, quæ calidiorem infundant, vel frigidiorē, quam opus sit: in modo quæ longiori, vel breuiori tempore faciant huiusmodi medicinam. Temperamentū igitur in qualitate iudicem constituit manū ipsius curantis, qui manum suam aqua perfundēs, quam infusus fracturæ est, potest pro fractura temperationem iustam conicere. latē autem patet, quam dico temperatio: & ad communem hominum speciem, non ad offensum duntaxat refertur, ea enim interdū & ipsi iusta videbitur. Ergo, ubi primū fasciās solueris, hac perfusa poteris de homine quærere, nimis ne calida, an gelida sibi videatur: atque ita calidiorem vel frigidiorē perfundens pro ægrotante appositē temperabis. Temperatum ergo aquæ calorem iudicari primō nostra manu uoluit, quem quidem propriē admodum perfectissime quæ & omnium optimē iudicat sensus ægrotantis. Iam uero quādiu in perfusione aquæ calidæ perseverandum sit, ex eisdem colligitur animaduersionibus, quibus frictio, & quoduis præsidium calefaciēs, hac siquidem admota, non modō euocare possunt ad affectam partem, quod iuxta cōtinetur, sed etiam digerere. Quocirca aquæ calidæ, & ob corporis modum, & ob diuturniorem & breuiorem usum, contrarij esse effectus videntur. quoniam toto corpore inanī, digerit magis quam euocat: contra repleto, magis euocat quam digerit. tum paruo tempore admota implet amplius quam detrahat: sed si longior mora in perfusione sit, digerendo plus potest, quam implendo. Iure igitur dixit, ubi relaxandum tenuandum quæ est, maximam copiam requiri: modicam, ubi molliendum, & caro producenda. Extenuantur protinus, quæ ex inanīuntur: non tamen ita protinus relaxantur, quæ extenta sunt, sed alijs medijs interiectis. quæcunque enim multitudine distenduntur, cuiusmodi sunt omnia, quæ inflammatione tenentur, ubi exinanita sunt, relaxantur: quæ uero frigore spissante, ubi calefacta sunt: quæ siccitate distenduntur, ubi madefacta relaxantur. Rectē ergo ait aquā calidam laxare, ubi plurima corpori infunditur, cum hæc præstare valeat. Mirari uero te nolim, si diximus aquam calidam posse & superatē humorem detrahē, & solidum corpus madefacere, alibi enim utrumque esse uerum demonstrauimus. Hæc igitur aquæ calidæ vis est, quæ, ubi pauca sit, quid præstare possit, proferre simpliciter non licet. si quis enim iterum uel tertio infudisse, aut per spongiā fouisse, contentus sit, operam penitus luserit: sed, si modicē perfusione utatur, Hippocrate auctore carnem producet, molliet quæ, quibus eiusmodi præsidio opus fuerit. Quorum uero adiecerim /quibus opus fuerit/ cognosce. moderata aquæ calidæ perfusio graciliori corpore, ac repleto superanti humore, calefactam partē H implebit: sed, si corpus macrum sit, & minimē repletum, carnem simul producet, & molliet. creatur enim caro in illis partibus, in quibus alij & crescere debet, quum temperatam naturam inter frigus & calorem habent, & sanguis sincerus iusto modo ad illas confluit. utrumque efficit calidæ aquæ moderata perfusio. quandoquidem sanguinem cōcitāt ad sedem perfusam: & ibi prius existentem carnem temperat, si frigida prius erat, calefaciēdo, si calida, refrigerādo, quum calorem euocat ad exteriora, & utili humore madefacit, atque idcirco etiam refrigerat. quemadmodum balnea aquæ dulcis, hæc siquidem eos calefaciunt, qui ex itinere, in modico frigore emoriuntur: exustos uero non lædunt. videntur enim temperatæ aquæ solio delectari, & vindicari post balneum à siti. Id etiamnum ualet perfusio aquæ calidæ, quæ si moderatē adhibeatur, carne implet, & ob id particulam reddit molliorē. caro enim nuper coacta mollis est, ut potē, cum sanguis haud ita pridem concreuerit, quoniam casei modo, qui recens cogitur, generatur.

- 16 *In eo quod perfunditur, hac moderatione utendum, ut, cum intumescit, finiatur, priusquam residat. Primō enim attollitur, postea extenuatur.*

Modus


A Modus eius perfusionis, quæ carnem producere, & mollire debet, est, ut desistamus, antequam perfusus locus incipiat relidere, primò enim attollitur, hoc est in tumorem assurgit naturali maiorem, tum quia funditur sanguis, qui in ipso continetur, tum quia a superioribus partibus eo descendit: post hæc extenuatur, quia multum sanguinis discutitur, tam eius, qui a superiori parte concurrit, quam eius, qui ibi subsistebat.

17 *Contineantur autem molliter, equaliter, & alius excitata quæcunque extant in corpore, cuiusmodi calx est, & coxa, ita, ut neque curuentur, neque peruertantur.*

Orationem hanc alij legunt, quasi totam coniunctè contextam: alij in duas partes seiungunt, & vtramque seorsum explanant. Prior itaque pars ita circumscripta est, ut suum habere absolutum sensum per se possit. Ergo, siue contineri partes communiter intelligamus, ut sub continendi verbo comprehendantur etiam quæ suspenduntur, veluti brachium, siue ad solum crus referamus, optimum erit molliter contineri, & equaliter, & sublimiores. molliter quidè, ne laborans eo loci premitur, & ob prementium sensum inflammatione periclitetur, ne uel coactus statum mutare, fractum membrum peruertat, quod seruari immobile debuit, & ex toto conquiescere: quæ verò in equaliter continentur, dolent simul, & deprauantur, cum alia parte sine fulcro sint, alia vrgantur. non iniuria itaque censet equalem habitum esse deligendum. ad hæc, ubi alius excitentur, defenduntur a materiæ cursu, cui, quum opportuna sint, quæ in inferiorem partem inclinantur, inflammatione prehendantur. Constat igitur prioris partis orationis sensum vnum esse posse, rectè quæ ita explanatam esse. Alterius verò partis, liquidem per se legatur, mens hæc erit. Quæcunque in corpore extant, ut in calce & coxa, rectè contineantur, ut neque curuentur, neque peruertantur. Sed quia non adiectum est / rectè contineantur / idcirco non nulli eam præcisam existimant, coguntur quæ cum priori parte ipsam coniungere. Rursus, si coniunctè ambe legantur, oratio non amplius manet communis, sed solum ad continendum extantia pertinet. Qui in omnibus hæc accipiunt, communem orationem fieri dicunt, eo quod cum extantibus partibus, & reliqua intelligantur. quin, & Hippocratem ostendunt, non in hoc libro tantum, sed & in alijs multis, ex vnius vel alterius rei exemplo res vniuersas completi. quum id, quod proponitur, euidentia antecellat ea, quæ sunt eiusdem generis, sic, ut ex ipso intelligantur, quemadmodum nunc ex calce, & coxa. Etenim, cum omnes eiusmodi partes, quando affectæ sunt, molliter & equaliter iacere, & sublimiores haberi debeant, in extantibus qualis coxa est & calx, id maxime seruandum esse perspicuum est. Septimè autem diximus huiusmodi loquutiones præbere ansam alijs ad alia traducendi, sic, ut quod cuique visum fuerit, probabile credatur. quare de opinione, quæ vera videatur, non conuenit sententiam proferre. Hoc igitur meminisse nos oportet, illud etiam non ignorantes in discrepantibus expositionibus, ubi in sententia non peccetur, non diu esse insistendum, satius enim esse, transire ad id, quod ad artem maxime pertinet, atque in eo immorari, quod nunc facere præstat. Ergo, quum conueniat partes omnes molliter collocandas esse, tum equaliter & sublimes, potissimum quæ extant, qualis coxa est & calx, ad ea, quæ restant, veniamus, ubi inquit / ita, ut neque curuentur, neque peruertantur /. Rursus hoc loci iis, quæ ad artem pertinent, annumerari debet extantis partis collocandæ peritia. hæc, si iusto alius excitetur, membrum curuabitur: si humilior erit, peruertetur ac præsertim, cum is error accidit, ubi primò collocatur. Quæ verò præter medicinalem artem in oratione sunt, longam requirunt explanationem. In commentariis autem de fracturis, sicut perfectè tractatum est de alijs omnibus, quæ ibi præcipiuntur, ita etiam de calce continendo, ubi ait / danda potissimum opera est, ut imus calx optimè contineatur /. Sed consueverunt non nulli addere omnia ubique, totas quæ alibi positas orationes, quibus idem præceptum continetur, adscribere, quod neque biduo perpetuo fieri posset. quocirca scripta ita exponentium nemo legit breuiori spacio quam annuo.

D iam ergo quum in libros de articulis & de fracturis commentaria scripserimus, hic tantum monuisse necesse est. Si quis igitur eos libros legerit percurrrens celerrimè, quod nunc proponitur, ad vltiora pergat, doctus à nobis, qui periculum fecimus, perfectos fieri artifices lata plena quæ docendi ratione, non breui & compendiarie: quam alioqui vtilem esse non inficior, cum paucis contemplationem vniuersam complectatur.

18



Canalis cruri subiectus

Septima Classis.

Canalis verò crus non dimidiū, sed totum excipiat. Spectetur autem morbus, & cetera, quæ oriuntur incommoda manifesta.

Agithic, ut cum iis, qui commentaria de articulis & de fracturis legerint, id manifestum appellans, quod quibus vnus est populo intelligit. Non nulla siquidem ita conspicua sunt, ut vniuersis appareat, qualia sunt, quæ proximè præcedentibus verbis narrauit. omnes enim

EEEEEE iij intelligūt

Sec. 2. l. 77. 7.
241.

Sect. 2. t. 64. 7^a.
239. b
Sect. 2. t. 75. 7^a.
41. f

intelligunt fractum membrum molliter & equaliter esse collocandum, incommoda tamen, quæ ea naturalis affert, non vident, nisi qui ab ipso perceperint in opere de || fracturis, his verbis, quorum principium est, De canali, qui fracto cruri subiicitur, incertus sum quid dem consilij. causam verò, cur iure incertus sit, subiicit. Ac rursus alibi in || eodẽ opere, ubi incipit, Si quis ipsi femori canalẽ subiiciat. tum compluribus adiectis in extrema oratione adscribit, Canalis igitur, vel totum excipere crus debet, vel nullo modo adhiberi. Voluit autẽ propositis verbis canalıs vsum necessariũ non esse, si adhibeatur tamen, subiiciendũ esse toti cruri inguinibus tenus, non ad genu duntaxat pertinentẽ. Ex illis ergo manifestũ est, quod proponitur hoc loco, neq; ipsum per se ipsum patet. quoniã quantum spectat ad verba /non/ dixit /ñ/, quæ vox accipi potest, quali disiungat, sed eã ab ipso vsurpari ad negandũ scimus. censet enim canalem vniuerso cruri subiiciendum innocentẽ. Eodem modo etiã vsurpauit ipsam Homerus in eo carmine,

Sect. 2. t. 64. 7^a.
239. b

Tutari incolumem populum non perdere conor. ubi /non/ dixit /ñ/. quin & Thucydides etiã ita mutuatur. Vult autẽ spectandum esse morbum, cuius gratia canalıs admouetur, & alia omnia, quæ ledere possunt. Morbus quidẽ est fractura grauis ossium cruris, ad cuius curationẽ opus est crure penitus immobili. canalıs enim probatur à quibusdam, vt qui vtilissimẽ tũc subiiciatur, quũ æger è lectulo surgit, id autem accidit, ubi vel desidere cupit, vel cubilis duriciẽ non ferens, F ad alterum transfertur iam tunc stratus, quod in opere de || fracturis exposuit: ubi illud etiã ostendit, q; canalıs, si non sit longior, q; vt vltra genu pertineat, nõ prohibet crus, quũ mouetur: infestus q; est, & sepius comprimit. Imperat autem, vt morbum intuiũ, cuius gratia canali vtimur, & ea, quæ canalıs affert incommoda, ipsum modò accipiamus, modò repudiemus. namq; ubi molestia, quam canalıs exhibet, exuperet, vitandũ erit: contra, si vincat vtilitas, prestabit crus, non vsq; ad genu tantũ, sed totum canali excepisse.


19 Præter hæc porrectio, ab inferiori parte intentio, in diuersas partes ductio, cõpositio, alia q; secundum naturã sint.

In prioribus dictũ est porrectionem, quam *πάρεξις* dixit vocari, quũ languens se ipsum præbet medico curandum. quo tpe medicus primũ cognoscit affectum ipsum infestantem: deinde ad curationẽ ipsam accingitur. At quũ necesse omnino sit affectam partẽ aliquo modo contineri, iure videtur secundũ naturam esse continenda: nam, si præter naturã iaceret, non mediocriter lederetur. Postquã porrecta est, vel intendi solũ debet ab inferiori parte, ubi adeò tenera est, vt abundẽ sit, si à superiori parte teneatur: vel in diuersa diduci, ubi validior est. constat itaque, & hoc tpe satius esse ægro eum seruare habitum, qui secundum naturam sit. Quo facto proximum G est, vt componatur, ac tunc etiã conuenit eundem habitum tueri. Dehinc sequitur, vt cõtineatur, vel suspendatur, quæ duo non commemorauit nominatim, sed significauit, dum dixit /alia q;/.
A. li. 4. f. 5. t. 2
c. 4. 483. b

20 De natura, quod ad actiones pertinet, animaduertendum est, quid requirat opus, quod sit, quod ad hæc: attendenda quies, medium, consuetudo. In quiete quidem, atque ocio considerare rectum habitum oportet, puta brachij: in medio, porrectionem, atque contractionem, quemadmodum, ubi cubitus cum humero propè ad rectum angulum figuratur: consuetudo idcirco spectanda est, quia non alius habitus facilius fertur, cuiusmodi est in cruribus, ubi extenta habentur. Quæ enim hoc modo collocantur, immobilia diu facillimè perseuerant.

Præfatus in superioribus verbis /secundum naturam/ non immeritò hic exprimit, quæ nam sit hæc natura, quæ ue sint eius notæ. Scribit autem /de natura, quod ad actiones pertinet, animaduertendum est, quid requirat opus quod sit/ quasi ita dixerit, naturalis habitus in actionibus quidẽ actionis proposito indicatur, & vfu, cui destinatur /quod ad hæc/ id est ad ea, quæ nunc proposita sunt, scilicet ad porrigendum, extendendum, componendum, collocandum, quũ homo ad nullum opus læsa parte vti debeat. Alias animaduersiones in peruestigatione habitus naturalis deinceps adiungit his verbis, /attendenda quies, medium, consuetudo/. quietem intelligit, H quũ homo feriat ex toto in ocio est. vnde colligi rectum habitum testatur, sicut in brachio docuit, subiici cubitum volens, ei que radium insidere. Eo medio ait apparere habitum inter extremam porrectionem, & contractionem, quod scribit propè accedere ad rectum angulum cubiti cum humero, quem ipse *ἐγγώνιον* dixit, quo volunt habitum appellari, qui est ad rectum angulum, sic, vt cubiti os cum humero rectum angulum ostendat. Verũ additur /propè/ vetustis omnibus exemplis, quam scripturam agnoscunt, qui hunc librum explanarunt. bis autem peccatur in hac scriptura, si *ἐγγώνιον* accipiat pro habitu, qui acutum angulum habet. Quũ quod acutus angulus dicatur, qui recto minor est, nam, ubi recta linea super rectam ducta angulos efficit ab vtraque parte inter se æquales, vterque æqualium angulorum rectus est, sed qui recto minor est, appellatur acutus, sicut qui maior, obtusus, habet rectus angulus eam magnitudinem, cui nihil addi, nihil demi potest, sed acuti, & obtusi anguli numero sunt infiniti. in recto angulo, nulla penitus declinatio est, quandoquidem recta linea super rectam ducta tunc vtrinq; rectum angulum facit, quũ in neutram partem inclinatur, at ubi linea, quæ rectum angulum facit, vergat in alteram partem rectæ lineæ subiectæ, inclinationes maiores minores q; fiunt innumerabiles.
Non

A



Non licet ergo, vbi quis rectum angulum exprimi simpliciter velit, dicere, prope acutum. siquidem prius intelligitur rectus, postea acutus, quoniam (vt retuli) vnus est rectus, acuti vero innumerabiles. merito igitur dicit quis acutum quempiam angulum prope rectum accedere, sed, quum plurimi sint acuti anguli, intelligemus illum esse, prope rectum, qui pa-

rum abest, neque concursum rectarum linearum, a quibus producit, ita acutum habet. ex quam plurimis itidem angulis obtusis eos intelligemus prope rectum accedere, quibus rectarum linearum, a quibus fiunt, coniunctio modice obtusa est. aliquem vero angulum prope ad acutum accedere incomprehensibile est, cum acutus angulus non sit vnus. Non potest ergo ἐγγώνιον dici quod ad acutum angulum figuratur: tum quod nemo ex grecis appellat aut ἐγγώνιον per duplex γγ, aut ἐγγώνιον per ἐν syllabam, acuti anguli figuram, sed, quæ rectum angulum habet, ea ἐγγώνιον

B per ἐν diphthongum, & ἐγγώνιον per duplex γγ nuncupatur. An ἐγγώνιον necesse est accipere id, quod ad rectum angulum figuratur, quod accidit, vbi cubitus cum humero facit angulum rectum: exquirere autem, cur Hippocrates prope, adiungit: Dicemus igitur & nunc, quod sapientius dicere consueuimus, obscuræ orationis explanationem non certo sciri, sed, si quid probabile sit, cum eo vt quod propositum est verum sit, & auctoris sententiæ non repugnet, accipiendum esse. huc itaque incumbentes verbum /prope/ conabimur enodare. Statuamus ἐγγώνιον figuram, quum vna sit, neque minui posse, neque augeri: nobis autem non licere brachium ita collocare, vt ossa ad angulum rectum sine vlla inclinatione inter se committantur, sed satis esse, si non ita multum ab huiusmodi figura recedant, præsertim cum neque Hippocrati placeat is totius brachij habitus. demonstrabo enim naturalem habitum prope rectum angulum esse, sed paulum recedere ad obtusum, hoc est spectare ad porrectionem: demonstrationem vero ab ijs accipiam, quæ ipse scripsit, nam de quiete ait, & de consuetudine, indagare nos posse naturalem habitum, ex ambobus coniunctis conficitur consilium vnum compositum, perinde quasi quis ita dixerit: Collocandi rationes, quibus iacere singulæ partes solent, quum ociosæ sunt, in curationibus quoque eligi debent, nam in partibus commodè figurandis, id patet primò studendum esse, vt minimè

A. I. 4. 85. t. 2.
4. 483. h

C doleant. Verum, si huiusmodi quiescentium habitus a laborantibus non seruetur, sed alio modo iaceant sine dolore, haud diu mansuros esse manifestum est. Igitur, si respexeris ad homines ociosos, plerunque conperies brachia non penitus media, inter porrecta ex toto, & ex toto curuata, sed ad porrectionem magis accedentia, id quod etiam accidit in altera habituum oppositione. Cuncti enim homines, vbi defessi sunt, brachia aperientes, habitum eligunt medium inter primum prorsus, & supinum, vt qui omnium maximè dolore carcat, coguntur tamen paulum inclinare in primum. Volens igitur Hippocrates hæc exprimere, cum non esset, quod rem pluribus explicaret, adiecit verbum /prope/. Quod autem ea ratione, quam dixi, inter ceteras maximè collocari cubantem iuuat, præcipue intelligunt, qui sunt in eiusmodi artis operibus versati, hæc enim oratione audita veram esse rem comprehendunt. Itaque, vbi mens auctoris propter obscuritatem dubia est, expositorem tueri auctoris sententiam, & propolite rei veritatem oportet, sic enim, qui discunt, vtilitatem consequuntur. Hoc igitur consilium seruare in omni expositione conor. quod quidam expolitores, neque si operam darent, assequi possent, vt qui medicinalium operum sint expertes, & cauillatorum vestigijs insistant, hanc que ex eorum numero, qui λογιστὰς καὶ ἰατροὶ vocantur, id est verbotenus medici, quorum causa vulgo suspecti sunt qui recte vtuntur

D ratione. Hæc, & si rarò explicentur, teneri memoria debent. Accedamus nunc ad ea, quæ proximis verbis subiiciuntur, quemadmodum habitus inter primum & supinum omnium minimè dolori est, cui afflucti sunt ferè omnes plurimum tempus ætatis: ita etiam se res habet in cruribus extendendis, extenta enim crura iacere diu queunt immobilia. Mutandum vero necessarium non esse membrum in alterum habitum minus iocundum ostendimus in libro de musculis, vbi mutationis quoque causam adieccimus. quare id non amplius ostendendum est, sed in memoriam reuocandum, quemadmodum & illud etiam, quod citò ad eundem habitum reuertemur. sed necessarium non est causam referre, longiorem enim sermonem desiderat. satius itaque est sententia Hippocratis ad vnguem seruata aliud quid pro causa tradere, quod iuuenibus magis expediat, quod & a nobis disputatum est in libro de motu musculorum. Igitur in committura humeri cum cubito, habitus naturalis medius est inter vtrunq; extremum, nempe eius, vltra quod porrigere, & eius, vltra quod curuare, brachium non licet. Apparet autem, vbi ossa carne nudentur, duobus processibus terminatum cubiti cauum, quo recipitur humeri ambitus cardinem representans, quem duo tubercula medium complectuntur: tum in vltima porrectione posterior

cubiti

cubiti processus coniectus in sinum humeri posteriorem, non secus quam in extremo flexu E prior in priorem. quibuscunque verò sinus posterior natura magis sinuatur, præter extremam porrectionem cubitum adducunt ad anteriorem partem, sicut contra, qui eum recessum iusto minus cauum habent, perfectè brachium non extendunt. Vt non sunt autem continentes in omnibus structuræ articulorum, neque certi in omnibus extendendi fines, sic neque medium erit in omnibus idem. quare ubi medium habitum inter extremam porrectionem, & ultimum flexum naturalem, esse affirmamus, medium non ad vnguem accipimus, sed sic, ut latè pateat, quod medium Hippocrates appellat κοινόν. Verum, sicut nullo modo fieri potest, ut medijs ex toto habitus seruetur, ubi nec adijcere latum vnguem, nec demere queas, sic non expedit brachium longè ab hoc medio figurari. Id enim interest inter artificiosam coniecturam, & eam, quæ artis est expers, quod artificiosa exquisitam moderationem propè attingit, quæ artis est expers, plurimum non nunquam aberrat. Posset itaque Hippocrates iuxta hanc sententiam monuisse, ut seruetur habitus prope ἐγγώνιον, hoc vocabulo rectum angulum appellans, ut qui nos coniectura ductos, non longè recessuros esse ab exquisita moderatione existimet. Sed iam iam persequar, quod pollicitus sum me relaturum iunioribus, quod ad hunc locum maximè conferat. Habet consuetudo præcipuam in medicina vim, ita, ut à clarissimis medicis natura aduentitia nuncupetur. quam conitatur inter ea, quæ necessariò admodum spectantur, Hippocratem ubique numerasse in indicandi facultate tribuentem ei secundas, illa videlicet primas occupante, quæ à natura sumitur. collocandæ enim ratio, quæ ab hac indicatur, eatenus inferior est, quatenus exquisitè in omnibus eadem esse non potest, sed pro cuiusque consuetudine variatur. Conspecti ergo quosdam totum diem confidentes, qui artes exercent sedentarias, alios stantes, aut ambulantes: censui quæ non immeritò ijs magis extenta figuranda crura esse, qui bonam temporis partem habere sic collocata consueverunt, ex contrario minus extenta, quibus curvata diem vniuersum detinentur. experimento autem rem comprobans, comperi qualem speravi. Brachiorum verò eadem est ratio, iacere enim ad rectum angulum debent, sed propius ne accedere ad ipsum oporteat, an longius abesse, ex consuetudine intelligitur. Verum homines, quum quæ à ratione excogitata sunt, experimento dijudicant, tunc rei excogitæ certum indicium habent, ubi experimentum à ratione non dissentit. itaque præceptum hoc ab omnibus amicis comprobatum firmiter iam constitutum est ad hæc maximè pertinere. Arbitramur ergo Hippocratem voluisse habitum, qui ad rectum angulum ad vnguem est, pro consuetudine variari: mutationem verò exiguam esse, hoc est, prope rectum angulum accedere. G

21 In mutatione verò, postquam adhibita intentio est, hæc similiter se habeant, quod ad habitum pertinet & situm, musculi, venæ, nervi, ossa, benè admodum contineantur, & bene figurentur.

A.1.4.f.5.c.2.c.
4.483.h

Hæc superius etiam dicta sunt, si quis autem ex toto ipsa detraxerit, præceptis nihil dempserit. Accidit enim in huiusmodi libris, quibus multa summam continentur, ut auctor easdem res aliter atque aliter adscribat, ea de causa, ut consideret, quibus verbis, eas potissimum explicet: librarius verò postea, ubi repperit scripta non nulla in margine, non nulla in ipso spacio, in quo contineri scriptura solet, vniuersa in ipsum spaciū cōgerat, quo ordine maximè censet conuenire. Id igitur, quod propolitis verbis ostenditur, eius generis est. Complura diximus attendi tempora in eo, qui curatur, primum, ubi ad medicum accedit aliquo prorsus modo figuratam habens affectā partem: alterum deinde, quum se præbet medico, qui intuitus partem, & vitium eius cognoscat, & qua præparatione ad curationem opus sit. Sequitur deinceps tempus præparationis, & postmodum intentionis, tum ossa componendi, ubi fracta fuerint, & restituendi, ubi prolapsa, dein alligandi, postremum omnium est tempus suspendendi in brachio, continendi in crure, & in locis iuxta spinam, & caput. Εξω igitur, id est habitum hinc vocauit ὡς τὸ ἐξω, quod habeat eam rationem, qua partes continentur figuratæ eo tempore, quod ab iniecto vinculo proximum est: huic è regione opposuit situm eorum, quæ continentur, nempe triū crurum, capitis, & totius spinæ, sic, ut habitum accipere in alijs debeamus, ut puta in iugulo, brachio, latere, capite humeri, lato scapularum osse, malis, maxilla, & siquid aliud simile est. censet enim opus esse, ubi prædictæ partes affectæ mutantur, non nullas rectè iacere, puta quæcunque contineri possunt, non nullas rectè figuratas haberi, nempe, quæ contineri non possunt. Dixit autem, quæ continentur ἐνθετα, alia verò ἐκθετα. cætera in alijs ex dictis temporibus diuersa sunt. Commune est omnium vnum & idem naturalis scilicet partium status, ad quem spectare iubet illum, qui postremo tempore vinculum diu seruandum constituit. nam, si membrum alio modo figuretur, dum alligabitur, postremo tempore etiam mutabitur musculorum, venarum, & nervorum positio, ac neque ἐνθετα erunt, neque ἐκθετα, hoc est neque rectè continebuntur, neque rectè suspendentur.

Intendere

- 22 A Intendere autem illa valentissime oportet, quæ maximæ sunt & crassissimæ, & vbi vtrumque os comminutum est: minus vbi id, quod subiectum est: minime, vbi id, quod superius.

Intendere (inquit) valentissime oportet, quæ maximis & crassissimis ossibus continentur, & corpora, quæ ipsa cingunt, hoc est musculos. hi enim sunt, qui potillimum intentione indigēt, vt quibus maxime vis insit ad sua initia recurrendi. ex harum partium numero est semur, deinde humerus & crus, post hæc brachium, postremo, quæ iuxta manum sunt & pedem. excipe hic quæ in spina sita sunt. Sed quod ait /vbi vtrumq; os fractum est, magis extendere oportet. intellige cubitum & radiū: qđ verò subiicit /minimè/id est leuissimè, ac maxime moderate: /vbi id, quod superius/ accipe in brachio radiū. quæ omnia (vt retuli) discussa sunt in opere de fracturis.

- 23 Quòd si iusto valentior intentio adhibeatur, noxia erit, præterquā in pueris: partes aut paulo altius excitentur.

Si ossa in pueris, vel vbi franguntur, vel vbi suis sedibus excidunt, minus quàm expedit, extendantur, tantum rem procedere non sinent. nam nec componentur quæ fracta sunt, nec quæ prolapsa sunt, restituentur: sed si valentius extendantur, proprium affertur detrimentum. quo quidem tempore vis adhibetur, dolor excitatur, postea inflammatio superuenit, febris, neruorum distentio, & interdum etiā resolutio. quod testatur se vidisse Erasistratus in humeri capite nimium extento. Minus tamen alijs pueri leduntur, si vehementius extendantur, propter humorem corporum & molliciem. nam, vt lora plurimum citra noxam distenduntur, quum mollia sunt & madida, abrumpuntur verò, cum arida sunt & dura: ita musculi, atque nerui, quum madent, & molles sunt, ducentem facile subsequuntur, neque multum dolent, neque rumpuntur: sicci verò & duri, quum, nisi magna vi cogantur, extendi nequeant, grauiori dolore vrgentur, non solum si iusto magis, sed etiam si modicè intenduntur. in eo enim casu neruorum ac musculorum fibræ conuelluntur, rumpuntur q̄, quorum nihil manet pueros, neque enim postea inflammatione, atque idcirco febre, delirio, neruorum distentione, ac resolutione, prehendantur. Ipse igitur de pueris verba fecit, quæ transferenda nobis sunt ad eunuchos, foeminas, tum ad eos, qui natura siue consuetudine madent, & molli carne sunt, cum istiusmodi corporum temperamenta ducenti facile pareant, neq; sentire offensam vllam grauiorem soleant, si vltra debitum extendantur: at quibus vel natura, vel consuetudine corpus induruit, vix cedunt extendentibus, atque ea de causa minus ipse censuit à medicis esse extendendos, valde liquidem leduntur, vbi immodica vis adhibeatur. Quod verò ait /partes autem paulo altius excitentur/ item duplici de causa proponitur, & vt fidelius contineantur, dilabuntur enim, quæ contraria sunt: & ne doleant.

- 24 Bene repositi articuli exemplum sit ille, qui cognominis, qui par, qui similis, qui sanus est.

Cognominem Hippocrates dixit *ὁμώνυμον*, satius autem fuit dixisse *συνώνυμος*, alia enim sunt *ὁμώνυμα*, quàm quæ hic tractantur. homini quidem homo, & equus equo, tum canis terrestris terrestri, marinus marino, *συνώνυμος* est. quæcunq; autem nomina in multis singularibus speciem vnā significant *συνώνυμος* in ipsis dicuntur: contra ea, quibus differentes species appellantur, vocare solemus *ὁμώνυμος* dicta, & quæ sub ipsis sunt, atque exprimuntur, *ὁμώνυμα* habentur. qui dicitur igitur brachium brachio comparatum *ὁμώνυμον*, quando speciem eandē habet. Sed non expedit in verborū controuersia immorari. Quæ sequuntur magnum in medicina momētum habent, quibus iubemur, cum prolapsum articulum in suam sedē restituiamus, vt exemplo cognominis, paris, similis, sani. cognominis quidem, vbi humerus cum humero cōfertur, cum brachio brachium, femur cum femore, crus cum crure: paris in eodem homine, & non in alio, quam rem in opere de articulis declarauit his verbis /spectare/ quæ in articulis, non quidem alterius hominis: pari autem adiecit similem, potest enim, cum quo confertur, par esse, vt sanè similis non sit, cum sæpe alter humerus vitio quopiam tabuerit, aut abscessu egrotauerit, vel crus valgum sit, aut varum: atq; idcirco sanum rursus adscripsit, ne quid nos perperam accipiamus, nō grauatus verbum, quantum est in vi, idem penitus iterare, nam, quod par est, vtiq; sanum est, si simile sit, nisi vbi vtrumque membrum eodem modo sit affectum, tunc autem in alijs hominibus spectandum erit, in quo casu conuenit simili sanum adscribere, sed, si in eodē homine consideretur, abundè erit dixisse sanum, quod simili comprehenditur. fortasse autem Hippocrates vtrumque scripsit, vt in alijs scriptum inuenitur, animo accipiendi non vtrumque, sed alterum tantum, librarius verò vtrumque adscripsit.

- 25 Fricitio ad resoluendum valet, & adstringendum, præter hæc ad implendum, ac minuendum. Nam, si dura sit, adstringitur corpus: si mollis, resoluitur: si multa, minuitur: si modica, impletur.

Adstringere intelligit durare: resolvere, laxare, & mollire: minuere, extenuare. sub dura enim frictione carnē pertractatam verisimile est reddendam esse frictioni similē, dum adstringitur premitur q̄: sic & sub molli carnē similem afficiendam, eo qđ contraria præstet, atq; dura: multa in super,

Sect. 1. l. 3. 4. 7.
257. E

per, cum demere plurimum possit, extenuari corpus probabile est: sed non similiter plerumque refici. Ea quæ multæ contraria est, pauca videlicet, verum modica, quod superius dixit de usu aquæ calidæ. paucissima enim frictio, non secus, ac exigua aquæ perfusio, nihil efficit, quod sensu percipiatur. Perfricare igitur oportet, ubi implendum est, quoad indicia conspiciantur, quæ tradita de perfundendi moderatione fuerunt, quum ait /dum intumescit priusquam residat finiatur: primo enim attollitur, postea extenuatur/. demonstrauimus autem in secundo de tuenda sanitate ex ijs, quæ frictio præstat, nihil ab Hippocrate prætermisum. Illud verò, quod multos latet, ignorare non oportet, quauis ἀνὰ sursum significet, τριψίς frictionem, ἀνὰ τριψίον vocari à grecis non modò eam frictionem, quæ ab inferiori parte sursum procedit, sed quamlibet, quouis modo intendat: raro quæ legi apud ipsos vocabulum τριψίως, consueverunt enim appellare ἀνὰ τριψίον, quam nunc dicimus τριψίον.

- 26 Sed, quod ad vinciendum attinet primum vinculus premi se maxime dicat, quia vitium est, extremis uero partibus minimè: fulcri item fascias, & non vngere se, id quæ non vi, sed numero, eo ipso die, quo deligatus est, ac nocte paulo magis, posteriori minus, tertio autem laxari. Reperitur postmodum in extremitatibus tumor mollis, tertio die cum resoluitur, quod vinculo exceptum fuit, extenuatum. Id quæ seruandum est quotiescunque alligatur, cum quæ iterum vincitur, intelligendum est conuenienter ne iniectum vinculum fuerit. In posterum enim expedit plura atque arctiora lintea dare, ab hinc tertio die plura adhuc atque arctiora, deinde septimo die à primo resolutio vinculo ossa gracilia in conspectum veniant, & facile tractentur. At, ubi ferulis alligatis locus gracilis sine prurigine, atque exulceratione fuerit, super sedendum est usque ad vigesimum diem ab ictu: si quid suspectum sit, soluere interim ferulas conuenit, & tertio quoque die coarctare. Eodem autem modo figuratæ habendæ partes sunt, dum suspenduntur, dum continentur, atque dum alligantur.

Fulcimenta constat à grecis appellari, non solum ἐμμάσματα, sed ἐρείσματα, vel ex eo, quod Poeta ait in eo carmine, ὑπὸ δ' ἥριον ἐμμάτα νηῶν. ad cuius similitudinem fulcire dictum est ab Hippocrate ἥριμόσ, quod quasi inlidere significat, & inherescere. Id autem fieri iubet linteorum numero magis quam pressu, caueri enim per se voluit linteorum pressum. Sed hæc & alia multa, quæ & præpositis & sequentibus verbis continentur, abundè explanata sunt in opere de fracturis, & de articulis. quare, si quid obscurum est, non est, quod exponamus, transferamus quæ huc quæcunque ibi perfectè prodita sunt, atque ideo quasi rem apertam prætermittendum existimo. ille enim qui non modò magis appositè, quam ego, sed, qui omnium optime potuit dicendo sensa mentis aperire turpe duxit,

Quod clarè expressum est iteratis dicere verbis.

His igitur relictis, ut potè, quæ plana sunt ijs, qui commentaria de fracturis & de articulis legerint, ad ea, quæ restant, progrediar.

- 27 Capita figurandi ex consuetudine & natura vniuscuiusque membri colliguntur: Species verò, ex cursu, statu, cubandiratione, ex actione, & ocio.

Apertè quoque ex his verbis intelligitur librum hunc, qui summatim rē complectitur, post obitum auctoris editum fuisse. nam, qui huiusmodi libros excubunt, si qua sint, quæ duobus modis, vel in margine etiam, appolita sint ab auctore, ut postea cōsideret utro exprimere mētem suam præfret, soliti sunt omnia describere in ipso opere. quis enim adduci posset, ut crederet eum voluisse hic eadem iterare nulla ratione cogente, præsertim cum summopere studeat breuitati? Sed cum maiores nostri hæc duxerint explananda, nos quoque illos sequemur. Patet igitur capita collocandi dicta esse quali proposita, ad quæ intendentes idoneum cuiusque partis habitum inueniemus. quin & consuetudinem vniū esse ex ijs propositis supra memoriæ prodidit, cum inquit, Præter hæc porrectio, intentio, in diuersas partes extensio, compositio, alia quæ secundum naturam sint. De natura, quod ad actiones pertinet, animaduertendum est, quid requirat opus, quod fit: ad hæc, attendenda quies, mediū, consuetudo. in quiete quidē atque ocio considerandus rectus habitus, puta brachij: in medio porrectio, & contractio, quæadmodum, ubi cubitus cum humero propè ad rectum angulum figuratur: consuetudo idcirco spectanda est, quia non alius habitus facilius fertur, cuiusmodi est in cruribus, ubi extenta figurantur, nam, quæ collocantur hoc modo, diu facillimè possunt immobilia perseverare. hæc cum paulo antea scripserit, qui deterius iterum hic repetet? Proposita igitur consuetudine & natura vniuscuiusque membri, deinceps species hoc est differentias ipsorum colligendas esse ex actionibus arbitrat. Non nulli verbo /species/ adiecerunt /mēbrorum/ ita, ut oratio sic habeat /species membrorum/. de cruribus autem gratia exempli dixit /ex cursu, incessu, statu/ cui addidit cubandi rationem / quod idem est, ac verbum superius scriptum, videlicet /quies/. his rursus subiecit /ex actione & ocio/ actionem accipiēs pro incessu, cursu, statu, singularibus actionibus, ocium verò pro quiete. Quare nihil amplius his verbis exequitur, quam actionem & quietem. Neque propterea, quod in principio huius orationis naturam membrorum nominauerit, existimari velim alterum nunc collocandi modum indicasse, cum nullum aliud naturæ tradiderit indicium præter actiones, quod totum sic habet, quemadmodum in verbis paulo supra scriptis docuit.

A docuit, quocunque autem tempore curationis eorum affectuum, qui manus auxilium desiderant, vnus seruandus est partis habitus, qui secundum naturam est, quem inueniri ait ex quiete atque ocio, id est vbi quis conquiescit: tum ex medio, quod scilicet est inter extrema: atq; ex consuetudine, sub qua actio & quies manifestè comprehenditur. Hæc itaq; duo maximè communia indicia, medium scilicet inter extrema, & consuetudo vniuscuiusque partis, naturalem habitum nobis exponent. ego autem in libro de motu musculorum hæc persequutus & partium compagine indicans, quam ex ratione corporum incidendorum inueni, naturalem partium habitum iuxta Hippocratem in libro || de fracturis docui. Videri autem possunt diuersa de propositis rebus dici, cum aliàs alia verba & nomina vsurpentur, veluti cum quis dixerit collocanda esse membra, quemadmodum minimè ledunt, non alium habitum inueniet, quàm eum, in quo detineri solent quiescentes, qui medius quoque est inter extrema: sed & indicatione sumpta à partium compagine hic idem inuenitur.

Sec. I. l. 16. 7.
226. g

28 Quoniam labor firmat, ignauia resoluit.

Hoc etiam perangustè traditum fuit ab auctore, quod fortasse constituerat dilatare in eo libro, quem erat editurus. Legitur autem in quibusdam exemplis /quid labor firmat, ignauia resoluit:/ proponente sibi ipso auctore rem exquirere vtilissimam non modò ad medicinæ partem, quæ manu, sed & ad eam, quæ victus ratione medetur. omne igitur corpus, vbi in ocio degit, effeminatur, & imbecillum redditur: firmatur autem & vires colligit, vbi quid faciat, hoc est aliquem vsum præstet. cuius orationis duo fidem faciunt, experientia omnium, qui animaduertunt euidenter apparentia: & indicatio, quæ à naturali compagine sumitur, quam in libro de tuenda sanitate explicauimus. Quod verò ad chirurgiam attinet, non debent diu affectæ partes haberi immobiles, sicut non nulli securitatis gratia faciunt: sed inflammatione sublata modicè dimoueri, quod primò tantum faciendum est, quàm affectæ sedi calida aqua infunditur, deinceps in balneis, postea etiam sine his.

29 Adstringendum est numero potius, quàm pressu.

Item hoc ipsum ab auctore summatim per se scriptum à librario sanè huc translatum fuit. supra enim clarè perfecte q; explicatum est, nunc præcise adscribitur. Supplere autem oportet /lin-teorum/ vt vniuersa oratio sic habeat /adstringendum est numero potius linteorum, q; pressu/.

C
30 Vbiunque sanguinis suffusio est, seu contusum, siue abruptio, siue tumor, si inflammatio non est, sanguinis plurimum à vitio sursum expellatur, paulum verò deorsum. Sed nec brachium, nec crus dependeat. Fascia autem ab affecto loco incipiat, ibi q; validissimè insidat, extremis verò partibus minimè, medys modicè: extrema item sursum adducta vinciantur: numero q; potius quàm compressu fasciæ adstringant. Huc autem maximè accommodantur tenues, leues, molles, munda, lata, valentes, vt quæ sine ferulis adhibeantur. Perfusionem insuper copiosa vtendum.

Hippocrates iuxta Ionum linguâ (vt solitus est) contusum appellauit φλάσμα per φ, id quod à nobis per θ θλάσμα dicitur. accidit autem hoc vitij, vbi graue aliquid decidit in corpus, quod quasi carnem abrumpendo, atterendi vim habet. Verum vbi contusa caro ad regionem, quæ sub cute est, sanguinem transmittit, hæc sanguinis suffusio dicitur ἐκχύμα, sub qua cutis inuiolata seruat. scindi autem tenues venas cum carne, vbi id exoritur, manifestum est. Incidit autem abruptio (quod ἀάσμα dixit) quàm musculorum fibræ plurimum extēduntur, ita, vt non nullæ abrumpantur, cuiusmodi mala recentiores medici ῥήματα propriè appellāt. Huic subiecit Hippocrates tumorem, quem dixit οἰδημα, quo vocabulo solet omnes præter naturam tumores notare: iuniores dispartiuntur hos in inflammationes, quas φλεγμονὰς vocant, & in duros tumores, atq; in molles, & pituitosos, quos propriè vocant οἰδήματα, sed φλεγμονὰς solet ipse appellare φλογώσεις, vnde nomen inditum est calidis tumoribus. accedit ad priores tumores is, qui erysipelas dicitur, quod perpetuò quidē inflammatum est, non tamen perpetuò tumet. Hi ergo morbi omnes nominatim positi ab Hippocrate, quod ad rationem victus ac medicamenta pertinet aliam curationem exigunt: quod verò ad manum, vinciri conuenienter debent, præsertim, vbi oriuntur ex præcedentibus vinculis, de quibus nunc pertractat. Illud verò /à vitio sursum expellatur/ dixit ἐξαρῖται, quod quasi exprimatur significat. nō nulli aperte scribunt ἐξάρεται, hoc est expellatur, vt nulla apud grecos explanatione sit opus. Ceterum deligari hæc in libro de fracturis voluit, fasciā orsa à loco tumido: nunc verò à vitio partis, quod τραματος nomine exposuit, sed vinculum, quod ad fracturas pertinet, hic eatenus variat, quatenus fascias plurimum ferri docet ad superiora, parum verò ad inferiora. Illud item /sed nec brachium, nec crus dependeat/ commune quoq; est eius vinculi, quod ad fracturas accommodatur, sed id adscripsit, vt potè, quod magnum in propositis momentum haberet, ne (vt consueuimus) negligentius agentes sumimopere ledamus: quàm, quæ ingentem noxam aut opem afferunt, prout quis rectè vel

non

non rectè vtitur, Hippocrates commemorare frequentius non grauetur: contra, quæ parum pro E
desse nouit, aut obesse, contentus sit semel tractare. Ergo in fracturis, cum primum alligantur, an
tequam vel inflammatio, vel aliud ex dictis nunc vitij accesserit, cautio est similiter, atq; in his, ne
quid ad affectam sedem concurrat: at nō eque in illis danda opera est, vt quæ affectam partem oc-
cupant, digerantur. quocirca perfusionem hīc adiungit, non quo illic quoq; non adhibeatur, sed
quo hīc magis. perfundēda enim copiosius hęc sunt aqua calida, vt quod in tumidis partibus col-
lectum est, discutiatur. Quamobrem ipse, cum loquutus est de calce, qui à saltu ex superiori loco
sanguine suffunditur, præter cetera auxilia ad id hoc quoq; posuit, aqua calida copiose perfunden-
dum, vinctum q; locum sine compressione fideliter continendum. Igitur hęc quoq; ad fracturas
docuit, licet plus habeant ponderis in malis, quæ nunc cōmemorantur, nempe ea de causa, vt citra
oēm pressum digeratur: ac propterea sine ferulis quoq; deuincit, ita, vt iunctura hæc duplici mo-
do differat ab ea, quam fracturæ postulant, tum q; fascias requirat minus arctatas, et potissimum le-
ues, tenues, molles, mundas, his enim maximè indigent, quæcunq; adstringi leuius oportet: tum
q; digestionem opus sit vehemētiore. Adiungit præterea vnumquodq; ex propositis vitij inflam-
matione vacare debere, si qua docuit ratione, curādum sit. siquidem inflammationes ne modicum
quidem pressum ferunt, cōtra eas igitur nitimur per cataplasmata, per assiduam calidæ aquæ per- F
fusionem, per q; liquida medicamenta, quæ succurrere scilicet inflammationibus possint.

- 31 *Vbi articuli suis sedibus excidunt, aut his intactis, quæ ipsos continent, resoluuntur: aut ossa, quæ citra commissu-
ram se contingunt, diducuntur: vel quæ iuncta erant, abrupto eo, quo continebantur, inter se dehiscunt: seu iuxta
articulos comminuuntur: aut peruertuntur, cuiusmodi sunt, quæ vara sunt, in alteram partem inclinantia: ab ea par-
te, à qua mota sunt, lenius vinciri debent, arctius ab ea, in quam, vt quum deligata sunt, in contrariam spectent,
ac priusquam deligarentur, id q; paulo plus æquo: quod & fascijs agendum est, & pannis, tum suspendendi, collocan-
di, intendendi q; ratione, præterea conuertendo, dirigendo, plurimum quæ perfundendo.*

Mala hæc vniuersa latè persequutus est in opere de articulis, & de fracturis, quæ nunc sicut
alia multa in compendium contulit: quod breuitatis causa per se obscurum est, at ijs, qui ea
volumina legerint planum. nos, quum ipsa antea explanauerimus, vt memoria redintegretur,
pauca in medium afferemus: si quis autem ab officina medici initium acceperit, huic præceptore
opus est, qui res enodet, & quæcunque ab Hippocrate in opere de fracturis & de articulis scri-
pta sunt, in commentarium translata huc proferat. Dixit igitur Hippocrates propositis verbis
ἐν πλώματα in articulis, qui suis sedibus excidunt: ἐν πλώματα, vbi intacto articulo, quæ iuxta ip- G
sum neruosa sunt, resoluuntur, quod præsertim accidit, quum ambulando vestigium fallit: ὁ-
σμήματα, cum ossa, quæ citra commissuram naturaliter se contingunt, præ affectu quopiam di-
ducuntur, in opere etiam de articulis & de fracturis || nominatim mentionem facit de ossibus,
quæ inter se diducuntur, vt de cubito & radio in commissura brachij cum humero, & in manu
de ijs, quibus illa continentur, & in crure similiter de ijs, quæ iuxta genu sunt pedemque in vi-
cinia calcis: ἀποσπασματα dixit, quum abruptis ijs, quæ ossa inter se connectunt, ipsa, quæ prius
iungebantur, plurimum inter se dehiscunt, quemadmodum ipse de extremitate lati scapularum
ossis ostendit: sed ἀποκλάσματα dicit, quæ iuxta articulos comminuuntur, vocantur à iunio-
ribus ἀπάρματα, de quibus in fine libri de fracturis meminit inter cubiti noxas, vbi ἀπαγμα
scripsit, eo ducuntur, qui post ipsum hoc vocabulo nuncuparunt quæcunque transuersam to-
tius ossis fracturam in vicinia articuli, in qua videlicet fracti ossis partes inter se plurimum rece-
dunt, ossa, quæ sic franguntur, recentiores dicunt frangi καυλίδον, quum caulis modo abrum-
pantur: ὁσμήματα vocauit, quæ peruertuntur, ab ijs autem quæ ἐν πλώματα dixit, differunt
ὁσμήματα, quatenus hæc aliquo modo perueniunt ad articulum leuiter ipsum deprauantia, H
suaque sede commouētia, id quod euenit præcipue vni ossi tibie in pueris, in quo casu vincimus, H
vtrinque ad dirigendum obijcientes lignum ex tibia, vel ex tali aliqua materia firmum molle q; te-
nuem inde regulam parantes. Rectè autem addidit, vbi commemorat ea, quæ peruertuntur / in
alteram partem inclinantia / etiam, si legamus vt non nullis placet / cuiusmodi sunt, quæ valga
sunt, hæc in alteram partem inclinantia / vtriue scripturæ optimè conuenit adijcere / in alteram
partem inclinantia / siquidem totus articulus sæpe in interiorem partem vel exteriorem conuer-
titur, idque cruri accidit frequenter prope genu & prope talos. Vocantur autem, quæ in exte-
riorem partem vergunt ἐλίσσῃ, id est valga: quæ in interiorem ῥέβῃ, & κυλλῃ, id est vara. His
omnibus vinculum prodest, quod duo spectat, vt ab ea sede, in quam prolapsa pars est, fasciæ ad-
ducatur, vrgant q; locus verò, vnde ea recessit, laxior sit, vt admittat, quod sub vinculo ad ipsum
compellitur, hoc est, vt fasciæ ibi laxæ sint, non arctatæ. Supplere autem oportet / venerunt / vbi
inquit / ab ea, in quam / sic, vt totus sermo sit / ab ea parte, à qua mota sunt, lenius vinciri debent /
hoc est fasciæ laxiores esse arctius ab ea, in quam venerunt, vt spectent in contrariam partem, at-
que venerunt. terminum autem conuertendi in contrariam partem non præscripsit naturalem
statum, tunc enim morbo vinculum cederet, quum deprauationi diu pars assueuerit: sed pau-
lo ultra

Alo vltra naturalem statum partem adducendam censet, atque hoc est, quod ait /id' que paulo plus aequo/ nam, quod naturale est, aequum est. Caterum præcipit, vt ad contraria conuertamus per omnia, quæ ad vincendum admoventur. quæ ipse nominatim cum fascijs recensuit, quum inquit /& pannis, tum suspendendi, collocandi, intendendi que ratione, præterea conuertendo, dirigendo/ quum possit vinculum per hæc omnia plus iusto ad contraria inclinari. Scribit item /plurimum perfundendo/ addens /plurimum/ quod in proximè præcedētibus verbis omisit, intelligi tamen potuit ex ijs, quæ proposita erant. ibi itaque digerendi, hic verò molliendi causa, copiose aquam infundit.

32 *In his, quæ extenuata sunt, plurimum integre partis comprehendatur, vt ex transfusione, quæ exhausta sunt, magis, quam suapte natura emacrescerent, diuerso vinculo ad incrementum spectent, & carne impleantur.*

Percurrerunt locum hunc expolitores huius libri, non secus atque alia multa, circuitione que vti pauca quædam attulerunt: qui verò enodare apertè ipsum contendunt, veritatem non attingunt, ita, vt mirum sit, qui potuerint extenuatis, hoc est gracilibus partibus, & quæ ali desierunt naturalem habitum restituere. Equidem cenfeo quæcunque, vel ad verborum significationes attingunt, vel ad quæstiones captiosas, vt perperam accipiantur, nihil ad artis opera discentibus obesse: quæ verò contraria idoneæ curationi traduntur, necessariò ijs officere, qui medendi artē exercent. Ante omnia igitur docebo qua via curauerim, quæ summa macie cōlecta essent, vt qui addiscunt, iam eius ope fruuntur: deinceps accommodare veritati proposita verba enitar. vbi enim latebra est obscuritatis, conabor rei veritatem tueri, ei que, si vlla ratione fieri poterit, verba Hippocratis consentanea demonstrare: quod si interim non dabitur, iuuenis certè rē ipsam, vt sese habet, comprehendat. Ergo macies partium plerunque, vel ex diuturna quiete, vel ex eo vinculo, quod ad fracturas pertinet, proficitur, quum ob illam robur quiescentium partium emoriatur: ob hoc regio, quæ vincula est, sanguine sursum partim, partim deorsum expulso, alimento priuetur. Quocirca contrario modo, atque contractum fuerit, mederi vitio debemus, nempe affectæ parti vim restituentes, efficientes que, vt eo sanguis affatim concitetur. Vires quidem restituit moderata infriçtio, perfusio, motus: debet autem esse idonea moderatio in vtroque genere, in qualitate scilicet & modo. sanguinis verò plurimum euocabunt, proposita nuncratio alligandi, aquæ calidæ perfusio modica, motus, & frictio, quæ & vires etiam cōfirmant. Omnia autem modo & qualitate moderata esse conuenit, cum non satis sit frictionem, motum, calidæ aquæ perfusionem, nec multa esse, nec omnino pauca: sed oporteat frictionem quoque mediam esse, tam inter duram & mollem, quam inter multam & paucam: similiter aquam ita temperari, vt media sit inter eam, quæ non dum calefacit (*χλιαρόν* id est tepidam vocant), & quæ iam dolori est, calore mordens (*ζερόν* id est feruentem dicunt): in modo item, mediam inter multā & paucam. verum de modo supra tractauit, cum dixit /dum intumescit pruisquam relidat, finiatur/. hoc autem tempore, si pars cum se ipsa conferatur, rubens maximè apparet. Quæcunque ergo gracilitate, macieque tentantur, planè magis exanguia conspiciuntur, quam quæ benè valent, vix quæ & quum pertractantur, & quum aqua calida perfunduntur, rubescunt. hoc autem nobis propositum sit, quod ad modum pertinet, vt membrum rubore offundatur, quo tempore tumidiùs quoque exhibetur, sed, nisi cesset qui fricat, vel perfundit, tumor desinit, & rubor finitur. Maciem verò vel medicinam non admittere, vel sanabilem esse, indicio erunt tumor ruborque, prompte vel magno negotio excitati. quibus hi quidem egrè contingunt succurrere soleo perfricando corpus aliquo ex calefacientibus medicamentis, atque ex ijs præcipuè, quæ modicum accipiunt thaplie non vetustæ: sed & huiusmodi gracilitates inungo aliqua mixtura, quæ picem habeat, qualia sunt medicamenta, quæ *πιττωτά*, vel *διρωπακισά*, græcè à quibusdam dicuntur. quæ, si *πίττωτά* & *διρωπακισά* nominari audies, eque intelliges, licebit que tibi appellare, vt velis. instituimus autem in his commentarijs iuniores atticismum non docere, sed persequi medicinalis artis effectus utilissimos, atque eos præcipuè, qui ex confectiōibus picem habentibus ad proposita pertinent. Igitur, si primus vsus partem reddat tumidam & rubram, iam cessandum est: sin minus, iterū & tertio inungendum, in alijs quotidie, in alijs tertio aut quarto quoque die, prout affectæ parti maximè opus esse iudicabis. Illud verò, quod pars, quæ fricatur, aut pice illinitur, incalcescit, inter ea, quæ spectantur interdum non enumero, quoniam sub rubore comprehenditur, cum eodem tempore caleat, rubeatque. Ego hac ratione gracilitati præter naturam sepè occurri, raro que vsus sum vinculi opera, & si quando vsus sum, eo modo alligauī, quo docet Hippocrates in specus verbis ipsius /diuerso vinculo/. quod enim inquit /diuerso/ illi vinculo opponitur, quod pertinet ad fracturas, quodque affectam sedem vehementius virget. Diuersum itaque vinculum primo protinus fasciarum ambitu discrepat ab eo, quod posuit ad fracturas. non enim ordimur à parte cui medemur, quemadmodum facere in vlcibus, fracturis, sanguinis effusione, ceteris que omnibus paulo antè propositis consueuimus: præter hæc affectum locum non magis adstringimus, sed remittimus, maxi-

mē autem comprimimus partem integram, unde incipimus. inde enim præcipit, ut fascia usque **E**
 ad affectum locum laxetur, atque ubi eò ventum est, laxissima inuoluatur. hic siquidem hyeme
 obuoluendus est, ne calefiat, laxus videlicet nec minimum quid adstrictus: sed æstate debet inte-
 gra sedes vinciri, ut, qui in ea subest sanguis, ad locum, qui refectione indiget, depellatur, partem
 verò quæ curatur, sub vinculo calefacere & digerere alienum est. Vbi autem crus totum, aut to-
 tum brachium valde emacruit, alterum par membrum deligare conuenit, initio ab imis parti-
 bus accepto, dein fascia ducta in crure inguine tenus, in brachio ad alam usque & humeri ca-
 put. quandoquidem eodem modo venæ, quæ cruribus alimentum subministrant, ab inferiori
 parte iuxta os sacrum deriuantur à vena cava: atque illæ, quæ brachijs, à superiori iuxta iugu-
 lum. sanguis itaq; qui ad vnum fertur ex paribus membris, ubi iter clausum est, ad alterum de-
 ducitur. Adstringi autem sanum membrum hætenus debet, ut ob compressionem minimè in-
 dolescat: sed, quod vitiatum est, vel nudum relinquendum, vel pauca lana usque ad inguen ob-
 tegendum, ubi coelum frigidum sit: sed, ubi non sit tale, expedit nudum esse, & subinde linteis
 perfricari, tum calidis medicamentis foueri, si locus ægrè incaleseat. nāque, ubi promptè, oleum
 cui parum ceræ adiectum sit, per se idoneum est, siquidem diutius manet & minus resoluit. Ea-
 dem omnino ratio est in brachijs, in quibus vinciendum id est, quod bene valet, perinde quasi **F**
 crus: præstanter quæ calefaciendum, quod ægrum est, & frictione & motu: hominem verò, ubi
 prorsus stupidus non fuerit, rogare præstat, num in ea parte, quæ curatur, aliquid eius caloris,
 qui excitatus fuerit, sentiat superesse: an aperte desisse sibi penitus videatur. quod si cessasse re-
 spondeat, iam tempus est iterum adhibere, quæ calefaciant, & partem confirment, quorum qua-
 tuor genera sunt, frictio per linteum, calidæ aquæ perfusio, frictio per calida medicamenta vel per
 oleum, simplicis dropacis inunctio. ubi vitiatæ pars retrixisse plurimum videatur, dropax va-
 rius sit, habeat quæ bitumen, modicum sulphuris ignem non experti, & pyrethrum. Curanda
 verò sic esse corpora extenuata, experimento comprobauimus plurima reficiens. Vtrum autem ver-
 ba Hippocratis rectè exposuerim non est, quod contendā, quum me non lateat obscuræ oratio-
 nis explanationem eò euadere posse, ut probabilis sit, non tamen ut firmiter sciatur. Declaro au-
 tem verba Hippocratis non sicut plerique sic scripta / ut ex transfusione exhausta magis, quam
 ipsa emacrescerent, sic enim absurda sententia esset, sed (ut alij legunt) adiecto pronomine his
 verbis / ut ex transfusione, quæ exhausta: vocat enim exhausta, quæ extenuata sunt, propterea,
 quod in ocio degerint, fuerint quæ alimento destituta. hæc autem ex transfusione sanguinis (quali
 ex cursu dixerit) sanari, nimirum sanguine ad affectum locum copiosius concitato, quam si na- **G**
 turaliter haberet. Siquidem hac ratione implebitur, quod extenuatum erit, si diuersum adhi-
 beatur vinculum ab illo, quod in prioribus indicauit, cuius discrimen nos paulo antè demon-
 strauimus, ex quo necessario facultatis dissimilitudo proficiscitur: illud quidem ab affecta sede
 sanguinem expellit, hoc amplius ad eam concitat, quam si rectè valeret. nam, cum bene vale-
 bat, abundè erat, qui in ipsa continebatur, & ideo non opus erat amplius transmitti, quam qui,
 partim in alimentum subministrandum consumitur, partim digeritur: nunc verò, quum vitia-
 tus locus inanis sit, atque exanguis, multo plus concurrere sanguinis oportet, non modò ut ala-
 tur sicut in secunda valetudine, sed reficiatur etiam, præterquam quod nunc plurimum necessa-
 riò digeritur, quum subinde calefiat. calefaciunt enim quæcunque ad ipsum præsidia adhiben-
 tur, siue frictio, siue motus & medicamenta, siue pix illita, & confectiones picem habentes, ac
 tandem calidæ aquæ perfusio. nam & hac Hippocrates vsus est, fortasse ob eius seculi inopiam
 balneorum: nos autem hoc seculo aqua, quam in balnei labris habemus, contenti sumus, ad affe-
 ctas partes modicè calefaciendas, tollendum quæ eam lassitudinem, quæ extendentium sensum
 repræsentat. Iam vero partes exerceri necesse est in actionibus vsitatis, id quod quotidie facien-
 dum est, non subito semel, verum subinde, quomodo etiam frictio adhibenda est, donec exci- **H**
 tetur calor, tunc quæ ab ea desistendum. Verbis igitur sic veram curationem accommo-
 dat, cuius vim experientia demonstraui, sexcentos, qui sub vinculo diuturno quæ ocio extenuati erant,
 recreando. Sed iam eorum, qui librum hunc enodarunt, mentem aperire tempus est. ex ijs
 plerique (ut retuli) vsi circuitione duntaxat integram verborum obscuritatem reliquerunt. pau-
 ci conati sunt iuxta verba ipsa ad vinculum relata hoc modo vniuersam sententiam enodare.
 Hippocratem præcipere aiunt, ut eorum, quæ extenuata sunt, curatio à vinculo inchoetur. quo
 exhausta, hoc est extenuata magis, quam antè extenuata fuerant, in contrarium habitum mu-
 tentur. multos enim morbos putant hac ratione sanari, afferunt quæ exempla & eorum, qui
 nausea pressi sumpto medicamento vomitum ciente ad sanitatem peruenerunt: & qui assidue
 cita & acris aluo exerciti, cathartico confanuerunt: & quorum tussis finita est ob præsidia vehe-
 mentiore tussim excitantia. Nec desunt ex illis, qui commemorent, quæ Hippocrates in illis
 sententijs, quæ aphorismi vocantur, ad verbum sic scripsit. || Est etiam, quum in neruorum ri-
 gore citra vlcus iuvene habitiori, media ætate, gelidæ aquæ multa perfusio calorem reuocat. er-
 go, sicut contra morbos (inquiunt) non solum pugnamus per auxilia ipsius contraria, sed etiam
 per

A per similia, ita nunc ab Hippocrate iubemur gracilitati occurrere ab eo vinculo orsi, quod magis extenuare potest. id quod transfusione fieri aiunt, cum partes paulatim plurimum que sub vinculo contabescunt, iterum recurrentibus humoribus recreantur, & idoneæ fiunt, quæ carne impleantur. Sed quum videant, qui sic exponunt à se nullo modo explanari illud posse, diuerso vinculo, scribunt /diuerso habitu/, sic, vt ternæ reperiantur scripturæ inter se differentes, quarum vna habet /diuerso habitu/, namq; in non nullis exemplaribus sic scriptum reperitur. Qui scribunt igitur /diuerso habitu/ locum hunc in vinculo non accipiunt, sed in parte ægra, quam alterius habitus existentem ac prius esset, spectare ad refectionem dicunt, eum que habitum comparari vinculo plurimum extenuante, quasi exhaustæ partes non amplius vinculo extenuentur, sed nunc fortasse futurum sit, vt inde reficiantur. Itaque quum vinculum, quod ad fracturas pertinet, commune (vt paulo antè dixi) & aliorum affectuum, quibus annumerabantur sanguinis suffusiones, contusa, abruptiones, extenuandi facultatem habeat, quis conficiet, vt de eodem refici extenuatæ partes incipiant. quamobrem non nulli ita legunt /vt ex transfusione/, quæ suapte natura exhausta sunt/ concipientes id absurdum, quod oratione sequitur, estugisse, eo quod partes suapte natura sint extenuatæ: atque id, quod nunc præcipitur, non pertineat communiter ad omnia, quæ extenuantur, sed ad ea tantum, quæ sua sponte. sic autem commune hoc præceptum & generale pauca complectetur, paucissima enim sunt, & rarissima, quæ hac de causa tabescunt, reliqua omnia ob diuturnum vinculum, simul que ob vitiatæ partis quietem in hunc morbum incidunt, ea que potissimum fas est commemorari ab Hippocrate, quum sub ijs fiant, quæ superius posita sunt. docuit enim hætenus de fracturis, & de quibusdam alijs affectibus, qui simile vinculum exigunt, quibus quum maciem partium superuenire intelligat, indicare merito voluit, quæ ratione ad sanitatem perducatur. Sed iam iam exequar, cuius maxime accusari possent, qui putant Hippocratem monere, vt extenuans vincendi ratio adhibeatur. Consilium quidem est reficere, quæ exhausta sunt, quod contingere non potest, nisi & vires reficiantur, & materia alimenti abundè subministretur. vinculum verò, quod tradi ab Hippocrate volunt, & sanguinis concursum prohibet, & robur infirmat: sed quod nos dari ab eodem credimus, diuersum est ab illo, quod extenuat, inchoandum enim est à parte sana, non ab ægra, & per multos circuitus adstringendum comprimendum que, dum ne compressione excitetur dolor, qui posset inflammationem mouere: fascia item vsque ad affectam sedem trahenda est paulatim vi compressionis remissa. Illud præterea, quod integrum crus vnà cum ægro deligari conueniat, ipsorum expositioni minimè congruit, vbi inquit Hippocratem velle vincendum esse, vt quæ extenuata sunt magis, exhauriantur, quo non modò nihil confert vinculum alterius cruris, sed etiam obest, sanguis enim, qui antè ad illud ferebatur, nunc omnis ad affectum depellitur. Quod autem superioris expositionis auctores malè huc exempla transferant, in aperto est, quum nullam similitudinem habeant cum ijs, quæ ab Hippocrate traduntur. quoniam qui rectè rationi innititur, si subito ejici velit omne id, quod causam exhibet, nempe, quod ventriculi tergoribus ita inhaerescit, vt vix inde extrahi queat: similiter & acria, quæ paulatim destillant, & ita ventrem iritant, vt desidendi necessitas sit, subito non iniuria educer: quemadmodum euenit in tussi mediocri, quæ ijs exoluitur, quæ ipsam concitant acriorem. sed nulla his communitas est cum eo, quod putant affectum locum, vt recreari incipiat, exhauriendum esse, quum ex vinculis, neque tabescentes partes firmari possint, neque alimenti materia deduci. Illud verò, quod afferunt de neruorum rigore maxime alienum est, ignaros enim se ostendunt artis, quam tradidit Hippocrates, quum docet medendi rationem esse, vt contrarijs tollantur contraria. At non nulli minus verborum vim percipientes ad contradicendi studium conuersi sunt, quod ferè faciunt, qui inconsiderate aduersantur, atque ea labefactare contendunt, quæ nunquam didicerunt. tantum enim abest, vt per artificiosa illa, quæ traduntur ab Hippocrate, id tollatur, quod contrariorum contraria sint auxilia, vt etiam confirmetur. Quin & in adducta sententia dixit, || Frigidæ enim aquæ perfusio calorem reuocat, hæc autem calore finiuntur/ hunc verò calorem, qui medetur frigidis vitijs interdum frictione mouemus, interdum calidis medicamentis, modo exercitatione, aut calida aqua infusa: atque vbi vehemenuere calore opus est, bitumine (vt sæpius retuli) vel pice illita, interdum etiam & aquæ frigida perfusione. sed cætera omnia, vt potè quæ calefaciendi vim habeant, ijs partibus ac morbis, quibus calore opus est, vbi que vtilia sunt: frigida aqua, vt quæ frigida est, quantum in se est, raro vtiliter adhibetur, atque ei tantum corpori, quod potentem habet innatum calorem. In habitiore quidem corpore (inquit ipse) est, vbi vtilis sit aqua frigida, neque in hoc, quolibet tempore, sed æstiuo. frigida enim aquæ potionem duo afferre, vel noxam ex frigore, vel plurimum caloris ex ætioribus partibus redeuntis, quis non nouit, aut non docuit ex ijs, qui de ea conscripserunt: Corpore itaque abundè calido fit, vt à frigore non superetur calor, qui in ipso est, sed cute densata, atque ijs, quæ expirare debent, relictis, augeatur: at si calor imbecillior fuerit, quam vt subeunt frigori

s. Aph. 21. Ex.
ord. 39. b

gori obliſtat, vi ipſius ad altiora corporis aſpirante, homo frigidis morbis excipitur. fortasſe hæc E ſuperuacanea nunc attuli, quàm alibi (vt dixi) ea fuerim exequutus. Quæ primò igitur meden- tur, primò necesse eſt contraria ſint. prima autem dicuntur, quæ nullius medijs auxilio his oppo- nuntur: quæ medio indigent, non primò efficiunt, ſed alia adiuuando efficiendi ſocia ſunt. Agunt autem nugæ, quia alui purgationem, medicinam tuſſim mouentem, frigidam perfuſionem pro- ferunt. nam hæc, quamuis rectè interdum ſiant, plurimum tamen ab eo, quod nunc proponi- tur, abhorrent: in quo demonſtrandum eſt, qui fiat, vt vincendi ratio, quæ extenuandi vim habet, vel quod exhaustum eſt, confirmet, vel plurimum eò ſanguinis concitet. Fruſtra autem, dum hæc oſtendere nequeunt, exempla adſcribunt, præterquam quòd exemplo ſtabilem cer- tamque ſcientiam non efficiunt, neque argumento neceſſariò demonſtant. oſtendimus enim in li- bro de exemplis, non eſſe exempli vſum, vt qui rem non cognoscunt, eius ſcientiam acquirant: quod quidem non nulli aſſerunt, qui rhetorum more, vt ſcientia comparetur, exempla adhiben- tes tota aberrant via, non ſecus atque vbi Platonem dicunt plerunque per enumerationem de- monſtrare. oſtenſum enim eſt illum vt enumerationibus gratia explanationis: quicunque verò tenetur ſtudio exquisitiùs intelligendi enumerationis vim, & exempli, ad eum locum adeat, vbi de vtroque tractatur, quæ nos alibi exequuti ſumus. Sed nunc ad propositum reuertamur eos hor- tati, qui in hiſce libris verſantur, vt quàm hæcenus diligenter legerint, ad ſequentium expoſi- tionem accedant, quæ præcedentium fidem faciunt. ad ea iam igitur progrediamur vniuerſa, quæ vt in aperto magis ſint, non adſcribemus tota ſimul, ſed membratim, eòque modo etiam explanabimus.

- 33 *Cæterum præſtat partem, quæ ſuper aliam poſita eſt, ſicut femur ſuper id, quod à genu ad pedem eſt, ſimul quæ; alte- rum crus, cum integra parte deligare, vt ſimilius ſit, pariter quieſcat, & æquè alimento prohibeatur, atque alatur.*

Paulo antè propositum eſt rationem deligandi extenuatas partes diuerſam eſſe debere ab ea, quæ ad fracturas pertinet: hæc ſiquidem adhibetur, vt ſanguinis curſum prohibeat, quod in alie- cta ſede collectum eſt, ſurſum deorſumque exprimat, membra quieta ſeruet & immobilia, cum hac via vitiatæ partes interdum ab inflammatione penitus defendantur: at nunc non eò incum- bitur, vt fluxus ſanguinis repellatur, vt quod in ipſis ſubſiſtit educatur, vt immobiles continean- tur, ſed ad omnia hiſ contraria conſilium dirigitur. Fascia itaque (vt ſupra ſcripſi) ordiatur à par- te ſana, premendo quæ hanc, ſanguinem, qui in ipſa continetur, ad extenuatam transfundat, non G tamen ex toto integram partem exhauriat. Crure igitur aut brachio egrotante abundè eſt vincu- lum incipere ab inguine, aut ab ala: ſed, ſi malum hoc femur infeſtat, aut humerum, necesse eſt contrarium membrum deuinciri, vinculo ab ima parte orſo, & vſque ad inguen vel alam porre- cto. Si quando autem brachium, aut crus vehementer egrotet, expeditius eſt vtrunque deligare, & quod ſuperpoſitum eſt affectu parti, & quod integrum, vt prohibeatur alimentum, neque illi ſubminiſtretur. atque hac de cauſa dixit Hippocrates / ſicut femur ſuper id, quod à genu ad pedem eſt, ſimul quæ; alterum crus, cum integra parte deligare / vt pariter (inquit) quieſcat, id eſt ocioſum ſit alterum crus, atque illud, quod affectum eſt, & equè ipſius alimentum intercipiatur. Illud ve- rò / vt equè alatur / idcirco poſuit, quia membrum, quod vincitur, noluit ita alimento prohibe- ri, vt nulla pars penitus ad ipſum feratur. Quòd ſi vehementer quis adſtringat, ex toto ferri ali- mentum prohibebit, periculumque protinus erit, ne pars emoriatur: id ſi non fiet, alimentum qui- dem certè tam in femore, quàm in crure auferetur. propositum quidem eſt nō extenuare femur, ſed crus reficere. verum quia vinculi ratio alimentum detrahīt, huiusmodi noxam aliquandiu admittimus: deinde poſtea, vbi crus modicè carnem contraxerit, vtrique communiter conſuli- mus. Quare illi audiendi non ſunt, qui volunt Hippocratem iubere, vt cum extenuata parte, ea, H quæ ſuperpoſita eſt, atque alterum crus extenuetur, vt gracilium partium macies occultetur, ne in aperto ſit, ne ue ex plenioris mēbri comparatione deprehendatur. cum nec medicus quiuus vnus e populo, nedum Hippocrates, hanc curandi rationem probaret.

- 34 *Linteorum numero, non preſſu.*

In ſuperioribus iam ſepe imperauit, vt hoc idem fieret, vbi deligatum membrum ſanari peni- tus ſine dolore voluit.

- 35 *Laxandum eſt primò, quod maximè indiget: ac frictione vtendum, quæ impleat, & perfuſione citra ferulas.*

Verbum / primò / vel ad tempus retulit, vel ad vim. ſi ad tempus, vel in vno vinculo, vel in hiſ, quæ ſequuntur, inter ſe collatis. Sed quia verè hæc omnia dicuntur, idcirco quod proponitur clarum

A clarum est, nisi fortasse si ita scripsit, volens cuncta hæc à nobis intelligi. Protinus igitur in primo vinculo, quoniam conuenit plurimum integræ partis comprehendere, lintea q; primo ambitu arctari, tum subinde magis laxari, maxime autem ea parte, quæ refectione maxime indiget, probabile utiq; esset verbum /primo/ ad vim relatum, de parte dici, quæ curatur: ad tempus vero, de primo vinculo. Quod si accipiamus in omnibus vinculis inter se comparatis, mens erit huiusmodi. si in primis vinculis cum integra partem quoque vitiatam deuinxeris, interdum nudandam æger præbebit, quod ipsum primo agendum est in ijs, quæ refectione indigent, atque ea de causa minus bene nutriuntur. at quum sanguis ad vitiatum locum & frictione concitetur, & alijs quæ paulo supra narraui, ipse magis citius q; carne implebitur. Verum Hippocrates & frictionis & perfusionis aquæ calidæ meminit, non tamen medicamenti, quoniam hic sola docet manus præsidia. neque existimandum est prætermisum ab eo fuisse membra eatenus dimouenda esse, ne ad lassitudinem dentur, quum ea ostenderit, quæ sunt eiusdem generis, & motus quilibet per macræ partis ad id genus spectet, ad quod frictio: quum verò quiescere iusserit alterum crus, non secus atque integram partem, & nunc frictionis mentionem fecerit. motu quoque utendum esse planè censuit. nihil enim prohibet, quo minus absq; humero brachium, & crus absque femore **B** moueatur, quum non opus sit aduersus maciem immobili crure ac brachio. constat enim curari hæc, dum mouentur transmissio alimento per partes superiores, quæ eo non fruuntur, liquidem illæ potissimum fricentur, pice illinantur, & calidis medicamentis curentur. Plurimum verò sanguinis ad membra concurrere extremis partibus calefactis magnum tibi sit indicium concitatus ibi calor & rubor. Horum autem plenam curationem habes, quum his, quæ Hippocrates tradidit, adiecerimus calefacientium medicamentorum admotionem, cuiusmodi est inunctio picis. Hippocrates nihil penitus in hoc libro de medicamentis meminit, quâquam plures affectus memorat medicamentorum auxilium postulantes, ex quorum numero sunt sanguinis suffusiones, id vitium sub quo resoluuntur quæ articulos continent, præter hæc abruptiones, cum eam persequi medicinæ partem instituerit, quæ manu medetur, atq; hanc (ut dixi) non vniuersam, sed partem, quæ maxime necessaria sit, & vtilissima his, qui ad medicinalem artem aggrediuntur.

36 *Fulcimenta verò, ac firmamenta, velut pectori, costis, capiti, cæteris quæ eius generis, alia pulsus causa adhibentur, ne quid eo concutiat: alia propter commissuras, quæ dehiscunt, ad ossa caluariæ, ut fulciant: sed ad iussim, & sternutamentum, alium uel motum, cuiusmodi in pectore & capite excitatur, ut firment: quorum omnium eadem in vinciendo moderatio est, nam quæ vitium est, maxime adstringi debent. Subiicienda igitur lana mollis, quæ morbo aptetur, alligandum q; est, non arctius, quam ne pulsus concutiat, extremitates q; commissuræ dehiscens se contingant, neq; circa iussim, & sternutamenta, sed firment, ita, ut neque cogi, neque concuti sinant.*

Quid sibi velit verbum fulcire, quod Hippocrates dixit ἐκουάζειν, inde aperte colligit, ubi iussit fulciendum vinculis esse, nō tamen comprimendum, tam quum panniculus super fascias injicitur, quàm quum fasciæ ipsæ circundantur. Ducta autem vox est à nomine ἐκουατα, sic enim fulcimenta græcè vocantur, quorum meminit Homerus in eo carmine, ὑπὸ δ' ἡρώων ἐκουατα γυνῶν. quasi nihil differat, ἐπεκουατα id est fulcimenta ne dicantur, an στενίζματα id est firmamenta. Constat autem Hippocratem sapius dixisse ἐκουάζειν non tam in fasciis, quàm in pannis panniculisque, quod στενίζειν id est firmare significat: quin & expositores ubique pro eodem acceperunt. Nunc verò duorum nominum ἐκουατα, sic enim dixit fulcimenta, & στενίζματα, quo firmamenta expressit, proximè alterum alteri subiiciens, indicasse videtur non significari idem ab utroque. An ἐκουατα intellexit, quæ in vinciendo subiiciuntur, circundantur q;: ut affectam partem immobilem teneant, ac primò quidem fascias, quæ primùm injiciuntur, quæ præter alios **D** quosdam usus, etiamnum ἐκουάζειν id est fulciunt: dein pannos, qui & ipsi non modò fracturæ, sed & fascias fulciunt: post hæc fascias, quæ ferulis superinjiciuntur, & panniculos: siquidem hæc omnia, cum ea de causa dentur, ut contineant quæ antè inuoluta sunt, non ea tantum, sed fracturas quoq; fulcire possunt. Verum στενίζματα id est firmamenta, mihi videtur appellare quæcunque line vinculo ægræ parti vniuersæ superdantur, aut à sinistra vel dextra parte, aut à superiori vel inferiori. voco autem superiorem vel inferiorem ad crassitudinem respiciens totius corporis, in eo enim spacio, quod in ipsius crassitudinem est, quæ subiiciuntur, ab inferiori parte sunt: quæ superimponuntur, qualiacunque sint, à superiori. Firmatur autem extremitas recta aliqua re, quæ ab inferiori parte erigatur, caput puluinis & cervicalibus, tum lana & panniculis molli- bus: canalis comminuto cruri item subiectus vtrinq; ipsum firmat. Sed pilam ex lana demissam sub alam, in quam humeri caput exciderit, licet & fulcimentum & firmamentum appellare, eo enim, quod & ipsa alligetur, pars quodammodo fit totius vinculi: quæcunque autem ad fulciendum thoracem & caput superdantur, firmamenta magis dicuntur quàm fulcimenta. Hæc à medicis excogitata sunt propter motus partium necessarios, quorum aliqui naturales sunt, ut respi-

ratio pectoris, pulsus membranarum: non nulli præter naturam, cuiusmodi tussis, sternutamentum, singultus, & quicumque pulsus inflāmati partibus accidunt, aut sub vehementi capitis dolore in temporum arterijs, & sæpe palpitatio præcordiorum: est etiam interdum, cum alię partes firmamentum requirunt. Debent itaque adhiberi firmamenta fascijs non nunquam per se iniectis, ut ad temporum arterias, ubi caput intolerabili dolore torquetur, aut ad præcordia palpitantia, aut ad vulnera, in quibus veremur, ne sanguis erumpat. non nunquam verò fascia lanam comprehendimus: interdum tamen nulla adiecta fascia simpliciter firmamus. thoracem quidem et ceruices lana, caput puluinis mollibus, aut leuibus sacculis, in quos milium calefactum coniectum fuerit, ubi simul & firmandum & fouendum est: maxillam verò prolapsam, mollia firmamenta admo-
uētes interdum firmamus. Ergo, cum communis sit ἐρμάσματος id est fulcimentū, ac σπείγματος id est firmamenti vsus, iure putant, qui librum hunc exposuerunt, ab utroque idem significari: qui
bus sæpe verbis nos quoque utemur nullo discrimine interpolito. Est autem commune consilium, id, quod paulo antè dicebam, ut partes motu minimè concutiantur, sed, cum (quod proximè declarauī) proprium quoddam discrimen inter hæc sit, ubi curiosius agere volumus, σπείγματα dicemus, quæ line vinculo: ἐρμάσματα, quæ cum hoc adhibentur. sic quoque statuemus ea vocari σπείγματα, quæ partibus illis dantur, quarum motus necessarius est, à quo cessatio non est in nobis: ἐρ-
μάσματα, quæ immobilibus. Motus siquidē cruris & brachij in nobis est: thoracis verò & mem-
branarum non est in nostra potestate, neque item palpitatio alicuius partis, neque tussis, neque sternutamentum, neque singultus: quibus, quo minus moueantur, obistere aliquandiu non licet. vrget enim postea necessitas, ubi, qua concitantur, causa vehemens fuerit, videntur quoque valentissimi viri duratius posse resistere, prohibere quoque, ne moueantur. Sed aliter Hippocrates in proposito loco scri-
psit, quod ad pulsus pertinet, ne concutiat: tum quod ad commissuras capitis, ne dehiscant: ἐρμάσ-
ματος verbo vsus: σπείγματος verò ad tussim & sternutamentum aliumue motum, cuiusmodi in pectore & capite excitatur. Dehiscunt igitur in capite suturæ, quæ ραφαὶ dicuntur, cum, ubi ossa capitis se tangunt, propriè dicantur ἀρμόνιαι, sed translato vocabulo ραφαὶ. caluarie enim ossa ad vnguem inter se ἥρμους, id est committuntur, atque idcirco ipsorum contactus καὶ ἀρμόνιαν committi merito dicuntur: & à similitudine eorum, quæ fiuntur, ραφαὶ id est suturæ. hæc autem faciliè interdum hiant, & interdum dolorem mouent, quum ea inflammantur, quæ connectunt membranam caluariam tegentem cum ea, quæ dura sub caluaria cerebrum cingit. Sepius item venę tenues, quæ per suturas transcunt, inflammatione tentantur: quo fit, ut motus duræ membranæ super inflāmatam partem concidentis, dolorem afferat, ad exemplum motus arteriarum, qui
aliquando ob inflammationem dolori est. Hęc quidem vitia curiosam firmamenti moderationē postulant, sic, ut nec ita laxum inhereat affectę parti, quæ mouetur, ut ipsum quoque faciliè concutiat, & ea de causa molestum sit: nec rursus plus iusto inlidens premat & dolorem exasperet. Ipsa autem alligandi moderatio superius ab ipso posita est, & ad alios quosdā morbos, quibus idem vinculum quod fracturis cōuenit, atque idcirco nunc scripsit / quorum omnium eadem in vinciendo, moderatio est, / quorum / intelligens, quæ nunc proposita sunt. Cum quoque eandem dixerit moderationem esse, deinceps moderationem ipsam refert, cum inquit / nam, quæ vitium est, maximè adstringi debent / id est, ubi vitium est: siquidem verbum / quæ / ἢ ab ipso dicitur, quod nunc pro aduerbio loci accipitur, ac propterea debet adspiratione & circumflexo accentu proferri. Itaque id, quod ad huiusmodi vitium fulciendum vel firmandum adhiberi vtiliter testatur, adstringi voluit, nimirum fasciarum ambitu, non magis, quam ut prohibeat partes, quo minus sub pulsu concutiantur, quod est præ angustia impedire motum arteriarum, hæc enim est causa doloris. Alium insuper finem præscripsit, qui propriè pertinet ad suturas, quæ diducuntur, quum inquit / extremitates quoque commissurę dehiscētis se contingant / extremitates vocans, ultra quas non possunt commissurę se contingere. Intelligitur autem ex hoc vehemēs & immoderata compressio. nam, ut diduci ossium commissuram non expedit, ita, nec plurimum comprimi, quādoquidem hoc quoque naturæ alienum est. Hi ergo fines sunt valentioris pressus: imbecilliores, deinde adscribit / neque circa tussim & sternutamenta, / quasi ita dixerit, neque in tussi & sternutamento, ita, ut affectę partes nulla re contentę concutiantur, agitentur quoque: tunc siquidem acriores motus concutiendo laxiores partes, et minimè fulctas, vehemētius quæ vitiatas opus sit, earum dolores exacerbarent. Quæ verò moderatio adhibenda sit in fulciendo, ipse postremo adiungit, ubi ait / ita, ut neque cogi, neque concuti sinant / id est, ne, quæ vitiatas sunt, comprimantur, valenter, neue motu concutiantur, hoc est, neque nimis arctè, neque nimis laxè, colligantur.



GALENI IN HIPPOCRATEM DE FRACTVRIS


COMMENTARIORVM LIBRI TRES

Vido Vidio Florentino interprete.

*Ab eodem denuo multis locis ex vetustis manuscriptis
Græcis exemplaribus castigati.*

ARGVMENTVM PRIMI LIBRI

Communis ratio corrigendi simplices in cubito fracturas tractatur. Ac primum Brachio proposito docet, quo pacto extensiones, conformationes, deligationes, & positiones fracturarum partium fieri debeant.



Cire licet, antequam singula exponamus, posse expositionem omnem, quæcunque in opere obscura sunt, aperire. aliquid autem ex ijs, quæ scripta sunt, vel vt verum demonstrare, vel vt falsum refellere. tutari q; si quid à cavillatore quopiam reprehensum fuerit, preter expositoris officium est, consuevit tamen fieri ab omnibus iere, qui libros exponunt. quam rem ab expositore modicè attingi propriè nihil prohibet: sed certare de auctoris sententijs absolute, expostoris tunc excedit. Hoc igitur non illud respiciens, ubiq; ijs, quæ verè expostiones sunt, pauca ad confirmanda, quæ proponuntur, adijciam. Verum, quum duplex sit huius expositionis differètia: quandoquidem & id ipsum, quod obscurum est, duplex est: de hoc quoque aliquid præfari expeditius arbitror. Hæc ipsa, quæ in libro de expositione seorsum latius enarraui, paucis explicabo, quasi quoddam compendium faciens. ibi enim ostendi aliud re uera obscurum esse, aliud ob id precipue, quod multa sunt auditorum genera, vt sermone cruditi sunt & exercitati, vel omnino rudes: tum vt natura perspicaces sunt, & prudentes, vel hebetes, & imprudentes. Ac, ne longius exempla petamus, in hoc proposito libro de fracturis, ubi Hippocrates inquit, Dicendum ergo est e medicorum erroribus, quos docere volo, quosque dedocere. verba per se obscura sunt. quum minime existimemus quosdam esse errores, quos docere conueniat. Huiusmodi etiam illud est. Præterea articulus ita extensus recuruatur in hoc habitu. intento enim brachio curuari inquit cubiti iuncturam. videtur autem & hoc absurdum, id curuari dicere, quod rectum est. Item, quod inquit. Nam si ita collocetur inum caput humeri, quod cardinis modò in cubiti sinum conijcitur, efficit, vt brachij atque humeri ossa dirigantur, perinde ac si totum vnum sit. sed, si quis viderit, quale vtrunq; os sit, de quo agitur, nullam habet obscuritatem. iure autem verba existimabit obscura, qui naturam cubiti iuncturæ ignoret. Ego, quoniam plerique eorum, qui librum hunc legunt, in incidendis corporibus minimè sunt versati, melius dixi omnia huius generis explicare: quæ verò talia non sunt præterire, adhuc de his illud præfatus ijs, qui librum hunc lecturi sunt, vt si quæ ex verbis à me expositis obscura ipsis aliquo modo videantur, ante omnia spectent, num quid mendii sit in suo libro, cum exemplaribus fide dignis illum conferentes, examinantes: quæ: tum si recte habere vius fuerit, eadem verba attentè iterum, & tertio legant. ego verò, quum præsens præsentis libri aperio, ad vnguem conijcere possum expositionis modum, ubique addiscentis ingenium inspiciens: at cum omnibus scribo, nec quid maximè, nec quid minimè idoneum exigit, conij-

sect. u. l. 7. 225. c

Septima Classi

FFFFFFF uj

cio:


cio: nam illud plerisque obscurum erit, hoc iniquo animo ferunt, qui in rebus claris immorantur. Optimum igitur censeo, quid mediocre ingenium postulet, conijcere, atque, ubi non succedit, magis ad id spectare, quod præstantius est: neque enim commentarios legendos puto, quibus ingenium est inferius mediocri, quibus cum bene agitur, si postquam eadem sapius de doctoribus audierunt alijs atque alijs verbis expolita, percipiunt.

1 *Medicum oportet, quæ suo loco mota sunt, & fracta, recto admodum statu intendere.*

Non nullæ orationes, & si nihil doceant, quod magni momenti sit, tamen expositionis particulæ censentur, quales sunt, quæ scripturæ varietatem notant, cuiusmodi quidpiam nunc videmus in proposita oratione, quæ ab alijs scribitur /medicum oportet/. ab alijs abique primis verbis /medicum oportet/, Atticis enim hoc prorsus est vsitatum, quorum linguam Hippocrates aliquantum vsurpat, ita ut eius sermo à non nullis priscus atticus existimetur. Nos autem in alio paruo libello, quid de sermone Hippocratis iudicemus, seorsum demonstrauiamus. Nunc explanationis initio satis est admonere omnia hæc à me prætermittenda, quum propositæ materiæ necessariæ partes non sint, & expositionem reddant nimis longam /quæ suo loco mota sunt, & fracta, recto admodum statu intendere/. appellat autem, cum ossa citra fracturam suo loco mouentur, non solum ἐκπύσεις, & ἐκπύματα, sed etiam ἐξarthρώσεις, & ἐξarthρώματα. Quod ad fracturas pertinet, id animaduertendum est Hippocratem, ut sapius κατάγματα, raro ἄγμα nuncupet, eo vocabulo, quod rarius vsurpauit, hoc opus inscripsisse: quo fit, ut non nulli velint non seiunxisse hoc Hippocratem ab opere, quod inscribitur, de Articulis, sed vtrunque in vnum contulisse: diuisum verò fuisse postea in duo præ magnitudine: atque, ubi in vnum ambo conuenerant, inscriptum fuisse, de Officina medici. Quam rem malè conantur testimonio firmare, asserentes scriptum fuisse librum vnum de officina medici, ab homine antiquo primo Hippocrate, qui patrem habuit Gnosidicum: libellum verò, quem nunc ita inscriptum habemus, compositum non fuisse à magno illo Hippocrate, qui maximus inter græcos habitus est auctor ac medicus. Sed quia in his duobus operibus tractatur de ijs, quæ in officina medici fiunt, idcirco aiunt inscripta fuisse, de officina medici, atque ea de causa hîc etiam exquisitum ordinem in docendo non seruari: ipsum enim in hoc opere de fracturis mentionem fecisse de articulis quibusdam luxatis: atque operi, quod sequitur de articulis, non pauca de fracturis inseruisse. Verum quibus placet opera hæc, non ab aliquo seiuncta, sed à principio duo composita fuisse, ab ijs, circa quæ magis versantur, inuenisse inscriptionem affirmant. ita enim opinantur ipsi inscripta fuisse, atque inde initio sermonis accepto longius labuntur, ostendentes pleraque ex operibus Hippocratis hac ratione inscribi. Equidem in vnum ne contulerit Hippocrates ambo hæc opera, an non, dicere non habeo: procedente autem sermone ostensurum me polliceor fracturas, & eas luxatas, quæ tractantur in hoc opere, doctrinæ cognationem inter se habere, atque item luxatas, & eas fracturas, quæ in opere de articulis. At quomobrem in propositis nunc verbis /quæ suo loco mota sunt, & fracta/ orationis ordinem permutter (scripsisse enim debuit /quæ fracta sunt, & suo loco mota/, eo quod antè de fracturis tractet) possum vnâ duntaxat causam reddere, hoc pacto. sapissimè videre licet Hippocratem, & ex maioribus eos, qui eloquentissimi sunt, hunc enunciandi modum vsurpasse. Fortasse igitur non ordinem dicendorum, sed ordinis concentum attenderunt, vel adeo exquisitum ordinem in huiusmodi orationibus neglexerunt. /Recto admodum statu intendere/. Membra, quæ luxata sunt, aut fracta, dum intenduntur, præcipit recto admodum habitu figurari. sed qua de causa intendi debeant, hîc omittit: de modo, quo collocari membrum conueniat, dum intentio adhibetur, latius pertractat. cum posset in opere rem ipsam docens, nihil de ijs, qui hæc fecus sentirent, meminisse. Atqui non in hac oratione tantum, sed in ceteris omnibus ignorare non oportet, orationum alia summam rem proferri, atque hæc omnium breuissima est: alia huic maximè contraria rem plenè explicari, in qua nihil omnino prætermittitur, quod vtiliter dici potuisse videatur: reliquas verò omnes his interiectas esse, & alias ad breuissimam, alias ad longissimam, propius accedere, sicut alias rursus paulum à media distare. Vtriusque autem generis legere singulas oportet pro arbitrio, atque ocio: eos autem nullo modo accusare, qui vel quod breues esse laborent, obscuri fiunt: vel, quod orationis perspicuitati studeant, longius labuntur. illis enim dare legem non conuenit, præsertim, quum nihil sit profutura, sed accipere debet vnusquisque quod sibi vtile sit, cum eo ut intelligat docendi propositum non esse idem in omnibus libris. verbî gratia, in his duobus de fracturis, & de articulis, plenè scribit: summam verò in eo, qui, quum de impellendis ossibus tractet, μολικὸς inscribitur, ubi, quod ad res pertinet, idem agit. Est autem plenè explicandi ratio ad perspicuitatem maximè accommodata: compendiarîa verò ad memoriâ. huius rei, quam semel indicauî, ubiq; memento. Sed iam pergimus ad ea, quæ traduntur, diligenter animum aduertito.


Ipse

A Ipse ergo in sequentibus causam inquireret, cur, siue fractum os componendum, siue luxatum in suam sedem collocandum sit, ante opus sit extendere. Mihi autem res explicanda, locus hic videtur, ut qui operam dem, ut planè exponam: ad quod plurimum conferre orationis ordinem, quàm nullam controuersiam recipiat, nihil est, quod demonstremus: sicut nec ab ijs, qui quidpiam exponunt perspicuitatis gratia, non solum ordinem, sed modum singularem omnium orationum attendendum esse. nulla enim alia de causa expositionem scribimus. In opere igitur de motu musculorum ostendimus maxime proprium esse musculorum, si ad reliquas corporis partes referantur: si ad se ipsos, maxime commune ad exemplum lori, chordæ, aut funis, in se ipsos contrahi. nam, sicut hæc distenduntur, ubi eorum extrema prehendentes in diuersa diducimus: & ubi sinimus, ponimus que, contrahuntur: ita musculi ossibus vtraque extremitate innexi coniunctionem habent ijs, quæ manu prehendantur, respondentem: ab ipsis autem in contrarias partes attracti medijs inter extremas partes. hoc est, suo corpore vniuerso intenduntur. quæ de causa ubi eorum fibre omnes transuersæ præcidunt, partes plurimum inter se recedunt, vna quidem sursum ad totum musculi initium, altera verò deorsum ad extremum, qua parte post articulum cum altero membri osse coniungitur. Idcirco, ubi integro musculo articulus suo loco moueatur, finis musculi iunctus illi parti, in quam os excidit, qui totus ad suum initium contrahitur: cū eo autem attrahitur pars membri cum qua necitur, hoc est, caput ossis, quod in recessum inferitur, quo contracto vnà contrahitur totum os.



C bet, sic, ut comminuti membri extrema se tangāt. est enim fractura perpetui ossis abruptio, perinde, atq; vlcus carnis. vtrunq; autem tunc ex toto restituitur, cum ad pristinam vnitatem ad alium est, quod fieri non potest, nisi fracti ossis partes e regione collocentur, quæ curatio græcè *ὑπὸ τῆς* *σῆς* dicitur. Itaque, si levis fractura fuerit, vtraq; lesi ossis pars suo loco manet: sin os penitus perfringatur, necesse est partes inter se cedere, hac, ut puta in priorem, illa in posteriorem regionem veniente, atq; alia in dexteram, alia in sinistram. Quamobrem ambabus manibus, vtriusque membrum prehēdēs, quod in priorem partem erupit, retrō cogimus: quod in posteriorem, compellimus in priorem: quod in sinistram excidit, in dexteram trudemus: quod in hanc prolapsus est, in contrariam repellimus, ita, ut omnes comminuti ossis partes per manus componentis in contrarias partes vrgeantur. Dum hæc itaq; fiunt, periculum est, ne aliquæ fracti ossis eminentiæ confringantur. non enim redditur ex toto leue vtriusque ossis extremum, perinde quali sectum sit ferra gladium referente: nam quæ dentata est, & ipsa exasperat.

Fracti ossis alternatio & asperitas.



interdum solis ministrorum manibus committentes. interdum laqueos inicientes, ubi maiori vi opus sit, in diuersa contendere. Ostendimus autem tã in fracturorum, quam in luxatorum ossium curatione, principio intēdendū esse: adhibendam verò intentionem hanc mēbro non temerè figurato, deinceps dicemus: atq; illud in primis, quum in fracturæ curatione quatuor agere debeamus, intendere, componere, alligare, & continere, eundem habitum omnium esse communem

Septima Classis.

FFFFF III

oportere.

In quo casu accidit, ut caput eius ossis, quod in commissura subiectum est, pristina sede sublimius colloceat. quare nullo modo restitui in suum locum potest, priusquam toto membro intento eatenus deorsum compellatur, quatenus sursum præter naturam venit. Hæc itaq; de causa ossa, quæ prociderunt, prius intēdenda sunt. Quod aut comminuta quæq; ossa intēdi debeant, vel ex eo potissimum colligitur, quod sicut in luxatis restitutum est, quod erupit, ita in ijs, quæ fracta sunt, quod affectum est, componi de

Quare fracti ossis partes in diuersa, partim sursum versus, partim deorsum deducentes, ad componendam fracturam venimus, euentes, ne, dū coniunguntur partes ossis, quarum altera super alteram excessit, aliquæ ipsorum eminentiæ perfringantur, quod penitus assequemur, ubi ossa e regione sunt, id est condantur, vnum scilicet sub altero. eo enim vocabulo vitur Hippocrates, ubi fracti ossis partes in suum locum reponuntur. Ergo, ut, quæ recesserunt, iungantur, necesse est alteram partem sursum, alteram deorsum attrahere, quod iam omnes medici faciunt, rem

oportere. componimus quidem, dum intendimus: vbi composuimus, protinus alligare conuenit, saluo eodem membri habitu, quo compositum est: quem rursus seruare decet, vbi continetur: nam, si moueatur, vinculum quadam parte laxiores habebit circuitus, quadam arctiores. laxiores, quum ossa moueri patiantur, quod compositum est, corrumpet: arctiores, quum dolori sint, inflammationem excitabunt. Quatuor igitur, quæ agenda diximus, communem habitum requirere demonstratum est. consideremus posthac, quid intuiti, hunc habitum inueniamus. Porro, quum membrum intenditur, ille optimus est, sub quo non magna vi separata ossa in diuersa componuntur: quum continetur, ille, qui minimè lædit. vtrunq; præstat, qui ita figurat, vt musculorum fibre directè intendantur. directæ autem intenduntur, quum ab ima membri parte vniuersus musculus collocatur: nam, si musculus, qui suum initium habet à parte interiori, ita collocetur, vt medius ab interiori parte membri, extremus ab exteriori: vel sic, vt medius à superiori, extremus ab inferiori situs sit: hoc pacto circa membrum in cochleam serpēs magnam vim requirit, cum intenditur.

Musculorum directio.



Musculorum distortio in supinæ manus figuratione.

Itaque, si hoc modo figuratum musculum extēdas, dum fracti ossis partes abundè diducantur, vehementer dolebit, magno cum periculo, ne conuellatur. constat enim intentionis vi conuulsos interdum musculos fuisse. Quare eundem esse habitum constat, qui minimè lædit, & qui musculos nullo modo peruersos continet: quod apertè Hippocrates expressit, volens brachium cubito tantum innitī, non ex toto curuatum, aut extentum, sed in medio inter hæc collocatum. Quē

habitus ipse docuit optimum esse, primo, quod cubiti os longius est radij sede, ipsum que firmiter sustinet: deinde, quia muscoli, qui oriuntur ab interiori tuberculo humeri, extrema habent ab interiori parte totius brachij: qui ab exteriori incipiunt, ab exteriori finiuntur. Cuius autem musculi initium & finis ab interiori parte sunt totius brachij, huius & reliquæ omnes partes, & propterea totus ipse musculus. Similiter cuius extrema ab exteriori parte sunt, & ipse totus ab exteriori parte est totius membri. Quin & experimentum indicat hunc habitum minimè ledere. Ex duobus verò quibus hic interijcitur, supinus musculos plurimum peruertit, & vehementem dolorem mouet: pronus minus peruertit, minus que dolori est. Habes de brachio figurando summam omnia, quæ latius deinceps Hippocrates docebit, ea oratione vsus, quæ perfectè plane quæ rem exponit, ita, vt paucis omnino opus sit ad ea exponenda, ijs præsertim, qui imbuti sunt puerilibus disciplinis, vel apud doctores librum legerunt, quibus sanè commentaria scribuntur.

2 *Ea siquidem est natura iustissima.*

Quasi dixerit maximè conueniens. nam, vbi, quod conuenit vnicuique, seruatur, res iustè habet, atq; administratur. Quid autem corpori conueniat, præter id, quod secundum naturam est, haud facile intelligitur. ergo cum singulis partibus conuenientia inest figuræ, coloris, & magnitudinis, optimè habent.

3 *Sed, si in hanc vel illam partem declinatur, in prouum habitum peccatur. lenius enim peccatum est, quàm si in supinum.*

Duos habitus posuit, supinum & prouum, qui & ad vniuersum corpus referuntur, & ad vnā ipsius partem, nempe brachium. Totum igitur corpus prouū dicimus iacere, vbi deorsum venter spectat, dorsum verò in superiore partem: contra supinum, vbi sursum venter, in inferiore partem dorsum. Quos habitus cōmemorans loquuturum se de brachio indicauit, quum nequeat corpus totum frangi, aut excidere. Sed causam, cur præstet in prouum declinare, quàm in supinum, vbi quis deceptus rectum non assequatur, ipse in sequentibus aperiet.

14 *Qui nihil capiunt consilij, plerunque nihil errant: ipse enim, qui deligabitur, sic iusta natura coactus brachium porrigit.*

Medici, inquit, qui ante naturalem brachij habitum, nihil attendunt, plerunque melius curant, quàm qui malè ratiocinantur. Idiotæ enim, qui alligandus est, medico brachium porrigit figuratum, quemadmodum minimè lædat, instructus à natura, quam nunc iustam dixit: quippe quæ generationis initio, & postea in tota vita degenda, *δικαίων*, id est conuenientem, singulis partibus habitum inuenit. Ipse enim qui deligabit brachium porrigit, vocabulum porrigit, *ἀπορῆγει* dixit, quod nō nulli accipiunt pro *ὀρέγει*, id est porrigit medico: nō nulli pro *ἀποκωλύει*, hoc

A hoc est, non permittit, ut medicus indoctior membrum in contrarium conuertat. omnes enim homines natura singulas partes figurant, quemadmodum minimè lèdant: quem habitum indicat Hippocrates esse maximè rectum. Porrigunt igitur egri se ipsos ita figuratos: atque agrè ferunt, ubi aliter à medicis collocentur, renituntur: quæ, atque ob dolorem ducendi non parent. hoc autem volunt Hippocratem significasse verbo ἀποπέγει. Sed utrius modo acceperit, res eadem manet. nam idiotæ, quum ita brachium collocent, quemadmodum minimè lèdat, præstantiores sunt medicis, qui, cum sibi sapientes videantur, malè hoc figurant. Sunt & qui ad utrumque id referant / sic à iusta natura coactus brachium porrigit/. Sed cum proposita res seruetur, quomodo-cunque verbum id accipiatur, superuacaneum est in his ampliùs insiliere, inutilia enim sunt, & inuentu facilia, quæ ambiguis verbis traduntur. Quare illi omittenda sunt, qui tēpori parciunt, quum in iis, quæ vtilia sunt, id consumere magis conueniat.

- 5 *Sophistæ autem medici utique sunt, qui peccant. Porro brachium fractum non magno negotio pertrahatur, id quod (ut ita dicam) cuius medico facile est.*

Sophistas intelligit eos, qui sapienter aliquid sibi inuenisse videntur, errantes tamen, atque idcirco non obseruantes, quod rectè omnes idiotæ cognouerunt.

- 6 *Quem locum cogor latius explicare, quoniam medicos vidi, qui, cum deligarent, sapientes habiti sunt à brachio figurando, vnde par fuit videri ignaros. Multa enim alia, quæ sunt huius artis, ita iudicantur. Nam, quod nouum est, quamuis non dum constet, utrum sit vtile, anteponunt ei, quod consuetum est, quod iam sciunt utile esse, atque id, quod alienum est, ei, quod receptum.*

Ipsemet tibi ostendit in sequentibus, quæ omnia obscura sunt, cur sermonem de figurando brachio dilatauit, quanquam locus per se, nec difficilis est, nec ita multa verba desiderat, ex quo protinus causam inuenies, quamobrem in iis, quæ tradidit, ordinem omnino exquisitum non seruauit. quisque enim prius de eo, quod magis vrget, verba facit. Ergo, qui à medici eius sæculi pro cōperto habebant ad omnem, tam comminuti quam prolapsi ossis curationē intentione opus esse, sed ignorabant, qui nam habitus secundum naturam esset, idcirco de hoc in primis egit. Ac multo adhuc magis, quia medici quidem optimo deterrimum habitum anteponentes, prauis rationibus eam rem sibi ipsis, atq; aliis persuadebant. Quod si ignari omnino fuissent, oportebat verū ipsos docere. at, cum non solum ignari essent, sed etiam cognitionem sibi vendicarent, necesse fuit Hippocratem id primò conuellere, deinde animum iam purum vera scientia instituire.

- 7 *Dicendum igitur est è medicorum erroribus, quos docere volo, quosque dedocere, de brachij natura.*

Dedocere vult ea, quæ medici non putant vitio danda, quum tamen vitia sint: docere quæ putant vitia, quum non sint,

- 8 *Etenim, quod hac ratione traditur, ad alia quoque ossa corporis pertinet.*

Non iniuria dicit orationem hanc ad alia quoque ossa sananda pertinere. ea enim ad quæ spectantes, inuenire naturalem vniuscuiusque habitum conueniat, omnium cōmunia sunt. duo autem sunt (ut supra indicauimus) nempe ut dolorem euitemus, & rectum statum tueamur. illud experimento comperitur: hoc partium quoq; situ, quem corporibus incidendis comparamus.

- 9 *Ergo Brachium, de quo sermo est, quidam vincendum dedit pronum: hic autem cogit collocari modo sagittario-Drum, quum humeri caput coniungunt: atque ita deuinxit existimans hunc esse naturalem eius habitum. Quam rem eo argumento comprobauit, quod ossa omnia, quæ in cubito sunt, inter se dirigantur, tum superiectæ partes æquantur: quod etiam tam exteriores, quam interiores, inter se directæ collocantur: ita enim inquit & carnem, & nervos naturaliter siros esse. Sagittarios præterea testes adduxit. His autem dicendis, præstandis quæ sapiens habebatur: aliarum verò artium immemor erat, quæcunque vi aut artificio quidpiam moluntur, nesciens alium alibi esse habitum naturalem. Quin & in eodem opere, alius erit dextræ, exempli causa, alius sinistræ habitus naturalis: aliter enim brachium naturaliter figurant iaculantes, aliter funditores, aliter rursus qui lapides coniungunt, aliter pugiles, aliter qui in ocio sunt. Quotquot enim artes reperiri possunt, singulæ naturaliter brachia requirunt, non eodem modo figurata, sed ad instrumentum, quo in singulis vtendum, & ad opus, quod efficiendum est, accommodata.*


De his quoq; semel aliquādo meminisse oportet, quam rem nos minimè præteribimus. Quidam ex iis medicis, qui sapientes habentur, proposita verba / ergo brachium de quo sermo / tanq̃ mendosa iure suo corrigēs, græcè ita scripsit / τὴν οὖν χεῖρα περὶ ἧς ὁ λόγος ἦν / adiecto verbo / ἦν, hoc est erat / suā nobis ostentās disciplinā, qua fuerat à grāmaticis, rhetoribus q̃ eruditus, ita ut ignoraret modū præcisè loquendi omnibus antiquis vtitum. Exit aut̃ plena oratio, si perficiatur hoc modo

modo / ergo brachium, de quo sermo erat, quidam vincendum dedit pronum. Idiotæ plerumque E medicis brachium porrigunt conuenienter figuratum, sed horum quidam nimium curiosi recedentes ab eo, quod naturaliter propositum esse debet (id autem sunt doloris carentia) pronum habitum eligunt, ut potè quem commodiorem existiment. nullus tamen idiota medico brachium porrigit resupinatum: multum enim abest hic habitus ab eo, qui minime ledit. quem alicui medici & ob inscitiam, & ut sapientes videantur, interdum non admittunt atque ea de causa sagittariorum exemplo brachium vniuersum collocant, quidam penitus resupinatum, quidam non multum ab huiusmodi habitu recedens. Peccant igitur, non modo in hanc partem, sed quod extentum figurent, quos Hippocrates prodidit ea ratione moueri, quod ubi totum brachium sagittariorum exemplo figuretur, ossa diriguntur, & totius brachij superiectæ cuius partes æquantur. sed hæc valde probabilia sunt, & se vicissim consequuntur: illud reuera non sic habet. carnem & nervos eo habitu, perinde, atque ossa in recto situ omnibus partibus seruari: quod si ita res haberet, non modo probabiliter, sed firmissimè demonstrarent huiusmodi habitum naturalem esse. Verum hæc tolerabilia sunt, transferre autem huc sagittariorum exemplum, existimari debet prorsus fatuum, fatiusque fuit eos ab Hippocrate nullo modo commemorari, quam acerrimè refelli. nam, quæ prorsus stulta sunt, deridenda magis sunt, quam à scriptoribus consultantur: non tamen F prohibeo, quo minus, dum viuentes agunt, redarguantur: ac præsertim, ubi, qui hæc nugatur, audientibus persuadet, ut sibi ipsi hominis curationem committant. Fit etiam interdum, ut nos quoque in scribendo stultis opinionibus contradicamus, ubi multos videmus illis credere, quasi veræ sint: quod nunc accidit Hippocrati, qui nihil esse commune sagittarijs, & vincientibus, ostendit. Quæ verò afferuntur de ossibus, nervis, & carne, recto statu collocandis, quamuis nullum per hæc fuisse Hippocrates reprehensurus, per se necessaria fuerant ad optimum habitum inuertendum, cuius caput est, si argumentum ex signo colligamus, doloris carentia, id enim neque ipsos idiotas latet: verum, si rei causam, naturam que spectemus, rectus partium status, qui idiotis non item patet, sed illis duntaxat, qui incidendis corporibus operam dederunt. Quæ ab Hippocrate subiiciuntur, maxima ex parte plana sunt, nec quidquam habent, quod in questionem vocetur, quare vniuersa hæc mihi prætereunda, quod non accidit iis, qui librum legunt, quibus longiori tempore sunt consideranda. Quod inquit / hic autem coegit ipsum collocari modo sagittariorum, cum humeri caput coniiciunt / obscurum est, & incertum. quocirca non nulli verbum / coniiciunt / quod dixit ἐμβάλλωσι, propterea scriptum ab Hippocrate existimant, quod extento brachio humeri caput in sinum ceruicis, quæ in lato scapularum osse est, coniiciatur, in quem antea G non coniiciebatur, cum brachium demissum erat. tunc enim iuxta erat duntaxat, & cōtingebat: quam rem his verbis expressit / versatur humerus in lato scapularum osse transuersus, ubi brachium iuxta latus extenditur. Censent alij ἐμβάλλωσιν dixisse Hippocratem translatione usum à nauium impetu. ἐμβολήν græcè dicitur, ubi datur opera, ut naues hostium mergantur, quando cunque signo dato prora aptatur ad nauem alteram perfringendam, potissimum à latere, totam quæ dissoluendam, ac submergendam. tunc quasi paratum esse ad ἐμβολήν, id est ad impetum faciendum aiunt. Item apud comicos porrecta membra dicuntur ad ἐμβολήν, id est ad impetum faciendum parata: quod Antiphanes ostendit, quum inquit, χωρεῖ ἐπὶ γραμμῇ λόφος ὡς ἐμβολήν, id est, recta accedit incuruus, quasi ad impetum faciendum paratus. Quæ subdit omnia, si animaduertantur, manifestæ sunt, vique dum inquit.

- 10 In sagittarijs præest hunc alterius brachij habitum optimum esse: nam si ita collocetur, imum humeri caput, quod cardinis modo in sinum cubiti coniicitur, efficit, ut brachij atque humeri ossa dirigantur, quasi totum vnum sit.

Scribit nunc aduersus eos, qui vniuersum brachium intentum deuinciunt, sicuti sagittarij sinistrum continent. Ait enim ad id agendum iure opus fuisse brachio extento, quum nervus dextra tenditur versus partem posteriorem: totus verò arcus in eadem regione continetur à sinistra, ne in alteram partem inclinetur. Nam si nervus dextra valide in posteriorem partem intentus totum arcum secum adducat, ductio sagittæ in posteriorem partem impediatur, ut quæ debeat à valido nervo contento que emitti. Ergo, quantum ex vltima contentione remittitur, tantum demittitur de emissionem sagittæ: quod, quum in confesso sit, Hippocrates causam adiungit huiusmodi / nam si ita collocetur imum humeri caput, quod cardinis modo in sinum cubiti coniicitur, efficit, ut humeri atque brachij ossa dirigantur, & brachium totum sine inclinatione seruetur. vocat autem γιγλυμοειδές imum caput humeri, quod cardinis modo cum cubito committitur. quandoquidem cardines (græcè γίγλυμοι) & quosdam sinus habet, & quosdam processus sinibus recipiunt eorum, cum quibus committuntur, processus: processibus in ipsorum sinus inseruntur. Similiter imum caput humeri in gibbum ambitum desinens duo à lateribus tubercula exigit, unde similitudo trochleæ fit. hæret autem huiusmodi ambitu trochleam referente in sinibus cubiti. Extremus hic ambitus, & à priori & à posteriori parte cauum habet: in utroque se insinuat cubiti processus rostro similes. Siquidem

A



Siquidem cubiti caput superius C literam refert, quā cum humero committitur: accipit que humeri ambitum, qui trochleam refert, ferē totum, vbi brachium sic collocatur, vt cubitus atq; humerus rectum angulum ostendant. At rursus, vbi humero quiescente, cubitus circa gibbū eius ambitum moueatur, si in priora feratur, cubiti commissuram flectit. si in posteriora tendit, in maximo quidem flexu prior cubiti processus in humeri cauum, quod à priori parte est, conicitur: in extensione posterior processus in posterior cauum, quod, quū maius sit, maiore processum accipit. quare plurimum extēdere & curuare totum brachiū possumus: quod nullo quidem modo cōtingeret, si nullum cauum in humero fuisset. Quū huiusmodi ergo sit cubiti iunctura, vbi totum brachium ad rectum angulum figuretur, ita, vt humerus & cubitus rectum angulum ostendant (quem habitum Hippocrates solitus est appellare ἐγγώνιον) ambitus trochleā referens medius heret cauo cubiti, quod C literam repræsentat. At vbi totum brachium extenditur, cubitus in posteriorem partem fertur, & processus, qui ab ea parte est, motui præest: cessat autem, quiescit que, quū primum ad humeri cauum, quod ea parte est, peruenit. Quo fit, vt commissura extendatur, & inum humeri caput, cardinis modo, sinu cubiti innitatur. vocat autem Hippocrates βαθυίδα, non modò humeri sinum, sed ceteros omnes, in quibus recipiuntur ossium processus.

11

Præterea articulus ita extēsus recuruatur. Ergo verisimile est sic eum locum minimè flecti, maxime que intendi, neque à nervo, quem dextra tendit superari, neque illi cedere: ad hæc nervum ipsum plurimum adduci. Quo fit, vt sagittæ à valida subita que vi emittantur: quæ autem sic emittuntur, maiori impetu celerius feruntur, longius que. Sed vincientis & sagittarij nihil commune.

Ex modis, quibus brachium figuratur, extensio flexui contraria est, supinus habitus prono. hi ergo extremi sunt, & quasi quatuor habituum excessus: duo alij medij sunt, vnus quidem inter Cextremum flexum & extensionem, quem Hippocrates (vt dixi) ἐγγώνιον appellat: alter inter pronum & supinum, sub quo ait cubitum radio subiici. Igitur, sicut hunc iustum & rectum dicit, sic etiam illum, qui ἐγγώνιος dicitur, sub quo humerus cum cubito ad rectum angulum collocatur. Quod si hic habitus rectus est, sequitur, vt, vbi brachium extēditur, non debeat rectus appellari. si rectus non sit, certè erit in exteriorem partem recuruatus: quemadmodum, si in posteriorem partem ita recuruetur os cubiti, vt cum humero angulum ostendat: quod iam non nullis accidisse perspectum est, quibus necesse est posterius humeri cauum abunde altum esse, in quod se inserit posterior cubiti processus. Quod si huiusmodi cauum nobis omnibus altissimum elicit, flectere in posteriorem partem brachium possemus, vt dixi de his, quibus aliquantulum id licet, vtpotè qui posterius cauum non secundum naturam penitus habeant, sed nimis sinuatum.

12

Qui brachium deligat, vbi sic figuratum contineatur, multa alia affert mala grauiora, quàm vulnus. Nam, si curuari brachium imperet, non ossa, non nerui, non caro eundem habitum seruabunt, sed vinculus cedentibus in aliam atq; aliam partem mouebuntur. Ecquid opus est sagittariorum habitum? qua in re nullus fortassis error fuisset, si sophista permisisset, vt homo ipse vulneratum brachium porrigeret.


D

Qui intentum brachium deuincit omnino (inquit) vel ita contineri iubet, vel curuari sinit: vtrumuis fecerit, egrotantem ledit. nam, si in eodem habitu contineatur, dolor assidue vrget: sin aliter figuretur, deprauatur brachium sub vinculo, quod eò spectat, vt membrum, sicuti compositum est ab iniectis fascijs contentum, sine vlllo pressu tueatur. at, si aliter figuretur, contrarium accidet, nempe, vt fractura vinculo non contineatur, sed moueatur, transferatur que vnà cum neruis habitum mutantibus, musculis que, quos carnem vocauit, eorum nobis naturam ostendens. Sunt enim muscoli caro sentiendi vim habens à simplici carne, ex qua maxime constant, caro nominati, per quos fibræ distribuuntur à neruis ac ligamentis diductæ. creatur enim totus musculus à natura eiusmodi fibræ contentus, quibus caro simplex vndique concreuit, atq; hæc est propria musculi natura, per quem venæ & arteriæ discurrent, vt non secus ac ceteræ partes, alatur & viuat: proprium verò musculorum corpus fibræ sunt, quæ simplici carne cinguntur, plurimum quidem medijs musculis, tum subinde minus, præsertim que in initio ac fine ipsorum. quocirca extremi muscoli nervosi magis sunt, medijs verò carnosius.

13

Quidam alius medicus resupinatum brachium extendi iussit, atque ita figuratum deuinxit, sibi persuasum habens hunc statum naturalem esse: quod ex cute coniciebat, & ex eo, quod ossa sic tueri naturalem habitum existeret. Quid
o. 115

ossis, quod in prima palmæ parte extat à parte minimi digiti, è regione collocetur eius ossis, vnde cubitum metimur. **E** Hæc adducebat ad comprobandum huiusmodi habitum esse naturalem, rationi quæ consentanea loqui videbatur. Sed brachium vehementer cruciari, si supinum extendatur, experiri quilibet in suo potest: nam si extendatur, hunc habitum dolori esse comperiet. Quin, si imbecillus homo manus prehensat valentis ita collocatas, ut cubitus resupinatus curvatur, utique, quod uolet, ipsum ducet. Manus nem eo modo collocata, si gladiū teneat, uti eo minimè poterit: & quæ adeo istiusmodi habitus violentus est. Ad hæc, ubi brachium in eo habitu vincitur, grauiori dolore torquetur homo, dum ingreditur: graui, dum cubabit. Quod si brachium flectatur, necesse est musculos contrahi, & ossa in eodem habitu minimè contineri. Ignorabat autem illud, præter alia, quæ in huiusmodi habitu in omni modo accidunt, quod os in prima palmæ parte extans à parte minimi digiti, cubiti pars est: illud verò, quod in cubiti iunctura est, vnde cubitum metimur, est humeri caput.



Directio interioris tuberculi brachij ad finem cubiti

Si quis brachium resupinauerit, videbitur humeri caput ab interiori parte, quod græcè κόνδυλος id est tuberculum, nominatur, esse caput superius cubiti, cum quodammodo è regione se ostendat capitis inferioris, quod in prima palmæ parte extat à parte minimi digiti. Non tamen omnes cubitum metiuntur ab humeri tuberculo: sed sunt, qui metiri incipiant, id quæ rectè, à cubiti eminentia, quam græci ὀλέκρανον dicunt & ἀγκύρα. At Hippocrates, cum dixit vnde cubitum metimur, significare videtur, vel omnes, vel plerisque inde metiri. Quomodo autem sese res habeat, hic querere

superuacaneum est. illud meminisse oportet, quod inferius cubiti caput situm in prima palmæ parte è regione superiori capiti respondet, ubi secundum naturam brachium figuretur, ut scilicet curua pars interior sit, gibba exterior: in quo habitu fit, ut minimus digitus ab inferiori parte subiciatur, pollex à superiori insidat.

14 Hic verò putauit hoc idem os esse atque illud.

Non ita dixit / hoc idem os esse, atque illud / sicuti aliquem eundem cum se ipso dicimus, ut Aiacem Telamonium eundem cum Æacide, sed quod utrunque ossis extremum intelligat eiusdem **G** esse, nempè cubiti.

15 Est autem idem cum illo eminentia cubiti, cui potissimum innitimur.

Vocabulum /idem/ accipiendum nunc quoque est eodem modo, quo proximis verbis explanauimus, cum vnus & eiusdem ossis partes esse existimarent, quod in prima parte palmæ situm est, & quod ab interiori regione commissuræ cubiti extat.

16 Ergo, ubi brachium resupinetur, partim hoc os peruersum conspicitur: partim nerui, qui ab interiori sede, & digitorum, & primæ palmæ partis procedunt, supino brachio peruertuntur: tendunt enim huiusmodi nerui ad humeri os, vnde cubitum metimur. Errores, atq; ignorationes naturæ brachij tot ac tales sunt. Si quis autem (ut præcepimus) fractum brachium extendat, dirigetur os, quod à parte minimi digiti ad cubiti eminentiam tendit: dirigentur item nerui, qui à prima palmæ parte ad extremum humerum pertinent: suspensum quæ brachium in eodem habitu continetur, in quo fuerit colligatum, neque dolori erit, aut molestia, siue ingreditur homo, siue cubet.



Distortio neruorum & musculorum & ossis cubiti in resupinatione manus.

H Quum accidit, ut ossis cuiuspiam, vel nerui, vel musculi initium sit ab interiori parte membri: finis vel ab exteriori, vel ab inferiori: constat partem hanc peruersam esse. Rectè igitur dixit omnia hæc peruersti, ubi totum brachium resupinetur. Ac ne longius exempla petamus, nerui, qui ab interiori parte feruntur ad manum, cum cubito iunguntur circa totum humeri caput. Fiet itaque resupinato brachio, ut neruorum, qui cubito illigantur, initia ab interiori parte collocetur, fines à superiori. idè accidet musculis, & ipsius cubiti ossi: horum enim omnium initia ab interiori parte sunt iuxta tuberculum humeri. Poterant aut per se musculi, cum peruerterent, abundè dolorè excitare, atq; ea de causa inflammationē. Si quis aut brachium figurauerit, ut Hippocrates iussit, musculi, qui ab interiori parte cubiti oriuntur, toti ab interiori parte sit erunt, qui

A qui ab exteriori, in hac similiter continebuntur: quemadmodum, qui à superiori, positum à superiori tuebuntur in vniuerso membro. Ab inferiori autē cubiti parte nullus situs est omnino musculus. sed, si cubiti musculorum omnium situm cognoscere tibi curæ est, ex primo libro de incidendorum corporum ratione addiscere poteris: tum ex opere de musculis incidendis, vbi musculorum omnium natura ad compendium confertur magis, quàm in libro de incidendorum corporum ratione.

- 17 Collocari sic hominem oportet, vt id ossis, quod excedit, ad lumen quantum maxime potest, illustre conuertatur, ne Chirurgicum lateat, dum intēdit, quando satis fuerit directum. Porro, qui vsus habeat, quum adnota manu os excedens continget, rem optime comprehendet.

Siue iacere, siue sedere, significare voluerit verbo /collocari/ quod καθικεῖσθαι dixit, cum altero alterum quoque intelligendum est. Nam si ægri vires, & fracturæ magnitudinem, intueamur, ipsum modò iacentem, modò sedentem, vinciemus. Verum vtrouis modo collocetur, vt vitata pars conspectui magis pateat, ex luminibus quæ dantur, spectare debet ad maxime illustre.

B

DE BRACHIO

- 18 Ossium brachij, cum non vtrunque fractum est, facilius curatio est, quibus quod superius, comminuitur, quamuis plenius sit: tum quia integrum, quod subiectum est, fundamenti vicem præstat: tum quia facilius reconditur, præter quàm in vicinia manus. Superius enim os carne plurimum contegitur: id uerò, quod subiectum est, minime carnosum est, ægrè conditur, ac maiori vi extenditur.

Indicauit brachiū ex binis ossibus constare, vbi ait /ὅν καὶ ἀμφοτέρω/, id est cum non vtrunq;. non enim consuevit dictio ἀμφοτέρω græcè vsurpari ad vnum, vel tria, vel plura significanda. Ex his ergo binis ossibus, quod subiectum est πῦξ, id est cubitus, propriè vocatur, id quæ sanè longius est: quod superinsidet κερκίς, id est radius. Plana autem est, non modò oratio hæc, sed reliquæ ferè omnes huius libri. Illa duntaxat explanationis mihi visa sunt indigere, quæ à me enodantur. Quare si quid præter hæc obscurum tibi videatur, spectato, num quid in exemplari fuerit mendosum. vbi enim correxeris, si quid lectum semel non comprehenderis, iterum ac tertio relegens, quod propositum est, optime percipies.

- 19 C Vbi non hoc, sed illud fuerit comminutum, satisfacet simplicior vis in intendendo: vbi vtrunq; extendere valentius oportet. Puerum iam vidi plus iusto intentum: sed plerique, minus quàm res postulat, extenduntur.

Vim simpliciore, & quæ non magno negotio adhibetur, φαλοτέραν dixit. φαλοι enim apud veteres græcos, non solum significat vitiatum, sed simplex.

- 20 Intentione adhibita, conuenit admotis prominentioribus palmarum partibus dirigere.

Prominentiores partes palmarum appellant θέναρα deducto vocabulo à percutiendo, quod θένειν græci dicunt, vt non nulli volunt, qui verborum interpretationibus student. Quicquid enim percutimus, prominentioribus his partibus percutimus. Alij non omnes prominentiores palmarum partes sic appellatas existimant, sed eas tantum, quæ pollicis subiiciuntur.

- 21 Deinde cerato inungere non ita liberaliter, ne fasciæ superinnatent, atque hoc modo deuincire.

Vinculi vsus duplex est, nam & comminuti ossis partes, quæ rectè inter se composita fuerint, fideliter continet, & lintea liquore aliquo respersa, vel illita medicamento quod ad repellendam inflammationem præsentissimum esse putauerimus, decidere non patitur. Adhibent itaq; non nulla medicamenta, quæ linteis illinuntur, his quæ excepta imponunt, vinculum superdantes. Alij humorem aliquem ingerunt ad rem idoneum, quale est vinum, vel per se, vel cum oleo, & sæpè liquidum aliquod medicamentum, cuiusmodi est ceratum hoc. cuius duplex ratio est: interdum liquidum cera ex rosa, vel oleo liquatur: interdum arida pix adiicitur, hinc q; πισσινὰ κηρωτῇ græcè nominatur. Sed liquida medicamenta, spissa quoque sunt & crassa, cuiusmodi est liquidum ceratum. Fiunt autem & ex emplastris inflammationem arcentibus, liquatis in oleo, de quibus loquuti sumus & in opere de simplicium medicamentorum facultate, sed latius in eo, quod scripsimus de ratione curandi, & in eo, quod de compositione medicamentorum. Hippocrates igitur liquido cerato vtitur, quod multò magis inflammationem coercet, quàm quod durum est, seu quouis alio nomine libeat appellare. Modum verò vtendi huiusmodi cerato indicauit inquitens /nō ita liberaliter, ne fasciæ superinnatēt/. sed cōtrarium terminum, vt pote, qui nobis notus sit, præterit. is autem est, ne ceratum ita parum inungatur, vt iniecta lintea siccescant, prius quàm tertio quoque die resoluantur. At qua de causa cerato, nunc inungendum dixerit, considerandum est, quum, vbi os cute excedit, vinum nigrum austerum superintundi iusserit. Mihi sanè videtur vinum excogitasse ad hæc tanquam prælidium efficacius: omisille verò in aliis fracturis, vbi nullū

ex comminutis ossibus nudatum est, eo quod uini usus summam diligentiam postulet, nam, nisi E subinde infundatur, aridae fasciae maximo sunt detrimento. Plurique autem ex iis, qui laborantibus feruiunt, recusant subinde infundere, noctu praesertim. Sed quia extremus morbus extrema curatione perfecte restituitur, idcirco quibus excedit os, ut vinum superinfunderetur, edixit. Sed plura de facultate vini dicemus, ubi eo utitur. nunc illud indicasse satis sit, quod, cum alia fracturae sola cerati inunctione curari sine vino possint, non necesse est hoc adhibito grauiter interdum ob ministrorum negligentiam peccare. At, quum summum periculum circumstat, tunc & ipsi vltro fatigandos se praebent, & nobis imperantibus parent. Adde, quod nos etiam ob periculum ingens frequentius his adsumus, atque interdum vniuersam noctem immoramur, ubi veremur, ut ministri recte exequuturi sint, quae praecepimus.

- 22 *Cura habita, ne manus inferior iunctura cubiti collocetur, sed paulo superior, ne sanguis ad imum fluat, sed retineatur.*

Cubitum ita figurandum esse, ut radio subiiciatur, atque ad rectum angulum cum humero collocetur, in superioribus proditum est. Sed, quum hoc fieri possit, manu & supra & infra cubiti regionem posita, merito hoc quoque definiuit, imperans, ut manus paulo sublimior, quam iunctura F cubiti habeatur. Constat enim, ubi membra dependeant, ad ima concurrere materiam: ac propterea, quemadmodum, qui totum diem inambulant, quibusque crura calidiora sunt, maximi momenti censent noctu hanc vniuerso corpore sublimiora continere, ita iubet Hippocrates, ut caueamus, ne manus dependeat, sed sublimior collocetur. quod si cubiti iunctura multo sublimiorem figurari iussisset, huiusmodi habitus in iis etiam, qui paululum in eo perseverant, dolorem afferret vniuerso brachio, potissimumque musculis a priori parte humeri sitis. Eum autem habitum dolori esse docebit ipsa experientia: doloris vero causam ostendet natura musculorum, cubiti iuncturam mouentium. sunt enim & a priori, & ab interiori parte humeri, atque ubi cubitum flectimus, ad suum initium contrahuntur, & sursum versus intenduntur, cumque ipsi contrahuntur ac sursum tenditur totum brachium, cui suis imis partibus iunguntur. /Ne sanguis ad imum fluat, sed retineatur/. verba haec referenda sunt ad illud /ne manus inferior iunctura cubiti collocetur/. interposuit autem /sed paulo superior/ sic, ut tota oratio sit huiusmodi: Cura habita, ne manus inferior iunctura cubiti collocetur, ne sanguis ad imum fluat, sed paulo superior retineatur.

- 23 *Post haec fascia alligare, capite, qua fractura est, iniecto.*

G

Potest iniici caput, vel non iniici, qua fractura est, dupliciter. cum id modo in longitudine membri, modo in latitudine, accipiat. Termini autem iniiciendi fasciae caput in longitudinem membri sunt, ubi primus fasciae circuitus in orbem attractus fracturam vniuersam complectitur. Quod si, vel superius iniiciatur, quam ut fracturam contingat, vel inferius, quam ut ad ipsam perueniat, caput hoc verè quis poterit asserere minimè iniectum esse, qua fractura est. sic mihi intelligito iniectum, vel non iniectum caput, qua fractura est, sed in latitudinem, cum fasciae caput primò superdatum, vel qua fractura est vel extra procedet. Hic igitur Hippocrates membri longitudinem intuitus, caput, qua fractura est, iniiciendum esse proposuit, hoc est, neque fractura inferius, neque sublimius. quod indicauit per ea, quae subdit, quum inquit /ubi super fracturam iterum & tertio circumierit, sursum feratur/. At in libro de officina medici, cum ait, ||Principia iniicienda sunt, non qua vlcus, sed hinc vel hinc. ad membri latitudinem spectauit, ut ibi rursus demonstrat verbis *ἐνθα ἢ ἐνθα*, id est hinc vel hinc, his enim vocibus graece latitudo significatur. Pleraque autem exemplaria sic leguntur /Principia iniicienda sunt, non qua vlcus, sed qua nodus/.

Sect. 2. t. 8. 7.
207. f

- 24 *Sic ut insidat, non tamen vehementer adstringat.*

H

Docet hoc loco vinculi moderationem. id siquidem insidere debet eatenus, dum fracti ossis extrema immobilia tueatur: non tamen ita arctari, ut dolorem afferat laboranti. Quilibet enim dolor, cum perseverat, praesertim si ex compressione est, inflammationem concitat. Haec igitur spectari debent in fasciis coarctandis, quae initio ad vnguem conicere non licet: licet autem, ubi sapius deuinxerimus. nam diligenter animaduertentes modum adstringendi, cum vinculum iniicimus, interrogantesque hominem, qualem circumdatam fasciam sentiat, iterum aequè ac primò iniicientes, laxare vel adstringere oportet: si quidem premi se dixerit, proculdubio laxare: sin vinculum ita laxum affirmet, ut iniectum minimè sentiat, adstringere. Licet autem, prius quam eum alligemus, quem fractura male habet, exerceri, sanum puerum sapius vinciendo, sed cum eo, ut percontemur, quae paulò antè interroganda proposuimus. sicut enim promptiores erimus ad fracturas deligandas. Illud etiam perspicere oportet, quod quaecunque corpora robustiora sunt ac duriora, vinculum sustinent arctius adstrictum: quae verò infirmiora sunt & molliora, lenius adstringi debent.

Vbi

25 A Vbi super fracturam iterum, aut tertio circumierit, sursum feratur, ut fluens sanguis retineatur, atq; ibi subsistat.

Ipsè causam exposuit, cur primò velit fasciam sursum ferri: vult enim sanguinem prohiberi, quò minùs à superioribus membri partibus descendat. hac autem vinciendo ratione, non solum coercetur ille, qui fluit, sed, qui circa fracturam coit, exprimitur: qui fluit, vno duntaxat itinere fertur à superiori parte deorsum: qui exprimitur vtroque, & à superiori parte deorsum, & ab inferiori sursum. Depelli enim aliquid potest, & ad superiorem membri partem, & ad inferiorem. monet sanè, ut vtrique operam demus, quum duas adhiberi fascias iubet, quarum utraque ordiatur ab affecta sede, habita longitudinis ratione: deinde prior sursum procedat, secunda deorsum: quoniam præstat sanguinem à vitata sede exprimi ad summum membrum, atque ad totum corpus, inum enim minus est, quàm ut sine iniuria recipere succorum copiam possit, quandoquidem, postquam sub priori fascia sanguis transmissus est ad summum brachium, si altera arctius adstringatur, inflammatio iuxta primam palmæ partē & digitos orietur. Hac igitur de causa antè ad superiora depellendum est, potissimum q3, si fieri potest omne id, quod dolori foret: sed, si paulum quid relictum fuerit, exprimendum ad inferiora, altera fascia iniecta. Totam hanc sententiam

B perfectius intelliges in sermone de ratione vinciendo.

26 Prior fascia, longa ne sit.

Iure hoc adscripsit: prior enim fascia, quum à fractura incipiat, & ad superiora feratur, atq; ibi desinat, breuior sit, necesse est, quàm secunda. Hanc enim voluit à fractura orsam primò deorsum ferri, deinde sursum, ad eum locum, vbi prior finiebatur.

27 Secunda primum super fracturam iniiciatur.

Non immerito: inde enim excerni plurimum sanguinis constituit.

28 Ac semel super ipsam circumeat.

Secundæ fasciæ caput semel circuire iussit, non bis vel ter, sicut prioris. vult enim ob propositam causam sursum magis, quàm deorsum, transferri id, quod ad fracturam collectum est.

29 Tum deorsum demittatur, lenius adstringatur, atque ex maiori intervallo circumdetur.

C Minus adstringi membrum iussit à secunda fascia ob causas propositas: quin & eius circuitus non ita spissos adhiberi, quum id opis, quod spissi afferunt circuitus, à priori fascia satis afferatur.

30 Vt possit relata ad eam partem, qua prior desinit, peruenire.

Hippocrates, antequàm pannos superimponat, binas fascias adhibet. alij verò ternis vtuntur, vna, quæ à fractura incipiens sursum tendat, quemadmodum Hippocrates præcepit: altera, quæ à fractura deorsum: ac tertia, quæ ab inferiori parte sursum per priorem vtranq; in cochleam serpat. Verum hi secundam fasciam duabus prioribus breuiorem iniiciunt, illas verò inter se æquales, propterea, quod prima fascia super fracturam ipsam iterum ac tertio circumeat, membrum q3 ipsum spissiori ambitu complectatur: secunda semel super fracturam voluta ex maiori intervallo circumdetur: tertia super vtranq; obuoluatur, & quia minus spissè circumagitur, primæ longitudinem non excedat. Sed constat (etiam me tacente) tres positas fascias duabus, quas Hippocrates prodidit, contineri, quum secunda duplicem vsum præstet, quem illi partiti sunt, vnam iniicientes, quæ à fractura procederet ad partē inferiorem: alterā, quæ hinc sursum, quæ prima finiebatur.

31 D Attrahere verò fascias in hoc casu, vel à dextra debemus vel à sinistra, prout ab hac vel illa parte, ad fracturæ habitum, atque inclinationem in hanc vel illam regionem, confert.

Ossa, quæ sub fracturis peruertuntur, modò in dextram membri partem, modò in sinistram, declinantur. Quocirca priores duæ fasciæ attrahi à contraria debent, ab ea scilicet orsa, in quam membrum conuertitur, atque in contrariam inclinata. sic enim fractum os æquè in vtramq; partem inclinabit. atq; hoc est, quod nunc ab Hippocrate proponitur, quum præcipit, ut fracturæ habitum intuiti fasciam circumagamus, hoc est, ut ad contrariam partem, atque fractura inclinat, fasciam adducamus.

32 Post hæc panni superdentur modico cerato inuncti, siquidem leniores sunt, & stabiliores.

Panni duas fascias priores fulciunt, quas propriè ὀποδερμίδας vocat. Iniiciuntur autem contraria rōne ac fasciæ: ille enim serpūt circa membrū transuersæ: panni verò in longitudinē dantur, vniuersum

vnuerfum vinculum ex binis prioribus fascijs excipientes. iussit autem cerato modicè inungi. **E** fluerent enim, vbi cerati copia labarent, non secus ac, si parum inungerentur, quòd subiectis fasciis minimè coirent. exhibet enim ceratum vicem glutinantis. constat autem in aliis, quæ glutine colligantur modum esse optimum. Panni igitur comprimunt, vbi sicci imponantur, cui oppositur, quod inquit /leniores/: sicut & quod dicit /stabiliores/ illis cōtrarium est, qui ob cerati copiam non hærent. Iure itaque ait /liquidem leniores sunt, & stabiliores/. namque, vbi panni nullo pacto cerato inungantur, non ampliùs lenes sunt: vbi plus iusto vncti sint, non ampliùs stabiles, labuntur enim copia cerati.

- 33 *Hi fascijs alligandi sunt inter se aduersis, alijs à dextra parte, alijs à sinistra, plurimum ab inferiori parte sursum dextra, aliquatenus à superiori deorsum.*

Fasciæ, quæ primò dabantur, non circuibant inter se aduersæ, sed utraq; membrum, quod peruersum erat, à contrario habitu ad naturalem restituebat: sed, quæ pannis superiniiciuntur, cum eò pertineant, vt membrum vnuerfum alligent, tueanturque vinculum vnuerfum, quale exeperint, aduersæ inter se procedunt, atq; vna quidem à dextra parte, altera à sinistra circumagitur: **F** similiter altera à superiori, altera ab inferiori: sic enim, quum inter se aduersæ sint, vinculum, quale acceperint, potissimum seruabunt. Quare quatenus à dextra parte vel sinistra procedunt, iunctura ex toto fit æqualis: quatenus verò à superiori vel inferiori feruntur, altera non longè alteram excedit, sepius tamè circuit, quæ ab inferiori parte sursum tendit, hoc liquidem tutius est, ob causam, quæ paulò suprà posita est, vbi iussit sanguinè à fractura depelli ad summū membrum.

- 34 *Quæ extremitate tenuantur, pannus æquanda sunt in orbem datis, qui, vbi ea dirigimus, non subitò, sed paulatim plurimi obuoluendi sunt.*

Tenuantur membrorum extrema, quæ dixit ὑπόξιννα. Has igitur partes circumdatis pannis transuersis compleri voluit, & pluribus fasciæ circuitibus cingi, cum eo, vt quod tenuius est, non subitò (sic enim vinculum inæquale redderes) sed paulatim impleatur.

- 35 *Laxe quæ circa primam palmæ partem varijs locis vinciendi.*

Solent iuxta vitiatam sedem loca omnia inflammatione affici, ac præcipuè membrorum extremitates, quoniam paruæ sunt, & minimè carnosæ, & idcirco materiam à locis, qui iuxta fracturam sunt, descendente non recipiunt citra noxam. Eas igitur leuare constituit cerati inunctione, quod non expedit per se membris imponi sine vlllo tegmento, sine alijs fasciis. nam cum caput & finem haberet sine aliquo fulcro, citò caderet, idcirco vsus est fasciis totius fracturæ, quas iure laxas iniicit, vt nullam afferant molestiam, sed id vnum duntaxat efficiant, vt inflammationem arceant, non enim admouentur ad id, quod fractum est continendum.

- 36 *Quod ad linteorum multitudinem pertinet, duas partes primò abundè est superdare.*

Ad vnuerfum vinculum, quod primum omnium damus, censet paucioribus linteis opus esse, quàm procedente tempore futurum sit. docuit enim paulò infra, quo tempore plurimis vt fasciis conueniat. Sed, quum linteorum multitudo, fasciarum & pannorum numero longitudineq; augeatur, quæret quis num idoneo tempore, maiora an plura lintea iniici velit: quin & quanta singula esse debeant. Porro longitudinem & latitudinem fasciarum definiuit in libro de officina **H** medici, quum inquit, || Quod verò ad longitudinem & latitudinem pertinet, impleant trium, quatuor, quinque, aut sex, longitudinem quidem cubitorum, latitudinem verò digitorum. At neque numerum nunc silentio præterit, ex fasciis enim, quæ primæ iniiciuntur, duas dari iussit per vnuerfum vinculum, pannos item duplices triplicesue superiniiciendos esse, ibi quoq; explicauit: quos esse voluit tot numero, vt complecti queat vnuerfum membrum. Sed fasciæ, quæ super pannos dantur, plerumque duæ sint, quarum vna ab inferiori parte sursum tendat, altera à superiori deorsum. has etiam licet & ternas, & quaternas imponere. nos autem binis vbique utimur. igitur, qui in hæc incumbet, duas linteorum partes initio: sed quo tempore vitiat locus inflammatione vacat, tres dandas esse cōiiciet. In libro itaq; (vt diximus) de officina medici, fasciarum longitudinem definiuit, iubens, vt superiniiciantur longæ ternos vel quaternos cubitos, ni mirum hominis, qui deuincitur. nam ridiculum esset puerum exempli causa bimum vel trium fasciis ita longis alligare, vt robusti hominis quaternos cubitos æquent: vel ad robustum ita breues adhibere, vt quaternos pueri cubitos impleant. Sed in hoc opere, fasciarum longitudinē

A longitudinem non statuit, sicut neque latitudinem, ea nobis conicienda relinquens. Constat autem fracturæ magnitudine inspecta inueniri a nobis longitudinem fasciarum, quum (vt ipse imperauit) debeat vinculum semper plurimum integræ partis comprehendere. Hæc non conuenit eadem vbiq̃ue, sed pro magnitudine fracturæ, vt diximus. Quod si iterum, aut tertio super fracturam circumagenda prima fascia est: postea crebris circuitibus voluta non prius finienda, quam integræ sedis plurimum complexa fuerit: planè debet ita longa sumi, vt propolis ab Hippocrate circuitibus sufficiat. Eadem ratione, & aliarum fasciarum longitudo tanta sit, vt sufficiat deleripris ab ipso vinculis. Porro fasciarum latitudinem comperies, si ad ea, quæ ipse docuit, respexeris. inquit enim /fulciantur, non tamen cogantur/. significat autem fulciri quali hæcere. quod fiet, vbi fasciæ non ita latæ parentur, hæc siquidem rugant, quum circumaguntur. nam alioquin latior fascia, vt quæ plurimum amplectatur, fracti ossis partes firmitus continet, atque hac de causa latissima fascia ex vñu maximè est. verum, quia, quæ talis est, rugas contrahens, quum super affectas partes est obuoluta, laxior fit, & quæ subiecta sunt, minus fideliter continet, idcirco expedit, non ita latam imponere, sed eatenus eius latitudinem augere, quatenus nulla pars laxatur. Quamobrè experiens hæc omnia melius præstabit: eiusmodi enim obseruationes coniecturales sunt, neque

B scriptura comprehendere aut lectione possunt. Ob quam verò causam plures fascias dari postea velit, tunc intelliges, cum ad eum locum peruenerimus.

37 *Hinc autem cognosces rectè hominem curatum esse, ac terminum deligandi, vbi, num prematur, rogaueris: atque is responderit se premi quidem, sed leuiter, id quæ præserim qua fractura est. Hæc itaque sic habere, necesse est fateatur, qui rectè est alligatus.*

Quoniam ea, quæ nos spectamus in fasciis obuoluendis, intelligit non comprehendere scientia, sed coniectura, ex certis indicis iudicandum censet, quæ rectè iniectione fuerint, quæ malè. Quod si homo abundè sub fasciis vrgeatur, celerrimè soluentes aptius deligabimus: si fasciarum circuitus iusto laxiores fuerint, non patiemur diutius sic habere: nam, quæ arctius adstringuntur, dolent, inflammantur, & interdum etiam extrema parte emoriuntur: quæ laxius, prorsus eiusmodi periculo vacant, sed non prohibent membrum, quo minus, quæ fractura est, deprauetur. Vrget igitur arctior iunctura sic, vt necesse sit eodem die soluere, & rursus deligare: quæ laxior est, non item, potest enim vñum diem, & interdum alterum sustineri. Hac igitur de causa diligenter

Crogare eum, qui alligatus est, conuenit, qualem sentiat fasciarum circuitum: vt ex iis, quæ respondet, aliquid de fasciis emendandis intelligamus. Debet enim (inquit) respondere, qui alligatus est, sentire se vinculum arctius iuxta fracturam, quam alijs partibus ipsius membri. ea enim sedes inter eas, quæ adstringuntur, acerrimè sentit, quod & ægra sit, & fascia à nobis magis compressa, vt potè, qui operam dederimus, vt sanguis vniuersus à fractura longè ad vtramque membri extremitatem exprimeretur, siquidem hac via futurum sit, vt quod vitiatum est, ab inflammatione defendatur.

38 *Moderationis autem indicia sunt, si eodem die ac nocte, quo deligatus fuerit, ipse sibi videatur non leuius, sed valentius, adstringi: postridie vero tumor in manu oriatur mollis ac paruus: indicant hæc vinculum fuisse abste moderate adstrictum.*

Quum adstringendi modus in vinciendo omnium maximè momentum habeat: quum que hic variari consueuerit, tam quod quædam partes mollitie ac duritie inter se distent, quam quod alia corpora hebetioris sensus natura sunt, alia acrioris: meritò contendit ex pluribus notis securitatem ægrotantium inuestigare. atque hac de causa non contentus sola posuisse indicia, quæ ex interrogatione sumuntur, inspiciendas etiam nobis ipsas partes existimat, potissimum extremas. Inquit enim, vbi moderate adstrinxerimus, futurum postridie in manu paruus tumorem mollem, hoc est cedentem, si superdatis digitis prematur. Quare, si tumor hic, vel nullus appareat, vel durus, planè scire licet vinculum, vbi nullus appareat, non satis fuisse adstrictum: vbi durus, nimis arctatum. Constat enim extremum membrum succis sub vinculo ad ipsum transmissis, quum multi sint, impleri, digitis que pressum non cedere. id quæ tibi indicio erit vinculi valentius adstricti, non secus atque, vbi manus nullo modo tumeat, conicere poteris nihil fuisse sub vinculo expressum. nanque adstringendi modo modus eorum, quæ exprimuntur, perpetuo respondet: & huic modus tumoris. Quare non immeritò renititur tumor in extremitate membri: atque ingens est, vbi coniminita pars eius fortiter fuerit adstricta: cedit atque exiguus est, vbi leuiter: non secus autem, vbi non adstringitur, nullus tumor excitatur. ergo euidentissimum est, vbi postridie in manu tumor magnus sit, & renitatur, membrum solui protinus debere, perfundi que multa aqua calida, cui oleum copiose fuerit adiectum, rursus que alligari modicè adstrictum: vbi

postero die nullus tumor appareat, tertio resolui, & arctius alligari. quod si tumor modicus fuerit, Hippocrates tertio die resoluit: nos usque quartum, interdum quintum diem trahentes, hyme potissimum, nihil vidimus deterius accidisse.

- 39 Labente iam die minus adstrictas fascias sentiat, sed tertio die penè resolutas. Scire autem licet, si quid horum, quæ proposuimus, absit, vinculum non satis arctatum: siquid superet, fuisse iusto plus adstrictum. Hæc itaque indicia intuitus, deinceps, vel laxius alligabis, vel arctè magis.

Relaxantur fasciæ, non mehercle (vt non nulli putant) quod intentæ tempore longiores appareant, sed quod membrum extenuatum contrahatur, vbi rectè fuerit alligatum: quod euidenter in omni fractura perpetuum conspicitur, quemadmodum & ipse Hippocrates ostendet.

- 40 Tertio die, postquam extenderis atque direxeris, soluere membrum oportet. Quod si primis diebus moderatè deuinxeris, paulo magis fascias adstringes. Deligare autem incipies à fractura, quemadmodum prius: nam, si hanc partem prius deuinxeris, materiam inde ad vtramque membri extremitatem depelles: sin aliam prius adstringeris, inde ad fracturam deduces, quod intellexisse pertinet ad multos locos. Sic ergo ordini semper vinculum debet, atque hunc locum primum adstringere, alios verò pro portione: quo enim longius à fractura procedit, eo lenius arctari: nunquam verò ex toto laxari, sed adherere: post hæc aduciendæ fasciæ sunt, quotiescunque deuincimus. Rogatus autem homo respondeat adstringi se paulò magis quàm antè, præsertim qua fractura est, atque alibi pro ratione. Tumeat itè membrum, vigeatur, leuetur, pro ratione prioris iuncturæ. Abhinc tertio die sentiat fascias relaxari. Tum soluere conuenit, ac rursus deligare paulò arctius omnibus fasciis iniectis, quibus utendum erit. Post hæc laborantia omnia eueniant, quæ in superioribus alligandi circuitibus exposita sunt.

Si primo die homine propter fracturam dolente, quantum adstringendum est, non adstringerimus, vbi, omnibus rectè factis, tertio die dolor remittatur, arctius alligamus, neque tunc quoque quantum res postulat: hoc siquidem, quum omnia rectè procedunt, quinto die conuenit. quare tunc plurimis fasciis utemur, & quantum res exigit, adstrictis, non obliui hoc ab ipso præcipi, vbi omnia conuenienti ordine sequantur. nam, si propterea quod aliquid interim peccatum sit, brachium non dum quinto die ex toto inflammatione vacet, neque nos fasciis omnibus utemur. Exhibet quidem fasciarum multitudo (vt ipse ait) vinculi firmitatem. potissimum verò ea utemur, quo tempore defecit locus, qui circa fracturam est: & ipsum os, quod perfractum est, laxius effectum est, & facilius tractatur, vt componi possit. At si quando hoc quinto die non cedat, differemus in alium circuitum, qui ad diem septimum perueniet: iubet enim donec ferulæ ad fracturam dentur, tertio quoque die solui, ac rursus deligari, ea de causâ, vt aqua calida infundatur ad educendos succos in comminuta parte existentes, qui tenues sunt, & ferè naturam habent, digestionem que requirunt: & simul etiam ad leniendum dolorem, & pruriginem finiendam. Itaque, vbi nec dolor nec prurigo hominem exerceat, atque indicia illa omnia se ostendant, ex quibus rectè fracturam habere cognoscimus, etiam si quarto quoque die solues, nihil ledes, hyme potissimum, atque adeò magis homines agrestes, qui lauari ferè non consueverunt: sed eos, qui cotidie lauati solent, & qui præsertim bis id faciunt, conuenit non longo interpolato spacio resolui, ac præcipuè, vbi carne fuerint molliori.

- 41 Inde, vbi ad tertium diem ventum erit, qui septimus est à primo, quum iniectum vinculum fuit, si rectè alligatus fuerit, tumor in manu apparebit, is que non admodum magnus: locus item, cui vinculum iniicitur, quotiescunque deligabitur, tenuior & gracilior conspicietur, septimo autem die tenuissimus: atque ossa perrupta tractantur facilius, magis que ducentur, vt dirigantur. Quod si hæc ita habeant, dirigere oportet, alligare que, ac ferulas excipere, paulo que amplius, quam antè adstringere, nisi si tumor, qui in manu est, maiorem dolorem afferat. Vbi verò fascias inieceris, imponendæ ferulæ sunt, super que fasciæ alligandæ admodum laxæ, sic, vt circundatæ ferulæ contineantur, nec quidquam brachium adstringant. Quo facto prematur offensus eodem modo & releuetur, atque in prioribus vincienti circuitibus. At, vbi ad tertium diem perueniens laxum vinculum sentiat, necesse est ferulæ magis arctentur, potissimum qua fractura est, atque alibi pro ratione: si quidem ipsum vinculum laxum potius erat, quam adstrictum. Pleniores autem adhibendæ ferulæ sunt ab ea parte, qua fractura extat, non multo tamen: videndum que est, ne e regione pollicis collocentur, sed hinc vel hinc: neque item e regione minimi digiti, qua os in prima palmæ parte excedit, sed hinc vel hinc. Verum, si fractura omnino ferulas requirit, his locis breuissimæ superaccommodandæ, sic, vt ad ossa, quæ in prima palmæ parte extant, minimè pertineant: periculum enim esset, ne vlcus fieret, & nervi nudarentur. Debemus autè ferulas arctare tertio quoque die paululum omnino, id spectantes, quod eo nomine imponuntur, vt vinculum tueantur, non vt adstringant. Quod si optimè perspexeris ossa sub prioribus vinculis abundè fuisse directæ, neque locum prurigo aliqua infestat, neque vlla exulcerationis suspicio est, ultra vigesimum diem finito alligatas ferulas manere: nam plerisque summum triginta diebus brachij ossa conferuent.

Si tertius

A Si tertius dies fractum os nobis daret, quale ferè septimus exhibet, necessariò ad ferulas veni-
remus: sed quia (vt ipse dixit) septimo die *πᾶν λεπτόν*, id est tenuissimum apparet, quo voca-
bulo significauit gracilius fieri, quàm quum erat in pristino statu salubri, idcirco eodem die feru-
las circumponit, tunc scilicet membrum diligentius componens, vt potè quum ossa laxiora sint,
eò autem ferulæ pertinent, quò & pannos antè diximus, nempe vt fractū os cōtineant. at, quum
ossa ob siccitatem naturalem nequeant carnis modo coalescere, callo circa fracturæ oras increscen-
te, quasi quodam vinculo circundantur: hic autem creatur de eo quod superat, ex ipso fracti ossis
alimento. quòd si laborans vel nō idoneo victu vtatur, vel plenus sit, id, quod superat, copiosius
est, effusum que fascias totas veluti crasso sanguine madefacit. Quicquid igitur ex eo, dum effun-
ditur circa fracturæ oras concrescit, tempore ab osse, cui heret, mutatur, & simile ipsi redditur, cal-
lus que nominatur. Ergo, si fracti ossis oræ agitentur, dimoueantur que, prohibebitur, quo mi-
nus adstrictum maneat, atque idcirco creari callus & agglutinare non poterit. quod enim gluten
lignis efficit, quæ glutinantur, id callus præstat ossibus fractis. Iure igitur summa quiete opus est
ad fracturas, quæ callo debent solidari: nam, si agitetur coactus callus, dissoluitur, perinde ac glu-
ten, quo ligna coherent, & coactum lac. summam verò hanc quietem præbent fasciæ adstrictæ,
B & quæ superdata continent: porro continent fasciarum multitudo, ac ferulæ. Quæ deinceps se-
quuntur, omnia plana sunt, his, qui animum adiungunt. præcipit enim, vt sicubi vinculum laxetur,
ferulæ tertio quoq; die arctentur, non tamen resoluatur tota iunctura, nisi homo ingenti pru-
rigine vexetur, vel exulcerationis alicuius suspicio sit. prurit autem fractura initio magis, deinde
minus, quoniam vitata pars exhauritur. excitatur enim prurigo à vaporibus, qui ab eo, quod su-
perest, profusi leuiter mordent. At, vbi acrius mordeant, prurigini iā dolor iungitur. Igitur, quan-
do pars inanis est, nihil omnino tale superat, vel certè quàm minimum.

42 *Nihil autem perpetuum est: multum enim & ætas ab ætate distat.*

Non dixit simpliciter differre ætatem ab ætate, sed adiecta coniunctione indicat alias etiamnū
causas esse, cur non omnes brachij fracturæ triginta diebus consanescant, sed quedam paucioribus.
sunt enim in causa, anni tempus, regio, natura egrotantis, anni temperatio, ratio victus, & vin-
ciendi modus. nam citius conferuecunt, hoc est callo firmanentur, & ob materiæ, ex qua callus ori-
tur, quantitatem ac qualitatem moderatam, & ob robur virium ipsam cogentium. diutius autē
trahitur ex materiæ inopia, quod enim breuiori tempore ob materiæ copiam vires efficiūt, id lon-
C giori præstant ob inopiam, & interdum etiam ob copiam immodicam. callus enim concrescens
abluitur humore, qui ab interiori parte fluit, vbi multus sit, & continetur. Porro materia crassa
commode spissescit, & in callum vertitur: humor autem, vbi aquosus fuerit, & habitu tenuis, spif-
fando callo maximè est alienus. Vires quoq; quum valēt, maturè suo munere fungi: serò, quum
imbecillæ sunt: nihil attinet dicere. quibus de causis callus diuerso tempore fractis ossibus circum-
datur. Hæc autē ipsa, quæ nunc dicuntur, ob causas prius positas mutantur. quoniam materia, &
plus & minus abundat, & crassior est ac tenuior, ob temperamentum, tam vniuscuiusque natu-
rale, quàm aduentitium ipsius fracturæ eo tempore, quo curatur, atq; item ob victus rationē qua
homo vtitur, & ob modum quo deligatur, præter hæc ætatem, tempus anni, regionem: ex quibus
omnibus validiores vires sunt, aut infirmiores.

43 *Vbi solueris, aqua calida perfundito, & rursus alligato fasciis lenius quàm antè adstrictis, paucioribus itē quàm
antè iniectis: inde tertio quoque die soluens, rursus laxioribus fasciis & paucioribus deuincito.*

A primo die, vsq; dum ad ferulas veniat, & fasciarum numerum auget, & arctius adstringit:
D eas autem imponens septimo die, membrum non soluit vsque ad vigesimum, statuere quali fir-
mam basim volens calli producendi, quo circumdato fracturam penitus immobilem nō ampliùs
tuetur. nutrire enim callum oportet, vbi altius radices egit. nutritur autem, quum materia in ip-
sum deriuatur: quā sicuti ab initio auertimus ab affecta sede ad alias corporis partes, ita nunc euo-
care debemus aqua calida perfusa. quin & initio fasciis multis atque adstrictis, quo minus ad vi-
tium locum conflueret, ex toto ipsam prohibuimus: nunc paulatim numero demimus, pres-
sum que laxamus, quum non expediat prohibere, ne confluat.

44 *Quòd si alligatis ferulis suspicio sit, ne ossa rectè concurrerint, vel aliud quidpiam hominem infestet, vbi dimidiū
temporis præterierit, vel paulò ante, soluere oportet, & rursus deuincire.*

Superiora dicta sint, quum omnia rectè procedant: nanque, vbi sit sensus aliquis doloris, vel
exulcerationis suspicio, aut vereamur, ne fractura malè composita sit, aut casu aliquo interuenien-
te membrum motum sit, soluere vinculum ante vigesimum diem cogimur. id autem ipsum desi-
niuit, ne quis existimet perpetuum esse, quod supra imperauit, fracturam quamlibet vsque ad vi-

gesimum diem seruādam esse penitus immobilem. semper enim pugnare medicus debet aduersus id, quod magis vrget, neque obligare se præceptis tanquā legi, quam contemnere nephas sit, quū omnia præter rationem eueniunt.

- 45 *Quibus initio cutis non abrumpitur, neque os cute excedit, idonea est ratio victus propè quæuis: minus tamen cibi sumant vsque ad decimum diem, præsertim, quū quiescant.*

Φαῦλον vocabulum solent veteres græci ferè omnes vsurpare, quū significare volunt /simplex/ aut /quoduis/: huic opponitur exquisitum, quod Iones σκεθρὸν appellāt. Sicut igitur exquisitam victus rationem σκεθρὰν vocat, ita, huic contrariam φαύλην: atque hac ratione nunc eam, quæ propè quæuis sit, ὑποφαύλην dicit, quæ media est inter quamuis simpliciter, & exquisitam. Exquisitam victus rationem imperat, quibus initio, præter ossis fracturam, carnis quoque vulnus accessit, ac præcipuè, quū ex fracto osse aliquid cute excedit: simplicem, id est quāuis, illis, qui omnino periculo vacant: propè verò quāuis mediamque, quibus os fractum est primis diebus, quorum terminum constituit decimum: nō quod non interdum maturius, interdum serius, mutare victum liceat, sed quod plerunque ita accidat. Vtitur autem media victus ratione, propterea, quod neque ita magnum periculum est, sicut cū ossa nudantur: neq; ita res tuta, sicut cū intacto osse caro simpliciter vulneratur. meritò igitur iis, qui medij sunt inter eos, qui periculo vacant, & eos, qui periclitantur, mediam victus rationem indicit: præsertim, quū vsque ad decimum diem, quibus brachium fractum est, ex toto quiescant, quod Iones ἐλινύειν dicunt. Itaque par est exquilitiori victu sustinendos esse quiescentes, quā qui mouentur. at, quū à decimo die plerique suspenso brachio inambulent. meritò præcipit, vt in eum vsque diem medio victus genere vtantur, præsertim quū quiescāt. Quod /præsertim/ vertimus, Hippocrates habet ἡδ ἡ, quod plerunque tempus notat: sed adiicitur etiam ad aliquid comprobandum, vt, si dicamus, & ob alia, & ἡδ ἡ, hoc est, præsertim propter hæc credendum huic, faciendum hoc est: quomodo videtur nunc ab Hippocrate vsurpatum, sic, vt oratio talis sit. Mediocri victu vtēdum vsque ad decimum diem, & alia de causa, & præsertim, quū homo interim ex toto conquiescat.

- 46 *Adhibeant quæ ex obsonijs mollibus, quæcunque modicè admodum deiciunt aluum.*

Puissanam videlicet, betam, aut maluā, atriplicem, siue blitum, vel cucurbitā, & pisces teneros. G

- 47 *Sed à vino & carne sibi temperent.*

Docuit ipse exquisiti victus rationem, & eius, qui quiuis est, & eius, qui propè quiuis, quam nunc præcipit vsque in decimum diem seruari. nam, cū ager carnem edit, & vinum potat, victus simplex est, & quiuis: sed cū solo ptisanæ cremore, & mulla viuūt, victus tenuis est, atque exquisitus: inter vtrunq; est ille, quem proximè indicauit, quū inquit /adhibeant quæ ex obsonijs mollibus quæcunque aluum modicè deiciunt/.

- 48 *Tum paulatim se reficiant. Oratio hæc lex iusta fertur de curatione fracturæ.*

Reficiantur dixit ἀνακομίζεσθαι, quo vocabulo nihil aliud significat, quā, vt cui comminutum os est, postea recrectur. scribit autem ἐκ προσαγωγῆς, hoc est paulatim, cui contrarium est repente: damnat enim, quod subito plurimum implet, aut demit, vel quid aliud præstat.

- 49 *Quare danda opera est, vt iusta curatione adhibita res benè procedat: vbi autē non sic procedit, scire licet aliquid H curationi defuisse, aut superasse.*

Iustam vocauit eam, quæ laboranti omne id præbet, quod ei conuenit, & nihil prætermittit. curationem verò, quam χεῖριξιν dixit, vel pro chirurgia, vel pro vniuersa simpliciter rerum omnium admotione accipit. græci enim μεταχειρίζεσθαι dicunt, non solum, quæ manibusprehendunt, sed quæcunque tractant.

- 50 *Illud prætereà animaduertere in hoc simplici modo conuenit, quod medici non admodum attendunt: quanquā, si non rectè fiat, corrumpere curam omnem, omnem quæ vinciendi rationem potest.*

Simplicem modum fracti ossis, & prolapsi vocat, vbi non accedit vlcus: non nudatur os: neq; quod perfringitur, in multas partes comminuitur, quod fracture genus recentiores à farina ἀλφίτιδον appellant. ita, vt nullus ex propositis modis simplex sit, sed ille dūtaxat, vbi fracture nullus alius casus adiicitur. sic autē à se vsurpari vocabulum /ἀπλῆν, id est simplex/ aperte ostēdit paulò
infra

A infra in hoc ipso libro, vbi propriè eam rem agit. quòd si ossa simplici fracturæ modo perfringantur, peccatur, videtur què id peccatum leue: si quis tamen diligenter simul omnia estimet, maximum momentum habet, id enim, si committatur, priorem curam vniuersam corrumpit. quid autem hoc sit, in sequentibus ostendet. Scribitur item aliter eadem oratio sic / quanquam, si non rectè fiat, corrumpi omnis cura, omnis què vincendi ratio potest. vbi curâ ipsam, quum aliquid peccatur, damnare videtur, vt quæ corrumpere possit, quæcunque ad laborantem particulam rectè adhibita sunt.

Seft 3. l. 7.
242. b

51 Quòd si vtroque osse comminuto, vel eo quòd subiectum est tantum, deligatum brachium mitella suspendatur, ea quæ plurima circa fracturam detur: partes vero hinc atque hinc suspensæ sint: necesse est os ad superiora perueriti.

Diligenter voluit animaduertendum esse, qua ratione totum brachium suspendatur, quum homo iam ingreditur, & non amplius cubat, hoc est, à decimo die. ante siquidem plerumque cubabat brachio (quemadmodum supra ostensum est) ita figurato, vt manus paulò sublimior haberetur: sed, quum iam inambulat (vt fieri consuevit, brachio ex ceruicibus suspensio) mitellam adhiberi præcipit sic latam, vt brachium vniuersum sustineat, totum què æqualiter amplectatur, neque vllam partem eius relinquat, quam non fulciat, quo fieret, vt brachij os à parte, cū qua iungitur, deorsum inclinaret, ac deprauaretur. nam priusquam vitaretur, totum perpetuum erat: corrupta autem eius vnitatem, vbi perruptum est, potest altera eius pars à subiecta mitella sustineri, altera verò pars, vt quæ non amplius cum illa continetur, deorsum inclinata perueriti. Potest item ex eadem parte, vbi non rectè mitella subiciatur, altera extremitas ab hac elata sursum ferri, altera deorsum inclinata perueriti. Quatuor igitur modis mitella brachio malè subicietur, primo, vbi fracturam solummodo sustinet, partes autem hinc atque hinc suspensæ manent: secundo, vbi extremitates brachij partes & supra à cubito, & infra à manu, diligenter mitella fulciuntur, medium non suspenditur: tertio, & quarto, vbi interdum prior brachij pars, interdum posterior, mitella excipitur. Ex his quatuor modis binos dumtaxat scripsit, qui maxime membrum peruertunt: reliquos binos præterit, vt qui ex enarratis intelligi possint. eorum duorum, quos scripsit, alterum propositis verbis ostendit, vbi censet in iis, quibus vtrunque brachij os fractum sit, vel tantum id, quod subiectum est (cubitus propriè nuncupatur) intelligendum esse primum ex propositis modis. sed commune, id est duobus modis, de quibus verba faciet. proprium verò est vtriusque, prioris quidem, quem nunc indicat, subiecta brachio mitella angustiori, quam, vt totum membrum complectatur, fracturam solummodo fulcire: alterius rursus, vtranque membri extremitatem sustinere, fractura tantum non fulta. Depruari autem inquit priori modo brachium in superiorem partem conuersum: sed in inferiorem altero modo, quem subdet proximis verbis. priorem, qui sursum versus peruertit, nunc proposuit. Nam, quum brachium, quæ fractum est, à mitella sustineatur, partibus, quæ vtrinque sunt, deorsum inclinatis, quum non sit, cui firmiter innitantur, accidet, vt quod à mitella excipitur, altius excitatum callo glutinetur: eum verò habitum, quo membrum callo solidetur, in posterum perpetuo seruabit. Quare sepius necessarium est, quæ sic peruersa sunt à nobis de integro abrumpi, extento membro rursus fracturam, qualis initio fuerat, reddentibus: quam supra diximus nullo modo coalescere, sed alligari à callo, qui circumdatur. hunc igitur extendendo dissoluimus, rursus quæ operam damus, vt callus increseat fractura conuenienter figurata. Videre autem licet in alijs animalibus comminuta ossa non omnino coalescere, vt in sue, apro, boue, capra, oue, gallo, gallina. si quando inuenies (inuenies autem sæpè, quemadmodum & nos) fracturæ oras callo inter se glutinatas, vbi hoc tibi curæ sit, callum deradens conspicias fracturæ oras se contingere, non tamen coaluisse, solidatas quæ esse eo modo, quo in vulneribus glutinata caro coalescit. At cur, vbi vtrunque brachij os comminutum sit, & quod propriè cubitus vocatur, & quod radius, accadat, vt membrum adeò peruertatur, si in suspendendo aliquid peccetur: sed minus, si alterum tantum, cubitus scilicet: ac si radius per se, nihil omnino deprauetur: non magno negotio comperies, si coram, quæ ipse retulit, memineris. quia, quod subiectum est (inquit) fundamenti vicem præstat ei, quod abruptum est, atque ipsum depruari non patitur: sed radius, vbi intactus sit, cubitum quodammodo secum dirigit, si rectè vinculum adhibeatur. tueri autem ipsum à deprauatione ex toto non valet, vbi aliquis error sit in suspendendo, quando quidem cubitus subiectus nihil habet, quo fulciatur, præter vinculum ipsum.

52 Sin ossibus sic fractis mitella manum dumtaxat & articulum cubiti excipiat, reliquum verò brachium suspensum sit, deprauatum inclinabitur deorsum.

Ex quatuor modis, quos paulò supra declarauimus, secundum hunc tradit, qui primo contrarius est: siquidem in priori mitella solam fracturam sustinebat: in hoc, quum cætera sustineantur, sola fractura sine fulcro est. Quemadmodum igitur in priori suspendendi ratione, vbi fractura, quum sola à mitella sustineretur, sublimior fuit, reliquæ verò partes vtrinque humiliores, iure dixit depruari brachium totum in superiorem partem conuersum: ita nunc, quum ea tantum membri pars,

Septima Classis.

GGGGGGG iij qua

qua fractura est, non sustineatur, deprimetur, & deorsum versus inclinabitur: quo fiet, ut brachium in eam partem curuetur, atque ea de causa, ubi callus circumdatus fuerit, peruersum deorsum spectet. Exposuimus igitur vniuersam propositae orationis sententiam. legitur autem scripta duobus modis, si vocem spectemus, maxime inter se contrariis: re tamen, si animaduertantur, inter se minime discrepantibus. Itaque brachium suspensum non nulli intelligunt, quod à mitella non excipitur, sed solum in aere suspenditur: alij contra, omne id, quod à mitella sustineatur, ut potè quum in inferiora minime inclinetur, neque fiat ob id humilius, quod suspensio contrarium est. Merito igitur scripturae, verbis inter se pugnant, sententia conueniunt. namq; hæc vox *μετέωρον*, hoc est, suspensum, quum apud expositores contraria significet, à quibusdam eorum citra negationem scribitur /reliquum verò brachium suspensum/: ab alijs negatione adiecta /reliquum verò brachium non suspensum/, verba, ut illis videtur, accommodantibus ad vtramq; significationem vocabuli *μετέωρον*, hoc est, suspensi.

53 Debet ergo brachium suspendi per mitellam latam, mollem quæ, multum brachij cum prima palmarum parte equaliter sustinentem.

Duas hic indicat suspendendi rationes, quas præterierat: eas inquam duas, quarum commune est extremam brachij partem sustinere: proprium autem vtriusque, vel eam, quæ à cubiti cominifura, vel eam, quæ à manu tantum. Exequutus enim eam suspendendi rationem, ubi mitella solummodo fracturam excipiebat, atque alteram, ubi vtramque extremitatē: deinde subiiciens verba proximè posita, in quibus præcipit, ut plurimum ex brachio, cum prima palmarum parte, mitella equaliter sustineatur: reliquas duas suspendendi rationes euidenter reprehendit, quum non habeant id, quod maxime requiri voluit, siquidem neutra primam palmarum partem, & plurimum ex brachio equaliter fulcit, non tamen propriè eas hic expressit, præcipuè (ut dixi) quod intelligi ex superioribus possint: tum quod leuem omnino noxam afferant, ubi nihil in deligando peccetur. duæ enim superiores suspendendi rationes, ea de causa plurimum erant aliene, quia fractura continetur contrario modo, atque eius partes vtrinque, quum interdum sola à mitella attolleretur nullaeius particula fulta, interdum sola deorsum conuerteretur.

GALENI IN HIPPOCRATEM
DE FRACTURIS
COMMENTARIUS SECVNDVS

Vido Vidio Florentino interprete.

ARGVMENTVM LIBRI

Curatio reliquarum Fracturarum simplicium, Luxationum, ac Dimotionum, quæ in brachio, summa manu, pede, tibia, calce, & femore, contingunt, exponitur.

DE HUMERO



T ubi humerus perfringatur.

Testantur non nulli ex iis, qui librum hunc exponunt, Hippocratem, ut supra *πῆχυν* vocauit modò eam partem totam, quæ inter manum & cubiti articulum est, modò cubitū, qui è duobus ossibus longior est, ita nunc humerum appellare *βραχίονα*, nempe id os, quod à cubiti articulo pertinet ad humeri caput. Alij non ipsa ossa, sed partes, quæ inter articulos sunt, volunt iis vocabulis nuncupari, quia consueuerimus ita loqui. Ille in capite plagam accepit, vel in malis, aut naso, & ubi plaga cutē tantum violauit, & ubi altius aliquid lesit, puta musculi membranam, neruum, arteriam, aut venam. quoniam, quum humerū exulceratum dicimus, ostendimus humero id mali incidisse, quod vlcerus vocatur. At, quum definitione vlceris caro contineatur, quamuis nominatim non explicetur, vlceris tamen vocabulo notatur. carnis enim diuisionem appellamus vlcerus, sic, ut, cum dicimus Dionii exempli causa humerum esse exulceratum, carnem humeri significemus. eadem ratione, quum fractū humerum dicimus, significari volunt os huius partis eo vitio teneri, quod fractura nuncupatur. Sed cōtrouersia hæc de nominibus ac significationibus nullo modo ad fracturæ curationē pertinet: neq; enim quidquā officit, aut prodest, quæ verò in sequentibus docet, qua ratione curare fractū humerum conueniat, ostendunt. cuncta autē (ut mihi videtur) plana sunt, non secus, atq; alia, quæ supra de brachio tradidit. ea enim paucis admodū verbis exceptis, clara erant. Longius autē lapsi sumus, quum cau-

fam

A sam adiecerimus, cur singula præcipit: quæ res, & si expositionis fines excedat, fieri tamen (vt re-
ruli, ab omnibus expofitoribus confuevit. at, quum hæ rationes alibi paucis ab ipfo ostenduntur,
neque nos hic eas tanquam auctores adiecimus, sed ordinem mutauimus. Totus autem nunc pro-
positus sermo, si per se examinetur, consideretur que, perquam facilis est. adde quod ratio singu-
lorum, quæ tractantur, fuit in sermone de brachio explicata. ad cõmunia enim præcepta, quæ ibi
tradita sunt, hæc quoque referuntur, primùm de vniuerso brachio figurando: tum de extenden-
do, de componendo: postremò de continendo, ac suspendendo, quæ continendi species est. His
itaque habitis, si quid se offeret, quod breue sit & non planum, in sequentibus aperiemus.

2 Si brachium extendatur, eo quæ sic figurato intentio adhibetur, humeri lacertus intentus alligabitur: atque, vbi,
qui deligatus est, cubitum curuet, humeri lacertus habitum mutabit.

Propositæ orationi illud adicere oportet, quod antea dictum est, scilicet, vbi humeri lacertus
ab iniectio vinculo aliter figuretur, futurum esse, vt alias eius partes vehementer vinculum com-
primat, aliis laxius sit atque delabatur: compressæ item partes inflammatione tententur: sed rela-
xatis vinculis membrum peruertatur. Quare brachij habitus nullo modo variandus est, sed per-

Bpetuo (vt supra demonstratum est) à principio ad finem seruandus. At contra, si ille habitus ser-
uetur, in quo extensum membrum deuinctum est, vinculum quidem nullo loco arctius erit, aut
laxius, sed ipse habitus, quum vitiatum sit (vt supra declarauimus) dolorem, atque idcirco inflam-
mationem afferet.

3 Iustissima itaque intentio ad humerum sic adhibetur. Lignū, quod cubitū æquet, vel paulò breuius sit, qualia sunt
ligonum manubriola, habena ab vtraque parte alligatum suspenditur: homo autem sublimiori alicui sedi insidet, bra-
chium quæ super manubriolum imponit, sic, vt in alam indatur ea moderatione, vt ille vix considere possit, nihil q;
propius sit, quàm vt suspendatur. Tum aliquid aliud paratur, cui brachium inhereat scorteo puluino superdato vno,
vel pluribus, ita, vt ad eam altitudinem perueniat, vt cubitus ad rectum angulum collocetur. Commodissime autem
lorum mulle, latum quæ seu lata habena circundatur, atque inde magni ponderis aliquid suspenditur, quod extendere
conuenienter possit: aut in vicem huius, robustus aliquis in inferiorem partem cogit cubito cum humero ad rectum
angulum figurato.



- C**
- A Lignū cubitalis longitudinis.
 - B Habena qua suspendendū est.
 - C Sedes alta.
 - D Brachij supra lignū trāslatū.
 - E Aliquid aliud itaile.
 - F Scorteus puluinus.
 - G Cubitum ad rectū angulum.
 - H Lorū latum.
 - I Magni ponderis aliquid.

D

Ostēsum est in libris de philosophia, na-
turæ iustitiam in eo cōsistere, vt quod vni-
cuiq; conuenit, distribuat, non lege aliqua,
sed suapte nutu. quod iam supra quoq; di-
ctum est. dictum est insuper, eum esse iustū
habitum, qui aptum situm vniuscuiusque
particulæ membri tuctur. demonstratū est
etiā huiusmodi habitum minimè omniū
lædere. hic autē in brachio est, vbi cubitus
cum humero ad rectum angulum colloce-
tur. Toto itaq; brachio sic figurato præcipit
hominem sedere: iuxta ipsum verò à priori
parte poni lignum transversum, quale ac
quantū est ligonis manubriolum. ligones
verò appellat *σκαθία*, quibus terram fodi-
mus (græci *σκάπτειν* dicunt). his annume-
rantur etiā bipalia (Attici *υμῶες* vocāt).
Vult autē huiusmodi lignum, quod iuxta
collocatur, immobile reddi, sic, vt dum ma-
nus admouetur, nec sursum ferat, nec deor-
sum. quod continget, si ab vtroq; extremo
habenæ vinciatur: quæ ad aliquid sublime
reliantur, vt lignū inde suspendatur. Præ-
cipit igitur, vt eger brachium antè super ip-
sum imponat, hoc est, vt lignum transuer-
sum alæ subiiciatur: tum is, cuius humerus
fractus est, sedeat ita sublimis, vt parum ab-
sit, quin suspendatur. sedere autem ægrum
iubet, vt vires, dum manus adhibetur, suffi-
ciant, neq; propterea quod stet, conuellantur. neq; in humiliori sedili hominē collocat, sed q̄ ma-
ximè potest alto, quum sedet, & ob ipsum medicum, vt rectus agere possit, neq; plurimū coga-
tur deorsum inclinari: & ob egrotantē ipsum, cui magis expediat ita sedere. solent enim, quibus
Septima Classis. GGGGGGG iij brachiū

brachium extenditur, præ dolore ducentem sequi, atq; attolli, nec in eadem sede penitus, qua col-
locati sunt à principio, permanere. quo fit, vt intentio remittatur. Hoc igitur cauens imperat, vt
homo sedeat, quantū maximè potest sublimis, & propè suspendatur, ac, si paulum attollatur, stet.
quod, vbi eueniat, neq; ipsum egrotantem, neq; alios latebit: atq; vbi non lateat, paruo negotio
rursus, vel ab alijs, vel per se ipsum in priorē sedem restituetur. quin, vbi homo ita sedēs stabit, pau-
lulum mutabitur: plurimum verò, vbi humilior fuerit collocatus. Quare ex sessionis mutatione
minimum leduntur, qui sublimiori insident sedili, plurimum, qui humiliori. Constat itaq; trans-
uersum lignum ab Hippocrate ea de causa sub alam demitti, ne brachio ab inferiori parte intēto,
eger sequatur, atq; intentionē soluat. quod nos sine ligno soliti sumus sepius facere per laqueos
alē circumdatos, quorū extrema versus posteriorem partem extendenda sunt, non secus etiā alijs
laqueis circumligatis fractum os in diuersa diducimus, vbi intētio, quę per manus adhibetur, im-
becillior sit, q̄ oporteat. Verūm, si hanc credamus per se posse effectum præstare, vt in puerili cor-
pore, non opus est ampliū laqueis, & multo minū machinamentis habentibus axes, ad quos ex-
tremos laqueos alligantes valentius in diuersa contendamus: quo extēdendi modo ad luxata po-
tissimum vtimur. In ea autem extendendi ratione, quam nūc probat, præcipit, vt brachiū rei cui-
piam hereat, quam ipse vocat *ἑστὸς πόν*, hoc est, huiusmodi quidpiam, cui firmiter insidat, scorteis
puluinis subiectis: deinde ab imo humero iuxta cubiti articulum graue aliquod corpus suspenda-
tur, quę pondera *σαθμίων* nuncupauit: hæc sunt, quibus vtī consueuimus, ex ferro, ære, aut plum-
bo confectis. præterea lorum molle, latum, vel habena valida imo humero circūdetur, vnde pon-
dera suspendantur.

- 4 Debet autem Medicus curare, stans altero pede super quapiam re sublimiori collocato: componere autem os promi-
nentioribus palmarū partibus: facile autem componitur: ea enim extendendi ratio optima est, si quis conuenienter ip-
sam adhibeat: post fascias inuicere à fractura orsus: reliqua uerò omnia, ut antea iussus est, exequi, eadē q; de homine
requirere: tum ex isdem indicis intelligere, moderata nec ne sint: ac tertio quoque die soluere, & rursus deligare,
arctius quę adstringere.

Sect. 1. l. 18. 7^a.
203. c

Eligit hunc Chirurgici habitum tanquam firmiorem. idem in opere de officina medici præce-
pit, cum inquit || Stantem verò oportet pariter ambobus pedibus benē insidere, sed agere altero
insistente, at non eius partis, cuius manus agit/.

- 5 Dein septimo aut nono die ferulas alligare: quòd si uereatur, ne rectè ossa concurrerint, interea soluere, dirigens q; rursus deuincire. G

Quod in superioribus, quā de brachio, supplendū esse existimaui, idem nunc existimo, scilicet,
quū omnia cōmodè respondeant, eo tpe ferulas imponendas esse. Verūm, vbi de brachio egit,
septimo die simpliciter iussit ferulas circumdari: in sermone verò de humero, coniunctionē, quā
dissurgentem appellamus, vsurpauit. ait enim / septimo aut nono die ferulas alligare/ eo q; in hu-
mero ob musculorū, quibus continetur magnitudinē, quę circa fracturā sunt, diuturniori tēpore
ex toto gracilia fiant, laxa q; vbi verò talia essent, ostendimus opportunè tunc ad ferulas veniri.

A. li. 4. f. 5. l. 3.
c. 9. 489. b

- 6 Humeri os "ferè quadraginta diebus conferuet: quos ubi excefferit, soluere oportet, & pauciores fascias dare, le-
uius quę arctatas: ac diutius uti uictu magis exquisito, quā ante: intueri autem manus tumorem, & uires. A. ibidem.

Conferuere, quod *ὑπατίειν* dixit, intelligit, vbi fracti ossis partes callo firmantur, vt in supe-
rioribus etiā, quā de brachio. Quo autē grandius est humeri os, eo longiori tpe per callum glutinatur. Reliqua oīa, ex iis, quę dicta sunt de brachio, plana sunt. nulla igitur opus est explanatiōe.

- 7 Illud etiam ignorare non oportet, quòd humerus natura ab exteriori parte gibbus est, & perueri facile solet, ubi
malè curetur. Quin & alia ossa omnia, quę naturaliter aliqua parte gibba sunt, ubi comminuta curantur, facile ab ea
peruertuntur. Ergo, ubi tale quidpiam timetur, lata fascia humerum excipiens in orbe circa pectus agatur: & quū
quiescere humerum oporteat, pannus multiplex implicitus inter cubitum & latus subiiciatur, uel quidpiam huius ge-
neris aliud, hac enim uia os gibbum dirigetur. Est autem cauendum, ne nimis in interiorem partem conuertatur. H

Quæ in sermone de humero vsq; ad finem scribuntur, omnia clara sunt. namq; ipse causam ex-
ponit, cur in exteriorem partem conuertatur, & quo pacto in contrariam coactum dirigi debeat.
iussit autem, vt multiplex pānus inter latus & cubitum demitteretur, ne humerus attingat latus,
sed in medio spaciū sit, quo compulsi habena ad pectus adducēte minimè deprauetur, quū
natura in exteriorem partem spectans ad interiorem conuersus dirigitur.

DE OSSIBVS PEDIS ET MANVS

- 8 Pes hominis ex multis minutis quę ossibus constat, quemadmodum & manus.

Similitudinē quandam habent inter se totius cruris & brachij partes: qualis enim est hu-
merus in brachio, tale est in crure femur: quale item in brachio est id, quod est inter cubitum
& manum

A & manum, tale in crure id, quod inter genu est & pedem: reliqua verò pars, scilicet manus, pedi respondet. Caterum manus apud græcos proprium nomen non inuenit distinctum à toto brachio, sicut pes, qui nomen habet distinctum à toto crure. quare Hippocrates merito pedem simpliciter, *ποδια* vocauit, *ἄκρον* vocabulo non adiecto: manum verò non vno verbo expressit. sed *χείρα* dixit, quod brachium significat, *ἄκρον* adiciens, quo extremum notatur. Sed satis dixi de vſu nominum, venio ad res. Iſ, quæ superius tractauit, proximus erat sermo de manu. ipse verò non tantum agit de hac, sed etiam de pede, sermonem quæ de ipſo dilatat, quod maiorem diligentiam requirat. Dicit ergo vtramque partem ex multis minutis quæ ossibus constare. nos autem adiungimus / & duris / quandoquidem medulla carent, caua minimum sunt, & à lapillis paruis non abhorrēt. Siuile igitur est totum brachium toti cruri, atq; itidem vnus extremum extremo alterius. qualis enim in manu primæ palmæ pars est, tale est in pede id, quod inter talos est & plantam: tum qualis in manu palma, talis planta in pede est: similitudo autem, quæ inter digitos est, vel me tacente, clara est. præter hæc in pede sunt ossa iuxta calcem, atq; idcirco de pede plura verba facit, quàm de manu. quæ quidem pes habet, communia quoque ipsius manus primum enarrat, deinde illa subdit, quæ propriè ad pedem pertinent. Primam igitur palmæ partem complent

B octo ossa, palmam quatuor. at singuli digiti ternis ossibus continentur, vt in vniuersum ossa manus septem sint & viginti. sed in pede quatuordecim sunt ossa digitorum: nam magnus digitus ex binis constat, planta ex quinis. Quocirca in vtraque parte sunt decem & nouem. Totidem in manu palmam & digitos explent, quum planta vno osse palmam excedat: ac digiti manus, pedis digitos æquæ vno osse exuperent. quocirca, si vtraque pars ad vtramque conferatur, idem erit ossium numerus. Restant in manu ossa octo, quæ primam palmæ partem constituunt: in pede autem ea pars, quæ inter talos & plantam sita est, cum calce ac talo, quæ omnia ossibus octo continentur. Calcis autem os, omnium, quæ in vtriusq; extremitate sunt, maximum, sustinet talum & crus, ac propè corpus fert vniuersum, vbi stamus: à priori autem parte committitur cum osse, quod à cubi similitudine *κυβωειδές* appellatur: perinde atque tali caput, cum eo osse, quod, quia scapham representat, *σκαφοειδές* dicitur. cum vtroque horum iunguntur alia ossa, quæ partem potissimum inter talos & plantam explent. Si quis autem velit talum extremo cruri reddere, idem erit ossium numerus in vtriusq; mēbri extremitate, ita, vt docendi modo, non natura ipsa rerum, inter se discrepent, qui vigintiseptem, & qui viginti sex, ossa pedis esse affirmant. erunt enim vigintiseptem, vbi talus non annumeretur cruris ossibus, sed sine hoc vigintisex. Rectè igitur scribit / pes hominis ex multis minutis q̄ ossibus constat, quæadmodum & manus /. agit enim cum ijs, qui prima elementa didicerunt, & incidendis corporibus operâ dederunt, in memoriâ reuocans, quæ perceperunt ad hunc locum facientia. quum non solum scire conueniat propositarum partium vtrâq; ex multis duris minutis q̄ ossibus constare, sed meminisse etiam habitus & magnitudinis singulorum, & qua ratione cum proximis connectantur: quod *θέσις*, id est positioñe vocant, vt, vbi aliquod ex ossibus, quæ his partibus sita sunt, suo loco mouet, pròpte restituamus.

9 *Ossa hæc ferè non rumpuntur, nisi acuta vel graui quapiam re carnosæ partes vulnerentur. De vulneris autem dicemus, vbi vlcera curationem persequemur.*

Carnosas partes *χρῶτα* nuncupauit, quo vocabulo vocant Iones, quidquid in nostro corpore carnosum est. cuius generis præcipuè sunt, cutis, & musculi, tum viscera. ossa verò cartilaginem & ligamenta *χρωτός* vocabulo non significat. Ad hoc etiam exemplum videtur vsurpari ab Homero, quum cutem *χρῶτα* vocat his versibus:

Αἰεὶ τῶν ἔσαι χρῶς ἔμποδος ἢ καὶ ἀρείων.

Et iterum,

Ὡς ἂν μὴ κλαύσῃ κατὰ χροῶ καλὸν ἰατρὴς.

D Propositarum igitur partium ossa ait ferè non perfringi sine vlcere. Illud enim / nisi carnosæ partes vulnerētur / idē libi vult, quod / sine vlcere /. nihil aut̄ interest, quod ad hunc locū attinet, vlcus ne an vulnus nominetur. atqui carnosæ pars extremis mēbris minima est, plurima autem in humero & femore. Ea igitur tota facillè leditur, vbi externū aliquid super manū vel pedem incidat, quod frangere aliquid possit ex ipsorum ossibus. Abrumpitur aut̄ os quatuor de causis maximè generalibus. super ipsum enim vehemēti impetu incidit aut aliquid cōterendi vim habens, quod planè necesse est natura durum esse, & mole non exiguū: aut aliquid, quod non tantum cutē, & quæ inter cutem sunt & ossa, sed hæc quoq; secare possit, quem morbum Hippocrates in libro de vlnribus capitis *ἑλκρον* appellat: nō nulli etiam ob saltū ex altiori loco fregerunt tibie vel femoris os, q̄ sicciora his essent, & non ita densa: videmus itē in palestra cōminui os *κατὰ δελιχλασιν*, hoc est, vbi tibia vnā cum sura perfringitur, & præter fracturam, vulnus quoq; magnum accedit, atq; ossa nudantur, quod fracturæ genus accidit, cum luctantis membrū cruri ipsi transuersum subiecit, atq; vtrumq; eius extremum, tam quod à genu, q̄ quod à pede est, deorsum versus cogitur. Euenit huiusmodi tale lignis, quæ nos de industria rūpimus. imposita enim super vtrumq; femur obliqua, & manibus ab vtroque extremo in inferiorem partem coacta cōfringi media videmus.

Quemadmodum



Quēadmodum igitur neq; magnū lignum, E
neq; validū, sed parū & infirmū, hac rōne fran
gitur, ita, cū os infirmū natura fuerit, medium
sub propositis palēstre generibus perrumpitur.
At ossa, qbus extrema mēbra continent, sub hu
iusmodi palēstre generibus, siue ex superiori lo
co saltātes deorsum ferant, & in terrā incidāt, si
ue pes vehemēter conuellat, non facile rūpūnt.
his. n. icūbus frangunt ligamēta ossium magis,
q̄ ipsa ossa: cuius causa est, eorū non tam exigui
tas, q̄ durities. sed neq; externa, quū magna vi
sup incidūt, possunt hac ossa facile perfringere,
nisi duriora illis sint, & grandia. at quod tale est,

neq; carnem inuiolatam relinquit, quemadmodum nec ictus ab acuta re: nam & hic priusquam
attingat ossa, quæ ipsis superiniecta sunt discutit. quare meritō dixit ossa hæc ferē non abrumpi
sine vlcere. Sed quoniam in sequentibus seorsum de fracturis ager, quibus carnis quoque vulnus F
accedit, hæc ad eum huius libri locum referuauit.

- 10 Siquis erumpat ex digitorum articulis, vel aliud quidpiam ex ijs ossibus, quibus continetur pars pedis, quæ inter
talos & plantam est, compellere singula in suam sedem oportet, quemadmodum in manu.

Quod ait /quēadmodum in manu/ accipiendū est, non quasi aliqd præfatus sit de ossibus, que
in manu sita sunt, sed quasi ita scripserit, singula ossa pedis in suam sedē compellēda sunt: id, quod
etiam fieri debet in manu. Compellere aut Hippocrates dixit ἀναγκάζειν, vel, ut alia exempla ha
bent, κατὰ τὰς ἀγκυλὰς, quod idem sibi vult, ac si dicat, os suo loco motū restituere. mouetur aut, vbi
ligamenta, per quæ cum proximis annectitur, abrumpunt. non tñ abrumpuntur oīa ligamenta,
quæ prolapsus os in orbē comprehendūt, rarō. n. id ex toto accidit. in quo casu os, quod ita ledi
tur, suam sedē relinquens ad cutē prorumpit, præsertim quibus ea laxior est, ita, ut ossi, quod pro
labitur, parū renitatur. ea verō de causa ferē nō solet os, quod mouetur, in inferiorē partem pedis
excidere, quia cutis, quæ pedi subiecta est (ἵψος græcè dicitur) crassa est & dura. adde, q, quæ pe
dem feriūt, plerūq; à superiori parte sup ipsum cadunt. Ergo hac vna via os, quod suo loco moue
tur in inferiorē partē excidet, scilicet quū ex superiori loco qs saltauerit sup rem aliquā, quæ G
eminētias habeat admodū asperas acutas ve. Quæcunq; igit vndiq; prorsus resoluta sunt, vbi sua
sede mota in superiorē vel inferiorē pedis regionē veniūt, ægrè recōduntur: siqñ aut (quod rarō
accidit) recōdant, semp magno negotio i sua sede seruant. nāq; vbi os rursus vehemēter moueat,
nihil erit, qd ipsum cōtineat, vtpotē solutū ligamētis, qbus alligabat: q̄ si nō fuerint ex toto abru
pta, sed aliqua ex parte integra, sicut euenit, qbus p̄cidere solet, distendētes totū pedē vrgebimus.

- 11 Tum cerato moderi pānis fasciis q; non secus atq; ubi frangitur, excepto quod omittēda ferule sunt: eodē q; modo
adstringere, ac tertio quoq; die alligare. Is aut, qui deuincitur, similiter atq; i fracturis, adstringi se respōdeat, vel laxari.

Qualem curationem ad fracturas tradidit, talem nunc ad ossa, quæ extremis membris mouen
tur, præcipit adhiberi. Primō, siquidem extendere conuenit, ad hoc, ut ossa, quæ prolapsa sunt,
in suam sedem compellantur: tum, vbi reposita fuerint, deuincire, consilio ad idem directo: pro
positum enim est membrum ab inflammatione tueri, & sub linteis adstringere, cōtinere que os,
quod restitutum est. In superioribus autem ostensum est hæc nullo modo rectē fieri posse, nisi san
guis, qui in affecta sede subsistit, ad summum atque imum membrum depellatur: prohibeatur q;,
quo minus alter concurrat. Hæc itaque, si in memoria habeamus, spectantes, vniuersam vincien H
di rationem fracturis idoneam inueniemus, quam hic vtēdam dixit, nisi q ferule non debent cir
cundari, quandoquidem loci natura eas non patitur. nam partes quibus ferule iniiciendæ sunt,
æquē planę esse debent, cuiusmodi non est ea pars pedis, quæ inter talos & plantam sita est.

- 12 Omnia hæc viginti diebus perfectē ad sanitatem perducuntur, nisi, quæ cum cruris ossibus iunguntur, vel ex eius
regione sita sunt. Interim verō iacere conuenit, non tamen id sustinent, qui morbum paruifaciunt, sed ingrediuntur
priusquam conualescant: eoq; fit, ut pleriq; nō benè sanentur. sed subinde languoris sensu aliquo tententur, atq; id qui
dem non iniuria. Ferunt enim pedes onus corporis totius. Vbi ergo non dum cōualuerunt, si inambulāt, articuli, qui
moti sunt, malè confirmantur, atq; hac de causa subinde ossa dolent, quæ cruri iunguntur. Porro quæ cruris ossibus
iunguntur, ceteris maiora sunt, & cū mouentur, longiori tempore confirmantur, sed medendi ratio eadem est.

Cruris ossa intelligit tam suram, q̄ tibiam. volēs autem significare è regione, κατὰ τὴν dixit, quā
loquutionem sæpius varijs q; in locis vsurpauit. sed & paulo inferius eadem ter ex ordine vtitur,
de crure pertractans, quū ait, || Femoris enim caput superius corpus fert. id autē ab interiori cru
ris parte situm est, at non ab exteriori, sed è regione tibiæ, tum quia pars altera corporis è regio
ne huc

« A ne huc propius accedit, q̄ ad exterius os. adde, quod os interius plenius est, quàm exterius, non secus atque in brachio, vbi os, quod è regione minimum digiti spectat, tenuius est, & longius.

13 Plurimis autem fascijs, plurimis q̄; pannis vtendum est.

Vt ossa, quæ reposita sunt, suo loco mancant, solent tum fasciæ, tum panni circumdari, præsertim que, cum loci inæqualitas alligari ferulas non sinit.

14 Ferè aut hinc atq; hinc Vincire conuenit, adstringere q̄; , sicut cætera omnia, ea parte potissimū, qua os prol. y sum est, primū q̄; ibi fascias circumagere.

In prioribus imperauit, vbi fractum os in aliquam partem conuertatur, si ad dextram inclinet, vt ad sinistram adducatur: si ad hanc spectat, vrgeatur ad dextram. At vbi alligare pedem oportet, in neutram partem debet vinculum inclinari, quū ossa, quæ sua sede excidunt, non ad latera, sed ad superiorem vel inferiorem partem conuertantur.

15 Quotiescunq; vinculi soluitur, multa aqua calida fouendū. In omnibus aut, qui iuxta articulos sunt, affectibus liber aliter calida aqua perfundenda est. Quod ad laxandum vel adstringendū pertinet, ysdem reponibus eadē indicia se ostēdant, q̄ in superioribus: resoluerē itē, & rursus deligare similiter expedit. Hi aut quadraginta diebus ex toto conualescunt, præsertim, si iacere sustinēt: sin minus, in eadē mala incidunt, q̄ superius posita sunt, atq; etiānum grauiora.

Quū leniendus dolor est, & corpora, quæ adstricta sunt, laxanda, tunc præcipit, vt multa calida aqua perfundatur. id potissimum accidit in affectibus articulorum, quū hæ partes ossibus magis & neruis contineantur. Comprimuntur igitur cum inflāmatione, & magis dolorem sentiunt, quod magis neruosa sint. Appellauit autem affectus *σῖνεια*, quoniam affici *σῖνεια* dicit.

DE CALCE

16 Quicunq; ex superiori loco saltantes, calci vehementer insistant, his ossa diducuntur: venæ sanguinē effundunt, carne circa os attrita: tumor magnus oritur, & dolor. Hoc enim os exiguum non est, extat q̄; è regione sub tibia.

A. 14. f. 5. t. 3.
c. 18. 490. b

Ex *χρῆσις* dixit venas, significare volens effundere succum, quem continent, nempe sanguinem: quod fit, quū colliditur earum tunica. corpora enim, quæ colliduntur, naturalem vnitatem amittunt, quū pluribus exiguis q̄; partibus diuellantur, quibus sanguis suffunditur. Hunc Cigitur effusum sanguinem recipiunt loca, quæ venam cingunt: quibus non seruator, qualis recipitur, tempore siquidem nigrescit, perinde atq; vbi extra corpus effusus diu manet: concreuit, insuper, quam rem græci *σπόμωσιν* appellant. hinc factum est, vt sanguis propterea, quod concreuit, *σπομωδὸς* iam, & dicatur, & sit. prius autem nigrescit, deinde redditur admodum putris. At qui non possunt grauiissima hæc accidere sanguini, qui à venis in corpore funditur, namque, vbi natura vincit, hunc non secus mutat, atq; alium, qui in inflāmatione suppurante cōtinetur, vertit q̄; in pus. Ad hoc autem, vt partium natura sanguinem superet, duo obseruanda sunt, alterum, ne inflāmatio corpori superueniat, id qua ratione fiat, supra habuimus: alterum, vt sanguis, qui effusus est, repellatur. In hæc itaq; incumbens Hippocrates, omnia, quæ subiiciuntur, præcepta sigillatim tradit. Diducuntur (inquit) ossa his, qui ita saltant, abruptis nimirum ligamentis, quibus ipsa neceiebantur, sicut paulo supra de ea parte, quæ inter talos & plantam est, dicebamus. Iungitur autem cum calce à superiori parte talus: à priori id os, quod à cubi similitudine græcè *κνέστις* vocatur: sicuti cum talo à priori parte id ossis committitur, quod à scaphæ similitudine *σκαφοειδὲς* græcè nominatur: cum vtroque autem horum, scilicet cum eo quod cubum, & cum eo quod scapham refert, quatuor ossa, quæ inter talos & plantam sunt, committuntur. omnia autem hæc ossa tam manus, quàm pedis, in commentario de ossibus exposita sunt.

17 Coniungitur item Venis & neruis grandioribus, posterior quæ chorda huic ossi innectitur. Hos igitur curare oportet cerato pannis fascijs quæ: ad hæc calidam aquam largè infundere, fasciarum quæ numerum augere, tum alijs vti optimis præsidijs ac maximè lenibus.

Coniungitur, inquit, os calcis neruis quos nominat *ἑναιέρες*, id est grandiores, tum venis nō paruis. Innectitur item huic ossi posterior chorda, quæ diducitur à musculis, qui siti sunt in parte cruris, quæ carnosā à posteriori parte prominet. De his autem abundè diximus, tam in eo libro, qui de corporum, quàm in eo, qui de musculorum incidendorum ratione est. ea autem tenere ad vnguem debet, qui assequi vult, quæ nunc ab Hippocrate traduntur.

18 Quod si cutis, quæ calcem tegit, naturaliter tenera est, relinquenda est, quomodo se habet: sin dura & crassa, qualis in quibusdam conspicitur, æqualiter succidenda est, atque extenuanda, non tamen inueneranda.

Propositis vitijs circa calcem atq; adiunctas partes periculum est, ne ingens dolor atq; inflāmatio

tio non modica superueniat. huiusmodi enim partes ossibus continentur, non quibuslibet, sed E
valde minutis inter se commissis, ita, vt vel leuis inflammatio magnum dolorem possit compri-
mendo excitare. chordę vero, quę calci a posteriori parte innectitur, cum grandior sit, vbi inflā-
matur, periculum erit, ne neruorum distentio superueniat. quin & cum hac parte iunguntur mul-
ti nerui, qui ossa contingunt, quod in libro de incidendis neruis ostendimus. Reliqua igitur vni-
uersa curatio diligētem animaduersionem requirit, & quod ad viciū tenuem pertinet, & quod
ad modum calidę aquę perfundendę. sed & cutis, quę pedi subiecta est (ἰζὺς gręcę dicitur) in-
cidenda est magna cū moderatione. vbi dura est, altitudo plagę debet duritię altitudinem aqua-
re. occallescit enim quibusdam, ita, vt ne paululum quidem sanguinis fundat, nisi scalpellus altē
admodum demittatur. Illa igitur secunda est, quę sanguinem non fundit: quę verō ita in cruen-
tatur, relinquenda est, nam, si secetur, dolet. At neq; in illa, quę dura est, quouis modo, sed aqua-
liter, incidere conuenit id, quod ex ipsa cute durum est. spectare autem tria debet, qui aequaliter
incidit, primō, longitudinem sectionis, deinde altitudinem, tertio, intervallum. sectiones autē
ęquę longę atq; altę sint, oportet, & ęquę inter se distātes, vt vniuersa cutis, quę pedi subiecta
est sine tormento inflammationis tempore similiter distendatur. Constat autem omnem inflam-
mationem distendere, quod quę distenditur dolere, atq; idcirco inflammationem augeri, & ner-
uorū distentionē excitari. Quemadmodū igitur liberalis aquę calidę perfusio, cui oleū copiose
fit adiectum, saluberrima est, ita etiam secādam cutem duxit scalpello eatenus altē demisso, vt hęc
minime cruentetur. Vtiliter autem excogitauit huiusmodi sectionem, quādoquidem in alijs par-
tibus, vbi vehementer inflammanur, cogimur cutem scalpello exasperare, partim educentes ali-
quid eius sanguinis, qui in inflāmatione superat: partim expirationem efficientes: partim laxan-
tes, quę sub inflāmatione distendebantur. At in pede inflāmatione non dum orta festinabi-
mus ad cutem incidendam, eo qđ durissima sit. vbi verō talis est, nequit sub inflāmatione amplius
extendi. quamobrem dolebit hęc, & vehementissimē premet intētionē quadam proximas par-
tes, præcipue qđ latam chordam, quę illi iuncta est, cuius qđ initium est ex fine vnius ex musculis
sitis in posteriori parte cruris, quę carnosa prominet. Igitur, vbi hęc dolore atque inflāmatio-
ne tentetur, periculum est, ne totus musculus eadem sentiat. id si accidat, neruorum distentionem
sequi verisimile est. Ob hęc itaq; omnia cutem, quę sub pede est, secare, vt dictum est, conuenit:
deinceps, vt retulit, extenuare, hoc est, tenuem reddere. id autē fiet, si molliatur ipsius durities, &
multitudo exhauriatur. Ad hęc ambo valet oleum, & aqua calida, si copiose infundatur: a per-
fusione vero priusquā vinculum detur, olei, quod nullam adstringendi vim habeat, inunctio. G

19 Hęc bene alligare non cuiusuis est. Nam si quis vinciat eo modo, quo cetera circa talos vinciuntur, fascia modō
ad pedem data, modō ad ipsam chordam, circumacta fasciæ compressio, calcem, quā ictus fuit, expellet.

Dictionem /bene/ ἀγὰρ dixit, sæpe enim ab alijs veteribus ita vsurpatur. præcipit autem, vt
vitia, quę circa calcem sunt, vinciantur ea ratione, qua fracturę, eos reprehendens, qui eo modo
deligant, quo deligare sæpius consueuimus, vt medicamenta, seu cataplasmata, seu quædam ex
perfusione madentia, ea parte teneantur. Vinciendi modus, quem damnat, sic se habet.

- A Initium fasciæ.
- B Decussatio ad literę x figuram.
- C Circumuolutio iuxta malleolum.



- A Initium fasciæ.
- B Orbicularis circumuolutio circa plantam.
- C Decussatio ad literę x figuram.
- E Circumuolutio iuxta malleolum.



Fascia ab altera parte talorum orsa, obliqua fertur
a priori parte extremi cruris, qua talus extat, quem
ἀσπράγαν vocant: inde transuersa sub pede demit-
titur: eo qđ circumdato vsque ad contrariam partem
obliqua rursus infernē sursum procedit ad priorem
partem tali, ei que iniicitur, quemadmodum antē.
At vbi ita circumbeat, necesse est in priori parte pedis
sibi occurrat, & X literam representet: inde in or-
bem circa talos data eō redeat, vnde incepit: sic au-
tem iterum circumagitur, ita, vt eodem reuertatur:
tertio qđ similiter voluta rursus ad suum initium re-
dit, atq; inde rursus circa talos porrigitur. Verūm
alijs, vbi transuersam sub pede fasciam dederunt, non
protinus obliquam sursum attrahunt ad talos, sed
antē per superiorem partem pedis in orbem ipsam
adducunt: quemadmodum alijs in orbem circa ta-
los, sic, vt obliqui circuitus ab ijs, qui in orbem
sunt, comprehendantur. Hęc quidem vinciendi ra-
tiones vsitatę sunt, vbi musculi sint, sed ad propo-
sita vitia minimē accommodantur, quod ante fa-
scias nihil ibi imponatur, quod illis continen-
dum sit: neque calx vitio vacet, sicut in eo casu,
qui

A qui illas requirit, sed ipse primò Iesus sit. quare proposita vincendi ratio, quum ad calcem sanguinem exprimat, ipsum expellit. at contrarium fieri debet, sanguis enim a calce ad partes. quæ iuxta sunt, per vinculum expellendus est: quam rem ea duntaxat vincendi ratio præstat, quæ ad fracturas pertinet, quam supra demonstrauit. eadem igitur nunc vititur.

20 Atque hoc pacto periculum est, ne os calcis corrumpatur.

Corrumpatur dixit *σθακελίσαι*, nam, quum pars ex toto corrumpitur, veteres dicere id vitium solent *σθακελον*, quod, vbi carnis partibus accidit, alijs nominibus appellant. Vocat item Hippocrates carnem, quæ putrescit, *σάπραν*, *υδωσαν*, *σπυγνυον*, atque alijs etiam num vocabulis. At vbi os ex toto corrumpitur, *σθακελον* vsurpat: quod vitium ossibus accidit, vbi a superiecta carne perniciofa sanies profluit, quæ hæc ipsa irrigando corrumpit.

21 Quod vbi corrumpitur, morbus æuum durat.

Apertius dixisset totam ætatem hominis. Habet autem ipsius oratio hanc mentem. si quando calx corrumpatur, casus curationem non recipit, quod quæ ex eo sequitur malum, totam ætatem hominis durat.

22 Nam alioquin, vbi calx hoc modo non corrumpitur, sed quod nigrescat, quia dum homo iacet, negligenter habitus sit: vel quia crus iam diu graue vulnus acceperit, quod calx est sensu: vel vitium femoris, aut alterius affectus causa, diu iacuerit: diuturna tamen res est, & molesta. Tum subinde recrudescit, nisi summa diligentia, & longa quieteaten- datur. Quare quæcumque hoc modo corrumpuntur, præter aliam noxam, corpori summum quoque periculum afferunt.

Calcis os (inquit) non modò ex propositis affectibus vitari solet, sed ex eo, quod calx diu iacuerit (quam rem *ὑπιασιν* dixit) nigrescit sæpe, quando negligenter fuerit collocatus. id autem tenet, vbi super quapiam re dura continetur, neque subinde attollitur: sed hinc, quæ subiecta sunt, continenter calefit, premitur quæ. Quocirca attollendus est, mutandus quæ orbiculus ex lana molli, quem non nulli ex grecis *τρόχιον* dicunt, eius autem cauum respondere debet magnitudini calcis. quo orbiculo ita calx fulcitur, vt imum eius attollatur, ne comprimatur, ne incalcescat, ne expirare prohibeatur.

23 Sequitur enim febres acutæ admodum, continentes quæ, cum tremore, singultu, mentis alienatione, quæ paucis diebus hominem præcipitant.

Hæc fieri inquit, vbi calx corrumpitur, non ea de causa, quia os alienatur: ipsum enim, si per se circumscribatur, nullam superiorum partium afficit: sed quia ad partes, quæ ipsum cingunt, ipsi quæ alligantur, eius vitium pertinet, idcirco superiores quoque corporis partes læduntur. Chorda igitur, quæ calci innectitur, vbi inflammatione teneatur, musculos quidem posterioris partis cruris, quæ carnosâ prominet, propter consortium afficiet, quum ab ipsis oriatur. quibus musculis affectis, nerui, qui per eos distribuuntur, promptè ledentur, quemadmodum, & arteriæ, per quas cor noxam sentit, sicut per neruos cerebrum. Sed quum cor innati caloris fons est: cerebrum vero per se rationis domicilium habet, & per musculos partes mouet motu, quem voluntarium dicunt: con- sequens est, vt propter cor febris oriatur: mentis alienatio, propter cerebrum: tremor, neruorum quæ distentio, propter musculos: singultus, propter stomachum, qui plurimum neruosus est.

24 His accedunt, venarum sanguinem fundentium liuor, nausea, gangræna. Causa compressio est. Possunt hæc alioquin incidere, etiam si nihil corrumpatur. Hactenus de his, quæ superueniunt, vbi ictus vehemens admodum fuerit. Pleraque tamen leniter colliduntur, neque ita magnum studium & diligentiam exigunt, sed curari nihilo minus recte debent. Quod si casus videatur asperior, fulcire oportet, alia quæ efficere, quæ proposui.

Sanguinem fundentes intellexit venas grandiores, quandoquidem his diuisis sanguis effunditur: quod exiguis venis non accidit, parum enim ab his sanguinis profluit, celeriter quæ citra noxam in oris plagæ concreuit. Nauseæ nomen duxit à nauseantibus, atque ea de causa vomentibus, quam appellauit *ναυσίωσις*, cum Iones *ναυσίαν* id est nauseam, sic appellent, ac serè, quod ante dixit *εργουώσεις*, vocat nunc *ναυσιώσεις*, vbi venæ sanguinem expuunt, & quasi vomunt, oppressæ tum sua imbecillitate, quam inflammatio attulit: tum multo vitioso quæ sanguine, quem constat sub huiusmodi affectibus vitari. Gangrænam vocauit, quum venæ ex ingenti inflammatione emoriuntur. Quorum omnium causam esse affirmat alienam vincendi rationem, quæ duplex caput habet, vnum, quod calcem non comprehendit, sed nudum relinquit: alteram, quod partes, quas complectitur, arctius adstringit. Diligentiam expressit vocabulo *μελέτης*: sic enim ab lonibus appellari solet, & ab ipso sæpius nominatur.

Faciunt quæ

- 25 *Fasciam quæ maxima ex parte ad calcem dare, & modò circa extremum pedem, modò circa medium, modò etiam E circa crus obuoluere: tum, quæ his proxima sunt, hinc atque hinc omnia comprehendere, quemadmodum supra ostensum est, neque arctè admodum alligare.*

Vinciendi rationem probat contrariam illi, quam supra damnauit, quæq; apud multos in vfu est, sub qua sanguis ex alijs partibus pedis ad calcem transmittitur. debemus enim superantes succos, à calce ad alias partes depellere, hunc vincientes, quomodo supra ad fracturas docuit, fasciâq; maxima ex parte ipsi obuoluentes, non tamen nimis arctantes.

Sed linteorum numerum augere.

In superioribus etiam indicauimus Hippocratem velle, vt vinculi firmitatem, vel fasciarum numero moliamur, vel arctius adstringendo.

- 27 *Præstat veratrum eodem die epotum, vel certè posteriori. Præterea tertio die resoluerè, & rursus deligare.*

Veratrum potui præstat, non eo nomine tantum, vt quæ supersunt, purget, sed & in aliam partem auertat. constat autem dari ab Hippocrate album, quod vomitum excitat, & à toto corpore F materiam in ventriculum auocat, priusquam ad intestinorum sinus deducatur. quod autem albū intelligi debeat, planè licet ex sequentibus colligere. Inquit enim /sed si homo vacat febre, per superiora conuenit purgare sicut dictum est/. Quod igitur ea, quæ superant, vtiliter educantur: quodq; ad contrariam partem, atque affecta est, materiam depellere magnum momentum habeat: euidentissimè apparet: at num albo veratro moliri id expediat, non dum est manifestum, strangulare enim interdum solet, vbi redundat in corpore glutinosus succus, aut crassus. quocirca hic prius dissipari debet victu extenuandi vim habente, de quo totum librum composuimus. Fallacissimum ergo est veratrum dare, antequam corpus victu præparetur, quum sæpius non facile sit, vt quales corpori supersint succi, dignoscantur. Hippocratis sæculo veratrum album fortasse tutò sumebatur ob rationem victus eorum hominum, qui curabantur, qui vitæ genus non ociosum sequebantur aut intemperans, sed laboriosum, paucisq; alimentis erant contenti, sic, vt crassos succos nulla ratione contraherent, neq; enim nos latet fieri hos, cum ocio, tum abundantia. Quod si vim æstimaueris corporū eius sæculi, quā ex eiusmodi victu cōparabāt, magis adhuc dari veratrū permiseris, quum, quæ vomitus affert incōmoda, ferre homines illi facile potuerint.

- 28 *Ex eo autem intelligitur, futurum nec ne sit, vt hi affectus recrudescant. namque, vbi sanguis à venis transfusus, nigrities, & quæ his proxima sunt, subrubicunda sunt & subdura, periculum est ne recrudescant.*

Malos affectus, qui recrudescunt, vocat παλιγκότα παθήματα: & παλιγκοταίνεω dicit, quasi mala rursus fieri. Docet autem quibus indicijs cognoscantur propositi affectus, quando futurum est, vt rursus mali fiant: quæ indicia ad superuenientem inflammationem spectant, quam in primis cauit, ne oriretur. Quælibet igitur inflammatio rubicundiores durioresq; cutem efficit, quorum neutrum opus est affectis partibus. mollis enim esse debet, ac subviridis sanguis à venis transfusus: hunc enim voluit citra inflammationem suppurare. Quare, si membrum molle sit, & non rubeat, inflammationem abesse demonstrabit. suppurantis sanguinis indicium erit carentia vtriusque coloris, ruboris scilicet & nigritiei. nam, vbi ruber est, inflammari: vbi ex toto niger est, neque superari neque concoqui se à natura denunciat, sed concretum esse. Hoc enim ipsi accidit, vbi diutius extra venas maneat, etiam, si in corpore contineatur, siquidem in eo casu nunquam in pus vertitur. Cōtrā, si natura in corpore superet, vertitur in pus: si ea vincatur, putrescit, non secus, ac vbi extra corpus est, atq; adeo magis, quum in calido loco retineatur. H

- 29 *Sed, si homo vacat febre, vomitu purgetur, sicut dictum est: idem conuenit, si febris sit, sed non continua: vbi ea non intermittat, abstinendum à purgatione, à cibo & sorbitione: aqua potui danda, vitandum vinum, sed non ὀξύλυκός.*

Purgare φαρμακδεν dicit. consuevit enim Hippocrates vsurpare id vocabulum, non vbi quæuis medicamenta adhibet, sed solum, vbi purgantia. Præcepit autem, vt veratrum eodem die detur, vel posteriori, priusquam inflammatio in affectis partibus oriatur, atque homo febricitet. sed, si febris præuenerit, siquidem leuis est, veratro nihilo minus vtitur (nos verò neque integro homine dare veratrum audemus) si vehemens non vtitur, sed maximam abstinentiam imperat, non cibo, non sorbitione vtens, solam potionem adhibet, neque hanc vini, quod licet nusquam posuisset, fugiendum esse manifestum erat. Permittit autem, vt æger ea potione vtatur, quæ dicitur ὀξύλυκός, vel etiam mulsa, hæc enim potui præstat in tenuissimo victu: & tertium ad hæc oxymel, quod ex mulsa, & aceto constat: sed ὀξύλυκός fauos habet dulcissimos maceratos, atque incoctos, sicut etiam nunc in Hellade componitur cuius ratio est:

Fauis

A Fauri expresso melle in ollam coniunguntur, in qua pura aqua sit: tum inferuent, donec omnem prorsus humorem in aqua posuisse videantur. is autem humor reponitur, seruatur que, & aliquo tempore bibitur ad sitim tollendam, frigida aqua dilutus. Hac ergo potione nunc vitur Hippocrates, si ea non est, fumere mulsam licet. sed oxymel, ubi neruolæ partes vitiatæ sint, alienum est, aceto enim tentantur: quam rem & vsus docuit, & ipse demonstrauit. quibus vero idoneum sit oxymel, ostendit in libro de ratione victus in morbis acutis, quem male non nulli inscribunt in Cnidias sententias: non nulli de pristana, neque etiam hi recte.

30 *Sed, si nullum periculum est, ne recrudescant, sanguis suffusus, nigrities, proximæ partes subuidentes sunt, & citra duritiem.*

Vis horum verborum expostita est in eo sermone, ubi inquit /namq;, ubi sanguis à venis transfusus, nigrities: & quæ his proxima sunt, subrubicunda sunt & subdura: periculum est, ne recrudescant/. illis enim, scilicet subrubicundis & subduris, nunc opponit subuidentes, & sine duritie, fiunt enim subuidentes, ubi paulatim in pus vertuntur: duritie carèr, propterea quod inflammatio non est admodum vehemens: id enim causa fuit, quam obrem effusus sanguis verteretur in pus.

B

31 *Quod idoneum testimonium est, ubicunq; sanguis transfunditur, metuendum non esse, ne malum recrudescat.*

Idoneum dixit ἀγαθόν, quasi certum, stabile, verum, perpetuum. testimonium posuit pro signo, siquidem testis est, nobis que opinionem facit eorum, quæ ab Hippocrate propositis verbis traduntur. Inquit igitur positum indicium certum esse, ubi sanguis suffunditur, non solum in calce, sed in cæteris partibus etiam, id que iure, quum non ex partium indicatione, sed ex ipso sanguine transfuso intelligatur. Malus autem transfusi sanguinis affectus, non par adest periculum: differt enim pro natura partium, quibus suffunditur. Prouenit tamen periculum non ex ips partibus, sed ex sanguine suffuso, qui in pus non vertitur. quo minus in pus vertatur, prohibet ingens inflammatio, vel sub aliena vincendi ratione orta, vel ob succos, qui aut copia sui malè habent, aut corrupti sunt. quibus Hippocrates succurrit purgatione per medicamenta, nos per venæ sectionem: miramur que ipsum hac sola contentum non fuisse, quum hoc præsidium nouerit, atque ad huiusmodi casus adhibuerit. siquidem in libro de articulis inter alia, quibus opus est se censeat ad costas collisas, venam incidi in cubito iubet.

Sec. 3. c. 62. 7.
275. 2

C

32 *Sin duræ sunt, & luent, nigritie periclitantur.*

Sanguis etiam, qui super terram funditur, interdum diutius conseruatur, modò magis flauus fit, modò in nigriorem, modò in euidenter atrum, conuertitur. verisimile autem est ab aere, in quo continetur, sereno, nebuloso, humido, sicco, calido, aut frigido variè colorari. Præcipua vero causa varietatis colorum consistit in ipso sanguine, qui varius est, sicut in singulis hominibus conspicitur, vel ad atram bilem magis, vel ad flauam seu pallidam, vel ad pituitam accedens, vel etiam aquosus: id quod illi etiam accidit in animalium corporibus, namque à venis transfusus in varios colores conuertitur, & ubi non superetur, & ubi à partibus, quæ ipsum continent, in pus vertatur. Merito autem hoc tempore liuidus apparet. color enim liuidus illis interiectus est, qui nigri penitus sunt, & qui floridum colorem habent, qualis præsertim est rubicundus, & flauus. sed & hic color, liuidus inquam, à colore florido recedens, ad nigrum accedit, qui apparere etiam solet, ubi, quæ nigra sunt, dum suppurant, inalbescunt. Sæpe enim videre licet, quæ nigra sunt, quum incipiunt verti in pus, liuida se ostendere: tum paulatim nigritie amissa ad ignis colorè accedentia, albidiora euadere, est enim pus cinerei coloris. Indicat ergo Hippocrates nunc discrimen in eo sanguine, qui transfusus liuidum se ostendit. nam, si cum duritie sic appareat, partes inflammatione tenentur: si sine duritie, inflammatione vacant. quæ inflammatione carent, naturam robustam demonstrant, & sanguinem concoquendum esse, et in pus vertendum: at inflammatio naturæ infirmitatem indicat, quæ ob inflammatarum partium imbecillitatem, & multitudinem mali succi subliscentis, transfusum sanguinem nec concoquere potest, nec in pus vertere. Sequitur itaque, ut nigrescat & corrumpatur.

33 *Pedem verò expedit ita collocare, ut reliquo corpore plerunque paulo sublimior habeatur, sanescit autem sexaginta diebus, si quiescat.*

Si pes humilior sit, sanguis, qui ex crure ad ipsum confluet, inflammationem excitabit: si sublimior, nihil confluet. atque idcirco sublimior omnino continendus est, non tamen multo, dolet enim, si diutius hac ratione contineatur: quæ verò dolent, in inflammationem incidunt. Sublimiter ergo figurandus est, quatenus non doleat. hoc autem conperies, si tendi pedem senties, ubi paulo altior contineatur.

D

Crus binis ossibus continetur, quorum alterum altero ab vna parte multo, ab altera paulo, tenuius est.

Verba hæc, quibus crus appellat *κνήμην*, eorum confirmare sententiam videntur, qui volunt *πῆχυν*, *βραχίονα*, *κνήμην*, *μῆλον* vocari ab Hippocrate, non totum id, quod compositum ex ossibus & partibus superiectis est, sed sola ossa. At re uera ex his ipsis verbis colligitur, non hoc modo, sed illo etiam, accipi posse, quare nomina hæc, quibus vitur, duobus modis accipere licet, sicut accipiunt, qui ea referunt, modò ad ipsa ossa tantum: modò ad ossa simul & partes, quibus ossa superconteguntur, sic, ut *κνήμην* appelletur id, quod inter pedem est, & genu. Duorum autem ossium, quæ in ea parte sita sunt, alterum scilicet tibiā græcè appellari *κνήμην*, reliquum scilicet suram, *πτερόν*: ad hæc tibiā pleniorē esse, suram verò tenuiorē: ac medium, quod minimè carnosum, & per vniuersam hanc partem à summo ad imum in longitudinem fertur, & in his, qui graciles sunt, conspicitur (græcè *αντικνήμιον* vocatur) tibiæ partem esse, non suræ, atque alia, quæcunque ad ossa pertinentia scire licet, omnia exposuimus in libro quem de ossibus conscripsimus, ad eos, qui primas institutiones addiscunt.

35 *Hæc ad pedem inter se iunguntur, communem quæ appendicem habent.*

Communem non debemus ita accipere, quasi continuā, atque omnino vnā, sed quali vtriusque appendices inter se iungantur, & vnius tantum opinionem faciant. ita enim inter se conueniunt hæc appendices, ut vna esse videatur. extremæ verò earum partes rotundæ, quæ carne nudantur, non rectè à quibusdam talus nominatur: perpetua enim chorda talum continet ab interiori parte, qui ab hac tectus nec visu comprehenditur, nec tactu.

36 *Sed recta in crure dehiscunt.*

Dehiscunt proposita duo ossa recta in crure, hoc est, in longitudine cruris non se contingunt, neque inter se connectuntur.

37 *Ad femur autem iunguntur, & appendicem habent: appendix verò discrimen.*

In commissa genu, caput tibiæ longè crassius est, quàm suræ, atque idcirco appendix tota esse tibiæ videbitur, ipsam quæ ab exteriori parte sura fulcit. Discrimen, quod *διαφύσιον* vocat, id intelligit, quod in medio extat neruosum cartilagosum quæ, quod processus femoris, qui in tibiā coniunguntur, distinguit: sed in ossibus eorum corporum, quæ iam diu mortua sunt corrumpuntur, sic, ut aliquis decipiatur, falsum quæ existimet, quod ab Hippocrate scribitur: iniuria quidem, quoniam in recenti cadauere id semper apparet.

38 *Longius autem paulo est alterum os, quod à parte minimi digiti est. Natura ossium cruris sic se habet.*

Quod inquit longius, ego sic scribendum censeo /longius autem paulo est alterum os à parte minimi digiti/. Quod si non hoc modo, sed illo, Hippocrates scripsisset, confirmaret prius tibiæ appendicem in genu communem esse vtriusque ossis, non propriam tibiæ. nam simpliciter longius esset, non ab ima parte duntaxat.

39 *Luxantur hæc modò à parte pedis: ac tunc, modò vnà cum appendice ossa ambo, modò appendix tantum mouetur, modò alterum os.*

Seft. 1. t. 1. 7.
251. c

Putant medicorum aliqui verbum *διαρρῆν* vsurpari ad ea ossa significanda, quæ toto loco mota sunt, sed *ὀλιθαίνεν* (quo verbo /luxantur/ expressit) ad ea, quæ paululum, nō tamen ex toto, naturali sede excesserunt. Verum hi non videntur legisse librum de articulis, vbi initio protinus ait, || Articulum, qui cum lato scapularum osse committitur, vidit vno modo excidere, nempe in alam/, in quo loco verbum excidere *ὀλιθαίνον* dixit. Atqui totum humeri caput eo sinu mouetur, in quo recipitur, quum non possit paulum excedere, sicut ipse Hippocrates docuit, vbi causam adiecit: quam habebimus, quum ad eum locum veniemus.

40 *Hæc quidem minus molesta sunt, quàm quæ in prima palme parte, homines modò quiescant. Curatio autem in vtroque casu similis requiritur. namque hæc coniicienda in suum locum sunt, intenta perinde atque illa, sed valentiorē etiam intentionem requirunt, quatenus corpus hac etiam parte validius est. Plerumq; satis duo homines sunt, qui in diuersa contendunt. qui, vbi nequeant abundè extendere, facili est validiorē intentionem adhibere.*

Non modò minus molesta sunt, quàm quæ in prima palme parte, sed multò magis, quàm quæ in pede. Sed quoniam de pede & manu communiter tractauit, idèò abundè existimat alterius partis

A partis duntaxat meminisse, quæ, quod ad molestiã pertinet, media est inter crus & pedem. quanto .n. maiore molestiã affert, quæ crus, tanto minore, quæ pes, & precipue quæ calx, de quo paulo supra egit.

- 41 Nam vel rotæ modiolum defigere oportet, vel aliud quid simile: tum molli aliqua re pedem obuolueri, subulis quæ loris latis circumligare, & eorum capita vel ad pistillum vel ad aliud lignum deuincire, eius quæ imam partem in modiolum demittere, summam recuruare: alios vero & ab humeri capite, & a poplite, in contrariam partem extendere.

A Rotæ modiolus.
B Mollis res pedi circumiecta.
C Lora lata.

D Pistillum.
E Ab humeri capite extendens.
F A poplite extendens.



Lignum defigi iubet, quod recipere possit imã partem vetricis, p. quæ membrũ debet ab inferiori parte extendi. Tibi verò ignotũ esse nō credo, rotæ modiolũ *πλύνων* ab Ionibus appellari, cum apud poetam hoc quoque vocabulũ legat. Comonet autem Hippocrates, ut ubique ex his, quæ ad curationẽ cõducunt, illis utamur,


quæ in promptu sunt: & nunc etiam meminit modioli rotæ, qui præsto nobis esse potest vbiuis gentium. similiter pistillo pro vetricis nunc ad extendendum vitur. Sed qua via adhiberi hæc debeant, ipse suis verbis, si animaduertantur, aperte declarauit.

- 42 Sed à superiori quoque parte adhibere vim licet.

C Vim, hoc est, valentem in vtranque partem intentionem *ἀνάγκη* appellauit, ut vehementem eius potentiam indicaret.

- 43 Potes etiam, vbi velis, aliè lignum defigere rotundum ac læue, sic, ut pars eius extet, quæ inter crura, media inter anum & naturale demittatur, ut prohibeat sequi corpus, quod à pedibus extenditur.

A Lignum rotundum ac læue.
B Extensio à pedibus.
C A latere clunem repellens.



Rectum statuit lignũ hoc firmiter in hærens, ne corpus (ut dictũ est) à pedibus extẽtũ se quatur, quod collocatum sit hoc lignũ inter anum & primã naturalis partem, quem locum *ὑποκλινῶν* appellat.

Deinde, ne corpus inclinetur in id crus, quod intenditur, collocare aliquem à latere oportet, qui clunem repellat, ne corpus ducatur.

In plerisque exemplaribus, quæ nunc proponuntur verba, proximè positis subiiciuntur, quam sine his vniuersa sententia maneat. vult enim medium lignum statui inter vtranque crus, atque ita ab inferiori parte affectum crus extendi, aliquo sursum clunem repellente, ne corpus ea parte trahatur, & in alteram partem inclinatum permittat crus ducentem sequi. namque, vbi hoc accidat, intentionem remitti necesse est.

- 45 Idem quoque fiet, si ad utramque alam lignum figatur, brachia uero seruentur extenta, & alius genu prehensens in contrariam partem adducat.

Septima Classis.

HHHHHHH

Modum



Modum alium docet, quo prohibere possis, ne totum corpus extantam membri partem se-
quatur. figit enim lignum ad utramque alam, quod corpori obiectum, hominem sequi non pa-
tatur, quum partes inferius extenduntur. Sed nunc nihilo minus oportet crus, quod ab inferio-
ri parte extendit, propriè à genu prehensum in superiorè partē attrahi, atq; ita in diuersa diduci.

- 46 Nihil etiam prohibet, si placeat, lora alia ad genu vel ad femur alligare, alium quæ rotæ modiolum post caput ho-
minis figere, lora quæ ad aliquod lignum dare, quod in modiolum demittatur.

Vbi velis crus à superiori parte extendi, ut in diuersa diducatur, moliri eam rem poteris inie-
ctis loris, quorum capita sursum adducta ad vectem religuntur: imæ autem vectis parti, quæ he-
rere pavimento debet, necesse est cauum aliquod subiiciatur, cuiusmodi est rotæ modiolus, qui
obex vecti sit, ut possit in contrariam partem attrahere.

46
Qui apud Feli.
fuit unus tex-
tus, videtur se-
cat in duos.

Et ad contraria, atque ad pedes attrahat.

Ad contraria dixit τὰναντία. Sed si scriptum inueniremus ὁπὸς τὰναντία, quid nam obscu-
rum in verbis aut sententia esset? Verum quia legimus τὰναντία, sine propositione ὁπὸς, quæ
significat ad, duorum alterum existimandum est, aut principio ab eo, qui librum descripsit, omis-
sam fuisse particulam εἰς, vel ὁπὸς: aut ab ipso Hippocrate de industria, vel quod idem significet,
vel, quod vocem /τὰναντία/ usurpet pro adverbio, quasi dixerit ἐναντίας.

- 47 Pro modio etiam poteris lecto mediocrem trabeculam subijcere, eius quæ utrunque caput stabilire, lignis quæ re-
curuatis lora extendere.




H

Antè, binis modiolis, binis quæ vectibus in contrarias partes extēdebat, vno infra pedem ex-
tēto, altero supra caput. Sed quoniam (ut retuli) in eo exerceri nos voluit, ut præsidia in promptu
habeamus, alium modum docens, in similiū inuentione te exercet. nā, si modioli nō sint, tignū, quod
lecti, super quo ægrotans iacet, longitudinem equet, subiiciendum est. Cætera omnia, eadem at-
que antè, efficienda sunt. lora enim corpori iniicienda eo modo, quo superius docuit, vinciēda quæ
ad ligna, quibus, quasi vectibus ad extendendum utimur. Sed pro modiolis nunc adhibētur ex-
trema longioris tigni, quæ capita dicuntur, ut modicè utrinque lectum excedentia, & à capite &
à pedibus, extendentibus lignis, mora sint. trabeculam verò, quod lignum in longitudinem le-
cto subiicitur, ὁπίσθ' α' dixit, quasi μικρὰν ῥάβδον, id est paruam trabem, significans.

- 48 Cōmodè item extends per axiculos ab ὑπὸ γ' parte collocatos. Sunt etiā aliæ extendēdi rationes, quàm plurimæ.
Axes

A



Axes solius est
appellare *crus*, quē
admodum, ubi feri
bitur, velatur.
nūc verō axiculos
nominavit *crura*,
vltus nomine dūni
nutuo, sicut in su-
perioribus verbis,
trabeculā *scilicet* a
dixit, parāntur abē
significās. Exerce-
ri autem debet, nō
solū in *his*, quę prō-
pta sunt, excogitā-
dis atq; admoūen-

B

dis, sed etiam in machinamentis, quę parantur à medicis ad has intendendi rationes. Axes itaq; collocandi sunt, nō recti in longitudinem corporis, sed transuerſi ab *his*, quę hinc atq; hinc sunt, partibus corporis, quod curatur. id autem non aliud significat, quā alterum ab inferiori parte à pedibus, alterum à superiori à capite, collocandum esse. Post hæc iniecta lora extrema ad axes danda, quī versati *crus*, quod curatur, in diuersas partes diducant.

- 49 Optimum autem est, si quis medicinam in magna *rebe* exerceat, paratum habere lignum, per quod vim omnem adhibeamus ad fracturā & luxata omnia restituenda, tum extendentes tum impellentes. Abundē autem erit lignum tale, quales sunt quadratæ columnæ quernæ, quod ad longitudinem latitudinem & crassitudinem pertinet.

Organi cuiusdam, seu machinamenti, quod haberi voluit, mentionem facit: in libro autem de articulis, qui huic subijcitur, docet eius fabricationem. Nos ibi si quid obscurum fuerit, expone-
mus. nunc proximum est ad ea transire, quę subdit:

- 50 Vbi satis extenderis.

C Crus videlicet: de crure enim agens circa talum prolapsō inferuit extendendi rationem. sic q; rursus ad sermonem reuertitur, quem initio proposuit.

- 51 Articulus facile reconditur. Diducitur enim ab antiqua sede, sic, ut è regione supra ipsam spectans non hæreat. *videtur unum*
Prominentioribus itaque palmarum partibus dirigendus est, partim, quod extat adurgetur, partim infra talum, *facit textum,*
52 repellentibus. Eo restituito crus, si fieri potest, extensum alligandum est: sin lora prohibeant, ea soluenda, & dum vim *que tibi. dios*
culum mycitur, in contrarias partes extendendum. *fecit.*

Hippocrates articulum *ἀρθρον* dixit: quo mouētur, qui volunt sic apud ipsum vocari extrema ossa, quę in cauis recipiunt, sic, ut totū id appelletur *ἀρθρὸς πᾶσις*, ubi cōmittunt extrema ossiū, quę in flexu atq; porrectione mouētur. Ex viroq; aut ossē, id quod inserit, *ἀρθρὸν*: cauū, quod recipit *κοτύλη*, vel *γλήνη* ab Hippocrate dicat. sed hæc nominū disceptatio reijcienda est. Deinceps verō ostēdet luxati restituendi rationē vniuersam, sicuti nos in primo horū cōmentariorū statim diximus, ubi intēdēdi vltim explicauimus, demonstrātes nō posse luxata cōmodē restitui, nisi ita diducant, ut alterū alteri non inhercat. Protinus aut terminum habes, ad quē vltq; extēdere conueniat. nāq; ubi iā videbunt eatenus extēta esse, ut altero alteri nō inherēte, diducant, extendere delines.

D.

- 53 Dandum insuper eodem modo vinculum est, æquē capitibus ex parte, quę extat, impositis: ibi quę primò & plurimum circundandum, & pannus plurimus iniectis potissimum adstringendum.

Capita summam commemorauit illius vinculi ad fracturas pertinētis, quod antè declarauimus. Meminisse autem oportet, ea, quę in manu, pede, calce, talis quę, suo loco excidunt, eo modo vincienda esse, quo fracturæ, atque idcirco in hoc libro omnia comprehendit. Causam verò, quamobrem ita vincendum sit, siue fractum os sit, siue prolapsum, in superioribus habuimus.

- 54 Tum hinc atque hinc plurimum obuoluendum.

Hoc etiam docuit in libro de officina medici, quū inquit, Comprehendat quę vinculum *scilicet* integræ partis q; plurimum. Causa in prioribus posita est. latius. n. est succos, non solum exprimi *scilicet* à viuata parte ad ea loca, quę iuxta sunt, sed repelli ad ea, quę plurimū recedūt, & longē cohiberi.

- 55 Hunc autem articulum, ubi primò deuincimus, comprimere magis debemus, quā qui in manu.

Septima Classis.

HHHHHHH ij

Modum

Modum comprimendi, & fasciarum numerum, constituit pro magnitudine articulorū, intui E
tus etiam, quā neriis cōtineantur, & q̄p acris sensus sint: hos liquidem minus comprimi iubet.

- 56 *Iniecto vinculo pars deligata, reliquo corpore sublimior habeatur. Sic tamen continenda est, ut pes minimè suspendatur.*

Pedem continendum esse reliquo crure paulo sublimiorem, supra quoq; dictum est. Dictum est insuper ipsum catenus excitandum, quatenus extenti muscoli non laborant. Nunc præceptū adiungit, quod ad tutò continendum pertinet, ut pes ne minimum quidem suspendatur, id autē fit, ubi lana molli vndiq; cingitur. quin & pars eius extrema, qua cutis est, ipsi subiecta, molli aliquo, ut puluino, fulcienda est, tum ligno aliquo erecto, ad quod per mollem habenam vincitur.

- 57 *Extenuari autem corpus debet, prout ossa grauiter suo loco excidunt. Non nulla enim leuiter, non nulla plurimum mouentur.*

In aperto sanè est, quæ paululum exceſſerunt, paruam curam exigere: quæ plurimum prolapsa sunt, & maiorem abstinentiam, & cætera, quæ corpus extenuant.

- 58 *Magis omnino ac diutius extenuare corpus oportet, ubi crus, quàm ubi brachium leditur, quum illud maius sit & crassius, quàm hoc. Neceſſe item est corpus quiescere, atque iacere: sed soluere articulum tertio quoque die, & rurſus alligare, nihil prohibet, nihil item cogit. Reliqua omnia eadem fieri debent, quæ in prioribus posita sunt. Quod si homo quiescat, & iaceat, abunde sunt quadraginta dies, modò ossa in suam sedem restituta fuerint. Sin quiescere non lit, ægrius crure utetur, cogetur que diutissime vinculum adhibere.*

Ipsè causam reddidit eius, quod præcepit. inquit enim /quum illud maius sit, et crassius, quàm hoc/: quibus tertium adiicit, quod homo cubans confanescat, non ingrediens, sicut ubi brachiū offenditur. Hæc igitur in vniuersum pertinere ad omnes articulos arbitramur.

- 59 *Verum, ubi ossa ex toto in suam sedem non reuertuntur, sed aliquid abest, tempore extenuatur coxa, femur, & crus: ac, si in interiorem partem excidunt, exterior pars tenuatur: si in exteriorem, interior.*

Si qua ex integris partibus diu quiescat, vel leuiter moueatur, tenuior fit, q̄p prius esset: motus enim corpora calefacit, eorum que vim firmat, ob quam partes melius nutriuntur. sed, ubi luxatum aliquid non fuerit perfectè restitutum, deterius perticiuntur motus, præcipue que à contraria parte illi, in quam venit, quandoquidem locus eà vacuus relinquitur, quum os in contrariam G moueatur. Homo igitur facilius illi parti inhaeret, in quam articulus excidit. superiores enim partes sedē requirunt, quā inanis locus non exhibet, sed plenus, quum nihil possit inani loco hære: atque ea de causa crus ab ea parte, in quam articulus erumpit, sustinere corpus solet, & tantum musculis, qui ea continentur, suo munere fungi, hi liquidem benè nutriuntur: in exercitatis verò non satis alimenti subministratur, hi autem in contraria parte continentur.

- 60 *Pleraque tamen in interiorem partem promouentur. Sed, si integra cute vtrumque cruris os comminatur, validius intendendum est. Si vna pars fracturæ valde super alteram excedat, aliquo vtendum est ex propositis intendendi modis. Abunde quoque est, & per homines extendere: ferè autem satis sunt duo homines robusti, qui in diuersa contendunt, vnus ab vna parte, alter ab altera. Extendere autem recta secundum naturam oportet, & è regione cruris ac femoris, tam si huius quàm si illius fracti ossa extendantur.*

Quæ excidunt ab inferiori parte, qua cum talo cōmittuntur, in interiorem partem magis prorumpunt. cuius rei causa est suræ processus, qui ab exteriori parte talum magis cōplectitur, quàm tibiæ processus ab interiori.

- 61 *Atque ita extenta ambo deligare, vtrumuis deuinxeris. At non eadem cruri ac brachio accommodantur. Nāq; ubi brachij vel humeri ossa comminuta deligantur, brachium suspenditur: atque, ubi extentum alligatur, caro alio modo figuratur, dum cubitus flectitur. Nequit enim cubitus extentus diu haberi: non enim solitus est sepe in hoc habitu detineri, sed curuatus. Quin, quum homines ingredi possint brachio comminuto, neceſſe habent cubitum curuare. Crus verò, quia ambulando & stando in interiorem partem, nunc ex toto, nunc propè ex toto, intendi secundum naturam, & ferè etiam reliquum corpus consuevit, idcirco sine molestia extenditur, quum opus est. Quid quod & in lecto sepius hoc modo cōtinetur figuratum? Sed, ubi frangitur, neceſſitas hominis animum subigit: nequit enim excitari, quare de curuando crure, aut de surgendo nullum verbum facit, sed ita figuratus quiescit, & cubat.*

Siue femur, siue crus alligetur, præcipit, ut vtrāque cōmissura extendatur, scilicet, quæ in coxa est, & quæ in genu. Cur ita figurari debeat, ipse deinceps adiicit euidenti demōstratione vsus, cuius mentem facile comprehendes. Horum itaque verborum capita sunt. Consuevit crus, & eorum, qui stant, & eorum qui ambulant, extendi, à natura enim, corporis ferendi gratia factum, ab eadem ad hūc habitum præparatum est: atque ea de causa in cubando plerunq; extentū seruat, sed

A sed brachia & in ingressu, & alioquin ferè modicè curuata continentur, quandoquidē nemo extētis brachijs ambulat. ac propterea brachio etiā deuincto mitella cubitum excipiente ambulare æger potest: at crure perfractio, priusquam callo firmetur, ingredi minimè licet.

62 Ob has igitur euidentissimas causas non conuenit eodem habitu brachium, atque crus, extendere & Vincere. Quòd si abunde fuerit per duos homines adhibita vis, frustra laborandum non est: tactantia enim est, uti machinamentis, ubi res non exigit. At si duo homines non satis extendant, confugiendum ad eum ex propositis intendendi modis, qui expeditissimus sit. Intentione satis adhibita ossa facile restituntur, & in suam sedem committuntur: prominentioribus palmarum partibus directà atque diducta. Postquam resoluta fuerint, extenta facilius alliganda sunt, quæ siue à dextra, siue à sinistra parte, magis attrahi debeant, illis primò inuoluenda sunt. Ordinantur autem ab ea parte, qua fractura est, primo quæ ibi circumueant: deinceps ad partem cruris superiorem porrigantur, quemadmodum ostensum est in alijs fracturis. Fasciæ verò latiores & longiores, ac multo plures ad crus adhibeantur, quam ad brachium. Vbi deligatum fuerit, super aliqua re plana molli quæ collocandum est, ne in hoc, vel illud latus deprauetur, ne ue in anteriorem, ne ue in posteriorem partem peruertatur.

B Euidētissimas causas appellauit *εὐφάσεις*, quamuis causæ, quas proposuit, veræ sint, neque id vocabulū ad falsas causas significandas (ut vsurpari solet) mutuatur. paulo infra etiā eodem modo ipsum accipit, quū inquit /ob has igitur euidentissimas causas, si os, quod ab exteriori parte est, cōfringatur, maturè homo ingreditur/. Id quod de fura dixit, verā causam reddēs, cur ea fracta crus celeriter moueatur: atq; ubi tibia perfringitur, longo spacio opus sit ad hoc, ut homo uti crure possit.

63 Maxime autem pro valitudine est, cervical subijcere ex lino aut lana, quod medium in longitudinem molle sit, vel quidpiam tale.

Crus fulciri iussit eo modo, quem posuit, cervical magis quàm canalem adhibens. proxime autem subdit, cuius rei illos accuset, qui canali vtuntur.

64 De canali, qui fracto cruri subijcitur, incertus sum quid dem consilij, subijci nec ne debeat. Prodest quidem, sed nō quantum existimant, qui illum adnouent: non enim quiescere cogit, ut arbitrantur. Nam neque si reliquum corpus in hanc, vel illam partem conuertatur, prohibet canalīs, quo minus sequatur crus, nisi ipse homo caueat. Neque item prohibet, quo minus sine corpore crus in hanc vel illam partem moueatur. Sed & subiectum lignum immite est, nisi molle aliquid in ipsum indatur: est tamen commodissimum, quando vel sterni lectum, vel desidere hominem oportet. Licet igitur, & cum canali, & sine eo curationem bene vel male adnouere. Vulgò sibi persuasum habent medicum culpa maior vacare, si canalem subijciat, quanquam res minus artificiosa est. Crus enim rectum prorsus iaceat, oportet, & super plana ac molli aliqua re, quum necesse sit contineri vinculum, ne peruertatur, dum membrum iacet, quocunque se vertat, & moueatur. Respondeat item, qui deligatus est, eadem, quæ supra posita sunt. Nam vinculum tale esse conuenit, & tumorem in extremis partibus assurgere, & eodem modo laxari, ac tertio quoque die resoluī, & rursus deligari: ad hæc id, quod alligatur tenuius inueniri, tum arctius Vinciri, & pluribus linteis uti, pedem quæ non arctè comprehendere, nisi fractura ad genu proximè accedat. Debent etiam ossa modicè extendi ac dirigi, quotiescunque vinculum iniicitur. Nam, si curatio idonea fuerit & tumor ut conuenit, procedat, alligata sedes tenuior est, atque gracilior, & ossa facilius tractantur, & ducentibus magis parent. Septimo autem uel nono die ad ferulū ueniendum est, quemadmodum dictum est in alijs fracturis.

Et nunc etiam quosdam medicos noui, qui etiam nunc cruri vel femori affecto canalē vel glossocomum subijciūt, ubi femur quidem lectum est vniuerso cruri: sed, si quod inter genu & pedem est, ledatur, non nulli vniuerso cruri lignum subijciunt, non nulli eam partem duntaxat glossocomo fulciunt. lædunt, qui vnà femur etiam comprehendunt, sed minus quàm alij. Noxas docuit Hippocrates sic aperte, ut mea explanatione non egeant: verū, si quid iudicaui in verbis eius fore cuiuspiam obscurum, illud explicabo, atque ante omnia, quid inter canalem & glossocomum interlit. Glossocomum ab atticis appellatur arcula illa, in qua seruare homines solent eas res, quas in precio habent, & scripta, quæ recondi volunt: qua non nulli ad itinera vtuntur. At nihil refert, siue glossocomium, siue glossocomum nominetur, sicut neque siue per duplex ut siue per duplex si. Constat autem glossocomum, quod cruri subijciendum est, longius esse debere, & angustius, quàm quæ in usu sunt. eius enim latitudo parum excedere debet cruris latitudinē, seu crassitudinem, seu quomodocunque libeat appellare: ut lana vndique adiecta bene crus firmetur, sic, ut loci angustia, etiam si eger velit, crus moueri non pauatur. sed, ne in dextram partem vel sinistram moueatur, potest imposita lana efficere: at, quo minus in superiorem vel inferiorem feratur aut excutatur, prohibere non potest. Quocirca Hippocrati huiusmodi ligni vsus non placet, quoniam præter cetera incōmoda durum est. nam immite, quod ipse dixit *αγέεον*, durum significat, & insuauē, quòd nihil cedat, quemadmodum cervical, & ille puluinus, qui cum cu-


bito subiiciatur, ὑπαγκώνιον græcè dicitur: hæc enim modicè cedētia crurī minimè infesta sunt. E Commodum autem est machinamentum hoc, quū desiderare homo debet, vel ad lectum alterum transferri, ut ille in quo iacet, sternatur, qua potissimum causa eius vsum admittimus. quanquam alij cervical adhibentes habena transversa initio illi protinus subiecta: atque, ubi crus in id coniectum fuerit, habenæ capitibus inter se aduersis vtrinque ductis in altitudinem cruris, & in superiori parte membri inter se deiunctis: fideliter contineri crus existimant, quoniam cervical, ubi homo ex vno lecto ad alterum transfertur, crurī vicem glossocomi præstat. Adiecerūt non nulli ad imam eius partem lignum rectum lana superdata, ut pes extremus moram habeat: ne homo videlicet crus vel ad superiora attrahat, vel ad inferiora demittat. ad superiora enim ferri, vinculum non patitur: ad inferiora verò, lignum, quod plantæ adijcitur. Verū, ut hæc à medicis stabilia præparentur, non tamen prohibetur motio articulorum, quū languens possit articulum tali ac genu paulatim dimouere. De coxæ enim articulo nihil attinet dicere, quū nec à vinculo nec à glossocomo comprehendatur. canalis verò in cæteris glossocomo similis est, sed figura ipsa differt, quū ab exteriori parte teres sit, ab interiori cauus, ad exemplum fictilis canalis, vnde nomen traxit. Videtur autem hic ad propositum vsum maximè idoneus, namque vniuersum crus in orbem complectitur, magis quàm glossocomum, in quo non nulla loca inania relinquuntur, postquam demissum crus fuerit. Quidam verò medici plures canales paratos habent, ut ad singula membra eo vtantur, qui idoneus sit, id lignum conquirerent, ex quo cauare eos possint firmos, albos, & molles. Apud nos autem quidam medicus eiusmodi canales complures habebat ex tilia confectos, sic, ut ad singula crura eos adhiberet, qui magnitudinī membri responderent, non sine vinculis, quæ (ut recensui) à quibusdam cervicalibus superdantur. Sed vincula in cervicalibus laxantur, & compositum crus corrumpunt: canales verò, dum homo ex vno lecto ad alterum transfertur, ob ligni mollitudinem, sine vlla compressione id continent.

Ad continendum autem firmiter, Glossocomum instrumentum à iunioribus medicis inuentum est, seu femur, seu crus fractum sit, cuius structuram vsumque subiiciam. id autem non ab re mihi videtur fuisse excogitatum: & tam si femur, quàm si crus comminutum sit, ubi callus circumdatur, commodissimè adhibetur. Habeat ab ima parte axem, ad quem extremi laquei in diuersa extendentes deligantur. iniiciantur laquei extremis partibus ossis, quod curatur, fiant quæ ex duabus habenis, sic, ut quatuor vterque capita habeat, bina à dextra parte, totidem à sinistra. Ex ijs capitibus, quæ inferioris laquei sunt, per foramina facta in inferiori parte glossocomi ad axem duci debent, quæ superioris, primò procedere ad superiora: deinde ipsa quoque per latera glossocomi perforata trajici, quibus foraminibus trochleæ inclusæ sint: vtrinque autem ab exteriori parte glossocomi superioris laquei capita ferenda sunt ad axem. His enim ita cōstitutis vna axis conuersio pariter ambos laqueos extendit, deorsum versus illum, qui ad inferiora fracti ossis alligatur, sursum alterum, sic, ut, ubi crus iacet, liceat in posterum cotidie hanc laqueorum in diuersas partes intentionem corrigere, valentius vel lenius extendendo. Laqueum igitur, qui in inferiori parte est, directâ ductione axis extendit: eum, qui in superiori parte, intercedente alio motu, græci δὲ τῆς μεταληπτικῆς τάσεως dicunt.

GLOSSOCOMIVM

65

- A Axis ad quem laquei alligantur.
- B Laqueus superior.
- C Laqueus inferior.
- D Inferior pars glossocomij.
- E Trochleæ.
- F Superioris laquei capita ab exteriori parte glossocomij.



intētio est, aut negligenda. Potissimum aut, vel cū fractura primò deligatur, vel certè quā celerrimè, extendenda semper ossa sunt, dum in suum locum reuertantur. Quodcūque autē membrum ossibus non rectè compositus sub vinculo adstringitur, magis indolescit. Reliqua curatio eadem est. Ex ossibus cruris interius, quod conspicitur in priorī parte cruris, quam græci ἀντικνήμιον dicunt, curationem ægrius admittit, & intentionem postulat valentiorē:

neque

Cauendum est, ne ferulæ è regione talorū, uel eius chordæ, quæ à crure ad pedem tendit, imponantur. Conferuent autē ossa cruris quadraginta diebus, si rectè curentur: sed, ubi suspicio sit, ne quid ossis dirigi debeat ne ue aliqua interim facta fuerit exculceratio, in fra hoc tēpus soluere oportet, tum dirigere, & rursum alligare. At si alterum os abrumpatur, lenius intendendum est, sed non propterea omittenda

A neque latere potest, ubi non recte ossa concurrant, totum enim se ostendit, & sine carne est: multo que tardius homo inceditur, ubi hoc fractum est. Quod si exterius os abrumptur, casus longe tolerabilior est, neque id ita facile deprehenditur, quum minus recte componitur, quoniam carnosum est: maturius item ex per pedibus consistit. Maximam enim oneris partem sustinet os, quod ab interiori parte situm est, tum quia magis laborat, & ob id sum cruris, & ob pondus, quod e regione est, senioris enim caput superius corpus fert, id autem ab interiori cruris parte situm est, at non ab exteriori, sed e regione prioris partis tibiæ: tum quia altera pars totius corporis e regione huc propius accedit, quam ad exterius os. Adde, quod os interius plenius est, quam exterius, non secus, atque in brachio, cuius os, quod e regione minimum digitorum spectat, tenuius est, & longius.

Extantes ossium partes, cuiusmodi sunt tibiæ suræ que extrema, ferulas non patiuntur: cautio igitur esse debet, ne his locis circundentur, imponantur/dixit ἐν ἐδ. παρ. quasi ἐδ. παρ. adiecta præpositione ἐν, ut clarius rem ipsam exprimeret. Hæc itaque ossa, quum extent, & carne minime tegantur, impositis ferulis premuntur. Magis autem premi dicantur, non ipsa, sed muscoli illis superiniectioni, tum quidam musculorum fines & cutis, hæc enim collocata inter duo corpora dura, nempe inter ferulas ab exteriori parte, & os ab interiori, premuntur, atteruntur que, & sepius ita læduntur, ut exulcerentur. Calci verò à posteriori parte versus priorem innectitur chorda, quæ ab vno diducitur ex musculis, qui continentur in parte cruris posteriori, quæ carnosaprominet. hæc, quum carnis maximè expers sit, potissimum in homine gracili, superimpositam ferulam non sustinet: sed, quum acerrimi sensus sit, si comprimatur, inflammatione vrgetur. ea verò, quæ tibiæ suræ quæ tuberculis superiniectioni sunt ob duritiem eorum, quibus (ut dictum est) excipiuntur, compressa eatenus læduntur, ut exulcerentur. summæ autem cutis exulcerationes sub comprimentibus ortæ, ἐκθλίμματα ab Hippocrate vocantur.

66 Verum longioris ossis structura in inferiori articulo dissimilis est. Non enim similiter flectitur cubitus, & poples. Ob has igitur evidentissimas causas si os, quod ab exteriori parte est, perfringatur, maturè homo ingreditur: si, quod ab interiori, tardè,

Quum ipse in prioribus dixerit, suræ os longius, quæadmodum & in brachio os cubiti: utrumque autem e regione minimum digitorum spectare, & tenuius esse, quam id, cum quo iungitur: deinceps addidit, qua ratione inter se distent. Explicauimus autem in commentario de ossibus, præter alia, quomodo se habeat utriusque commissura: atque insuper radium in brachio cum interiori tuberculo humeri committi, ac circa ipsum moueri in exteriorem vel interiorem brachij partem conuersum: sed in crure, tibiæ solam cum femore committi, quia sura nullam motum præstat. Nam neque hic articulus in latera villo modo mouetur, sicut articulus cubiti, sed curuatur duntaxat, id quæ non eadem ratione, qua articulus cubiti, ubi humeri ambitus trochleam referens in cauo cubiti recipitur: at in genu duo processus femoris in sinus tibiæ se inferunt. Adde, quæ ex cubiti processibus rostrum referentibus, posterior in posteriori sinu humeri recipitur, ubi maximè articulus extenditur: prior in priori, ubi maximè curuatur. quorum neutrum tibiæ accidit, quum nullum penitus processum habeat rostro similem, non enim similiter flectitur cubitus ac poples. Cubiti verò eminentiam clarum est vocasse ἀγκώνα, quo nomine vius est etiam in superioribus, de cubito agens, quum dixit / est autem idem cum illo eminentia cubiti, cui præcipue innititur/. Eandem eminentiam & ὠλέκρانون dicunt, & κόλπον. sed nunc ait / non enim similiter flectitur cubitus & poples/, idem significans, ac si dixisset, illa commissura, quæ iuxta cubiti eminentiam est, & illa, quæ iuxta poplitem, dissimiliter curuantur: cuius rei exemplum infra habet, quæ de luxatis, ubi allerit, quæ in cubiti articulo sunt, molestiora esse. Illud autem multis in locis meminisse oportet, exquisitam nominum rationem, ne ab vno quidem ex vetustis grecis seruari, quum quibusdam abutantur, quædam à propriis rebus ad alias transferant. Atqui poplitis nomen tale est, quale ipsa ala, quæ locum significat sub humeri capite: at poples id appellatur, quod à posteriori parte ipsi genu opponitur: genu autem notant, priorem partem huius articuli vniuersam. Quare, si cui hac parte cutis exulceretur, eum hominem inquiunt teneri vlcere in genu: quod si chorda, quæ sub cute os cingit, secetur, genu accepisse vulnus dicunt: non secus, etiam si patella vitietur, quam greci & μηδελ, & ἐπιγορτίδα vocant. Ad hæc, qui latera corporis exprimunt, modò ab interiori parte genu, modò à posteriori, vlcus ortum aiunt. vniuersum enim hunc locum à lateribus, genu vocabulo appellant: eadem ratione, & poplitem, & alam, & humeri caput: sic etiam cubitum, & talos, & primam palmarum partem ad totum locum significandum vsurpant: sepe etiam adijciunt, articulum capitis humeri, aut cubiti, genu, coxæ, vel talorum. Constat igitur Hippocratem variè nominibus uti, aliorum maiorum exemplo (ut retuli) contempta quam iuniores excolunt, curiosa verborum ratione: quæ ab ijs, qui in ea versantur, exquisita diligentia dicitur.

DE FEMORE

67 At si femoris os fractum est, valenter omnino extendi debet, non minus quam res postulat, id fiat: siquidem plus
Septima Classis. HHHHHHHH iij iijto

iusto intentum non leditur. Nam ossa hæc, quæ per vim diducta sunt, si sic recedentia inter se vinciantur, non sanè E poterūt, ita diducta, vinculis contineri, quin celerrimè concurrant, quum primū, qui extēdunt, ex opere se receperint.

Quia maximi sunt musculi, qui femur circundant, non immeritò veretur, ne (quod sæpe contingit) nō satis membrum extendatur. Ergo, vt audacter extendamus, intentio (ait) iusto valentior nō lēdit: fieri enim in hac parte potest, quod suspectum ellet in alijs. At quid hoc est? vt de- uinciatur os fractum, dum ipsius partes, quæ pertractantur, inter se recedunt: quas non secus, atq; vbi membrum naturaliter se habet, coire oportebat nullo relicto inani spacio, in quo ex cōtracta sanie periculum sit, ne os corrumpatur. Si quando enim fracti ossis partes, quum vehementius intentæ fuerint, diductæ vinciantur, non poterunt post iniectum vinculum, vt in cæteris locis contineri, in quibus circumactæ fasciæ musculos immobiles seruant. quod in femore monet perti- mescendum non esse ob magnitudinem musculorum, quum hos vinculum non superet, sed ce- dat. quam rem propterea dixit, quod proprietas est, vinculi quidem femur tueri, quomodo deli- gatum accepit: musculi verò ad suum initium concurrere. Quum contraria igitur sit proprietas vtriusq; si vinculum superet, naturalis musculorum motus cedit, quum fracti ossis partes didu- ctæ contineantur: sed, si musculorum motus vinculo validior fuerit, ipsi ad initium contrahētur, F atque vnà trahent, & ad superiora adducent comminuti ossis partem inferiorem.

- 68 Crassa enim ac robusta caro vinculum superabit, at non superabitur. Id ergo, quo de agitur, extēdi valenter oportet, sic quæ, vt in neutram partem conuertatur, ne ue minor vis, quàm ipsum exigat, adhibeatur: quum turpe ma- gnopere sit, atq; incommodum, femur breuius reddere. Brachium namq; si breuius fiat, clari poterit, neq; noxa ma- gna erit: crus si breuius reddatur, hominem claudum demonstrabit: ab integro enim, quod longius erit prodetur, adeo, vt illi, qui malè curandus sit, satius fuerit vtrūque crus frangi, quàm alterum, æquè enim in vtrāque partem inclinaretur. Vbi verò extēdum sit abundè, prominentioribus palmarum partibus, eodem modo, quo supra positum est, dirigatur, ac deligetur: fasciæ q; caput iniiciatur, vt antè indicauimus, ipsa quæ sursum versus porrigatur: tum- uidem respondeat, vt in superioribus: præterea, & magis vrgeatur, & laxius vinculum sentiat ipsa partibus, quæ su- præ posita sunt: ad hæc similiter resoluator, ac rursus deligetur: ferulæ quæ eodem modo superaccommodentur. Con- feruet autem femur quinquaginta diebus.

Hippocrates vsitato vocabulo carnē appellauit, quos in superioribus musculos diximus. nam quæcunq; caro sentit, musculi pars est, atq; hæc in medijs musculis potissimum se ostēdit, quum G in extremitatibus musculi neruosi magis quodammodo sint, minus q; carnis habeant.

- 69 Illud etiam scire licet, quod femur ab exteriori parte gibbum est magis quàm ab interiori, & à priori magis quàm à posteriori. In has igitur partes conuertitur, vbi non rectè curatur. Quin & in his partibus minus carnosum est, quàm in alijs: vt quando peruertitur, latere minime possit. Ergo, si quid eiusmodi suspectum sit, tale quidpiam moli- ri oportet, quale traditum est ad humerum peruersum.

Gibbum dixit, γαῦτος, at quod hæc vox gibbum significet, res ipsa declarat, siquidem femur non omnino rectum est, sed à priori atq; exteriori parte gibbum, sicut à cōtrarijs simum. Vtrum verò vox γαῦτος, postrema syllaba acui, an penultima circumflecti debeat, incertum est, nō enim frequenti in vsu est apud græcos id verbi. quidam à similitudine ducti penultimam circumflecti volunt, quemadmodum γαῦτος, μαῦτος, γαῦτος: quibusdam verò magis placet vltimam sylla- bam acutam esse, quoniam omnia nomina duarum syllabarum, quæ affectum significant, acuto sunt accentu in vltima, γολός, λολός, σρεβλός, κυρτός, βλεσός, ραιβός: nec solum, quæ duabus syl- labis constant, sed ferè quæcunq; affectum notant, ἀρθεϊτικός, πλδευτικός, ἡπατικός. Concedi- to igitur, vtro quis velit modo pronūciare. At γαῦτος, efferenti tibi vltima acuta (eos enim, qui li- H brum legunt ire in hanc sententiam tantum comperi) si quispiā aduersetur, existimans debere pe- nultimam circumflecti, tu quoq; vtcunq; illi placet, pronūciato. Quod si alium rursus nactus fue- ris, qui malit vltimam acui, tu itidem facito, nomina, atq; accentus parū pendens, vtpotè, quæ ni- hil ad philosophiam conferant, & multò minus ad geometriam, arithmeticen, musicen, astrono- miam. Quare, si nulli arti ad suum finem importuna contemnenda que nominum inquisitione opus est, non modò horum hominum nō probare studiū conuenit, sed quàm maximè deridere.

- 70 Circundare autem aliquot lintea oportet, ea quæ in orbem circa coxam & ilia: vt inguina etiam, & quod inter- anum & naturale est (πληχάδια græci vocant) inuoluantur. Quod & ob aliam causam vtile est, & ne extre- mæ ferulæ nudam partem offendant.

Coxa, id est os illud, in quod se inserit femoris caput, ἰχίον græcè nuncupatur, sicut & ipsius cauum κοτύλη, vtroque nomine vtitur poeta in hoc carmine:

Ενθά τε μηρὸς
Ἰχίῳ ἐνσπρέφεται κοτύλῃ δέ τε μὲν καλέεσι.

A Ilia dixit ἰξύας, quæ non nulli accipiunt pro ilium ossibus, non nulli pro parte, quæ super ipsa est, quæ λαπάρα propriè vocatur: quod verbum apud poetam reperitur in eo carmine,

-ὄντα κατὰ λαπάρην.

Equidem de vocabulo λαπάρας dicere possem, adductus experimento, & Hippocratis ac poetæ usu, tum ipso morbo, eam significare partem, quæ inter ossa pectoris, & quæ propriè appellantur ossa ilium, est interiecta: de quo suo loco agemus. Quæ autem partes ἰξύες nominentur, nō est quod multis agam: ob id enim, quod poeta numero singulari ἰξύαν scripsit in illo carmine,

-περὶ ζώνην

Βάλλετ' ἰξύν ἐκατὸν θυσάνοις ἀραρυῖαν.

tum ob id, quod credibilius est zonam dari inter ilia & thoracis ossa, existimet aliquis hanc ipsam partem corporis ἰξύαν appellari. Contrà verò ex eo, quod Hippocrates multitudinis numero ἰξύας dixit, quod quæ ad ilium ossa voluit vinculum pertinere, iure arbitrabitur aliquis ἰξύας hæc ipsa nuncupari.

B



Deligatio circa femur, inguina, coxam, ilium os, & ilia.

Quod ad hunc locū attinet, quando superior femoris pars comminuitur, fasciā non solum vīq; ad inguina ferri debet, sed vītrā aliquam ex superioribus partibus comprehendere. tales sunt, primum coxa, deinde ossa ilium, postremo ea pars quæ sine osse est (λαπάραν vocāt) quam, vbi vis, complecti licet, dum ilium ossa etiam deuinxeris: quibus omīssis, fasciā protinus ad hāc sedem, porrigendā esse minimè puto, quū Hippocrates maximi fecerit, nullum relinqui locū nudum, sed æquē perpetua, donec ex integra parte cōprehensum aliquid esse videatur, omnia fasciis alligari. Πληγάδα quidam per χ scribūt: quidam per γ, πληγάδα. eo vocabulo significatur, quod inter vtrunq; crus spaciū est. vnde Hippocrates diuaticari vocat ἐκπεπληῶσθαι καὶ διαπεπληῶσθαι. Nā & poeta τοῖδ' ἐκπλήστοντο πόδες, dixit, significare volens /diuaticabant pedibus/.

71 A qua semper vtrunque satis recedere debent. Semper autem cautio sit, ne imponantur super ossa in articulis natu-
Craliter prominentia, neque in articularum vicinia super neruum.

Solet Hippocrates, vbi de vna specie pertrahat, complura docere ex iis, quæ communia sunt ac generalia, monens ea non esse propria vnius speciei, sed ad omnes, vel multas, vel aliquot pertinere. Adicit autem orationi modò particulam /semper/ vt in propositis verbis: modò, quod intellexisse pertinet ad multa loca, /interdum/. Hoc ad omnia vtile est: est enim re vera, quod nunc ab ipso proponitur, semper commodissimum, non in femore duntaxat, sed in vniuersum in omnibus fracturis, quæ ferulas postulant. breuiiores enim sint oportet, quàm vt ad eam sedem perueniant, quæ fasciā non excipitur: quod potissimum obseruandum ait, vbi ferularum extremitates proximæ sunt ossium tuberculis.

72 Tumores verò iuxta poplitem vel pedem, aut alibi, sub constringentibus vinculis assurgentes, multa lana succida curentur, benè carpta, & vino & oleo respersa: tum cerato inuncti deligentur: atque, vbi ferula vergeant, citius laxentur. Extenuarentur autem tumores, si sursum versus ad ferulas tenues fasciæ vincirentur, quæ ab imis partibus orisæ ad superiores intenderent.

D Tumores (inquit) sub constringentibus vinculis assurgentes (quos ἰξαιρευμένους dixit) propterea, quod succi expressi magno impetu ferantur, curari debent alligando multum lanæ succidæ benè carptæ, item vino atque oleo respersæ: cutem verò, cui hæc superimponuntur, iubet cerato inungi, atq; ad eandem rationem vinculum adhiberi à tumoribus sursum procedens. Fasciæ si rationē ipse aperuit, docens à qua parte quis inceperit deuincire, ab eadem trāsinitti materiā, atq; depelli. At de facultate medicamentorū, quibus vitur, abundè dictum est in operibus, quæ de illis sunt: dicuntur & nunc capita eorū, quæ in illis fuerunt ostensa. Ergo oleum dolorē leuat, & discutiendi vim habet. Vinum siccare potest, repellere, & concoquere, itē mollire & digerere. Constat autem lanam succidam (quam non nulli οἰσπηρὰν vocant) & ceratum præter leniēdi vim, digerendo quoq; esse & repellendo. Non sine ratione igitur ab eiusmodi medicamentis præsidium petiit, quoniam verò tumor fit iusto maior ab iis, quæ sub vinculis eò exprimuntur, curatio primum dirigi debet ad id exhauriendum, quod in tumida parte præter naturam subsistit. At, quā multa sint, quæ hoc efficiunt, quibus nam viemur? digerentibus, repellentibus, lenientibus: digerentibus quidem ac reprimentibus, quoniam aperte exhauriunt: at lenientibus eo nomine q̄ prohibent, ne materiā præ dolore ad vitiatam sedem concitetur: atque ob hanc causam lenius digerentia, ac reprimentia ad inflamatam partem admouemus, nam, quæ horū vtrunq; fortiter præstant,

præstant, dolorem iritant. His ratiocinationibus ductus Hippocrates, lana succida usus, hoc est, E
cæsypo redundante, curationi adiicit oleum, vinum ac ceratum, lanam quæ ipsam bene carptam esse
vult, quo lenior sit, & dolor leuet. quæ elota quidem est, carpta facile mollietur: at succida ob for-
dem non facile tractatur, carpitur quæ, eo quæ sit, ut negligenter carpta, dura dolenti parti inhaereat.
quod Hippocrates, quum aliquando neglectum animaduerneret, addidit /bene carpta/. Iam ve-
rò copiosè ipsam adhibet, ut vino atque oleo madens cõseruetur, quum facile liccescat, quæ exigua
imponitur. Ad primum etiam consilium pertinet ratio vincendi tumoris, quæ ex tumidis par-
tibus (ut dictum est) ad superiora succos expellit.

73 *Hac siquidem via tumor celerrimè extenuaretur.*

Diceret extenuari membrum, non tumorem, qui propriè loqueretur. danda siquidem opera est,
ut tumor ex toto euanescat. maiores tamen complura sic loquuntur, præsertim, qui eloquentissimi
sunt, contempta, quam iuniores excolunt, curiosa nominum inquisitione, non exquisita diligen-
tia, ut ipsi nuncupant, qui in ea versantur. Sed digni utique essent, quos laudaremus, si hac vel exqui-
sita, vel propria (ut cunquæ ipsi nominent) verborum inquisitione, rem clariùs aperirent, quæ Hippo-
crates: sin obscura atque humilis est eorum oratio, præstat maiorum amulari negligentiam. F

74 *Et ad priorem iuncturam superferretur. Ad quem deligendi modum veniendum non est, nisi tumor aut pustulis,
aut nigritie periclitetur. Sed nihil tale sequitur, nisi quis fracturam vehementer adstrinxerit, aut fuerit dependere,
aut manu scalpsit, aut aliquid cutem attigerit, quod ipsam irritauerit.*

Vna quidem hæc scriptura est /& ad priorem iuncturam superferretur/. putant tamen expref-
so tumore alij materiam depelli super iuncturam, alij ad loca, quæ iuxta sunt: quorum controuer-
siam diiudicare facile est, si antè vincendi ratio constituat. Vbi enim ferulis relaxatis, tumida pars
(ut supra ostensum est) alligetur, aliquid sanguinis ad loca, quæ iuxta iuncturam sunt, depelletur:
sed, si ferulis summotis, atque omni vinculo penitus resoluta, de integro vinciamus, simul & eam
iuncturam adhibentes, quæ fracturis accommodatur, & eam, quæ à tumore incipit, succus hac via
expressus ultra partem prius deligatam ad superiora transferetur.

75 *Si quis femori canalem subiiciat breviorē, quā ut ultra poplitem pertineat, noxam in ipsis quā opem afferet:
quandoquidem prohibere nō poterit, quin corpore aut crure moto, femur quoque moueatur. Popliti item infestissimus
erit, ubi adhibeatur, coget quæ id fieri, quod minimè est opus: minimè namque opus est curuari genu, omnia enim de- G
iuncti cruris ac femoris vincula necessariò mouerentur, si quis genu curuaret: neque fieri posset, quin muscoli alio atque
alio modo figurarentur, comminuta quæ ossa dimouerentur. In primis igitur danda opera est, ut extendatur poples. Vi-
detur autem femur in eum canalem utiliter coniici, qui à coxa ad pedem est.*

A tumoribus ad canalem aggressus est, quem euidenter exposuit. mox autem adscribet cana-
lem uel δίαμπερῶν, hoc est, qui totum crux excipiat, uel nullo modo subiiciendum esse. Glossoco-
mum verò machinamentum diximus rectè fuisse à iunioribus repertum.

76 *Detur item fascia lenta iuxta poplitem cū canali, quo modo & infantes inuoluuntur in cunis: sic enim, ubi femur
in superiorem partem, siue in latus uertatur, cum canali alligatum meliùs continebitur. Canalis igitur, uel totum exci-
pere crus debet, uel nullo modo adhiberi.*

Quod inquit /cum canali/ duobus modis exponitur. non nulli existimant canalem extrinse-
cus fascia circundandum, ita, ut hæc sit Hippocratis sententia: Fasciam dare laxam conuenit, quæ
utrumque complectatur, & hominis poplitem, & canalem qui ipsum excipit, id est, ut ipse poples
non seorsum, sed unà cum canali comprehendatur. Alij circumligandum esse poplitem intelli- H
gunt, ut crus immobile cum canali contineatur, hoc est, subiecto etiam nunc canali: quum neque
vinculum per se possit satis fideliter continere, neque canalis, sed ambo simul.

77 *Item maximè uidendum est, ut in fractura tam femoris, quā cruris, quantum potest, imus calx optimè continea-
tur: nam, si dependente pede crus reliquum fulciatur, necesse est ossa gibba in priori parte cruris conspici: sin calx iusto
sublimior collocetur, reliquo crure leniter suspenso, os in priori parte cruris iusto magis sumum necessariò se ostendet,
id quæ adeò, si calx hominis naturaliter est grandior. Ad hæc omnia ossa tardius conferuent, ubi non figurantur natu-
raliter, neque in eodem habitu detinentur: præterea callus infirmior circumdatur.*

In superioribus, ubi de cubito mitella suspendendo pertractauit, diximus à quibusdam scribi
/brachium suspensum/ dempta particula /non/: à quibusdam ea adiecta /brachium non suspen-
sum/: & illos quidem intelligere suspensum brachium, quod nō inhaeret, neque subiecta alicui rei
insidet: hos uerò id, quod fideliter sustinetur. De crure autem, quod fulcitur, ἡρματισμένος dixit, du-
cto vocabulo à fulcris, quæ dicuntur græcè ἑρματα, quorum meminit poeta in eo carmine.

ὑποδ' ἑρῶν ἑρματα νηῶν. Sic igitur accipitur uocabulum ἡρματισμένος.

GALENI IN HIPPOCRATEM
DE FRACTVRIS
COMMENTARIVS TERTIVS

Vido Vidio Florentino interprete.

ARGVMENTVM LIBRI

Curationem earum Fracturarum, in quibus ossa denudata sunt, aut partes exulceratæ, noxarum quæ gibbi cubiti & genu, absoluit.

I Nterueniunt hæc, quibus os quidē fractum est, at non excidit, nec alioquin vulnus accessit.

B



Hactenus simplices fracturas proposuit, in quibus neq; os cute excidit, sic, ut nudum se ostendat, neq; vilo modo vulnus accessit. Constat autē ossa nec excidere, nec nudari, nisi cutis & superiecti muscoli secentur: fieri tamē vlcus potest, etiam si nihil ex comminutis ossibus detegatur. Transsit ergo iam atque aggreditur ad fracturas, quibus carnis quoque vulnus accessit, siue id solum sit, siue præter id, os etiam nudetur.

2. Quibus sine fragmentis ossa simplici modo comminuta, eodem die vel certè posteriori reposita sunt, atque in suam sedem restituta, nec testæ alicuius expectatio est, quæ ab offe abscedat: aut quibus vulnus quidem est, sed abrupta ossa non excidunt, neque fractura talis est, ut metuendum sit, ne testæ quæpiam ab offe abscedat: his omnibus aptissima deligandi ratio est, quæ simplici fracturæ accommodatur.

Fracturæ, ubi vulnus quoq; adiicitur, duplicem curationem docet, alteram quatenus aliquid fracti ossis nudatur, vel testæ vrget, quæ à contrito offe diducta est: alterā, quum nihil tale est, sed extra fracturam, quæ rectè composita est, vno vulnere sollicitamur. Nam, si nudum os cute excidit, quod protinus benè compositum fuerit & restitutum, mutandum esse superius genus curationis non censet. Verum alia requiritur curatio, ubi vulneri adiecta fractura os excedens restitutum est, neque suspicio est, ne aliqua testæ à perfracto offe resoluatur: alia, ubi os tegitur cute, sed expectatur testæ, quæ resoluta procedente tempore à natura per vulnus expellatur. In priori casu vititur iunctura, quam posuit conuenire, ubi os integra cute perrumpitur: in altero variam curationem adscribit, ut mox euidenter ostendet: satius enim est ipsum audire.

3. Non nulli (atque hi non admodum proficiunt, aut obsunt) vlcerebus imponunt aliquod ex purgantibus medicamentis, ut ceratum, quod picem habet: vel quodpiam ex iis, quæ cruentis vulneribus iniiciuntur: vel quoduis aliud, quod componere soleant. Illos autem laudo, qui pannos superdantes vino madefectos, aut lanam succidam vel eius generis aliquid deiungunt: ubi uerò ulcera pura sunt, & iam glutinantur, tunc lintea complura adhibent, & per ferulas dirigunt. Hæc ratio curandi aliquid confert, neque multum lædit: ossa tamen in suum locum nō similiter reponuntur, sed hæc via sunt aliquanto tumidiora, quam par sit.

Retuli ad eas fracturas, quibus carnis quoque vulnus adiicitur, curationem duplicem ab Hippocrate admoueri. Nunc orsus ab ea, quam primo loco posui, eos primū reprehendit, qui malè vlcere illi medentur, in quo, quum fractum os benè compositum est, nihil aliud, quam ipsum restat, neq; vlla suspicio est, ne fragmentum ab offe resoluatur. Quidam (inquit) medici eos, qui sic affecti sunt, inter initia curant, perinde, ac si vlcere solo detinerentur: ubi hoc moderate habet, tunc ea vincendi ratione vtuntur, quæ ad fracturas pertinet. Caput igitur propositorum verborum huiusmodi est. multus autem est in eorum curatione narranda, qua non nulli vtuntur, eo quod singula persequatur. Equidem scripsi eos ita curare, sicut, si citra fracturam vulnere mederentur: at ipse, quibus etiam medicamentis vterentur, exposuit, facta mentione cerati, quod picem accipit, tum medicamentorum, & quæ protinus cruentis vulneribus iniiciuntur, & quæ purgandi vim habent, item panni vino madentis. Rectè autē medicamenta, quæ cruentis vulneribus iniiciuntur, *ἐναυμα* vocat. namq; etiam nunc apud medicos id vocabuli est vsitatum, quo ea medicamenta nuncupare solent, quæ vulneribus superdantur, ut primū illata sunt, & non dū ex toto sicca, sed adhuc cruenta, hoc est, cum crur (græcè *αἷμα* dicitur) ex cute ipsa vulnerata, seu etiā ex carne, in roris specie destillat. purgans verò medicamentum est, quod modicè siccet (quā rem demonstratū est caput esse in vlcere curatione) ac detergendi facultatē habet, qua vlcera pura reddit. Huius generis sunt mixture, quæ ex crugine gris & squama cōponuntur, quarū duplex ratio est, siquidem crugo ab aliis coquitur, ab aliis adiicitur cruda: quæ crudā accipiunt, virides dicuntur: quæ

quæ coctam ruffæ, à colore, qui in vtrifq; se ostendit. Igitur hæc medicamenta purgare vlcerà pofe
funt, quùm mediocrē habeant detergendi facultatē. huiufcemodi eſſe, quæ ſordē ab vlceribus de-
trahunt, ſicut contrā, quæ cruentis vulneribus protinus iniiciūtur, carere detergēdi facultate, in-
dicauimus. variē autē miſcentur ſicuti priora. At, quēadmodum in illis exempli gratiā, aris aru-
ginē attuli & ſquamā, potui & alia ſimilia eadem ratione proponere. nunc autē abundē ſit illud
indicafſe, quod *ἔλαινα* vocata, quibus abeſt detergēdi facultas, ſunt, quæ ex bitumine cōponunt.
Horū exempli gratiā mentionem faciā, quùm omnia quæ id præſtant, in opere de medicamentis
fuerint explanata. Ceratum autē, quod picem habet, inter oēs ferē conuenit, lenire dolorē, & pus
mouere. tunc verò confert, quùm vlcus iā inflammatione tenetur: alioquin ipſum nemo impo-
neret, quùm neq; detergere ſordem poſſit, neq; vlcus glutinare, aut ad cicatricem perducere. At
panni vino madentes ob vinū ipſum repellunt. dantur enim ad continendū ab iis, qui hoc modo
medentur, qui adhibere volunt vlceris cauſa eas faſcias, quibus antē iniectis aliæ ſuperdant. Quæ
autē ſcire oporteat eū, qui rectē vlcerà curaturus ſit, poſita à nobis ſunt, quo ordine ſingula requi-
rebant, in tertio & quarto libro de ratione curandi, atq; etiā abundē in expoſitione libri de vlceri-
bus. quod ad hunc locum pertinet, ſatis eſt hæc retuliſſe, nā de curatione propolitorū affectuum
rurſus tractandū nobis erit, quùm Hippocrates illā exequetur: nūc meminī aliorū medicorum, F
quos ait, nō ſimiliter grauē noxam afferre, atq; illos, quorū mentionē facit. Quid igitur eſt, quod
errant? liquidē, quùm primū id cognitum fuerit, conſtabit etiā iure ab Hippocrate ſcribi illos nō
admodū proficere, aut obefſe, qui vlceri non malè prouident, ſed fracturā initio negligūt, idoneū
vinculum poſtea ſuperdantes, quod prodiūt eſt ab initio conuenire: quamobrē (inquit) oſſa ſūt
tumidiora. Satiū igitur eſt per omne tēpus curationis cōprimi hæc, atq; adſtringi, quod præſidiū
ad non paucos dies initio prætermittunt: aſſerit enim, vbi iā futurū eſt, vt vlcerà glutinentur, tūc,
qui ſic medentur, incipere deligare eo modo, quo fracturæ conuenit. Conſtat autē vlcerà ſuppu-
rare, deinde purgari, prius q̄ glutinanda ſunt, quod triduo fieri nequit, aut quatrīduo.

4 *Quibus tam crurus, quàm brachij vtraque oſſa fuerint comminuta, breuiora etiam ſunt.*

Breuitatis Hippocratis propriū eſt id, quod in propoſito ſermone deſideratur, apertē ex eo,
quod ſubiicitur, indicare: quā rem nunc ſecille perſpicuū eſt: præfatus enim corū, qui ſuperiori ra-
tione curantur, oſſa reddi tumidiora, non deſinuit, omniū ne, an aliquorum: at nunc ex propoſi-
tis verbis euidenter colligitur, non omniū, ſed corū duntaxat, quibus alterum fractū eſt, quùm
partes, quæ iuxta fracturā ſunt, minimē ipſum contineant, vt, quæ per omne tempus curationis, G
nec adſtrictæ fuerint, nec coarctatæ. Membrū tamen breuius non redditur, quandoquidē alterū
os integrū manet, quo naturalis longitudo ſeruatur. Sed, vbi vtrunq; comminuitur, muſculi (vt
antē expoſuimus) cōtracti, ad ſuperiores partes vitīata quoq; oſſa cōtrahunt. quāobrem extendi
ea iubet, antequā componātur. Sed, quia ſine cōuenienti iunctura cōpoſita oſſa nequeunt cōtine-
ri, ea de cauſa, donec increſcat callus, curioſe deligat. Quā rem qui negligunt, & vlceris curationi
inliſtunt, non ſolūm tumidū magis q̄ naturaliter cōueniat, mēbrū reddūt, ſed breuius ēt efficiūt.

5 *Rurſus alij reperiuntur, qui lintea in eiufmodi caſibus à principio protinus circundantes vtrinque deuinciunt:
Vlcus verò ipſum relinquunt, & nudum eſſe patiuntur: deinde ſuper ipſum imponunt aliquod ex purgantibus medi-
camentis: tum pannis ex vino madentibus ac lana ſuccida medentur. Hæc quidem curatio aliena eſt: qua qui & in
his fracturis, & in alijs vtuntur, longē aberrare verſimile eſt. Maximē enim ad rem pertinet noſſe, quo pacto inici
primò linteam debeat, & quā valentiſſimē coarctari: item quid conſerat, quā potiſſimum parte conuenit, cum fa-
ſciæ caput ſuperdare, tum adſtringere: quidūe ſequatur incommodi, ſi alia parte, atque opus eſt, oſſa faſcia fuerit, nec
quā maximē expedit, ſed hinc vel hinc fuerit arctata. Vtriuſque vinculi effectum in ſuperioribus demonſtrauiſmus,
cuius teſtimonium eſt ipſa medicina. Illi enim, qui ſic deligatus fuerit, neceſſe eſt vlcus in tumorem aſurgere.* H

Eorum nunc meminī, qui ſummopere lædunt, & quæ ab his admoueantur, planē docet: tum
errores ipſorum apertē redarguit, ſic, vt meæ expoſitionis non egeant, qui in iis, quæ ab ipſo affe-
runtur, laborare non recuſent.

6 *Nam, ſi carnoſa pars, quæ ſana eſt, hic atque hinc vinciatur, media non comprehenſa, ea pars, quæ relicta ſine
vinculo fuerit, maximē turgebit, minus quæ erit ſui coloris. Quo pacto igitur vlcus hæc effugiet?*

Hippocrates quamlibet carnoſam partem appellat *χρῶτα*, vt ſuprà quoq; indicauimus. Nūc
illud animaduertendum eſt, q̄ qui rationalem medicinam proſitetur, vbi præſidiū idoneū eſſe
comperit, non expectat longum vſum. putant autem, vbi vlcus ſine vinculo dimittentes, vtrinq;
faſciam circumagunt, excitari inflammationem, & vlcus malè affici ex mala conditione affectus,
at non ex ea, quam adhibent, curatione: cuius primus auctor ſe ipſum falſa ratione decepit: ſuc-
ceſſores verò vſitatam hanc curationem edocti ſeruarunt, eò quòd mutare non auderent. ex
quo magnum malum ſequitur. Id illis meritò euenit, qui artes vſu ſine ratione pertractant:
vna

A una enim ratio est, qua fretus aliquis, rei natura demonstrante mutare tentat, quæ malè fuerant longo usu recepta. Qua ergò ratione motus Hippocrates ipsorum curationem mutauit, nò hercle probabili assumptione, aut aliena, sed quæ scientiam faceret, ac necessaria esset. Quod si corporibus benè valentibus, sub ea vinciendi ratione materia vtrinq; in medium spaciū inter partes deuinctas expressa, inflammationem excitat, qui non longè magis id faciet ægrotantibus.

- 7 *Igitur necesse est, decoloretur vlcus, & materia ad ipsum exprimatur, tum lachrymet, ac minime suppuret: ossa vero, & quæ abscessura non essent, abscedant.*

Quæ accidunt, vbi malè vlcus deuincitur, hoc loco declarauit. Cuncta autem ab inflammationis magnitudine proficiuntur: quandoquidè ob hanc vlcus labra in exteriora vertuntur, perinde atq; ea, quæ propriè oris labra nominantur, vbi inflammatione vexentur. Totus autè locus mali coloris non iniuria conspicitur, quod & ipsum constat ex immodica inflammatione provenire. Destillat verò ab vlcere tenuis, & cruda sanies, similiter ac lachrymæ ab oculis inflammatis.

B excitarunt, crudi permanent, dum ea vinculi ratio admouetur. Sed & ossa necesse est procedente tempore vitari. his enim crudorum succorum abundantia madefactis mirum non est, si qua particula abscedat, vbi qui sic medetur, ab alieno vinculo non delistat. Singula, quæ in vniuerso sermone restant, euidentissima fient, si quis (vt diximus) animū adiungat: tum in memoria habeat, quæ suprà ostensa sunt, eò enim hæc omnia pertinent, & (quemadmodum ipse Hippocrates admonet) his illa confirmantur.

- 8 *Vlcus item pulsu affligetur, atque igneum erit, tumor item coget cataplasmata superdori: quod incommodum similiter afferunt, qui vtrinque deligant, quum præter alium pulsum, inutile quoque onus adiciant. Fascias tandem solvunt, vbi vlcus recrudescere conspiciunt, & reliquo tempore sine iunctura medentur. Nec secus curant quoq; si aliud vulnus nacli sint. siquidem hæc euenire minime censent, eò quòd hinc atque hinc deligauerint, & rursus vulnus reliquerint, sed aliquod aliud infortunium causantur. Quòd si hanc deligandi viam, penitus alienam esse, frequentari verò à compluribus, tum maxime ad rem pertinere eam dediscere, aperit non cognouissim, non tam multa scripsissim. Adde, quod hæc testantur, quæ suprà exposita sunt, maxime ne an minime adstringendum sit, rectè fuisse tractata.*

Oportet autè (vt summam dicam) vbi nullum expectatur os, quod recessurum sit, similiter curare, ut quæ ubi sine vlcere fractura est, extendenda enim æquè ossa sunt, ac dirigenda, & eodem modo vincienda. Ad hæc vlcus cerato, quod picem habeat, inungendum, tenui ut paulo duplici contegendum, proximæ quæ partes albo cerato illinende. fasciæ verò, cætera quæ sciendenda paulo latiora, quàm si vlcus non esset: & qua parte primum dantur, latiora multo danda, quàm vlcus, quum, quæ angustiora sunt, instar zone ipsum cingant, quod minime expedit. primus enim circuitus totum vlcus completi debet.

Indicauit paulo suprà sub hac vinciendi ratione, tumorem exprimi ad ipsa vlcera. tumorem verò *διδος* nūcupat, sic, vt sermo talis sit. Sanguis, qui sub aliena vinciendi ratione vtrinq; ad ipsum vlcus exprimitur, tumorem facit præter naturā, hunc q; & *διδος* & *οιδρμα* solitus est appellare. Tumori autem, quum pulsus accedit atq; ardor, inflammationē perficit, quæ propriè *πυρεωδης* superius appellata est: quod vocabulum nò sic accipiebatur apud veteres, eò siquidem notabant omnem ardorem, quemadmodum sæpenumerò declarauimus: ab Erasistrati vero sæculo cōsuevit usurpari ad illos tumores significandos, quibus non modò ardor accedit, sed renixus etiam & pulsus, necessario q; rubet. ruborem efficit ingens ardor: renixus & pulsus à multitudine oritur. Poterat Hippocrates igneum vlcus dicere *πυρεωδης*, quasi febricitans: dixit autem *πυρεωδης*,

D sumpto vocabulo ab igne, quem græci *πυρ* vocant, quo ardorem (vt mea fert opinio) nobis reduceret in memoriam: quoniam & febris, quæ *πυρεωδης* græcè nuncupatur, ab eodem vocabulo ducitur, quum nihil aliud sit febris natura, quàm igneus calor.

- 9 *Feratur item fascia præter vlcus ad partes etiam, quæ suprà sunt, atque infrà.*

Veteres quum superiorem atq; inferiorem partem significare volunt, rarò *ἐνθεν καὶ ἐνθεν* scribunt. his enim uocabulis plerunq; exprimunt partes vtrinq; à lateribus fitas: Hippocrates tamè hic antiquam exponendi figuram usurpauit.

- 10 *Ergo caput fasciæ muciatur è regione vlcus, & laxius paulo attrahatur, quàm si fractura esset citra vlcus. Circumagatur autem eo modo, quo suprà positum est: sint quæ fasciæ molliiores semper, quàm si integra cute os esset abrupit: neq; pauciores, quàm prius diximus, sed aliquanto plures: homini verò, quum inuolutus fuerit, uideatur astrictiōne inhaerentes, nò tamen adstrictæ, asserat quæ super plagam maxime inhaerere: tum eodem tempore, quo suprà indicauimus, ipsas & benè insidentes, & laxiores sentiat: deinde tertio quoque die soluitur, & rursus alligentur. In cæteris similiter agendum, ut in superioribus: hic tantum latius, quàm ibi coarctetur. Quòd si fiat, quæ rōni consentanea sunt, locus*

IN LIB. HIPPO. DE FRACT.

locus in quo plaga est, & reliqua etiā sub vinculo comprehensa, semper graciliora se ostendent: iam verò & pus ocyus **E** orietur, quā si alia curat o admoueat. Caruncule præterea, quæ in vlcere nigrescunt & emoriuntur, celerius sub curatione hac resoluuntur & recedent, quā si alia: atque vlcus celerius cicatricem recipiet, si hac via, quā si alio modo curetur. Cuncta hæc propterea fiunt, quòd & locus exulceratus, & quæ iuxta sunt, extenuentur.

I^{xi} semper intelligit Hippocrates /è regione/ modò in longitudinem corporis, modò in latitudinem: veluti nunc, quū voluit primæ fasciæ caput dari super dextram vel sinistram vlceris partem, dein super ipsum vlcus inuolui, sic, vt vniuersum complectatur, neque vllam partem nudam relinquat.

- 11 Reliqua curatio esse debet, perinde ac si ossa citra plagam perfringantur, nisi quòd ferule nō s. ni im. onende. Quā obrem pluribus fasciis hic opus est, quā alibi, quū & minus adstringendum sit, & ferulæ tardius circumdandæ.

Interdicit, ne ferulæ imponantur, vbi fracto ossi vulnus accessit, veritus ne comprimant: atq; ob eam rem præcipit, ne arctius super has fasciæ deligetur, sed vtrāque de causa plures imponantur. Memento autem ipsum imperasse, vt plures inuicerentur, propterea, quod & minus coarctantur, & ad ferulas tardius veniunt. **F**

- 12 Tamen, si ferulæ superaccommodentur, è regione vlceris minimè circumponantur: detur quæ opera, ut laxiores sint, ne vehementer adstrictæ premant, quā rem in superioribus quoque proposuimus. Tenuiori autem cibo diutius contenti sint, quibus à principio carnis quoque vulnus accessit, vel ossa cute exciderunt, & (vt una complexione complectar) grauissimæ fracturæ rationem uictus tenuiorem amant, & diuturniorem.

E regione nunc intelligit in longitudinem, in hanc siquidem ferulæ imponuntur. Suprà loquutus est, vt, qui ferulas summovebat: nunc, vt is, qui non nunquam ipsas accipit. Inquit / tamē, si ferulæ superaccommodentur/. Quid ipse in eiusmodi casibus facere consueuerit, & in ipso curare etiā, non est, quod contendam, quū rem minimè definiuerit. Exponam tamen id, quod facio. in illis fracturis, quibus in longitudinē membri, carnis quoq; vulnus accedit, ferulas vtrinq; à lateribus vulneris adhibeo: sed si hoc transuersum fuerit, non patitur ferulas superdari, præsertim, vbi grandius sit.

- 13 Eandem verò curationem requirunt vlcera, quæ non à principio fracturæ, sed, vel ob lintea nimium arctata, vel **G** ob impositas ferulas, aliā ue de causa, sub curatione postea oriuntur. Cognoscitur autem, ubi vlcus subest, ex dolore, & pulsui: item ex tumore, qui tunc extremis partibus indurescit: & si digito presseris, exprimitur, ac rursus citò reuertitur. Igitur, si quid tale suspectum sit, soluere oportet: atque vbi, vel ea pars, cui superdantur illæ fasciæ, quæ primæ iniunguntur, vel altera, quæ deuincta fuerit, pruriat, in vicem alterius cerati inurgenda est eo, quod picem habeat.

De vlcerebus nūc agit, quæ procedente tempore fracto ossi ob circumpositas ferulas superueniunt. Docet ergò, quibus de causis fiant, quibus q; indicij cognoscantur, vbi iam orta sunt: post hæc præcipit, ne per consuetum tempus alligatas esse fascias sinamus, sed celerius subtrahentes, idoneam curationem quam ipse euidenter exposuit, admoueamus.

- 14 At si nihil eiusmodi sit, sed ipsum vlcus irritatum, nigrum valdè, aut sordidum reperiatur: tum caro purulenta: futurum quæ etiā sit, vt nervi excidant: hos non conuenit ex toto nudare, neque suppurata hæc timere, sed in cæteris eadem ratione mederi, atque vbi initio vulnus adiectum est.

Nudare dixit ἀναψύχων, hoc est, vinculum detrahere fracturæ idoneum, vt vlcus nutriatur. **H** non enim vult nulla re imposita, nudum prorsus ipsum relinqui, sed adiciens / non conuenit ex toto nudare/ mediani curationem indicat. esset autem media huiusmodi quæpiam. Si in vulnere aliquod ex propolitis signis apparet, imperat, vt quā primū soluatur iunctura fractis ossibus accommodata: & vno atq; altero die curatio, quam vlcera postulant, adhibeatur: membrum quæ rursus deligetur, quemadmodum subiecta verba demonstrant.

- 15 Tantum fasciæ laxæ admodum ordiantur à tumore, qui in extremitatibus est, deinde semper sursum versus circumagantur, neque ullo modo coarctentur: infideant item vlceri commodissimè, alibi uerò laxius iungantur. Sint autem hæc prima lintea munda, non angusta: & eorum, quæ circumdari solent, ubi ferulæ imponuntur, vel numerum æquet, vel non multo pauciora sint.

Imperat hoc loci, vt vinculum orsum à tumore, qui in extremis membris affurgit, inde ita feratur, vt nihil nudū relinquat, donec ad ipsam fracturā, qua parte exulceratio est, porrigatur: ita, vt in vnū committatur vinculū, quod tumore curat, & quod fracturā deuincit: vna q; sit vtriusq; intentio, quæ paucis circuitibus absoluat. lubet autē fasciam commodissimè vlceri infidere, hoc est

A est laxam esse eatenus, vt nullo modo adstringatur: super ceteras verò partes, atq; adeò iuxta fracturam magis edicit, vt minimè coarctetur: perpetuum enim esse voluit arctius eam partem vinciri, vnde sanguis exprimi debet, monet autem, vt in extremitatibus, quæ tumida sunt, fascia laxius alligetur, ad id consilium dirigens, vt vinculum in vnum committatur. At nō propterea caput totius curationis illi committit, nō enim id est, quod in hoc casu remedio sit fractis partibus, vbi nigre sunt, atq; emoriūtur, sed tumori, de quo ad verbum scripsit / tumor extremis partibus indurefcit, & si digito prefferis, exprimi, ac rursus citò reuertitur/. Hæc tumoribus superueniūt. iure igitur non æquè eos negligit, atque vbi molles sunt, nec ad eosdem dirigit præcipuum totius curationis consilium.

- 16 *Vlceri abundè est pannum inducere albo cerato inunctum, siue caro, siue neruus cadere debeat: his enim acris sperdare non expedit, sed mitia, nō secus atque adusis. Insuper tertio quoque die soluere conuenit, ac rursus deuincire: tum ferulus vitare, & magis quàm antè conuiescere, atque abstinere. Scire etiam oportet, vbi futurum sit, vt vel caro, vel neruus excidat, hac ratione vitium minus serpere, & celerius multò excidere, ac proximas partes fieri longè graciliores, quàm si vlceris linteis resolutis, quoque ex medicamentis purgantibus nutriatur. Iam verò, vbi excidat, quod purulentū est, citius caro increfcet, & cicatrix maturius inducetur hoc pacto, quàm si alio succurramus. Hæc omnia igitur eò pertinent, vt sciamus rectè & cum moderatione deligare. Eo etiam confert idoneus habitus, reliqua victus ratio, & fascia quàm aptissima.*

Declarauit ipse adustorum exemplo, cur acriū medicamentorum vsus eiusmodi vulneribus noceat: siquidem orta sunt ex calidorum atq; acriū succorum mixtura. Cum quo simul etiā ostenditur, albo cerato acrius esse id, quod picem habet: pix enim eo est acrior cera, quo calidior.

- 17 *At si quis deceptus recenti vulnere nullo modo existimans fore, vt os recedat, quod recessurum sit, eam vinciendo rationem adhibeat, quàm simplices fracturæ postulant, eiusmodi medicinam non debet permiscere: quandoquidem nullum ingens malum apportabit, dum possit modò rectè & citra noxam manu deuincire.*

Timere, inquit, non oportet modum alligandi fracturæ idoneum, quamuis recessuri ossis indicia se ostendant, quæ nam illa sint, proximis verbis addices.

- 18 *Denunciat autem futurum esse, vt sub curatione hac ossa recedant, quod pus ex vlcere amplius profluit, & videtur ad exitum festinare.*

C *Vbi copiosius, q̃ pro vlceris modo, pus feratur, verendum est, ne subiectū os vitiatum sit: sed, si præter id videtur ad exitum festinare, quod ὀργάνον dixit, hoc est, si festinanter à vitata parte expellatur, iam certa res est. At vnde cognoscemus membrum festinare ad expellendum & primum ex oris plagæ, quæ inter se non cōmittuntur, sed dehiscunt, & in interiora vertūtur: deinde ex hominis sensu, qui exiguum quēdam motum sentire sibi in altioribus partibus videtur, vbi ceteras non sensu non animo aduertens, hanc vnam obseruet, cui hæc superueniunt.*

- 19 *Resoluere igitur ac deligare frequentius oportet ob humoris abundantiam: cum alioquin febres excitentur, & vlceris cum his, quæ proxima sunt, si nimium vinculis coarctentur, emacrescant.*

Humoris abundantiam (vt solitus est) appellat *πλάσιν*, seu tenui habitu sit, seu crasso, quale nunc est pus, quod, quando pars quæpiam ab osse recessura est, dixit copiosius euadere.


- 20 *Ergo, vbi expectatio est tenuium partium, quæ ab osse recedant, haud multum expedit variare: fascia tantum laxior circumligetur, ne pus retineatur, sed exitum facile habeat: & dum os recedat, sapius soluatur, ac deligetur: ferule quæ omni modo vitentur.*

D *In quibusdam exemplis simpliciter legitur /variare/ non adiecta particula /multum/, sed verius similius fit illam adiici debere, nam, quum ratio fracturæ alligandæ tribus modis varia sit mutetur q̃, non diceret simpliciter /haud expedit variare/ quandoquidem addita etiam particula /multum/ dicet aliquis Hippocratem falsa prædicasse, propterea q̃ imperet nunc, vt fascia laxior inuoluatur, vt sepius resoluatur, ac deligetur, vt ferulæ non imponantur, & quarto (id quod in vniuersum ab ipso præcipitur) vt fasciarum numerus augeatur, vbi vel laxius deligatur, vel ferulæ omittuntur, sed, quod seruatur, est modus ille vinciendo, qui pertinet ad fracturas, cuius habita ratione dixit in curatione /haud multum expedit variare/. Fasciis enim vtendum, quæ primò inuiciuntur, quarum vna à vitata parte orsa, vbi ter fuerit super ipsam voluta, desinat in superiori parte, eo q̃ modo feratur, quo antè proposuit: altera item, quæ super priorem fertur, ab eadem parte incipiat, tum deorsum ducta ad superiora reuertatur, minus que arctetur. Panni quoque extrinsecus inducendi ad eundem modum, quo in prioribus declarauit, & super hos fasciæ dandæ: quæ omnia docuit, vbi vinculum fracturæ idoneum indicauit. At, si suspicio est, ne grandior ossis testa recedat, non amplius ad quem modum fracturæ postulāt, deuincit, vt proximis verbis subiiciet. Iure igitur hîc scripsit /haud multum expedit variare/. Quod si detracta particula /multum/ legamus, audiemus*

dicimus ipsum asserentem, non mutandam esse rationem deligandi, quæ ad fracturas posita est. E nihil enim mouet, quum similiter atq; in ea fascijs illis vtatur, quæ primò iniiciuntur, & deligare incipiat, ac primò circumagat, postea que adducat, item pannos eque iniiciat, & alliget: quod nihil aliud est, q̃ eandem rationem seruare.

- 21 At quibus grandius fragmentum expectas ab osse recessurum, siue initio præsenseris, siue postea cognoueris, non amplius eadem medicina opus est, sed quod ad intendendum membrum ac dirigendum pertinet, idem fieri debet. Panni verò duplices sint, non angustiores, quàm vt dodrantis dimidium æquent, quæ in re contemplari quoq; vulnus cuiusmodi sit, oportet: tum, quod ad longitudinem, paulo breuiiores, quàm vt bis fractum membrum complectantur, multo autem longiores, quàm ut semel: tot que numero sint, quot res postulat. Tincti autem in vino nigro austero primū medij superduntur, perinde ac fasciæ, quæ à medys orisæ in vtramq; partem attrahuntur: post hæc ad figuram fasciæ dextrum caput ad sinistriorem partem, sinistrum ad dexteriorem, procedat.

A. lib. 4. f. 5. t. 2.
c. 6. fol. 484. c



Ascia sincera inæqualis.

In libro de officina medici, de circuitu fasciæ ingit / simplex orbicularis ascia. / Est ascia breuis ille circuitus, qui rectus incipiens ad latus attrahitur, nō dum tñ est obliquus: delinit q̃ ad similitudinē ascie, qua fa F bri vtuntur, namq; à recta linea paulum recedens curuatur, vnde nomen ascie traxit. In hanc igitur figurā præcipit, vt panni super fractū membrū imponantur: eorum q̃ capita ducantur, non secus atq; vbi fasciæ à medijs orisæ vinciuntur: hoc est, vt panni sup membrum medijs primū dentur, deinde eorū capita per vitiatū locum ferantur, non in orbem, sed paululum inclinati sic, vt à cōtraria parte, atq; inceperint, ad X literæ similitudinē inter se committantur. quod non fieret, si circūagerentur in orbem. Nam, quæ ita procedunt, planè inter se cocunt. Pannorū longitudinem indicauit, quum inquit / paulo breuiiores, q̃ vt bis fractū membrum cōplectantur, multo autem longiores, q̃ vt semel. / præcipit enim membrū ab his sepius excipi, sic, vt singuli semel ipsum amplectantur. At non continerent firmiter, si qua parte cōmittuntur, eadem finirentur, neq; vltra procederent, aliam q̃ membri particulā complecterentur. Ferè autē totius membri dimidiū secundo pannis inuoluendū esse intelligit, quum G inquit / paulo breuiiores, q̃ vt bis fractū membrum complectantur, multo autē longiores, q̃ vt semel. / quod sanè continget, vbi hi dimidiū membri ambitū amplexi defināt. Quare si panni pedalis vtputa longitudinis totū membrum semel inuoluant, duplo longiores esse conueniet ad hoc, vt bis præstare idē possint: sed, si secundo vltra dimidiū non feratur, eo longiores sint, q̃ vt semel totum membrū excipiant, quo breuiiores sunt, q̃ vt idem bis efficiāt. crunt autē sic sesquipediales. Diligenter igitur contemplari membri crassitudinem oportet, & de ipsa pannorū longitudinē coniectare, eos q̃ tantos adinouere, vt primo circuitu totū, secundo dimidium duntaxat, complectantur. Vbi minis tuæ coniecturæ cōfidas, si eos super integrū membrum inducas, ad vnguem longitudinem reperies. Dubium autē non est, quin panni ita coherere inter se debeant, vt nullū inter ipsos inane spaciū relinquatur. Hos docet ex vino madefieri, quod colore nigrū sit, gustu austerum, habitu verò, quale illiusmodi vinū est, plenum videlicet. nā ex cunctis vini generibus ad hæc vitia, id optimum est, quod nigrū & austerum est. communis enim illi gratia est, ob quam in vlcere vinculis ingeritur, præterquam, quod minis mordet, q̃ aliud vinū ex adstringentibus: quod permagni in eiusmodi curatione refert, ostensum enim est sub dolore inflammationē se cōcipere. quare potius est, quod modicè, q̃ quod vehementer austerum est, quandoquidem hoc do H lorem mouet, quum carnem vltra debitū cogat, comprimat q̃. Quamobrem, nec id vtiliter adhibetur, quod tenuium partiū, quale albū est, aut flauum, aut rufum, quum ad altiores partes exulceratæ carnis penetret, dolori q̃ sit, eam comprimens, atq; adstringens: at plenum, cuiusmodi nigrum est, ad carnem altius non descendit, sed illā refrigerando & contrahendo, qualitatem duntaxat impertit. repellit itaq; succos, qui iam recepti sunt, & eos, qui influūt, coerces. Ratio igitur eligi vinum hortatur, quod nigrum sit & austerum. quāobrem, vbi velis etiam experimento comprobare, periculum faciens eius facultatis in maximis grauissimis que vulneribus, verum dixisse me cognosces. Dictum autem est etiam in superioribus, oportere vlcus ex eo continenter madere. quandoquidem, vbi superiniecta lintea paulatim siccantur, atque incallescant, vlcus inflammari necesse est, potissimum æstate. Quo tempore, quum pontifices Pergami apud nos semper gladiatores darent, eos, qui grauissimè vulnerati fuerant, curauī, multiplicem pannum vulneribus inducens, istiusmodi vino madentem: extrinsecus verò superimponens spongiā mollem: deinde totum ferè diem noctem que perfundens. Vulnerato autem membro pellem subieci leniter à pedibus sinuatam, per quam procederet infusum vinum, & quasi per canalem efflueret, atque

A atque inani pelui receptum, regeſtum, que rurfus infunderetur. Extra alios uſus, quos vinum hoc præſtat, ferè nullum odorem mouet, id, quod inter cetera commodiſſimū eſt: cum ex alijs quod odoratum eſt, maximè caput tentet: nigrum & auſterū, neq; etiam eo nomine offit, ſed ſi vllum excitat odorem, ille exiguus eſt, cum natura frigidum ſit. Oſtendimus autem in libro de ſimpli-
cium medicamentorum facultate, vinum auſterum natura frigidum eſſe ac terreſtre. Tale igitur, quum ex miſtura conſtet frigida terreſtri que, calidos vapores ad ſuperiora minimè tranſmittit. At, quum plerifque eorum, qui icſi ſunt, huius præſidijs vtendi copia non ſit, quo nos ad gladiato-
res vſi ſumus, diximus inter initia prorinus horum commentariorum inungendum eſſe liquidū ceratum, quo ſimplices fracturæ illinuntur: quod vino longè imbecillius eſt, ſatis tanten efficere poteſt id, quod res exigit.

- 22 *Imponantur autem hi ſuper ipſum vlcus, & hinc atque hinc, neque vſlo modo adſtringantur, ſed catenus inſi-
dant, vt vlcus fulciant.*

Nunc rurfus, hinc atq; hinc / ἐνθεν καὶ ἐνθεν / dixit, vt longitudinem membri, non vt latitudi-
nem indicet: ſeruat autem commune præceptum, vt vincula non parum ſuper integrā partem
B ferantur: vbi ingens vitium eſt, vt cum maximè.

- 23 *Ad vlcera verò admoneatur ceratum, quod picem habeat: vel aliquod ex iis medicamentis, quæ cruentis vulne-
ribus iniiciuntur: uel aliud ex iis, quæ idonea ſunt, quæ perfundantur.*

Summa curationis in perfuſione ſita eſt primis diebus, quibus & exprimere ab vlcerata parte
conuenit, quidquid humoris in ea iam contractum fuerit, & id prohibere, quod à ſuperiori parte
concurrit. A tertio die ceratum, quod picem accipit, expeditius eſt, quo maturatur, quæ in vlcere
collecta ſunt. At Hippocrates cerato initio cum vini proprietate vitur, q; vlceratas partes attin-
gi, nolit à vino puro, ſed mediū aliquid interici, ne qua illis iniuria propter adſtringentem vini
facultatem accedat: non enim medetur vulneribus enſis icſu ſimpliciter illatis, ſed quibus iuxta
omnis caro plus minus uē quodammodo neceſſe eſt, atteratur: liquidē ſub quo icſu frangitur os,
caro etiam atteritur. Merito igitur ſuper ipſa vlcera imponi quoq; voluit aliquod medicamentū
ex iis, quæ ſtatim cruentis vulneribus iniiciuntur, vt attrita curret, ac mitiora efficiat: præcipit au-
tem, vt idonea legantur, quæ id, quod extrinſecus infunditur, admittant: idoneum autem hoc lo-
Cco σύντροπον dixit.

- 24 *Si æſtas fuerit, panni ſubinde vino mafeſcant. Superdetur hyeme multa lana ſuccida vino atque oleo reſperſa.*

Quia vitia hæc, vbi vehementer frigeſcunt, interdum neruorum diſtentione periclitantur, &
vinum tum habitu tum natura frigidum infunditur, propterea veritus, ne quid hyeme grauius
accidat, quum frigide medicine temporis quoq; frigus accedat, occurrit inmodico frigori lanam
multam inducens, tinctam vino, cui olei paulum adieciū ſit: imperat q; , vt ea ſuccida ſit, quo per
ceſypum aliquid calefaciat, & modicè refrigeret.

- 25 *Subiiciatur que pellis ſic figurata, vt humor per ipſam facile deſcendat: & quod effunditur, recipiatur.*

Pellem ἱξάλιν vocauit: quo nomine caprina ne tantum ſignificetur, an alia queuis, quærere
in arte hac ſuperuacuum eſt, quum non verborum expoſitio, ſed vitiorum curatio, propoſita ſit:
in qua noſſe id ſufficit, quod ſubiicere pellem oportet raram non denſam, per quam ſeratur quaſi
per canalem, non modo id, quo perfunditur membrum, ſed etiam ſanies, quæ abluitur: eam que
Da pedibus, vt ſuprà poſuimus, figurare.

- 26 *Meminiſſe etiam debemus exulcerari eiſmodi partes, ſi diu in eodem habitu perſeuerent, & egerrimè ad ſanita-
tem poſtea perducī.*

Que cingunt os ſacrum (quod & latum appellant) calefacta atq; exefa in torporem incidunt,
& vltra cutem exulcerantur: ea que exulceratio difficulter curatur, quum ſub cute ſint cartilagi-
noſa offium extremitates, que nudatæ cicatricem vix recipiunt.


- 27 *In iis, qui aliquo ex ſuperioribus modis, vel ex iis, qui poſtea ſubiiciuntur, ſub vinculis nequeunt ad ſanitatē per-
duci, eo potiſſimum incumbendum eſt, vt pars comminuta rectè contineatur, atque è regione corporis, ea obſeruatō-
ne, vt ad ſuperiora magis ſpectet, quàm ad inferiora.*

Præcipit, vt crus omnino è regione corporis contineatur, ſed extrema parte paulo ſublimiùs.
De his enim ſuperiùs iam poſui, ex humiliori habitu ad crus plurimum materie cōcurrere, ex ſu-
blimiore dolorem excitari. Hac igitur de cauſa vbiq; cauendus eſt humilior membri habitus, ſupe-
rior verò hætenus accipiendus, quatenus cruri dolorem non dum aſſert.

28 Quod si bene expedire que rem agere quis velit, necesse est machinationibus utatur, ut fracti ossis intentio iusta E sit, ac minime violenta: præcipue autem ad crura machinationibus opus est. Quidam sane reperiuntur, qui quoties crus abruptum est, & alligatum, extremum pedem ad lectum deuincunt, aut ad aliud lignum, quod iuxta lectum de figunt. Hi ergo omnia mala efficiunt, nec quicquam boni, eo quod nihil ad extendendum conferat vinculum pedis, quoniam nihil minus reliquum corpus ad pedes fertur, atque ea de causa non amplius extenditur: neque etiam ad continendum è regione aliquid conducatur, sed potius peruertat: reliquo enim corpore in hanc, vel illam partem conuerso, vinculum non prohibebit, quo minus pes, atque ossa quibus continetur, reliquum corpus sequatur: quod si nullo modo vincitur, minus utique peruertetur, minus enim relinquatur, ubi reliquum corpus moueatur.

Intentione, quæ per organa adhibetur, quam in his latius & iâ exposuit, & nunc exponit, equè totum membrum extendi, neq; vllam sinu particulam peruertere, superius ostendimus. Quæ verò scribit de iis, qui pedem vincunt, plana sunt: pergamus ergo iam ad sermonem de orbibus.

29 Si quis è corio Aegyptio binos orbis suat, qualibus utuntur, qui diu in magnis compedibus detinentur, sint quæ or bes hi vndique tunicis inuoluti, altioribus quidem à fractura, ab articulo humilioribus, tumidi præterea, & molles: accommodentur autem vnus quidem super talos, infra genu alter: à lateribus verò vtrinque habeant ex simplici uel F duplici loro exiguos quasi sinus, alios vtrinque à talis, alios à genu: sinus quæ superioris orbis, è regione illis respondeant, qui in inferiori. Deinde cornea bacula eiusdem magnitudinis prehendant, scilicet digiti crassitudine, & ea longitudine, ut quum flectuntur, diducere ossa possint, sic, ut non inhereant.



Sermo de orbibus, quos Hippocrates ex cogitauit, minime ita clarus videtur, ut mea explanatione minime opus sit. Sed, quoniam non nulli sæpius dixerunt nescire se, quo G modo se habeant, quæ ab Hippocrate traduntur, incertum est quid agant: iis enim, qui negarunt intelligere se Hippocratem, orbis ipsos monstravi: ac librum legens, sermonem planum feci, sin

gula eius verba accommodans ad eam orbis partem, quam monstrabam, de qua ipse tractauerat. In libro autem non licet orbis demonstrare, sic, ut nesciam, qua via hanc orationem aperiam: si quis enim Hippocratis verba, quæ plana sunt, comprehendere nequeat, nec mea etiam comprehendet. Ea igitur sæpius legat, ac diligenter consideret: certum enim scio, eum, qui hoc sæpius fecerit, si antè non intellexit, omnino intellecturum: equidem quicquid lucis addere potero, non omittam. Orbis igitur non debemus tales intelligere, quales sunt pilæ, quibus pueri ludunt: illæ enim verè orbis H sunt, sed quos Hippocrates parari iubet à compedibus (ut ipse retulit) non abhorrent, quorum afferre similitudinem licet: eos enim concipito anguibus similes vel farcimini. Ergo, quemadmodum coqui intestinorum sinus similitudine infercipientes, vel carne concisa, vel alio eius generis quopiam, farcimen parant: sic tu quoque corium fuito, quod inane intestinum representet, & molli aliqua re impleto. Præcipit autem, ut corium sit Aegyptium, id est validum & molle: quod si in Italia, vel Thracia, aut vbiuis gentium eiusmodi corium habeas, Aegyptium ne querito. Sit autem assutum corium ita longum, ut compedum modo talos completi in orbem possit. Alter præterea orbis ad regionem, quæ sub genu est, similiter detur: his enim binis opus est ad singula membra, quæ curantur: quorum item multa paria disparis magnitudinis habeantur, ut prout unicuique conueniunt, huic quidem maiores, illi verò minores iniiciantur. Hæ autem tunicæ, quas σφαίρας, id est orbis uocauit, ex toto esse in orbem non debent, neque paræ latitudinis, aut altitudinis, sed quæ cuti herent paulatim patefcentes quodammodo: qua uerò attolluntur, rotundæ: neque etiâ exquisitæ tales, sed ab interiori parte magis in altitudinem attollantur, inde in orbis speciem desinant, dum ad cutem perueniant à parte exteriori: ea pars, quæ desidit, in inferiori orbe ad pedem propius accedat, in superiori ad genu.

Orbibus

A Orbibus igitur (ut dictum est) constitutis, quædam appendices innectantur, quas in utroque vult duas esse, binas in inferiori orbe, quarum sinus sursum spectent ad genu, binas in superiori, quarum sinus contra deorsum conuertantur: hæc autem à lateribus alluantur ab ea nimirum parte, quæ maxime attollitur, hinc una, atque inde altera: in quas coniungi vult quatuor bacula extrema, quæ, ubi coniecta fuerint, eodem penè momento paulatim curuentur, ut, dum ad naturalem rectum habitum redeunt, orbes compellant, superiorem ad lumen membrum, inferiorem ad imum: hoc enim facto fracturæ partes in diuersa extentæ rectè componuntur, seruaturque. Imperat autem, ut ob firmitatem ligni bacula è corno accipiantur, constat quod ad hunc usum ex eo vtilius adhiberi. Glossocomum verò machinamentum membris in contrarias partes diducendis aptissimum esse, in superiori commentario indicaui, ubi exequutus sum eius structuram.

30 *Magna cura, ne imæ fustium partes cuti infidant, sed extremis orbibus. Parentur autem baculorum paria tria, vel plura: sint quæ alia alijs aliquanto longiora brevioraue, ut, ubi magis extendere volumus, commode posimus: demittantur quæ hinc atque hinc à talis.*

B Infidere dixit ἐγχεῖσθαι, quasi inherere significans: edicit enim, ne bacula, quæ ad orbes data, ipsos, alterum ad superiora, alterum ad inferiora compellunt, cutem tangant, sed, sublimiora ipsis orbium sinibus inherant. Cornea verò accipi iussit ob firmitatem, ut, quum induntur, vehementer inflexa rursus dirigantur, & ad pristinum habitum reducantur: neque dubium est, & sursum, & deorsum, orbes per hæc eatenus compelli, quatenus extenta in longitudinem procedent.

31 *Hæc, si rectè parentur, iuste intendunt, tum pariter è regione, nec fractura aliquod tormentum sentiet: nam, si quid exprimitur, partim ad pedem partim ad femur transmittetur. Commodius autem bacula collocantur à talis hinc atque hinc, ne situm cruris impediatur, & ut fractura bene oculis subiciatur & facile curetur.*

Διὰ μέσους id est iuste, dixi ab Hippocrate poni pro ἴσως id est æqualiter: sed idē significare videbitur ὁμαλῶς id est æqualiter, & ἴσως id est pariter, quod proxime subiicitur. Verum ἴσως in partibus vnius rei accipitur, sed ὁμαλῶς minimum in duabus rebus. Nunc autem, quod inquit /iuste intendet/ intelligendum est de intentione, quæ per duos orbes in contrarias partes adhibetur, & de corneis baculis in eos demissis: quod verò subdit /pariter/ de ea intentione, quæ singula præstant, puta orbis, qui à talis est, si per se æstimetur, dein is, qui iuxta genu, post hæc ea pars, quæ

C à dextro baculo, dein, quæ à sinistro.

32 *Nilil autem prohibet, si quis velit vel duo bacula superiora inter se iungere, vel aliquid etiam superinucere, sic tamen, ut, quod superinucitur, à fractura attollatur. Si orbes igitur leues, firmi, molles, ac non suauiter, & bacula rectè extendantur (ut iam proposuimus) machinatio maxime idonea est: sed, si quid horum non rectè habeat, oberit magis, quam proficiet. Perpetuum autem est, alius etiam machinationes, vel rectè, vel nullo modo, adhibendas esse: turpe enim est, & ab artificio plurimum abhorret, machinationibus utentem ipsa machinatione destitui.*

Quatuor erant bacula, ab utraque parte cruris duo, vnum superius, alterum inferius. duo (inquit) quæ à superiori parte sunt, alligari inter se possunt, ut maneant recta, ne, dum magna vi curuantur inter se aduersa, ad proxima loca conuertantur.

33 *Plerique tamen medicorum fracturæ, seu integra cutis sit, seu vulnus etiam acceperit, primis diebus Lana succida medentur, neque id videtur ab arte alienum. Quicumque sane recentioribus fracturis protinus, ubi lintea non sunt, coguntur Lanam imponere, maxime venia digni sunt: siquidem linteus exceptus nihil est, quod multo commodius, quam lana super vitia hæc alligetur: ea verò copiose danda est, tum bene coarpta, non aspera: pauca enim & mala, parum quoque proficiunt. Sed, qui vno die, aut altero vincendam lanam consent: tertio autem, & quarto lintea mucientes, tunc maxime adstringunt, atque extendunt: medicinalis artis sunt ignari, atque admodum imprudentes. In vniuersum enim omnia vulnera tertio & quarto die minime vexanda sunt, omnisque opera speculi fugienda est his diebus, & quibuscumque alijs vulnera recrudescunt. In summa enim vulnera pleraque tertio aut quarto die recrudescunt, tum quæ inflammatione, tum quæ sordibus, grauiter excipiuntur: aut febrem inferunt: quo præcepto nullum aliud tradi potest vtilius. Nam quæ sunt in medendi arte grauissima, quibus id non sit commune? non enim pertinet ad vlcera tantum, sed ad alios quoque morbos complures.*

Propositum auctoris est prauam emendare consuetudinem medicorum, qui satius existimabant, non protinus à principio fractum membrum extendere, sed primum duobus aut tribus diebus lenientes, tertio aut quarto die à principio vim adhibere. Hippocrates verò curandi rationē docet huic maxime contrariam, nempe initio membrum extendendum esse, tertio & quarto die leniendum. Quod si, quæ hic scribuntur, singula consideres, plana erunt, aperte enim loquitur.

34 *Nisi si quis dicat, alios quoque morbos esse vlcera, quod quodammodo verisimile est.*

Septima Classis.

IIIIIIII ij

Verisimile

Verisimile dixit ἐπιεικὲς, quasi probabile: id autem propterea posuit, quia nō nulla à ratione E prorsus abhorrent. Quo igitur argumento mouebit, qui alios morbos vlcerà esse affirmet? Morbi sanè, qui dolorem afferūt, probabiliter admodū annumerari vlceribus possunt: indicaui enim dolorem inde oriri, & quod continuum soluatur, vbi secatur, extenditur, aut cōtunditur: & quod immoderatum incidat temperamentum. Atqui solutionem cōtinui ad vlceris spectare, cuius manifestum est: sed immoderato temperamento, vbi subita mutatio accadat, aliquam fieri cōtinui solutionem, in opere de simplicium medicamentorum facultate demonstraui. Calorem quidem constat penetrare, & quasi exedere, quod continuum est: frigus item, quod vehemens est, cū subito cogit, quæ soluta sunt, aliquam creare solutionem, in eodem opere ostensum est. Iuxta hoc igitur non solum probabile, sed verum quoque erit, dolorem omnem ad vlcerum genus pertinere: at non æquè verè, atque id, quod propositum est, non tamen absurdè, morbi omnes poterunt vlceris nomine appellari: quandoquidem, cum plerisque morbis dolor coniungitur, à quibus sermo transferetur ad omnes, quum ratione quis contender totum corpus omnino, vel immoderato affici temperamento, vel contundi, extendi, aut euidenter secari: deinde conficiet à quolibet immoderato temperamento continuum aliquid solui: id, quod, quanquam euidenter sensui nō subiicitur, rationali tamen contemplatione verum esse comprobatur. hoc adeo magis accidit in F iis, quæ extenduntur, contunduntur, & comprimuntur: hæc liquidem proximè accedunt ad ea, quæ diuelluntur, quæ res cōtinui solutio est.

35 *Sæpenuerò alij alijs germani sunt.*

Quos consueuimus similes dicere, coniunctos, aut cognatos, Hippocrates solet appellare germanos: quo vocabulo summam rerum coniunctionem consortiū q̄ significat: nam, cū multi inter se cognati sint, nulli magis propriè cognati dicuntur, quàm germani. Eos igitur, qui maximè coniuncti sunt, quasi eandem coniunctionem habeant, quam germani, eo verbo nūcupat.

36 *Quicumque verò existimant lana vtendum esse, donec ad septimum diem ventum fuerit, dein extendendum, dirigendum, & fascijs vinciendum, non ita videntur imprudentes: tunc enim inflammationis impetus conquieuit: atq; ossa ab his diebus laxantur, & faciliè tractari possunt. Hac tamen curatione longè melior est, quæ à principio vinculum adhibet, sub qua septimus dies membrum exhibet ex toto alligandis ferulis idoneum: quod sub hac multo postèrius contingit.*

Illis in superiori sermone reprehensis, qui tertio, aut quarto die adhiberent vinculum fracturæ G accommodatum, ad eos nunc transit, qui post septimum diem ad id veniunt: quos minùs errare indicat, vt qui partes extendant non ita inflammatas: sed, qui tertio aut quarto die id efficiūt, quo tempore inflammatio, quum maximè vigeat, lenientibus eget, eos in non mediocri errore verari ostendit.

37 *Alia etiamnum affert incommoda, quæ omnia persequi longum esset.*

Longitudinis temporis accusauit eam curationem, quæ non nisi post septimum diem vinculo vtitur fracturis accommodato: nunc subdit in alia quoque compellere incommoda, quæ, ne multus sit, omittit. Nos satius ducimus ea subiicere, moti ab iis, quæ in superioribus demonstraui. Vbi fractura mediocris sit, partes sub hac vinciedī ratione tumidiore sunt, vt suprà etiam ostendimus: quod si os asperius & grauius perfringatur, periculum quoq; est in eo casu, ne corrumpatur, si vinculum, quod ad fracturas pertinet, dum trāseat septimus dies, differatur. hoc enim iubet à primo adhiberi, quoniam in vtramque partem à fractura exprimit superatē sanguinem, qui, si diutius ibi subsistat, non nunquā efficit, vt ossa vitiosa sanie plurimum irrigata corrumpantur.


38 *Quibus ossa fracta & cute excedentia restitui nequeunt, hoc modo in suam sedem collocantur.* H

Solent græci, qui Asiam incolunt, vsurpare verbum κατὰσῆσαι, vt significant in suam sedem collocare: vnde mihi videtur Hippocrates ducere nomen κατὰσῆσαι per σ tertiam syllabā scribens, sic, vt idem significet, quod κατὰδρυσις, quod vocabulū nihil aliud sibi vult, quàm aliquid in suam sedem collocare, quam rem κατὰσῆσαι dixit. Malè igitur scribunt non nulli κατὰτασιν absq; σ, non enim per intentionem, quam κατὰτασις notat, sed & per impulsus, nudata ossa in suum locum reconduntur.

39 *Ferramenta facere oportet ad similitudinem vectium, quibus in lapidicinis vtuntur, latiora ex vna parte, angustiora ex altera: quæ terna habeantur, aut etiam plura, vt semper aduci aptissima possint: quibus demissis ossa eodem penè momento, quo intenduntur, impellenda sunt. Innitantur autem ab imo, inferiori ossi, à summo, superiori: atque (vt vno verbo dicam) non aliter, quàm si vectis ad lapidem vel lignum fortiter impellendum admoueat. sint autem ferramenta quantum fieri potest firmissima, ne flectantur. Hæc itaque curatio maximum momentum habet, si ferramenta idonea sint, & impulsus conueniens adhibeatur.*

Constat

A



Constat fabricanda esse ferramenta ad figuram vectium, quibus in lapidicinis vtuntur, non tamen æque magna, cum, quæ ad impellenda ossa adhibentur, ab iis non abhorreant, quæ ad virgidos dentes comparantur. Verum ad ossa impellenda parari multa debent, quorum alia aliis pleniora, vel tenuiora sint, vel minora, ab extrema parte, qua maxime suum effectum præstant: sed qua via vti eisdem ferramentis cõueniat, Hippocrates ipse euidenter declarat. Si quis eius verba nõ intelligit, alia expositione, aut interpretatione

non indiget, sed oculorum sensur: quedam enim res natura tales sunt, vt aliqui nec discere, nec doceri eas possint, nisi in conspectum adducantur.

- 40 B Ex vniuersis enim machinationibus, quæ ab hominibus excogitate sunt, hæ tres sunt omnium valentissime, axis versatio, impulsus per vectem, & cuneus adactus: namque homines sine aliquo vno, vel sine omnibus, nullum opus, quod maximam vim postulet, perficiunt: quare non paruis faciendus est impulsus hic: siquidem ossa, vel hac via, vel nulla alia, reconduntur. Sed si id os, quod super alterum excidit, vecti idoneum locum non præstet: sit quæ ita acutius, vt vectis effugiat: scalp pro excauandum, donec vecti locus fiat, cui firmiter hæreat. Impellere autem oportet, atque extendere eodem die, vel postmodum, sed non tertio: quarto vero, vel quinto minime: nam, si his diebus lacerata ossa nequeant in suam sedem reuerti, inflammatio superueniet, ac nihil minus etiam, vbi restituuntur.

Axes nuncupantur ab Hippocrate vocabulo ὄξυς & ὀνίτης. Horum itaque versationem ait validissimam esse, sicut & vectis impulsus, & cunei admotionem, quam vocat σπένδωσις, quæ lignorum per cuneos diductionem, diuisionem quæ significat.

Atqui multo magis nervorum distentio excitabitur, si os restituatur, quam si restitui nequeat: quod quidem ignorare non oportet: nam, si condito osse nervorum distentio superueniat, in angusto spes est: præstat autem iterum expellere, si potest citra molestiam fieri.

Causam, quamobrem his omnibus vitiis inflammatio accedat, vbi ossa condantur, ipse deinceps omnem persequitur, semel ipsam explicasse contentus, non secus atque alia multa, quæ in medicina maximum pondus habent, vt, qui transferendum nobis sermonem censcat ad cetera eiusdem naturæ omnia. Ecce tibi adscribam eius verba, quibus vniuersum hoc, quod ad multa singularia pertinet, exponit.

- 42 Neque enim ius, quæ iusto laxiora sunt, nervorum distentio aut rigor supernascitur, sed ius, quæ ultra debitum intenduntur. Quod ad hunc locum attinet, propositus diebus tritare non conuenit, sed operam dare, vt vlcus quam minime inflammatione tentetur, & quam maxime suppuret: atque ubi septem dies, vel paulo plures transierint, si febris non sit, atque vlcus inflammatione vacet, tunc minus prohibemur eniti ad reponendum, vbi veti cõputres fieri posse non desperemus, quoniam sine effectus spe non conuenit & sibi & alteri molestiam afferre. Ergo, si ossa in suam sedem collocentur, quæ curatio adiuuenda sit, iam declaratum est, siue abscessura credamus, siue non. Quod si abscessura esse videantur (vt dixi) si scilicet in omnibus his ordinibus a medis debent, plerumque, quemadmodum illæ, quæ primæ circumdantur, in vtramque partem attrahi.

Ostensum est in libro de motu musculorum singulos musculos suo munere fungi, vbi versus suum initium contrahuntur: quæ res, quando inuitis nobis accidit ob inflammationis magnitudinem, nerui distenduntur. Cur igitur, si reponantur ossa, quæ fracta aut luxata inter se cesserunt, musculorum distentio sequitur? Quæstio ex eo præsertim diluitur, quod membrum redditur breuius, quàm fractum vel luxatum os cute excedit: sed postquam in suum locum reposita sunt, quæ nudata erant, suam longitudinem recipiunt: in quo casu coguntur muscoli, quos inflammatio exercet, vnà cum toto membro distendi. Duobus igitur modis distenduntur, & sub inflammatione, & nunc, quum ad pristinam longitudinem reuertunt.

- 43 Attendenda insuper est figura vlcus, ne sub vinculo hiet, ac diuarcetur.

Translatione vsus duo hæc verba vsurpat, hiare scilicet, quod σπένδωσις dixit, ducto quidẽ verbo à labiis oris: & diuarcari, quod ἐκσπένδωσις, à cruribus plurimum inter se diductis: diducta enim crura diuarcata dicimus: labia verò, quum sine motu maxillæ inter se distant, hiantia: namque, vbi os sic aperitur, vt labia non cocant, dentes verò inter se committantur, hiare dicitur. Cauet autem, ne oræ vulneris diductæ vinciantur: vult enim eas contrahi cutis partibus suum situm recipientibus: quandoquidem subiectum musculorum vlcus hac via minime cõprimetur, & maxime tegetur, scire enim licet, quæcunq; cute conteguntur, hac eadem delectari, nihil quæ nunc

dari innocenter. At quid mirum est, si ea, quibus cutis proprium, atq; innatum velamentum est, **E** semper velamento gaudent innato, cæteris q; omnibus læduntur? Equidem, quum nihil ex cute præciderem, sed eam ab vterioribus partibus super locum inducerem, à quo detracta erat, agglutinata vidi, & (quod magis admiratione dignum est) quum locus iā nigritie occuparetur. Illud item longè admirabilius, q; non modò adolescentibus, sed senibus nō paucis, cutem ita detractam protinus, vbi in plaga nigresceret, sæpè agglutinaui. At nuda caro, si sine cute relinquatur, ægrè ad cicatricem perducitur, præterquam q; morsum omnino sentit, & sordida redditur: medicamenta enim, quæ inflammationem coercent ac leniūt, cuiusmodi est, quod *πάρυρον*, & quod *τετραφάρμακον* nuncupatur, affectam partem ab inflammatione tuentur, sed vlcus sordidum efficiunt: quæ verò vlcus purgant, ob detergendi facultatem mordent. Sed, vbi pars, à qua detracta cutis est, eadem contegatur, nulli eiusmodi noxæ patet: quod simile est, atq; vbi pustulæ sub varijs causis ortæ in tumorem assurgunt, & interdum grauem afferunt dolorem: acuta enim acu (vt nosti) eas aperio, vt exitum habeant, collecto q; ibi humore leuiter expresso, superiectam cutem relinquo. Hæc deinde iterum implentur præcluso foramine, impletæ que eodē modo aperiantur: humore expresso cutis ad carnē compellitur, seruator q; dū quod sub ea exulceratū est, ad cicatricem perueniat. Hæc dixisse volui, vt apertè ostenderem vlcus quodlibet innata cute con- **F** tegendum esse. hîc autem nō quodcunq; tractatur, sed quod altè penitus insedit, quum caro tota ab ossibus discussa sit: non enim cute excederent, nisi prius vniuersam carnem incidissent. Hanc igitur melius est proxima cute velari: namq; vbi nuda sit, contactu medicamentorū, quibus nutritur, si oleum accipiant, & vlcus mitius reddant, sordida euadit: sin purgēt sordem, & detergendi vim habeant, morsum sentit. At, vbi iniecta medicamēta, per cutem, suā facultatem carni exulceratæ impartiant, nulla ipsorum particula penetrante, proderūt quidem, sed nullum afferent ex superioribus incōmodis. Iure igitur Hippocrates magni momēti existimat oras huiusmodi vlcum contrahi, id, quod benè vtique cedit, si diligenter figura vlcus animaduertatur: si vna enim ora in alterum latus inclinetur, fascia inde orsa ad contrarium cōuertenda est: si pariter in utrūq; media primò iniici debet, atq; oræ vulneris inter se committi.

- 44 *Fascia commodè quibusdam à dextra parte attrahitur, quibusdam à sinistra, alijs in vtramque partem ducitur. Quæcunq; autem ossa reuerti in suam sedem non potuerunt, hæc scire licet abscessura esse, non secus etiam ea, quæ ex toto carne sunt nudata: nudatur autē quibusdam pars superior, plerisque verò emoritur caro, quæ circa fracturā est.*

Συντόπως dixit, vt commodè significaret, inutili translatione vsus: quod mihi libuit notasse, **G** quandoquidē eloquentissimus quilibet translationē vsurpat, vt rem apertius declarans exponat.

- 45 *Ossa quædam sub fractura diuturna alijs putrescunt, alijs minimè: & quibusdam grauius, quibusdam leuius: tum modo grandia, modo exigua ossa infestantur. Ob hæc igitur, quæ posita sunt, non licet vno verbo explicare, quo tempore abscessura sint: non nulla enim, & quod exigua sunt, & quod in summo continentur, celerius excidunt: non nulla non excidunt, sed arefacta & putria squamam remittunt: præter hæc multum curatio alia ab alia differt. Ferè tamen ossa illis celerrimè abscedunt, in quibus celerrimè pus apparet, & celerrimè etiam atque optimè caro increfcit: caro enim, quæ in vitiosa parte succrescit, plerumque os attollit. Ambitus ergo totius ossis, si quadraginta diebus abscedit, optimè abscedet, quum non nulla vsque ad sexagesimum perueniant. Rariora quidem ossa maturius abscedūt, firmiter seriū, alia, quæ minora sunt intra tempus multò breuius, atque alia aliter.*

Ossa, quæ putrescunt *σεσάρισαι* dixit, verbo ducto à nomine *σαπρῆς*: nominant autē quæcunque corrupta sunt, *σαπρῆς*, id que non rectè: quæcunque enim & vetusta, & diuturna sunt, ab ipso dicuntur *σαπρῆς*.

- 46 *His autem de causis os præcidendum est. Si restitui nequit, & parum quid excedere uideatur, abscindere hoc licet: si noxium sit, & carnem aliqua ex parte vulneret, ac molestiam afferat, nudatum quæ sit, hoc quoque abscindendum est. Reliqua verò non multum refert, præcidantur nec ne: scire enim certum licet ossa, quæ carne nudata sunt ex toto, & arida, omnia penitus abscessura: ea verò præcidi non oportet, à quibus squama resoluenda est: ex propeptis autem indicis, conuiciendum est, quæ penitus abscessura sint. Ad horum curationem pannis vtendum est, ac vni perusione, sicut antè indicaui in ossibus, quæ abscessura sunt: cauendū quæ ne frigida aliqua re à principio perfundantur: nam periculum est, ne cum febre grauis horror sequatur, ne ue neruorum distentio superueniat: nam frigida semper neruorum distentionem afferunt, præsertim vlcerebus. Illud item ignorare non oportet, quod membra, in quibus vtraque ossa comminuta sunt, dum inter se cedentia curantur: & ea quibus fragmentum à toto ossis ambitu recedit: necesse est breuiora fiant.*

Causas appellauit *προφάσεις*, patet autem ab eo hîc quoq; sic vocari, non falsas, sed veras causas. vniuersus autem sermo de ossibus putribus planus est, quum imperat, vt id ex ipsis præcidatur, quod in causa est, cur non condantur, vt quod proximam carnem pungit, atque (vt ipse ait) molestiam affert, hoc est, cum perturbatione, atq; tormento reponitur. Addit insuper futurū prorsus, vt ea ossa abscedant, quæ nudata protinus restituta non fuerunt: ad hæc, quæ inaruerunt.

Quibus

47 A Quibus femoris vel humeri os excessit, ferè non euadunt, sunt enim ossa hæc grandia, & medullosa: addit, quòd multa ac magna simul lacerentur, nervi scilicet, musculi, ac venæ. Quòd si reponantur, solet nervorum distinctio superuenire: si non reponantur, acuta, biliosa quæ febres cum singultu, ac moria. Non minus euadunt, quibus nec reponimus, nec reponere tentamus: magis adhuc euadunt, quibus inferior pars ossi, quam quibus superior excessit. Euadere etiam possunt, quibus reponuntur, raro tamen: multum enim curatio, multum quæ natura corporis, alia ab alia distat, quod ad faciliè ferendum attinet. multum quoque refert, an ab exteriori humeri femoris ut parte ossa excesserint: multa enim & grandes venæ per internam partem feruntur, quarum non nullæ vulneratæ hominem ingulant: per exteriorem vero pauciores intendunt. In eiusmodi igitur casibus, periculi meminisse oportet, quod proprie circumstat, id quæ in tempore prædicere. Quòd si restituere cogaris, speres quæ te id assequiturum, neque ossa nimium inter se cesserint, neque musculi contracti sint (consueverunt enim ad suum initium recurrere) hæc quoque per veciem impellendo, extendendo quæ, in suam sedem reponito,

Constat, quibus ossa hæc nudantur, nō tam ossium, quàm musculorum, nervorum, arteriarū, ac venarum magnitudine periclitari: ad hæc, quoniam propiora sunt nervorum musculorum quàm initiis. diximus autē in opere de musculis, ubi ossa inter se cesserint, eos faciliè in se ipsos contrahi,

B id quod sæpius adduximus. Cetera, si animum adiungas, in aperto sunt.

48 Vbi restituantur, veratrum molle potui dandum est eodem die, si eodem die restituantur, alioquin ne tentare quidem oportet: Vlcus verò curandum est, non aliter, quàm calvariæ ossa, ubi comminuantur, nihil singulum imponendum, à cibo penitus abstinentum.

Incertum est, quid sibi velit /molle/. patet autem, vel qualitatem potionis, vel modum, significare: nemo autem de modo exiguo, molle, propriè dictum existimaret: nec quæ ratione Hippocrates præparari ipsum velit, faciliè intelligitur. Nos sanè radiculam ex oxymelle interdum dedimus, in quam veratri radicem surculi duntaxat per totum diem ac noctem fuisse infusa. Huiusmodi autem purgatio per veratrum leuior est. Ipsa autem res cōprehendi sanè non potest, quum nō adiecerit, quo pacto dari debeat: scimus enim & veteres medicos, & iuniores, & qui inter hos sunt, sumendi veratri varias rationes prodidisse.

49 Si homo naturaliter amara bile redundat, sustineri debet potione aquæ, cui oxglycis odorati paulum aspersum fuerit: sed, si amara bile non redundet, contentus sit aquæ potui. Si quidem commenti febre laboret, non minus quatuordecim diebus hoc victu utatur: sin febre vacet, septem.

Contrariam huic scripturam habet Artemidorus, qui Capito cognominatus est, volens, ubi amara bilis non superet, dandum oxglyces: ubi superet, aquam. Scripsit autem hoc modo: Si homo naturaliter amara bile non redundet, sustineri debet potione aquæ, cui oxglycis odorati paulum aspersum fuerit: sed, si amara bile redundet, contentus sit aquæ potui. Quidam alii cū Artemidoro scripturam hanc superiori præpositam habent: quanquam in libro de ratione victus in morbis acutis Artemidorus ipse cum locum, ubi Hippocrates agit de potione aquæ, ita scribit: Alioquin, nec sitim tollit, sed amara efficitur: biliosis enim naturaliter bilem faciunt. & præcordijs aliena est: infestissima verò est, potissimum quæ bilem facit, & vires conuellit, cum inani corpore assumitur. Qui locus, quum à quibusdam ita scribatur /bilem enim naturaliter faciunt, & præcordijs aliena est/ Artemidorus ipse priori scripture potius subscripsit, in qua adiecit /biliosis/, atque ita legit /biliosis enim naturaliter bilem faciunt/ volens aquam non simpliciter cutlibet, sed biliosis duntaxat, bilem facere. Quo pacto igitur nunc dat aquam bibere, quibus amara bilis abundat, nisi forte si existimat amara bile redundantes, quos Hippocrates vocat *πικροχόλες*, alios esse, atque biliosos: sed nemo est, qui nesciat illos vocari *πικροχόλες*, in quibus amara bilis redundat: namque altera bilis, quæ nigra conspicitur, acida est: quæ verò pallida, & flava, amara. Patet autē ob vitia, quibus languens derinetur, vinum remoueri: si quis autē amara bile naturaliter redundet, quum ab aquæ potione plurimum lædatur, quemadmodum dictū est in opere de ratione victus in morbis acutis, huic tantum permittit dari paululum omnino oxglycis, quam multum nominant etiam *ἀπόμειλι*. Eligat autem id, quod dulce est, ne tentet partes nervosas: nam, quod magis acidum est, magis nocet, ac præsertim, ubi ex melle constat & aceto, non ex fauis, ut supra indicavimus: quo modo in Hellade quidem, atque Eli potissimum componitur. Nos in aliis regionibus ex fauis conficimus, acetum mellis adicientes, post hæc incoquentes, donec eorū qualitates in vnitatem coierint, atque acetī vis frangatur.

50 Deinde paulatim pro ratione ad quemlibet victum reuertatur. Quibus remaneat, si ossa non fuerint, eadem purgatio convenit: eodem modo vulnus nutriendum, & eadem abstinentia. Si ossa non fuerint, quæ non danda est, extendi non debet, sed contrahi potius, ut spaciū in ulcere laxius sit. Si autem ossa non fuerint, quæ non danda est, extendi non debet, sed contrahi potius, ut spaciū in ulcere laxius sit. Si autem ossa non fuerint, quæ non danda est, extendi non debet, sed contrahi potius, ut spaciū in ulcere laxius sit.

Septima Classis.

IIIIII IIII penultima

Sect. 3. l. 40. 7.
131.2

pericula multa circumstant: atque ubi ossa non reponantur, medicus videtur arte destitui: ubi reponantur, homo ad E interitum magis præcipitatur, quàm liberetur.

Antea quoque diximus quamlibet victus rationem, quæ exquisitæ contraria est, ab Hippocrate *παύλην* nuncupari.

- 51 *Ubi ossa genu vel toto loco mota sunt, vel paulum excefferunt, casus multo mitior est, quàm ubi ea, quæ in cubito sunt, vel toto loco moventur, vel paulum excedunt.*

Quum ossa toto loco moventur *ὀλισθήματα* dicit, quum paulum excidunt *διακρίματα*. mitiorem verò casum *εὐνθέσιον* appellauit, iuxta propriam significationē verbi *εὐνθης*, quo significatur bonos habens mores. nam, si stolidus græcè vocatur *εὐνθης*, similiter dicitur, atq; *γλυκεία* & *καλλεία*. *γλυκείαν* quidē vocant suem, ubi diis immolatur, vt blandè rem appellent: *καλλείαν* verò simiam: nam ab hoc quoque vocabulo cauent, quod testatur Callimachus quum ait, A vocabulo feræ per horam caueto.

- 52 *Nam pro magnitudine tenuior est articulus femoris, quàm humeri.*

F

Commisura genu duobus ossibus continetur inter se commissis, femoris scilicet, ac tibiæ. sed, sicut in cæteris commissuris necesse est quoddam cauum esse, in quod se inserat caput ossis, quod recipitur, atque ipsum caput rotundum esse, vt promptè facillèque in cauum coniiciatur: ita etiā in commissa genu, extremum quidem femur inlinuatur, tibiæ verò caput recipit. nam, quum hæc femori subiecta sit, duo eius tubercula, duobus cauis admittit respōdentibus, quæ media aptè distinguuntur cartilagine quadam neruosa. Merito igitur Hippocrates ex ossibus, quæ inter se committuntur, articulum vocat, non id, quod proximum processum accipit, sed, quod in cauo recipitur. nunc autem inquit /tenuior est articulus femoris, quàm humeri/, quoniam, ubi articulus hic, id est imum femoris caput, cum tibiā committitur, tenuior est, hoc est, minùs tumet: non tamen simpliciter est minor humero, quàm cum cubito coniungitur, sed si pro portione aestimetur. nam, si imum femoris caput magnitudini femoris respōderet, longè maius esset: sed res aliter habet, multò enim maius est femoris os, quàm humeri: imum verò femur paulò maius est, quàm imus humerus.

- 53 *Atque hic vnus iustam naturam habet, eam quæ rotundam.*

G

Femoris articulus, qui in genu est solus, inquit, iustam naturam habet. Constat autem (vt sæpe numero indicauimus) iustum ab ipso intelligi, quod æquale est. Si scrutemur itaque diligenter, qua ratione dicat hunc vnum naturam æqualem habere, inueniemus nullas in eo partes excedere, quum omnes inter se similes sint, quumque vnam tantum commissuram habeat. Igitur, quia femur ea parte in duos rotundos processus finitur æqualis magnitudinis ac figuræ, qui in duos tibiæ sinus æquales coniiciuntur: & quia vtrunque extremum, femoris scilicet ac tibiæ, situm est e regione totius ossis: ea de causa iure quis dicer articulum hunc iustam naturam habere. superius enim femoris caput, quod cum coxa committitur, neque e regione femoris est, siquidem videtur in interiorem partem proiectum: neque magnitudini eius respondet, cum multo plenius sit femur, quàm humerus, ac nihilo minus summum caput humeri longè minus sit, quàm femoris: at neque ipsum humeri caput e regione humeri situm est. Quod si cæteras spectes commissuras, nullam inuenies habere omnem æqualitatem, quam in genu proposuimus. Ac, non longè abieris, extrema tibiā, quæ suræ iuncta, cum talo committitur, neque appendices, neque sinus habet ossibus respondentes: necesse enim fuit, si ita se habere debuit, quæadmodum tibiā longè crassior est, H quàm sura, sic eius appendicem & ab interiori parte commissuræ, qua caua est, & ab exteriori, qua gibba, maiorem esse. sed res aliter habet. quin & ipse talus non simplicem figurā representat, quàm committitur, sed variam, partasque habet plurimum inter se differentes. Inuenies autem ab his non abhorrire commissurā cubiti, & radij cum manu. Quod si omnia persequi velim, cogar longius labi, & multò magis, si cæterorum articulorum omnium naturam exponam, vt maxillæ vertebrarum, & ossis quod latum appellatur. satius igitur duxi rem summatim, breuique sermone complectens ad alia transire. is sermo sic habet. De natura omnium ossium scriptus est à nobis liber vnus, ubi vniuscuiusque magnitudinem, figuram, commissuramque explicauimus: quem, si quis præ manibus habeat, inueniet verè hoc loco propositum esse, inter commissuras omnes, solam, quæ in genu est, ad vnguem iustam esse.

- 54 *Humeri autem articulus magnus est, & plures recessus habet.*

Quum propositum ipsi fuerit genu & cubiti commissuram inter se conferre: quumque ostēderit casus genu mitiores esse, quàm cubiti: hanc rem conficere volens, dixit/nam pro magnitudine

Agnitudine tenuior est articulus femoris, quàm humeri/, & insuper adiecit /atq; hic iustam naturam habet/. Quod abundè fuisset, si genu cum cubiti commissura duntaxat comparasset: sed quoniam orationi adiecit /vnus/, quum inquit /atq; hic vnus iustam naturam habet/, cogitur articulorum omnium naturam referre: quam nullus simplicem habet, sed tum figuræ ac magnitudinis inæqualis, tum partium dissimilium. Nunc igitur, quum ad cubiti commissuram veniat, ostendat q; partes eius dissimiles esse & inæquales, nos quoque verba eius sequuti, quæ proponuntur, singula explicabimus. Magnum ergo esse inquit humeri caput in cubiti commissura, id quæ non immerito: lateſcit enim hac parte, plura q; habet capita inæqualia, quæ *κονδύλης* græcè dicunt. at nullum eorum cauo recipitur, quemadmodum euenit in genu, nisi gibbum quoddam, quod inter ea medium est, & trochleæ imaginem representat: quum ex magnis tuberculis humeri, quod interius est, cum nullo osse coniungatur: quod ab exteriori parte est, committatur cum radio, in summum eius sinum coniectum. Hactenus humerum videmus excipi cubito ac radio. sed alio rursus modo humerus cubiti processus excipit, cum ab vtrâque parte quantum satis est, sinuetur, minus quidem à priori, magis à posteriori, quum & cubiti processus, quos à rostri similitudine græci, & fœminino genere *κορώνας*, & neutro *κόρωνα* vocant, non sint æquæ magni, qui quæ à posteriori parte est, maior sit. Quocirca cubiti commissura varia & inæqualis est, ac dissimilium partium: atque ob hanc causam rectè ait Hippocrates iustum esse articulum in genu, in cubito non item. Sed cur dixit /& plures recessus habet/? an eo quia voluit cubitum cum genu conferre: sunt enim in genu duo recessus tibie duntaxat, sicut et duo femoris tubercula: sed in cubiti commissura vnus est magnus cubiti recessus, qui duobus processibus terminatur, vno quidem breuiori à priori parte, à posteriori altero magis oblongo. ipse autem humerus duobus recessibus excauatur quasi foueis quibusdam, in quos cōiūci diximus cubiti processus: exculptus item est alio recessu, qui medius trochleam representat.

55 *Ad hæc ossium cruris longitudo similis est, sed quod ab exteriori parte est paululum excedit, id q; non est animaduersione dignum, nihil q; magni momenti prohibet: ab hoc oritur exterior chorda, quæ iuxta poplitem sita est.*

Paulo maius esse ait exterius os, quod *περόνλευ* id est suram dicunt: quod & in superioribus iam posuit, cum simplicis fracture cruris curationem tradidit. nos autem, quod eo loco diximus, nunc etiam repetimus, ima parte suram tibia longiorem esse, à genu autem magis dicendum est tibiā esse longiorem. non enim coniungitur femur cum sura, verum (vt paulo antè diximus) caput suræ, quod ab exteriori parte est in cauo tibie, ab eadem parte recipitur. Sed qua de causa dixerit à sura nihil, quod magni momenti sit, prohiberi, manifestum est ijs, qui librum de vsu partium legerint: vbi ostendimus in omnium articulorum fabricatione duplex fuisse cōsiliū, nempe, vt permittat membrum sine impedimento suos vsus præstare, prohibeat q; (quod Hippocrates dixit *κόλυμα*) ne suo loco ossa moueantur. vt permittat quidem membrum suos vsus præstare, efficiunt & caua in summo existētia, & ligamenta laxa: stabilem commissuram reddunt caua admodum sinuata, altiores q; oras habentia, tum firmioris naturæ ligamenta breuiora q;, ad hæc robustæ chordæ valentes q; cingentes commissuram à parte exteriori. Sura igitur ad firmitatem commissuræ genu nihil confert, nisi paululum quid: id quod expressit his verbis /ab hoc oritur chorda, quæ iuxta poplitem sita est/. Ad eius autem exquisitam cognitionem non debes expectare, dum corpus incidatur, cum in omnibus gracilibus euidenter quoq; se ostendat ante corporis sectionem. At quamobrem chordas, id est, extremos musculos, cum in nervos degenerant, *τένοντας* vocet, sæpenumerò declarauimus. Chorda hæc ab exteriori parte poplitis sita, ab eadem commissuram quoque adstringendo ad huius partis firmitatem conducit, prohibet quæ, ne femur in eam prorumpat.

56 *Sed brachij ossa inæqualia sunt, quod q; breuius est, multo plenius est: quod tenuius, plurimum ultra articulum fertur, atque excedit.*

Inæqualia dixit brachij ossa, non quod cū crure hæc conferat, quasi crus inæqualia ossa non habeat, quippe quum in eo posuerit longius esse, quod ab exteriori parte situm est: sed, quod exterius os tibiā excedat, minimum tamen, cubitus verò plurimum. nam, si diligenter summa pars cruris inspicatur, sura videtur paulo minor q; tibia, eadem q; in imo crure apertè longior conspicitur. Ergo, quia sura in summa parte paulo minor est, præ vt in ima excedit, cubitus autem tota sua eminentia radium excedit, idcirco dixit ultra articulum ferri, articulum nominans vel commissuram vniuersam, vel extremum humeri, quod cauo cubiti C literam referenti inseritur.

57 *Nervus item illigatur, qua parte ossa inter se coniunguntur.*

Ligamenta nunc nervos appellat, vbiq; autem eos ita vocat: lata verò ligamenta, & quasi membranas circa commissuram, nominari nervos patebit ex ijs, quæ proximè subiicit: sed et ab ijs illis euidentissimum

evidentissimum est, nullum ex ijs, qui propriè nerui nominantur, ad os pertinere: hoc siquidem **E** proprium est ligamentorum, ac propterea chordarum, quum hæ naturam habeant mixtam ex neruis ac ligamentis. Hæc autem omnia absolute tradita sunt à nobis in libro de motu musculorum. Sed nunc ad id veniendum est, quod in propositis verbis exequitur. Illigatur (inquit) id cubiti, quod excedit, id est, eminentia cubiti, ligamentis commissuram comprehendentibus, qua parte ossa inter se iunguntur, cubitus scilicet & radius, quod idcirco protulit, quia ultra hunc locum, totum id, quod in posteriorem proiectum est, carnis est expers, neque ligamentis commissuræ aliquo modo comprehenditur: ipsi enim innectitur latefcens chorda musculi illius, qui cubiti commissuram extendit.

- 58 *Pluribus autem neruis ad humerum alligatur id os, quod tenuius est, quam quod crassius. Natura igitur horum articularum, atque ossium talis est.*

Ex his verbis colligi diximus totius commissuræ ligamenta *vevex*, id est neruos, ab Hippocrate nominari, quæ quidem ab imo humero orta, summo cubito ac radio ea parte innectuntur, euenit enim in omni commissura, ut lata ligamenta, quæ ipsam comprehendunt, ita communia sint ossium, quæ inter se committuntur, ut crassæ membranæ videantur. hæc autem capiti radij **F** etiam iunguntur, sed magna ex parte cubito. atq; ea de causa dixit / pluribus autem neruis ad humerum alligatur id os, quod tenue est, quam quod crassius / hoc est cubitus, quam radius: siquidem ambo ad humerum alligantur per ligamenta innexa, quæ nunc retuli *vevex*, id est neruos, ab Hippocrate appellari, sed pluribus alligatur cubitus.

- 59 *Ob cuius naturæ modum ossa, quæ in genu articulo sunt, sæpius excidunt, & facilius reconduntur.*

Ossium enim, quibus utraq; commissura continetur, structura arctior est in cubito, laxior in genu. Huc accedit, qd multi processus multi q; sinus inter se commissi, vnde quaque cubiti commissuram adstringunt: at in genu femoris tubercula in exiguos ac resupinatos tibiæ sinus coniunguntur. Iure igitur articulus hic magis prolabitur, & celerrimè reuertitur.

- 60 *Inflammatiò verò non magna supernascitur, neque articuli vinculum.*

Oritur inflammatiò vi, qua ossa expelluntur, qua q; in suam sedem collocantur. Sed in genu, quum vtrunq; facile & sine magna vi incidat, inflammatiò non oritur: quæ quum absit, articuli **G** vinculum non sequitur, sub quo cum neq; facile extendatur, neq; facile curuetur, egrè post curationem mouetur. Fit autem huiusmodi vinculum ea de causa, quia articulus inflectitur ob neruos ac ligamenta, quibus continetur, quæ sub immodica inflammatione extenduntur. Quocirca articulus ob quasdam inflammationis reliquias ita ægrè mobilis redditur, ut alligatus esse videatur. Nam, quum chordæ ac ligamenta, quæ ipsum illigant, comprehendunt que, & extendi & in omnibus promptè sequi musculos articulum mouentes non possint, sed propter duritiem in contrariam partem attrahant, affectus vinculo similis proficiscitur. Verum in cubiti commissura, quum tenues extremitates processuum cubiti interdum confringantur, & vbi excidunt, & vbi conduntur: quum q; multorū cōcursus sit, vinculum articuli grauius oritur, & curatu difficilius.

- 61 *Plerunque autem in interiorem partem mouetur, interdum in exteriorem, non nunquam in poplitem: quæ mutationes vniuersæ difficiles non sunt. Sed si in exteriorem vel interiorem partem erumpat, super sedile aliquod humile collocare hominem oportet, crure sublimiori quidem, sed non multo.*

Qua parte articulus magis adstringitur, ea minus elabitur. perfectè igitur à priori parte adstrin **H** gitur, qua patella est, quam non nulli medici, cum toti genu opposita sit, *ἐπιγονατίδα* græcè merito appellant. hanc ab exteriori parte continet lata quædam chorda, cuius initium est à ligamentis, quæ à priori parte femoris sunt. ea verò per totam patellam fertur, ac tibiæ capiti innectitur. Priorem igitur partem commissuræ genu, & patella, & chorda, quæ (ut dictum est) ad tibiæ caput pertinet, optimè tuentur: sed posteriorem exquisitè rotundam adstringit caput eius musculi, quo curuatur crus. est quidem hic musculus exiguus, atque ob eam causam ipsa commissura absconditus latet eos, qui corpora incidunt. maxime autem crassum caput habet, quod validissimis ligamentis annumeratur. Superfunt duæ partes in commissura genu, exterior & interior, quæ nulla tali re sepiuntur, quali prior & posterior: atque idcirco femur in eas prolabitur: magis autem in interiorem, ut quæ minus septa sit.

- 62 *Fere satis est modicè extendere, crus scilicet ab inferiori parte, femur à contraria.*

Quum extendendè apertè mentionem fecisset, de reponendo nihil meminît, ut de re que plana sit, quod optimè nouerimus perpetuum esse in articulis omnibus reponendis ad contrariam partem

A partem eius, in quam venit, prolapsum articulum repellere. At, ubi reponimus, si quadam eminentia ossis non longa extat, os quod reponendum est, dirigere conuenit. quod etiam docet non secus, ac fecerit in cubiti commissura. Nihil autem de genu articulo meminit, quum in poplite prolabitur, quoniam eadem ratione conditur, atq; ubi in exteriorem vel interiorem partem mouetur. membro enim in diuersa diducto, articulus, qui excidit, in priorem partem adurgendum est.

63 *Molestiora sunt, quæ in cubiti, quam, quæ in genu articulo incidunt, & maiori negotio restituantur, id quæ ob inflammationem, & ob naturam ipsam, nisi protinus restituantur. Excidunt quidem hæc minus quam illa: sed æquius in suum locum collocantur diriguntur q; magis q; inflammatione prehenduntur, & callo circumdantur: hæc uero se paululum excedunt: id q; modo ad pectus, modo in exteriorem partem: articulus autem non toto loco mouetur, sed aliquid ex cubiti processu, quæ excedit, in humeri cauo manet. Hæc igitur, ubi in hanc vel illam partem protrahunt, facile reuertuntur. Sani autem est e regione humeri recta extendere, sic, ut unus brachium a prima palmarum parte extendat: alter prehendat hominem sub ala: alius item una manu ad os, quod extat, admotum, prominentiori eius palmarum parte ipsum propellat, altera uero prope articulum data cogat in contrariam partem. Atque hæc quidem luxata non eoque in suam sedem reponuntur, si priusquam inflammatio superueniat, recondantur. Plerumq; igitur in exteriorem partem ueniunt, ueniunt & in interiorem: figura autem ipsa exprimitur, sæpius quæ hæc licet absq; valida intentione restituere. Neesse est, ubi in interiorem partem erumpant, articulum ad naturalem sedem repellere: brachium uero magis in prouum habitum conuersum circumducere. Cubitus ergo plerumq; in has partes excidit, sed, si humeri articulus in hanc vel illam partem moueatur ultra cubiti processum, qui in cauo eius recipitur, quod raro accidit: sed, si accadat, ad hæc luxata non amplius accommodatur. directa extendendi ratio, namq; ubi sic extendimus, id cubiti, quod excedit, prohibet, quo minus sequi humerus possit. Quæ igitur sic luxantur, eo modo extendenda sunt, qui ante traditus est ad extendendum humerum fractum, quum alligandus est: ab ala enim conuenit sursum: uersus extendere, a cubito deorsum cogere. Humerus enim hac ratione diductus e regione sui recessus collocabitur, sic, ut non hæreat: hoc, ubi accidet, facile restituemus prominentioribus palmarum partibus partim id humeri, quod extat, impulsu reponentes: partim id cubiti, quod iuxta humeri articulum est, a contraria parte coactum in suam sedem collocantes, eodem modo in utroq; casu: hæc autem intentio ad huiusmodi luxata iustissima est: restitui etiam possent, si recta intentio adhiberetur, minus tamen, quam si hoc modo intendantur. At humero ut in priorem partem erumpat raro admodum accidit. Sed, quid subita vis non expellit? multa enim suo loco excidunt, licet magni sit, quo prohibentur. In hoc autem casu grande est, quod super os crassius excedit, plurimum q; nervi tenduntur: qui usum tamen excidit: cuius rei id signum est, quod neq; minimum quid curuare cubitum possunt, quod etiam articulum contingenti patet. Nisi ergo subito reponatur, graues uehementes q; inflammationes cum febre oriuntur: sed, si statim occurratur, non magno negotio conditur. Expedit autem lintecum durum, implicatum, non magnum, quæ parte cubitus curuatur, transversum inijcere, tum repente cubitum flectere, & quantum maxime potest, manum, ad humeri caput porrigere: hæc enim reponendi ratio, ipsæ, quæ sic luxata sunt, abunde est.*

A Lintecum conuolutum in flexuram cubiti coniectum.

B Cubitus repente conflexus.



id patebit, si quis priorem iuncturæ partem tangat, quæ diuiditur vena, quæ a superiori parte lacerti procedit: quæ res ubi

Potest item directus intendendi modus ad hanc reponendi rationem aptari. Debet autem, qui restituit, prominentioribus palmarum partibus id humeri, quod, quæ cubitus curuatur, præter naturam extat, retro cogere: alter ab interori parte cubiti eminentiam adurgere, sic, ut ad cubitum ipsum e regione spectet. Valer autem ad huiusmodi luxata ille extendendi modus, quæ supra narrauimus pertinere ad extendendum humeri ossa comminuta, quum vincienda sunt. Intentione adhibita prominentiores palmarum partes adiuuende sunt, quemadmodum in prioribus demonstrauimus. Verum, ubi humerus in posteriorem partem erumpat (id quod raro accidit) maxime omnium dolorem mouet, & febrem, ea quæ sub pura bile continuatur, mortifera est, & paucis diebus hominem præcipitat: homo autem extendere brachium nequit. Quod si a principio protinus adhibeatis, eoque cubitum extendi, ac per se restituitur: si iam febris anteuerit, non amplius reponendus est, adhibita enim vi dolor hominem interimeret. Atque (ut uno uerbo dicam) nullum articulum, dum febris est, compellere in suam sedem conuenit, sed minime omnium cubitum. Obnoxia item est cubiti iunctura alijs grauius noxis: hoc enim os crassius est, quum q; ab altero diducitur, ea neq; curuari, neque extendi similiter potest.

res ubi accidit, non facile restituitur. Neque enim alia ossa, quæ bina inter se iunguntur, ubi dehiscunt, facile in pristinum locum reuertuntur: sed necesse est ossibus sic diductis partem reddi tumidam: rationem verò, qua deligare conuenit, posuimus, ubi vinculum eius commissuræ, quæ ad talos est, ostendimus. Est etiam, quum perrumpitur interdum os cubiti, quod humero subiectum est: interdum eius cartilago, à qua nascitur chorda, quæ sita est in humeri parte posteriori. id, quum accidit, febrem concitat, & malis vitij annumeratur: articulus tamen suo loco remanet, basis enim eius tota hac parte excedit. At, quum ea pars comminuitur, quæ subiecta est humeri capiti, articulus huc atque illuc mouetur, si transuersa penitus frangitur. Sed (ut summam rem exponam) leuiora vitia sunt, sub quibus os frangitur, quàm sub quibus hoc inuolato venæ ac nervi grandiores ibi conteruntur: hæc enim hominem magis ad interitum præcipitât, quàm illa, si continua febris accedat: sed huiusmodi fractura raro accidit. Est etiam interdum, quum imum humeri caput frangitur, quæ prominet: id autem multo grauius videtur vitij, quæ cubito incidunt, sed aliquanto leuius est. Qua ergo via restitui potissimum, curari q; luxata singula debeant, diximus: atq; id etiam, articulum protinus reponendum esse, quod nervi celerrimè inflammatione prehendantur: nam si, ubi excident, statim recondantur, nervi tamen contrahi solent, & aliquandiu consuetam porrectionem contractionem q; non præstare. Curare autem hæc omnia similiter conuenit, & quæ comminuitur, & quæ dehiscunt, & quæ procidunt: omnia enim pluribus fascijs pannis quæ & cerato nutriendi sunt, non secus ac cætera, quæ franguntur. Figuranda autem est in his omnibus cubiti commissura, sicut quando humerus & cubitus fractus deligabatur: huiusmodi enim habitus maxime communis est omnium, quæ excidunt, dehiscunt, aut franguntur: maxime item communis mutationis, quæ postea sequitur, siue curuari illa, siue extendi debeat, ab eo enim habitu mota, æquè & curuari & extendi potest. Præterea membrum ita figuratum citra molestiam egrotantis continetur atq; suspenditur. Ad hæc, si exento brachio callus obduceretur, contineret q; satius esset nullo modo increuisse, multum enim esset impedimento, & parum proficeret: expeditius autem esset callo curuatum brachium firmari: multo autem melius est callum circundari, brachio medio inter hos habitu collocato. Hactenus de figurando. Deligare autem conuenit fasciæ capite super vitiatam partem iniecto, seu fracta sit, seu prolapsa, seu diducta: ea q; primos circuitus dare, ac maxime adstringere, sed hinc atq; hinc leuius: vinculo quæ & humerum & brachium comprehendi, & vtrunque magis, quàm plerique soleant, ut à vitiatâ sede tumor quum longissimè ad partes, quæ hinc sunt atq; hinc, depellatur. Inijciatur autem vinculum eminetiæ cubiti, si ea parte vitium sit, ne tumor ibi excitetur. Cauendū insuper est, quantum potest, ne in vinculo plurimum vinculum colligatur, quæ cubitus flectitur: adstringenda verò est quàm maxime pars vitiatâ: reliqua eadè sequantur, quod ad vinculi spectat, arctius ac laxius: atq; eodem tempore singula, quo superius scripsimus in curatione fracturæ: tum tertio quoque die fasciæ soluantur, ac rursus alligentur, sentiantur quæ tertio die laxæ, sicut in fracturis. Ferulæ quoque debito tempore circundentur, nihil enim alienæ sunt, tam si fractura sit, quàm si non sit, nisi homo febricitet: laxissimæ autem imponantur, ac tum ad humerum, tum ad brachium dentur, neque crassæ sint: adhiberi item debent inæquales inter se sic, ut vna alteram excedat, quantum conferre ad flexum conijciemus. Quum & panni superinijciendi sunt eadem ratione, qua ferulas diximus, sed quæ vitium est, paulo pleniores. Temporis verò coniecturam facere oportet & ex inflammatione, & ex ijs, quæ supra scripsimus.



GALENI IN HIPPOCRATEM DE ARTICVLIS

COMMENTARIORVM LIBRI QVATVOR

Vido Vidio Florentino interprete.

ARGVMENTVM PRIMI LIBRI

Vtin libro de Fracturis multa dicta sunt, quæ ad Luxationes attinent, ita hoc quoque de Articulis multa de Fracturis tractantur. In cuius prima parte de Humeri articulo restituendo, de Summo humero, ac de Iugulo, pertractat.



C

Librum hunc illi proximè subiectum esse, qui de fracturis est, in commentarijs in eum iam diximus, quod nunc paucis etiam dicemus. Eam rem ante omnia planè demonstrat principium vtriusque libri. in illo enim ita orditur: Medicum oportet, quæ suo loco mota sunt & fracta, recto admodum habitu intendere. vbi apertè de fractis ac luxatis tractaturum se indicat. Sed in hoc rursus, ab initio protinus /*de*/ coniunctionem, quam /autem/ vertimus, adiungit: quæ ibi adijci solet, vbi aliquid agitur, cuius antè mentio facta fuerit, nunquam tamen in principio sermonis adscribitur: quanquam non nulli ad id sapientiæ deuenerunt, vt Xenophōtis librum, qui œconomicus dicitur, adducant, inde putantes fidem facere, veteres solitos esse /*de*/ coniunctionem in principio sermonis usurpare: ac propterea Xenophontis libri tale esse initium asserunt, *ἡκούστα δὲ τότε αὐτῶ, καὶ αὐτῶ, οἰκονομίας τοιαυτὴ μοι ἔδειχεν, οὕτως*, non intelligentes eum librum postremum esse inter eos, quos de Socratis dictis ac factis memorabilibus scripsit. Ad hæc ipsa rerum doctrina testatur librum hunc ei, qui de fracturis est, proximè subijci. ibi enim pollicitus de fractis luxatis que tractare, quæcunque ibi explicanda reliquit, hic exequitur, sic, vt nihil in opere delideretur: atque ea de causa dixi Hippocratem iuxta quorundam sententiã vniuersum hoc opus in duos libros non secasse, sed vno colligasse. eum que inscripserat de officina medici, qui præ magnitudine postea ab altero distinctus fuit in duos. Nullum autem fracturæ aut luxati genus fuisse ab Hippocrate prætermissum, exceptis, quæ ad caput pertinent, cùm alio libro ab ipso tradantur, euidentissimum est, si in memoriam reuocentur, & quæ in libro de fracturis prodidit, & quæ in hoc ipso ostensurus est. In libro itaq; de fracturis scripsit de brachio, cubito, crure, ac femore comminuto: tum de ijs, quæ pedi incidunt & manui: postea de illis fracturis, quibus vlcus accedit. & ossa nudantur: postremo de omnibus vitijs genu & cubiti. Restabant adhuc ex luxatis humeri caput, quod cum lato scapularum osse committitur: & femoris caput, quod coxa recipitur, maxilla, & spina: ex fractis, costæ, maxilla, nasus, auriculæ, quæ in hoc libro persequitur. Sed & de ossibus, quæ dehiscunt, ac de ijs, quæ circa articulos conteruntur, in vtroque libro tractat: & si quid in eo, qui de fracturis est præterijt, in hoc adiecit, ita, vt nullum superlit genus fracti, prolapsi, aut diducti ossis. Scripsit etiam de musculis, venis, ac nervis collatis, & de alijs, quæ (vt retuli) satis testantur hunc librum illi, qui de fracturis est, subijciendum esse. Huc accedit, quod in hoc ipso exponit vniuersam structuram machinamenti illius, quod in eo voluit paratum haberi medicis, qui in magna ciuitate medicinam faciunt: simul q; in memoriam reducit, illius se antè mentionem fecisse. Id machinamentum à medicis, qui post ipsum fuerunt, scamnum Hippocratis appellatur. sed satis hæcenus ostēdimus librum hunc proxime sequi eum, qui de fracturis est. Ad expositionem igitur eius

eius veniamus, adhuc illud præfati, quod in enodatione libri de fracturis proposuimus, nèpe ser-
monem Hippocratis planum esse, minima quæ expositione indigere apud eum, qui primis discipuli-
nis institutus sit, qui quæ fuerit in Hippocratis sermone versatus. si quis enim ita paratus offi-
um hois, vel certe simiæ, commissuras inspexerit, facilius adhuc comprehendet, quæ in hoc opere traduntur. si quis
autem incidendis musculis operâ dederit, & prudens alioquin natura fuerit, huic (certum scio) super-
uacua videbuntur complura eorum, quæ in ijs commentarijs posuimus, quoniam quidem verba Hippocratis
prius tenebit, quæ à me exponantur, sed quoniam non his commentaria scribimus, satius arbitror & alio-
rum habita ratione, si quid vel parum videatur obscurum, id nullo modo prætereire.

1 *Articulum autem lati scapularum ossis noui vno modo excidere, nempe in alam.*

Ostensum iam est in superiori libro Hippocratem solitum esse mutuari nomen ἄρθρον (quem
articulum interpretamur) ad significandum ossium, quæ inter se committuntur, non cauum, quo
proximi ossis caput recipitur, sed ipsum caput. nunc verò meminisse etiam oportet humeri caput,
quod grande est, inferi in extremitatem ceruicis lati scapularum ossis, quæ leniter caua est: tum cõ-
fuisse Hippocratem interdum eiusmodi res ita exprimere, ut nunc, quum inquit /articulum au-
tem lati scapularum ossis/: interdum non ita, sed ac si diceret, Articulum, qui cum lato scapula-
rum osse committitur: quemadmodum in libro de fracturis, ubi sæpenumero scribit /articulus, F
qui ad genu/. Vno modo/ inquit, hoc est, in vnam partem scire se hunc articulum excidere, quod
an verè sic habeat, in ijs, quæ sequuntur, considerabimus.

2 *In superiorem verò locum, aut in exteriorem, nunquam.*

Cauum id, quod (ut retuli) in extrema ceruice lati scapularum ossis situm est, in priorem partem
spectat. quare ubi humerus in superiorè partem porrigitur, illius caput eo cauo prorsus toto reci-
pitur. At, quum commissuræ vniuersæ sex sint partes circumstātes, superior & inferior, prior & po-
sterior, exterior & interior, pars huius commissuræ exquisitæ superior tegitur carnosa parte illius
musculi, qui, quum literā Δ representet, δελτοειδὴς à quibusdam nominatur: quæ verò ad collum incli-
nat, superiectum habet dorsum lati scapularum ossis, quæ id summum cum iugulo coniungitur. ab inte-
riori parte obijcitur processus lati scapularum ossis, quæ non nulli ab anchoræ similitudine vocant
ἀγκυροειδὴς, alij à rostri figura κορακοειδὴς. Hic itaque prohibet, quo minus in eam partem articulus
elabatur: in posteriorem quis nostrum poterit concipere, quum ibi latum scapularum os sit. Restant
quatuor loca non septa, in quæ putare licet articulum erumpere, quorum omnium meminit: inferior G
ris quidè initio libri, quum inquit /articulum autem lati scapularum ossis noui vno modo excidere,
nempe in alam/: reliquorum verò trium nominatim, primò superioris, deinde exterioris, tertio
prioris. Consideremus igitur, quid de duobus modis dicat, quos aggressus est proximis verbis.

3 *Non est tamen, quod contendere cupiam, excidat ne an non, & si de eo non desit, quod dicam: sed in priorem partem elapsus, nec vidi vnquam, nec elabi posse existimo: censent tamen quidam medici in priorem partem pluri-
mum excidere: decipiuntur autem maximè ijs, quorum caro circa articulum & humerum tabe consumpta est: si qui-
dem in his humeri caput in priori parte prominens se ostendit. Ego quum in eam partem procidisse articulum nega-
rem, propterea & à medicis, & à vulgo, malè audiui: vnus enim habitus sum ignarus, ceteri quæ omnes periti,
vix quæ persuadere illis potui rem ita habere.*

Exequutus duas partes, in quas excidit, superiorem scilicet, & exteriorem, testatus quæ ex vtrisque
in neutram se vidisse articulum luxatum, quasi de vtrāque pertractans adscripta nunc verba pro-
posuit. Quod autem postea ponit, cum inquit /& si de eo non desit, quod dicam/ apertè videtur ad
alteram propositarum partium referri: nam, si referri ad vtramque voluisset, non loquutus esset
singulari numero /de eo/. An de solo exteriori loco intelligit, siquidem verba hæc ab eo loco H
proximè subiiciuntur /& si de eo non desit, quod dicam/. Potest etiam (ut non nulli accipiunt)
de vtroque loco id scripsisse, vsus antiqua loquendi figura, quali ita scripserit /& si non desit de
eare, quod dicam/. Aiunt non nulli dari posse, scripturam hanc corruptam esse, cum à primo li-
brario non rectè fuerit descripta: & quum nemo deinde ausus fuerit ipsam corrigere, hæcenus
corruptam perseverare. Nos autem in quodam exemplo ita scriptum inuenimus /& si non
desit de ijs, quod dicam/ quum aliquis non dubitarit aliter scribere, quam alibi reperiretur.
sed, siue de vtroque loco, siue de altero tantum dicat (non est, quod contendere cupiam), ope-
re precium nobis est vtrumque contemplari, quod attinet ad eius verba illo duntaxat adiecto, quod
verbo ἰαυερίω significauit contendere cupio: id enim nihil aliud notat, quemadmodum & ver-
bum ὀψείω videre cupio: vnde Homerus deduxit vocabulum ὀψείοντες, significans cupientes
videre, quum inquit, τῶ ῥ' ὄγ' ὀψείοντες αὐτῆς ἐπὶ πολέμοιο. Consideremus igitur causam, quam-
obrem ait nolle se aliquid dicere, & si non desit, quod dicat, primò intelligentes, quæ nam sint,
quæ dicere posset. Constat autem, si quid dicendum omnino sibi statuisset, ex partium natura
inueniendum fuisse. partium autem naturam demonstrauius ad vnguem in libro de ossibus,
in eo,

A in eo, q est de musculis incidendis, & in eo, qui de rōne incidēdi corporis. natura. n. arteriarum venarū nervorū nihil ad hunc locum facit, quia casus oēs, vbi articuli excidunt, sunt ac prohibentur & ob ossium cōmissurā. & ob musculos quibus illa comprehenditur: ad quā rem nihil conferunt, aut prohibēt venæ, nervi, & arteriæ. Ac ne longius à proposito discedamus lati scapularū ossis articulus inter ceteros oēs facillimē prolabitur, qm̄ vnus forme est, et simplex, non duplex, quemadmodū qui in genu est: neq; varius, & nullo modo simplex, quemadmodū qui in cubito: et qm̄ humeri caput grande est et line oblonga ceruice in sinum parū dehidētem conijctur: femur verō caput paruum habet, et ceruicem oblongā, id verō cauum, quo recipitur, valde sinuatum est, & al-
tis labris cingitur. adde q in summo capite per validissimum ligamentū ad suum cauum, quā maximē altum est, ditinetur. Iure itaq; femur raro procidit, sæpe humerus, vt qui neq; ligamentum habeat, neq; in altiori cauo se insinuet. Necesse autē est, cū prolabitur, principio in eam partē mo-
ueri, in quam compellitur vi illius habitus, quo figuratur: vbi manere necessario non potest, & q suo pte nutu deorsum feratur, & q interdum prohibeatur angustia loci, siue ob ossium processus, siue ob musculorum vires. Igitur lati scapularū ossis cōmissura superiectam habet a superiori par-
te summum lati scapularum ossis, quā cum iugulo coniungitur, & ideo, quāuis in eam aliqui arti-

B culus moueat, quum ab ossibus, quę ibi sunt, non admittatur, statim pōdere inclinatum deorsum feretur: ab exteriori verō magis musculis cōtinetur, præterquam q articulus deorsum naturaliter inclinatur. Interdum tñ violentus habitus, qui musculos possit inter se deducere, potest in spaciū, quod inter eos est, articulum compellere, quo deinde adstrictus musculis contineatur, atq; hac de causa dixit Hippocrates nolle se contendere, excidat ne articulus humeri, an non, quatenus enim deorsum fertur, manere in priori parte nō potest: diductus autē musculus (vt dictum est) nihil alienum videtur adstrictum ibi contineri. Hęc adducere potuit de humeri capite luxato in alium lo-
cum, q in aliam: sed, cū id nunquam viderit, cōmētitias causas scribēdas esse minimē credidit, vbiq; magis fide dignū existimās, quod euidenter apparet, q̄ quod a ratione ducitur. Sic & quę-
cunq; ipse ad curationem excogitauit, priusquā nos doceat, experimēto cōprobat: non sicut non nulli ex iunioribus medicis, q in scriptis de ratione medēdi, nobis ea imperarūt, quę ipi nunquā antē sunt experti. Sed & ipse Hippocrates in hoc libro, quum tractasset de his quę spinæ pte, subdidisset q; posse experimēto redargui, quę ipse excogitasset, inquit. Pulchra. n. humeri motus-
mēta sunt eorū, q cū experti sumus, sine effectu inuenimus, et causarū, pp quas parā pcellerint.

Sec. 1. 50.
748

4C Siquis carnem detraxerit ab ea parte, quæ superiecta cōmissuræ humeri: cum lato scapularum osse ad ceruicem in-
tendit, & ab ea, quæ sita est: musculus, qui versus superiorem partem extendit, & a chorda iuxta alam, & a iugu-
lo ad pectus, humeri caput, quāuis prolapsus non sit, in priori parte aliquid se ostendet. Naturaliter enim hu-
neri caput in priorem partem prominet: reliquum verō ossis humeri in exteriorem conuertitur.

Βραχιον, quem humerum vertinius, dicitur ea totius brachij pars, quæ inter duos articulos sita est (duos autē articulos intelligi volo, & cum, qui ad latū scapularum os, & eū, qui ad cubitum est) *ἐπ' αὐτῆς* verō illa, quæ superiecta cōmissuræ humeri cū lato scapularum osse ad ceruicem intendit, *ὀμὸς* enim gręcē noīatur ex tota cōmissura id, quod oculis subiicitur. nā quod lati scapularū ossis minimē se ostēdit, a posteriori parte sitū est: ab inferiori oē id, quod apparet, quum totū brachiū sursum porrigit, ala *μαζὰν* gręcē nuncupatur. Præfatus igitur Hippocrates, vbi in carne, q hu-
meri cōmissuram contegit, macies summa orit, caput humeri ita extans cōspici, vt quibusdā exci-
disse videat, docet vniuersam eius naturā ex arte corporis incidēdi, præcipiēs, vt si quis aperte in-
tueri ipsam velit, ab ea parte, q superiecta cōmissuræ humeri cum lato scapularum osse ad ceruicē
intendit, carnē detrahat. hoc est, scalpello circūcidat, donec, quæ in cōmissura sunt, ossa nudentur:
detrahat similiter ab ea chorda, quæ iuxta alā est: terni. n. hic muscoli sunt, primus a lato scapularū
osse ac iugulo orit, quæ a similitudine literę Δ vocāt *δελτοειδής*. Huius musculi, quod carnosum
est, tegit vniuersam cōmissurā: chorda in lōgitudinem tendit per os humeri, cui illigat altera chor-
da grādiōris musculi, qui a pectore incipiens cū superiori connectit, quā sita vena est, quæ sub ala
ad cubitum procedit. Meminit ēt huius ipsius, quum inquit / & a chorda iuxta alam, / sed, quum
ait / & ab ea qua sita est musculus, q versus superiorē partē extēdit / potuit loqui de musculo, qui
Δ literā representat, cuius, quod carnosum est, operit vniuersam cōmissurā. potuit ēt musculū illū
intelligere, qui fertur ad priorē partē humeri, & a duobus capitibus ligamēta valida hēt, quorū al-
terū a lati scapularū ossis, pcellu ā chore fīsi, alterū a sublimiori labro ceruicis eiusdē ossis, depēdet.

D osse ac iugulo orit, quæ a similitudine literę Δ vocāt *δελτοειδής*. Huius musculi, quod carnosum
est, tegit vniuersam cōmissurā: chorda in lōgitudinem tendit per os humeri, cui illigat altera chor-
da grādiōris musculi, qui a pectore incipiens cū superiori connectit, quā sita vena est, quæ sub ala
ad cubitum procedit. Meminit ēt huius ipsius, quum inquit / & a chorda iuxta alam, / sed, quum
ait / & ab ea qua sita est musculus, q versus superiorē partē extēdit / potuit loqui de musculo, qui
Δ literā representat, cuius, quod carnosum est, operit vniuersam cōmissurā. potuit ēt musculū illū
intelligere, qui fertur ad priorē partē humeri, & a duobus capitibus ligamēta valida hēt, quorū al-
terū a lati scapularū ossis, pcellu ā chore fīsi, alterū a sublimiori labro ceruicis eiusdē ossis, depēdet.

5 Versatur humerus in cauo lati scapularum ossis a latere, vbi brachium iuxta latus extenditur: ac vbi totum in
priorem partem porrigitur, humeri caput ē regione caui lati scapularum ossis collocatur. neq; amplius valetur in prio-
rem partem excedere. Ergo, quod propositum est, nunquam vidi humeri caput in priorem partem promineri: non ta-
men contendere velim, eo nec ne promoueat. Quum humerus igitur in aliam excedat, complures retinendi peri-
tiam habent, quippe quum multus excidat: callere autem omnes modos, quibus medici luxatum reponant, & quæ ra-
tione ipsis vtendum sit, eruditū est. Tunc autem adhibere modum validissimum debes, cum maxima vi opus esse in-
telligis: validissimus autem est, qui omnium postremus adscribitur.

Versari

Verfari dixit ὀμῖλῆν, quod vocabulum græcè ferè mutantur antiqui, non ad significandum, E colloqui, quemadmodum nunc pleriq; sed hac voce intelligunt inter se conuenire, & quasi vnà verfari, quod ὀμῖλῆν εἰλεῖσθαι dicebant. quin & Homerus eodem modo id vsurpat in ijs, quæ scribit in clipeo appicta fuisse à vulcano, cum inquit, ὀμῖλεον δ' ὥς εἰ ζωὸν βροτῶν. Humerum itaq; à latere ait verfari in cauo latiscapularū ossis, vbi brachiū iuxta latus extenditur, ὀμῖλῆν dicens verfari, vt eo verbo significaret, simul esse, & ipsum contingere. At vbi (inquit) brachium totum in priorem partem porrigitur, humeri caput è regione sinus latiscapularum ossis collocatur, neq; cum erectum maneat, videtur amplius in priorem partem excedere.

6 *Quibus humeri caput sepenumero excidit, ipsi per se restituere possunt.*

In commentarijs quoque de fracturis ostendi articulos duabus de causis frequenter vel leui occasione erumpere, aut enim ob ipsos sinus parum desidentes, atque ipsis labris resupinatos: aut ob humorem earum partium, quæ commissuram comprehendunt, ob quem laxantur, & faciliè extenduntur. Adieci etiam articulos iisdem de causis promptè restitui. quamobrem ab egrotantibus per se citra operam medici, reponuntur.

A. l. 4. E. 5. c. 1. c.
1. 477. 8

7 *In alam enim coniungentes tubercula digitorum alterius manus, articulum ad superiorem partem adurgent: cubitum verò ad pectus adducunt.* F

Primus restituendi modus hic est, quum seu æger ipse, seu medicus aliquis, humeri capiti digitorum tubercula subiicit, non quouis modo, sed à parte interiori, vt primò ad priorem partem caput humeri compellat, dein ad superiorem, ipsum que è regione collocet sui caui. vbi (vt arbitror) musculi, qui commissuram complectuntur, ipsi subseruiant, & efficiendi loci erunt. ipse enim ait in opere de fracturis, quod & nos in libro de motu musculorum, id proprium esse atque innatum musculis, vt in se ipsos contrahantur. non enim à se ipsis, sed quiescentes atq; ociosi, ab ijs, qui in contraria parte siti sunt, tenduntur. Hic musculorum motus humeri caput in alam luxatum non patitur in eodem loco manere, sed ipsum attrahit ad latus, dum expellatur, subiiciatur que ceruicis latiscapularum ossis. Quocirca tria in restituendo sunt agenda, primò quidem in priorem partem impellendum est, deinde in superiorem, postremò in posteriorem: hoc siquidem necesse est quocunque modo quis reponere id tentauerit. Igitur, vbi partes, quæ commissuram comprehendunt, naturaliter madent, & laxæ sunt, humeri caput, vel leuiter intento brachio in priorem partem adducitur: at, vbi valde sint, valentius intendi debet. Quamobrem plures in G uenit sunt restituendi modi, quorum omnium caput vnum est, quod ego retuli. spectat autem ad ea tria, quæ proposui agenda. inueniuntur hæc ex eo, quod maximè commune est & generale, positum quidem ab Hippocrate, demonstratum verò à nobis in libris de ratione curandi: quod & nunc etiam docebimus, quantum poterit breuissimè, nempe ex ijs, quæ naturaliter habent, nihil esse corrigendum, siquidem ea nobis consilium est non tollere, sed tueri: quæ verò præter naturam sunt, propositum est in naturalem statum restituere. necesse autem est id quod in antiquâ sedem, vnde excelsit, reuersurum est, rursus idem iter facere, quod perinde est, ac si dicas, contrarium iter facere: nam ijs, qui Athenis Eleusinem proficiscuntur, iter contrarium non aliud appellari potest, quàm Eleusine Athenas, quanquam primum iter, quod fecerunt Athenis abeuntes, postremum est, vbi redeunt. Considerato igitur in singulis luxatis, vnde cœperit articulus expelli, quâ processerit, & vbi confiterit. oportebit enim excidendi finem, principium esse reuertendi, atque inde rursus ad excidendi principium procedere. Ac ne longius discedamus in proposito casu, cum humeri caput suo loco motum in priorem partem venit, ob pondus deorsum fertur, deinde in posteriorem partem ad latus vi musculorum ad se recurrentium contrahitur. cum ergo reuerti ad suam sedem debet, inchoari à posteriori regione necesse est, tunc q; primò in priorem H partem impelli, postea sursum adduci: deinde, cum situm est è regione sui caui, duorum alterum faciendum est, vel res tota musculis committenda, vel vnà cum ipsis attrahentibus adurgendum est. at, vbi rem musculis commiseris, in ferio rem locum sine futura ne relinquo: sustineri enim hîc re aliqua humerum oportet, ne, cum musculi nō dum sic confirmati sint, vt ipsum attrahant, deorsum feratur, priusquam ab illis in suam sedem adducatur. Ergo, cum tria hæc itinera sint, optimum est, vnumquodque ad rectam lineam fieri, primò quidem in priorem partem, deinde in superiorem, tertio in posteriorem. sæpe autem non sic, sed circa ceruicem latiscapularum ossis circunducentes humeri caput restituimus: cuius sanè generis est primus reponendi modus per digitos, vel ipsius hominis, vel medici. Eum modum appellat || Hippocrates κατὰ δεισφαλσιν, qui citra noxam proficit in commissura humeri cum lato scapularum osse, quippe quæ nullum oblongum processum habeat, neque in capite humeri, ex toto enim rotundum est, neq; in labris illius caui, quo recipitur. Quibus itaque sæpe promouetur, necesse est commissuram esse laxam, & cauum exiguis labris contineri: atq; ea de causa ipsi per se ipsos articulum restituant, quibus ita habet, integre manus digitorū tubercula in alā cōiūctes, sic, vt inter latus et humeri caput demittantur:

A demittantur: in quo casu digiti vicem vectis præstant, cum tubercula in acutum desinant ad effigiem summi cunei. hac igitur summitate facile inter humeri caput, & latus inferuntur. quod si ibi semel admittantur, cum facile restitui possit ob humorem partium, quæ commissuram comprehendunt, digiti quidem ea parte protinus admissi articulum à latere in priorem partem reducunt. at cubitus, quum ad pectus adducitur, humerum attollit: cum quæ digiti simul interim impellant, & circumducant iuxta inferiorem & priorem partem commissuræ, humeri caput ad sui caviam ascendit. quod si semel eo fuerit compulsus, leui momento in ipsum cavum reuertitur: hic autem restituendi finis fuit.

- A Digni sub ala coniecti.
B Caput ad summum humerum obiectum.
C Genua ad gibbum cubiti appulsa.



- A Digni demissi sub ala ab interiori parte articuli prolapsi.
B Caput obiectum, quæ iugulum cum lato scapularum osse committitur.
C Alter cubitum ad pectus adducens.



rum adurgere, imperet alteri, ut ipsum ad pectus adducat. hoc supra ostensum est fieri ab idiota, quod sæpe articulus excidat, edocto qua ratione agendum sit: sed cui nunc primum excidit, non licet id efficere, nisi si generosus est, atque aduersis rebus non perturbatur: hic siquidem iussus à medico per se humerum excitabit.


- 9 Reponitur item humeri caput, quum brachium retrodatur ad dorsum: tum altera manu eminentia cubiti sursum compellitur, altera à posteriori parte urgetur articulus.

Septima Classis.

KKKKKKK

Hoc

- A Cubitus ad spinam dorsi reductus.
B Manus gibbum cubiti sursum retorquens.
C Manus à posteriore parte ad articulum innixa.



Hoc restituendi modo magis circumducimus, quàm superiori, sed sub ipso etiam necesse est in tres partes articulū agi, quæ tamen singulæ proprijs finibus non circumscribuntur: neque angulum efficit, quum ex vna parte ad aliam transfertur, sed in orbem flectitur, perinde ac si anguli à quadrato retundantur. Quid autem accidat, quum articulus in orbem agitur, circumducitur quæ, planè intelliges ex descriptione huius figuræ.

B A Concipito caput humeri, quem articulū lati scapularum ossis vocat, quum primò agitur, ferri à latere ad partem priorem per lineam c d, inde sursum per lineam d b, postea in suum cauū conijci, vbi a. q. si ita feratur, non circumducitur: sed, si anguli d b quasi infringantur, non amplius per tres lineas rectas feretur, sed per vnā curuam. Sic itaq. circumductus humerus ad orā adducitur sui caui. ad quam vbi venit, modico impulsu in suam sedē reuertitur. Atq. hoc commune est omnium, quæ circumducendo



reponuntur. id quod etiam euenit ei restituendi modo, quem nunc exprimit, siquidem brachio in posteriorem partem ducto ad spinam, quum necessariò humerus sequatur, caput huius in priorem ac superiorem partem translatus circumducitur, primò circa inferiorem partem commissuræ, deinde circa priorem, donec ascendat ad oram sui caui: in quod, vbi coniectum fuerit, continetur, tunc quæ restituendi finis est. Quemadmodum autē in superiori modo restituendi, ne homo sequens in priorem partem conuerteretur, præcepit medico, vt capite obiecto summum lati scapularum ossis, qua cum iugulo committitur, retrò repelleret: ita nunc, ne in posteriorem partem conuertatur, contrarium imperat, vt scilicet manu obiecta à posteriori parte totius commissuræ, hominem in priorem repellat.

- 10 Hic reponendi modus, atque is qui superius positus est, secundum naturam non sunt: circumagentes tamen in suam sedem articulum cogunt.

Dixit non secundum naturam esse, eo quod articulus ad rectam lineam non feratur, sed in orbem magis, vt ostensum est. qua in re periculum est, ne abscindantur processus aliqui. Propterea autem adiecit /cogunt/ vt vim eorum indicaret.

- 11 Sed, qui per calcem reponere nituntur, propè secundum naturam cogunt.

Qua de causa hunc reponendi modum asserat propè secundum naturam esse, apertè intelliges, quum ipsum vniuersum cognoueris: quod fiet, vbi, quæ subiiciuntur, animaduertas.

- 12 Hominem oportet humi resupinare, medicum verò ab ea parte, à qua articulus eruperit humi sedere, deinde suis manibus hominis brachium affectum prehendere, ac deorsum versus extendere, & calce in alam demissò, dextro quidem in dextram, sinistro in sinistram, in contrariam partem virgere. Necesse autem est in sinum alæ rotundum aliquid dimittere, quod ibi aptetur. maxime idoneæ sunt pilæ paruæ admodum ac duræ, quæ e corio ferè sumuntur: nam, nisi tale aliquid indatur, non potest calx ad humeri caput peruenire: brachio enim ab inferiori parte extento, sinuatur ala, quoniam chordæ ab vtrâque parte alam constringunt inter se aduersæ. Oportet autem aliquem ab altera parte eius, qui extenditur, sedentem, continere hominem ab integri humeri cum lato scapularum ossis commissura, ne corpus aueatur affecto brachio ab altera parte extento: post, loro molli abundè lato pilam in alam coniectam excipere, cuius lori vtrunque caput alter extendat, qui à capite hominis sedeat, pede quæ eam partem repellat, vbi iugulum cum summitate lati scapularum ossis coniungitur. Pila verò, quantum maxime potest, intus conijciatur, atque adlatus, & à capite humeri recedat.

Si quis

A

A Medicus suis manibus brachium affectum prehensum, ac deorsum versus extendens.
 B Eiusdem calx in alam demissus, in contrariam partem vrgens.
 C Aliquis ab altera parte sedens, continens hominem ab integri humeri commissura cum lato scapularum ossē.

D Lorum molle, quod pilam excipit in alam coniectam.

E Alter extendens utrumque lori caput, & pede repellens eam partē, qua iugulū cū summate lati scapularū ossis cōmittit.



B

affirmet, quos que superius posuit, tanquam non secundum naturam reprehendat. Primò quidem hic reponendi modus humerū extendit, quod neuter ex superioribus præstitit, quāobrem à quouis meritò laudetur. nos enim ad quem vsum intentio adhiberetur, extendendum q̄; perpetuò esse, antequam restituere aut componere tentemus, in opere quoq; de fracturis ostendimus. Deinde, in hac curatione calx homo retrò repellitur, ne sequatur, quū brachium attrahitur. Hæc itaque duo agētes in diuersa contendimus: lori quidem circa alam iniecto hominem in posteriorem partem ducimus, pede in priorem repellimus. patet autem eundem esse, qui vtrumque efficiens in diuersa contendit. Hæc in proposito reponendi modo secundum naturam adhibentur, sed, quū impulsus ablit, à conuenienti modo recedit, eo q̄ nequeat exigua pila inter latus & humeri caput penetrare, ac multò minus etiam calx. At, vbi eò nihil indatur, quomodo impellimus? vbi non impellamus, neque reponere secundum naturam poterimus.

Est et alius reponendi modus, quo super summū humerū alterius hominē collocat. Maior autē esse necessario is debet, super quē collocatur: hic autē apprehenso brachio laborantis summū humerum suum excitat um ala hominis subiacet.

A Homo collocatus super summum humerum, alterius.
 B Maior, super quem collocatur.
 C Levis puer a posteriori parte appensus.



D

14

Primus reponendi modus, quē posuit, per digitos fuit, siue ægrotantis, siue medici: alter per calcem: tertius est, quem vocat ὁ ἰατρίτης, eo q̄ Hippocrates dixit, ὁ κατωὶστὴς ἐς ἀνθρώπον, quū significare voluit eum modū, quo super summum humerum alterius hominē collocant. Quomodo autem hoc fiat, ipse aperte docuit, quū præcepit, vt qui super summū humerum collocaturus hominem esset, suis manibus prolapsum ipsius brachium prehenderet, atq; ita summum humerum suum attollens in hominis alam conijceret, vt cauum, quod in ea est, eiusmodi eminentiæ locum præstaret.

Postea conuertatur, quasi sedili velit insidere, eo spectans, vt summo suo humero æger ala suspendatur: ipse verò se ipsum ab eo humero magis excitet, quā ab altero, suspēsi q; humerum ad suum pectus quā celerrimè adducat. Ita verò figuratus conuertatur, quū hominē suspenderit, vt reliquum corpus in contrariam partem inclinetur, atq; humerus continetur. Quod si homo levis admodum fuerit, appēdatur ei a posteriori parte levis aliquis puer. Hi restituenti modi omnes ad palestram sunt aptissimi, quoniam luxata ibi, vt restituantur, nullū aliud machinamentum desiderant, quibus alibi vti et conueniet.

Ἦτος πέλας dixit verbum / conuertatur / significare volens, summum humerum, super quem
 Septima Classis. KKKKKKKK η homo

13
 A. L. 4. E. 5. t. 1. c.
 1. 479. a

homo collocatur, conuertitur, sicut quando ad sedile accedimus, ut illi insidamus. Aegrotantem vero, quum ab humero pendeat, constat à tergo eius, super quem collocatur, suspendendum esse. hac siquidem via in contrariam partem ducetur, atque brachium, quod à fronte trahitur. Quod si leuis fuerit, qui suspenditur, appendi leuem puerum præcipit, ut grauius reddat pondus, quod tendit in partem contrariam. vult etiam concuti articulū humeri ipsius ægrotantis ab eo, super quem collocatur, ut è regione sue sedis constitutur. sæpius enim diximus ubi articulus ita collocetur, facile recondi: quum nobis etiam nihil impellētibz, musculi, quod expedit, efficiant.

- A Pistillum molli fascia inuolutum sub alam intrusum.
B Brachium ad pistillum porrectum ac detractum.
C Alter manibus cernici circumiectis deorsum compellens.

15



Sed & qui super pistillū cogunt, prope secundum naturam restitunt. Inuoluitur autem pistillū molli aliqua fascia, minus enim elabitur: atque inter latus & humeri caput demittatur. Quod si pistillū breuius fuerit, homo alicubi sedeat, sic, ut iuxta humerū super pistillum possit. Ferè aut pistillum adhiberi longius conuenit, sic, ut homo stans penè ex eo pendeat. Deinceps humerus et brachium iuxta pistillū extendatur, corpus verò alter in altera parte adurgeat, manibus ad collū datis iuxta ingulū.

Atque hi etiam, quatenus in diuersa continentur, secundum naturam reponunt: quatenus verò humeri caput (ut in sequentibus ostendit) pistillo circumducitur, à reponendo secundum naturam abluunt. quæ aut hic scribit, singula in aperto sunt.

Hic reponendi modus moderatè secundum naturam est: ac restituere articulum potest, si rectè adhibeatur.

Hunc modum secundum naturam esse affirmat moderatè, quod significauit verbo *ἐπιεικῶς*, quæ admodum et homo moderatus *ἐπιεικὴς* græcè dicitur. putarunt non nulli verbū *ἐπιεικῶς* viurpari, p. maximè, atque idcirco (ut opinor) in principio huius orationis remouerunt dictionē /propet/ ita scribētes /sed & q super pistillū cogunt, secundum naturam restitunt/. Debuerunt aut, et si Hippocrates id non monuisset, p se intelligere, cuius rei hunc reponēdi modum in sequētibz accuset. accusat enim, quum inquit /licet. n. pistillo humeri articulus inhereat, periculū est, ne corpus in hanc vel illam partem labat/: ac propterea ait eū modum, q per scalā adhibet, meliōrē esse. Modus igit, qui pistillo utitur, ad summū perfectiōis nō accedit. quare neq; verbo *ἐπιεικῶς* /maximè/ significat: magis. n. eum probat, qui p scalā est: magis itē eū, qui per spatham habet in summo capitulū rotundū ac leniter cautū.

Quin & alius quidam modus est per scalam adhuc melior: quandoquidem tutius suspensum corpus nō magis in hanc, quàm in illam partē, inclinabitur. Licet enim pistillo humeri articulus inhereat, periculum est, ne corpus in hanc vel illam partem labatur.

Quintus hic est reponēdi modus. ob quam verò causam utilior sit, quàm qui positus est quarto loco, aperte ipse exposuit.

Alligandum autem est super gradum rotundum aliquid, quod alæ sinui conueniat, ut humeri caput in suam sedem compellatur.

Ex eo ipso ligno, ex quo gradus conficiunt, tale quidpiā extat initio protinus, quum scale machinamētū paratur, quo nos et frequēter utimur. simile

16



A Rotundum quoddā scalæ gradui alligatum.

17

18


H
A. I. 4. E. 5. L. 1.
C. 2. 479. C

A simile autem est ligno, quod proximè subdet, quod summum habet capitulum rotundum ac leniter cauum, vnde apud recentiores medicos fere omnes græcè *αὐλὴν* nomen inuenit. cōsuevit autem illis organis adijci, quæ erecta collocantur: cuiusmodi est organum tum Andree tum Fabri. Neutrius autem structurā adscribere nunc oportet, posita enim est a sexcentis architectis tumioribus, quæ de organis scribunt. nobis autem institutum est Hippocratem explanare, qui ad omnia validissimè in contrarias partes, seu extendenda, seu impellenda, eo machinamento vitatur, quod scamnum appellatur.

- 19 Inter omnes reponendi modos hic præstantissimus est. Lignum accipitur ad summum quatuor vel certe quaterminus digitos latum: crassum verò binos, aut etiam minus: longum cubitos duos, vel paulo brevius: quod ab altero extremo rotundum sit, angustissimum ac maxime tenuissimum summum capitulum rotundum ac leniter cauum habet, at parum ex extet ab una parte, non quidem versus latus, sed versus humeri caput, ut huic subiectum. alia mox latus accommodatur. Summo item ligno, vel linteum, vel mollis habena agglutinatur, ut maius sit: deinde caput linteum ad demittitur intrò quantum potest inter latus & humeri caput: brachium totum super lignum exten dunt, & ligatur quæ paulum infra humeri caput supra cubitum, & supra manum, ut quæ maxime immobilis sit. Esi autem maxime momenti extremum lignum intra humeri caput in aliam intine indere.

B Sextum reponendi modum, quem pouissimum laudauit, hic docere ingreditur, apertè exponens structuram ligni, cuius extremo superimpositum est capitulum rotundum ac leniter cauum. Hoc quia simile est labro, quod græci vocant *αὐλῶνα*, medici totum lignum *αὐλῶνα* appellant. tale siquidem labrum est, quale videmus in ollis conuersum in interiorem partem, versus cauum. vnde quidam comicus, ut per iocum morderet, dixit quendam ollarum *αὐλῶνας* delingere. Artici igitur masculino genere *αὐλῶνας*, Iones fœminino *αὐλῆς*, huiusmodi labrorum figuras appellant. Commodissimè autem capitulum hoc demittitur inter latus atque humeri caput, vtilissimumq; est ad impellendum, quàm firmiter, quod gibbum est ex humeri capite, excipiat. In vniuersum autem singula ipsius verba plana sunt.

20



Post hæc tignum transuersum inter duas columnas bene alligandum est, super quæ ad brachium unum ligno imponendum, ita, ut ab una parte brachium sit, corpus ab altera, sed tignum iuxta aliam: deinde ab altera parte circa tignum attrahendum brachium cum ligno, ab altera reliquum corpus. Vnde incipit autem transuersum lignum sublime, ut reliquum corpus suspensum in pedibus sit. Modus hic reponendi caput humeri præstantissimus est: iustissimè enim impellit, modo lignum retrò magis, quàm humeri caput, demittatur. iustissimè item in contrarias partes inclinat, os quæ humeri tutum seruat. Vbi casus quidem recens sit, articulus citius opinione reconditur, prius item, quàm extensus videatur.

Columnas constat ab ipso *σῦλῶς* appellari. tignum verò transuersum, quod ab una columna ad alteram peruenit *σπῶρτῆς*.

21D

Sed & quæ iam diu exciderunt, hoc tantum modo reponi possunt, nisi tempore caro in casum venerit, atque humeri caput locum sibi tritum fecerit, in quem veniat. Vbi autem luxatus humerus manum ita inueterauerit, hac via arbitror posse restitui: nam quid non moueat iustus impulsus. manere tamen suo loco non puto, sed prolabi, ut consuevit. Idem efficies, si super gradum vim adhibeas, hac reponendi ratione vsus.

Locum tritum & callosum nominauit *τρίβων*, quem efficit humeri caput, quod adstrictum diu continetur in ea parte carnis, quæ iuxta cōmissuram est, in quam forte a principio erumpens confuit. *κοτύλλω* dixit cauum cōmissuræ, quod (ut dictum est) super insidet extrema ceruici lati scapularum ossis. Plerunq; aut tam ipse, q̃ alij medici, *κοτύλλας* appellant alta caua ac magnis oris septa: sed nunc iure suo mutuatus est hoc vocabulum ad significandum cauum, in quod proxima caro cōiicitur, quàm articulus luxatur: & locum occupat, in quo humeri caput ante recipiebatur.

Septima Classis.

KKKKKKK ij

Igitur

Igitur & propterea, quod ipse sinus capitis humeri obstructus est: & propterea, quod locus, in E quem venit, occalescens, sinus vicem præstat: fit, vt, si quando reponatur, contineri non possit: cum caro, quæ iuxta erat, sinum præter naturam occupet, & ea, quæ ossi locum facit, occalescens commissuræ sinum referat.

A Sedile thessalicum.


B Ægrotus in latus collocatus in sedili.

22



† 23 textus
in ætea impressus.

A Ianua biformis.



Satis quæ omnino fuerit, si recens adhuc vitium sit, super magnum sedile Thessalum vim adhibere. Sed parari lignum conuenit, quemadmodum dictum est, atq; hominem in latus conuersum sedili insidere, brachio cum ligno super eam partem sedilis iniecto, cui sedentes dorso inhaerent: atq; ab vna parte corpus attrahere, ab altera humerum cum ligno. Idem quoq; facere licet super fores bipartitas. His aut vtendum est, prout præsto sunt.

F

Sedilis quondam hæc figura fuit potissimum in Thessalia, vt ad rectam lineam attolleretur ea parte, cui sedentes dorso inhaerent, super quæ adhiberi voluit vim in diuersa extendendi, quæ admodum antè super tignum docuit. Verum, quomodo collocare languentem super sedile oporteat, ipse apertè explicauit. Idem efficiet fores bipartite, si super eas vis adhibeatur. Inueniuntur aut huiusmodi fores, in quarum medio interiectum est lignum firmum, quale paulo antè dixit tignum inter duas columnas. ex his foribus altera ab inferiori parte aperitur, à superiori altera, atq; hac de causa bipartitas fores vocauit, quasi duplicem quandam duas in se continentem paruas. Docet igitur prolapsum G humerum super lignum inter duas fores situm imponi, vt intentio in diuersa admoueat.

DE HUMERO IIS MODIS PROLAPSO,
QUOS HIPPOCRATES NON VIDIT

Testatur quidem Hippocrates humeri caput prolapsum in aliam dūtaxat se vidisse: quidam verò ex recentioribus medicis scribunt, in alias quoq; partes excidere, vt in quas etiam prolabi possit: nos autem quinquies hætenus eiusmodi casum nacti sumus, semel in Asia, Romæ quater, nec sapius arbitror Romæ accidisse, quoniam medici omnes, vt me confunderent, quæ præter opinionem euenirent, mihi ostendebant. Quater igitur procidit, ac semper in priorem partem. erat autem discrimen, eo, quod nunc magis ad commissuram accedebat, nunc ab ipsa magis deducebatur in longitudinem, vel latitudinem membri. Mirabar autem quodammodo, quid fieret, vt Hippocrates hoc nunquam viderit: ex recentioribus verò vnus dicat semel se vidisse, alter bis: nemo autem ita sape, sicut nos hætenus conspeximus, & fortè rursus etiam conspiciemus. Existimamus autem non casu, sed ratione, id nobis accidisse, vt deinceps ostendemus. In Asia nostra primum inspeximus humerum ita prolapsum, quum Smyrnæ adhuc à præceptoribus erudiremur (est autem hæc vrbs multo maior illa, cuius vbique meminit Hippocrates) vt qui ibi plurimum essemus. Post trigessimum & secundum annum

A annum Romę degimus: quam urbem tot homines habitant, vt Polemo rhetor eam celebrans dixerit terrę habitatę compendium. Quod autem quater hactenus eiusmodi casus euenierit, patere planę potest, eo qđ omnes medici (vt posui) mecum cōmunicarent, quęcunq; pręter opinionem nacti essent, ac non modò Romę nihil me latere huiusmodi potuit, sed neq; in portu, atq; in proxima vrbe, quam Hostiam nominant, quū omnibus amicis vterer, quicunq; illis locis medicinam exercerent, quę & ipsa frequētissima sunt. At vrbes, quarum meminit Hippocrates, vbi diutius egit, non plures incolunt, qđ Romę vicum vnum, nihil ergo mirum, si in frequentissima vrbe plures incidunt in idem malum. Illud pręterea experientia discens, ductus sum ad causam inueniendam, non nullis enim palestra, non nullis medicorum opera, visus est articulus eo modo excidere, nam duo quidem ex ijs, quos vidi, articulum in alam venisse mihi retulerunt: medicis autem imperitę vrgētib; musculorum complexu arcte contentum fuisse secus ac principio apparuisset. Quocirca, si Romę has duas causas pręter hominum frequentiam adicias, requires, non quidem cur tot nactus sim, quibus humeri articulus ita prociderit, sed cur non plures. Hippocratis enim seculo medici optime artis pręcepta discebant, atq; ea presertim, quę ad huiusmodi manus operam pertinent: ea nunc à medicis, vel nullo modo addiscuntur, vel certę exiguo tē-

Bporis spacio: deinde palestrę vsus mirum in modum increuit, vbi eius magistri mēbra varijs modis contorquent, atq; peruertunt. Requires igitur (vt dixi) non cur tot, sed cur in tot hominum millibus non plures viderim, quos magistrorū numerus in palestra, & inscitia medicorum, in huiusmodi noxam compulerit. Restituuntur autem luxata hęc ijsdem consilijs scilicet extendendo, impellendo, & collocando. Non conuenit autem, ita impellere in hoc casu, sicut quando in alam articulus eruperat, ibi enim opus erat articulum primò in priorem partem, deinde sursum, adducere, dum collocaretur è regione sui caui: nunc autem, quū penitus in priori parte commissurę sit, siue in interiorem, siue in exteriorem partem adstrictus à musculis inclinetur, impellere ipsum oportet ad contrariam regionem, in quo faciendo periculum est, ne ipse deorsum lapsus à musculis in alam trahatur, quam rem in diuersa extendētes precipuē vitamus. Nō est autem ab re, dum in diuersa contenditur, locum sapire, qui sub ala est, quod nos Smyrnę fecimus, ad articulum in priorē partem elapsum. Accidit autem in palestra, quū brachium cuidam à luctante duplicaretur, sub quo modo potissimum articulus in priorem partem prorumpit, nos verò homine resupinato intentionem in contrarias partes adhibuimus similem illi, quę per calcem fit, quodam à posteriori parte sedente, ac loro lato sub ala iniecto, sinu aliqua re prius cōpleto. Nos (vt diximus) ar-

Cticulum è musculis, quibus adstringebatur, expellentes, dein remissa intētionē suimus attractū à musculis in se ipsos recurrentibus in suum locum reponi. Hic igitur promptē restitutus est, in palestra enim protinus curationem aggressi sumus, satis qđ fuit affectum brachium à nobis ipsis extendi, non secus, atq; in eo reponendi modo, vbi calce vtimur, interdum etiam extendendi causa laqueum iniicimus. sit autem laqueus ex ijs, qui facultatem habent extendendi æqualiter, qualis est duplex Carchesius, qui ex duabus habenis cōficitur. Sed, vbi iam diu procidit, opus fuit scamno Hippocratis, quod ipse in sequentibus tradet. Hęc de articulo prolapsō, pergamus iam ad ea, quę tractat de corporum varietate, quibus magis aut minus humeri caput elabitur.

24
A. li. 4. f. 5. c. 1.
c. 1. fol. 477. g

Illud autem ignorare non oportet, quòd in luxatis facili restituentis, nature à naturis plurimum differunt, & multum cauum à cauo distat: nam hoc quidem facilius, illud verò minus facile superatur: multum etiam discriminis est inter eos, quibus nervorum coniunctio laxa est, & quibus tenta.

Cum sermonem de restituendo absoluerit, causam docere incipit, quamobrem non nullis facile quiuis articulus excidit, ac sine magno negotio reponitur, non nullis contra raro excidit, sed magno negotio restituitur. qua in re nos suprā & ossium commissuras causati sumus, & superdiniectos musculos valentes, aut laxos.

25 *Quibusdam n. hoibus humor in articulis est propter aduictos nervos. si natura laxi fuerint, et excēdi facili patiuntur. Cōplures aut videre licet ita humidos, vt ubi velint, sine dolore articulos sua sede moueāt, atq; itē sine dolore restituāt.*

Commutasse mihi sermonem videtur, quū nervosa corpora laxiora fiant ob humorem hominis naturalem: at non propterea qđ laxiora sint, idcirco humor sit in articulis: cuius oppositum indicant Hippocratis verba. Videtur autem mihi voluisse nervosa corpora propter humorē hominis facile plurimum extendi, non tamen hoc sua oratione allequitur, sed particula /propter/ abusus lectorem adducit ad intelligendam causam.

26 *Differunt etiam inter se corporis habitus. Quibus enim membrum boni habitus est & carnosum, articulus minus excidit, & egrius reponitur: quibus quāsoleat tenuius est & minus carnosum, magis elabitur, & facilius restituitur: cuius rei indicio sunt boues, quibus femur suo cauo magis erumpit tunc, quū ipsi emacrescunt: emacrescunt autem boues maximē vltima hyeme. Tunc igitur maximē his articuli luxantur, modo quid tale in medicina scribere conueniat, sed certē conuenit.*

Naturæ atq; articulorum differētiæ, sub quibus ipsi, seu promptè, seu vix procidunt, & reuer- E
tuntur, duæ sunt: quas sæpius recēsi, cum in superioribus habeatur. Illis non nunquam tertia ac-
cedit, quam nunc exequitur, à crassitudine vel macie corporis orta, quam ῥέσις id est habitū, di-
cunt. hoibus enim, quo habitiores efficiuntur, eo articuli ægrius excidunt, ac reponuntur, qm̄ car-
nis copia vndiq; constringuntur: contra ijs, qui emacrescunt, relaxat cutis eius carnis, quæ cōmis-
suram cōplectitur, parum q; prohibet, quo minus articulus excidat, & reuertat: nec quidquam de-
terius agitur cum his, qui natura graciliores sunt, q̄ cum his qui pleniores, ostēdimus. n. in libro
de temperamentis graciliorem esse naturæ liccioris, pleniorē magis madere. Quocirca muscoli,
quum gracilibus robustiores sint, cōmissuram coarctant: plenioribus caro, quatenus magis abun-
dat, adstringit id, quod articulū ambit: quatenus aut mollis est, facile peruertitur, quum rotundo-
rum ossium, quæ sua sede mouent, capita admittat, sic, vt vtriq; quod ad articulos excidentes atti-
net, æquales sint. Si quis tñ habitior aliquē emacrescit, facilius huic articuli elabunt, ac rursus recon-
duntur, tunc, q̄ antea: non secus etiam, si quis natura gracilis, carne impleatur, ei vix procidit, at-
que ægrè reuertitur. Quam rem comprobat per ea, quæ in bobus apparent, ita apertè loquutus,
vt nulla explanatione opus sit, nisi alicubi in vno, vel altero vocabulo, quæ à me notabuntur.

- 27 Rectè enim scripsit Homerus ex omni pecore boues tempore hoc maximè pati, atque inter boues, qui arant, quum F
hyeme laborent: his igitur maximè articulus excidit, quoniam maximè extenuantur. Namque aliud pecus pascere
exiguas herbas potest: bos non item, priusquam grandiores fiant. Aliud enim pecus tenuem habet laborum promi-
nentiam, tenues item malas: bobus contra laborum prominentia crassa est, malæ item hebetes & crassæ, atq; idcir-
co exiguis herbis non possunt eas subijcere.

Pecus ἀρόβατα nunc dixit, significare volens vniuersum pecus, quemadmodum & in libro
de morbo comitiali, vbi ad verbum legitur Οὐκ ἔστιν ἄλλο ἀρόβατον ἐδὲ ἢ βόες καὶ αἰγες. Simile
quid apud poetam legitur, vbi ait,

- Πολλὰ γὰρ οἱ ἀρόβατά ἐστι. Vult enim significare gregem pecudum armentum q; quam
vocem è maioribus multi similiter vsurparunt.

- 28 Verum animalia, quæ solidi pedis sunt, vt potè quæ vtrinque sint dentata, vellere possunt, & exiguis herbis den-
tes subijcere, gaudent quæ eiusmodi herba magis, quàm grandiori. Omnino enim melior est ac firmitior exigua herba,
quàm quæ grandis est, antequam ad maturitatem veniat: ac propterea scripsit,

Sicut quando redit gratum ver bobus, in orbem

Crura quibus vertuntur- quoniam grandior herba iucundissima illis videtur. Sed & bos natura hunc arti- G
culū laxiorem reliquis habet, atq; ea de causa pedē circūuoluit magis quàm cætèra animalia, præsertim ubi macie se-
nio q; confectus sit: quas ob res oēs bovi maximè prolabitur. Plurima de ipso scripta sunt, quoniā hæc fidem faciunt
eorū omniū, quæ proposita sunt. Sed, ut eò reuertatur oratio, unde digressi est. gracilibus magis prolabitur articulus ac
citiùs reponitur, q; ijs, qui bono habitu sunt: minus q; inflāmatione tentantur madētes ac graciles, q; sicci et carnosī.

Vellere Hippocrates σαρκάζειν dixit, quo vocabulo nō nulli significari volūt, labra vehemen-
ter inter se coniungere, sic, vt herbæ partem auellant: alij inferioribus dentibus cū superiori labro
idem efficere, nam qui derident (σαρκάζοντες græcè dicuntur) dentibus labrum mordēt. Verum
illi quidem superioribus dentibus mordent labrum inferius: animalia verò, quæ ruminant, cum
inferiorem tantum dentium ordinē habeant, eo ad mordendum vtuntur. ac propterea accipiūt
alij vocabulum σαρκάζειν in illis, quæ dentes inter se committunt, qm̄, quæ carnem vorant (σαρ-
κοφαγῆντα vocantur) tam superioribus q̄ inferioribus dentibus vtuntur. atq; his videntur faue-
re verba Hippocratis, quum σαρκάζειν dixerit, non de ijs, quæ ruminant, sed de ijs, quæ vtrinq;
dentes habent, quæ ἀμφώδοντα græcè nuncupant. Hæc quidem pascere exiguas herbas possunt,
cuiusmodi sunt equi, asini, muli: at ex ijs, quæ ab vna parte tantum sunt dētata, illa duntaxat, qui-
bus labri prominentia tenuis est. atq; idcirco inter animalia, quæ herbis vescuntur, soli boues hye-
me pastu indigent, qm̄ nequeunt exiguam herbam aut σαρκάζειν, id est dentibus abscindere, aut
labris præhendere: boues. n. non habent labra ita tenuia, vt exiguam herbā circūplicare atq; com-
prehendere possint, quemadmodum & capræ & oues. Hæc tria animalium genera multifidos pe-
des habent: sed solidi pedis sunt, quæ vtrinq; sunt dentata. appellantur autem græcè μώνυχα con-
tracto vocabulo, vt asserunt, qui nominum interpretationem excolūt, à dictione μονώνυχα, eo q̄
vnum vnguē habeant, græci μόνον ἔνυχα dicunt: solidipedum. n. pedes extremi vnguibus homi-
nis respondent. / Minus q; inflāmatione tentantur. quum facilius articulus excidat, sequitur, vt
similiter recondatur: quo fit, vt nulla vel certè q̄ minima inflāmatio superueniat. namque, vbi
magna vi procidat, ac reuertatur, muscoli dolore vexantur, quem subsequitur inflāmatio.

- 29 Minus q; in posterum articulus alligatur. Atqui, si citra inflāmationē mucci iusto plures fuerint, idcirco etiam
facile procidet. Ferè autem circa articulos mucci redundant magis in gracili, quàm in pleno.

Quod inquit /in posterum/ referri potest ad duo tempora, & ad id, quod reposito articulo pro
ximum

Aximum est, cum inflammatae partes curantur, & ad id, quod deinceps citra molestiam insequitur. eo quidem tempore, quod reposito articulo proximum est, ubi inflammatio sit, articulus ab ipsa cōstringitur, quod ipse etiam narrauit: post curationem à validis eiusmodi hominum musculis, et à quadā duritie, quā musculis ingens inflāmatiō relinquit, articulus quasi vinculo cōarctatur.

- 30 Sed & caro quoque gracilium, qui arte non fuerint rectē extenuati, mucosae magis est quam corā, qui pleni sunt. Vbiunque autem mucci cum inflammatione sunt, inflammatio articulum illigat: ac propterea non admodum elabitur, ubi mucci redundant: qui lapsurus utique fuisset, nisi locum vel amplius, vel minus, inflammatio occupasset. Qui reposito articulo, partibus, quae iuxta sunt, nulla inflammatione affectus protinus humero uti sine dolore possunt, hi nulla cura sibi opus esse arbitrantur: sed medici officium est praesagire contra eorum opinionem, siquidem his rursus prolabitur, magis quam quibus nervi inflammatione tentantur. Hoc in omnibus articulis ita habet, & praecipue in commissura humeri cum lato scapularum ossē, ac in genu, namq; hi praecipue luxantur. At quibus nervi inflammatione vexantur, humero uti non possunt, dolore enim prohibentur, atque inflammatione extendente. His itaque mederi oportet cerato pannus quē, & multas fascias circumdare: tum lanam mollem ac mundam in alam subuere, donec id cavius compleatur, ut vinculum fulciat, & articulum sustineat. Continere autem humerum oportet, plerumque in superiorē partem conuersum: sic enim fiet, ut humeri caput longe collocetur à loco, in quem proruperat. Conuenit autem humeri articulo deligato humerum ipsum ad latus deuincire, fasciā in orbem circa corpus porrecta.

Quicumq; seu fame, seu oblidione, seu luctu, seu mœrore, siue etiam cibi fastidio, alimentū nō satis fumentes extenuati sunt, caro non statim siccescit, sicut illis, qui arte rectē sunt extenuati: sed ferē in omnibus propositis calibus madentior efficitur, quibuscum tūc ob inopiam liquatis. Magis adhuc tabescunt, qui in mœrore sunt, quem græci poetæ μελεδῶνα idcirco dicūt, quasi membra edat, deuoret q; sub hoc itaq; adeps omnis tabescit, & quęcūq; caro mollis ac recens cōcreuit. Sed, ubi medicus de industria corpus aliquod extenuat, p ea, quę excogitauit, moliri id cōtendit: deinceps frictione utitur, quo tpe opus est, si quid liquatur, exhaurire vel per sudorem, qui sensui subiicitur, vel per expirationē, quę non sensu sed ratione percipit. Ad hęc par est ipsum esculentā & poculentā nō temerē dare, sed conari per hęc, ut quęcūq; educēda sunt, benē exitū habeāt, non modō quę per deiectiones, sed & quę per urinā. eo enim pacto, si quis in corpore humor liquaretur, vndiq; extra corpus efflueret, nam, ubi in corpore maneat, tpe mucosās carnes efficit. Quodcūq; igitur tenue omnino ac serī naturā habens liquatur, effertur: & per expirationē, quę sensu non cōprehenditur, magis q̄ alio modo, discutitur: tantum autem sublitit id, quod aliquatenus crassum est, quod tempore glutinosum efficitur, & à muccis non abhorret.

- 31 Necessē est insuper humeri commissuram sensim molliter quę perfricare. Opus autem medico est multarum rerum & frictionis etiam experiente: siquidem ab eo, quod eodem nomine appellatur, non idem effectus oritur: potest enim frictio laxiorem articulum illigare, & iusto duriorē soluere. Verum de frictione alibi pertractabimus. Ergo hanc humeri commissuram conuenit mollibus manibus perfricare, tum leniter, quod alioquin rīle est.

Efficit frictio sensim molliter q; adhibita, ne quę remaneāt inflammationis reliquiae. variē autem procedat, oportet, modō manus à superiori parte deorsum, modō ab inferiori sursum ferant: deinde oblique non solum ab inferiori parte sursum, sed à superiori deorsum: post hęc in orbem, & quasi transuersē à dextra in sinistram, & rursus à sinistra in dextram, ut musculorum fibræ oēs molliantur. Maiores enim græci ad frictionem significādā mutuati sunt vocabulū ἀνατρίψωσ pro τρίψωσ, at nolim tibi persuadeas (quemadmodū non nulli existimarunt) Hippocratē velle manus in perfricanda humeri commissura ferri ab inferiori parte sursum, q̄ τρίψωσ frictionem, Δανά sursum significet: nam verbum ἀνατρίβειν vniuersum frictionis genus exprimit, non eā dumtaxat, quę ab inferiori parte sursum procedit. quod & ipse indicauit, quū inquit, /sed de frictione alibi pertractabimus/ ubi frictionem ἀνατρίβειν vocauit. non enim pollicetur se de vna specie tractaturum ceteris omnibus omissis. Sed in libro etiam de officina medici omnes exposuit, genus vniuersum ἀνατρίβειν appellans, quū inquit, Frictio ad resoluendum valet, & adstringendum, preter hęc ad implendum ac minuendum. & quę sequuntur, quę tum in commentariis in eum librum persequuti sumus, tum in opere de tuenda sanitate latissimē narrauimus.

Sec. 3. c. 25. 7^a.
218. d

- 32 Articulus non violenter dimouendus est, sed quatenus citra dolorem moueatur. Confirmantur autem omnes, alij quidem longiori tempore, alij breuiori.

Inflammatione remissa nihil expeditius est, q̄ eiusmodi motus, soluit enim illius reliquias oēs: quibus neglectis articuli contracti atq; illigati redduntur, vtriusq; enim vocabulis appellantur.

- 33 His autem indiciis exciderit ne humerus, intelligendum est.

In libro de fracturis ante ad eos, qui errant, aggreditur, quod nunc quoque facit. nam postquā errantes

Sec. 1. c. 5. 7^a.
225. a

errantes redarguit, reponendi rationem subiicit, quæ non solum sequitur, quod propositum erat, E sed eius etiam fidem facit. Eam ergo primum exequutus, nunc deinceps indicia subiicit humeri capitis luxati, quæ in exercenda arte necessario præcedunt, in tradenda non item necessario. eorum verò, quæ præcedunt, aut sequuntur, illud tibi indicio sit, quod non recte effici potest opus, quod sequitur, aut percipi quod præceptum est, antequam intelligatur quod præcedit. Ratio quidem luxati restituendi, antequam intelligatur in quam partem articulus eruperit, aperte demonstrari nequit: sed nihil eam addisci prohibet, priusquam notæ enarrentur. Principio itaque orationis, si id vnum edocti sumus, humerum in alam prolabi, & ipsi inuenire modum reponendi possumus, & ab altero etiam doceri: non tamen comprehendere modum reponendi, nisi ante sciuerimus humerum in alam procidere: sicut neque quo pacto in alam procidit, nisi prius nouerimus naturam vniuersæ commissuræ. Si quis igitur restituendi modum præfatus, deinceps adiciat, in quam partem articulum luxatum restitui docuerit, necessarium ordinem perturbat. id quod accidit etiam ei, qui primo incipit ostendere, in quas partes articulus erumpat, dein transit ad commissuræ naturam exponendam. nam, si quis penitus noster, quomodo articulus in alam excideret, superuacuum esset commissuræ naturam hunc docere: sed, si quis primo audiat, percipiat quæ, quod nam modo hæc habeat, deinde in quam partem articulus venerit, huic nihil opus est ad hoc, ut restituendi modum doceatur. Eodem etiam modo nunc nihil nos prohibuit signorum inscitia, quo minus reponendi rationem intelligeremus. quæ res communiter euenit in omni curatione tradenda: potest enim doceri quis, qua ratione curetur inflammatio iocinoris, seu ventriculi, seu renū, siue intestini crassioris, antequam ipsorum affectus teneat: non tamen curare potest, priusquam eos intelligat: sicut neque ratione curationem inuenire, aut doceri ab altero, priusquam naturam calleat partis, quæ curatur.

34 *Partim quidem, quum homines iustum habeant corpus, & brachia, & crura, ad exemplum integri extimare vitiatum oportet, & ad exemplum vitiatum integrum, neque spectare alterius hominis articulos.*
A. li. 4. f. 5. l. 1. c. 10. 478. h

Quod ab utraque parte tam dextra quam sinistra æquale est ad vnguem, iustum appellauit. Sed quoniam membrorum forma in hominibus varia est, imperat, ut affectum membrum cum pari ipsius affecti hominis membro coteratur: atque inde quatenus a naturali statu recesserit, coniectura fiat.

35 *Aliis enim magis extant, aliis minus, sed ipsius laborantis, an integer vitiatum dissimilis sit.*

Eos, quibus articuli naturaliter extant, prominentes quæ ἐξέρχονται appellauit.

36 *Quæ res recte quidem ostendetur, omnino autem magna eius inscitia est. Hac de causa non satis est ratione artem hanc scire, sed visu experiri ipsam oportet.* G

Insitiam dixit παρασύρειν, non omnem simpliciter intelligens, sed eam, quæ coniuncta est ac proxima scientiæ. indicabit autem ipse in sequentibus, qui fiat, ut interdum decipiantur, qui protinus cum vitiatum integrum conferunt.

37 *Multis enim articuli præ dolore vel alia de causa, ut non exciderint, nequeunt tamen eo modo, quo in sanis corporibus figurari. Intelligere igitur, ac scire huiusmodi habitum oportet: nam multo magis in ala sentitur caput humeri prolapsi, quam eius, qui naturaliter habet: ad hæc locus, qui a superiori parte super commissuram est, cauius apparet: item latius os scapularum summum, quæ cum iugulo committitur, extare videtur, cum articulus inferiori loco recipiatur.*
A. li. 4. f. 5. l. 1. c. 10. 478. h

Insitiam, quam ipse παρασύρειν dixit, nunc vnam ponit, quæ in figurando accidit. Interdum enim nequeunt affecta membra aliquo modo figurari, quamuis hoc ægris non accidat, propterea quod articulus eruperit, sed vel dolore, vel musculorum intentione. Deinceps insitiam alteram subiicit.

38 *In quo etiam accidit inscitia, de qua in sequentibus agemus: est enim memoratu digna.* H

In eo quod locus, qui humeri commissuræ superiectus est, cauius conspicitur, quendam incidere errorem ait, quem in sequentibus dicturum se pollicetur. id autem interdum euenit, ubi iugulum a lato scapularum osse diducitur.

39 *Partim etiam a latere cubiti eminentia recedere magis videtur ab eo humero, qui prolapsus est, quam ab altero: si quis tamen cogat, adducitur quidem, sed cum dolore.*

Indicium quoque hoc fallax est, nisi sub ala humeri caput contingas, quod in eam venit. quo fit, ut brachium adduci ad latus sine dolore non possit.

40 *Adde quod cubito extento brachium iuxta eiusdem partis aurem non ita porrigi potest, quemadmodum & integrum, neque in latera similiter. Hæc itaque indicia sunt humeri capitis luxati: restituendi verò modi hi, qui scripti sunt, & curationes eadem.*
A. ibidem. 479. a

Hoc quoque signum ex illis est, in quibus esse insitiam proposuit. quod euidentissimum est ex his, quæ prodidit, cum inquit / multis enim articuli præ dolore, vel alia de causa, ut non exciderint, nequeunt

A nequeunt eo modo, quo in sanis corporibus figurari. Si quis (ut ipse ait) promptè brachium possit ad latera porrigere, id certum indicium est articulum naturaliter habere: quod si aliqua ex parte prohibeatur, potest huius rei causa esse dolor, vel musculorum intentio.

- 41 *Maxima autem animaduersione dignum præceptum est, quæ ratione curare eos conueniat, quibus sæpe humeri caput elabitur, cum multi ob calamitatem hanc, quamquam alioquin idonei, certare prohibeantur: multi etiam ea de causa redditi sint imiles ad bellum, ac perierint. Ob id etiam animaduersione dignum est, quod neminem nouerim, qui re etè curaret, sed alios quidem manus homini non iniicere, alios contrarium ei, quod expediret, excogitare moliri que. Adusserunt iam complures medici, ubi humeri articulus excideret, eum locum, qui a superiori parte commissuræ est: & eum, qui à priori, quæ prominet humeri caput: & à posteriori parte paulo infra superiorem scdem commissuræ. Profecto huiusmodi unctiones commodæ fuissent, si humeri caput in superiorem, priorem, aut posteriorem partem venisset: nunc, cum in inferiorem erumpat, expellunt magis quam cohibent: excludunt enim humeri caput à spacio superiori. Sic autem adurere hos conuenit: cutis sub alaprehendenda digitis est, atque attrahenda e regione potissimum eius partis, in quam humeri caput elabitur.*

B In hac etiam oratione pleraque plana sunt. quare à me prætermittentur, nisi si qua videantur obscura.

- 42 *Tum, cute sic attracta, ita admoendum candens ferramentum est, ut traiciatur.*

Imperat, ut ex cute extenta nihil relinquatur, quod non vratur, sed candens ferramentum traiciatur à dextra parte alæ in sinistram, atque ab hac ad dextram.

- 43 *Ferramentis autem adurere oportet, non crassis, neque nimium rotundis, sed oblongis: celerius enim manu impulsæ traiciuntur.*

Ferramenta extremitate rotunda appellauit *καλαρα*, cuiusmodi sunt capitulata illa, quibus ad alas vtuntur (*πτερίδες* vel *διαπτερίδες* nuncupantur) atq; item spathe capitulatae: quæ verò, his contraria, oblonga sunt, *τροχιλὴ* dixit, quorum extremitas non est rotunda, sed acuta, illis aliquo modo similis, quæ ad perforandum accommodantur.

- 44 *Sint quæ candentia, ut traici quam celerrimè possint: quæcumque enim plena sunt, tardius traiciuntur, & crassæ inde latiores resoluiuntur, periculum quæ est, ne vlcera abrumpantur: quod & si nihilo deterius esset, turpius tamen atque expers artis penitus haberetur. Vbi ergo candens ferramentum traieceris, fere abundè erit in inferiori parte duntaxat aduulsi.*

Candentia esse voluit ferramenta, quæ ad alam admoventur, quod expressit vocabulo *διακαυόν*.

- 45 *At si nullum inflicere periculum videatur, ne vlcera abrumpantur, sed magnum spacium in medio integrum relinquatur, instrumentum, quo ad illinendum vtimus, tenue traiciendum est, ab vna unctionis parte ad alteram, cute adhuc extenta, non enim posset aliter traici: quo facto remittenda cutis est: postea inter vtranque plagam alia media facienda est, admo to tenui ferramento cæcènti, donec ad prius demissum instrumentum pertineat. Quatenus verò prehendere cutem sub ala conueniat, hinc conicere poteris, quod glandulæ sub ala sitæ sunt, atq; in multis aljs corporis partibus.*

Vlceravocauit *ὠτειλᾶς*, quemadmodum & poeta, qui de recenti vulnere inquit,

Ὅσρα δὲ αἰὲν ἐπὶ θεικὸν ἀντρεθεὶς ὠτειλᾶς. Vbi extentam cutem (ut ait) transversam ferramento traieceris à dextra in sinistram, præcipit, ut iterum aduras, demisso candenti ferramento, non amplius transverso ab vna parte ad alteram, sed prorsus in altitudinem. Oportet autem inter vtramq; plagam, quam candens ferramentum fecit, non exiguum spacium interuicere, namq; ubi exiguum sit, periculum est, ne vlcera abrumpantur, atque vna magna exulceratio fiat. quamobrè & si nihil deterius accadat, liquidem adurimus, ut partem exiccemus, atque adstringamus, non tamen necesse est magna induc'ta cicatrice locum deformem reddere, quum per exigua foramina liceat æquè succurrere.

- 46 *Sed alibi glandularum vniuersam naturam persequemur, quid sint, quid quæ & in quibus indicent, aut possint. Glandulas itaq; prehendere non conuenit, nec quæcumq; glandulæ interiora sunt, id siquidem valde periculosum est.*

Glandularum vniuersam naturam appellauit *ἐλαυελίης*, quam pollicitus est alibi docere. non tamen extat hic liber Hippocratis de vniuersa glandularum natura. Sed quidā ex medicis iunioribus, qui Hippocratem sequuntur, paruum libellum confecit, quem inscripsit, Hippocratis de vniuersa glandularum natura. qui tam loquutionibus, quam sententiis, longe superatur à germanis libris Hippocratis. adde quod neq; vllus veterum medicorum eius libri meminuit. neq; ab his, qui indicem scripserunt, commemoratur.

Proximè

- 47 Proximæ enim sunt nervis, qui magnam vim habent. Extra glandulas plurimum prehendum est, nam id fit innocenter.

Seçt. 4. circa
medium.

Subiectos esse ait glandulis in ala nervos magnam vim habentes, quos nuncupavit τόνες. Ridiculè igitur quidam ex recentioribus medicis existimant nervos illos duntaxat ab ipso appellari τόνες, qui coniugati à cerebro oriuntur, quoniam in secundo de || morbis vulgaribus, cum dixit/duo enim nervi à cerebro iuxta os magnæ vertebræ/ & quæ sequuntur, nervos appellavit τόνες. nervi enim, qui ad brachia intendunt (vt in confesso est apud omnes, qui incidendi corporis peritiâ habent) à spinæ medulla in ceruicibus dependent, qua parte ad thoracè accedit: quos constat ab ipso nominari τόνες, tum in propositis verbis, ac deinceps bis in iis, quæ subiiciuntur: tum infra rursus, vbi de spina agens, nervos appellat τόνες.

- 48 Illud etiam ignorare non oportet, quòd vbi humerum valdè in superiorem partem porrexeris, nihil prehendere ex cute sub ala poteris, quod extendere operæ precium sit: nam, vbi in superiorem partem porrigatur, cutis, quæ sub ala est, absumitur. Ad hæc nervi etiam nulla ratione violandi sunt: hi siquidem in eiusmodi habitu prominent, atque extenduntur. Sed, si humerus paulum excutitur, multum cutis apprehendi poterit: & nervi, quos cavere oportet, intrò magis recedent, longius quæ aberunt ab eo, quod apprehenditur.

Absumi in ala cutem ait, vbi totum brachium sursum porrigatur. antè siquidem laxa erat, ita, vt superesse videretur. brachio autè sic figurato extenditur circa partes, quas contegit, ita, vt quod prius superesse videbatur, pereat, & quali absumatur, quàm brachium sursum porrigitur.

- 49 At non ne in vniuersa arte in primis danda opera est, vt quo pacto singula iustè figurentur, inueniamus?

Iustè intellexit quasi æqualiter. hoc autem fit, vbi seruator, quod vnicuique rei conuenit, & proprium est. Id nunc, quo de agitur, vsitio cutis in ala est, quam admouere oportet, humero conuenienter figurato. nam, si ita demittatur, vt latus attingat, nimis parùm excitabitur, neque poterit altitudo alæ se ostendere, neque cutis sanè digitis extendi atque aduri: sed, si humerus plurimum attollatur, digitis extendi nihil ferè cutis poterit, sub hoc enim habitu circa subiectas partes extenditur: adde, quòd nervi prominent. Eatenus igitur attollere humerum conuenit, atque ab ala reducere, vt locus in conspectum veniat: sit quæ, quæ subicere digitos facillè possimus, & cutem extendere, atque adurere. Quæ, quàm primum excitato brachio fieri possunt, admouenda manus G est membro ita figurato, neque vltius attollendum. non enim alia de causa humerus attollitur, nisi vt possit cutis sub ala digitis extendi hæcenus, vt candens ferramentum admoueat, prout ipse indicauit, ita, vt si hæc præstare potuissimus humero demisso, eiusmodi habitu nihil antiquius fuisset. quàm laxiorem cutem efficiat. sic enim plurimum attrahitur, ac manus sine vilo periculo penitus admouetur.

- 50 Hæc circa alam: satis quæ est sic prehendere, modò quâ conuenit, candentia ferramenta demittantur.

Prehendere dixit de cute.

- 51 Extra alam duæ tantùm sedes sunt, quàm aduruntur morbo auxiliantes.

Dictionem /extra/ dixit ἐκτοθεν, quam posuit non vt loci differentiam notaret, sed quemadmodum apud Demosthenem, atque alios rhetores vsurpatur, qui cum ἐξωθέν τι τῆ πράγματος dicunt, præter rem significare volunt. Id igitur, quod Hippocrates asserit, tale est. Præter vitionē alæ, duæ aliæ sedes sunt morbo auxiliantes, quàm aduruntur. vsus autè est vocabulo τιμωρέσαι, quo constat ipsum non aliud significasse, quàm auxiliantes. quod fecit etiam Euripides, cum Orestem induxit hæc loquētem, ἀνόσια μὲν δρᾶν, ἀλλὰ τιμωρεῖν τῷ πατρὶ. Disserunt autem inter se τιμωρῶν, & τιμωρέμενος, quod vocabulum cū accusandi casu iungitur, hoc siquidè significat crucians. eadem ratione & Menandri fabula inscribitur ἐαυτὸν τιμωρέμενος.

- 52 Vna quidem est à priori parte inter caput humeri, & chordam, quæ ad alam est.

Nos quoque vidimus articulum contineri in hoc loco, qui pars totius prioris regionis est. nā, quàm ea lata sit, vna quidè eius in medio ad vnguem est, duæ autem vtrinq: vna ab interiori parte, cuius nunc meministi, altera ab exteriori, de qua paulo infra loquitur. Est autem admiratione dignus, qui, quàm nunquam viderit humeri caput in aliam partem excidere, quàm in alam, non contentus fuerit ipsam tantùm adurere, sed adiungens duas alias regiones, illas coniecerit, in quibus nos vidimus caput humeri fixum: ex his in eam, qua vena sita est, per summum humerū procedens, vbi duo muscoli cōcurrunt, & magnus ille, qui à pectore oritur, & qui à literæ Δ similitudine Δελτοειδὲς nuncupatur, quater vidimus humeri caput prorupisse: in exteriorē verò partem mediæ regionis semel, de qua tractabit in sequentibus.

Quâ

53 A Quà demittere candens ferramentum conuenit, ut cutem traiciat, non tamē nimis altē: proxima enim est crassa vena, ac nervus, quorum neutrum calefaciendum est.

Crassam venam intelligit nunc eam, quæ per summum humerum fertur ad cubitum (*ἀντία* græcè vocatur) quasi latam vel grandem, cui innectitur coniunctio duorum musculorum propositorum, cuique adiungitur nervus, qui distribuitur in partes cutis, quæ iuxta venam est. Cauendū autem esse, ne in adurendo nervus aut vena attingatur, aperte declarauit, non tamen ostendit, à priori ne an ab interiori parte venæ, vel prorsus super ipsam, adurendū sit. Fieri enim hoc potest, in primis cutem attrahendo, quo modo in ala diximus, dein transuersam adurendo, post hæc instrumentum, quo ad illinendum vtimur, traiciendo, atq; in orbem iterum adurendo. Quemadmodum autem in ala, quamuis sublint nerui maximi, & cum ipsis arteria ac vena latissima, tamē aduri cutem voluit, securitatem subiectarum partium comparans eo instrumento, quo illinimus, demisso, sic in proposita nunc vltione nihil mirum, si cutem venæ superiectam aduri iubeat. illos autem nervos dixit *ἐπιαιροτάτης*, quod vocabulum mutuari solet ad ea, quæ magnam vim habent, quemadmodum illi, q̄ non longè distent à spinæ medulla, & maximè pleni sint. Sed circa venam, quæ ab interiori parte tendit ad cubitū, neruum simpliciter dixit, non adiciens *ἐπίαιρον*: multum enim distat à medulla spinæ, atque exiguus est.


54 Rursus alio loco licet adurere ab exteriori parte multo supra chordam, quæ ad alam est, paulo infra humeri caput. Traiciatur autem cutis candenti ferramento, sed non nimis altē, ignis enim nervus est inimicus.

Venit ad tractandum reliquum ex iis locis, in quibus recipitur humeri caput prolapsum. hic autem est in exteriori parte prioris regionis, in quam semel etiam cōspexi humeri caput venisse. non rectē autem in plerisque exemplaribus legitur /rursus alius locus quem licet adurere à posteriori parte est/, hic enim locus non à posteriori, sed ab exteriori parte commissuræ est. Si quis igitur exquisitè definire loca velit, quæ iuxta humeri commissuram sunt latitudinem habentia, hic profectò omnia intuitus in priori regione mediam dicet esse quandam lineam, sine latitudine conceptam in medio ad vnguem, quæ superne in humeri longitudinem tendat: & vtrinque in latitudinem terminari priorem regionem, ab interiori quidem parte ea vena, quæ ad interiorem cubiti sedem pertinet, ab exteriori verò alia quadam lineâ, quæ distet à lineâ mediâ, sine latitudine concepta, quantum ipsa vena recedit. Hi sunt ergo termini prioris regionis. duo autem alij vtrinque sunt, quæ feruntur chordæ ad alam: vnus interiorem regionem, alter exteriorem finit. eam verò intelligito interiorem commissuræ regionem, quæ est inter venam, & chordam, quæ ab interiori parte alam terminat: sed exteriorem, eam, quæ incipiens à lineâ, quæ tantum distabat à mediâ li-

nea sine latitudine concepta, quantum ipsa vena tendit ad chordam, quæ ab exteriori parte alam finit. Quare iuxta diuisionem hanc quidquid erit superius chorda, quæ ab exteriori parte alæ sita est, non dicetur vtique à posteriori regione commissuræ, sed ab exteriori. siquidem regio posterior in commissura est, quæ latum scapularū os sumum est: inferior in ala continetur: superior verò inter lati scapularum ossis summitatem atque humeri caput.

Porro mederi in tota curatione vlcerebus debemus, videntes, ne multum attollatur humerus, sed modicè, quatenus vlcere curatio postulat, quoniam frigus eò minus adspirabit. Ad ista enim omnia tegenda sunt, non secus etiam moderate curanda: nam sic minus hiant, minus sanguis erumpit, minus nervorum distentio sequitur.

Causas ipse exposuit, cur edicat, ne multum humerus vnquam attollatur, primum, quod vsta omnia tegere expedit, sic tamen, vt curari possint, & non frigeant, quum alioquin (vt ipse testatur) frigus vlcera mordeat, cutem induret, pus fieri in dolore non patiat, ac multo magis in iis, quæ calor excitauit, sicuti nunc ignis /minus (inquit) hiant/ hoc est diducuntur vlcereis oræ. ob id enim frigore magis



- A Linea latitudine carens.
B Humeralis vena.
C Alterum tantum interuallum.
D Posterior pars.
E Interior.
F Exterior.
G Inferior.
H Superior.

magis excipiuntur, & tardiùs sanescunt, grandioremq; cicatricem recipiunt. Quod autem sub- E
dit/minùs sanguis erumpit/ communiter ad omnia vlcera refertur, non propriè ad ea, quæ pro-
posita nunc sunt. nam si quis sic cutem vrat, quemadmodum præcepit, periculum nullum sangui-
nis eruptionis sequetur. fortasse autem nerui tantùm distentione periclitabuntur ob frigus, quod
cute nudati contraxerunt: cuius rei in fine orationis meminit.

- 56 *Vbi vlcera pura sint, & ad cicatricem intendant, tunc sanè oportet humerum diu noctu quæ semper ad latus de-
ligatum continere.*

Ὡς τε ἰατὴς nunc propriè de cicatricibus dixit, non de vlceribus, quemadmodum antè. monet
autem maximè dandam operà esse, ne humerus, nisi paululum duntaxat, à latere diducatur, id q;,
quùm vlcera curantur, quoniam pura vlcera opportunissima sunt illis omnibus casibus, quos in
oratione proximè præcedente narrauit, atque iis præsertim, qui ab exterioribus causis oriuntur.
anteà siquidem sordida erant, atque inflammata, sordemq; & humorem præter naturam supe-
rantem pro velamento ac tegmento quodam habebāt, quin & inflammationis calor extrinseco
frigori oblittebat: at, vbi inflammatio conquieuit, & pura reddita sunt, ac sine superatè humore,
magis quàm ante sentiunt ea, quibus læduntur. Ob hæc igitur omnia faciliè sub exterioribus cau- F
sis ac præcipuè frigidis dolent, & refrigerantur, propter sensum verò acriorem vehementiori do-
lore cruciantur, cui accedunt ea mala, quæ sequi dolorem solent.

- 57 *At vbi vlcera conualuerunt, humerus diu debet ad latus similiter deligari: namque hac via cicatrix maximè con-
firmabitur, atque id spacium, in quod maximè humerus procidit, contrahetur.*

Hic etiam indicauit, quo consilio hæc præceperit, quùm inquit/ namq; hac via cicatrix maxi-
mè confirmabitur, atque id spacium, in quod maximè humerus procidit, contrahetur/ quasi ita
dixerit, quo minor cicatrix inducetur, eo magis alæ cutis contrahetur: quod maximum momen-
tum habet in prohibendo, ne in hanc partem humerus elabatur.

- 58 *Quibus recondi humeri caput non potuit, si adhuc crescunt, humerus non æquè augetur atque is, qui integer est:
sed quàmuis aliquid augeatur, altero tamen breuior redditur.*

Ea nunc persequitur, quæ necessariò iis accidunt, quibus humeri caput suo loco non est. Pri- G
mum ac maximè commune, cui reliqua omnia superueniunt, est, quòd minus alitur: quam rem,
si membrum iam perfectè increuit, gracilitas sequitur: si adhuc augeatur, exiguitas. Non alitur au-
tem membrum ob muscutorum & venarum, quas continet, deprauationem. eius quoq; rei cau-
sa est totus articulus immobilis, nam & integra mēbra, vbi diutiùs omnino immobilia mancant,
apertè graciliora conspiciuntur.

- 59 *Iam verò, "qui à primo natali die humeros breuiiores habent (γαλιόγωνες græcè appellantur) ob duplicem no-
xam id mali experiuntur, vel quod dum in vtero sunt, humeri luxentur: vel aliam ob noxam, de qua postea aliquan-
do scribemus.*

Al. 4. f. 5. c. 1.
c. 9. 478. h.

Dicitur ne sint γαλιόγωνες à similitudine felis (γάλη græcè dicitur), an ab alio quopiam, relin-
quenda quæstio est iis, qui in huiusmodi studia incumbunt. medicum verò scire conuenit nasci
quosdam vtriusq; humeri articulo luxato, dextro & sinistro, sicque humeros breuiiores esse: neq;
ignorare alteram huius vitij causam, de qua tractaturum se pollicetur. Difficile autem est alteram
inuenire, præter illam, quam ipse deinceps ait illis accidere, qui teneri sunt. Inquit ergo.

- 60 *Sed, quibus "tenera adhuc ætate iuxta humeri caput in intimis partibus alte quæ suppurationes oriuntur, omnibus
sanè humeri breuiiores fiunt: ac siue secantur, siue vrantur, siue per se pus aperiatur, scire licet hæc ita se habere. Ma-
ximè verò brachio vti queunt, quibus à primo natali die humeri breuiiores sunt: neque ipsi tamen sursum ad aurem
porrigere brachium possunt, cubito extento, nisi multò minùs, quàm ab integra parte.*

H

A. ibidem.

Potest hoc etiam, dum in vtero sunt, accidere: aliam verò noxam, quæ iis, qui in vtero geruntur,
causa sit, vt articulus elabatur, difficile est inuenire. sed has ambas accidere nihil prohibet: potest
enim, dū infans in vtero est, à natura suppuratio fieri, aperiiri, & ad cicatricē vlcus perducì: quod
magis adhuc euenit, vbi humeri caput elabatur ob humorem infantis naturalem, & quia cauum
commisuræ ipsius humeri tale est, vt faciliè articulum expelli patiatur.

- 61 *Quibus verò ætate iam robusta humeri caput erupit, neq; restitutū est, pars, quæ super commissurā est, tenuatur,
et gracilioris habitus fit. vbi dolore liberatur nō æquè præsclare possunt opera omnia, quæcūq; requirunt, ut cubitus à pe-
ctore*

A Et ore diductus in latera attollatur. Ad ea autē valent quęcunque efficienda sunt humero vel in priorem partem, vel in posteriorem ad pectus adducto: nam terebra, ferra, secure, ac rastro videntur, dummodo cubitum non admodum attollere neesse sit, atque ad alia omnia idonei sunt, quę brachia postulant ita figurata.

His, qui hoc vitio tenentur, pars, quę super humeri commissuram est, protinus etiam inter initia tenuior apparet, & gracilior, quā humeri caput lati scapularū ossis cauum reliquerit: sed et istiusmodi in posterū adhuc ampliū conspicitur, eo quōd procedente tempore emacrescant partes musculi, Δ literā referentis, quōd redditus sit imbecillis, quā sequens humeri caput, vi deorsum feratur ad alam: & quōd immobilis maneat, neque suo munere fungatur, quod erat humerum attollere: quare frigidior & imbecillior redditur, atque emacrescit: quandoquidem labor firmat, ignavia tabidum reddit.

DE SUMMITATE LATI SCAPULARVM OSSIS,
QVA CVM IUGULO CONIUNGITVR

62 B Quibus lati scapularum ossis summitas diducitur, extare videtur os, quod recedit: est autem hæc ligamentum iuguli cum lato scapularum osse. Diuersa autem est hac parte natura hominis à ceteris animalibus. Medici itaq; in hoc casu maximè decipiuntur: excitato enim osse, quod recedit, humeri commissurę pars superior apparet depressa, & caua, ita, vt quasi prociderit humeri caput, prouideant. Noui ergo complures medicos alioquin non ignobiles, qui summo opere læderent, dum niterentur huiusmodi humeros restituere, vt qui luxatos esse extimarant: nec prius desisteret, quā vel rem desperarent, vel indicarent per se non posse humeri articulum restituere. His eadem curatio conuenit, quę ceteris eius generis, nempe ceratum, panni, fasciæ, atque eadem vinciendi ratio: Veruntamen deorsum cogendū est id, quod excedit, tum ea parte plurimi panni inuicendi, maxime quę adstringendum, humerus quę ad latius continendus est, suspensus à parte superiori. Hac enim ratione id, quod recessit, proximè adducetur: quā rem scire optimè licet, atque prædicere, omni periculo vacare, si alioquin tibi videatur: ex hoc enim casu, nec paruum nec magnū in humeri commissura oritur detrimentum, sed aliquid decoris eo loco amittitur: nunquam enim huiusmodi os in naturalem & antiquam sedem reuertitur, sed necessario, siue amplius, siue minus, à superiori parte prominet: neq; enim aliud os vllum in pristinam sedem reuertitur, quod recesserit ab aliquo osse, cum quo naturaliter iungeretur. Paucis autem diebus à dolore liberatur latum scapularum os summum, si commodè vinciatur.

Indicat lati scapularum ossis summitatem esse coniunctionem. dicit etiam ipsam esse os, quo Calligantur proposita ossa ambo. constat autem summitatem lati scapularum ossis esse cartilaginolum os, quod situm est, quā iugulum cum lato scapularum osse committitur, à quo depēdent membranę, quibus extrema ossium colligantur. Hoc, vbi recedat, iugulum etiam sequi consuevit, & idcirco restituitur iugulo deorsum compulso, sic, vt ea parte in orbem quodammodo inclinetur: quo fit, vt in iuuenibus facilius cogatur, nam, quo magis ætas procedit, eo magis corpora nostra siccantur. Ergo, quemadmodum licca ligna minimè idonea sunt, quę curuentur, madentia autem & viridia faciliè id patiuntur: eodem modo & ossa eorum, quę adhuc increscunt, coacta curuari possunt, ac multo magis, vbi rara sint, & cauis plena, quale est iugulum. Equidem experimento sensi iugulum in me ipso curuari: nam, quā vinculi vi vehementer compelleretur, altè vigeat. quod ego pertuli quadraginta dies, quibus iugulum ad humeri caput ita adductum est, vt iis, qui nunc alpicunt, nunquam recessisse videatur: quī quę tunc quā recessit, diductum in teruallo trium digitorū viderunt, rem admirentur. Inde tamen factū est, vt humerus id temporis minimè nutrireretur, ita, vt penitus emacresceret, cūmq; eo brachiū etiam nutrirī delineret. Sed his omnibus, vno vinculi præsidio succurrens, non multo tempore à soluto vinculo totū membrum refeci. In adolescēte autem, ac multo magis in puero, os facilius vinculo cogitur: ego verò, quā did mihī accidit in palęstra, annū agebam trigelimum quintum. nullum tamen alium ex iis, qui firmissima ætate essent, æquē licuit ad sanitatem perducere, eo qd vinculi vim minimè ferrent. Ipse igitur locū sensi frigidum prorsus, sic, vt totum diē ac noctem perfundere calidum oleū cogrer, pelle toto corpori subiecta, super qua nudus iacebā, quā caniculę æstus vigeret. A pedibus igitur inani pelue subiecta pellis ita figurata erat, vt oleum per eam commodè funderetur. quidquid autem in pelui coactum erat, in ollam coniciebatur iuxta ignem, vt calefieret, eo qd inde accepto totus affectus locus perfundebatur. at quā, vel modicum quid aliquando intermittebatur, sentiebam continuò musculos iuxta ceruices distendi, sic, vt aperte cōstaret sequuturam esse neruorum distentionem, si ignauī fuissent, quī perfundebant. Mihī etiam aliud euenit, quod nō parū in causa fuit, vt muscoli malè afficerentur, atq; id quoq; enarrasse operæ precium erit, ne quis existimet malè affici musculos, propterea qd iugulum duntaxat deorsum fuerit coactum. In palęstra enim lati scapularum ossis summitate ducta magister intuitus partem superpositam humeri commissurę, depressam, existimans humeri caput in alam excidisse, intentionem tentat, atque impulsus: quę quidem artificiosè agit. at quā sine vilo profectu operā perderet, arbitror peccati aliquid in impellendo: quamobrē alios adhiberi iubeo, quī cum ipso humerū, & ab inferiori parte,

& à

& à contraria extendant: atque ipse integræ manus digitos, quantum possum, intro demitto ad E humerum, qui excidisse videbatur, ut inditi inter latus & humeri caput, ipsum impellerent: nihil autem inueniens in ala præter naturam, iubeo, ut extendere cessent, qui cum magistro simul vim adhibebant, eo quod humeri caput non procidisset. hi verò existimantes me fracti animi ob dolorem esse, hortantur, ut sibi me ipsum committam, nec ab extendendo desistunt, ita, ut musculum auullissent (quæ res aliis iam accidit) nisi forte alter aduenisset, qui optimè nouerat me nullo modo ob mollitiem extendentes prohibere. hic eos remouet, ac me rogat, quid mali sit, quid que faciendum censeam. respondeo summitatem humeri diductam esse, opus autem mihi esse oleo, lintheis, lana. eo igitur ad balneum, multo que oleo perfusus maneo in labro, quoad possum, dum, quæ ad curationem facerent, afferrentur. Quare musculis assidua perfusio necessaria fuit, quum malè affecti ea ratione fuissent. multi autem vinculum non sustinent, etiam si id non accidat, sed malunt in posterum, quæ ex eo malo molestia sequitur, ferre, quam id quadraginta diebus sustinere: neque enim breuiori spacio consequi eos posse existimo, ut iugulum ita exquisitè curuetur. Reliqua Hippocratis verba plana sunt.

DE IUGULO FRACTO

F

- 63 Iugulum comminutum, si ex toto fractum sit, facilius curatur: si in longitudinem, ægrius: hæc autem contraria sunt, atque aliquis existimet. Id igitur, quod ex toto fractum est, magis utique in suam sedem compelli potest: ac, si summa cura provideatur, quod sublimius est, magis deorsum cogetur idoneo habitu, ac debito vinculo: quamuis autem ex toto in suam sedem non collocetur, tamen ea pars, quæ excidit, non valde acuta apparebit. At quibus in longitudinem frangitur, simile vitium est, atque ubi ossa diducuntur, de quibus supra tractauimus: non ita enim in suam sedem restituitur, extans quæ ossis extremitas aspicitur admodum acuta. In vniuersum autem scire conuenit, nihil humeri commissuram aliam, ne partem lædatur, quum iugulum frangitur, nisi (quod rarò accidit) corrumpatur.

Ex toto frangi dicit, quod nulla parte heret: cuius contrarium est, quod non ex toto abrumpitur. Id vno modo fieri expressit, quum inquit /si in longitudinem, ægrius/: simul quod demonstrauit, quod ex toto abrumpitur, transuersum abrumpi: quod non ex toto, in longitudinem. ergo, ubi ex toto comminuitur, partes cedere inter se plerumque solent, atque vna sursum ferri, altera deorsum, tum altera in interiora, in exteriora altera. qua de causa videtur fractura grauis, & ægrè sanabilis. Verum altero modo, quum fractura in longitudinem est, leuior quidem apparet, ægrius tamen curationem admittit: nequit enim iugulum fasciæ excipi in orbem, sicut membra: qua via duntaxat propelli, atque adduci posset, quod in longitudinem fissum est. Quod si hæc, quæ nunc ostendimus, in memoria habeantur, nihil obscurum videbitur ex iis, quæ ab Hippocrate in sequentibus ponuntur.

- 64 Iuguli fractura deformitatem affert: deformitas autem principio maxima est, deinde minor.

Satiùs fuisset dicere /minus apparet/. principio enim rei nouitate deforme vitium videtur: procedente tempore, sicut alia omnia, quibus assuescimus, ita deformitatem paruifacimus.

- 65 Sanescit autem cuius iugulum, atque alia ossa, quæcunque rara sunt, quoniam callo hæc maturius obducuntur. Igitur, ubi casus recens est, ægri solliciti sunt, putantes malum grauius esse, quam sit, medici autem sedulos in probe curando se exhibent: procedente tempore laborantes, ut qui non doleant, neque ingressu, neque cibo prohibeantur, rem contemnunt, at medici, ut qui locum reddere decorum non possunt, se subducunt, neque offensorum negligentiam iniquo animo ferunt: interim callus festinat crescere. Deligandi autem ratio ea conuenit, quæ plerisque, cerato, pannis, fasciis mollibus, adhibitis. Hæc autem prouidisse oportet, atque item nouisse in hac præsertim curatione, plurimos H pannos, quæ os extat, obuicendos esse, ac fascias plurimas, ibi quæ maxime premendum. Non nulli existimarunt plumbi aliquid alligandum, quod oneri esset, ut deorsum cogeret, quod extaret. Fortasse autem nec illi sapiunt, qui simpliciter vinciunt, quandoquidem neque propositus modus fracto iugulo conuenit: nihil enim ferè cogere potest, quod excidit. Sunt & alij, qui cognoscentes vincula ipsa aliena esse, neque in naturalem locum adducere, quod extat, deligant quidem eiusmodi ærotantes pannis fasciis quæ superdatis, perinde atque alij: sed hominem fascia aliqua cingunt, qua parte commodissime cingitur: ubi pannos obiecerint, quæ fractura extat, sic, ut ea parte in tumorem assurgant, caput fasciæ ad cingulum à priori parte deuinciunt, fasciam quæ e regione iuguli porrigunt ad partem posteriorem, & in cingulum demissam ad priorem adducunt, atque inde rursus ad posteriorem. Alij fasciam in cingulum non demittunt, sed inter anum & naturale: tum iuxta anum ipsum, dein circa spinam ducentes, sic fracturam comprimunt. Hæc, quum ab eo audiuntur, qui usum non habet, prope videntur secundum naturam esse: at, ubi quis ea experietur, inutilia comperiet, neque enim aliquod tempus immobiles manent, etiam si homo cubet, quanquam hoc modo proxima essent: tamen si cubans crus flectat, aut ipse curuetur, omnes fasciæ movebuntur: præterquam quod hæc vincendi ratio alioquin fœda est.

Causam ipse adiungit, quamobrem hæc celeriter sanescant: sed cur callus maturè increseat, causam

A causam non expressit, ut quæ ex natura ossium, de quibus tractatur, percipi possit, quoniã in his, quæ rara sunt, multum humoris contrahitur. In prioribus autem demonstrauimus, recepto humore ob affectu ossis vim spissato, in oris fracturæ callũ incrementum, qui vbi latus incrementum, ita latus oris illigat, atq; adstringit, neq; enim os altioribus partibus solidatur, quod admodum cito, sed (ut dictũ est) in summo, quali vinculo adstringit. Quæ sequuntur, si diligenter considerentur, oĩa plana sunt.

66 Siquidem anus comprehenditur, sicut & q; in hac loci angustia colliguntur. Quod dicitur a latius fasciis peruenit, quæ in zonam induuntur, non ita arte hæc cingitur, quin sursum ferri cogatur: quod vbi angustia, nec efficitur, nec vinculum relaxari. Proximè autem moliri quis sibi videbitur, quamuis nihil magnum efficiat, si fascias non nullas in cingulum demittat, sed plerumque ad primum vinculum adhibeat: hac enim ratione maxime stabiles erunt, & alteri circuitui aliter auxiliabitur. Plurima quidem dicta sunt ex his, quæ ad inguli fracturam attinent. Scire autem loci, ingulum plerumque ita frangi, ut ea pars, quæ a pectore est, sursum foratur: quæ a summitate latus scapularum est, deorsum: cuius causa est pectus, quod neque admodum sursum, neque admodum deorsum mouetur.

Locum angustiam dixit *σπινθη*, quod nomen (ut quibusdam placet) nõ componitur ex vocabulis *ὄρη*, *σπινθη*, & *χώρας*, quæ significarent humidum, angustum, locum, sed deducitur à voce *σπινθη*, quæ nihil amplius sibi vult, quam *σπινθη*, quod significat angustum, unde quadam additione (quam figuram *παραγωγήν* dicunt) deducitur *σπινθη*, quæ nihil aliud sibi vult, quam angustiam, quod ex his euidenter colligitur, quæ Simonides sic scribit *ἡ τὴν σπινθη ἀπὸ τοῦ ἐν ὕψει αὐτῆς λέγειται λιν, ὅδ' ἐπὶ τὰς ἀλὶν μὲν ὅς σπινθη συντυχανεὶ τὰς ἀλὶν*. enertur autē secunda syllaba tenui spiritu.

67 Exiguus enim est motus articuli, à parte ossis pectoris.

Exiguum motũ vocauit *κίχλις*. At siue vocabulum sumatur à motacilla aue, quæ græce *κίχλος* dicitur, eo qd assidue caudam moueat, siue à quouis alio, non pertinet propriè ad hunc locum: sed magis persequi causam oportet, cur communis iuguli cum pectore, quamuis sicut aliæ non nullæ referri inter minimas non debeat, tamen nihil ferè moueatur, sed quã huius rei causam Hippocrates tradat, audiamus de verbis ipsius. Os pectoris *σῆθος* appellat, quo nomine significasse nunc videtur, non omne id, quod est à priori parte thoracis, sed medium os, in quod se inferunt costæ, quod græcè à iunioribus medicis *σέρπον* vocatur, de quo rectè dixit,

68 C Ipsum enim os pectoris sibi continuatur, & spinæ.

Os pectoris sibi ipsi cõtinuari manifestissimũ est, sed & spinæ etiam, liquidò constabit, si qñ in cadauere detracta carne costas videris à posteriori parte, spinæ a priori, ossi pectoris, inherere.

69 Sed & iugulum prope humeri articulum supernatat. Cogitur autem moueri sepius, eo quod cum summitate latus scapularum ossis iungatur. Maxime autem, vbi perumpitur pars, quæ ab ossi pectoris est, sursum fertur, neque facillè solet deorsum repelli, quoniam natura leuis est spacioum quæ ipsi latus patet a superiori parte, quam ab inferiori: latus vero scapularum os, humerus, & quæ his inheresiunt a costis & ossi pectoris, optime soluantur: quamobrem possunt plurimum attolli, atq; demitti. Itaq; vbi iugulum frangitur, ea pars, quæ est a latus scapularum ossi, deorsum cõuertitur: facilius enim deorsum fertur una cum humero ac latus scapularum ossi, quam sursum. Quando igitur sic se res habet, decipiuntur, qui censent posse, quod super excedit os, deorsum compelli: namq; in aperto est inferiorem partem ad superiorem adducendam esse, ea siquidem mouetur, ea a naturali sede recedit: cõstat autem hanc aliter nullo modo propellè posse, vincula enim nihil magis adducunt, quam repellunt. Si quis autem humerum, ad latus, quantum potest, adductum sursum attollat, ut humeri cõmissura maxime acutam se ostendat, hoc pacto concurret cum ossi pectoris, a quo recedit.

Solet Hippocrates quasdam figuras ac linguarum proprietates vsurpare, quamuis consuetam locutionem sequatur. Simile quid apud Xenophontem legitur, ipse enim, si quisquam est, qui vltima locutione vtatur, in his nomen profiteri suũ. sepius tamen inserit vocabula lingue propria, ac translata: quod rariùs apud hunc, frequentius apud Hippocratem reperitur: quem admodum in præcedentibus verbis, vbi *κίχλις* dixit paruum motum, nunc verò, *πλεονεκτεῖς*, quod supernatat, id autem quasi sine fulcro significat: cuius rei testimonium facit, quod subneit, quum inquit/cogitur autem moueri sepius, eo qd cum summitate latus scapularum ossis coniungatur/, at summitas latus scapularum ossis rursus ob humeri articulum sepius mouetur, quum ipse imbecillis sit, & maximus motus. Initio verò sermonis /propè/ dixit, dubium autē est ad locũ ne, an ad rem debeat referri: vel enim accipimus, præpõnens, frequenter iugulum moueri, quã sententiã magis probo: vel (ut quibusdam placet) /propè/, referimus ad frequentē motũ, ita, ut mens eius sit, iugulũ maxime propè accedit ad ea, quæ iniquitate mouetur, quum humeri articulo iungatur.

70 Si quis igitur legitimum vinculum adhibeat, ut celerrimè sanetur, nec omnia extra huiusmodi habitum superuacua existimet, rectè utique sentiet, celeriter quædam sanantur, etiam in adueritatem perducti, quom iacere maxime ad rem pertinet, satis quæ sunt quatuordecim dies, ut sanentur.

Septima Clauis

LLLLLL

Legitimum

Legitimum vinculum appellat, quod omnibus in consuetudine est, ac iam est veluti lex quædam non scripta. sic enim & in vita fit, vt quos mores, omnes student, legibus similes sint. Vinculum igitur quod ad fracturas pertinet, huc non admodum accommodatur, atq; idcirco fusiùs de ipso scripsit in primo de fracturis: hinc autem nullum vitium exponitur, ad quod eiusmodi vinculum adhibeatur. Ostendimus enim in commentarijs in eos libros, & nunc etiam in memoriâ redigemus, morbos omnes, quibus accommodatur id vinculum, quod ad fracturas pertinet, traditos fuisse ab Hippocrate in eo volumine: in hoc autem omnes, qui alteram vincendi rationem postulant. Porro autem in eo vinculo, quod ad fracturas pertinet, fascia super affectû membrum in orbem circundatur, sed in altera vincendi ratione fertur ad alias partes, ac plurimum ad eas, quæ vitiatæ sedi contrariæ sunt: quod in libro de officina medici testatur, cum inquit, Consentit autem cum capite humeri fascia ad alteram alam demissa.

- 71 Si in iuguli fractura (quod rarò accidit) contrarium eueniat, vt scilicet id ossis, quod à pectore est, subiiciatur id, quod à summitate lati scapularum ossis sublimius feratur, ac super alterum excedat, nullo magno præsidio opus est: demisso enim lato scapularum osse, cum humero, rectè ossa inter se concurrent: ac quæuis ratio vincendi satis erit, & callus paucis diebus increset.


In superioribus quidem demonstrauit, vbi totum iugulum transuersum abrumpatur, ferè quod à pectore est, sursum conueriti: quod à summitate lati scapularum ossis, deorsum. nunc eum modum persequitur, qui rariùs accidit, sub quo ea pars iuguli, quæ est à summitate lati scapularum ossis, sursum fertur, quæ à pectore demittitur: atq; hic (vt ait) faciliùs sanescit. nam demissa summitate lati scapularum ossis, simul etiam demittitur ea iuguli pars, quæ ipsi continuatur, sic quæ alteri equata illigatur, curatur quæ.

- 72 Quod si non comminatur hoc pacto, sed ab hac vel illa parte in latere erumpat, in suum locum collocandum erit, lato scapularum osse: nam cum humero excitato, quem ibi notauimus & in superioribus explicauimus: vbi restitutum fuerit in pristinum statum, reliqua curatio celerime perficitur. Plurimque igitur, cum partes inter se cesserunt, ipso humero sursum co.æctore restituitur.

Quod ab ipso nunc proponitur, accipere debemus in osse, quod in interiorem vel exteriorem partem prolabitur. intellige nunc, quam dico interiorem partem, eam, quæ altè sita est in corpore: exteriorem, quæ in superficie ad cutem.

- 73 Vbiq; autem, quod à superiori parte est, in latus vel in inferiorè partem veniat, cõmodè restituitur, si homo resupinetur subiecta aliqua re inter scapulas, quæ attollat sic, vt pectus quam maxime recuruetur: aliquis item humerum iuxta latus extensum sursum adducat: medicus verò altera manu ad humeri caput data prominentiori palmæ parte repellat, altera quod diductum est, componat: sic enim maxime in naturalem sedem restituet. Sed (sicut iam diximus) superius os deorsum ferri maxime solet. Plurisque, vbi alligati sunt, conuenit ita figurari, vt cubitus iuxta latus continueatur, sic quæ humeri caput excitetur.

- A Æger supinus collocatus.
B Pulvinus inter scapulas subiectus.
C Alter brachium à coltis diductum attollens.
D Medicus fracta ossa componens.



Vbi ea pars iuguli, quæ cum pectoris osse cõmittitur, vel in latus, vel in inferiorè partem prorumpat, tunc aut cõmodè restitui, si homo resupinet, subiecto inter scapulas iuxta spinam puluino, seu cervicali, siue tali quopiam, vt hac via thorax totus recuruet. hoc autem expressit vocabulo περιρρηδης, quod poeta est vsurpauit, quum inqt,

Περιρρηδης δὲ τραπεζῇ κατέπεσε. Homine igitur ita figurato, præcipit, vt medicus altera manu humeri ad latus adducti caput in exteriorem partem repellat, sic enim diductæ iuguli partes plurimum inter se recedent, recuruato pectoris habitu multum ad eam rem cõferente: altera manu componat, atque in vnum adducat diductas iuguli partes. humerum verò iuxta latus sursum compelli interdum fatiùs esse in sequentibus adscribit.

Sed

74 A Sed quibusdam (vt narrauimus) debet humeri caput sursum urgeri: cubitus autem ad pectus adduci: manus vero ad summitatem lati scapularum ossis ab integra parte porrigenda est. Quod si homo cubare non recuset, aliquid imponere conuenit, quo fulciatur, sic, vt humeri caput maxime sublime sit: at si inambulet, fundam a cervicalibus suspendere ex fascia oportet, quæ cubiti eminentiam complectatur.

Hæc figurandi ratio efficit, vt humeri caput in exteriorem partem compellatur, cum quo adducitur & iuguli pars, quæ summitati lati scapularum ossis adiuncta est. Sed eiusmodi habitu inquit ferè opus non esse, quod superiori satis restituatur, sub quo humerus iuxta latus extensus adducebatur, cubito ibidem collocato, non quemadmodum nunc pectori superimposito. Abstinere igitur debemus ab imponendo cubito super pectus, non quod hic habitus priori sit deterior, sed quod per illum duntaxat, pleraque præstari possint, quæ ad reponendum idonea posita sunt. Quo modo, si res non succedat, ad habitum transibimus secundo loco ostensum.


GALENI IN HIPPOCRATEM
DE ARTICVLIS
COMMENTARIUS SECVNDVS

Vido Vido Florentino interprete

ARGVMENTVM LIBRI

Agit de reliquis Manus articulis: de Faciei malis, ac maxillis: de Naribus & Auribus curandis: cum luxata vel fracta fuerint.

DE CVBITO



Vbi articulus, vbi paulum dimotus suo loco excesserit, vel ad pectus, vel in partem exteriorem, maneat q; pars eius acuta in cavo humeri, recta extendere oportet, & quod extat repellere, atque ad latus urgere. At vbi toto loco motus fuerit in hanc vel illam partem, idẽ extendendi modus aptatur, qui fracto humero, cum deligandus est: sic enim curua pars cubiti non impedit: maxime vero versus costas erumpit. Restituitur autem plurimum reductus, ne humeri caput attingat cubiti processum: ita autem collocatus vt non hæreat, circumagitur ac circumflectitur, non recta cogitur: eodem que tempore vtrinq; in contraria compulsus in suam sedem restituitur. Expediit & cubitum nunc pronum, nunc supinum conuertere. In curatione ita figurare brachium oportet, vt manus paulo sublimior cubito habeatur, humerus vero ad latus: sic autem & suspensum & collocatum natura & vsui comodum erit, modo callus non male crescat: crescit autem celeriter. Linthea vero adhibenda eo modo sunt, quo articulorum ratio postulat, vt pars quoque acuta adligetur. Malum autem luxato cubito maxime recrudescit febre, dolore, vomitu puræ bilis: præcipue cū in posteriorem partem exciderit, quod cartilaginosa sit: deinde cū in priorem: sed curatio eadem est. Vbi in posteriorem partem prolapsus reponitur, recta extendere oportet: signum autem sic prolapsi est, quod homo extendere brachium nequit, nam vbi in priorem venit, sic extendere non potest: tunc autem durum aliquid implicitum conuenit inuicere, & cubitum porrectum plurimum repente circa ipsum flectere. Diducta autem ossa intelliges, vbi eam partem tangas, qua vena in humero diuiditur: sed hæc celeriter callo circundantur. Ossa autem à primo natali die breuiora sunt, præsertim quæ proxima sunt cubito, deinde quæ manui, tum quæ digitis. Humerus autem & scapula propter motum validiora euadunt: sed & alterum brachium propter opera validius est.

Minuitur caro vbi in exteriorem partem venit ab interiori, alioquin à contraria illi, in quam venit. At vbi cubitus in interiorem vel exteriorem partem prolabitur, distentio ita adhibenda est, vt cubitus ad rectum angulum cum humero collocetur. Attollere autem alam oportet fascia subiecta, & cubitum super rem aliquam collo-

- A Alæ subiecta habena.
B Manibus depellens.
C Medicus articulum pal-
mis coaptans.



Septima Classis.

LLLLLLL ij care,

care, ac iuxta articulum graue aliquid appendere, aut manibus deorsum vergere. Suspenso autē articulo necesse est pro- **E**minentioribus palmarum partibus adurgere, quemadmodum in manibus. Hæc figura conuenit dum deligatur, dum suspenditur, dum collocatur: Vbi in posteriorem partem subito extendere oportet, & prominentioribus palmarum partibus in suam sedem compellere, quod similiter seruandum est in alus reponendis: Vbi in priorē imposito linteo in parte speciem inuoluto flectere simul, & reponere necesse est: quod si in alteram partem vergat, cum reponitur, ut cuiusque fieri debet. Figura autem, quæ communiter aptatur, cum reponitur, & cum deligatur, idonea esse etiam potest, cum distenditur, ita, ut in omnibus communiter requiratur. Quod spectat ad modos reponendi, reponuntur alij suspendendo, alij distendendo, alij circumducendo: quæ celeriter finit, ubi figuræ in hanc vel illam partem excedant.

DE MANU

- 2 **Manus autem articulus in interiorem, vel exteriorem partem promouetur: sed maxima ex parte in interiorem.** Manifestū indicium, ubi in interiorem, quod curuari: ubi in exteriore, quod porrigi digiti non possunt. In restituendo collocatur digitus super scammū, & in diuersas partes distendantur: quod extat ex osse vel prominentiori palmarum parte, vel calce simul repellatur, & in anteriore & inferiorem partem vergatur: sed ab inferiori iuxta alterum os, pila aliqua mollis subiciatur, manui pronæ, ubi à superiori est: supinæ, ubi ab inferiori. Curatur autē linteis. Prolabitur tota manus vel in interiorem, vel in exteriorem partem, vel in hoc aut illud latus, maximè autem in interiorem. Pro **F** mouetur aliquando & appendix: aliquando & alterū os diducitur, tunc autem vehementer extendere conuenit, & quod extat repellere: reliquum verò à contraria parte adurgere, duobus modis retrò, & ad latus, vel manibus super scammū, vel calce. Maximè autē recrudescunt & deformitatem afferunt, tempore tamen confirmantur, ita ut vsui sint. Curatio autē lintea postulat, quæ ad manū & cubitum pertineant: tum ferulis, quæ vsque ad digitos accommodentur. Alligata autē scrulis sæpius resolueri oportet quàm fracturas, & vberius manere. Verū à primo natali die breuior fit manus, & minuitur maximè caro à parte contraria illi, in quam os venit: ei verò qui iā adultus est, ossa manent.

- A Extendentes in diuersa.
B Medicus palmis os eminens retrudens.
C Inuolucrum molle alteri ossi subiectum.



Seçt. I. L. T.
251.e

DE DIGITIS

Digitus articulus, ubi excidit, in aperto est. Restituitur recta distendendo, tum quod extat repellendo, & in contrariam partem adurgendo. Curatio fasciis & lintea postulat. Nisi restituatur, callo extrinsecus circumdatur. Luxata autē ossa uel à primo natali die, vel ei qui adole scit, ab inferiori parte breuiora euadūt, et caro minuitur, à contrario illi in quā prolapsa sunt, sed iā adulto manet. **G**

Maxilla "paucis hæctenus toto loco mota est.

A. li. 4. f. 5. l. i.
C. 2. 478. d

Qui operā dant corporibus incidendis γνάθον dicunt eam partē, quæ genis subiecta est: genas verò, quæ μῆλα vocant, eas, quæ leniter rotundæ in facie prominēt. Quemadmodum igitur Hippocrates dixit, articulum autē latiscapularum ossis, pro articulo, qui cum lato scapularum osse committitur, sic nunc maxillæ articulum intellexit, quū maxillam ait, quam γνάθον appellat. Sic etiam poeta dixit, Κόπτων ἀμφοτέρησι χαμαὶ δ' ἀπαντας ὀδόντας, Ἰνῶθων ἐξελάταμι σὺός ὡς ληϊβοτήρην.

ubi videtur appellasse γνάθους, malas & maxil

xillam, quas ipse etiā Hippocrates in sequentibus γνάθους nominat. Atque hæc de vocabulo, cur **H** autē scripserit paucis maxillam toto loco moueri, ipse deinceps docebit. animum igitur adiūgito.

- 5 **Os enim, quod à malis procedit, cum eo coniungatur, quod ab aure, hoc autem maxillæ capita excludit: quorum unum à superiori parte situm est, alterum subiectum.** Item ex maxillæ capitibus unum quidem ob longitudinem nō facile expellitur, quod rostro simile, iugale os excedit.

Antea quoque diximus in expositione libri de fracturis, & in primo cōmentario, si quis nō intelligit, quæ ita clarè ab Hippocrate exponunt, huic opus esse monstratione ossiū, præcipuè hominibus, vel certè simiis. fatius autē est nō tūc, cum liber legitur, sed prius per oculū ossa inspicere. Diximus itē scriptum fuisse à nobis librū de ossibus ad eos, qui primas institutiones addiscunt, in quo antè exerceri melius est eū, qui percepturus est, quæ ab Hippocrate scribuntur. Atqui, ut in superioribus scripsi, sic etiā nunc faciā mediā quandam doctrinā, inter eam, quæ conuenit iis, qui inspexerint, & eā, quæ iis, qui non inspexerint. Hoc enim pacto, qui inspexerint molestie sermonis longitudinē non ferent: qui nō inspexerint quasi descriptionē quandam habebunt exquisitæ cognitionis, quæ haberi nō potest, nisi ossa ipsa inspiciant. Intelligito igitur ex partibus oris, quæ dētes continent,

A continent, eam, quæ mouetur, esse maxillam: quæ immobilis est, malas: in utroque item osse dentes contineri, tam magnitudine, quàm numero, inter se æquales. Procedit autem à malis os tenue continuatum illi osi, quo continetur angulus oculi temporibus propior. cum hoc alterum os necitur, in quo situm est foramen auris. quæ verò cœunt hæc inter se, commissura sit futurae similis. Hoc igitur os, quod malas capiti annectit, ab iis, qui incidendis corporibus operam dederūt, iugale os appellatur: quandoquidem & ipse Hippocrates coniugatur, inquit, ostendit duo ossa inter se coniungi, quasi iugo subiecta. huic autem iugo cauum subiectum est non mediocriter, in quod se inferit alterum maxillæ caput, quod rostrum refert. hoc & foeminino genere *κορωνν*, & neutro *κόρωνον*, græci appellant. Iuxta hunc processum maxilla quoque alterum exigit, per quem cum capite prope aurem committitur. Sed hic breuior est, alter multo longior. vterque distinguitur iugali osse, quod medium inter vtrunque situm est, longiori humilius, breuiori sublimius. utrosque maxillæ processus Hippocrates nominauit capita, quum inquit hoc autem maxillæ capita excludit hoc est, diducit, separatque inter se, alterum ab inferiori parte, à superiori alterum. Constat igitur pro cedere maxillam non posse, nisi processus rostro similis iugali osse humilior demittatur. at non propterea simpliciter luxabitur, vbi illud accadat, aperto enim ore in suum locum reuertetur. Ad hoc igitur, vt luxetur, necesse est reditum prohiberi, eo quod ipsa in latus conuertatur. Recte igitur in sequentibus inquit luxari autem non potest, nisi ore vehementer aperto in latera conuertatur: neque enim ferri potest ipse processus infra os iugale. priusque maxilla à malis plurimum diducatur, quod accedit, vbi homo maxime hiat: neque reditu in suam sedem prohibetur, nisi in latus conuertatur. Ægre igitur prolabitur & ob hæc, & ob musculorum robur, quibus ad superiores partes alligatur, de quibus agit proximis verbis.

6 *Iam verò ab utraque harum summitatum neruosa oriuntur chordæ, quibus musculi illigantur, qui κοταφῖται, & μασσητήρες dicuntur.*

Quæ ante *κοταφῖται* id est capita maxillæ vocauit, nunc *ἄκρια* id est summitates appellat, ab vtriusque inquit neruosa chordas oriri, quas *τένοντας* vocat. solet autem sic appellare eas musculorum extremitates, quæ græcè ab iis, qui versantur in corporibus incidendis *ἀπονεύουσαι* nuncupantur. Semper autem magis neruosa sunt, quàm medius musculus: verum inter se differunt, eo quod aliæ naturam magis neruosam habeant, aliæ minùs. vbi carnosâ natura plurimum abundat, musculi extremitatem carnosam vocant, contra vbi neruosa superat, neruosam. nunc quia neruosa magis sunt, quàm carnosæ, iure dixit ab utroque horum capitum neruosa chordas oriri: innecti enim inquit summitatibus maxillæ musculos, qui *κοταφῖται* & *μασσητήρες* nuncupantur. Sed incertum est, num eosdem musculos his vocabulis appellet, an alios esse velit *κοταφῖται*, alios *μασσητήρας*, quoniam, qui post Hippocratem versati sunt in corporibus incidendis *κοταφῖται* vocant eos, qui à temporum ossibus oriuntur, quos vbi intenduntur, claudere & contrahere os aperte videmus: eos verò, qui maxillæ, quæ latefcit, illigantur, vtrinque scilicet vnus, *μασσητήρας* nominant, eo quod in mandendo maxillam circumagant: quod efficere non amplius possunt, qui à superiori parte oriuntur, hi enim sursum solummodò ipsam adducunt, non tamen in latera mouent. Quocirca ipsis opus est in contrahendo ore, non secus etiam, vbi prioribus dentibus aliquid mordentes abscindimus, vel vbi comminuere aliquid caninis volumus. Sed, vbi cibum, vt contundamus, cōteramusque, super maxillares imponimus (quæ actio *μάσσησις* græcè dicitur) musculi tunc suo munere funguntur, qui maxillam, cui illigantur, quæ latefcit, in latera mouent. Probabile igitur est hos musculos appellari *μασσητήρας*: eos verò *κοταφῖται*, qui à musculis iuxta ossa temporum (quæ græci *κοταφῖται* dicunt) oriuntur, qui & neruosa chordas continent, maxillæ summitatem rostro similem circumagentes. Atqui conditum est in ore par aliud musculorum, qui superne ab osse, quod ab alarum similitudine *πτερυγοειδές* vocatur, & à toto sinu iuxta posito oriuntur. iunguntur autem maxillæ, ea potissimum parte, vnde processus ad commissuram fertur. perueniunt autem hi musculi ad eos, qui *μασσητήρες* dicuntur, qui quæ (vt dixi) maxillæ inhaerent ab exteriori parte, quæ latefcit, quum ab interiori parte duo, qui propoliti sunt, vtrinque vnus, maxillæ, quæ latefcit, comprehendant. Ergo, quum Hippocrates ait iam verò ab utraque harum summitatum neruosa oriuntur chordæ, quibus musculi illigantur, qui *κοταφῖται*, & qui *μασσητήρες* dicuntur: constat nullo modo loqui de musculis, qui ab exteriori parte maxillæ superiniiciunt, sed duo musculorum paria indicasse, eos scilicet, qui euidenter ab extrema fronte oriuntur, & eos, qui iuxta sinum ossis *πτερυγοειδές*: hi enim alterum processum attrahunt, quem inferi in commissuræ cauum diximus: sed alterum musculorum par, quod (vt retuli) maxillæ extremitatem rostro similem in orbem amplectitur, rursus ipsos maxillæ processus sursum ad caput adducit.

7 *Et propterea vocantur, ac propterea mouentur, quod inde illigantur.*

Quum propositos musculos dixerit nominari *μασσητήρας*, causam reddidit, cur ita appellerent.

Septima Classis.

LLLLLLL in inde

IN LIB. HIPPO. DE ARTIC.

inde enim illigantur, hoc est, maxillæ summitatibus: propterea mouentur, quum mandimus, & Ε
μασσητήρες vocantur.

8 Nam, quum edimus, loquimur, aut aliter ore utimur.

Maxilla solum modo mouetur, quum à malis ipsam reducant priores duo ceruicū musculi, cum q̄ μασσητήρες illam adducant. Iure igitur euidenter mouentur, quum ei ossi, quod maxime mouetur, illigentur. Dicti autem sunt ob huiusmodi motum μασσητήρες, à mandendo, quæ maxillæ actio valentissima est, leuiter enim mouetur, dum loquimur.

9 Male quidem quiescunt: innectuntur enim capiti, sed non insinuantur ut articuli: at maxilla mouetur, ut quæ articulorum modo cum malis & capite committatur.

Verbum /innectuntur/ συνήρτηας di cit. non nulli scribunt συνήρθρωται, id est iunguntur, propterea q̄ Hippocrates ait συνάρθρωσιν esse iuncturam ossium, interdum eorum, quæ vix, interdum eorum, quæ nullo modo moueri videntur: sicut διάρθρωσιν naturalem commissuram ossiū, quæ aperte mouentur. In propositis autem verbis commissuram articulorum ἀσάρθρωσιν vocat, quod idem notat ac διάρθρωσις liquidem & ἀπὸ θρωσίν & ἰσθμῶσιν σημαίνει. F

10 At quamobrem neruorum distentionis, rigoris quæ, hic articulus primus indicio sit, ubi contrahitur: & quam obrem plagæ in temporum musculis graues sint, & stuporem inferant: alibi explicabimus.

Paucis persequi rem potuit, quoniam hic articulus ad neruorum initium propius accedit, primus neruorum distentionem concitat, plagas quæ habet stuporem inducētes, nescio autem quo pacto reseruentur, fortasse voluit in scribendo demonstratione uti, mentionem faciens neruorū, qui à cerebro ad hos musculos perueniunt, quod necessarium nō fuit, in proposita doctrina, atq̄ deinceps in alium locum, perfectum sermonem distulit.

11 Atque hæc causæ sunt, cur non admodum prolabitur.

Sed quæ nam sunt: nempe non alia, q̄ quæ dictæ sunt, quarum duplex est caput, natura ossiū (vt narraui) & robur musculorum.

12 Illud etiam in causa est, quod nulla ferè in edendo necessitas est, quæ cogat hominem aperire os, vltra quàm possit: luxari aut aliter maxilla non potest, quocumq̄ figeretur, quum cum ore vehementer aperto in alterā partē conuertitur. G

Preter duas superiores causas, quæ efficiunt, ut maxilla raro luxetur, tertiā adscribit, scilicet nisi plurimum os aperiatur, luxari minimè posse. Verum non sepe fit, ut nobis opus sit ore plurimū aperto: quandoquidem eiusmodi actio duplici vsui accommodatur, vel vbi volumus ore magnæ molis quidpiam apprehendere, vel vbi quàm maxime hiamus: quorum illud raro accidit, hoc de liranibus duntaxat. Quod & aliquando accidisse vidimus Plutio Placino, cum quātum poterat, os aperiret, deinde maxillam in latus deduceret. cōsueuerat autem sic subinde figurari, ac tanquā egregium factum, vltro semper hiare amplius conabatur.

13 Veruntamen illud etiam efficit, ut maxilla excidat, quod ex omnibus neruis ac musculis, qui iuxta articulos sunt, vel non longè ab articulis, quibus illigantur, quicunque in vsu frequenter dimouentur, dum extenduntur, maxime idonei sunt, qui extensi sequuntur, perinde atque coria, quæ, quum optimè mollia sunt, plurimum extendi possunt.

Quod ad propositas causas attinet, necesse est maxillā vel nullo modo, vel raro admodum, luxari. Videtur tamen res aliter habere, excidit enim raro, at nō adeo, ut permulti nostrum eiusmodi casum non viderint, quod in iis euenit, quæ sunt rarissima, eo enim q̄ eiusmodi commissura multum mouetur, musculi nerui quæ ipsius tenduntur, & opportuniore sunt, qui extendantur, H q̄ quibus raro motus opus est: quemadmodum (ait) & coria εὐδελήτοτατα, hoc est, optimè mollia, plurimum extendi possunt: quoniam poeta verbum δελήν mutuatur ad significandum mollires, quum inquit κηρὸν δελήσας μελινδέα.

14 Ergo (quod propositum erat) maxilla raro excidit, mutatur tamen subito sepe, quum homo hiat, ut compluribus aliis musculorum, neruorum quæ motionibus accidit.

Mutatur subito dixit σχᾶται, quod verbum quid significet, intelligemus, si ea, cum quibus in oratione coniungitur, animaduertamus. inquit enim /ut compluribus aliis musculorum, neruorum q̄ motionibus accidit/, quare σχᾶται vitium est neruorū ac musculorū articulo non erūpente. Quid nā hoc vitij sit, aperit, quum inquit /motionibus/, voluit enim ex naturali situ in alterū mutari, id q̄ subito, idem & paulò post indicat significari verbo σχάσαι, quum ait /dein subito mutare ad tres habitus simul consilio directo/, vbi mutare dixit σχάσαι, hoc est, subito mouere priorē habitum, adde, quod nunc etiā in Co, ac ferè in omnibus Græcie ciuitatibus, σχαστηρίαν dicunt id, super quod pedē imponentes, protinus efficiunt, ut id in carceribus cadat, cui adsit, qui cursuri

A cursuri sunt. In palestra item verbum $\sigma\chi\acute{\alpha}\sigma\alpha\iota$ significat brachium a priori situ celeriter retrahere. Vbi ergo dixeris maxillam $\sigma\chi\acute{\alpha}\sigma\alpha\iota$, ad musculorum vitium referendum est, repente mutatum alias partes, sic, vt musculi antiquam sedem minimè retineant, sed aliqua ex parte deprauentur, aliqua etiam extendantur.

15 *Ali. 4. f. 5. c. 1. c. 7. 478. c.* Hinc autem "euentissimū est, cum excidit: maxilla enim in priorem partē prouentur, conuertitur q; in cōtrariā, atq; vnde luxata est, summitas q; ossis rostrū referens magis extat iuxta malas, maxilla q; cū malis egre cōmittitur.

Diximus etiam in superioribus os, quod iugale appellatur, ita situm esse, vt superiniiciatur maxillæ summitati rostrum referenti: ac nisi in alterā partem prolabatur, maxillam ad suū locum reuersuram. Necesse igitur est, si quando maxilla excidat, propolitā summitatē extra iugale os ferri, nullus enim alius locus est, in quē impellatur. Quare merito extat iuxta malas, quā sitū est iugale os: sed quā potissimum situm sit, faciliē percipies in homine gracili, musculus temporis, genā q; intuitus, inter vtrunq; enim situm est iugale os. In memoria itaq; habens eius situm, vbi aliquem videris, qui os claudere nequeat, maxilla in priorem partem proiecta, atq; in alteram inclinata, conari debes, exquisitē oculis, digitis q; summitatem comprehendere, quæ iuxta genam & iugale os B extat. At vbi sic habere comperies, optimum indicium erit maxillam excidisse.

16 *A. ibidem.* His quæ ratione "apertē reponi debeat, in aperto est. Oportet enim aliquo laborantis caput continente, alterum doctus maxillam ad mentum comprehendere, tam ab exteriori parte, quam ab interiori, homini hanc: quantum modicè potest: ac primò quidem aliquandiu maxillam manu in hanc, atque illam partem adductam dimittere: imperare que, vt ipse homo maxillam relaxet, simul que cum medico ipsam adducat, & adducēti quā maxime pareat.


Ratio reponendi euidentissima est iis, qui in corporibus incidendis, partium, quas narrat, cōpositionē diligenter inspexerint: ad quos respectū habens, hæc scripsit. Quæ deinceps adiungit de restituendo, omnia plana sunt, nisi licubi vnū vel alterum verbū occurrat, quod a nobis notabit.

17 *A. ibidem. c. f.* Dein subito "mutare ad tres habitus simul consilio directo: siquidem ab ea sede, in quam peruersa est, ad naturalem adducenda, præterea in posteriorem partem aduergenda est: tum æger obsequens eam debet cum malis committere, ac minimè hære. Ratio quidem reponendi huiusmodi est, neque reponi maxilla potest, si aliter figeretur: lenis qui medicina abunde est, nempe panni cum cerato, laxiori fasciæ alligati. Tutius autem est aduocare manū hominē resupinato, capiti subiecto scorteo puluino, maxime factō, vt quā minime cedat.

C Vbi, prius neruis & musculis agitatīs atq; emollitis maxillam deorsum traxerimus, & quantū potest a malis reduxerimus, debemus agere, quod ab Hippocrate iubemur, quū inquit deia subito mutare, quod $\sigma\chi\acute{\alpha}\sigma\alpha\iota$ dixit, id est repentē ac simul articulum collocare e regione suæ sedis: tum ita collocatum rursus in posteriorem partem momento impellere, homini imperantes, vt os claudat. Antea quidem præcipiebat, vt homo hiaeret, laxam maxillam præbens, id est nullū musculus intendens: id enim maxime confert ad neruos musculos q; agitandos, repēte q; ad naturalem sedem adducendum maxillam deprauatam, atq; ad compellendum in posteriorem partē. Nunc ita, vbi vtraq; maxillæ summitas sita est e regione suæ sedis, permittit musculos, qui $\alpha\sigma\tau\alpha\phi\acute{\iota}\tau\alpha\iota$ dicuntur, agentes, eam totam ad se ipsos attrahere: agunt enim, vbi æger comprimere, claudere que os velit.

18

D



Alquis autem caput offensi continet.

Dum maxilla agitata, ac modicè deorsum demittitur, præcipit, vt caput continetur, ne sequatur maxillam, quod perpetuum est in omnibus, quæ in diuersa duci debent. Offensum appellauit $\alpha\sigma\tau\alpha\phi\acute{\iota}\tau\alpha\iota$, lones enī quamlibet offensam $\alpha\sigma\tau\alpha\phi\acute{\iota}\tau\alpha\iota$ dicunt.

Septima Classis.

LLLLLLL iij

Quod

- 19 Quòd si maxilla vtrāq; parte elabatur, curatio eadem est: sed homo minùs comprimere os potest. tunc enim mentū **E** magis prominet, sed in neutram partem inclinatur: intelliges autem in neutram partem inclinari, præcipue ex dentū finibus, vbi inferiores è regione superioribus respondeant.

Maxilla ab vtrāq; parte, dixit, γνάθοι ἀμφοτέρωθεν. videbit autē γνάθος appellasse nō maxillā totā, sed vtrāq; eius partē, quā latefcit: mentū quoq; cūm γέννας dixerit, videri poterit intellexisse maxillę imū, quā nudū os est sine carne, quū inquit / tunc enim mentū magis prominet/, sed paulò post maxillā totā nūcupauit γνάθον, quū ait / sed si maxilla, quā ad mentū iungit, diducat: sola autē hæc iūctura est in maxilla, in malis multę/. Quare apud Hippocratē significationes verbi γνάθος & γέννος cōfundunt. quod tñ ait in propositis verbis huiusmodi est: Quòd si maxilla luxetur ab vtrāq; cōmissura, magis quidem in priorem partem propellitur, q̃ vbi excidit altera parte duntaxat, magis q̃ à malis recedit: non tamen deprauatur, aut peruertitur, sed naturalem se dem sine inclinatione tuetur. id autem indicant dentes, qui è regione respōdent, hoc est, inferiores superioribus, qui secant secantibus, canini caninis, maxillaribus maxillares.

- 20 His quā celerrimè restituenda est: qua autem ratione, supra explicauimus.

A. li 4. f. 5. l. 1.
c. 7. 478. c

Celerrimè quidem reponenda est, priusq; muscoli distenti ob consortium cerebrum afficiant. **F** modus autem reponendi, quem docuit, vbi altera parte prolabitur, mihi nō videtur ex toto idem nunc accommodari: tunc enim paulatim maxilla in alteram partem conuertitur, nunc pariter in vtramque. quare satis est concutere, mentum que adducere deorsum, vt processus extremas rostro similis, iugali osse inferius collocetur, sic que in interiorem partem vtrinq; totam maxillam compellere, simul q̃ præcipere homini, vt os claudat.

- 21 Si reuerti nequeat, mortis periculū istat propter febres cōmītes, atq; marcore, et inexpugnabilē dormiēdi necessitatē.

A. ibidem.

Periculo quidē non vacat maxilla, etiā si altera parte luxē: sed, si vtrāq;, egrius restituit, quū musculos oēs, quibus maxilla continet, intēdat, sunt autē quatuor (vt dictū est) duo scilicet, qui à tēporibus incipiunt: duo, qui à sinibus iuxta os, quod πτερυγοειδές nomina. Habent autem hi muscoli neruos ab ipso cerebro, ac propē ipsum cōtingūt: quo fit, vt celerrimè afficiatur. Hi ergo quatuor muscoli, vbi maxilla prorūpit, maximè affliguntur, quū inter oēs præcipui sint, vt qui neruos ex cerebro habeāt à tertia cōiugatione, quę non longē ab ipso principio sita est. Atqui fit etiā, vt muscoli, qui maxillā extrinsecus cōprehendunt, orti ab vtrāq; parte eius, præter naturā extendantur, vbi maxilla luxē: quanq̃ non ita præcipui sint, sicut quatuor prædicti, magis enim à cerebro recedūt, neruus q̃, qui in hos distribuit, longius oritur, & nō ab ea cōiugatione, vnde nerui ad quatuor musculos ferūtur, qui & ipsi nō parū vsui sunt, perinde atq; alij vniuersi corporis muscoli, & si nō equè præcipui sint, atq; hi. Ob hæc igitur oīa, periculū mortis impendet, quū præter naturā muscoli intēdantur, ac propterea doleant, & idcirco inflāmatione premantur, ac simili vitio cerebrū afficiant, quo affectio acutę febres sequuntur, simul q̃ lēduntur oēs animi actiones. non enim solet, vbi cerebrū inexpugnabili dormiēdi necessitate prematur, eius vitio sensus duntaxat lēdi & motus, sed ratiocinatio, memoria, sensus & motus voluntarius corrumpi.

- 22 Huiusmodi enim muscoli inexpugnabilē dormiēdi necessitatē inducūt, quū alienātur, et præter naturā extenduntur.

Potest vtrunque ex propositis inexpugnabilem dormiēdi necessitatem inferre, & alienatio musculorum, & distentio, quū vterque affectus ob consensum ad cerebrum pertineat. Distentio inde proficiscitur, q̃ fibrę, quę prius laxę erant, nunc omnes ad rectam lineam extendantur: alienatio, vbi vltra modum calefiant, frigescent, madescant, siccantur, inflammentur, erysipela prehendantur, vel putrescant, in quibus omnibus eorū natura alienatur: sed in distentione fibrę duntaxat extenduntur citra naturæ ipsius alienationem.

H

- 23 His solet alius bilem puram, atq; exiguam reddere, ac si euomant, vomitus purus est.

A. ibidem.

In febribus admodū acutis nihil mirū, si pura bilis in corpore produci, siquidē & adeps & caro tenera ac paulò antè concreta, sub hmōi febribus tabescit, & sanguis adurit. concurrere autem hæc ad aluum, atq; intestina, quū tabent, propriū est, vbi tantū neruosæ partes laborant: cū ipsis enim vitia lēditur q̃ os vētriculi, quod maximè neruosum est. Rectē autē ab ipso docemur proximas, cōmunes q̃ partes primū potissimum q̃ affici: præterea, vbi ventriculi os lēdatur, dolorē ne leuē quidē posse sustinere: sequitur enim animę defectio, vbi ipsum malè affligat, & quū animus deficit, oīa, quę superfunt, tenuia ad ventrē concurrunt. quā etiā, si hoc nō accadat, sub vehemēti dolore, atq; in cōrrore, quę superāt in corpore huius generis, vident ad ventriculum atq; intestina decurrere: quę in ventriculo coeunt, vomitu excernuntur: quę in intestinis, deiectione.

- 24 Decedunt autem hi maximè decimo die.

A. ibidem.

Verbum /maximè/ μέλιστα dixit. inuenitur autem, & apud alios veteres ita acceptū, sicut nūc ab

A ab Hippocrate accipitur, vt coniecturam numeri eius rei, quę proponitur, proximè ostēdat, quā si ita dixerit: Hi ergo decedunt plerunque circiter decimum diem. ita vt, quamuis nono vel vndecimo intereant, vera oratio sit. Testantur autem exempla vocabulum /μαλιστα/ ita vsurpari.

Thucydides quidem in primo libro inquit, Hæ omnes græcorum, & inter se, & contra barbarum res gestæ fuerunt maximè quinquaginta annis. atque ibidem, Distat sexaginta stadia maximè. Andocides item de mysterijs inquit, Homines maximè trecentos. vbi maximè /μαλιστα/ dicunt, in quam significationem huiusmodi vox à græcis sæpenumero accipitur.

25 Sed, si maxilla comminatur, vbi non frangitur omnino transuersa, sed aliqua parte icta ossa inter se coherent, in suam sedem compellenda sunt, digitis vtrinque prementibus, tum ab ore lingua in laus adducta, tum à cute, vt conueniet repellendo. Quòd si peruertantur dentes ad fracturam mori, vbi ossa in suam sedem collocata sunt, non solum bini, sed etiam plures, inter se ligandi sunt auro potissimum, vel certè lino, donec ossa confirmentur. Quo factò vincire oportet paucis pannis cerato que iniectis, paucis que fascijs, non valde astrictis, sed laxioribus.

Vbi comminuto osse nihil integrum relinquitur, partibus inter se recedentibus, ita, vt nullo pacto cohareant, huiusmodi fracturæ speciem recentiores medici græcè /καυλιδον/ à fracti cau-
B lis similitudine apellant, eo quòd Hippocrates illud /vbi non frangitur omnino transuersa/ dixerit /Εάν μὴ διακαυλιδῇ παντάπασιν/. Reliqua omnia tam in hac oratione, quàm in sequentibus, plana sunt. sed, si parum quid offendemus, id quoque explicabimus.

26 Scire autem conuenit maxillam fractam fascijs parum iuuari, si rectè iniiciantur: vbi minus rectè, multum ledi.

Cōmune est omnibus fracturis summo opere ledi à vinculo, quod non rectè superdetur: at non admodum iuuari maxillæ fracturam vinculo rectè iniecto non pertinet cōmuniter ad omnia ossa, sed ad ea duntaxat, quæ fascia comprehendere in orbem nequeunt, quæ vitiatum os quo modo à medico compositum exceptum fuerit, seruetur. Adde quòd in maxilla vinculum præcipuè infestum est, quòd semper solita sit nuda esse, ac sine velamento.

27 Subinde autem circa linguam altè inquirere oportet, ac diutius digitis vtrinque reprimere, dirigere que id ossis, quod inclinatum est: optimum autem esset, si semper id fieri posset, sed non potest. Quòd si os transuersum omnino abrumptur, quod quidem rarò incidit, collocare eo modo, quo dictum est, os in suam sedem oportet. Quo facto deligare dentes inter se conuenit, veluti supra ostendimus: hoc siquidem maxillam valde immobilem præstat, si quis capita rectè, vt oportet, sutura insuper coniunxerit. Vniuersam verò manus curationem ad vnguem scribere non facile est: sed ex ijs, quæ scripta sunt, exprimenda est.

Μάττεδς significat inquirere, sed ἐσμάρτεδς altè inquirere, sicut nunc, vbi altè inquirere ἐσμάρτεδς dixit. præcipit enim Hippocrates digito in os demisso considerari, num fracti ossis partium altera super alteram excedat: atq; ita digito adurgeri, quòd expedire videatur, id quod in interiorē partem conuersum est, in exteriorē repellendo. In aperto autem esse existimo Hippocratem imperare, nō vt medicus assidue, sed vt æger hoc efficiat.

28

D



A Habena inferiori parti maximè agglutinata.
B Habena superior.

Dein, si is, quem fractura malè habet, puer sit, satis erit corij Carthaginensis, exterioris partis id, quod durius est & magis densum, admouere: sed, si robustior fuerit, ipsum corium. Incidēda autem habena est, quæ trium digitorum latitudinem æquet, vel quanta conuenit, tum maxilla gummi inungenda. maxillæ enim, quæ transuersa fracta est, firmitus hæret extrema habena agglutinata interposito digiti spacio, vel paulo longiori, id quæ ab inferiori parte: incidatur quæ habena hæc media in longitudinem, vt vtrinque mentum complectatur. altera item habena equalis, vel paulo latior superiori parti maxillæ agglutinetur, distet quæ à fractura quantum prior. scindatur autem, quatenus possit aurem comprehendere.

Molle accipi voluit corium, cuiusmodi tunc fortasse fuit Carthagini. huius enim exempli causa nominatim meminit, quemadmodum Ægyptij corij antea in opere de fracturis. constat autē in eo corio partis, quæ maximè summa est, id quod durius est ac magis densum, nunc /λιπὸν/ ab ipso nuncupari. At quomodo illud adhibeat, vt maxillæ fractæ partes in diuersa extendat, ipse nobis euidētissimè aperiet, si quorsum de his agat intelligamus: vult siquidem fracti ossis alteram partem deorsum à mento extendi, alteram à capite sursum.

Sect. 3. l. 29. 7.
245. c

Acuantur

29 *Acuantur autem habena, quæ coniungi alligari quæ inter se debent.*

E

Præcipit hic, ut habena quodammodo angustiores sint, paulatim latitudine imminuta, quo iunctura firmior reddatur. capita enim, quæ lata sunt, quamuis summa cura vinciantur, non tamen fideliter continentur.

30 *In glutinando corij caro cutem contingat, sic enim magis inhaerescit.*

Corium fit ex pelle animalis duplicem naturam habente. id enim ex ipsa, quod exterius est, cum ambienti aeri obiectum sit, magis densum euadit, & neruosum est: quod interius, mollius & rarius, atque ex hoc ipso minus id, quod ad exteriorem partem magis accedit: quod ad interiorem, quæ id tangit quod cuti subijcitur, rarius est & carnosum, quod sanè corij carnem nominauit, à quâ parte glutinari voluit: nam, quum rarius et mollius sit, ad eiusmodi vsum magis accommodatur.

31 *Deinceps extendenda est huiusmodi habena, magis autem, quæ à mento sita est, ut potissimum cautio sit, ne maxilla in acutam figuram ducatur: in vertice autem iungendæ sunt utraq; habena, dein circa frontem fascia alligandæ.*

F

Utque habena extremates dari debent ad caput laborantis, atque in vertice deligari. magis autem extendi voluit inferiorem, ne maxilla (ut ipse dixit) *ὑποσμιλαίνετ*, id est in acutam figuram ducatur.

32 *Aliquid etiam super omnia extrinsecus iniici debet, ut fieri solet, quo vincula immobilia reddantur. Cuius autem homo in maxillam integram, non tamen huic, sed capiti innixus. Corpus verò extenuandum est, usque decimum diem, postea reficiendum est non tarde: nam, ubi primis diebus inflammatio non oritur, maxilla viginti diebus conseruet: celeriter enim callus increscit, sicut in alijs ossibus, quæ rara sunt, nisi corrumpantur: sed restat alius sermo longus de cunctis ossibus, quæ corrumpuntur. Intentio autem, quæ per gluten adhibetur, firmiter manet, intendi & minui potest, & ad multa dirigenda saepenumero proficit. Medicorum verò, quicunq; incogitantes sunt, & in alijs casibus, & in maxillæ fractura promptè manus admouent: comminutam enim maxillam uariè, et bene, et male deuincunt.*

Quod super omnia extrinsecus iniicitur *κατάβλημα* appellauit, siue panniculus sit, siue aliud eius generis. vocat autem panniculum *πάραρμα*, sicut etiam nunc dici solent *ᾠδάρματα*, quæ ex vestimentis præciduntur ab ijs, qui ea suunt. hæc siquidem ad propositum vsum propter molliem commodissima sunt, quæ ubi non sint, licebit aliquid simile admouere.

33 *Omne enim vinculum maxillæ ita abruptæ ad fracturam ossa inclinat, magis quam secundum naturam.*

Maxillæ inquit ita abruptæ, hoc est, quæ transuersa fracta sit, vinculum ad fracturam magis ossa conuertit, quam dirigat, propterea, quod fasciæ in orbem circumdari nequeant circa sedem affectam, sed ab exteriori parte duntaxat imponi.

34 *Sed, si maxilla, quæ ad mentum iungitur, diducatur (sola autem iunctura est hæc in maxilla, in malis multa, sed à proposito sermone discedere consilium non est, in alijs enim morborum generibus de ijs dicendum est) si iunctura inquam, quæ in mento est, diducatur, componi à quouis potest: nam quod extat, intus repellendum est digitis superdatis: quod in interiorem partem conuertitur, in exteriorem adducendum digitis adurgendo: hæc autem facienda sunt ossibus in diuersa diductis.*

H

Maxilla quidem ex duobus ossibus constat, quæ in imo mento ad vnguem inter se iunguntur: Mala verò, ex multis, quæ iuncturam habent omni motu carentem, *κατὰ συνάρθρωσιν* dicunt. sed curiosum hoc huiusmodi vocabulorum studium apud veteres non fuit, atque idcirco Hippocrates iuncturam ossium malarum sub *ξυμφύσεως* genere posuit, id tantum in ipsis indicium spectans, quod in eiusmodi ossium iuncturis nullus sit motus, qui sensui subijciatur.

35 *Ossa enim sic facilius in suum locum reuertentur, quam si quis tentet altero sub altero condito compellere.*

In omni eiusmodi commentario scire licet consueuisse Hippocratem in ijs præceptis, quæ singulis communia sunt, cum semel vnius mentionem facit, exponere vim rei communem esse omnium similium: quemadmodum & nunc volens maxillam prius extentam ita componi, subijcit/ossa enim sic facilius in suum locum reuertentur, quam si quis tentet altero sub altero condito compellere/. Hoc autem, quod nunc proponitur, attinere ad ossa omnia, quæ componuntur, propositis verbis indicauit.

36 **A** *Composita maxilla alligare inter se dentes conuenit, qui sunt hinc atque hinc, sicut antea quoque dictum est, menden que cerato, ac pannis paucis fascijs que. Vinculum autem exiguum varium que maxime huic loco accommodatur: propè enim sine inclinatione est, quanquam non ex toto sine inclinatione sit.*

Pars exquisitè sine inclinatione est, ubi simillimam cylindro figuram representat. voco autem cylindrum, non quo pueri ludunt, sed qui columnæ imaginem refert: hæc autem ex toto in nullo ossè reperitur, magis tamen in femore atque humero, quam in alijs ossibus, conspicitur. In maxilla autem constat non esse huiusmodi figuram: quocirca eam inclinatione vacare non protulit, propè tamen sine inclinatione esse, eò quod sinistra eius pars dextræ ex toto similis sit & equalis, atque idcirco, quod ex utraque componitur sine inclinatione est, & in neutram partem inclinatur. admittit autem maxilla varia vincula, sicut in fasciando, quæ exercitatio omnium prima est, didicistis.

37 *Attrahi autem fascia debet, si maxilla à dextro latere extat, à parte dextra, tunc autem à dextra parte esse indicatur, cum dextra manus fasciam ducit: sed si ab altero latere maxilla excedat, alio sano modo attrahenda fascia est. Vbi autem rectè componatur, atque, ut oportet, immobilis seruetur, citò sanescit, dentes que integri remanent: sin Bsecus, longiori tempore confirmatur, tum peruertitur, dentes autem vitantur, atque inutiles redduntur.*

Antea quoque dictum est in vlceribus, quibus oræ excedunt, caput fasciæ secundum oram excedentem iniiciendum esse: atque ita fasciam voluendam, ut ad alteram oram vlceris, ipsam adducat. est autem hoc perpetuum in omnibus, quæ restitui ad priuinam naturam debent, quod commune etiam nunc seruandum est, quod excedens pars repellatur, cogatur que. id autem continget, si ea fascijs ad alteram adducatur. adducetur autem, si dextra parte, ut puta, excedente, fascia inde orsa porrigatur ad sinistram: si sinistra læsa sit, ab hac incipiens ad dextram feratur. Hippocrates igitur, ubi à dextra parte incipiens ad alteram fascias adducit, huiusmodi vinculum à dextra parte nuncupat, attendens non quò ferantur fasciæ, sed utra præcipuè manu attrahantur. namque, ubi intuearis medicum è regione eius, qui deligatur, collocatum, fascia, quæ à dextro latere maxillæ ad sinistrum procedet, à dextra manu attrahetur: contraria, à sinistra.

DE NASO

38 **C** *Quod si nasus perfringatur, fracturæ modus non est vnus.*

Ipsè deinceps modos adscribet, aut enim pars eius abruptitur, ipse tamen seruetur perpetuus, sic, ut neque deorsum inclinetur, nec in alteram partem conuertatur: aut horum alterum sit, id quod aut in parte eius, quæ cartilaginosa prominet, aut in reliqua, quæ ossibus continetur.

39 *Sed, qui præstantia vincula amant sine mente, complura alia ledunt, atque adeò nasum.*

Præstantia *καλὰ* dixit irridens, non quò verè significauerit præstantia, quorum consilium est affectam partem ad suam naturam restituere, sed pulchra & aspectu iocunda. qualia hæc sint, in sequentibus ostendet.

40 *Inter omnia enim vincula hoc maxime varium est ac plurimis locis fasciæ imaginem refert, & aliquod spacium cutis nudum, ac sine fascia intermittit, quo rhombi varie admodum representantur. Igitur ut dictum est qui sine mente huiusmodi vinculis student, comminatum nasum libenter deligant: sed vinculo iniecto, vno, vel altero die medicus lætus est, lætus item & qui deligatur, deinceps eorum cito satietas capit, inuentio enim noxia est: abunde que Dmedico est, ostendisse peritiam, quam habet, nasum varie deligandi. Efficit autem hæc vincienti ratio omnia contraria, atque oporteat, tum quòd, qui ob fracturam simi sunt, si à superiori parte adstringantur, magis adhuc simi cadent: tum, quòd quibus in hanc, vel illam partem, seu quæ cartilago est, seu supra nasus conuertitur, nihil superposito vinculo iuuandos, sed magis ledendos esse manifestum sit.*

Asciam appellat, ubi fascia à transuerso circuitu recedens paululum inclinatur, ut supra ostensum est. spacium verò, quod fascia intermittit, dixit *ῥαβδωγ* dicitur: rhombi verò figuram, eam, quæ æqua latera habet, sed angulos non rectos, nam & Euclides ita rhombum finit. nosti autem ex fascijs primam ferè nominari rhombum, quum eam figuram potissimum representet.

41 *Sic autem panni à latere nasi haud benè aptantur: quanquam neque hoc faciunt, qui alligant.*

Nihil conferre ait vinculum ad nasum sub fractura in latus conuersum, cum id præstare non possit, quod vtile esse videtur. videtur autè vtile esse per pannos nasum fulcire ab ea parte, in qua iacet, sed neque ad hanc rem inquit id prorsus accommodari.

Proximè

- 42 Proximè autem Vinculum mihi videtur occurrere, si in medio naso, quà acutus est, caro iuxta os conteratur, vel paululum etiam os ipsum ledatur, non tamen multum: his siquidem nasus callo obducitur, & aliquanto asperior fit: neque tamen Vinculo egent magni negocij, si sanè alligandi sunt.

Commune vinculum nasi proximè ad salubre accedere videtur, vbi in medio cutis cōtusa fuerit, vel os parumper vitiatum. sequitur autem, vt promineat, quà callo circumdatur. Vinculum itaque in huiusmodi casibus coercens, repellens, quæ affectum locum, prodesse aliquid videbitur. sed neque his vlllo modo necessarium est, conari enim debemus, quæ contusa sunt, maximè ab inflammatione defendere: atque vbi inflammentur, celerrimè inflammationem tollere. quin & callus, quum paruus increfcit, nihil profectò huiusmodi vinculis eget.

- 43 Satis est ad contusum, pannum admouere cerato inunctum, dein semel fasciam circumdare, quæ in vtrunque partem ducatur.

Media fasciā medio naso injicienda est: cuius vtraque capita ad posteriorem capitis partem nō magna vi adducenda sunt, atque inde fronti circumdata inter se vincienda.

- 44 Optimum tamen presidium est illinere hæc farina tritici huius anni, lota, glutinosa, respersa, pauca.

Qui optimè videntur verba Hippocratis enodare, asserunt σιτάνιον triticum ab ipso appellari, id quod satum est σῆτες, quod attici vtrāque syllaba per τ prolata τῆτες dicunt: quo verbo significari volunt /hoc anno/ id est quod vere satum est, quod & duorum mensium, & quadraginta dierum, appellatur. Equidem in Co, & in tota Græcia Asiæ, vidī tritici genus σιτάνιον appellatū, sed parum furfurum habet, & eius farina ex aqua subacta plurimum glutinosa est. quam rem nunc Hippocrates maximè exigit, quæadmodum ipse deinceps narrabit: qui vbi farina hæc non sit, imperat, vt puluis qui ex concussio thure habetur, vel gummi admisceatur. feritur autem eiusmodi triticum vere ineunte, vt duorum mensium sit: recte q̄ sic dicitur, quoniam summum ad id temporis perducitur, cuius farina ex aqua subacta maximè glutinosa redditur, vbi molito tritico furfures ex toto detrahantur, id quod fit & cribris tenuibus, & tritico antè eloto. Nam idē tritico euenit, atq̄ hordeo: ex hoc enim, vbi ptissana preparanda est, cortex magis remittitur, si antea madefactum fuerit. Quo pacto igitur dixit /lota/ quum non idem sit madheri, & lauari: in quolibet enim pistrino madefit triticum, priusquam molatur: non tamen lauatur in quolibet, sed in cōpluribus Asiæ ciuitatibus: vbi calathos habent magnos intextos ex tenuibus iuncis exigua spacia intermittentibus, per quæ excerni puluis possit & arena, sed triticum retineatur. Id ergo triticum, quod molendum est, primò in calathos conijciunt, atq̄ excutiunt: deinde calathos in aquā demittunt, sic, vt triticum lauetur, ac modicè madefiat. calathos ex aqua recepto humoris plurimū effluit: tantum autem in tritico remanet, quātum idoneum est, vt moli possit. nam nisi madefiat, cortex circumpositus, qui tanquam innata cutis est, sub mola in tenues partes dissipatur, atq̄ ita, cum farina per cribrum excernitur, educitur aliquid etiam ex furfuribus in tenues partes diuisis: sed tritico prius madefacto, furfures, grandiorum partium quum sint, manent, & cum farina nō excernuntur. atque idcirco tritico prius madefacto farina magis purgatur, & quod ab interiori parte est tritici huius anni, lotum (vt ait) & glutinosum, quod scilicet post cutem est, veluti caro ipsius, in farinam, vt proposui, redactum, valde glutinosum redditur. Puto itaque ab ipso lotam farinam appellari, vbi ex tritico fit, sic purgato, & prius madefacto. nam, nisi ita accipiatur, restat, vt intelligamus farinam, vbi ex aqua madefacta variè agitur, deinde finitur cōsistere, tum super innata aqua excipitur, ac decoquitur, quod in farre etiam fit: sed huic repugnat, quod respergi farinam iubet, decoqui enim dixisset, non enim respergitur huiusmodi humor, sed coquitur dum H taxat. Ex verbo igitur /respersa/ quid sibi voluerit, magis demonstratur.

- 45 Vti autem conuenit ad omnia hæc huiusmodi farina, si ex optimo tritico fuerit, facile quæ duci possit: sed, si nō omnino benè ducatur, modicum pulueris illius, qui ex thure concussus habetur, in tenuissimum pollinem redacti, & aqua diluti, farinæ adijcere, vel paulum omnino gummi similiter admiscere. Quibus igitur fractus nasus in inferiorem partem demittitur, sinus quæ efficitur, si ab inferiori parte, qua cartilago est, desidat, potest in nares indī aliquid, quod dirigat: quod vbi non fiat, omnia hæc excitanda sunt digitis, si fieri potest, in nares coniectis.

Optimum triticum dixit ἀγασθὲς κόρυς: maiores enim soliti sunt ἀγαθὸν vocabulo vti, ad notandum id omne, quod in suo genere primum est: nunc autem omnes, qui in panificijs versantur, asserunt optimum triticum esse, quod densum est: nam quod rarum, multis furfuribus cōtinetur, farina quæ eius ex aqua subacta non æquè efficitur glutinosa, atque illius, quod densum est. glutinosum autem expressit, cum ait /facile ducitur/ ea loquutione sumpta ab eo, quod ipsi accidit, quandoquidem à nobis in diuersa attractum, seruatur perpetuum, neq̄ dissipatur: contra quod

A quod minimè glutinosum est, quàm ita tractatur, diuellitur: sed si diuellatur, quo pacto sequi dicetur, cum manu trahitur: ac si non sequitur, qui nam dicetur facile duci: id vero quod non dissipatur, sed perpetuum est, iure quis dicet facile sequi, quemadmodum & viscum. hoc siquidè manibus nostris prehensum in cōtrarias partes plurimum attrahitur. Quare ex his cōstat velle sup-
pocratē farinam ex aqua subactam glutinosam esse, atq; vbi huiusmodi non sit, gummi vel puluerem ex concussio thure collectum (quem *uzmāy* appellat) adici iubet: vbi eius pulueris copia nō sit, contundere thus ipsum ea de causa oportet, atq; ex eodē id, quod maxime pingue est. Ego interdum, quum nec thuris, nec gummi copia esset, resina liquida vti sum, hanc forte nasci: ut vbi, neq; hæc sit, melle vti poteris, sed vtilius puluis ex concussio thure vel gummi adijcitur. nam mel & resina quodāmodo calefaciunt, sed talia ab initio aliena sunt: procedente verò tempore remanētibus inflammationis reliquijs, vt si quid aliud commodissima. Quemadmodum igitur in superioribus gratia exempli meminit prius corij Ægyptij, ac rursus Carthaginēsis, sic etiam nunc tritici huius anni: quasi ita dixerit, Farina vti debemus, quæ ex aqua subacta glutinosa sit, qualis efficitur ex tritico huius anni, quod *tritation* appellauit, fortasse eiusmodi vocabulo significare volens triticum omne, quod densum est, & farinam reddit glutinosam, ita, vt nomen ab eo, quod

B ipsi accidit magis, non ab aliqua singulari specie, sumptum fuerit.

46
 A. l. 4. f. 5. c. 3.
 c. 3. 488. a. b. c

Vel certè eo instrumento, quo ad illinendum utimur, pleniori digito compulso, non in priorem partem, sed quæ desidet: extrinsecus autem digitus utrinq; cōpre his impellere simul conuenit, & excitare. Sed si fractura omnino in inferiori parte fuerit, licet aliquid in nares inferere, si ut iam diximus, vel linamentum, vel aliud linteolo cinctam, vel maris Carthaginēsi pellicula, circumsum q; & ita pignatur, ut idoneum sit, quod in hunc locum demittatur. At, vbi fractura fuerit superior, nihil demitti intus potest: nam, si in inferiori parte id brachium alienum est, qui non in superiori? Primò itaq; & ab interiori parte dirigere nasum oportet, & ab exteriori utrinq; compellere, atq; in prius nam sedem restituere: cōmodissime enim restituitur nasus fractus, præcipue eodem die, vel certe paulo post. Sed torpēt medici, & primo mollius rem pertractant, quàm opus sit: utrinq; enim digitos, qui naso accommodantur, demittere oportet, quantum fieri potest in unum, & ipsum ab inferiori parte sursum compellere, atque excitare, simul q; ab interiori parte dirigere: ad quā rem nullus alius medicus magis idoneus est, si homo id dare operam velit, audeat q; & ipsius digiti indices, hi enim maxime secundum naturā sunt. Absnuere autē utrinq; digitum conuenit, ut toti nās, in hæreat, atq; ita quiescere, potissimum, si fieri possit a sidue, donec glutinaretur, vel certe plurimum tempus, ut dictū est: aut si non ipse egrotans, saltem puer, vel mulier aliqua digitos demittat: mollioribus siquidem manibus opus est, ut

Coptime nasus curetur. Verum, ubi nō reddatur simus, sed deorsum spectans, in neutram partem inclinetur. Equidem nullum vnquam nasum vidi ita fractum, qui non posset protinus componi, si priusquam callus increveret, compelleretur, modo quis recte mederi vellet. At qui deformitatem homines maxime oderunt: curationē vero partem ignorant, partim non sustinent, nisi dolore premantur, aut mortem pertimescant: quoniam in naribus callus cito increverit, nam decem diebus favefcit, nisi corumpatur. Quibus os a latere abrumitur, curatio eadem est: dirigere nimirum oportet, non æque ab utraque parte, sed eam, quæ inclinat, ad naturalem situm adungere ab exteriori parte compellendo: in naribus item arte conquirere, quod in interiorē partem conuersum est, dirigendo a sidue, dum restituatur, cum eo, ut sciamus nasum, nisi protinus dirigatur, dirigi postea non posse, sed perueri. Quo ad naturalem sedem compulso, ad eum locum abnuendi sunt digiti, vel vnus, vel plures, seu ipsius hominis, seu alterius, ut quæ excedit, repellatur, dum fractura sanescat: sed & minimus digitus in nasum subinde coniciendus est, quo componentur, quæ declinant. Vbi his inflammatio superueniat, farina vti conuenit ex aqua subacta: digitos q; similiter dare, eiusmodi etiam farina inducta. Verum, si quæ cartilago est, nasus a latere perforatur, necesse est extremum perueri: itaque oportet ad extremum nasum aliquid ex his, quæ dicta sunt, adhibere, quod ipsum componat, vel aliquid tale demittere: multa enim inueniri possunt accommodata, quæ odorem non mouēt, & alioquin mollia sunt. Ego interdum frustum pulmonis ouilli conieci, id enim forte naciū sum: nam si spongiæ indantur, humorem combibunt.

D


Si nequeant (inquit) digiti in nares demitti, adhibendum est id instrumentum, quod nunc sicut in superioribus etiam, *παραρτηρ* appellat. quo verbo intelligitur omne id, quo ad illinendum utimur, qualia sunt specillum, ipathæ, id quæ instrumentum, quod *σφαδαιον* dicitur, quæ omnia in summo capitulum habent rotundum. sed quemadmodum in superioribus ad alæ vitiōnem opus fuit tenuissimis, ita nunc plenioribus, quādoquidem & digitos, vbi licet, ad mouemus, & in nares conijcimus, eos nempe, qui aptantur, & qui fractam nasi partem componant. Quara-
 tione autem vti conueniat hoc instrumētō, ipse aperit exposuit, imperans, ut indatur in cauum, non in inferiorē partem nasi, sed qua potissimum fracta pars in eius cauum decidit: ea siquidem est, quæ impulsu eget, ut excitata possit in suam sedem reueri. nihil enim aliud est componere quamlibet partem, quàm vnamquamque eius particulam in suum locum compellere. Quæ subiiciuntur, per magnam partem orationis plana sunt.

47

Ad hæc ex parte exteriori corij Carthaginēsis incidenda habena est, quæ vel pollicem lata sit, vel quantum conuenit: & extrinsecus naso, quæ declinatur, agglutinanda: post hæc intendenda est, quantum expedit, paulo autem ma-

g^u

gis quam ut nasus dirigatur, intendi debet: tum sub aure (longa enim esse habena debet) sursum circa caput adducen-
da. Licet autem fronti extremam agglutinare: licet & ulterius ferre, & circa caput uoluitam uincire: hæc siquidem
iuste nasum dirigit, & intendi & remitti potest, atq; ubi velis, nasum in contrariam partem, ac iacet, magis aut mi-
nus repellere. Nam & quibus à latere nasus abruptitur, in cæteris eadem curatio conuenit, quæ proposita est:
plerisque autem opus est naso extremam habenam agglutinare, ut in contrariam partem repellatur, atque inclinet.
Quod si fracturæ vlcus accedit, nihil sollicitare nos debet, sed nutriendum est cerato, quod picem habeat, vel aliquo
ex ijs medicamentis, quæ protinus cruentis vulneribus inijciuntur, hæc siquidem facile curationē admittunt. Acquē
etiam, ubi ossa recessura sint, primò dirigere assidue conuenit, nullare prætermittenda, & in posterum diguis compellere
laxius superdatis, superdatis tamen: nasus enim ex omnibus corporis partibus facillimè componitur. Atqui habena
agglutinata, & impulsu in contrariam partem, atque, nasus declinatur, nihil uti omnino prohibet, neque si vlcus sit,
neque si inflammatio, innocenter enim eiusmodi præsidia adhibentur.



A Habena nari inclinatæ, & fronti, ag-
glutinata.

Appendatur, dixit ἀπαρτῆν: quo verbo significauit
vniuersam rationem extendendi & quasi dirigēdi na-
sum peruersum, per ea, quæ agglutinantur. quod au-
tem nunc præcipit, experimento imbecillum compe-
ri: nā, si habena vehementius intendatur, gluten discu-
titur, resoluitur q; si modicè, nihil ferè proficitur.

DE AURE

In fractura auris quodlibet uinculum inimicum est, neq; enim
ita laxum circumdabitur: quòd si magis adstringatur, plurimum
efficiet, quandoquidem integra auris sub uinculo adstricta dolet,
pulsu vexatur atque inflammatione.

Vbi continuū soluitur græcè in carne ἔλκος ap-
pellatur, in osse κήρυγμα: in cartilagine nō habet pro-
prium vocabulum, sed eam fracturam Hippocrates
αβύλος κήρυγματος nomine nuncupauit.

49

Sed & cataplasmata, quæ maximi oneris sunt, penitus aliena
sunt: pleraque etiam noxia sunt, atque abscessum concitant, &
mucos plurimos, suppurationem quæ infestam reddunt: quibus minime opus est auri comminutæ.

Omnia sigillatim ijs consentanea sunt, quæ ostendimus in libro de ratione curandæ. nāque Hip-
pocrates etiam nunc ledi aurem asserit cataplasmate, quod experimēto conspicitur, abunde enim
ficcare eam voluit, quum natura siccissima sit, eo qd ex cute confiet & cartilagine. Ostensum au-
tem est vnamquamque partem, quatenus siccior est, eatenus sicciorē curationem requirere.

50

Proxima quidem est (modò quid superimponi conueniat) farina glutinosa. Hæc autem necessariò grauis ne sit, ac
minimum contingat: interdum enim optima medicina est, medicinam non facere, & ad aurem, & ad alia multa. Ca-
uere insuper homo debet, ne in eam partem dormiat. Extenuare autem corpus expedit, illi potissimum, qui auri suppu-
ratione periclitatur, & aluum mollire.

Proximum inquit esse ei, quod non obest, cataplasma ex farina glutinosa: constat enim hoc ma-
gis ficcare, quàm alia. diximus autem paulo antè, ubi de illinendo naso tractauit, qualem appeller
farinam glutinosam. huic simillimum cataplasma conficiunt experimento edocti, qui in palæstra H
verfantur, ex farre in aceto madefacto, dum maceretur, atque ita temperato.

51

Sed, si homo facillè vomat, vomere debet, ut modicè exhauriatur.

Veteres appellabant συρμασμός, quum modicè homo exhauriebatur, seu vomitu, seu deie-
ctione. tale quid nunc fieri iubet eodē vocabulo usus. Multa autem sunt medicamenta, quæ hoc
præstant. nam & mel copiose assumptum, & mulsæ minus diluta, vel cremor ptissanæ ex aqua de-
coctus, seu per se, seu cum melle: magis adhuc vomitum citat radícula, & bulbus narcissi. His effi-
caciore est, non dum tamen valens radícula, in qua furculos radicum veratri albi defixeris, data po-
stridie siue per se siue ex oxymelle.

52

Sed, si ad suppurationem veniat, non est celeriter aperienda: multa enim ex ijs, quæ videntur suppurare, interdum
absorbentur, etiam si nullum cataplasma inducatur.

Cauendū est, ne auris incidatur ob cartilaginē cuti subiectā. nam, nisi, ubi incisa est, consolidet
& glutinetur,

A & glutineſ, periculū eſt, ne cartilago obefa reddatur. / Abſorberi (quod *ἀνατρίβει* dixit) hoc eſt, diſcuti ac digeri puſ ibi collectū, nō nūquam p ea q̄ ſuperimponunt ſimplicia medicamēta. ac leuia, ſine morſu ſiccādi vim habētia, cuiuſmodi eſt muccuſ cochleę adieſto thure: ac, ſi valētius ſiccare opus ſit, vel aloę, vel myrrha, vel vtriſq; Eodē modo ſiccare poteſt mel atticū inunctū inſperſo quouis ex propoſitis medicamentis, bene contrito. voco autē ſine morſu thuſ, aloę, et myrrhā.

53 *At, vbi incidere coactū ſis, celerrime ſaneſcit, ſi candens ſerramentum ab vna parte ad alteram demittatur. Si re autem certum licet aurem curtam reddi & mancam magis quam aliora, ſi candens ſerramentum traiciatur.*

Curta neceſſariō ſit, & manca, cū non exigua pars & cartilaginis. & cutis ipſam comprehendit, vſione abſumatur. Ad quod præſidium monet, vt confugiamus, non nunquam veritus, ne cartilago ægre ſaneſcat. namque vbi nudatur, cicatricem non recipit, præſertim ſi res aliquot dies protrahatur, neque cutis à ſectiōe protinus coeat & glutinetur.

54 *Sed ſi candenti ſerramento non traiciatur, incidere conuenit, quod magis excedit, ſectiōe non admodum exigua.*

Nequid ſuperſit puris, quo cartilago lædatur, incidi non parum iubet.

55 **B** *Quandoquidem puſ altius inuenitur, quam quiſ exiſtimet.*

Decipiuntur, qui ſecant, in cognoscendo pure, quod ſubiectum eſt, ita, vt exiſtimēt id in ſummo contineri, & cutem extenuatam eſſe. Quo pacto autem in hunc errorem incidant, ipſe Hippocrates proximè demonſtrabit.

56 *Verum (vt ſummatim dicam), cetera quoq; omnia, quę mucoſa ſunt, & mucos producant, vt pote glutinoſa, vbi tangantur cito in hanc vel illam partem & puris eliciuntur: quāobrem altiora hæc medici reperiunt, q̄ exiſtimēt.*

In dignoſcendo loco ſuppurāte, vbi in affecta parte, quum tangenti moderatè cedit, ſectiōe adhibita contentū puſ inuenitur, medici poſtquam eundē cedendi modum in quouis alia parte comprehenderint, putantes eam ſimiliter ſuppurare, vt illæ, quas prius intuiti fuerint, venientes ad ſectiōnem errāt: is q̄ error interdum duplex eſt. & q̄ nullo modo ibi puſ inueniaſ, quum hæc multo craſſiora ſint q̄ opinentur: & q̄ medicis ea ſuppurare videantur, quę mucoſum humorē in ſe continent. id, quod euēnit, qm̄ huiuſmodi humor (vt ipſe ait) vbi tangatur, cito elabatur. contrahi autem ſolet in cartilagine, chordis, neruis, ac ligamentis, vt deinceps oſtendet.

57 **C** *Quandoquidem & ea tubercula, quę ganglia dicuntur, cū humida ſunt, & mucoſa carne continentur, à multis aperuntur, inde fluxurum humorem putantibus. Medicum itaq; in ſectiōe animus fallit: ſed ei, qui ſectus eſt, nullum affertur detrimentum. Quę autem loca aquoſa ſint, vel mucorum plena, quibus ne partibus ſingula, quę aperiuntur, hominem interimant, vel alterius noxę cauſa ſint, alibi exponuntur.*

Hęc enim ganglia circa cartilaginofas partes, & circa neruos, ex horum alimento increſcunt, oriuntur q̄ ex humore glutinoſo ac mucoſo: hoc enim eſt proprium neruorum alimentum.

58 *Vbi quiſ igitur aurem ſecuerit, abſtinere ab omni cataplaſmate, atq; omni linamento debet, mederi q̄: vel medicamentis, quę protinus cruentis vulneribus iniiciuntur: vel alio, quod neq; onere lædat, neque moleſtiam afferat.*

Auris quia ſicca eſt, idcirco ſiccantia medicamenta requirit. non tamen plus iuſto ſiccanda eſt, vbi à ſectiōe protinus medicamenta inducuntur, diſtendunt enim, cū nihil habeant, quod leniat. Sed neq; onerari auris debet mole eorum, quę ſuperimponuntur, dolet enim & infeſtatur. Optimum eſt igitur à ſectiōe medicamentis vti, quę modice ſiccent, cuiuſmodi ſunt, quę cruentis vulneribus protinus iniiciuntur. Cataplaſmata leniunt quidem, ſed reſoluunt, atque effœmi-
Dnant: ſuperantem vero humorem non diſcutiunt, præſertim cū glutinoſus ſit & craſſus.

59 *Namq; , vbi cartilago nudari incipiat, coitum q̄; habeat purulentum ac mucoſum, res infeſtiſſima eſt.*

Adicere orationi oportet /humorum/ ſicut non nulli adſcribunt, vt vniuerſa ſit huiuſmodi /namque, vbi cartilago nudari incipiat, coitum quę humorum habeat/. Vocat autem *ὀστέας* coitum humorum, qui intus cōtinentur, & excerni debent, puris videlicet & mucci. res (inquit) infeſtiſſima eſt, hoc eſt, dolorem affert, quod patet, quum cartilago vitiatur.

60 *Fiunt autem & hæc ob illas curationes. In omnibus autem, quę recrudescunt, maxime abunde eſt candens ſerramentum traicere.*

Quam curationem damnat eam ne, quam paulo ſupra indicauit, præcipiens vt cataplaſma, linamentum, quod onerat, quod dolorem excitat, vitemus.

Galenī

GALENI IN HIPPOCRATEM
DE ARTICVLIS
COMMENTARIVS TERTIVS

Vido Vidio Florentino interprete.

ARGVMENTVM LIBRI

Luxationes ac reliquas noxas, quæ manu curantur, absoluit, cum Spina,
Costæ, aut Femur patitur.

DE SPINAE VERTEBRIS



Pinæ autem vertebræ.

1

Adiecit /spinæ/ non quia in alijs corporis partibus vertebræ reperiuntur, omnium. n. vertebrarum cõpositio vocatur spina: sed quasi ita dixerit, ver-
tebræ, quarum situs est in spina. Quibusdam tñ ex iunioribus placet spinā
nominari, non vniuersam vertebrarum cõpositionem, sed earum tantum,
quæ ad thoracē sunt, & lumbos. iuxta quos Hippocrates nunc de vertebris
agere videt, quæ in lumbis tantum & dorso sitæ sunt, nō de ijs, quæ in cer-
uicibus. vertebrarum verò cõpositionē vniuersam in libro de ossibus ad eos, qui primas institu-
tiones addiscunt, ad vnguē narrauimus, in quo exerceri illū volumus, qui percepturus est hæc cõ-
mētaria, intuitum exquilitē qualia sint singula ossa in cadauere arefactio hominis, vel certē simiæ.

2

Quibus ob morbos trahuntur, vt gibbum efficiant.

Gibbum "dixit κῦρον. vocatur autē spina gibba, quum in posteriorem partē conuertitur, quod
vitiū ἐπιστοκύρωσις græcē nominatur: sicut curua, qñ in priorem partem, dicitur autē hoc græ-
cē λόρδωσις: sed σκολίωσις, cum depratur à latere. Non nulli autē existimant spinam in postero-
rem partē peruerit (quod vitiū κύρτωσιν quoq; græci nominant) vbi in ea fuerint cruda tuber-
cula magna, dura, ac diuturna, quorum onere vertebræ in posteriorem partē compellantur. neq;
intelligūt, si supinus homo iaceat, non posse subiectas vertebras tuberculis onerari, neq; ēt si fiet, G
aut sedeat, ac neq; si in latus conuersus cubet. Ad hæc absurdum est, existimare tubercula ad tan-
tum pondus ac duritiem peruenire, vt ossibus grauiora fiāt, & duriora: sed, & à crudis tuberculis
spinam in priorē partem cõuerit Hippocrates ipse paulo post docebit. Illud itē animaduerten-
dum est, nō solum eos, qui librū hunc exponunt, sed Hippocratem in propositis nūc verbis dixit
se /trahunt, vt gibbum efficiant/ quum dicere potuisset /impellunt/, quemadmodum his placet.
Absurdum verò videbitur asserere vertebras, quæ in posteriorem partē crumpunt, trahi à morbo
in priorem: hoc siquidem magis propriū est illius vitiij, sub quo spina in anteriorem partē conuer-
titur. Quoniam igitur pactio res vera sit, quid q; Hippocrates sentiat, conabor exponere. Verte-
brarum quidem ossa per se, neq; peruertuntur à tuberculis, neq; trahuntur, sed primū vitiū est
in ijs corporibus, quibus vertebræ alligantur. Igit, vbi ad vertebras tuberculum oriatur, cum in tu-
morem assurgit atq; augetur, ab interiori siue priori parte, vtroq; n. vocabulo appellatur, necesse
est, vt tuberculum sequatur ligamenta, atq; hæc rursus vertebræ. Itaq; si in vna parte duntaxat tu-
berculum oriatur, vbi hæc in anteriorem trahatur, spina in priorem partem conuertetur: sed, si in
duabus, vbi aliqua interiecta sit inuiolata, gibba euadet. vtroq; enim tuberculo adiunctam verte-
bram trahēte, quæ in medio sunt, à posteriori parte gibbæ fiūt. quod euidenter intueri licet oibus H
euenire, quæ curuari modicē possunt, cuiusmodi sunt virides rami, & ex scriptorijs calamis ple-
riq; quos si quis dextre digitis ab vna parte, sinistre ab altera, præhendens ad se traxerit, mediū in
contrariā partem attractū gibbum q; cõspiciet. Atqui neq; alia de causa spina ad latus cõuertitur,
q; ob crudum tuberculū, quod à latere eius sit. Hæc autē tria vitia in spina incidunt, cum vertebræ lo-
co mouent. nam vel κύρωσις fit, vel λόρδωσις, vel σκολίωσις: cum in posteriōrē quidē partem cõ-
uertitur, κύρωσις: quum in priorē, λόρδωσις: quum in latus inclināt, σκολίωσις. Extra hæc quartū
vitiū in spina incidit, quod σείσις vocatur, vbi vertebræ loco manēt, sed earū cõpago dimouetur.

A.I. 3. f. 22. l. 1.
c. 12. § 99. g

3

Plerunque solui nequeunt, præcipue, vbi spina supra septi transversæ coniunctionem gibba fiat.

Nō nulla (inquit) quæ in spina incidunt, egrè soluuntur, præcipue q; vbi supra eam regionem,
qua cū septo trāuerso coniungit, gibba fiat, hoc est, in vertebris thoracis. dixit autē ποτὶ, significa-
re volens /præcipue/ quæadmodum etiā in principio huius libri, quum inquit /omnino enim me-
lior est ac firmior exigua herba q; grandior, præcipue antequam ad maturitatem veniat/, vbi ver-
bum præcipue dixit ποτὶ. Sed qua ratione ægrè tubercula soluantur, proximis verbis intelliges.

Infra

4 A *Infra verò quædam solvuntur, cum varices in cruribus fiunt: illi autem magis gibbam spinam solvunt, qui in vena poplitæ oriuntur: fiunt etiam & in vena inguinum.*

Quædam (ait) vitia infra thoracem, nempe ad lumbos, à varicibus vel torminibus solvuntur, cum succi, qui ea faciunt, primò ferantur in venam maximam ipsius spinæ, deinde in eas, quæ ab eadem diductæ ad crura intendunt. huiusmodi autem in thorace nulla vena est, quæ possit vitiatos succos recipere, quoniam vtrinque octo costis vna alimentum subministrat, sed superioribus, duæ aliæ tenues, scilicet ab utroque latere vna: quæ omnes per thoracem distribuuntur, dissipantur quæ. Idcirco, si succus aliquis ad ipsas ex tuberculis transferatur, excerni non potest, præterquam quod egre etiam admittitur. succi enim, qui cruda & dura tubercula faciunt, glutinosi sunt, & crassi, quare non facile per tenues venas feruntur: sed vena, quæ ad lumbos est, latissima est, & sanguinem ad venas omnes transmittit. Ergo, cum hos crassos ac glutinosos succos receperit, si affectus partes viribus adeo valeant, ut quod superat, expellant, ad venas hic sitas transmittit, quo fit, ut lateant, & in varices assurgant. ubi quidem succi crassiores fuerint, id accidit in inguine proximus, in medio crassi, in poplite. namque, ubi primum, eo quod crassi sunt & glutinosi, conferti sublestant, ibi venam distendunt, dilatant quæ. Etenim, quibus citra causam hanc varices in cruribus oriuntur, videre licet venas pro portione succorum crassitudinis latecentes, ubi crassissimi sunt, latissimas, cuiusmodi venæ sunt in inguine: ubi minus crassi, minus latas, quales in poplite. Interdum enim, quum maiores venas obstruunt, hunc affectum excitant: interdum ad inferiores concurrunt, quæ angustiores sunt. in vniuersum autem in varicibus crassus sanguis continetur, nam id vitium perunque à succo melancholico, interdum etiam ab alijs crudis crassis quæ concitatur.

5
J. 3. f. 12. r. 1.
12.499 g

Solutum quoque iam id vitium est à torminibus diuturnis.

Ubi succi, qui præter naturam in corpore sunt, ad intestina transferuntur, tormina fiunt, quum abradantur intestina ob succos acres, qui ad ipsa confluunt, nempe, ubi tubercula suppurant, neque enim aliter ob suam crassitudinem confluere ad intestina potuissent, sed in suppurationibus crassi succi extenuantur, & naturam affectæ partis ad expellendum excitant id, quod in ea contentum iam molestum est.

6 *Quibus verò adhuc pueris spina gibba fit, antequam corpus perfecte increverit, hoc corpus ad spinam, non augetur: sed crura & brachia dumtaxat perficiuntur, quæ sunt ad spinam, non complentur.*

Nihil inirum est, si in his morbis spina non increseat, quemadmodum supra in luxatis tradidit, cum inquit quibus recondi non potuit. Nam & propter venas peruerbas, & propterea, quod ægrius membrum moueatur, natura que in eiusmodi affectibus langueat, læsa partes necesse est deterius, quam ante nutriuntur. Quo fit, ut quæ iam perfecte increuerunt, emacrescant: quæ adhuc increscunt, incremento iuxta spinam prohibeantur. Sed, quæ à vitiatas partibus longius absunt, ut brachia & crura, sine noxa omnino seruantur: ea enim, quæ sic vitiatas sunt, non totum corpus, sed solummodò proximas partes afficiunt.

J. 3. f. 22. r. 1.
12.499. h

7 *Quibus item supra septum transversum gibba spina fit, costæ in latitudinem augeri non solent, sed in partem priorem: pectus vero latum non fit, sed acutum: spiritus difficulter mouetur, & cum sono, quum cauum, quo spiritus recipitur atque emittitur, angustius redditur.*

De his agens, quæ adhuc increscunt, dixit, quæ iuxta spinam sunt, his augeri non consuesse. Ergo, ubi spina gibba fiat in vertebra thoracis, hæ maximè increscere in longitudinem prohibetur. Hac igitur de causa, & illa etiam, quod vertebra, cum spina gibba sit, in posteriorem partem conuertitur, necesse est thoracem angustum reddi, atque acutum: & idcirco interiora caua, quæ spiritui accommodantur, minora effici, sic, ut, ubi spiritum attrahunt, corpus minori modo ipsius fruatur. Diximus autem & in libro de difficultate spiritus, ubi is minus attrahatur, quam opus sit, necesse esse breuiori temporis intervallo proximè rursus attrahi, quam si prius secundum naturam attrahi cœpisset. spiritus autem, qui breuiori intervallo attrahitur, creber redditur, in quo consistit id genus spiritus difficultatis, sub quo & exiguus, & creber coarctatur. sonus autem adiecit, ob angustiam iuxta fauces, & asperam arteriam, auget angustiam hanc id, quod proximè subiicit.

8 *Atqui coguntur etiam ceruices iuxta magnam vertebra in priorem partem conuerti, ne caput in eadem proijciatur, hoc autem fauces reddit admodum angustas: nam quæ etiam, qui naturæ recti sunt, id quod, si in anteriorem partem inclinatur, spiritus difficultatem affert, dum repellatur. Ob id igitur, quod ita figuntur, guttur his hominibus magis extare videtur, quam bene valentibus.*

Cum vertebra, quæ ad pectus sunt, ubi gibba spina fit, in posteriorem partem spectent, necesse est collum in priorem conuerti, quare & ipsum caput, illi enim è regione superimpositum est.

Septima Classis.

M M M M M M M

Accidet

Accidet igitur ijs, qui gibbi sunt, ambulare ita figuratis, sicut ceteris omnibus, cum totum collum E spinam q̄ inclinant, & vtrunque curuantes à posteriori parte gibbi terram spectant. quod ut cui tent, qui gibbi sunt, coguntur collum in posteriorem partem recuruare, eius vertebri, ut quæ minimum mouentur, ad hoc parum cōferentibus: sed, quæ potissimum moueri aliquid possunt, valde recuruatur: possunt autem quæ duæ primæ vertebræ inter se & cum capite committuntur. Quemadmodum igitur figurantur iuxta capitis commissuram illi, qui bene valentes caput in posteriorem partem compellunt, ita gibbi, cum erecti sunt. præterea, ut ijs, qui naturaliter habent, guttur extat, ubi caput in posteriorem partem recuruatur, sic gibbis, cum rectum continetur. Vocauit autem ὀξυέλεος ἄρας eos, quibus in priorem partem extat ἐεὶ γὰρ, quo vocabulo verisimile est vel asperam arteriam totam, vel guttur dūtaxat appellasse. hinc autem maximè fit, ut spiritus cum sono reddatur, quicquid maximè etiam fiertunt, qui sic figurati dormiūt: quamobrē scribit /nā & ijs, qui natura recti sunt, id offis, si in interiorem partem inclinetur, spiritus difficultatem affert/. dicit aut id offis, ad illud referēs, quod principio orationis proposuerat, cum inquit /atqui coguntur etiam ceruices iuxta magnam vertebram in priorem partem conuertere/. vnde posset quis conijcere magnam vertebram appellari secundam, quæ magis potest in priorem partem vrgeri, atq; inde rursus repelli. Constat autem eandem regionem, & priorem, & interiorem, F ab ipso vocari: priorem quidem, quum vertebræ à posteriori parte in eam erumpāt: interiorem, quum sit in profunditate corporis, si spectetur summa pars siue prior, siue posterior.

- 9 *His tubercula plerunque circa pulmonem sunt, ea quæ dura & cruda: plerisque enim eiusmodi tumores sunt causa gibbi, & distentionis, quibus proximi nervi afficiuntur.*

Quibus spina supra septum transuersum gibba est, his plerunque ait tubercula fieri circa pulmonem: constat autem, & quibus ad lumbos gibba fit, his ea parte tubercula versari. Dixit /plerunq; propterea q̄ & casu & ictu spina gibba redditur, & tum in priorem partem tum in latus conuertitur. At cum inquit /plerunq; enim eiusmodi tumores causa gibbi sunt, & distentionis/ eandem sententiam tradit, quam à principio, cum ait /spinæ vertebræ, quibus ob morbos trahuntur, ut gibbum efficiant/. Quod autem nunc scribit /quibus proximi nervi afficiuntur/ ad nervos dorli refertur, ac vertebrarum, nos verò antea causati sumus vertebrarum ligamēta attrahentia, quibus cum & ipsæ vertebræ trahuntur. non enim arbitramur nervos, qui à spinæ medulla oriuntur, attrahere secum vertebrae posse, cum & propter exiguitatem & propter mollietatem longe imbecilliores sint, quàm ut præstare id possint. quippe, qui ab ossibus non dependent, quemadmodum ligamenta, quæ firmiora sunt & nervis coniuncta: ac, si tuberculis afficiantur, secum trahere vertebrae possunt.

- 10 *Verum ex his quibus sub septo transuerso gibba spina est, non nullis renum & vesicæ vitia superueniūt: sed & abscessus ad ilia & inguina, qui diu manent, & egre sanantur: quorum neutrum gibbum soluit.*

Ob consensum sanè propositi affectus superueniunt. consensu autem afficiuntur, & quæ sunt eiusdem generis, & quæ vicina, quæ supra significauit, quum proximos dixit: sed quæ communia primò sunt, maximè leduntur. Tormina igitur, & varices, quorum causa erat succorum tubercula excitantium transusio, gibbum curant: sed ex ijs malis, quæ consensus causa oriūtur, nullum est, quod priorem morbum depellat.

- 11 *His autem coxæ extenuantur, magis quàm quibus spina supra gibba est.*

Quibus spina ad lumbos gibba est, his coxæ graciliores sunt, quàm quibus ad pectus. hinc autem manifestum est coxas, quibus spina ad pectus gibba est, graciles modicè reddi propter consensum, quem habent cum spina.

- 12 *Tota autem spina longior his est, quàm quibus à superiori parte gibba est.*

His qui ætate non dum robusta sunt, præterquàm quod communis est macies, accedit quod affectæ partes non augentur, quemadmodum & antea dictum est: Nunc discrimen aliud adiungit, non ab ætate, sed à locis affectis: nam spina, quo magis versus suum initium vitatur, eo minus augetur, cum habeat & originem & incrementum supernè.

- 13 *Pubes autem & barba serius increfcit, & minus completur, minus item fecundi fiunt, quàm quibus gibba est pars superior.*

Ad communem rationem consensus accedit differentia ex natura locorum. Communis igitur ratio est, ut quæ vitatis locis proxima sunt, consensu afficiant: propria autem, ut ubi hæ partes læduntur, quæ spiritui accommodantur, sequatur, ut spiritus ægrè, & cum sono moueatur: ubi, quæ infra septum transuersum, pubes serius increfcit, lædatur q̄ etiam barba.

Sed

- 14 A Sed quibus corpore iam robusto gibba spina fit, his euidenter solus morbum tunc ex silentio: tempore tamen eius aliquid se ostendit, sicut & is, qui iuniores sunt, aut plus aut minus: plerumque, autem, hi affectus minus magni sunt.

Euidenter ἀτακτικῶς nunc dixit, quod non nulli alij ex veteribus dixerunt ἀτακτικῶς. Aperte igitur, & (vt dixerit quis) quali res manu teneatur, gibba spina admittit ea, quæ quum morbus indicatur, id est soluitur, expelluntur, videtur quæ ex toto morbus summotus: supersunt tamen reliquæ parue, quæ irritant, si quid vel in ratione victus peccetur, vel noxium extrinsecus occurrat.

- 15 Multi quidem gibbi, facile, & non secus, quam bene valentes, iam usque ad senectutem id mali sustinuerunt, praesertim quibus corpus carnis plenum & pingue effectum est: pauci tamen ex his ad sexagesimum annum perueniunt, plerique enim citius moriuntur.

Ob validas vires, ob morbum leuem, iam quæ ob vniuersam victus rationem, qua viuunt, non nulli gibbi quasi sani ad senectutem usque vitam degunt.

- 16 Non nullis etiam vertebrae ab hac vel illa parte in latus mouentur. Hæc tamen vel omnia, vel complura incidunt, eo quod spina ab interiori parte deprauetur.

Antea iam diximus spinam ad latus conuerti orto ab eius latere tuberculo, quod ad se traheret ligamenta. hoc Hippocrates fieri dixit ὅτι τὰς τῶν νεύρων, id est, per neruos,

- 17 Quosdam etiam in id vitium compellit, vna cum morbo habitus ille, quo iacere consueuerunt.

Concurrat ad spinam gibbam efficiendam, & quod materia magis confluat ad id, quod humilius est: & quod pars, in quam quis cubat, magis comprimatur. Prima autem & præcipua causa, & tuberculi, & cuiuslibet vitij, est partium natura morbo opportunior. demonstrauiamus enim ad eiusmodi partes concurrere ea, quæ superant.

- 18 Verum de his agemus, quæ de diutinis affectibus pulmonis: ibi enim de his futurorum pulcherrimæ prognosticae aures traduntur.

Multa quoque alia in hoc libro scripturum se pollicetur, quæ nunc non extant. Ea fortasse vel non scripsit, vel interierunt, quemadmodum & multa alia antiquorum volumina, quæ nunc non extant, de quorum interitu complures scripserunt. De diutinis igitur affectibus pulmonis multa habentur & in maiori libro de morbis, cuius initium est. Si pulmonis arteria exulceretur, atque etiam in primo libro de morbis, qui non recte ita inscribitur, cuius initium est, Qui utique interrogare de curatione recte velit, rogatus quæ respondere. Sed in neutro horum plene exequitur, quæ hic pollicetur.

In initio libri de diutinis affectibus.

- 19 Quibuscumque cadentibus gibba spina fit, paucis ita conualescit, vt dirigatur.

Adhuc scripsit de spina citra exteriorē causam deprauata, quæ deinceps adscribit, omnia sunt de vertebra, quæ ob casum vel ictum aliquem læduntur. Pleraque autem plana sunt, nisi si ubi opus sit omissam causam adijcere, quemadmodum & nunc, cum asserit raro luxatam spinam restitui, cuius rei causam, & si nunc asserre potuisset, in sequentibus demonstrat, cum scribit vertebrae cardinis modo instructas, ita, vt, vbi vna aliqua quouis modo exciderit, in suam sedem magno negotio reuertatur, cum in singulis multi procellus sint, multi sinus. hoc autem & aspectu ipso in ossibus didicimus.

- 20 Iam verò intentio, quæ super scalam adhibetur, nullum, quod sciam, restituit. Ea potissimum vtuntur medici, qui apud vulgus videri volunt magnum aliquid moliri. Apud hoc enim admirandum est suspensum hominem intueri, vel proiectum, vel tale quidpiam: semper quæ hæc ab ipso laudantur, cui nec vltra curæ est, qui nam effectus sequatur ex huiusmodi presidio, bonus ne an malus: medici vero, qui hæc student, rudes sunt, quos quidem noui. Inuenio quidem reuera ita est: atque ego sane primum auctorem laudo, non solum huius, sed cuiusque machinamenti secundum naturam excogitati, in nunc enim diffido non nulla restitui posse, si quis recte præparans concutiat: sed turpe existimam eiusmodi morbis ita mederi, quum eiusmodi machinationes magis sint impostorum.

Quoniam (vt ostendimus) in omnibus articulis restituendis, præcedere debet in diuersas partes extensio, eandem quoque ad spinæ ossa necesse est adhibere. qua verò ratione intendere in diuersa conueniat, in sequentibus docebit. nunc de ea intentione loquitur, quæ minus recte adhibetur, quod facere consuevit, sicut in prioribus iam monstratum est. Primo enim reiicienda sunt, quæcumque male à quibusdam medicis sunt, deinceps tradenda sunt salubriora. Igitur, quum medici complures luxatam spinam per scalam extendant, asserit in primis eiusmodi inuentionem nihil proficere: si quis tamen ea uti velit, docet, quomodo facere id optime possit. Ergo in intendenda spina propositum est superiorem partem intendere per vincula prope affectum locum inue-

etia: inferiorem, per corporis pondus. Ad hoc itaq; spectans, quæ ab ipso subijciuntur, percipies, E maxima enim ex parte clara sunt.

- 21 Quibus prope ceruices spina gibba fit, par est minus succurri intentione adhibita per caput deorsum demissum, parum enim ponderis habent caput, & vtrunque latissimarum ossis summitas, cum deorsum spectant: sed hos verisimile est in pedes deorsum concussos magis restitui, in eam enim partem demissi maius pondus habent. At quibus infra gibba fit, hos concutere magis conuenit capite deorsum spectantes. Si quis igitur concutere velit, rem sic recte molietur. Scalam slerere scortus puluinus transuersis debet, vel ex lana bene alligatis, ac paulo plus & longitudinis & latitudinis scale tenentibus, quam occupet hominis corpus.

Quum spina vel prope initium lædatur, vel prope finem, vel in medio spacio, primò agit de noxa ipsius prope ceruices. Ergo in hoc casu, si quis super scalam à pedibus hominem suspēdat, sicut non nulli medici Hippocratis seculo consueuerunt, nulla ferè intentio fiet ab inferiori parte, quum parum ponderis sit in capite, & ceruicibus: sed, si in ima vitium sit prope os sacrum, maxime sperare quis poterit huiusmodi vim ab inferiori parte abtūde futuram, subdit deinceps, qua ratione id optimè fiat.

- 22 Post hæc homo super scalam resupinetur, dein pedibus nō diuarcatis iuxta talos ad scalam alligetur vinculo, quod quidem firmiter ac sine compressu teneat, sed molle sit: vinciatur item, & ab inferiori, & à superiori parte circa vtrunque genu, & tum circa cōxas, circa illa insuper & pectus, habena ita lata, vt concuti non prohibeatur: sed brachia iuxta latera extenta ad ipsum corpus, non ad scalam religantur.

Exprimit omnia euidenter, vinculum, quod firmiter ac sine compressu teneat, εὐοχον dicit.

- 23 Scala ita preparata attrahenda est ad turrim altam, vel ad culmen domus.

Turrim dixit τύρην: culmen verò domus, id est altissimam partem ipsius, ἀέτωμα, ita enim appellant eam tecti partem, quæ attollitur in speciem trianguli. Si quis enim solarium faciat, pro tegulis tectum sruet planum, quod calorem non prohibeat: sed, si tegulæ imponantur, propositum est, vt pluuialis aqua possit effluere. Hac igitur de causa medium tectum in longitudinem à priori & posteriori parte attollitur, vtrunque autem à parietibus humile est. Maiores igitur ad exemplum alarum, demissarum hanc partem domus ab aquila videntur ἀέτον appellasse, quo vocabulo tectum appellat & Pindarus in pleiadibus, vbi ait,

Χρύσεα δ' ὀξύπτερά αἰετὲς ἀείδον κληιδόνες. & Euripides in Hylipyle, cum inquit,

Id est πρὸς αἰθέρα ἐξαιυλῆσαι κόραι γράπτες οἷσι πρὸς βλεπόν τύπες. Quod τύρεις turrim significet, idoneus testis est Diocles Charistiis, qui iuxta verba (ᾧ δ' ἀφ' ἑασι greci dicunt) locum hunc exponit in libro de fascijs. Inquit igitur attrahenda scala est ad turrim altam, vel ad culmen domus, vbi turrim, quam Hippocrates τύρην, τώρην dixit.

- 24 Locus autem super quem concuti homo debet, renitatur: qui verò sursum attrahunt, non ignari sint, ut æqualiter, rectè, et in neutram partem inclinantes repente quæ demittant, ne scala in alteram partem inclinata ad terram perueniat, ne ue ipsi in priorem partem conuertantur.

Summam scalam à sublimiori loco suspēsam, quæ (vt dictum est) alligatum hominem habeat, in pauimentum subito demittit, vt cadente hac, atque concussa recondantur spinæ vertebræ suo loco motæ. Merito autem ad hunc vsum duro & renitenti pauimento opus est: nam, si ita molle sit, vt cedat, spinæ concussus remitteretur, ac sine vlllo effectu res erit.

- 25 Vbi verò à turri demittas, vel à malo, qui carchesium habeat annexum, commodius adhuc rem parabis, si à trochlea vel ab axe funes demittas, sed molestum est in his longius immorari. Per has tamen machinationes concuti quis maxime poterit. Quod si spina in parte admodum superiori gibba fuerit, atq; omnino concuti hominem oporteat, expedit in pedes concuti, vt iam dictum est: hoc siquidem pacto magis in inferiorem partem compelletur.

Quum scala ex sublimiori aliquo loco suspensa in terram demittenda sit, repente, æqualiter, & in neutram partem inclinata, satius est, inquit, vincula ipsa circa trochleas volui, sic enim facile, æqualiter, & sine inclinatione ducentur. Antea turris tantum & cacuminis domus, mentionem fecit, nunc malum adiungit, quem ἰσὺν appellat, significans maximum atque erectum tignum, cui summo superpositum est aliud lignum transuersum, à quo suspenditur velum, quod ἰσίων græcè nuncupatur. Differunt enim inter se ἰσίων trium syllabarum, & ἰσὺς duarum: hoc siquidem vocabulo malus significatur, qui (vt retuli) tignum est, quod in naui erectum affigitur: sed illo linteum, quod à ventis inflatur. funes verò in summo malo, carchesij nominantur. Ergo ubicunq; ad suspendendam scalam malo vtendum est, id efficiendum est per trochleas, & carchesios. nihil etiam deterius esse affirmat ad hæc vti axiculis, quos appellat ὀνίσκους.

- 26 A Fulcire autem pectus debes ad scalam fortiter alligans, atque item ceruices habena valide laxa, quatenus, quod excessit in suum locum reuertatur: atque insuper caput à fronte ad scalam deuincire, ac brachia exientia ad corpus non ad scalam: reliquum tamen corpus solutum sit, nisi quod pluribus locis habena laxa circumdatur, quatenus, quod excessit, in suum locum reuertatur.

In superioribus quoque ostendimus ἐρματα dici ab Hippocrate fulcimenta, & ἐρμάτας fulci re: atque hoc esse, quod à poeta scribitur, Ἴπποκράτης ἐρματα νῶν.

27

- A Scala cum scorreis puluinis.
B Æger scalæ alligatus.
C Turris alta.
D Trochlea.
E Paumētum durum ac renitens.

B

C



28

Sed videndum est, ne huiusmodi vincula concuti hominem non sinant. Crura verò non ad scalam, sed inter se uincienda, ut è regione spinæ deindeant: hæc siquidem ita aduincere conuenit, si homo super scalam omnino coadiutendus sit. Turpe autem est in omni arte, nec minus etiam in medicina sine ullo profectu magnam adhibere turbam, magnum spectaculū polliceri, & multa verba facere.

Quòd si homo, qui concutitur, nullis corporis partibus, exceptis superioribus, ad scalam uinciatur, facilè in latera deuoluitur: at rursus si fortiter alligetur, vt immobilis sit, concussu nihil leuatur. Ambo hæc igitur spectantes ita hominem uincimus, vt neque immobilis sit, quum concutitur sub uinculis firmiter adstrictus: neq; ita laxè super scalam contineatur, vt in latera deuoluatur. Hippocrates autem huiusmodi extendendi rationem contemnens, quo tamen modo optimè adhiberi posset, adscripsit: quandoquidem vidit, qui ea vtuntur nescire ipsam optimè adhibere. huc accedit quod superius dixit/minimè enim diffido nō nulla restitui posse, si quis rectè præparans extendat/.

In primis quidem cognoscendum est, quæ sit natura spinæ: ad multos enim morbos ea opus est.

Notare semel alicubi volumus, atq; in memoriā reducere, quæ à nobis dicta sunt à principio in primo libro de rōne corporū incidēdorum Hippocratis, in quo empiricorum impudētiā cognoscēs, qui audent Hippocratem appellare empiricū. Fuit enim oīum, qui medicinam exercuerūt, maximè experiens, maximè q; experimentorum spectator: ijsq; oīa comprobauit, quæ multis fretus rationalibus argumentis inuenit. potissimum q; rationi corporū incidēdorum operam dedit, vt quæ mirum in modum ad artem conferat: quod nunc aperte docet, cum spinæ naturam intelli gi velit, quam empirici non secus quàm cæterarum partium omnium, esse inutilem dicunt.

- 29 D Vertebrae igitur ab interiori parte, quæ ad ventrem spectant, inter se sunt æquales.

Vertebrae à posteriori parte processum exigunt acutum, extrema parte cartilaginofum, qui spi na nuncupatur: à contraria verò, priori scilicet, siue interiori (viroq; enim vocabulo nūcupatur) eque cartilagine superiectam habent, quæ rotundæ sunt & leues, nullum q; acutum processum exigunt, neq; prorsus eminentiam aliquam vel breuissimam, quemadmodum et à posteriori parte, & à latere. Quales igitur singularum vertebrarum processus sint, ex cadauere arido intelliges: ex quo planum etiam fiet id, quod ait, vertebrae ab interiori parte esse æquales, hoc est, æquam sin gulas, quæ inter se iunguntur. Quoniam igitur ea parte nullum processum habent, apertissime q; inter se conueniunt, æquales esse inter se dixit, hoc est æquari, ea parte, qua coherent.

- 30 Alligantur autem inter se mucoso ac nervoso ligamento, quod à cartilagine orsum vsque ad spinæ medullam progreditur.

Naturam cōmissuræ vertebrarum ad vnguem indicat, non. n. altè admodum in vnitatē cocunt à parte interiori, sicut nō nulli existimarunt: nam sic ubi in posteriorem partē plurimum curuan da spina esset, vel ex toto reniterentur, vel diuellerentur. nunc autem res aliter habet, quum non

Septima Classis.

MMMMMMM iij

cocant

coeant in vnitatem, sed veluti vinculo alligentur mucoso nervoso quod, atque idcirco leniter aliquid E hac parte mouetur, qua nullo modo motu fuissent, si continuarentur. At neque vinculum earum ad spinam medullam usque pertinet, sed interiecta aspera membrana in orbem medullam ipsam complectitur, quae non secus, ac cerebrum, tenui membrana primo velatur, postea crassiori. sed praeter ea quae in cerebro sunt spinam medulla septa est, hoc tegmento, quod vim habet prohibendi ne doleat, quum vertebrarum ossibus offenditur, ubi spina mouetur. Circa ipsas autem vertebrae innatum est vinculum mucosum, hoc est glutinosum, & quasi pituita plenum, ut vertebrae promptius moueantur, ipsum quod vinculum minus laedatur. In vehementi enim motu abrumpuntur, quae sicca sunt, & sine humore, atque idcirco qui loribus ad vehicula et iumenta vtuntur, ipsa inungunt, quanquam eiusmodi mucosus humor in omnibus articulis ob eandem causam inuenitur.

31 *Quaedam alia etiam ligamenta nervosa, perpetua adnascuntur, & hinc atque hinc a lateribus ipsarum intendunt.*

Perpetua ligamenta intellexit, quae a superiori parte deorsum feruntur plurimum longa. nihil tamen habeo, quod scribam, quamobrem ligamenta, quae iuxta intendant, nervosa dixerit: dicendum. n. fuit, non nervosa, sed nervi, nisi si valida appellauit nervosa. nervi autem euidenter per vniuersum thoracem iuxta vnamquamque vertebrae intendant, quorum superiorem originem in corporibus incidi F deinde demonstrauimus. ad ceruices autem & lumbos super vertebrae muscoli sunt, per quos feruntur nervi.

32 *De venis autem & arterijs huc pertinentibus alibi tractabimus, quot & quales sint, unde inchoentur, quid quae in quibus possint.*

Has quoque didicistis in corporibus incidendis: sed et in libris, quos de venis & arterijs, de nervis item incidendis habetis: quae omnia diligentius tradidimus in libro de ratione incidendi corporis. quare pluribus hic de illis agere oportere non est, quum neque ipse Hippocrates persequi in hoc opere vniuersam earum naturam vellet, sed ea sicut alia multa in alium locum differat. licet, quae de venis & arterijs scripta nunc pollicetur, non extent. de nervis autem iuxta vertebrae tendentibus in secundo libro de morbis vulgaribus, non plene quidem, sed in commentarij modum tractauit, tanquam de alijs, quae nos ostendimus in eo libro commentarij modo & non plene ab Hippocrate scripta: solummodo enim primum & tertium librum de morbis vulgaribus absoluit, ita, ut edi posset.

33 *Tum de medulla spinæ, quibus tegmentis tegatur, unde originem ducentibus, qua parte finitis, quibus cum coniunctis, quid quae valentibus.*

Tegmenta ac velamenta alicuius rei veteres appellat *ἐλντες*, atque idcirco Hippocrates nunc medullae spinæ tegmenta *ἐλντες* nuncupauit, quae nos paulo ante narrauimus. duo quidem intrinsecus omnino sunt: extrinsecus vero communia omnium vertebrarum ligamenta. Oriuntur autem membranæ a membranis, quae cerebrum tegunt: sed tertium velamentum, quod extrinsecus eas complectitur, originem habet a caluaria, quae cum prima vertebra committitur. Huiusmodi autem ligamenta non secus, atque ipsa medulla, ad imam spinam finiuntur. /Finitis/ Hippocrates dixit *κράινουσι*, sicut poeta quum inquit,

Εἰπερ δὴ κραινέω γε καὶ εἰ τελεισμὸν ἔσαι. quid vero possint, exquisitè iam ostendimus in opere de ratione corporum incidendorum, atque etiam in proprijs libris, inter quos praecipuus est, qui de usu partium inscribitur. nunc autem scripsisse abundè est membranas, quae cingunt spinam medullam, eundem praestare usum, atque in cerebro, quod crassa membrana defenditur, ne a circumpositis ossibus laedatur. Est & aliud cerebri velamentum, & quasi cutis innata, quo haec nectuntur, nempe tenuis membrana. de tribus autem his tunicis in medulla spinæ paulo supra pertractauimus.

34 *In vltiore autem parte, vertebrae cardinis modo commissuras habent.*

Quum explicare spinæ naturam instituerit, orsus ab interioribus partibus ipsius, quae vertebrae aptè inter se cohaerentes ad ventrem spectant, & inter se sunt aequales, iure nunc subdit /in vltiore autem parte vertebrae cardinis modo commissuram habent/. vltior enim pars ipsa, quae proposita sunt, erit posterior, qua inquit vertebrae cardinis modo inter se committuntur. Non debes autem intelligere posteriorem partem eam, quae sita est contra ligamentum propositum, quod scilicet a iunctura vertebrarum procedit, is enim locus medius exquisite posterior est, ubi spina tantum est, sed eam, quae vtrinque est a commissuris ipsarum vertebrarum: quae, si ad spinam referatur, erit a lateribus spinæ: si ad priorem partem, in qua dixit vertebrae inter se colligari, posterior. Scripsit autem eas commissuras cardinis modo esse, quoniam quatuor exigunt processus, quibus committuntur: duobus quidem admittunt eminentias proximè vertebrae, duobus se in alteram insinuant. efficitur autem quodammodo structura cardinum similis.

35 *Nervi omnium communes, & ad exteriorem partem, & ad interiorem procedunt.*

Pars vertebrarum, quae ei opponitur, qua illigantur, posterior & exterior appellari potest: sicuti

A sicuti ea ipsa, qua illigantur, interior, & prior, verum à posteriori parte non reperiuntur nervi, quos nunc *τόνεις* dixit, si nervi intelligantur, qui motum voluntarium prestant. qui enim vertebrae inter se committuntur, foramen est, per quod unusquisque nervus à spinæ medulla traiectus, protinus distribuitur, cuius aliæ partes ad priorem regionem intendunt, aliæ ad posteriorem, atque in musculos dissipantur, qui, quum spinæ superiecti sint, *ράχιδαι* græcè nominantur.

36 *Singule autem vertebrae, tam maiores, quam minores, in exteriorem partem singulos processus exigunt: his autem processibus adiecta est cartilago, atque ab ea germen oritur ligamentorum, quæ nervis exterioribus germana sunt.*

Singularum vertebrarum processus per medium dorsum intendant, atque universam spinam componunt: extremo autem processui cartilago innixa est, à qua oritur germen ligamentorum, quæ (ut ipse ait) nervis germana sunt: quo significat, vel simillima, vel inter se coeuntia, immixta quæ, utrumque, n. verum est.

37 *Adiunctæ autem costæ sunt capitibus in interiorem partem spectantibus magis, quam in exteriorem, quæ singulatim cum unaquaque vertebra committuntur.*

Costæ, id est thoracis ossa, quæ à spina intendunt transversa ac modicè obliqua ad pectus, græcè non modo ab Hippocrate, sed ab omnibus iunioribus medicis, nominata sunt *πλευραι*. Has inquit cum vertebra committi, quod *προσνηρθεῖν* dixit, quasi dicat *συννηρθεῖν*, quod vocabuli apud iuniores medicos magis in usu est: eo. n. significant ossium committuras quibus talis inest motus, ut sensu aliquatenus percipi possit. Costarum capita vocavit extrema, per quæ cum vertebra coniunguntur, in radices processuum à lateribus se insinuant. Exquisitè autem dixit ipsas magis in interiorem partem spectare, nostris enim rem ita se habere: ipsarum verò committuram quodammodo duplicè conspeximusquam rem Hippocrates prætermisit, vel quod non ex toto universam naturam committuræ fuerit intuitus, vel quod tam diligentem eius inquisitionem ad propositum pertinere non existimaverit.

38 *Maximè autem flexæ sunt hominis costæ, & modo eorum, quæ curvæ sunt.*

Inter omnia animalia homo costas habet maximè curvas, quum & pectus omnium latissimū: ex ceteris vero animalibus, alia magis, alia minus, acuto pectore sunt. latissimi autem pectoris est homo, dein simia, quæ pectus habet angustius homine, latius quæ cetera animalia. Comune est autem omnium animalium, quæ thoracem habent, costas esse ab exteriori parte, quæ tangimus, gibbis: à contraria, intrinsecus scilicet, simis. Id. n. necessarium hominibus fuit, ut thoracis spatium latum redderetur, quum iuxta os pectoris dirigantur costas oportuit: reliquas earum partes, quum deberent ad spinæ vertebra pervenire, opus fuit plurimum curvari. Res igitur, quæ proponit, ex eo aperte intelligitur, quod ipse ait costas maximè curvas esse, quod quæ earum figura talè euidenter se ostendit. Restat questio, quæ ad rem non pertinet, sicut prior, sed ad vocem, quum Hippocrates explanationis vel exempli causa vult verbo *ροισειδῆα*, quod maiore affert obscuritate, quæ ipsa, cuius gratia id exemplum afferri. tunc fortasse vox erat usitata, aliogru verba hæc / modo eorum, quæ curva sunt / non dixisset *ροισειδῆα τρέπον*: deinde usu explosa, obicura effecta est. Vox quæ *ροισειδῆα* per se apud Theocritum curvum signat in eo carmine, ubi inquit,

Ροικόν δὲ κεν ἀρχεμελαίας δεξιτέρῃ κορυφῇ.

Idem quoque significat apud Archilochum, quum scribit,

Ἀλλὰ μικρὸς τις εἶναι, καὶ πρὸς κνήμῃς ἰδεῖν.

Ροικὸς ἀσφαλέως βεβηκὼς ποσὶ καρδίῃς πλέως.

Apud Nicandrum similiter.

Ἀλλοὶ δὲ ροικοῖσιν ἰσχυρεῖς αὖ τὰ παγκροῖς, γυῖα βαρύνονται.

Per 6 autem scriptum *ροιβὸν* nescio quid tibi velit. Quanquam in non nullis exemplaribus per 6 scribatur, sed in magis probatis, per *κ*.

39D *Quod autem inter costas est, quod quæ inter processus ossium vertebrarum, utrinque complent muscoli, qui à cervicibus orsi usque ad nexum intendunt.*

Quod in corporibus incidendis apparet, non admodum consentit cum verborum sententia, nam quod apparet homini est. A costarum capitibus, quæ cum vertebra committuntur, muscoli sunt à posteriori parte, qui *ράχιδαι* nuncupantur, alij in longitudinem spinæ tendunt usque ad initium crurum: à priori parte in longitudinem musculi non procedunt, sed transversè inter costas, quos *μεσοπλευρικούς* appellat. Deinde ad aliquot costas pertinent muscoli, qui stomacho subiecti sunt, à quibus totum collum in priorem partem attrahitur, & paululum et annuit, ubi capitis committura non moueat: ipsa. n. per se maximum habet motum in annuendo, et abnuendo, si quis eam cum vertebra coferat, quæ post primas sunt: aliarum. n. inter se committuræ paululum mouent. Sed et à regione iuxta lumbos, procedunt ad extremas thoracis costas eorum musculorum summitates, qui *ψόαι* dicuntur: in medio autem thoracis ad costas musculi non pertinent, qui sibi sunt ad vertebrarum processus à lateribus positos, quæ committi costas posui. Sunt & alij duo musculi angustij. atque exigui, qui ab exteriori parte per universam thoracem iuxta musculos, qui *ράχιδαι* dicuntur, intendant à priori parte, non à posteriori versus spinam. Hæc igitur est positio, ac natura musculorum circa vertebra, quæ ex corporibus incidendis inuenitur.

Septima Classis.

MMMMMM iiij

Videamus

Videamus deinceps de quibus nam Hippocrates meminerit, ac de his quod est, quod inter costas sunt, patet E ipsum minimè egisse, quum ait / musculi, quod à ceruicibus orsi, superest igitur, ut eos intellexerit, vel qui παχίται dicunt, vel quod iuxta hos siti sunt. sed neutri rectè dicent, quod inter costas est, quod quod inter processum ossium vertebrarum, cōplere. Παχίται quidem musculi vniuersis propolitorum ossium cōmissuris in toto thorace supiniecti sunt à posteriori parte, nihil relinquētes, quod nō cōtegant, sed oēs costarum radices, & vertebrarum processus, qui à lateribus sunt, ad hæc quod inter ipsas radices est, complectunt: Angusti autē musculi, qui iuxta hos versus priorē partem siti sunt, protinus post cōmissuram sunt, ad extremitates eorū processuum, quos vertebra à lateribus exigunt. quum ēt, quod in fine propolitorum verborū adiungit / vsq; ad nexum / si de angustis musculis intelligatur, necesse est ad septi transversum nexum referamus: si de his, qui παχίται vocant, ad crurum nexum, quem ὀρόσφυσιν dixit, crurum fortasse iuncturā intelligēs. Equidem verba hæc nequeo accommodare ad id, quod sensui apparet, arbitror quod initio protinus errasse primū librariū, sicut in alijs multis veterum scripturis. Sed, quum ita habeāt, quæ in corporibus apparēt, quæ est idonea expolitionis cōmuniter oibus proponatur. quod autē distinctum, & aliquatenus probabile videt, huiusmodi est. Costas accipiemus pro ipsarū costarum capitibus: processum ossium vertebrarum, pro ossibus, quæ spinā constituunt: sed musculos cōplentes vtrinque eam regionē, quæ interiecta est, ὀζ F χίτας intelligemus: nexū, septi transversum. Pelops autē præceptor noster costas, nūc ab Hippocrate voluit notari oēs vertebrarum processus, quod à lateribus sunt: sed nexū retulit ad septū transversum.

40 *Ipsa autem spina in longitudinem rectè obliqua est.*

Obliqua dixit σκολίαν, eam sic appellare solitus, quæ in latus inclinata est: nunc autem non in latus, sed in posteriorem et anteriorem partē significare vult, spina enim in longitudinem recta paululum in posteriorem & anteriorem partem inclinatur, ut ipse deinceps docebit.

41 *Ab osse sacro vsque ad magnam vertebram, quæ inheret crurum nexum, spina caua est. quoniam vesica, partes naturales, & id intestinum, quod laxum est supra anum, hac parte continetur.*

Crurum nexus multis modis intelligi potest, maximè quidem propriè fortasse is, qui à coxarū cōmissura est, quum scilicet femoris caput coxarum ossi per lata ligamenta illigatur, & per id, quod rotundum est, quo altissimis partibus caui ipsius coxæ innectit: tum per musculos, qui cōmissuram femoris mouēt, meritò vtrique dici potest crus necit superioribus partibus: deinde per nervos, postea per arterias, & venas. Videtur autē hic Hippocrates nexum per nervos exponere, quum ab extrema lumborū vertebra, quæ cōmittitur cum osse, quod & latum & sacrum nuncupat, oriatur nervi, qui tendunt ad crura. cōprobatur autem, vel ex eo, quod in corporibus incidēdis apparet, vesicā, & partes naturales, & id intestinum quod laxum supra anum est, hac parte contineri, quamobrem ab exteriori parte gibba structa est. Naturales partes quas ὀσάς dixit, intellexit eas, quæ generationi accommodant, vterum in foeminis: quæ semini aptant in maribus, ὀσυντικὰ nūcupantur. id autē, quod laxū est: supra anum dixit χαλαρόν ἀρχέ, id siquidē sacro ossi superimpositū est, & reuera laxum est, quum nō habeat musculos, qui extremum intestinum rectū adstringunt.

42 *Ab hac ad septi transversum nexum, recta in interiorem partem recuruat.*

Hac parte nihil tale spinæ insidet, quales in inferiori vterus & vesica. Quare non necesse fuit ab interiori parte simam esse, atque idcirco, neque ab exteriori parte gibbam, sed hac parte spinam paululum intus spectare, fulciri enim ab ipsa magnam arteriam, ac venam oportebat.

43 *Atque hic locus solus ab interiori parte adiunctos habet musculos, quos ὀσάς appellant.*

Ex his potissimū verbis cōiungere quis posset, Hippocrate spinæ nō annuerasse vertebra ceruicū. quasi. n. spina vniuersa lato osse & vertebris, quæ ad lumbos, & quæ ad thoracē sunt, cōtineatur, dixit / atque hic locus solus ab interiori parte adiunctos habet musculos. Nā, si spinæ ceruicū quoque vertebra annumeret, falsum vtrique erit hūc locū duntaxat habere adiunctos musculos, cum & in ceruicibus ab interiori parte grandes musculi contineantur: quos, quum grandes sint, non latuisse Hippocrate nemo ignorat, quādo ēt, si exigui fuissent, nullo modo ipsum latuissent. horū tamen musculorū, qui ὀσάς noīantur, particulā vsq; ad eā regionē pertinere, quæ septū transversum innectitur, propolitis verbis non notauit, ut qui opere precium esse tā exquisitè docere nō existimaret.

44 *Ab hoc item ad magnam vertebram, quæ sita est sublimior commissura humeri cum lato scapularum osse, recta in gibbum vertitur, sed magis adhuc videtur, quæ sit: habet enim spina in medio ossium processus altissimos, ab utraque autem parte humiliores.*

Vertebra, quæ ad costas sunt, ab interiori parte simæ paululum videntur, à posteriori gibbæ multum propter spinæ processum. vertebram autem, quam magnam dicit sitam super commissuram humeri cum lato scapularum osse, nouistis, & reminiscendi causa habetis in commentario,

Ario, quem de ossibus scripsi. His autem, quæ proponuntur, accommodanda illa sunt: neque opus est me ulterius explanante, nisi si quod verbum alicubi occurrat, quod expositionem requirat, cuius causa huiusmodi commentaria scribuntur: quemadmodum evenit in hoc ipso loco.

45 Ipsa verò ceruicium commissura in anteriorem partem spectat. Quibus igitur vertebrae gibbae sunt, maxima vi conjunctione abrupta expellitur vel una vertebra, vel plures: quæ res non accidit multis, sed paucis, non enim facili mercedunt huiusmodi casus, nam nec facile in anteriorem partem veniunt vertebrae, nisi a priori per ventrem vehementi ictu truantur, sic autem homo interiret: aut nisi quis ex superiori loco decideret, in coxas vel scapulas caderet, sed & sic quoque expiraret. A posteriori autem parte non facile expellitur vertebra in anteriorem, nisi aliquid graue admodum super ipsam incidat: ossa enim, quæ ab exteriori parte procedunt, singula talia sunt, ut potius frangi possint, quam coactis ligamentis, valde in anteriorem partem erumpere.

Speciat in priorem partem, dixit *λεπὸν*, ita enim conspicitur. Duæ autem sunt primæ vertebrae, quibus ceruicium commissura efficitur: post quas relinquuntur tres, quarum non meminit, quomodo collocatae sint inter secundam & sextam, nempe tertia quarta & quinta, quæ maxime videntur rectum positum habere. hæ autem vertebrae longè minores sunt duabus, & præcipue tertia, quarta enim hac maior est, sicut his rursus quinta, sexta verò non his duntaxat maior est, sed septima etiam. Ab hac autem usque ad extremam spinam pro ratione altera maior altera est, si hæc in homine perpendantur, vel in ea simia, quæ hominis faciem magis representat, & magis quæ ceteræ, recta inambulat, namque hæc, & in aliis, & in ossibus homini simillima est. vnum autem in spina habet aliarum quoque quadrupedum commune, quod in homine non reperitur, nempe lumbos pro magnitudine reliquarum partium corporis longiores, quæ homo, cui ad lumbos quinque duntaxat vertebrae sunt, in simiis autem sicut in aliis quadrupedibus sex. Illud autem animaduertere in propositis verbis oportet, quod Hippocrates, quum de spinæ figura tractare continuaret, orsus hoc modo / ipsa autem spina in longitudinem recta obliqua est / in extrema oratione adiecit / ipsa verò ceruicium commissura in anteriorem partem spectat / videbitur enim hic rursus ceruices spinæ partem posuisse.

Supra t. 40.

46 Et articulis, qui alios recipiunt, & in alios coniciuntur. Medulla item spinæ laboraret, si parumper loco sua inclinaretur, vertebra hoc modo expulsa. Luxata in super vertebra medullam comprimeret, si non inclinaret: hæc autem compressa detenta quæ, multis locis grandibus & præcipuis torporem afferret, ita, ut medico non amplius curæ esset, qua ratione dirigere vertebra debet, circumstantibus multis aliis malis violentis: sed manifestum quoque est restitui non posse, neque concutiendo, neque alia via.

Vertebrarum articulos dicit in processibus à lateribus sitis, quorum alter alterum excipit. eos autem ait recipere, & in alios conici, eo quod vtrique vertebra duobus processibus sublimioribus cum superiori vertebra committatur: duobus humilioribus cum inferiori. sic, ut aliis proximæ vertebrae processus admittat, aliis in alterius processus coniiciatur. quæ omnia perfecte exequuti sumus in libro de ossibus.

47 Nisi hominem feces, deinde manu altè in ventrem indita ab interiori parte in anteriorem compellas: quod quidem mortuo fieri licet, viuento, nullo pacto. Quorsum igitur hæc scribimus? quoniam non nulli sibi persuadem se sanasse eos, quibus vertebrae articulis ex toto excedentes in anteriorem partem venerunt. Quamquam non nulli facillimum existimant vertebrae eo modo luxatis euadere, nihil quæ opus esse restituere, sed eas per se restitui. Alii sane ignari sunt, & ob imperitiam lucrum faciunt, vulgo enim suadent. Hoc itaque pacto decipiuntur. Spinam, quæ in dorso extat, putant esse ipsas vertebrae, nam singula tactu ibi: rotunda sentiuntur: neque intelligunt hæc ossa a vertebrae procedere (de quibus paulò supra tractauimus) ipsas verò vertebrae multo magis in priorem partem sitas esse: siquidem ex omnibus animalibus homo pro magnitudine ventrem habet angustissimum a posteriori parte in priorem, præcipue ad thoracem. Ergo, ubi aliquod ex his ossibus, quæ valde excedunt, comminuitur, siue unum, siue plura, is locus humilior fit, quam qui hinc est, atque hinc: ac propterea errant, putantes vertebrae in anteriorem partem procedisse. Quos item fallit habitus eorum, qui icti sunt: nam, si curuari velint, dolent, cum qua parte percussi sunt, cutis tendatur, sic quæ ossis fragmenta carnem magis vulnerent: sin ita figurari, ut spina a posteriori parte caua sit, lenantur, cutis enim, quæ fractura est, laxior efficitur, & ossa minus vulnerant: quin si ea parte tangantur, cedunt, spinam in priorem partem compellentes, is quæ locus inanis & mollis tangenti apparet. Hæc omnia, quæ dicta sunt, medicos fallit: cetero aut, ac sine aliquo detrimento, huiusmodi homines per se sanescunt, hæc enim ossa omnia, quæ rara sunt, callo celeriter glutinatur.

Manum altè indere in ventrem, causa conquirendi, quæ ibi sunt, dixit *ἐν τῇ κοιλίᾳ*.

48 Iam verò iis, qui sani sunt, obliqua spina fit pluribus modis: namque & natura, & usu sic habet, sed & ob sonum, & sub dolore, hæc siquidem colligandi vim habent. Gibba autem plerumque fit, quum homo vel in coxas vel in scapulas cadit: necesse enim est in spina gibba unam aliquam vertebrae reliquarum omnium conijuncti maxime, si memineas autem, quæ hinc atque hinc sunt, minus. Nec plurimum huiusmodi vertebra ab aliis recedat, sed parum, quia do-

pag. 28

singula subito plurimum cedunt. Hac igitur de causa, et spina medulla facile fert, quum ita peruertitur, quum fiat gibba in orbem, non ad angulum.


Vbi spina gibba fit, hoc est, in posteriorem partem cōuertitur, κύφωσις appellat: λόρδωσις, vbi curua, spectat q̄ in priorem: vbi obliqua & in latera, σκολίωσις, quo verbo vritur alio modo & ad omnem spinæ deprauationem significandam, indicans verbum generale magis esse quàm alia. in qua significatione nunc quoq̄ ait spinā σκολιαν εἶναι, quasi dicat quouis modo peruerit: atq̄ in superioribus etiam dixit ipsa autem spina in longitudinem recte obliqua est, obliquam vocans σκολίην, vbi eam inclinare in priorem & posteriorem partem indicauit.

49 Oportet autem restituendi rationem huiusmodi præparare. Commode quidem lignum firmū ac latum quod in longitudinem incisum sit, foditur: commode etiam pro ligno paries in longitudinem excanatur, quod latum a paui-
mento, vel cubitum, vel quantum res exigit, attollatur. Dein veluti quadrata columna querna transversa adhibetur, quæ
a pariete catenus recedat, vt aliquis inter vtrumque vbi opus sit, transire queat: stratur columna hæc vel tunicis,
vel quapiam re, quæ mollis sit, & non admodum cedit. Homo fouetur, & si sustinet, multa aqua calida lauatur: de in-
de in ventrem iacet extensus, brachius secundum naturam porrectus, atq̄ ad corpus alligatus. Lorum item molle la-
tum quæ abunde, & longum, quod constet duabus habenis, medium medio pectori iniecitur bis circumdatur, quātum
potest iuxta alas: postea, quod ex loris superest, circa alas humeri capiti obuoluitur, capita que ad aliquod lignum cu-
iusmodi pistillum est, alligantur, eorum enim longitudo aptatur longitudini eius ligni, quod subiectum est, vt hoc pi-
stillo extendenti mora sit. Huiusmodi etiam aliud vinculū super genua, & super calcas datur, capita q̄ eius ad aliquod
tale lignū vincuntur. Aliud insuper lorum latum molle ac valens habenæ modo conuenienter longū ac latū coxis in

- A Columna querna quadrata pannis strata.
- B Laquei pectus circumdantes qui feruntur ad superius pistillum.
- C Laqueus supra genu & talos.
- D Lorum ilibus alligatum.
- E Pistilla ad caput & pedes.
- F Manibus comprimens.




- A Columna querna quadrata pannis strata.
- B Laquei pectus circumdantes, qui feruntur ad superius pistillum.
- C Laqueus supra genu & talos.
- D Lorum ilibus alligatum.
- E Pistilla ad caput & pedes.
- F Insidens & se attollendo concutiens.



orbem firmiter deuinci-
tur, quam maxime po-
test prope coxas: deinde
lori, quod superest, utriq̄
caput simul ad lignum,
quod ad pedes sit, alliga-
tur. Homine ita figurato
intentio in diuersa adhi-
betur sine vlla inclinatio-
ne simul, & recta: nullū
enim magnum detrimen-
tum inferre eiusmodi in-
tentio potest, si recte præ-
paretur, nisi quis de indu-
stria id agat. Medicus ve-
rò vel alius quouis modò
prævalens sit, & non im-
peritus, sublimiori vnius
palme parte, qua spina
gibba est, data, atque alte-
terius palme sublimiori
parte superiniecta, cōpri-
mit, intuitus num recta
deorsum uersus caput, uel
uersus coxas debeat, com-
primere. Adhibetur autē
hoc modo vis maxime in-
nocenter: innocenter etiā,
si quis super eam partem,
quæ spina gibba est, sedeat:
simul quæ, vbi homo ex-
tenditur, se attollens con-
cutiat. Sed & pedibus
consistere super spinam,
quæ gibba est, sustineri
quæ leniter concutere,
nihil prohibet, ad quam
rem satis idoneus est qui-
libet palæstræ assuetus.
Apriſimè

- A Columna querna quadrata pannistrata.
 B Laquei pectus circumdantes.
 C Laqueus supra genu & talos.
 D Lorum ilibus alligatum.
 E Pistilla ad caput & pedes.
 F Infittens & pedibus sensim incutiens.



- A Paries excavatus.
 B Columna querna quadrata pannistrata.
 C Habena pectori circumdata.
 D Laqueus supra genu & talos.

- E Habena ilibus circumiecta.
 F Pistilla ad caput & pedes.
 G Asser è tilia.

Aptissime autem cogitur, si paries, qui excavatur, vel lignum, quod foditur, quatenus convenire videbitur, infra hominis spinam incidatur: asser verò è tilia, vel ex altero ligno non tenuis sectur: tum super spinam, quæ gibba est, vel multiplex panniculus, vel parvus aliquis pulvis scorteus, imponatur: sed quantum minimè potest, convenit hæc subucere, videndum est solummodo, ne assers præduritie frustra doli sit: ea autem pars spinæ, quæ gibba est, sit maxime è regione eius parvis, quæ paries excisus est, ut assers, quæ maxime spinæ extat, superimpositus, maxime premat: adhibitus verò assers, à ministro uno vel altero si opus fuerit, cogatur, alij (ut supra ostensum est) hinc atque hinc in longitudinem corpus intendant. Licet & per axes extendere vel iuxta lignum defossos, vel contentos in quibusdā lignis in ipsum defixis, quæ erigantur, siue utrinque à lateribus paululum extantia, siue in utraque eius extremitate. Accommoda-

tur autem vis, quæ per hæc adhibetur, & ubi vehementiore, & ubi leniore opus est: tantum enim roboris habet, ut si quis non in medicina, sed ad torquendos homines eam adhibeat, præstanter ad id valeat, ita, ut, siue tantum extendamus in longitudinem, hinc atque hinc nihil ultra cogentes, siue citra intentionem assere duntaxat admoveamus, abunde sit. Optimum autem est uti eiusmodi via, quam in ipso usu, & intendendo, & remittendo moderari potes, quæ ne secundum naturam est. Quæcumque igitur extant, compressa, in suum locum redeunt: quæ præter naturam coierunt, intentata, secundum naturam compelluntur. Equidem cogendi alium modum meliorem aut iustiores habeo nullum.

D Quæ subiicit, plane omnia explicat. quare si quis non percipit, quæ proponuntur, huic non explanatione opus est, sed monstratione. quin & commentaria ad eos scribuntur, qui eiusmodi curationes iam inspexerint. Monui etiam in superioribus, ut, si quis prima lectione non intelligat, quæ ita clarè ab Hippocrate scribuntur, iterum, & tertio, & sæpius, diligenti animadversione relegat. quòd, si hoc faciat, quæ planè ab ipso traduntur, omnino intelliget.

50 Nam quum è regione ipsius spinæ intentio adhibetur, ab inferiori parte, & iuxta os, quod sacrum appellatur, non est locus, qui prehendi possit: à superiori iuxta cervicem & caput, est quidè, sed aspectu indecorus, præterquam quòd, si corpus ab hac parte valentius extendatur, alia quoque noxa afferetur. Expertus aliquando sum utrem non inflatum, quem resupinato homine spinæ, quæ gibba erat, subieci, dein fistula ænea demissa inflavi, sed parum prodest: cecidit enim uter, quum homo benè extendebatur, neque spiritus impellere quidquam poterat, sed alioquin uter promptè labebatur, quum se compellerent & gibbus spinæ locus & repleti utris tumor: at contra, quum non valde homo extendebatur, uter ob spiritum in tumorem assurgebat, sed homo magis quam expediret, in priorem partem convertebatur. De industria autem hæc scripsi, pulchra enim huiusmodi monumenta sunt eorum, quæ, quum experti sumus, siue esse elu invenimus: & causarum, cur parum processerint.

Locū, qui prehendi possit ἐπιλαβὴν, quasi ἀντιλαβὴν, & ἀντίληψιν dixit, eo quod obex & mora sit

fit iniectis laqueis, sic, ut hereant, quæ eminet, & minimè decidat. Ab osse sacro nullus talis locus est: E à superiori parte, quamuis ceruices sint, & caput, homo tamen strangulari videbitur, si hac parteprehendatur: atque idcirco ea intendendi ratio indecora habebitur, sed & noxam inferet, si laqueus ad guttur delabatur.

- 51 Quibuscumque autem vertebrae in interiorem partem conuertuntur, vel quod homo ceciderit, vel quod graue aliquid super ipsum incidat, plerumque nulla vertebra valde ab alijs recedit: Vbi non valde recedat, siue una, siue plures, hominem non precipitat, sicut antea dictum est, cum spina in orbem, non ad angulum peruertatur. His quidem vrina, & alius magis supprimitur, quam quibus vertebrae in exteriorem partem conuertuntur, pedes quæ & crura tota magis frigescunt: atque hæc magis mortifera sunt, quam quæ posita sunt: quibus, si euadunt, vrina sine voluntate magis prorumpit, crura quæ magis resoluuntur, & torpent. Quod si superior spina in priorem partem conuertatur, vniuersum corpus resoluitur ac torpet. Machinationem autem nullam habeo, quæ spina restitui possit, vbi sic luxatur. Quod si nihil proficiat concutiendi modus, qui per scalam admouetur: vel alia similis curatio, seu extendendi via, qualis paulò antè dicta est: nullum noui impellendi simul & extendendi modum, qui id præstare possit, quod assero, vbi spina gibba erat: nam, qui fieri poterit, ut à priori parte per ventrem impellatur? Ergo, neque hoc licet, neque tuus aut sternutamentum vim aliquam habet, quæ ad extensionem conferat. Nihil etiam proficies, si spiritum in ventrem indas. Quia, & F qui magnas cucurbitulas defigunt, ut sursum attrahant vertebrae, quæ in interiorem partem exciderunt, summo opere aberrant: expellunt enim magis, quam attrahant, quam rem ignorant, qui eas defigunt: nam quo maior cucurbitula est, eo magis spina cauasit, quum à superiori cute vrgeatur. Alios item concutiendi modos præter iam positos adducere possem, quos existimet quis ad vitium magis pertinere, sed eos (ut pote quibus parum confidam), omitto. Illud autem in vniuersum, ut summam dicamus, intelligere oportet, quod, vbi spina in interiorem partem conuertitur, ad interitum ægotantem precipitat, & infestissima est: vbi in exteriorem, vacat mortis periculo, vrinam non supprimit, & plerumque torporem non infert.

De vertebrae agens in interiorem partem luxatis, inquit casum asperiores esse, quæ si in exteriorem ferantur, causam esse in aperto dicit. Nervi enim omnes, qui à spinæ medulla oriuntur, in interiorem partem procedunt. Premuntur ergo magis, vbi spina in hanc partem conuertitur, quæ vbi in exteriorem, cum quibus iis vrgentur, quæcumque partes spinæ superinsident. quo fit, ut interdum superior quoque pars velicæ comprimatur: & quæ cum his consortium habet, omnia inflammatione occupentur. Quamobrem neque velica vrinam, neque alius deiectionem reddit: expellentis enim facultatis, quæ vna ex naturalibus est, vitium est vrinam atque alium supprimit: torporis autem membrorum causa est, neruorum affectus: sed velica & intestinis affectis, periculum est, ne homo interrim decedat, dum tollitur inflammatio, quæ efficit, ut nec alius, nec vrina respondeat. Quæadmodum autem musculus, qui velicam adstringit, cum nimium suo munere fungitur, non patitur vrinam euadere, ita verisimile fit affici musculum animum, quæ græci ab adstringendo σφιγξνναι nominarunt.

- 52 Quum nec alui itinera distendat, nec prohibeat, quo minus facilem exitum habeant, spina, quum in exteriorem partem conuertitur: sed quum in interiorem, utrumque hoc efficiat, accedant quæ alia complura.

Quum proximè proposuerit his vrinam & alium magis supprimit, quam quibus vertebrae in exteriorem partem conuertuntur, nunc causam adiecit his verbis / quum nec alui itinera distendat / id est exitum eorum, quæ per velicam & per anum expelluntur. Distendi autem partes, per quas hæc feruntur, & à compressione vertebrarum, & à consortio, quod cum nervis habent, à ratione minimè abhorret.

- 53 Multo autem pluribus crura, & brachia resoluuntur, corpus torpet, vrina supprimitur, quibus vertebrae nec in exteriorem partem, nec in interiorem exciderint, sed concussæ vehementer fuerint, manentes è regione spinæ: quibus spina deprauatur, minus hæc patiuntur.

Ut deprauationem exprimat, mutuatur ὕβρις vocabulum tanquam generale, agens de vertebrae, quomodocumque suo loco motis. Vniuersa autem oratio clara est, venit enim ad quartum genus vitiorum spinæ, quod græci à concutiendo σέσω appellat. Id autem est, quum vertebrarum spinæ compago vniuersa dimouetur, periculum quæ est, ne conuellatur atteratur quæ spina vehementer concussa: quod malum ipse testatur multo deterius esse, quam, si spina non concussa vertebrae peruertantur. In sequentibus ad costas pergit, quibus abruptis huiusmodi quidpiam accidit.

DE FRACTURA COSTARVM

- 54 Multa quoque alia in medicinali arte quis inspiciet, quorum, quæ vehementia sunt, quum morbi momentum omne in se contineant, non nocent: quæ leuiorem offensam asserunt, mala concitant diuturna, & reliquum corpus plurimum afficiunt.

Locutus de vitio, sub quo spina concutitur, vertebrae nullo modo sua sede excedentibus, subiicit multa in medicina leuiora esse re vera, quamquam grauiora videntur: multa enim, quæ minus afficiunt partes cum vitioso loco consortium habentes, ut, quæ nullam ex præcipuis partibus lædant, sed in se morbi momentum habeant, minus molesta sunt, quamuis grauiora videantur.

In

A In sequentibus gratia exempli de costarum affectibus meminit, indicans eorum alios graues apparere, alios esse.

- 55 *Quin & costis abruptis tale quidpiā accidit. Quibus enim costa una, vel plures abruptuntur, sicut permultis abrumpti videmus, si comminuta ossa, neque in interiorem partem compellantur, neque in superiore, pauci adhuc febricitarunt: sed neque multi etiam sanguinem spuerunt, nec multis item contractum est pus in thorace, aut linamentis opus fuit, aut vitiatum os est: victus autem quivis idoneus est.*

Ex proposita oratione, quæ longa est, non parum intelligi potest orationis modum ad facilitatem conducere. Nos priorem partem supra attigimus, quam Hippocrates longius labens obscuram fecit, paucis autem ita loqui potuit: Vbi costa abrumptitur, si fractura simplex et sola sit, casus quidem asperior videtur, licet leuior sit, q̄ ubi atteritur, celerrimè enim curatur & sine periculo: sed absq; fractura, ubi caro circa costas atteratur, in maximo interdum periculo reuoluuntur, qui sic affecti sunt. Caput quidem orationis huiusmodi est, singula autem deinceps videamus. Si primam partem huius orationis paucis Hippocrates explicasset, quemadmodum ego, quum dixi, ubi sola & simplex costarū fractura sit, apertius scripsisset. verum ipse, quali exponens ait /si ossa abrumpta, neq; in interiorem partem compellantur/. vocauit autem interiorem partem interius spacium thoracis, in quod erumpere os abruptum, per se non potest, nisi nudetur à tota carne superiecta: nisi item scindatur membrana, quæ costas cingit, per hæc igitur simplicem fracturam indicauit. Deinceps notauit casus leuitatem, quum ait, paucos febricitasse, raros item sanguinè expuiffe, aut pus in interiori thoracis regione contraxisse, raro q; opus fuisse linamentis, vel costarum os vitiatum fuisse, & idcirco abundè esse victus rationem quamuis. hanc ipse (vt didicisti) vbique *φάλλον* nominat, eam, quæ exquisitæ contraria est, significans. Propositæ igitur partis orationis vniuersus sensus huiusmodi est: ad reliqua igitur pergamus.

- 56 *Quin, & ubi continens febris non inuadat, deterior est inedia, quam cibus: & dolorem, febrem, ac tussim magis concitat, venter enim modicè repletus costas dirigit, quas inedia suspendit: at ubi suspendantur, dolorem inferunt.*

Tumor ventris costas fulcit: quare, ubi hæc rumpuntur, qui magis ventricoli sunt, minùs dolent: quibus gracilis venter est & contractus, dolore magis vexantur, quum costas sentiant sine fulcro suspensas. Quod si continens febris hominem occupet, inedia vti debet (quod ipse significauit verbo *καταναγειν*) quoniam magis læditur à cibo, q̄ à costis non fulctis. At si nulla febris sit, expedit catenus cibum sumere, vt venter in eum tumore allurgat, vt costis sedes sit ac fulcimentum citra offensæ partis compressionem.

- 57 *Ab exteriori parte Vincire rursus quoniam modo satis est: tantum cerato, pannis, fasciis quæ leniter adstrictis debemus æquale vinculum reddere, aut etiam lanæ aliquid superimucere. Conseruet autem costa viginti diebus: in huiusmodi enim ossibus citò callus increfcit.*

Vinciendi modum quemuis *εαῦλον* vocat, quemadmodum & victum: qui contrarius est ei, qui summa diligentia adhibetur.

- 58 *At carne circa costas detrita, quod homo percutiatur, cadat, re aliqua urgeatur, aut alio tali modo, multam sanguinem expuerunt.*

In memoria habendus est hic sermo propter eos, qui existimant in lateris dolore necessarium esse, aliqua ex fibris pulmonis afficiatur. nam, quum proximus sit lateri inflammato, asserunt aliquid ad eum trāsmitti ex tenui sanguine, qui in inflammatione subsistit. Pulmone ergo nihil violato, sed costa affecta, quosdam ait sanguinem expuere. quo pacto autem hoc fiat, licet per ocium requirere. Nos sanè quæstionem hanc perpendimus in iis, quæ scripsimus in librum Erasistrati de sanguinis sputo: nunc illud duntaxat intellexisse abundè est, quosdam sine vitio pulmonis sanguinem spueri, propterea, q̄ morbus circa costas versetur. Vidistis sepe, & in aliis inuolata cute, quæ fracturam tegit, effundi cruorem, sic, vt fascias impleat, quamuis cutis membrorum denior multo sit, q̄ membrana, quæ costas amplectitur. Quare nihil mirum est, si sanguis per hanc affecta costa in interiorem regionem ducatur: dein protinus in ipsa expiratione in asperam arteriā, quæ in pulmonem distributa est, transferatur: quemadmodum in iis videmus, quibus membrana hæc vulneratur, quicquid enim per vulnus in thoracem instillaueris, per os cōtinuò reddetur. quam rem, quum Erasistratus ignorasset, absurda scripsit in libro de sanguinis sputo. sed qua in re decipiatur, eius scripta de me audientes sepe numero didicistis.

- 59 *Venæ enim & arteriæ, quæ per id, quod est inter costas, intendunt, & nervi, ex us, quæ in corpore præstanti, imia sunt, oriuntur. Multi igitur sæpe tussi, tuberculis, pure in thorace collecto oppressi sunt, & ad id venerunt, vt linamentis egerent, costa quæ vitaretur: sed & quibus nihil tale superuenit, carne circa costas attrita, tardius dolore liberantur,*

rantur, quàm quibus perfracta costa est, atque in eiusmodi casu dolor sæpius locum repetit. Verum non nulli longè magis hæc mala contemnunt, quàm si abrupta costa esset.

Arterias & venas *ὀρετῆς* vocauit: quod autem est inter ossa singularum costarum *λαπαρόν* dixit, qua parte muscoli sunt, qui, quum mediis costis interiecti sint, *μεσοπλευρίαι* græcè nominantur: nervos verò appellauit *τόνους*. Oriri autem ait hæc omnia ab iis, quæ præclarissima sunt, quoniam initium harum venarum, perinde atq; arteriarum, est in vicinia cordis: nervorum autem ad spinæ medullam, quæ ad thoracem est, quibus aliquid cognationis est cum alio pari nervorum, qui à cerebro proficiunt. Quæ deinde adscribit, euidentissima sunt iis, qui meminerint, quæ prodita sunt in prioribus commentariis.

- 60 Sed & curatione egent magis exquisita, si sapiant: conuenit enim media extenuari, corpore quàm maximè con-
quiescere, abstinere à venere.

Exquisitiorem vbiq; appellat *σκηροτέραν*, cui contraria est simplex & quæuis, quam *φύλιν* nominat.

- 61 Itē ab esculentis pinguibus, & fauces exasperantibus, ac tussim mouentibus, & ab iis, quæ ualentissimæ sunt materie. F

Esculenta, quæ fauces exasperando tussim mouent, *κερχῶδες* nuncupat: huiusmodi autē sunt pinguis, acuta, atq; acris. ualentissimæ materie intelligit, quæ egrè concoquuntur. In exemplaribus autem magis idoneis, uerbi *κερχῶδες* secunda syllaba scribitur per *v*, ducto vocabulo à *milio*, quod *iones κέρχων* appellant. id accidit, ubi in faucibus aspera quædam milij modo exigua sentiuntur. Quod autem in superioribus dixit, de iis, quibus circa pulmonem tubercula sunt diuturna, quæ egrè ad maturitatem perueniunt, & spiritus redditur cum sono, *κερχῶδες* absq; *v* scribitur. ducitur autem à uerbo *κέρχεν*, quod sonum notat, qui vel angustia loci, quo spiritus redditur, vel humoris multitudine accidit, plerumq; tamen utroque concurrente, quem spiritum non nulli *δυσία*, id est asperum vocant. Sed qua de causa abstinere hominem uelit ab esculentis tussim mouentibus manifestum est, quum affectæ partes omnes quietem postulent, atq; idcirco silentium rursus imperat: manifestum item est, cur cauere uoluerit ea, quæ vehementer dimouent uniuersum corpus, quandoquidem cum toto pars etiam dimouetur.

- 62 Ad hæc venam secare in cubito conuenit: & quàm maximè silentium habere: inducere quæ super sedem attritam G
pannos non multiplices, sed complures, & multo latiores quàm sit attritus locus, cerati inuentione adhibita: linteis quæ
latis, ac siccis non latis, & mollibus alligare, modice quæ adstringere, ita, ut qui deligatus est, dicat sentire se uinculū
non valde adstrictum, neque item laxum: inde autem ordiri debet, ubi locus est attritus, ibi quæ maximè insidere.

Meminisse huius loci oportet aduersus eos, qui existimant venam solummodo secandam esse, ubi ea concurrunt, quæ multitudinem denunciant. E quorum numero est Menodotus Empiricus. Ostendimus autem in opere de venæ sectione, & in eo, quod de multitudine scripsimus, falsam esse eiusmodi opinionem, quæ præter alia multa, vel ex eo reicitur, quod, ubi quædam partes eiusmodi plagas acceperint, medici ad venæ sectionem confugiunt, quāquam, qui icti sunt, multitudine non tentantur, eo quod, nisi iis sanguis detrahatur, maximæ inflammationes oriuntur: quod cum euenit, alia insequuntur, quæ morbo accidere solent.

- 63 Iniciendum verò uinculum medium est, & in utraq; partem attrahendum, ne cutis circa costas in alterutrā par-
tem inclinet, sed sine inclinatione seruetur. Deligandum autem, vel singulis diebus, vel tertio quoq; die. Satiū item est
aliū mollire leui aliquo medicamento, quod deiectionē citet, ac decē diebus media *vi*, dein corpus reficere et implere. H

Cutis superiecta costis plerisq; laxa est, præsertim, si quo tempore homo plagam acceperit, plenior non fuerit. his ergo ait magis q̄ aliis opus esse fasciis, quæ mediæ primū inician-
tur, nam cutis peruertitur, si ab vno capite fascia ordiatur. q̄ si, ut cautior sis, crassos quoq; ita alliges, nihil
lædes, præcipuè ubi regio prope alam atteratur, ibi enim cutis semper laxa est.

- 64 Ad hæc dum offensus media *uitur*, arctius alligandus est: ubi plenior uictu, laxius. Quod si ab initio sangui-
nem expuat, quadragesima diebus habenda cura, alligandum quæ est: si sanguinem nō expuat, ferè viginti abunde sunt.
Coniicere autem tempus ex *vi* casus oportet.

Commune hoc est omnibus fracturis: quod vnā cum multis aliis, quæ hīc ab ipso traduntur, antè etiam exposui, quum librum de fracturis explanarem. Ea igitur magis sunt vobis in memo-
riam reuocanda, quàm sæpius à me repetenda.

- 65 Quicumque autem rem parui fecerint ob huiusmodi ictum, sub quo atteruntur quæ circa costas sunt, quamuis in
aliud malū detrius non incidant, carnē tamen magis mucosam habet in loco attrito, quàm prius. At, ubi talis relin-
quitur,

Aquitur, nec curatione ad bonum habitum restituitur, res peior est, si mucosa circa os ipsum relinquatur, quum caro non amplius similiter os attingat, & ipsum os morbus opportunius reddatur. Ob eiusmodi autem causas ossa multum vitiantur, quod malum diutius extrahitur.

Mucosum humorem appellare consuevit glutinosum & album, qui colligitur in partibus exanguibus, ut in osse, & cartilagine, ubi ipsorum natura recte concoquere alimentum non possit. relinquit enim quasi quoddam semicoctum, quemadmodum relinquunt infirmæ oculorum membranæ pituitam crassiorem, quæ λήμνι græcè nominatur. Vis autem imbecillior redditur, vel ob suam temperationem immoderatam, vel ob multitudinem concurrentis humoris, quod etiâ euenit in tumoribus præter naturam. Cætera omnia orationis huius clara sunt.

66 Quod si non, quæ iuxta os sunt, sed ipsa caro mucosa fiat, nihilominus subinde morbus & dolor reuertit, si quis corpore laborauerit: quo circa dare vinculum expedit, & bonum, & valde accommodatum, donec siccetur discutiat, quæ sanguis in attrito loco suffusus, & caro integra ibi augetur, augetur autem ossis caro.

B Caro, & qualibet pars sanguinem habens, non per se mucosa fit: id enim, quod propriè in ipsis superat, tale est, quale in fluxu, atque in defectionibus ob iocinoris imbecillitatem cõspicitur. Quocirca, ubi ossa, cartilago, membranæ læduntur, mucosus humor sæpe contrahitur: carne affecta raro, id quæ vel propter consortium, quod hæc habet cum eiusmodi partibus: vel propter humorem copiosè defluentem, ubi mucosus succus, aut pituita in ea contrahitur. constat autem eiusmodi succum maximo negotio excerni, eo quod nec perfusione, cataplasmate, aut medicamentis, euo cari digerit quæ possit, neque villo alio præsidio educi, nisi ex toto antea tenuetur, atque in vapores resoluatur. Ergo, quia succus glutinosus in vapores soluendus est, idcirco ægrè mouetur. ubi verò tale aliquid superans relinquitur, leui de causa pars affligitur, cum ob infirmitatem quidquid in reliquo corpore qualitate vel modo superans collectum fuerit, promptè recipiat.

67 Quibus autem neglectus morbus inueterauerit, & locum dolor exerceat, caro quæ mucosa sit, his ferramentum candens medicina optima est: quod si caro ipsa mucosa sit, adurere conuenit usque ad os, ea observatione, ne hoc ipsum calefiat: ubi inter costas hæc fuerit, neque sic, in summo conuenit adurere: cauendum tamen est, ne candens ferramentum penetret usque ad partem internam. Vbi sedes iuxta os attrita esse videatur, sed recens casus sit, neque os adhuc vitiatum fuerit, si exiguum vitium sit, ita vrere conuenit, sicut dictum est: sin oblongum sit, quod in osse attollitur, pluribus in locis adurere expedit. De costis autem vitiatas dicemus, simulatque de eis tractabimus, ad quorum curationem linamentis est opus.

Mucus glutinosus cum dissipari per medicamenta non potest, reliqua curatio est adurere, quæ quo pacto adinuenda sit, aperte declarauit.

DE FEMORE EX COXA PROLAPSO

68 Quod si femoris articulus è coxa prorumpat: prorumpit autem in quatuor partes, sæpius in internam, deinde in externam: in priorem & posteriorem excidit quidem, sed raro.

Qui coxæ cauum inspexerit, non est, quod desideret causam à me doceri, quamobrem in internam partem sæpius moueatur, deinde in externam, quum in eam caui, non sit omnibus partibus æquale: & articulus, qua parte ora humilior est, facilius elabatur.

69 Vbi ergo in internam partem venit, crus longius est, si cum altero conferatur, id quod iure duplici de causa. Ossi enim, quod à coxa sursum procedit ad pedinem, femoris caput inheret, ceruix quæ articuli cauo sustinetur: rursus ab exteriori parte clunis cauius apparet, ut potè quum femoris caput in internam partem exciderit.

D Orationem hanc ferè vniuersam initio orsus ipse ita euidenter adscripsit, ut nemo loqui possit euidentiùs: sed & eorum, quæ tradit, causas etiâ adiecit. Quare quod sæpius dicere consueuimus, nunc etiâ adducemus. Si quis consideret, quæ proponuntur, ea, si non ubi primò, saltem ubi secundo, vel certè tertio legerit, percipiet.

70 Extremum rursus femur iuxta genu spectare cogitur in partem externam, similiter crus & pes. Ergo, quum pes in externam partem conuertitur, imperitus medicus cum hoc alterum confert, non hunc cum sano, atque idcirco crus læsum multo longius videtur, quam integrum.

Hoc etiam communiter pertinere ad omnia ossa luxata antea quoque demonstrauimus, quum altera extremitas spectet semper in contrariam partem, atque ea, quæ prolapsa est. Nunc igitur femoris capite in internam partem prolapsa, altera extremitas, quæ ad genu est, merito in externam conuertitur.

71 Multis quæ aliis modis error in his accidit.

Errorum

Errorem παρασύρειν dixit: quo vocabulo consueſſe Hippocratem appellare non quemlibet E errorem, ſed cum, qui vero proximus eſt, & eade cauſa probabilis, ſuprà quoque indicauimus. Errant ergo nunc, quatenus in conferendo affectam partem cum integra in naturali habitu deci piuntur: debuerunt enim integrum cruri recto ſtatu extēto, quod vitiatum eſt comparare, ſed cō trarium faciunt, integrum enim æſtimant ad exemplum vitiatum.

- 72 Quin, nec ad inguen ſeclere crus poſſunt ſimiliter, atq; ab integra parte. Adde, quod femoris caput, ſi cōtingatur, inter anum & naturale prominens ſentitur. Ex his itaq; iudiciis colligitur in anteriorem partem ſemur veniſſe.

Flectunt quidem, ſed cum dolore, ac minus perfectē: cuius rei cauſa ſunt poſterioris partis mu ſculi illis, qui ſemur inflectunt, oppoſiti, quod donec ex toto ſemur curuetur, ſine dolore non ſe quantur: quoniam, ubi ſic ſemur exciderit in maximo flexu maiorem diſtentionem ferūt, quā ſecundum naturam conueniat.

- 73 Quibus ergo articulus prolapſus fuerit, neq; reſoſitus ſit, ſed reponi non potuerit, neglectus que ſit, dum ingrediun tur, crus circumagunt, perinde ac boues, plurimum que integro pede nituntur. F

Quum vitiatum crus longius reddatur femore ita prolapſo, neceſſe eſt hominem bouis modo ingredi. ille ſiquidem coxæ articulum laxiorem habet, ſicut ipſe ſuprà in principio huius operis teſtatur. Fortaſſe autem non oportuit laxiorem duntaxat articulum cauſari, ſed mouētium quoq; muſculorum imbecillitatem. nam, ſi validi fuiſſent, facile vtiq; commiſſuram curuaſſent, quo fa cto non neceſſe eſſet crus in anteriorem partem circumagere. ambulamus enim vtrumq; crus in vicem ſiſtentes, mouentes que: ubi enim ſiniſtrum ſiſtimus, tunc dextrum ex poſteriori parte in priorem agimus: quod ubi in priori parte ſtabiliuimus, alterum ruruſ a poſteriori parte in prio rem transferimus: ſic que ruruſ hoc in priori parte ſiſtentes ad dextrum mouēdum reuertimur, altero crure recto humi innixo, altero, quod mouetur, excitato. Quod ſi crura nec ad inguen nec ad genu curuarentur, cogeremur proruſ vtrumque transferre ligni modo, aliquantiſper altiū excitantes, & circumagentes: at quum poſſint ad vtramq; commiſſuram curuari modis inter ſe contrariis, qui tamen cruri toti aptiſſimi ſunt, ambulamus hec neque circumagentes, neque tan quam ligna excitantes: quoniam commiſſura, quæ ad inguen eſt, attollit ſemur in partem priorē: quæ ad genu id, quod inter ipſos & talum eſt, in poſteriorem. Quare crus, quod transfertur, ſi lon gius eſſet, quā quod humi inſiſtit, nihil oporteret in anteriorem partem circumagere, modò ha beret idoneos muſculos, qui celeriter ſeclere vtramque commiſſuram poſſent: ſed, quum ob im becillitatem ſeclere promptē nequeant, & ob dolorem recuſent, ſupereſt, vt in orbē circumagāt, quum infirmi ac dolentes muſculi nihil excitare ſublime poſſint, quod ligni exēplo nequeat cur uari. Hac igitur de cauſa, magis quā quod crus longius redditum ſit, circumagi in orbem, dum homo ingreditur, euidenter intelliges, de exemplo, quod ipſe Hippocrates adicit. in ſequētibz enim ait / quandoquidem quicumque vlcus habent in pede, aut crure, nō ita poſſunt crure vti ad ambulandum, & pueri quoque ita inambulant: / hiſ enim licet crus longius non reddatur, acci dit, vt ita ambulent ob ſuperuenientem dolorem, ubi commiſſuras ſeclāt, præcipuē circa inguen & circa genu, ac tertio eam, quæ ad talos eſt, cum neceſſe ſit iuxta commiſſuram hanc, extremum crus ſinum in ingreſſu euadere, & ſublimem ferre pedem vniuerſum: nā, niſi hoc fiat, offender, ac potiſſimum in ſolo inæquali.

- 74 Coguntur que regionem iuxta eius partis ilia, & iuxta articulum prolapſum, cauam oſtendere & obliquam. H

Neceſſe habent ita figurari, non ubi crus integrum ſiſtentes moueant quod luxatum eſt, & in orbem transferunt: ſed, ubi vitiatum innixi, quod integrum eſt, transferunt: nam, quod vitiatū eſt, ſuperpoſiti corporis fulcrum eſſe non poteſt, erectum ſicut quando naturaliter ſe habebat, ad re ctam lineam ſolo hærens, ſed obliquum, ita, vt ab inguine in anteriorem partem conuertatur, in quam etiam inclinant id corporis, quod è regione eſt affecti cruris, quum periculum ſit, ne in cō trariam cadant. quo fit, vt corpus circa ilia prehendant. ilia autem vocat νεφῶνα, eam regionē in telligens, quæ eſt inter oſſa coxarum, & coſtas nothas, quæ omnino ſine oſſe eſt. Sed, quum neq; ſic vitiatum crus ferre corpus poſſit, & propter imbecillitatē, & propter habitum, ope indiget: quam aſſerunt non nulli ægrotantes, qui re ipſa docti affectum crus manu ſulciunt, quā maxime opus eſt, ab exteriori parte femoris inſidente. quæ res, quum eos cogat ſpectare in regionem cru ris affecti, eius partis ilia obliqua magis reddit, quæ ſi crure etiam in anteriorem partem non con uerſo, ita figurantur, cauā videbuntur.

- 75 Clunem verò integri luteris neceſſe eſt ab exteriori parte rotundum eſſe: ſi quis enim ambularet pede integri cruris

A cruris in exteriorem partem conuerso, reliquum corpus a vitiato crure ferri utiq; cogeret, a quo saltemini minimè posset: nam quo pacto? necesse igitur est hominem ambulare integri cruris pede in interiorem partem conuerso, non in exteriorem: sic enim integrum crus, & partem suam, & eam, quæ ad vitiatum pertinet, maximè feret.

Explicandi ordine permutato paulo obscurior fit: conuenientem vero ordinem seruasset, si ita scripsisset, sicut ego nunc: Clunem verò integri lateris necesse est ab exteriori parte rotundū esse, eo qd homo inambulet crure hoc in interiorem partem spectāte. nam, si in exteriorem spectaret, reliquum corpus vitiato crure ferri utique cogeret: quod fieri minimè potest, siquidem hoc modo integrum crus (vt dictum est) maximè corpus fert, scilicet quando homo ambulat integro pede in interiorem partem conuerso: sic enim corpus totum ita sustineri ab ipso poterit, vt nequeat facile perueriti.

76 *At quum regio iuxta illa eius partis & iuxta articulum sinuetur, parui apparent, & a latere coguntur humi inniti ab integro crure: ea enim parte indigent aliqua re, quæ obiectantur; ita, in hanc enim clunes conuertuntur, & ab eadem onus corporis sustinetur.*

B Quia vitiatum crus corporis partem sibi superiectam ferre nequit, propterea integro toto maxime in interiorem partem compulso nituntur, & in id spectant corpore vniuerso. Euenit igitur, vt in alteram partem inclinati in periculo sint, ne cadant in eam partem, quæ vitiatæ cōtraria est. Quemadmodum igitur, cum vitiato cruri innixi sanum trāserunt ad priorem partem, vitiatum manu fulciunt: ita, quum periculum sit, ne conuersi in integrum grauitè in terram cadant, ad baculi præsidium confugiunt.

77 *Coguntur item inclinari: necesse enim habent manu, quæ è regione affecti cruris est, a latere semur fulcire, quoniam, vbi transferenda crura sunt, non potest, quod vitiatum est, ferre corpus, nisi contineatur, deorsum quæ vergeatur.*

Rursus hic etiam obscurus fuit, quum non præfatus sit pergere se ad alteram partem ambulationis. hætenus enim de ea parte tractauit, in qua crus, quod naturaliter habet, humi consistit, affectum in priorem partem fertur: nunc agit de altera, in qua affecto cruri innixus, sanum transfert, de qua parte ambulationis paulo supra tractatum est.

78 *His itaque modis figurari necesse est eos, quibus articulus in interiorem partem clausus, reconditus non fuerit, homine nullum consilium capiente quomodo aptissime figuretur, sed calamitate ipsa edocito, ex his figurandi modis, qui dantur, eum eligere, qui sit commodissimus: quando quidem quicumque vlcus habuit in pede, aut crure, non ita ut crure possint ad ambulandum: & pueri quoq; ita ambulant, ingrediuntur enim affecto crure in exteriori partem conuerso.*

Quum non vno tantum, sed duplici statu, in ingressu vtantur, qui sic affecti sunt, merito dixit /his itaq; modis figurari/. vnus quidem status est, cum femur manu fulciunt: alter, quum integro cruri innixi in id toti inclinantur, atque idcirco baculo egent, quo fit, vt in cōtrarias partes corpus inclinent, modo in dextram, vbi dextro pede insistant, modo in alteram, vbi altero. hi quoq; magis indecorè ambulant, quàm quibus femur coxa excidens in exteriorem partem prorupit, quos in sequentibus persequetur.

79 *Duo autem luctantur, duobus enim indigent: nam corpus in ingressu non æquè fertur eo crure, quod in exteriorem partem conuertitur, atque eo, quod in interiorem, quum cruris non sit è regione illius, sed multo magis huius, e cuius regione in ambulando & cruribus transferendis onus collocatur. Præterea, si ita figurentur, vt affectum crus spectet in partem exteriorem: quod integrum est, in interiorem: integrum vicè alterius quam citissime subibit. Quod ad propositum attinet, magni momenti est inuenire statum corpori commodissimum.*

Vbi læsum crus in exteriorem partem circumagunt, & integro spectante in interiorem nituntur, duplex tibi lucrum comparant: siquidem quod læsum est, nec toto corpore superiori oneratur, nec diu subseruit, cum quod integrum est paulum interualli moueatur. Nam, si diligenter intueri tempus volueris, quo crus vtrumq; subseruit, non modo duplum, sed & triplum reperies: per breuissimum enim spacium celeriter quæ recta duntaxat integrum crus fertur: per multū tardè quæ, quod affectum est: siquidem conspicuum est, quanto longior sit ambulatio in orbem, q̃ quæ recta est, quamuis vtraque iisdem finibus terminetur.

80 *His autem, qui non dum perfecte increuerunt, si excidens non recondatur, breuius redditur femur, crus, & pes: neq; enim ossa, simuliter in longitudinem augentur, sed breuiora fiunt, femur præsertim.*

Minus ait reddi crus totum, quibus nō dum auctis femur luxatum relinquitur, quod (vt in superioribus ostendimus) omnium quoque articulorum commune est. Communis autem rei nūc

Septima Classis.

NNNNNNN caulam

causam assignat, quemadmodum solitus est. semel enim, ubi aliquod singularem tractat, eius me- **E**
minit, quod commune est. hac igitur de causa inquit crus his non augeri, neque ali, partim quod
articulus loco motus sit: partim, quod nequeat suo munere fungi. Ego autem in superioribus re-
tuli ocium causam esse, cur partes neque augeantur, neque alantur, quæ ambo eueniunt articulo
luxato, quare non video quo pacto Hippocrates luxatum articulum causatus, ocium subiiciat: lu-
xata enim non possunt primo prohibere, quo minus partes alantur, sed intercedente venarum et
arteriarum depravatione, atque ocio.

- 81 *Crus item vniuersum sine carne & sine musculus efficitur, ad hæc effœminatum tenuius quæ, partim quod articu-
lus loco motus sit: partim quod nequeat suo munere fungi, quum naturalem statum non retineat.*

Partes, quibus musculorum natura continetur, caro sunt, vt in musculis incidendis sepe vidi-
stis, quum duo esse eorum principia demonstrarem, quæ sensu comprehenduntur, nempe fibras
neruolas, & carnem super ipsas spissatam. Ergo, ubi quis exercitatione & frictione robustior eu-
dat, fibræ melius aluntur, caro gracilior fit, sed firmior. ignauis contrarium ferè accidit, graciles
enim fibræ sunt: at caro admodum quidem abundat, sed ob humorem mollis est. eiusmodi enim **F**
carne caseus, qui adhuc concreuit, representatur: sed carne eorū, qui exercentur, ille, qui iam spis-
satus est. quocirca his musculi duri, neruosi, & propriis finibus circūscripti, cōspiciuntur: in exer-
citis vero molles & carnosii apparent, ac vel nullo modo vel vix circūscripti, quibus propterea
sine carne crus reddi Hippocrates asserit. Sed quum hoc quoque fieri ex multa exercitatione intel-
ligeret, ubi dixit /sine carne/ proxime subiicit /sine musculis/ quasi musculis non circūscriptis
à finibus, qui sensu comprehendantur, nullus liquidem ex ipsis musculis ex toto corrūpitur, sed,
sicut corpus sine venis dicimus, ubi venæ non apparent, ita sine musculis, cum musculorum fines
penitus delitescunt. Ad hæc, quum clarius ostendere vellet, in his cuiusmodi forma cruris seque-
tur, adiecit effœminatum, hoc est madens, molle, non adstrictum, sed laxum, quales sunt fœminæ,
de quarum carne conuenienter hæc omnia dici possent: à quibus translatione vsus mutuatur ver-
bum /effœminatum/. Adiungit autem in extrema oratione /tenuius/ indicās partes eius omnes
extenuari, quam rem in principio dixerat his verbis /breuius redditur/. nam quod ait /sine car-
ne/ ad solam carnis carentiam refertur: quod vero dicit breuius reddi crus, ad partes omnes, quæ
breuius redduntur.

- 82 *Namque vsus aliquis id, quod valde effœminatum est, confirmat: soluit etiam aliquid ex eo, quod augeri membrū **G**
in longitudinem prohibebat. Potissimum autem læduntur, quibuscunque, dum in vtero sunt, hic articulus elabatur:
deinde quibus id accidit, dum in ætate sunt admodum tenera: minime, quum iam robusti sunt. Quæ ratione autem in-
grediantur, qui robusti sunt, iam ostendimus.*

Verbum /aliquis/ μετεξέτερος dixit, quod apud Iones nihil ampliùs sibi velle, quàm quod no-
bis dicitur έτερος, id est alter, licet ex Herodoto colligere, vtitur enim eo frequenter, sicut & ver-
bo μετεξέτεροι, quo significat id, quod nos vocabulo τινες, id est aliqui: sed & nunc quoque μετε-
ξέτερος tale quidpiam sonat. præfatus enim ob ignauiam crus ipsis minui, ne quis fortasse rem mi-
nus benè accipiens existimet quemlibet partium motum efficere, vt alantur, asserit non omnem,
sed quendam hoc præstare, nempe moderatū, sicut cetera omnia in vniuerso victu salubri: quod
ipse & alibi, & in vno capite in sexto de morbis vulgaribus testatur, cum inquit, || Labor, cibus, po-
tus, somnus, venus, omnia moderata/.

Sect. 6. à princi-
pio.

- 83 *Quos tenera ætate calamitas hæc inuasit, plerique in dirigendo corpore negligentes sunt, male quæ super integrum
crus circumuoluuntur, manu, quæ è regione eius est, deorsum vrgentes. Negligentes item non nulli sunt in rectè am- **H**
bulando, quibus, postquam ætas induruit, hoc vitium accidit. Sed, qui tenera ætate huiusmodi calamitatem experiun-
tur, si rectè educuntur, integro crure rectè inambulant, baculum tamen alæ, quæ integro cruri respondet, subiiciunt:
non nulli baculum ad vtrumque brachium admovent, vitiatum verò crus suspensum habent.*

Quum homo ætate iam robusta eiusmodi calamitatem experitur, crure vti potest, quanquam
claudicante: paruulis pueris (qui, quamuis crura naturaliter haberent, quo nam iis pacto vtī pos-
sent) superuenit ignauia quædam circa membri actiones: atque ea de causa καταβλακύνουσιν όρ-
θῶσαι, id est, in dirigendo corpore negligentes sunt, atque ignauī. At quid mirum, si ambulan-
tes pueri rectè claudicare non student, quando ij, qui iam robusti sunt, non sustinent interdum
claudicare, sed (vt ipse dixit) super integrum crus circumuoluuntur: manifestè autē aperuit mo-
dum motionis ipsorum verbo /circumuoluuntur/.

- 84 *Eo autem facilius agunt, quo affectum crus breuius habent.*

Facilius agentes appellat eos, qui promptius ingrediuntur, quod contingit, ubi vitiatum crus
breuius

A breuius habent. non enim coguntur id circumagere, quæadmodum, qui ætate firma sunt, quum luxatus articulus non reponitur, quibus crus ob prolapsum articulū longius efficitur, coguntur que (vt ipse antea indicauit) ipsum, dum ambulant, in orbem circumferre.

85 *Atque integro crure nihilo minus valent, quàm si vtrumque integrum esset.*

Merito hoc adiungit, iure siquidem integro crure vtuntur æque, ac si vtrumque integrum esset, vt quod eundem vsum præstet: atque vbi vtrumque integrum erat, similiter nutriatur, & robustum sit.

86 *Iam verò his omnibus caro cruris effœminatur, plerumque autem magis ab exteriori parte, quàm ab interiori. Non nulli autem ferunt Amazonas suis maribus prætinis infantibus articulos sua sede expellere, alias ad coxas, ad genu alias, vt claudi fiant, ne scilicet mares fœminis infidantur, sed operarum loco sint, & futuri iam fabrilis, alias ne sedentarias artes exercent: Quæ vera nec ne sint, ignoro: sed hæc sequi certò scio, si, dum infantes sunt, articuli expellantur.*

Omniibus aut effœminari carnem ab exteriori parte magis, quàm ab interiori, vbi in interiorē partem prorumpat, quandoquidem ea pars magis in ocio est: nam femoris caput ab interiori parte, licet præter naturam moueatur, mouetur tamen aliquantum, vbi femoris caput interiori parte continetur.

87 *In coxis quidem multum refert, in interiorē ne partem articulus excidat, an in exteriorē: in genu refert quidem, sed minus. Suius verò claudicandi modus vtriusque est: nam quibus in exteriorē procidit, variè magis fiunt: minus autem recti stant, quibus in interiorē partem luxatur. Similiter, ubi circa talos articulus prorumpat, si quidem in exteriorē partem, variè fiunt, sed stare queunt: si in interiorē, valgi, & stare minus possunt.*

Varos dixit *καλλῆς*, quo nomine quidam significari volunt deprauationem quamlibet, generale ipsum existimantes: alij, eam solummodò, sub qua membrum in exteriorē partem conuertitur, in quo casu necesse est extremum eius, pedem scilicet, in interiorē partē spectare: quæ res non mediocriter ad id confert, vt pes firmiter insiliat, ita, vt ij, qui naturaliter curuis sunt cruribus (*καυροί* aut *έκινεοί* græcè nominantur) firmitus pedibus insidant, & maiori negotio subuertantur, quàm ij, qui recta penitus habent crura, id vel ex Archilochō patet, quum inquit / imperatorem magnum non probo cruribus diuaricantibus, sed paruum cruribus curuis, pedibus firmiter insistentē, & animi audacis/. Verum curiosa inquisitio significationis verbi *καλλῆς*, nihil ad præsentem locum confert: ex ipsa enim oratione ita planum sit, vt Hippocrates nullo modo obicitur esse videatur. Ergo quibus in exteriorē partem articulus procidit, stare magis posse affirmat, quàm quibus in interiorē venit. nam quibus coxæ articulus in exteriorē partem excidit, pes ē regione totius corporis collocatur: recedit autē à situ, qui ē regione est, vbi articulus in interiorē partem conuertitur. constat autem omnes homines, qui naturaliter valgi sunt, deterius stare, neque posse celeriter currere, tum paruo momento ac leui de causa cadere. Hoc igitur rerum discrimen in coxa maximum est, deinde in genu, tertio ad talos, commissuræ enim magnitudinem noxæ quoque magnitudo cōsequitur. hinc ergo manifestum est eos melius stare, atque ingredi, quibus femoris caput in exteriorē partem prolapsum est, de quo paulo inferius tractabit.

88 *Ratio autem incrementi ossium hæc est. Quibus ad talos crus exciderit, his pedis ossa minimum crescunt, hæc enim vitio finitima sunt. In crure augentur, neque multo minus, caro tamē minuitur. Sed quibus articulus, qui ad talos est, suo loco manet, ille qui ad genu, clabitur, his cruris ossa non æquè crescunt, sed breuissima fiunt, vt quæ vitio proxima sint. At in pede minuuntur quidem, sed non similiter, quemadmodum paulo antè dictum est, quoniā articulus, qui ad pedem est, inuolutus seruetur: quod si in pede liceret, sicut cum varius est, minus adhuc his minuerentur pedis ossa. Quibus vero coxæ articulus promouetur, his femoris os non pariter crescit, proximè siquidem vitium attingit, sed integro breuius euadit: his tamen ossa cruris & pedis etiam, non æquè crescere prohibentur: id autem euenit propterea, quod & femoris articulus, qui cum crure committitur, & cruris, qui cum pede, suo loco manet. crus tamen uniuersum his gracilius redditur. Quod si crure in pedem possent, ossa magis adhuc augerentur, sicut antea quoque dictum est, femore excepto: & minus caro minueretur, multo tamē magis quàm in sano crure. Huius autē rei indicio sunt illi, qui latus humeri luxati, vel à primo natali die, vel dum crescunt, priusquam robusti sunt, breuiore redduntur: hi humeri os breuius, brachium verò & manum sanis paulo minora habent ob causas superius dictas, quia humerus læso articulo propior est, idcirco breuior redditur: brachium verò eiusmodi noxæ non similiter cedit, quoniā humeri articulus, qui cum brachio committitur, in pristina sede manet: manus item longius distat à vitio, quàm brachium. Ob propositas igitur causas, quæcumque ossa vitium attingunt, incremento prohibentur: quæ non attingunt, non prohibentur. Multum autem facit ad bonum habitum totius brachij labor manus, nam qui humerum iam luxatum breuiorem habent, pleræque ex manuum operibus non minus præstare possunt, manu eius partis, quàm integra: neque enim, quemadmodum cruribus, ita manibus ferendum corpus est, sed earum opera lenia sunt: propter vsum vero us, qui luxatum iam humerum breuiorem habent, caro manus ac brachij non minuitur, sed & humerus inde aliqua parte impletur.*

Septima Classis.

NNNNNNN ij Vbi

*Vbi verò in interiorem partem coxæ articulus excedit, vel in vtero matris, vel adhuc infantibus, caro magis minui-
tur, quàm in brachio, ea de causa, quia crure vti non possunt.*

Sermo hic, qui sequitur, vniuersus perspicuus est, doctrinæ autem capita duo habet. Quæ ad prolapsos articulos propius accedunt, magis incremento prohibentur, emacrescunt que: minus, quæ longius absunt. femore autem luxato multo magis membrum incremento prohibetur, atque emacrescit, si in interiorem partem, quàm si in exteriorem prorumpat, siquidem deterius mouentur, & claudicant magis. Meminit autem eorum, quos γαλιάγκωνας vocat, quo vocabulo retuli apud ipsum significari eos, qui ob humeri caput in alam prolapsi, dum adhuc increscunt, humerum breuiorem habent. his aut minus lædi brachium totum, quàm crus totum illis, quibus luxatur articulus, qui in coxam inseritur, quoniam in multis vitæ operibus satis laborant: at non similiter vti crure possunt, quibus femoris articulus in interiorem partem promouetur.

89 *Hæc ita habere id testabitur, quod paulo infra subiiciemus.*

Quæ nam sunt, quorum testimonium adducturum se pollicetur? hæc sanè, quod ex iis, quæ præter naturam habent, quæ minus mouentur, magis alimento, incremento que prohibentur: F quæ vero magis vicina sunt partibus habentibus actionem secundum naturam, minus effeminantur, minus que priuantur alimento atque augmento. Pollicetur ergo ipse Hippocrates ostensurum se in iis, quæ paulo infra subdet, eorum testimonium. ego, quum ad locum veniam, vbi eam rem agit, hanc ipsam orationem in memoriam reuocabo.

DE CAPITE FEMORIS IN EXTERIOREM PARTEM LVXATO

90 *Quibus in exteriorem partem femoris caput elabatur, crus, si cum altero extendatur, breuius est, id quæ non immerito, quum femoris caput non feratur super os, sicut quando in interiorem partem procidebat: sed iuxta os, quod non prominet, sed natura residet, in carnem humidam cedentem quæ insigatur: hac itaque de causa breuius apparet. Interior autem regio, qua crura diducuntur, caua magis conspicitur, & gracilior fit: exterior verò gibba, vti in quam venerit femoris caput. Sed & clunis apparet superior, quum, quæ ibi caro est, cedat capiti femoris: femoris item extremitas, quæ ad genu est, intro spectat, non secus etiam crus & pes.*

Agit nunc de coxæ articulo in alteram partem luxato, narrat que mala, quæ ibi apparèt, & causas adiicit, quemadmodum in omnibus fecit: nihil que præterit ex ea doctrina, quæ in experimento aut ratione consistit. quæ oratio vniuersa similiter in aperto est.

91 *Sed neque curuare crus possunt, perinde ac sanum. Hæ sunt ergo notæ femoris in exteriorem partem excidentis.*

Hoc verò accidit ob musculos posteriores, qui flexui pugnāt, quoniam ita figurati plurimum extendi non sistent.

92 *Quibus ergo ætate iam robusta prolapsus articulus non reuertitur, totum crus breuius fit: calx ingressu terram non contingit, sed planta ima, extremi que digiti parum in interiorem partem spectant: melius que id crus superius corpus fert, quum quibus in interiorem partem excessit, partim quia femoris caput, & articuli cervix, quum natura à latere contineatur, magna ex parte coxæ subicitur: partim quia extremus pes non cogitur in exteriorem partem inclinari, sed propè e regione corporis est, & aliquantum magis in interiorem partem conuertitur.*

Imam plantam dixit ἡν-ῥος, quam πῶδ' ἰον appellant, qui corporibus incidendis versantur. ea est ad radices digitorum: nam pedis medium naturaliter cauum est, quod calce extremo à posteriori parte terminatur, à priori plantæ principio, sic, vt pes humi insidat calce, ima planta, & ea carne quæ extremis digitis subiecta est: reliquis partibus omnibus, quæ propositis interiectæ sunt, attollatur, excepta pedis parte exteriori, qua humi totus insidet. Habent autem non nulli pedum structuram prauam, vt quibus medius pes ab interiori parte non sit cauus, quos à pedibus planis græci nominant λεῖοπόδας. sed hos, vt qui similem valgus pedum structuram habeant, in hoc sermone præterijt. Quæ sequuntur igitur animaduertens in iis, qui naturaliter figurati sunt, perpende. namque hi, quum moderatè progrediuntur, toto calce, ima planta, ac digitorum parte carnosa humi herent. quod si enitantur maximè progredi, principio calci insidunt: deinde, quum iam transferunt in priorē partem alterum crus, tunc imè quoque plantæ innituntur: postremò, vbi plurimum similiter altero pede progressi sunt, calce terram contingere incipiunt, tunc quæ pedis antè consistentis calcem quidem attollunt, extremos verò digitos in solo collocant. Eorum igitur, qui naturaliter habent, ambulatio huiusmodi est. sed, vt quibusdam ex vitio aliquo crus longius sit, aut breuius, vtrumque duplici de causa accidit. longitudinis causa est humor multus neruorum, vel articulus luxatus, quo modo supra diximus: breuitatis siccitas, & articulus luxatus in eam partem, quam

nunc

Anunc proposuit. priores quidem ingrediuntur ad eum modum, quem paulo supra indicauit: reliqui sicut nunc docet, primò ostendens femoris caput carnoso loco excipi, & nò osse, vt in primo casu femoris erumpentis, quem proposuit. Cedit igitur in hac parte caro. singulis q; musculis ad suum initium attractis fit, vt totum quoq; femur sursum trahatur. Merito itaq; crus breuius altero se ostendit, neq; terram contingere similiter potest, atq; vbi naturaliter habuit. Hi ergo, quum ingredi necesse habent, contrario modo pedem figurant, atq; ii, qui antè propoliti sunt, quibus affectum crus integro longius reddebatur: illi enim iuxta talum pedem sinum figurabant digitos excitantes: contra hi pedem inclinant, inflectunt q;, & terram cōtingere extremis digitis cupiūt: atq; hac de causa ab affecta coxa se demittunt, vt humi innitantur non solum extremis digitis, sed magna ex parte ima planta, quā retuli ab eis, qui in corporibus incidēdis versantur, vocari τῆς ἰσῆς: Hippocrates autem eam dixit ἑνὶ ποδὶ. quòd si velint calce terram contingere, demitti multum ab affecta coxa cogentur, periculum quē erit, ne inclinati in alteram partē cadant. qua de causa neq; vt calce eiusmodi homines tentant.

93 **V**bi caro, in quam articulus excessit, iam trita est, & glutinosa euasit, dolor tempore conquiescit: quo cessante, ingredi absque baculo possunt, si alioquin velint, potest quē affecto crure ferri corpus. Ius ergo, cum crure vtantur, caro minùs effœminatur, quàm paulò antè propolitis, effœminatur autem vel magis, vel minus: scire autem magis ab interiori parte, quàm ab exteriori. Alij uero ex his nequeit calciamenta se induere propterea quòd crus non curuetur, alijs id licet. Quibus autem seu in utero matris, seu in aũm adhuc crescunt, huiusmodi articulus iam exciderit, neque repositus fuerit: quibus item morbo elapsus fuerit expulsus quē, complura enim talia enuntiat: Vbi aliquibus horum femur corrumpatur, supurationes habet diuturnas, & linamenta indigent: atque ossa non nullas nudantur, & femoris os, tam vbi corrumpitur, quàm vbi non corrumpitur, multo breuius redditur, neq; ad sanum exemplum augetur: præterea ossa huius cruris breuiora sunt, quàm alterius, parum tamen ob easdem causas, quæ ante exposita sunt.

Locum tritum dixit translatione vsus à locis ambulatione tritis. est autem eius oratio talis: Femoris caput suo loco motum in exteriorem partem figitur in carnē: is uero, qui sic affecti sunt, à principio dolet caro, quam premit femoris caput: procedente tempore occallefcit, perinde quasi fossorum manus. vbi id accidit, sedes fit commissuræ similis, quum femur trito loco vtatur, nò tecus atq; antea cauo coxæ: nam præter cætera quidā ea parte humor colligitur, qui principio quidem copiosè ob inflammationem coit, dein tenuiori sui parte & aquosa magis à superiectionis medicamentis dissipata, reliqua remanet, quæ glutinosa est & mucosa: hæc ad motionem capitis femoris maximè confert, ob quem humorem trito hoc loco, tanquam articuli sinu vtuntur: magis autem inclinatur in exteriorem partem, quàm in interiorem. Dictum autem est in superioribus quoq; partes contrarias iis, quæ luxatum articulum recipiunt, graciliores fieri, & molliores, quatenus magis in ocio sunt: eas uero in quas prolapsus articulus figitur, quamuis præter naturā, aliquantum tamen mouentur: illæ, vnde recessit, per se quidem non mouentur, sed paululum per alias, quæ primò motæ sunt, quum partes in quibus articulus erat, effœminentur, atque hoc est id testimonium, quod allaturū se pollicitus est. In sequentibus de partibus, quæ plus minus uē emacrescunt, extenuantur quē.

94 **I**ngredi quē huiusmodi homines possunt, non nulli quidem eo modo, quo illi, quibus ætate iam firma articulus excidit, neque repositus est: non nulli uero toto pede insistentes, coguntur quē ob cruris breuitatem in ingressu à recto habitu, & qui sine inclinatione est, in affectam partem inclinari: & ab inclinatione, quæ in affectam partem est, rursus attolli, atque erigi. Hæc itaque sic eueniunt, vbi, & quod ad figurandi rationem attinet, & quod ad cætera, quæ conueniunt, fuerint diligenter a pueris instituti, priusquam ita confirmentur, vt in ambulare possint: diligenter item ac recte, postquam confirmati fuerint. Summam uero curam postulant, quibus ætate maxime tenera hoc infortunium accidit: nam, si negligantur, quum teneri sint, crus vniuersum inutile efficitur, & minime crescit: caro item totius cruris magis minuitur, quàm in sano, multo tamen minùs ips, quàm quibus in interiorem partem excessit, id quē vsus ac laboris causa, quum statim vti crure possint, quē admodum supra de his diximus, quibus ob humeri caput iam in aliam prolapsum humerus breuior redditur. Inueniuntur autē non nulli, quibus in utero penitus, alijs, quibus sub morbo, utriusque cruris articulus in exteriorem partem prolabitur. His ergo ossa eiusmodi vitio vexantur, sed caro minime effœminatur, crura autem habitiora fiunt, nisi si ab interiori parte parum emacrescant: ea uero de causa habitiora sunt, quia hi utroque pariter vtuntur.

A recto habitu, & qui sine inclinatione est, in affectam partem inclinari, & rursus ab inclinatione attolli atq; erigi, διαπέπτεω dixit: quod quid sibi velit, & in superioribus ostēdimus, & hic quoq; ostēdemus. Namq; vbi femur in exteriorem partem promouetur, à musculis, qui ibi sunt, sursum attractum (quemadmodum antè dictum est) innexum crus totum sublimius reddit, atq; ea de causa vix terram contingit. quamobrem coguntur ima tantum planta humi insidere, dum ambulant vniuerso corpore in affectum crus conuerso, quum huic innituntur. necessariò itaq;, vbi sano inniti debent, cum quod lesum est in priorem partem transferunt, in sanum rursus conuertuntur femore erecto, ita, vt semper in ingressu duos habitus inuicem mutet, varient q;. nam,

quo tempore integro crure insistant, erecto corpore attolluntur simul & ambulāt: quo rursus le- E
so humiliore nituntur, demittunt se, atq; in id inclinantur. Mutare igitur corpus modo à recto
habitu & sine inclinatione, in affectam partem inclinando, & ab inclinatione, quæ in affectā par-
tem est, rursus attollendo atque erigendo, διαρρέπειν dixit, vno verbo propositam habitus mu-
tationem exprimens.

- 95 *Similiter enim ab utraq; parte in ingressu agitantur, cunibus quæ apparent admodum in exteriorem partem pro-
minentibus, propterea quod articuli excesserint.*

Quibus utriq; crurum articuli in exteriorem partem exciderūt, mutatio totius corporis, dum
ingrediuntur, in utroque crure similis est habitui, qui accidit, quum altero duntaxat luxato ager
iplo innititur, atq; ad ilia curuatur deprimitur quæ. altero enim tantum luxato, quum homo affe-
cto cruri insistit, eo modo, quem nunc diximus figuratur: sed cōtrario, cum alteri nititur, corpus
enim attollit erigit q; & ilia recta continet. Cōstat ergo cum tunc dissimiliter figurari, sed in hoc
casu agri eodem statu ab utraq; parte tam dextra quam sinistra cōtinentur. Agitantur autem hic
nihilominus, dum inuicem utrique cruri innituntur, quod ipse dixit / σαλεύουσιν ἐν τῇ ὁδοιπορίῃ,
id est, in ingressu agitantur. agitari exprelsit vocabulo σαλεύειν, quod idē significat, ac διαρρέπειν. F
Accidit igitur hic, ut similiter utraq; corporis partes figurentur, quum utrunq; crus inuicem ter-
ræ innitatur: quod (ut ostensum est) ipsis antè non eueniebat.

- 96 *Sed, nisi his ossa vitientur, neque gibbi supra coxas fiant (non nulli enim huiusmodi vitijsprehenduntur) nisi in-
quam tale quid eueniat, in cæteris satis sani degunt.*

Non nulli ex iis, quibus crura sic luxantur propter communitatem gibbi fiunt: nempe, quum
inflammatio in vertebrarum ligamentis primo oriatur, tum duræ quædam reliquæ remaneant.
id siquidem & extrinsecus accidere videmus popliti, cubito, & digitis non raro, quum articulus
contrahitur, ἀγκυλιν greci dicunt: patet q; in eiusmodi iuncturis articulum præ tumoris duritie
contrahi, cum chorda musculos, qui eam partem tendunt, minimè sequatur: sicuti, cum ob durū
tumorem flectentes non sequitur, committitur, quæ sic affecta est, tenditur, quod malum greci no-
minant ὀρθόγων. Potest igitur ob talē quendam durum tumore spina deprauari: potest & pro-
pter confortium sub crudo duro q; tuberculo idem vitium experiri. Sed quo pacto eiusmodi affe-
ctibus spinæ peruersio superueniat, supra posuimus, vbi de ipsa propriè tractauimus.

- 97 *Minus tamen toto corpore increfcunt capite excepto.*

Quibus coxæ articulus in exteriorem partem prolabitur, meliùs ingrediuntur, quàm quibus
in interiorem, vbi inflammationis periculum effugerint, & præcipuarum partium, cui opportu-
niores sunt, q; illi. Articulus enim, cum in interiorem partem luxatur super os fertur, quod nō pre-
mitur, cum durum sit, neq; huic malo pater: at exterior femoris regio, cum maximis musculis cō-
prehendatur, ingenti dolore torquetur: premiuntur enim articulo in eam prolapsi, teruntur q;, &
extenduntur tumore præter naturam, nempe femoris capite: & sentiunt omne id, quo vexantur,
ac propterea dolent. Ergo propter musculos, qui articulum admittentes teruntur, premiuntur q;, &
atq; idcirco inflammantur, & ceteræ partes adiunctæ, & quæ circa spinam sunt, afficiuntur: quæ
si quando afficiuntur, & æger adhuc increfcit, non secus ac femur incremento prohibetur, & mi-
nores fiunt, atq; omnino deteriores. Illius autem meminisse oportet, quod iam sæpius dictum est,
& eorum testimonium est, quæ paulo antè proposita sunt, Vbi, qui adhuc augetur, sic leduntur,
partes minus increfcunt: quibus verò etate firma id accidit, minus aluntur, & molliores euadunt.
spina minus aucta, sequitur, ut reliquū corpus huiusmodi hominibus minus reddat: infra enim
crura afficiuntur: super crura vsq; ad caput spina sita est: Itaq;, vbi hæc minor fit, minus item crus H
totum, meritò dicit his hominibus vniuersum corpus minus increfcere excepto capite.

DE FEMORIS CAPITE IN POSTERIOREM
PARTEM LVXATO

- 98 *At vbi in posteriorem partem femoris caput prolabitur (prolabitur autem raro) extēdi non potest crus, neque ad
articulum luxatum, neque admodum ad poplitem: sed ex omnibus partibus, in quas hic articulus excidit, vbi in poste-
riorem excidat, committitur, quæ ad inguen, & quæ ad poplitem, minimè extenditur.*

Femoris caput ob causam, quam suprā declarauimus, in propositam nunc partem paucis exci-
dit, quoniam scilicet caui altitudo inequalis est. quo circa quæ minor est, magis procidit, atque ea de
causa magis in interiorem partem: quæ maior, paucis, & ob id in posteriorem raro procidit, in quā
vbi mouetur, crus ad inguen nullo modo extenditur, ad genu non ex toto. utriusq; causa est mus-
culorū situs, quorum naturam perfectè indicauimus in opere de musculis incidēdis, & in secun-
do libro de ratione corporū incidendorum. Ut autē in memoria habeatis, quæ sæpius intuiti estis
incisa

A incisa simia (hoc enim animal structuram habet maxima ex parte homini similem) primum meminisse debetis musculi, qui à lumbis ortus ad paruum femoris tuberculum pertinet: deinde alterius, qui ab osse, quod pubi subest ad idem tuberculum intendens, cum superiori coniungitur. hi ergo vehementer extenduntur, quum femoris caput in posteriorem partem elabatur, ibi implicati, & circa coxæ cauum in orbem voluti, atque, ubi is, quem hoc vitium exercet, extendere articulum tentet, oportebit vniuersum femur in posteriorem partem circumuolui: in quo casu propositi duo musculi potissimum læduntur, ut qui plurimum trahantur, extendantur que: nam, quum longiores, quam antè facti sint, vterius extendi citra dolorem nequeunt: cum que longiores fieri non possint, commissuram extendi non patiuntur. Hac igitur de causa, qui sic affecti sunt, extendere crus ad inguen non possunt, neque etiam ad genu, propterea, quod femoris caput suo cauo prolapsum continetur in posteriori parte illius ossis, à quo recipi solet. quod si futurum esset, ut femoris caput extensum ad genu, inguine penitus curuato multum attolleretur, necesse esset, ut femoris caput à coxa plurimum in posteriorem partem excederet: quod fieri non potest, nisi conuellatur musculus, quo exceptus est, quum ex naturali sede procidit. In commissura ergo, quæ ad inguen est, neutrum fieri potest ex iis, quæ fiebant, priusquam articulus procidisset, nam

B neque perfecte extendi, neque perfecte curuari potest. Quid ergo Hippocrates alterum duntaxat adscripsit? An quia, postquam luxatus articulus est, crus curuatum protinus apparet: ut potè quum imum femur ad genu eatenus in priorem partem excedat, quatenus summum in posteriorem, & quatenus ad inguen crus curuatur: quo fit, ut posteriores musculi, qui ad poplitem sunt, superioribus capitibus extendantur, quum femur sic retrò prolapsus est: his autem supernè extensis, extenditur vni reliquum eorum corpus vsque ad chordas, quæ perueniunt ad crus: quibus extensis poples curuatur. quo circa quibus sic articuli luxantur, curuatæ merito vtræque commissuræ conspiciuntur. Igitur quia extendere ipsas nequeunt, præcipue eam, quæ ad inguen est, idcirco non dixit solummodò has commissuras non posse extendi: sed in ea, quæ ad coxam est, id simpliciter protulit, in ea, quæ ad genu, adiecit *καρτα*, hoc est admodum, ut potè quæ extendi possit, non admodum tamen, nam si id posset, nihil à naturali statu recederet. superuenit autem hæc noxa ob eandem causam, ob quam ab articulo luxato protinus poples curuatur. Illud enim scire licet commune omnium deprauationum, quod, ubi partes aliquæ extendantur, quæ cum his continentur, sequentes ad ipsas conuertuntur. nulla enim ex iis, quæ sic suo vitio conuersæ sunt, naturalem sedem relinquit, sed ab ea, cum qua continuatur, attrahitur: hæc autem attrahit communis

C vna ratione quod tendatur: sed tenditur, non vna de causa, siquidem intendi solet, ubi vltra debitum humore impleatur, siccescat inflammatione, vel duro tumore teneatur, vel locū mutet. quare cuncta hæc Hippocrates in sequentibus latius adscripsit, cuius nos sermonem sequuti verba omnia enodabimus.

99 *illud etiam ignorare non oportet, vtilissimum enim & maximi momenti est, ac plerosque latet, quod nec qui bene valent, extendere poplitum commissuram possunt, nisi simul extendant eam, quæ ad inguen, præterquam, ubi pedem admodum attollunt, sic enim possent. Hi ergo poplitum articulum curuare non similiter possunt, sed multo ægrius, nisi inguinis quoque articulum curuent.*

Coniunctionem, quam posuit in partibus, quæ moueri aliquo modo prohibentur, non suo vitio, sed earum, cum quibus consortium habent, nunc docere incipit in musculis, qui naturaliter habent, quorum nullus initium sumit à femore, quanquam multi sunt. non nulli enim ab osse, quod ad ilia pertinet, oriuntur: non nulli à coxa: vnus tantum ab osse, quod pubi subest. Hac igitur de causa commissuras moueri simul necesse est, sicut nunc in pede & poplite ostensum est, in

D quibus apparet etiam consortium, quod cum inguine habent. nam (sicut demonstratum est) quæ admodum musculi, qui posteriorem ipsorum partem mouent (ut dixi) in imo femore ad radices tuberculorum incipiunt, ita, qui per priorem cruris partem feruntur, ex eodem imo femore dependent. quare necesse est intendi posteriores quidem, quum poples extenditur: priores, quum curuatur. ubi ergo tendantur magis, quam eorum naturæ conueniat, oppositi reniuntur, & minime sequuntur. voco autem oppositos eos, qui extendunt, iis, qui curuant, id est priores posterioribus. Duobus autem musculis gratia exempli cōtentus ero ad huius loci explanationem, quum qui in corporibus incidendis omnes cruris musculos intui sunt, ex his possint de reliquis facere coniecturam: aliis verò, qui nullo modo intui sunt, neque sermo de duobus clarus erit. Hi ergo orsi ab eo osse, quod ad ilia pertinet, procedunt, primò quidem per femoris commissuram, quæ ad inguen est: dein, ubi per femur totum ad alteram eius commissuram, quæ ad genu est, intenderunt, alter, qui angustior est, fertur iuxta interius femoris tuberculum, quod humilius est, tum spectans in priorem tibie partem, cruri ex interiori parte innectitur: alter, qui magnus est, latescit degenerans in valentissimam chordam, quæ miscetur cum altera chorda dependente à maximo ex musculis prioris partis, qui à clune inchoatur. patellæ autè primum superiniicit, dein fertur ad crus.

Septima Classis.

NNNNNNN iij Itaq;

Itaque si crus ad inguen flectatur, ea parte musculi breuiores reddentur: si extendatur, longiores. E commiffura verò genu ac poplitis, vbi extendatur, qui super patellam fertur, breuior fit: qui ab interiori parte, longior. quare cogetur maximè extendi, qui à priori parte est, si extendentes commiffuram, quæ ad inguen est, conemur poplitem curuare: qui à posteriori, si poplite extento inguen curuetur, ex fublimiori enim loco per priorem partem femoris descendens flectitur, inde conuertitur obliquus, & ad priorem tibiæ partem porrigitur. Merito igitur ipse longior euadens primas partes cruris ac femoris longiores reddit, vbi excitantur. ostendimus enim in libris de motu musculorum summam contractionem, summamque extensionem, dolori esse: & musculos quidem contrahi, dum agunt, extendi verò, dum ab oppositis attrahuntur. si quando autè, quum musculi in se ipsos contracti agunt, oppositi non dolent, simul extenduntur naturaliter quidem in commiffuris, quæ propositum consortium habeant: præter naturam verò in illis, quæ deinceps adscribentur. complures autem medici decipiuntur, putant quæ eos musculos affectos esse, quorum prohiberi actionem viderint, quod magis adhuc perfpicuum est in sequentibus.

100 *Multa quoque alia in corpore inueniuntur, quæ similiter germana sunt: de neruorum item extensione & musculorum habitu multa etiam sunt, & magis scitu digna, quam quis existimet: præterea de intestinis ac ventre vniuerso, de vtero, qui huc atque illic fertur, contrahitur que. Sed alibi de his verba faciemus germana his, quæ nunc traduntur: quod ad hunc locum attinet, & extendi crus non potest (sicut iam dictum est) & breuius apparet duplici de causa, tum quòd non extendatur, tum quòd articulus in carnem clunis eruperit.*

Antea quoque diximus consueffe Hippocratem eas partes nominare germanas, quæ inter se consortium & cognationem habent, quarum id caput est, quod vna parte vitata alterius actio, situs, habitus, vel magnitudo laeditur. communis horum omnium causa est in contrariam regionem extensio. In situ exempli causa (vt ab euidentissimis ordiamur) multos vidimus, qui mederi aggrediuntur, quod non ritè didicerunt: & protinus, vbi aliqua pars contraheretur, & breuior fieret, pristinumque situm penitus non seruaret, ad eam ipsam remedia adhiberent, quamuis nullo vexaretur affectu, qui curatione indigeret. Itaque, vbi musculi ab altera maxillæ parte resoluantur, fit, vt altera breuior appareat, & quali contracta, sed, quæ læsa est, eam sequuta, extendi videatur. nam, cum musculi omnes vnā propriam habeant actionem, qua scilicet ad sua initia contrahuntur, quando illi, qui à sinistra parte maxillæ siti sunt, agendi potestate priuantur, qui à dextra sunt robusti, ac naturaliter habentes agunt, dextram maxillam vniuersam, & labra ad se contrahentes: atque ita conspiciuntur sinistrum labrum extensum, & longius redditum: dextrum breuius, & contractum. ergo in hoc casu breuius fit, quod integrum est, attrahens ad se ipsum maxillæ partem, quæ resoluta est. Alibi verò ab eo, quod affectu est, attrahitur, conuelliturque id, quod sanum, sicut vbi musculus vel chorda, cum induruit, nequit simul cum oppositis, dum agunt, extendi. Multa quoque similia, euenire constat, id digitis manus, cubito, poplite, cum contrahuntur propter vitia musculorum & chordarum interiorum, sed, vbi extenduntur græci ὁρδοκώλες dicunt, ita enim appellare medici solent articulos, qui extenti sunt, & curuari non possunt. Huiusmodi quid accidit cicatricibus magnis ac duris, quæ, quum ab interiori parte sunt, articulum contrahunt, cum ab exteriori (vt dixi) sic extendunt, vt curuari non possit, quod ob siccitatem, & ob ingentem humorum vel spiritus instantis cōcursum euenire etiam solet. nam, quum partes, quæ sic affectæ sunt, in se ipsas contrahuntur, sequitur, vt oppositi musculi agere nequeant, quum, qui contrahuntur, partes in cōtrarium auellant. Sic neruorum distentiones fiunt, quum ipsi musculi primò ac præcipuè se ipsos, deinde partes, ad quas perueniunt, ad suum initium contrahunt. Sic & vterus interdum sursum fertur, non nunquam in latus conuertitur: non quòd ipse sua actione naturalem sedem relinquat, sed quòd ab alio trahatur. multa verò sunt, quæ attrahunt, nam & ea, H quibus appenditur, & nerui, & arteriæ, & venæ, quæ cum eo iunguntur, efficere id possunt, vbi in tumorem assurgentes catenus breuiiores fiunt, quatenus in latitudinem augentur: namque hoc commune est corporum omnium, quæ extenduntur, contrahunturque, non modò animalium, sed eorum, quæ inanima sunt, cuiusmodi sunt vtres, sacculi, calathi. Vterus igitur hac de causa sursum, ac deorsum fertur: & quædam intestina, musculique complures, ac propterea membra, & maxilla. Simile quid supra ostensum est in spina, vbi gibba, caua, vel obliqua redditur.

101 *Est enim hæc natura ossis coxæ, vbi & caput, & cervix femoris recipitur, quòd, quum hoc luxatum in exteriorē partem natium decliue fertur, curuare quidem homo crus potest, si dolore non prohibeatur.*

Tenuis est natura ossis coxæ, in quo cauum continetur. patet autem, quum femoris caput in posteriorem partem prorumpit, ab ea parte, quæ post cauum est, sustineri, vt inter cauum & femoris caput id os sit, quòd à posteriori parte cauum complectitur: hoc quidem est pars coxæ, cuius nunc meminit, quum ait /in exteriorē partem natium decliue fertur/. Manifestum est autè iis, qui

A qui viderint eiusmodi locorum sectionem, femoris caput vi cum tota ceruice expelli in magnum musculum natum, qui commissuram hanc extendit: à quo musculo chorda oritur, quæ à membrana non abhorret, coniungitur q̄ cum ea chorda, quam paulo supra diximus, quæ ex duobus musculis orsa à priori parte femoris ultra patellam tendens cum tibiæ capite connectitur. Ergo hic musculus prolapsus femoris caput admittens omnium maximè torquetur, quum sub ipso prematur, distendatur q̄. quare necesse est inflammatione ipsum prehendi, sursum q̄ ad se trahere chordam, quam paulo antè commemorauimus à membrana non abhorrentem: quod quum accidit, consequens est, vt homo doleat, vbi poplitem flecit, quatenus enim hic flectitur, hæc chorda extenditur, atteritur quæ à patella: hæc autem extensa musculum extendit, à quo dependet, nempe magnū illum, quo (vt retuli) recipitur femoris caput. Procedente tempore, quum musculus hic ab inflammatione soluitur, contrahit q̄ humorem quēdam glutinosum, pars eius, quæ articulum contingit, occalescit, & poples citra dolorem extenditur: ad quam rem faciunt & alia, quæ prius posita sunt de cruris musculis.

102 Tum crus & pes modicè recta se ostendunt, neq; multum in hanc vel illam partem inclinata.

B Hippocrates modicè *ὀρεκνέως* dixit, quo verbo significari, neque perfectè, aut omnino vehementer, neq; ex toto, sed mediocriter, ex ipsius verbis colligitur: ipse enim subiungens /neq; multum in hanc vel illā partē inclinata/ apertè demonstrat, quum adscripserit /multum/ id cruri accidere, vt non multum, sed vt parum peruertatur, deprauetur q̄: atq; ob eam rem dixit /tum crus & pes modicè recta se ostendunt/, quasi dixerit has partes apparere mediocriter rectas.

103 Præterea in inguine caro mollior sentitur, præsertim si tangatur, vt potè quum articulus in alteram partem exciderit: sed in natibus, si tangatur femoris caput, videtur magis prominere. His ergo notis indicatur femoris caput in posteriorem partem procidisse. Cui autem ætate iam robusta prolapsus, restitutum nō fuerit, ambulare quidem potest, quum tempus processit, & dolor cessauit, atque articulus volui in carne consuevit: cogitur tamen, dum ambulat, vehementer ad inguina curuari, id quæ duplici de causa, quia ob ea, quæ proposita sunt, crus multo breuius redditur, & multum calx abest, vt terram contingat: nam si vel paulum tentet eo pede susimiri, nulli alteri rei innixus, caderet vtrique in partem posteriorem: coxæ enim, quum magis in posteriorem partem, quàm pedum basis, excedant, in eam plurimum inclinabunt, & spina item in coxas, vix quæ implanata consistet: neque hoc accidet, nisi ad inguina se curuet, & alterius cruris poplitem flectat, quandoquidem necesse est, vt manu, quæ à parte affecti cruris est, in quolibet passu super femore hæreat: quæ res cogit ipsum flecti aliquid ad inguina, nam quum in ingressu crura permutentur, nequit corpus affecto crure sustineri, nisi id crus manu deorsum ad terram compellatur, quoniam articulus corpori non subiicitur, sed in posteriorem partem ad coxam prominet: ambulare tamen offensus sine baculo potest, si alioquin assueuerit, propterea, quod basis pedis è regione pristina spectat, neque in exteriorem partem conuertitur. Idcirco igitur nihil egent baculo, quod renitatur, quicunque velint femur non amplius comprehendere, sed in vicem baculo inniti, quod alæ ab affecto latere subiiciatur: quod si longius baculum admoueant, magis erecti ambulant, pes tamen terræ non innititur: si inniti velint, breuius admoueant, cogentur autem ad inguina curuari. Emacrescit etiam ijs caro pro ratione, quemadmodum antea diximus: nam quibus suspenditur crus, minime quæ laborat, maximè excienuatur: sed, quum in ingressu vsui admodum est, minime gracile fit: integrum tamen crus non iuuatur, sed potius deformius redditur, si vitiatum vitantur terræ innixi, nam dum sanum vitiatum subseruit, coxam & poplitem curuari necesse est: quod si vitiatum crus terram non contingat, sed suspensum sit, & homo baculo innitatur, hoc pacto integrum robustius reddetur, quum naturaliter habeat, et exercitatione magis firmetur. At dicet quis hæc præter medicinam esse, nam quid ultra scire nobis conuenit de ijs, quæ curationem non admittunt? conuenit tamen summopere, intelligenda enim hæc sunt ab eodem professore, quum tanquam aliena seiungi nequeant: siquidem tractare debemus, quæ curationem recipiunt, ne insanabilia euadant, intelligentes qua potissimum ratione occurramus, quo minus insanabilia efficiantur: illa verò in quibus medicina locus non est, dignoscenda sunt, ne maximè noxia reddantur. Præclara autem & ardua prædictio in eo consistit, vt intelligamus, quo, qualiter, & quando singula terminentur: ac siue in ea mala vertantur, in quibus remedio futurus locus sit, siue euadere in insanabilia debeant. Cæterum quibus vel à primo natali die, vel alioquin, dum increscunt, articulus similiter in posteriorem partem excidit, neque reconditus fuit, seu vi, seu morbo exciderit (multis propter morbos sic articuli luxantur, cuiusmodi verò sint hi morbi posthac indicabimus) si prolapsus (inquam) reuersus non est, femoris os breue efficitur: vitiatum item crus vniuersum, minus q̄ increscit, & gracilius redditur, quum nulli vsui sit.

Præsertim *πoτὶ* dixit, quam vocem in superioribus etiam retuli ab Hippocrate vsurpari, vbi intendere velit, quod proponitur. est autem eius oratio talis: In inguine caro mollior sentitur, si aspiciatur, & multo magis si locus tangatur. Quæ sequuntur omnia patent ijs, qui in memoria habeant, quæ antè posita sunt.

104 Vitiatum enim hic & articulus, qui ad poplitem est, quoniam nervi ob propositas causas intenduntur. Quare, quibus sic coxa exciderit, extendere poplitem non possunt: nam (vt summam dicam) quæcunque in corpore ad aliquid

quem visum fabricata sunt, si quis moderatè utatur, exerceat quæ in eo laboris genere, cui singula assueverint, eo pa- E
cto bene valent, augentur, & ad longam senectutem perducuntur: si in visu non sint, sed ociosa degant, morbus patet,
non augetur, & maturè senescunt: id præcipuè accidit nervis, atq; articulis, nisi quis illis utatur. Itaque igitur de causis
vitiantur magis, quàm hoc modo articulus luxatur, quàm cum clavis: totum enim crus incremento prohibetur, &
quod ad carnem, & quod ad ossa pertinet. Huiusmodi ergo homines, quum ætate iam robusta sunt, suspensum cur-
vatum quæ crus tenent, sed altero feruntur baculo innixi uno, vel etiam altero.

Evidentiissimum est Hippocratem dixisse coxam excidere, pro coxæ articulo. sæpè enim nar-
rauimus maiores nostros nō dum tenuisse exquisitam tenuem q; nominum rationem, in qua po-
steriores exercent, sed sat existimasse in ijs, quæ explicabant, eō tantum incumbere, vt quæ diceret,
ab auditore intelligerentur. quod inquit igitur, huiusmodi est: Quibus femur in posteriorem
partem prorupit, vitiatum non solum articulus luxatur, sed & qui ad poplitem est. propterea &/
coniunctionem adiunxit, neq; simpliciter dixit vitiatum articulus, qui ad poplitem est. quo au-
tem vitio occupetur, ipse aperte exposuit, cum ait /nerui intenduntur/: sed neruos ne intellexerit
eos, qui propriè nerui sunt, qui q; à spinæ medulla oriuntur, vel in quas muscoli degenerant chor-
dæ, quæ ad crus pertinet, in hoc loco nihil interest, cum vtraq; fidem facere possint rectè à nobis F
expolita fuisse, quæ ab Hippocrate dicta sunt, vbi allerit non posse poplitem extendi, quibus hoc
modo femur promouetur. Quandam præterea communem rationem adiecit, nempe partes ali-
quas variè ledi, quod ad habitum pertinet, magnitudinē, positionē, ac motum, quamuis ipsæ nul-
lo proprio morbo lædantur, sed a quibusdam alijs afficiantur, quibus cum consortiis habent.
Intentionem verò in huiusmodi affectibus præcipuè causatur, quam persequutus tribus modis
inducat, vno, quum musculus aliquis resoluitur, tunc enim, qui integer est, contrahi videtur: alte-
ro, quum oppositus tēditur: tertio, vbi quod integrum est, trahitur ab aliquo eorum, cum quibus
coniungitur, sicut accidit, quum vterus mouetur. Nūc ergo, quum posteriores nerui, muscoli, &
chordæ tendantur, curuatus poples extendentibus musculis non paret. Ceterum de chordarum,
musculorum q; extensione antea dictum est: nunc de neruis, qui à medulla spinæ orti ad crura in-
tendunt. quorū initia tria sunt, vnum à priori parte iuxta magnū foramen ossis, quod pubi subie-
ctum est: alterum ad inguina: vbi neruus fertur, & cum magna vena, & absque ipsa à priori par-
te femoris, atque hæc parua sunt: maximum autem neruorum initium à posteriori parte fertur
ad vniuersum crus, primum q; procedit ab ea regione, quæ est inter os latum, & id, quod ad anum
terminatur, *χόνυχ* græcè dicitur. hoc igitur initium, vbi articulus in posteriorem partem elaba- G
tur, premitur, tenditur quæ: atque idcirco diximus Hippocratem hoc loco posse intelligere eos
tendi, qui propriè nerui vocantur.

DE FEMORIS CAPITE IN PRIOREM PARTEM LUXATO

105

At quum femoris caput in priorem partem erumpit (quod quidem rarò accidit) perfecte extendi crus potest, sed
ad inguen minimè curuari, laborat enim homo, etiam si flectere poplitem cogatur: ad calcem verò, & in vniuersum
crus, æquè longum conspiciuntur.

Propter cauum, quod non æquè vndiq; altum est, articulum in aliam partem rarò, in aliam fre-
quenter luxari, antea sæpè numero demonstrauit: nunc autem de femore differens in priorē elapso,
contrario modo affici ait eos, quibus in hæc luxatur, atq; eos, quibus in posteriorem. illi enim ex-
tendere crus non poterāt: hi, cum in ipso flexu nūc sit femoris caput ac ceruix, curuare ad inguen
non possunt nec ad poplitem propter musculū priorem, qui oritur ab osse, quod ad ilia pertinet:
ille enim cōprimitur, tēsus q; attollitur à femoris capite, cum q; extendi amplius nō possit, reniti-
tur, si quis flectere poplitem conetur, apparet aut cruris longitudo cōsimilis. In superioribus au- H
tem de femore luxato in partem anteriorem sic ad verbum scripsit /os enim, quod à coxa sursum
procedit ad pectinē, femoris capiti inhaeret, ceruix q; articuli cauo sustinetur/, à quo prius non
sustinebatur ex toto, sed magna ex parte in eius caui altioribus partibus insidebat: in casu autem,
quem nunc ponit, in inguine prominet, atq; is locus intentus apparet, cum femur nunc à suo ca-
uo recedens in priorem partem & paulo inferius venerit. quo fit, vt vitiatum crus sani longitudi-
nem æquet: id, quod præsertim ipsis accidit ad calcem, extremum enim crus minus demitti in ter-
ram potest: cuius rei causa in superioribus explicata nunc rursus summatim etiam enarrabitur.

106

Sed pes extremus spectare minus potest in partem anteriorem: crus verò totum rectam positionem naturaliter
seruat, nec in hanc aut illam partem inclinatur.

Potest, dixit *ἐθέλει*, vbi verbū *ἐθέλει*, id est velle, pro posse vsurpauit, quemadmodum etiā
Homerus, cum ait, *Οὐδ' ἐθέλει πορρέειν*. vbi ponit, *οὐδ' ἐθέλει*, id est noluit, pro nō potuit. Ex-
tremum pedem appellauit eam partem pedis, quæ à planta ad digitos est, & vngues. accidit enim
(quemadmodum supra ostensum est) vt extento poplite non benè articulus tali in priorem par-
tem

Atem inclinetur. Hæc itaque nunc exponere volens ait /sed pes extremus minus spectare vult in partem anteriorem/ indicans digitos, quibus continetur extremus pes, non facile extendi posse, aut deorsum conuerti, & terram contingere.

107 Ferè autem his dolor protinus accedit, & vrina suppressitur, magis q̃; quàm si articulus in aliam partē luxetur.

Quamobrem hæc sequantur, ipse causam adiungit.

108 Venit enim femoris caput maxime prope neruos magnam vim habentes, & in inguine prominet, atque is locus extensus apparet, in clunibus rugæ conspiciuntur & summa gracilitas. Quas quidem diximus, nra sunt femoris in priorem partem prolapsi.

Neruos appellauit τόρες, eos intelligens, qui cum vena & arteria per inguen feruntur. /magnam vim habentes/ vocauit ἑνναεστὰς, sicut in superioribus etiam didicimus. habent autē hi magnam vim, quum medullæ spinæ proximi sint, atq; inde oriatur, vnde initium sumunt nerui, qui ad velicam feruntur. quo fit, vt femoris capite in hanc partem luxato, velica quoq; afficiatur, inflammetur que, & reddere vrinam nequeat. Fortasse etiam aliquando ob inflammationis magnitudinem, qua velicæ ceruix affligitur, vbi musculus est, qui eam adstringit, vrina suppressitur, eo quod inflammatis partibus excæcatum iter claudatur.

109 Quibus verò ætate iam robusta articulus in hanc partem clapsus, minimè restituitur, hi quum dolor finitur, & articulus assuescit in eo loco conuerti, in quem procidit, recti protinus ingredi possunt sine baculo, ac recti ex toto, quum vitiatum crus neque ad inguen, neque ad poplitem, facile compæciuntur. Ergo, quum ad inguen non flectitur, crure in ingressu magis recto vtuntur, quam quum integrum erat.

Quo tempore articulus excidit, dolorem dixit protinus accedere. & vrinam suppressi: procedente verò tempore, vbi hæc cessant, ingredi hominē posse: at qua de causa hæc fiuntur, quam femoris caput maneat, comprimatur q̃; & similiter neruos extendat, docuit quum orationi adiecit /& articulus assuescit in eo loco conuerti, in quem procidit/. Videtur enim in ea re consuetudinem causari, quoniam, quæ ab aliquo premuntur, quum tempore occalescant, ad facilius ferunt: & ea, quæ tunc tendebantur, quum huic molestiæ assueuerint, dolere cessant. Cur verò sine baculo recti ingrediantur, ipse subiicit. caput autem orationis id est, quod crus erectum seruetur, & neutra commissura, nec quæ ad inguen, nec quæ ad poplitem est, flectitur.

110 Non nunquam etiam pedem per terram trahunt, vt qui superiores commissuras non facile flectant, quanquam pe de toto inambulant: namque hi minus calcei, quam priori parti pedis, in ingressu nituntur.

Superiores commissuras nominat, eam, quæ ad inguen est, & eam, quæ ad poplitem. quatuor autem commissuræ ingressui accommodantur, quæ ad inguen est, quæ ad poplitem, quæ ad talum, & quæ ad digitos. postremam quauis multiplex sit, vt vnā tantum annumero, quum vsum atque actionem communem præstet. hæc non admodum confert, dum per equale solum ingredimur: ea verò, quæ ad talum, ad progrediendum, atq; ad crura transferenda nihil proficit, maximè tamen efficit, vt pes humi hæreat, ad quam rem parum faciunt digitorum commissuræ. Vniuersa autem cruris actio, dum ingredimur, & multo magis dum currimus, à commissura, quæ ad inguen est, & ab ea, quæ ad poplitem, proficiscitur, his enim curuatis crus à terra attollitur ac faciliè transfertur: at nunc, quum neutra flectatur, iure per terram trahi pedem ait. Adiecit /non nunquam/ propter soli differētiam, & vim noxæ. illi enim, qui per æqualia & decliua loca ingreduntur, si vel parum quid crus ad superiores commissuras inflectat, pedem haud trahunt: sed, qui per inæqualia ambulant, & accliuia, minime q̃; eas curuant, tantum ab eo absunt, vt pedem non trahant, vt etiam offendant in ea, quæ in solo eminent. /Qui q̃; pede toto inambulent/ inambulāt pe de toto, qui calce, planta, & extremis digitis terram contingunt. illi enim, quibus in posteriorem partem femoris caput elabitur, de quibus ante hos tractauit, cum breuius crus redderetur, nō utebantur calce in ingressu, sed terrā contingebant ima planta duntaxat, quæ (vt diximus) ab ijs, qui in corporibus incidendis versantur, & ed 109 dicitur: verum, quibus in priorem partem coxæ articulus promouetur, calce primum in terra confidente, quum ea parte pedis, quæ ad digitos est, ingredi nequeant: quæ postea vtuntur, quum iam affecto cruri insistentes transferre alterum incipiunt.

111 Verum, si valde progredi possent, calce admodum ingrederentur: nam & qui bene valent, quanto maxime procedunt, tanto maxime calce ingreduntur, quum vni pedi insistant, & alterum attolunt.

Eos,

Eos, qui valde procedunt, calce terram contingere, supra ostendimus, quod euidentissimè ap-
paret. non minus etiam in aperto est, non posse omnino valde procedere, qui superiores commis-
suras curuare ob quamvis causam nequeunt. id autem ipsis accidit, propterea quod molestiam non
ferant, quæ, dum transferunt extremum crus, vexantur, nihil enim aliud prohibet, ne maximè
procedant. quod si sano cruri insistentes id facere vellent, possent quidem, sed non sine labore.
quamobrem satius fortasse fuit hanc orationem, ita explicare: Quibus coxæ articulus in priorem
partem erupit, his nihilo minus quàm ima planta et digitis, ad ambulandum vti calce licet: ac si sustineant
longius affecto crure procedere, & calce omnino ingredientur: verum non sustinent, quoniam,
ubi extentum crus cum difficultate transferunt, dolore torquentur.

112 *Præterea, quibus sic procidit, magis adhuc calci inhaerent, quàm priori parti pedis.*

Inhaerere dixit ἐγγρίπτεω, quod vocabulum mutuari solet ad ea significanda, quorum alteri al-
terum inhaeret, iuxta quam significationem eo utitur, quum in fracturis componendis imperat, ut
fracta ossa prius intenta inter se diducantur: sic enim ait facilius componi, quàm si ἐγγρίπτοντα, id est,
quum alterum alteri inhaeret, propellantur. Quod igitur paulo antè proposuerat, clare in hac ora-
tione demonstrauit. namque hi nihilo minus calce ingrediuntur, quàm priori parte pedis. quod
clarius adhuc & melius dixisset hoc modo /non enim minus hi calce ingrediuntur, quàm priori par-
te pedis, sed magis etiam/, non tamen adiecit in superiori oratione /sed magis etiam/.

113 *Pedis enim anterior pars, quum reliquum crus extentum est, non æquè potest in priorem partem curuari, atque ubi flexum est: neque item simus pes redditur, ubi crus inflexum est, sicut ubi extentum. Crus igitur natura, quum benè valet, sic se habet, ut diximus. Vbi verò articulus luxatus restitutus non fuerit, homo ob propositas causas inambu-
lat, sicut ostensum est, crus tamen altero gracilius redditur, & à clune, & a carnosa parte, quæ in posteriori crure pro-
minet, & e regione posterioris partis. Quibus itaque tenera ætate articulus elapsus minimè restituitur, vel à primo na-
tali die id mali incidit, femoris os magis minuitur, quàm tibiæ, aut pedis.*

Pars pedis, quæ ad plantam & digitos est (quàm priorem appellat) extēto poplite contingere
terram non potest. vocauit autem huiusmodi pedis habitum καμώλον, id est curuum: nam com-
missura, quæ ad talum est, neque extenta dici solet, neque flexa, sicut ea, quæ ad poplitem, & ea, quæ ad
inguen. Ergo, ubi priores musculi eam partem pedis, quæ inter talos & plantam est, attollunt, di-
ci solet aliquo modo pes σιμῶδες, id est, simus fieri: ubi verò posteriores calcem ad se trahunt vnà
cum ea parte, quæ inter talos & digitorum radices est, nullum est nomen vsitatum, quo istiusmo-
di habitus nominetur. quare Hippocrates (ut ostēdimus) eum appellauit καμώλον, vocem in-
ueniens rei, quam exprimit, accommodatam. neque enim potest pes simus fieri, attolli quàm à priori-
bus musculis, quod non aliud est, quàm simum fieri, quum crus inflexum est, sicut quando erat exten-
tum: quemadmodum nec curuus fieri, nisi crus flectatur: potest autem utroque modo figurari, sub
utroque cruris proposito habitu, sed paulum & violenter, multum & sine vi, non potest. Ergo, cum
musculi (ut diximus) orti à posteriori parte cruris, quæ carnosa prominet, non ab anteriori, calcem
& vniuersum pedem trahunt ad partem posteriorem, eiusmodi habitum pedis, græcè non nulli
κάμπω, non nulli ἑκτασιον nuncupant: quemadmodum, ubi pes in contrariam partem à priori-
bus musculis mouetur, alij ἑκτασιον, alij κάμπω nominant, in quo casu (ut retuli) dici solet pes
σιμῶδες, id est simus fieri: in contrario nullum est nomen, de quo inter omnes conueniat, sed nihilo
deterius habet rerum peritia propter vocabulorum dissensionem. Equidem absque vocabulis, de
quibus non conueniat inter omnes, oratione vtrunque mihi clarè videor explanasse.

114 *Minimum autem femur minuitur, quum in hanc partem promouetur: minuitur tamen caro vbi que, à posteriori
parte præsertim, sicut in superioribus quoque dictum est. Ergo quicumque rectè educati fuerint, uti crure possunt, cum
increscunt, quanquam aliquanto breuius altero est, baculo tamen fulciuntur à parte cruris vniati: neque enim abs-
que calce ima planta consistere, quod quibusdam alia de causa claudicantibus licet: quamobrem nequeant, paulo supra
declaramus: idcirco igitur baculo egent. Iis verò, qui negligenter habiti fuerint, neque crure terram contingant, sed
id suspensum habeant, ossa magis minuuntur, quàm alijs, qui crure vtuntur: circa articulos autem crus, quod ad re-
ctum habitum pertinet, magis deprauatur, quàm quibus articulus alio modo luxatur.*

Quidam ex ijs, qui huiusmodi dictiones exponunt, tantam videntur earum habere peritiam,
ut /minimum/ arbitrentur /nullo modo/ significare: /non minimum/ /maximè/. hi ergo Hip-
pocratem dixisse existimarent his, qui sic affecti sunt, femur nullo modo minui. At minui ipsum
constat, non equè tamē, atque ubi in alias partes prolabitur: causæ enim, ob quas minuitur, leuiiores
sunt in hoc casu, quàm in illis. Duae autem causas reddidimus, instrumentorum deprauatio-
nem, & actionum noxam, ob quam parum crure vtuntur. sed, quum in hanc par-
tem femoris caput erumpit, præterquam quod instrumenta non
admodum deprauantur, actio ipsa cruris non
multum læditur.

GALENI IN HIPPOCRATEM
DE ARTICVLIS
COMMENTARIVS QVARTVS

Vido Vidio Florentino interprete

ARGVMENTVM LIBRI

De Differentijs ac de Curatione Luxationum tractat, quæ in Cruribus, & Manibus, horum q̃;
partibus contingunt. Ratio item interponitur Excidendorum ossium, & Structuræ
illius machinamenti, quod Scamnum Hippocratis appellatur.



T summatim igitur dicamus articuli, qui excidunt, & elabuntur, non eodem modo semper excidunt & elabuntur: modò enim multo plus, modò multo minus. Vbi quidem multo plus & elabuntur & excidunt, in vniuersum maiori negotio restituuntur: ac nisi reuertantur, ossa, caro, atq; habitus, & magis & apertius deprauatur, vitiantur q̃;: At, quum minus excidunt & elabuntur, ossa hæc facilius conduntur: & vbi vel negligantur, vel reponi ne queant, minus debilitantur, & cum leuiore detrimento in hoc casu, quam in eo, quem proximè posuimus. In reliquis ergo articulis multum interest, magis ne an minus sua sede excendant: sed vtrunq; caput tam femoris quam humeri semper omnino æque prolabitur: quoniam

nam absq; vilo excessu simpliciter rotundum est, & cauo recipitur, quod in orbem est, & optime sibi aptatur: quocirca euenire non potest, vt in his articuli dimidium procidat: nam, cum rotundus sit, vel totus erumpet, uel intro reuertetur. Id ergo, quo de agitur, ex toto sua sede mouetur, alioquin non excideret: interdum tamen magis, interdum minus, à naturali sede recedit, quod magis femori euenit, quam humero.

Non modò huius orationis, sed & omnium, quæ sequuntur, caput vnum est, luxata non mediocriter inter se differre, quatenus magis aut minus à naturali sede recedunt. non nulla enim multum, non nulla parum absunt, vtrunque autem magis aut minus patiuntur. In alijs quidem articulis res clara est, vt in cubito, manu, crure, pede, digitis: sed humeri & femoris caput indicat non posse paulum suo loco excedere (quod vitium græci *ὑπερβολή* dicunt) quum rotundum sit, et in cauum inferatur, quod oras in orbem habet, in quibus consistere caput nequeat, necessario enim, vel protinus recondetur, vel ex toto excideret. vtrunq; tamen caput ait interdum longè, interdum paululum, à naturali sede recedere. vbi verò & plurimum & minimum datur, non paucas, quod ad plus & minus attinet, differentias intercedere manifestum est.

2 Quandoquidem non nulla ex ijs, quæ à primo natali die sua sede mouentur, si parum excefferint, restitui possunt, præsertim q̃; ad pedis articulos.

Quod ait/ primo natali die/ non nulli ad eos referunt, qui in vtero sunt: alij ad eos, qui nō multo antè nati sunt. horum sententiam comprobant, quæ sequuntur: sed illi proculdubio errant, qui accipiunt in ijs tantum, qui in vtero sunt. fatius enim est ad vtrosq; orationem referre. Præterea, quæ sequuntur cum alijs facere paulo post demonstrabimus, vbi cum locum aperiemus.

3D Quibus à primo natali die crus varum est.

Crus varum, id est in exteriorē partē conuersum: supra etiam nuncupauit *χυλδόν*, vbi spectare intro pedem ait. dixit autem pedis articulos, quoniam plures numero sunt, omnes iuxta tali commissuram liti, cum quo non vnum os tantum committitur. sura enim ab exteriori parte, ab interiori tibia, vtraq; magno processu complectitur talum, cuius pars prior, quæ rotunda est, & quasi caput habet rotundum ceruici superimpositum, à cauo excipitur illius ossis, quod scaphæ similitudinem refert, qua parte commissuræ pes potissimum & sursum extenditur, quum limus efficitur, & in posteriorē partē ducitur: sed & ab inferiori parte talus cum calce committitur, quomodo in libro de ossibus explanauimus, in quo exerceri iussimus eū, q̃ debeat in his expositionibus versari. Verum pes tūc potissimum varus redditur, cum tibia in exteriorē partē creuit, sic, vt inferior suræ processus, quo talum ab exteriori parte complectitur, sine vlla fulcra suspendatur.

4 Pleriq; sanabiles sunt, nisi ita magnus excessus sit, aut pueris tam adultioribus res incidat. Commodissimum itaq; his est celerrimè subuenire, antequam & pedis ossium, & carnis in crure magna admodum defectio sequatur.

Adultiores

Adultiores vocat eos, qui plurimum increuerunt, quorum ossa non æquè tractari & componi possunt, atque infantium propter mollitiem. Hinc itaq; colligitur Hippocratem de ijs agere, qui nati iam sunt: at loquatur ne de illis, qui in vtero sunt, non similiter manifestum est, sed in superioribus sæpius retulit in vtero matris articulos luxari.

- 5 *Modus ergo eius virij, sub quo pes varus fit, non simplex est, sed multiplex. Plerunque autem varus redditur, non quòd articulus ex toto luxatus fuerit, sed quòd pes consueuerit re aliqua exceptus figurari.*

Modum *τέτον* dixit, quod verbum plerunq; mutuari solet, quum de vnoquoq; eorū loquimur, quæ inter se differunt lingua: sed nunc agere potest, qua ratione pes varus fiat, quod multis modis accidit. namq; id, quod subiicitur, vtramq; sententiā comprobatur, quum ait / plerunq; autem varus efficitur, nō quòd articulus ex toto luxatus fuerit, sed q̄ pes consueuerit re aliqua exceptus figurari/. Nam, quum inquit / non q̄ articulus ex toto luxatus fuerit / vnum quendam vitij modum expressit: quum verò dixit / sed q̄ pes consueuerit re aliqua exceptus figurari / vnde is fiat, ostēdit. Neq; alienum est deprauari tenera & veluti cerea infantium ossa, prauè à nutricibus figurata, cum in cunis collocantur quodammodo contorta, vel pluribus velamentis inuoluta, vel sic, vt à quibusdam etiā vrgeantur, à quibus omnibus deprauationes fiunt. F

- 6 *Hæc autem in curatione animaduertenda sunt. Os cruris, quod ad talos extat, ab exteriori parte in interiorē repellendum, dirigendum quæ est: calx contrā e regione eius in exteriorē repellendus, vt ossa, quæ excesserunt, inter se concurrant, & in medio, & à latere pedis: digiti quæ omnes vna cum pollice repente in interiorē partem inclinandī, atque ita cogendi sunt.*

Sect. 2. t. 34. 7.
236.e

Scribit ipse in libro de fracturis, || Crurū binis ossibus cōtinetur, quorum alterum altero tenuius est, ab vna parte multo, paulo ab altera. solent autem recentiores hoc os, quod ab exteriori parte situm est, græcè nominare *πρεόν*. iubet igitur, vt illud in interiorē partem cogatur, simul q̄ calx repellatur in exteriorē, id q̄ præsertim ex calce, quod e regione est, cruris videlicet, quod super ipsum naturaliter situm est. De hac autem restituendi ratione antea sæpius mentionem fecit, quæ omnium communis est: siquidem necesse est, quod naturali sede excessit, in pristinum locum propellere: & quod subiectum est, in contrariā partem adducere, vt ossa inter se concurrant. Quæ subiicit de ipsis dirigendis euidentissima sunt ijs, qui in memoria habeant, quæ superius diximus in expositione huius libri, & antè, eius, qui de fracturis est. siquid autem occurrat, quod obscurius videatur, illud duntaxat enodabimus. G

- 7 *Deligare item conuenit adhibito cerato, quod resinam copiose acceperit, & fascijs mollibus, non paruis, neque admodum arctatis.*

Partibus compositis aptatur ceratum, quod resinam acceperit, quoniam fasciæ cuti melius inhaerent, & partes corporis magis siccantur. ex eo quòd fasciæ inhaerent, sequitur, vt partes, quæ curantur, immobiles, vt compositæ sunt, seruentur: ex eo quòd partes siccantur, vt spissentur, & confirmantur, quæ res etiā composita fideliter tuetur. Porro autem fascias molles adhibet ob corporum mollitiem, quæ infantium corporibus propter ætatem inest, quas leniter adstringit, cauens, ne vehementer arctatē comprimant, præcipuè cum corpora mollia sint, sed quia minus adstringit, idcirco imperat, vt plures fasciæ injiciantur: scripsit enim vinculi firmitatem vel pressu comparari, vel numero fasciarum.

- 8 *Non secus autem circumagenda fasciæ est, quàm si pes manibus dirigendus sit, vt paulo magis valgus appareat.*

Hoc item præceptum communiter ad luxata fracta q̄ omnia pertinet, quod sæpius ab ipso memoræ proditur. non enim vult in dirigendo, quæ composita sunt in naturalem sedem exquisitè restituenda, ita relinqui, sed paulo ultra compelli, vt ad cōtrariū eius loci, in quem diu peruersa spectarunt, à nobis impulsæ, consistant in medio, quod prorsus secundum naturam fuit: nam si collocata in hoc dimitterentur, ad diuturnam deprauationē redirent. Constat autem præceptum hoc ad id consiliū pertinere, quod in curando maximè cōmune est, in quo contraria contrariorū esse præsidia docuit: quum nec refrigerata, moderate calefaciamus: nec calefacta, moderatè refrigeremus: sed eatenus à medio in cōtrariā partem recedamus, quatenus in alterā morbus recessit. Nunc quia pes varus est, cui vitio contrariū id est, sub quo valgus efficitur, idcirco Hippocrates iubet, dum componitur, vt in valgum conuertatur, scilicet ultra sedem prorsus naturalem.

- 9 *Solea item conficienda est, aut ex pelle non multum dura, aut ex plumbo.*

Hoc etiā ad stabiliendam iūcturam molitur: quamobrem iubet ipsum postremum omnium super iūcturam deuinciri, vt eam totam contineat, & carnem ipsam non comprimat, id quod in sequentibus expressit, inquit enim,

Alliganda q̄;

- 10 A *Alliganda quæ non ut cuti insidat, sed cum postrema lintea circumdantur. Vbi iam alligaueris, caput vnius ex fascijs, quibus vincitur, è regione minimi digiti assuendum est illis fascijs, quæ sub pede sunt, ut dum moderate se habere videatur, fascia sursum ducta circa posteriorem cruris partem, quæ carnosâ prominet, voluatur, atque ita firmiter maneat. Sed (ut uno verbo dicam) quasi ceram fingamus, debemus & manibus in naturalem sedem compellere, & vinculo similiter non magna vi, sed leniter, adducere.*

E regione minimi digiti, hoc est, ab exteriori parte pedis fasciâ appêdit, quam attrahit ad posteriorem partem cruris, quæ carnosâ prominet, quoniam quidem pedi varo medet: quod si valgum curaret, ab altera parte fasciæ caput allueret, quoniam inclinare pedem oportet in contrariâ partem atque conuertit, sic, ut, quæ extra spectant, compellantur intro: quæ intro, similiter in contrariâ regionem cogantur.

- 11 *Assuendæ autem fasciæ sunt, ut quomodo opus est, suspendantur: alia enim deprauatio aliam suspendendi viam postulat.*

Quod ego nuper posui, ipse nunc declarat, alijs deprauationibus alias suspendendi rationes accommodari. constat autem, ubi pes in interiorem partem spectet, ita suspendendum esse, ut extremum crus in interiorem partem compellatur, pes in exteriori: ubi pes in exteriori inclinatur, ita, ut crus in exteriori, pes in interiorem virgeatur: ubi in vtramvis partem paulum excellerit, appensa fascia moderate in contrariâ partem cogi debet: qui longè à naturali situ recessit, validius repellendus est. Ideo deprauationem (quam *χλωμα* dixit) commune nomen omnium prauitatum accipito.

- 12 *Calcei verò è plumbo instruantur, qui super iuncturam obligentur, ad eam formam, quam Chiæ crepidæ habebant: quibus opus non est, si quis manibus recte componat, recte item fascijs alliget, recte suspendat. Curatio igitur hæc, neque sectionem, neque vitionem, neque aliam varietatem requirit: celerius enim opinione huiusmodi vitia curationi cedunt, tempore tamen superanda sunt, dum corpus iusto habitu increseat.*

Quæ nam fuerit chiæ crepidæ forma, non satis patet, quoniam neque Hippocratis seculo in vsu erat: atque idcirco inquit /ad eam formam quam Chiæ crepidæ habebant/ quum potuisset dicere /habent/. Constat autem infantibus, cum diriguntur, id calciamenti genus maxime idoneum esse, quod ad vnguem pedem excipit, & carnem non comprimit: ad quæ rem spectantes, parare nunc idoneum calciamentum poterimus, quamuis cuiusmodi chiæ crepidæ fuerunt, non requiramus.

- 13 C *Vbi autem ad calceos veniatur, aptissimi sunt, qui per loca luto plena gressari solent, *πυλοπατίδες* nuncupantur.*

Veniunt ad calceos pueri, qui curantur, quum pars, quæ dirigit, confirmata fuerit, & aliquid increuerit, atque omnia ipsa non amplius mollia sint. nam nec permittendum est, ut prius inabulent, ne pars ad priorem deprauationem iterum reuertatur: at ubi tuto ingredi possunt, calceis vtantur licet, quos Hippocrates *αμβύλας* appellat. est autem calciamenti genus cautum, quod arctè pedem vniuersum exquisitè usque ad talos complectitur. Manifestum est autem eiusmodi esse, ex eo, quod Hippocrates subiicit, quum inquit /*πυλοπατίδες* nuncupantur/, hoc enim nomen inuentum est: quod si per *π* scribat, *πυλοπατίδες*, ductum erit à luto, quod *πυλός* græcè dicitur, quum ab ipsis lutum calcetur, calcari enim *πατέω* dicunt: si per *β*, *βυλοπατίδες*, à luto similiter, & à verbo ambulare, quod *βαίνω* dicunt, quum, qui his vtantur, tuto in luto ambulent.

- 14 *Namque hoc calciamenti genus à pede minime coercetur, sed magis ipsum coerces.*

Et natura, & vsu, alius homo alio modo inambulat, alius enim pede prorsus recto, alius in interiorem partem inclinato, alius in exteriori: atque insuper alius plâta im, alius calce magis ingreditur, alius equè toti pedi insidit: quin & calcei videntur semper in ambulandi modo similes reddi, ubi neque alti sint, neque exquisitè pedem comprehendant: quorum calceorum si quem intuearis, conijcere licet, quomodo ingrediatur, qui illis vtitur, calceus enim rectus & in neutram partem inclinans, sed talis permanens, qualis structus est à futuro, hominem recto pede ingredi denunciat: sed, si vel intro, vel extra spectet, inambulantis pedem conuertit in eam partem demonstrat. Idem euenit, ubi calceus vel in posteriorem, vel in priorem partem vergit. Non secus etiâ clauis, ubi attritu magis sint vel ad calcem, vel ad plantam, vel ad anteriorem partem, vel ad posteriorem, indicio sunt ambulantis pedem in eas partes conuertit. Hunc igitur calceum Hippocrates coerceri ait à pede, hoc est suaperari: sicut à contrario, qui rectus seruatur, & in neutram partem declinat, coerceri pedem, cogi quæ rectum, ac sine inclinatione terræ insidere. caput autem huius structure id est, ut calceus vniuersum pedem arctè contineat, & abundè altus sit: arctè autem complecti pedem non potest, nisi multis locis findatur. Quâobrem venatores hominū calceis induuntur, cum per inæqualia loca, & saltare, & currere necesse habeant, in quibus obtorquenti conuellunt quæ iuxta talos, nisi calcei ex toto cuti hæreant.

- 15 *Idonea item est ratio calciamenti Cretensis.*

In Asia

In Asia nostra, & non minus in Creta nunc calciamenta in usu sunt, quæ ad medium usque crus E pertinent, in quibus fissa pellis est multis locis, & ab utraque parte dextra scilicet & sinistra aqua liter extenta: extremis partibus foramina habet, per quæ traiectionum lorum partes pellis incisæ inter se contrahat. In aperto autem est huiusmodi calceis pedem cum vniuersa commissura, quæ ad talos est contineri, atque adstringi. his autem utuntur apud nos venatores potissimum, quum feras faciunt: quandoquidem in asperis, atque inæqualibus locis non solum currere, sed saltare etiam coguntur. Eadem causa Cretenses ad talium calceorum usum impulit ob vastos insule montes, atque asperitatem.

DE OSSIBUS, QUAE EXCIDUNT SIMUL
ET NUDANTUR

- 16 *Vbiunque cruris ossibus luxatis accedente vulnere articuli, qui ad pedem sunt, siue in interiorem, siue in exteriori partem, penitus excedant, reponendi non sunt, sed sinendum est, ut cui placet medico, eos reponat: scire enim conuenit, ubi repositi feruentur hominem decedere, paucis quæ diebus vitam trahere: nam pauci septimum diem excedunt, cum nervorum distentione absumantur.*

Ossa *κνήμης*, id est cruris, suram intelligit ac tibiæ, quæ *κνήμη* græcè dicitur, & cognominis est cum eo toto, quod inter genu & pedem est. nudantur autem hæc & cute excedunt, ad utranque cruris commissuram, cum pede scilicet & cum femore. Antè igitur tractat de commissa cruris cum pede, imperans, ut, ubi tibiæ os luxatum nudetur, à reponendo caueamus, propterea, quod nervorum distentio superueniat: quod ubi incidat, dictum est in opere de fracturis musculos alios cõuelli, alios contineri, & continuatos seruari. Vbi ergo ad suum initium contrahantur, vniuersum membrum breuius redditur, sequitur enim, quum à musculis attrahitur. quare si quis extendens os extans reponat, musculi & ipsa intentione non mediocriter læduntur, & longitudine membri simul distenti dolorem sentient intolerabilem. atque idcirco, quum musculi grandes sint, nervorum distentionem sequi necesse erit: nam & ubi exigui essent, quemadmodum in digitis, neque sic res periculo vacaret. Multi tamen ex his ob summam in curatione diligentiam seruantur. Hactenus, quod curationi utile erat, superest questio quædam ad locutionem spectans, quæ curationi non prodest, aut officit: ut si requirant aliqui, cur Hippocrates de cruris ossibus *ἔξ ἀποσπέν* id est luxari dixerit, quum id vitium esse eorum ossium affirmet, quæ in cauis se insinuant, non eorum, quæ processus accipiunt, hos enim vocat *ἀρθρα* id est articulos, ut antè sapius ostendimus. non debuit igitur (inquiunt) dicere *ἔξ ἀποσπέν* de crure, sed de talo. Ijs, qui hæc requirunt, respondendum est id, quod in prioribus sæpenumero diximus, Hippocratem eò tantum intendere, ut propositam rem exprimat, quod ipse Plato & præcipit, & primus exequitur. A libi autem demonstraui veteres non aliò quam huc spectasse: solus enim Prodicus studuisse videtur tenui huic nominum inquisitioni, quam qui Prodicum sequuntur, solent exquisitam diligentiam nuncupare. Hippocratem verò nihil obscurius rem expressisse, ex verbis eius aperte conspicitur, quum inquit /vbiunque cruris ossibus luxatis articuli, qui ad pedem sunt, penitus excedunt/. nam, si omnino dempseris verbum luxatis, apertum est quod proponitur. sed Hippocrates hoc adiecit nihil respiciens ad tenuem huiusmodi nominum inquisitionem, cui qui student, plerumque non sunt eloquentes: nam, qui dicendi facultatem habent, ad vim enunciationis respicientes, verba singula non attendunt, sed græcorum more illis utuntur, quorum copiam habent: quomodo videtur nunc Hippocrates loqui volens ossa cruris à commissa recedentia cute excedere. si quis enim id, quod extat, & extra commissuram valde prominet, luxatum dicat, clarius H rem exponet, auditorem quæ imagine rei docebit.

- 17 *Pedem in super & crus gangræna comprehendit: quæ sic futura esse certum scire conuenit.*

Gangrænam quoque his superuenire ait, ob inflammationis scilicet magnitudinem, ubi excedentia ossa recondita fuerint. Inflammata ergo partes, cum rubor inflammationis recedit, livida evadunt, minui quæ dolor videtur, eo quod sensus torpeat: sed, ubi, quæ sic affectæ sunt, ex toto sentiendi facultate carent, græcè id vitium non amplius gangræna, sed sphacelus vocatur. Inter hunc autem & magnam inflammationem media gangræna est, quæ tanto grauior eiusmodi inflammatione est, quanto leuior sphacelo: sub hoc enim natura membri vniuersa corrumpitur: idem quæ, ubi iam hæret, curationem non admittit, sed solum à principio, cum non dum sphacelus est, sed magna gangræna sphacelo vicina. Verum abutimur interdum vicinorum affectuum nominibus ad eos significandos, qui ad hos accedunt, quanquam non dum ex toto ipsorum speciem & naturam habent. sic igitur & ingentem inflammationem, cum non amplius suum

A suum colorem tuctur, dolori que est, interdum nominare gangrenam consueuimus, quæ quamuis gangrena non dum penitus sit, futura tamen est paulo post, si negligatur.

- 18 *Nec mihi etiam videtur idoneum esse veratrum eodem die datum & rursus eorum, sed ut quoduis tale ad idoneum proximè accedere, cui tamen confido. Quod si neque ab initio reponantur, neque tentet aliquis ea reponere, ple-rosque se explicare manifestum est.*

Tractauimus de vsu veratri ad eiusmodi vitia in commentarijs in librum de fracturis.

- 19 *Fulcire autem crus & pedem oportet eo modo, quo ipse velit.*

Fulcire crus & pedem ἥρμόδῳ dixit, hoc est, stabiliter collocare: quod spectans imperat, ut mem-
brum figuremus, quemadmodum maximè cubantem iuuat. nam, quod ait /eo modo quo ipse
æger velit/ huc euadit.

- 20 *Tantum ne dependant, ne ue moueantur.*

Eius quod nunc ait /ne ue moueantur/ vim antè proposuit, cum fulcire præcepit, quod signifi-
B cauit verbo ἥρμόδῳ. Neque enim aliud est fulcire membrum, quàm ab omni parte stabiliter colloca-
re, sic, ut nullo pacto moueri possit. Rectè autem adiecit /ne dependant/. præfatus enim continen-
dum à nobis membrum, quemadmodum cubantem iuuat, non ignorans contineri membrum
posse etiam dependens, edicit, ut eiusmodi habitum vitemus, cum ad affectum locum materiam
concitet, quæ causa inflammationis est. Meministis quidem eius, quod narrauit in superiori ope-
re de crure figurando, ubi extensum pedem collocari voluit, paulo sublimiorem, quàm ut exquiritè re-
ctus seruaretur: nunc verò permittere ægris videtur, ut ipsum rectum habeant. nam cum tribus
modis figurari possit, dependens, rectus, ac tertio in superiorem partem spectans, permittit egro-
tanti, ut quo pacto velit, crus figuret, modò non dependeat: sed antea præceperat, ut sublimiorem
duntaxat contineret. Perspicuum itaque est Hippocratem in huiusmodi affectibus, eò potissimè
incumbere, ut dolor vitetur, veritus ne sequatur neruorum distentio, quam in neruosis partibus
dolor maximè infert. quamobrem, si quæ hoc modo vitata sunt, neque refrigerentur, neque do-
lore tententur, neruorum distentione prehendi, minimè possunt.

- 21 *Mederi quæ cerato, quod picem habeat, paucis pannis ex vino madentibus non valde frigidis, quandoquidem fri-
C gus in his neruorum distentionem concitat.*

De his quoque iam loquuti sumus. nam ceratum, quod picem habeat, vlceribus accommoda-
tur: vinum, præsertim quæ (ut ipse docuit) nigrum & austerum affectas partes inflammari non pa-
titur. Quod autem inquit fugiendum esse frigus cum neruorum distentionem efficiat, in carnosis
partibus fortè aliqua expositione indiget, in neruis euidentissimum est, quibus vtrunque inest:
nam & facile refrigerantur, ut qui natura frigidi sint, atque exangues: & cum læduntur, in disten-
tionem incidunt. cum neque in alia parte distentio incidere possit, nisi nerui afficiantur. commillu-
ras verò inter alias partes maximè neruofas esse manifestum est, in quibus muscoli posita carne,
quam alijs suis partibus habebant, in chordas degenerant. Quare magis inquirendum est, cur vtra-
tur modicè frigidum, quàm non mediocriter frigidum, sed calidum adhibendum videatur: cuius ra-
tio sic habet. In curandis partibus exulceratis propositum est, ut ab inflammatione defendatur:
defendentur autem, si nullus humor ad eas concurreret, quam rem eas refrigerando consequemur.
nam, si admoueantur, quæ calidum & humidum corpus efficiunt statim rubicundius, paulò post
tumidius ipsum exhibebunt, & in alium affectum inflammationi similem compellent. contraria
omnia præstant, quæ refrigerant, cum non modò nihil humoris à superioribus partibus ad refri-

D geratum locum concitent, sed quod in eo sublitit, exprimant, & ad proximas partes depellant.
Est autem refrigerantium duplex genus, quædam aduentitia qualitate tactu frigida sentiuntur:
quedam innatam refrigerandi facultatem habent. adstringentia quidem frigida sunt, sicut in ope-
re de simplicium medicamentorum facultate demonstraui, ubi reliquum genus refrigeran-
tium ab his diducitur: ad hoc spectat papaueris lachryma, mandragoræ succus, cicuta, & cætera,
quæ madefaciunt simul & refrigerant. namque austera omnia terrenam naturam habent cum facul-
tate refrigerandi. De vsu autem horum medicamentorum non pauca scripsimus in eo volumine,
quod est de ratione curandi, nec non in commentarijs in librum Hippocratis de vlceribus. Sed
quod ad hunc locum pertinet, id nouisse abundè est, quod madefacientium & refrigerantium me-
dicamentorum vis penetrat omnino ad altiores partes eorum corporum, quibus admouetur, citò
que ipsas ultra debitum refrigerat, torporem que affert potentiæ corpora administranti. Quæ
verò cum refrigerandi vi terrenam naturam habet (ut ostensum est in libris, quos commemoravi)
ad confluentes succos depellendos maximè aptantur, atque hac de causa illis vtimur. sed quia calor
ad se humores concitat, ideo aduentitia qualitate frigida admouemus, neque illa calefacimus. Nunc
verò quod spectat ad exulceratarum partium affectum, Hippocrates frigidis vteretur, quemad-

modum & in alijs vulneribus: sed quatenus neruorum distentionem timet, quā afferre frigus solet, veretur ex toto frigida imponere, atq; idcirco adiicit, cū de his loquitur / non valde frigidis/.

- 22 *Resiste etiam solis betæ, vel tussilaginis, vel cuiuspiam alterius talis, in vino nigro austero semicotta, vlceri atque adiectis partibus imponuntur.*

Tussillago herba quædam est proposito affectui salutaris, quā modicè siccet, id quod in omnibus vlceribus requiri demonstraui. De vino autem nigro atq; austero loquuti sumus in cōmentarijs in librum de fracturis. hoc repellendi facultatem habet, similiter vt alia vina, & cū crassiorum partium sit, quā ipsa, exulceratas partes non mordet: ea de causa præstantius est.

- 23 *Tepido item cerato vlcus inungitur.*

Admouet nunc ceratum, non ut vlceri medeat, ostendimus enim in expositione libri de vlceribus, vitari ab Hippocrate huiusmodi medicamenta, quæ vlcerum glutinationem prohibent: sed quoniam nunc vlceri quatenus vlcus est, non succurrit, quā neq; id glutinare propositum sit, sicut alia recentia vulnera. Primum autem curationis consilium eò spectat, ne homo neruorum distentione prehendatur. quocirca neque reponendum articulum censet, sed magis permittendum, vt crus ex vlcere turpiter claudicat. Non tamen simpliciter adhibet lenia medicamenta, quæ vocat in libro de vlceribus *μαλθακώδη*, quamuis possint inflammatas partes lenire. primò enim eò incumbit, ut inflammatio minimè oriatur, atque idcirco repellentibus vitur: neque his rursus per se, quemadmodum in alijs casibus, timet enim neruorum distentionem: sed compositam curationis rationem indicat, per medicamenta contrariæ facultatis iusto modo inter se mixta, quò maximè tendere in sequentibus videtur. ad quæ iam animum adiungito.

- 24 *Quòd si hybernium tempus fuerit, lana quoque succida madens ex vino atq; oleo tepido imponenda est. Et perfusione insuper vtendum.*

Neq; medicamēta tepida adhiberet, neq; oleum prorsus adijceret, si loco subueniret. quasi simpliciter vlcerato, sed (quod supra retuli) veretur neruorum distentionem: atq; ob eam rem oleum admiscet, & tepida cuncta superimponit, nec, vt qui tantum pugnet contra neruorum distentionem, vlceris curationem relinquit: sed neque ad vlcus spectat duntaxat, mixti enim morbi mixta quoq; præsidia exigunt. quocirca præcipit, vt lana succida inducatur, quam *δισυπληράν* dicunt, propter ea qd cæsyum habeat. quandoquidem (vt in libro de simplicium medicamentorum facultate ostendimus) huius medicinæ proprietates simplex non est, sed mixta ex contrarijs qualitatibus ac viribus, adstringendi scilicet & modicè calefaciendi. Perfundi autem voluit hos affectus, nō hyeme tantum, sed æstate etiam: hoc siquidem, quod in fine subdit, commune est totius propolite curationis, quoniam huiusmodi affectus non hyeme duntaxat assiduam perfusionem requirunt, quā æstate quoque magis eam postulent q̃ hyeme, quò tunc his lana imposita magis siccescat. imperat igitur, ut hæc omnia assidue perfundantur: id uero quo perfundimus tale esse debet, quale in principio protinus curationis admoueri iussit, nempe uinum ætate per se, hyeme cum oleo. Caloris autem modum conijcies ex tēperamento aeris, in quo uiuimus, ubi enim ualde frigidum fuerit, humoris, qui perfunditur, calorem augebis: ubi calidum, remittes. ad calidi enim usum nunquam uenit, quocirca caloris modum augens atq; remittens, pro ambientis coeli temperamento uariabis. in quibus omnibus meminisse debes eorū, quæ in uniuersum dixit, nec omnia ubiq; uelle percipere. At quæ nam hæc sunt? nimirum ea, quæ in cōmentarijs in eas sententias Hippocratis, quæ aphorismi inscribuntur, & in alijs compluribus, recēfenda duximus: quorum, ubi unū aliquid positum fuerit, omnium, quæ eandem uim habent, meminisse oportet, existimare q̃ sermonem in omnibus accipiendum esse, quasi omnium communis sit. Sic igitur & nunc Hippocrates hybernū temporis meminit: tu uero regionem, ætatē, usum, corporis naturam, reuocare in memoriam debes, nempe regionem frigidam, ætatem senilem, usum eorum, quæ corpus refrigerant, corporis naturam frigidiorē. siquidem hæc omnia idē hortantur, ac tempus, cuius Hippocrates meminit. Sed quemadmodum hyeme curationem calidiorē adhibet, sic æstate contra tu frigidiorē admouebis: & sicut in æstiuo tempore, ita in ætate, regione, consuetudine, & natura corporis calida. quòd si omnia calefaciendum esse denunciēt, calidioribus præsijs uteris, si refrigerandum, frigidioribus: sin alia ad calefaciendū, alia ad refrigerandū hortentur, ipsorum numerū ac uim spectabis. sic enim maximè conuenientem calefaciendi & refrigerandi modum conijcies.

- 25 *Neque ullare quidpiam deuincies, neque aliquid impones. Scire enim licet huiusmodi virijs, omnibus modis alienum esse pressum & onus.*

Subtrahit in hoc casu non modò eas fascias, quæ primè iniiciunt, quas ubiq; ad cōminuta & ad luxata

A luxata ossa adhibuit, sed & eas, quæ super lanam voluuntur. cuius rei causam ipse reddit, cum inquit /huiusmodi vitij omnibus modis alienum esse pressum & onus/. sufficit autē iplis solummodo lanam imponere, quæ cum mollis sit, & levis, oneri esse non potest. hoc autem timet, non ut qui vlceri medeatur, sed ut qui nudatis attritis que chordis ac neruis caueat, ne distendantur.

26 *Ad hæc autem pertinent non nulla ex ijs medicamentis, quæ cruentis vulneribus injiciuntur, ea scilicet, quæ idonea sunt, quibus imposita lana vino persusa, longiorem moram trahat.*

Medicamenta, quæ vulneribus statim injiciuntur, & in his libris, & in eo, qui de || vlceribus est, *trauma* appellat. inter hæc, quæ longiori tempore resoluuntur, & interim, dum soluantur, perfundi possunt, admoueri potissimum debent: siquidem constituit, quemadmodum in tota reliqua curatione, eò spectandum esse, ut leniendi vim habeat. hæc enim de causâ neq; vinculum imponit, neque frequenter soluit. Ex medicamentis autem, quæ cruentis vulneribus protinus injiciuntur, ea longiori temporis intervallo soluere licet, quæ validiorem liccandi facultatem habent, ea tamen cautione, ne ob vehementem vim contrahendo lædant. Duo autem medicamēta, quæ nota vobis sunt, gratia exempli commemorabo, leguntur enim in omnibus libris de medicamētorum cōpositione, quales sunt duo Andromachi, & vnus Heræ, & aliorum permulti. cōponuntur medicamēta hæc ex bitumine: alterum Barbarum, Cyzicenum alterum nominatur. hoc cum magis siccet, quàm opus sit medicamentis, quæ cruentis vulneribus injiciuntur, obest magis quàm prodest, cum membra contrahat, & dolorem afferat: alterum verò medicamentum idoneum est, si moderata mixtura fuerit, ex ijs siquidem nō nulla plus iusto exiccant, & dura sunt. verum de huiusmodi medicamētorum discrimine in opere de compositione ipsorum fusius tractauimus. Quæ post hæc ab Hippocrate scribuntur, magna ex parte plana sunt, si quæ supra, & in commentarijs in librum hunc de articulis, & antè in eum, qui de fracturis est, prodidimus, in memoria habeantur.

Non longe à principio.

27 *Quæcunq; autem ex ijs medicamētis, quæ cruentis vulneribus protinus injiciuntur, paucorum dierum sunt, vel pitem accipiunt, non æquè atq; illa proficiunt, quādoquidem vlcerum purgatio porrigitur in longius tēpus, diutius enim madent: horum tamen non nulla utiliter deligantur. Scire autem aperte conuenit necesse esse hominē turpiter claudicare, quum versus partem superiorem pes trahatur, & ossa luxata ab exteriori parte promineat. Fere enim: nulli ex ijs ossibus nudatur nisi paululum quid, neq; recedit, sed cicatrix inducitur tenuis: atq; infirma, ea q; nō nisi multum temporis cōquiescant: alioquin periculum est, ne remaneat vlcusculum, quod curationem non admittat. Sed, quod ad propositum malum attinet, si hac ratione curentur, seruantur: si articulus reponatur, maneat q; in exitum præcipitatur.*

Quæ nam ex ijs medicamentis, quæ cruentis vulneribus protinus injiciuntur, paucorum dierum vocet, non magno negotio inuenies, si in memoria habeas, quæ in explanatione proximè politæ orationis tradidimus. patet enim eum sic appellare, quæ ex paucorum dierum intervallo soluantur. ex intervallo autem paucorum dierum soluere conuenit, quæcunq; ex propositis infirmiora sunt: patiuntur enim in vlceribus multum colligi saniei, eo quod non satis exiccet. Hæc à non nullis ex veteribus resina extrinsecus excipiebantur, quorum nescio. multa enim dici possent: sed, quum Hippocrates ab omnibus his medicamentis abstineat, longius iabi operæ precium non est: in opere enim de medicamentis, quæ de his scire conuenit, omnia exequuti sumus, nunc autem, quod attinet ad proposita, satis hæc sint. Quæ sequuntur omnia præteribimus, quum manifesta sint ijs, qui eorum meminerint, quæ antè explanauimus.

28 *Eadem ratio est, si brachij ossa ad manum adiecto vlcere, siue in interiorem partem, siue in exteriorem excedant: certum enim scire conuenit, hominem paucis diebus interiturum tali genere mortis, quale supra posuimus, si reposita ossa fuerint, contineantur que: sed, si nemo hæc vel reposerit, vel reponere tentarit, longè sæpius liberatur. Cui malo mederi eadem ratione expedit, qua supra diximus: deprauationem verò deformem reddi, ac digitos manus infirmos atque inutiles fieri, necesse est.*

Quemadmodum in crure totum id, quod inter talum & genu est, duobus ossibus contentum *κνήμην* appellant: sic brachium, quod inter manum & cubitum est, *πῆχυν*, quod similiter non ex vno osse, sed ex binis constat, quorum alterum *ῥαχίς*, id est radius, alterum græcè *ῥαχίς* propriè nominatur, id est cubitus: quod similiter euenit *ῥαχίς τῆς κνήμης*, hoc est, in crure. communis igitur, quæ ad manum est, commissuræ tali respondet: quæ ad cubitum, illi, quæ ad genu. Maiorum tamen partium mala, seu fractæ, seu prolapsæ sint, semper grauiora sunt. quam rem si animaduertas, exigua expositione ad sequentia indigebis.

29 *Nam digiti, vbi ossa in interiorem partem luxantur, curuari non possunt: vbi in exteriorem, extendi.*

Cur luxari dicat in superioribus ostendimus, vbi cruris ossa adiecto vlcere dixit ad pedem luxari: nunc reddere causam volo, quamobrem, cum brachium accedente vlcere in interiorem par-

tem prorumpit, digiti curuari nequeant. in hoc casu sanè accidit, ut brachij ossa ab interiori regio ne ossibus, quæ in prima palmæ parte sunt, superinsidant, ab exteriori subiciantur, quum prima palmæ pars tendatur à chordis, quæ ab exteriori parte ad ipsam perueniunt, sursum q̄ ad humerum tendunt. quod, quum euenit, necesse est digitos versus exteriorem regionem trahi, quo fit, ut extendantur. idcirco neque flecti ex toto possunt, cum exteriores muscoli, & chordæ flectentibus renitantur. sæpius enim diximus perfici actionem non posse, nisi oppositi muscoli ipsi pareant, qui agere nituntur. Hinc etiam fit, ut digiti minimè extendantur, cum brachij ossa in exterioriorem partem mouentur. interiores enim muscoli, & chordæ vehementer intenduntur, atq; idcirco cum cedere exterioribus nequeant, necesse est exteriorum actio intereat. Sed & ipsorum ossium positus, cum brachium in interioriorem partem elapsum primæ palmæ parti insidet, prohibere flexum potest: cum in exterioriorem promouetur, porrectionem.

- 30 *Vbiunque autem cruris os ad genu cute siue in interiorē, siue in exterioriorem partem excedit, quibus receditur, maturius intereunt, quam alij, quamuis illis quoq; vitæ periculum insit: sed, si curationem adhibeas reponere minimum tentans, hac via tantum spes salutis superest: hæc autem ossa eo magis periculosa sunt quam cætera, quo superiora sunt & robustiora, & à robustioribus prolabuntur. Quod si femoris os ad genu luxetur, vbi ponatur, maneat quæ, maior vi, & citius adhuc homo absumitur, quam superioribus casibus: si non reponatur, res longè periculosior est, quam in superioribus: hæc via tamen salutis spes superest.*

Hoc etiam, & id quod proximè subdit, non parum comprobat, quæ paulo supra indicauimus de ossibus, & ad talum, & ad manum cute excedentibus. neque enim talus in commissura cruris, quæ ad pedem est, nudatur, neque prima palmæ pars in commissura cubiti cum manu, sed in crure ossa cruris, & in brachio similiter ossa brachij. iure igitur excedere hæc, & luxari dixit, ut, quæ extra commissuram excedant. Nunc itaque crus interdum excidere inquit ad tali commissuram, ac modò ab exteriori parte, modò ab interiori: quanquam subdit, nō crus, sed femur luxari, id q̄ non immeritò, nam in commissura genu modò crus modò femur excidit, ad pedem verò crus duntaxat, sicut ad manum brachium. Cætera, quæ in hac oratione sunt, ipsi patent, qui in memoria teneant, quæ superius dicta sunt.

- 31 *Eadem ratio est articulorum, qui ad cubiti commissuram sunt, nempe cubiti & humeri. Quicumq; enim ex his cum luxantur, cute excedunt, si restituantur, omnes mortiferi sunt: sin minus, res non omnino desperationem habet, sed ipsi, qui liberantur membrum remanet deprauatum: magis autem mortiferi sunt, si recondantur, articuli superiores, sed & ydem, si non recondantur, alijs similiter sunt periculosiores. Si cui ergo superiores articuli luxati, cum vlcere cute excedant, vbi restituantur, celerrimè in exitium præcipitant: vbi non restituantur, cæteris periculosiores sunt: curationem autem, quæ mihi commodissima videtur, iam exposita est. At quibus digitorum pedis, vel manus, articuli luxati adiecto vlcere cute excesserunt, osse quidem non fracto, sed ab ipsa commissura recedente, si repositi maneant, nervorum distentionis periculum impendet, nisi rectè attendantur: expedit tamen, vbi prædixeris summa cura & diligentia opus esse, eos reponere. Facillimè autem & maximè promptè, magno q̄; cū artificio reponuntur, si adigatur paxillus, quemadmodum supra diximus in ossibus fractis, luxatus q̄;: quo facto quiescere homo debet, cubare quæ, & modico cibo vti: satius quæ est leui aliquo medicamento, quod vomitum citet, ipsum purgare.*

Meritò hic articulos dixit multitudinis numero, quemadmodum in genu: vbi verò de commissura, quæ ad talum, & de ea, quæ ad manum loquitur, non posuit articulos multitudinis numero. propositam verò nunc partem nō vno tantum articulo contineri in tertio cōmentario in librum de fracturis ostendimus. eandem inquit rationem esse huius commissure, & eius, quæ ad genu, de qua prius tractauit: nam quemadmodum ibi modò tibiam, modò femur, excidere dictum est, ita nunc modò cubitus, modò humerus, in idē malum compellitur. Quæ sequuntur, oīa plana sunt. H

- 32 *Auxilium autem aduersus vlcera in medicamentis est, quæ cruentis vulneribus protinus iniiciuntur: in illis scilicet, quæ perfusioni accommodantur, aut in buphthalmo herba, aut in ijs, quæ fractis caluariæ ossibus succurrunt: nihil autem induci debet ualde frigidū. Ac primi quidem articuli minimè periculosi sunt: superiores magis periculose laeduntur. Eodem autem die restituendi sunt, vel: cerè posteriori, tertio aut quarto minimè, si quidem quarto die malum recrudescere maximè videmus: vbi ergo non protinus recondatur, his diebus supersedendum est, contineri enim solet, quod intra decem dies conditur. Quod si repositio articulo nervorum distentio supernascatur, cito expelli debet, & subinde calido humore perfundi.*

Quæ nam ex medicamentis, quæ cruentis vulneribus protinus iniiciuntur, idonea sint, quæ perfundantur, antea declarauimus. præcipit autem, ut herba buphtalmi (quam *πολυφθαλμον* appellat) non secus atque antè tussillaginis, quæ eandem vim habet, folia imponantur. huius quoque herbae meminit Diocles in libro de oleribus. Totius autem curationis caput ait id esse debere, quod in libro de vulneribus capitū demonstrauit, in quo ostensum à nobis est curationem requiri sicciorem, quam quæ in vulneribus circa articulos præsertim.

- 33A Conuenit item vniuersum corpus magis curuatum esse, quàm extensum: expectandum tamen est fore, vt repositi digitorum articuli abscedant, plerumque enim ita accidit, si quæuis inflammatio superueniat. Quare, nisi vereretur medicus, ne vulgo imperitus haberetur, nihil reponere prorsus deberet. Ossa igitur, quæ ad commissuras sunt, si cute excedant, vbi recondantur (sicut ostensum est) periculosa sunt.

Extensum esse non idem significat, atq; extēdi, sicut neq; curuari, & curuatum esse. si quis. n. mēbrum extensum dicat, vnū tātūm exprimit eius habitum, rectum videlicet, qui neq; plus, neq; minus admittit: si curuatum omnes eius habitus, qui post extensionem sunt, notat vltq; ad vltimum flexum, qui quatenus maiores minores q; sunt, inter se differunt. si quis extendi & curuari dicat, motum, qui accidit, vbi mutatur habitus mēbrorum, significabit, nempe, quū extendi ait, eū, qui euenit in mutatione, quæ fit à summo flexu ad summam extensionem: quū curuari, eum, qui à summa extensione rursus ad summum flexum. Nunc ergo Hippocrates curuatū, inquit, corpus esse magis conuenit, q̃ extētum, verbo /extensum/ rectum habitum notans, quem solum vitandum cēset: sed, cū ait curuatum, habitus medius inter hunc & extremum flexum significat, inter quos ille eligendus est, qui maximè accommodatur, modò qui parum, modò qui longius ab extremo flexu abest. quo tempore, vterque accipiendus sit, licebit, & ex superioribus conijcere.

DE OSSIBVS. PRAECIDENDIS

- 34 Quæcumque circa digitorum articulos ex toto absceunduntur, plerumq; detrimentum non afferunt, nisi, dum secantur, homo animi defectione lædatur.

Nunc tractare incipit de ossibus præcidendis. apertè autem, sic omnia narrat, vt mea explanatione opus non sit. illud duntaxat me præfari abundè est, quod ferè quæcumque ab ipso traduntur, intelliges, si id spectes, quod ostensum est in articulis cute excedentibus (iuniores medici *ἐκφυρωματα* dicunt) dimetiendum, scilicet esse periculi magnitudinem pro magnitudine articulorum. quod sicut in illis euenit, sic & nunc in ossibus, quæ præciduntur, euenire solet. adijciemus tamen eorum, quæ obscura videbuntur, expositionem.

- 35 His autem vlcerebus, quæuis curatio idonea est. Sed & quæcumq; ossa, non ad articulos, verum ad aliquam aliam regionem præciduntur, similiter sine noxa sunt, & alijs promptius adhuc curationem recipiunt: simuliter quæcumq; ossa fracta in digitis cute excedunt, non ad articulos, hæc quoq; innocentè reponuntur. Ex toto autem ossa, ad articulos, in manu, in pede, & in crure non nullis ad talum, atque in brachio non nullis ad primam palmæ partem, plerumque citra noxam præciduntur, nisi protinus anima deficiat, vel quarto die continens febris superueniat. Caro tamen corrupta, & in vlnerebus sanguinem fundentibus, & in iis, quæ valèntius adstringuntur, tū in ossium fracturis plus iusto compressis, in iis item, quæcumq; vinculis violenter comprehensa fuerint, compluribus decidit, quorum plerique liberantur. Liberantur & illi, quibus in femore pars aliqua carnis et ossis decidat, & quibus in humero: sed citius adhuc & facilius ad sanitatem perducuntur, quibus aliquid in brachio & crure decidat. Quibus verò fractis ossibus aliquid protinus alienatur, & nigrescit, his cito abrumpitur: & quibus casurum est, cito cadit, quū ossa iam cesserint: at quibus ossè inuolato nigrities accidit, his celeriter caro emoritur, os verò tardè abscedit, & quæ nigrities terminatur, & quæ nudatum os est.

Curationem quamuis *φαύλλω* dicit: quo vocabulo iam sæpius ostēdimus Hippocratem nuncupare eam, quæ exquilitate contraria est.

- 36 Ceterum partes, quæ citra finem nigrities fuerint, vbi iam prorsus emoriantur, & dolorem non sentiant, iuxta articulos excidendæ sunt ea animaduersione, ne quid violetur: nam, vbi qui secatur, dolet, quū non dum quæ secatur, emortuum corpus fuerit, maximū periculum est, ne sub dolore anima deficiat: eiusmodi autem animæ defectio plurimos repente iam sustulit. At femoris os hoc modo nudatum vidi octogesimo die abscedere: crus tamen huic homini ad genu vigesimo excisum est: mihi verò propius etiā videbatur, cū non eodem tempore, sed antè prouidendum existimarem. Cruris verò ossa, quæcumq; nudata fuerint, circa medium omnino ex huiusmodi nigritie sexagesimo die deciderunt: curatio enim a curatione distat, quātum ad id pertinet, vt nudata ossa maturius vel serius decidant: pressus item à pressu distat, quatenus vnus altero validior est, aut imbecillior, ad efficiendum, vt nervi caro venæ citius aut tardius emoriantur: nam, quæ emoriuntur, quamuis non fuerint adstricta, non omnia ex alijs ossium partibus decidunt, sed quædam ex summis. Quocirca tēpus, intra quod singula hæc soluantur, certum definire non licet.

Quū dixerit necessarium esse, vbi nigrescat & corrumpatur caro, quæ sita est circa ossa, vt ossibus tempore idem eueniat: atque ea de causa imperauerit, vt præciderentur: nunc præcipit, vt excidantur, ea cautione, ne integræ partes violent, ne præ dolore anima admodum deficiente homo ægerrimè reficiatur. Ad articulum autem, si fieri potest, præcidi membrum voluit ad celeritatem spectans: namque, vbi medium præcidatur, multum temporis absumitur, quū ossa secantur, sed iuxta articulum affecta membri pars intacto ossè absceunditur.

- 37 *Accipiendæ prorsus eiusmodi sanationes sunt, magis enim terrent, dum accipiuntur, quam dum adhibentur: at- E
que hæc omnia lenem medicinam requirunt, ipsa enim per se ipsa solvuntur. Est autem victus expeditissimus ille, qui
febri aduersatur.*

Hippocrates consilium dirigit, non solum ad ægotantes, sed etiam ad medicos, ut apud ægro-
tantes à culpa semper vacui sint, & laudem plerunque inueniant. quamobrem mala, quæ graua
videntur, monstrat, discernit quæ ab ijs, quæ verè talia sunt. in ijs enim, quæ verè graua sunt, non
tamen talia se ostendunt, monet, ut medicus se subducatur: illis manum iniiciat; quæ graua viden-
tur, quemadmodum & hæc, quæ nunc proponuntur. Vbi enim pars aliqua ex toto emortua sit;
non amplius grauiter afficit, quæ vicina sunt. hanc si præcidas, cauens ne, dum manus curatio
adhibetur, animæ defectio sequatur, malum aliud non afferes vllum.

- 38 *Ad hæc iusto habitu figurare corpus oportet. Iustus habitus est, vbi nihil suspensum est, nihil deorsum spectat, sed
sursum magis, præcipue donec ex toto resolutum fuerit, periculum enim est, ne interim sanguis erumpat. Quamobrem
vulnera inclinari in inferiorem partem non debent, sed superiora haberi.*

Ostendimus iam sæpe /iustum/ apud Hippocratem vocari id, quod potentia æquale est: hoc F
autem illud est, quod unicuique conuenit, quandoquidem & iustitiam huiusmodi quid esse ma-
nifestum est. Quod quidem ad musculos attinet, ille iustus habitus est, sub quo tam qui mem-
brum flectunt, quam qui extendunt, in neutram partem trahuntur: quod verò ad collocandum
membrum in inferiorem, vel superiorem partem spectans, iustus habitus videri poterit, qui me-
dius erit inter eum, qui sursum, & eum, qui deorsum spectat, hoc est qui ad rectam lineam prorsus
extensus est. hic autem, vbi nullum periculum sit, ne sanguis erumpat, & facillimè ab ægro-
tante feratur, eligendus est. de quo etiam paulo supra tractauimus, vbi ossa cute excedentia perse-
quuti sumus. At nunc in ossibus abscindendis, sicut dum manus adhibetur, vnum periculum est,
ne præ dolore intolerabili anima deficiat: ita postquam adhibita est, vnum aliud circumstat, ne vi-
delicet sanguis erumpat, id quod euenire solet, vbi putrescentes corporis partes resoluuntur. Con-
stat autem habitum, sub quo membrum dependet, eruptioni sanguinis esse opportunissimum.
Quantum ergo spectat ad sanguinis eruptionis periculum penitus tuto quæ euitandum, præcisum
membrum superius omnino habendum esset, sed quia status hic dolori est, idcirco moderatè in
superiorem partem conuertitur. Manifestum item est, quum in ijsdem verbis augere vellet, quod
proponitur, adiecit vocabulum /præcipue/ quod *πρὸς* dixit, quasi ita scripserit, Vbi nihil suspensum G
est, nihil deorsum spectat, sed sursum magis, potissimum, vbi putria ex toto resoluta fuerint,
periculum est, ne interim sanguis erumpat.

- 39 *Namque, vbi tempus processerit, & vlcera iam pura sint, non amplius accommodatur huiusmodi status: sed ille,
qui rectus est, & interdum ille, qui versus inferiorem partem inclinatur: tempore enim non nullis ossa abscedunt, &
illæ fasciæ necessariae sunt, quæ primæ injiciuntur.*

Non secus, atque vbi sanguinis eruptionem cauebat, rectum membri statum, quamuis me-
dius & iustus esset, catenus in eum, qui sursum spectaret, conuertebat, quatenus membrum sine
dolore excitabatur, nunc quoque præcipit, ut membrum moderatè in inferiorem partem incline-
tur, ut sanies effluat. quandoquidem, vbi nullum periculum est, ne vel sanguis erumpat, vel pro-
pter consortium aliqua pars afficiatur, vel inflammatio superueniat, atque vlcera iam pura tantum
modò ad cicatricem perducenda sunt, danda in primis opera est, ut nec pus, nec sanies aliqua te-
nuis tunc subsidat, sed omnia exitum habeant. At si qua ibi pars sinuetur, hoc enim accidit sub
fanie, quæ illas partes erodit, dum nos cauentes ne sanguis erumperet, membrum sublime habui-
mus, ad fascias veniendum erit, quæ primæ injiciuntur, quibus sinus coerceatur. Vinciendi autem H
ratio in eo casu contraria est illis omnibus, quæ supra dictæ sunt, in quibus fasciæ ab inferiori par-
te orse in superiori terminantur: sed in propositis affectibus, vbi eò consilium tendit, ut pus excer-
natur, à superiori parte incipiunt, et deorsum versus intendentes paulo supra os ipsius sinus finiunt,
ut quicquid in imo sinu relidet, sub hac Vinciendi ratione exprimat, & ore aperto protinus euadat.

- 40 *In his autem procedente tempore expectandæ sunt deiectiones cruentæ, cum plerisque & ex nigritie, & ex sangui-
ne ab vlcibus fuso, cruentæ deiectiones superueniant. Fiunt autem plerunque, vbi nigrities & sanguinis eruptiones
solutæ sunt.*

Cruentam deiectionem Hippocrates *δυσεντερίαν* vocauit: quo nomine vsus videtur, non ut
exulcerationem intestinorum, quæadmodum plerique medici, sed ut cruentas intestinorum deieccio-
nes significaret, sic, ut, vbi propter iocinoris imbecillitatē cruentum descendat, id quoque vitium
δυσεντερίαν appelletur, quod à medicis vsurpari ac dici nouimus. sæpius quæ homines ita affectos me-
dentium inscitia perijle vos non latet: interdum enim, quum propter deiectiones acres, princi-
pio quidem pinguedo, processu temporis quædam strigmenta, quæ ab intestinis deraduntur, vnà
excernantur,

A excernantur, plerique medici neglecto iocinore, vlceri duntaxat intestinorum medentur, atque idcirco egrotantes precipitant. Est ergo morbus & iocinoris imbecillitas, & vlcus intestinorum: cruenta verò alius communiter superuenit non propriè causis propositis, quàm intestinorum venis præ sanguinis copia adaperitis, cruentum deſciatur, ſic, vt ſimilis affectus ſit, atq; vbi ora venarum nō in ano, ſed in iſtintorum anſraçtibus, aut ad initium recti iſtinti longe ab ano aperiantur. Per multos autem videmus experiri hoc malum, quibus mēbrum exciſum fuerit: qui ve repente vehementes exercitationes omiſerint, quibus ante aſſueuerant, quum non nulli certarent, alij foderent, vel quid huiuſmodi laborioſum vitę genus ſequerentur. nam, niſi quemadmodum exercitationi, ita aliquid dempſerint, cibi aut potionis abundantię, qua utebantur, dum exercebantur, non nullos celeriter inuadunt ea mala, quę à multitudine ſunt: alijs, qui minus aduerſa fortuna vtuntur, alius cruenta deſcit, quam rem Hippocrates propoſuit, *δις τρις* vocabulum uſurpans, quo (vt retuli) cruentam deiectionem ſignificat. Quosdam ego iam vidi, quos ſanguinis per nares eruptio liberauit: alios, quos tentauit cholera: his autem omnibus æquali ſere temporis circuitu ſanguis effunditur, languentes enim repente exhausti, refrigerati quę, in poſterum victus ratione curioſa non vtuntur, ſed rursus inordinate viuunt, rursus multitudinem colligunt.

B prior æqualē & equali tpe. Horum ergo affectuum cōm cauſam in multitudinē referemus, quę adaperitis venis, vel in naribus, vel in ano, aut iſtintis eiſcitur. colligitur aut multitudo in illis, q̄ liberaliter, vt ſoliti erant, cibū ſumunt, ſed ſanguinem, quem ex aſſumpto alimento cōtraxerunt, minimē abſumunt. Ad cōmunem horum affectuum rationem ſpectat, quod ab Hippocrate proponitur: quibus enim aliquod membrum abſciſum fuerit, alimētum, quod ante transferri ad ipſum ſolebat, in venis coit, & ſanguinis multitudinem producit. Hos itaque omnes mōnere oportet, vt minus cibi capiant, quàm ante, is quę infirmior ſit: ſubinde aliū ducant, et quantum poſſunt, exerceant: multam frictionem adhibeant: à cibo non lauentur, ſed ante ſæpius rectē autem conſulent, ſi digerente aqua vtantur, vbi eius copia fuerit. Hęc præter propoſitam rem adieci, quum tamen ab re non ſint. Cur autem non nullis, quibus copioſe ſanguis effunditur, aliquo interpoſito tempore cruenta deiectione ſuperueniat, adicere ſermoni oportet. Fit ergo in his, vt ob vehementem ſanguinis profuſionem corpus refrigeretur, atque idcirco minus quàm ante per citem exhauriatur, quod verò non exinanitur in corpore ſubiitēs ſanguinis multitudinem auget: quę (vt ſupra oſtenſum eſt) efficit, vt, vel cholera ſuperueniat, vel ſanguis per nares erumpat, vel *αιματώδης διάρρηξια* ſequatur (ita enim appello clarioris doctrinę gratia) hoc eſt, cruentum deſciatur. Proſciſcitur autem huiuſmodi deiectione ex multitudine ſanguinis, quem natura tentat magis ob virium robur, quàm ob infirmitatem, expellere: quę res contrario modo ſe habet, quàm in iocinoris affectibus, in quibus ſanguis per iſtintina ob viſceris imbecillitatem deſcendit. Quod ſi per ora venarum, quę ad anum, iſtintina, aut nares pertinent, natura, quod ſuperat exinaniret, bene ageretur cum eo, cui hac viā multitudo detraheretur: vbi multitudo non recipitur his locis, ſed ad thoracem vel pulmonē confluit, malum iam graue eſt: alterutrum enim, vel pulmonis inflammationem, & lateris dolorem, vel ſanguinis ſputum, ſuperuenire neceſſe eſt.

41 *Magno autem impetu concitantur, ſed nec diuturna ſunt, nec mortifera: nam neque homo valdè propter cibi faſtidium abſtinet, neque alioquin exhauriendus eſt.*

Adiungit hæc Hippocrates, non vt hiftoriam conſcribat eorum, quę ſic affectis eueniunt, quemadmodum Thucydides, vbi peſtilentiam illam recenſet, ſed vt cruentas has deiectiones diſtinguat à torminibus, quę alijs de cauſis accidunt. Quare hæc, quamuis ad propoſitū opus propriè non pertineant, exponere tamen alienum non fuerit, quum medici complures morbos, ſub quibus ſanguis deſcitur, diſcernere: non poſſint: non nulli enim exiſtimāt vbiq; cruentam deiectionem ex iſtintorum vlcere prouenire, quos magnopere animus fallit. Sanguis itaq; quum ab ore venarum, quę in ano ſunt, funditur, neque laborantes ipſos latet: ſed vbi cruenta deiectione à ſuperiori parte ad anum feratur, quędam protinus à principio deſcendit, quędam præcedente aliquo tali. Quod ſi repente cruor multus deſciatur, ſcire conuenit, adaperitum eſſe os venę natura id, quod pondere moleſtum eſt, depellente, cuius generis eſt, quam nunc Hippocrates proponit, cruenta deiectione, quę magno impetu concitatur, & cito quieſcit, præterquam quod homo ob cibi faſtidium non admodum abſtinet, ſicut quando ob iocinoris imbecillitatem alius cruenta eſt. quanquam raro initio, quum iecur afficitur, huiuſmodi alius ſe oſtendit: plerumque enim à principio tenuis ſanies cruenta deſcitur aquę ſimilis, in qua lota caro ſit: interdum tamen incipit iocinoris affectus cum ſubita ſanguinis deiectione, vbi videlicet viſceris imbecillitati ſanguinis multitudo acceſſerit: poſt principium verò vitrouis modo res acceſſerit, & ager maximē cibū faſtidit, & ſanguis modò purus & non multus, modò flaueſcenti immixtus ſimul, cum deraſa iſtintorum pinguedine deſcitur, poſtea quaſi ſex ſanguinis deſcendit, vbi iecur iam peſſimè habet. Sub huiuſmodi ergo deiectionibus, præſertim vbi aliquid bilis admixtum fuerit, quędam ipſius

intestini partes excernuntur, quæ, quum deradantur, *ξύματα* vocant. nam, quæ per intestina E descendunt, eo quod acria sint, summam ipsorum partem eradunt. in quo casu quanta maxime potest, abstinencia imperanda est: sed ijs, qui superantem sanguinem deijciunt, conuenienti modo cibus dari debet, quum iecur valeat, & possit ipsum conficere.

QVA RATIONE FEMUR IN COXA

CAVVM REPONATUR

42 *Vbi femur à coxa elabatur, si in interiorem partem venerit, hac via restituendum est.*

Reprehendunt Hippocratem, quod ponere tentet femur à coxa prolapsum, quum iterum protinus elabatur, primo quidem Ctesias Ggnidius eius cognatus, nam ipse quoque ex familia fuit Asclepiadarum: post Ctesiam verò alij nō nulli. Sed, quum hæc omnia duplici via iudicentur, altera, cum iplis oculis comprehenditur, quod requiritur: altera, cum non expectato longo vsu aliquid demonstramus, iudicio ex iplius natura sumpto: nos quoque vtrāque via iudicabimus. Natura igitur rei sic habet. In hac ipsa commissura ligamentum rotundum validissimum inclusum est, quo summum femoris caput altissimis atque intimis caui partibus innectitur, ita, vt quis, licet ligamentum ipsum nō viderit, possit ex hac narratione intelligere id breue esse. nam, cum femur semper conuertatur, quod Poeta retulit, cum ait, in coxa conuertitur: nec vnquam caui oris excedat: necesse est ligamentum breuissimum esse. Hoc ipsum igitur, dum naturaliter habet, excidere femur non patitur. Potest autem non abrumpi solum, sed & ob humoris copiam in cauo collectam præter naturam adeo extēdi, vt linat femur sua sede moueri: quod vbi accidat, quamuis statim positum fuerit, non poterit suo loco manere: nam, quum cauum deuexum sit, onus verò totius cruris, quod appenditur graue, leui momento rursus suo loco excedet, si quis in ingressu tentet paulo celerius moueri. vel aliquid transgredi, quod ob pedes sit, ita, vt si quis æquali solo paulum moueatur, hoc modo fortasse tueri naturalem positum assidue poterit. sed videtur id fieri minimè posse, nam si non ad alium vltum, certè quum lauatur, cogetur homo pedē magis attollere, vt ingredi in labrum possit. Hoc igitur pacto rei natura monemur, vbi ligamentum abrumpatur, femur repositum in sua sede contineri non posse. Sed & illud verè adijceretur, quod commissura genu ab exteriori parte nervosis quibusdam ligamentis continetur: femur vero hoc vno, neque vllum aliud habet tale, quo commissura ab exteriori parte illigetur, sed nec musculos etiam, qui non parum quoque conferunt ad continendos articulos, ne procidant, præsertim vbi boni habitus fuerint ac validi. Quamobrem athletis, quamuis in palæstra vehementiores ictus patiantur, cadant, distendantur, contorqueantur q̃ ad articulos, nihilo minus membra non luxantur, eo quod validis & grādiōribus musculis vndique circundentur. Scripsit etiam Hippocrates || inter initia huius libri, bobus potissimū coxæ articulū luxari, vbi senes sunt, & graciles. Femur igitur abrupto ligamēto, quo continebatur, etiam, si in suam sedem collocetur, manere non potest, ijs præsertim, qui graciliores fuerint. Spectemus deinceps, si ligamentum humoris copia relaxatum excidere femur linat, id quæ reponatur, quid futurum esse credibile sit. mihi quidem, & in hoc casu res manifestissima videtur. namque, vbi idem humor maneat, similiter erumpet: sed, si inarescat, ad naturalem firmitatem reducetur. femur verò ob humorem excidere, & ipse Hippocrates docet, qui in sententijs illis, quæ Aphorismi inscribuntur, sic inquit, || Quosunque coxæ dolor exercet, his si coxæ articulus excidat, & rursus recondatur, mucci superueniunt. muccis autem in commissura collectis, hoc est, glutinoso humore, madefit ligamentum ac relaxatur. Nihil autem interest, seu ligamentum, seu nervus illigans vocetur: quæ- H cunque enim ligamenta neruorum exemplo rotunda sunt, ab ijs, qui in incidendis corporibus versantur, vocari solent nerui illigantes. Sed & nos quoque femur hac de causa luxatum bis iam restituimus, neque amplius postea procidit. diu autem oportet siccantibus medicamentis commissuram circundare, dum nervus illigans abunde siccetur, ne amplius ita extendatur, vt femur oris caui possit excidere, sed intus in naturali situ ipsum contineat. Manere autem interdum femur, vbi repositum fuerit, idoneus testis est Heraclides Tarentinus, homo, qui nec, vt sectam comprobet, mentitur, sicut soliti sunt rationalium plerique, nec medicinæ vsus est expers, sed optimè, vt quiuis alius in medendo exercitatus. Audiamus ergo, quæ ab ipso traduntur in quarto libro de ratione curandi ea, quæ sunt extrinsecus. sic autem ad verbum habent: Errāt, qui censent femur repositū non manere, q̃ abruptus sit nervus, qui ad coxā ipsum alligabat, cum in vniuersum rem negent. neq̃ enim Hippocrates, Diocles, Philotimus, Euenor, Nileus, Molpis, Nimphodorus, & alij non nulli de restituendi ratione tractassent. Sed & nos quoque id consequuti sumus, vt duos pueros sanarem, quibus sepius, et magis quàm ijs, qui etate iam robusta sunt, excidere articulus solet. Rem igitur ratione iudicare non oportet: sed, quum interdum maneat,


Se. I. t. 27. 256. f.

6. Aph. 59. Ex. ord. 53. f.

»
»
»
»
»

« A maneat, existimare non semper neruum abrumpi, sed relaxari, & iterum contrahi: quoniam expe-
dit hoc requirere, quanquam non omnino commune est/. Adiecit hoc Tarentinus in fine ora-
tionis, ut quam profitebatur Empiricorum sectam tueretur, quorum ea sententia est, ut in his, quæ
ita manifeste apparent, ut inde proferre utilitatem ad artem iam possimus, inutile sit causam que-
rere. Sed & post Heraclidem multi alij ex iunioribus restitutum à se femur perpetuo seruatum
esse in sua sede testantur.

43 Hæc quidem restituendi ratio bona, iusta, & secundum naturam est, per quam subito serè ad finem peruenitur, si
quis ostentationi studeat. Homo per pedes ab eo ligno grandiori, quod transversum ab vno pariete domus ad alterum
peruenit, vinculo suspendatur, firmo, molli, lato quæ: pedes autem habeat quatuor digitos, aut minus etiam inter, se di-
stantes: vinciatu item super genua loro lato ac molli, quod ad propositum lignum adducatur.



A Lignum grandius.
B Homo à ligno, vinculo suspensus.
C Homo rectus assistens corpori suspenso se appendens.

Qui cum ostentatione aliquid efficiunt, ab
atticis κομψεύεσθαι, dicuntur, quemadmodum
nunc ab Hippocrate, qui ostentationem ex-
primere volens usus est verbo κομψεύμενος.
nam & antea, ubi hominem super scalam re-
supinauit, ad id præsidium eos venire dixit,
qui vulgo videri volunt magnū aliquid mo-
liri, id tamen scripsit, quia viderat multos sui
 sæculi medicos, qui eo minus rectè vterentur.
ita etiam nunc ostendere voluit, qua via cru-
re per scalam optimè extento femur repona-
tur, qua uti fortasse non erit ab re, ubi non sit
scamnum, de quo postea tractabit. Præcipit
igitur, ut scala, super qua homo loris alligatus
fuerit, suspendatur à ligno grandiori, quod
transversum ab vno pariete domus ad alte-
rum pertinet, μεσόδμην vocat, id videre li-
cet in magnis diuerloriis, ubi iumenta ha-
bentur, & ruri similiter in ædibus rusticorum.
Vult ergo pedes ad tignum sursum spectare,
caput verò deorsum versus non multum re-
cedere à terra, ita, ut ille, qui articulum repo-
nit, stans ad reponendum, suis uti manibus pos-
sit, quomodo in sequentibus docebit.

Sect. 3. l. 27.
271.2

Sed affectum crus duobus digitis magis quam alte-
rum extendatur, caput verò recedat duos cubitos à ter-
ra, vel paulo plus, aut minus: brachia deligata sint ad
latera molli aliqua re: quæ omnia parata sunt homine
resupinato, ut quàm minimo tempore suspensus maneat.

Partibus, quas commemorauit, quomodo iniicienda vincula sint, aperte exposuit. Illa igitur,
quibus affectum crus appenditur, robustiora esse voluit & mollia, id quæ non iniuria, cum tota in-
tentio ad ipsius curationem adhibeatur, ea ratione, quæ communiter requiritur in luxatis omni-
bus reponendis. Igitur femoris caput, quum cauo excidens in interiorem partem eruperit, à mu-
sculis, qui ibi sunt, attractum primò in inferiorem partem attrahendum est, vnà scilicet cum femo-
re: deinde in exteriorem impellendum: cum quæ è regione sui caui collocatum fuerit, tunc vel so-
lis musculis committendum est, vel simul etiam adurgendum. Sepius autem diximus, musculos
naturalem vim habere, qua ad sua principia contrahuntur. Attrahunt igitur simul & femur, quod
attractum suo capite in cauum coxæ coniicietur.

45 Homine iam suspensio peritus aliquis, & non imbecillus trahere manum debet inter femora eius, qui curatur, col-
locare quæ brachium inter caput femoris luxati, & eam regionem, quæ inter anum & naturale media est: tum trahere
etiam manum altera prehendere, & rectus assistens repente corpori suspensio appendi, ita, ut sublimis maximè equa-
liter suspendatur. In hac reponendi ratione omnia secundum naturam sunt: nam corpus ipsum suspensum suo ponde-
re deorsum versus extenditur: is, qui appenditur in inferiorem partem extendit, & femoris caput excitari cogit è re-
gione sui caui, simul quæ osse brachij ipsum vrgat, trudit quæ, sic, ut in pristinam sedem reuocetur. Necesse autem est
aptissime vincula iniicere, ea animaduersione, ut is, qui appenditur, validissimus sit.

Solet Hippocrates eam regionem, quæ est inter inguen vtriusque cruris nuncupare αλχηάδα
cuius

cuius mediū *περίαιον* vocat, quæ ab initio naturalis ad anum pertinet, quæ ceruix vesicæ sita est. **E** Inter hanc itaque regionem, quam *πληχάδα* nominat, in medio eius in longitudinem, & caput femoris, iubet, ut, qui trahit femoris caput, manum demittat, cum qua alteram cōiungat, sicut ipse aperte declarauit, atq; ita suspendatur. quo fiet, ut femoris caput, nō solum trahatur, sed in exteriorem commissuræ partem impellatur, ut è regione caui, quod in coxa est, collocetur.

- 46 At (quemadmodum supra narrauimus) homines plurimum natura inter se differunt, quantum ad articulos attinet facile vel vix restituendos. Quamobrem plurimum differat, diximus, quæ de humeri capite: nam femur quibusdam absque ulla præparatione reuertitur, siquidem leui adhibita intentione, & exiguo motu, manibus in suam sedem compellitur.

Ante *κίχλισμόν* masculino genere dixit, nunc fœminino *κίχλιν*, quod vocabulum *διακίχλιν*, id est exiguum motum significat: quoniam verbū *διακίχλιν* mutuatur ad id significandum, quod leuiter dimouet, cuius meminit, cum tradidit qua ratione luxata maxilla reponeret.

- [47 Compluribus etiam, quum crus ad commissuram hanc flecterent, circumactus iam articulus reuersus est: sed plerumque non paret cuius præparationi: quamobrem, quæ ad singula efficacissima sunt, in vnaquaque arte scire conuenit, & ea vbiq; adhibere, quæ accommodata videbuntur. Supra extendendi modos diximus, ut quilibet eo utatur, cuius copia sit: oportet enim præstanter ab vna parte crus extendere, ab altera corpus: nam, si bene extendamus, femoris caput è regione sui caui excitabitur, quod, vbi sic excitatum fuerit, non facile prohiberi poterit, quo minus in suam sedem reuertatur, ita, ut iam quouis modo impellere ac dirigere abunde sit. Sed minus extendunt, quam par sit, idcirco maiori negotio reponunt.

Vbi crus ad inguen curuatur, femur vniuersum suspenditur: in qua actione prolapsu in femoris caput dimouetur, circumactumque restitui non nunquam solet. Quid sit circumagere, quod accidit, vbi prolapsus articulus, vel qui in latum scapularum os inseritur, vel qui in coxam restituitur, ipse in superioribus declarauit, vbi docuit non posse articulum in his cōmissuris suo loco paululum excedere, ut ad cubitum, ad manum, ad genu, ad talos. nam, cum & femoris caput rotundum sit, & oræ caui in quo recipitur in orbem, nullo pacto fieri potest, ut caput partim in cauo sit, partim extra, vel oræ caui hæreat, quoniam vbi primum voluetur, vel intro reuertetur, vel excidet. Igitur quia paruo momento in vtramvis partem caput compellitur, hoc quod fit circumagendo fieri asserit.

- 48 Non solum autem pedibus iniicienda vincula sunt, sed etiam supra genu, ne hoc magis quam coxæ articulus vinculo intendatur: sic itaque extendere à pedibus conuenit. Verum, vbi altera parte vis adhibetur, non solum circa petus & alani iniecto laqueo in contrariam partem attrahere debemus, sed lorum longum, duplex, validum, molle, inter anum & naturale demittere, à posteriori parte ad spinam, à priori iuxta iugulum adducere, & re ligare, atque ita in diuersa contendere, alijs ab vna parte, alijs ab altera ducentibus. Animaduertendum autem, ne lorum, quod inter anum & naturale demittitur, super femoris caput extendatur, sed inter femoris caput, & eam regionem, quæ inter anum & naturale media est. Dum intentio adhibetur, femoris caput in exteriorem partem propellendum, pugno ipsi inherente: vbi, qui extendit, suspenditur, vna manu traiecta, & alteri iuncta, simul & extendere debet, & in exteriorem partem dirigere: sed alius ad genu femur in interiorem partem leuiter dirigat.

Vbi homo per pedes appendatur, capite deorsum spectante, omnes articuli extenduntur. At propositum est eum solum extendere, qui ad inguen est. Iure igitur super genu vinculum iniicit, quod femur sursum extendat. nam, si permittamus attrahi crus solum à vinculis, quæ infra genu sunt, fiet ut genu, non minus, imò magis quam coxæ articulus extendatur, quum propius sit vinculis sub se extendentibus.

- 49 Supra etiam diximus expeditissimum esse iis, qui in frequenti ciuitate medentur, lignum habere quadratum, sex cubitorum, aut paulo longius, latum cubitos duos: cuius crassitudo si dodrantem impleat, abunde est.

Sect. 2. t. 49. 7.
238. b

In opere de fracturis huius machinamenti meminit, ita, ut huic quoque testimonio innitatur, qui aiunt compositum fuisse principio ab Hippocrate librum vnum, inscriptumque de officina medici, deinde in duos diuisum ob magnitudinem, eiusque priorem partem inscriptam de fracturis, alteram verò de articulis. Quale autem strui velit machinamentum hoc, manifestum est iis, qui id viderint, quod scamnum Hippocratis nuncupatur, sic enim ex multo iam tempore à medicis appellari consuevit. Plerique autem formulas paruas habent, ad eius exemplum fabricatas. Sapissimè verò adhibetur, articulisque restituendis per se abunde est. si quis autem velit alijs quoque uti, est *πολύσπασον*, ita appellatum, quod multis orbiculorum circuitibus, facilitatem præstet, quod iterum facientibus maximè idoneum est. refertur autem ad Archimedem auctorem. In vrbibus verò nō alienum est Fabri vel Andreæ organum, vbi erecto opus

A opus est: ubi plano, scamnum hoc Hippocratis præcipue aptatur, quod a non nullis ex recentioribus medicis varie iam struitur, sicut machinatio spathæ, quæ in summo capitulum habet rotundum ac leniter cauum. Deinceps igitur ad organi structuram, quæ ab ipso traditur, animum aduertite, ea, quæ Hippocrates scribit, iis, quæ in scamno inspicillius accommodantes: hæc enim, sicut antea quoque dictum est, sola demonstratione aperiuntur. Equidem iis, qui apud me librum legunt, rem facile demonstrare, organo iuxta collocato, sæpe ipso magno, sæpe paruo aliquo, ad magni exemplum fabricato, cuiusmodi ad hunc tantum usum paramus, ut ostendere legentibus possimus, quum per tales formulas nequeant articuli in suam sedem vrgeri. nunc autem monstrari hæc minime possunt: sed exponere licet, si quid ex verbis Hippocratis obscurum sit: quod & in superioribus feci, & nunc etiam faciam.

50 *Excavetur præterea hinc atque hinc in longitudinem, ne machinamentum iusto sublimius sit.*

Hinc atque hinc/ dixit *ἐν τῇ ἑκαστῇ ἐν τῇ ἑκαστῇ*, quod accipit pro a dextra parte, & sinistra. id vel eo patet, quod adicit / in longitudinem quod idem significat, atque longum. nam, si excavari voluisset supra a capite, vel infra a pedibus, transuersum potius dixisset, non in longitudinem. Mens autem **B** totius orationis huiusmodi est, quam non ab re est perspicuitatis causa non longe a verbis recedentem exponere. Excavetur præterea hinc atque hinc in longitudinem ligni: id quod cauum eam altitudinem habeat, quæ ad impellendum accommodatur, ne machinatio iusto sublimior sit. Verbum / iusto/ ipse scribit *τὴν κατὰ*, græci enim ita dicunt, & interdum etiam *τὴν προσήκουσαν*, quod / debito/ significat. Ergo altitudo caui tanta esse debet, ut vetus, qui ad impellendum aptatur, illis inherere, atque obici possit.

51 *Postes item ab utraque parte adiciantur, breues, robusti, qui axes contineant.*

Nominata axes *ἐν τῷ ξύλῳ*: postes vero, quæ sunt ligna, quibus axis sustinetur, *ἐν τῷ ξύλῳ*. hæc magno ligno adici voluit, ab utraque parte, a superiori scilicet & inferiori. Religantur autem ad axes extrema laqueorum, qui quo tempore conuenit in diuersa diducere, laboranti inuiciuntur.

52 *Satis autem est in dimidio ligno, nihil etiam prohibet in toto, paruas quasi fissas quinque aut sex excavare, quæ palmum inter se distent, & trium digitorum latitudinem atque altitudinem æquent.*

Fossas dixit *κατὰ τὰς*, quod verbum non pauci ex veteribus græcis in eandem significationem acceperunt. id mutuatur nunc Hippocrates translauone usus, ad ea caua significanda, quæ in scamno ea de causa fiunt, ut illis obici vetes possint: quæ caua præcipit, ut in altera ligni parte magis, hoc est in inferiori, exculpan. nihil est (inquit) prohibet, quin in superiori quoque parte sint. quanquam non necesse est, hoc liquidem machinamentum, quod nunc exponimus, non solum ad coxæ articulum pertinet, sed & ad vertebrae quocumque modo luxatas, & ad humeri caput reponendum. Cōplura autem sint caua hæc oportet, quandoquidem, qui curant, ætate, magnitudine, & vniuerso corporis habitu, inter se differunt. quæ magna esse debeant, & quantum inter se distare, ipse euidenter exposuit.

53 *Medium insuper lignum altè in quadratam figuram trium digitorum excavetur, in quod cauum, ubi opus esse videatur, defigatur lignum, quod cauo conueniat, & superius teres sit. Figatur autem, quum ad rem pertinere uidebitur, medium inter femoris caput & eam regionem, quæ inter anum & naturale media est: quod lignum extans corpus se qui non permittit, quum a pedibus trahitur: interdum enim hoc sufficit, absque intentione, quæ, ut membrum in diuersa diducatur, a superiori quoque parte adhibetur.*

A Lignum sex cubitos longum, latum duos, crassitudinis nouem digitorum.

B Quatuor ligna, pedem longa, extremis partibus rotunda.


C Axes nabentes in medio clauos, & in extantibus capitibus manubriola ductaria.

D Fossæ, quarum altitudo tres digitos æquet.

E Pnapiscus superius teres, demissus in medium lignum altè in quadratam figuram excavatum.

F Duo postes.

G Transuersum lignum in speciem gradus.



Scamnum Hippocratis.

sa diducatur, a superiori quoque parte adhibetur. Interdum autem, ubi crura ab utraque parte extendantur, lignum hoc versus hanc uel illam partem laxum demittitur, ut femoris caput in exteriorem partem impellat: hac enim de causa & caua exculptra sunt, ut cuneus, vel vetus ligneus, in quod expediriis sit demissus, aut iuxta articuli capita, aut ipsis prorsus inherens, eodem momento impellat, quo intro adducitur, seu in exteriorem partem, cum in interiorem impellere opus sit.

Exadi

Excidi voluit in scamno quoddam cauum, quo recipi id lignum possit, quod erectū collocan- **E**
dum est, inter prolapsi femoris caput, & eam regionem, quæ est inter anum & naturale. Cur autē
lignum hoc, dum extendimus, adhibendū sit, licet cætera omnia, quæ deinceps subdit, ipse aper-
tè indicauit: ob eos tamen, qui hebetioris sunt ingenij, verba hæc aperire aliquantulum non gra-
uabor. Hoc igitur lignum, quod erectum collocatur inter caput femoris prolapsi, & eam regio-
nem, quæ media est inter anum, & naturale, renixus causa obicitur, quū ab inferiori parte crus
extenditur. sæpius enim ostendimus, vbi membrum extenditur, nisi à contraria parte tendatur, se-
quente agro intentionem resolui. Tenditur autem & per laqueos superioribus partibus iniectos,
sed firmitatis causa lignum hoc adhibet, quo non nunquam minū firmiter hærente ad impel-
lendum vitur.

- 54 *Ac seu teres vectus esse debeat, seu latus, alius enim alij articulo conuenit, huiusmodi impulsus, si intentio quoque
accedat, ad omnes crurum articulos reponēdos efficacissimus est: proposito autem articulo vectis teres accommodatur.
Quod si per hoc machinamentum vis adhibeatur, fieri non posse existimo, vt aliquis sit articulus, qui non reponatur.
Reperiet quis & alios reponendi huius articuli modos.*

Ipse deinceps ostendet tereti vecte tunc vtendum esse, quū femur in interiorem partem im- **F**
pellitur, quod nunc instituit, quū femoris caput in interiorem partem prolapsum reponat: nā,
si in exteriorem luxatum sit, latum vectem admoueri iubet. Nunc quidem præcipit, vt medium
inter caput femoris prolapsi, & eam regionem, quæ est inter anum & naturale, inferamus. concu-
rimus que sublimius paulo, quā femoris caput demittere: sed, quū in exteriorem regionem ar-
ticulus veniet, vbi satis spacij est, latus vectis firmitus obicitur, quod ipse paulo infra ostendet,
vbi aget de ipso separatim.

- 55 *Nam, si magnum hoc lignum medium duos postes habeat pedales, eius altitudinis, quæ idonea videatur, ab utroq;
latere vnum: tum super hos duos postes transversum lignum in speciem gradus statuatur: deinde integrum crus inter
postes traiciatur: quod læsum est, super gradum commodè collocatur, super que aptatur, quia articulus excipit. Gradū
verò iusto subliorem stabilire oportet: & multiplicem vestem, prout conuenire videbitur, corpori subicere.*

Postes nominari ab Hippocrate, non ea ligna tantū, quibus axis sustinetur, apertè ex hac ora- **G**
tione colligitur. in media enim regione longitudinis totius scamni situm est lignū transversum,
quasi gradus, quod à dextra parte ad sinistram pertinet, super quod crus, quod luxatum est, exten-
ditur, non simpliciter, sed cum altero ligno alligato, quod in longitudinem à superiori parte cru-
ris ad inferiorem porrigitur, ita, vt super gradum crus cum eo ligno cogatur. Constat autem inte-
grum hominis crus super gradum habendum esse inter *ελιάς*, sic enim vocauit postes, ligna in-
telligens, quæ gradum sustinent, quorum vtrinque vnum struit in ipso scamno. Hippocrate verò
vsum translatione à portarum postibus ita nominare ligna, quæ in scamno sunt, peripicuum est.

- 56 *Post hæc lignum, quod conuenientem latitudinē habeat, & longitudine vsque ad talum perueniat, cruri subiicien-
dum, sic, vt vltra caput femoris, quantum potest, feratur: cruri que alligandum, quot locus opus esse videbitur.*

Lignum alligandum esse ad totum crus, suprā etiam ostendimus, sed nunc superiorē ligni ex- **H**
tremitatem, superiorem capite femoris collocandam existimat, adiiciens orationi / quantum po-
test / siquidem, quod nunc fieri iubet, difficillimum est, nisi ea pars longi huius ligni, quæ inguini
hæret, humilior struatur: quæ spectat in exteriorem partem, sublimior: nam, si equale sit, parem quæ
altitudinem habeat, difficile admodum fuerit ipsius summam simul in inguine stabilire, & lu-
periorē femoris capite demittere.

- 57 *Quo factō, dum crus intenditur, vel per lignum, quale pistillum est, vel per aliud ex iis, quæ idonea ad extendendū
sunt, simul oportet crus cum alligato ligno super gradum deorsum compellere, & ad coxam ab aliquo hominem conti-
neri: hac enim via femoris caput intentionis vi e regione sui caui superius collocabitur, & simul ob impulsū in suam
sedem trudetur. Quæ cogendi rationes valide sunt: & si rectè admoneantur, vitium superant: sed (quemadmodum
antè dictum est) articulus hic, imbecilliori vi, & plarumque quauis præparatione in suum locum reuertitur.*

Femore super gradum extento prolapsus articulus humilior redditur: quæ res ad restituendū
aptissima est, nam sic ora caui humilior femoris capite cōtinetur. Sed, quū elapsus articulus, nisi
caui ora superior sit, reponi nequeat, vbi sublimior fuerit, optimum erit humiliores collocare,
atque ita extendere. Ceterum laquei, quibus crus extenditur, religandi sunt, vel ad lignū, quale pi-
stillū est, cuius ima pars firmiter in pavimento oppositæ moræ obiciatur: vel si huiusmodi ligno
vti ad intendendum nolis, lori capita ad axem, qui in scamno à pedibus est, vincienda. id enim sibi
voluit, quū ait / vel per aliud ex iis, quæ idonea ad extendendum sunt / , ex iis / intelligens, quæ
proposita sunt diuersa à ligno, quale pistillum est. Quæ subiicit in hac oratione manifesta sunt.

At vbi

58A At ubi in exteriorem partem femoris caput exciderit, ab utraque parte, quomodo ante diximus extendendum est: sed impellendum per latum rectem simul que cum intentione adhibetur, ab exteriori parte in interiorem utrendum, uel ad clunem ac paulo supra accommodatus. Et ne corpus cedat, aliquo interea partu clunem repellente, aut manu, uel alio huiusmodi recte superimposito, qui caui illi, quod magis in rem est, adiuuatur: si mori temeritate, quod ad genus est, ab interiori parte leniter in exteriorem cogendum, sufficere tamen. Ubi actus uel in hanc partem uenit, alienum est, quandoquidem cubitus illius, qui appenditur, articulum a suo cauo reducere: impu, autem per uenerit. Etum lionum uidetur alicui ad hoc genus luxari pertinere: in quo casu ab exteriori parte accommodandum est. Quid plura? si commode recte que extendamus, recte item impellamus, quis articulus uel luxatus non reueritur?

Sicrus valenter extendatur, non necesse erit per lignum impellere: manibus enim prehendentes femoris caput totum iuxta clunem cogere ab exteriori parte in interiorem poterimus, donec e regione sui caui collocetur. Patet autem teretem rectem ad huiusmodi impulsu inutilem esse, quum & latus etiam non sufficiat, nisi, qua clunem attingit, talis struatur, quale strui uoluit capitulum rotundum ac leniter cauum super eam spatham, quæ ad reponendum humeri caput aptatur, *autem* dicitur. Ipse autem ad verbum scripsit utrendum recte ad clunem ac paulo supra accommodato. relinquitur autem hunc esse necesse est, qua clunem complectitur, non ex toto rectum. Quæ sequuntur in hac oratione omnia clara sunt.

59 At si in posteriorem partem femur exciderit, extendere oportet, & in diuersa deducere, comodo, quo diximus: imponere que super lignum, rectem multiplicem, ut modo admodum sit, & homine primo extendere. Eodem autem momento, quo extenditur, per alteram cogendum, non secus atque, ubi spina gibba est, ita, ut asser e regione clunis, seu supra seu infra coxam magis collocetur. Cauum in pariete e regione asseri non sit, sed magis dorsum spectet ad pedes. Hæc reponendi ratio articulo in posteriorem partem luxato maxime secundum naturam est, ac simul etiam uidentur omnia. Satis fortasse fuerit aliquem pro asseri insidere, uel manibus utgere, uel pedibus repente consistere articulo que, quo tempore intentio adhibetur. Nulla autem alia restituendi ratio femori uel luxato secundum naturam est.

Hæc etiam, quæ de femore sic luxato tradit, iis, qui eorum, quæ propolita sunt, meminerint, in aperto omnia sunt. edicit enim, ne hos ut priores resupinemus, sed in ventrem conuertamus. hic siquidem est habitus pronus. Valenti ergo intentione adhibita a posteriori parte in priorem compellere articulum oportet, nam, cum homo ita iacet, ut præcepit, posterior pars sublimior collocatur, prior subiicitur. quocirca necesse est, ut qui restituit, femoris caput deorsum compellat, quod commodissime præstat impulsus, qui per alteram adhibetur. idem efficeret, qui qua prominet femoris caput insidens, magna vi cogeret: sed, nisi clunis eminētia luxato capiti hæreat, nihil hominem iuuabit. Hæc igitur curatio virum summæ diligentiae ac prudentiae postulat.

60 Si in priorem partem uenerit, idem conuenit extendendi modus: sed aliquis moru admodum strenua, & maxime percutus sublimiori inius palma parte ingueni adiungat, eandem que manum altera comprehendat, simul que quod excedit, in inferiorem partem trudas, & versus priorem genu subigat. Hic extendendi modus, ubi femur sit luxatum, maxime nature conuenit: sed & ille, qui hominem suspendit, prope etiam nature aptatur, in quo necesse est, ut is, qui appenditur, non ignarus sit, ne brachio articulum impellat: sed inter partes naturales & anum, iuxta os, quod sacrum dicitur, appendatur.


Ad quartum genus luxati femoris aggressus est: de quo euidentissime omnia prodidit, iis prefertur, qui in memoria habeant, quæ antea dicta sunt: quare nihil est quod nugæ hic agamus.

61 Inuenias etiam laudem, si suæ utre articulum hunc restituas: sed quosdam noui, qui cum præ infirmitate, & ubi in exteriorem & ubi in posteriorem partem erumperet, reponere per utrem tentarent, neque intelligerent hac via expelli magis, quam in suam sedem restitui: primum uero auctorem constat utrem adhibuisse, ubi articulus in interiorem partem elaberetur, scire tamen licet alia multa ex usu magis esse, quam utrem. Datur ergo inter femora uter non inflatus sic, ut quantum maxime potest, sublimis inter anum & naturale collocetur: tum femora inter se vincuntur habena, quæ a parietis ordiatur, & usque ad dimidiam femorum partem interdat: post hæc inflatur uter, descenditur que demissa ante fistula in unum ex pedibus, qui solutus sit, & eger in latus cubat iuncto crure sursum spectante. Preparatio igitur huiusmodi est, sed plerique hanc adhibent deteriore, quam ego dixerim, cum non adigant bonam femoris partem ut proposui: sed genua duntaxat: adde quod intentionem, quæ maxime necessaria est, omittunt. Non nulli tamen luxatum iam restituerunt, ut qui rem facilem nacti fuerint, sed huiusmodi impulsus non iniquopore tolerabilis est: siquidem inflatus uter, quæ maxime tumet, eam regionem non attingit, in qua præcipue femoris caput iacet, quæ potissimum impellendum est, sed infra illud, ut qui in medio femorum uel interius etiam clunatur: ad hæc femora naturaliter sunt curua, a superiori enim parte caruosa sunt, & prope inter se iunguntur, ab inferiori remanent: quare & femorum natura utrem expellit ab ea parte, qua præcipue ad mouendum esset, ita, ut si paruus uter inferatur, cum vim exiguam habeat, nullo modo utgere articulum possit. Oportet ergo, si utrendum utri sit, femora ad magnam partem inter se deuincire, & utrem inire, eodem momento, quo corpus extenditur, curua que extrema parte inter se colligare, ubi hac ratione articulus reponitur.

Docet

A Homo in latus cubans.
B Vte: inter femora iniectus.
C Alter ænea fistula virem inflans.

62



Docet, quæ ratio- E
ne quis vtrâ modo
restituendi per vtrê,
quamuis eum non
probet. cuncta autê
planè explicat.

In tota arte medici-
nali id in primis dare ope-
ram oportet, ut quod ma-
lè habet, ad sanitatē per-
ducatur: quod ubi cōtin-
gere possit pluribus mo-
dis, ille eligendus est, qui
omnium minimo nego-
cio comparatur: hoc si F
quidem magis officium est
probi viri, & plus habet

artificij, nisi quis in popularem auram incumbat. Sed, quod ad hunc locum attinet, quidam modi extendendi corporis
per ea, quæ domi habentur, parari possunt, sic, ut ex iis, quæ præsentia sunt, inuenire liceat, per quæ promptè cura-
tio adhibeatur.

Oratio hæc postrema est, in qua iubet, ut in iis exerceamur, quæ promptè ad curationem accō-
modantur, ita, ut quamuis nec scamni copia sit, neque alterius, ex iis, quæ proposita sunt, excogi-
tare per te aliquid simile possis. sed de his euentissimè in sequentibus tractauit, ut neque breui-
sima expositione opus sit. omnia enim perspicua sunt iis, qui meminerint quæ proposita sunt:
explicabo tamen, si quid mihi obscurius esse videatur.

63 Quòd si vincula ex loris non sint mollibus, & quæ facillè tractentur, sed tantum vel catenæ, vel rudentes, vel fun-
nes, necesse est antè fasciis vel panniculis è lana eam partem inuoluere, quæ potissimum inuici vinculum debet, & vlti-
riorem quoque, postea deuincire.

A Homo scalæ defossæ insidens.
B Calathus lapidibus plenus vitiato cruri appensus.

64




Nauium rudentes græci vocant ὀπλά,
quod Poeta indicat in eo carmine,
Κεῖτο δ' ἰὼ ἀρθέσθ' ὀπλον νεὸς ἀμφιελίσης.
Constat etiam Hippocratem, quum ru-
dentes ὀπλά dixit, eos funes intellexisse,
qui in nauibus habentur: nam eos, qui in
urbibus, & qui in agro, communi funium
vocabulo appellauit σχοινία.

Ad hæc super lectum, qui ex iis, quorum copia
est, firmissimus sit, & maximus, rectè homo ex-
tendatur: lecti autem pedes, vel qui à capite vel
qui à pedibus sunt, vel ab exteriori vel ab interiori
parte fulciantur, ita, ut fulcra limini firmiter hæ-
reant: sed ad alios pedes collocetur lignum quadra- H
tum transuersum, quod perueniat ab vno pede ad
alterum: ac si tenue sit, ad pedes lecti deligetur, si cras-
sum, sine vinculo relinquatur: post hæc vinculorum
capita tam eorum, quæ versus caput procedunt,
quàm eorum, quæ versus pedes, vtrique ad pistil-
lum vel ad aliud tale lignum vinciantur: vincula
autem vel rectè iuxta corpus porrigantur, vel pau-
lo etiam superiora, conuenienter quæ à pistillis inten-
dantur, quæ erecta sint, sic, ut vnum limini obli-
ciatur, alterum ligno, quod adiectum est. Sic igitur
per pistilla ad se attracta adhibere vim oportet: sa-
tis autem esset loco liminis & ligni appositi scala,
quæ gradus firmos haberet, lecto subiecta, ut pi-
stillis hinc & inde admotis, vincula extenderentur.
Reponitur

A Reponitur item hoc modo femoris articulus, siue in interiorem, siue in priorem partem eruperit. Scala desolitur, cui homo insidet integro crure, leniter extento, & quā commodē poterit alligato: Vnto cruri vas fictiū appenditur aquæ plenum, vel calathus in quem coniecti lapides fuerint. Est & alter reponendi modus ad eō, quibus femoris caput in interiorem partem luxatur. Transuersum lignum inter duas columnas deuincitur, quantum res postulat sublimē, & ab vna parte extra columnam cubitum porrigitur: deinde homo vestimentis pectore obuoluto super eam partem transuersi ligni, quæ extat, collocatur, ac pectus per latam habenam ad columnam deuincitur: integrum crus ab aliquo tenetur, ne subuertatur: sed affesto appenditur res aliqua, quæ orauitatem habeat conuenientem, ut supra quoque dictum est. Ante omnia igitur scire licet omnium ossium commissuras plerumque sinu & capite contineri: & in aliis sinum cauum esse & oblongum, in aliis parum desidentem. Semper autē restituere conuenit omnes articulos, qui exciderūt, protinus, quū adhuc calidi sunt, vel certē quā celerissime: nā, qui reponit, facilius & citius reponit: & ager minorem molestiam sentit, ubi priusquam locus inuenerit, articulus restituitur. Perpetuo item, ubi reponendus articulus est, emoliri ante debet, & dimoueri, sic enim promptius reuerti consuevit. Vbi quique autem reponitur, imperanda abstinentia est maxima, ubi maximus fuerit, & difficilissimus ad reponendum: minima, ubi exiguus, & facile recondatur.

- A** Canterius inter duas columnas deligatus.
B Homo canterio insidens pectore ad columnam alligato.
C Alter crus sanum detineus.
D Vas testaceum aqua plenum cruri lasso appensum.



DE DIGITIS LUXATIS

Quod si digiti articulus excidat, seu primus, qui ad manum pertinet, seu secundus, seu tertius, eadem est & equalis reponendi ratio. maximi quidem articuli semper agrius restituantur. Excidunt autem in quatuor partes, vel sursum, vel deorsum, vel vtrique ad latera, sed maxime in superiorem partem, minime in latera, quod accidit, ubi vehementer moueantur. Quod si à

latere prorumpant, ab ea parte, in quam veniunt, quasi capitulum rotundum conspiciunt, & leniter cauum: si in superiorem vel inferiorem partem prolabantur, quū hic locus leuior sit, quā qui à lateribus, simul quæ procidentium articulorum excessus paruius, facilius reconduntur. Reponendi ratio sic habet. Summus digitus fascia vel aliqua tali re inuoluitur, sic, ne dum intenditur, extrema parte prehensus elabatur: quō inuoluto vnus eam regionem, quæ super primam palmæ partem est, alius inuolutam partem, ad se vterque valenter attrahat, simul quæ excedens articulus in suam sedem compellatur. Si à latere excedat, ratio extendendi eadem est: namque, ubi videbitur loco excessisse, simul dum intentio adhibetur, protinus in suam sedem cogendus est: sed interim alius ab altera parte debet digitum repellere, cauens, ne in eam rursus prolabatur. Commode quoque restituantur per digitorum tegmenta ex palmis intexta, quæ à lacertis τὰ πρὸς ἁρτὸς græcè nuncupantur. Vbi in diuersa digitorum extenderis, prehensens altera manu primam palmæ partem, altera tegmentum, posito articulo, debes quā citissime deuincire fascia tenuissima, inuncta cerato, quod nec nimis molle sit, nec nimis durum, sed moderatē: cū quod durum est, à digito recedat, quod liquidum &

D molle, digiti calore tabescat & resoluatur. Soluendus autem est digiti articulus tertio aut quarto quoque die, atque in vniuersum, si inflammatio locum occupauerit, frequentius soluendus est, sin minus, rarius: quod communiter de omnibus articulis intelligi volo. Confirmatur autem digiti articulus decimoquarto die. Eadem verò curatio est digitorum manus ac pedis. Quicumque articulus recondatur, debet homo in media ac tenui victu vsque ad septimum diem vti: ac, si inflammatio sit, frequentius resolui, alioquin rarius. Semper autem quiescere vitiatum articulum conuenit, & quā optime figurari.

DE GENV LUXATO

Facilius restituitur articulus genu, quā cubiti, propter iustam & facilem naturam, quamobrem facilius quoque excidit. Excidit autem plerumque in interiorem partem, quanquam & in exteriorē, & in posteriorem. Reponitur verò vel flectendo, vel calcitrando vehementer, vel ubi fascia in globum conuoluta & ad popliteum adnota repente crus curuetur. Sed si in posteriorem partem prolabatur, potest per distentionem in suam sedem collocari, quemadmodum articulus cubiti. Si in latera excidat, flectendo & calcitrando restituitur, quāquam mediocris distentio communi pertinet ad quoduis reponendum. Quod si genu in suam sedem non reuertatur, curuari non potest, ius, quibus in posteriorem

posteriolem partem venit, neque omnino aliis. Vnde femoris & cruris prior pars extenuatur. Quibus excidit in interiore, Valgi magis fiunt, sed extenuatur pars exterior. Si moueatur in exteriorem, magis vari fiunt, sed non ita claudicant, & crassiori osse nituntur, sed extenuatur pars interna. Quod si à primo natali die, vel in incremento, id acciderat, succedit res quomodo ante ostensum est.

DE TALO LUXATO

Quæ ad talum pertinent valenter distendere oportet, vel manibus, vel alius quibusdam, & simul dirigere quod commune est omnium.

DE PEDI

Quæ in pede perinde atque ea quæ in manu, restituntur. Tum eorum quæ in crure siue à primo natali die, siue in incremento, luxentur, eadem est ratio, atque eorum quæ in brachio. Quicumque ex superiori loco saltantes calci vehementer insistant, ita ut ossa diducantur, venæ sanguinem effundant, nervi qui iuxta sunt, contendantur, atque hæc gravissima acciderent, periculum est, ne calx corrumpatur, & æuum negocia faceat: ossa enim molesta sunt nervi inter se communicant. quandoquidem & quibus ob fracturam in crure aut tibia, aut ob nervos qui cum calce communicant attritos, aut quod homo, dum iacet negligenter habitus sit, nigrescit calx, & malum recrudescit, & corruptioni ossis febres acutæ accedunt, cum singultu, cum mentis alienatione, quæ celerrimè hominem interimunt: accedit & Venarum sanguinem fundentium lior. Ex eo autem intelliges, futurum ne sit, ut malum recrudescat, si sanguis è venis fusus, si nigrities, & quæ iuxta sunt, subdura sint, & subrubicunda. Tum, si cum duritie liuida sint, periculum est ne nigrescant. quod si sanguis suffusus, nigrities, proximæ partes subvirides sint & molles, talia in his omnibus bona.

Remedium est veratrum si febris absit: sed si adsit, & res postulet, bibatur ὀξύλινος. Ratio vincendi eadem conuenit, quæ articulis. maxime autem vbiq; ad collisâ pluribus linteis mollioribus, & minus astrictis utendum est: fasciam vero oportet maxima ex parte circa calcem obuolucere, & ita circumdare, ut ipsum non exprimat, & à ferulis abstinere. Quibus autem pes, aut per se, aut cum appendice, elabatur, elabatur autem magis in interiorem partem, si non restituitur, extenuatur tempore coxa, femur, crus è regione partis luxatæ. Reponendi ratio eadem est, atque in prima palmæ parte. distentio validior conuenit, & curatio eadem quæ articulis. Minus autem recrudescit malum quàm in prima palmæ parte si homo quiescat: in quo casu tenuiori victu opus est. Eorum autem, quæ à primo natali die, vel in incremento, eadem ratio est, quam supra ostendimus.



GALENVS DE FASCIIS

Vido Vidio Florentino interprete

VIDIVS LECTORI

Postremi libri de Fasciis de Laqueis, de Machinamentis non reperiuntur / quod sciam, nisi in eo codice, cuius mentionem fecimus in epistola ad Regem, in quo sunt tres auctores de fasciis, Galenus, Soranus, & Heliodorus: quibus ego iam feci Galenū duntaxat, nam qui hunc non tenebat quos plane non. Sed an eiusmodi liber germanus sit Galeni, dubitare nemo debet, nā vel ipso proœmio convincitur: atq; hic est ille liber, quem ipse pollicetur in secundo cōmentario de officina medici. Verum desiderantur in Galeno quedam, quæ placuit accepta à Sorano & Heliodoro in hunc librū inferere, ne qua superflua humani corporis pars, cuius vinculum in hoc opere non reperias. Quæ sunt omnes, putamus vel ab auctore omīssa, vel quod magis probabile est, intercidisse: neque enim verisimile est Galenum tam Sorano quam Heliodoro posteriorē, qui ab utroque multa alia de fasciis mutavit, quæ nunc desiderantur, omnībile, nec singulis partibus, ut pollicetur, tam in vincendi rationem assignasse. Huc accedit, qd descriptio à sorano vinculi, quam posuit Heliodorus ad vincendum femur, in libro Galeni non legitur, licet eius meminerit saepe numeri: quia tamen necessaria fuit, prætereunda fuisse nō videm. Vbiq; autem aliunde quiddā petemus, auctoris nomen manusculis licetis notabimus hoc pacto, Ex SORANO, Ex HELIODORO. cum quæ ad Galenum reuertemur, Nunc GALENVS.



Ippocrates ille auctor vetustissimus mundiciem spectans, quam exigunt aliæ artes in agendo, mihi videtur non inconsiderate protulisse, Nobis sanè placet in arte vniuersa animi intentionē adhiberi: in quacunque enim opera decore agere recte, que possumus, decore ac recte agere conuenit: quæcunque mundiciem celeritatem, que admittunt, celeriter munde q; conficienda sunt: atq; vbi euitari dolor possit, quàm maxime iocunde: tum reliqua huius generis omnia præclarius agere debemus, quàm alij eiusdē artis professores. Siquidem (ut in nō nullis, quæ efficiuntur, videre licet) artifices vsum habentes non alia re præstant ignaris & expertibus, quàm celeritate atq; elegantia. Medi-

cum ergo eo magis quàm alium artificem fungi decet suo munere, quo sibi nobilior est subiecta materies: & idcirco, siue sciet, siue adurat, siue alliget, siue quid aliud manu molitur, non modo utilitati studere debet, sed mundicie & elegantia, quemadmodū ipse alibi rursus testatur, quum inquit, Vinculi ratio duplex, altera illius quod iniicitur, altera illius, quod inieciū est: quod ini-

icitur, ut celeriter, iocunde, prompte, eleganter: celeriter quidem, ut opus expediatur: iocunde, ut facile præstetur: prompte, ut vbiq; sit in promptu: eleganter, ut oculos delectet. Mala enim in non nullas corporis partes incumbētia, idoneam vincendi rationem postulant, eam, que per se homo sapissime decoram experit. Quare tam solius agrotantis gratia, quàm omnium quibus sui

Dividendi copiam faciet, scire oportet, quæ vincula, & simplicia, & varia, singulis partibus accom-

modentur: nec ignorandum est non nullis vtraq; conuenire, non nullis alterutra, nempe varia. licet alij secus existiment, de qua controuersia primo diiudicare operæ precium est. Expellunt nō nulli varia vincula, non modo tanquam nihil proficientia, sed veluti vsum præstantia maxime alienum, id quod nulla stabili ratione firmant: sed testimonio maiorum nitantur, primum Hippocratis, cum inquit, Sed qui præstantia vincula amant sine mente, complura alia lædunt, præstantia id est varia: deinde Mantia, referentis cuiusdam oculos procidisse, cui pharmacopola caput & faciem vario vinculo deligauerat: id q; iure putant euenisse, quod fasciæ ob varietatem inæquales vrgeant, & idcirco mouere inflammationes possint, atq; abiceilus. Sed sanus fuit eos dignoscere, non vinculorum varietate accidere, quod adducunt, sed insentia alligantium, qui valenter adstringunt, oportuit enim ita deligare, ut Hippocrates docuit, cum ait. In his autem maxime ad vinculum pertinet, ut arctetur quidem sic, ut quæ inieciā sunt, neque recedant, neq; comprimāt, sed fulciantur, non tamen cogantur. æquum autem fuit, vbi Hippocratem citarunt, illud adiungere, quod in Hippocratis oratione restabat: non enim simpliciter scripsit, sed, qui præstantia vincula amant, complura alia lædunt, verum subiecit / sine mente. Intelligent autem ex his quæ mox persequar, vinculum varium nullo modo ab Hippocrate submoueri, ipse igitur in libro de

Septima Classis.

PPPPPP

officina

In lib. de iis q
in med. f. sect. 2.
l. 6. l. 7. 205. 2

In lib. de iis q
in med. f. sect. 2.
l. 6. l. 7. 205. 2

Sect. 2. t. 2. 7¹.
205. d

officina medici || fasciandi rationem agens. vbi narrauit quid vincula requirant dum iniiciuntur, E
quid postquam iniecta sunt, subdit / quod iniectum est, vt recte, vt decore / recte intelligit inie-
ctum, quod confert: decore, quod elegans est. vt autem exponat quid sibi velit decore, addit / de-
core quidem, vt simpliciter, vt distincte. adiungit autem verbum simpliciter, non quo ex toto
declaret decore, sed ex parte, quasi dicat vinculum simplex sit & distinctum, quod euentius col-
ligitur ex his, quæ subiecit: Aut similibus & æqualibus, æqualiter & similiter, aut inæqualibus &
dissimilibus, inæqualiter & dissimiliter. Species autem simplex orbicularis, ascia, lima, oculus,
rhombus, dimidiatus. aptetur vero species speciei, ac morbo illius, qui deuincitur. Ergo vinculi
speciem, quæ simplex est, orbicularē esse necesse est, sed ascia omnino lima est, atq; ita quod pror-
sus æquale est, erit sibi simile, quod inæquale dissimile. Num igitur deterrentur iam de sententia,
qui varia vincula repudiari ab Hippocrate voluerunt, fatentes asciam, oculum, rhombum, dimi-
diatum, variis assignari an præter hæc, illis commemorem eundem Hippocratem in libro de ar-
ticulis, ad fractum iugulum, vinculum ad mouere, quod à gruis similitudine *ῥεπιδία* nomina-
uit, id quæ varium esset. Sciant autem quibusdam partibus, cuiusmodi femur est, vbi repositū est,
atq; humerus & cubitus alia q; plura, nullum aptari vinculum posse nisi variū. Hactenus de his.
pergamus iam ad fasciarum vinciendi q; rationem: scrutemur quæ in primis, vt fasciæ inter se di-
stent, materia, habitu, longitudine, latitudine, structura. Materia igitur inter se dissident, qm non
nullæ lineæ sunt, non nullæ ex lana, alia ex membranulis: quarum vsus, cum neq; vnus sit, neq;
similis, sed dispar, vbi opus erit, eas accipere conabimur, quæ morbo maxime congruant. quæ-
cunque ergo adstringenda erunt, linteis alligabimus: at vbi adstringere non oporteat, propterea
q; hoc inflammationi sit inimicū, sed abunde sit continere vel tegere, ex lana: ex membrana vero
secuti Hippocratem, || vbi nasus vel maxilla comminuitur, extremitatem membranulæ parti quæ
vinculum postulat, agglutinantes: Habitu, cum alia glomeratæ alia scissæ sint, assutæ alia: glo-
meratæ sunt, quæ ex habena in longitudinem fiunt, quibus nihil assuitur, tales sunt quibus per-
fracta membra vinciuntur: scissæ, quæ ex vno linteio extremis partibus vel alibi scisso conficiun-
tur, quales sunt, quæ ad capitis vulnera dantur (canceri dicuntur) siue in quatuor partes scindantur,
siue in sex, siue in octo: assutæ ex pluribus habenis varia figura inter se iunctis componuntur, qua-
les sunt, quæ suspendunt, quæ cingunt, quæ mammias deuinciunt, quæ mammis & loco præte-
rea, qui iuxta anum est, accommodantur: Longitudine, cum quædam breuiiores, quædam longio-
res sint: Latitudinis eadē ratio est, siquidem tam hæc, quàm illa, debet vinciendis partibus respon-
dere: Structura, nam aliæ texuntur, aliæ constant ex materia per se coacta, vel certo ordine impli-
cata, quæ simplici textura fiunt: non nullæ hac de causa texuntur, non nullæ conficiuntur ex tela,
quæ ad alium vsum texta scinditur in fascias: his plerunq; vulnera obligamus, illis vtuntur vena-
tores ad crura defendenda: eadē primæ palmæ parti circūdantur, quæ ex implicata materia fiunt,
ab aurigis ad latera continenda adhibentur. Est autem perpetuum, vt qui vinciunt fasciis abun-
dent: & quas habent, sciant quàm optime adhibere: atque vbi deligandi locus est, tales accipiant,
quales docuit Hippocrates || quū inquit, iam vero fasciæ parentur, leues, tenues, molles, munde,
late, sine futuris, sine eminentiis, ita valentes, ne extentæ rumpantur. & paulo amplius, Mundas
quidem esse conuenit, quoniam sordide præter quàm quod indecore sunt, liquore aliquo resper-
se, non madescent, deterius q; id reddunt, quo perfunduntur. esse itē sui coloris debent, ne si pur-
pura inficiantur, vel alia huiusmodi re, eandem noxam afferant, aut coloris similitudine currentē
sanguinem representent: tenues insuper, ne ambitus in tumorem nimium assurgant: molles, ne
ob duritiē virgeant: leues, ne onere infestent: sint præterea sine futuris inæqualibus, ob quas futurū
esset, vt comprimerent: tum sine eminentiis, hoc est non sint oræ à lateribus ipsa textura cōfectæ,
vel alioquin versæ atque confutæ, nec quædam extantia, quasi fibræ: cum quæ eminent, vinculum
reddant inæquale, quæ extant, non patiantur fasciam facile circuire. Quod si fasciæ ex inciso linteio H
fiant, incidatur non per transversum, sed in longitudinem, sicut intextum est, sectione ad stamen
directa, sic enim lineæ facile scinduntur, quod secus habet, si quæ subtegmen procedit, hoc tente-
tur, adde, quod quæ in longitudinem scinduntur fasciæ, quod vinctum est, firmius continent. At
vinciendi ratio quædam (vt superius dixi) simplex est, & quædam varia: atque hæc modo nomen
inuenit à sede, cui adhibetur, modo ab euentis, non nunq; translato vocabulo à similitudine ani-
maliū. à sede, quæ vincitur, nomē trahit, oculus, nasus, inguen, cetera q; huius generis: ab anima-
libus, cancer, accipiter, aries, lepus, testudo: sed ab euentis, vallum seu coniunctū, seu disiunctum,
operculum, habena, & quæ his similia sunt. Præterea ex huiusmodi vinculis quædam sunt vincula
tantū, vt tholus, regium, scapha, discrimen: quædam vincula simul & laquei, cuiusmodi est lepus
auritus, pastoralis, ceteri q; cōsimiles. Vinculum insuper aliud ab altero fasciarum capite incipit:
aliud à mediis fasciis: aliud vtroq; modo. Quoddam item certis sedibus idoneū est, reliquis alie-
num cum sit: quoddam aliis quoq; aptatur. Super hæc aliud à priori parte cōspicitur, q; priorem
hominis partem duntaxat alligatam ostendat: aliud à posteriori: aliud ab vtraq; similiter & prio-
rem & posteriorem partem eque vinctam demonstrans. atque hæc nunc cōsimili, nunc dispari
ratione veniunt in conspectū, quæ omnia plana fient, cū ad singula ventum erit. Sed consideran-
dum

In li. de Artic.
sect. 2. t. 27. &
46. 7^a. 265. d
& 267. d

In lib. de Offi.
med. sect. 2. t.
26. 7^a. 211. f

Adum est, inquirendum q̄; an quomodolibet ordiri fascias oporteat: maiores enim eē. statuerunt certas corporis sedes, à quibus fasciæ ordiri deberent. Exempli causa in capite, ob quæcunque causam vinciatur, fasciæ caput in occipitio collocant, inde ipsam circūagentes, iuncturam conficiūt: nec quidquam intuentur, quod agunt, morbo ne, cuius causa vincitur, in adhibent, secundum sit, an aduersum: in alijs item partibus incertitia vel ignoratione (vt credibile est) decepti, locos præferunt. necesse enim est recte vincientem auctore Hippocrate eo incumbere, vt non solum deligandæ parti, sed affectui quoq; vinculum conueniat. Nos igitur non vndeūq; sed quā maxime expedit, ordimur, extremam q̄; fasciam imponimus, quā docuit Hippocrates, cum inquit, Quæ

In lib. de iis q̄
i med. f. sect. 2.
c. 14. 7. ac 8. h

“ mouentur, vt articuli, quā curuantur, minimis, & maxime collectis, veluti poples: quā extendun-
“ tur, simplicibus & latis, veluti patella, obuolui debent. quæ autē adiciuntur ad cōnuendum qui-
“ dem, quæ circa hæc sunt: ad suspendendum vero fasciam omnem, quā corpus quiescit, & quā ma-
“ gis cauum est, superimponenda, vt supra vel intra genu. Consentit autē cum capite humeri fascia
“ ad alteram alam demissa: cum inguine, ad alterum ilium: cum crure, super partē huius postero-
“ rem, quæ carnosā prominet, quibus autem sursum labitur, ab inferiori parte suspendenda est: qui-
“ bus deorsum, à superiori, vbi nihil tale est, quemadmodum in capite, quā maxime equale est, con-

Btineri fascia debet, & duci quā minime obliqua, vt postremo obuoluta, quā valētissime hæreat, vagos circuitus contineat. Oportet præterea deligātem ad ea respicere, quæ in vinculo requiruntur, cuius Hippocrates duas esse species testatur, vnam eius, quod iniicitur alteram eius, quod iniectum est, vtrobique autem summa cura enitendum est, dum vinculum iniicitur, vt celeriter, totocunde, prompte, eleganter, celeriter quidē, vt opus expediat: locunde, vt facile præstetur: prompte, vt vbiq; sit in promptu: eleganter, vt oculos delecet, cum iniectum est, vt recte, vt decore habeat, nihil q̄; ablit ex iis, quæ supra opus esse retulimus. De vsc autem vinculorū scire licet quædam ea de causa adhiberi, vt continendo curantibus præidiis subseruiant: alia non propter hoc, sed vt ipsa per se agant, quibus curatio committitur. in his maxime attendendum à qua parte fascia ordiatur, quā circūeat, quā desinat: quæ singula exquisitius conscribi non possunt, docere tamen viam licet per quam medicus facile iudicare de singularibus poterit, naturam singulariū partium perspicere, q̄; facile alligentur, suspendantur, collocentur: atque insuper quid vinculum valeat: efficit enim, vt quæ abscesserunt propellantur, hiantia coniungantur, peruersa dirigantur, atq; omnium cōtraria præstentur. Oportet autem, si quid abscessit, ita deuincire, vt quæ sublimia sunt, sedem contingant, hoc est locum, vnde recesserunt, at non premant: incipiendum vero à parte sa-


In lib. de iis q̄
i med. f. sect. 2.
c. 1. 7. ac 8. a

Cna, & quā vlcus est, finiendum, vt quod subest effundatur, & aliud vltra non coeat. Sed quæ abscedere volumus, contrario modo penitus alliganda sunt, atq; vbi in vnum adducere conuenit. verum vbi, quæ hiant, hoc est, quæ in exteriorem partem conuersa sunt, longe initio accepto cōiungenda sunt, in ceteris eodem modo vinciendum, tantum ab vltioribus aliquid adducendū erit, paulatim quæ comprimendum, primo minimum, deinde magis, maxime compressionis terminus sit, vbi se contingunt, aptantur quæ, sed non vrgent. verum in diducendis, quæ cōtracta sunt, si inflammatio est, super sedendum est: si ea non est, præparatione eadem vtendum, sed vinculo cōtrario, digerere item vbi peruersa oporteat, cetera fieri eadem debent: tum quæ recesserunt adducenda sunt, contraria autem contra. Hæc omnia medicum quasi leges tenentem obseruantem q̄; expedit id eligere, quod singulis vitiis idoneum est, minime quæ ad certos locos consilium dirigere. Nos, quanquam in vno quoque casu, quā primum ordiri vinculum oporteat, perfecte explicare difficile est: dum tamen fasciarum rationem indicabimus, vt res euidentior sit, locos statuemus, à quibus ordiri potissimum conueniat: medicus vero in agendo vbiq; illum eligeret, qui maxime in rem erit.

D Linteum scissum ad summum caput, & ei proximam regionem.

1.

Linteum iustæ magnitudinis scinditur in partes sex, & medium qua verticem complectitur, integrum relinquitur: ex partibus vero pendentibus mediæ findantur è regione aurium, ac sub mentum demissæ nodo inter se vinciantur. quo facto altera fasciola angusta media occipitio iniicitur, extrema q̄; ad frontem adducuntur, & à latere capitis nodum accipiunt: quatuor vero partiū, quas pendere sinebamus, hæc ratio est, posteriores prope nodum angustioris fasciolæ, priores supra occipitium inter se colligantur. licet item absque nodo, alijs subiectis, alijs superdatis, postremæ fibulam imponere.



Septima Classis.

I
PPPPPP

Linteum

Linteum scissum ad frontem, & partes, quæ iuxta sunt. II.

In quatuor partes scindere linteum oportet, medio intacto quæ fronti circumdetur: priores quæ partes super posteriores, quæ dependeant, ad occipitium dare, ibi quæ inter se deuincire: post hæc reliquas duas conuersas, in summo capite colligare, quæ sub mentum etiamnum demitti possunt, & ibi nodum accipere. Hoc vinculo ad occipitium quoque utimur partibus à latere capitis nodo inter se deligatis.

Linteum scissum ad totum caput. III.


Linteum scissum in partes octo, ita, ut medium integrum sit, donec tegere caput possit, toti capiti obuoluatur: tum ex pendentibus partibus, duæ iuxta aures fissæ sub mento inter se deligentur: è reliquis vero, binis à priori parte, quaternis à posteriori, duæ à posteriori extremitate super alias ducantur ad frontem, altera alteri subiecta, ut à superiori continetur: deinde priores duæ ferantur ad occipitiū, sic, ut æque alteri altera insidat, his comprehenduntur quæ prius fuerant circumdatæ: reliquæ duæ posteriores ad frontem attrahantur, altera similiter alteri subiecta, extremæ quæ à latere fibula iniiciantur. Hæc vincendi ratio efficit, ut caput sine nodis inuolutum defendatur à tædio, quod hic comprimendo asserre plurimum solent.

Cancer, siue Vinculum capitis siue Operculum scissum in partes octo, ad caput. IIII.

Mediū amplecti debet vniuersum caput, sic, ut quatuor partes à fronte recte dependeant, ab occipitio totidē: ex illis exteriores, ad occipitium porrecte inter se alligentur: ex his exteriores similiter fronti circumdatæ, à latere deligentur. tum ex reliquis, quæ in fronte scissæ partes sunt, ad occipitiū, quæ in occipitio, ad frontem attrahantur.

Operculum ex fascia lata trium capitum (σκεπάσρα dicitur) & ex altera, quæ hanc continet (κάτοχος vocatur) & tertia, quæ prohibet, ne totum vinculum diducatur, καθολκνὺς nominatur. V.

Pertinet ad obuoluendum vniuersum caput, dicitur autem παρασκεπάσρα. est quidē κάτοχος fascia longior, quæ in orbem faciei & capiti circumdatur, ut operculum comprehendat: sed καθολκνὺς ex fascia fit oblonga, adhibetur quæ eo nomine, ut diduci vinculum non sinat. quarum hæc ratio est. Linteum adhibetur sic latum, ut caput vniuersum cōplectatur, longius quàm ut duplicatum, hoc efficiat, cuius alterum caput occipitio datur, alterum à fronte dependet: tum angustior fascia sub mentum media iniicitur, & in vtranque partem per



Aper malas attrahitur inter frontem & verticem, inde sub mentum rursus demittitur: post hæc alterius angustioris fasciæ medium fronti iniicitur. capita q̄ in orbem ad occipitium porrecta, ibi & inter se, & cum alterius angustioris fasciæ capitibus alligantur: at quod a facie pendeat in longitudinem, vsq; dum ad supercilia ventum fuerit, diuiditur in duas partes, quæ in frõte altera super alterã insidente ad similitudinẽ literæ X in orbem ad occipitium ducuntur, atq; ibi deligantur. Potest autẽ vna fasciã dũtaxat longior, & operculum cõtinere, & prohibere, ne tota iunctura diducatur, ad hunc modũ, si media inter frontẽ & verticẽ ordiat. capita vero recta per malas sub mentum demissa, ibi q; altero sup alterũ excedẽte in similitudinẽ literæ X, sub imas aures ad occipitiũ dentur, vbi rursus in speciẽ literæ X inter se aduersa ad frontẽ ducantur, & nodo a latere deligentur.

Hactenus de simplicibus vinculis. Sequitur, vt de variis dicamus, si id antea ostẽderimus, q̄ fasciæ circuitum alius dicitur rectus, alius transtuersus, obliquus alius: quid autem hi tibi velint, nomina declarant: tũ alius *σεδαριας*, *μετωτιας* alius, *ταπειας* alius, alius *γυριας*: præter hæc aliud vinculum orbiculare, aliud in orbẽ *serpens* nuncupatur, aliud postremo *ascia*. Est autẽ *σεδαριας*, qui coronarum modo inter frontẽ & verticem tendit: *μετωτιας*, qui frontem ambit: *γυριας*, qui sub mẽto circũagitur: *ταπειας* similiter a malis p̄ quas ducitur, nomẽ habet: illa demũ vocat̃ *B* fasciã, quæ lunata figura ab vna parte summa est, ab altera gibba. Circuituum igitur istarũ nomina sunt.

Rhombus alter simplex, alter Hippocratis, de quo nunc.

V I.

Ap̃tissimum est vinculum hoc (vt quidam senserunt) ad suturas, vbi dehiscunt: vel (vt aliis placet) ad partium, quas vulnus diduxit, glutinationem, atque ad emittendum humorem, eo, quod comp̃mendi vulneris vim habeat, sic autẽ circũire debet. Fasciã a latere capitis orsa, obliqua ducenda est ad verticẽ atq; alterum tempus: deinde malis vtrinque circundanda, & oblique parti prius obuolutæ aduersa in modum literæ X ad occipitiũ demittenda: inde obliqua, sic, vt a priori circuitu distet, per malas porrigenda est ad alteras malas: ac rursus obliqua sursum danda, vt bis X literã repræsentet, quod q̄ in medio est rhombi figuram accipiat, quo factõ ad occipitiũ ferenda est, & fronti in orbẽ inicienda, eatenus autẽ circumagenda, vt quæ nuda sunt, includantur.

Semirhombus vel Lepus sine auribus.

V I I.

Huic, & illi, cui nomen est Tholus, in omnibus eadem vis est, ratio adhibẽdi huiusmodi est. Fasciẽ caput occipitiõ iniicimus, eam q; sub infimã auriculã oblique inter frontẽ & verticẽ ad occipitiũ ducimus: tum inter frõtem & verticem priori parti aduersam, ac sub infimã auriculam ad occipitiũ attrahimus. post hæc frontĩ circũagimus sic, vt quod mediũ est, semirhombi effigie referat. extrema vero fasciã, non modo in hoc, sed in aliis quoq; capitis vinculis, fibula a latere vincienda est. Possumus etiã, si ex vsu sit, fasciã circũducere, non ab inferiori parte sursum, sed contra.

Vinculum ad caluariam, vel Scapha, vel Tholus, seu Dioclis, seu Glaucy.

V I I I.

Maxime idoneum est, vbi summũ caput, & quod inter ipsum & frontem est, vincire cõuenit. hoc autem modo ipsum iniicies. Orsus ab occipitiõ fasciã recte per verticem ducas ad frõtem: ibi q; sinistrẽ manus digito indice continebis, & iuxta priorem partem rursus ad occipitiũ demittes: ab eo que tertio ad frontem porriges iuxta partem priorem, vbi ipsam obuolues per eum sinum, qui a digito tenebatur: postremo frontĩ circumages.

Thais Perigenis, quam aly ad Molpeam auctorem referunt.

I X.

Adhibetur eadem causa, qua Tholus, sed quandam præter vsũ elegãtiam habet. Vbi

Tholus vinculum superdatum fuerit, angustioris fasciolarũ caput, sub eius ambitum indatur, ea q; porrigatur obliqua ad summum caput, & inter ipsum & frontem, tum in fronte sub prioris fasciẽ sinum agatur, inde obliqua ad verticem, per id, quod inter ipsum & frontem est, ducatur, post hæc ad occipitiũ: dein sub infima auriculã dextra inter frontem & verticem, sub infima auriculã sinistra rursus ad occipitiũ reuertatur. Nos vero, vt fidelius contineatur, alium quoq; ambitũ per frontem adiicimus.



Thais alia sine auctore. X.

Tholo obuoluto, fasciola, quæ digiti latitudinem æquet, vel etiamnū angustior sit, orsa ab occipitio recta ad summū caput, et ad frontem, per id, quod inter ipsam & verticem est, adduci debet: ibi q̄ duplicata rursus ad occipitiū porrecta conuerti: atque inde per dexteram capitis partem ad verticē, & inter ipsum & frontē procedere: deinde ad sinistrum tempus demitti, quā duplicanda est, & per partē prius obuolutam, ad dextrā capitis attrahenda: inde similiter duplicata ad tempus: quod tertio fiat, vt tres sinus duplicatæ fasciæ cincturorum imaginem referant: sed postquam tertio ad dextram occipitiij partem ventum fuerit, fasciola ad sinistram partem conuertenda, vt æque in altero tempore conspiciatur: postremo, vt bene priores ambitus teneat, fronti circumagenda.



X



XI

Discrimen.

X I.

Ad eosdem pertinet ad quos Glaucij Tholus, iniicitur q̄ hoc modo. Fasciæ quod satis est, a facie dependeat, & reliqua eius pars ad summum caput, per id quod inter ipsum & frontem est, feratur: inde ad occipitium, ibi q̄ tradatur minitiro cōtinenda: post hæc cōuersa circa frontem datur: quo facto caput a facie pendens, per partem primo iniectam, recte ad verticem, per id, quod inter ipsum & frontem est, procedat: inde ad occipitium, ibi q̄ finiatur.

Scapha, seu Tholus Diocleus. XII.

Recte datur, vbicunq; cōiungere diducta necesse est, vel quod ob diutinū materiæ cursum ad oculos incisa cutis fuerit, vel q̄ frons alioquin vulnus acceperit. obuoluitur autē hoc modo. Fasciam ab occipitio orsam trahimus sub infima auricula dextra, vel sinistra, prout ab hac vel illa prius ducendam aestimabimus: inde ad tempus adiūctum, ab eo que transversam inter frontem & verticem, porrigimus ad alterū tempus: inde sub infima auricula ad occipitium, quā caput prius superiniecctum adstringimus: dein super aurē fronti circumdamus, sic, vt ambitus hic illi subiciatur, qui inter frontem & verticē procedit, ac vterq; e regione alterius, ab interiori parte sit resimus, tum quoties opus est, eodē modo circumagimus. Iniicitur & aliter per duos fasciæ ambitus, circa eam futuram, quæ ad aures per verticē tendit, sic, vt alter ambitus super futuram sit, alter infra, & vterq; ab interiori parte sit resimus: inferior autem sursum procedere debet, superior vero deorsum.


Thais sub incerto auctore. XIII.

Illis idonea est, quibus quod inter frontem & verticem est ac proximas partes, conuenit deuincire. eam sic admoueto. Vbi semirhombum inieceris, sic tamen, vt fasciā frontem nō complectatur, ipsam ab occipitio obliquam, ad verticem & frontem porrigito: ibi que cōuertito, facito que, vt circa frontem Lunæ figurā imitetur, & cornua sursum spectēt, ima parte sita inter supercilia: post hæc ab altera parte verticis ad occipitium ducito, sic q̄ circa frontem attrahito. huiusmodi vinculum præter eam, quam semirhombus affert utilitatem, est etiam aliquo modo speciosius.

Glaucij Vinculum superimpositum, vel additum. XIII.

Ad eosdem confert, ad quos vinculū ad caluariā, sed huic magis fidendum. Igitur, vbi vinculū ad caluariā adhibitum est, aliud superiniicito, cui nomen est Lepus sine auribus, ne longū faciam.

Regium



XIII



XIII

H

A Regium.

XV.

Idem efficit, quod Thais sub incerto auctore, nimirum, quod inter frontem & verticem est, ac proximas partes, deuincit. cuius hæc ratio est. Fasciæ quâ tum satis est dependere à facie finimus, quod quæ ex ea restat, inter frōtem & verticem recta ad occipitium trahimus: inde conuersam sub ima aure inter frontem & verticē oblique ad occipitiū: ab hoc oblique item ad id contrariæ partis, quod inter verticem & frontem est: tum per tempus, ac sub ima aure ad occipitiū ducimus: deinde caput, quod à facie pendeat, ad frontē attrahimus, ter quæ ibi replicamus, sic, vt sinus ad similitudinem graduum, se excedat: quos postremo cōprehendimus fasciā circa frontem obuoluta.

Capistrum, quod dimidiatum, vel ad alteram partem, dicunt. XVI.

Expeditissimum est, vbi maxillam seu vuleratam, seu prolapsam, seu ob distentionem oris aliumue morbum oportet ab altera parte vinciri. Fasciā ab occipitio orsa, obliqua per verticem, & inter ipsum & frontem per tempus ferri debet ad malas: idē sub mēto et ima aure alterius partis ad occipitiū: deinde sub imis auribus ac mento attracta eodem reuertitur, atque ad eandem rationem, quoties opus est, circuire. Tunc vero cōmodum ita circumdatur, cum à superiori parte deorsum deligandum est. Sin ab inferiori parte sursum, fasciā ab occipitio incipiat, & sub infimam auriculam, mentum quæ procedat: tum per malas ducatur: & obliqua inter frontē & verticem ad occipitiū, dein sub mentum circumagatur: postremo frontem ambiat.

Capistrum ad vtramque partem.

XVII.

Ad eos pertinet, quibus maxilla vel vtrinque suo loco mota est, vel alio quopiam tenetur, ex iis, quæ dicta sunt in capistro ad alteram partem. Fasciā occipitio primum iniecta, oblique per verticem & inter ipsum & frontem ad malas porrigitur, demissa quæ sub mentum maxillam & malas ab altera parte amplectitur: inde inter frontem & summum caput per partem prius iniectam in speciem literæ X ad occipitiū reuertitur: & sub imis auribus ac mento rursus ad occipitiū data, nouissime frontem complectitur.

Idem ab inferiori parte sursum. XVIII.

Ab occipitio ordiatur, & sub infimam auriculam ac sub mentum detur ad malas: inde oblique per summū caput ad occipitiū tendat, ab eo quæ sub infima auricula alterius partis, & sub mēto demittatur: tum ad malas: post hæc oblique inter frontem & verticem ad occipitiū ducatur, & fronti postea circumdetur.

Idem in vtramque partem ductum à superiori parte deorsum. XIX.

Mediā fasciā complecti occipitiū oportet, capitāque eius per verticem obliqua inter ipsum & frontem porrigere, sic, vt X literam representent: deinde per malas sub mentum, & sub imas aures ad occipitiū reuertitur: post hæc circa frontem obuolui, & ad occipitiū ad ducta sub mentum demitti: postremo ad occipitiū per frontem circuire.

Septima Classis.

PPPPPPP iij Idem



XV



XVI



XVI



XVII



XVIII



XIX

Idem aliter.

XX.

E

Media fasciā super frontē detur, capita q̄ eius ducantur ad occipitium, ibi q̄ figuram accipiant literæ X: post hæc sub imas aures ac mentum ad malas, inde inter frontem & verticem obliqua ad occipitium demittantur, tum sub mentum, nouissime per frontem circudentur.

Aliter.

XXI.

Fasciā media ab occipitio orsa, capita sub imas aures mentum q̄ attrahenda sunt, tum per malas: quod superest eodem modo obuoluendum, quemadmodum in ea, quæ proxime posita est.

Capistrum obliquum ad alteram partem, quo vincuntur quæ iuxta aurem sunt & maxillæ processum. XXII.

Ab occipitio initium sumat, & sub infimā auriculam ad tempus, atque inter frontem & verticem oblique ad occipitium, & circa frontem procedat, sæpius q̄ ad eandem rationem circumcat: quo modo procedere debet, cum ab inferiori parte sursum attrahitur. Sin expeditius sit à superiori parte deorsum, ita porrigitur: Incipiat ab occipitio, et oblique p̄ verticem, & inter ipsum & frontem ad tempus procedat, ab eo q̄ sub infimā aurem ad occipitium reuertatur, deinde frontem ambiat.

Quod alij Leporem sine auribus, alij Semirhombum vel Nauculam dicunt, ad vtranq; partem commodissime ad frontem, & ex parte etiam ad id quod inter ipsam & verticem est, adhibetur. XXIII.

Occipitio primum fasciam iniicimus, ab eo q̄ sub infimā auriculam ad tempus, & inter frontem & verticem adducimus, & obliquam ad occipitium demittimus: inde circa frontem iuxta angulum oculi tempori propiorem, & inter frontem & verticem oblique ad occipitium: inde oblique inter verticem & frontē, parti prius iniectæ aduersam sic, vt ibi X literam repræsentet: post hæc sub infimā auriculam ad occipitium, postremo circa frontem.

Idem in vtranque partem ductum à superiori parte deorsum. XXIII.


H

Media fasciā occipitium amplectitor, capita q̄ eius per verticem inter ipsum & frontē adducito, sic, vt ibi X literam repræsentent: inde sub imas aures ad occipitium, post hæc circa frontem attrahito.

Idem ab inferiori parte sursum. XXV.

Fasciā media ab occipitio orsa sub infimis auriculis in vtranq; partem ducitur ad angulos oculorum temporibus propiores, ab his inter frontem & verticē ad occipitium reuertitur, deinde frontem comprehendit. Quibusdam placet hanc sub mentū quoq; circūagi.

Vinculum



XX



XXI

F



XXII



XXIII

G



XXIII



XXV

A Vinculum à superiori parte iunctum.

XXVI.

Capistrum rectum ad utrâq; partem adhibemus, fasciam q; nō amplius sub mentū, sicut in illo, sed per medium nasum agimus ad occipitium, et super eam futuram attrahimus, quæ ad aures per verticem tendit.

Vinculum Glaucij valde iunctum.

XXVII.

Eadem ratione obuoluitur, atq; id, quod à superiori parte iunctum inscribitur, nisi quod fertur etiam sub mentum.

Perigenis Galea gladiatoria. XXVIII.

B Aptissima est, vbi caput ac malæ pluribus locis vulnus acceperūt. Capistrum obliquum ad utrâq; partē iniicitur: dein Glaucij scapha, post hæc rursum capistrū ad utrâque partem, non nulli vt vinculum hoc elegantius reddāt, id capitis ornamentū, quod *περαλῆς* appellant, parantes assuunt. Adhibetur item & alio modo sine obliquo capistro, & fascia per malas minime porrecta.

Galea aliter ad esum. XXIX.

Fasciæ quod satis est à fronte dependeat, reliqua ad occipitium recta ducatur, & eatenus obuoluatur, vt rectum capistrum efficiēs totas genas & caput complectatur. quo facto caput quod à fronte pendet, sursum conuertendum est, & recta per verticem ad occipitium attrahendum: ac, si placeat, sub imas quoque aures adducendum.

C Lepus auritus. XXX.

Sic appellāt semirhombum, vbi laqueus ille accedit, quem auriculas nuncupant, qui vel gladiatoribus decoris causa datur, vel vt caput contineat, vbi propter aliquem faciei affectum pertractare id oporteat. si decoris causa, auriculæ breues sint, & in medio frontis, nam sic animalis imaginem referūt: sin vt contineāt, in medio similiter, & magnæ, vt digiti in earum sinus coniecti, continere caput queant.

Alus ad tempora. XXXI.

D Hac ratione obuoluitur. ex altera parte fasciæ laqueus fit pastoralis, vel qui duos habens sinus nominatur (quos sæpius in libro de laqueis breuiter declarauimus) & fronti iniicitur: super quē deinde semirhombus, vel naucula circumligatur.

Simplex Oculus, vel Tenue Vinculum ocularium. XXXII.

Fasciam ab occipitio orsam ducimus per verticem inter ipsum & frontem, inter supercilia ad oculum, sic, vt ipsum contegat: inde sub infimam auriculam ad occipitium, postremo circa frontem.


Idem ab inferiori parte sursum. XXXIII.

Ab occipitio initium sumit, & per summum caput inter ipsum et frontem, inter supercilia ad oculū: tum sub infimam auriculam ad oculū, inter frontē & verticem agitur: post hæc ad occipitium, & circa frōtem.

Duplex



XXVI



XXVII



XXVIII



XXIX



XXX.



XXXI.



XXXII.



XXXIII

Duplex Oculus à superiori parte ductus.
X X X I I I I.

Orditur ab occipitio, & per summum caput, atque id, quod inter ipsum & frontem est inter supercilia fertur ad oculum: tum sub infimam auriculam alterius partis, ad alterum oculum, inter supercilia inter frontem & verticem ad occipitium: postea circa frontem.

Potest etiam, si ad rem magis pertineat, initio conuerti, & ab inferiori parte sursum circundari.

Duplex in vtranque partem ductus à superiori parte deorsum. X X X V.

Media fascia ab occipitio orsa, ducere capita oportet inter frontem et verticem, atq; inter supercilia, sic, ut ibi X literæ figuram accipiant: tum ad oculos, atq; inde sub imas aures ad occipitium & circa frontem.

Alter. X X X V I.

Media fascia ordiatur à fronte, capita ad occipitium dētur: inde ad modum literæ X similiter, atq; in superiori vinculo, pcedāt.

Oculus rectus ad alteram partem.
X X X V I I.

Orsi ab occipitio, fasciā per summum caput, & inter ipsum & frontē directā ad oculum ducimus: idē per eā partē, qua maxilla cum malis cōmittitur, sub mentū, et sub infimā auriculā ad occipitium et circa frontē.

Duplex ex eodem ductus. X X X V I I I.

Priusquam frontem comprehendat, ab occipitio ad alterum oculum trahi debet: tum recta, quā maxilla cum malis committitur, sub mentum, ab eo q; sub infimam auriculam ad occipitium & circa frontem.

Idē ab inferiori parte. X X X I X.

Fasciam ab occipitio orsam ducito sub infimam auriculam: ab ea q; sub mētum, & quā maxilla cum malis cōmittitur, ad oculum: inde inter frontem & verticem ad occipitium: post hęc sub infimam auriculam, sub mentum, quā maxilla cum malis ex altera parte committitur, ad oculum attrahito: tum inter supercilia super partem prius iniectam, ad modum literæ X inter frōtem & verticem ad occipitium porrigito: & circa frontem nouissime circundato.

Idē in vtranque partem ductus. X L.


Fascia media nō secus ac in ea, q̄ obliqua oculū vinciebat, occipitio iniiciat, capita q; à superiori



XXXIII



XXXIII



XXXV



XXXVI



XXXVII



XXXVIII



XXXIX




XI

A à superiori parte, vel inferiori attrahantur. potest etiamnum media fascia sub mento incipere.

Lintheum scissum ad nasum. XLI.

Fascia eatenus lata esse debet, vt nasum complectatur: longa vero, vt duplicata à naribus ad occipitium perueniat. Orsam igitur ab occipitio rectà, per verticem & inter ipsum & frontem ad medium nasum adducimus, & quod ex ipsa superest à facie sinimus dependere: quod rectum in duas partes scindimus, vsq; dum ventum sit ad superius labrum. quo facto alteram fasciolam mediā, ab imo naso orsam super eam, quæ scissa pendet à facie, in vtranque partem, sub imas aures ad occipitium ducimus, super partem primo iniectam, sic, vt ibi X literam representet, ministro'que tradimus: deinde partes scissas à facie conuertimus ab vtraque parte nasi inter supercilia, vt ibi literæ X similitudinem accipiant, ac per summum caput obliquas ad occipitium porrigimus, & cum priori capite iungimus: super quas deinde capita ministro contenta circa frontem attrahimus, sic, vt à latere nodo vel fibula inter se vinciantur.



XLI

Funda ad nasum ex quatuor capitibus. XLII.

Scindendum lintheum est in partes quatuor, medium q; integrum relinquendum, quæ vincire debet inium nasum. ex capitibus vero, quæ superiora sunt, pendere deorsum oportet: inferiora per genas primum ad angulos oculorum temporibus propiores procedere, inde inter frontem & verticem ad similitudinem X literæ inter se commissa à ministro contineri: reliqua duo sub imas aures ad occipitium demitti, ibi que literæ X similitudine accepta, circa frontem agi, & à latere inter se deligari, tum quæ à ministro tenebantur, in occipitio desinere.



XLII

Eadem ex tribus fasciis. XLIII.

Vna mediā inijcitur sub imo naso, capita q; eius per oculorum angulos temporibus propiores inter frōtem & verticem ducuntur, ibi q; aduersa ad imaginem literæ X à ministro continentur: altera mediā datur super imum nasum, & in vtranque partem ducitur ad occipitium, ibi que accipit nodum cum capitibus à ministro contēus: tertia orditur à fronte, & capiti circumdata à latere deligatur.



XLIII


XLIII

Eadem ex duabus. XLIIII.

Vna sub imo naso dari mediā debet, capita que eius per angulos oculorum temporibus propiores inter frontem & verticem porrigi, atque inter se aduersa in speciem literæ X ministro similiter tradi: altera mediā inijci super imum nasum, & capita eius ferri sub imas aures ad occipitium, & ibi X literæ similitudine accepta per frontem circumagi, & à latere deuinciri.

Nasus ex binis fasciis. XLV.

Vna super nasum in lōgitudinem detur, dimidia q̄ pars à fronte dependeat, reliqua per verticem recta ad occipitium porrigat: sed alterius medium dandum est sub imum nasum, capita vero sub infimas auriculas ad occipitium ferenda, vbi debent literæ X similitudinem accipere. post hæc prioris fasciæ quod à fronte pendet, sursum conuertendum, & super partem primo volutam recta per verticem ad occipitium demittendum. quo facto, capita quæ ibi literæ X figuram acceperant, id complexa, postquam fronti circumdata fuerint, finienda sunt.



E

Accipiter ad nasum ex tribus fasciis. XLVI.


Vna sub imo naso media incipit, cuius capita vtrinque iuxta nares inter supercilia ducuntur ad imaginem literæ X, inde ad summum caput atq; occipitium dantur, ibi q̄ continentur: altera media super imum nasum obuoluitur, capita q̄ eius sub infimas auriculas ad occipitium demittuntur, & ibi inter se, & cum capitibus, quæ continebantur, vinciuntur: tertia media à fronte orditur, & in vtranque partem circumacta à latere capitis finitur.

Idem ex binis fasciis. XLVII.

Prior fasciæ perinde atque altera circumagenda est, sed capita huius in occipitio ad literæ X similitudinem inter se aduersa vbi frontem complexa sunt, finiuntur: illius vero sub his comprehenduntur, vel ipsa quoque in occipitio in speciem literæ X inter se aduersa sub mentum adducuntur, ibi q̄ inter se alligantur.

Fascia glomerata ad idem. XLVIII.

Fasciæ pendere tantum à facie finito, quantum à naribus possit ad occipitium peruenire, reliquam eius partem recta per nasum, inter supercilia ad frontem & verticem trahito: inde per medium caput ad occipitium demittito, ibi q̄ conuersam sub infima auricula ad imum nasum attrahito super partem pendentem: inde sub infima auricula alterius partis ad occipitium ducito, ibi que contineto. post hæc caput, quod à facie pendebat, recta super partem priorem volutâ, ac occipitium dato, sic, vt à reliqua fasciâ comprehendatur: quam postremo circa frōtem adducito, & ad occipitium reuersam à latere capitis deuincito.



Funda. XLIX.

Orfa ab occipitio obliqua per verticem & inter ipsum & frontem tendit ad angulum oculi temporis propiorem: inde per genam ad imum nasum, ab eo que ad genam similiter alterius partis, oculi angulum temporis propiorem, inter frontem & verticem, ad summum caput fertur prioris parti aduersa. post hæc ad occipitium demittitur, et sub infimis auriculis porrecta ad occipitium reuertitur, nouissime que fronti obuoluitur.


Eadem aliter. L.

Fasciam occipitio primum iniicimus, deinde obliquam per verticem ad tempus atq; angulum oculi

A oculi tempori propiorem adducimus, ab eo q³ sub imum nasum, atq³ infimam auriculam rursus ad occipitium demittimus, ibi³ que conuertimus, & priori parti aduersam obliquam ducimus ad tempus, ac sub imum nasum ad infimam auriculam contrarie partis, post hæc ad occipitium, deinde sub infimam auriculam, sub imum nasum, ac sub imam auriculam alterius partis ad occipitiū, postremo circa frontem obuoluimus.

Amintæ Vallum. L I.

Orsi ab occipitio, fasciam oblique per verticem ducimus, atq³ inter ipsum & frontem inter supercilia: inde à latere iuxta angulum oculi, naribus propiorem, recta ad proximam narem: inde quæ maxilla cum malis cōmittitur, attrahimus: tum sub mentum demittimus, & sub infimam auriculā ad occipitium damus: ab eo³ que per verticem oblique inter ipsum & frontem, atque inter supercilia porrigimus, priori parti aduersam in speciem literæ X: post hæc à latere nasi, ex contraria parte, & qua maxilla cum malis committitur, sub mentum atq³ infimam auriculam alterius partis ad occipitium: inde fronti circundamus: post hæc sub infimam auriculam, per medium nasum, ad alteram infimam auriculam atq³ occipitium, præter hæc non nulli quoq³ mentum complectuntur. Adhibetur autem commodissime, vbi vel inter supercilia, vel medium nasum deligare opus est.




Phaleræ, seu Vallum. L II.

Ab occipitio inchoatur, & oblique per summum caput atque inter ipsum & frontem procedit inter supercilia: inde iuxta angulum oculi naso propiorem per genam sub imam aurem ad occipitium: ab eo³ que per contrariam partem, sic, vt inter supercilia literæ X figuram accipiat: tum oblique inter frontem & verticem, per verticem ipsum ad occipitium demittitur: deinde sub infimam auriculam, per medium nasum atq³ alteram infimam auriculam, item ad occipitium reuertitur: post hæc circa frontem agitur. Quidam, vt speciosius vinculum efficerent, per eam quoq³ futuram, quæ ad aures per verticem tendit, circuire voluerunt. Potest etiam, si res postulat, fascia duci in vtramque partem. Huic & superiori eadem vis est.

Menecratis Accipiter. L III.

Fascia primum occipitio detur, & recta per verticem inter supercilia tendat iuxta angulum oculi naso propiorem: & ab altera nare super imum nasum feratur iuxta alterum angulum naso propiorem, & inter supercilia, vt ibi similitudo literæ X fiat: post hæc recta iuxta partem prius volutam ad occipitium reuertatur: ibi³ que conuersa sub infimam auriculam, & super imum nasum, ac sub infimam auriculam alterius partis, itidem ad occipitium adducatur, & fronti nouissime circūdetur: quam agere etiam licet super eam futuram, quæ ad aures per verticem tendit. Non nulli, vt elegantius vinculum reddant, adijciunt semirhombum, cuius rationem supra indicauimus.



Amintæ Vallum ad nasum in alteram partem declinatum. L IIII.

Fasciam ab occipitio orsam recta ad summum caput adducito: deinde inter ipsum & frontem, atque inter supercilia ab altera nare sub imum nasum attrahito: inde sub imam auriculam alterius partis, & super imum nasum, ab eo³ que sub imam aurem ad occipitium obuoluit: inde circa frontem.

Hippocratis

Idem præstat, quod proxime positum. sic autem obuoluitur. membranula palmæ longior accipitur, cuius vnum caput glutine vel gummi illitum naso agglutinatur ab ea parte, in qua iacet: alterum sub imam aurem ad occipitium adducitur, ab eo que ad frontem, quæ similiter agglutinatur.

Ad aures linteam scissum in quatuor partes. LVI.

Medium auriculam complectatur: ex partibus vero scissis, quæ super auriculam sunt, ubi X literæ figurâ acceperint, vna per frontem, altera per summum caput, ad occipitium porrigantur: tum quæ per frontem procedebat, quæ X literæ similitudo est, attrahatur, quæ per verticem ad frontem ducatur, & à latere capitis ambæ inter se vinciantur: sed partes subiectæ aduersæ inter se procedant, & altera per posteriorem partem, altera sub mentum detur ad occipitium, ibi quæ nodum accipiant.

Auris ex fascia glomerata. LVII.

Fascia post laxam aurem prope occipitium orsa, per ipsam ferri debet, vt ex parte eandem includat: inde inter frontem & verticem attrahi non longe à fronte: tum per priorem partem prope alteram aurem ac sub mentum ad aurem affectam, deinde inter verticem & frontem ad posteriorem partem integræ auris, & sub mentum, atque infimam auriculam ad occipitium, inde circa frontem, ac rursus ad occipitium.

Alter. LVIII.


Occipitio primum inijcitur, & sub infimam aurem sanam inter frontem & verticem ad priorem partem affectæ auris porrigitur, atque inde sub mentum & sub infimam aurem ad occipitium, deinde oblique super aurem, post hæc circa frontem.

Linteam scissum in partes sex ad regionem iuxta aurem. LIX.

Medium super locum vinciendum inijcimus: ex partibus vero alijs à ceruice dependentibus, alijs super caput collocatis, eas, quæ à priori parte sunt, inter frontem & verticem nodo inter se deuincimus: medias vero in summo capite & inter se, & cum prioribus alligamus: posteriores ad occipitium adducimus, vt X literam referant, circa frontem agimus sic, vt à latere capitis finiantur.


Iunctura ad malas ex tribus fascijs. LX.

Vna media inter frontem & verticem inijciatur, capita que eius per malas sub mentum demittant, ab eo quæ per malas iuxta priores partes inter frontem & verticem procedant, ibi quæ inter se colligentur: quod si ocu-



LV

LVI




LVI




LVII



LVIII



LIX



LX



LXI

A los quoq; deuincire volueris, ducantur non iuxta priorem partem, sed per oculos, tum inter frontem & verticem data in speciem literæ X ad occipitium adducantur: altera fascia media inter frontem & verticem orsa in vtranque partem attrahatur iuxta oculorum angulos temporibus propiores, ad mentum, atque ibi nodum accipiat: tertia media medium nasum amplectatur, capita que eius sub infimis auriculis ad occipitium adducantur, ibi que X literæ similitudine accepta per frontem circumeant, & nodo à latere capitis vinciantur.

Longa ad frontem & regionem, quæ inter supercilia est ex fascia glomerata. LXI.

Dari primo super occipitium debet, post hæc recta duci ad frontem & inter supercilia, deinde ad occipitium reuerti, & postremo per frontem circumagi.

Funda ad labrum inferius scissa in partes quatuor. LXII.

Medium, quod integrum est, iniicito B super labrū inferius: superiores vero partes ad mentum adducito, atq; inde ad occipitium, ibi que in speciem literæ X altera super alteram excedente, ad summum caput, & inter ipsum & frontem attrahito, ministro que tradito. reliquas vero binas partes sub infimis auriculis ad occipitium porrigito, atq; ad formam literæ X ad frontem attrahito, & has, & quæ à ministro continebantur, inter se deuincito.

Eadem ad labrum superius. LXIII.

Media superius labrum complectitor: inferiores partes iuxta angulos oculorum C tēporibus propiores adducito inter frontem & verticem, vt ibi X literæ figuram accipiāt, inde ad occipitium demittito: reliquas duas partes sub infimas auriculas ad occipitiū attrahito, ibi q; inter se aduersas circa frontem agito, & inter se deuincito.

Fascia glomerata ad labrum inferius. LXIII.

Orditur ab occipitio, & sub infima auricula fertur ad labrum inferius. ac sub infima auricula reuertitur ad occipitium.

Eadem in vtranque partem ducta. LXV.

D Media labrum complectitur, capita q; eius sub imas aures ad occipitium attrahuntur, & fronti circundantur.


Alia. LXVI.

Incipimus ab occipitio, et sub infimam auriculam ad labrum fasciam ducimus, ab eo q; sub infimam auriculam ex altera parte ad occipitium, inde per verticem obliquam, & inter ipsum & frōtem ad tempus porrigimus, ab eo que per malas sub mentum ad malas ex altera parte, deinde inter frontem & verucem in speciem literæ X inde ad occipitium, postremo circa frontem.

Ad labrum superius. LXVII.

Ab occipitio ordiatur, & obliqua detur inter verticem & frontem iuxta oculi angulum temporibus propiorem ad labrum superius, ab eo que ad alterum tempus, atque oculi angulum ipsi propiorem, tum inter frontem & verticem super partem prius iniectam ad imaginem literæ X, inde ad occipitium & circa frontem.

Eadem



Media superius labrum complectere, capita q̄ iuxta tempora oculorum que angulos temporibus propiores porrigere, inde inter frontem & verticem, ut ibi X literam referant, tum ad occipitium, post hæc per frontem, rursus ad occipitium.

Funda scissa in partes quatuor ad occipitium LXIX.

Media occipitium comprehendit: ex partibus vero, quæ subiectæ sunt, per malas atque angulos oculorum temporibus propiores inter frontem & verticem feruntur, ibi que inter se deligantur: reliquæ sub infimas auriculas ad occipitium ducuntur, ubi ad modum literæ X altera super alteram excedit. quod si breuiiores fuerint, in occipitio cum prioribus aptantur, si longiores, ad frontem adducuntur. *

Cum de vinculis tam simplicibus, quam compositis, quæ faciei & capiti cōueniunt, abunde dixerimus, proximum est, ut ad reliqua pergamus.

Iunctura ad mentum EX SORANO. LXX.

Fasciam ab utroque capite scindentes, sic, ut medium, quo mentum comprehenditur, intactum relinquatur, inferiores quidem partes, recta per malas inter frontem & verticem porrigimus: superiores per mentum transversas ad occipitium attrahimus, nodo q̄ inter se alligamus: prodest autē quibus deinceps mentum conuenit.

Spica Glancij. Nunc GALENVS LXXI.

Nomen inuenit à spica, quam suo ambitu imitatur. maxime autem proficit, ubi iugulum fractum est, aut humerus excidit. eius ratio est: Hapsus lanæ mollis ab ea parte, quæ vincienda est, alæ subijcitur, donec id cauum compleat: post hæc fascia glomerata, quæ longitudinem & latitudinem habeat proportionem eius, quod alligatur, ab altera ala incipiens obliqua per dorsum tendit, quæ iugulum cum lato scapularum osse committitur: inde sub ala affecti humeri ad eam partem reuertitur, quæ iugulū cum lato scapularum osse cōmittitur, ita, ut ibi X litera repræsentet: deinceps obliqua per pectus procedit ad alam integræ partis: inde per dorsum obliqua ad iugulum, ita, ut parti prius obuolutæ aliquantulum insidat: ab eo que sub ala iterum datur ad iugulum, sic, ut secundo similitudo X literæ fiat: postremo ad alam integræ partis, atque ad eandem rationem, circumagitur.

Eadem media primum iniecta. LXXII.

Adhibita spica brachium figurandum est ad angulum rectum, atque altera fascia media inuoluendum, cuius capita recta ducenda sunt, quæ iugulum cum lato scapularum osse committitur, atque ibi in speciem literæ X aduersa inter se ad alam integræ partis attrahenda: post hæc per latera atque affectum humerum circumdanda catenus, ut omnia includantur, & sub ala sanæ partis finienda.


Eadem



LXVIII


LXX

F



LXX

G



LXXI

LXXII

H

A Eadem in vtramque partem ducta.
LXXIII.

Media alam affecti humeri complectitur, & in vtramque partem ducta, qua iugulum cum lato scapularum osse committitur, X literę figuram accipit: inde oblique pars vna per dorsum, altera per pectus procedit ad alteram alam, atque ad hunc modum, quoties opus fuerit voluta, finitur.

Geranis (ita enim appellatur à gruvis similitudine)
Hippocratis, siue (vt alyis placet) *Perigenis*. LXXIII.

B Iisdem conuenit, quibus spica. in hunc autem modum obuoluitur. Vbi spicam iniecerimus, semel circa humerū dari fascia debet: inde ad iugulum procedere: tum oblique ad alteram alam, atque ibi desinere.

Funda humerum complectens, quæ idem præstat atq; Geranis. LXXV.

Spicam adhiberi prius conuenit: tum ab ea parte quæ iugulum cū lato scapularum osse cōmittitur, fasciam semel recta ferri ad brachium, quod ad angulum rectum figuratum sit: atq; inde rursus ad eā partem, qua iugulū cum lato scapularum osse cōmittitur, deinde ad alam integrę partis: post hæc humero & lateribus circūdari, & sub ala nodum accipere.

Eadem aliter. LXXVI.

Media vitiati humeri caput amplectatur, capita q; eius recta ducantur ad brachium in vicinia cubiti: et rursus iuxta partes prius iniectas, quæ iugulum cum lato scapularum osse coniungitur: inde ad alam integrę partis, post hæc in orbem.

Aliter. LXXVII.

Media circundanda est alę integrę partis, capita q; eius in orbē ad latera atq; humerum attrahenda: tum sub ala integrę partis iterum demittēda: inde obliqua ducēda sunt ad eum vitiatę partis locum, vbi iugulum cum lato scapularum osse cōmittitur: deinde recta per humerum ad cubitum: ab eo q; rursus ad eam partem, qua iugulum cum lato scapularum osse cōmittitur: inde ad alam integrę partis, postremo in orbem circa humerum.




Spica duplex, quam alij Quadrigam dicunt.
LXXVIII.

Commodissime iniicitur, cum vtrumque humeri caput male habet. eius ratio hæc est. Vbi spica simplex data fuerit, fasciam sub alam vincti humeri demittentes obliquam ducimus ad alterum humerum, atq; ad eam partem, qua iugulum cum lato scapularum osse committitur, sic, vt ibi X literam referat: deinde ad alteram alam, atque ad eandem rationem circumagimus.

Septima Classis.


QQQQQQQQ

Caraphracta.



Cataphracta. LXXIX.

Nomen habuit à similitudine thoracis Romani, quem cataphractam dicunt. Prodest autem quibus deligare iuxta iugulum conuenit latum os scapularum, pectus, dorsum aut latera. quod vinculi aliqua ex parte duplicem spicam representat. sic autem obuoluitur. Ale primo circumdatur, tum oblique per pectus ducitur prope illam regionem, vbi iugulum cum osse pectoris comittitur: inde per ceruices ad latum scapularum os humeri contrarij atq; ad alam subiectam, ab ea q; ad ceruices super partem prius iniectam, ita, vt prope ceruices similitudo X literæ fiat: post hæc obliqua datur ad latum scapularum os ex altera parte, atque ad alam: ab ala ad ceruices, vt in vertebra colli X literæ figuram accipiat: deinceps sub ala & oblique prope eam regionem, vbi iugulum cum osse pectoris committitur, sic, vt hic quoque similitudo X literæ fiat, & iuxta ceruices, & super latum scapularum os, & sub ala, vt quater X literam representet, nimirum semel à priore parte, semel à posteriori, his prope iugulum. Ad eandem autem rationem quoties opus est, circuit: deinde in orbem attrahitur circa pectus & latera sic, vt tota iunctura thoracem referat.



LXXIX


LXXX

Eadem in vtramque partem ducta. LXXX.

Sub ala dari mediam fasciam oportet, & in vtramq; partem ferri ad proximum iugulum, sic, vt prope ceruices X literam referat: deinde oblique porrigi ad contrariam alam, ab ea q; ad proximum iugulum, vt ibi prope ceruices fiat similitudo literæ X: inde ad alteram alam oblique, postremo in orbem circa pectus.

Subtrati Vinculum rectum ad alam & pectus. LXXXI.

Maxime conuenit, vbi medium pectus, vel dorsum, aut latera, seu thoracem volumus deuincire. Duas igitur fasciolas iuxta longitudinis humerorum capitibus iniicimus, earum q; capita recta sinimus dependere: deinceps fascia glomerata thoracem totum obuoluimus & latera, vt contegantur, extremam q; fasciam nodo alligamus: capita vero, quæ & à priori & à posteriori parte pendeant, fasciæ circuitibus assuimus, ac, si longiora fuerint, sursum conuersa, qua iugulum cum lato scapularum osse comittitur, inter se colligamus.



LXXXI

LXXXII


Vinculum in speciem literæ X ad alam & pectus. LXXXIII.

Quas proxime posui fasciolas, non rectæ, sed oblique dependeant, ita, vt tam à pectore, quam à dorso similitudo X literæ fiat. cætera eadem fieri debent, quæ, vbi rectæ adhibentur.

Amictus Thorax. LXXXIII.

Huic & vinculo, quod ad alam posui, eadē vis est. sic autem fasciatur. Imposita cataphracta ad vtramque partē ducta, vbi fascia eatenus circuierit, vt vsq; ad vmbilicum complexa omnia fuerit, capita inter se vinciri debent, sic, vt lupus laqueus fiat: quod q; ex his vltra laqueū relinquitur, ad ilia vtrinq; adductū prioribus circuitibus inseritur, sic, vt extremum pēdeat, quod quatuor digitorū longitudinem æquet: quo fit, vt thoracis fimbrias representet.

Thorax ad idem X literam representans. LXXXIII.



LXXXIII

LXXXIII

Fasciam ilibus primum à dextra parte iniicito, & oblique per latus & medium pectus trahito ad humeri caput: ab eo q; ad alam atq; iterum ad humeri caput super partem priorem ad effigiem X literæ: post oblique per dorsum ad ilia super caput primo iniectum, deinceps per ventrem ad ilia sinistræ partis in orbem circumducito:

A circumducito: deinde per dorsum priori parti aduersam, sic, vt ibi eiusdem literæ similitudinem habeat, ad caput humeri dextrum: post hæc sub alam demittito, & rursus ad caput humeri circumagito, sic, vt ibi similitudo X literæ fiat: post hæc per medium pectus ac latus oblique ad ilia sinistrae partis, nouissime in orbem circumdato, atq; ad eandem rationem voluito, dum quæ liganda sunt, omnia includantur.

Stella. LXXXV.


Adhibito vinculo, cui nomen est thorax X literam representans, debet angustior fasciola dari in orbem semel aut iterum circa pectus & dorsum, & extremo capite fibula deuinciri.

Geranis in speciem fiscelle. LXXXVI.

Idem potest, quod cataphracta. eius autem ratio est. A dorso incipit, & oblique per scapulas ad eam partem procedit, vbi iugulum cum lato scapularum osse committitur: inde sub ala demissa eodem reuertitur, vt similitudinem B X literæ super eandem commissuram accipiat: post hæc obliqua per māmam ad vmbilicum, ibi q; conuersa oblique trahitur ad alteram māmam, atq; ad eam partem, vbi iugulum cum lato scapularum osse committitur, vt ibi literæ X figuram accipiat: deinde per dorsum demittitur, & in orbem datur circa latera, atq; ad eandem rationem circuit.



LXXXVI




LXXXVII

Stella à posteriori parte se ostendens. LXXXVII.


Vtiliter adhibetur, quibus deuincire dorsum oportet, sic autem circumdatur. Ab ilibus orsa putra sinistrae partis, per dorsum tendat ad caput humeri dextri: inde ad alam, ab ea q; per latum scapularum os sinistrae partis ad alam atq; humeri caput: dehinc oblique per dorsum feratur priori parti aduersa: post hæc semel aut iterum in orbem circa ilia detur, eo que ambitu extrema pars contineatur. Eandem quoque sic circumagere licet, vt à priori parte oculis exponatur: id quod fit, C vbi non à priori parte, sed à posteriori æque circumeat.

Vinculum, quod à fulmine Κεραιώϊος appellatur. LXXXVIII.

Idem efficit, atq; illud, quod proxime positum est. Fasciam iuste longitudinis atq; latitudinis mediam in longitudinem scindimus, dum recipere caput possit: ex capitibus vero vnum à ventre, alterum à dorso, patimur dependere: post hæc imponimus id vinculi, cui nomen est Thorax X literæ representans, ima q; capita prioris fasciæ scissa in plures partes pēdere sinimus.



LXXXVIII



Simplex Vinculum ad ceruicem. LXXXIX.


D

Commodissimum est, vbi res poscit alterā ceruicem partem alligari. Incipit autem à medio latere, & per dorsum fertur ad ceruicem & pectus, & post hæc ad latus super caput primo iniectum, deinde per thoracem in orbem.


Duplex. XC.

Fascia primum alæ circumdari debet, tum oblique per dorsum ad ceruicem procedere: inde ad pectus, et alam, atq; alteram alam: post hæc oblique per pectus ad ceruicem ita, vt ibi X literam representet: deinde oblique per dorsum ad alam: ac postremo in orbem circumagi, atq; ad eandem rationem circuire.

Septima Classis.



LXXXIX



XC

QQQQQQQ ij

Cuspsis

Binæ fasciolæ, quæ & longitudinem convenientem habeant, & duorum digitorum latitudinem non excedant, mediæ humerorum capita complexæ dependent, & tam à dorso, quàm ab umbilico X literæ figuram accipiunt: post hæc fibula inter se iunguntur: quo facto obuoluitur geranis in speciem fiscellæ.

Rhombus simplex. XCII.

Iisdem prodest, quibus proxime adscripta. conficitur autem ex duplici vinculo ad ceruices, & ex geranide, ante dictis.

Rhombus duplex ad idem. XCIII.

Fascia ab ilibus orsa obliqua per iugulum fertur ad latum scapularum os: inde ad alam, ab ea q̄ ad iugulum, ita, vt quæ iugulum cum lato scapularum osse committitur, referat similitudinem literæ X: post hæc trāsuersa per col lum ad alterum iugulum: tum sub ala demittitur, atque ad idem iugulum reuertitur, vt ibi quoque similitudo X literæ fiat: inde obliqua per mammam porrigitur ad ilia cōtrariæ partis, sic, vt in pectore eandem literā referat: postea in orbem circa ilia fertur, & obliqua per dorsum tēdit, quæ iugulum cum lato scapularum osse committitur: inde ad alam demissa eodem reuertitur: tum tranſuerſa per priorem partem, quæ iugulum cum osse pectoris, & quæ cum lato scapularum osse committitur, & obliqua per dorsum ad ilia, postremo in orbem. Cum hoc etiam imponitur, vel duplex geranis, vel simplex vinculum ad ceruicem, vel etiam duplex.

Sostrati Κεραύνιος. XCIII.

Proficit vbi medium pectus & dorsum deligandum est. sic autem obuoluitur. Duo iniici vincula oportet, & quod cuspis, & quod stella nuncupatur: tantummodo capita, quæ in stella per fibulam inter se iungebantur, ad ilia adducta dependent.

Apollonij iunioris Ημικεραύνιος. XCV.

Fasciolas, quas in cuspide adhibuimus, ad humerorum capita damus, tum duplex vinculum ad ceruices iniicimus, deinde geranida in speciem fiscellæ.

Sostrati parua Ara. XCVI.

Speciosa est, siquidem obuoluta paruæ aræ angulos representat. Primum deligetur vinculum ad ceruices, deinde geranis in speciem fiscellæ, quo facto adiicitur vinculum Sostrati ad pectus, cum fasciolis suspendentibus.

Eiusdem paruum Templum. XCVII.


Hoc etiam & decorum est, & idem proficit. Recto vinculo Sostrati imposito illud iniiciendum est, quod quadriga nominatur.

Apollonij Thirij paruum Templum. XCVIII.

Binæ fasciolæ super dorsum dantur, quemadmodum in vinculo recto Sostrati ad pectus, postea simplex rhombus circumagitur.


Geranis in speciem fiscellæ in priori parte se ostendens. XCIX.

A latere orsa obliqua per pectus eò ducenda est, vbi iugulum cum lato scapularum osse committitur,



XCI

XCII



XCIII

XCIX

Amittitur, inde sub alam: ab hac eodem reuerſa per collum tranſuerſa ducenda eſt ad commiſſuram iuguli alterius partis cum lato ſcapularum oſſe: deinde ſub ala à priori parte verſus poſteriorem ad eandem commiſſuram porrigenda: inde obliqua per pectus, & poſtremo in orbem circa ilia. Idem quoque vinculum à poſteriori parte ſe oſtendet, ſi circuitus, qui à priori parte fuerant, in poſteriori colloceamus, & eos qui à poſteriori, in priori.

Auriga. C.

Valet ad latera deliganda, atq; ad hunc modum iniicitur. Media fascia collum comprehendimus, capita que obliqua per pectus attrahimus: ibi que inter ſe implicata ſub alas adducimus ad dorſum, vbi rurfus implicamus: **B**atq; ita, donec totum thoracem deligauerint, modo à poſteriori, modo à priori parte iplicamus, extrema q; inter ſe deuincimus. quo vinculo vtuntur aurigæ ad latera continenda.

Expoſitis faſcijs, quæ thoraci accommodantur, proximum eſt, vt ad reliquas pergamus.

ET HELIODORO

Aſſuta faſcia ad mammam.
C I.

C Faſciam, cuius lōgitudō ac latitudo ſit proportione hominis, duplicamus: tum initio factō à medio eius partis, quæ duplicatur, ſuimus deorſum oblique tēdentes: deinceps omne id, quod ſuper futuram eſt, excidimus, vt pilei modo ſinus fiat, qui mammam, & quod ſuper iniectum eſt, capiat. vtrunq; huius faſciæ caput in duos ſcindimus: deinde ab altera parte ſinus, quæ contra futuram eſt, & veluti labrum lintei, faſciolam latam circiter digitos duos à latere ſuimus ſic, vt alterum caput longius ſit, breuius alterum: quæ faſciola cingulus dicitur. vinciendi ratio eſt. Sinus datur ad māmam, vt ipſam comprehendat: longius vero cinguli caput per dorſum attrahitur ad integram mammam, & cum breuiori nodum accipit. ex capitibus ſciſſis priora duo ſurſum ferūtur ad ceruices, ita, vt dexteriori ſiniſtrum, ſiniſteriori dextrum procedat, pendere que ſinatur, quibus cum reliqua duo capita colligantur.

D

Glomerata faſcia ad mammam. **C II.**

Longioris faſciæ, quæ tantum latitudinis habeat, quantum vſus requirit, caput in duas partes ſciſſum detur iuxta integram mammam: faſcia vero per dorſum oblique ad viciatam mammam procedat, ab ea q; ad alteram, poſt hæc ſuper dorſum: inde ad affectam mammam à ſuperiori parte deorſum porrigatur, vt inter vtrāq; mammam **X** literæ figuram accipiat: ſæpius q; ad eandem rationem circumeat, dum quæ nuda ſunt, omnia contegantur. extrema vero faſcia ſcindatur, tum ſciſſæ partes inter ſe vinciuntur altero nodo ſub integra mamma, altero ſupra collocato.

EX SORANO


Duplex in vtranque partem ducta, à ſuperiori parte deorſum. **C III.**

Mediæ faſciæ, quæ pectori tranſuerſa circundetur, altera aſſuitur, donec vtranque mamillam pertranſierit: hæc capitibus ſuis recta ad collum datis ex eo ſuſpenditur, illa per dorſum procedit: vtriuſque capita inter ſe vinciuntur, vt deligandis mammis accommodentur.

Septima Claſſis.

QQQQQQQ iij

Vinculum



Vinculum Suspendens sex habens capita.

CIIII.

Suspendenti vinculo quatuor capitum circa mediam futuram, alia fascia trāsuersa affuitur, cuius capita, vbi (vt dictum est deligauerimus, in dorso inter se vinciuntur, ne aut resolui vinculum possit, aut rugosum fieri. Habet autem eundem vsum, quem proxime traditum.

Nunc GALENVS

Iunctura Ad alterum Inguen. CV.

Expediitissima est, vbi alligare inguen oportet. inijcitur autem hoc modo. Fascia ab ilibus orsa oblique per clunes ferri debet à parte inguinis vitiati inter anum & naturale, post hæc sursum procedere ad inguen: tum in orbē per coxam ad ilia super partem prius iniectam, & ab inferiori parte sursum adduci.

Ad Vtrunque Inguen. CVI.

Abdomini fasciæ caput inijcitur, eam q̄ oblique per coxam inter anum & naturale attrahito ad inguē ab inferiori parte sursum: deinde iuxta caput primo iniectum ad coxam, atque inter anum & naturale ad alterum inguen ab inferiori parte sursum: post hæc infra vmbilicum: sic q̄ circumagito, dum inguen vtrunq; includatur.

Eadem in Vtrunq; partem ducta. CVII.

Media fasciæ incipit ab inguine, capita que eius ad coxā data literæ X figuram accipiunt, & vnum ad inguen, alterum ab exteriori parte procedit: deinde ambo in vnum adducuntur, atq; ad eandem rationem circumeunt.

Aliter ad Alterum Inguen. CVIII.





Vnū fasciæ caput, quod breuius sit, nec duorum vel trium cubitorum longitudinem excedat, ab inguine dependeat: alterū vero glomeratum, per ilia ad coxam detur atq; abdomen: inde oblique ad coxam & inguen circūagatur ab inferiori parte sursum, tum ad ilia & coxā, ac per ilia cōtrariæ partis ad abdomen: tunc q̄ caput dependens ad inguen sursum conuertat sic, vt ibi sinus fiat, qui altero capite, quod glomeratum est, comprehendatur. post hæc rursus quod glomeratū est, per inguen & coxam ducatur ad abdomē: rursus q̄ primū caput duplicetur à superiori parte deorsum, & eo, quod glomeratum est, comprehendatur: ac dum fasciæ desinat, alterum quidem duplicetur, alterū superdetur: nouissime fibula imponatur.

Aliter ad Vtrunque. CIX.

Fasciola media lumbos complectimur, capita q̄ eius ab inguine non secus q̄ in iunctura ad alterum inguē sinimus dependere: tum alteram fasciā à ventre orsam, quēadmodum in iunctura, ad vtrunq; inguen circundamus, capita vero, quæ pendebant, quemadmodum in simplici dictum est, duplicamus.

Pecten seu Vinculum Suspendens ad Colem. CX.

Fasciola media lumbis inijcienda est, capita q̄ eius super ventrem adducta nodo inter se vincienda: tum alterius fasciæ glomeratæ caput zonæ inferendum: reliqua pars ad colem data in zonam



A nam rursus à superiori parte deorsum coniicienda, post hæc sub colem & ad zonam: postremo te-
sticulos complexa, in zonam demittenda est.

Aliter. CXI.

Iniecta zona fasciæ caput super colem im-
ponatur, ea q̄ circa ipsum in orbem detur, do-
nec totū includat: deinceps ad zonā feratur,
ab ea q̄ ad colē, atq; inde rursus ad zonam: no-
uissime testiculos amplexa, in zonā demittat.

Idem ex fascia scissa ac zona. CXII.

Linteū iustæ magnitudinis scindito in par-
tes quatuor sic, vt medium integrū relinqua-
tur, quo colem excipito: tum ab altero capite
scissas partes in vicinā colis findito: in quæ fif-
sa coniuncto partes alterius capitis, cingulo q̄
inserito, & nodo alligato.

B *EX HELIODORO*

*Vinculum ad alterum inguen, quod non nulli
dixerunt Cancrū pro inguine. CXIII.*

Fascia ab ilibus contrariæ partis incipiens
obliqua fertur ad lumbos, deinde ad inguen,
quod vinciri debet, ab eo q̄ ad summam coxā
porrigitur. post hæc ad idem inguen reuerſa
datur ad regionem, quæ sub vmbilico est, vt
X literæ figuram accipiat, ab ea q̄ ad ilia alte-
rius partis: sic q̄ circumagitur, donec, quæ nuda
sunt, omnia cōplectatur: tunc q̄ vtiliter semel
in orbē ambit circa lūbos, et infra vmbilicū.
Prodest autē, quibus deuincire inguē oportet.

Ad vtrūque inguen. CXIIII.

Vbi vinculum adhibuerimus ad alterum
Cinguen, omisso circuitu in orbem, in vinculo
ad vtrūq; inguen, fasciam à lumbis attrahi-
mus ad alterum inguē: deinceps ad summam
coxā, ab ea q̄ ad idem inguē, vt in altero si-
militudo X literæ fiat: deinde ad lumbos ad-
ducimus: post hæc eatenus hac ratione obuol-
uimus, vt quæ nuda sunt, includamus. Valet
ad vtrāq; inguina deliganda, neq; ab re est vl-
tra propositos circuitus, in orbem quoque fa-
sciam circumagere.

Iunctura ad inguen tuendum. CXV.

Fasciæ glomeratæ, à capite duodecim inter-
positis digitis fasciolam assuere duorum cubi-
torum oportet, eo q̄ capite super ilia contra-
riæ partis injecto, fasciolam rectam à poste-
riori parte per lumbos & clunes demittere in-
ter anū & naturale, obuolutam q̄ inguinī vi-
tiato sursum porrigere: deinde glomeratā fa-
sciam bis, ter ue circumagere, per quem ambi-
tū fasciola attrahitur quasi per nodum. vbi
vero huiusmodi circuitibus in orbem inguen
adstrictum est, fasciola ad summam coxā por-
rigitur, ab ea q̄ ad idem inguen, et ad eā regio-
nem, quæ sub vmbilico est. quo facto ex fascia
glomerata vinculum fit ad alterum inguen,
nodum q̄ accipit sub vmbilico. Pertinet autē
hoc vinculum ad eos, quibus propter varices,
qui inguē implent, manus curatio admouet.


Assuta iunctura ad anum. CXVI.

Fascia sumi debet eatenus longa, ac lata, vt huic iuncturæ sufficiat: cui ab vno capite altera va-
lentior fascia, lata circiter digitos tres, trāuersa assuenda est, hæc zonæ nomen inuenit: tum eidem


Septima Classis.

QQQQQQQ iij

fasciæ



CXII




CXIII

CXIIII



CXV

CXVI



CXVI

CXVII

fasciæ intervallo puta nouem digitorum alia fasciā trāsuersa, perinde lata vt zona, similiter assuen-
da est, cuius partes vtrinque adiuncta crura nuncupantur: alterum vero caput rectæ fasciæ, quod
contra futuram est, scindendum in duo crura. Homo igitur explicata zona cingatur, recta vero fa-
sciā per lumbos procedat ad anum atq; inter ipsum & naturale, eius q; crura ad inguina ducta zo-
næ inferantur: post hæc adiuncta crura arctata in zonam demittantur atque ibi cum cruribus al-
ligentur. Quod vinculū sine adiunctis cruribus nō nulli ad caculosos, vbi calculus euulsus esset,
adhibuere: id nos ob nodorum inæqualitatem reiicimus, ne pars vmbilico subiecta vrgeatur, ve-
sica. n. inæqualiter compressa inflammationi obnoxia est. Deligamus aut, quibus calculus euulsus
est, parua fasciā, quā proxime ad inguen proposuimus: sed nunc breuiorem rectam fasciolā assui-
mus, extremam q; scindimus in duas partes. hæc aut iunctura illis longe cōmodior est, q; quæ ani-
causa iniicitur, siquidem glomerata fasciā in orbem voluta lūbos & omne id, quod sub vmbilico
est, tegit, extrema que sub vmbilico prioribus circuitibus assuitur. ex recta vero fasciā quod inte-
grum est, ad anum & inter ipsum & naturale demittitur, partes vero scissæ ad inguina attractæ in
prioribus circuitibus immittuntur: quæ vincendi ratio, calculosis, vbi secti sunt, aptissima est.

Scissum vinculū ad scrotum. CXVII.

Linteum pro hac ipsa iunctura longum la-
tum ue, ab vtroq; capite in quatuor parteis diui-
ditur, sic, vt ab vno breuiores sint, ab altero lon-
giores: deinde à medio versus breuiores excidi-
tur, donec, vbi vsus requiritur, coles eo cauo exci-
piatur. zonam ergo iniicere primum homini
oportet, tūc q; ex breuioribus partibus linteī me-
dias duas in zonā demissas, inter se deuincire, &
reliquas duas in eandem zonam coniectas pati
dependere. quo facto coles per id cauum excipi
debet, scrotum q; totum cōprehendi integro lin-
teo: ex cuius partibus longioribus, duæ exte-
rioris scroto inuoluendæ sunt, ita, vt dextra siniste-
riori, dexteriori sinistra pcedat: deinceps in zo-
nam demissæ eo modo, quo priores permittēde
sunt pēdere. reliquæ duæ mediæ scroto similiter
iniectæ, vt dextra sinisteriori, dexteriori sinistra
procedat, per summas coxas in eandem zonam
demittendæ, & cum prioribus partibus penden-
tibus alligandæ.

EX SORANO
Iunctura ad scrotum ex tribus capitibus.
CXVIII.

Vni extremæ fasciæ assuat altera mediā ad ima-
ginē literæ T. harum, quæ transuersa est, hominem
cingat: quæ recta, feratur ad scrotū, ibi q; catenus
incidat, quatenus coles suo cauo recipiat, extrema q; ad zonā alligetur, vt scroti vitij accōmodetur.

EX HELIODORO


Fasciā glomerata ad cubitum. CXIX.

Incipit ab imo humero in vicinā cubiti, atq; in orbem circūagitur: post hæc obliqua ducitur per
priorem cubiti partem, qua secari venę solent: tum brachio in orbem obuoluta obliqua ad hume-
rum reuertitur, sic, vt in priori parte cubiti X literā representet: sic autem circuit, donec tegantur,
quæ nuda sunt, & vbiq; à latere nodū accipiat. Illud aut cōmune est humeri brachij alterius ue mē-
bri vincendi, q; fasciæ in orbē ferri debent, cū eo vt interdum et oblique procedant, quo vinculū
firmius hæreat. Huius vero fasciæ extremitas vel inferioribus assuenda est, vel angustiori fasciola
vincienda est: aut in duo capita scindenda, quæ ab altera membri parte nodo inter se alligentur.

Iunctura in orbem: quidam adiiciunt, sub auctore Hippocrate. CXX.

Huius vinculi ratio est vt fasciā super aliquod membrum pluribus circuitibus in orbē ambiat.
recte autem iniicitur, vt membrum contineat, quod in suum locum restituitur: magis vero perti-
net ad corporum, quæ abscefferunt glutinationē, his seruatis, quæ ad artificiosam fasciandi ratio-
nem pertinet. Abscedentium enim ore in inferiori parte sito fasciā à superiori parte deorsum pro-
cedit, vt humores excernantur, & eorum, quæ abscefferunt alterum alteri insidat, vt glutinentur:
sed si vlcus superius sit, vt materia ab inferiori parte sursum sub vinculo excernatur. vbi vero ab-
scedentia corpora transuersa sint, fasciā ab ipsis circumdetur versus os, vt humor emittatur.

Menecriti



A *Menecriti vinculum ad partes extremas.* CXXI.

Ab extremo brachio prope manum orsi, vbi fasciam semel in orbem duxerimus, obliquam attrahimus per primam palmæ partem: deinde per palmam ipsam circumagimus priori parti aduersam, ita, vt ad primam palmæ partem reuertatur, prope ipsam prius X literæ similitudine accepta: atque ad eandem rationem obuoluimus, dum quæ nuda sunt, contegantur. Adhibentur autem vtilissime, vbi & primam palmæ partem, & palmam alligari necesse sit.

B *Cancer.* CXXII.

Angustioris fasciolæ, cuius latitudo exempli causa digitum æquet, capite su per primam palmæ partem imposito, ipsa per palmam attrahenda est, & ab interiori parte versus exteriorem oblique ad pollicem adducenda: tum circa ipsum ab exteriori parte oblique porrigenda ad primam palmæ partem aduersa parti prius iniectæ, sic, vt super exteriora pollicis X literam referat: atque ad eandem rationem eatenus voluēda, vt omnia complectatur: nouissime que circa primam palmæ partem data, finiēda est. Commodissime autem obuoluitur ad vinciendum pollicem, quæ ἀντίχρεια vocant.

Ex SORANO

Innētura ad primam palmæ partem.

CXXIII.

Orsa à prima parte palmæ obliqua versus palmam ducatur, deinde per palmam ipsam transuersa, postremo in orbem circa primam palmæ partem, vt quibus hanc ipsam vincire volumus, accommodetur.

D *Vinculum oppositum.*

CXXIII.

A prima palmæ parte incipiens, post ipsam oblique circa pollicem obuoluitur: tum oblique à priori parte manus ad primam palmæ partem porrigitur, ibi que in orbem attrahitur, vt vinciendo pollicis aptetur.

Vinculum, vt in palestra ductum.

CXXV.


Adhibito vinculo opposito fasciam insuper oblique prope primam palmæ partem versus digitos circundamus, deinde in orbem circa indicem: post hæc oblique aduersam parti prius iniectæ, prope primam palmæ partem attrahimus: idem q; facimus circa reliquos digitos, vt illis idoneum sit, quibus tam quod prope primam palmæ partem versus digitos est, quam quod post digitorum articulos, vinciri debet.

Rhombus ad medium membrum.

CXXVI.

Fasciæ caput membro iniicimus, eam q; super id obliquam ducimus, post hæc in orbem, deinde aduersam parti prius obuolutæ, atque ab altera parte in orbem, vt ad eas fracturas conferat, quibus carnis quoque vulnus accessit.

Rhombus



Rhombus multiplex ad vnicum membrum.

CXXVII.

Super extremā vnus membri partē fascia imponit, & per ipsum æquis intervallis quasi in cochlea serpit vsq; ad alterā extremitatem: quā in orbē cōplexa, oblique circuit, & in orbē dat aduersā partē prius iniectā, certa seruās intervalla, vt iis, quæ cōprehēdit, accommodet.

Palma habena.

CXXVIII.

Orsa à summo membro, obliqua per mediū ad imum feratur, & in orbem circa ipsum detur: post partē prius iniectā aduersā ad summum reuertatur, & iuxta eosdē circuitus ambiat, vt eas partes fideliter contineat, quæ recenti callo glutinatæ sunt.

EX HELIODORO

Rhombus equalium crurum. CXXIX.

Tradita iūctura hæc est ad femur, vbi id ali qua parte vulneratum sit, & adiunctæ partes abscedāt. cuius ratio est. Ab inferiori parte vlcis fascia in orbē circuit, inde obliqua ducitur à latere vlcis: & rursus in orbē à superiori parte vlcis attrahitur: tū obliqua ad imaginē literæ X deorsum demittitur: deinceps cōuenienti intervallo bis iuxta vlcus obliqua porrigitur semel ab inferiori parte sursum, semel à superiori deorsum, ita, vt bis litera X representetur, & in medio rhōbus super vlcus collocetur, quo per medium intervallum nudatum humores excernantur. Circuit autem ad eandem rationē, donec quæ nuda sunt excipiat, eo q; fit, vt quæ abscesserunt, sub vinculo, quasi sponte sua ad glutinationem veniant, nudato q; vlcere, quidquid humoris collectum est, effundatur.

Rhombus inæqualium crurum. CXXX.

Vbi proximum vinculum inieceris, requirit quod nūc proponitur, vt fascia per vulnus feratur, etiā obliqua. Eo vsi sunt, quibus operiendi quoque vulneris consilium fuit.

Ascia.

CXXXI.

Scribūt, qui huiusmodi iūcturā adhibuerunt, ipsam vtiliter iniici, quibus vulnerato femore proximæ partes diducunt. sic autē iniici debet. Voluēda sub vulnere fascia est in speciem ascie sic, vt pars gibba deorsum, sima sursum spectet: deinde super vlcus iterum in speciem ascie priori aduersā circūagēda est, atq; ad eandem rationem attrahēda, dum quæ nuda sunt contegat, ab inferiori parte sursum, & à superiori deorsum procedēs, interdum etiā per vlcus, vt ipsum operiat.

Vinculum à latere X literam representans.


CXXXII.

Fascia imo femori in orbē ppe genu circū agimus: tū oblique ducimus, et rursus partē prius iniectā aduersam attrahimus sic, vt à latere genu literæ X similitudinem referat, eodem q; modo circūducimus. Potissimum autem pertinet ad eos, quibus genu in alteram partem lapsum reconditum est, representanda vero X litera est ab ea parte, in quā excidit.

Tctudo.

CXXXIII.

Super genu faciam tendere in orbē oportet,



A tet: inde obliquam à superiori parte deorsum per patellam demitti ad poplitē: ibi q; sub genu in orbem iterum circumagi, & parti prius iniectæ aduersam super patellam procedere in speciem litteræ X. post hæc per poplitē & patellam in orbem circuire, atque ad eandem rationem obuolui. Conuenit autem patellæ, quomodocunque sua sede proruperit.

Ad Calcem. CXXXIII.

Circumagenda fascia est circa talos in orbem, inde à posteriori parte ex vno latere nerui lati oblique ducenda ad alterum latus: tum circa calcē voluenda, ab eo que porrigenda, atq; ad eandem rationem circūdanda. Valet autem ad calcem alligandum.

B *Ad Talos.* CXXXV.

Fascia super talos datur, inde obliqua ad superiora pedis porrigit: post hæc sub plantam demittitur sic, vt ad superiorem partem reuerfa, X litteræ similitudinem referat: alligata vero planta circumducitur in orbem. Valet, vbi vinciri talos oportet.

Spica ad Plantam. CXXXVI.

Fasciam in orbem, magnum digitum complectatur, ab eo q; per plantam procedat circa talos: inde obliqua reuertatur ad plantam sic, vt non longe à minimo digito similitudo litteræ X fiat: post hæc ad superiorem partem pedis intendat, & ad eandem rationem circumear. Maiores vinculum hoc ad magnum digitum deligandum memoriæ prodiderunt: nobis vero superuacaneum videtur digitum alligare ad plantā atque ad talos: abunde enim existimamus, si cum digito & planta pars pedis superior vinciatur, quemadmodum propositum est in digitis manus.

EX SORANO

Calcens.

CXXXVII.

D Fasciam primo talis iniicimus, tum per ipsos obliquam ducimus ad plantam: ab ea que ad alteram partem talorum obliquam attrahimus: postremo circa crus in orbem porrigimus, vt illis accommodetur, quibus devincire talos conuenit.

Ad Calcem.


CXXXVIII.

Fasciæ caput sub talis iniicito, eam q; circa ipsos oblique ad plantā demittito: tum oblique circa calcem, & in orbem iuxta talos adducito, vt illis aptetur, quibus obligare calcem volumus.

Finis Galeni de Fasciis.

ORIBASIVS





ORIBASIVS DE LAQVEIS EX HERACLE

Vido Vido Florentino interprete.



VIDIVS LECTORI

Laudatur liber de Laqueis à Galeno in libro de Fasciis, quâuis alibi quoq; mentionem faciat laqueorū, qui hoc opere cōtinentur: refertur tamen hic liber in græco exemplo ad Oribasium auctore. Quicquid est, opus viliſſimū est, sine quo multa sunt, quæ in medicinali arte nec cōprehendi, nec præstari possunt: pertinent enim laquei non modo ad fasciandū, sed etiā ad extendendum ossa fracta, vel suo loco mota, seu æqualiter, seu inæqualiter adhibere vim oporteat: tum ad curanda atq; alliganda mēbra, dū manus adhibetur.

Quæ ratio sit Laqui Attollentis.



Attollentem habena adhibetur duplicata, cuius vtrunque caput sinistra manu continetur, sinus vero dextra prehenditur, & capitibus superiniicitur, sic, vt capita sita sint in medio sinu. quo fit, vt ex vna parte, laquei nexus feratur, capita ex altera. Habet autem hic laqueus facultatem extendendi æqualiter, pertinet que non modo ad extendendum membra, sed etiam ad cōtinendum, cum in suam sedem compelluntur: & ad figurādum corpora, vbi quid manu fieri oportet. Recte quidem eas partes intendit, quæ binis ossibus continentur, quando-
cunque enim alterum vitiosum sit, sinus super ipsum, capita super integrum imponuntur: nam sinus corpori inherentes affectam partem vehementer distendunt: at capita, cum recedant à corpore, eam partem, quæ bene valet, vel nihil omnino intendunt, vel certe quàm minimum. Membris quoque cum reponuntur, apuſſimus est, sicuti cubito, cum in aliquam trium partium excidit, in quas vbi prolapsus est, brachium curuum est, neque extenditur, id est in posteriorem, interiorem, atq; exteriorem, in quo casu laqueus ossibus, brachij iuxta primam palmæ partē iniicitur, capita que eius sublimiora feruntur, & vt retinacula sint, ad aliquid immobile deligantur. Ad figuranda in super corpora, vbi manu medemur, adhibetur commodissime. in iis enim, quæ iuxta anum vitia infestant, vbi tractantur, brachia poplitibus subiiciuntur, & huiusmodi habenæ attollētes ab brachia dantur in vicinia manus, eorum que capita ad ceruices hominis adducta, inter se vinciuntur: quoniam attollens laqueus non solum iniicitur implicitus, sed super membrum quoq; circumponitur: suspēsa enim fascia sinus membro subiicitur, capita que eius per medium sinum traiciuntur, ea que ratione circumpositus conficitur.



Quo modo laqueus Nauticus debeat adhiberi.

II.

Ex medio sinu duplicata habenæ duos item sinus facere oportet, eos q; inter se permutatos ita


A ita collocare, vt interior extrinsecus, exterior ab interiori parte situs sit. hac enim via nexus laquei ab vna parte, capita ab altera procedunt. Est autem idoneus is, quæ extendi inæqualiter debent. valet item ad continendas ferulas, quæ fracturis accommodantur. lunctura nanque adhibita vnum habenæ caput sinistra manu teneatur, alterum vero per affectam partem voluatur, sic, vt vnus & alter sinus fiat, per quos reliquum habenæ caput trahitur, vt ab ea parte, quæ in nos spectat, versus contrariam porrectum sinistra rursus contineatur. quo iniecto ferulæ in sinus demissæ ad vniuersum membrum dentur, capita que attrahantur, & inter se alligentur, vt ferulas teneant. Valet item ad cubitum sustinendum, non secus atque ad intentionem, aut ad ferulas continendas: imponitur enim, implicatur quæ ad cubitum suspendendum, vbi lata fascia non est. in quo casu sinus ita inter se diducendi sunt, vt alter prope cubitum sit, iuxta manum alter: capita vero ad ceruicem adducenda sunt, ibi que nodo inter se deliganda.

Laqueus Χιασδὲς quo modo implicetur. III.

B

Ad χιασδὲν habena duplicanda est, cuius vtrumque caput sinistra manu continendum: sinus vero dextra prehensus conuertendus est, sic, vt capita ad similitudinem literæ X aduersa inter se sint, inde enim nomen habuit χιασδὲς. quo facto sinus capitibus X literam referentibus superiniiciendus, quod q̄ ex his subiectum est, per medium sinum attrahendum. Eo que fit, vt medius laquei nexus appareat:


C à lateribus vero, hinc sinus vnus, inde duo capita se ostendant. Valet autem, vbi oportet inæqualiter distendere.



Pastoralis laqueus, qui & Sandalius dicitur, quo modo ini-ciatur. IIII.

Pastoralis, dictus à quibusdam Sandalius, cum eo implicatur, quem χιασδὲν nominauimus, hic siquidem primo est adhibendus, vt Sandalius fiat: quo iniecto sinus eius dependens attrahi debet ab inferiori parte sursum, per medium eius sinus, qui contra capita situs est: sic enim ab vna parte laquei nexus, ab altera capita collocantur. in nexu vero tertius sinus, duo scilicet à lateribus, tertius in medio conspiciuntur. Adhibetur autem commodissime ad talum prolapsum, vbi re-

ponitur. vnus enim sinus à posteriori parte tali super latum nervum datur, à priori alter ad partem pedis superiorem, medius, hoc est tertius, planta subicitur. quo facto capita ad id vinciuntur, quo extendendi causa vtiuntur. Neque talo duntaxat conuenit, sed maxillæ, quæ excidit, vbi in suam se dem compellitur. vnus enim sinus ad frontem hominis, alter ad occipitum datur, medius per os procedit vtrinque sub malis: capita vero per tempora ad ægri caput feruntur, ac siue vt retinacula sint, siue vt à superiori parte extendant, ibi inter se vinciuntur.



Draco laqueus, qua Via iniiciatur. V.

Ad laqueum draconē mediā habena à posteriore parte tali, incipiat iuxta latum neruum: capita vero versus priorem ferantur ad superiorē partem pedis, vbi X literæ similitudine accepta, ad plantam porrigantur, & rursus inter se aduersa eandem literam repræsentent: post hæc circa talum, vel ab inferiori parte sursum, vel à superiori deorsum circudentur: tum deligentur ad id, cuius opera ad extendendum vtimur. Facit autem hic laqueus ad talum suo loco motum, vbi reconditur.

Qua ratione is laqueus adhibeatur, quem Simplem nodum dixerunt. VI.

Laqueus, cui nomē est simplex nodus, à quibusdā Perineos appellat. Quocunq; autē vocetur, eius rō est. Habena simplicē nodū accipiat, eiusdē q; sinus attrahat, capita vero depēdeant: deinde membrū, quod reponere opus est, inter superiores sinus collocādū: tū alter sinus in alterum insitus, ad capita ducēdus, cōi q; nodo cū capitibus ad id vinciēdus, qđ ad intēdendum adhibemus. Habet autē inequalē extēdendi facultatē.

Lupus laqueus quo modo nectatur. VII.

Duæ habena iustę longitudinis duplicentur sic, vt capita ab eadē parte collocētur: sinus inter se aduersi sint: tū capita, quę ab inferiori parte, sursum, quę à superiori, deorsum vellant, sic, vt medius laquei nexus, vtrinq; vero bina capita se ostēdant. Habet autē vim extēdendi æqualiter: pertinet q; nō modo ad ossiū, quæ restituntur, intentionē, sed in herniæ curatione ad mēbranā abdominis adstringēdam: item ad vinciēda venarū capita sanguinē fundentia. Nos autē in sinus conicere linea simplicia cōsueuimus, quæ cōi medicorum vocabulo, q relaxēt, σχασνίαι dicuntur. neq; hæc ipsa temere adiiciuntur, sed vt, vbi quæ arctata sunt, remittere volumus, per lina id præstemus, & non per capita.

Nodi Herculei ratio. VIII.


Ad nodum Herculeū, habena adhibere oportet, quæ duos nodos accipiat inter se distantes, quo fit, vt Hercules nodus vtrinq; se ostendat, hinc autem sinus, inde vero sint capita duo. Vallet, vbi equaliter intendere consilium est. Quod si sinus, qui contra capita est, medius incidatur, à lupo laqueo non differet.

Simplex Charchesius qua Via implicetur. IX.

Ad simplicē charchesiū, q vim habet extēdendi æqualiter, duplicari habena debet, capita quę eius sinistra manu contineri: sinus vero dextra sursum cōuersus supimponi capitibus, quę media opus est aduersa inter se collocare in speciem X literæ. eo facto sinus capitibus iniectus à superiori parte deorsum attrahatur, per mediū eius partis, qua X literæ fuit accepta similitudo: sic enim laquei nexus medius apparet, ab vno latere sinus vnus, ab altero duo capita.

Duplex Charchesius quo modo implicetur. X.

Duplex charchesius æqualiter distēdit, ac simplici longe est efficacior. eius autē ratio est. Habet nam prehēdimus duplicatam, capita q; leua cōtinentes, linū patimur dependere. tū ex capitibus, quæ cōtra sinū sunt, alterū duplicamus, sic, vt paruus sinus fiat, quē in sinistra manu ponimus, alterum



A terum per sinum traicimus: deinde nexum per sinus conuertimus, et in sinistra collocamus. quo facto, ex capite, quod cōtra sinum est, rursus alterum sinum efficiamus, quem nexui adiungimus. postremo pendentem sinum per medium nexum trahimus, ab inferiori parte sursum. quo fit, vt ab vno latere sint duo capita, ab altero vnus sinus, quibus laquei nexus medius intericiatur.

Duplex Charchesius, quō ex simplici fiat. X I.

Cum duplex charchesius varie consueuerit implicari, siquidem per se interdum, interdū fit ex simplici, non nunquā conficitur circūponendo, supra demonstratū est, quo modo per se iniiciatur: nunc qua ratione ex simplici fiat, exponemus. Adhibere igitur primo simplicem charchesium oportet, sinus q̄ alterum ab altero diducere: deinde cum, qui subiectus est, in superiorem conicere, & similiter vtrunque diducere, ac per spacium, quod ipsis medium intericiatur, B sinum qui cōtra capita est, ab inferiori parte sursum attrahere. sic enim rursus laquei nexus medius se se ostendit, hinc vnus sinus, inde bina capita conspiciuntur.

Duplex Charchesius, quo modo implicetur circūponendo. X II.




Quoniā vehementi validorum corporū intentione, laquei capita, ex vna parte sepius rumpuntur, ante perfectā intentionē, ne cogamur intendētis adhuc laquei capita relaxare, charchesium circūponimus. Tenentes igitur sinistra manu caput, circa membrum restituendum tres sinus efficiamus inter se distantes ita, vt ex his quod satis est, dependeat: post hęc primum sinum in postremum demittimus, & semel aut C iterum eos conuertimus, per quos medium sinum rursus attrahimus. quo fit, vt circa membrum laquei nexus, ab vno latere vnus sinus, ab altero duo capita se ostendant.

Plinthij, quod alioquin Quadruplex circulus dicitur, quæ ratio sit. X III.

Ad Plinthiū laqueū, adhibet habena circulū representans. i. sine capitibus. Hęc ab interiori parte manus, pollicibus minimis q̄ digitis circūdat, nec nō vtriq̄ indicī, vt sinus in vtraq̄ manu terni sint, vnus circa minimū digitum, circa indicē alter, tertius sup̄ pollicē. post hęc, sinus, in quos insiti pollices sunt, ad proximios minimis trāsferunt, tū ad indices, qui minimis iniecti fuerūt, deinde sinus, in quos indices demissi postremo erant: medij à pollice à superiori parte deorsum vellunt, sic q̄ ab vno latere duo sinus, totidem ab altero, mediū inter hos laquei nexus ad rhōbi similitudinē conspectui subiiciunt. Habet aut̄ æqualē intēdendi facultatē, & nō solum ad intētionē, sed v̄ ad menti quoq̄ fracti cōpositionē pertinere. nam mentū ipsum sub fractura aliquā peruersum, in laquei complexū, rhombum referentē inseritur ab exteriori parte: sinus vero p̄ malas, parteis q̄ superiores, ad summum caput feruntur, atq̄ ibi inter se deligantur.

Laqueus Epangylosus (ita enim appellatur, quoniā sinus super sinu inicitur) qua via inferi possit. X IIII.

Ad Epangylosum, vnū habenæ caput, intere sinistrae manus pollicem & indicē collocamus eā q̄ extrinsecus vltra primā palmæ partē adducimus: inde per palmā ipsam, datā inter pollicem & indicē



ORIBASIVS DE LAQVEIS

& indicem vtriusq; manus attrahimus, post hæc inter minimum & proximum digitum demitti **H** mus. eo facto habenæ caput dextra manu sursum vellimus, extremâ q; partem inter minimum ac proximū digitum tenemus. quo fit, vt duo sinus efficiantur, inter quos attractus nodus apparet. Facit autem ad corpora figuranda, vbi manu curatio adhibetur: inter sinus enim vtraque manu hominis coniecta, reliquis habenæ partibus totum corpus firmiter continetur.

Ratio eius laquei, quem Auriculas nuncupant. XV.

Ad auriculas, epangylosus primo iniiciendus. danda autem opera est, vt alter sinus amplior sit, quem implicare oportet ad modum laquei chiasmi, sic, vt duo sinus oculis exponantur: inter quos, quod ex habenâ dependet, duplicatum se ostendat. Recte autem adhibetur, vbi prolapsa maxilla reponitur, tum ad processus capitis recondendos. Sinus enim dantur ad tempora ægrotantis, quod q; inter eos duplicatum conspicitur, ad frontem: deinde vinculum illud iniicitur, quod leporē auritum appellant: postremo auriculæ, vel vt contineant, vel vt à superiori parte extendant, super caput offensi porriguntur.

Laqueus duos habens sinus (quem non nulli minus proprie Strangulantem dixerunt) quo modo iniiciatur. XVI.

Laqueus, quem duos sinus habentem appellant, ex binis constat chiasmis, quorum alter ab altero diducitur. Est autem aptissimus ad corpora figuranda, vbi vitia iuxta anum curantur: siquidem brachia subiecta poplitibus, eiusmodi laqueis adstringuntur: at pars, quæ media inter sinus duplicata depēdet, ad ceruicem hominis fertur, atq; hac vja corpus figuratur.

Ratio laquei, quem Strangulantem proprie nuncupant. XVII.


Laqueus, qui proprie strangulans nuncupatur, ex simplici fit charchesio, hic enim primo iniicitur sic, vt alter sinus ab altero distet. Conferat autem ad quos proxime expositus. Brachia nanque rursus coniecta in sinus coarctantur, & ea pars habenæ, quæ duplicata est, media similiter collocatur, in eam q; ceruices inferuntur.

Quo modo adhibeatur laqueus Τερεζατος, id enim nomen traxit ex eo quod supra feratur. XVIII.

Hyperbatus fit ex laqueo Nautico, siquidem in hunc primo implicitum brachia inferi debent, sinus que inter se diduci, & capita ad ceruices deligari.

Laquei igitur, quorum expeditissima comprehensio est, huiusmodi sunt.

Finis Oribasii de Laqueis.





ORIBASIVS EX HELIODORO DE MACHINAMENTIS

Vido Vidio Florentino interprete.

VIDIVS LECTORI

Machinamentis non solum vtuntur architecti, sed medici etiam, cum his robustiora membra vtiliter, & quantum fieri potest, sine dolore extēdant, vbi luxatis vel fractis medentur. Hæc ab Oribasio collecta sunt ex Hippocrate, Galeno, atq; aliis auctoribus, vt patet, vbi singulorum vsus & structura exponitur: sed præter vtilitatem, quā in curatione exhibent, multos apertius in medicina locos, qui sine his omnino sunt incomprehensibiles. Quamquam in hoc libro machinamenta aliqua desunt, quæ auctor inter cetera commemorauit, vbi vniuersam machinamentorum rationem recenset: sed opus me nobiscum agitur, quando non omnia intenerunt.

Quibus modis Luxata restituantur.

I.



Luxata in suam sedem tribus generalibus modis collocantur, quibus alij ferè omnes continentur. Vnus vocatur Palæstricus, ad quem ferè solas manus admouemus: atq; hic, vt pote imbecillis, aptatur ad mollia corpora, muliebria nimirum & puerilia, tum ad mascula, quæ illis robustiora sunt, modo recēs vitium fuerit. Alter Methodicus dicitur, ad quem instrumenta adhibemus, quorum vsus in communi vita est: hic omnibus idoneus est, pueris, scæminis, masculis iā robustioribus, & corpori iuuenili, atque iis luxatis, quæ iam vetusta sunt. Tertius reponendi modus, qui per organa est, maius momentum habet: valet enim ad prolapsa, vbi malum diutius trahitur: valet ad corpora athletarum: præterea quæcunque prolapsa curationem recipiunt, & sub methodico curari nequeunt, omnia organorum opera reponuntur.

De Organorum Differentiis.

II.

Organorum medicinalium differentia in vniuersum, & quasi generales, summum (vt alij sentiunt) ternæ habent. alia enim tractoria sunt, alia machinamēta, alia quæ erecta collocantur: nobis autem placet nō nulla tractoria esse, non nulla machinamenta, non nulla quæ erecta, non nulla quæ plana collocantur. Tractoria sunt, quæ, cum parua breui q; sint structura, extēdendi duntaxat facultatem habent. hæc vt suo munere fungantur, aduentitia quædam postulant, vt scamnum, lectū, scalam, eo q; per se vsui esse minime possint: quocirca & alligata, & in plano sita nuncupantur. nam, vbi in agro, aut solitudine quapiam, quæ suo loco mota sunt, reponimus, ac neq; scamni, neq; lecti, neq; scalæ copia est, aliquid in solum dehgimus, ad quod tractorium organum alligemus. Machinamenta sunt organa tractoris ampliora, minora tamen aliis, quæ nō modo intentionem, sed impulsū quoq; pollicentur: ac præcipue quorundam membrorum gratia comparantur. Erecta organa sublimiorem structuram habent, & non solum ad extēdendum valent, sed etiam ad impellendum. Porro autem plana organa sunt, quorum humilis structura est. ex his constant, quæ & extendendi & impellendi vim habent, ita, vt homine illis intidente, recondi, quod elapsū est, possit. reperiuntur etiam in his quædam propria structuræ discrimina.

Ex qua Materia struantur Organa.

III.

Basis, crura, latera, transversaria, cubiti, telūdines, adiuncta crura. hæc omnia, quæ in organis ampliora expediuntur, ex robustiori materia concipienda sunt. vt puta iligneæ, vel fraxigneæ, quæ secundas obtinet. Oportet autem ea de causa validissimam esse organorum materiam, vt vim queant in condendis articulis sustinere, quod in iis potissimum organis requiritur, quæ erecta collocantur. Vertebrae, radices, clauī, vncī, catenulae, vecīes, omnia quæcunque exigua sunt, quæ q; plus efficiunt, area vel ferrea comparentur, vt quod structuræ exiguitas detrahit, materiae firmitas restituat. Aliquando autem quælitum est, ferrea ne, an aenea sumi debeant. inquit, qui

Septima Classis.

RRRRRRR

ferro

ferro æs præferunt, hoc leuius esse & facilius tractari, minus quàm rubiginem trahere quàm ferrum: E contra, qui æri ferrum anteponunt, validiorem huius materiam laudant, ære enim efficacius robustius quàm ferrum est. atqui de ferro conuenit firmitus esse, sed superuacuum est eximium robur, ubi eius nullus est usus, cum liceat hæc ex ære fabricare, quod mollius est, & satis roboris habet. licet tamen & ex ferro. Quod si ex ære fiant, sumatur id, quod ducitur, nam, quod conflatur, facilius rumpitur, comminuitur quàm, ita, ut præstet ex ferro hæc parare, quàm ex fuso ere. Sed quoniam ferrum cito rubigine obducitur, idcirco aliquot interpolitis diebus subinde pingui aliquo inungendum: ac, ne rubiginem sentiat, manu perfricandum. At dicet quis, si ferrum neglectum rubigine corrumpatur, id culpa domini ipsius organi fieri.

Ex quibus Partibus Organa consistunt, & quis sit earum usus.

IIII.

Continetur omne organum non omnibus, sed quibusdam ex iis, quæ numerabo, nempe basi, cruribus, transuersariis, cubitis, axibus, regulis, testudinibus, cochleis, tympanis, clauis, manubriolis ductariis, vectibus, baculis versantibus, obicibus, cuneis, item lunatis lignis, orbiculis, trochleis, fossis, operculis, vertebris, fibulis, radicibus, vncis catenis, forficibus, sedilibus, priapiscis, ad hæc cochlea femina, quæ græce περιόχλιον appellatur, cuneolis, chiniscis, columbariis, ergata. hæc ferè sunt, quibus organa componuntur, quorum usus sigillatim iam nunc exponendus nobis est. Basis ad id potissimum struitur, ut super eam erecta organa statuuntur. Crura in organis & latera dicuntur, in iis, quæ erecta collocantur, proprie crura, minus proprie latera: sed in tractoriis proprie latera dicuntur, minus proprie crura. hæc ferè in organis statuuntur, ut ipsorum machinationes contineant: proprie autem in organis erectis crura recte commode que dimensa ad illam pertinent condendi rationem, quæ excitatio præstatur. Transuersaria, quæ διαπήματα dicuntur, ut græcum nomen indicat, ad crurum laterum quàm compaginem fiunt, ad quæ usum primo præcipue quàm destinantur: huc accedit, quod machinationes quoque sustinent, ut puta trochleas, cubitos, atque alia quedam. Cubiti ad eum usum in organis comparantur, ut per ipsos, quæ suo loco mota sunt, à superiori parte extenta reponantur, quemadmodum videre licet in organis Fabri atque Andreæ: in quibus cubiti per superius transuersarium demissi in testudinem figuntur, ut hac elata, quæ prolapsa sunt à superiori parte intenta recondantur. latæ cubitorum summities alæ ab architectis dicuntur, imæ vero partes quadrate, calces. hi ergo proprie cubiti nominantur, sed quidam vocabulo abutuntur. Spathæ impellendo sunt idoneæ: ea autem spatha, quæ in Fabri atque Andreæ machinamento est, utimur, ubi extrahendo impellimus ad femur in posteriorem partem erumpens. sunt & aliæ spathæ in quibusdam organis, ad alios impellendi modos fabricata. Radices & fibulæ complures usus in organis præstant: primo enim radix & fibula in organo Fabri spatham distinent ad testudinem. est quidem in testudine radix, spatha vero, quæ parte quadrata est, medium habet cauum, in quod radix eadem inditur: deinde fibula continendi causa, in spatham ac radicem pertusam inseritur. proprie radices ad id fiunt, ut recipere vncos possint, & alios effectus præstare: sed fibulæ item gratia est, quod machinationes immobiles seruat, ut puta axes. Catenæ eò pertinent, ut fibulæ ex ipsis suspendantur, quo seruentur in organis, neque decidant. Vnci adiciuntur, ne mobiles machinationes moueantur, veluti axes: quod uero in radices coniecti quedam organorum machinamenta sistant. Per vertebras (quas græci σπονδύματα dicunt) ferè id effcimus, ut quedam organa immobilia moueantur, sicuti crura organi Andreæ. crura enim in organo transuersa secta, vertebris fibulis quàm continentur, ut organo modo erecto, modo per vertebras inclinato, circumducendo impellamus. ad exemplum huius structuræ organi Andreæ Plinthij crura prope basim secta sunt, rursus quàm vertebris continentur, ut organum modo erigatur modo per vertebras motum, adiunctis cruribus innitatur, usum quàm illius organi præstet, quod planum collocatur. hi sunt effectus vertebrarum in organis. Axes ad corporum ductiōnem, hoc est intentionem spectant: quorum quidam ab una parte ad alteram penetrant, ac per se H mouentur: quidam latent, & per alias machinationes conuertuntur. penetrat axis in Plinthio Niclei, & in scamio Hippocratis: latet in Apellidis organo, quod, quia per tres funes circumuoluitur, trispastum appellatur, & in Nymphodori glossocomo. penetrantes igitur axes per se manibus conuertuntur, latentes autem per alias quasdam machinationes, exempli causa in Nymphodori glossocomo per tympanum & cochleam ad lentis imaginem fabricatam, in trispasto per funes alligatos. Ad clauos, qui in axibus infiguntur, funes alligant, vel habent, atque huiusmodi alia ad extendendum pertinentia. Manubriola ductaria, bacula versantia, & vectes, omnes hæc machinationes ad axium cochlearum quàm uersiones statuunt. primas occupant manubriola ductaria, secundas vectes, quibus minus efficacia sunt bacula versantia: pleraque enim ex ipsis exigua cum sint, una manu conuertunt. Chinisci, cuiusmodi sunt in lyra, excogitati sunt ad axes continendos. ubi enim fibulæ non sint, quod poterit aliud utilius inueniri: quod enim ad vim pertinet, usum habent fibularum: decoris autem causa, in sculpta habent anserina capita lignea. Statuunt in organis Phliæ, ut ab uno latere ad alterum penetrantes axes continent, cuiusmodi sunt in scamio Hippocratis, & in nostro. Est & alia media phlia in organo Hippocratis ad similitudinem literæ Π, eo nomine fabricata, ut ad eam impellendi rationem, quæ extrahendo fit, ubi femur excidit, accommodetur. Trochleæ in organis collocantur, ut funes libere

A libere duci possint, veluti in organo Fabri, quod duplicem cochleam, qua testudo mouetur, in superiori transuersario continet, in nostro quoque organo rursus trochleæ sunt, quæ per indito, funes, axes attollunt. Verum trochleæ ferè ad id fiunt, ut axes & habenæ celeriter ducantur, simulque ut ad intentionem, quæ alio intercedente motu fit, accommodentur. Orbiculi struuntur ad trochlearum motionem, quæ per se sunt immobiles: collocantur autem in medio earum, quemadmodum in Demosthenis ἀσφάλει, & ad funes continendos, ut in trispasto Apellidis. Cuneus præsertim paratur ad humeri caput in alâ prolapsum, ac deinceps ad alios quoque usus. At lunatû lignû prodest, ubi humeri caput in priorè aut posteriorem partem excidit. Est autem Polus lignum infixû superioribus crurû extremitatibus in organo Philistionis, luxato enim humeri capite brachiû extēdit, polusque obliquitur ad hominis ceruices. Epipoma vero, quod & Epipigma dicitur, est II figura in ligno insculpta, in quâ coniicitur II inuersum: qualis conspicitur in eo organo, quod Hermes dicitur. fit autem hoc, ne ab Hermis vultu corpora terantur, ut in organi cōpactione ostendemus. Καλάθιον vero et Σκιθάλιον cōiter parata sunt, ut epipigma ferant. Est quidē Σκιθάλιον lignû sex digitorû in medio hebes. Καλάθιον vero lignû sex digitorû rotundû, quod angustiori basi nititur, et quasi illo simile est. Sunt & in organis quædam colūbaria insculpta ad similitudinē columbarum, quæ ornâdi causa facta sunt, atque ad id et, ut aliud ferant epipigma. Tympanis hæc gratia est, quod quædam organorum machinationes, quæ maximû vsum præstant, per ipsa paulatim mouent, ut axes & cochleæ. est autem Tympanum rotunda machinatio dentata. At Delphines dentibus inclati, machinationes motu prohibent, quæ vnei quoque efficiunt. Testudines in organis ad id collocatæ sunt, ut corpora, quæ restituant, paulatim, & minime cōcussa extēdantur. quemadmodum enim testudines animalia lento gradu procedunt, ita machinationes, quibus illa referunt. Porro autem ex testudinibus non nullæ transuersariis similes sunt, aliæ oblongæ, aliæ cubi speciem representant. transuersariis similes sunt, in organo Andree, Fabri uel oblongæ in quadrata colūna, quæ appellat Hermes: cubi referunt in rotunda colūna Eraclidæ Ephesij. Præterea testudinû aliæ cubitos & spathâ attollunt, aliæ cuneatâ & lunatâ appendicē, quædam nihil attollunt, sed solû sunt ad extēdendû inuētæ. cubitos attollit testudo, quæ sursum fert, in organo Andree: cubitos & spathâ testudo, quæ est in organo Fabri: cuneata et lunata appendix ea testudine excitat, quæ in Herme est: nihil attollit, sed solû modo extēdendo est, ea testudo, quæ in rotunda columna Eraclidæ Ephesij collocat, similiter & quæ deorsum fert in organo Andree. Aliæ autem & dracones fibulæque infixæ clauorû vsum præstant: proprie autem dracones, quod ad materiam pertinet, in vicem manubrioli ductarij fabricantur. Quoniam vero testudines plerumque à cochleis mouentur, proximû est, ut cochlearû structurâ, atque vsum exponam. comparantur ergo cochleæ in organis, ad alias machinationes impellendas, puta tympana & testudines, quo paulatim & nulla ratione cōcutiendo extēdant. Cochlearû, quædam quadratæ sunt, quædam ad imaginē lentis: quæ figuræ nomen inuenerunt, relata ad capreolos, at non ad structurâ scapi, quælibet enim cochlea rotunda est ad tornû rotundata. Differunt cochleæ capreolis, quæ aliæ quadratæ, aliæ ad lentis imaginem dicuntur. quadrata cochlea est, quæ capreolos habet quadratos, atque ex iis non solû quod prominet, sed et quod cauum est, cuiusmodi cochleas videmus in organo Andree: quæ in lentis specie sunt, id capreoli, quod cauum est alie angustû habent, latû vero in summo, cōtra quod prominet à basi latû vertice ipso tenuat. similis autem est huiusmodi capreolus lenticulæ dimidiata, à qua figura cochlea hæc ad imaginē lentis dicta est. Cochleæ igitur tam quadratæ, quæ ad imaginē lentis, ad motum diuersarû machinationû statuunt. quadratæ enim testudines cōpellunt: quæ sunt ad imaginē lentis primo quidem tympana, interdum etiâ testudines in us, quæ pericochlia nuncupantur.

Quaratione Quadrata Cochlea testudinem moueat.

V.

Demus testudines esse ita fabricatas, quemadmodum in organo Andree, quarum singule pertusæ sunt, atque in id cauum cochleæ demissæ: ab interiori autem parte caui ferrea vel ænea lamina testudini infixâ sit, quæ quidē lamina dens nuncupatur. hic igitur dens testudinis, in cochleæ capreolo includitur. quo fit, ut in quadâ cochleæ cōuersione, lamina, quæ dens nuncupat, testudini infixâ, atque in cauo capreoli contenta testudinē moueat. Præterea ex iis ipsis cochleis quadratis alia simplex est alia duplex: simplex, cochlea est, quæ vno duntaxat capreolo est excauata, vnamque testudinem impellit: in duplici, bini secti sunt capreoli, hæc & binas testudines mouet, qualis cochlea reperitur in magno Andree organo, quod Plinthium nuncupatur. excauatum enim lignum est à medio ad transuersaria capreolis inter se aduersis, ita, ut quadam cochleæ conuersione orsæ testudines, vel à medio versus transuersaria, vel à transuersariis versus medium impellantur. est & alia cochlea duplex in eo, quod κηρύκιον appellatur, excauata à summo principio usque ad extremum aduersis capreolis, quæ rursus duas testudines mouet, quemadmodum in ipsa organi structura videmus. At cochlea ad imaginē lentis tympanum mouet, liquidum capreoli cochleæ, tympani dentibus insitu, machinationē conuertunt: quemadmodum cochlea, quæ baculo versante, vel manubriolo ductario conuertitur in tympani dentes cōueniēs machinationē mouet: mouet interdum eadē cochlea testudinē, sed non amplius per dentem, quemadmodum quadrata, verum in foemina cochlea cōtenta, quæ in ipsa testudine struitur: quoniam testudinis cauum, in quod cochlea demittitur, excisos habet capreolos aduersos iis, qui sunt in cochlea lentis formam referente, sic, ut id, quod prominet ex capreolis cochleæ

Septima Classis.

RRRRRRR ij lentē

lentē referētis, in cauo capreoli foemine cochleę recipiat: quod q̄ cauū est in capreolis cochleę id, E quod extat ex capreolo, cochleę foemina capreolis admittat. Accidit autē in cochleę cōuerhōne, vt testudo modo sursum moueat, modo deorsum, cū cochlea in ipsius capreolis voluatur. Huiusmodi structure plurimę adhibent ad organa, quę plana collocant: ad id enim fabricant, vt hoies, q̄bus luxata restituant, inclinatis organis insidant: organa enī quę plana collocant: ita parata sunt, vt egris sup̄ ipsa, vel sedētibz, vel cubātibz, luxata reponant. Priapiscus, q̄ & stiliscus & scalmus nuncupatur, in quolibet organo, quod planū collocei, statuitur. sit autē ea de causa, vt ei parti, quę inter anum & naturale est, obex sit, vbi, quę prolapsa sunt, restituantur. est igitur Priapiscus lignū octo digitorū, magna ex parte rotundū, ab eo, quod superest quadratū, sic vt quadrata ipsius pars cōficiat in cauū, ad literę Π similitudinē quadratū, i organo, qd̄ planū collocai: reliqua vero pars, quę extat, inter anū & naturale obiciat. Cōfigit autē in trāuersariū Π ferreū, vt firmiter priapiscū contineat. sed in nostro organo videre licet magnū Π ferreū ad aliū vsum cōparatū, nēpe ad gibbā spinā per pressum impellendā. Opercula in organis parātur, vt machinationes sub ipsis occultent, ne, si absq̄ operculo fuerint, idiotis pateant. Anuli adhibentur ad organa tractoria, vt alligari possint: ad alia vero, vt machinationes cōtineat, quęadmodū in Menecriti Bucranio, vbi axis cōtinet, atq̄ eadē de causa in aliis organis. Forfices in organis arcte trāuersaria cū cruribus iungūt, & ad hūc enī vsum infixas forfices eneas inuenimus. Ad iūcta crura id efficiūt, vt organa, q̄ erecta collocātur, illis innixa inclinata q̄ eundē vsum p̄stent, ac si plana statuerent. Prefatus, ex q̄bus oīa organa parent, & quorsum singulę ipsorū machinatiōes spectēt, declarabo in sequētibz, quę nā ex organis immota, suo munere fungant, & quę mota: tū ex iis, quę mouent, quę nā suo loco manent, q̄ locū mutēt, dū mouētur: rursus ex iis, quę immobilia sunt, quę ppetuo & vbiq̄ immobilia maneant, quę eximi possint, ad alios quoq̄ vsus idonea. Hęc itaq̄ immobilia sunt i organis, basis, crura, latera, trāuersaria, cuneata & lunata appendix, sedile, priapisci, atq̄ alia cōplura. Viui sunt, crura mouent, vertebz, vnci, axes, tympana, cubiti, cochleę, testudines, atq̄ huius generis plurima. Mouētur in eodē loco manētia, vertebz, vnci, tympana, cochleę, pleriq̄ axes. Locū mutāt testudines, cubiti. Eorū, quę in organis immobilia sunt, quędā semp̄ & vbiq̄ immobilia sunt, quędā & eximi, & inseri possunt: semper quidē immobilia manent, basis, crura, latera, trāuersaria, radices, sedilia, lunata appendix: extrahi possunt in quibusdam organis, quamuis immobilia sint, tum cunei, tum priapisci, qui ad alios quoq̄ vsus facti extrahuntur, & immittuntur.

Ex Galeno de Machinamentis.

V I.

Articulis reponēdis Hippocratis scānū p se abūde est. si q̄s autē velit aliis quoq̄ vti, est polys- G paston, ita appellatū, qm̄ multis orbiculorū circuitiōibus facilitatē p̄stet: quod iter facientibus maxime idoneū est. refertur autē ad Archimedē auctorē. In vrbibus vero nō alienū est Fabri vel Andreę organum, cum erecto opus est: vbi plano, scamnum Hippocratis præcipue aptatur.

De Glossocomo machinamento.

V II.


Non ab re quidē mihi glossocomū v̄r à iunioribus medicis inuentum, qd̄ seu femur, seu crus cōminutū sit, vbi callus circumdat, cōmodissime admouet. Habet autē ab ima parte axē, ad quē extremi laquei in diuersa extēdentes deligant. Iniciant laquei extremis partibus ossis, quod curat, fiant q̄ ex duabus habenis, sic, vt quatuor vterq̄ capita habeat, bina à dextra, totidem à sinist. ex iis capitibus, quę inferioris laquei sunt, per foramina facta in inferiori parte glossocomi ad axem duci debēt: quę superioris, primo procedere ad superiora, deinceps ipsa quoq̄ p latera glossocomi perforata trahici, quibus foraminibus trochleę includantur. Vtrinq̄ ergo ab exteriori parte glossocomi, superioris laquei capita ferenda sunt ad axē. his enim ita cōstitutis, vna axis conuersio pariter ambos la-

queos extēdit deorsū versus, illū q̄ ad inferio-
ra fracti ossis alligat,
fursū: alterū sic, vt cō-
posita fractura in po-
sterū liceat quotidie
hāc laqueorū i diuer-
sas partes intentionē
corrigere, valentius,
vel lenius extēdēdo.
Laqueū igit, q̄ in infe-
riori parte est, directā
ductiōe axis extēdit:
eū, q̄ in superiori par-
te, intercedēte alio mo-
tu, gręci δια τῆς μετα-
ληπτικῆς τάσεως dñt.

Capsula Machinaria.

- A Axis ad quem laqueorum capita circūiiciuntur.
- B Laqueus superior.
- C Laqueus inferior.
- D Inferior caput capsulę.
- E Trochleę.
- F Superioris laquei capita ab exteriori parte capsulę.

H



Nilei

A *Nilei Plinthium.* VIII.


FActum est Plinthium Nilei ad eorū organorum exemplum, quæ vocantur tractoria quadrata oblonga: duo enim habet latera, longa palmos quatuor, digiti crassitudine, quæ extremis partibus transversariis inter se compacta sunt. Est autem transversariorum crassitudo & latitudo, quanta laterum, sed longitudo palmū implet. Merito igitur, cum talis cōpactio sit, ut latera quatuor palmos longa sint, transversaria vnum, totius organi quadrati structura oblonga cōfecta est. Licebit autem, si quis voluerit latera breviora, quàm dictum est, efficere, quādoquidem organum, per vnicum axem, effectum præstat. Media itaque latera pertusa sunt rotundis ac peruis foraminibus, per quæ axis traicitur, qui media parte clauum infixum habet: capitibus vero, quibus latera excedit, vectes aeneos vel ferreos decem digitorum magnitudine. Sunt itē in organo quatuor anuli lateribus affixi, bini ab inferiori parte, totidē a superiori. Antiqua huius organi structura auctore Nileo talis est. Herodotus quidam architectus transversariorum priores partes medias excavauit ad figuram literæ *U* ne habenæ, quæ a corporibus, quibus vis adhibetur, ad axis clauum feruntur, extantibus angulis atterantur, sed recta procedant. Hactenus Herodotus. nos vero quam accepimus,

Bistoriam referemus. Ferūt Pasiratē architectum Sidoni organum hoc vidisse, quod a statua continebatur, aliter tamen fabricatū. nam cum eadem compactio esset, conspiciantur in eo organo ab extantibus axis capitibus, aeneorum draconum complexus, quorum capita e regione ad caudas spectabant. sed quod pertinebant hi dracones: non aliō nisi ut in vicem vectium axes conuerterent. tum in organo, quod Sidoni erat, media transversaria pertusa erant rotundis foraminibus, quæ clauo axis responderent. constat autem foraminum eundem esse vsum, qui in organo Herodoti, nimirū ut habenæ, quibus corpora extenduntur, ad clauum rectæ per ea foramina porrigantur. Retulit insuper Pasirates axem inclusa habuisse in vicinia laterum tympana quatuor ex ære dentata, duo ab interiori parte, totidem ab exteriori: atq; itē in lateribus foramina fuisse dentium ordini respondentia, ut postquam abūde extenta corpora fuissent, fibulæ inter dentes eō demisse, ubi in luxatis restituendis opus esset, axem si sterent. Sed recētiore tympanis omissis prior parte latera pertuderunt. pertuderūt item in orbem aliquo intermisso spacio, & ipsa axium capita, quod ad vsum dictum fibulæ inditæ axem mobilem tuerentur. Ego autem, cū fibulæ decidat, ad eum, quē dixi vsum, vncos lateribus infixi: axis vero capita foravi sic, ut huius foramina illis cōuenirēt, quæ erant in orbē in lateribus aliquo spacio interiecto, quod, ubi vellem in luxatis cōdendis axem immobilē reddere, vncum includerē in foramen, quod esset accommodatum. Cōmunis Plinthij tractorij fabricatio huiusmodi est: verū ego aliter Plinthiū struxi. Salua enim eadem laterum mēsurā inferius transversarium sursum trans

- A Duo latera.
B Transversaria.
C Rotunda, ac peruisa foramina.
D Axis, qui media parte clauum infixum habet.
E Vectes ænei.
F Anuli.
G Transversarij priores partes excavatz ad figuram literæ *U*.
H Aeneorum draconum complexus.
I Foramina rotunda.
K Tympana ænea dentata.
L Fibula indita.
M Vncus.

Nilei Plinthium.

- N Scamnum quale in ludis videmus.
O Cava quadrata.
P Fibula.



Dramina porrigantur. Retulit insuper Pasirates axem inclusa habuisse in vicinia laterum tympana quatuor ex ære dentata, duo ab interiori parte, totidem ab exteriori: atq; itē in lateribus foramina fuisse dentium ordini respondentia, ut postquam abūde extenta corpora fuissent, fibulæ inter dentes eō demisse, ubi in luxatis restituendis opus esset, axem si sterent. Sed recētiore tympanis omissis prior parte latera pertuderunt. pertuderūt item in orbem aliquo intermisso spacio, & ipsa axium capita, quod ad vsum dictum fibulæ inditæ axem mobilem tuerentur. Ego autem, cū fibulæ decidat, ad eum, quē dixi vsum, vncos lateribus infixi: axis vero capita foravi sic, ut huius foramina illis cōuenirēt, quæ erant in orbē in lateribus aliquo spacio interiecto, quod, ubi vellem in luxatis cōdendis axem immobilē reddere, vncum includerē in foramen, quod esset accommodatum. Cōmunis Plinthij tractorij fabricatio huiusmodi est: verū ego aliter Plinthiū struxi. Salua enim eadem laterum mēsurā inferius transversarium sursum trans

Septima Classis.

R R R R R R R in tuli,

tuli, quatuor digitis infra transuersarium extrema crura relinquens, axem vero collocaui in medio transuersariorum, cui parti græce *φωτλ* nomen est: & scamnum quoddam, quale in ludo videmus, ab vna extremitate excidi cauis quadratis atq; oblongis, vt propolitorum crurum extrema in eiusmodi caua conuenirent: ipsa item latera extremis partibus transuersa pertudi, foraminibus ab vno latera ad aliud penetrantibus, vt fibula in foramina coniecta Plinthium contineret. Hæc de organi structura, nunc ad ipsius motionem aggrediar.

De motu Organi Tractorij.

IX.

QVoniam tractoria organa imperfecta sunt, nec præstare quidquam per se possunt, sed alterius operam requirunt, puta scalæ, lecti, scamni, quæ vbi non sunt, eorum vicem exhibet pavementum, terra q; ad prolapsa restituenda, mihi operæpretium videtur, quasi doceam in ludo, gratia eorum, quæ nunc tractantur, super scalam præparatam, organi motum enarrare.

Scala præparata ad Humerum restituendum in alam prolapsum.

X.

PAratur scala vna ex iis, quæ in communi vsu sunt, non lata, quæ oblique collocatos gradus habeat, siquidem talis luxatis reponendis est aliena, sed æque crassa sit, quadratis q; gradibus constet, leuatis angulis, ne corpora conterant, atq; in rotundam figuram redactis. huiusmodi scalæ vbi copia non sit, quo mollius corpora insidant, gradus lana inuoluantur. Ordinar autem ab humeri capite in alam excidente. Oportet igitur, vbi id restituitur, cuneum funibus suspensum collocare super gradum idoneum, cui brachium (vt ostendi) superimponatur, & per funes ad eum alligare. est autem ille gradus reponendo idoneus, quem retuli. brachio superiniectione q; adhibita suspendendus homo est sic, vt duos palmos à pavimento recedat: & cuneus ad gradum firmiter alligandus non temere, sed eo obseruato, vt ex partibus, quæ cum cauo quodam capitula est, ad humerum detur: quæ gibba iuxta est, ad latus. A cuneo vero deorsum versus alterius siue tertij gradus interuallo, organum ad scalam vincendum est per eos quos habet anulos, & funes, aut habenas, aut alia quæpiam traiecta. ipsa item scala in pavementum fortiter adigenda est, ne in extendendo moueatur, sed stabilis maneat, ac sine vlla inclinatione, quatuor præterea trochleæ, siue solidæ, siue ex duobus lignis curioliis factæ, alligentur, quarum duæ à summo gradu suspensæ deorsum spectent, duæ ab imo sursum. qua fabricatione parata cuneus ad id, quod prolapsus est reponendum, admoveatur, tenui lana molli que obuolutus, tum vt lignum quod durum est, circumdata lana minus tactu lædat: tum vt sudor, qui proprie oriri solet ala plurimum calefacta, magis que ægotantis metu ac labore, lana cuneo impolita combibatur. Hæc autem scala vel contineatur stabiliter ab assistentibus, vel extremis partibus in pavementum defigatur, cuneis que (vt propositum est) confirmetur. Illud autem in aperto est scalam bene longam esse debere, vt postquam demissa in terram fuerit, quod extat, vbiq; pro magnitudine eius, qui curatur, abunde longum sit. scala confirmata subsellium iuxta collocetur.

- A Cuneus funibus suspensus, ac super gradum alligatus.
- B Organum ad scalam alligatum.
- C Trochleæ duæ à summo gradu suspensæ deorsum spectantes.
- D Trochleæ duæ ab imo gradu suspensæ, sursum spectantes.
- E Subsellium.




De Humeri

A

De Humeri Capite in alam prolapsio.

X I.

Super subsellium homo ascendens, brachium super gradum traiciat, ita, ut cuneus apte in alam demittatur: post hæc duplicata habena media inter cuneum & humerum detur, capita quæ eius extrinsecus pendeant: deinde charchælius laqueus, vel alius æqualiter extendens, humero iniiciatur, non circa medium, ne lacertum vrgeat, sed citra lacerti tumorem vel ultra: hic enim cubiti inæqualitas laqueum deorsum labi non patietur, præterquam quod hoc modo vilius imponetur. sequuntur enim facilius ea corpora, quæ ampliori interiecto spacio adducuntur: quæ exiguo, difficilius. Circundato laqueo capita eius recta deorsum ducta ad clauum axis religuntur, & axis vel per vinctes, vel solis manibus conuertatur, ut eius conuersio directa ductione ab inferiori parte intendat. eodem autem tempore, cum aucta iam intentio est, subsellium subtrahatur, ut homo à scala pendeat, atque ita excitando reponi luxatum possit. Suspenso homine, minister assistens à posteriori parte utramque manum simul iunctam ad ceruicem eius adducat, collum quæ in contrariam partem cogat, id quæ fiat, quo tempore intēdimus, atque excitamus, cum laquei ægro iniecti postea laxentur. Nervis abunde diductis, debet qui reponit assistens, habenæ capita prehendere, cubitum quæ ad scalam repellens, humeri caput per habenam extrahere. quo facto remittenda intentio est, & ipse articulus sursum compellendus, ut in regionem pristinam reuertatur. Ratio directe ductionis ita habet. Sed ut tuto reponamus, optimum fuerit prius, quam nervi extendantur, habenis & crura hominis inter se & integrum brachium ad latus devincire, ne ob tormentum, quod in condendo articulo sentiet, vel super scalam ascendat, vel manu laquei capita contineat. Licet etiamnum alio intercedente motu ab inferiori parte extēdere: id qua ratione fiat, subiiciam. Iisdem omnibus factis, quæ præcepimus, cum ab inferiori parte extēdentes directa ductione utebamur, laquei capita per inferiores trochleas traiciuntur ab inferiori parte extra, atque ad axis clauum religantur: vel ducta ab exteriori parte versus internam ad axis vinctes vincuntur, ut axe versato alio intercedente motu ab inferiori parte extēdamus. Nihil item prohibet, quo minus eadem fabricatione parata duplici motu contrario intercedente ab inferiori parte adducamus: quod ad quem modum fiat, indicabimus. Laquei capita ad inferiores trochleas ducta, ibi que traiecta, ad superiores referuntur, tum deorsum attracta, ad axis vinctes alligantur, ut eius conuersio duplici motu contrario intercedente ab inferiori parte extendat. postquam abunde extēderimus, proximum est, ut impellamus eo, quo ostendimus, modo, ubi de directa ductione loqueremur. Hi sunt modi, quibus ab inferiori parte intendimus. Postquam reconditus articulus fuerit, subsellium ad scalam referendum est, ut æger super id statuatur, tam à scala, quam à cuneo remotus, collocato humero ut antea dixi. Verum, cum maiores nostri idem organum idoneum à superiore parte attrahendo tradiderint, sequitur, ut nos quoque à superiori parte extendendi rationē vobis aperiamus. Ergo (sicut dixi) placuit maioribus luxati restituendi modum, & à superiori parte adducendo, & in diuersa trahendo explicare. potissimum autem à superiori parte intendunt, ubi humerus non solum elapsus esset, sed etiam perfractus. spectemus igitur, quibus modis voluerint luxata restituere, à superiori parte intendentes. Scala igitur in cæteris eodem modo præparata, cuneum non amplius ex funibus suspensum, ad gradum alligant, sed solum superimponunt: funium vero capita admodum longa per superiores trochleas ab interiori parte extra traiciunt: post hæc deorsum demissa vinctibus, qui pro clavis sint, circumligant. His ita constitutis subsellium ad scalam ponunt, super quod homo ascendens, brachium superiniiciat, ut cuneus rursus in alam indatur: deinceps charchælium laqueum, vel alterum æqualiter extendentem humero iniiciunt, capita quæ eius deorsum ducta, ut contineantur, ad aliquem scalæ gradum devinciunt, quibus ita contentis axis conuertitur, per quā conuersionem cunei funis alio intercedente motu attractus à superiori parte intēdit. Nervis, quantum res postulat, intentis impulsus adhibetur, & per duplicem habenā extrahendo, & manibus sursum compellendo. Equidē



Septima Classis.

RRRRRRR

iij

huic

hunc reponendi modo non subscribo ea de causa, quam adiungam. cuneus elatus circumagitur, E qui cum sub ala non manet, articulus ex toto non reponitur, ac potissimum, ubi quis velit suspendere hominem excitando illum reponere. Ea vero extendendi ratio, quæ ab inferiori parte adducit, stabilis est cuneo super gradum collocato, & per funes alligato, ut antea diximus. At quo pacto nos à superiori parte adducentes firmiter restituamus, paulo post intelligetis, ubi condendi luxati rationem recensebimus. Ratio autem, quæ in diuersa diducit, sic habet: Cæteris omnibus ordinatis laquei capita non amplius ad gradum vinciuntur, sed ad axis clauum dantur: per se dantur, vel alio motu intercedente, ut prius scilicet per inferiores trochleas traiciant, tunc quæ ad axem deliguntur. Eadem nunc culpari possunt in hac in diuersa extendendi ratione, quæ paulo ante dicta sunt in illa, quæ à superiori parte extendit. ubique enim probo, cum is, cuius articulus reponitur, rectus collocatur, solam ab inferiori parte extendendi rationem adhiberi. Nunc proximum est, cum de humero in alam prolapsio dixerimus, ut de eodem quoque in priorem partem excidente pertractemus.

De Humeri Capite in priorem vel posteriorem partem excidente.

XII.

AD humeri caput in priorem vel posteriorem partem elapsum scala eadem ratione modo quæ præparata vel figurata, organo quæ & trochleis (ut antea dictum est) alligatis, rursus, ubi restituere volumus, subsellium iuxta ponimus, lana quæ vel linteis cõtegimus gradum idoneum, super quem restituamus: cui (sicut ostensum est) inuoluto ala insidat: tum carchesium laqueum, vel aliud æqualiter extendendi vim habentem humero (ut propositum est) circumdamus, cuius capita deorsum attracta ad organi axem religamus, quemadmodum ad humerum in alam prolapsum tradidimus, ut conuersus axis directa ductione ab inferiori parte intendat. eodem momento, quo intendimus, aliquis rursus à posteriori parte assistens, utraq; manu ad ceruices hominis data, corpus in contrariam partem repellat. Licebit autem in hoc casu magis & extendere & ducere ad inferiora. Subsellio itaque subtracto, homo suspenditur, ut simul & articulus excitetur, & quæ illi superiecta sunt, laxentur. ubi quantum reponendus articulus postulat, intenderimus, circumducendo impellimus: si quidem in priorem partem, humeri caput exciderit, ab ea sede, in quam venit, ad eam, ubi esse naturaliter debet, prominentiori palmæ parte vrgemus, atque altera manu cubitum à posteriori parte in priorem adducimus, quo facto minister assistens manum apertam lato scapularum ossi opponat, atque id repellat, ne vis operæ resoluatur: verum, si in posteriorem partem prorupat, contrarium fieri debet, humeri quidem caput prominentiori parte palmæ vrgendum est, ut à lato scapularum osse in suam sedem reuertatur, atque altera manu cubitus ad posteriorem partem prorsus adducendus. Hac igitur ratione humeri caput restituendum ducimus, ubi in priorem vel posteriorem partem eruperit. Sed alij in utroque casu eam reponendi rationem probant, quæ à superiori parte extendit. hoc, quo pacto agat, videamus. Scala eodem modo parata duplicatæ habenæ vel funis medium lana vel linteis inuolutum alæ subiiciunt, capita quæ eius per superiores trochleas traducta deorsum ad axis vertices tanquam ad clauos alligant: deinde humero carchesium laqueum, vel alium, qui equaliter extendere valeat, circumdant, cuius capita deorsum demissa, ut contineantur ad aliquem scalæ gradum deuinciunt. quibus ita constitutis axis conuertitur, quo conuerso & continetur, & à superiori parte intenditur: ac postquam abutitur extendunt adducendo impellunt. At cum in diuersa contendant, capita laquei vel directæ ductione vel alio intercedente motu, funis vero per alium motum interiectum, ad axis clauum alligant, ut conuerso axe in diuersa diducant: postquam satis intenderunt, adducendo impellunt. Intentiones quidem succedunt, sed impulsus fallax est, siquidem hominem excitato, & suspensione distracto, ægre articulus restituitur, atque ob hanc causam nunc placuit extendendi rationem tam à superiori parte, quam ab utraque præterire. Humeri ergo caput, in quacumque parte venerit, conuenit ab inferiori parte extendendo reponere, cum erectus homo collocatur. Qua via humeri caput restituatur, exposuimus. Pergamus igitur ad cubitum.

De Cubito.

XIII.


AEque duo brachij ossa in quatuor partes erumpunt, in interiorem, exteriorem, priorem, & posteriorem: atque ubi in tres partes venerint, exteriorem scilicet interiorem & posteriorem, brachium curuatur, & extendi non potest. Commune est horum trium casuum, in quibus curuum brachium minime extenditur, scalam cum organo (ut dictum est) ad restituendum parare: postea hominem iuxta scalam collocare, ut super subsellium ascendens brachium super conuenientem scalæ gradum iniiciat: tum ea iunctura, quæ palma nuncupatur, humerum continere, & laqueum in æqualiter extendentem, ut attollentem chiasmum aut nauticum, brachio in vicinia manus circumdare, eius quæ capita ad unum scalæ gradum, ut retinacula sint, deuincire, ut ubi vis adhibetur, recti anguli figura fideliter conseruetur: eo quæ facto mediū duplicatæ habenæ, brachio prope cubitum deuincere, capita vero deorsum ducere ad axem, ibi quæ vel directæ ductione ad axis clauum alligare, vel alio intercedente motu, non secus ac ubi humeri caput reponitur, ut similiter axis conuersio ab inferiori parte intendat. Traditur etiam ad cubitum ille reponendi modus, qui à superiori parte extendit, cuius ratio est hæc. Cæteris omnibus (ut propositum est) constitutis, humerus non amplius, ut contineatur, deuincitur, sed laqueus carchesium, aut alius ex istis, qui æqualiter extendunt, ipsi circumligatur, cuius capita ad superiores trochleas adducta ab interiori parte in exteriorem attracta deorsum feruntur, & ad axium vertices quasi ad clauum alligantur: duplicatæ vero habenæ capita

A capita deorsum adducta, vt retinacula sint ad aliquid immobile dantur. conuerso igitur axe & cōtinemus, & alio intercedente motu à superiori parte extendimus. At modus, qui in diuersa extendit, hinc manifestus est: vbi enim in diuersa extendimus, laquei capita per se ad clauum axis vel alio intercedente motu ad eiusdem vecies deligantur, vt eadē conuersio in diuersa extendat. Nervus, quantum res postulat, extentis conuenienter impellere oportet, adducendo, si luxata in duas partes venerint, in interiorem scilicet & exteriorem: extrahendo, si in posteriorem: quas impellendi rationes in opere de articulis exposui. Hec igitur fieri debent, quando cubitus in propolizas partes erumpit. Verum, si in priorem, in quo casu diximus extensum brachium non curuari, iterum eadem scala atq; organum comparatur, ager scalæ assistens brachium super eodem gradum imponit, humerus ad scalam per eandem iuncturam vincitur, laqueus æqualiter extendens ad brachium datur in vicinia manus, cuius capita deorsum feruntur ad organum, vt ab inferiori parte attrahantur. si quis autem velit agere hoc tum continendo, tum à superiori parte adducendo, humerum non amplius ad scalam deuinciat, sed vtriq; membro laqueū iniiciat, qui æqualiter intendant, vnum scilicet humero, alterum brachio: et superioris quidem laquei capita sursum ferat ultra caput, alterius vero deorsum, vt (quemadmodum in alijs reponendi rationibus declarauimus) extendat. quod vbi abunde fecerit, nunc reponendi causa duo modi impellendi possunt

Brauius aptantur, qui premūt, & qui circumducit. sed ante quidem premere conuenit, dum intentio adhuc manet, dehinc circumducere: quos impellendi modos multo ante exposui in opere de articulis. Oportet autem eo, quod luxatum est, restituto, brachium curuare atq; extendere, pronum q; & supinum collocare, vt ex toto restitutum esse intelligas: tum ad angulum rectum in sequentem curationem figurare. Vtraque igitur brachij ossa, vbi loco suo non sunt, per superiores modos reponuntur. verum quoniam vtrunq; per se proprie vitiatur, cum suo loco mouetur, post hac necesse est

Cscribamus, quo nam modo cubitus erumpens, radius que diductus ab inferiori parte extenti reuertantur.

- A Cuneus sub ala per funes suspensus.
- B Organum ad scalam alligatum.
- C Trochlea à summo gradu suspensa.
- D Trochlea ab imo gradu suspensa.
- E Subsellium.
- F Iunctura, quæ palma nuncupatur.
- G Laqueus attollens in vicinia manus.
- H Capita laquei, vt retinacula sint, ad scalæ gradum deuincta.
- I Medium duplicatę habentę prope cubitum iniectum.
- K Capita ad axis clauum directā ductione alligata.




D

De Cubito & Radio.

XIIII.

Mouetur per se cubitus interdum loco, & rursus per se radius diducitur, ijs modis, quos in opere de articulis declarauimus. Ad hæc igitur ossa restituenda, scala similiter paratur, humerus q; ad gradum vincitur ea iunctura, quæ palma dicitur: ad ipsum vero brachium vtiliter datur laqueus aliquis ex ijs, qui inæqualiter extendunt, cuius laquei sinus à parte, quæ restituitur: capita à contraria, hoc est ab integra collocent. proprie enim laquei, qui inæqualiter extendunt, eas partes magis cogunt, quibus linus hærent: minus vero, quibus capita. siquidem consilium est, vbi superius os excidit, ab inferiori parte attrahere: ad id, quod suo loco est, vim minime adhibere. Huius igitur laquei capita ad axis clauum dari debent, vel directā ductione, vel alio motu intercedente, vt conuersio axis ab inferiori parte extendat. sed vbi, quantum restituendum os poscit, extenderimus, idoneis impellendi modis vti conuenit, cubito quidem in interiorem partem excidente,

excidente, radio' q; in exteriorem adducto, vtriusque manus digitos inter se iunctos eminentiæ E
cubiti subiicimus, prominentiores' q; palmarum partes vtrinque ponimus, atque his summo pe-
re vrgentibus adducimus: sed, si in posteriorem partem prorumpant, cubitus præsertim, ea repo-
nendi ratio efficacissima est, quæ extra-
hendo impellit. sin radius in priorem par-
tem conuertatur, expedit premendo & cir-
cunducendo impellere, quemadmodum
ostendimus, vbi vtrunque os in priorem
partem elapsum ponebamus. exquisitos
autem reponendi modos in opere de arti-
culis exposuimus. Repositi autem ossis
indiciū erit, in cubito libera brachij cō-
tractio atque porrectio: in radio, in pro-
num vel supinum habitum conuersio.
Quo modo igitur per scalā homine ere-
cto restituere luxatum conueniat, demō-
strauimus. verū quia iusta aliqua de cau-
sa, aut ob imbecillitatem, aut ob femur,
seu crus simul comminutum, æger stare
nequit, dum luxatum restituitur, neces-
se est in sequentibus aperire, quæ ratio sit
restituendi, homine super planam sca-
lā iacente.



- B Organum ad scalam alligatum.
C Trochleæ superiores.
D Trochleæ inferiores.
E subscellum.
F Iunctura, quæ palma nuncupatur.
G Laqueus inæqualiter extendens.
H Capita laquei duplici intercedente motu
ad axem data.


*Quo pacto iacente homine restituitur Humerus
in alam prolapsus.*

XV.

Scalam collocare planam oportet, & vt à pauimento attollatur, extremitatibus lapides vel ligna ab vtraq; parte subiicere, atque equandi gradus causa linteum superimponere: huiusmodi enim lectus, quod pertinet ad ægrum iacentem, dum restituitur, scamni munus præstabit. organum vero ad scam alligandum ab inferiori crurum extremitate, rursus q; trochleg (quemadmodum dictum est) binæ à superiori scalæ parte, totidem ab inferiori vincienda. satius autem est ad luxata restituenda pro scala adhibere scamnum, quod ab altero extremo quadratis fossis excavatum sit, vbi organum firmiter insistat. quæ preparatio esse debeat, dictum est: modos autem, quibus humeri caput restituitur, exequemur. Prolapso igitur humeri capite collocare hominem cōuenit, sic vt iaceat super scam, organo ad pedes constituto, supinus, vbi in alam vel priorem partem excidit: in ventrem, vbi in posteriorem. Igitur, vbi in alam conuertitur, funis capita super caput à priori vel posteriori parte adducenda, medium q; habenæ duplicatæ dandum est ad humerum sic, vt inter ipsum & cuneum demittatur, capita q; eius ab exteriori parte ferantur, atque ita pendeant: post hæc laqueus charchesius, vel alius ex ijs, qui æqualiter extendunt, humero (vt supra ostensum est) iniiciendus, cuius capita deorsum ad organum adducenda. cum capita ergo ad pedes ferantur, agemus vel continentes, & ab inferiori parte extendentes, vel in diuersa trahentes, siue directis ductionibus vtamur, siue alius motus intercedat, vt antea indicauimus. cum factis extenderimus, condere humerum debemus, idoneam impellendi rationem adhibentes: præcipue autem duplex impellendi ratio idonea est, & quæ articulum extrahit, & quæ sursum compellit. manente intentione duplicatæ habenæ capita tenentes vi humeri caput extrahimus, eodemq; momento cubitum in interiorem partem ad latus repellimus: eo enim fit, vt humeri caput facile prompte q; in exteriorem partem ducatur, moueatur q; quo facto remissa intentione, protinus sursum compellimus: post hæc humerum prehendentes attollimus, vt in suum locum collocemus. Hæc sunt quæ fieri oportet, vbi humeri caput in alam excidit.

A Cuneus

- A** Cuneus alligatus ad funem, cuius capita dantur ad gradum supra caput.
B Organum ad scalā alligatum.
C Trochlea a summo gradu suspēsa deorsum spectantes.
D Trochlea ab imo gradu.
E Habena media demissa inter cuneum & humerum, cuius capita spectent in partem exteriorem.
F Charchesius ad humerum datus.

**B**

De Humeri Capite in priorem vel posteriorem partem excidente.

XVI.

Sed si humeri caput in priorem vel posteriorem partem conuertatur, homine (vt dictum est) figurato, nempe supino, si in priorem partem venit, in ventrē: si in posteriorem, tunis aut habenā, mediū lana siue linteo obuolutum, alā subiicitur, capita q; supra caput feruntur, non quidem ē regione vitiati humeri, sed obliqua versus partem cōtrariam ad rē aliquā immobilem vinciuntur, qua retineant. Ambigitur vero, quāobrem capita non recta ferant, sed versus cōtrariam partem obliqua. Pasocrates quidem atq; alij non nulli hoc ea de causa fieri aiunt, ne a medio funis humeri capite sursum attractio prohibeamur, quo minus ab inferiori parte extendamus: sed decipiuntur similitudine femoris, cum res aliter habeat, siquidem femur ad Γ literæ similitudinē declinat, at humeri caput dimidium orbiculatū est, neq; potest femoris modo a medio tunc sursum adduci, quorsum igitur id fit: ne sub medio fune, quē sub ala sunt compressa, alie regionem compleant, completo. n. recessu, humeri caput locū non habebit in quē recondat. Nos ēt non secus atque ij, qui non multo ante nos vixerunt, ob propositam causam, habenā vel funem similiter collocamus. Consueuimus interdum & aliter cōtinere, duos. n. laqueos ex ijs, qui inequaliter extendunt, implicātes, thoraci dorso q; sub alijs circūponimus, eorum q; capita continēdi causa ad gradum, qui cōtra situs est, alligamus: qua continēdi ratione adhibita laqueū equaliter extendentē humero circūponimus, quēadmodum tradidimus, quā de humeri capite in alam prolapsio: cuius deinde laquei capita ab inferiori parte ad organū denutimus, & ad axē deuincimus, vt eō cōuerso cōtineamus, & ab inferiori parte pariter extēdamus. Vi, quantū res exigit, adhibita, vt articulū restituamus, premēdo impellimus. pminentiori. n. vnus manus palma vi humeri caput cōprimimus, altera vero cubitū huc atq; illuc agitamus. Indicium autē repositi ossis in superioribus explauimus. Fit etiam interdum, vt ad humeri caput luxatum, mediū quoq; humeri fractura accedat, cogatur q; medicus eodē tempore vtriq; vitio subuenire. Docēdi autem gratia sermioni insitit, qui eum casum explicet, vbi & caput humeri in alam excidit, & medius humerus comminuitur.

De Humero fracto simul & prolapsio.

XVII.

Quasitum est a maioribus nostris, qua via hęc restituant. Pasocrates quidem os suo loco motum primo restituit, q; maiorē vim in restituēdo postulet, q; fractura. At si quis sub fractura laqueum injiciens eodē momento velit tā quod fractum est, q; quod excidit, restituere, dum vis ad luxatum, quantū postulat, adhibetur, fractura plus iusto intenta partes fracturæ superiectæ ultra debitum extentæ lædentur, resoluentur nerui aut abrumpentur, & fortasse corpora tota, priusq; articulus laxetur. atq; hac de causa censuit ipse laqueum super fracturam imponendum, & ante quod luxatum, dein quod fractum est, restituendū. Voluit Aristion eodem tpe, & luxatum & fractum humerum restituere, ne si luxatum prius reponat, dum fractura componit, prę vi positum humeri caput erumpat. Quę dicuntur in vtroq; casu sequi detrimenta, vere sic habent, quapropter nobis placet, ante articulum reponi, pxiime q; fracturam curari, ea cautione, ne dum quod fractum est, ab inferiori parte extendit, articulus elabatur. Ad luxatū igitur restituendū cuneus a funibus dependens in alam conijcitur, rursus q; capita funis sursum adducuntur super caput: humero super fracturam Charchesius laqueus imponitur, vel alius, qui æqualiter extēdat, eiusq; capita, deorsum demissa, vt retineantur ad aliq; moram, vinciuntur, atq; a superiori parte attrahendo articulus reponitur. quo facto cuneus in ala relinquitur, vt humeri articulus maneat, laquei vero capita inferiori parte resoluuntur, & super caput adducta tanq; retinacula vinciuntur, vt vtriusq; præsidio cunei scilicet & laquei, articulus suo loco seruetur. post hęc Charchesius laqueus, vel alius æqualiter extendens humero injicitur, cuius capita deorsum demissa ad axem, vt ab inferiori parte intendant, religantur. quo fit, vt fractura ab inferiori parte intenta componatur, superiori articulo non excidente. Hactenus de humeri capite, nunc de cubito.

De Cubito

Cubito in illas tres partes conuerso, in quas ubi procidit, brachium curuum est, neq; extenditur, homo resupinandus est super asserem scalæ insidētem: alligatis trochleis organo quo ab inferiore parte, laqueus inequaliter extendens brachio prope manum iniiciendus, cuius capita super caput adducta ad oppositam moram alligētur: tum duplicatę habentę medium iuxta cubitum dandum, capita q; eius deorsum adducenda. Dantes igitur capita, laquei quidem humero inieci, supra caput, duplicata vero habenę, deorsum, continebimus simul & ab inferiori parte extendemus, ut ostensum fuit in superioribus. neruis abunde intentis eo modo impellemus, quę paulo supra diximus, cum de erecta scala pertractauimus. At si in priorem partē elabatur, in quo casu brachium extenditur, resupinato iisdem homine, laqueus æqualiter extendens humero iniiciatur, capita q; eius super hominis caput attrahantur: tū alter laqueus æqualiter extendens ad extremum brachium alligetur, eius q; capita deorsum ducantur. intentionem vero à pedibus adhibendam esse antea exposui. Eodem autem modo, ubi articulum restituiimus, impellere oportet, premendo scilicet & circumducendo, eadem q; ratione, quę in opere de luxatis dicta est. verum, si alterum os præter naturam habeat, siue cubitus excidat, siue radius diducatur, laqueo rursus æqualiter extendente ad humerum dato, capitibus q; eius sursum super caput adductis, ut retinacula sint, brachio laqueus iniicitur, qui inequaliter extendat, quemadmodum explicauimus: capita q; eius deorsum ad organum, adducuntur, & iisdem impellendi modi accommodantur. Absoluimus iam sermonem vniuersum de cubito atque humeri capite, restat, ut ad manum accedamus.

De Manu.

XIX.

Manus in quatuor partes mouetur, interiorem, exteriorem, priorem, & posteriorem. Restitui autem debet, vel super scamnum, vel super scalam, quæ plana collocetur. Homine itaq; iuxta scalam vel scamnum sedente, figuret manus, supina, si in interiorem partem erupit: prona, si in reliquas tres. deinceps circa sinum manus, ferramentū, quo adurimus transuersum vel transuersus axis detur, atque ad ipsam palmam vinciatur: tum extremitatibus, propositi vectis seu ferramenti, sinus laquei inequaliter intendentes vel medietate habentę iniiciantur, capita q; à priori parte ad organum ferantur. Brachio autem in vicinia manus circumligetur laqueus æqualiter extendens, cuius capita ferantur à posteriori parte: rursus q; intentio adhibeatur, quę paulo ante exposita est: vel continendo, & seu ab inferiori seu superiori parte extendendo, vel in diuersa adducendo, postq; abunde intēderimus, impellere debemus, quemadmodum in libro de luxatis exposuimus: præmedo, ubi in interiorem vel exteriorem partē venit: ubi in priorem et posteriorem, adducendo. Sed venio ad spinā.

- A Organum ad scalam alligatum.
- B Trochlea.
- C Ferramentum datum ad sinum manus.
- D Sinus laquei dati ad ferramenti extremitatē.
- E Laqueus æqualiter extendens brachio iniectus in vicinia manus.



De Spina.

XX.

Spina gibba ex recenti ictu restituitur. Oportet in restituendo hominem prouum collocare, vel super scalam, cuius gradibus asser iniectus sit, vel super scamnum, trochleas q; (ut dictum est) adhibere: post hæc ad spinam dare binos laqueos æqualiter extendentes, vnum à superiori parte gibbi, alterum ab inferiori: vel quaternos ex ijs, qui inæqualiter extendunt, inter se oppositos, binos à superiori parte, totidem ab inferiori: et superiorum quidem capita sursum, inferiorum vero deorsum adducere, siue ut retinacula sint, & vel ab inferiori vel à superiori parte intendant, siue ut in diuersa diducant, verum, ubi in diuersa diducimus, trochleis utimur aliō intercedente motu agentes. Postquam abunde intēderimus, eo modo impellimus, quem in libro de articulis enarrauimus. Sequitur autem, ut de modis reponendi femoris pertractemus.

De Femore.

XXI.

Femur in quatuor partes prorūpit, interiorem, exteriorem, priorem, & posteriorem: atq; ubi in tres partes conuertitur, crus extentū est, & curuari minime potest: q; si in posteriorem partē prolabatur,

A labatur, curuatur, sed non extenditur. Igitur, si in illas tres partes venit, vbi extensum crus minime implicatur, resupinandus homo est super scalam vel scamnum, & duplicate habene vel funis medium lana seu linteo circumdatum inter anum & naturale injiciendum, capita q̄ eius super caput adducenda. Sin in exteriorem quidem & priorem partem femur eruperit, media habena variè quacunque parte inter anum & naturale dari potest: sed, si in interiorem partem exciderit, inter femur integrum adhibenda est, & articulum, qui restitui debet, ne si femoris capiti subiecta fuerit, membrum ab inferiori parte attrahi non sinat. quo facto Charchesius laqueus vel alius equaliter extendens femori extremo circumponendus est, capita q̄ deorsum ad organum ferenda, & ad axis clauum alliganda, vt adhibitis retinaculis conuerso axe contineamus, & ab inferiori parte extendamus. Nihil item prohibet, quo minus à superiori intēdamus, quemadmodum dictum est, quā de humeri capite. Neruis, quantum satis est, diductis, iisdem vtendum est impellendi modis, quos in opere de articulis indicauimus. At, si femur in posteriorem partem prolabitur, vbi complicari crus diximus, sed nullo modo extēdi, organo ab inferiori parte alligato æger sedeat: magis tamē in supinum habitum conuersus, in alteram coxam inclinetur. post hæc contineatur, sicut in opere de articulis ostendimus. tunc Charchesius laqueus, vel alius æqualiter extendens, femori circum-

B detur, eius q̄ capita deorsum demissa, vt ab inferiori parte extendant, ad axem religuntur. neruis, quantum res postulat, intentis, oportet eadem ratione in restituendo impellere, quæ in opere de articulis expolita est, spatha premendo idonea extrahere, & femoris caput in exteriorem partem adurgere: sic q̄ crure deorsum extēto, atq̄ homine resupinato articulus reponitur. Crus autem restitutum testatur eius flexus, atq̄ porrectio: in quamcunq̄ enim partem venerit, vbi restitutum est, liberam eius actionem spectamus, flexum scilicet & porrectionem.

De Genu.

XXII.

Genu in tres partes erumpit, interiorem, exteriorem, & posteriorem: vbique autem crus extensum est. Si in interiorem & exteriorem partem veniat, hominem resupinare conuenit: si in posteriorem, prouum collocare, tunc que laqueos æqualiter extendentes membris injicere, vnum quidem femori prope genu, alterum cruri super eam regionem, quæ carnosā à posteriori parte prominet: rursus q̄ organo ad inferiora deligato, easdē adhibere intendendi rationes, quæ in alijs luxatis sunt ostensæ, impulsus q̄ in opere de articulis declaratum.


De Tallo.

XXIII.

Talus modo in interiorem, modo in exteriorem partem prolabitur, non nunquam etiam in posteriorem. Rursus itaq̄ oportet hominem sedere, extēto q̄ cruri laqueum imponere, qui æqualiter extendat, eius q̄ capita ad posteriorem partem porrigere: ad talum vero sandalum, vel draconem laqueum dare, capita q̄ à priori parte ad axem adducere, cōtinendo q̄ ab inferiori parte extendere, & iisdē vti modis impellēdi, quos in opere de luxatis explicauimus. Restituendū rationē præterimus, quoniā de hac præcipue agimus, vbi organorum, quæ plana collocantur, præsertim q̄ nostri machinamenti, motum declaramus.

D

A Laqueus iniectus cruri æqualiter extēdēs.
B Sandalius laqueus ad talum datus.



Glossocomum Nymphodori.


XXIII.

Glossocomum Nymphodori tractoriū, organū est quadratū. hēt autē duo latera, q̄ extremis partibus p̄ duo transuersaria inter se iungunt. laterū vero & transuersariorū eadē est magnitudo, sunt. n. lōga lata q̄ duos palmos, crassa digitos totidē. quare, quū equalis sit eorū modus, iure glossocomum ex eorū numero est, q̄ proprie quadrata appellant. Media igit latera exculpta, cauata q̄ sunt cauis nō nimis alte penetrantibus, q̄bus includit axis hñs i medio tympanū, cui ab vtraq̄ parte ferrei vnci sunt, duo in vniuersum, vel foramina, in q̄ possint conijci funes. quorū hæc ratio est. Funes duo vncis medijs circūligantur, & ab vtraq̄ parte p̄pe foramina nodū accipiunt: quorū capita, quū quatuor sint, duo trahunt p̄ transuersariū prius, ab interiori parte extra: reliqua duo p̄ id, q̄ posterius

posterius est. Secundum tympanum cochlea speciem lentis referens recta collocatur, hæc compo E
sito vocabulo græce *κοχλιάξων* dicitur. eius extremitas demittitur in cauum nō penetrans prio-
ris transuersarij: pars vero, quæ cochleæ modo striata est, iuxta tympanum collocat: quod superest
ex eius longitudine per foramen transit, extrema q̄z parte baculum versans habet, quo torquetur,
vt cochlea per id versata tympanum moueat, cōuerso hoc axis versetur, quo moto funium capita,
quæ extra procedunt, ad intendendum ducuntur. Sunt item in glossocomo opercula, vt quæ in eo
sunt machinationes occultentur: tum quatuor anuli ad latera fixi, bini ab inferiori parte, totidem
à superiori, ea de causa, vt alligari organum possit. Huius fabricationis auctor est Aristion filius
Pasicratidis, siquidem aliter structum fuit à Nymphodoro. in vetusta. n. structura extat cochlea nō
per transuersarium, sed, quæ opercula sita sunt, traiecta. duas enim forlices ferreas ad latera affixas
habet ad medium pertusas, quarum vna axi subiicitur, altera superponitur, utraq̄ à latere tympa-
ni collocatur, inferior angustius foramen habet, superior latius. Cochlea igitur ab ea parte, qua
opercula sita sunt, traiecta, atque à forficibus contenta, alterum operculū sine impedimento clau-
ditur: alterum claudī non patitur pars cochleæ, quam penetrare diximus, cui q̄z baculum versans
affigitur. hoc itaq̄ operculum medium transuersum in duas partes secatur, quarum altera manet
immobilis, altera clauditur: atque hæc media in longitudinem lunata figura exciditur, vt, quum F
operculum clauditur, lunatum eius cauum propositam cochleæ partem excipiat. Hanc Nympho-
dori structuram non accepit Aristion, sed adiecit organo axem habentem tympana foramina q̄z,
vt axis, qui in medio est, motus, vbi velis, consistat, & vi minime voluatur: transulit item anulos
iuxta prius trāuersarium, ne organum à parte operculi, sed à parte prioris transuersarij alligetur.
traiecit præterea funium capita per opercula, hæc quidem à superiori parte, illa vero ab inferiori.
quod quidem pertinet ad anulorum situm, vnā nobiscum sentit: sed axem, quem adiunxit, tan-
quam superuacaneum reijcimus, siquidem vnus axis ex robusta materia præparatus, quod opus
est, abunde efficit. Sed cum glossocomi fabricationem absoluerimus, sequitur, vt ad eius motum
veniamus.


- A Latera.
- B Transuersarium prius.
- C Transuersarium posterius.
- D Cauum non penetrans.
- E Axis habens tympanum in medio.
- F Foramina in quæ funes conici possint.
- G Funes duo.
- H Capita funiū traiecta per prius transuersariū.

Nymphodori Glossocomū clausum.



- I Capita funium per posterius transuersarium traiecta.
- K Cochlea speciem lentis referens.
- L Manubriolum.
- M Quatuor annuli in transuersarijs.
- N Ferrea forfex.
- O Pars operculi, quæ manet immobilis.
- P Pars operculi in lunatam figuram excisa.
- Q Axis habens tympana foramina quæ.

Nymphodori Glossocomū apertum.



A

De motu Organi.

XXV.

Vbi humeri caput suo loco mouetur, præcipue q̄ si in alam veniat, ad scalā eodem modo paratam, quo in Nilei Plinthio explicauimus, nunc pro Plinthio Glossocomum alligetur, nō ab operculis, ne sub cochlea habentē abrupantur, sed à priori trāsfuerario, anulis prope ipsum affixis. Aperiantur item opercula, capita q̄ funium ad axem alligata excipiantur, hæc quidē à superiori parte, illa vero ab inferiori: ac deinceps, vbi restituere volumus, subsellum prope scalam ponatur, super quod homo ascendens brachiū sic transeat, vt indatur cuneus in alā: circūligetur in super humero Charchesius laqueus, vel alius aqualiter extendens, eius q̄ capita ducantur ad superiora funium capita, vt machinationum motu aut directis ductionibus ab inferiori parte intendamus, aut alio intercedente motu, aut per duos contrarios motus interiectos, hoc modo: Laquei capita per inferiores trochleas traiciantur, et cum funium capitibus colligentur, apto rursus fit, vt machinationes motæ, alio intercedente motu ab inferiori parte extendant: verum, si per superiores laquei capita traiciantur, deinceps per inferiores demissa ad funium capita vinciantur, rursus machinationum motus per duos contrarios motus interiectos ab inferiori parte extēdit. Impulsus vero, quos deinde res postulat, fiunt, quemadmodum dictū est, vbi humerus in alam prolabitur, & per duplicem habentē extrahendo, & intentione remissa per manus furtum compellendo. Retulerunt alij organum hoc, vbi à superiori parte extendere volumus, idoneum esse, trāserunt enim ipsum ad superiorem partē supra caput, cuneum q̄ ad gradum adhaerentem, solutum tñ, in alam coniungunt: deinde capita funium cunei, ad inferiora capita funium organi religant, et Charchesium laqueum humero iniiciūt, cuius capita deorsum adducta ad imum scale gradū immobilē deuinciunt, vt per hæc retinaculis adhibitis directis ductionibus à superiori parte intendāt. Licet etiam organo ab inferiori parte alligato à superiori extēdere alio intercedente motu: alligatis enim laquei capitibus, vt (quemadmodum dictū est) retinacula fiat, cunei funium capita per trochleas traiecta cum superioribus capitibus funium organi vinciunt, vt machinationibus motis alio intercedente motu à superiori parte extendant: aut laquei capitibus non amplius retinaculi vicem exhibentibus, sed ad funium organi capita alligatis, vel ad superiora directis ductionibus, vel alio intercedente motu ad inferiora idem præsent: cum q̄ abunde extenderunt, eosdem adhibēt impulsus, quos paulo ante proposuimus. Quæ relata sunt, adscripsimus, probamus autem & in hoc, quod de Nilei Plinthio diximus, vbi scala erecta collocetur, intentionem ab inferiori parte adhiberi, cuneo ad scalam alligato: eam vero, quæ vel à superiori parte trahit, vel in diuersa deducit, ex toto prætermitti, eiusmodi siquidem imbecilles sunt. Quod si homo iaceat, sic interdum censui luxatum reponi, contentus sum propositis reponendi rationibus exempli causa propter organi motum huc allatis: omnia enim luxata per hoc quoq; instrumētum reponi possunt, non secus ac per Nilei Plinthium. Vtriusque machinationes sunt diuersæ, sed reponendi rationes eadem, sic, vt liceat ex superioribus vniuersum huius organi motum intelligere.

Trispassium Apellides, seu Archimedes.


XXVI.

Illud in primis scire conuenit, quod neque Apellides, neque Archimedes medici fuerunt, sed Architecti, qui machinamentum hoc excogitarunt (quemadmodum nos accepimus de hiliaria,) ad naues deducendas funibus non per manus, sed per ergatam attractis: illius autem seculi medici eius structuræ modum minuentes trispassium organum medicinale ad luxata fracta que restituenda fabricarunt in hunc modum. Totum organum ex eorum genere est, quæ oblonga quadrata nuncupantur, est autem hoc modo compactum. Duo latera longa palmos quatuor digiti crassitudine inter se coagmentantur per trāsfueraria longa palmos duos, crassa digitiū, latitudo potissimum posterioris trāsfuerarii sex digitos æquat: prioris propter opercula palmos duos. Vt retulit autem Palicrates, media latera excauata sunt, cauis non nimis alte penetrantibus, quibus duo axes includuntur rotas habentes in vicinia laterum, vtriusque axis rotæ perforatæ sunt peruijs foraminibus, quæ non alia de causa facta sunt, nisi vt in ea funes immittantur, quorum ratio hæc est. Funes duo extrema parte nodum accipientes, coniecti in prioris axis foramina attrahuntur ita, vt nodi super foramina collocentur: tum funes circa suas vterque rotas inuoluuntur: & per posterioris axis foramina traiectionem nodum accipiunt. Posterior axis medius inter rotas foramen habet, in quod rursus funis conijci debet, sumitur funis longus, qui ab vtraque extremitate nodum acceperit: deinceps per propositum foramen traicitur sic, vt nodus foramini iungatur: post hæc circa medium axem inuoluitur: quo facto altera eius extremitas per posterius trāsfuerarium, quod medium perforatum sit, traicitur. at quid nunc sit fune traiectione manu tractus euolutus, que posteriorem axem conuertit, quo conuerso alia capita funium, qui extra procedunt, ducuntur. Adhibentur autem funes quatuor, duo, & item duo, atque ad hunc modum immittuntur. Sumuntur funes duo, qui extrema parte nodum acceperint, & per duo foramina prioris axis, quæ inter rotas sunt, traiciuntur attrahuntur q̄, sic, vt nodi foramina contingant, tunc q̄ funium capita per prius trāsfuerarium perforatum ab inferiori parte versus anteriorem traiciuntur, aut prehenditur funis vnus duplex, cuius capita coniecta in prioris axis foramina attrahuntur, vt medius funis inter foramina statuatur: postea eiusdem funis capita tran-

tur

tur per foramina transfuerfarij prioris. Duo item alij funes fumuntur nodo extrema parte deuin E
cti: hi per foramina inter rotas posterioris axis facta, et à medio foramine recedētia, attrahuntur:
qui deinde, vbi eorum nodi ad foramina peruenerint, tunc ducuntur, traiciuntur q3 per posterius
transfuerfarium perforatum, sic, vt quinq3 nunc sint funium, quæ extra feruntur, capita, duo per
prius transfuerfarium, tria per posterius, his posterioribus manu attractis, inclusis q3 funibus (vt di-
ctum est) inuolutis atq3 euolutis, capita eorum, qui exterius ferebantur, ducuntur, extendunt q3
capita habenarum, quibus distenditur corpus. Huiusmodi organi structurā Palicrates exponens
reprehendit tanquam minime efficacem. vniuersum enim organi opus consistit in ductione fu-
nis posterioris, qui manu attrahitur, at nequit manus in restituēdis luxatis vim tantam sustinere,
præsertim, vbi magni articuli sunt, & corpora robusta. quamobrem organi structuram immuta-
uit, duosque axes, qui inclusi erant, ita struxit, vt penetrarent, & priorem minorem exiguis ca-
pitibus extantem, posteriorem maiorem & longiora capita habentem, & ad prioris quidem axis
extantia capita clauos confixit: posteriori vero vērtes adiecit. demissis axibus duobus digitis ma-
chinamentum in restituendo sic mouit. Habenas extendendis corporibus iniectas ad extantia
prioris axis capita deligauit, vt posteriori axe conuerso prior moueretur, & euolutis inuolutis q3
funibus nerui extenderentur. Sed Aristion Palicratis filius patri aduersatur, vt vetustam organi F
structuram ignorantē. In vetusta enim (inquit) organi structura, axes non mouebantur in laterū
cauis, sed circa ferreos chodaces affixos lateribus in capreoli formam excauatis: quod videre licet
in organis ad aquam hauriendam comparatis, quæ ob fabricationis rationem facile conuertuntur,
neq3 tamen rotæ in se continent armillam, sed chodacem. quoniam igitur axes per armillas mo-
uentur circa chodaces, & rotæ per chodaces circa armillas, axes prompte admodum versabuntur,
atque idcirco sine impedimento erunt, etiam si funis manu ducatur. Ob id autem ipsum trispa-
stum organum appellatum est, quoniam tres funes agunt, vnus quidem extra ductus, duo inclu-
si. Hactenus ipse probabiliter scripsit, sed vera sunt, quæ à Palicrate adducuntur, nō enim potest
manus funem ducens bene restituere, sed fortasse monstrationis causa in ludo organum mouere,
vis autem, quæ in restituendo requiritur, per manum minime poterit adhiberi. atque ea de causa
ijsdem omnibus factis, quæ in vetusta scriptura sunt ostensa, tertium axem organo adijciendum
iudicauimus, cuius capita traiecta per latera essent, vt posterior axis nunc medius fiat, medius au-
tem perforetur: in extantibus capitibus vērtes demittantur, vel manubriola, aut bacula ductaria:
medius vero funis posterior, vbi circa axem est inuolutus, traicitur per foramen axis penetrātis,
suoque ibi capite alligatur. His ita constitutis conuersus posterior axis, ille inquam cuius capita G
extāt, funem circa se inuoluit: quo fit, vt me-
dius axis moueatur, quo moto prior quoque
axis mouetur. Tribus axibus cōuersis, funiū,
qui extra ducuntur, capita tēduntur, cum qui-
bus vinciuntur habenæ, quæ corpora exten-
dunt. Habet item organum opēcula, veluti
glossocomum, ne machinationes oculis expo-
nātur: atq3 item anulos ad latera affixos, qui-
bus alligetur. Hæc est vniuersi trispasti fabri-
catio. Restituēdi autem modi aptantur ijdē,
quos posuimus in glossocomo, distat enim so-
lum, quibus mouetur, machinationibus: præ-
terea funium eadē est ductio, habenis ad eos
alligatis. Sed iam trispasti fabricationem ex-
plicitam habemus.

- A Duo latera.
- B Prius transfuerfarium.
- C Posterius transfuerfarium.
- D Duo axes habentes rotas in vicinia laterum.
- E Funes circa rotas inuoluti.
- F Funis coniectus in foramen medium inter ro-
tas posterioris axis.
- G Funis duplex, cuius capita traiecta per forami-
na prioris axis, per prioris transfuerfarij fo-
ramina traiciuntur.
- H Tertius axis, cuius capita traiecta sint per la-
tera.
- I Vērtes in extantibus capitibus demissi.
- K Anuli ad latera affixi.



Fabri organum ad hunc modum fit. Super basim, quæ *κρηπίς* nominatur, pro organo dimen-
sam statuuntur crura duo, quorum longitudo duos cubitos & semissem aequat, aut etiam ex-
cedit: latitudo implet digitos quatuor: crassitudo tres. crura hæc per duo transuersaria inter se co-
agmentantur, altero ab inferiori parte, quod quinque palmos à basi recedat, altero à superiori, qua
crura finiuntur. inferiori transuersario subiicitur asser transuersus, qui & cum lateribus organi, &
cum transuersario committitur. hunc asserem sedile consuevit omnes appellare, cuius medium
ad transuersarium exciditur ad effigiem II inuersi, qua parte transuersario infigitur cuneum II. Ac-
commodatur tam cauum, quàm II demittendo priapisco octo digitos longo. Inter transuersaria
ab inferiori parte crurum canaliculi excauantur, in quibus, dum luxata reponuntur, moueatur
quadrata testudo, spatham & cubitos mouens. quandoquidem prior pars testudinis (frontem di-
cunt) peruiio foramine pertunditur, in quod radix coniicitur, cuius extremum, quæ extenuatur,
ad posteriorem testudinis partem per crassitudinem traicitur. Proposita pars radices peruiio fo-
ramine pertunditur, per quod fibula demittitur, ne radix euellatur, sed manens in foramine tor-
Bqueatur. Fibula autem in extrema radice scutulo superposito includitur. Radix eò pertinet, vt
spatham in organo sustineat, habet enim organum spatham capitulo leniter cauo assurgentem,
ita longam, vt à testudine ad superius transuersarium, quod caput nominatur, pertineat, & cunea-
ti axis modo excedat. Huius spathæ extremitas, quæ contra capitulum est, media in quadratam fi-
guram exciditur, atq; in id cauum includitur radices extremitas lata, quæ perforatur. perforatur
item spatha ab vno latere ad alterum, in quod foramen fibula demittitur, vt spatham detineat ad
radicem. Ipsa vero testudo iuxta medium pertunditur foraminibus quatuor, vel ordine disposi-
tis, vel duobus à priori parte, totidem à posteriori constitutis: quæ non alia de causa fiunt, nisi vt
funes in ea indantur, vt in sequentibus ostendam. Medium caput, hoc est superius transuersa-
rium in quadratam figuram excauatur: in quod cauum duplex trochlea inditur, quæ circa axi-
culum versatur. habet item superius transuersarium duo alia caua quadrata peruia, nempe ab
vtroque trochleæ latere vnum, in quæ coniiciuntur quadratæ cubitorum partes: duo enim cubiti
per superius transuersarium demittuntur deorsum, & testudini inhaerent, quæ quadrata caua in
summo habet. Imas cubitorum partes quadratas tenues quæ architecti calces nuncupant: su-
periores latas ac rotundas dixerunt alas. In alas ergo cubitorum, quæ superius transuersarium ex-
Ccedunt, & peruiis foraminibus pertusæ sunt, axis coniicitur: cuius capita vtrinque excedunt, me-
dium cuneatum est, in extremis capitibus vinctes sunt, vel manubriola ductaria, quibus conuertitur.
Alarum partes priores iuxta foramina & axis capita rursus forantur, vt, si quando opus sit, in
foramina fibulæ demissæ seruent axem immobilem. Organo præterea iuxta crurum extrema-
tes alia duo sunt adiuncta crura, vt, si quando sedilis vicem exhibeat, super basim atque adiuncta
crura iaceat. Verum, quia testudo per funem elata, & cubitos & spatham attollit, in sequentibus:
qua ratione funis indatur, adiciam. Sumitur funis duplex, cuius capita per duo foramina, quæ
vel iuxta cubitos sunt, vel à priori parte, vel à posteriori, vel in medio, traiciuntur, vel ab inferiori
parte sursum adducuntur sic, vt medius funis inter foramina collocetur: deinde capita sursum
feruntur, & circa duplicem trochleam prioris transuersarii inuoluuntur, atq; (vt dictum est) per-
mutata deorsum procedunt, & ad clauos penetrantis axis religantur: continetur enim organo
Fabri alius axis coniectus in crura, quæ super transuersarium inferius digitis quinque interpolitis
perforata sunt. In axis medio duo clauus sunt infixi, in extantibus capitibus vinctes vel manubriola
ductaria, quibus conuertitur axis, cuius conuersio per funes testudinem attollit: atq; vna cum spa-
tha simul cubiti & axis, qui alis continetur, sursum feruntur ad luxata, quæ à superiori parte ex-
Dtenta in suam sedem collocantur. Huiusmodi est antiqua structura organi, quod ad Fabrum re-
fertur auctorem.

Septima Classis.

SSSSSSS

A Basis


ORIBASIVS

- A Basıs.
 B Crura duo.
 C Transuersarium superius.
 D Transuersarium inferius.
 E Asser transuersus subiectus inferiori transuersario.
 F Medium assers excisi ad formam II inuersi.
 G Priapiscus.
 H Canaliculi excavati ab interiori parte crurum.
 I Quadrata testudo.
 K spata.
 L Cubiti.
 M Prior pars testudinis per uio foramine pertusa.
 N Radix.
 O Fibula demissa per radicem.
 P Capitulum spathe cuneati axis modo.
 Q Extremitas spathe in quadratam figuram perforata.
 R Foramina quatuor testudinis.
 S Duplex trochlea indita in cauum superioris transuersarii.
 T Cava duo quadrata superioris transuersarii, in quæ demittuntur cubiti.
 V Imæ partes cubitorum quadratæ.
 X Superiores cubitorum partes rotundæ, quæ alæ dicuntur.
 Y Axis in alas cubitorum demissus.
 Z Fibulæ demissæ in alas perforatas, quæ axem immobilem seruent.
 a Alia duo crura adiuncta.
 b Funis duplex.
 c Alius axis, qui in cruribus continetur.
 d Vectes, quibus conuertitur axis.
 e Binæ trochleæ ad basim.
 f Binæ trochleæ ad summa crura.
 g Cuneus.

De Motu


FABRI ORGANVM

E



FABRI ORGANVM

G




A

De Motu Organi.

XXVIII.

Cum erecta organa comparantur ad reponendum humeri caput excitando, & alijs quoque modis idonea sint, de humeri capite restituendo tractare constitui. ordiatur autem ab eo casu, sub quo in aliam prolabitur. Verum, ut organi motum perfectum habeamus, quaternae trochleae organo adnectuntur, binæ ab inferiori parte, qua basis sursum spectat, totidem a superiori ad summa crura: Vbi ergo luxatum restituere volumus, cuneata pars axis primum lana vel linteo circumdetur, subsellum quoque iuxta organum ponatur, super quod homo ascendat: deinceps vinciantur crura quidem habena inter se, sed integrum brachium extensum, ad latus: in foramina autem alarum indantur fibulae, ut axis seruetur immobilis, usque dum eo moto opus erit. His ita constitutis brachium super axem imponatur: atque ubi cuneata pars axis in aliam coniecta sit, laqueus Charchesius, vel alius aequaliter extendens, humero iniiciatur, eiusque capita deorsum adducta, ad clauum eius axis, qui cruribus annectitur, alligantur: fune non amplius indito, quemadmodum in organi fabricatione regulimus, axis conuertitio directa ductione ab inferiori parte extendet. id quod etiam, alio intercedente motu, ad hunc modum fit. Laquei capita primo per inferiores trochleas traducuntur: inde sursum data ad clauos axis alligantur, ut hic versatus propositam intentionem molitur. Idem B quoque efficitur duplici contrario motu interiectio. laquei enim capita per inferiores trochleas traiecta ad superiores feruntur: inde ad axis clauos vinciuntur, ut duplici contrario motu interiectio ab inferiori parte extendant. Tales sunt modi, quibus ab inferiori parte intendimus. Si quis autem a superiori intendere voluerit, fune in testudinem coniecto, veluti in organi structura posuimus, laquei capita deorsum adducat, & tanquam retinacula ad aliquid immobile deuinciat: post hanc axem conuertat: quo conuerso testudo alio motu intercedente, per funem elata, a superiori parte intendet. Ex his quoque ille modus comprehenditur, qui in diuersa extendit. hic non amplius requirit, ut capita retinacula sint, sed ab inferiori parte ad axis clauos vinciantur, vel per se vel alio motu intercedente, ut per vnum machinationis motum, propositus extendendi modus adhibeatur. Seruetur autem in intendendo axis immobilis, quemadmodum declarauimus. Postquam abunde intenderimus, fibulae, quae C moueri illi non patiebantur, recipiendae sunt, atque ipse per vectes vel manubriola ductaria conuertendus, ut cuneo aliqua ex parte inclinato, extrahendo impellamus, sicut in alijs organis ostendimus: post hanc dum restituiamus humero deorsum intento, minister a posteriori parte assistens manus det ad ceruices hominis, ut corpus versus pedum regionem cogat in contrariam partem. Verum, ubi restituiamus, ministro id praestante, quod ostendimus, subsellum pedibus hominis subiectum subtrahatur, ut ipse suspendatur ab organo: tum (ut alibi dictum est) eodem momento, quo ab inferiori parte extendimus, atque excitamus, per cuneum extrahendo impellemus: deinde intentione remissa sursum cogemus, utraque manu membro comprehenso, & ut in suum locum recondatur, elato. Hac igitur ratione humeri caput in aliam prolapsum restituitur.



Verum si in priorem partem aut posteriorem veniat, vertere sic axem oportet, ut quod ex eo cuneatum est, deorsum spectet: sursum, quod equum est: hoc siquidem nunc aptatur ad reponendum humeri caput, quod in oppositas partes eruperit. Eo facto homo super subellum, quod iuxta sit, ascendens brachium superponat, sic, ut axi insidat: deinde humero iniiciatur laqueus aequaliter extendens, cuius capita deorsum ad axem alligantur: eodemque intendendi rationes adhibeantur, quae traditae sunt, ubi in aliam excidit. Nervus abunde diductus impulsus conuenit, quem in aliorum organorum motione monstrauimus.

Sed si neque cubiti sint, neque axis in alas coniectus, humeri caput in aliam prolapsum ita restituitur. Agitur spatha sic, ut capitulum eius, perinde atque cuneata pars axis superius transversarium excedat: tum duplex habena media inter spatham & transversarium datur, cuius capita ab exteriori parte pendunt. In restituendo autem, eger ad organum assistens, brachium super transversarium imponit sic, ut spatha in aliam indat: post hanc Charchesius laqueus, vel alius aequaliter extendens, humero iniicitur. cuius capita

Septima Classis.

SSSSSSS ij

deorsum

deorsum demissa ad transuersarium vt retinacula deligantur: fune ad testudinem dato axis conuer-
sus testudinē, cum q̄ ea sphatham attollens, à superiori parte extendit. Aptatur itē ille extēdendi
modus, qui in diuersa ducit. laquei capita mutata ad axem alligantur, tunc liquidē conuersus axis
in diuersa diducet. postquam satis extenderimus, duplicis habenæ capita continenda sunt, &
per hanc ipsa spatha, vt per spatham extrahendo impellamus, quo facto intentio remittenda est,
membrum q̄ sursum adducendum, vt quā celerrime in suum locum articulus collocetur. At si
organum non spatham habeat, non cubitos, non axem illis contentum, humeri caput in alam ve-
niens per cuneum sic reponi debet. cuneus, in quem funes coniecti sint, superiori transuersario
insidat, & per funes ad ipsum vinciat: deinceps æger brachium superimponat, cuneus q̄ in alā
coniiciatur: quo cōiecto laqueus Charchelius humero circūligetur, eius q̄ capita deorsum demis-
sa dentur ad axem, qui cruribus continetur, vt axis versatio ab inferiori parte extendat. at vbi sa-
tis intenderit, impellere oportet, velut in alijs organis demonstrauius, aut extrahendo, aut sur-
sum compellendo: qui modi, cum ab inferiori parte extendimus, potissimum ad rem pertinent.
Placuit alijs per testudinem ita reponere. funē primo resoluunt, ipsum q̄ duplicant: cuius dupli-
cati capita per duo testudinis foramina trañciunt, à superiori parte deorsum, & ad inferioris axis
clauos alligant. attollunt itaq̄ testudinem prope superius transuersarium, tunc q̄ restituendum
brachium superinijciunt, cuneum q̄ in alam demittūt: post hæc brachium per palmam iuncturā
ad testudinē vinciunt. his ita constitutis inferior axis conuertitur, testudo q̄ à subiecto fune deor-
sum versus attracta ab inferiori parte ducit: quo pacto intentio quidem ab inferiori parte adhibe-
tur, sed humero ad testudinem alligato prohibetur conueniens impulsus.

Cubito in illas tres partes elapso vbi brachium curuatur, interiorem inquā, exteriorem, & po-
steriorem, iuxta organum ab omni parte præparatum stare æger super subsellium debet, atq̄ axis
conuertere sic, vt pars eius, quæ cuneata est, deorsum spectet: sursum, quæ equa: dehinc brachium da-
re super axē. quo facto humerus ad axē per palmam iuncturam deligandus est: brachio vero in vi-
cinia manus iniiciendus est laqueus inæqualiter extendens, eius q̄ capita sursum adducēda, & ad
alam, vel ad extans caput axis ē regione alligāda. brachio sic ad rectum angulum figurato habenæ
vel latæ fasciæ medium ad eā regionē detur, quæ proxime sub cubito est, cuius capita deorsum ad
axem porrigantur. Quod ad extendendū pertinet, ijdem modi conueniunt, quos, vbi humeri ca-
put restituitur, ostēdimus, nunc siquidem licebit vel continendo, & à superiori parte extendēdo,
vel in diuersa ducēdo vim adhibere: qua abunde adhibita eadē impellendi ratio accommodatur,
quæ tradita est, vbi de aliorum organorum motu pertractauimus. At si cubitus in priorem partē
moueatur, in quo casu brachium extēditur, membro superimposito humerus ad axem deligetur:
tunc Charchelius laqueus, vel alius æqualiter extēdens brachio iniiciatur, eius q̄ capita deorsum
ferantur, eadem intendendi ratio adhibeatur: post idem impellēdi modus expeditissimus, quē in
tractandis organis demonstrauius. Proprie autē spatha plurimum videtur ad cubitum restituen-
dum pertinere. Videamus autē, quo modo, vbi neq̄ cubiti in organo sint, neq̄ axis in alis cōtinea-
tur, opus hoc efficiendū sit. Funis igitur resoluitur, duplicatur q̄, & eius capita per duo foramina
testudinis à superiori parte deorsum trañcta, ad axis clauos alligantur. testudo autem cum spatha
prope superius transuersarium attollitur: dein spatha torquetur, & brachium super transuersariū,
cui lana circumdata sit, imponitur, humerus q̄ ad transuersarium per palmā iuncturam alligatur,
brachium vero ad spatham toto membro curuato. conuertitur igitur axis cruribus contentus, te-
studo q̄ deorsum versus à fune coacta spatham similiter deorsum adducit, sic q̄ ab inferiori par-
te intendimus. At, vbi satis extenderimus, aptat impulsus, quem paulo supra posuimus, si in exte-
riorem vel interiorem partem cubitus elabatur, adducendo: si in posteriorem, extrahendo. Porro
ab inferiori parte extendere possumus, impulsu autem, eo q̄ brachium deuinctum sit ad spatham
extrinsecus, prohibemur, nili, cum radix cuelli ex foramine possit, extrahendo impellamus. Ma-
gis autem accommodatur spatha, vbi cubitus in priorem erupit, quem si restituere velimus, fu-
nem demittere similiter oportet, sinere q̄, vt spatha dependeat: deinde membro superiniecto, hu-
merum ad transuersarium deuincire, brachium vero ad spatham: post hæc ab inferiori parte exten-
dere, vi, quantum res postulat, adhibita impellere, ante quidem premendo, tum circumducendo,
spatha cum brachio torta curuata q̄ premendi causa. Hactenus de cubito luxato.

Ex Ruffo Scammum Hippocratis.


XXIX.

Lib. d. Art. sect.
4. t. 49. 7^a. 289. h
Et lib. d. Fract.
sect. 2. t. 49. 7^a.
239. b. Lib. de
Art. sect. 4. t. 51.
& 55. 7^a. 290. b
c. f

Hippocrates maxime admiratione dignus multis in locis suū organum || ξύλον appellauit, in
quibusdam ēτ χεῖρας: recentiores id ῥάσπον, id est scānum, dixerūt, eo q̄ affixis cruribus &
pro organo & pro scāno vsi sunt. struitur autē sic. Paratur lignū sex cubitos longū, latū duos, nouē
digitorum crassitudine, resupinatur q̄: et quatuor alia ligna pedē longa extremis partibus rotun-
da, duo scilicet & duo cum eius extremis iuguntur. huiusmodi ligna, quæ φλαῖ ab Hippocrate
vocantur, in latitudine peruijs foraminibus pertunduntur, quibus continentur penetrantes axes
in medio clauos habentes, & in extantibus capitibus manubriola ductaria ad conuertendum.
totum lignum in medio vsque ad alteram partem quatuor digitorum spacio iniecto caua habet,
quorum altitudo pariter & latitudo treis digitos æquet. caua hæc Hippocrates καπέτους nuncu-
pauit.

A parit. Medium præterea lignum alte in quadratam figurā excavatur, quo scalmus demittitur, qui priapiscus vocatur. Alias item habet *ολιάς*, in medio ad similitudinem literæ Π, nō inutiliter adiectas. Structura igitur Palicrate auctore huiusmodi est, cui deinceps subdam, qua ratione moueatur scamnum Hippocratis: quod ubi vetustā structurā habeat, homine iacente, ad luxata omnia restituenda idoneum est, ut dum singula exequar, declarabo.

- Scamnum Hippocratis.*
- A Lignum quadrangulum sex cubitorum, latitudine bicubitali, crassitudine dodrantali.
 - B Postes breues axes habentes.
 - C Fossile.
 - D Lignum teres in medio cauo infixum.
 - E Postes pedales lignum transversum tanquam scilicet gradum continentes.




De Maxilla restituenda. X X X.

Maxilla excidente, siue ab altera parte, siue ab vtraque, homo resupinatur sic, ut caput iuxta axem, qui ab eius parte est, colloceat, brachijs ad pectus atque abdomen alligatis, cruribusque inter se, & omnibus ad scamnum organum deuinctis. tum capiti ea iunctura imponitur, quæ lepus auritus dicitur, eiusque sinus ad ea ligna, quæ proximum axem sustinent, ut retinacula sint, deligantur: media habena in os inditur, quantum potest intima, iuxta eam regionē, qua maxilla cum malis committitur, inter dentes maxillares, eiusque capita deorsum demissa ad axem, quæ a pedibus est, alligantur: aliaque habena media mentum complectitur, & in vtranque partem ultra caput adducta ad axē, qui super ipsum est, diducendi causa deuinctur. his ita constitutis, inferior axis torquetur, ut continendo, & ab inferiori parte extendendo, vis adhibeatur. Postquam intenderis, quantum res postulat, ad eos impellendi modos venies, quos in opere de articulis exposuimus. Si maxilla quidem ab vna parte exciderit, tria efficies, adduces, premes, & sursum compelles: sin ab vtraque, extrema mota fuerint, premere conueniet, et sursum compellere. Hæc de maxilla, nunc venio ad humeri caput.

D

- A Iunctura lepus auritus.
- B Sinus leporis deligati ad ea ligna, quæ sustinent axem proximum, ut retinacula sint.
- C Habena, quæ media in os inditur.
- D Capita habene alligata ad axem, qui a pedibus est.
- E Alia habena, quæ media mentum complectitur.
- F Habene alterius capita diducendi causa ad axem deuincta.



De Humeri Capite in alam prolapso. X X X I.

Vbiunque humeri caput restituimus, si in alam vel in priorem partem venerit, resupinare hominem debemus: si in posteriorem, primum collocare. Vbi ergo in alam prolapsus restituimus, cuneus eo immittendus est, sic, ut qua capitulum assurgit rotundum ac leniter cauum, Septima Classis.


SSSSSSS in

in

in priorem partem spectet: quā equus est, in posteriorem. expedit autem cuneum ut mollior sit, **E** linteos vel lana inuoluere: omne enim lignum (auctore Hippocrate) durum est & tactu lædit, atq; hac de causa potissimum lana circumdatur. adde, qd hæc sudorem absorbet, qui in ala oritur & ob curationis metum, & ob calorem eius partis naturalem, qui ad diducendum confert: & qd cuneum labi non patitur. Deinde funium capita, hæc quidem à priori parte, illa verò à posteriori super caput ad axem adducenda: media item habena sub ala inter cuneum & humerum danda est, vel (ut alijs placuit) inter cuneum & latera, eius qd capita ab exteriori parte attrahenda. Ipsi autem humero Charchesius laqueus, vel alius equaliter extendens, iniiciendus non quā laceratus est, ne cum nervosus sit, si adstringatur, doleat, sed supra vel infra, pleriq; superiorem regionem anteponunt tanquam magis idoneam, quod proxime ad articulum accedat, sed locus hic ad curationē minus accommodatur, prohibet enim rectum impulsus. Sub musculo igitur deligandum censemus, & ob hanc causam, & propterea qd locus, qui iuxta adstringitur, ægre laxatur, quæ vero mediocri interiecto spacio attrahuntur, facile sequuntur. Expedit autem, ut laqueus mollius insidat, humerum lana obuoluere, deinde laqueum iniicere: tubercula enim cubito subiecta prohibent, quo minus laqueus sub extendentium vi deorsum labatur. His ita constitutis laquei capita deorsum demissa è regione ad axis clauum alliganda sunt, vel circa ipsum obuoluta, vel nodo inter se deuincta, magis autem ad rem pertinent, ubi inter se alligata clauo circumponuntur, tunc siquidē opus suum firmitus præstāt. necesse autem est, vel continere, & seu ab inferiori seu à superiori parte extendere, vel per organi axes in diuersa contendere. Abunde vi adhibita, primum conuenit impellere, per duplicem habenam extrahendo: & eodem, quo extrahimus, momento cubitum altera manu ab exteriori parte in interiorem agere, in tentione adhuc manente: tum hac remissa laxata qd manibus sursum compellere. At si caput humeri in priorem partem moueatur, hominem supinum collocamus: pronum, si in posteriorem. cuneo qd omisso, medium duplicatæ habena lana inuolutum sub alam demittimus, capita que eius supra caput adducimus, non è regione humeri vitiat, sed versus contrariam partem, homine resupinato, si in priorem partem articulus exciderit. Quæ sit autem causa est, quamobrem id fiat. Palicrates quidem id propterea fieri dixit, ne humerus detineatur habena è regione sursum versus attracta: recētiore non ea de causa, capita oblique ducenda esse dixerunt, sed, ne corpora, quibus ala continetur, compressa lati scapularum ossis sinum impleant: nobis vero cum omnibus conuenit, capita oblique danda esse ad contrariæ partis ligna, quibus axis continetur. Rursus autem humero Charchesius laqueus iniiciatur, vel alius, qui equaliter extendat, eius que capita deorsum ad axem, qui à pedibus est, demittantur, ut **G** vel retinaculis adhibitis ab inferiori parte intendamus, vel (si placeat) in diuersa contendamus. Conuenit autem impulsus, quemadmodum supra declarauimus manibus præcipue adducendo, comprimendo que. Similiter autem ubi humeri caput in posteriorem partem moueatur, homine prono eadem moliri conuenit, que, ubi in priorem venit, tradita sunt. At ubi satis extenderimus, manibus premere, & adducere, & sursum compellere necessarium est.

- A Cuneus.
- B Funium capita ad axem supra caput adducta.
- C Habena media inter cuneum & humerum data.
- D Charchesius laqueus humero iniectus.
- E Laquei capita ad axem; qui à pedibus est, alligata.

De Humero



H

A

De Humero luxato comminuto cune.

XXXII.

Non nunquam accidit, ut prolapsio humero fractura quoque adueniat membrum medio comminuto, in quo casu recondere articulum oportet, & fracturam componere. Quod ad reponendum pertinet, retinaculo uti expedit, & a superiori parte extendere: quod ad fracturam, similiter uti retinaculo, & ab inferiori parte attrahere, sed ante restituere, quod prolapsum est, oportet: deinde, quod fractum. Ergo, ubi volumus, quod prolapsum est condere, cuneum in alam indimus, capita quoque funium super caput attrahimus, ac mediam habenam inter cuneum & humerum demittimus, cuius capita ab exteriori parte procedant. tum infra cuneum ac super fracturam charchesium laqueum iniicimus: eius quoque capita deorsum ad ligna, quae axem sustinent, ad retinendum, alligamus: sed funium capita ad axem, qui super caput est, vincimus, ut eo conuerso & contineamus, & a superiori parte extendamus. Neruis abunde intentis per convenientem impulsu articulum restituimus. quo facto laquei capita super caput data, retinacula fiunt: & alter laqueus aequaliter extendens, cuiusmodi charchesium est, humero iniicitur, cuius capita demissa ad axem, qui a pedibus est, vincuntur, ut & retinendo, & a superiori parte extendendo vis adhibeatur. neque nunc est, quod timeamus, ne fractura ab inferiori parte attracta repositus articulus excidat, siquidem, cum a superiori parte tam a cuneo, quam a superiori laqueo retineatur. Vt satis adhibita fracturam manibus componimus, quemadmodum saepius indicauius. Quod si humeri caput in priorem vel posteriorem partem venerit, ubi restituitur, eadem animaduersiones deliderat. Haecenus de humeri capite.


De Cubito.

XXXIII.

Cubito in illas tres partes elapso, in quas ubi venit, brachium curuum est, neque extenditur, anteriorem posteriorem & posteriorem, homo super organum resupinetur: quo commode figurato charchesium laqueus, vel alius aequaliter intendens, humero circumdetur, cuius capita, ut retinacula sint, sursum super caput vinciantur: brachio autem in vicinia manus laqueus iniiciatur, qui inaequaliter extendat, puta Attollens, Chiasus, aut Nauticus, cuius capita sursum adducta ad ligna, quibus axis continetur, religuntur, utrunque scilicet ad id, ad quod spectat e regione, sic, ut cubitus cum humero ad rectum angulum figuretur. tum duplicatae habenae, seu latae fasciae medium ad brachium detur iuxta cubiti iuncturam, cuius capita ad axem, qui a pedibus est, vinciantur. Datis igitur capitibus, laquei ad superiora, duplicatae habenae ad inferiora, binis quoque axibus vno super caput, altero iuxta pedes collocato, vim adhibebimus vel continendo, & a superiori vel inferiori parte attrahendo, vel in diuersa ducendo: ea quoque ratione impellemus, quae reponendo articulo idonea sit. ubi in anteriorem vel posteriorem partem conuertatur, adducemus: ubi in posteriorem, extrahemus. Quod si in priorem partem articulus elabatur, in quo casu curuari extensum brachium nequit, homo supinus iaceat in vitiatam partem inclinatus: brachio super scammum extento charchesium laqueus humero iniiciatur, cuius capita super caput procedant: extremo item brachio in vicinia manus alius detur laqueus, qui aequaliter extendat, cuius capita deorsum attrahantur: item eadem vis adhibeatur, nempe retinaculis, & intentione a parte inferiori. Equidem satius duco in diuersa contendere, nam hoc ad articulum reponendum efficacius est, quam si ab inferiori parte solummodo extendamus. oportet autem, cum abunde extenderimus, ad commode impellendum transire, premendo nimirum & circumducendo, premendo quidem intentione adhuc manente, circumducendo, postquam remissa fuerit. Condito articulo, ut eius restituti certa indicia habeantur, experiri oportet naturales brachii actiones, flexum inquam & porrectionem. praeterea situm in primum habitum ac supinum, quoniam, ubi huiusmodi actiones liberae sint, perfecte restituti articuli fidem faciunt. possumus & conferentes cum altero cubito. num ex toto luxatum restituerimus. colligere. quo perfecte restituto brachium commode ad rectum angulum curuetur, contineatur quoque in sequente curationem. Duo igitur brachii ossa, ubi suo loco mota sunt, his modis reuertuntur. sed potest seorsum utrumque etiam offendi, cum cubitus erumpat. radius diducatur, quod nunc quoque explicabo. Laxatur per se cubitus radio inuolato: dehinc seorsum radius, cubito in sua sede manente. utrumlibet horum ossium laxatur, ubi per hoc organum restituitur, humerus iniecto laqueo ad ligna, quae axem super caput continent, alligatur, extremo quoque brachio rursus laqueus circumdatur, qui inaequaliter extendat, sicut Attollens, aut Nauticus, cuius capita deorsum demissa intendendi causa ad axis clauos vincuntur. In circumdando laqueo, qui inaequaliter extendit, id obseruatur, ut sinus super eam partem, quae reponitur, capita super contrariam collocentur, siquidem laquei inaequaliter extendentes proprie illas partes magis cogunt, quibus eorum capita insident, minus vero contrarias. Ergo, cum brachium duobus ossibus contineatur, ubi alterum suo loco motum reponitur, cogere id potissimum expedit: & alterum, si fieri potest, non virgere. Intentione abunde adhibita, illi conueniunt impellendi modi, quos luxati genus postulat, siquidem cubitus in anteriorem partem venerit, utriusque manus digiti inter se iuncti ab exteriori parte radii eminentiam cubiti complectuntur, prominēiores quoque palmarum partes a latere dantur, ut his impellentibus quasi adducendo, os in suam sedem collocetur. At si cubitus ad posteriora radii proruperit, brachio aliquantisper curuato, eodem momento, quo ab inferiori parte extendimus, prominentiori palmarum

mae parte premere debemus, vt os in suam sedem reponatur. hac enim premendi ratio ad restituendum proprie aptatur. At vbi radius in priorem partem recedat, extento brachio perinde agere conuenit, quasi vtrunq; in eandem partem excefferit. adhibenda itaque vis est & continendo, & ab inferiori parte extendendo. quo abunde facto duplex impulsus accommodatur, & qui premit, & qui circumducit: qui premit, intentione manente: hac remissa, qui circumducit, vt ostensum iam est. Commune est vtriusque, vbi restituta fuerint, spectare, an brachium suo munere sine impedimento fungatur, curuetur nimirum, & extendatur, & supinum primum, que figuretur: quae actiones, si liberae sint, ex toto restitutum esse testantur. quo facto brachium, in sequentem curationem ad rectum angulum collocetur.

- A Charchesius laqueus humero iniectus, cuius capita sursum, vt retinacula sint, adducitur.
- B Attollens laqueus in vicinia manus, cuius capita ad ligna, quibus continetur axis, religantur.
- C Medium duplicatę habentę ad brachium datę.
- D Capita duplicatę habentę religata ad axem, qui a pedibus est.



De Manu.

XXXIII.

MANUS in quatuor partes prolabitur, in interiorem, exteriorem, priorem, & posteriorem. G
Oportet, si in interiorem partem veniat, supinam collocare, super scamnum homine similiter resupinato, pronam, si in reliquas tres partes elabatur: deinde Charchesii laqueum vel aliud aequaliter extendentem brachio iniicere, & super sinum manus dare vectem transversum: vel ferramentum, quo adurimus, ad palmam ipsam deligare eo vinculo, quod, Ad extremas partes, inscribitur: tum vectis vel ferramenti extremitatibus iniicere vel medias habenas duplicatas, vel laqueorum inaequaliter extendentium sinus, deorsum q; demittere: atq; alterum laqueum aequaliter extendentem brachio circumponere, eius q; capita super caput adducta, vt retinacula sint, de uincire: quae vero deorsum ferebantur capita extendendi causa ad axem, qui a pedibus est, religare, vt eius conuersione & contineamus, & ab inferiori parte extendamus. quam rem vbi satis praestitimus, conuenienter impellimus. Nunc autem maxime ad manum restituendam pertinet adhibito retinaculo, ab inferiori parte extendere: licebit praeterea & sursum adducere, & in diuersa contendere. nervis abunde diductis impulsus necessarij sunt, qui eam compellere in suum locum possint. Quod si in interiorē vel exteriorem partem exciderit, prominentiori parte palme, aut etiam calce superdato pressa ossa coguntur, deinceps manus iuxta digitos huc atque illuc agitur: sin in priorem vel posteriorem partem eruperit, vtiliter adducendo impellimus. H

De Spina luxata.

XXXV.

Hippocratis organum luxatis omnibus restituendis accommodatur, sed praecipue spinę: quae, vbi gibba facta est, tunc maxime curari posse censetur, cum recens ex ictu vitium est. Collocatur igitur homo pronus super scamnum, vt laquei capita e regione ad axem ferantur: circumdantur spinę laquei duo aequaliter extendentes, vnus supra gibbum locum, alter infra: aut quaterni ex iis, qui inaequaliter extendunt, bini a superiori parte, totidem ab inferiori, inter se aduersi iniiciuntur, vt in opere de luxatis explicauimus. Vis nervis adhibetur potissimum in diuersa deducendo, interdū tamen continendo, & vel ab inferiori, vel a superiori parte extendendo. Intentione abunde adhibita, ille impulsus, quo premimus, accommodatur. Hippocrates varios tradidit impellendi modos, & per prominentiorem palmam partem, & per spatham premendo idoneam. Impulsus per huiusmodi spatham illis restituendi modis annumeratur, qui facile comparantur: extremitas enim spathę in fossam aliquam demittitur, vel in lignū excauatū. Nos, vt spathę obex opponeretur, Hippocratis scamno Π-ferreū adiecimus, quod & extrahi & infigi posset, & spathę rinderet, pertusum q; pluribus foraminibus esset, & in foramina crurū organi demitteret, vt

A ut Π pro gibbi magnitudine accommodaretur, spatha^a que extrema in Π coniecta, eius partem premendo accommodatam super gibbum dantes premendo impulimus. Alij duplicata^a habenæ mediū organo subiicientes eandem spatham super locū iniectam premunt. Premendi modū in opere de articulis exquisiti^{us} indicauimus.



- A** Laqueus equaliter extendens supra gibbum, cuius capita recta ad axem feruntur.
B Laqueus equaliter extendens infra gibbum, cuius capita recta ad axem feruntur.
C Spatha.
D Π ferreum.

B

C

De Femore.

XXXVI.

Femur in quatuor partes promouetur, in interiorem, exteriorem, priorem, & posteriorem. Si in tres partes prolapsum est interiorem, exteriorem & priorem, crus extensum est, implicari que non potest: si in posteriorem, curuum est, neque extenditur. Ergo, si in illas tres partes erumpat, in quas ubi venit, crus extensum est, resupinato homine medium duplicata^a habenæ lana inuolutum inter anum & naturale demittendum est, capita que eius super caput adducenda. Vbi in alias partes venerit, nullo interpolito discrimine inter anum & naturale dari habenæ debet, sed ea animaduersione, si in interiorem partem exciderit, ut ad integrum femur magis spectet, ne femoris caput, cum extenditur, habenæ media detineatur: cuius capita vel ad axem alligentur, ubi in diuersa contendimus, vel ad ligna, quibus axis, qui a capite est, continetur: ubi & retinemus, & ab inferiori parte extendimus. Extremo autem femori prope genu Charchesius laqueus iniiciatur, eius que capita deorsum demissa ad axis clauum vinciantur, ut eo conuerso & contineamus, & ab inferiori parte adducamus. Nervus, quantum res exigit, intentus veniendum est ad impulsus.

De Femore in interiorem partem prolapso.

XXXVII.

Proprie autem ad femur in interiorem partem prolapsus excogitata sunt ligna ad similitudinem Π a lignis, quibus axis continetur, non abhorrentia. Vbi ergo femur in interiorem partem erumpens restituitur, ager in integrum latus versus iaceat, euulso que priapisco integrū crus proposito ligno subiciatur, alligetur q^{ue} ad scamnum ita, ut immobile perseveret, eadem que ratione & brachia & reliquum corpus: crus autem vitiatum detur super transversarium lignorum, quæ Π literam repræsentant, ita, ut transversarium inter anum & naturale collocetur: sed extremo femori iuxta genu iniiciatur laqueus, vel Charchesius, vel alius, qui æqualiter extendat, eius que capita ad inferiorem axem demittantur: super ipsum vero lignum Π literam repræsentans sub crure, quod restituitur, detur spatha, quæ premendo aptatur, vel lignum habens in summo capitulū rotundū ac leniter cauum, ab interiori parte a summo crure ad imum pertinens. Quo facto, ubi restituere volumus, axis conuertitur, cuius conuersio ab inferiori parte extendit^{ur} postquam

postquam nervi abunde extenti fuerint spatha vel eo ligno, quod in summo capitulum habet, super id lignum, quod Π literam refert, cum crure magna vi deorsum adducto, impulsus extrahendo adhibetur: post quem alius idoneus est, qui sursum versus compellit, quemadmodū diximus de humero in alam prolapsō.

- A Postes Π literam representantes.
B Transversarium.
C Charchesius laqueus.
D Lignum à superiori parte cruris ad imum pertinens.



De Femore in posteriorem partem prolapsō.

XXXVIII.

Verum, si femur in posteriorem partem elabatur, neque primum neque supinum hominem collocamus, sed sedentem, magis autem in integram coxam inclinatam. Homine ita figurato, duas prehendere habenas oportet, earumque vnam simplicem extendere, atque alteram duplicem demittere in mediam simplicem: & simplici quidem hominem cingere, duplicem à superiori parte deorsum demittere, ab ea regione, quæ umbilico proxime subiicitur, ad eam, quæ inter anum & naturale est, & per anum sursum adducere, ut quatuor habenarum capita à posteriori parte ad retinendum vinciantur. Retinaculis datis lata pars spathæ, quæ premendo accommodatur, coxæ supponatur, imò quæ femori iuxta genu laqueus iniiciatur, qui æqualiter extendat, cuius capita ad inferiorem axem demittantur, ut eo conuerso & contineamus, & ab inferiori parte intendamus. Intentione satis adhibita, dum adhuc intendimus, caput femoris per spatham in exteriora propellatur, aperta quæ manu æger resupinetur, per hanc enim vim femur in suum locum compelletur. Repoliti autem indicium erit, comparatio cum altero crure, & liberæ ipsius actiones: nam, si citra impedimentum complicari & extendi potest, ex toto intus esse coniiciendum est.

De Genu.

XXXIX.


Genu in tres partes prolabitur, interiorem, exteriorem, & posteriorem. In omnibus his casibus, crus extensum est, & minime complicatur. Oportet, si in exteriorem partem prociderit, hominem extento crure super scamnum collocare: tum duos laqueos æqualiter extendentes, cruri iniicere, alterum à superiori parte super femur, alterum infra genu: dein capita superioris super caput adducere, inferioris ad axem: nervosque intendere, quemadmodum in reliquis articulis dictum est, siue retinaculis vli ab inferiori vel superiori parte intendamus, siue in diuersa diducamus. Nervis abinde diductis, si in latus ab inferiori vel exteriori parte motum fuerit, ille impellendi modus conuenit, qui adducit: si in posteriorem, & ille qui premit, & ille qui circumducit, qui impellendi modi, cum similes illis sint, qui ad cubitū traduntur, commode in hunc locum transferuntur.

De Talō.

XL.

Talus modo in interiorem partem procidit, interdum in posteriorem quoque conuertitur: in quas partes ubi venerit, æque resupinare hominē conuenit crure extento: ac cruri Charchesium

A chesium laqueum æqualiter extendentem circumponere, eiusque capita à posteriori parte ad axem, qui supra caput est, adducere: talo autem draconem vel sandalium laqueum iniicere, eiusque capita ad anteriorem axem alligare, tunc quæ membrum vel in diuersa diducere, vel continere, & ab inferiori parte extendere: Nervis, quantum res postulat, diductis conuenienter impellere, ubi in anteriorem vel posteriorem partem eruperit, retro cogendo: ubi in posteriorem, extrahendo, nunc siquidem ob eum habitum impulsus extrahendo aptatur. De modis autem impellendi diligentius tractabimus in opere de luxatis.



A Charchesium laqueus.
B Sandalium laqueus.

SEPTIMAE CLASSIS

FINIS

aaaaaaa bbbbbbb cccccc dddddd eeeeeee fffffff ggggggg

hhhhhhh iiiiii kkkkkk llllll mmmmmm nnnnnn

oooooooo ppppppp qqqqqq rrrrrr sssss ttttt

vvvvvvv xxxxxx yyyyyyy zzzzzzz

AAAAAAAA BBBBBB CCCCCC DDDDDD EEEEEEE

FFFFFFF GGGGGG HHHHHH IIIIII KKKKKK

LLLLLL MMMMMM NNNNNN OOOOOO

PPPPPP QQQQQQ RRRRRR SSSSSS

Omnes sunt quaterniones, præter yyyyyyy zzzzzzz quinterniones, et

AAAAAAAA BBBBBB SSSSSS terniones.




VENETIIS APVD HAEREDES
LVCÆ ANTONII IVNTAE.

232

1881

THE
OFFICE OF THE
TREASURER
OF THE
UNITED STATES
OF AMERICA
WASHINGTON
D. C.



UNITED STATES OF AMERICA
WASHINGTON

